

India Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS NO. 581.9 (595)
BOOK NO. RHE-h v.3.
ACC. NO. B2398

HORT. BOT. REG.
S CALCUTTA 19

v*V|

The Rariss. Curios. Botan. Jardin,
H O R T I
I N D I C I
M A L A B A R I C I
 PARS TERTIA
^{D E} *Malabar*
A R B O R I B U S
 REGNI MALABARICI,

Latinis Malabaricis, ^trabicis^ & Brachmanum Charatferibus nominibusque exprefſis,

Unā cum Floribus, Fm&ibus & Seminibus, naturali magnitudine à peritissimis
 pi&oribus delineatis, cV ad vivum exhibitis-

*Addita infuper accurata earundem defcriptione, quā colores, odores, fapores, facilitates,
 & prcipu<£ in Medicina vires exaclifimè exhibentur.*

A * D O R N A T A

'Per Nobiliſimum ac Generofijmum C.D. T.'

HENRICUM VAN REEDE, TOT DRAAKESTEIN,

Toparcham in Meydrecht, quondam Malabarici Regni Gubernatorem > supremi Confeſliis
 apud Indos Belgas Senatorem Extraordinarium 3 nunc vero Equeſtrisordinis nomine
 Illuſtribusac Praepotentibus Provincial Ulcrajeſtina! Proceribus adferiptum,


E T

J O H A N N E M M U N N I C K S, M. D.

In eademquefacultate Anatomes ac Botanices in Academia Ultrajeſtina
 ProfefTorem, & Reip.Ultraj.Poliatrum^

Nottis adauxitt & Commentariis illuſtravit

J O H A N N E S C O M M E I N U S .




AMSTELODAMI,

Sumptibus Vidux JOANNIS van SOMEREN, Hs:redum JO ANNIS van DYCK,
 & tienrigi Scvidua? THEODORI BOOM.

Anno CID lac Lxxv.

the haub fayrouys ottawer. Pars v. Calm



HORTI
^INDICI MALA.BAKICI
Pars terlia
dt
VHIIDKI B! S.

AM1STELOTJAMI. Sumptibus JOAN M^{IS} VAN SOMEREN & J^{AN} WIS VAN DYCK.
{ KVJULI et 'idw' TIM:ODORI BOOM A'1 >r->cr,xxx II.

PRIMA&10 NOB/LI IN MALABAR.

POTENTISSIMO PRINCIPI
NOET A VILE - VIROLA
R E G • I

Pedinbodappe-Sourowan, Courour, Peratevidc,
Ellerta-Sourowari, Cochin, &c

S. T. T>:

HENRICUS VAN REEDE TOT DRAAKESTEYN.

*[Redacted] j Uoties CMalabarkas ftirpes animad-
I verio, toties mihi colleffionk, dept&io-
: nu dc dejcriptionū occafw ante oculos
! verfari videtur: Eorumque memoria
quorum ope in colUgendo uetus fui, fd-
piw recordor. ^4t majejlatis tua, ingentu Horti
tJMalabarici Domini, nōmen prafertim in men*
Jem venit; moxque tanti beneficii, ac amoris recor-
datio, quibus Majejlas tua > ejusque jubditi & vici-
ni <> me femper profequutifutre, renovatur: quorum
āuxi/iq, & opernihie ex immenso arborum) fruti-
cum, ac plantarum numero hortulum hūm cdllichen-
di pot est as fuit. Si his impulfus fpatium prateriti
temporis refciām, cumjor tun a iua vexatte, fun-
ditmque everfee, exilii foliatum queere coa&us
ejfes, Majeftatis tua dignitas memorise me <c, egre-
gium*

D E D I C A T I p.

gium constantice exemplum, & RegUindolisfigna
prof erf; Cel fo ac nobili tuogenere digna, quod per
duo mille, & quingentos annos fuppeditavit fucce-
fwe Ind\$ a Reges: Tun enim recorder, quo tiestum
taatisaç ocultis, turn lndt&is & apertis hofibus,
exaltijpmo Reg^digmtatisgradupraapitatus, a
jubdms expu/fus, exulagerecoattusfuifti. Fortu-
na ita adverfa, adeo te constante fuiffi miratu
dignum, ut neque honor um direptio, neque dhitia.
rumpnvatio Majeftatem tuam permoverint: ne-
quetunc, cumin Celjam&prijtinamdimittatis
fedemreftitut, ac-tottantxque Reyonis Regemte
coronan viderem. Cum namque in maxim as ca-
lamitatis tenebras <JltajeJlas tua effet conjecta,
atque inadverfufmeu Uo remedio aliquandum an-
Met, poftea feliciter Belgarum ope, omnibus ho-
fitbus JubaBts, tantis vicloriis ad Regix dignitatis
Solutmadfeendit: ^otemporeper(mendeciman-
no, me tua CMajeftati.fervire fortunapermifit.
Hijce ommbus ad gratias impelkr, ut non folum
Majejiat tua, fed omnibus notum Jit, quod neque
Mjentia, neque locorum diverfitas, honorem, quern
P'e/totumvit curfum Majefiat Ucedebam, per-
dere valeant. Eas obcaufat CMajeftati tuab ac de-
picta Horn Mala baricipars offertur, qua cum no-
mine Majeftatis tua exordiens per totum verfabili-
tur orbem, & Majeftatem tuam inter <Duces ac
frmici pes cuicunque Reipubliccc Moccenates nume-
rari va kbit.

V I R I NOBILISSIMI,
H E N R I C I V A N R E E D E
VAN DRAAKENSTEIN,&c.&c.
A D
BENEVOLOS LECTORES
P R E F A T I O:

*In qua ratio redditur operis hujus, necnon obiter muha noH protnta
de Brachmanibus & M.alabaribus eorumque religione, politia
ac, moribus admifcentur.*

 I qui funt, qui me norunt ac pulcre perfectum
habent, me ab ineunte quarto decimo m^tx
artatis anno nihil aliud egiffe, quam extra pa-
trios fines peregrinatum, & pene maximam
orbis partem continuo itinere permenfum fuif-
fe 5 illi, inquam > non poflunt non novifle, me
nee eruditione varia & recondita, nee Botanices, nee aroma-
tum fimpliciumve medicamentomm accurata cognitione flo-
rere; quam fcientiam uti quis nancfcatur, illi peromnes fuse
vitas dies huic uni rei diligentiflime incumbendum fore crede-
rem, qua tamen felicitate ipfegavifus nonfum, qui alio vitae
genere tantum non perpetuo fui occupatus. Has ob rationes,
hifce, quos dixi, hominibus abfursum admodum videtur,
quod in fronte HORTI MALABARICI meum nomen ex-
ftet ³ qui liber perfequitur exoticas plantarum defcriptiones,
earumque in Medicina ufum: Neque fine ratione abfurdi me
arguunt, putant namque fi mala fide, temere, ac arroganter id
peregerim, nihil mihi fuperfore, prater ignominiam.

Alii., qui me non norunt, & forte majora fibi de me polli-
centur, quam prasftare poiTum, illi procul ullo dubio erunt
perfuafi³ prioreshosduostomostotum H O R T V M M A L A .
BARIC V M confituere, aut fi benignius fentient, fcatere cre-
dient librum magni momenti erroribus, & nullo ordine edi-
tum.; quod nemo non exfpe&at, fi illi ad edendos librosani-
mum appiicent, quido&rina nonpollent. OffFendent etiam
nonnullos barbara & ignota exoticarum plantarum nomina;
gcomiffieearumcumEuropasis convenientise Sccomparatio-
nes: omiffo itidem Dodiffimorum Virorum laudationes, qui

* * ali-

aliquando de his plantis scripferint, aut eam mentionem fecerint, malealioshabebunt, quihorurnyivorum teilirnonio has pfantas in rerutn exifere naturaferio perfuafuri fibi fuiflent. Erunt etiarn[^] quibustsediofae emnttot indefcribendis plantis minutiae, quarum fane quamaccuratamrationemhabuimus: Culpabunt forte etiam nonnulli, nos in perfequendis plantarum defcriptioribus iis verbis ufos non effe, quibus Botanici eruditiores has illasve plantarum partes infignire ex artis fuse more confuevere. Sic 6c alii alia, qu# quidem ipfimet non diffiternur, criminabuntur.

Ut ergo 8c his 8c mihi fatisfaciām ipfi, abfurdum fore non credidi, si prima H O R T I M A L A B A R I C I initia, progefum & fucceffum a capite ad calcem, quod ajunt, paullo diligentius repetam. Non enim dubito, quin candidi rei herbaria[^] aeftimatores non folum admiraturi fint, fed 8c grato animo accepturi, quod tot exoticas ignotasque plantas luci damus, ex regione 8c notiffima 8c multis frequentata, 8c quam Lufitani per centum 8c feptuaginta admodum annos coluere₅ 8c magniſlcis urbibus exornavere > mirabuntur, inquam, 8c grati r-ecolent, has plantas jamprimum in theatrum spedandas proferri ab eo, qui aliis 8c majoris momenti rebus occupatus potuiffet eo labore fuperfedere. Verumen imvero quia ea eft faeculi noſtri 8c Europe felicitas, 8c doſtorum copia, ut typographic jam videantur commercia, quas Terrarum orbem innumeris libris replent 3 hinc quoque orta eft crambe centies milliesque recoda , qua plerique mutatis nonnullis verbis₅ ordine parum variato ex charta in papyrus alienos priorum labores exſcribunt, 8c pro fuis ambitioſiflime edunt 5 unde non mirum, quod plerique eruditiores nihil magni faciant, nifi guod aliqua novitate fe commendet, cum vetera iis (int cognitiffima: Damus ideo hoc noſtro opere amplum exſcriptoribus campum, in quo plantas legere poſtunt, easque generali plantarum indici inferere, quae in noſtro orbe hue uisque innotuerunt.

Pofte aquam aliquammultis annis apud Indos fuifTem, 8c pro ratione ejus, quam ornabam, fparta[^] faepius mihi itinera facienda effent per cultiffimas regiones , obiter mihi notavi fylvas 8c amplas 8c arduas 8c denfas; notavi eas mira arborum varietate jucundas, ita ut duas ejusdem generis arbores in eadem fylva reperire difficile quseilturo foret: notavi arbores plerasque cindtas 8c implicatas aliis plantis, quarum aliae radice interram defixa am fecerant cum arbore, cui implicabantur,

tur, mixturam, ut vix difcernere eflēt: notavi faspius tales (ut itageneratimloquar) hederas plures 8c diverfi generis arbori uni adhccrescere 5 8c prater has fuccrefcere in ipfis arborum rafnis, nee non ad caudicis trūcum alias atque alias plantas, ita ut fpe&aculo longe jucundiflmo f^pifllme in una arbore ex-biberentur decem duodecimve diverfi generis folia, flores, firu&us: neque tamen hax ulloerant impedimento, quo minus caudices harum arborum eflēt bene fpiffl, & largiflma* craffitie 5 aut quo minus arbores illas proceritate eleganti ad L x X X. faspius pedes [vulgaris menfura] capita fua in auras efferrent, circumcirca omnis generis virentibus herbis, itautnihil intactum relinqueretur, ornatae 5 rami etiam undequaque patuli 8c umbrofi afcendebant tandem in faftigium ampliflimum, 8c planemirificum 5 imo nonnunquam defcendebant ac terra feraciſllmaedenuoinfiti repullulabant ac germinabant. Videres in una ejusmodi arbore magnificum, elegans ac amoeniflimum palatum, cujus fornices tot columnis fuftinebantur, quotramos cerneret 5 atque in tali palatioplurimi latere commode poterant, vitand# aëris injuriae caufa, imbrum puta 8c asftus Solis nimii, atque ita hx fylvae potius elegantiflmas ftrucl:ur<< domus, quam inculta nemora videbantur. Neque folum terram feraciorem perplana porredam fie ornatam animadverti, fed 8c horridas rupes , 8c prsecipitia montium comata ejufce-modi fylvaluxuriare, quinimo fteriliflmas etiam petras nihilominus laetiflma arborum herbarumque fegete iuperbas, quarum quaedam plants cacumen obfidebant, quaedam rimas fecerant, in quarum fifliiram radicem inferebant. Omnis ager, 8c campus per plana decurrens adeo laeta omnis generis pkn-tarum arborumque (quod fupra de fylvis dixi) fertilitate ridebat, ut quaevis etiam pars curiofacujusdam Hortulani manu culta , 8c elegantiflma ferie digefta videretur. Etiam ipfa ftagna, quod mirere, paludes, imo littora fluviorum falfam aquamvehentiumoftendebantvariasplantas, quibus tantum non plane tegebantur. Cjud multis > iiulla vel minima foli portio, etfi fterilifllmi, erat quat non aliquas plantas oftentaret.

Hxc quum omnia identidem animadverterem, ilia me in eamadduxerunt opinionem, ut non fine ratione exiftimem, hanc Indian partem jure meritoque eflē totius Terrarum orbis fertiliflmmam, 8c fere maxima ex parte respondentem Infulae Taprobanae (qu#C^/ <?tf hodievocatur) inprimis illi portioni, q\xx fub eodem, ac Malabarar regionis, climate eft fita.

Saepius meinceffit lubido explorandi ac inquirendi harurn, plantarum folia, flores, cortices, radices; ibiquetumplerunque deprehendi ilia effe odoris fuaviffimi, & faporis penetrantis j & quum ex indigenis quasrerem , qui me in itinere faciendo comitabantur, plantarum harum fiquidnoffent, illi turn non nomina folum indicabant , fed &: vires & ufum earunt pulcerrime callebant, id quod obiter sepius expertus furn, fi. ubi quis nofrorum comitum malo quodam five interno, five externo laboraret, licet nee Medicinse, nee Botanices cognitione eflent prsediti , hi Indi , ut qui omnem «tatem terunt five militia, five agro colendo, five opificiis.

Injucundum aut abs re fore non arbitror, quoniam mentionem facimus horumIndorum, hujusqueregionis, *hxc* paullo accuratius Ledoribus si referamus, quibus operas pretium fuerit haec nofra legiife.

Malabarica regio ab uno latere mari cincta > ab urbe Goa.ad promontorium Comorinum, in longitudinem circiter centum & viginti milliarium Germanicorum patet, latahincindedecem, triejntave plus minus milliaribus. Ipfā regio tanta hominum ftequentia colitur, utvideaturnihileflealiud, quam continue urbes, pagi, horti. Variis paret principibus quibus subjedi sunt plures quamtresmyriades, feu, utliquidoconflat, unum & triginta millena millia nobilium, foli militiam natorum -, ut taceam innumerum ilium caeterorum hominum numerum. Vivunt ad capularem fere fene&utem, eorumque valetudini proficiunt indigene Medici, qui ex aliis regionibus medicamentanonpetunt, aut certe quam pauciflma, illis foliis , quas ipforum regio liberaliter fuppeditat, contenti; quern morem Europasi ibidem locorum feliciflime imitantur: Belga^ vero qui ibi sub aufpiciis Societatis Orientalis Indite morantur, nefcio qua ofcitantia utuntur medicamentis, quae primum ex illis locis pctita per Perfiam Arabiamque in Europam deferuntur, &: hinc denuo mari in Indiam referuntur, fere obfoleta & corrupta,- nonfine fummafumtuum jadura, qui huic rei fine ullo commodo impenduntur.

Hx ideo & similes rationes me impulerunt, ut votis fummis expeterem hominem huic rei aptum &c idoneum, qui data opera hujus regionis plantas vivide delinearet, easque describendo explicaret, additisviribusearumqueufu: ipfe videlicet mihi perfuadebam, quod si *hxc* res fucceffu non frufraretur, multis Botanies studiofis in Europa placitaram > nee minus emolumen-

mentum redundaturum ad Illufrem Indiae Orientalis Societa*
tern, quippe quae poffet fumibus illis fuperfedere, quos in me-
dicamenta illuc locorum transportanda impedit: poffe enim
geminorum fumtu, & majori cum fru&u Indica medica-
menta in ufum vocari, aut eadem, aut certe viribus paria, fi-
non, ob diciras rationes, fuperiora.

Sed enim haec res votis perficinon poterat. Malabaricam
namque regionem nemo petit, ut huic rei incumbat, fed omnes
sub Aufpice Illuftri Societate Indian Orientalis illuc profecti
ita coguntur fui officii accuratam habere rationem, ut nihil
illis fuppeteret otii ad hanc rem, etiamfi vellent, perficiendam :
quare haec me via omnino febellit hujus tarn egregii operis ali-
quando in aftum deducendi. Tandem, quum hujus operis
perficiendi {pern tantum non abjecit} Tem, ad aures meas acci-
dit, in ditione Regis Cochinenfis degere Virum quendam,
prasditum fumma plantarum Indicarum notitia, quas ad vi-
vum delineaverat. Hie, quern modo dixi, Vir erat fummas
eruditionis, vita3 auftera?, fexagenarius xstate, profefllone Sa-
cerdos Pontificius ex ordine Carmelitarum Difcalceatorum,
diftus nomine Frater Matthasus de SancTro Jofeph, natione
Neapolitanus : hie multos arinos in Arabia & Perfiavixerat,
& turn temporis miffus erat Coadjutor futurus Archiepifcopi
Chriftianorum S. Thomas regionum Malabaricarum. Arcet
fitus reverendus hie Vir ad me venire non dubitavit in urbem
Cochinenfem, &, ubi meum fcopum intellectiflet, fcilicet ut
fieret recenfio ac defcriptio plantarum Malabaricarum , in
quam rem meam opem pollicebar reverendo huic Patri 5 ille
humaniffime ac promptiflime officium fuum mihi vice verfa
detulit, &c una oftendit rudimenta plantarum, quae antea in
flias memoriae fibfidium calamo atque atramento delineave-
rat , fcilicet cujusvis plantar unum folium, florem, fructum,
quorum maxime notaverat vires, quorumque ope piiflimus
hie fenex in itinere suo turn fibi, turn aliis quamplurimis opem
tulerat.

Itaque prima hujus horti initia fuerunt, ut ex rudimentis
plantarum in aliam translati chartam fieret earum exaclrior de-
lineatio, curante Rever. Patre Matthseo, qui fola memoria
fretus naturales plantarum figuris mirum in modum ex rudi-
mentis expediebat 3 fed enim, quum omnia calamo idque fu-
perficie tenus signaret, penicilli utique ducendi ignarus ideo
pidhira minus refpondebant vivis plantis} hue accedeh

quod pates plantarum minores nequierint accurate exhiberi, aut faltem per transennam, ut ita veras & spirantes plantarum figuræ minime exin cognoscere eiTet, prasfertim quum in picturis **illis** calamo fa&s neque lucis, neque umbraa ratio paullo accuratior habita fuerat. Scilicet opus fore non putarat optimus fenex, majorem & accuratiorem in pingendis defcribendisque hifce plantis operam collocare, quum memoriae fuæ ope facile obvias plantas earumque vires ipfe pernoffet: accedebat praeterea, quod *hxc* in itinere fere confecta eflent rudimenta, ita ut faepiufcule aut huic plants fructus, aut illi flores, aut utrumque aliquando deeffet.⁵ quern tamen ego defedtum promea virili emendabam, plantas ipfas inquirendo & deilde-rata supplendo: plures tamen reperta? non funt, five quia nomina accurate non notaffet, five ilia accepiffet venerandus fenex ab hominibus , qui communia plantarum nomina, queis unamquamque Malabarici Botanici infigniunt, nefciebant, five quia erant alius climatis plants. Haec fere impedimenta M A L A B A R I C I H O R T I initia turbabant 5 inter qu^e hoc maximum, quod fi conferres figuræ ipfis plantis, vix dixiffes, ex iis effigiem effe expreffam, ita male responebat. Quantum ad defcriptionem, ilia fubinde perfundtoria ac fugitiva diligentia adeo male cohasrebat, ut pluribus plantis convenire potuerit, licet diffimillimis.

His tricis impeditus quum hasrèrem, ex infula Ceylonenfi ad Malabaricos accefhit Cl. V. Paulus Hermannus, M. DocT: cum maxime in Illuftri Lugduno-Batava Academia defignatus Botanices Profeffor 5 hie quum vidiiTet noftri Horti initia tot laborare impedimentis , & minus accurata ratione cum defcriptionum, turn figurarum, modeftiffima humanitate 110-bis significare vifus eft, hacrationelibrumalicujusmomenti vix fore. Veruntamen brevitas temporis illius , quo mihi aderat, inculpafuit, quo minus, aut ego illi mea colleftanea Horti Malabarici communicare, aut ille me prudenti confilio in hoc opere adeo perplexo juvare potuerit. Haec cum itafe haberent, animus tulit, rem omnem denuo ordiri, ac memet ipfe contuli, ad plantas pro mea virili defcribendas , atque Hortum huncaliomorecolendumj fed vix cooperam, quum animadvertisquantom mihi fit impedimento illud, quod fuftinebam, officiumj cuius ratio mihi etiam horarum momenta difpenfabat, ut ita vix Horto colendo pro dignitate vacare potuerim.

Nee eft, quodquisquampacet₅ hxc narrari, ut labores & honestissimi conatus Rev. Patr. Matthsei eleventur sed potius contra. Huic enim Viro honestissimi vitas & non fucatse pietatis gratias quas possumus maximas habemus, qui nos adeo candiae, fideliter, & improbo labore juvit. Quin imo in eum finem Optimus hujus Virimeitionem facimus > ut oftendamus memoriam ejus apud nos eTe 8c fore Temper venerandam, ejus in nos amorem 8c voluntatem grata recordatione recolendam : hunc, inquam, primum hujus Horti conditorem₅ & au&orem, nee non in progreffu fedulum cultorem ingenue profiteor 5 hujus tandem confilio, utpote semper Sacro officio, cuius caufla illic locorum morabatur, occupatissimi_y in partem laboris follicitavi Virum admodum Reverendum, Johannera Gafearium, V. D. in Ecclesia qu^A Christo in urbe Cochin collitur vigilantissimum ministrum, Virum in omni eruditione, folam Botanicen si. exceperis, verfatissimum, cui studio nunquam operam dederat, unde verebatur, stylum suum, quem propria illa Botanicorum & Medicorum vocabula fugiebant, non fore est dignitatetantioperis. Attamen, multis & oravibus cauffis perfuafus in partem oneris ferendi confenit.

Ordinem, ut opus hoc fine tricarum molesta mora promoveretur, hunc observabam. Medici nonnulli, tam Brachmanes quam aliis generis, meo juflii notissimarum & celeberrimorum indices plantarum suo idiomate conficiebant, ex quibus iterum alii plantas dividebant, pro ratione tempeftatis, qua velfoliis, velfloribus, vel fructibus ornatae conspiciebantur j harum catalogus pro ratione temporum anni certis hominibus dabatur plantarum peritis, quibus cuvx illud erat demandatum, ut nobis plantas cum foliis, fioribus ac frudibus undecunque defnum conquirerent, etiam confeenfis altissimis arborum faftigiis, hos partibus factis plerunque ternis ad has illasve fylv^As ablegabam. Pidores tres, quatuor, qui mecum habitabant in loco commodo e vestigio vivas accurate depingebant plantas a conquifitoribus mox allatas, quibus & me fere prxfente defcriptio addebat. Praeterea omnes Principes Malabaricos humanissime rogaveram, ut amice nobiscum communicarent plantas & forma &c uero celebriores, qua re fadum eft, ut fubindequinquaginta exaginta veleucis plants ad nos perlatse fuerint, & ut nullus Regum illorum Principumque fuerit, qui in noſtro horto aliquos flores non fevii Tet. Plantas itaque per Botanicos conquifce, per Pidores depidas, per ido-

neos homines descriptas, fiquidem opera erat pretium, exameni Medicorum ac Botanicorum peritiorum, quos in eum finem convocaveram, tarn ex familiaribus, quam celebritate nominis aliqua notis sub jiciebantur. Scilicet huic Collegio, quod nonnunquam quindecim aut fedecim doctris conftabat, exhiberi curabam plantarum picturas, ac per interpretem ex illis quasri, num noviffent iiftas plantas, ipfarumque nomina & vires & qua? refponfa in Commentarium referebantur. Verum enimvero iiftud Collegium exdiverfis Malabaricae regionis partibus coierat, unde fiebat, ut, cum alter alterum non noviffet, ambitionis, pudoris atque fufpcionis ftimulo age-rentur > gratiam videlicet demereris 5 fi qnx ignorarent, palliare atque tegere 5 &c ne fe proftituerent, fi mala fide plantis aut maja- rora vero aut minora tribuerent, omni opera conabantur.

Jucundifllmum fa^pe audivi acroama, hos puta Brachmanps feu Gentiles Philofophos inter fe differentes & certantes pondere argumentorum, quae ex fententiis, regulis, rhythmis ex antiquitate & libris fuorum majorum eruditione illuftrium depromebant. Difputabant vero, atque unusquisque fententia? fua3 fbritifllme patrocinabatur, incredibili tamen modeftia, quam vel in cultiffimis gentium Philofophis defideres, fine ullaacerbitate, animi perturbatione aut neglepto fecus fentientium mutuo honore. Piiffima reverentia Antiquitatem profequuntur, & primos artium inventores, his & fuas fententias Scfuaquoque experimenta accepta referunt, ac eorum auclo- ritati subjiciunt. Et quantum ad Medicinam atque Botanicen ipedat, harum dodtrina verfibus continetur, quorum primus quisque verfus plants nomine proprio incipit, cujus dein species, propria, accidentia, formas, partes, locum, tempus, vires, ufum & alia ejusmodi accuratiffime perfequitur 5 atque hoc artifcio illudeffecere, ut fi quis plants alicujus proprium 110-rnenproferat, Brachman aliquis exemplo tibi referet, quecunque de ilia dic:a funt dicique poffunt. Quamvis autem hie docendi modus, qui memoriamentacem requirit, difficilior eife videatur 3 attamen teneras pueritia^ inter lufus & crepundia hos verfus memoriae, quam turn plus valere ajunt, imprimunt, quos poftea animi deciles adolefcenſe 8c ftatas astatis fideliffime tenent. Prima harum artium (Medicine puta & Botanices) inventio adeo antiquahabetur, ut proferant Audorum libros, quos conftantiffima affeveratione ante hos quater mille annos vixiflē affirmant omnes. Sed enim quia homines hi quam

exercent artem non libera ele&ionisvoluntate, fed nafcendi forte profitentur, *qnx* unicuique honores, fervitutem & Spar-tam denique, quam hac nafcendi lege exornet, neceffitate plus quam Stoicadifpenfat, inde eft, quod percontinuos setatum gc generum gradus ac fucceffiones parentes liberis quad de manu in manum tradant, quaecunque ad artis illius, quam nativitatis lex ab ultima temporum memoria huic aut illi generi prsefcripfit, perfe&ionem requiruntur: five inevitablem & vel adamante fixiorem hanc legem Rex aliquis illorum populo inobfequiaparatifllmotulerit; five mutuus populi hujus confuseamintroduceduxerit, five devotiflma aliqua facrorum reverentia, aut oraculorum fuperfttitio divinarumque revelatum, cui h#c gens mirum in modum dedita originem & aucloritatem & per tot faecula confirmationem huic legi dederit, de quo tamen difputandi nee locus nee animus nobis eft. Hoc unum tamen poifumus affirmare Sc experti veriffima teftari, hanc Legem, quae ex forte nafcendi vita? genus cuvis demandat, adeo rigide, adeo fride, adeo fancire in hanc ufque diem obfervari, ut nemo mortalium quacunque demum vel arte vel audacia etiamfi Herculea mutarehujuslegis vel hilumpoffitjifie ut ruftici & pifcatores, per omnem annorum feriem & temporum fugam, nunquam alios nifi rufticos & pifcatores daturi fint 5 tali etiam modo fe res in opificiis & artibus casteris habet. Hac autem fatali quafi lege efficitur, ut nunquam artes aut officia deficiant, ut omnes placidiffime ac incredibili tranquillitate vitam innocentifimam transigant, quippe qui pro nafcendi forte altiora noncupiunt, majoribusquenoninvident, ea tantumreoccupati, in quam fatalis ilia lex permajorum progeniem pofteros eorum devolvit. Atque hinc eft, ut in continua ilia majorum &c confanguineorum difciplina femper magis magisque eruditiores redditi tandem infignem illius, quam profitentur, artis & exquifitiffimam notitiam acquirant.

Nee eft, quod quis miretur tarn antiquitatem horum populorum, quam inconcuffam per tot faecula legum &c confuetudinum conftantiam & audoritatem: Si quis vel levi cognitione legum, morum, privilegiorum, & confuetudinum quas apud illos Sanftiffimevigent fit tintus, fateatur oportet, in hac republicaconfituenda aecuratiffimam habitam effe rationem fundamentorumadeo folidiffimorum, que, ut ita loquar, vel seternam poftllnt reddere & ab omni mutatione fecuram rempublicam. Theologia namque illorum atque Politia tarn

artificioe ac prudenter confpirant, adeo provide etiam diftinguntur, adeo altera alterius auftoritatem tuetur, ut cui primse deferri debeant, ambigui res fit judicii. Theologiae enim Politia&haecviciilim illi amiciflme refpondet; ficeademlex, quae maleficos templo arcet , illos quoque & civitatis & cognationis jure, quin imo humanitate atque adeo vita ipfa privat, aut fi clementius cum iis agatur, libertatem per omnes vitas annos adimit. Respublica eorum harmonia tarn arcana mixta eft, ut ante diu illorum admiffione opus fit, quam nōris, ex quo reipublicae genere fint. Populus liber tantis gaudet privilegiis, ut videatur effeDemocratia; è regionetamen populus ipfe tantis ac tot fervibus officiis Principes fuos fuſpicit, ut vita; necisque jus ac omnium fortunarum in unum Regem conceffifTe putes. Alienae nationis aut exterorum conjugia non ineunt, & tamen quascunque nationes cujuscunque religionis inter fē liberrime vivere patiuntur. Patrios fines nunquam egrediuntur, nee tamen peregrinorum itinera molefte ferunt. Reges illorum nee fucceffionis, nee elelionis folo j ure regnant, fed utroque, tantas enim majeftatis faftigium uni alii cui familia? ac toti generi haereditaria eft, ex qua Principes eli- euntur, quorum natu maximus Rex eft. Qui Sacrorum curam habent &: religionis, illi&plurimifunt, &fumma tranquillitate vivunt, ampliflimis beneficiis & fummis honoribus au&i, queisacceduntdevotiffimipopulidonaria, ut juremerito homines illi in toto terrarum orbe beatiffimi prasdicari poflint. Nobiles quoque ejus regionis frequentiflimi & numerofiflimi funt, qui opificiis aut artibus exercendis omnino liberi, amplifTimis privileges & fummaprae caeteris dignitate excellunt; atque adeo patet huic populo vitas 5c morum mutationem nee exfpedandam nee optandam fore. Eadem ratio, qnx perpetuam in hoc populo pacem confervat, ilia &c feditiones, fi quae fubortas, in ipfo ortu oppreffit, ita ut mutacionem aliquam rerum faltem minari nequierint. Alieni Imperii bellis intadi, ilia quoque non metuant, hinc abOccafu vaftò illo Indico Oceano cindi₅illinc ab Ortu praerupto, arduo & immanimontium tracliu muniti, qui per anguftiffimas 8c difficillimas pylas non nifi paucilTimos fimul admittere potefit, fi vel ingredi vellent hoftili animo homines. Neque finitos verentur, quibus vires adfeaggrediendos deeffenorunt 5 cum ipfi Malabares è contrariobiduifpatiopluresexercitusincre- dibili frequentia hominum₃ unde illorum numerum fidem vix habi-

habiturum referre non audeo, cogerepoflīt, egregie&apte
armatos, ac belli peritia nulli fecundos; quorum milites au-
dacia &c fortitudine omnes Indos caeteros antecellunt, qui
#ternam animae fuæ falutem extra omnem dubitationis aleam
ponunt, si in bello propatria, pro aris & focus, pro Lege &c
Rege occubant defundti officio, cui nati erant. Hanc Spar-
tam optime & fortissime Nobiles illi, quos diximus, Malaba-
res ornant: qui, ubi occasio tulerit, viros fæ patrias natos for-
tiflime præsentant, ac quasi furore quodam correpti tune in
hostem per tela per ignem aguntur, adeo in lethum mens prona
Viris; hinc natio hæc nee ulli unquam hosti, neculli etiam
rerum mutationi ab ultima faeculorum memoria fuit subjeclia;
unde haud injuria illos antiquissimis Orbis terrarum populis
afflere possumus, cum Brachmanum nomen temporibus quo-
que Alexandri Magni in dignatione fuerit, & Historicorum
libris celebratum.

Seddehis jam plus fati, quæ tamen Le&ori noftro gratiis-
caturi diximus; abs ratione namque alienum non duximus,
quum Hortum hunc Malabaricum oculis tuis subjiceremus,
non nihil praefari, quibus interris, per quos & quales homines
fuerit cultus. Ordine, quern supra dixi, conffituto, quo Hor-
tus felicius coleretur, abfoluti iunctu, quos nunc inpu-
blicum dedimus, quorum nimis primus arbores, alter fru-
ties perfequitur. In animum equidem induxeram, fatius
fore Horto huic in Europa edendo tamdiu superfedere, do-
nee colligendis plantis finis effet repertus & fadhis; at quum
una mecum meo animo reputarem, quam inconftantes, Auxx
ac mutabileſſent res humane, quam vanus fuiflet & inca-
fumomnis labor iftemeus, si forte Deo itavolente vitſefum-
ma brevis fpm praecideret longam; neque enim perfuadere
mihi poteram, fucceſſibres mihi in tot tantosquelabores fore,
quos equidem indefeffa conftantia in hoc Horto colendo ex-
antlaveram: acceſſit, quod ipfe mihi nee moras tempus, ne-
dum plantarum numerum definiveram, quo Hortus noſter
eflēt colendus; itaque pergebam in ejus cultura, dum tempus
& occasio ferebat 5 fiquidem plerique, quorum opera poteram
uti, Illuftri Indian Orientalis Societati alter in hoc, alter in illo
officio operam fuam locaverant, quam neneſigenter exerce-
rent, alienis illis Horti noſtri colendi laboribus faepiffime va-
carenequibant, unde Hortus subinde cultoribus erat YUCUS.
Interea tamen temporis ad finem properabat plantaruni

defcriptio, qu& circa urbem Cochin crefcunt, quarum vires ab ultima antiquitate celebres à Medicis indigenis indicabantur. Fuere tamen faepius plants, quarum ut florem aut fru&um nancifceremur per integrum annum, imo nonnunquam longiori fpatio exfpe&andum erat, atque *hx* plantae quail per Satyram annotabantur, ut *qnx* in iis deficiebant data occafione rekre poſlent fuppleri. Nonnunquam, fi ubi vel officii ratio, vel praegnantes alias cauſlx poſcerent, omnibus iis , quorum opera in hoc Horto colendo occupabatur, aliisque bene multis comitatus ad hunc illumve Malabaricum Principem meorum Superiorum ergo compellandum, id quod publici boni cauſla faepius necefle erat, aqua in continentem interiore proficifcebar: Ibi quail aliud agens dum obfervarem in itinere fertiliffimas fylvas, & campos longe amoeniffimos, omnem meum comitatum navi exfcendere jubebam, quorum quidam prasmii nancifcendi ergo, nonnulli quod ea re impendio deledtarer , plures ut animo fuo novarum rerum curiofogratificarentur, caeteri, quod operam horto noſtro localTent, partibus fadbis per nemora palabantur, depopulantes omne plantarum genus, illarum paeprimis, quas fru&u & floribus ornatas videbant. Haec manus, *qnx* fubindeducentorumcapitum erat, ubi per aliquot horas legerant plantas, hinc illinc undecunque ledis plantis onufti ad naves noſtras bellicas , quas Malabares *Mansjous* appellant, revertebantur. Heic praedam excutiebamus luftrabamusque, ac plantas nee dum vifas ruditer delineabant pičiores, quibus defcriptio brevior 8c rudior accedebat, quae poſtea commodiori loco & tempore perficiebantur. In aulis Regum faiba re Illuftris Societatis Indicae Orientalis, Principes ea erant curiofitate &c humanitate, ut per fuos homines nobis omnis generis plantas fuppeditarent, imovero ipfU met illi Principes ad noſtra tentoria vifebant, &c fumma animi deledatione improbum noſtrum laborem &c Ipirantes plantarum pifturas confpiciebant, atque hoc modo, qui faepius accidebat, Hortus noſter cultior 8t plantis indies crefcebat: imo haud raro una die plures plantas ruditer delineabantur, quam quot per menfes aliquot pičiores atque Clariffimus Cafearius digerere poſlent. Interea dum hac ratione cceptum opus urgeo, cauffſe maxime prasgnantes me nec-opinum fubito Malabarica regione abire juſlerunt. Dum enim honeftiffimis gc inriocuis hifce deliciis animumpafco, animadverto infidias 8c cuniculos, perquosmeclanculum invidia oppugnabat, infidias,

dias, inquam, quas nunquam vel in horridissima Malabarum
folitudine verebar: an ita tamen coeptum opus tam in itinere,
quam Bataviae perficiendi continuabam. Sed, sed ja&uram gra-
vissimam! dum hsec meditor, ille fidus nostrarum Achates, ille
laboris focius, ille Horti hujus rigator Apollo, ille fuavissimas
nostrae delicias Vir doctissimus & admodum Reverendus Ca-
farius in flore aetatis acerbam mortenobis eripitur, ac mortalit-
atem cum immortalitate commutat. Jacturam tamen hanc
non nihil levabat humanus Vir Christianus Hermanni de
Donep calamo promptus & Latins lingue fatus peritus, qui
mecum adverfaria ilia &c collectanea, quoad ejus fieri poterat,
Ndigerebat quam rem fummopere juvit, quod plerique illas
plants recentime amemoriax rerent. Bataviae plantas quas-
dam reperi, quarum nonnullae partes apud Malabares defecer-
rant, has pidorum ope fupplebam. Vir autem felicissimas ex-
perientiae ac dodiflimus Guilielmus ten Rhijnen (qui ob ex-
cellentem in Medicina peritiam Imperatoris Japonici postula-
tu ab Illuftri Societate Indica Orientali ad Japonas misTus est)
vires plantarum ac fumum, qax in certis adverfariis annotave-
ram, Latine subjiciebat, ut il gravior calus opus nostrum tur-
baret; non nihil faltem ejus fuppereflet > ipse vero totum opus
idoneum otium nactus recensit, errores corre&urus plurima,
qua? adhuc deficiebant, &: subinde integras defcriptio-
nes fuppleturus j infelix enim hoc lolium in Horto nostro *Gic-*
crefcebat subito illo nostro à Malabaribus abitu, & praematu-
ro Cl. Cafearii p. m. obitu. Vix recensionem cceperam, quum
cauffi plane fontica^ me Indos omnino relinquere urgerent :
itaque plantarum picliuras denuo depingi , ac defcriptiones
eoufque perfectas defcribi curabam, quod exemplum Clariffi-
jno Dochlori ten Rhijnen reliqui, ut, si vel naufragium, vel
jactura iterum turbaret, denuo Horti Malabarici exem-
plum aliud ad Europos transmitteret, idque toties repeteret,
donee tandem portum opportunum naftae elTent fed placuit
Deo T. O. M. nos iterum ialvos &c incolumes patriis Laribus
reddere. Has in regiones appulsi ac patrias redditus non fine
quadam animi perturbatione primam arborum partem editam
conficio, quippe quae longe aliter edita, ac ipse editionem
adornandam ex Indis transmissem volueram; unico enim
tomo arbores fecundum sua genera & species divisas contineri
placebat: fed Typographus, utquidem videtur, librum mo-
lis amplioris fore quoque nimii pretii putavit, neque fane in-

***^**

juria,

juria, figuraenamqueseriincifae nativamplantarum magnitudinem & formam exa&e referentes , chartae regime & optimas notas, nee non literis magnifies Sc nitidiflimae libro pretium faciunt, quod quum plurimi expendere nolint pro libro, qui novas, ignotas & peregrinas plantas , quibus pauciflimi etiam deleitantur, fimpliciter perfequitur \$ hanc ob cauffam primam partetn in duos tres tomos divifit, unde, quia in ifto tomo vel illo arbores pro tomi commoda mole deficiebant, frutices quidam intermixti funt: praeterea vero tot jamfiguras aericu-raverat Typographus incidi, ut non fine gravifllma fumtuum jadura ordo mutari , aut figure commodiori loco refervari potuerint; factum hinc eft, ut tomus alter pari paffu primum infequeretur, ordine inquam perplexo ; ifte enim tomus, qui fruticibus erat deftinatus fupplementi ergo & minoris generis herbas recepit. Primus tamen tomus felicior altero fuit, gavifus Commentatione & illuftratione & comparatione ad Europaeas plantas faclia Viri Doftiffimi &c longe Celeberrimi Arnoldi Syen, Med. Dod. & in illuftri Lugduno-Batava Academia Botanices Profefbris, Botanici fummi & in plantarum experientia plane incomparabilis, cujus eruditiffimis curis Sc caiteras Horti noftri partes relinquere animus ferebat: at, quam van^&iluxsehominumcurae! Botanicorum hie noftraaetate princeps morte longe acerbifllma &c nobis &c Academic Lugduno-Batavae eripitur, quse Tanti Viri dotes, &c indefflos floridx aetatis doftiffimos labores incredibili &c trifliffimodefiderioluget. Neque ruina hxc fola fuit, traxitetiam Viros optimos & humaniffimos Johannem van Someren &c Johannem van Dijck, qui Horti edendi curam fufceperant, paeclare de re Botanica merituri: atque hx jadurae graviflimas Horti noftri lsetum incrementum mirum quantum turbarunt. Interim tamen humanifllmus Vir Johannes Commel'mus, Vir Botanices eruditione nemini fecundus, Botanices amore inflammatus alterum tomum elegantifllmis notis illuftravit, unde tandem afpexit lucem. TantcB molis erat. Tot difcri-mina, tot cafus, tot fumtus, tot denique labores Hortum hunc exercebant, ut unum impedimentum ex alio natum, ac proximum quodque gradus ac inftrumentum eife fequentis videtur: hie accedebant querelse Typographi fumtuum jacturam verentis > emtores pauciflimi, ut opus tantum minimi fieri crederes 5 ardui illi &c perplexi tomi reliqui, qui fub manibus meis adhucerant, quique idem ac priores fatumhabituri

vide-

vidabantur j hxc_a inquam, omniatediumfumnummihi**
gerebant, fumtus tantos facierft < ; seris noftri impcndendi
alienisdcliciis. Hortum proin \ planeoculoac anteintue-
bar, quern mihi feponebam, ut laorumolimnoftrorumme-
miniiLc juvaret, parvi fa&urusautlaudesautcalumniasfamae
rumorisque levioris. Atque fie aliquandiu hortus nofter pla-
cide compofitus quiefcebat, donee aliquammulti rei Botanicas
bene cupientes quotidianis pene adhortationibus nos obtun-
derent; rcmmiferrimamcauilantes, tot labores atque alio fub
folc natas plantas uni charts credere: efle fatis multos, qui
maximo deflderio reliquos tomos defiderarent. Typogra-
phus quoque rufus fopore illo folutus me etiam denuo incita-
vit, utfecundomeHortoedendoaccingercm, atqueejusor-
dine, quantum fas eiTet, commodiffime digerendo 5 nam,
quod antea monui , ilia pars, qua; arbores continebat , me
infcio in plures tomos divifa erat₅ ita ut plane nefas foret opus
totum eleganter diftingucre 5 licet enim tcrtio tomo arbores
denuo continuarem, alter tamen tomus, qui fere fruticescon-
tinet, ordinemturbabatj hinc commodiffimum fore judica-
vij conjungere illasplantarumfspecies, qua^fingulaeperfeuni
tomo non fufHciebant, fedquidemjun&ac j ut ita reliqui tomi
non turbarentur. At vero D. Commelinus cum modo minus
digettus fpcierum ordo exifteret, ita procedere iniquum cen-
febant j fed arbores ordine exhibere convenientius putabat:
atque ideo reliquos tomos ita difpofuit, ut minimedubitandum *fit*, quin hujus ftudii cukores grato animo accipient. In
quibusdmnadver&ria memoriae ergo fa&a digero, exque iis
defcriptionem concinno, prater opinionem video adeo muka
abelTe, ut feculo huicdelicatiffimofatisfaclurus alia plane via
mihi incedendum fuerit, idque eo magis, quodcavilloscen-
forum & notas experti fint primus & alter tomus a Cl. Cafe-
rio p, m. delcripti, unde immerito in fequentibus tomis opti-
mum Virum calumniati fuiflent, &: Hortum inamoenum red-
didiiTent 5 hinc ope meorum adverfariorum, colleclaneorum,
annotationum, & cxperientia, quam morae mea^ apud Mala-
baresfpatio fatis largo nactuseram, quoque recens memoriae
obvcriabatur, ipfemet ego defcriptionem plantarum Belgice
concinnabam, neque dubitabam Typograpno affuturos homi-
nes, qui has defenptiones Latine &: commode redderent, id
quod ipfe Typographic mihi affirmabat. Captoautemtrans-
lationis experimento eamincommodam&iaamodumimpro-

priam deprehendimus 5 quam remoram dum indico Viro
Clariflmo & Do&iflmo Johanni Munnicks, Anatomes &
Botanices in illuftri AcademiaUltrajedina Profeflbri ordina-
rio, ut pro iingulari fuo in Botanicen ftudio & fparta ea, quam
publice ornabat, Hortum hunc tar de fuccrefcentem fua opera
juvaret, ac hominem transferendis defcriptionibus idoneum
inquireret; is non folum humaniflime omnem fuam operam
detulit, fed & omnium defcriptionum & qu^e eas fpeclrabant
curam generofe infefufcepitj utihic, quern Tibi, Benevole
Ledor, nunc exhibemus tomus tertius, ejus Cl. V. cura[^] de-
betur, quern indefeflb labore commodo hoc ordine digeflit.
Atque hxc funt, Benevole Ledor, qnx nobis pr[^]fari ac Te
fcire asquum effe putabamus.



JOHANNES MUNNICKS LECTORI BOTANICO SALUTEM.



Obiliff ac Generofill- D. D. Henricusde
Reede in Draakeftein, Toparcha in My-
drecht, quondam Malabarici Regni Guber-
nator ftrenuiffimus, pr*ftmti\$morumM.egwni^t
Magnammorum IHufiriumque Heroum ad exemplar_y in
ipjoetiamarmorumjlrepitu , rerumquepoltticarumoccu-
pationibus difltractijftmm, studiosejemer excolmt ran herbariam, &ftirpium
m ijlo mundi traBu najcenttumcogmtione cumprmtsfmt delectatm. Et Jane non
mtrum : quumenim harum reruminruejligafio amceni&ima'varietate Jecom-
*mendet, nee minus habe-at utilitatisquavn obleciamenti, non *v ifttm efi Regum*
amplitudini_y free Imperatoru jMajejiati indecorum hupismodt excratits dc~
tinert,- frajertim ubi ah krgentijftmis negotiispublicif rejpira re, atqtealiquid
fMotiiimpeirarelic0.it. Sic Salomon Regum amplilllmUS, prater
immenfas opes earn conjecutus eft a DEO Japientiam, ac rerum naturalmm
cognitionem, ut nullus Regum 'lit fMerit comparandas • in herb arum notiti'a
miriske verjatus > exacieque edocius legitur: ac dijeruije nonjolumdepi- .
fcibiuS) dtttbus quadrupedtbus, afms; jeddearboribus etiam, & 'firpibus 4
*cedro Libam usque ad hyjfopum, qui egreditur e par lete, hoC eft > aminu**
tiffi'Ma hsrba ad clarijjimas usque arbores, emma habutje probe exploratA, £?
penitijftme pergxfta. Cyrum kgtmt Perfarum Regem celebratiP*
limum, plantariamanuju JimjlitMJje , atquehoctpfumcum Lyfandro
Laceda^monum Legato differentem, in aliquafflorU & felicitate fua
partecolijocaffe. Attaktm quoque Pergami Regem non prettofijjma
jtppelecltl'Jfdgorj nonjecundafortune blandtmenta adeodetmebant, qumin-
termijfh dtqnandoRegniadmmij'lratione, hortorum cokndorutnfludio plan-
tarumquefatu, defejfum aut aberrantem amnum recolligeret. Romanos ohm
h<zc exercttatto tantopere tenmt, ut Reges , & "Imperiorum fundatores, positis
diis cur is, hac mapotijfmme deleclarentur. Sci pi On em Carthaginis
everforcm, Hannibal is atque Antiochi devidorem pdam
eft i LtrJermhortojubigendotrmmphalemanMnadhibwffe: ~Ei tsmfuanjem
*expertumfuijfehortenjemhanc operam DiocletiantimCx fare m, ut la**
Eli•co4 & olera diphre diademati tmperidipraferret.

Hifeettaque > aliisq%e, quorum rneminit veneranda antiquitas, exemplis in-
^;>'^/j-NobiliiT D. De Reede, cum hocagentj ut accuratamarbo-
i,fi-uticum, diarumquein Mdabarica RegionecrejceutmpUntamm
dar defcriptionem, non ex aliorun relatione, jcdprof>rta& diltgenti-ffima
inatiftitione, atque accurate obfervatione, muhis itimnbui propterea non fine

*penculofufceptis > primo confuse illas notari & delineari curavit, prout variu
 loci* & temporibꝫ s̄fere offerebant, aut ipfi plerorumque Regm Malabarici Re
 gum > ac Brachmanum, aUorumque Dōctorum Malabar'icorum auxilio uppe
 ditabantur; deinde illas ordine juo disponere, & 'ad fuas daffes redi qere ccepit•:
 & Reverendo D- Joanni Cafeario verbi Divini IVlinistro
 in Codi\X\p^{er}i^{ta}J^{ut} accurd tam omnibus adderet defcriptionem, ac inte
 grum aliquando exflrueret Woxi XWn. JVtalabaricum -Jed morte prwento
 Revel". D. Cafeario, duojolum ^evolumina ex ejus editione lucem vi
 derunt, reliqua vero imferfecta remanferunt: quo in cafu nos rogati a
 Nobiliff D. de Reede, ^/^ e^Rever D. Cafearii
 turn Dodoris ten Rhynē Patrisque Matth^{ei}, ordinis S- Jo
 fephi Cameliti E dilcalceatī, aliorumq[ue] notatis, c&teris ftirpiumpi ctu
 ris no firas qnas que ad jungrem ui' commentationes; fique reliquavolumina orbi
 pander emus, ac integrum opus perfciceremus: quod Jane, quanquam professo
 rali munere, turn agrorum vifitationibus difiracli admodum, denegare ne ē
 <voluimus, nec potuimus, • atque ad eo arborum harum imaginibus adorna' vimus
 defcriptiones i ut• decet Botanicum, breves ac Juccin Bas, Jequuti Clufii,
Bailhini* Prolperi Alpini, aliorumq[ue] Botanographorum hac in re
 vestigia. Quasfi non ingratas fore animadvertemus, fique D E US vītam
 & vires fuerit largitus, integrum tandem ftirpium Malabaricam hifloriam
 perfeciuros nos pollkemur. Interim hifcefruere, & vale.*



J O-

JOHANNES COMMELINUS

A D

LECTOREM BENEVOLUM



Emireris, *Benevole LecJor*, hanc tertiam Horti Malabarici partem, quae de arboribus agit, ac primam fequi debebat, poft fecundam de fruticibus demum prod ire* quam pcedere ordinis gratia par effet. Cum enim prcecedentium voluminum, jam modo imprefforum, defcriptionum, ex India hue transmit forum compotes effemus, in ea hserebarous opinionem, omnia ad umbilicum eflb perdueta, & nil amplius reftare. Sed cuiffii Nobtitffl 'D. de Reede, ex India reducem, conveniendi occafionobiseffet, pluresarborum, fruticum, ac plantarum imagines commentatione, ac impreffione indigentes fupereffecognovimus ac omnes ftirpium piſturas fao generi debito ordine conjungere neceffe habuimus; quod pro viribus praettare fuimusconati. Quapropter ut reliquse Horti Malabarici partes ordine in lucem prodirent, ab arboribus rurfus exordiri coad;os nos fuiſſe patebit. Sed quoniam varise in tertio hoc tomo exhibentur arbores, quarum species in priro defcriptse funt, quasque properea illic fequi convenkntius fuiſſet, Leftorem in bonam partem id accepturum rogamus;

JSr

quod

quod facile impetraturos speramus , cum error
ibicommifTuSj hiccorrigiā nobis nequeat. Interim animadvertis, & intuearis hancce Horti
Malabarici partem j, in qua miraberis Divinx
bonitatis^ cui tot tantisque stirpibus^ haēte-
nus ignotis, hoc Regnum Malabaricum ornare
placuit: queseque nunc ex aetatis imaginibus orbi
panduntur^ quibus arbor um& plantarum exoti-
carum notitia haud mediocriter promovebitur;
Enim vero multos quidem in earum depidio-
ne elaborarafle, nullostamen carum genuinas
iiguras & defcriptiones protuliffe, fed alios ex
aliis omnia excerptifffe certum eft, unde^ tanta
orta fuere difcrimina, prsefertim quum propira
carerent experientia, qux noſtro colledori
minime defuit: ipfe enim omnia obſervavit,
& accuratè notari & depingi curavit, ut non i-
magines fed ipfa objecla repr^efentari videan-
tur; quibus iterum noſtra adjunximus commen-
taria, quse Le6tori grata fore speramus: funt
namque ociofi , & à munere publico redun-
dantis temporis labores.- Utaris ergo his noſtris
laboribus^ quos amoeno huic operi impends
mus; ac stirpes hafce Malabaricas adfpicias , ex
quibus j omnia hsec mundana magnificentiam
Dei referre, haud difficile tibi erit colligcre.

PARS

Coldia *sanguinaria*

Dr. J. C. Gmelin

Kunze

कृष्ण वृक्ष

कृष्ण वृक्ष

कृष्ण वृक्ष

पूर्ण




Fig. 1

Fig. 2


Fig. 3


Tab.

Cordyline

Lit.

Taf. 1.





Coddia-patula Gr.

Fig. 1.

Tab. 4




Fig. 8.

Codla-puraria Linn.

Fig. 6.


Fig. 5.

Fig. 4.


Fig. 3.

Fig. 2.


Fig. 1.



Coddia-painii. L.



Codilia - planata



Coldia pani L.



Coldia pana. f.
Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Pl. 9.






Carex sp. L.

Colda - nana. L.

Pl. II.





Coccolithophora

P A R S T E R T I A .

H O R T I
M A L A B A R I C I

D E

A R B O R I B U S .

C O T > T > A - T A N N A ,

five PALMA MONTANA MALABARICA.

T A B . i.x.3.4.5.6.7.8. 9.10.11. ix.

[REDACTED] iRbor hsec *Codda-Panna* Malabareniibus dicitur, iifque *Pannageneratenomen* eft, quod cuique Palmse speciei attribuitur * atque ideo *Palma Indica* etiam *Tenga-Panna* nOminatUI*. 3rachmanis autem *KareteU\$* Cingalenfibus *Tala-gas*, & *Talagaija*; LIUſtanis Arvoredos *Sombreiros* hoc eft *Arbor Umbrofa* appellatur. Ea autem magnam **habet fimilitudinem** CUM *Tenga> Karin-panna*, & *Ampannam* parte I^{ma} defcriptis j Itbi in comment, ad Fig. 9. Dotfijf. Arnoldus Syen.p. m. Folium ejus a el. Paulo Hermans Botanico eximio ex Infula Zeilan ad fe miflum defcribit pro *Karin-panna*.

Poftquam vero intra annos triginta quiisque aut fex, ad fexaginta vel feptuaginta pedurn altitudinem arbor h^c excrevit, necintereauallis aut floribus, aut fruaibus prolatiſ, è medio ejus apice novum quaſi caudicem emittit, qui trium quatuorve menſium fpatio ad triginta circiter pedummenfuramaffurgitj quo tempore folia pteraque decidunt, & arbor altiilimo ae tevigato malo plane fimilis

Pars III.

A

eft.

eft. Deinnovushiccaudexduodecimauttredcrirn circiterhebdomadarum decurfu undique longos, ronindos, aclsevesramos , nullis fbliis aut ramulis lateraJibus ornatos, em.ittit; quorum inferiorcs viginti pedum longitu-
•diricmbbtinenc Atqueexhilceramisdemurn plurimi ra-
muli prodeunt, qui copioiiffimis ac exiguis albicanibus
flofcilisj in falciculos quad colle&is, inftrudti intuenti-
busjucundumexhibitfpedlaculum. His autem flofculis
poftres quatuorve feprimanas decidentibus, exigua? fuc-
cedunt bacca^, quae indies augentur, & fex circiter men-
Hum (patio perfe&os ac maturosexhibit frud:us j quibus
delabentibusnovushiccaudexmarceficit, totaquearbor
cmoritur. At veroarboris hujus variaspnes'; & multi-
formes earum imagines qui cupit intueri, adje&as hafce
T*b*i* tabellas perluftret, ubi *Fig. i.* arbor oftenditur novella,
cumfoliaceis fuis ramis> quo tempore haud abfimilis eft
*Amptmn.epartis i^m*fig. id* delineate. *Fig. z*-parsfolii, iriqua
lacini^ & divifurx exaele apparent: *Fig. 3.* integrum fo-
lium iftiusmagnitudinis, ut decem pluribtfve homihibus
umbraculi loco infervirequcat; qiiem in finem incolie ex-
tremasfoliilaciniasconfuunt, ut rotunditatem quandam
acqiiirat, qua facilius (ub ejus tegmine aliquot homines ab
imbribus, radiiique folaribusdefendi poiliint.

T.b.: *Fig.-1.* Arbonnummovigore exhibetur, antequam ul-
los'-emifitramufos; necnongenuina folii expanfi conftru-
dio , uti arbori^dhcTret, latitudine quatuordecim» &,
excepta Ipinosacaule, iongitudine Ovtodecim pedes fa-
perantis. Etenim iftd tempore iiupenda: magnitudinis
obfervantur folia , qux tamen cum arbor ramos undique
cmittat•, altkifque excrcicat fenfim minora proferuntur.
Etquoniam arbor *hxc* , *utt^elenga*> e medio trunci apice
novella profert folia, hinc *Fig. t.* complicatum hujufnodi
folium adeft, rbtundum, viginti pedurn longitudinern
obtinen\$> quoauterefoluto *3c* explicato integrum fefe
hieo'ffertfolium. *Fi?*. 2. exieum finHJ ^"lentumexplica-
turn

turn cum nervointermedio, quocmplicari aciterumrefolvi queat: & *Fig. 4.* idem fegmentum complicatum, longitudine fex pedes, latitudine vero fex digitos non raro iiiperans.

Eg. 1. Arbor triginta quinque aut lex annorum confpici- *Tb. 5.* tur, cum novo suo caudice, leu potius theka, è qua fruhis poftea emergunt. *Fig. 2.* Frufhium theca aut vagina exa&us delineamr, qux (uti di&um) ad triginta pedurn menfuram è medio truncī apice excreicit: ea queeplurimisconftatgeniculis, qu^efingulaobduftafuntviridibus, flexilibus, ac intrinfecus albicantibus & coriaceis involucris fibi è regione relpondentibusj fub quibus alias minores latent thec^e feu vaginute, ut ex *lit. a. k c* & adjunfa *Fig. 3.* facilecolligitur. Atqueintali vaginula, qu^longitudinerpithamam, & latitudine palmannondumfuperat, plufquam viginti millia frud:uum occultantur.

Eg. 1. Vaginula qu^edamcum involucro suo *lit. a. majori Tab. 4,* vagina *Eg. 2.* defumpta habetur, intra quam primordia florūfurculi//>.c & *Fig. 4.* separatim depidi, exaftè apparent. *Fig. 3.* florū primordiorū ramufculus defumptuse *Fig. i;* demptis omnibus involucris, in quorum primo *Ut.d.* femper apertura *ht.B*, appare, quaaugefcente hie florū ramufculus fponte in lucem prodit. At vero theca haec, cumteneraeft, exfoliaceisintegumentis, fu-prafe invicem convolutis, atque in apice aperto femper hiatu patentibus, conformatur} cui innumera capfularum germina ordine decuflato adherent. Ita ut *Fig. 4.* ei%. 3. & ilia e *Fig. 1.* atque h#c c*Fig. i.* fuccedat. Qui vero hujus Tabulx *Fig. i^{mx}* multiformes vicifituidines intueri fatagit, tabulas omnes fequentes relpiciat neceffum eft, ubi

Fig. 3. Thecah^cinlatere(ubilionierus furculus extat) *Tab. 5.* aliquantulum, *Fig. 4.* magis aperta. *Fig.. 5. 6 7.* turiones. *Fig. 8.* tres coles ob oculos, ponuntur.

Eg. 1. Arbor undique teves, virides ac nitentes ramos *Tab. <s.*

emittit: at *Ftg. 2.*, patct. quomodo iidem e communifru-
dtuum theca, apertis vaginalibus involucris *Ut. a.* 8c pro-
priis thecis *Ut. b.* dehiicentibus > .crumpunt. Inferiores:
tern hi transverfi rami longitudinc viginti pedummenfu-
ram fuperant, antequam florum ramuiculi in confpe^tum
prodeunt.

Tab. 7. • *Fig. %.* Lateralis ranius *Ik. a.* e theca ftia *lir. B.* emergens, ful*
qucramigeris capfulisgeniculatim interfHh&us, atquein-
volucris fuis (quale ieparatim *Eg. 1* delincatur) obreptu;
exhibitut; quibus ablatisF/^%. ^.icemaftionibrifriidiferis-
vefurculis(&. c.ae.jimQhn, & % 4 ieorfimnotatis)alter-
nato ordine circunidatum comnionftratur: *qux* omnes
harum partium vicillitudines ex vaginula *F%.* j. oriuntur.

Tab. 8. Fjg.i.Ramuskteralis, equofloriferiiurculi *la.B.B.B.t-*
rumpunt > at *Fig. 2.* Boriferus furculus {eoriim del lgnatur.

Tab. 9. *Fig. i.* Florifenfurculiin ipfaarboreintegra. % ^.thec^
egmentum cum appenfb furculo, gentiina in magnitudi-
ne. % 3. legregatus furculus cum caplx tegniine. Ff.4.
recifus furcuii floriferi lateralis ramulus cum floriproniis
gemmais, viva imagineexprimuntur.

Tab. 10. % i.Floriferusramuscum latcraiibus ramufculis; flo-
rum viz. conceptaculis, retinaculisque, acfrudliumpro-
mifcondiSj jucundiffimum exhibens fpc&colum. *Fig. %.*
trifidurn ramulorum legmen cum annexis partim claufis,
partim apertis.floiculis(quiF/^%. 5. cum omnibus fiis parti-
bus coniHtuentibus exade adumbrantur) repradenratur.
Ita namque poft furculorum floriferorum omnium par-
tium ,ramis acIpfiis iurculis ad majorem longitudinem pro-
vedis, flores e gemmis apertis propullulant; iiiqueplures
&numeroii furculis adherent contigi, terni, quaterni,
canclicantes, tribus fbliolis, fexque fbminibus dotati.

Tab. 11. *Fig. 1.* Ipfa arbor foliis privata, at frudtuum primordiis
on ita abruptus lateralis ramulus cum fru&ibus exi-
guissoftciiditur.

Tab. n. *Ftg. i* Ramuli illius lateralis segmentum unicutn cum ad-

hserentibus fru&ibus naturali magnitudine. *Fig. z.* separatus fructus turn suo putamine. *Fig. 3.* fructus transverfim diflē&us (in quo *lit. a.* cortex cum carne. *///.* *k* nucleus oſfeus. *lit. c* medullare corcitum, quod niinquā indura* tur, fed tertio pore confumitur, accavitatem relinquit, oftenditur) *F^4.* ipse nucleus genuinā ſia figurā exhibetum Fru&us autem hi, qui furculis adherent, exafitē fph^erici funt, cortice glabro, viridi, carnofo, fucculento, aqueo, fubpingui, ac fūbamaro? veftiti 5 nucleus vero, qui hoc fructu continetur, fatismagnus, rotundus, albicans, aeburneus, carne dura & oflea infarcitui*.

Nafcitur h^ec arbor locis montanis & petrofis in Mala-bar, Provinciis nimirum Mangatti, Tirtsjour, Katour, & pluribus aliis locis. Crefcit quoque in Infold Zeilan Provinciis Menda Corla, Agras, & jiixta Bhoudhou-Malec feu Adams-pico. Floret indiferenter quocunque anni tempore, quanquam in Augufto non raro hi flofcilliob-ferventur, qui intra quatuordecim menfes vix maturos exhibent fru&us} quos ante quam fefath&carbor, plus quam triginta annis indiget, Scpoft quamfeniel illos produxerit tota fufe vitas fpatio, emoritur, atque ex deciduo hujusmodi fructii nova propullulat arbor.

Cseterum arbor hsec in Medicina vix ullum habet ufum: iiii hilominus tamen liiccūs e furculis fructiferis exprefliis Vomitum excitando conducit ex moffu ferpentis veftigiiofis, ac delirantibus. Fructuum theca tenella adhiic fidicindatur liquor exftillat, qui radiis folarib[us] in fubftantiam duriorem condensatus, ac mulieri gravid^ exhibitus foetum necat, & potenter expellit. Infuper folia medium teftis inferviunt, nee non pro chartaceis philyris Malabarrenles iis utuntur, adeo lit eorum libri nofr ex libris, *hoc eft*, arborum corticibus interioribus ipfi ligno adhxrentibus, led ex hujus afboris foliis conflentuf admodum durabiles, & fi bene aflerventur pene perennes -, quibus fefre oftilo fios chai-afteres imprimunt, unde liiperiore cuticulâ de-

hifcente iiterce fignat se remanent. E rru&ibus autem globuli ad armillas, brachialia, moniiiaque pro Doniiceilis tornantur, iique Ixvigati & rubro colore tin&i pro genuino rubro corallo imperitis facile obtruduntur.

T A B - i. z. 3.4. 5.6. 7. 8.9. 10. 11, 11-

Inter varias, qrae invertiuimiri, Palmz species, h*c Baxime admifanda eft, turn rat lone iplius ftra&ur*i tum p^{xxci} ue in p^{xxci} producendis floribus fru^{xxci}ibus ue, no milliarboripoteit comparari; atquc ideo h^{xx}ud immcxrito. irboipef fefrabetur, uti Ampanna part. 1. defcripta: cujus t*men species eft, quipropter convenien-
• cus in pane 1. • ppft jimpoinam & Qitnm-ptnnsm potuifodderibi: licetcnim h^rumarborutnSorts, fru-
ftuque inter ie nori canveniant, foionnn lamea ratiu-
ac merio fub uno rferuntur gencre; ideue quod ad
hypotheftn i CA R^{xx}&. Morifin de legibus naturae ethibi

urn, cbiter **M^fTafoaktH&tjf. Arndi,\$jm.f,m,**
mQgishantCs(JW-p<wnww confirmare puto. Mencio-
nem c^{xxci}usnullus, quodldii, fecit Botanicorum; vi-
tivax timen rudi modo illam delinearc J,icsbat vñ
N^{xxci} k^{xxci} irbor. Eft^ue forfm C^{xxci}jfe-^wjwwad-
miranda illa irbor, cs^{xxci}as nitmimit b'itoiatu Vojiarn in
Itinerari fo'i quuxq:ie 1 CajparvB^{xxci} in pane voca-
tur Arborfdtsit fix brachiamm longii cujus folio extenso tres
yuatutrvt nririm stmerit oprinmur, ut pisruias non mctu.mt.
Nobii vero erii Pitinn mmlan* Malabarici^{xxci} Jv/w
ma-
gnes, compheato, aim, fidm^{xxci}h r^{xxci}miaſi, fil uroliando.



N I T I - T A N N A

Est & altera *Codda-pann** species, quae Malabaribus *Niti-panm* dicitur Cingalenibus *Nicol* & *Gw-cotla*, Lufitanis *OUs iagoa*; quafi *Palmam aquatica mdicas..* Crelcitnamque in aquis, & copiosè in fluminibus Teckencour in Malabar.

Radix nigricans, orbicularia, fibrata, amara, graveolens.


Folia, Palmifoliis, planefimilia sunt.


Hujus arboris icon inter cameras non reperitur.

Niti-nanna Codda-pann species haud videtur, quo-
do; iafupct nec arbor est, (cd potius planta aqua*
nuila inter cas, nisi foliorum, est & similitu-
mam tica.



त्रिविलास
संक्षेप
३५८





Agave
mammillaris









Fig. 1. *nnnud* 1. 2. 3.

4. 5.








Thesia
peruviana


Taf. 38





Tschirnau, 1861.

67

Taraxacum L.




Lith. 20



Lith. 20

174
T. & J. Newell Scn.



T 0 2) 2) A-T ANN A.

TAB, \l. 14 15- 16. 17. 18. 19. 20. zf.

**ls!j§&Odd-panna feu Mouta-pann# Malabarienibus,
Andexa Motha-panna Brachmanis, Soteetsou Japo-
nenibus, Armatoria das Igrejas feu Palma d'Igre-
yia Lufitanis, in arborem excrefcit jufta ma-
gnitudinis, quuldraginta circkcr pedes aL
tarn, caudice craflb uti Tenga-panna, qui cir-
cularibus & extuberantibus anntilis undique circumdatus,
&cortice craflb, cinereo, Iquammofo, ihtus purpureo
obduduseftj lignumalbicans, molle, cujusmatrix Have-
fcens.*

Cum, vero arborhax primum e terra erumpit, nullum candicis fundamentum iiib dio obtinet, fed *Corns* prodit foMaceistegminibuscoopertusT^. i.Fg.3. qui cum undique fefe aperit, ac novelli folio rum furculi, tribus iemet iniequentibus ordinibcis (in inferiore fedecim, in media novem, in superiore ferie ocl:o)ex eo prodeunt, pedentim foliacea ilia tegmina fublevantur > ut qui primo ferme planus erat comi apex, acutius fenfim > tandemque rotundumacquiratcacumen> ufquedumobtegentia ilia foliolatranfitum concedere cogantur foliofis furculisT^. 1* B^iquiquomagisadolefctint, eomagisexplicantur, foliorumque ilia opcrimenta verlus latcra diducuntj atque ita foliofi furculi majore fpatio indigentes magis reclinant, & ad latera vergunt, donee tandem ipiam caudicis peripheriam circumveftiunt, languidis tune & marcefcentibus

eorum primis tegminibus, *quxdn* ~~dec~~ Junt, & fuitigmata relinquendo circularibus prominenti bi annuhs earn cingunt. Pofthax inter ipfas arboris frondos novus cxontur Conus priori plane fimilisve quo novelli alatorumfohorumramidenuo prodeunt; qua: foliorum product^ toties renovatur, quoad fruQibus cnitepdis-apta fiatarbor: quo terapore Conus in humani capitis magnitudinem augetur, ac undique iefe aperiendo plures ramiculos reflexos irudibus ornatos exhibit *Tak* 4.6/7, & H-mulac aperitur noviis ex ejus cavitate emergit ibiigerus Conus W- 5- *Fr_f*, 1. 2. qui cum denuo augetur> aperitur> ac novellos foliorum ramos undique emittit, eccenovus mtus adeft fruaipromus Qonus _s qux foliipromi fru& genque Coni yiciffitudines toties fiunt, quoique viget arbor. Contingit quoquenon nunquam, ut cxunotrtingo quatuor aut quinque vertices enaftantur *Tak* 8. *B^A*. yiz. quurn, caudice ad viginti circiter pedurn altitudinem au- 30, fruaipromus conus non unum, led plu re; *dk* novellos Conos, equibustotidem prodeunt arboris ver- tices i *id* tamen raro oblervatur, & fingulis arboribus fimplex plerumque adeft vertex, uti *Id.* 8. % 1. videre eft. At vero ut arboris hujus varia: partes, & multiformcs earum vidffitudines rite inteiligantur, adje&e hxtabei Le ut perlufrentur hcceffb eft/ ubi

Tab. I. % r. Arbor, prout extra terram truncum fuum confi- mere incipit: quoties namque foliorum rami cum fblia- cds Coni tegminibus marcefentibus decidunt (quodfemel intra annum aut fefquiannum contingit) toties circula- ri prominentiqrie annulo caudex cingitur, 8c augetur. *Ftp* 3. idem Conus _v qui *fig. 1. tit. A.* in medio confiftens alatorum foliorum ramos undique emittit, confans eplurimis ob- longo-teretibus, crailis, coriaceis, deniaque ianugine vefti-

M A L A B A R I C U S .

i r

veftitis foliis \$ lanugine vero iliâ detritâ viridi-fufcis. *Fig. z,* novelli foliorurnfurctili, utiprimum è Cono apertoprodeunt, exhibentur.

Fig. i. Foliacei rami, od:o pedum menfuram longitudine_{Tab. im} haud raro fiiperantis, genuina effigies. *Fig. x.* caulis foliacei rami f aturate viridis, ac in fiiperiore limbo exiguis fpi~nis.munitus, naturali magnitudine. *Eg. 3.*unicum folium atrovirelcens, iiiperne fjplendens, inferne nequaquam, viva imagine exprimuntur.

F/^i.Oftenditur, quomodo novelli alatorumfolioriim_{Tab. 5.} ramiexarboris apice, foliaceisConi tegminibus undique apertis, prodeunt. *Eg. z.* 3.4. iidem novelli foliorum firrculi, liibrufelcente denfaque lanugine veftiti, lanuginosâ vero iliâ tunicâ manu detrita viridi-fufci, ad lunt 5 quorum lateralia & tenella folia haftenus counita, intorta, & crafla exiftunt. *Fkjf.* exadius adumbranturea, *quxFig.i.* exhibentur, viz. quomodo ex arboris cacumineZ/ACfoliaceis Coni tegminibus *lit. B. B.B.* undique apertis, foliorum furculi prodeunt.

Frudipromus Conus, cui numerofi includuntur fm-_{Tab. 4.} dlus, naturali magnitudine reprfefentatur, ubifingulis illius partes unitis repagulis obferantur.

Fig. 1. ejufdem fruſtipromi Coni difciifi interior com-_{Tab. 5.} monfratatur forma , qua infuper exilior Conus, è foliaceis tegminibus (novellorum ramuiculoram conceptaculis)conflatuſcomprehenditur, *utiFig. 2.*Jpeciatim oftenditur-

Prſedifti Coni majus incrementum refert, ubi lingui-_{Tab. 2} formiainvolucra, verifruſtuumloculi, magis extenduntur.

FVi. Idemfruſtus maturi cum expanſisfuis retinaculis,_{Tab. 7-} ac novellis foliorum furculis//>^. nee non foliaceorumte-

»*f H O R T U S

gminumabfciiTorum reliquiae //>-^ continentur: Fructo autem cum suo putamihe^ C putamenipfum tit.D. && nucleus Vero transverfim diffe&us lit F reprafcantur. Suntqne hi fruclus oblongo-rotundi, prunis majoribus haud abfimiles, quostegit cortex glaber, viridis/acnitens, pofteaflibflavus, &deinrubefcens, gratidulcifque iaporis/ cuifubjeaus cortex rufus ac Bgnofusv nucleum continens candidum, fapore caftaneis haud abfimilem.

Tab. 8. Integra habetur arbor, qua:Pig.i. fimplici cacumine, at *Fig.* • x. quinque apicibus orhata confpicitur. i\ 3. 4. \ 6. multiformes hujus arboris in foliis fruclibufque producendis mutationes obfervari poffunt.

Tab. 9. Adulti caudicis frufrturn cum orbicularibus fuls extuberantiis (tegminum foliaceorum, atque frudtiferorum ramufculorum veftigiis) viva imagine ob oculos ponitur.

Hie vero caudex craffitie fefquipedem, altitudine trigintapedes haud raro fuperans> nonnunquam in ternoS' quaternos, quinofque apices (ut fupra diflum, & T^8. Bg. z. depi&um) femet divaricat, alias fimplici cacumine *Tab. %.* *Fig A-* eredus, Singuli autem illi apices unius ferme pedis (patio reliquum trunci circularibus & extuberantibus annulis tircumdant, quiduos trcfvcdfitos Jati, diftindtis intervallistnum quatuorveditorum intercapedine ab imo ad liimmum a fe mutuo diftant. Ad ha:c ubi transverfim diffecatur hie caudex , guttas expromit pellicidas, qux radiis Iblaribus in candicans cryftallinumque gummiinfptilanti.

Crdcit.haecarborlodsmontanis, petrofis, &arenofi» in Tiiihjour & Couronuada Provinciis Malabar, nee non in Japonic infulis Roukiou & Lequas: mine vero confpicitur id Celfiffimj Principis Auriaci viridario *Honselaardijh* non procul Haga comitis, eo ex India Orientals dclata-

Indifferenter quo cunque anni tempore viciflitudines suas patitur, & foliipromos fru&igeroique proiert conos, atque a quinto extove circiter fafionis anno ad eentefimum & ultra frugifera eft.

Geterum arboris hujus tanta eft fertility, ut recilise-jufdem ramus *terrx* vel levins comrnifllis innovamarbo-reprogerminet 5 quinimo experimento compertum dicatur, re jedum trunci frnftum novas radices emitt ere, & in arborem denuo renafci 5 quodque magis ad hilcmiran-dum, fi vel per annum, vel etiam plures annos è terra ei-vulfa fervetur ficca arbor, & poftea terras committatur, revirefcere, cujus rei fidem faciunt Japonenfes, qui ob admirandam ejus cum ferro fympathiam arborem hanc fc-tcftfouy hoc eft, à *ferro virejcentem* naucupant: hsec quippe cum fiis radicibus e terra evulfa, & in aprico locoficcata revivifcit, ubi arena fervida fcoriis ferri admixta radici iib-fternitur. Etiamp prodigiis inftareflet, fiverum foret, quod de hac arbore referunt, viz. ramos à trunko abruptos, clavifque ferreis eidem denuo affixos priftino virori redi. Infuper ubi languefcit h^ec arbor, ramofque qua fieri mor-tuadimittit, trunko clavos ferreos infigunt, atque ita ad viorem reduci perhibent.

Fruftibus autem vefcuntur Malabarenfes cum faccharo Thom^eo, alioquin alvum relinquunt ad ftridam. Succus e novellis foliorum furculis exprefliis, atque exhibitus in teftinorum cruciatus compefcit, ftomachi ardor em fedat, & vomitui cniento medetur^ Fruftigerus conus contufus, & in cataplafmatis formam redaftus, lumbifque applicatus dolorem nephriticum tollit, & in Voluntarium feminis in Gonorrhea effluxum mitigat. At vero è frudtibus tene-rioribus in aqua deco&is medicamentum paratur, quv.d vomitum ciendo ventriculum egregie expnrgat Ipfius ar-

boris gummi affumptum quibuscunque venenis refiftit, atqne cum galling ftercoremixtum & foris applicatum vi perarummorfus mirifice fanat. Ex Arboris trunco Japonenfes farinam ex eaque panemconficiunt, *Sagouip Cisdi* ftum. Denique nMalabarenfes, qui à D-Thoma conver ibs f'e profitentur, atque ideo *Thomiftx* vulgo nuncupantur > templa sua diebus f'eftis foliofis hujusmodi ramis exornant, quia non facile exarelcunt, atque hwinc ob caufam arbor h^C palma d'lgrcfid jell armatoria das igrezjas à Lut tanis **nUnCU-** patur.

T A B . 13.14. 15. 16. 17. 18. 19. zo. xi.

Quimquimcfruflibushujus arboris farina confici- i per Indiam mnottefit, non e t'ru&ibus, fed c caudice tur, *Xtagu difia*, non tamen *Todda-panna* eft *Palmam*, cujuſdam arboris fit: *Tidda-pa»na eiQ adminndi CpX"* referent arbor *Fariniftra*. C.B. neque *Arbor xjgu Am-idim Palmjeſpecicſeft*, quuxexjaponiaadfercur. bjēnfmm, quoniam farina qux z, *agu* nomine ubique






كَانَتِيْلِيْن
كَانَتِيْلِيْن
كَانَتِيْلِيْن
كَانَتِيْلِيْن



Xanthorrhoea
Lam.



Nationaal Nat
uurhistorisch
museum

In Jind, 1st
Post. Males.
In
Bam.
In
Jind.



KtdTO U- INT> E L.

T A B . 22. 23. 24. 25.



Rbor hxc Malabarenibus *Katou-mdd*, Brachmanis *Kafoun*, LufitaniS *Samara do Mato*, Beligis *wiUe Dadelboom* nuncupatur: Eftque mediocris magnitudinis, quatuordecim circiterpedesalta, cortice nullo, fedcruftacionereafolummodoobduda, ligno albicanti 3 pr^eduro arftiffime unita.

Rami foliacei è caudice ordine decuflato erumpunt, non Vellifolumè vertice prodeentes, vetuftioribus, qui infioresfunt, intereadecidentibus: funt autem rami hi virides, glabri, & nitentes, intusplani, extusconvexi, nee non inferius Ipinis oblongis ac rigidis obfiti.

Radix albicans, fibrata^ odoris fylveftris, faporisunctuofi.

Fo^brevibus petiolis exadverfo ramulis inherent, numerofa, oblongo-teretia, acuminata, denfa, glabra, communis virore nitentia, ad exortum interiora verfus claufa, necnon nervulis lубtilioribus in longum ftriata.

P/om, ut etiam in T^^ cernitur, rigidis, viridibus, ac coriaceis capitis primo occultantur, equibus deinde aperitis emergunt exigui, plurimi uni pediculo inh^rentes, tribus rotundis e viridi-albicantibus foliolis, tribus albicanbus lanuginofis taminul isdotatis, conftantesj odorii nullus^fpora ufterus.

ir/^?^ oblongo-rotundi, exigui, prunellorum fylvetrium adinfatar, cuspide duro ac lignofo in vertice dotati, ad bafin verp calyce viridi in tres laciniias fefto excepti, p^umvirides, dein rubicundi, matriores vero rubro-fulti. nigricantes, & nitentes, cortice tenui & fructu facili obdfti, accarne albicante, dulci, farinacea^ referti 5 intra

Pars III.

F

quam

quam ofliculum continetur oblongum, rufum, fulco profundo in longum ftriatum, nucleus continens albicanem & amarum. Hi vero frudhis ramis proveniunt .viridibus, glabris, & nitentibus, duos fermecubitos longis, duoi-quedigitos latis, planis, rigidis a clignofis, nulloque cor** tice veftitis; quorum tenerioribus abfcilfis liquor elfluit pellucidus, aufterus. Provenit #c<>rbor locis montanis, petrofis, & arenofis ubique in Malabar, imprimis circa Warapouli, & Trevancoor: quo vis annis tempore floret, fruftuſ que fert, eft quenon raro ad fexagefimum annum fru-gifera.

Fruftus vero hujus arboris , quem admodum fruftus *Famfelfeu Anedu*, cum folio Betel & calceviva apuperibus manducantur^ avidè quoque ab Elephantibus expetuntur ob Palmito, *hoc eft*, meduUam fuaviflimam ramulis, quibus fruftus adherent, inclufām. C^eterum folia, friiftus, alte-que arboris partes validiflime adftringunt, & fluxus quot cunque potentiflime fiftunt. Infuper e foliis pileos contextunt indigene.

T A B . xx. x^A. X4. X5.

Hujus palmx speciei nemo, quod fciam, nteminit Bovanicorum , atque e fylvcftrium palmarum genere, eft, & refcribi potefit ad eas , quas defcribit *Tifi hiji*. *jinn Makbmicm** fobrante, fructu prami factis. *turii & mid. Brafil. lthr. 4. tap. II. ubi decem fylveftriyn*

TSJ A.

Triplochiton oblongus Blatt. L.

No. 2. Nat.

Douglas wood tree.

Triplochiton


Nat.



Tukamarrum var. *Plan. L.*
as
Pongamia
putrescens *Lam.*
Cecropia *hurit*



Typhlocypris ac. Polau.
S. 19. und 19.
Drosophila rotundata
Taddei. Annot.



TS J <iA K A- M A R A M.

five J A C A , vd J A A C A.

T A B , x6. 27. 28..

*Sjaka-maram & Pilau Malabarenflbus , Ponojfou
JBrachmanis, Jaqueira Lufitanis, SoortfacktnBel-
gis, Arbor eft procera, caudiceex albofla-
[vefcentevariegato, craflb,.pr^duro, mul-
tifqueramisviridi-fufcis, geniculatis dona-
to , qui cortice craffo , dnereo, rufb, ac
intus croceo obdufti, ubi inciduntur ladeum fuccum
ftillant.*

SimiliteriW/Arcrallà, cortice craffo, aqueo, rufo, intus vero ad medullam croceo-rubefcente tefta, nee non fibris fuis late per terram diffufa -, fapor amaricans, odor nullus.

B//^oblongo~rottinda, denia, glabra, brevibus ac rotundis petiolis ramulis inherent, ac longitudine fpithaniamfiiperant,fupernelplendentcolore ex atro-vireicente, inferne virididiluto; cofta media crafla, & in adverfa parte alte extuberans, e qua nervuli transverfi fcabri, & fobalperi ibperiora verfu excurrunt, qui in fe invicem arcuatim deferuntur, atque fundunt diffra&i ladeum fuc- cum infipidum ac inodorum

Fruoios, Jaca, difti, ramis craffioribus > necnon ipficaudi ci adherent, & non raro cum imo caudice, cui inherent, intra terram fepulti: ramulis autem&furculis tenellis non pendent, fed craffioribus, cubiti longitudinem ferme x-

quantibus acnodulatis. Iplivero fructus oblongo-rotundi funt, feu potius *Coni* ingentes, latitudine spithamam, longitudine duas spithamas, pondere viginti quinque libras haud raro fuperantes: cortex namque viridis eft* crassus, & quamvis denfis aculeatis, velut gemmis adamantinis, bullatim exasperatus, intusque albicans & luteus.

Geterum intus in fructibus hicem majoribus, innumen minores fructus intra communem corticem includuntur fructus que hi oblongi, carne pifla, flavefcente, dulcis grattifici mique odoris & faporis, refertij qui finguli in medio unam continent caftaneam, quae intra carnem, tanquam faccolum confitae, ac calbatenui pelliculam, ceutunicam interiore coopertae elunt. Hac autem caftaneae oblonga, & fecundculis inclufe, cortice tenui, cartilaginofo, albicante, & transparente tegunt, cui alter rufus subjicitur, nucleus continens denfum, albicanem, & lafteum, ejus siem cum nofratis bus caftaneis faporis. Porro in medio ingentis hujus *Com* ftylus columnaris, crassus, albicans, & lafteus adeft 5. cui tanquam communi bafi, frudlus minores in orbem locati, inferti sunt, una & altera extremitate ipfi cortici est diametro adhuc rentes 5 inter quos numero fabravitur ligamenta coriacea, albanticia, & subflava, quae & ftylo medio, & cortice affixalunt; equibus, (diflciibz integro fructu) ut & est ftylo, & cortice, fuccus lafteus glutinofus, therebinthinae inftar, exfudat, quo aves capiuntur

Nafcitur hsec arbor ubique in Malabar, & per totam Indiam: fingulis annis maturos exhibit fructus, menfe viz. Decembri, atque a festo circiter latonis anno ad septuagesimum & ultra fructifera eft, propagatura tem hunc in modcun: integer fructus terra e committitur, omnesque fur-

lurculi, quos finguli minores fructus, majori huic Cono inclufi, emitunt, ab incolis vi minimis colligantur, ita ut in unum excrefcant caudicem. Id vero peculiare hie observatur: qu^u arbores locis petrofis nafcuntur, craffiores font, & minus *altx-*, qu[#] arerioifis, altiores, fed minus ~~craff~~^{fej} ad radix arboris cum aquis infiftat, nulos profert fru&us.

Caterum arboris hujus ultra triginta numerantur species ratione fruduum diftinct^u, qua: tamen omnes ad duore referuntur genera, quorum alterius frudus, qui carnifex fucculenta, gratissimi, mellinique faporis turgent, w.^u. alterius, qui carne flaccida molliori, & minus fapidare ferti funt, *Tsjaka-p^uri* uncupantur.

Porro fructus hi maturi corticibus denudati in delidis comeduntur, at laetus comefti difficile digeruntur. Ab in genis frudusteneri in edulis^u n/ expetuntur, vel muriain^u rcondiuntur, veletiam fructa concifico-quantur, aut in oleo de Palma africantur. Caftane* affatiduds faporis funt, & inter bellaria ad fecund^u menfe de-liciashabentur, verumavidius comeft^u fauces peftuque ardore, acdein raucedine infectant: indigene quoque in edulis O/hifce utuntur, atque ex iis fole ficcatis farinam, ex eaque placetas, *Apas* didtas, conficiunt. Nee non cor-^u a, qua caftane^u e pulpam proxime ambit, vicem *Are-*qua seu *Kani%* iis prafat in manducatione Betel. Praterea effrucauum teneriorum cineribus lixivium paratur, quo-^u um lotrices linteamina eluunt. Adh^uc arboris lignum o-Perifabili infervit.

C^uterum è radicibus decodatum paratur diarrh^u am fi-
tens. E foliorum pillvere Bubali excrementis admixto ca-^u plafmacohficitur, quod calidè maxillis appofitum fp-
irno cynico medetur. Ladeus fru&uum fuccuscumpul-

io


H O R T U S

vere calami aromatici tritus > oculilque illitus Nyftalopi# conducit. Tritum cum aceto lignum uvute relaxation^ & faucium tonfillarumque inflammationi prodelt Radix cum fructiis pulpa trita, & addito iaccharo in emplaftri formam reda&a, ac loco dolenti impofita maiigno ac vermiculari herpeti cum vermium nece confert

T A B . 26.27.28.

Errat *Cafparm Bauhinus*, quum *Tin.Hbr.* 12. Sett. 6. fructus quern exhibet, non *Jaaca* eft, fed *Vvriq** Arborem haucinter Palmarum species recenfet, & vo *ACOJI#* & *Garct&ab Horio* > quern *vQCdxFruftirnDnrio-* cat *Palmam fruBu aculeato ex arboris trunko frodmnte: nem major-emf, Jaacam, adeoque errat cum duas plane nullamnam quecum Palmahabet similitudinem. Arbo-* diftindas arborcs, *Durionem* & *Jaacam*, inter fe cqn- rem hanc *Jaacam* defcribunt *Garcias ab Horta libr. I.* fundat. Omnium optimè hanc *Tsjaka-maram dtfcnjbj** cap. 1 *i.Acoftahbr. 5. Cap. 39. Linchotus*, aliique.^jB(w-|P^/«^/« comm.in *Linfiotum*. Ceterum Fruftus hi in tins libr. 6. cap. \$ 1 w obfeure arbors hujus facie mentio- Guzaratte *panaz*, in Caiecutio *jaccros*. Sinenfis Po- nem, quum frudum folummodo deicribat : Et fane lo-mie nuneupantur.





Athenaeum

卷之三

مکالمہ

A T A' M cA R A M.

T A B . 29.



Tamaram ob similitudinem, quam frudus ejus habet cum *Job*, Malabarenibus *ManiLjaka* appellatur, *Brachmanis Atoa*, *Maml-pnofou*, & *Jonajaka*; *Lufitanis Atas*, *8cAtocira*.

Arbor est mediae magnitudinis, ad viginti y circiter pedum altitudinem astringens, cor tice tegitur fungofo intus rubro. *Lignum albicans*, pradrum, *cups matrix* viridior est, inodora, guttufubamara acfubaufera, paucos diffunditramos, quorum ut & ramulorum ac virgultorum cortex viridis est, cinereis interstinctus punculus.

~ RW^ slavefcens rubido legitur cortice, graveolens est, laporis vero unduofi, & in plurimas divisa fibras, qu^ tamen per terram non late diffunditur.

^ *Folia oblongo-teretia* atque glabra foliis *Malake-tsjambo* in parte prima de pedi te haud ab simili a funt, fibi tamen eregionen non respondentia₅ partefuperiore viridia & nitentia, inferiore vero fubviridia, manibus confrifta unftuo ft, inodora: a pediculo ad apicem folii nervus conlpi cuus decurrit, a quo plurimi nervuli oriuntur contortuplicati, qui tandem in apiceret init terminantur.

Flores singuli liiis pediculis coherent, foliis ornatis minoribus, qu^e poftea decidunt; foliis conftant tribus, craflis, triquetris, coriaceis, intrinfecus albicantibus, extnnfecus vero dilute viridibus, odorem corio ufto ^mu* lum, fiadoleantur, fpirantibus.

C^terum e floris ftamine *Frutus* emergit, feu potius *conus*, qui matus magnitudinem habet citri vulgaris, exterius viridis ac ftriatus, interius vero albicans, nee non medullâ focculenta faporis grati, odorifque fuavis refertns.

In his autem fructibus ^Wdura, oblongo-teretia, glabra, nitentk, nee non planar acutriculisi inclufa, locantur₅

ea que fucculenta & albican tetnidkis pulpa artificiose obdudkcerauntur. At vero frua usipf, immaturide carpuntur, quiponte perfemes paorum in ftarm itieantur, ac comeduntur,

Arborha; cn nullibi, nifi foboleaut iemini businhortis fatare pentur. Amat locum calidum & humidum, nec non hmo equmo fubact-um, at querigatione & fcridis folari bus radus gaudet. Et licet fructus holce copiolbs ubique lndra fuppeditet, non tamen Provinda Makbar patrius hujus arboris bcuseft; ledex in fuli_s Phii_{pp} ini_s & Manil haspn m_U ma Ch_{In} cn fibus & Arabibus, & poftea a Lufitanis in Indiam delata tuit.

J W e n n i u m i u m aut triennium arbor hxc
de nūr ^ ? i c ^ , l d d U e b i s i n a n n o i Apriliviz. Maj-
qm Augufto atque Septembrimenfibus, floret, ffi-
ttulque fert: flores namque qui m_{en} fe Aprili emergunt,
Augu^ a r T ^ T r o S p r o f e m n t a E

arnenfe Apn had Oaobrem continui fere fint imbræ, n»-
hilom. nustarnen Auguftus ut plurimum abiis immunis eft,
qua propter ab lnd. 5 inter menfes atftivos numeratur, &
ob eandem caufam a Lufitanis Vtrank_o appellatur Flores

C s t e r u m a r b o r ha^c diu fu-
r? ^ , non "" > ad quinquagefimum annum & ultra
tiugitua eft, modo conveniens ad hibeatur cultura.


* Olia hujos: ari»ris minutim contufa, & addito fale in
cataplafmatis formam redafta, tumoribuf quemalignis im-
P ^ p o t a t c r e o s m a t u p n t Frua us vero immaturi in
aqi. aconimun. cum pauxi Uo Zin ziberis decodi, vertigini
SS^{3t} (uffic! cntcr m_i «ga»i, & in deliciis comefti
vai ie resjfgen vumque reddunt laxiorem fi aqua fu-
perbibatur.

TAR. 29.

Atamaram ob fructus similitudinem videtur species
Frake. Recchus de plantis Mexicanis pag. 348. figuram ar-
boris cuiusdam Atamaram per filius proponit, quam
Abate de Panuco vocat, & hisce verbis breviter descri-
bit: Abate de Panuco vel Ate Pannicensis, aut Trifypa-
lii, fructu apud Mexicanas præcidenti, arbor nobilis, Fo-
rum aurei ponit, Fructus cœruleus, sed in nigrum tendens,
ferro polito simili, rotundus, totus quasi ex glandulis confans,
pineæ nucis figura, ramus vero castanei, folia juglandis.


J. W. BURTON - PUBLISHER

10



J. H. Gray - M. C. Gray

230



ANONA-MARAM, an ANON OFIEDI

TAB. 30. 31.

v,, ^xLtera eft Atamaram species, qua^Malabaren-
v| giibus/W^/^/, BrachmanisTsjina-pamlott,
il iLufitanis Anom nuncupatur Eaque pra-
% Wcedenti haud abfimilis eft, nee proceritate
fei^^Mcedit.

Fo^tamenanguftiora magisque acumina-
ta, ac pluribus ornata nervalis, nee non altiori vioren-
tentia.

Flares a prioribus vix differunt.

Fmtfusvero licet non, *wnAtamaram*, ecompa&ililigno-
iarumfquammarumtruecompofti, fed undique glabro,
hyacinthino, ac tenui nitente cortice obdudti fint, nee ma-
gnitudine cedant * quoad cetera tamen plane cum iis con-
veniunt.

Arborhax quoquenullibi, nifi fobole autfeminibus in
hortis fata provenit, nee Provincia Malabar natale ejus fo-
lum confituit, fed e longinquis regionibus prius in earn
allata fuit, quapropter haud perperam Malabarenflbus
Parangi-jaca, hoc eft, Jacaperegrina appellatur.

Vires cum priori eafdem habet.

TAB. 30.31.

^{^m^w^quocjueyrf^speciesmerirohabeturifct Fabitt Cofomnammt-m Rtcfrwm , qax Centmih}
^{^oitmiludineni Fruftus, eamque Rtcbr* hhr., c^Jconfirmaturfirborishujusdefcriptio ex Ovieii Ufa, 8.}
^{• aeferibere vtdeetur nomine^Lstautzapottieu Anma, Cap: 1?. cum n Fabii Columna ronfiratur, hucque}
^{te natUr que non folum in India Oricntali, fed ettam! referatur Gurniabmo eviedi, quis fpeciej: eft An ma-}
^{pluribus i in locis calidioribui provenire, uti in Iniiila maram. Jofipbia Acejia tibr,q. Cap. 15. quoque men-}
^{Helina, atfue in QuaulnaeinfLnovse HifpanitE pro- tionetnfactt Anina\|tM.Gusmabie><, que huic Anmg~}
^{vi»cis. extorianarborlii«c Anme ovkii eft, whi ccn- \maram pwfimiliseft.}

Augst. 1st
By Dr. Wm.
Dale, phys.
at work
from
C. G.
Leaf.



A N S y E i

T A B. 3*-

ARBORHSEC Malabarenibus *Amjeli*, Brachmanis *Pata-ponojou*, Lufitanis *Angeli*, Belgis *An-/<?//nuncupatuf*: Eftque vaft[^]magnitudinis, atquelēdecimmenfuram craffitie non raro fuperans, multifque ramis rotundis, geniculatis, hirfutis, fubafperis, & fpadiceis donata; *Lignum solidum, prædurum, albicans, intus subrufiim, craflb, viridi, acintusalbicantecorticetedium, qui infiiper cinereâ, & aufteri faporis cruftâ fquammofa obduftus eL*

Radix crafla, albicans, fibfata, coitice craflb candido, canticulâ rubicundâ & Iquammofa obdu&o, tefta, odoris & faporis fylvefris & ingrati.

F[^]brevibus, rotundis, ac hirfntis pedunculis ramorum geniculis ordinedecuflato inherent, oblongo-rotunda, denfa, glabra, longitudine pithamam, latitudine palmam[^] quantia, fuperne colore ex atro virefcenitentia, inferne viridi dilutiore, nee non brevibus ac lanuginofispilis obfita, adeoque alp̄era, & manuitangenti adh[^]erentia, nervis aliquot villofis & filbalperis e media cofta in latera excurrentibus. At vero tenella folia e vertice ramorum prodeunt, fpadiceo-viridi villofo involucro inclufā, uti & in *Titns* cernitur: ipfa vero arbor cum teneriore ft, in tres l[^]inias plerumque incila Hint folia.

Florum loco fupremis ramis>/[^] arbor base producit virides, intusalbantes, teretes, ac lanuginofos, longitu[^]

dine fpithamam > craflitie digitum^equantes; iique liccati candelarum inftar a pueris in ludis accenduntur.

Fru8t», Angelica didi, rotundis, craffis, fpadiceis, ac lanuginofis pendent petiolis oblongo-rotundi, corticecraf-*lo*, aculeato, feu potius echinato, viridi, & dein flave-
fcente obdudi, frudibus z w * haud abfitniles, at pugni magnitudinemfuperantes: intus vero, utiin>*cernitur, alnminoresfrudus oblongo-rotundi, ac fulcatiintracorticem&medullamoccultantur, fkbarum autcaftanearum adinfar, faporis acido-dulcis & vinofi, odorifque fragrantis: necnonintegrofruaudiffciffoladeusfuccusfilla-


Crefcit hsc arbor locis petrofis & arenofis ubique in Malabar, inpnmis in fylvis Kalicolan: fingulis annis, menfe viz-Decembmfradusprofertmaturos, ac integrum feculum frugif era manet. Ca^terum exficcata, calefadaque hujus arboris folia artubus impofita eorum dolorem ac rigiditatem demulcent: Eadem tefticulorum intumdcentiam e contufionevelquavisexternavi ortam, ut & Wjwxj, ^^^TM^ difcutiunt, at in pulveremredada, &cumunguentoalbo caphuratofonnfecus applicitaBubones venereoscurant, vel cum radice curcuma trita, atque indies parti afFeda;affrida vi fua adftringente vaforum orificia confolidando inveteratum haemorrhMum fluxum plane reprimunt. Frudus vero maturi avidius comefti diarrhaam'facile excitant, quam arboris radices & cortices facile fedant. At oleum eiudibus codis expreflum vel intus fumptum, vel foris applicitum appetitum excitat, ac alimentorum in ventriculo fermentationemjuvat: idem cum affato&tritoallio, nee noncoagulatoladefrixum,&podici admotum hajmorrhoidum dolores potenter fedat.

Infuper lignum arboris operi fabrili accomodum, ex eo queingentesciftx, & naves fabricantur: neenon ex hujufmodi


modiarboribusexcavatis naviculas Indi conficiunt, qius *Mansjous* appellant, quarum nonnulfce longitudine o&o-ginta, latitudine novem pedummenfuramfuperant, at vero naves ex ligno hujus arboris, quamvis duro, confstrutae in aquis vermium putredini facile obnoxfe funt, pxx-fertim in fluminum aquis minime falfis.

T A B - 32.

Arborishujusaccuratamdcfcriptionemnullus Bota-
nicorumtradiditj ejus tamen mentionem facitZononiiv, dtfcrationem; uti nee *hinefotus*, qui quidem refert ex
eamque *Angelina**** *arboretjt* nuncupat, Eftque forfan hujus arboris trunco continuo in India naves, *Twos vo**
Angelina arbor B.P. fed *Angelina arbor Tifonis* nullam cum catas, ex ftrui; fed prxterea nihil addit*
fecit habet fifmilitudinem. *Chrifji Acojl* Cap. 33.* etiam




Katun-Tjukka, Lar.
Bij Suu Bo, Mal.
مَحْمَدْ طَوْبَاجَانْ لَار.



K A T O U T S J A C A.

T A B . 33.

 *Aton Tsjaka* Malabarenibus , *Bavo pff.* Brachmanis; *faqua falja* Lllfitanis, Morgensterren Belgis Arbor eitprocera, caudicecraf- fo, pr^{dn}ro, imiltifqueramisdonato; qui corticeglabro, cinereo, intusviridi, fapo- risodorifque fylveftris obdufti, atque medulla intus rufa 8c molli referti funt.

Radix fibrata, albicans, ac filico cortice teda, odoris laporiique ingrati.

Fo/^geminatabrevibits, craffis, acrotundispetiolisor- dinedecuflato furculisgeniculatis inherent, oblongo-ro- tursda, glabra, denfa, fuperne colore exatiro vircfcente nitentia, *inferne* viridi dilutiore, nervis aliquot è media coftainlatera excurrentibus; odor fylveftris, laporaci- diufculus.


Summisramis innaicuncur^/^; ^/^'/^, queis denfa con- gerie in orbem F/^// flavefcentes inodori iniident, qui è calyce candido in quinque lacinias feſto prodeunt, & quinque oblongis, exteriora veriiis reflexis confhnt foliolis, totidem in medio rufis ftaminulis pr^{ed}iti, inter qua* oblongus, furredus, albicans prpditftylus. Flofcu- lis vero decidentibus/-^/^/^/^ virides funt, qui dein ru- bicundi, tandem quenigricantes & fragilese evaduhtj & fi afJ3eriustra6lentm% facile folvuntur, ac in plures oblon- gos, virides, nitentes follicnios fecedunt j quibus nume- rola, albicantia, exigua, oblonga continentur j f««^; fa- por intus aqueus, in cortice vero acidus.

Nafcitur in locis fylveftribus Malabar, in primis circa
Pars III. L Cran-


20 H O R T U S
Cranganoor; quo vis animi tempore floret, fructufq^{ue}
fert, acdiufrugiferamanet.
Efrudtibusvero expreflus fuccus vcntris cruciatus tin*
tigat.

TAB. 33.

Arbor hxc nullibi descripta reperitur, & quan- cum ea similitudinem habet, adeoque *nee ejus* ^{spes}
quam *Tsjaka* feu *Ja&a* vocatur * nullam tamen cics habcri potest.



PE*



Trop. Afr.

Dicot. mal.

*VELA feu GU^AJABO R**POMIFERA INDICA BP IN.*

T A B . 34.



Rbor hxc Malabarenibus *Pela & Pekuka* ;
 Brachmanis *Per a*, Lufitanis *Guajavas* feu *Pee-ra*, Nofratibus ibidem *Goejaves* appellatur.
 Eftque juſt^e magnitudinis, viginti circiter
 1 pedes alta, caudice redo > pr^duro, fes-
 quipedalicraffitudine, multiue ramisdo-
 nato, quicortice glabro, rubroyirentelaporifqueaufteri
 obdufti fiint,* novellis tamen omnino virentibus, qua-
 drangulis ac undique alatis.

Radix rufocortice teda fibris fuis late per terram diffundit.

Folia decuflatim brevibus craffisque pediculis ramisfur-
 culifque coherent, crafla, oblonga, acuminata, & non
 nihilcrifpa, nervis aliquot ex media cofta in latera excur-
 rentibus, inferne fabrafeitafpefa, fuperne iiequaquam;
 color ex atrovirefcens, odorgratus, faporvero aufterus.

F/omcandidiacinodori, quatuor, quinifve tenuibus,
 oblongo-rotundis foliolis conftant, multis in mediofta-
 minulis pr^ditialbicantibus, qu^ tamen apicibus feupo->
 tius nodtilis flavefcantibus eleganter funt ornata.


*TruOus.*nofratibus pyris hand abfimiles, in vertice um-
 bilicopr^ditilacunolb, ac tenui & e vifidialbicantecor-
 tice cin&i 5 maturi gratum fpirant odorem , maturitatis
 indicium, carneintus albicante & fucciilenta, dulcifque
 ac grati faporis referti, qu^ tamen in immaturis valde du-
 ra & adstringens 5 intra quam numerofa fubrotunda ac
 pr^edura oMervantur grana.


.. Arbor haec nufquam sponte in Malabar naicitur, sed Jaahnegotio in hortis alitur. Seminibus fata tertio anno fruauit icrt, quos plerumque menfibus Tanuario & Februano maturo se exhibet, manetque frugifera ultratriginta annos.

Ex foliis hujus arboris in aqua coftis Balneum conficitur, quod sua caliditate ludores movendo febrem lanat. Nec non e corticibus radibusque decotum paratur, quod iubin de affumptum vicerum obftruptiones referat, aquas hydropicorum ducit, & iderum tollit. Fruitus in acauino incoafdiarrhā sam ac dyfentriam fiftunt: iidem que matim av, de comeduntur, & in bellariis effe folent, alvumquelaxant.

TAB. 34.

Telam hanc deficit *Hift. Nat.* & *Mel Braft* L. ru & n., V_{rt} ^ . . ,
 A*fr. Alcapa* nominis *Gisajaba*. Eumque ~~in~~ *XIV* M^ t ^ V t " fructus hi in Indiis
 cap. 51. ^ i tres ejus po pntis ecies. Etrffert
Job. de Laat libr. 10, cap. 3. Cuayavos pro venire in Pe-
 Pin. libr. U, Se<a> 6. & *Gudyavalndicafrua** tn alifatice
 Jon. *Bauhini* *Hift. Plant. Tom. I. libr. i. cap-4* r





Mitchella repens
Linn.
var. glandulosa
Mak.
Te
G. Müller
diss.

MALACKA - TEL A

TAB. 35.

[REDACTED] Rbor hxc altera Pete species eft, ac Mala-
 barenfibus Malacka - Pela & Tsjma - Peloucka,
 Brachmanis Pera, Lufitanis Pera de Malacka,
 Inofratibus ibidem Goejaves appel dicitur. A
 j priori vix differt, nifi foliorum & florum
 magnitudine.

Fructus autem rotundiores > ac malispotius affimilantur,
 intus carne punicea aciducula prxdicti. Et quemadmodiim
 prior, fie etiam hxc nufquam fponte pro venit in Malabar,
 fed exteris è regionibus allata fuit, uti nomen *Malacfaindu*
 care videtur, quanquam nec Malacka patrius hujus arbo-
 risfinuseftj at è Moluccanislnfulis, aut China, autfor-
 fan è Nova Hif pania prius transferri c^epit.

TAB. 35-

/1 ten hxc Guayavos species eft Xalxojojptlfrima Rcmhi, & Araca-GHacu Tifom; cum priorc ubique crefcit>
 illi & deo rettatur.



Pars III.

N

PM-

Peltu lat.
Mal. مال
Lus. لوز
Ind. نیزه



TELOUfeu GUATABO STLFESTRE.

T A B. 36.

Delm & Katm Pela MalabarenfibdS , Pelouarta [Bradimanis, PtraBravaLuftan'lS, wtdcGoga- wBelgis, Arbor eft mediocris magnitudi- nis, decemautduodecimpedesalta, caudi- ce mediocriter craflb, multifque ramis in or- bemdiffusis d>nato, cortice craflb, ligno- fo, fcabro, furvo, acintasrubro, obdu&o; Lignum al- bicans, denfum, ponderofum, infipidum, odoris fylve- ftris.

Radix itidem albicans > cortice fusco intus rubro tefta.

Folia oblongo-rotunda, crafla, mollia, lanuginofa, in ambitu crenata, craflis, brevibus , albicantibus petiolis ramorum extremis, proveniunt rubicunda₅ qu^ tamen po- fteafuperneatro-viridia,infernefubviridia evadunt, lon- gitudinetres, latitudineduaspalmas facile fuperantia, in- fipida, inodora; `apediculoadapicem folii' coftainfignis albicans decurrit, que plures undique emittit nervulos<

P/orwbrevipediculo extremis furculis multi fimuljundi infident, atque è calice viridi quadripartito prodeunt, quatuor craflis, oblongo-teretibus, flaccidis , viridi- ftriatis foliis conftantes, numerofis ftaminulis albicantibus, flavefcenibus dotatis apicibus, medium floris cavi- tatem &umbilicum occupantibus,- inter qu^ ftylus pro- ditoblongus, albicans: odorgravisacfctidus, lapor amarus.

ir^&pyrishaudabfimiles, ac viridi, glabro, nitente, &duriorecorticecinfati, intufque carnedenfa & albican- tereferti; intraquam oblongo-rotunda, glabra, rufa, denfa, fapore caftaneas ^emulantia, locanturfemma: fru- ftu^vero immaturi valde duri funt, fbetidi, faporifque ingrati₅ & quanquam maturiores faporis liibdulcis eva-

Pars III.

dunt,


dunt, nontamen obvenenatam, quapnediti Hint, q^{ua}~ litatem comeduntu r.

Crefcit arbor hscubique in Malabar, in primis circa CQ" chin, & Porka; menfibus MayoScjunio floret, &aflti quisdecidentibus, no vis frondescit foliis, fructus yero lequentibus fert O&obri & Novembri, diuque frugife^{ra} manet.

Cseterum arbor hxcin Medicina ob venenofamquahtatem nullum habet ufum\$ corticetamenapridele£lan^{tur} quern in finem venatoribus in ufu eft.

TAB. 36.

Cenus hoc *Itk* feu *Gnaywos Sjheflrit*, I ncmine haftenus defcriptum, tertia ejus species *toaōo* hab:ri potefit.



CO-

Cornus *lanceolata*
M. M. M. M.
B. B. B. B.
J. J. J. J.



COFALAM feu. CITfONfA EXOTICA.

C A S P. B A U H. in P I N.

T A B . 37.

 *Ovalam* Malabarenfibus, *Belou* Brachmanis,
MarmektraLuftanis> *Sfym-appelsBdglS*> Arbor
 eftprocera, caudiceexalbo flavelcenteva-
 riegato, craffb, praduro, multifqueramis
 donatOj qui cortice craflb lignolb obdu-
 &i, ac fpinis oblongis aculeatis muniti funt.

Rami autem vetuftiores fpadiceo - fufci , teneriores vero
 abunapartevirides, ab alteraquaradiisexponuntur folia-
 ribus, rubicundi, uti & ipforum fpin^e.

Radix fibrata, albicans ac rufo cortice tedla, odoris gra-
 vis, laporisdulcis, deinde amariufculi-

Folia terna limul ex eodem pediculo nafcenia, oblon-
 go-teretia, inambitu crenata, communi virore nitentia,
 ffiaveolentia, auftera, manibusconfriftaunCtuofai à pe-
 diculo ad apicem folii cofta iniignis decurrit, qax plures
 undique emittit nervulos.

Flores fuaveolentes fexleptemve uni pediculo inherent,
 atque è calyce viridi in laciniis fedtb prodeunt, & quinque
 oblongo-rotundis, craflis, reflexis, exterius viridibus, in-
 terius albo-viridibus conftant foliolis, multis in medio lub-
 viridibus ftaminulis, viridibus apicibusdotatis, pr^diti;
 inter qu^eftilusprodit oblongus. craflus, furreftus, qui
 ipfius fruftus rudimentum eft •

FruBus mala rotundaexterñafbrm^areferunt^quostegit
 fubviridis tenuis cortex, cui lubjeftus alter pr^duruş li-
 gnofus, e&peneofleus, carnem continens vifcofam fub-
 flavam,humidam, faporisacido-dulcisj intraquamfemi-
 na plana oblongo alba, gummofo pellucido fucco intus
 turgentia, reconditafunt.

Pars III.

p

Na.

Nafc; turfrequentcrinTcckenkour, Kalico Ian, aliifque
Irovincus Malabar, nee non in Iniiila Zeilan: Seminibus
xto vel feptimo demum anno frudus fert, quosta-
riguiisannis Decembri & Januario menfibus matu-
ic sexnibet ac integrum ie culum irugiferamanet

ix autem fru&us tenerii ac charo vel aceto conduntur
matanores vero in delie iis coaiedunt Lir. Ex arboris cortice
6c radicuhs cum aqua communi decodum paratur,
quod melancholiam hypochondriacam., cordis palpita-
tionem, & lypothymiam fanat. Ex eodem cortice in fu-
btilem pulverem redadlo, & melli admixto E leauarium
connotur, quod mane fumptum aiirncntorum in ventri-
tuio termentationi juvat, capitis dolorem ac vertigi-
nem to Jht Polibram decodum afhtmati medetur. E%
flonbus aqua defWllatur cardiaca & alexipharmac. Fru-
ttus demque vix matnri diarrhccam & dyenteriam ^{Jiaiaf.}

T A B. . 37.

*Covalam si non ipsa arbor, quam exhibet Bontius
lib. nat. de Med. Indiae oriental. lib. 1. Cap. 9. no mine
Mali Cydones Indici, rakem species ejus trf. C, ricas ab
Horto aromat. lib. 1. Cap. 14. vocat cydoniam. Rou-
la, usitano illi
gala, Bengalensis Script
s de Ben-
ane*

*cum Brachmanico Belou 2. sitanico Marmelina
conveniunt. Intuper Caffer Durante in hortulo sanitatis
fol. 5, d. 1. bir. Covalam nomine Marmelis de Belo
Cydonia exotica Caspari Bauhini in Pi-




STR

Syngonium, Schlecht.



Syphax L.



S T A L L T A .

T A B . 38. 39.

 Rbor h#c Malabarenibus *Syalita*, hoc eft *Synceritas*, appellatfir, Brachmanis *Karinbala-pala*, Lufitanis *Fruita Eftrelada*, Belgis *Roos-appel*. Eftautem procera, quadraginta aut quinquaginta pedes alta, caudice admodum cralfo, cortice itidem craflb munito, qui cuticulâ cinereâ fquammosâobduftus, intus albicans, aqueus, ac ubi inciditur cōpofam aquam adftringentem exfudans.

Similiter *BA^X* crafla eft, & tenui rubro-riigricante fquammofo. intus vero ad albicantem medullarn purpureo cortice tefta, nee non fibris fuis late per terram diffufa, fapor acris, odornullus.

Mia oblongo rotunda fingula craffis, intus cavis ac villoſis feu lanuginolis ffiis petiolis inherent, longitudine fpithamam, latitudine palrnamluperant, fuperne Iplendent, infernenequaquam, color ex atro-virelcens* cofta media craffa & in adveria parte alte extuberans, e qua nerviplures ordinatim ferme bini & bini perallelo dudtu ad prominentes dentatafque oras exeunt j vetuftorum odorut&fapor fylveftris, novellommacidus.

Inter ipfa autem folia e valido, craflTo, quadrangulo caule *calyx* prodit, qui admaliaaurantii magnitudinem auftus *MQ* aperit, conffans e quinque cochleato-cavis, viridibus, craffis, validis, nitentibusfoliis, feupotius cavis involucris '*Elm-em* cpntinentibus formoffimum & admirandum, itidem e\uinque albicantibus, glabris, cavis,

Pars III

Q

rotun-

rotundis, coriaceis foliis conflatum, plurimis in medio capillamentis albicantibus, aureis apicibus dotatis, primitum, quse infuper albicante umbilico ftellato, jeleganterevigintiangulisformato, fiiperius ornata font Pofl> quam vero flos ita apertus fuaviffimo ac liliaceo odore feptem o&ove dies elegantiamfiamprbiexhibuit, quinque ejus albicantia folia ftellatum umbilicum, ut & albicantia capillamenta inftar fetivas braffic^e ardiffime contringunt \$ dein crafla cochleato-cava viridia nitentia calycis folia omnes illas floris jpartes occludunt comprehenduntque, qu^e unitafingularium,. qILX in flore funf, p&~tium *complicatio Fruffam* efformat pra^grandi malo fimum. At vero floris ut & fmftus hujus varias partes., & multiformes earum imagines accuratiusqui cupitintueri,

Tibi duashafcetabellasperluftret, ubi N°. i. adverlafoliip^i⁵-
 2. petioli, quibus folia inherent. 3. cofta folii media alte extuberans. 4. fuperior folii pars A. A. A. calycis folia craffa, cochleato-cava, viridia, nitentia. E.E.E.E. ipfius floris albicantia cava, rotunda, coriacea folia , acido ac vinpfo fapore pr^dita , quse quutn calycis folia A-A. A. occludunt ac comprehendunt florem, plane mucofc fiunt. G. G capillamentorum in floris medio congeri ^.
 F.F-albicans umbilicus ftellatus, quo f los aut fructus in medio ornatus eft, exhibentur. N°.6. idem flos, qtium separatis craifis calycis foliis, bafis ejus. M. appare? & D.D,D. quomodo floris capillamenta G. G ipii b^fi- M-adherent. K. L. separata quxdam albicantia floris capillamenta. N°. 7. confpicitur floris bafin. M. ut & ft^/ latum ejus umbilicum. F. F. ex pluribus albicantibus femiuim folliculis inter fejunfts conftarL quorum unus 1.1. separatim delineatur, quemadmodum. P. exigua^ albicantia rotunda, qu# continet, femina adumbranturj & M°. 8. H. H. quo ritu leminales thecaj junguntur, ^{ut} floris bafin, & ftellatum ejus conftituant umbilicum- At* que hæ omnes multiformes partes fa flore reclufb & *
 dupto

du&o levi operâ separantur, qua? tynen in claufo non tarn facile exhiberiqueunt. N°. 1. A. A- maliformis fru&usper-
 feftus softenditur, in quo craffacocfaleato-cavacalycis fo-
 lia , qu^e didu&a cum i lore aperto *Tab*, \. exprimuntur > tam
 exaftefibi mutuo junguntur, ac ornes floris partes ita pc~
 cludunt, comprehenduntque. liteoram veftigia vix dif-
 cerni queant; adulto autem fruſtu, iifquedemptiscandi-
 cantia ipfius floris folia plane mucola conlpiciuntur: qui-
 bus porro detraftis florid us exfpendet after N. z-B. B.
 B- vifcidam in fruſtu ^mulans carnem, ficuti floris capilla-
 menta albicantia CC Clubricis & mucilaginofis fills afli-
 niilari poſlunt Sublato vero hoc ftellato vertice inferio-
 res defignuntur appendices, veras feminum capfute N°. 3.
 D.D.D. in quibus numer.ofa latent femina tenaci glutine
 tanquam pifdum ova coh^rentia, tabaci feminibus haud
 majora: adeo ut flos & frudtus ab ortu ad interitum eadem
 partes, formâequidem&fitu, non vero eflentiâ vel nu-
 mero, difcrepantes obtineant.

C^eterum fruftushi nofratibus poriiis vinofis fere affi-
 milantur odore> fapore, & pulpa₅ meditullium tamen
 paulo aliter hie conformatur: etiam pulpa in fruftibns hil-
 ce maturioribus faftis molifima evadit.

Crefcitha^c arbor in multis locis Malabar, praciue circa Cochinchina, & Provincias Moutan₅ femel in anno, Decem-
 bri viz. & Januario menfibus, fructus fert, & a fationis an-
 no circiter quarto ad quinquagefimum & ultra frugife-
 ra eft.

Fruftus hi ob nimiam acriditatem in deliciis vix come-
 duntur fed in eduliis, pr^ fertim indigenarum jufculis
 ufurpantur. Ex arboris foliis lixivium fit, capillorum un-
 ftuofitati, accapitis foribus abfumeiidis, nec non argen-
 to decoquendo, adeoque depurando accomodum. Suc-
 cus e radicibus expreffus cum linteis applicatiis tumores
 phlegmonofos accedemato foſrefolvit. E fruftibus tene-
 rioribus exprefliis fuccus cum faccharo milcetur, ac inde

4** ^ H O R T U S

lyrupsconficitur, q#iphleg_matainciditacexpellit, tuf-
iimfedat, necnonfauciuminflammationem, &aphthas
tollit: Frudus autem maturiores laxam reddunt alvum,
& diarrhceam non raro excitant. Deniquearboris cortex
amoryzx infiifo (quod indigence a J * w ^ nuncU-
pant) tritus, partiqueaffedte iUitus arthritidi medetur.

a *Ambatacanja* Incolis vocatur illa oryzæ aqua, quæ per noctem super coctam oryzam infusa fuit.

TAB. 38. 39.

A,borh*c, .neminehaaenustrfa, nonnuledici posset *Malus roſa Malabarica*.





Blaat.
Blad.
Ambetti.
Flora
o
Clad.

BL ATT I feu JAMBOS STLFESTRIS,

TAB. 40.



*LamfcuKatouSTSjambou, quafi fylveftris Tam-
bou, Malabarenibus hsec arbor dicitur,
Brachmanis Ambetti, Lufitani Š ^amboudeMato,
Belgis sterre-bolkn: Eftque mediocrismagni-
tudinis, quatuordecim circiter pedes alta,
craflb cinereo lignofocorticetefta?utiT^
&*> lignum albicans, prcedurum. Rami ac furculigenicu-
lati, nec non teneriores qui ad ranguli & alati, primum ru-
bicundi, dein fpadicei * vetuftiores vero alis privati, ac
rotundiores.*

Radix nigricante cortice teda, odoris ac laporis fylveftris.

*Po//^brevis, planis, purpureis, ac alatis petiolis, ex
adverfout plurimum ramulis inherent, oblongo-rotun-
da, glabra, denfa, communivirorenitentia, nervis ali-
quot ex media cofta in latera excurrentibus, longitudine
fex, latitudine quatuor ferme pollices iiperantia 5 odor
nullus, laporaufterus.*

*Flores inodori ac acidi floribus NaH-ujamboupa Yt 1. fig. 18.
exhibits haud abfimiles, lex oblongo-teretibus^ acumini-
natis, tenuibus, purpureis conftant foliis. & fngulibre-
^i ac quadrangulo pediculo extremis ramulis prodeunt \$
nec non lato > profundo, craflb, viridi, in fex lacinias fe-
& o, inherent calyci, qui plurimainfi pereniittitftamina
robusta, eminentia, oblonga, purpurea, rubicundis fal-
catis apicibus eleganter ornata.*

*Fruictm mala funt piano-rotunda ac lata, viridi-fufca &
nitentia, in vertice ftylo oblongo fubviridi dotata -, ad ba-
finverocalycepiano, lato, cairo, ac viridi excepta, qui*

Pars III.

S

ob-

oMongosfuoscufpideslateextendens, ac exterioraver-fusrefleſtens> ftellamexatterefert. Geterum fruſtushi, quanquam maturiores, duri funt, carne intus albicante &fucculenta> faporifque valdeacidi, referti,intraquarfl plurima angulata albicantia obſervantur femina. Infuper fru&ibus hifce transveriim difle&is feminum folliculi, eleganter in lpeciofe arboris formam per carnem difpofiti> albicantes fefe offerunt, qui tamenab aërisattaftumoX plane nigrefcunt, ac fi atramenti liquore effent imbuti.

Circa Palourti & Tirpoutarë Provincias Malabar, in flu* minum ripis, aliifque locis aquofis plurimum *hxc* arbor naſcitur: iemel in anno, menfe viz. Augufto, maturos exhibet frudlus, & à lationis anno tertio aut quarto ad vi-gefimum circiter frugifera manet. Frudxis vero hujus arboris ab indigenis coquuntur, & cum aliis cibis come-* duntur: fuccusaſtem e fruſtibus exprefliis, & melli ad-mixtus aphthis medetur, hec non febricitantibus ſeſtutn potentercompeſcit. E foliis contulis cataplafma confici-tur, quod capiti rafo in febribus. continuaſ impofitum fomnumconciliando delirium folvit.

T A B . 40.

Arbor *hxc* LuGtanis *Jamhon de Mato*, hoc eft, [quapropter malè hie loci traditur, fed potuiflctdefd^{bi} *Jambos Syheſtris* appellacur; clique *tertia Jambou* fpē; in Parte prima poft *Nati-Schaſmbu* Tab. i& cies, cujas nullus Bocanicorum haſtenus meminit,-]



Pantjika macam. Sar.
پنچیکا
Tembor. *frum.*
تمنبور
لیکھی



TANITSJIKASMARA M.

TAB. 41.

P Anitsjika Malabarenfibus > Tembiri Brachmanis₅
Fruitadagrude Lllfitanis, Lym-appel Belgis, Ar-
boreftprocera, altitudine odtoginta, craf-
fitie veroquindecimpedum menfuramnon
rarofuperans, multilqueramissonata} Li-
gnum prsedurum, albicans, nigricante aufterique lapo-
ris cortice obduftum.

Radix itidem albicans nigricante cortice tefta, & fibris
 fuis late per terram diffufa.

Folia oblongo- rotunda, glabra, denft, nitentia> craf-
 fis, brevibus> viridi-flavis petiolis rubicunda prove-
 niunt, qu^{ae} tamenpofteafuperñeatro-viridia, infernè
 subviridia evadunt, odoris & faporis fylveflris ac ingrati :
 ^ pediculo ad apicem folii nervus decurrit confpicuus,
 rotundus, viridi-albicans, infernè eminens, èquopl-
 rimiexoriuntturnervulicontortuplicati> exigui.

Flores vel candidi vel albo-flavè(centes, brevi pediculo
 extremis furculis multi fimuljun&i infident, atque e caly-
 ce viridi-flavefcente prodeunt: conftant ii unico folio,
 fed in quatuor aut quinque profundas lacinias divifo, fie
 ut plura videantur, numerofis fibris pallidis erediſ me-
 diamfloriscavitatem & umbilicum occupantibus 5 odor
 fuaviflimus&aromaticus, necnon è longinquonaresfe-
 riens.

Frūttus, qui etiam plures fimul jBoribus iiiccedunt, ac ca-
 lyceviridigrandiufculoexcipiuntur, exadc rotundiſtint,
 &pilarum obtinent magnitudinem, in vertice umbilico

Pars III.

T

præ-

pnediti, & cortice primum virid L dein rubro villofo feu lanuginofo, tandem vero glabro & cinereo *cin&i;* carne intus albicante, subviridi, & aquofafe upotius glutinofa, faporifque primum valde acidi > dein acido - dulcis > referiti, intra quam o&o aut *decem femi»a* rubicunda, plana, oblongo- rotunda 5 *fructuum Cacao #mula*, ac utricuiis inclufa, in orbem locantur , ea que glutinosâ fructus pulp&artificiofe obdupta cernuntur. At vero immaturi cum hi *b\l-* ftus fint humore glutinofo, gummoib, & aqueo-pellucida ita abundant, ut cortice pluribus foraminulispertufogut" tatim exfudet, qui radiis iblaribus in fubftantiam fpiifiorem concrefcens, ipfum fructum gummi inftar oblinit: fructus autem quum indies maturefcunt, vifcofitash^c, ut & humor ipfe minuitur, donee tandem modico ac grato fuo co repleti efui apti evadant. Nafcitur hsec arbor ubique in Malabar 5 quo visanni tempore fructus fert, quanquam Aprili & Odobri Menfibus ut plurimum floret; atque a feptimo circiter fationis anno ad centefimum & ultra frugiferaeft. Arborishujus folia tenella cum aqua trita (quam medicaminis formam plerique Afiatichi pro more habent) ac potui data, vel etiam fiiccus e frudibus tenerioribus ex preflus egregium eft ad aphthas & lingua fifluras remedium , fi ore contineatur. Idem fuccus ociilis inftill^⁸ ophthalmia conductit. Arboris coitexin pulverem redat us accum *oryzx* infuso., & ex preflb è matura nuceln-dic^lade ofucco mixtus > atque febricitantibus exhibitus ^eftuin potenter extinguit: infliper decorum ex hoc cor^tice paratnr, cui mel admifcetur, idque af lumentum ventris tormina fedat. E lèminibus oleum exprimitur, quod cum zinzibere & leminec Limini fumptum hydro picisi ^{uc*} currit; infuper alvi cruciatus lenit, eandemque evacuat. Fruftus vero maturiores cum inclufis lèminibus feu ⁿ_u cleis

cleisabindigenisfomeduntur. Succus denique ghitino-fus, gummo-fus, pellucidus, qui `efra&ibushaudmatu-ris exprimitur, radiis folaribus concrefcens acrufefcens> feu exrufo-nigricans, & velut vitrefcens, optimum eva-dit *gluten*, quo ad.qu#cunque.arfffrffimè conjungenda utuntur incofce: quemadmodum Judaei & Lufitani in com-pingeiidis libris folo hoc glutine utuntur , quiqe ob id teredini nunquam obnoxii funt: nee non pilcatores eo-dem hoc gltitinofo liicco retia sua inficinnt, ut durabi-liora evadant.

TAB. 41.

Panitsuka-waram defcribit *Fiji* bift. not. & M^jcriptionem. *Genipat* *Tkeveti* si non *Tanitsjika-ma-**
Brafiliens lib. 4. cap. 6. nomine *Janipaba*. *Clufius* £xo-ram, faltcm species hujus eft. Infuper Job. *Bauhim*tic.Uk u cap. 10. vocat *Junipapeywa* *Brafilianorum*; lib. *cap. 4. & 5- plura hujus arboris genera, h vaiiis fed quoniam exficcatum fructum ipfi folummodo li- au&oribus collecta, proponit,
cuit videre » accuratam huijs arboris non addic de^




Nierembergia, Lax.

ବୁଦ୍ଧିଜୀବ ମାଲ

Rima-bella frum.

ମନ୍ଦବଳ୍ଯ

ନିର୍ମିକାରୀ
Arab.



N I I R FA L A.

T A B. 4².

[REDACTED] jRborhasc Malabarenibus *NiirvaU*, Brach-
 rmaniS *Ranabeiou & Pretonou*, Lllfitanis *Pee do
 Morto*, Belgis *Bomheenen* appellatur: Eftque
 Ivaſte magnitndinis, triginta aut quadragin-
 tapedes alta, paucis ramis in orbem diffu-
 fis, cortice glabro , cinereo? albicantibus
 interftinfto punftuh's, obdudis 5 lignum prasduram, fla-
 Velcens.

Radix albicans, cortice cinereo tefta,graveolenseft, at
 fereiniipida.

Folia terna fimul petiolis teretibus, longitudine {pitha-
 mam^quantibus, proveniunt, oblorfgo-rotunda, acin
 mucronemdefinentia, glabra, communivirorenitentia,
 fubacida , manibus confri&a fuaveolentiaj ecofta me-
 dia infigni plures nervuli ordiñato ac parallelo du&u
 exeunt, qui ad oras arcuatim in le invicem incurunt.

Flow in ramorum extremis, tenuibus, oblongis, gla-
 bris, viridibus proveniunt petiolis \$ iiiquequatuoroblon-
 go - rotiindis, acuminatis, albicantibus, ac {triads conftant
 foliis, quflBtotidemintus.exiguis, acuminatis, fubviridi-
 busfoliolisfunt munita", iiumerofis viridibus ac rubrisfta-
 minulis, purpureis oblongis apicibus dotatis > medium
 floris cavitatem & umbilicum occupantibus j inter qu#
 viridis prodit ftylus oblongus, craffus, furreftus, apice
 rotuhdo » faturato-viridieleganter ornatus, e quo dein
 fruflusemergit: odor fuaviffimus & vinofus-

Fruetusvero viridibus, oblongis, craffis, rotundis, li-
 gnofispended petiolis, qui articulatimfiorumjungun-
 tur pediculis, uti & hi genieulatim ramulis inherent; f unf-
 queoblorigo-rotundi> virides, cortice cinereo tenuiob-
 d~~ftij~~ intuscarnehumida,albicante, quadripartita, odo-

risfaporifque vinofi , referti; intra qua numerofa continentur *femina* flavefcenia, prcedura, angulata & plana.

Provenit h&c Arbor locis petrofis & arenofis in Malabar, in primis circa Provincias Mangatti, ScPoigainflu- m inum ripis: menf e Aprili folia decidunt, verum fequen" tejunio & Julio, dum floret, no vis denuo frondescit foliis, at Novembri & Decembri Menfibii maturos fct fru&us, vixque annos quadraginta frugifera manet.

Foliorum autem fucus linteis exceptus, & inguinibus adhibitus urinam ciet: similiter fructus contufi & cum lale, comphora, & felis ftercore in cataplalmatis formam redacti, & di6tis locis applicati eofdem pr^eftant effectos- Cortex in aqua maceratus, & cum zinzibere & pip^{ere} longoinlafte vaccino & oleo fefami ad humidi confomptionem excoftus, egregium pr^ebet exficcandis frigid^{ls} humoribus linimenfum. Semen cum oriz^e infufo coftum* & dein cuim butyro recenti contufum, ac cataplafmatis formâ abfceffibus applicatum potenter eos emollit ac maturat.

TAB. 42.

*Tifo hift. not. & Mel Brafd lib. i.cap. |6. arborem men forfan procedit & natali folo, ubique ^ * .? .?" 3 deſcribit, quis Indigenis *Tapia* dicitur, & magnam dohaud conſtituto, uti non raro in alris itirpJDu^s cam *Nyrvala* habet ſimilitudinem, cum foliorum, turn contingere obfervamus; quapropter putamus, florum & fru&uum ratione, lignum tamen non ita hafce arb^{re\$} fi non eafdem, faltpm ſpecifics efc p^{as} durum > uti *NyrvaU*, (ed fungofum) quod diſcri- miles.*



Tamarindus indica
تمارين
تمارين



Tamarindus
Indica Linn.

Carambola
Linn.

التمارين
الكرامبولا



T A M A R A -TONGA,

S E U

€ A R A M B O L A S.

TAB. 43.44.



Rboris qu# Malabarenibus *Tamara-tonga* \$ Brachmanis & Lufitanis *CaramboU*, Belgis *Vyfhoeken* appellatur, duadiintspecies, quse inter fe vix diftinguuntur, nifiquodaltera dulciflimi plane fit faporis. Non altè, viz. ad duodecim aut qiiatuordecim eirciter pe~ dum altitudinem > excrefcunt. Caudex pedis meniiiram inambitu vix ftiperat, miiltifque ramis in orbem diffusis donatus, corticefcabro&fufcoobdu&us; Lignum albicans, medulla intus albicante & molli refertum.

Similiter *Radix* albicans, nigricante cortice tefta.

Folia ordine parallelo ramulis inherent, oblongo-ro~tunda, acuminata, crafla, mollia, glabra, viridia, fiipernefplendentia/inferne nequaquam, nervis aliquot in ad~verfa parte eminentibus, ex m^dia cofta in latera excur~rentibus; odor fylveftris, fapor amaricans & adftrin~gens.

Flons racematim ipfis ramis inherent, atque e calyce rubicundo, in quinque lacinias fefto, prodeunt, quin~quetenuibus, oblongo-rotundis, purpureis foliolis con^ftantes, quinque in medio albicantibus ftaminulis, fla~vefcentibus apicibus dotati's, praediti j fapor fibacidus, odor nullus.

Fmttus oblongi, umbilico exiguo, at eminentein ver~

Pars III

X

tiee

tice pr[^]diti, quinque arigulis craffioribus fulcati, qui ta-
men in medio eminentiores flint, juxta utrumque caput
nontamevidentes; cortice tenui, undique carni *ax&&*
ncadhaercnte, glabro, nitente, primum viridi / deihfia-
vefcenetecinai, carneprimumalbicante, dein eadefl
flavefcente, tenera, fucailenta, iaporifqtie primum a-
cerbi, demacidb-duids&fmvTs, intus referti. In pen-
tagono ejus meditullio feu volva *Serfam* dida, *Gmcls*
WT& \$ jw^a.decerii latitant femma oblonga, altera parte
obtufa, altera acuta, rufk, glabra, membranaccis qui-
ridamatque duris peUiculis ieaparietibusintegerrimis,
uti in malis, fejunda, itaut gemina in fingulis *ktitcnt*
celluLs.

Arbor haec in hortis&pomariisfata, ubique in Mala-
barcrelciti ter fingulis annis flores fert, fruaufquc ex-
nibetmaturos: fobole aut feminibus fata a primo trien-
mo ad annum quinguagefimurn ufque frugifera eft.

Succus autem e radicibus hujus arboris expreffus, &
afliimptus, aeftum febrilem compefcit. E foliis contufis
cumoryza:infurocatap!armaconficiair> quod tumores
quofcunque potenter emollit & refolvk; at vero e foliis
hifcein©ryz-i_nf_u{h deco&is aut maceratis egregium fit
deco&um vulnemrium- Succus e frudibus expreflus
prutitum, impetijg *inem*, pfprani, fimilefquearFeauscu-
tan?osianat, fi linteis parti afFedx fiibinde admoveaturs
Idemquefuccus, licumaduflo riucis Indica: vino (quod
vulgo *Ara^ne* dicitur) propinetur, alvi cruciatus *test* &
diarrboeam fiftit Infuper e foliis hifce contufis, & cum
fuccoepalma; floribus exgreffo cataplafmaparatax,
quod aitiammationibus quibufcunque medetur. E #U-
aibus exficcatis, & cum foliis Betels contufis pulvis fit,
qui


qui cum nucis Indict vino adufto propinatus labores partiirientiim promo vet, nee non foetum mortuum & lecundinasexpellit.

Adha^c fru&us maturi in deliciis comeduntur* immaturiverofaccharo, vel muria & aceto conduntur. Prxterea e fru&ibus immatiiris fuccus exprimitur, qui in veftes incidens suo acore colores exedit; atque ideo ad niaculas quafunque e linteis delendas frequenter ufurpaturj colores etiam ad lintea tingenda ex eo parantun nee non cum fruftibus immatiiris Anrifabri vafa argentea decoquere&depurare folent.

T A B - 43. 44.

Arboris hujus, cijudemque fructus mentionem fa-
ount GarZtiasab Hortolib.i Cap. I'S&Acoftacap. 47. Si-
^iliter Bontius libr. 6. cap. I r. breviter earn defcribit, fed
impeffet, Errat Capp*rus Bauhinns> quum Pinacis lib.
x^ fed, tf. Carambolos vocat Mala Goeifta fmftu off an** tur.

*guLzri pomi vulgaris magnitudim', iedus nimirum illis
qu' de oftangulari horum fructuum figura male refeix
Linfehotm. Adhax arbor hxc in Decan Camarix & Ca*
rambeli; Malaccis Bolimba ; Perfis Chamarock nuncupá-*



Bilumbi

दृढ़ दृढ़

Musāch, Carambola

मार्मलेट फ्रूट

पत्ता नियमित



1

Bilimbi. बिलिम्बी
मैलिम्बी मालिम्बी
Malacca Linn. का.

बिलिम्बी
Mal

B I L I M B I

TAB. 45. 46.



Illmbi Malabarenibus, Malald - Karamboli
Brachmanis, Bdimbinos Lufitanis, Blimbynen
Belgis> Arbufculaefthumilis, o&oautde-
cempedescirciteralta, caudicetenui, ra-
misin orbemdiffufiseleganterornato, qui
cortice atroviridi, primum hirluto, & spi-
nis tenuiffimis fubafpero, dein glabro obdufti, atque mol-
li & albicante medullâ intus referti funt 5 Lignum tamen
pradurum, albicans, infipidum, inodorum.

Radixfimi YitQY albicans, rufo corticetefta.

P<?&ordineparallelo ramulis inherent, oblongo-tere-
tia, craffa, mollia. viridia, luperneplendentia, infernè
nequaquam, nervis aliquot, inadverfa parte eminenti-
bus, ex media cofta in latera excurrentibus; odor fiia-
vis, faporfubacidus.

F/tfmrionfurculisfoliaceis, at ipfis ramis, nee non toti
caudici inherent numerofi, & quafi infafciā fpithamam
longascolleffi, atque e calycerubicundo* inquinuela-
ciniасacuminatasled:o, prodeunt, quinquetenuibusob-
longo-teretibus. fuperne colorerepurpleo, inferne pal-
Jidiorenitentibus, reflexis foliisponftantes, decemin
mediorubicundis ftaminibus, albanticibus apicibus ornatis,
medium floris^cavatatem & albanticem umbilicum occu-
pantibus, quorum quinqueelatiora extra florem promi-
nent, quinque vero breviora funt: odor violaceus, fa-
por fubacidus & grams.

Fruftm, qui etiam plures fimul floribus fuccedunt, fru-
ftibus *Tamar& - tong* & plane 'Smiles, oblongo - rotundi
funt, ovo gallimceo magnitudine rel>ondentes, quin-
que angulis crafforibus fulcati 5 cortice tenuij undique
carni arftè adh^erente, viridi, glabro, & nitente obdufti *

Pars III.

z

car-

came primum viridi, dein flavefcente, teneris, fucculenta, iaponsprimumacerbi, deinfubacidi&fūavis, instusfem, qusvanum carni haud abfimilis eft. In pentagonoejusmēditullio/^ fctitant oblonga, alte^ra V teobtufi, al^{te}racuta, rufa, gfcbra, membranaceisqui-bufdampeUiculisfeuparietibus integerrimis fejunaa, to utfingula m^gingulis latitent cellulis, interdum etiam gemma. Arborhascfoboleautfeminibusinhorrisfita, ubique in Malabar nafcitur; per totum annum floret, fru-S n^g *^H fert^{stq} Ue a F r i m o fationi sanno ad quinquag-limum, & ultra frugifcra eft.

SennZ! teVer0h T S arb0ris Partes ^id^ habentvires, eundemque in mediana ulum cum <*Iamara*-_{tonM.} Fruflux matunindeliCHsquoquecomeduntur, immawri faccha-(MKS.^{aCeto} & m^g ? c^o?ndiunt»r: Et quanquam maturi iubacidi, gratique fint faporis, immaturi tamen acerbi, adeo ut fupordentiurnexacidorumefi.contraftus, hifce rrutibuscomeftis obfufcetur.

T A B . 45.46.





لیلی
لیلی
لیلی
لیلی
لیلی
لیلی

Vitis rotundifolia



NELI-TOULI feu BILIMBI

A L T E R A MINOR.

T A B. 47. 48.



Rbufcufe quse Malabarenibus *Neli-pouli*, Brachrnanis *Amvallis*, Lufitanis *CheramelatBel-gis* *Suercnoop* luincupatur, du^e font speciès plane fibi confimiles, qnarum altera quan-Iquam floret, nullos tamen fructus fert, & peculiari nomine *M-pouli* dicitur. Non alte, viz. ad ofto aut decem circiter pedum altitudineni, excrefi:unt. Caudexalbicans, pedis menfuram inarhbituvix fuperat, miiltifqueiirculisfoliofis,glabris, viridibus,in orbem difflijis donatus, cortice craffo, furvo, intyfque purpureo obdu&tts.

Radix purptirea, cinereotegiturcortice, acfuccumtil-latlaſteum; ſaporacris, odornullus.

Folia, foliis *Bilimbi* plane fimilia, ordine parallelo quo-que ramulis inherent, cum quibus dein, novis foliis fron-defcentearbore, à ramis majoribus decidunt. Similitei* *Ilofiuli* non lurculis foliofis> non ipfi caudici, uti *mBiUmbi* cernitur, fed ramislighofis racematim inherent, exigui, uvarumfolculishaudabfimiles, quatuor aittfex tentiibus, acuminatis, purpureis, atque infalte modum expanfis, foliolisconfantes, ofto autdecem in medio albanticibus fibrisprsediti; odorfūavis, ſaporfubacidus.

IruBus, quifloribusfuccedunt, ramis lignofls qtioqlie racematim inherent, plano-rotundi, cerafonigromajo-ri magnitudine respondentes, fex oftovē angulis fulcati, glabri, fiibvirides, nitentes, acperlucidi, umbilicoexi-guo & concavo in vertice.ornati, nee non carne fucculen-ta, (prunorumcarnihaudabiīmili)fubacidi, gratiquefa-poris, intusreferd, acpelliculatenui, undiquecarniar-

Pars III

A a

diè

dtè adh^rente, cindti. Intra carnem *officulum* continetun quod^{^^^} includit callofum, oblongum, èfexo&ove *feminibm*, tenuis cuticute ope inter fejunftis, conftantem, qu&detradtahac pellicula confpiciuntur, oblonga, fuperne rotunda, infernè plana. Hi autem frudlus fubacidi & gratiindelipis comeduntur, & ineduliis ufurpantur, nee non faccharo, aut aceto&muriâ conduntur, vel in furno exficcati ad varios usus conservantur.

. Creicit hxc arbor, fobole aut feminibus inhprtisfata, ubique in Malabar & Canana; per totum annum. *uxx Bilimhi*, floret, frudlulque fert, atque à primo fationis anno ad quinquagefimum usque ffigifera eft.




Cseterum radix liujus arboris cumfemine finapi & cuminiconta, atque exhibita vomitum ciet, alvumque mouet: at verocitmfru~~ftu~~T^{^^^}r^-/(?) fi ufurpetur, nimium alvi fluxum compefcit, & dyfpneam fanat. E foliis cum aqua communi Decodtum conficitur, quod fudores mouet, ac variolose expellit. Ex iifdem etiam cum croco Malabarico (quern *Many a Com* indigence vocant) in aqua deco-
dilis Balneum fit, quod quibuscunque membrorum dolo-
ribus potenter medetur. Ipfi autem frudtus fummopere re-
frigei*ant, atque ideo ad iitimatingentem in febri continua
compefcendam per quam utiles fint.

Altera hujus arboris species, quse vulgo *AU-ppuli* nuncupatur, in Medicina nullum habet uliim.

TAB. 47.4<-

Arboris hujus descriptionem nemo haclenus de-; lpccts merito poteft habcri, & dici *Bilimbi alter*
du : **cum florum**, turn fruduum rations, *Bilimbi i minor*.

17



جعفر
الطباطبائي
كتاب
الطباطبائي
جعفر



D. 1860
L. 1860




D. 1870

T A N J A > T A N J A L A.

She SRBOR LAN IG ERA. BO NT I.

T A'B". 49- 5°- 51.

 Anja Malabarenfibis, Sangori Brachmanis*
 1 Algodano Lllfltanis, Kapock Malaccis, Bonsboom
 j Belgis, Arboreflproeera, quadragintaaut
 i quinqiaginta pedes alta, ramis decuflatim
 inaiios minores divilis in orbem brachiata;
 ita ut velut *a|x* expanfe videantur, ac (uti
 in abiete & pino obfervare eft) furfumverius magisma-
 gifqu-³ aracilefcant frondes* Lignum albicans, molle, cor-
 tice glabiv. atro-viridi variegato, inodoro, ac infipido
 obdudum.

Radix albicans, cinereo & glabro cortice te&a, fibris
 fuisnon late per terrain diflfunditur, led profundius eiin-
 h^eret -, fapor vifcidus & undhiolus, odornullus-

Fo/^longis* rotundis, glabris, nee non rubicundis pe-
 tiolis plura iimiil junfta, ac inrbem expanfa inherent,
 oblongo-teretia^c glabra, denfa, longitudine pithamam,
 latitudine duos circiter pollices arquantia, communi viro~
 renitentia, nervis aliquot in adveriaparte emincntibus ex
 media cofta, ordinato ac parallelodudtu, inlatera excur-
 rentibus-

Flores inodori ac infipidi, plures fimul junfti nu-fis* ro-
 tundis ac hirfutis petiolis, ramis lignofis inherent, atque
 e calyce craffo, viridi, in quinque lacinias fefto, prodeunt,
 quinque fubrotundis , denfis , intus lanuginofis, extus
 glabris[^] nitentibus, & albicantibus foliis conftantes> quin-
 que in medio teretibus, craffis, albicantibis ftaminibus[^]
 flavefcenibus falcatis ac divifis apicibus eleganter ornat '3,
 medium floris cavitaſem & umbilicum occupantibus 5 inter
 que ftylus prodit, flavefcente globulo dotatus.

Vruttw oblongo-rotundiflnt, quinque angulis leviori-
 Pars III Bb bus

bus fulcati, cortice primutn viridi, glabro , & nitente, deinrufo, fcabro, accduro, obdu&i; intus in quinque loculamenta, alba ac nitente lanngine ceu goflypio reier- ta, divifi, uti in *Erkm part-* z. Fig. 31. defcripta cernitur j intra quam lanuginecn, dehifcente demum firufts, num- rofa obfervantur/<J/»/»*rotunda, glabra, nigricantia. Hu- jusvero arboris fructibus maturis pler^eque ejus decidunt frondes, quo tempore fblis fructibus ornata eft arbor.

Provenit ubique in Malabar 5 femel in anno, viz. Janua- rio & Februario menfibus fructus fert, Martio autem & Aprili denuo frondescit & floret, atque fafa feminibus quadraginta annos non raro frugifera manet.

At vero fructuum horum lanugo feu goflypium colligi- tur, ex eoque leftuli & pulvinaria fiunt, qu^e fummaiij ob mollitiem plnrjs seftimantur. Arboris radix ficcata geftatur ad fpafmum pr^ecav^endum. Flores Frudtufque teneriores in cataplafmatis formam contufi, ac capiti impofiti cepha- lalgiam & vertiginem tollunt.

T A B - 49- 50- 51.

Arborem hanc breviter defcribere videtur *Bontius* ejus did potef- Et forfan *Panja* eft lanifera arbor like cap. 14. nomine *arbovtaniger** fweGoffampiniTH- feregrma Clujii Exotic, libr. 1. cap. 14. & *Goflypium* nv> fedrubicundosei tribuit flores, cumP^;^ flores! Javanenfi falicis fofo Cafpari Baubini pinacis lib. ir. candidi funt; quapropter fi non ipfa arbor, faltemfpc^ leel. 5,



Taf. 32

Mou Ceboru Lai
4 829-222 Mat
Pallt surarri

مُولِّي سُورَرِي
فران
Inn.



C M O U L . E L A F O U*She RBOR LANIGERA SPINOSA.*

T A B . 52.



Rbor qux Malabarenibus *Moul-ELvou*,
 Brachmailis *Valii-Sanvan*, Lufitanis *Algodano do Mato*, Belgis *Wol-doom* appellatur, procera eft, admiranda, altitudine quinquaginta, micraffitie ododecim pedummenfuranj haud rarofuperans, antequam ullosdiffundit ramos. Lignum molle, fragile, fubrufum, oortice craffo, molli, cinereo Jntusrubicundo, acfcabrofocindum; qui fquammis numerofis, rigidis, atris, glabris ac nitentibus fpinis infuper dotatis, undique ornatur: *hx* autem ipinx acute circa caudicis exortum demum decidunt, manent tamen in ramis liiperioribus, quos omni ex parte obducunt; atque *hxc* ratio eft, quod simfe nunquam hafce fcandard arbores.

Radix craffa, fibrata, albicans, cortice fubrufo, flavefcen-teacnodofoobdufl:aj faporacerbus, odornullus.

E//^infipida, inodora, manibus confrida unftuofa, *P^foliishaudabfimilia*, longisitidcm, rotilndis, glabris, necnonviridi-ftriatis, acnexortu nodofis, petiolisplura fimuljun̄da, & in orbem expanfa inherent.

F/o/^fuaveolentes, acmagnitudine palmum ^quantes, plures fimuljunfti ramulorum extremis inherent, atque e calyce craffo. denfo, intus fubviridi, extus flavefcente, prodeunt, quinqueoblongis, crailis, denfis, undique colore purpureo nitentibus, extus lanuginofis, & reflexis foliisconfstantes, mucrois in medio craffis, denfis, longis acrubicundis ftaminibus, atris falcatis apicibus dotatis, dupli ordine medianam floris cavitatem&umbilicumoccupantibiiSj interquae ftylusprodit fiffus, qui ipfius frutusrudimentumeft. Inluper in floris umbilico iiibcsBru-

Pars III.

Cc

leus

leusac pellucidus obfervatur humor, qui dulcillimi £*ratiffimique f^aporis eft.

Irucliis oblongo-rotundi *Fan*) A fruttibus plane fimiles, intus itidem in quinque loculamenta, albâ ac nitente lanagineceugoilypioreferta, divifi; intra quamlanuginem, dchifcente demum irudhi, familia obfervantur *Semina* numerofa, rotunda, glabra, nitentia; non tamen triplici, uti in *Panja*, led duplici ordine locata.

Crefcit arbor hxcubique in Malabar; feminibus fata anno circiter decimo i^exto frudtus fert, quos dein fingulis annis, viz. Februario & Martio menfibus, maturos exhibet, atque ad annum ducentefimum & ultra frugifera manet.

Infuper arbor *hxc*, quum lanuginemhancinfrudu recondit, ad genus earum, que godypium dant, referenda: atque ex hac lanugine, uti de *Pan*)* fruftibus innui-
mus> leftuliquoque&pulvinaria fiunt. Ex Arboris ligno navicute conllruuntur.


Arboris cortex pulverifatus, & cum fucco limonumin linimenti formam redadus inflammationes compefcit quascunque, & offium frafturas confolidat\$ cum adufto autem è nucelndica vino fi permifceatur, pro linimento adherpetem ufurpatur. Eradicis'vero cortice egregium fitvomitorium. Humor illedulcis, qui in floris dnu colli-
gitur, cum *Balam-ptt/ti* aut *Tamarmdi* /bliis exhibitus > quos-
cunque aquolos humores per alvum & veficampotenter educit.

T A B . 52.

Arbor *hxc Panja* specieseft, cjufdemque nullus ha- pium arboreum cauk/pinofi; fed rcfius did potcfjt *nJ*T
ftcnus m[^]minit Botanicorum, adeoque errat *Cafparus lanigerapmoftAUkb<ri<>*.
Bauffwmquura Tinatis lib. 1 j. feft% y. cam vocat Voffj- |

Bellatia-trinervia.
ન્યાંગું ત્રિનેર્વિયા.
Nya-tung.
નાસારામ
وَسِيْلَةٌ تِيْجَانِيَّةٌ فَعَام

Sur-
ma-
fram-
lath



BELLUTTA TSJAMTAKtAM*Srve CASTANEA ROSE A INDICA.*

T A B. 53.

AiRborh^c Malabarenibus *Bellmta Tsjampakam*,
 i Brachmanis *Nagatamfo*, Lufitanis *Moroius Rofa-*
Ido, Belgis *Caftame Roofen* niinCUpatUr; Eftque
 divaftemagnitudinis, caudice furvovariega-
 to, craffb, prasduro, glabro, multifque ra-
 mjs, *TiUaruminfar*, in orbem diffiifis donato,
 qui corrice obducuntur craflb , glabro, fulvo , odoris
 aromatici, faporisamari&acerbi.

Rdtx fibrata, rufa, glabro & flavefcente cortice teffb₅
 (aporamarus, odoraromaticus.

Folia brevibus petiolis ordine parallelo ramulis inherent,
 oblongo-teretia, glabra, denfa, fupernèviridia.infernè
 rore iubc^fuleo (utiin uvis cernitur)obdufl:a, nitentia,
 nervis aliquot fubtilissimis& vifum penèeffugientibus ex
 media cofta in latera excurrehtibus₅ odor itidem ardmati-
 cus, fapor amarus & acerbus.

Flares forma &magnitudine rofī fylveftribus feuEglen-
 tinisperfimiles, calyciquadripartito, exiguo, denfo, vi-
 ridiinherent, quatuorcandidate, rotundisac tenerisfoliis
 conftarites, tenuiumacalbicantium filamentorum, flave-
 fcentibus apicibus dotatorum, congerie medium floris ca-
 vitatem & umbilicum occupante: odor fuavis, rofaceus
 acviolaceus, fapdramarus.

FruBm globofi, quatuor angulis eminentibus fulcati, in
 vertice acuminati, per initia cum maturefcere incipiunt
 glabrir & fubvirides, maturitatem adepti rufi ac rugofi,
 cortice primumcrafla&molli, dein rufo accduto, cafta-
 nearumcorticiperfimili; obdufti: intusautem tres qua-

*tuorve continen
substantiâ &*

*tur[^]fccumforma&magnitudine, turn
iaporecaftanearumasmuii. Fruftus vero te-
nenores area bafin tenax & glutinofum erfudant*-,
cujusodoracnseft, &aromaticus*

Arbor hxc ubique in Malabar, pr*cipue in Provintiis Mangatti, obflorum jucunditatem ftudiosecolitur, quo Julio & Augufto menfibus fert, a (bxto fationisanno m!o! tann._s matures exhibet frudus, atquenonraro terna fecu- iatrugiferamanet.

Cæterum radixl? } scumZn 2iberer ecenticon-
tusa si affumatui " indores Pote nterexpellit. Similiterar-
boris cortex cui 7 af1b mpt US, tUmf «bp«lveris formavull
neri adhibitu lacte dulci co lcr Pen ir mm orfib usm «Ietur - Exfoliisin
fma conficitu. quod vcertia impofitum vifcidos & pitui-
' ^ s . nir e b r o COUΛOS hU TM reS inddit a — &
per narcis expurgat, adeoque gravedinem & catarrhum
Panat; , pf II m vero fo, lorum dec0(ftum potu m h, egmata
me dendo, attoundoac expellendo tutfm curat. Fru-
i "S" f ^ "teSCU TM mellecoflialvu m emolliunt & laxant,
ijccan autem adftnngunt, ex iifque oleum exprimitur
quodartubusiilitum quoleunque illorum dolorc-X£
de tollit.

T .4 B- 53.

Arboris hujus descriptio Z in nemo ^ ^ . . . habetur, & noſtratisbus in India *Caffiana roſea* appel-
fed fructuum ratione caſte peregrinatur.



جعفری

جعفری

جعفری

جعفری

جعفری

جعفری

-*EruBus* cum figūra, turn magnitudine pyris nofratibus haudabfimiles, glabri, fplendentes, primumrufi, dein virides, tandemque flavefcentes, carneintus viridi-fla-vefcente, fungosâ, & aquosâ referti, ac tenui pelliculâ cinfti: odorfuavis, faporvinofus* acris tamen& aufte* rus, finondum probè maturifint. Hujusverofrudusal-teri extremitati *Nux* quaedam, figura & magnitudine lepo- porinumrenemreferens, adnafçitur, viz. partealteragib- bofa, oppofitâ lacunamimpreflamhabens, qu^cinereo tegitur cortice₅ & prater hunc corticem alias *NucUum* com- pleditur pallidum, ea forma qua & totus eft fruftus, fuc- culentum, amygdatedulcisfapore, fubftântia molliore: at vero inter duos hofce cortices, qui culmiferelatitudine invicem aMunt, tophaceis cavernulis coercetur melligo craffiufcula&lenta, fepe ceraforum colore & confiften- tia, fiporeprimumadftringente, mox infigni acrimotia lingua & fauces vellicante, fervata tamen adftriftione.

Provenit *hxc* arbor ubique in Malabar; fingulis annis, viz. Augufto & Septembri menfibüs, maturos fert fruftus, manetque frugifera triginta circiter annos.

Cseterum eihiabushifcepotus exprimitur, qui debi- tomodofermentatus, vinofus evadit, &inebrians. Fru- ftus in deliciis, uti Amygdalae, comeduntur & uforpan- tar faporemque non minus gratum habent quam amyg- daliaiitcaftanex₅ crudosvero nemo fecureore apenet, quod continuo cutem abradant, magno dolore eorum, qui isnari temerè eos refecant: ideo cultro aperiuntur, aut, uti caftane*, fob cineribus aflantur, ut manducan noffint. Guttur autempeculiari natura cum deglutiunt Ur ftrincunt, gultu acri & auftero₅ ideoque in orbes fan- duntur, adjunftaaqua feu vino, faleque injefto, quibus modisacrimoniaillamitigatur, palatoitagriffimi. Hifce quo-

K A T A * KJM A V ot

S I V E

ACAfOUS <vel ANACARDI alia fpecies B.Pin.

TAB. 54

Apa-fnava fēu Kasjavo-maram MalabarenfibllS>

*Kasjo Brachmanis, Caj<w Lufitanis & Belgis,
 Arbor eftmediocris magnitudinis, caudice
 craflb, candido, cortice cinereo, iritus pur-^
 pureo, odoris fubacidi, fkporifque adftrin-*
 gentis, tefto, ac ramis atro-viridibus, eleganter in orbem
 diffufis, donato.*

.R^/Aralbicans, cortice furvo. tenuibus filamentis per-
 texto, obdupta.

*Folia fine ordine ramis adherent, oblongo-fotunda, gla-
 bra, communi virore splendentia, nervis aliquot infernè
 eminentibUs è cofta media denfa in latera excurrentibus.
 Tenellaverohujufrnodi folia tnaiiibus confrifta glutino-
 fafunt, &fragrantemfpirantodorem₅ vetuftiora autem
 priuftjuam decidunt, planè rufefcunt.*

Hfl/W/fuaveolentes, acmelleumodoremlpiraiites, ra^4
 cematim ramnlis extremis inherent, atque è calyce exi-
 guo> viridi, in quinque lacinias acuminatas fefto pro-
 deunt, quinque teretibils, reflexis, primum Viridi-fla-
 vefcentibus, deinrufis, tandemque purpureis confantes
 foliolis, ftaminulis quibufdam tenuibus, flavefcentibus
 apicibus ornatis, rhediam floris cavitatem occupantibus,
 interqu# ftylus prodit, qvii ex ipfius fruftus germine e*
 mergit,

Pars III.

Ee

Fructus

quoiquie nucleis leviter toftis incolse veicuntur ad Venerem ftimulandam. Ex mellagine quarn gemini cortices continent, copiofumindigeneeliciunt oleum, quodpidtoribus, ad linteamina qu& vi s indelebili nigricante col'ore pingenda, inufueft* eodemque oleofi lignum ungatur contra putredinem prsefervatitr , adeoque diirabilius redditur. Inluper acri illo oleo nihil pr[^]ftantius effeferuntad lichenes & impetigines tollendas, eodemque incote adverfuslcabiem, & vermesnecandosutuntur, extrinleucus illito. Denique nuclei hi comefti ventriculum roborant, aiimentorum fermentationemjuvaiit, nee noh vomiturri & nauleam tollunt. Succnsveroe fruftibushifceexpreA ills Diarrheam fiftit, & Diabetem fanat:

T A B . 54.

Arborhsecà variis defcribitur audoribus, at impr- S fruSum vero *Acaju* dici. Eftque *anacardi alia fpecm*, *je&h. Tifo tamen hift. nat. & med. Brafil. lib. j. cap. 6. & Cafgari Bauhini. Adha^c Rocbefortius ejus mentioncin KfantiJJ. aromat. cap. t6. accuratam hujus arboris ejufdem -1 facit nomine *Acajou*, hujusque tria proponit genera ; que frudus exhibet defcriptionem , additque earn in quorum unum,frudus fert *Cajdu* nomine vulgo noA inaltis Brafilis locis provenire, & iridigenis *Acajdiba*, toy.*



66



Chloranthus
Lam.
2300 m.
Dow-de-Chau
3500 m.
Nepal
66

/ T T I - A R E A L O U.

TAB. 5?.

Dicitur: T//^-^^Malabarenfibis, *Douadekegoli Brach-*
manis, Arbore daRdijs menorljjlfitanis, Cleyn JVor-
telyge Belgis, in proceram excrefcit arborem 5
\cups Radix fibrata, albicans, nigricante cor-
• rice tefh, qui ubi inciditur ladteum fuccum
ftillat.

Caudex, haud fecusat que in /^-aloupavt i. Tab. 26 ScPeera-
/^Tab. 28. defcriptis, obfervatur, plurimos undique difFundit ramos, qui (poft quam annos quadraginta aut quinqua-
gintavixit arbor) tenues squafdam, eafque fingulares fibras
feu filamenta, rufi ac cerei coloris, deorfum mittunt quibus,
ubiterra mattingunt, firmantur, novam que qua fiprolem
generant, & velut in novos arborum caudice stranfeunt,
quirurfus summa fuipartenovos ramos in latera Ipargen-
tes, novis denuo fibris deorfum miffis fe propagant. Sic
aliide inceps rami in iitfinitum, ut interdum unica arbor
fuis propaginibus milliare talicumin ambitu occupet, fit-
quedifficile, qu^nam primaria arbor, five omnium ifta-
rum prolium parens, dijudicare, praterquam ex trunci
craifitie, qu^e interdum tanta est, ut trium virorum ulnis
yix apprehendipoflit. Casterum non modo inferiores ra-
mi fimiles fpargunt fibras, fed etiam in arbore fummi, at-
que ideo unica arbor fylvam efficit deniflimam, & non ra-
ro plura fuperfTes manet fecula. Sub eas vero arbores adi-
tum fibiparant in cote, ac fibras jam in trunco converfas,
tenuiores fc-refcindere folent, atque ea ratio he vefuti con-
camerationes & umbracula faciunt, ^ftus arcendigratia:
adeo enim deniframulis reliqui maiores luxuriant, ut ib-
lis radii nulla ratione penetrare queant; imo aliquot ho-
minum millia sub tali arbore latere poftint.

F^fimilia funt foliis/m'^, atrnmora.

Pars III.

Ft

FmBus.

To ^

H O R T U S

Fruttm exigui, plano-rotundi, colore primum viridi, dein foris & intus fanguineo, granifque pleni uti vulgares *ficus*, dulces quidem, minus tamen grati faporis quam il-
\x, quapropteravibus potius quamhominibus cibo funt; nafcuntr inter folia quemadmodum vulgares *ficus*, *hoc efi*, in novelljs ramis, qua parte folia illis inherent.

Nafciturubique in Malabar > imprimis circa Warapouli* viretpertoturnannum, frudlufqueiert,

C^terum ex arboris hujus cortice, radice* & foliis in oleodecodtisBalfamum paratur vulnerariiim. Ex cortice in lafte ebutyrato cofto fit oris collutio, qu# aphthas abfterget, flaccidas& erofas gingivasfanat, necnon vacillantes dentes firmat.

TAB. 55-

Arbor haecj & fequentes *Abu feu Arbores da Rajic y* species funt illarum, quae patt. i. Tab. z5.26.27. 28. 29. cbfcribuntur_s omnesque ad *FicumIndicam Clufii* me-
rito referuntur; cum eodem mo; b è ramis undique dif-
fus tenuia quaedam filamenta deorfum mittant, quibus
ubi terram attingunt, firmantur > novamque quail pro-
lem generanc> & vclut in novos arborum caudices tranf*-
cunt quo tamen *Eximus Botanicus d'arno. us Syen p. m.*

haud notavit in comment. ad AtottJpecies part. I. exhibitor*
Interim hxc *Itti-arealoH* genus eft *Itti-alou*, ScArealoui
ac , uti ex illius d^fcritione fufpicari poftct, forfan
EuzadaPigafetta: fed fru&uum ratione minor {pecics
videtur *Fieus Indie** , quam *Ciujius* defcribit *Exotic.*
libr. I. cap. 1. Et noftro judiciovocari yoffet *Ficus M***
labaricay Folio mali cotmti, *Fruttu*, p_{ag} 10M**
do₉ fanguiqueo.



Lippia microphylla Sch.
مَدْنَبُ الْمَدْنَبِيَّةِ

جَانِي

سَنَدَنَبِي

سَنَدَنَبِي

جَانِيَّةُ سَنَدَنَبِيٍّ



T S J E R O U - M E E R - A L O U .

T A B . 5⁶-

Rbor qua; *Mahbarenihas Tsjerou meer-alou*,
Brachmanis P ^ , Lufitanis Arvm da Raijs,
Belms Wru Moomnuncupatm, minor eit ac
humilior prxcedentis Ipecies, eodemque
modo crefcit, & propagatur ut *Im-analm*.
Folia similia font foliis feqq- Atu-meet-don;

at minora, & numerosiora.


Fructus itidem fructibus *Itti-arealou* persimiles; sed minores,
brevibusque petiolis inter folia novellis ramis inhærent.

Cæterum uti *Itti-arealou*, crescit quoque species hæc ubi-
que in Malabar, præcipue in Provincia Warapouli; per
to inum viret, fructusque fert.

Vire autem hujus arboris eadem sunt, ac præcedentis,
præterquam quod ex radice cum calce & curcuma in aqua
decocta Balneum conficitur ad Epilepsiam & Lepram cu-
randam.

TAB. 5⁶.

Arbor hæc præcedentis species est, atque minabimus *Ficum Malabaricam*; folio & fra-
ctu nō minore.
à nemine hactenus tradita; quapropter nō






Coffea arabica
Gesue ex Willd.
var. longipetiolata

KATOU-ALOU.

TAB 57

 *Aton-alou* Malabarenibus, *Doulo-vadhou* Brachmanis, *Rayfeira vidriado* Lusitanis, *Glas-vijgeboom* Belgis, in arborem ex crescit proceram, imo altiorem quam *Itti-alou*, *P eeralous*, *Tsjerou-meeralou*, aut *Ittiare-alou*, atque fibris suis à ramis deorfummiffis propagator eodem nido ac *Jtn~arealott.Cxterum* quoad lignum, corticem, & radicem, species h^c cum pnedentibus planè con venit.

Fofooblongo-rotunda, ac in mucronetn definitia, denlā, fragilia, iipernè glabra, atro-viridia, splendentia, infemè albicantia&lanuginofa, infipida, inodora; ècofta media infigni plures nervuli qrdinato ac parallello duftu exeunt, qui ad oras arcuatim in fe invicem incurrunt.

Trubus in novellis ramis, qua parte folia illis inherent, fine petiolis proveniunt, rotundi, fruftibus *Im-aredou* per-* similes, fedmaiores, colore primum viridi; dein Haffcente, tandem querubicifndo, ac granis pleni, uti vulgaris fucus, dulcesquidem, fed minus gratifaporis quam ilte.

Crefcit hxc *dm* Ipecies in multis locis Malabar, pnedpue in pro vincia Parakaroo 5 per to turn annum viret, fru aufque fert, & aliquot fecula fuperfites manet.

Porro ex arboris cortice in aqua deco do conficitur oris collutio, qu^aphthasmaturat&abfterget, nec non dentes vacillantes firmat: idem deco flum potum renes expurgat, & urinam ducit. Infib per ex eoddhi cortice cum cancripedibus in oleocofto Balfamutn paratur, quod auribus

infilla^{tum}earum ex ulcerationes fanat, necnon tinnitus
Scfurditatem tollit. Denique ex radice & arboris coitione
final coftis Balneum fit, quod curandaj fepne, necnon
quibus cunque artuum doloribus mitigandis mirificè con-
ducit.

T A B. 57.

Katou-alou est ipsa *Ficus Indica*, *Clusi Escat.* libr. 1. *Pigafetta* pro hac arbore describit. Neque *Katou-alou*
cap. 1. & *Ficus Indica* foliis malis *Catonei* similibus, fructu est *Arbor da Rayz*, *Linscotti*, uti ex imagine ejus mani-
ficibus simili, uam describit *Casperus Bauhiny* pin. lib. 12. festum fit: sed fortan illa, * II. *Rockefortus de plantis*
scđt. I. En un.en idem *Baubinus*, quum *Euzadam* Americanis proponit. »





• *Stimmenia* L.
"mud"
Go. by
Dā-nāñ
"mud"
Lud.

O4TTI ± CM E E R - J L O U.

TAB. 58.

ARBOR hxc Malabarehibus Am - meer - alou, BrachmanisRauka-paray, Lllfitanis Arvore da raijsladrab, Belgis^{rt}[^][^]nuncupatur. Est quevaft#magnitudinis> caudicefaffo, tenues quafdam & singulares fibras deorfum mittente, quse ipfi caudici adh^refcentes* crafliffimumeumreddunt; adh^rciifdem fibris arbor ter TX firmatur, multilque ramis in orbem diffusis longe latéque propagatur. Z/[^][^]albicans, molle* & flexible, cortice iubviridi cinereo obduftiim, qui ubi inciditur fuccum fstillatla&eum, acrem, inodorum

JR^r/Aralbicans> glabro & nigricante cortice tefta, nee non fibris fuis late per terrain diffufa *Ixia* liquorem fundit candidum, unftuofum, qui dein cum incifa iradice purpureusevadit.

Folia foliis Atti-dou part. I. Tab. 25. defcripta?, haud abf^rmilia, breVibuspetiolisnoyellis ramis inherent, oblongo-rotunda, acuminata. denfa, communivirorenitentia, fu- pernèglabra, interne nonnibilalpera, nervis aliquot è media cofta, induas in^requales partes folium tiividente, inlateraexcurrentibusj faporamaricans, &acerbus.

Fructus brevibus petiolis inter folia ramulis inherent, fructibus Are-alou part. i. Tabx^r defcript^re, perfimiles.

Provenit ubiqiie in Malabar j per totum annum viret, frutufque fert. Initium uit ex arborum qiarundam caudicibus, auterupibiis, vel antiquorum murorum rimis & fifluris, e quibus eonvolvuli inftar prodit; dein radix & truncustenuia qu^rdam filamenta deorfum mittunt, quibus caudex infignitercrafTefcit; cumque iifdem fibris ter xx firmatur, longe latéque propagatur; adeo ut arbor,

e quainitiurn fuum duxit moriatur, h^{ec} vero evadat maxima omnium arborum, qu^ā in Indiis adhucdum repert[#] funt, nee non fecula aliquot fuperftes maneat.


Geterium arbor h^{ec} ihdigenis species habetur *an-alou*, quanquam illis facra non fir, uti *an alo* % Cingalenfibus, quarn *BboudGii-ga** feu *Rhōo-gas*, aquodam.£/*W<w facro ipfisNujrone, appellant. In *Kandenato* Regionis Cochin Provincial juxta templum^{te}? hujufmodi habetur arbor, caudice crafliflim.o, qu# in circumferentia quinquaginta obtinet pedesgeometricos, quamqueincotebismille anno[>] ibidem crevifleaffirmant. Porroexarboris hujus radice decolum fit, hepar obftrudum potenter aperiens 5 eodem quefioscolluatur prieftantiffimum evadit adverfus quos- cunque oris affedtus remedium: foliorum fuccus febribus medeturardentibus. Frudtusquofcunque alvifluxusfiftit.

TAB. 58.

Arboris hujus defcriptionem nullus Botanicorum hac- ta, quibus terras firmantur , novamque quad prolem tenus exhibuit. Videtur genus praecedentium *Alou* fpe- generant; haec autem non e.ramis, fed e.caudice tenues cierum y diffqrnt tamen maximopere modo crefcendi: quafdam fibras deorfum mittit > quibus noft propagattir, Enimvero ill< e.ramis tenuia deorfum mittunt filamen- verum caudex craflifimus fit.



Monograph. I. Tab. 59
Phyce
Novum
Eduard



H A N D I R-A LOU.

T A B . ?9-



of Rbor qu^f Malabarenfibūs *Handir-alou*, Brachmanis *Vodou*, Lufitanis *Figos dcBuzjo*, Belgis *Kray-vygh* appellatur, procera eft, caudice craflb> candido, fiingofo, corticeciereobduft:o, multifque ramis late diffusis ornato.

Simiiter *Radix nigricans* fibris suis late per terram diffunditur₅ faporacris, odornullus.

Folia Gne ordinenvellis rāmis inherent, oblongo-ro* tunda, denfa, glabra, fragilia, longitudine fpithamam, latitudine quatuor circiter pollices ^qilantia, fuperne atro-viridia, inferne subviridia, Iplendentia j nervis aliquot in adveifaparte eminentibus e media cofta, ordina-toacparalleloduau, in latera excurrentibus: faporau-fterus, odorfulveftris.

Truttus itidem granis pleni uti vulgares ficus, ac fru&ibus *Atti-alou* part. i. Tab. 15. defcriptse* perfimiles. Ab hominibus non comeduntur, fed defiderantur & fimiiS & cornicibus; quam obcaulam Lufitanis *Figos dosBuzjos*, hoc eft, si* *miarumficus* fructus hi nuncupantur.

Nafcitur ubique in Malabar, prsedpaiein fluitiinum ripis, & locismotitanis ac petrofis Mangotti5 viretpef to* turn annum, fru&ufque fert, & aliquot feciila ful)erftes manet. Ab avibus ferit: e#namque cum fru&us come->dunt, exigua illorum granula (in quibus germinandi vis confiftit) cum excrementis iterum deponunt, equibiii denuo arbores excrefcunt-

C[^]terumarborishujusfoliorum tenellorumfuccus ex-preflus ad erofas gingivas, simileisque oris affe&us egre-giumeft remedium; si eo os colluatiir. Ex eodem fucco cum butyro recenti digestivum fit, Ulceribus mundifica-ndis & confolidandis perquam utile. Ex radicibus & fo&^s simul in aqua decoctis Balneum paratur, quod fanand# le-pne, Scepilepfixconducere dicitur.

TA B. 59-

HujusquoquarborisnuliusmssinitBotanicorum: jgnamhabet similitudinem *cumdrbore Peregrina** *Fru-*
Species est praeedentis; filamenta namque non è ramis, *ttümficw ftmikmgennit a^xaClufius* perfunctoriè de-fed è caudice deorum mitrit, qux ipfi caudici adhaeren- j scribit; & referri potest ad *fepeawatl*, feus*com-*





لِبَنْ بَرْجَانْ
لِبَنْ بَرْجَانْ
Lipani
Tiliaceae
Tiliaceae

T E R E G A M.

T A B . 60.

Eregam feu *Teriga-maram* Malabarenfibns, *Ca-*

y Brachmanis, Arvore da Rajpa Lufitanis,
>Ri/v-l;oom Bdgis, arbor eft procera, triginta
 circiterpedes alta, caudice craflb, cortice
 atro-viridi, intus albicante obdud:o, necnon
 ramis lanuginofis ac afperis in orbem diffusis
 eleganterornato₅ Lignum ex albo flavefcens, molle, in-
 fipidum, inodorum.

Radix iibrata, albicans, cortice rubicundo, intus cro-
 ceotefta, inodora, infipida.

Folia rotundis, viridibus, ac hirfutis ramulis line ordine in-
 h^{rent}, foliismalicitriihaudabj[imilia, atro-viridia, denfa,
 Ipinulis quibufdam tenuibus & rigidis omni ex parte vefti ta!

Fructus ad ramulorum exortum ramis inherent, Alou
 frudibus perfimiles, rotundi, lanuginofi, cerafinigrima-
 jprismagnitudine, viridiprimurp, deinflavdcentecolo-
 re, ac granispleni, infipidi, inodori.

Provenit locis fylveftribus Malabar, imprimis circa Co-
 chin 5 pertotum annum viret[^] frudlufque fert, ac diu fu-
 perfites manet.

Folia autem liujus arboris ufurpantur ad fcrinia, ac qu#-
 cunqueligne, cornea, ftannea, & argenteaya africana,
 atque fabritie fuâ polienda ac *Ix* viganda, quam ob cauf àm
 Malabarenfibus *Terega*, Lufitanis *Folhas da Rajpa*, Belgis *EjjvbU-*
~~^r^n Radipantum Radietum~~ ~~aentcènudadindia~~ confe-
 ftocontula, & maneji~~j~~ uno ventriculo afluxum tavicatum
 ardorem compelcit. Frudus kidem impensè refrigerant.

T A B . 60.

Nemo, quod faan*, *teregam* fecit mentionem: adeo que nobis *zmFkml/falabarica,foliisri<ridis,Frt0H*
*fruauumratione fyccies FicvsInJic** haberis pofle: *kdrottwo, lamginofo, favefcnte, ctrafimavrñudim.*
 madus crecendi cum pneccidentibus planè discrepat. |

Seringa

Tab. 65

سِرِينَجَانْ
سِرِينَجَانْ

دِرِينَجَانْ

مِلِينَجَانْ



P E R I N T E R E G A M.

T A B . 61.


 pRbor qu^e Malabarenfibus *Perm Teregam*>
 Bradimanis *Meri Carabatti*^ Lllfitanis Arvore
Rafpa major, Belgis groote rijv-boom nunCupa-
 tur, pr^cedentis species eft major, atqueal-
 ior, caiidicecraflb, candido, molli, multiP
 que ramis genicnlatis donato , qui cortice
 cinereo, Hirfuto ac fubalpero ciridli, intnfque medullâ
 coceineâ referti fiint.

Radix albicians&laftejfcens, nigricante cortice obdupta,
 nee hon fibris ibis latè per terram diffusa, inbdora, infipida.

Folia similia iunt foliis *Teregam*, at majora, & craffiora.

Frutusvelfolharii, vel plures simul jundii ramulis inhe-
 rent, pr^cedentis specie ifruftibus intus ac extus perfimi-
 les, fedmaiores.

Nafcitur infylvis Malabar^ priecipue in Parou, perto-
 tum annum viiret frudhifque feit, & integrum feculum
 frugiferamanet.

Giterum folia hujus arboris iifdem ufibus inferviunt, ac
iolia Teregam: Fruftus contufiur pantur ad aphthas; in-
 fuper ex iifdem in la&ecaprino codis potus conficitur, qui
 hepatis obftruftioni, ejtifdemque Ibyrrho potenter me-
 detur: etiam ex frudlibushifce cum arboris cortice in aqua
 coftis Balneum fit, quod endemiis corporis maculis le-
 profis tollendis conduit.

T A B . 61.

Eftam arbor hcc , fru^uum ratione, pr^cedentis j^i Auni: fcdqioniam nemo haSenus ejus tradidit de-
 nee non caeterarum *Alou* specierurn genus videtur; di- j fcriptionem, plura addere nbn poſsumus.
 flinguitur tamei ab his modocrefcendi, u tei legam.

Pars III.

Mm

VAL



بَلْجِيَّةٌ
بَلْجِيَّةٌ
Chloranthus - *Latifolius*

FALLI*TEREGAM.

T A B - 62.

VAlh-Teregam **MalabarenfibUs**, *Caravatti-valli*
Brachmanis > *Arvorede Rafpapregirofo Lufitaills* >
d^Climmende Rijv-boom Belgls, Convolvulus eft
arborefcens, humilis, fexfeptemvecirciter
pedes altus, caudice tenui > candido, cortice
furvo obdudto, ramis tamen lanuginofis latè
undique, aliorum convolvulorum in modum, profer-
pentibusdonato.

Radix itidem fibrata, albicans & laftefcens, rubicundo
corticetefta, inodora, infipida.

Folia. decuflatim ramulis inherent, den fa, primum pro-
fundèincila, deinoblongo-rotunda, acuminata, Ipihulis
undiqueveftita, acfoliis *Perm-Teregam* fimilia, fed minoi'a

Fructm cum magnitudine turn figura prunorum^emuli,
intus & extus *Teregam* atque *Perin Teregam* fructibus haud ab-
fimiles.

Crefcit etiam in fyl vis Malabar 5 per to turn annum viret,
frudufquefert- Folia itidem hujus convoivuli iifdem ufi<
blls infcrviunt, ac folia *Teregam*, & *Perm Teregam*. SICCUS è
radiceexprefl%&afllimptusalvi cruciatus lenit: fimiliter
efoliiscumla&edulci contufusepreflus fuccusdyfente-
riam curat. Radicis cortex cum coriandri femine in pulve-
rem redadus & exhibitus, tuffi, afthmati, fimilibufque
thoracis affeftibus medetui^.


T A B . 62.

*Valli-Tergam*duarum prdeccidentium (pecks eft) montani candidi C. B. haud abfimilia funt 1 at dcia
fatione frudluum & foliorum 3 que novella foliis ami aliam plane acquirunt formam.

Pars III.

Nn

TSjELA,



Triele
Jac.
S. Mal.
Anatra.
B. Mal.
M. Mal.
Tram.
Jac. lat.

T S J E L A.

T A B - 6.3



Rbor hxc Malabarenibus *isjcU*, Brachmanis *Afouatou*, Lufitanis *Morfegeiro*, Belgis *Vkdermuys* - *boom* appellatur, eftque vafhe magnitudinis, feptuaginta circiter pedes alta, *caudice cranno*, oftodecim pedum menfum in ambitu haudraro fuperante, multifque ramis in orbem diffusis donato. Lignum albicans, cortice crallo, fabro, cinereo, intus rufo obdudlum, cuius matrix pradura, crocea.


Radix albicans. flavefcente cortice tefta, fibris fuig craffioribus profundd terr[^] inha[^]ret \$ fapor ladieus ac fibifalius, odornullus.

Folia rotundis ac fubviridibus petiolis in novellis ramis densa congerie proveniunt, oblongo-rotunda, acuminate, communi viore fupemè splendentia, inferne fubviridia, infipida, inodora; e media cofta nervuli plures ordinatoac parallelo duau exeunt, qui ad orasarcuatim inieinvicem incurront.

Fruaw ipfis ramulis inter folia fine petiolis adherent, cum formā turn magnitudineribeliishaud abfimiles, funtque exigux ficus, rufis granulis plen[^] uti omnes *Aim* & *Teregam* fructus, infipida, inodorie,

Nafcitur locis fylveftribus, montanis, ac petrofis Mala[^] bar, praciue in Ambalakatti, atque per totum annum fructus fert. Vefpfertiliones, quoniam frudibus delefantur, in hac arbore frequenter nidificare Iblent, quam ob cau[^] lam Lufitanis *Morjegeiro*, noRratibus *Flede* *rmuys* 400mdicitUr.

C[^]terum ex arboris hijus radicis cortice cum pipere longo in aqua communi decodumparatiir, quod tuffiin-veteratx, aliisque pulmonis- affedibus medetur. Ladeus e radice & frudibus expreffus luccusefficax in oculorunl vitiis remediumeft.



Trieß
Oval
Dinner
Fruit
Leaf
Lan
Leaves

Taf. 3.

T S J A K E L A

T A B - 64.

Sjakela Malabarensibus, *Rana-vodou* Brachmanis, *CordoeiraLufitanis*, *Heap-boom* Belgis, arbor eft procera, caudicecandido, pracrafio, multif que ramis crafioribus in orbem diffuiis donato, cortice nigricante intus purpureo obdaflo, quo leviter incifo fuccus extillat *laevius* *ww.v7*, acns, inodorus.

2U&fibntta, albicans, flavedccntecortice teda, incifa Scvulneratafirnilemplaneemittitlaaeumfuccum.

Fol>a rotundisacviridi-albicanfibus petiolis in novellis ramisproveniunt, oblongo-rotunda. acominata, d 3 &. longitudinefpithamamjatitudinepalmumfuperantiajb-pe mecommunivirorenitentia, inferne subviridia, infibisemedfaToft^T^a b i c a n t i b u s , ac eminentibus e media cotta in latera excufrentibus.

F^pr^cedentispecieifruibusfirnifefunt.
relictit locis Malabar *Paro* *Si* *Malabar* *Y* *y* *i* *vis* Para-
caro; *Si* *Malabar* *Y* *y* *i* *vis* Par-
bus fructus fert, atque sobole sata ad quinquagesimum us-
que annum non raro frugifera manet.

qJZT *X* *SCOnkep* *Culiari* *tifido* Chord^tor-
tur *X C U S K* *3rCUS*, *qUo* *Veftimen* **o/*/*>** *Nee* non color para-
tingunti *T* *ipfi* *sdi* *aa*,

Cæterum arbor hæc eosdem habet
Atti - alon part 1. Tab. 25. descripta in Medicina "fus, ac

T A B. 63. 64.

Hanc ibitandum, quin due hæ arbores præcedentium sunt species, sed >, * Botanograph quod f i t.a

pars HI

pp

I N D E X.

A.

Annona reticulata A Nona-Maram, feu Anon Ovie-
Ji. tab. 30. fol. 23

Antocarpus Ansjeli. /*X* «w/^T tab. 32. fol. z\$

Atinoraa Atamaram. *tft+m+iuutx-do.* ^ fol. 21

Ficus Atti-meer alou. *c^ecc/tm* tab. 58. fol. 75

B.

Messia ferrea Ellutra Tsjampakam, feu Cafhnea
Rofealndica. tab. 5tf. fol. ^3

Scerophoa Bilimbi. tab. 45. fol. 55

Somneratia Blatti,fcu Jarabos Sylvefris tab.40. fol.43

C.

Corypha umbilicatipera Odda-panna, feu pal ma Monta-
na Malabarica. tab. 1. fol. 1

Stegle Maram Covan, feu Cydonia Exotica Bauh.
Pin. tab. 37. fol. 37

H.

Ficus sejtica "LT Andir-Alou. tab. 59. %>1.77

I.

Ficus nitida TTti-Arealou. tab. 55. fol. 69

K.

Thaumatium JT Apa-mava, feu Acajous, tab.j4.f01.tfj
Ficus Katou-alou. tab. 57. fol. 73

Ph & i c i c Katou-Indel. ^A^yT^-/tab. 21. fol. 15

Nuclea Katou-Tsjaca. tab. 35. fol. 2.9

M.

Psidium A/f Alacka Pela. ^w-*-*^*. 35. fol. 33

Bombax Moul-Elavou, feu Arbor lanigera

Septaphyllum Spinofa. tab. 52. fol. Ci

V.

N.

fSTEli-pouli, feu Bilimbi altera mi-
nor, tab. 47. fol. 47

Niti-panna. fol. 7

Nyrvala. tab. 42. fol. 4?

Phylla.

P.

DAanja, Panjala, feu arbor Lanigra *Bombax*
bontii. tab. 4?. fol. 59

Panitsjica-maratn tab. 41. fol. 45

Pela, feu Guayabo pomifera Indica *Diospyros*
B. Pin. tab. 34. fol. 31

Pelou feu Guayabo Sylvestre, *Prunus*
tab. 36. fol. 35

Perin Teregam. tab. 61. fol. 81

Ficus

gYalita tab. 38. fol. 39

Dillies

specios

T.

TAmara-tonga, feu Carambolis." *taum*
tab. 43. foljt *carau*

Teregam. *Ficus* tab. tfo. fol. 79

Todda-panna. tab. 13. fol. <? *lyca*

Tsjabela. tab. C. fol. 87 *Ficus*

Tsjaka-maram, feu Jaca. tab. 2tf. fol. 17 *Artoe*

Tsjela tab. £3. fol. 85 *Ficus*

Tsjerou-meer-alou. tab. 56. fol. 71 *Ficus*

V.

VAlii - Teregam. tab. 61fol.85 *Ficus*

sterops

ERRATA EMENDANDA.

PAg. 1A'm.liAzgeKaretala. p. 2.1.18. ***#<? p. j.1. 8. exattius. & 1. ij.exmajör;. p.^A.Lemittit. X.^iterumpant. l. 7. ramus. I.9. obseptus. 1. ij.genuina. 1.2\$. promifeo»dis. p. 5,1. 1^Malec. lin. 26. dele adhuc. p. 6. 1^ 12. col. 1.Cann- fannam. col. 2. Bauhw. p. 7.1. 3 Niecol. 1#ulc col. 1. dele <^. p.p. 1. 3. Malabarenibus. p. 11. 1.21. fwulg. p. 12. l. 29. Conrouada. l. 31. in. p. 13. l. 14. Sxteesfu& nuxcupaut. p. 18. l. 16. reguntur. p. 19. l. 25. Kauze. 27. quocum. 30. Bubulis. p. 20. l. 15. col. 1. desribit. ibid. col. 2. leg. jaceros nuxcupantur. p. 21. l. 6. Atocira. l. 16. diffundantur. l. 17. Malake- rrijambou. p. 22. l. 2. decerpuntur. p. 25. l. 6. sedecim pedum. p. 29. l. 2. leg. 33. l. 22. rufis. p. 31. l. 1. Guajako. p. 32. l. 4. ma- netque. l. 18. col. 1. Guayevor. col. 2. l. 17. Pin. &c Indica. l. 28. Plant. pag. 37. l. 21. in quinque laciniias. l. 31. oblonga. n. 28. l. ult. Serifale. p. 41. l. 1^p. decerpuntur. l. 4. *L. naturioribzr>jolliffima. p. |A: *)doMato. p.^A.io.Tirpontafe. p. 50. l. II. camphra. p. 52. l. 28. dele &. p. 53. l. 17.col. 1.Carambolas. col*2. 1. lC.Chamaroch. p.do. 1. II. Aprili. p. 61.1.2%.numerous. p» 63.1-5- Maroin. p. 69.1.4. Arvore. lin. 12. quinqua?nta (revere) tenves. p. 71.1. 17. conficiatur. p. 74.1.10. Enzadam. p. 75.1.4. Rouka-paraj. p. 76* 1.31 y7#r. p. 77.1.4. Btzzh. p. 87> 1. 3. Tsjabsla.

In Dedicationepag. 2.lin. 15. lege aliquamdiu.

In Pracfat. feu Epift. Mu nicks ad Le&coremBotan. pag. i.lin. 22.lcge celffflmas. lin. penult, aliorym. lin. ult. *accrata*.

BOOK CARD

Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

Call No. \$ ⁹⁽⁵⁹⁵⁾
~~H.E.-h.Acc.~~ No. B 2398

Author R. K. Lebeck H. Van.

Title, ... Ifor. tus fejfr & f* Malabaricus
Vol. 3.

Name of Borrower/Code No.	Date of Issue	I	Date of Return
Shri N. C. Magindar Curator, C. N. H.	26-11-69 (L.S.)		5-2-70
Dr. H. P. Neir. (for exhibition at Chidambaram)	14-8-79.		15-8-79.

f4
INDIAN BOTANICAL GARDEN LIBRARY
SURVEY OF INDIA

