


Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS NO. 580-85
BOOK NO. LED-1 V.4
ACC. NO. 82623



ICONES

P L A N T A R I U M

NOVARUM VEL IMPERFEGTE COGNITARUM

FLORAM ROSSICAM, IMPRIMIS ALTAICAM,

ILLUSTRANTES.


ICONES PLANTARUM NOVARUM VEL IMPERFECTE COGNITARUM FLORAM ROSSICAM, IMPRIMIS ALTAICAM, ILLUSTRANTES,

E D I D I T

CAROLUS FRIDERICUS A LEDEBOUR,

PHIL. DR., BOTAN. PROFESSOR P. O. IN UNIVERSITATE CAESAREA DOPATENSI, HORTI DOPR AT.
DIRECTOR, ROSSORUM IMPERATORI AUGUSTISSIMO A CONSILIIS STATUS, ORDINIS S. ANNAE
SECUNDÆ CLASSIS EQUES, REL.

CENTURIA IV.



RIGAE apud I. Deubner,
LONDIM, PARISIIS et ARGENTORATI apud Treuttel et Wiirtz.
BRUXELLÆ in Libraria Parisiensi.

18 3 3.

ICONES PLANTARUM.
FLORAM ROSSICAM, IMPRIMIS ALTAICAM,
ILLUSTRAENTES.

CENTURIA IV.

ASPERULA PANICULATA. Tab. CCCI.

A foliis senis lanceolate oblongis acuminatis margine hispido - scabris cacteram cauleque erecto glabris Vfloribus terminalibus axillaribusque paniculatis , panicula diffusa, corollis campanulatis, fructibus laevibus.

Hab. in montori herbidis ad fluv. Tscharysch et Sentelek; in sabulosis ad ripam fl. Katunja.

Fl. Jun., Jul. %

Explic. Icon. CCCL - a) Flos integer auctus. b) Corolla longitudinaliter fissa m. a. c) Fructus submaturus auctus.

ECHINOSPERMUM BRACHYCENTRUM. Tab. cccn.

F canibus superne ramosis foliisque subsericeis, tubo corollae calyce paullo limbo duplo breviori, calycibus fructiferis erectis pedicellos superantibus, caryopsibus aculeis brevissimis uniserialibus marginatis, disco lateribusque tuberculatis.

Hab. in apricis, locis abruptis lapidosis inter pagos Butakowa et Tscheremschanha et prope Bucl-tarminsk Fl. April., Maj. %

rrriT — *| Flos integer m. a. b) Corolla longitudinaliter fissa m. a. c) Fructus immaturus magis auctus.
Explic. Icon, i/i/^{UD}n. — a) *^{UD} o

HERACLEUJVI BARBATUM. Tab. cccm.

H foliis Dinnatis bijugis, foliolis inferioribus terminalique sinuato - pinnatipartito petiolatis: ladiis acuminatis sefratis : serraturis ovatis acuminatis, umbellis radiantibus, carpellis ellipticis parcc pilosis apice subemarginatis , vittis commissuralibus parallelis.

Hab. in pratis montosis. Fl. Jun., Jul. £?

Explic. Icon. CCCIH. - a) Flos integer radii a fronte visus m. n. b) Flos integer disci m. n. c) Fructus immature m.o. d) Carpellum maturum a dorso m. n. e) Idem a commissura m. n.

HERACLEUM DISSECTUM. Tab. ccciv.

TT foliis ternatis: foliolis petiolulatis; lateralibus pinnati-, terminali palmatipartitis: laciis incisis innatidisve oblongis acuminatis serratis, umbellis radiantibus, carpellis orbiculato - ellipticis demum glabris¹, vittis commissuralibus divergentibus.

Hab. in pratis prope pagum Tschetschulicha, metallifodinam Riddersk et alibi. Fl. a medio Junio ad finem Julii. £

Explic. Icon. CCCIV. - a) Flos integer m. a. b) Carpellum a dorso n, ; y) Hem a commissura m. n.

PEUCEDANUM ELATUM. Tab. cccv.

P. caule tereti, foliis glabris tri- vel quadruplicate-pinnatis: pinnulis pinnatisectis: segmentis pinnatifidis incisis vel integris: laciniis linearibus acuminatis margine laevibus, umbella primordiali subsessili, involucro subnullo, involucellis abbreviatis.

Hab. in declivibus apricis herbidis ubique. FL Maj., Jun. IJ.

Explic. Icon. CCCV. — a) Flos masculus m. a. b) Flos foemincus m. a. c) Fructus a dorso m. n. d) Carpellum a commissura m. n. e) Idem sectione transversali m. a.

PEUCEDANUM GRACILE. Tab. cccvi.

P. caule apbyllo ramoso, rainis sparsis, foliis radicalibus cano-pubescentibus demum subglabris bi-pinnatis: pinnulis oppositis pinnatisectis: segmentis suboppositis subtrifidis, vaginis apliyllis amplexicaulibus coriaceis - chartaceis persistentibus.

13. microcarpum.

Hab. in apricis siccis subsalsis deserti sofigoro - kirghisici inter Buchtarminsh et lacum, qui Noor-Saisan vocatur; ft. in lapidosis ad fl. Grammatucha prope Riddersh. FL Majo. II,

Explic. Icon. CCCVI. — a) Flos integer m. a. b) Carpellum a dorso m. n. c) Idem m. a. d) Idem a commissura m. a. e) Idem sectione transversali hi, a. f) Idem var. /3. microcarpa in. n.

ASTRAGALUS BREVIFOLIUS. Tab. CCCVII.

Caprini. Decand. Prodr.

A. caespitosus subsericeus, foliolis septenis oblongis petiolulatis, pedunculis axillaribus brevissimis uni-vel bifloris, floribus folia superantibus, calycis tubo dentibus 3-4-plove longiori, leguminibus calyce subsericeo membranaceo arcto inclusis bilocularibus: loculis dispermis.

Hab. in sterilibus siccis deserti editi juxta fl. Tschfja extensi. FL Jun. !.

Explic. Icon. CCCVII. — a) Pars infinia petioli cum stipulis illi adnatis, m. parum a. b) Pedunculus cum floribus bracteisque m. n. c) Vexillum m. n. dd) Alae m. n. c) Carina m. n. f) Legumen calyce rupto vexilloque persistente obtectum. g) Idem caljee et vexillo consulte ablatis nu. n. h) Idem sectione transversali m. n.

PEUCEDANUM VAGINATUM. Tab. ccevm.

P. radice repente, caule simplici, foliis pinnatis: pinnis oppositis pinnatisectis: segmentis alternis pinnati- vel tri- partitis integris: laciniis linearibus acutis, vaginis membranaceis, involucro nullo, involucelli foliolis linearibus longitudine uinbellularum.

13. jjtimiliim.

Hab. in pratemibus ad fl. Jrtysch et Kohsun; f3. in apricis siecissimis deserti Kuraici et ad fl. Kerhjk. Fl. Jan., Jul. IJ.

Explic. Icon. CCCVIII. — a) Flos integer m. a. b) German focundatum a latere m. a. c) Carpellum a dorso m. a.

PEUCEDANUM POLYPHYLLUM. Tab. cccix.

I\ caule striato-sulcato ramoso, foliis radicalibus numerosis pinnatis: pinnis sessilibus pinnatisectis: segmentis pinnati-partitis trifidis vel integris: laciniis oblongis linearibus acutis margine laevibus, in^ volucr\ foliolis lanceolatis margine membranaceis deciduis.

C E N T U R I A IV.

7

Hab. in rupestribus siccis ad fl. Tscharysch et llerlyk, prope Riddersk, Loktewsk et alibi, nee non in collibus arenosis circa Schulbinsk ad fl. Jrtysh. Fl. Jan., Jul. 2I.

Explic. Icon. CCCIX. — a) Flos integer auctus. b) Cremocarpium a dorso m. a. c) Idem in. a. d) Carpellum a commissura m. a. e) Idem sectione transversali.

LIGUSTICUM DISCOLOR. Tab. CCCX.

L. foliis inferioribus ternato-bipinnatis: pinnulis inferioribus petiolatis trisectis; superioribus segmentisque inferiorium oblongis pinnatifidis incisive decurrentibus, involucro nniversali polyphyllo decido: foliolis lanceolato - Jinearibus ; partiali polyphyllo: foliolis linearibus persistentibus.

Ilab. in pratis v. gr. prope Bidder sk, Alexandrowsk, pagmn Belaja ad fl. Buchtorma. Fl. Jun., Jul. g ?

Explic. Icon. CCCX. — a) Flos integer a vertice adspactus in. a. b) Creipocarpium a latere m. paruii a. c) Carpellum a dorso in. parunra. d) Idem a commissura m. p. n.

AULACOSPERMUM M. .

Char, gener. Calycis margo 5 - dentatus vel obsoletus. Petala ovata: acumine inflexo. Cremocarpium a latere parum compressum ovatum. Carpella jugis quinque alatis subaequalibus ; lateralibus marginantibus. Valleculeae uni- vel plurivittatae. Semen sulco profunde angusto incisum eoque complicatum.

Involucrum imiversale et partiale polyphylJum. Carpophorum bipartitum.

Genus medium quasi inter Physospermum et Conium.

AULACOSPERMUM ANOMALUM. Tab. cccxi.

A. caule sulcato glabro virgato, foliis pinnatis: pinnis bipinnatim sectis: segmentis incisis integris acutis, involuci foliolis oblongo-linearibus integris pinnatifidis bipinnatifidisve.

CnidiuM anomalum. Fl. alt. I. p. 330.

Hab. in pratis fertilibns humidiusculis , in campestribus ad fl. Tscharysch, Kohsun , Jrtysh; — var. acaulis in alpe ad font em fl. Tschegan. FL Jun., Jul. £ ?

Explic. Icon. CCCXI. — a) Flos foemineus integer m. a. b) Flos hermaphroditus integer m. a. c) Cremocarpium a latere m. n. d) Carpellum a dorso m. a. e) Idem a latere ir. a. f) Idem a commissura m. a. g) Idem sectione transversal! m. a.

AULACOSPERMUM CUNEATUM. Tab. cccxn.

A caule sulcato glabro ramoso: ramis superioribus verticillatis oppositisve, foliis bipinnatis: pinnis inferioribus 3- sectis; superioribus bi- vel tripartitis incisisve cuneatis , foliolis involuci oblongo - ellipticis apice subdentatis, involucelli lato - ellipticis integris mucronatis.

Cnidium cuneatum. Fl. alt. I. p. 331.

Hab. raro in pratis ad fl. Kerlyh Fl. Jul. J?

Explic Icon. CCCXII. — a) Flos integer a vertice m. a. b) Cremocarpium submaturum a latere m. a. c) Idem sectione transversali m. a.

CACHRYS MACROCARPA. Tab. CCCXIII.

C. foliis radicalibus ternatis: foliolis bi- vel tripinnatis: pinnulis tri - vel palmatisectis: se^{mentis}
integris trinervis: laciniis hneanbus oblongisve, involucro utroque polyphyllo, cremocarpio ovaT cat
pctis glabris undecifnangulatis.

*Hab. in collibus apricis et rupestribus deserti soongoro-kinrhivrf ** nJ**»so ^ * ? TT *
gorsk inde ad lacum usque, qui kor-Saisan vocatur. Fl. M^7*

Explic. Icon. CCCXII. — 1. Umbellula singularis fertilis m. n. 2. Umbellula ^{"singulari"} ~~sterilis~~ m. n. a) Flos masculus
auctus. b) Flos hermaphroditus auctus. c) Cremocarpium a laterē m. n. d) Semen , Ut Vittae in conspectum veniant m. n.
e) Carpellum sectione transversali m. n.

STATICE CONGESTA. Tab. CCCXIV.

H. caulibus obliquis subfoliosis laevibus inferne subtriquetris ramiTM bus, foliis obovato-oblongis obtusis muticis glabris, calyc[^], "S! Sb₀nZJIT essis; infimis substerili-
quinqefido: laciniis obtusis profunde denticulatis. wtundibuhfoinu ad costas patulo-pilosu sub-

Hab. in locis salsis deserti edti ad fl. Tschuja. Fl. Jul. u.

Explic. Icon. CCCXIV- a) Flos bracteis stipatus in. a.

OXYTROPIS PUMILA. Tab. CCCXV.

0. acaulis, foliolis subnovenis sericeis snnra HPTM_m[^] J, L . ^obion SoTTM*TM Conjungatis ^Assime
3-4-tim verticillatis), scapis brevissimis JZ J l l 2 T7 .ris et in ^mribus [^]* aeuantibus,
bracteis ovatis calycibusque illis pl^{ss} duplo longioribus albo villok ^b villosissimis unilocularibus.
albo-villosis, leguminibus ovatis acuniinatis

Hab. in campestribus apricis ad fl. Tscharisch. Fl. Jan. ^

Explic. Icon. CCCXV. a) Calyx m. .. b) Vexillum m. .. cc) Alac m' n A| C .
persistente m. n. f) Idem sectione transversali m. n. e) Leguraen cum calyce

ASTRAGALUS MULTICAULIS. Tab. CCCXVI.

Hypoglottidei. Decand. Prodr.

A. caulescens prostratus vel adscendens piloso-pubescens, stipulis nⁱp^mhr_{ano} .
foliis, foliolis oblongis ovatisve emarginatis 5- 11-jugis, racemis abbr^Tv^TTis superantibus,
bracteis pedicello longioribus, calycibus nigro- vel albo- pil . '1 P^{uu}n^als ^oJ^un longe
mosis ovato - triquetris canaliculatis subglabris calycein triplum <nhap_n.^P oJ^{?y} eS^{III}<inibus erectis race-
monospermis). suDaequanUbus semibiJocularibus (loculis

*Hab. in limosis salis deserti Kuraici juxta fl. T I - Uchua e*Pansi> nee non similibus locis.ad
fl. Kan. Fl. Maj., Jun. %*

Explic. Icon. CCCXVI. — a) Calyx m. parum a. b) Vexillum m. n ee| Ai
f) Idem sectione transversali m. n. e) Lee_{umen} m. n.

CAREX MELANANTHA. Tab. CCCXVII

C. spicis subsenis confertis ovatis sessilibus erectis, st^t
ticis ~~stellatis~~ ore^by^hlino integrgeimoterminalis et p^unis Z⁸r ffT ^ T perigynia^{is} trigonis ellip-
ticam subaequantibus.

Hab. in summo monte ad fontem fl. Tscharysch, in monte crueis prope Biddersh, in insultis fl. Koksun et Tschuja. Fl. aestate. %

Explic. Icon. CCCXVII. — a) Gluma m. valde a. b) Perigynium floriferum m. valde a. c) Idem fructiferm a dorso visum m. valde a. d) Idem transversim sectum m. valde a.

ASTRAGALUS DAVURICUS. Tab. CCCXVM.

Annulares. Decand. Prodr.

A. erectus pilosus, foliolis 5—9-jugis oblongo-elipticis mucronatis, stipulis lanceolatis acuminatis, racemis multifloris pedunculatis folio longioribus, bracteis dentibusque calycinis setaceis, leguminibus erectis incurvis linearibus subcompressis extus canaliculatis pilosis obsolete reticulatis bilocularibus.

Hab. in herbidis ad fl. Tschulyschman in lacum aureum (Teletzkoe Osero) influentem. FL Jul. ©

Explic. Icon. CCCXVIII. — a) Calyx cum bractea m. n. b) Vexillum m. n. c) Alae m. n. d) Carina m. n. e) Legumen m. n. f) Idem sectione transversali m. n.

CAREX MICROCEPHALA. Tab. CCCXIX.

C. spica solitaria oblonga apice mascula, stigmatibus tribus, perigynis (sessilibus) laevibus ovatis rostratis ore hyalino oblique truncatis gluma acuta brevioribus, culmo triquetro foliisque planis scabro.

Hab. in montibus ad fl. Tscharysch. Fl. Majo. %

Explic. Icon. CCCXIX. — a) Gluma m. ralde a. b) Perigynium, a dorso visum m. valde a. c) Idem a facie m. valde a.

TAPHROSPERMUM. c. A. MEYER.

Char. gener. Calyx patulus, basi aequalis. Petala indivisa. Glandulae hypogynae . . . Filamenta libera, edentula. Stigma simplex. Siliqua supra torum sessilis, abbreviata, subulato - subtetragona (basi subcordata), bilocularis, oligosperma, dehiscens: valvulis (pellucidis) subnavicularibus, trinerviis; placentis dorso obtusis, inclusis. Semina pendula, uniserialia, immarginata, scrobiculata. Funiculi umbilicales setacei, liberi.

TAPHROSPERMUM ALTAICUM. Tab. ccexx.

f. glaberrimum, foliis subellipticis (sub)- integerrimis.

Hab. in locis lapidosis asperis summae alpis ad fl. Tschuja jacentis, versus ostium fl. Tschegan. Julio florifera et fructibus maturis onusta. 2I. ?

Explic. Icon. CCCXX. — a) Calyx cum genitalibus m. valde a. b) Petalum m. valde a. c) Genitalia m. valde a. c) Statumen a latere interiori m. valde a. d) Pistillum m. valde a. e) Siliqua a latere placentario m. valde a. f) Eadem a latere valvario m. valde a. g) Eadem valvula anteriori ablata m. valde a. h) Eadem transversim secta m. valde a. i) Segmenta dissepimenti m. magis a. k) Semen m. magis a. l) Idem transversim sectum m. magis a.

SAXIFRAGA FLAGELLARIS. Tab. CCCXXI

S. foliis spathulato - oblongis crassiusculis cartilagineo - glanduloso-ciliatis, caule folioso erecto glanduloso-viscoso 1—5 - floro, sarmentis elongatis apice radicantibus, petalis latis utrinque attenuatis calyce viscoso duplo vel triplo longioribus.

C E N T U R I A IV.

*Hal. in humidis summae alpis ad fontes ft. Tscharysch, nee non in alpibm ft. Tschuja adjacentibus.
Fl. Jan., Jul. %.*

Explic. Icon. CCCXXI. — a) Flos explanatus m. n. b) Stamen a latere interiori m. a. c) Folium m. a> <4) Cupsuta cum calyce, staminibus et calyce persistentibus: lacinii duabus consulte reflexis.

ARENARIA UMBROSA. Tab. CCCXXII.

A. scabrido-pubescent, caule erectiusculo, foliis subsessilibus oblongis trinerviis acutis, pedunculis axillaribus et terminalibus solitariis unifloris folium aequantibus vel superantibus, petalis capsulaeque dentibus circinnatis sepalae lanceolata acuminata subduplo superantibus.

Hah. iii hitmidiisculis umhrosis prope pagutn Tschetschulicha, munimentum Alexandrowsh, ad torrentem Grammatucha prope RiddersL FL Maj. — Jul. %

Explic. Icon. CCCXXII. — a) Petalum m. n. b) Calyx cum genitalibus m. a. c) Capsula matura m. a. d) Semen m. «

CAREX OVATA. Tab. CCCXXIII.

C. spiculis androgynis apice masculis in capitulum ovatum aggregatis, stigmatibus binis, perigynnis ovatis acuminatis serrulatis ore hyalino oblique truncatis gluma ovata acutiuscula longioribus, culmo triquetro scabro, foliis planis.

flab, in insults Kuraicis. Fl. aestate. !{.

Explic. Icon. CCCXXIII. — a) Gluma m. valde a. b) Peripynitum floriferuhi a facie visum m. valde a. c) Perigynium fructiferuni a dorso visum m. valde a. d) Idem transverse sectum nn v. a.

CAREX ORTHOSTACHYS. Tab. CCCXXIV.

C. bracteis foliaceis longissimis, spicis masculis subternis; femineis subternis distantibus cylindraceis erectis pedunculatis, stigmatibus (sub-) tribus, perigyniis glaberrimis erectis ovato-oblongis subtrigonis nervosis rostratis bicupidatis gluma mucronata longioribus, vaginis villosis.

Hah in prat is humidis versus laci/m, qui Noor-Saisan vocatur. FL Maj. !(.

Explic. Icon. CCCXXIV. — a) b) c) Glumae m. vaide a. d) Perigynium floriferum m. valde a. e) Perigynium fructiferum a dorso visum m. valde a. f) Idem transverse sectum m. valde a.

POTENTILLA APPROXIMATA. Tab. ccexxv.

P. caule erecto vel basi adscendente petiolisque albo-villosis, foliis radicalibus caulinisque inferioribus pinnatis, foliolis 7; superioribus quinatis ternatisve; omnibus supra pubescentibus viridibus, subtus incano-tomentosis pectinato - pinnatifidis, petalis emarginatis, calycem superantibus, receptaculo villoso, acheniis (sub lente) subrugosis.

Slab, in siccis graminosis ad fl. Jrtysch (31). Fl. Jim. U

E*Plic. Icon. CCCXXV. — a) Calyx n.. n. b) Petalum m. n.

POTENTILLA DEALBATA. Tab. CCCXXVI.

P. caule adscendente pubescente, foliis (raro 9-natis) 7-natis vel 5-natis; summis ternatis, supra glabriusculis subtus niveo-tomentosis, foliolis oblongis basi cuncatis pectinato - pinnatifidis marginc sub-

revolutis, stipulis subintegris, petalis obovatis calycem vix superantibus, receptaculo villoso, acheniis laevibus.

Hah. ad fl. Jrtyesch, Behun, Kurtschum, prope Schulhinsk in pratensibus, in desertis graminosis prope Loktewsh. Fl. Maj., Jun. %

Explic. Icon. CCCXXVI. — a) Calyx m. a.

POTENTILLA AGRIMONIOIDES. Tab. cccxxvn.

P. caule basi adscendente stricto patentissime villoso, foliis interrrnpte pinnatis, foliolis numerosis ovato-oblongis obtuse pinnatifidis supra pubescentibus stibitus cano-villosis, stipulis subovatis lanceolatis acuminatis, petalis calycem superantibus, receptaculo villoso, caryopsibus rugulosis.

Hah. in siccis graminosis ad fl. Jrtyesch. Fl. Jun., Julio. 1).

Explic. Icon. CCCXXVII. — a) Calyx m. n. b) Petalum m. n.

POTENTILLA ASTRAGALIFOLIA. Tab. cccxxvnr.

P. sericeo-vilosissima, caule prostrato subaphjillo, foliis radicalibus pinnatis subbijugis, foliolis oblongis integerrimis vel bi- trifidisve subimbricatis; suinmis subconfluentibus; terminali trifido; caulinis minimis simpliciblis integris, stipulis oblongis integris vel subincisis vel nullis, petalis suborbiculatis calyce duplo longioribus, receptaciilo villoso, caryopsibus laevibus.

Bah. in sterilissimis deserti editi ad fl. Tschvja expansi. Fl. Jul. y.

Explic. Icon. CCCXXVIIH. — a) Calyx m. n.

POTENTILLA ALTAICA. Tab. cccxxix.

P. caule adscendente cano - pubescente, foliis subternatis supra villosis subtus niveo - tomentosis: foliolis obovatis profunde pinnatifidis: laciniis linearibus, stipulis integris, petalis obcordatis, calyce duplo longioribus, receptaculo piloso, caryopsibus laevibus.

Hah. in alpinis humidhisculis ad fl. Tschuja. Fl. Majo. %

Explic. Icon. CCCXXIX. — a) Calyx in. a. b) Petalum m. a.

PHACA ABBREVIATA. Tab. CCCXXX.

Ph pilosa adulta glabrior; caulis erectis simpliciblisi, stipulis lanceolate - linearibus reflexis marcescentibus foliolis 21 — 23 oblongis utrinque rotundatis mucronatis, pedunculis folio longioribus, floribus in racemum abbreviatum multiflorum congestis, corollis calyce vix duplo longioribus, leguminibus Stipitatis compressis, junioribus dense pilosis; adultis pilosulis.

Hah. in suhalpinis ad ostium fl. Ahai a meridie in fl. Kohsun influentis. Fl. Jun., Jul. ^

Explic. Icon. CCCXXX. - a) Calyx m. n. b) Vexillum m. n. cc) Alae m. n. d) Carina m. n. e) Legumen m. n.

POTENTILIA DASYPHYLLA. Tab. CCCXXXL

P. caule adscendente villosiusculo, foliis multijugis, foliolis oblongis pinnatipartitis lobis oblongo-linearibus obtusiusculis supra pubescentibus viridibus subtus sericeo-villosis, stipulis ovato-lanceolatis integris, petalis obovatis calycem superantibus, receptaculo subviloso, caryopsibus teriuissime rugulosis.

Hab. in rupesribus ad fl. Korgon, Tscharysch, Tchuja, Koksun, in montibus Tschingistau deserti soongoro-hirghisic FL Aprili — Jul. II.

Explic. Icon. CCCXXXI. — a) Calyx m. n. b) Petalum m. n.

POTENTILLA SOONGORICA. Tab. CCCXXXN.

P. caule laxo basi subadscendente puberulo, petiolis albo-villosis, foliis radicalis pinnatis 3—4-jugis; caulinis 2-jugis: pinnis subtus cinerascentibus; superioribus profunde pinnatipartitis; inferioribus minoribus; infiniis subintegerrimis; subfloralibus lanceolatis integerrimis, stipulis inferioribus semipinnato-laceris, floribus laxe dichotomo-paniculatis, petalis subemarginatis calycem superantibus, receptaculo viloso, caryopsibus rugulosis.

Hab. in montibus Arhaul et Dolenhara Soongoriae. Majo deflorate, Ij.*

Explic. Icon. CCCXXXII. — a) Calyx m. n.

POTENTILLA CONFERTA. Tab. CCCXXXHL

P. radice multicauli, caulis adscendentibus petiolisque longissime patenti-villosis, foliis pinnatis: foliolis 7-11 oblongo-lanceolatis distantibus pectinato-pinnatifidis margine revolutis supra pubescentibus viridibus subtus incano-villosis, stipulis lato-ovatis subincisis, panicula terminali conferta, petalis obovatis subretusis calycem subaequantibiis, receptaculo viloso, caryopsibus rugulosis.

*Hab. ad fl. Kerlyh in fl. Tscharysch influent em et Buchtorma. FL Junio, Julio. *II*

Explic. Icon. CCCXXXIII. — a) Calyx.

POTENTILLA SERICEA. Tab. CCCXXXIV.

P. caule adscendente cano-pubescente, foliis pinnatis, foliolis 9—13 obovato-oblonris " paititis: lobis oblongo-linearibus obtusis utrinque sericeo-tomentosis, stipulis subincisis petal" ^ h" " datis calyce duplo longioribus, receptaculo viloso, caryopsibus rugosis.

Hab. in rupestribus ad fl. Tchuja, Koksun et Tscharysch. FL Majo, Junto. II

Explic. Icon. CCCXXXIV. — a) Calyx fructifer m. n.

SAXIFRAGA MULTIFLORA. Tab. CCCXXXV.

P. foliis lanceolato-linearibus sparsis cuspidatis subciliolatis a, 91. u -A MI I- nali multifloro, laciinis calycinis ovatis obtusis, petalis ellipticis It " " r^lUo%nils\^bo termino duplo superantibus, staminibus corollam excedentibus. ^ " obUsluscuUs uwne^ calycem plus

Hab. in Davuriae alpibus. !(•

Explic. Icon. CCCXXXV. — a) Flos integer in. a. b) Stamen singulare m. magis a. c) Pars sDicar, ..

ARABIS FRUTICULOSA. Tab. CCCXXXVI.

A. frutescens, pube stellata canescens, foliis integerrimis; inferioribus oblongo-spathulatis petiolatis; caulinis ovato-oblongis sessilibus, calycibus pedicelli longitudine, petalis obovatis patulis, siliquis puberulis erexit pedicello erecto - patulo multo longioribus.

Hab. in collibus ad fl. Ulba; in rupestribus praeeruptis montium a fortalito Buchtarinsk orientem versus saifreguens, nee non similibus locis in deserto soongoro-kirghisico, praesertim in montibus Arkau et Tschingistau. Fl. Aprili, Majo; semina pergit Juto, Julio. \$.

E I¹ Icon CCCXXXVI. — a) Frustulum folii cum indumento m. valde a. b) Calyx cum genitalibus m. n. c) Petalum m. n. ^Genili'a aucta. e) Ovarium austum. f) Siliqua a latere valvario m. n. g) Eadem, ablata valvula anteriore m. n. h) SiHqua transverse sccta valde aucta. i) Segmenta dissepimenti valde aucta. k) Semen m. valde a. l. Idem transverse sectum m. valde a.

POTENTILLA DESERTORUM. Tab. cccxxxvn.

P caule erecto stricto foliisque quinatis ternatisve viscidulo - glanduloso - hispidis, foliolis obovatis obtuse dentatis:dentetermina liminori, stipulis integerrimis, floribus paniculatis, petalis obcordatis, receptaculo villoso, caryopsibus laevibus.

Hab. in montibus Arkat deserti soongoro-kirghisici. Versus finem Julii jamjam deflorata. ^

Explic. Icon. CCCXXXVII. - a) Flos, b) Calyx fructifer m. n.

POTENTILLA CHRYSANTHA. Tab. cccxxxvm.

P caule adscidente patenter piloso, foliis quinatis (raro 7- natis); sunjmis ternatis plus minusve villoso-pubescentibus, foliolis oblongo-cuneatis serratis margine plams, petahs obcordat,s calyce duplo longioribus, receptaculo villoso, caryopsibus rugulos.s.

Hab. in convallibus apricis graminosis non rara. Fl. Aprili et Majo. If

Explic. Icon. CCCXXXVIII. - a) Calyx m. n.

ISATIS COSTATA. Tab. CCCXXXIX.

I. siliculis glaberrimis obovato-ellipticis utrinque obtusis latitudine subtriplo longioribus in disco trijugis, jugis subaequalibus; lateralibus obtusiusculis; intermedio obtuso bi-tricostato.

Hab. frequens in locis montosis et ad rivulorum ripas. Fl. Majo. i

Explic. Icon. CCCXXX.X. - a et c) Siliculae formae variae „, n. b et d) Eaede* transverse sectae m. r;

PEDICULARIS LASIOSTACHYS. Tab. CCCXL.

P. corolla rin^ente calyce vix duplo longiore, calyce membranaceo infundibuliformi acute quinque-dentato dense lanato bracteis foliaceis basi integerrimis medio pinnatisectis apice semilatis breviore, filamentis omnibus glabris, spica bred densa.

Hab. in udis summae alpis ad fl. Tschuja contra ostium fl. Tschegean jacentis. Fl. Jul. %

Explic. icon. CCCXL. — a) Flos integer cum bractea m. n. b) Corollae labium inferius m. n.

TUSSILAGO LAEVIGATA. Tab. CCCXLI.

P. laevigata Willd. Spec. pi. III. p. 1969.

T. racemo subfastigiato simplici, floribus radiatis, foliis reniformi - cordatis dentatis utrinque glaberrimis.

Hab. in fluviis et rivulis eorumque ripis adhivali tempore saepe subexsiccatis passim copiosissima, v. gr. in fl. - Tscharyschj Katunja, Ursul, Ulba, Uba etc. Fl. Majo. If

Explic. Icon. CCCXLI. — a) Caulis florifer m. n. b) Ejusdem pars infima cum radice et fasciculo foliorum radicalium nondum evolutorum m. n. c) Pars radicis repentis in. n. d) Folium radicale m. n.

IRIS TIGRIDIA. Tab. CCCXLII.

I. barbata, scapo unifloro foliis ensiformibns glaucis breviori, genuine trigono, tubo elongato spathas membranaceas mucronatas excedente, laciniis corollae obtusis bifidis interjecto dente; interioribus angustioribus margine undulatis stigmata erecto - patula profunde bifida aequantibus.

Hab. in apricis montis schistosi prope pagum Tschetschulicha ad fl. Tscharysch, neque alibi obvia fuit. Fl. April. %

Explic. Icon. CCCXLII. — a) Corollae lacinia exterior m. n. b) Ejusdem lacinia interior m. n. c) Stigma a dorso risum m. n. d) Germen transverse sectum m. n.

POTENTILLA VIScosa. Tab. CCCXLIII.

P. caule erecto stricto superne foliisque pinnatis subviscido - pubescentibus utrinque viridibus, foliis oblongis acute inciso - serratis; superioribus decurrentibus; infimis minoribus, stipulis subintegris, petalis obovatis calycem vix excedentibus, receptaculo piloso, caryopsibus rugosis.

Hab. in rupestribus ad fl. Tscharysch et in rupestribus et campestribus ad fl. Irtysch hand rara. Fl. Jul., Aug. !{.

Explic. Icon. CCCXLIII. — a) Calyx m. n.

PACHYPLEURUM M.

i. i 4. r i m^{*}nnfP flpticulatus. Petala persistentia; flforum in Chat, generic*. Calycis margo obsolete, vel > m u t e — » « ' inalia „f ... Ja exteriora teriorum oborato - oblonga, emarginata cum lacmla aeuta^ .nflexa, raarguo exteriora saborbic>laea proova<a, vix e.argina.a <n . a d ' fTM ^ TM ^ f ? f " f & * & - c o m p r e s sTM. CapeUa f <. anius-
maurinus, fovea

culum. Vittae nullae.

PACHYPLEURUM ALPINUM. Tab. CCCXLIV.

B*. in aysis et subalpinis, v. gr. m[^] m[^]* Mnst prone metallifodinam Riddersk, in alpe Aigulak.
Fl. a media Maji ad finem Julil %

Explic. Icon. CCCXLIV. - a) Folium nrolucen ». n. b) Flos g
integer disci a latere visus m. parum a.

TROLLIUS CAUCASICUS.. Tab. CCCXLV.

T. sepalis patulis, ultra 10, nectariis s t a t u s subbrevioribus, stylis (discoloribus) germinibus vix brevioribns apice inflexis.

Hab. in pratis montosis et subalpinis. %

i. m n b[^] Idem a facie visum m. n. c) Stamen m. n. d) Anthera cum
Explic. Icon. CCCXLV. - a) Nectarium a' latere J ^ J ^ f) Eadem a latere visa m. vaide a. g) Eadem transverse
filamenti particula a dorso m. a. e) Eadem a tace vi
.eota m. valde a. h) Pistillum auctum. i) Cyanum m. n.

VALERIANA CAPITATA. Tab. CCCXLVI.

V. caule simplici, foliis radi ihns ovatis in petiolum attenuatis integerrimis; caulinis 3-partitis:
laciniis acute serratis; intermedia

JM. * "If. •>"- circa forte* JL SevteU; Via e, Inja. Fl.Jun. *

Explic. Icon. CCCXLVI. - a) Achcnium m. n.

ERYSIMUM ALTAICUM. Tab. CCCXLVII.

canis, petalorum ungnibus alyce P compres ^ - tetrago ^ erectiS) stylo brevi (vel mediocn) suban-
placntariis truncatis triloDis, w^l quis ^ glandulis
cipite, stigmate bilobo.

Hab. in locis fertilionibus prope Riddersk, in montosis locis siccis et rupestribus, m[#] stenhsmzs
desert editi ad fl. Tschuja. FL Map, Junto. ^

Explic. Icon. CCCXLVII. — a) Calyx cum genitibus m. n. b) Petalum m. n. c) Pistillum cum staminibus tribus, 6ae-teris abscissis et glandulis nectarifcris, m. n. d, e, f, g) Siliquae variae longitudinis m. n. h) Siliqua transverse secta m. a. i) Segmenta dissepimenti m. valde a. k) Semen m. valde a. l) Idem transverse sectum m. valde a. m) Frustum folii in. v. a.

PRIMULA LONGISCAPA. Tab. CCCXLVIII.

P. foliis oblorigo - lanceolatis obtusis subintegris petiolatis utrinque nudis, umbellae multiflorae nudaee involucri foliolis linear - subulatis basi auriculatis radiis brevioribus, calyce tiibum corollae subaequante.

Hab. in pratensis ad fl. Irtysch, in pratis deserti barabensis et prope Loktewsk, prope Salair alisque. Fl. Majo. %

Explic. Icon. CCCXLVIII. — a) Flos integer m. n» b) Capsula matura m. n»

CAREX ENERVIS. Tab. CCCXLIX.

C. spiculis subsenis approximatis oblongis apice masculis, stigmatibus binis, perigyniis erectis ener- vibus compressis ellipticis rostratis immarginatis sermlatin ore hyalino bidentatis gluma acutiuscula ma- tica longioribus, bracteis aphyllis.

Hab. in montibus ad fi. Tscharysch. Fl. aestate. ij.

Explic. Icon. CCCXLIX. — a) Gluma m. valde a. b) Perigynium floriferum m. valde a. c) Perigynium fructiferum m. valde a. d) Idem transverse sectum m. valde a.

VALERIANA DUBIA. Tab. CCCL.

V. foliis radicalibus primariis integerrimis auriculatisve, caeteris lyrato - pinnatisectis, caulinisque pinnatis, laciniis oblongis obtusis summis decurrentibus subintegerrimis; corymbo composito coarctato, /loribus hermaphroditis.

Hab. frequentissime in montibus schistosis apricis prope Salair. Fl. Majo. %

Explic. Icon. CCCL. — a) Flos integer cum bracteis duabus m. parum a. b) Achenium m. parum a.

CERASTIUM PIOSUM. Tab. CCCL.

C. pilosum, caule erecto stricto, foliis oblongis utrinque attenuatis acutis subtus glaucis, pani- cula terminali dichotoma aphylla; pedunculis fructiferis deflexis, petalis integris subcrenulatis capsulisque sepala OAato - oblonga obtusa triplo superantibus.

Hab. in umbris humidis ad rivulos montanos. Fl. Juntb. i,

Explic. Icon. CCCLI. — a) Capsula.

SAUSSUREA FROLOWII. Tab. CCCLII.

S. anthodii foliolis linearibus; exterioribus reflexis; interioribus patulis, antheris basi bisetis, recep- taculo cicatrizado paleaceo, foliis radicalibus lyrato - pinnatifidis lanuginosis, caule unifloro, flore nutante.

Hab. in subalpinis v. gr. prop Riddersk, ad fl, Belaja et Tschornaja Uba, Aigulah etc. Fl. Julio. %*
Explic. Icon. CCCLII. - a) Fiosculus integer <. a. b) Antherarum cylindrus magU auctus. c) Receptaculum longitudina-
liter diHcetum anthodio circumdate m. n. A) Receptaculi pars m. a.

DONTOSTEMON MICRANTHUS. Tab. CCCLIII.

D. perennis eglandnlosus, foliis integerrimis, petalis obovatis calyce duplo longioribus, stylo erassiti stigmatiis, scminibiis immarginatis.

*Hab. in sterilissinus lapidosis deserti editi ad fi Tschuja. Fl Majo. **

E xplic. Icon. ccclii. - L Planta pri.ni anni <. n. a) Flos integer m. a. b) Gcnit.ia „. a. c) Siliqua tvansvers. secta m. a.

CINERARIA ROBUSTA. Tab. CCCLIV.

ver paucifloro, foliis radicalibus et canlinis infimis cordatis dentatis petiolatis; supremis angusto - oblongis subintegerrimis subscssilibus, floribus corymbosis, acheniis angulato - sulcatis glabris.

Hab. in montibus calcareis ad fi Kerlyk et Kan. Fl. Jun., Jul. %

Explie. Icon. CCCLIV. - a) Achenium -. n. b) Fl. «l» di.ei -. -.

ALLIUM LFPIIDUM. Tab. CCCLV.

foliato foliis linearibus canaliculatis siibfistulosis caule breviori- dicellis multo breviori --- simplicibus deinum corolla parum longioribus.

JU. in colubus apricis et campestribus siccis ad fi Mysck a fortatuo Vstka^orsk us.ue ad lacmn, qui Noor - Saisan vocatnr. Fl. Majo. %

*Explie. Icon. CCCLV. - a) Flos integer m. a. *) Mr. t .er m a b) Stamina duo m. a. c) Capsula matura m. magi. a.*

ALLIU3I CLATHRATUM. Tab. CCCLVL

A. radice reticulata, caule tereti ^ ^ brevioribus orbiculatis; altera mnuronata, petalis obtusis, folioso umbellifero, foliis exacte teretibus, vaginis striatis, petalis oblongioribus sim aquibus -

*nab in nr - montium altiorum ad fl. Tscharysch infra ostium fl. Kerlyk. Fl. Juli
 fr r t ccclv. a) Flos integer „. a. b) Stanina duo, aUero si.plici; altero appends u. , .) Sta.na
 Explic. Icon. II/i/i>'' /
 duo simplicia; altero latiori m. <>*

ALLIUM AMPHIBOLUM. Tab. CCCLVIL

A. radice oblonga, reticuiaw, v h;rai v valvis umbellam subaequantibus subbiparti- caule brevioribus, nmbella globosa densa , spatha bnaiv .

C E N T U R I A IV.

tis: laciniis ovatis acuminatis, petalis acutis, staminibus corona sesquilongioribus simplicibus auxiliis tricuspidatis.

Hab. in campestribus siccis subsalsis ad fl. Tscharysch et Kerlyk, nec non in rupestribus montis crucis prope Riddersk. Fl. Jul. 24

Explic. Ico, CCCLV... — a) Flos ,,, ,,, ,,, ,,, C) Stamina diversae structura m. a.

ALLIUM TENUISSIMUM. Tab. CCCLVII.

A. bulbis aggregatis cylindraceis tunicatis rhizomati horizontali adnatis, scapo tere foliato, foliis semiteretibus intus canaliculatis scapo brevioribus, umbella pauciflora; pedicellis bivalvi pedicellis ,,, ,,, bimori, petalis obtusissimis; exterioribus latioribus orbiculatis obovatis; staminibus simplicibus corolla brevioribus.

Uab. in rupestribus apricis ad fluv. Tscharysch, Ursul et Katunja. Fl. Jun., Jul. 24

Explic. Ico, CCCLV... — , Flos consulte expansus a vertice visus m. a.

ALLIUM HYMENORHIZUM. Tab. CCCLIX.

A. caule tereti sulcato-striato foliato, foliis V-ne bi-flora densa, foliolis spathae diphyllae orbiculatis statim! staminibus CCarinatis, TMglobosa multi-(acute) triquetiisrloculis dispermis.

Hub. in pratis humidis ad fl. Koksun et Uba. Fl. Jul. 24

Explic. Icon. CCCLIX. — a) Flos n, „ b) Stamina duo m matura m „ d) Ladem transversim secta IU, a.

ALLIUM SUBTILISSIMUM. Tab. CCCLX.

A. radice tunicata oblonga, caule tereti basi foliato f, ,,, cl pauciflora, spatha bivalvi: valvis pediceulis l, „ u, , „ fonnibus teretibus usi alba umbella fastigiata * r, „ n(latis, staminibus - purib, „ stjri; ; ; ; oclusis, i, petalis ellipticis

Hab. in campestribus trans fl. Irtysch. Fl. Jul. 24

Explic. Icon. CCCLX. — Planta integra m. n.

POLYGONUM HASTATUM. Tab. CCCLXI.

P. floribus racemoso-paniculatis, foliis oblongo-lanceolatis subhastatis Cfassius^is glabris glaucis; caule erecto, ramis inferioribus prostratis, caryopseos fodebus ovatis.

*Bob. in planiciebus subsalsuginosis v. gr. deserti editi juxta Ur hirghisici occidentaliori ad ripam fl. Irtysch et Malaja Nura. Fl. sch, „ J*****, ** dese TM soon goro*

Explic. Icon. CCCLXI. — a) Flos integer a vertice m. a. b) Idem ab inferiori latere m. a. c) Caryopsis datura calyce inclusa „ a. d) Caryopsis denudata m. a.

ALIJUM FLAVIDUM. Tab. CCCLXII.

A radice reticulata canle tereti inferne folioso umbellifero, foliis linearibus subtus convexiusculis, vaginis striatis, umbell'a hemisphaerica, spatha bivalvi: valvis pedicellos superantibus subbipartitis: laciniis ovatis acuminatis, petalis obtusis, staminibus demum corolla duplo longioribus; alternis tricuspidatis: appendicibus acuminatis petala subaequantibus.

Hab. in pratis subalpinis ad fl, Belaja Uba. Fl. med. Jul. %

Explic. Icon. CCCLXII. - a) Flos integer, b) Stamina duo.

VALERIANA OFFICINALIS VAR. SIMPLICIFOLIA. Tab. CCCLXIII.

V. floribus triandris hermaphroditis, caule ad nodos barbato, foliis omnibus integris serratis.

Hab. in Livoniae pratis. Fl. Jim. %

Explic. Icon. CCCLXIII. - a) Flos integer m. a. b) Achenium naturum n.. a.

PHLOMIS AGRARIA. Tab. CCCLXIV.

Ph herbacea, radice fibrosa, caule hispido, foliis radicalibus caulinisque cordato-ovatis grosse dentatis; floralibus ovatis; superioribus verticillo brevioribus serratis subtus hirsuto-tomentosis, calycis tubo bracteisque subulatis brevioribus canescenti-tomentosis.

Bab. in arvis prope Semipalatinsk. Julio omnino fere deflorata. %

~~Explic. Icon. CCCLXIV.~~ - a) Corollae labium inferius m. a. b) Corolla longitudinaliter fissa labio inferiori abscisso cum genitalibus m. r. c) Calyx m. n. d) Caryopsis matura ». n.

SOPHORA ALOPECUROIDES. Tab. CCCLXV.

S. ~~herbacea~~, foliolis 14 — 25 ellipticis oblongis utrinque sericeis subtus albidiioribus, racemo terminali.

Hab. in siccis arenosis deserti soongoro-kirghisici ad fl. Irtysch, Bekun, Kurtschum; rario in deserto barabensi ad fl. Alei. Fl. Jun. %

Explic. Icon. CCCLXV. - a) Legumen .. n. b) Calyx cum genitalibus «, „. c) Vexillum, ». n. dd) Alae », „. e) Carina m. n.

VICIA LILACINA. Tab. CCCLXVI.

v. ^{a,}le debili, foliolis (9-16) ovato-ellipticis alternis oppositis mucronatis subtus adpresso-nilosus venis anastomosantibus, stipulis oblongis acuminatis ciliatis integris vel semisagittatis' peduncularum floris folium superantibus, vexillo carinam superante alis subbreviori, stylos posticis, leguminibus oblongis compressis glabris subtrispermis.

Hab. in montosis herbidis rario, v. gr. ad fl. Tscharysch et Irtysch prope Alexandrowsh.

Fl. Junto. %

Explic. Icon. CCCLXVI. - a) Calyx cun, pistillo «, a. b) Vexillum n, n. cc) Alae „, „. d) Carina m. n. e) Legumen m. n. f) Semen m. n.

CINERARIA MACROPHYLLO. Tab. CCCLXVII.

C. glauca, caule simplici foliisqii **snbtus** parce pubescenti-pilosus dentatis; radicalibus ellipticis in pectio\yun marginato-alatum decurrentibus; cauVmis superioribus **amplexicaulibus**, floribus in paniculam confertam dispositis, radio 2 — 3 - floro , achenis angustato - sulcatis glabris.

Hab. in pratensibus deserti soongoro -Urghisici circa monies Tschingistau. Fl. Jul., Aug. %

Explic. Icon. CCCLXVU. — 1. Folium radicale m. duplo roinori. a) Flos integer in. a. b) Flosculus disci m. n.
c) Idem in. a.

VICIA MEGALOTROPIS. Tab. CCCLXVIII.

V. canibus cirrhisque ramosis, foliolis namerosis lanceolato-linearibus alternis oppositis mucronatis, stipulis angustissimis ciliatis linearibus vel semisagittatis, pedunculis multifloris folium subaequantibus vcl co brevioribus, floribus numerosis uniseriatis, vexillo alisque carinam aequantibus, stylo apice puberulo, leguminibus oblongis acuminatis.

Hab. in moitosis asperis ad fl. Vba, Vila, Koksun, Kurtschum. Fl. aestate. %.

Explic. Icon. CCCLXVIII. — a) Calyx cum genitalibus m. n. b) Vexillum m. n. cc) Mac m. n. d) Carina m. n.
e) Legumen m. n. f) Semen m. n.

PYRETHRUM MILLEFOLIATUM. Tab. CCCLXIX.

P. caule basi decumbente caeterum erecto stricto, foliis incanis bipinnatisectis : segmentulis linearibus acutis, corymbo paucifloro , radio corollulas disci parum superante.

Hab. in campestribus et collibus apricis frequens, loca editiora fugiens. Fl. Majo — Julio. !{,

Explic. Icon. CCCLXIX. — a) A nth odium cum receptaculo, cui flosculi nonnulli insident m. n.

ROSA BERBERIFOLIA, Tab. CCCLXX.

R. foliis abortu nullis, stipulis connatis foliiformibus glabris, aculcis stipularibus geminis.

Hab. non rara in sterilibus subsalsis deserti soongoro-hirghisici trans fl. Irtysh, rario Occurrit cis fl. Irtysh in deserto soongoro -kirghisico inter mont. Arkaul et lactm, qui Noor- Saisan vocatur, ubi Majo florere incipit fructusque maturat Augusto et Septembri. \$

Explic. Icon. CCCLXX. — a) Petium m. n. b) Fructus m. n. c) Idem longitudinaliter dissectus m. n. d) Carpellum sinuful are in. n.

GERANIUM AFFINE. Tab. CCCLXXI.

G. caule subtereti erecto incano-pubescente, foliis subseptempartitis: laciniis oblongis incisis, pedunculis subcorymbosis, bracteis pedicellos superantibus, calyce fructifero cylindraceo, petalis obovatis integris, filamentis basi dilatatis subciliatis caeterum glabris antherisque persistentibus.

Hab. in pratis fertilibus ad fl. Irtysh. Fl. Jun., Jul ^

Explic. Icon. CCCLXXI. — a) Genitalia cum glandulis nectariferis m. a.

MEGACARPAEA LACINIATA. Tab. CCCLXXII.

M. foliis villosis, radicalibus petiolatis pinnatipartitis, lobis grosse incisis dentatis.

Hab. hand rara in campis siccis argilloso-salsis deserti soongoro-kirghisici oriehtalis, trans fl. Kurtschum, nee non in rupestribus collium Arkaul et Dolenkara. FL primo vere. 2J.

Explic. Icon. CCCLXXII. — a) Pili, quibus herba obtecta est m. a. b) Calyx m. a. c) Petalum m. a. d) Genitalia m. a. e) Ovarium m. valde a.

ZYGOPHYLLUM FURCATUM. Tab. CCCLXXIII.

Z. scabrum, caule herbaceo ercto, foliis petiolatis unijugis, foliolis carnosis planis linearibus, floribus . . . petalis . . . capsulis angulato-cylindricis apicris acuminatis.

Hah. in locis limoso - salsis siccis deserti soongoro - kirghisici occidentalis ad radicem montium Tschingistau. Semina maturat Julio, Augusto. 2J.

Explic. Icon. CCCLXXIII. — a) Fructus sectione transversali m. n.

PASSERINA RACEMOSA. Tab. CCCLXXIV.

P. caulibus numerosis annuis simplicibus, foliis sparsis oblongis brevissimc petiolatis glabris racemo terminali pedunculato subelongato, floribus brevissime pedicellatis 8-striatis octandris, laciniis' limbi horizontalibus ovatis acutiusculis.

Hah. in apricis rupestribus ad fluv. Tscharysch et Koksun. FL Jim. ij.

Explic. Icon. CCCLXXIV. — a) Flos integer a laterc m. a. b) Idem longitudinaliter fissus m. a.

CIRSIUM SERRATULOIDES. Tab. CCCLXXV.

C. foliis oblongis semiamplexicaulibii integris ciliato-spinulosis supra pilosiuscilis subtus subarachnoideis; inferioribus semidecurrentibus, caule sulcato arachnoideo - piloso, pedunculis elongatis subpubescenti - arachnoideis, squamis anthodii glabriuscui lancicolatis ciliolatis adpressis apice patentibus spinula terminatis.

Hab. in arvis et pratis, praesertim submontanis, freqiens. FL Jul. %

Explic. Icon. CCCLXXV. — a) Summa pars caulis m. n. b) Ejusdem pars media m. n. c) Foliolum radicale m. n. d) Infima pars caulis junioris m. n. e) Foliolum anthodii exterius m. n. f) Anthodii foliolum interius m. n.

PHELIPAEA SALSA. Tab. CCCLXXVI.

Ph. sublanata, squamis floralibus ovato-lanceolatis calyce longioribus, bracteis sublinearibus, calycis lobis semiorbiculatis aequalibus, corollae rectiusculae tubuloso - campanulatae lobis subaequalibus semi-orbiculatis patentibus, filamentis basi barbatis, antheris muticis, stylo glabro, stigmate emarginato.

Hab. in locis argillosis deserti soongoro - kirghisici trans fluvium Kurtschum orient em versus. FL Majo. %

Explic. Icon. CCCLXXVI. — a) Flos cum bracteis et squama subflorali a latere m. n. b) Squama subfloralis a dorso m. n. c) Calyx longitudinaliter fissus cum bracteis m. n. d) Corolla longitudinaliter fissa m. n. e) Pistillum m. n. f) Fructus submaturus sectione transversali m. n.

PHELIPEA LANUGINOSA. Tab. CCCLXXVII.

Ph. albo-lanata, squamis floralibus ovato - lanceolatis calyce longioribus, calycis lobis lancicolatis subacqialibus, corollae fauce subinflata, labio superiore (paulo) longiore, lobis labii inferioris subaequalibus ellipticis obtusis subdenticulatis, filamentis antherisque glabris stylo glanduloso, stigmate bilobo.

Hob. in herbidis ad fluv. Talitza, Katunja, prope Barnaul. FL Jun. !{.

Explic. Icon. CCCLXXVII. — a) Corolla longitudinaliter fissa m. n. b) Pistillum m. n. c) Calyx longitudinaliter fissus cum bracteis et squama subflorali a dorso m. n. d) Fructus transversim sectus parum auctus.

ALLIUM VIRIDULUM. Tab. CCCLXXVIII.

A. bulbo solitario, caule basi 1—2-phyllo stricto cylindraceo foliis brevioribus cylindraceis fistulosis quadruplo longiore, umbella subglobosa multiflora, spatha bivalvi: valvis tenuissimis ovato-orbiculatis reflexis subtrincrvii, petalis aequalibus oblongis obtusiusculis, staminibus petala parum superantibus, capsulis trigonis.

*Hab. in regione orientali deserti soongoro - kirghisici. FL initio Maii. *u*

Explic. Icon. CCCLXXVIII. — a) Planta integra m. n.

ORNITHOGALUM TRIFLORUM. Tab. CCCLXXIX.

O. bulbo solitario, scapo subtrifloro, folio radicali solitario linearis; caulino oblongo-lineari, pedunculis racemoso-corymbosis, petalis oblongis obtusis; alternis latioribus.

Ilab. in Sibiriae alpibus.

Explic. Icon. CCCLXXIX. — Planta integra m. n.

MEGACARPAEA LACINIATA (FRUCTIFERA). Tab. CCCLXXX.

Explic. Icon. CCCLXXX. — a) Loculum siliculae, valvulae parte anteriori ablata m. n. b) Silicula sectione transversali m. n. c) Dissepimentum, stylo coronatum, cum semine altero, funiculo umbilicali insidente m. a d) Semen sectione transversali m. a.

OXYTROPIS PHYSOCARPA. Tab. CCCLXXXI.

O. caule fruticoso ramosissimo abbreviate, foliis impari-pinnatis, foliolis verticillatis (quaternis) oblongis linearibusve minutis margine ciliatis versus apicem barbatis, petiolis subpersistentibus, pedunculis axillaribus 3-4-floris folio subduplo brevioribus floresque aequantibus, calyce vilosiusculo leguminibus inflatis muricatis curvato-rostratis.

Hub. in lapidosis asperis summae alpis ad fl. Tschnja contra ostium fl. Tschegan. Fl. Jun. %

Explic. Icon. CCCLXXXI. — a) Calyx cum genitalibus m. „ b) Vexillum m# „ c) ^ m. „ *) tanina m* n^c e) Legumen m. n. f) Idem sectione transversali m. n.

ZYGOPHYLLIM PTEROCARPUM. Tab. CCCLXXXII.

Z. glabrum laeve, eaule herbaceo prostrate foliis bijugis petiolatis planis linear! - oblongis, floribus cernuis, petalis integris obtusis, capsulis oblongis alatis, alis latitudine seminum.

Hab. in argilloso-salsis ad fl. Tschuja contra ostium fl. Tschegan. FL Jan., Jul. %

Explic. Icon. CCCLXXXIL — Fructus sectione transversal! m. n.

ZYGOPHYLLUM SUBTRIJUGUM. Tab. CCCLXXXIII.

Z Klabrum laeve, caule herbaceo prostrate, foliis petiolatis tri- quadrijugisve, foliolis planis oblongis', floribus erectis, petalis . . . capsulis angulato- cylindrical aptens.

Hab. in locis argilloso-salsis subhumidis deserti soongoro - kirghisici trans fl. Irtysch. Semina maturat Augusto. %.

Explic. Icon. CCCLXXXIII. - Fructus sectione transversal! m. n.

ALLIUM STELLERIANUM. Tab. CCCLXXXIV

A «. aggregatis ovatis tunicatis rhizomati horizontali adnatis, scapo tereti basi foliato , foliis semitereti - ressis intus canaliculatis scapo brevioribus, umbella multiflora hemisphaerica, spatha subunivalvi ellis multo breviori, petalis ellipticis obtusis; interioribus latioribus, staminibus simpli- cibus corolla brevioribus.

Hab. in rupestribus siccis a radicibus ad summa montium cacumina usque frequentissime. Fl Julio, Augusto %

Eiplic. Icon. CCCLXXXIV. - a) F.os integer a latere n. n. b) Genitalia „, n. c) Capsula sectione transversal! m. parui aucta.

OROBANCHE AMOENA. Tab. CCCLXXXV.

O. glabriuscula, squamis florahbus o.ato la te cylindricae inc rva e labiis aequ ilongis, lobis lineari-lanceolatis f ^ ^ ^ ^ « TM , fila - n t i s basi hirsutiusculis apice styloque febris obtusiusculis denticulatis; mtermeao 6 subglandulosis, stigmate bilobo.

Hab. cum subsequente, sed multo frequentior, eodemque tempore floret. %

Explic. Icon. CCCLXXXV. - a) Corolla longitudinaliter secta m. ». b) Pistillum m. ».

OROBANCHE SORDIDA. Tab. CCCLXXXVI.

r, u m;« floralibus oblongo - lanceolatis flore duplo brevioribus, sepalis liberis bifidis; 0' pubescens, ^ ^ J ^ ^ cylindricae in rva e labiis subaequilongis, lobis labii inferioris lanceolatae subaequa h b j, ^ _ _ _ y intermedio sublongiore, filaraentis styloque subhirsutis, oblongis acutiusculis integerrnwis picuus, stigmate bilobo.

Hah. rarissime in locis rupestribus montium Arhaul in deserto soongoro - kirghisico orientali, non procul a lacu, qui Noor-Saisan vocatur. Fl. Mayo. %

Explic. Icon. CCCLXXXVI. — a) Corolla longitudinal*er fissa m. n. b) Pistillum m. n>

EtlFHUKBLV BLEPHAROPHYLLA. Tab. CCCLXXXVIL

*E. glauca, verticillo quinqueradiato, radiis subtrifidis dichotomis, foliis caulinis et radiorum ovatis» cordatis acutiusculis obtusisve integerrimis subcoriaceis glabris villoso-ciliatis, appendicibus rotundatis, coccis distinctis glabris laevibus dorso rotundatis, seminibus laevibus**

Hob. in locis rupestribus montium Arhaul et Dolenkara deserti soongoro - kirghisici trans fl. Kurt-schum. Fl. primo vere; seniina maturat Mojo. %

Explic. Icon. CCCLXXXVIL — a) Flos hermaphroditus integer a latere m. a. b) Flos masculus longitudinaliter fissus m. a. c) Stamen m. a.

ANEMONE ALTAICA. Tab. CCCXXXVIII.

A. foliis radicalibus binternatim sectis: segmentis 2—3-fidis inciso - dehtatis; caulinis petiolatis trisectis: segmentis inciso-dentatis; lateralibus bifidis; intermedio trifido, pedunculis solitariis, sepalis 8—12 lineari-oblongis patentibus, carpellis sessilibns oblongis, stylis ensiformibus convergentibus rectiusculis.

Hab. frequentissime in locis montosis ad radicem montium et in subalpinis. FL primo vero nivibus deliquescentibus. II,

Explic. Icon. CCCLXXXVIII. — a) Capitulum e carpellis formatum direccione naturali m. a.

OROBANCHE AMMOPHILA. tab. CCCLXXXIX.

O. albo-lanata, squamis floralibus ovato-lanceolatis florem aequantibus, sepalis bifidis: lobis lanceolatis subaequalibus tubo corollae cylindricae incurvae brevioribus, labiis corollae subaequialongis, lobis labii inferioris obtusis denticulatis subaequalibus, filamentis styloque hirsutis, stigmate subbipartito: laciniis patentissimis.

Hab. in tocis arenosis ad fl. Irtysch et Bekun, in parte orientali deserti soongoro-kirghisici minime rara; circa metallifodinam Kohtewsk. FL Mayo, Junio. 1L

Explic. Icon. CCCLXXXIX. - a) Squama subfloralis a dorso m. n. b) Calyx a latere m. n. c) Calyx a latere interior m. n. d) Corolla longitudinaliter tissa m. n. e) Pistillum m. n.

OROBANCHE BICOLOR. tab. CCCLXL.

O. fnrfuracea, squamis floralibus oVatis acntis flore (subdupo) longioribus, sepalis bifidis vel indiysis, lobis lanceolatis subaequalibus, corollae cylindricae incurvae labio superiori sublongiore bilobo, lobjs labii inferoris (panis) semiorbiculafcs denticulatis subaequalibus, filamentis basi puberulis apice styloque glabris, stigmate emarginato.

*Hal. in deserto soongoro-kirgKsico occidentali toe indein locis <***<*> * ** « * * **
ad ripam, rivuli Tschaganha versus radicem montis Tschingistau. Fl. aestate. ^

Explic. Icon. CCCLXL. - a) Corolla longitudinaliter fissa ». n.

PEPLIS ALTERNIFOLIA. Tab. CCCLXLI.

P foliis alternis petiolatis linearis-spatulatis, floribus pedunculatis solitariis axillaribus^subcorollatis.

*Hal. in scaturiginosis m. Dsclngilen deserti soongoro-kirglusici; rarius in inundatis ad fl Irtysh
 ex adverso fortalitii Schulbinsh. FL Jul., Aug. ©*

Explic. Icon. CCCLXLI. - b) Calyx cum fructu bracteis .tip.!... ». ..

ORNITHOGALUM FILIFORME. Tab. CCCLXLII.

O. bulbo solitario ovato so^l. do^o, M^o folio radicale unico viridi oblongo-linearis piano apice cucullato-
 cyndrico; floralibus suboppositis umbellat h^e ibus acutiusculis; interioribus obtusis.
 plicibus trigonis flore triplo longioribus, petalis exterioribus.

*Hal. in umbris kumidiusculis circa Buchtarminsk et fMi. Fl. Aprili. **

Explic. Icon. CCCLXLII. - Planta Integra m. ...

ASPARAGUS MARITIMUS. Tab. CCCLXLIII.

A. caule ramosissimo ramisque hon/ontahbus ^ f. emini reflexis.
 gentibus arcuatis, floribus campanulatis dioicis, pedunculis g

*Hal. in subsalsis ad fl * » * - I - - - * M * * * " "*

Explic. Icon. CCCLXLIII. - a) Flos longitudinaliter fissus, n. a.

HESPERIS SIBIRICA. Tab. CCCLXLIV.

H. glandulosa pubescenti-pilosa: p^o subcordatis, pedicellis pubescens calycis barbata
 radicalibus ellipticis; caulinis ^ lati^s siliquas ^ glandulosos-pubescentibus

sertim ad latera montium frequens. Fl. aestate. ♂

Ha d) Silique a latera placentalia m. n. e) w

T- , T rrriYTW — a) Calyx m. P^r d; b) Genitalia cum glandulis neeteriferi. m. par. a. c) Pars foli m. a.
 Explic. Icon. CCCLXLIV.) rY^r m sectione transversali ». ..

COTYLEDON LEUCANTHA. Tab. CCCLXLV.

C. foliis spina terminatis, radicalibus rosulatis spathulatis versus apicem subtus convexus; caulis
 coloribus. C. foliis spina terminatis, radicalibus rosulatis spathulatis versus apicem subtus convexus; caulis
 trigo-teretibus, corollis calyce triplo longioribus, pedunculis omni s unifloris, antheris dis-

Hal. „, «»»-«r. ; „, „ n Augmt i %
 in lapidosis ad trajectum P- navj*

Explic. Icon. CCCLXLV. — a) Flos integer auctus- b) Capsulae cam squamis hypogynis m. a.

S1LENE ODORATISSIMA. Tab. CCCLXLVI.

S. floribus axillaribus subsolitariis oppositis subsecundis demum erectis, calycibus clavato - cylindricis 10-striatis glabris, petalis quadrifidis fauce nudis, genitalibus longe exsertis, foliis lanceolato-linearis ciliatis cauleque erecto ramoso glabris.

Hub. in sabulosis ad fl. Irtysh hand procul a lacu, qui Noor-Saisan vocatur. Fl. Jun. 1J,

Explic. Icon. CCCLXLVI. — a) *Fructus submaturus antropoboro insiden**. b) *Inferior pars calycis cum pedicello.*

THALICTRUM ISOPYROIDES. Tab. CCCLXLVII.

Th. glaberrimum subglaucum, *radice* fibrosa, *caule* angu/ato, *foliolis* suborbiculatis tripartitis: partitionibus oblongis obtusis integerriinis, floribus trigynis divaricato - paniculatis subnutantibus, carpellis oblongis aequilateris utrinque obtusiusculis, *stylo* brevissimo.

Hab. in rupestribus montium Urmnchaika prope Buchtarminsk. Fl. primo vere, semina maturat aestate. 1\.

Explic. Icon. CCCLXLVII. —, a) *Sepala cum pistillis et stamine uno, reliquis consulte ablatis m. a.* b) *Carpellum m. a.*

SAXIFRAGA TEREKTENSIS. Tab. CCCLXLVIII.

S. caespitosa pusilla ; foliis radicalibus confertissimis cuneatis 3 - fidis : laciiniis oblongo - lanceolatis obtusis -glandulis raris ciliatis, caulinis paucis trifidis integrisvc, caule paucifloro glanduloso , petalis oblongis calyce duplo longioribus.

Ilab. in locis asperis lapidosis cacuminis alpium terekensis inter fl. Ursul et livoksun jacentium. FL Junio. 1j.

Explic. Icon. CCCLXLVIII. — a) *Flos a vertice m. n.* b) *Calyx a latere adspectus m. a.*

RUMEX STENOPHYLLUS. Tab. CCCLXLIX.

R. valvis aequalibus cordato - reniformibus acutis reticulato - venosis dentatis omnibus graniferis , racemis elongatis , verticillis subconfertis ; superioribus aphyllois, foliis oblongo - lincaribuis elongatis planis integerrimis acutiusculis.

Hab. in humidis deserti soongoro. kirghisici, v. gr. prope Belenki, ad radices montium Ku etc. FL Julio. 2J.

Explic. Icon. CCCLXLIX. — a) *Calyx fructifer m. a.* b) *Idem sectione transversali m. a.*

ARENARIA SUBULATA- Tab. cccc.

A. caulibus suberectis simplicibus, foliis subulatis rigidis pungentibus margine serrulato - scabris, panicula terminali pauciflora, sepalis lanceolatis acutis corolla brevioribus capsulam ovatam subaequantibus.

Hab. in rupestribus granitosis mont. Kent deserti soongoro - kirghisici. Septembri jam deflorata cum fructu maturo. 1\.

Explic. Icon. CCCC. — a) *Fructus cum calye et petalis euarcidis m. a.*



INDEX SPECIERUM
CENTURIAE QUARTAE ALPHABETICUS.

	Tab.	Pag.		Tab.	Pag.
<i>Allium amphibolum</i>	357.	17.	<i>Oxytropis physocarpa</i>	381.	22.
^{>} <i>clathratum</i>	356.	17.	" <i>puinilu</i>	315.	8-
" <i>flavidum</i>	302.	19.	<i>Pachypleurum alpinum</i>	344.	15.
" <i>hymenorizum</i>	359.	18.	<i>Passerina racemosa</i>	374.	21.
" <i>Pallasii (in textu A. lepicluni)</i>	355.	17.	<i>Pedicularis lasiostachys</i>	340.	14.
" <i>Stellerianum</i>	384.	23.	<i>Peplis alternifolia</i>	391.	25.
" <i>subtilissimum</i>	360.	18.	<i>Puccinellia datum</i>	305.	6.
" <i>tenuissimum</i>	358.	18.	" <i>gracile</i>	306.	6.
[~] <i>viridulum</i>	378.	22.	" <i>polyphyllum</i>	309.	6.
[~]	388.	24.	" <i>vaginatum</i>	308.	6.
<i>Anemone altaica</i>	336.	13.	<i>Phaca abbreviata</i>	330.	11.
<i>Arabis fruticulosa</i>	400.	26.	<i>Phelipaea salsa</i>	376.	21.
<i>Arenaria subulata</i>	322.	10.	" <i>lanuginosa</i>	377.	22.
" <i>umbrosa</i>	393.	25.	<i>Phlomis agraria</i>	364.	19.
<i>Asparagus maritiinus</i>	301.	5.	<i>Polygonum hastatum</i>	361.	18.
<i>Asperula paniculata</i>	307.	6.	<i>Potentilla agrimonoides</i>	327.	11.
<i>Astragalus, brevifolius</i>	318.	9.	^y , <i>altaica</i>	329.	11.
[^] <i>davuricus</i>	316.	8.	" <i>approximata</i>	325.	10.
" <i>multicaulis</i>	311.	7.	^h <i>astragalifolia</i>	328.	11.
<i>Aulacospermum anomalum,</i>	312.	7.	^{yy} <i>chrysanthra</i>	338.	13.
^{f1} <i>cuneatum</i>	313.	8.	" <i>cenferta</i>	333.	12.
<i>Cachrys macrocarpa</i>	349.	16.	[^] <i>dasyphylla</i>	331.	12.
<i>Carex enervis</i>	317.	8-	" <i>dealbata</i>	326.	10.
" <i>melanantha</i>	319.	9.	^{yy} <i>desertorum</i>	337.	13.
^{g1} <i>microcephala</i>	324.	10.	^{yy} <i>scricea</i>	334.	12.
" <i>orthostachys</i>	323.	10.	" <i>soongorica</i>	332.	12.
" <i>ovata</i>	351.	16.	^y , <i>viscosa</i>	343.	14.
<i>Cerastium pilosum</i>	367.	20.	<i>Primula longiscapa</i>	348.	16.
<i>Cineraria macrophylla</i>	354.	17.	<i>Pyrethrum incanum</i>	369.	20.
^{g1} <i>robusta</i>	375.	21.	<i>Rosa berberifolia</i>	370.	20.
<i>Cirsium serratuloides</i>	395.	25.	<i>Rumex stenophyllus</i>	399.	26.
<i>Cotyledon leucantha</i>	353.	17.	<i>Saussurea Frolowii</i>	352.	16.
<i>Dontostemon micranthus</i>	302.	5.	<i>Saxifraga flagellaris</i>	321.	9.
<i>Echinospermum brachycntrum</i>	347.	15.	[^] <i>multiflora</i>	335.	12.
<i>Erysimum altaicum (i</i>	387.	24.	" <i>terekensis</i>	398.	26.
<i>Euphorbia blepharophylla</i>	371.	20.	<i>Silene odoratissima</i>	396.	26.
<i>Geranium affine</i>	303.	5.	<i>Sophora alopecuroides</i>	365.	19.
<i>Heracleum barbatum</i>	304.	5.	<i>Statice congesta</i>	314.	8.
^{yf} <i>dissectum</i>	394.	25.	<i>Taphrospermum altaicum</i>	320.	9.
<i>Hesperis sibirica</i>	342.	14.	<i>Thalictrum isopyroides</i>	397.	26.
<i>Iris Tigridia</i>	339.	13-	<i>Trollius caucasicus</i>	345.	15.
<i>Isatis costata</i>	310.	7.	<i>Tussilago lacvigata</i>	341.	14.
<i>Ligusticum discolor</i>	372.	21.	<i>Valeriana capitata</i>	346.	15.
<i>Megacarpaea laciniata florifera</i>	380.	22.	[^] <i>dubia</i>	350.	16.
" <i>y, fructifera</i>	392.	25.	" <i>ofticinalis simplicifolia</i>	363.	19.
<i>Ornithogalum filiforme</i>	379.	22.	<i>Vicia lilacina</i>	366.	19.
^w <i>triflorum</i>	389.	24.	" <i>megalotropis</i>	368.	20.
<i>Orobanche ammophila</i>	385.	23.	<i>Zygophyllum furcatum</i>	373.	21.
^{yz} <i>amoena</i>	#390.	24.	" <i>pterocarpum</i>	382.	23.
^{yf} <i>bicolor</i>	386.	23.	[^] <i>subtrijugum</i>	383.	23.
" <i>sordida</i>					

INDEX SYSTEMATICUS.

Triandria.

Monogynia | *Valeriana capitata* pag. 15. tab. 316: *V. dubia* pag. 16. tab. 350. *V. officinalis simplicifolia* pag. 19. t. 303. *Iris Tigridia* pag. 14. tab. 342.

Tetxandria.

Monogynia', *Asperula paniculata* pag. 5. tab. 301.

Pentandria.

Monogynia: *Echinosperrum brachycntrum* pag. 5. tab. 302. *Primula longiscapa* pag. 16. tab. 348.

Digynia : *Pachypleurum alpinum* pag. 15. tab. 344. *Hercleum barbatum* pag. 5. tab. 303. *H. dissectum* pag. 5. tab. 304. *Peucedanum elatum* pag. 6. tab. 305. *P. gracile* pag. 6. tab. 306. *P. vaginatum* pag. 6. tab. 308. *P. polyplyllum* pag. 6. tab. 309. *Ligusticum discolor* pag. 7. tab. 310. *Cachrys macrocarpa* pag. 8. tab. 313. *Aulacospermum anomalum* pag. 7. tab. 311. *A. cuncturn* pag. 7. tab. 312.

Pentagynia: *Statice congesta* pag. 8. tab. 314.

Hexandria.

Monogynia : *Allium amphibolum* pag. 17. tab. 357. *A. flavidum* pag. 19. tab. 362. *A. hymenorrhizum* pag. 18. tab. 359. *A. clathratum* pag. 17. tab. 356. *A. Pallasi* pag. 17. tab. 355. *A. viridulum* pag. 22. tab. 378. *A. subtilissimum* pag. 18. tab. 360. *A. tenuissimum* pag. 18. tab. 358. *A. Stellerianum* pag. 23. tab. 384. *Ornithogalum triflorum* pag. 22. tab. 379. *O. liliiforme* pag. 25. tab. 392. *Asparagus maritimus* pag. 25. tab. 393. *Pepalis alternifolia* pag. 25. tab. 391.

Trigynia: *Rumex stenophyllus* pag. 26. tab. 399.

Octandria.

Monogynia: *Passerina racemosa* pag. 21. tab. 374.

Trigynia: *Polygonum hastatum* pag. 18. tab. 361.

Decandria.

Monogynia: *Zygophyllum pterocarpum* pag. 23. tab. 382. *Z. subtrijugum* pag. 23. tab. 383. *Z. furcatum* pag. 21. t. 373, *Sophora alopecuroides* pag. 19. tab. 365,

Digynia: *Saxifraga flagellaris* pag. 9. tab. 321. *S. multiflora* pag. 12. tab. 335. *S. terekensis* pag. 26. tab. 398. *Silene odoratissima* pag. 26. tab. 396. *Arenaria subulata* p. 26. tab. 400. *A. umbrosa* pag. 10. tab. 322.

Pentagy?ia: *Cerastium pilosum* pag. 16. tab. 351. *Cotyledon leucantha* pag. 25. tab. 395.

Icosandria.

Deca-Polygynia: *Rosa berberifoia* pag. 20. tab. 370. *Potentilla viscosa* pag. 14. tab. 343. *P. agrimonoides* pag.

11. tab. 327. *P. conferta* pag. 12. tab. 333. *P. approximata* pag. 10. tab. 325. *P. scircea* pag. 12. tab. 334# *P. dasypylla* pag. 12. tab. 331. *P. soongorica* pag. 12. tab. 332. *P. astragalifolia* pag. 11. tab. 328. *P. dealbata* pag. 10. tab. 326. *P. altaica* pag. 11. tab. 329. *P. chrysantha* pag. 13. tab. 33\$. *P. desertorum* p. 13. tab. 337.

Polyandria.

Polygynia: *Trollius caucasicus* pag. 15. tab. 345. *Thalictrum isopyroides* pag. 26. tab. 397. *Anemone altaica* pag. 24. -tab. 388.

Didynamia.

Gymnospermia: *Phlomis agraria* pag. 19. tab. 364.

Angiospermia: *Pedicularis laostachys* pag. 14. tab. 340. *Orobanche ammophila* pag. 24. tab. 389. *O. sordida* p. 23. tab. 386. *O. amoena* pag. 23. tab. 385. *O. bicolor* pag. 24. tab. 390. *Phelipaea lanuginosa* pag. 22. tab. 377. *Ph. salsa* pag. 21. tab. 376.

Tetradynamia.

Pleurorhizeae: *Arabis fruticulosa* pag. 13. tab. 336. *Megacarpaea laciniata florifera* pag. 21. tab. 372. *M. laciniata fructifera* pag. 22. tab. 380.

Notorhizeae: *Hesperis sibirica* pag. 25. tab. 394. *Dontostemon micranthus* pag. 17. tab. 353. *Erysimum altaicum* pag. 15. tab. 347. *Taphrospermum altaicum* pa. 9. tab. 320. *Isatis costata* pag. 13. tab. 339.

Monadelphia.

Decandria: *Geranium affine* pag. 20. tab. 371.

Diadelphia.

Decandria: *Phaca abbreviata* pag. 11. tab. 330. *Oxytropis pliysocarpa* pag. 22. tab. 381. *O. pumila* pag. 8. tab. 315. *Astragalus multicaulis* pag. 8. tab. 316. *A. davuricus* pag. 9. tab. 318. *A. brevifolius* pag. 6. tab. 307. *Vicia megalotropis* pag. 20. tab. 368. *V. lilacina* pa" 19. tab. 366.

Syngenesia.

Cyhareae: *Cirsium serratuloides* pag. 21. tab. 375. *Saussurea Frolowii* pag. 16. tab. 352.

Eupatorinae: *Tussilgo laevigata* pag. 14. tab. 341.

Monoezia.

Androgynia: *Euphorbia blepharophylla* pag. 24. tab. 387.

Diclinia.

Triandria: *Carex microcephala* pag. 9. tab. 319. *C. ovata* pag. 10. tab. 323. *C. enervis* pag. 16. tab. 349. *C. melanjanha* pag. 8. tab. 317. *C. orthostachys* pag. 10. tab. 324.



Asperula paniculata

C. A. Nees von Esenbeck

ex spicula

Taf. 502.



Echinocephalum brachycentrum.



Heracleum sphondylium



Panacium elatum

Fab. 506




Pennylanum gracile.

W. W. Gray and Son, Ltd.


No. 506

sympathetic sympathet.



202 PM.

Taf. 508



Peucedanum vaginatum

W. Burch. ad. nov. sp.


" " " "

Tab 309



"*U. i. Wibusii* polyphyllum

Tab. 510.



Taf. 511.



Salicea /ft cm/mm mm/mm

R. Kugler ad. ex. det.

Tab. 512.



Angelica sylvestris f. *stipa* // *t/i < it* // *f* 'f/f/t' //

H. Körner ex. nov. det.

W. W. Skeels ad.

, 1/11; f;



Cachrys macrocarpa



Statice congesta.


W. Hoffmann del.



Cymfyw/tti ftM mila

St. Schleifer et nov. det.

*Hab. tyWI ***



Astragalus multicaulis.

Taf. 517.



Carex melanantha




• > // () / / / / , * f f f s " " s s / / c c c c .

- M - V r



Carex microcephala



Taphrospermum alticium.



Saxifraga flagellaris.

C. Brunner ad sic del.

H. Kugler sc.

3a/ 532



Arenaria umbrosa



/', // - f.r eta/ft



Carex orthostachys.



Potentilla pifroximata.

Taf. 326.



. jcrtt/tt/lux. <leubata




Potentilla agrimonoides



Potentilla astragalifolia

W. W. Gray. 1851.



Potentilla iridifolia

-\M-

-Taf. 550.



Phaea abbreviata.

W.H. Edwards



Potentilla dasypylla.

W. H. Bishop del.



Potentilla scouleriae.

W. Koenig ad nov. det.

Figur 552.



Potentilla conferta



A-utilla scribbed.

W. W. Gray ex.



Saxifraga multiflora.

W. W. Skeen ex



90

Thlaspi glaucum -

Feb 337



Potentilla desertorum.

irJL A, ..

- 1, 33\$



Potentilla chrysanthia



1. 2. 3. 4. \times 10 ft.

W. Agardh.




Pedicularis lasioclachys.

D. Hoffm. ex. nov. del.

figur. n.



Tussilago lacvigata



Iris Tigridia.

H. Kengen et var. det.

W.H. Bishop ex

Fab 345



Potentilla riversa



Sphaeroleuron alpinum



Trollius altissimus



Valeriana capillata



Erysimum alticium.




Primula longiscapa.



Valeriana dubia.

Fol. 551



Cerastium pilosum

•*r>>



Saussurea Frolowii.

Taf. 555.



Dontostemon s' U ft/// /t/f.




Ageratum robustum.

Taf. 355.



Allium Pallasii.

Taf. 556




Allium clathratum

Taf 337



///tea/ (tmM/rewm

Taf 358



Allium tenuissimum

F. Schaffner ad. sive del.


Aug 1826

, W : > ; •



Allium hymenorhizum

Tub. 300.



|||||ift. >ift|||, \Ui/fftjt

• "for St /




Polygonum hastatum.

C. Nees — J. v. d. H.

Report 11.

Fab 522



Allium flavidum

F. Schleicher und Sohn del.

Augst 20



valeriana off< t »v^m • v&ftt -nt^t p^lia

Taf 364



Phlomis agraria.

Tab 365.



Sophora alopecuroides

Figur 36.

Fab. 300.



Vicia villosa


Taf 367



Cineraria macrophylla

k

Taf. 568



Vicia megalotropis.

Fab 569.

.1; % V



Pyrethrum vulgare


ft h*ytt ... v.v. id.

Siegert, Jr.


Taf 570



Rosa berberifolia.



Geranium affine



M. W. «fe? u lucinata.

Spec. del.

1813 + J. F. Hoff

Tab. 573.



Zygophyllum furcatum.

Tab. 374.



Passerina racemosa.



Cirsium serratumoides.

Taf 37e.




• *Phelipaea subret.*



Phelipanche lanuginosa

W. Wight ex. tab.



Allium viridulum.

Bogart. 20



11

Carex mitogalum triplorum.

N.D. Sprengel

Taf. 380.



Megacarpaea luciniala




Zygophyllum pterocarpum

— Bremekamp —

Aug. 18

Fab. 383.




Zyg. fdrn&m. subtiligum

Adsp. ad nov. sp.

Fig. 383.

Fab 284



Allium Stellatum.

W

La*

W

↳


1 1

1



Orrf'ttt>(t> amm'ro

Taf. 586.



Orobanchace sordida.

Dagobert 20

Tab 587.



Euphorbia blepharophylla


Figur 2.

figur 2.



Anemone altaica

Lippe



Orobanche ammophila.



Orobanche bicolor


Lamprat. 20



Pepis alternifolia

C. Fenzl ad. vnu del.

W. S. Sargent. ex.



Ornithogalum filiforme.

W. Schaffner und Sohn del.

7



Asparagus maritimus.

Taf. 394.



Hesperis sibirica.



Cotyledon leucantha.



r // /f-//C rffii'ff'•//. >•>///«/

Fab 397



Thalictrum isopyroides

Taf 598.



Saxifraga bronchialis

709



Rumex stenophyllus



Arenaria jubulata.

BOOK CARD
Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

sse-es- /X-2&01

K*qfJ&&&tA&JLx (fa)	Date in June	Date of Return
Sri B. K. Dixit (R.S)	25.5.79	3.7.81

INDIAN BOTANIC GARDEN LIBRARY
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

