

Louis Boscia Gorke Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS 202

BOOK NO. BUR-P

ACQ. NO. 6-18.7.71







JOANNES BURMANNUS MEL. Doct.
Botan. Profess. Amstelod. anno aetatis triginta.

Non hanc effigiem BURMANNI sculpto sed ipsum
Arte Prometheus vivere in aere videt
Taliz Paximis meditatur pallens moribus
Veribus aut fastos Chloridio angelus agit
Hic oculis procul genitorque hoc fratre resident
Nil non cyprius pupula gentia habet
Gaudet Amstelodam longus Hypsea perambulat
Hinc tabulari carum componebat

PLANTARUM *rwallith*
AMERICANARUM
FASCICULUS PRIMUS.,

Continens Plantas, quas olim

CAROLUS PLUMIERJUS,

Botanicorum Princeps

Detoxic Er. uitque,

Atque in INSULIS ANTILLIS ipse depinxit

Has primum in lucem edidit,

Concinnis defcriptionibus, & Observationib[us]


iEneisque Tabulis illuflavit

JOANNES BURMANNUS, M. D,

Athenai illujris, & in Horto Medico Amsteladammfi

P R O F E S S O R B O X A N I C E S,

Afadem[ic]i C[on]f[er]e Nature Curioforum Socks.



Sumtibus Auftoris,

Projtant Amfteladami in Hortb Medico,

Apud V I D U A M & F I L I U M S . S C H O U T E N ,
Atque & LUGD. BJTAF.

Apud G E R A R D , P O T V L I E T & THEODOR. HAAK.

M D G C L V . 1755-

NOBILISSIMO ET AMPLISSIMO VIRO,

GEORGIO CLIFFORTIO, I. U. D-

APUD AMSTEL7EDAMENSES

MERCATORI SUMMO,

BOTANICES, AC WTANICORUM

MFCENATI PERITISSIMO & UBERALISSIMO,

HORTI MEDICI AMSTELiEDAMENSis

FRJEFFECTO ET CURATORI DIGNISSIMO,

P R I M U M I I U N C

PLANTARUM AMERICANARUM

F A S C I C U L U M

EA, QUA PAR EST, OBSERVANTIA

D* D. D.

JOANNES BURMANNUS.

P K /£ F A T I O.

Priusquam vero horum votis ac defideriis rite fatisfacere poffim, baud fane leviores, led longe majores & plures fumtuſ, quam quis rerum in*. peritior facile crederet, fuerunt faciendi, unde rationes omnes, quibus hi facilius ferri ac fuppeditari poſlent, diligenter circumfpxi, atque id tandem confiliū cepi, ut plantas halce per Fafciculos, qui finguji Viginti quinque Tabulas continebunt, edere decreverim.

Quern aurem cum maxime manibus verfaris, Amice Leftor, propriis fumtibus inprimendum curavi, ut inde de reliquis tibi conftet, & judicare poffis de opera & labore in plantis his exornandis & inluftrandis a me inſtituto & confumto.

Subfequentes enim Fafciculos ſub infcriptionis condione, quod ajunt, in publicum emittere eft animus, ut illi, quorum de caufla hanc in me ſuſcepi curam, modicam ſubinde pecuniae ifumma fine uila *moleſtk* conſeruent, quo fpplendidum hoc Opi^V^tot tabulis a^neis infigne, ^iHnibos verisque Botanicis utiliflimum, feliriter tandem & nitide, (iimmo Numine adfpirante, abfblvatur: Bibliopolis certe tradere nolui, ne quid detrimenti a lucripet^ hujus nationis avaritia, ac loſdida quorumdam agendi ratione caperet, aut inlicitis artibus ac fraudibus deprimeretut.

Antequam vero conditiones proponam, fob quibus reliquos Paſciculos inprimendos cujabo, aliquid de Operis hujus pra?Hantia, fidplinTimisque iconibus praDmitten^w*n judicavi.

Tomi, quos adfervo, (int̄ duo ingentes, Atlantica fere, ut ajunt, forma, in quorum frontibus hie Jegitur Titius: „ *Icones Plnntantm Americananim*^ quas in *infutis Antillis* propria manu depinxit *Carolus Plu-fnierhis i juſlu* & fiimtibus LUDOVICI x i v, uti in Bibliotheca Regia ha-3, bentur^ digeffit *H. Boerhaavt* in binis voluminibus anno 17,33", ad calçem vero Icripfit idem Vir fide digniflimus; „ Hue usque *Icones Jlir-pfum Americananim*, quas *Carolus Pkmier.* fia manu in fblo nativo de* 55 panxit, Piftor Regius *Aubriet* exempla hax mjhi duxit ad prototypa, 35 quae in Bibliotheca Regi^ Parifiis fervantur; curavit *Vailhmtius*^ mihi asjmifit *Guilielm. gberard*, funt numerp 5085 abfblvi digerere 17^33* 35 *H. Boer have*".

Hoc autem Viri fummi teſlimonium adjiciendum putavi, 4Jt Leftor confertaret, non fioppoftias aut falfas, fed veras & genuinas *Plwnierij* eſlq plantas, quas jam illuſtrarr? Cum adgra{Tnc_m} Qtiqd pertinet ad ipias icones, Figura3 *Plumierii* fundamentales flint, feu qu\$ primas tantum Ion-gitudinis & latitudinis lineas plantarum tradunt, naturali, quantum fieri potuk, obſervata magnitudine, more olim *Carrierario\ Clufio?* & *Fucbfio* uifitato, quae pingendi & fculehdi ratio (aspius longe nitidius & clariss plantas proponit, quam multi faciunt hodie figuris totis infculptis, immo vivis coloribus illuminatis*, quam *Plumierii* methodum meritodolemus a Botanicis hodie negle&arn.

In hoc opere etiam non occurunt Figure, qua2 in prioribus *Pltmiem* editis Operibus reperiuntur, fed longe aliae, ac plera?que novce, id eft, ab alio Auſtore nondum editse, vel Figuris aut delcriptionibus rit^ iHnA trata?.

Cum itaque fatis jam, ut puto, Leftoribus conftet degenuini's verisque Auſtoris iconibus, dolendum certe, vel potius indignandum eſl; Panfinos Botanicos fiimmi hujys Viri Operam adeo neglexifib, ut nullas

Iane Plant&rum harum rariorū ac maxime defideratarum icones edidērint port annum 17*3, qua? ultima eft Stirpium Americanarum &c w. Sumtus forte dicent inmenfos hoc prohibuifle: At in Republica luce caufTa melius, quac majores inpenfas haud facile fuftinet, jufta eſt cennlēnda, fed in Regno florentifimo haec facile perficiuntur ac fubminiP trantur, potiflimum juſlii ipfius Regis; more fcilicet Majorum fuorum, ad ſrternam gloriam, & totius gentis fpplendorem decusque: Hoc certe>₀ ſimul ut Eruditorum Summorumque ingeniorum animis ftimulos adderet* alter LuDOVicus, fi quid video, diii curare potuiflet. Sperandum itaque, ut in pofterum reliquas plantar, quas me multo copiofioreſ poffident, fe- cundum hoc meum inftitutum cum omnibus Auftoris ipfius reliquis com- mentariis edere non dedignentur cordati Viri, nee celent gazas, quas Botanici oīnnes \$ horumque Principe^ avide dudum defiderant, quibus- *qae ntaninfigni artis detimento carcre!, amplius nequeunt.

Ut redeam nunç ad ipfam inferipuonis conditionem, illam commeri- dabilem admodum ftatuendam putamus. Pjo quovis itaque *Fafciculo*> qui, ut ltipra monui, viginti-⁸ünque continebit Plantarum Tabulas, quam exable fieri poſlit infculptas, tres tantum folventur florēni, quum ftafim, perafta ꝑinfcriptione, primus •, qui jam paratus eft, promulgabitur Fafciculus, atque intra trium menfium fpatum, vel citius, fi fieri goffit, fecundus erit in promtu, cujus Elpnchus in fine .Prioris confpicitur, ut Leftores inde cognolcere ac dijudicare pōiiint, quas, & quarri prasft^ntes plantas fubiēquens contineat; eoque abfoluto, idem denuo fblvetur pretiūm; ac porro per reliquos Fafciculos eodem modo progrediar, Summo Numine mihi vitam largiente ac valetudinem^ dum meritifiimur, hoc Opus ad finem fu'erit ablblutum.

Non poſlum tamen non, quin illorum cauflā, qui <nomina fua dare detraccl:averint, adjiciam, fingulos Fafciculos, inferipuonis tempore, trium nempe menfium elapfb, non minori, quam quatuor ftorenorum pretioj redimi poſlē.

Vos itaque 5 Viri praeftantiflimi, qui ex aequo de his, rebus judicare no- viftis, frequentes, quaefb, & promti fubferibite, meisque conatibus fa- vete, eun^que adjuvatote, qui veftra de cauflā hunc in fē laborem & in* penfas alaci aaimo fufcepit:

Ego certe'datam fiHein, pnimifiāsqnp ronditiones fan6te fervabo, &, fi per fata licuerit, quod fp̄ero > prſeftabo, praefertim fi tanto inferiben- tium numero mihi fucurratur, ut inmenfos, qui requiruntur fumtus, fiiftinere queam. Valete, rebusque veftris, & ſimul rei lierbariae commo- dis confilite.

*Dabam
Amftelaftami
xx Ottobris
AL DCC. LV.¹*

PLANTARUM AMERICANARUM FASCICULUS PRIMUS.

T A B U L A P R I M A.

A *Bunion Americanum*, fruticofūm, folio fbbrotundo, flores, ^{fructuosa} fru&u aculeato majore *Plum*Catalpl.Americ.p> 2. TAnjt.p**)*)**

HIBIS CUS Foliis cordattis, crenatis, indivifis, Capfulis fpinofis.

Quod fit species Hibifci feu Ketmias, patet ex calice exteriore polyphylloj corolla, & ftaminibus. Peculiare autem huic eīl, quod *Fruflus*, feu capful® conftent ex fpinis extra calicem prominentibus, quas in quovis JoruJtmentn rnpfices rūnt_a /implices, acuminatae, uti in*Figuris adje^tis confpicitur.

Folia fūnt cordata, crenata, venofā.

PedumtdiJ6\&x, uniflori, ex foliorum alis₃ petiolis longiores₃ flipulis plurimum gluplicibus*

Flor. luteus.

T A B U L A S E C U N D A-

A *Biitlon veficarium*, flore luteo, majus. *Plum. Hifibr. MJl Tom, iv, pag.. 14.*

SI DA foliis cordato-acuminatis, pedunculis petiolo longioribus, capfuīis pendulis obtufis.

Folia cordata, acuminate ferrata, alternata.

Flores corymbofi, per caulem alternatim fparfi, in caulis inferiore parte ^ ex alis foliorum, in pedunculis longioribus.

Frudlus, feu capfalse obtufe fūnt, ftriis plurimis parallelis diftincc^, pendul^e ex alis foliorum.

Obfervatic Hsec proxime convenit cum ilia planta, qua? a *t)illetio* \& *Horto Eltbam.pag. 7. Tab. 6. Fig. 6.* vocatur Abutilon veficarium, flare & fruclu majore non cnipo, fed ipfius folia inferiora rnagis lobat* fūnt, nee flores ita fticati.

Later alium quinque paria, propria majora tria paria, minora bina tSnturn, obverfe-ovata, integerrima, trinervia>

Pedimculi plires ex alis simplices, ubi j^etiolus communis foliola prodit bipinnata, partialibus trijugjs, propriis bijugis.

Flores tapitati., feu fphserici, simplici pedunculo infidentes.

Legumcn obtufum , fntura aculeis armata.

Ojjicula oblonga, uti in separatis adparet figuris.



T A B U L A N O N A .

A *Cacia non fpinofa, Juglandis folio, flore purpuralcente, Piunner.*
Cat. ph Amer. pag. 17. Tournef. pag. 605.

MIMOSA inermis, foliis conjugatis, pinnis terminalibus geminis, lateralibus alternis, ovato-acutis.

Foliola in hac ipecie ing^ntin , m pefinln romnni biparuto pinna; decem, quai-um duse pares fingulum ramum peyoli terminant, una ad htus interius, binse ad latus exterijs in fingulo rami petjolo, adeoque fmingularis in Mimofarum familia decurfus & ftruftura folii.

Ffflia fitppJicia, ovato-acuminata, integerrima, glabra.*

Flores ex'caule subfeffiles, fphaerici, ingentes.

Stmyina numerofiffima.

Piftillum eminens, duplo fere longius, fimplex, capitatum.



T A B U L A D E C I M A , ,

A *Cacia frutefcens, non aculeata, flore purpurafcente. Plum. CaUpcl Amer. p. 17. Tonrn. pag. 60jf.*

MIMOSA foliis conjugatis, pinnatis, foliolis intimis minoribus, caule inermi. *Linn.Jpec. pi p. 517* No. 9.*

F T O U R A P R I M A.

Petioli bifidi, petiolo fingulo partiali duobus foliolis termin^o, & unico ad bafin extrorfum verifp.

Foliola obverfe-ovata, Integra, subfeffilia.

Flores capitati, plurimi pedunculp communi infidentes, ftaminofi.

Siliq[ue]n[ta] glabra , fblitari® a reto, dependentes.

Ob-

6 PLANTARUM AMERICANARUM

Obfervalio. Diftinffftfima eft haec pfanta a reliquis, folijs conjugatis, feuL duobus jun&is ad bafin, & fpinlrum abfentia, qua noti nulla gaudet Mimofa.

FIGURA

S

ECU

NBA.

A *Cacia frutefcens*, non aculeata, flore purpurafr3nte, alia: *Plum. Htji. MS*

MIMOSA foliis tergeminis. *Linn.Jpec.pLp.* 5.17. IV& 7.

fctififi bifidi: in fingulo petiolo proprio tria paria foliolorum, ad divaricationem vero petioli communis quatuor paria, quurn bina infiiper fo* liola obpofita. faepius ^xcrefcunt, unde quatuor formantur paria.

Foliola funt fubovata, integra, intima minima.

JYflm'capitati, ingentes.

Stmaina numerofiffima, longiffima.

"*Siliqua* clunaculi figura.

Caulis a d cor dito ovata, ruminata, utj i a Figura feparata.



T A B U L A U N D E C I M A .

A *Cacia latifolia*, alopecuroides, iBore albo. *Phmier.Cat. pi Amen p. 17. Tournef. pag. 605.*

MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, partialibus qainque jugis, propriis multijugis, floribus fpicatis, caule muricato.

Caulis pun6tis elevatis exasperatus, unde faber, & tuberculofiiis eft, quod huic plants feculiare.

Folia duplicato-pinnata, foliorum lateralium* paribus quinque.

Foliorum feu pinnarura fuit nunc tredecim nunc quindecim.

/b/i^ovato-oblonga, emarginata, venosa, fubfeffilia.

fidepietolum glandula locatur, humorem meHeum forte fecernens.

Florcs pufilli fuit, plurimi in longam fpicam pcrrefti.

Siliaua copiofe, longe» finuofe, re&ae^ acuminate

OijfcijJa .fubrotunda, glabra, umbilicata, uti in Figuris marginalibus.



T A B U L A D W O D E C I M A .

A *Cacia* alia fcandens, lpicata multiplici, filiquis lads; *Plum. Cat. pL Amer. 17.*

MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, partialibus quatuor jugis, propriis incertis, floribik^fpicatis,
Mimofn inermis, foliis bipinnatis, partialibus prpprlsque fexjugis, ohlongis. *Linn.spec.pLp. 520. No. 22.*

Caulis inermis.

Folia duplcato-pinnata, lateraliurr quatuor. paria, propria incerta, fed fex plerumque ovato-oblonga, integra, vohofi.

Jfkhs lpicati₃ numerofiflimi in quavis fpica.

Siliqua lata, longa, emarginata, obtufa.

Faba oblongcc, finuofe.

Objirvatio. Hae bin^e pofleriores ipecies pertinent ad iftam phalangem Mimofarum, quB3 flores gerunt in fpicam longam porre(5los, nee in capitillum. *Ex-* Cainftitifflcattone. ant<<m (llarifT *lAnnai* hujus alia Ipecies eft, in qua regulariter foliorum petioli communes continent foliola narratiaRter utrinque fex, & infingulo partiali pinnas itidem utrinque fex, unde ipfi digla fuit *Mimofa* foliis partialibus propriisque fexjugis.

Ctrverp a *Phtmierio* vocetur fcandens * non patet, quum caulis* n^c volubilis, nee cirhi font, uti in *Entada* //, *Malab. torn.* 9. *Tab** 77. qu# z*JPlumierio* vocatur *Acacia* fcandens fpicata, filiquis ampliflimis j & a *LinnaaJpcc.pLp. 51S.NO, 18.* *Mimofa* inermis, foliis bipinnatis, cirrho terxniqatis.

TABULA DECIMA TERTIA.

A *Cer* fcartflpns *Convolvuli* folio, flore ex aureo coccineo. *Plum, Cat. pi Amer. p. 18. Tonrnf.p. 615.*

BANISTERIA foliis ovatis, ramis brachiatis, femirtibus extrorfumi tenuioribus. *Lihn.jpet. pag. 427. No. 6.*

Banifteria foliis ovatis, ramis ramofis, feminibus extrorfum tenuioribus, interioribus lacinulam emitentibus. *flort. Cuff. pag. 169,* ubi defcriptio.

Acer fcandens minor, Apocyni facie, folio fubrotundo *Sloan* ffift* Jam. part. 2. p. 27. Tab. 162. Fig. 2.* cuius folia rotunda nee acuminate.

Triopteris Americana, fcandens, fru&u fulgente majore, aureo. *Plukn. MantifL p. 18^*

8 PLANTARUM AMERICANARUM

Folia cordata, ovatoacuminata, integrerrima.

Caulis volubilis.


Florum petala crenata.

Nettaria duo ad bafin petalorum.

Flores ad alas congefti.

Semina tria pendula ex propriis pedunculis, quorum alae tenuiores extror-
urn verfe fiint, uti in *Figurafeparata**

Obfervatio. Hujus & alia obcurrit species, quae *Acer J^andens*, folio an-
gulofb a *Plum*, in *Catal pi Amer.p.* 18. vocatur, atque *Clematis angu-*
lofb folio, *Aceris fruclu* in *Defcript. PL Amerc> pag.* 77. vocatur, &
'Tabula 92. exhibetur, quae vera quoque *Banifteria* species eft, & *Ba-*
nifteria. foliis finuato-angulofis a *Linnao infpec.pL p.* 427. No. 2. vo-
catur.



TABULA DECIMA QUARTA.

A Grfcand^ns, foliis Citri, flore ca?ruleo ipicafn. P/, G?A pi A~
merit, p. 18. 7 ourñef. p. 015.

BANISTERIA foliis ovato-oblongis, acuminatis, racemis JateraJi-
bus, (eminibus patefitibus. *Linn, fpec.pl p.* 427. i&. 4%& i^l. *Zeylyp*_m
78.^/. 176. ubi defcriptio.

[^]f^r Icardens foliis Laurinis. *Sloan* Hifi. Jam. torn.* 2.p. 26.


uc^r Bengalensis, Laurinis foliis, fru6lu tergemino totidem mentbfa-
nis exftantibus alato. *Plukn. Altnag.p.* 7. *Pbyt. Tab.* 3. *Fig.* 1.

Folia ovata, pctiolata, -v-tio7a, iutcgira, obpofita,

Pedunculi ex alis, fpicis obpofitis confantes,

Flores fpiccti, quorum petala crenata.

Semina subfeffilia, quorum al» divaricate introrfum tenuiores.



TABULA DECIMA QUINTA.

A Cer fcandens, Pfeudo-acaciae folio, flore purpurafcente. *Plum. Cat.*
*jt pi Americ, p. 18- Tonrhef** p. 615.

BANISTERIA foliis pinnatis, foliolis ovatis, quatuor jugis, fpicis
lateralibus, fémibus pedunculatis.

Banifleria foliis ovatis, fpicis lateralibus, fémibus ereftis. *Linn.Jpec.pl*
pag. 427. No. 3.

Folia ovata, ad petiolos bina obpofiti, in pinnis quatuor paria, venofa,
integra. * >

Flores minus fpicati quam in praecedente, pedunculis lateralibus infi-
dentes.

Semina magis crenata, pedunculata, bina obpofita, introrfum tenuiora.



TABULA DECIMA SEXTA.

A Cer fcandens, tricoccos, foliis Citric flore luteo minore, *Plum.*
Hifi. Mff T. 11. pag. 107.

B'ANISTERIA foliis ovatis obpofitis, floribus terminaticibus co-
rymbofis.

Banijteria foliis ovatis, ramis dichotomis ? *Linn. Jpec. pag. 427. No. 5.*
vide & *H. Cliff. pag. 169. No. 3.* ubi & nominis derivatio explicatur.

Folio lata, ovata, acuminata, iuic^ra, obpofua, vix petiolata.

Flores in racemos corymbofbs colle6ti, qui in tres plerumque pedunculos
proprios fub-divisi sunt, ad quorum divaricationem, uti & per tojum
•Vorymbum^foliola fparfa flint oblongo-acuta, obpofita, ac feffilia.

Florum petala vix crenata sunt.

Fruodus fex alas'furfum majores lanceolatas, ac totidem minores fimplic-
ces deorfum mittit^, hinc de *Triopteri* multum participat.



TABULA DECIMA SEFTJMA,

A Geratum folio & facie Rapunculi. *Plum. Cap. pi Am. p. 19. &*
> *Tournef. p. 6\$2.*

PHLOX foliis radicalibus ovato-lanceolatis> caulinis lanceolatis, ob-
pofitis

Folia radicalia ovato-lanceolom > ad radicem feffilia, undique earn cin-
gentia, caulina vero angulta sunt, lanceolata, integerrima ? feffilia,
obpofita* .

Caulis erefli, fimplices, indivifi.

Racemus florum terminatrix fimplex.

Flores obpofiti, feffiles, hypocrateriformes, limbo quinquefido, emar-
ginato conftantes.


Frnftus efl. czpufuo oblonga, obtufa, trivalvis, femina minutiffim^conti-
«ens, uti in Figuris adjects adparet.

Radix fimplex, descendens, in pauca? laterales fibrillas diftincta,
Caulis quarq maxime hirfutus, procumiens.

Folia ovato-acuminata, ad utrumque caulis latus ternata, quorum medium maximum obverfe-ovatum, cun6ta feffilia, ad genicula pofita, veno- &, integra, fiicculenta, punftata.

[%]*Florum* capitula ad alas feffilia, pufilla, coadunata.

*Qbfervatio** Va^etas eft *Amarantoidis* marina? repentis Polygoni foliis, *Plum*, cujus fofovata, in petiolas folio Iongioresdeflnunt, uti monet *Cl. Royenus I. c.* ne^ caules adeo hirfuti funt.



TABULA VIGESIMA SECUNDA.

A

x\i\^"i</mfru6luparvo, folio tricufpidato. *Phm.Cat. pi Amer.p.* 3.

CUCUMIS foliis cordatis₃ tripartitis, dentatis, fruftu folitario fcabro.


Folia lata, cordata, triloba; acuminata, dentata, pctiolata.

Cirrbus fimplex₃ foliorum alis obpofitus.

Flcres plures in communi longoque pedunpulo.

*Fridus^fcdbber**, turbinatus, pedunculatus, ex foliorum alis exrefcens, in quatuor^ellul^s diftinclus, ut in *Figura marginali confpicitur/*

Obfervatio. Hujus & altera. obcurrit ipecies in colleflio_e *Plmnicrii^* quae Anguria triphylllos, parvo fruftu in *Catal pi. Amcr. p.* 3. vocatur, & tltfcuwro triphyllus, fruftu variegato dicitur in *Defcript.pl. Amcr. p** 85. *Tab*, 99. quae folia^f itcgcriiina, Cc augu(liorc₉ ae fruftibus pluribus simul cbllectis differt.



TABULA VIGESIMA TERTIA.

A

Anguria polyphyllos-; parvo fruftu. *Plum. Cat.pl. Amer.p.* 3.

CUCUMIS foliis; pedasis, integerrimis, fru6lu longifllmo, furcato.

Folia digitata fiint, ex feptem foliolis lanceolatis, integerrimis compofita, quorum lateralia fenfim minora fiint, cunfta venofa.

Grrbus fimplex ad petiolorum ortum.

Pedmculi long'Rvn, multiflori, fex flores utcunque producentes, quorum petala eleganter ftriata funt.

Frudus longiffimus eft, fcaber, ad extremum in clavos bifurcates dif tis, qualis in iconе exhibetur.

Jtoliola quina paria, lanceolata, int̄ gerrima, venofa, fessilia, infima minima, fenfim majora, suprcm^ nv\xima, ad articulos obpofita.

Flores racerhofi funt, quam maxime flaminofi, tubo infundibilifomi, qui ulterius a *Plumierio* in nov. pi. pag. 13. describuntur 8c Tab. 19. separatim exhibentur.

Lcgumen feujtliqua mollis eft, carnofa, ftriata, emarginata futurk aculeata, obtuia, quae transverfim fe6la

OJJicula prodit irreg^Jaria & anohiala, utiin. %uris marginalibus liquet, & ulterius in *Plumi^ii* Tabula examinari poflunt.

Obfervatio. Licet a *Plumierio* fingulare genus ex hac planta conftitutum fit, ex omnibus tamen fructificationis partibus patct, ad *Acacias* feu *Mimofis* re vera pertinere, unde & jure merito a Cl. *Linnao* in //, *Cliff*, inter eas recenletur, atque ut melsus cum *Mimofis* fupra propofitis, con Ferri poftet, antequam huic facfciculo finem inponerem, earn hie re^ cencere volui, licet in ordine Iconum *Plumierianarum* multo inferior locata effet.

Notatum autem volo, me chara&eres ipfbs fru6iificationis, fngiilasque ipfius partes in hoc opere non explicaturum, quum abunde fatis & dif rinciffime apyd Syfthematicos, *Phwyerurn* puta in novis *fnh* generibus, *Tourne/ort. in injliu* rei Herbaria?, & inprimis apud Cl. *Linnaum* in generibus olantarum inveniant-ur. Breves enlm efle (tudemus).



TABULA VIGESIMA QUINTA.

A *Butilon* aliud veficarium, flore luteo minus. *Plum. Hi/lor. Affl T. iv. p. 15.*

SI DA foliis cordato-aruminatis. ferrulatis_n capfulis veficariis obtufis. *Sida* foliis cordatis, fubrotundis, crenatis, tomentoiis, pericarpiis infla

tis, multiloculari*Hi3*, crenatis, repandis. *Linn. Jpcc.pl.p. 68f. No. 8.*

ylkailon veficarium crifpum, floribus melinis parvis. *Dtlle. H. EUham. p*& Tab. 5.*

•*Abittilon* Americanum fru&u fubrotundo, pendulo, e capfulis veficariis crisis conflato. *Martin. Dec. 1.pag.& Tab. 29. & Tab. 33.* altera ejus fp.ecies, foliis feffilibus &c.

Caulis alternatim inflexuf? contra ramos.

Folia cordata, ferrata, acuminata, petiolata.

Pedunculi ex alis iblitarii, indivifi, unicum producentes flofculum.

[^]n/flf^obtufus^nfatus, ftriatus, uti videtur, pentagonus, ex alis pendulus, femina utrimque terna in quovis nempe loculo producens, reniformia, uti in separatis confpicitur iconibus.

Obfervatio. Noftra pjanta rar>oča magis eft, nee pufilia ifta folia ex majoribus orta profert, uti refte monet Cl. *Diffenius* in *Horto Eltham.*

Pag- 7. ac *Martinii* planta lorjgiore gerit foliorum petiolos, qu\$ nee

ita ērrata funt , caeterum fatis (onveniunt, quas differentias accidentales automo, diverfo forte fqt) & caelo adscribendas ; vel figuris non exafte obfervatis.

Icon autem plantae noſtræ ligno incifa eft, quam pro ſpecimine ab artifice quodam olim infculpendam mihi curaveram , quumque in manus forte jam inciderat, malui earn hie Le&orum oculis submittere, quam tec tam omittere.

Finis Fafcicuti Printi.

E L E N C H U S
FLANTARUM AMERICANARUM.
F A S C I C U L I S E C U N D I .

- A** *Pocynum* foliis Amygdali longioribus. *Plum. Cat. pi. Amer. p. 3. Tourn. inf.*
p. 92.
fcandens, folio Amygdali, fliquis Emeri. *Plum.*
foliis Lauri, flore albo umbellato.
filiquarum extrema parte vefribus hſerente*
foliis Citri, fliquis maailatis:
arnpMImo flore luteo.
Arflia humilis, Ipinoſſima, folio Marv&iibrotuido.
Arijlollochia fcandens, foliis oblongis, radice repente.
Arifari folio umbilicato, flore longiltmo.
flore e viridi flavefcente, radice repente.
folio cordiformi, flore longiflimOj atropurpureo:
Arum amplis foliis, eſculentum.
ampliſſimo folio rubro.
fcandens, maximum, flore flavefcente.
* acinis amethyftinis, flore parvo.
amplis foliis acuminatis, & pergamaceis.
After Primulse veris folio, flore fingulari purpu<o;
« - _ _ fioſculis teniUſlimis.
acauks, Hieracii villoſis foliis.
frutefcens, Stſechados citrinſe folio, flore umbellato <illco.
Barb&yows lutea, foliis foraminulatis.
Barteria pyramidata, flore Cceruleo.
fblani folio, flore coccineo.
aculeata, Solani folio anguſtiole, flore caeruleo.
Baubinia aculeata, folio rotundo3 emarginato.
non aculeata, folio ampliori & bicorni.
Begonia purpurea maxima folio aurito.
rofeo flore, folio aurito, minor & glabra.
foliis acutioribus auritis & late crehatis.
folio orbiculari.
Belladona frutefcens, flore albo; Nicotians foliis.
Bellonia frutefcens, folio Meliflk afpero.
Bermudiana Palmae folio, radice bulboſit.
Besleria MelifTae Tragi folio.
Virg^e aureae foliis, flore luteo minor &c major.
*vmm, fcandens, criftata, frudu nigro.

TABLE I.




HIBISCUS folia cordatis, crenatis.




SIDA foliis cordato-acuminatis.




SIDA foliis subrotundo-cordatis.




MIMOSA fpiim in eaulq f»«miiu», fidji» liijpnmais.




MIMOSA spines ad alas geminis, foliis bipinnatis.



M1. Uus\ . . . tuti*, »!«« l(jjiiuinli>, j<irijnliLit* quinque jugis.



M 1 MOSAwuWtn.falii* inpinitM* .partinltlm* iuiruiui- jugatis .



MIMOSA aculeata, foliis bipinnatis, propriis trijugis.




ttOCOfA uu*rnuB,folii * conjugatis .




HIMOSA *Salis* conjugatis, pinnatis.

MIMOSA *foliis tergeminis.*



MIMOSA inermis, foliis bipinnatis, partialibus quinque jugis.





HANTSTHR*i\lulu** <ivMti;, t^onu.« brachiatis.




BANISTERIA i'oliia «vnto-obl(>)tjiris . acuminatis



BANISTERIA illinata*. fuif.li- % Hi*, ijuatuor jugis-



BANISTERIA foliis ovatis obpositis.



PHLOX

Joins radicalitus ovatu-lane euln tis

TAB. XVIII.









GOMPHRENA caule repente, capitulis
rotundis, lobilibus . .

Fig. 1.

SINE foliis radicalibus lobilibus


TAJI \XIII .



f' I < / HIS BO M p «Utij .



MIMOSA foliis pinnatis, quinque pagis, petiolo articulato



Sida foliis cordat. acuminatis serratis

PLANTARUM
AM^RICANARUM,
FASCICULUS SECUNDUS,

Continens Plantas, quas olim

CAROLUS PLUMIERIUS,

Botanicorum Princeps

Detexit, Eruitque,

Atque **in** INSULIS ANTILLIS ipfe depinxit.

Has primum *in lucem edidit,*

Concimis descriptionibus, & Obfervationibus,


iEneisque Tabulis illuftravit

JOANNES BURMANNUS, M. D.

Athenai illuftris > 6? in Horto Medico Amfteladamenfi

P R O C E S S O R B O T A N I C E S ,

Academia Cafarea Natura Curioforum Socius.



Sumtibus Auftoris,
Proftant Amfledadami in Horto Medico?

Atque

Apud V ID U A M & F I L I U M S . S C H O U T E N ,
& LUGD. BATAF.

Apud GERARD. POTVLIET, & THEODOR. HAAI
M. DCC.LV I.

NOBILISSIMO ac CLARISSIMO VIRO,

CAROLO UNS-MO, M. D.

•S-M R.GLE M:TIS SUECLE ARCHIATRO,

PROFESSOR! UPSALLE DOCTISSIMO,

EQU171 AUR. DE STELLA POLARL,

N E C N O N

ACADEM. IMPER. MoNSPEL. BEROL.

TOLOS. UPSAL. STOCKH. SOCIO.

S E C U N D U M H U N C

PLANTARUM AMERICANARUM

F A S C I C U L U M.

IN MUTU^A ~~ARTICLE~~ FIGNUS

D I C A T

JOANNES BURMANNUS.

PLANTARUM AMERICANARUM FASCICULUS SECUNDUS.

TABULA VIGESIMA SEXTA.

A *PoQinum* frandens, filiquarum extrema parte veftibus hasrente* *Plum.*
Cat. PL.Amer.pi 2. *Tonrn. Inft.p.* 92.

NÉRIUM caule volubili *fuberofo*, *foliis* ovaris, fubtus hirfutis, fbUiculis bafi apiceque hifpidis.

Planta eft caulirepens, fiberofa, cujus Radices laxoe & vagae per terram fofe di^ndunt.

*Folia cordato-ovaf&, acuminata, fubtus pilofa, petiolata, bina fibi obpofita.
5^^4rifea: Vinc\$, bini fibi obpofiti, pedunculis brevioribus, per cau-
**~hm hifpidum fparfi.*

Siliqua geminse fimul utrimque dependent, fubulato-lineares, apice & ad
5 bafiri'hiipidse, quali^ & pedunculus communis, unde & veftibus iiepius
adhaerent.



TABULA VIGESIMA SEPTIMA.

A *Ppsynum* icandens, folio Amygdali, filiquis Emeri. *Plum. Cat.pl*
Amw< p> 2. Tourn. infi. p. 92.

NERIUM caule volubili, foliis lanceolatis, folliculis filiformfc, tor-
tuofis, longiflimis, pendulis.

FIG U RA P R I M j‡.

Caulis varie inflexus, filiformis, volubiJis.

Folia lanceolata, Integra, vix petiolata, obpofita.

Flares inftar Vincae, ex foliorum alis pedunculo longo communi, dein tri-
partito inftant, uteunque terni.

to PLANTARUM AMERICANARUM

Siliqua filiformes, geminatae, tortuofse, longiffimae, dependentes.
Semina pappofa, uti in Figura marginali adparet.

Apoeynum fcandens, foliis Lauri, flore albo, umbellato. *Plum. Cat. pi Amer. p. 3. Tourn. injl. p. 92.*

CYNANCHUM foliis ovatis, integerrimis, florum pedunculo ex alis
)cr-giffimo,

FIGURA S E C U N D A.

Folia ovato-oblonga, vix petiolata, integerrima, bina obpofita.

Pedunculus communis, longiflimus, ex loliorum alis, umbeliatim flores
filUnens.

Caulis volubilis, uti plcrumque in nujus generis fpecies hue ufque notis.



TABULA VIGESIMA OCTAVA.

A poeynum icandens , foliis Citri, fliquis maculatis. *Plum. Cat. pL Amer. p. 2. lournef. injl. p. 92.*

NERIUM caule volubili fcabro, foliisovato-cordatis* ~~siliquis~~ maculatis, ventricofis.

Caulis vario modo inflexus, feu volubilis, ad petiolos articulatus, tuberculis exasperatus.

Fo/wcordato-ovatafunt, acuminata, integra, petiolata, bina obpofita,
Flores defunt.

Siliqua. ventricofe, acuminatae, maculatse, plerumque binse , rarius ternae, in quibus

Semina loeantur papofa, adunum latus excavata, qualia in icotie conficiuntur a (eparata.

Qkfervatia. Flures hujus Neiii ipecies habet *Plumierius* inter fias icones depidas, E. gr. *Apoeynum* fcandens Nerii ftare albo, quod vero *Jab. 06. Plantar. Americ. Defc.* invenitur, dein inter meás quoque invfutur *Apoeynum* fcandeoj ampio aore villofo kt^{aa}, filiquis anguf: tiffir.'s, quum vero quam maxime adfinea fiat, & h pturimisconvennnr' cum Nenis in *Tbefauro meoZeylanico* defcriptis & delineatis, hinc eas hie deialher^ deHoe^e fpecies superfkum puto, praterquani quod ui lab. 90*. *Defc. pi Amer.* in eo a noftra modo differat planta, quod flores ex alis gent. folitanbs, quum m̄rs ia Venice pierumuae
S^ etnos in communis de m̄rs ^ in Tkfmr. Ztyl Tab .78.

M PLANTARUM AMERICANARUM

quoad foliorum formam & ortum, quam ipfb caule differt, qiii in noftra planta penitus nodoflis eft, in ilia *Dilknii* glaberrimus, uti Figurarum comparatio exāminantem liquido docebit, unde & *Plumierii* plantam juxta cjs iconem hifce fubjcere curavi, quam illi *Dilknii* praefero, quum noftra in patrio fblo excreverit, ilia *Dilknii* in fīcīlf & Hybernaculis, quum plantae fzepius faciem fiam penitus mutant, uti id patet in Figura *Dilknii*, ubi florū pedunculi praeter naturam longiffimi òclineati funt, qui in patrio fblo longe breviores funt, foliaque noftrae plantae alio penitus modo excrefcunt, ita ut tota facies noftrae plantae quam maxime variet ab ilia *Horti Elthamenfis*.

TABULA TRIGESIMA PRIMA.

A *Ralia humilis*, fpinofiflma) folio Malvae fubrCiundn. *Plum*, Cat. pL Amer.p. 7.

ARALIA /pinulo/ā, folio cordato, finuofb, & crenato, pedunculis dichotomis.

Radix fimplex, divaricata, trichotoma.

Gaules, rami, petioli, & pedunculi fetis fpinofis undique obcliviti.

Folia cordata, obtufa, finuata, crenata, laevia, petiohta.

Pedunculi dichotomi, fubdivifi, finguli folitarios fuftinentes fl̄.

Obfervatio, Vix videtur *Aralia* eile ipecies, cum Hores in umbifullis non fint difpofiti, quorum examen in planta viva certum definire dcin poterit genus.



TABULA TRIGESIMA SECUNDA.

A *Ri/tolocbiafcmdens*, foliis oblongis, radice repente. *Plum*, Cat. tl Amer.p. 5. *Tourn*. infi.p. 163.

ARISTOLOCHIA fliis ovato-oblongis, obtufis.trinerviis, caule volubi':, pedunculis folitanis, petiolo longioribus.

FIGURE P R J M A.

Radice crassa, *divaricata*, trichotoma, fibrillofa.
Caulis volubilis, iimplex, indivifus, inervis.

Folia ovato-oblonga, trinervia, integerrima, obtufa, petiolata, alternata
Peduncuh ex ahs fimplices, petiolo triplo lonmores, f. pl. S. sp. S. siogen-
tem fuftinentes fl̄m', Ljus basi duobSTbis S. struſta est, quod
pecuhare eft in hujus floris corolla.

Fruflus

?4 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA TRIGESIMA. QUARTA.

A *Ri/lolocbia*; folio cordiformi, flore longiffimo, atropurpureo, ramo dice repente. *Plum. Cat. pi. Amer. p. 5. Tonrn. infi.p. 163.*

A R I S T O L O C H I A foliis cordato-oblongis, planis, caulis infirmis, flexuofis, teretibus, floribus folitariis. *Linn. fpec. pl. p. 961. no. 9.*
Aristolochia caulis infirmis, angulofis, flexuofis, foliis cordato-oblongis > planis, floribus recurvis folitariis. *Gronov. Fl. Virgin. pag. 112.*

Caulis debilis, decumbens, divaricatus, uti in Figura marginata;

Kami flexuofis, infirmi, inerves.

Fl profunde cordata, acuminata, obtusiflora, integerrima, venosa,
petiolata>

Flores longiffimi, ex foliorum alis erexit, pedunculis longioribus.

Siliqua subrotunda, flriata, fex capillaris, uti in Figura separata.

Semina difformia, seu irregularia, plana.

Observatio. Hujus & alia obcurrit species apud *Plumier. pag. f. qua?*
Aristolochia folio hederaceo, trifido, maximo flore, radice repente vocatur, & a *Linnaeo* *fpec. pi. p. 960. no* 2. Aristolochia* foliis trilobis.
Itaque Ambuyaembo *Marcgr. hiji. Brajil. p. 1\$.* ubi icon, quae non videtur varietas, ac *Scrpentaria* vulgo vocatur, sed ab illa. Oficina rum differt foliis cordato ovatis, caule brevi &c.

TABULA TRIGESIMA QUINTA.

A *Rum* auiplis foliis erulentum. *Plum. Cat. pi. Amer. p. 4.*

A R U M acaule, foliis fagittatis, triangulis, angulis exterratum flexis, acutis. *Roy. pr. FL Leid. p. 8. no. 9.*

Arum acaule, foliis fagittatis, triangulis, acutis, angulis exterratum flexis acutis. *Linn. H. Cliff. p. 435. 720. 3.*

Arum accule, foliis fagittatis, triangulis, angulis divaricatis, acutis. *Linn. fpe: p. 966. no. 11.*

Arum minus, erulentum, fagittatis foliis viridi nigricantibus, *Sloan. Cat. Jam. 63. Hid. vol. i.p. 167. Tab. 106. Fig. 1.* ubi simplex modo formum exhibetur.

Arum minus Sagittariae foliis. *Plukn. Phyt. Tab. 149. Fig. 2^*

Tajaoba fecunda *Marcgr. Hift. Brafil. p. 36.* que Colocafia Brafiliana non laefcens, Sagittal foliis angustis ab *Hermanno* in *Parad. Bat. pag. 87* vocatur, cuius & alias species ad olera ufuitae a Brafilianis ibi enumere rantur.

Radix noſtra? plantae craſla eft, ex lamellis quafi fibi impofitis conftans, variaſ emittens laterales fibrillas fimplices, indivifas.

Spatha ſupra terrain mox ſeſe aperit geminata, craſla, ex qua *Folia* ojiuntur petiolata, cordata, fagittata, auriculis extrorfum flexis, acuminatis, funtque ample extenfa, ncrofa, integra, variique coloris, quum inveniantur rubri & violacei colorisjuxta *Plumierium*.

Flores pufilli funt, breviffimi, curtifque infidentes pedunculis, prope folia ex fpatha communi ſimul propullantibus, ita ut tota planta penitus a caulos /it, ac primaria^jus virtus in radice lateat, qua? edulis eft, gratumque praebet incolis cibum.

ObfervaHo, Diftinguitur facile hoc Arum ab Aro maculato vulgar!, non tantum quod majus fit, fed & quod pedunculi breviflimi, & longe brevioreſ petidlis foliorum ex communi vagina excrefcant.



TABULA TRIGESIMA SEXTA.

A Rum ampliflmo folio, flore & frudu rubro. *Plum. Cat. pi. Am.p.*
4. T. 'tnft. 159.

ARJJ M^icaule, foliis cordatis, obtufis cum acumine, angulis rotundatis. *Linn. H. Qliff pag. 435. no. 7.* ubi defcriptio huic optime convenienter.

A acaule folfis cordatis, obtufis, mucronatis, angulis rotundatis. *Linn. fpec. pi. p. 966. no. 9.*

I x imbricata ex nodulis plurimis, feu nodofa penitus, ex quovis nodo fimplicem emittens fibrillam indiyifam.

Folia cordata, feu psicara u'quc ad petio/nm, ang-u'jis rotundatis, venofa, leviter fmuofa, acuminata, integerrima.

*Petio*ks radicatus eft, ere&us, longus, fuperius teres, inferius ampKatus, in membtanam compleftentem interiores inftar vagina? petiolos.

Flos adpiftus n@n eft, forte quod rariffime vel vix floreat; videturque ejus radix quoque edulis, uti prioris fpeciei.

*Obfervatio.** Proxime huic plantae convenit, ac forte tantum varietas hujus eft Arum amplis foliis cordiformibus, radice nodofa r^bra *Plum.. Cat. pi Amer. p. 4,* quod eft *Dracontii* amplis foliis 'corc&tjs, radice nodofa rubra *Plum. Defc. pi. Amer. p. 48. T. 63.* quum yero hoc intra baccarum rudimenta, evidentia petala gerat, nee fpadix; fyprime nudus fit, hinc vera *Dracontii* species habenda eft; ac proin^e Vocabu poſiet *Dracontium* foliis cordatis, transverfe nervofis, petiolis Javibus, flore nutante, quod, fi in noſtra iconē flores additi eflent, pro certo definiri poſlet.

TABULA TRIGESIMA SEPTIMA

A *Rumfcondctis*, maximum, flore flavefcente. *Plum. Cat. pi Amer.*
p. 4. Town. injl. p_t 160.

ARUM caulefcens, radicans, foliis cordatis, petiolis apice attenuatis.

Caulis adfcendens, ad alas fibrillas radicales undique emittens, ubi Stnodoſus'eft.

Folia funt ovata, acuminata, feu cordatoovata, integerrima, majoribus diftin&a nervis, inter quos venulse laterales plurimae parallelae decurrunf, uti in Foliatura majore confpicitur.

Petioſi longiflimi, lati, membranacei, fuperne prope foliorum ortum fimplices, & attenuati.

F/<wlóngiffimUs, *Spatha* contra&a, uti in separatis patet Figuris A & B.

Objervatio. Haec quoque species flores rariflime profet, ac frucYifica* tioniſ loco infervire videntur fibrillae radicales caulinæ, quod in plurimiſ obtinet plantis raro florentibus, quae loco florum fibrillis talibus luxuriant, quibus ſefè propagant, que hinc *Jieriles* quoque funt quo ad fru&ificationem, quod *Plumieriū* etiam confirmat, qui in *decript. Plant. Amer.* zpag. 37. ad 40. quatuor proponit *Colocajt^feu* Hujus An species, eodem modo ex caulibus fibrillas fuas emitterites, quum non vel rariflime floreant, ipſi etiam *Jieriles* di&ſe funt, nlrūm vero unam inter depiftas meas icones florentem fervo, cuius flos ex cāuTis nodo fimplex erigitur, longo infidens craſlbque pedunculo, vocaturque *Plumierio Arum* fcandens ampliflimis foliis, flore albo, noſtræ vero fimplex folium cum caule *Tab. 52. PI. Amer.* exhibetur, nomi-naturqueibi *Cokcafia* hederacca, Iterilis, latifolia.



TABULA TRIGESIMA OCTAVA.

A *Rum acinis amethyftinis*, flore parvo. *Plum. Cat. pi Amer. pas: 4.*
Town. infi. p. 160.

D R ^ t O N T I U M foliis cordatis, longitudinaliter nervofis, petiolis radi6aiiiJtjiis pedunculo longioribus, flore nutante.

RaMx ex pluribus nodis inbricatum fibi inpoſitis conflat, unde penitus nodofa, quae fibrillas later?les hinc inde emittit primo fimplices ad extreum vero in plurimas **fibrillulas** diftin^as.

Folia cordata fūnt, acuminata, profunde ab bafin incite, angulis rotu^{ca}s dis obtusifque.

Petoli longifTimi funt, radicales, fuperne teretes, inferne extend in membranam latam, interiores loco vaginae complettentes petiolos.

Pvduncti duplo & triplo breviores, inter petiolos ortu^Tducentes, fpatam minimam gerentes lanceolatam, involventem parvum florem, qui in fpadicem excrefcit dependentem, utcunque inflexum.

Obseruatio. Hasc planta vix videtur Ari species, cum fpadix undique flosculis te&us fit, unde potius eft species Dracontii, atque hinc melius vocatur *Dracontium* foliis cordatis, nervis longitudinalibus, petiolis lrevibus, flore nutante*



TABULA TRIGESIMA NONA.

A Rum amplis foliis*, acuminatis, & pergamateis, ex. Infula San&i Thomae. *Plum. Cat. pi. Amer. p. 4.*

DRACONTIUM acaule, foliis lanceolatis, ferratis, fpadice de* clinato.

Kadtx int̄cata eft ex pluribus iquamis & nodulis, undique fimplices emitens fibrillas in3ivifas.

Folia exlpiaradice ortum habent, fub*feffilia, longifrima, lanceolata, (erratar, nervosa, plurimis intermediis venulis fibrillas mentientibus pertexta, quae itafirmant folium, ut pergamateum penitus fit.

Flores pedunculis infident longifTimis, laevibus, ipatha minima plana acuminata, feu lanceolata, fpadix^ue longiffimus, pendulus, inflexus, Sau-ruri feu Piperis caudati fructurh scmulans.

Obseruatw. Inter P^rnicriunas icones hujus Sz alia obcurrit *lpecids*, quam maxime huic adfinis, qu33 Arum foliis rigidis, anguftis, & acuminatis vocatur in hift. *PL Amer. & Tab. 62.* exhibetur, & *Dracontii* quoque species eft, hujus vero folia funt integerrima, nee venis ita pertexta, noftraque, undique ferrata^ Omnesque, quas hie defcripfi, a nullo> antea auftore Iconibus illuſtratae fuere, licet maxima hujus fami* H3 fit cojiors, qua? a *Plumierio*, *Hermanno* in *Par ad. Batav.* uti & in *Horto Malabarico*, & a *Rumpbio* in *Herbario Amboin.* *Shane** in *Hiftor, Jamaic.* aliifque proponuntur, fed quas nondum exa&e in fpecies fuas naturales diftinft® funt, ita ut peritum latis exercere valeant Botanicum.



28 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA QUADRAGESIMA.

A Ster Primulas veris folio, flore luteo. *Plum. Cat. pl Amer. p. io> lournAnft.p. 483.*

INULA foliis fpatulato-lanceolatis, ferrato-incisis, obtusis, subvillo-hs, calicibus tumentibus.

Helenium Belliflorum, foliis amplis; Afphodeli radice. *Fall Aft. Panj. arm. 1720. pag. 393. no. 26.*

Hieraciup caule firmo, rigido, ftriato, foliis lofigis obtusis, per ttiarginem dentibus majqualibus leviter incisis. *Ray. Hifi. pi torn. 3. >. i₄₄. no? 71. &c.*

FIGURE F R I M A.

Amequam hcec planta caules Horefque producat, externa sua facie oer fefte *Pnimalam Veris* aemular, in orbem enim folia sua profert in mfi quafi terra feffilia, anguftiore bafi fenfim latiora, JanceoJata, crenula-ta, ac venofa, cppoifa: ex ipforum centro ^enuia.

C «A» feufcapi exfurguntfloriferi, fimplices, rariora gerentes folia al-ternata, feffih, profundius crenata, fenfim minora, ac fumma qA crenata^ fed fimpfciter laneeolata.

Flores in caulium' fummo progerminant plures, radiati, lutei, calice

bbi Z4». A. jumorem exhibet fcapum, in quo flores non dum T - ac foia lata & profunde crenata, ^ k C?ulis adu i Z'm a X^ ubi flores extenfi, ac foliatura contrafta, nee crenata, ffirmoh Radix hujus planta* quam maxime intricate eft, plurima de Z - phce's craftas inftar Afphodeli fibrillas. P*luri*mas demittens fun-

& Ster acaulos, Hieracii villofis foliis. *Plum. Cat. pi, j*mer. p. 10.**

TUSJILA GO fcaponudo unifloro, foliis ,anceolat^ dentatis, vil-

Tuffilago Hieracii folio villofo. *Poffl. Ad. Parif. ann. x_{no}*

FIGURA S EC u N ^376.910.7,

Rafexhuus plant* penitus fibrillofa eft. ex pl*Urih* r .. fis cohftans fibnilis, qua; laterales fimplic, " ^ ./ ^ Ficibus ^ c fmuo-lulas. capiHaceas emittunt fibril-

Folia ex radicis fummo mox e terra propullulam pofita laneeolata, emarginato-de hata ^ Znf ^ ^ ^ orh ^ adf P*erfa* enofa > villifque hinc inde

Scapi

Scapi floriferi inter folia e terra quoque mox excrefcunt, nudi, fimplfces, uniflori.

Flores contra&i flint ac pufilli, ere&i, fquamofb & inbricato calice contenti, qui femina dant ex pJurimis quafi ftellulis conflata, ac coronata pappo plumofb, qualia in tabula confpiciuntur.



TABULA QUADRAGESIMA PRIMA.

A Ster Primuta Veris folio, flore singulare purpureo. *Plum.*" *Cat. pi Amer.p.* 14. *Tourn. inji.p.* 483.

TUSSILAGO fcapo unifloro, foliis lyrato-ovatis. *Linn.Jpec. pi p»* 857. no. 1.

Tajjilago Primulas Veris-*folio. *J^ailLAd. Parif. ann.1-j20.pag. 376. no. 8.*

FIGURA PRIMA.

Rtidix hujus plantae haud multum librofā eft, fimplices enim ac perpendiculares modo in terram demittit fibrillas.

folia cun/la flint radicalia, feu feffilia, in orbem expanfā, ovata, dentata---4a, oi:t:u^, inferius lobato-finuata, fuperius ovata ac venofā.

Scapus ex ip^ quoque progerminat radice, nudus, longus, uniflorus.

Flos ipfe eft nutans, calice oblongo fquamofb contentus, atque conflat ex flofculis hermaphroditis plurimis in difco latentibus A & B, fa?minei autem radium formantes prioribus Jongiores flint, pistillo bifido influclu C* Sqminis pappofa flim tcnioiflirna ciliaria D, D.

Obfervatio. Mirum fane videbitur plantarum fcrtuatoribus, quod plantam s4mcrit<, anmn conjunxerim cum SiheHrn, fed ex commwiicatione Clariff. Linndi hanc? plantam ad illam Tuflilaginem retuli, qua? ab ipfo in Hort. Upfal. Tab. 3. Fig. 1. & a 'Qmelin. in Flor.Sikr. torn..2. Tab. 68.Fig. 1. exhibetur, fcribit enim LitmaM mihi de hac inquirenti, adeo similiis eft Pkmieril planta cum noftra, ut non audeam hanç specie. diftinguere, «.conyenient enim radix, folia, fcapi, & flores; fed in meaflos non nutans, & calix Plumkrii magis fquamofus eft; nee, non color flbris purpureus, qui in ripftra albus, vel parum admodam ?d purpurreum vergens. Nifi vidcam illam propriis oculis, nan agnosciam diverfam a Siberica, accedit, quod in fblo calidiore etiam mea planta evadat major: dejquaporro vide Linnai Amanitat.-Academ.vohmsi.'pag. 161. &e. ia Affert. de Ananctria.

A Ster Primub Veris foliis, fern' flofculis tenuiflimis. *Plum.* *Cat. pi Amer.p.JO.*

1 NULA foliis fpatalato-ovatis, ferratis, fubtus tomentofis. ,

FIGURA SECUNDA.

Heienium Virgs paftoris folio * fubtus incano & tomentofo. *Vaill. Ad. Parif. ann. 1720. no. 2.* item juxta Vaillant.

After Jacobese folio ampliflmo fubtus incano. *Plum. Cat. pi. p. 10. & Town. infl. p. 484.*

Caulis hujus plantae depiſlus eftSimplex, crafTus, rotundus.

Folia gerens bina fibi obpofita per petiolos decurrentia, fubfeſflilia, d̄vata, denticulata, acuminata, latiflma, incana, & tomentoia.

Flores in ramorum faſtigio bini fibi obponuntur, longis in pedur\cu\ls, fo\lt%u\, ampVi, tenmffime diffeſti, acradiati, qui ex petalis fimplci- bus linearibus conftant, caeteri difcum formant, uti in congeneribus.



TABULA QUADRAGESIMA SECUNDA.

A Ster frutefcens, Sttecbados Citrinae folio , flore umbellato aureo. *Plum. Cat. pi. Amer.p. 10. Tourn. infl. p. 483.*

INULA caule fruticofb, foliis lanceolatis, dentatis, (ubtus tomentofis, floribus corymbofis minutis.

Heienium frutelcens, Agerati folio, fubtus incano, floribus minimiffere umbellatis. *VailLAtt* Parif. ann. 1720./>• 394. no. 27.*

FIGURE Jf R I M^T A.

Planla frutefcens, ac ramofa, caules gerens lignofbs, fimplices.

/TA lanceolata, dentata, finuofa, acvenofa, fuBtus incana.

Flores corymbum terminant paniculatum, funtque illi pufilli, vix radia- ti, coloris elegantisaurei, in umbellse formam fere difpofiti.



JjArba.tfov̄is \ut<&, foliis foraminuiatis. *Plum. Cat. pi. Amer.p. 19.*

ANTHYLLIS foliis pinnatis, foliolis sequalibus, milleporis.

FIGURA S E C U N D A,

Planta frutefcens, ramulo^, glabra.

Terr. plurim, plerumque quinque paria cum inpar extrem(>9 p k m ^ terna,

Fa-

Foliola fubrotunda, glabra, pun&is quafl perforata, feu foraminulofa, in-flar Milleporas.

Flores fpicati, terminatrices, alternati, Jutei.

D

IJAri/eria pyramidata, ilore caeruleo. *Plum. Hifl* Mff.v. p. 52.*

JUSTICIA fruticofa, foliis ovatis, fpica imbricata, & pyramidata.

F I G l f R A TERTIA.

Quluis fulcratus, trichotomus, lignofus.

Folia obpofita, ovata, oblonga, integerrima, petiolata.

Spic<z terminatrices, pyramidatae, & imbricatae.

Brafft<z cordatae, feJiles, ex quibus floculi, forma *Adhatoda* feu *Jufticia* fimiJimi,' uti & tota planta hoc asmulatur genus, atque cum Bem-Curini *H. Malab. torn**. 2. *Tab. 21.* in plurimis convenit, excepto quod fiujus fpiae fint magis acutae, foliaque magis lanceoJata.



XABULA QUADRAGESIMA TERTIA.

Bdrlicria. Solani folio, flore coccineo. *Plum. nov.pLgen.p. 3r.*

BARLERIA inermis, foliis ovatis, denticulatis, petiolatis, *Linn** fpecpl.pag. 637. no. 5.

FIGURE P R I M ^4.

C?fl/warticulatus, inermis, ramofus. Kami alternati.

Folia obpofita, ovata, denticulata, petiolata, acuminata.

i^molaterales feu axillares, obpofiti, feffiles, quorum forma ac ftru&ura a *Plum.* in *nod. pi. gen. L c.* defcribuntur, ac *Fab. 31.* exhibentur

Figure marginales sunt A *Germen* cum pifillo & calice B. *Capjula* trilobularis diffecla. C eadem per Iongitudinem fe6ta, ut *feminum/ttus* conficiatur. D.Jemen ipfum fubrotundum.

Obfervatio. Si verum fit, uti in *Plumierii* Iconibus bina modo florum tfamina conficiuntur, quod fit haec planta diandria, turn juxta Cl. *Linnai* fyftema haec quoque pertinet ad *Jufticias* quum vera *Barlerh* ijuatuor gaudeat fhminibus, casterum hagc bina genera adeo sunt fibi ad finia, uti id patet ex florum flgura & capfularum ftru<5lurà,"tit juxta aliorurri methodum facile combinari poftent.

Barkria aculeata, Solani folio angufriors, florc caeruleo. *Plum. nov.*
B *pl. gen. p.-l'* -

fk. PL ANT ARUM AMERICAN ARUM

BARLERIA fpinis,& floribus axillaribus, caulis nodofis, foliis lanceolatis, dentatis.

Barleria fpinis axillaribus, foliis lanceolatis denticulatis. *Linn. fpec. pi. p. 636.no. 1.*

F I G U R A S E C U N D A.

Canlis ramofus, articulatus, ad nodos fpinofus, fpinis quatuor pluribusve ex alis armatus.

JPb/wobpofitā, lanceotata, dentata, finuofa, ac venofa, subfeffilia.

Flores ex alis feffiles, fblitarii, pufilli, coloris caerulei.

Obfervatio. Didum fuit hoc plamarum genus *Barleria* in memoriara Rever. patris *Jacobi Burlier*, qui & *Meet. Dott.* & *Botaniciis* infignis fuit, uti conftat ex ejus Opere pbfthumo Botanico de plantis per Hispaniam & Italiam obfervatis, aliisque manufcripds, guse in Biblioth. conventus Parifienfe funt tuftodita.



TABULA QUADRAGESIMA QUARTA.

B *Auhinia* aculeata, folio rotundo, emarginato. *Plum. Nov. pi. gen. p. & 23. Tab. 13.* floris character.

B AUHINIA caule aculateo. *Linn. H. Cliff, p. 156. no. 1. X¹. 14. ubt tenellus fine flore ramulus ac defcriptio & Linn. fpec. pi. p. 374. ^ 2. Roy.pr,p. 463.*

F I G U R A P R I M A.

Planta (triferrarii.) raiuus gereris alternos, craflos, lignofbs, reclinatos, aculeatos, horum *aculei* ad ramulorum exortum proveniunt gēmini, ob-pofiti, firmi, acuti, deflexi.

Folia alternata, cōdata, in medio bifida, obtufa[^] ac rotundata, lēptinervia, glabra, virentia, vix petiolata.

J%ra'exquinque petalis conftant lanceolatis, quorum latera funt incifa, feu profunde crenata, ex ipforum centro furgit piftillum incurvum, cum novem (taminibus ejufdem formae, uti in Icone confpiciuntur.

Siliqua eft oblonga, plana, acuminata, in tres ifthmos diftincta, ac finuofa, glabra, foeta feminibus tribus reniformibus, uti in separata filiqua A. ad parent.

B *Avhinia* non aculeata, folio ampliori & bicōni. *Plum. Nov. pi. gen. p. 23.*

B AUHINIA inermis, foliorum lobis acuminatis, & ereftis.

F I G U R A S E C U N D A.

Bauhinki foliis quinquenerviis, Jobis acuminatis, remotiffimis. *Linn.*
H. Cliff, pag. 156. no. 2. *Roy. pr. p. 464.*

Bnubinia foliis ovatis: Jobis divaricatis. *Linn. fpec. pl. p. iijq. no, 3.*

Naga Valli *H. Malab. torn. 8. Tab. 29.* ubi fine floribus depingitur, - ac dicitur, nunquam ibi fibres producere.


Canlis frutefcens, Jignofus, ere&us, inermis, ramos gerens alternates ^ breves, ad quorum ortum

Folia fblitaria, alternata, cordata, quinquenervia, femibifida, laciniis ovato-acuminatis, ereftis j nee ita dehilcentibus, uti in Figura. //.
Cliff, confpiciuntur, unde dubito, an *Cl. Linnans* refte fuam junxerit cum ilia *Phimierii*^ qua? eft folio ampio & bieorni ere6to.

Flores in racenftim iimplicem colledi funt, fed longe alias forms, quara praceidentis fpciei, *uti Figurarum comparatio docet, peculiare au- tem in hi.^ce eft, quod flamen infimum sequali longitudine cum jftilo producatur!

Siliqua plerumque fex fepatemve dependent, oblongae, acuminatag, fi- nuofe, tefafperm^, uti in separata filiqua B: confpicitur.

Obfervatio. BAUHINIA dida fuit a *Plwnierio* in memoriam Clariffi- rqprum fratrū *Joannh & Ca/pari Baubini*, Botanicorum **fūi** tem- poris^principum, quiqe variis fuis operibus tarn Botanicis quam Anato mičk^ Medicis unicuique Medico noti funt^ quorum fata ulterius •*aJPlumier.* in *nov. gen. p. 23. & Tourn. in I, p. 42.* commemorantur.



TABULA QUADRAGESIMA QUINTA.

-W% *Egonia rofeo ftore*, folio orbiculari. *Plum. Cat. pi. Amer.p. 20. 71*
£ *tnfi.p. 660.*

*B EG ON I A. *Linn. fpec. pi pag. io\$6.* ubi omnes hujus plantae recen* fentur Varietates.

Radix hujus plants craflā eft ac ramofā, fibrillas hinc inde emittens va- rias, fimplicesque, quibus fefē terra? infigit ac prorepit, uti & hs ipe- cies'repentiffimaa funt, fie gemmis, quibus fefc propagant, refertiffimae, ita ut quam luxuriofiffimae videantur ha3 plants, quod ex data Icone facile concludi potest.

Folia in hāc plantarum familia plerumque funt oblique cordata, m nac ve- ro, quam jam defcribimus, funt orbiculata, crenata, umbilicata, ac ve'nofa, longis flrmisque infidentia petiolis.

Flores duplidsfunt ftrufturaj, unus emm juxta *Tournef. L. c. iterihs eft*, atque ēx quatuor petalis componitur, quorum bina petala futt Jatiora,

34 PLANTARUM AMERICAN ARUM

bina anguftiora, uti in separato flore A confpicitur, alter vero flos rofaceus quafi eft, ex quirique plerumque petalis in orbem pofitis conflans, uti in flore B apparet, quiqe calici foliaceo C infidet.

Frutlus trigonuſ eft D, alatus E, in tria loculamenta F divifus, femina continens G plurimiaj exigua, rotunda.

Obfifvatib. Plures hujus plantse funt varietates, quarium folia inprimis dii Ferunt angulis acutioribus & obtufioribus, glabris & hirfutis, uti & magnitudine totius etiam plantse, fie omnium maxima eft

Begonia purpurea & nivea, maxima, folio aurito. Plum. Cujus folium Fig. K in Tab. 45. confpicitur.

Begonia rofeo flore j folio aurito, minor & hirfuta. Plum. Cujus folium Fig. 2. exprimitur, hujus & altera glabra eft, ejufclem penitus ftru&urſe.

Begonia rofeo flore, foliis acutioribus, auritis, & late crenatis. Plum. Cujus folium Fig. 3, inſculptum eft. #

Begonias vocavit Cl. *Plumieri* hafce plantas in pererfne obſervantist; fuis monumentum erga illuſtrifE D. *Bégon*, Regi ab intimis confiliis & rei nauticae prſeſeclum j tefte Clarify *Tournefortio* in *in/lit*, pag. 660.

• TABULA QUADRAGESIMA SEXTA.

Bella Dona frutefcens, flore albo, Nicotianae foliis. *PtunT. Cat. pi.*
Amer. p. 1. *Town. inſi.* p. 77.

A T R O P A caule fruticofb, foliis ovato-ot»longis, pedunculis confertis.

F I G U R A P R I M A .

Pjanta frutefcens, caules gerens lignofbs, rotundos, glabros, craflbs, 'q' quibus

Folia alternata, lanceolata, integerrima, fmoufa, ac venofa excrefcunt.

Pedunculi umbellati quafi, numerofi, uniflori, ex foliorum alls progerminant.

Flares oblongi, tubulofi, laciniis quinquefidis retroflexis, uti in separato flore A confpicitur.

Stamina funt filamenta quinque, erefta, decurrentia, anthers haftats, eretiae, uti in flore B iffe & dparent.

*P*erit germe in rotun tum, cum style ſubulato, longiffimo,

Baec fiibrotundae, ex propriis pedunculis dependentes, calicibus perfictentibus D.

Serpatio. Hujus & alia apud *Plumier.* obcurrit species, vel potius varietas que *Belladona amorelcens* » nore exalbicb, Nicotian* foliis ab7olocatur.

Nomen *Bella dona* Itali huic generi dederunt, quia mulieres vulgari fpe-
cie utuntur^ad fucum, denotatque, quafi dicatur *Pulcra mulier*, qium
ejus fucco faciei gratum concilient colorem, qui tamen fepe lethalis
fit, unde Cl. *Linnaus* illud mutavit, *Atropamque* dixit,- quum ^#-0-
/w una habeatur furiarum, quae a veteribus credebatur vita fila difcin-
dere, quje a 2fe\$i /&<ds, feu pulchra muJiere antea nexa fuere, ita ut
Antiphrafis feu Ironia fit in denominatione.

B *Ermudiana* Palmar foJip, radice bulbofa; Dⁿⁱ. Lignon. *Town. infit.*
p. 388.

IXIA foliis eniformibus, plicatis, glabris, caule ramofb.

"*Sijyrincbium* Americanarum, radice phcenicea, foliis plicatis & nervofis,
florealbo. *H. R. Monjp.* pag. 185,

FIGURA S E C U N D A.

"*Radix* bulbofa, tunicata inftar *Tulipae* vel *Cepae*.

/b/Mianceolats, pe^iolata, flriata, nervofa, ac firma, feu longitudina^
Jiter fecundum nervos plicata.

i^m^inracemumcolle&i, vel potius fpcati funt in caule ramofb.

Obfervatig. Haec quam maxime adfinis eft *Sifyrincho* i^thiopico, ramo-
<*{o, foljis plicatis nervofis &c. *Breyn. Centur.* pag. 8 ?• *Tab.* 3 7. a qua
modo floribus alois, & foliis glabris, nee villofis differt, fed haec^for-
te omnia diverfo fblo & coelo adferibenda flint.



TABULA QUADRAGESIMA SEFTIxMA.

D *OEUonia* frutefcens, folio Meliflae afpero. *Plum.* nov. pi gen. p. 19.

BELLONIA. *Lfrm.Jpec.pl.p.* 172.

Caulis lignofus, arboreus.

Folia obpofita, ovata, inaequaliter ferrata, icabra, CZ exafperata, venis
obpofitis ac finuofis, vix petiolata.

Florès in corymbum digefti, atque per caulem fparfi, rotati, monope-
tali quales a *Plum.* in nov. gen. *Tab.* 31. delineantur.

•p' a\elft nvato-acuminatus A, qui transverfim fcftus B feminibus fo-
etus eft plurimis exjguis rotundis U.

O *E*'/sru/jft/ ^n m^emor^am^ f*etr* Bdto*J** ^c pJ^{ant}a di&a fuit *Belloma*,
auir vir inprimis inclaruit libro de Jrboribus coniferis rariffim^, turn &

36 PLANTARUM AMERICANARUM

aliis Gailicis scriptis, quae a *Plumier.* in *nov. gen. p. 19.* recententur, quorum auctor non sine magno Botanices dispendio a nefanda latronis manu enecatus fuit, quem plura preclaras meditabatur opera.

TABULA QUADRAGESIMA OCTAVA.

Besleria Meliffe Tragi folio. *Plum* nov* pi* gen* p* 29. Tab, §. Charakteres Floris &c.*

BESLERIA pedunculis ramofis, foliis ovatis. *Linn, Jpec. pip, 619. no, 1.*

Caulis articulatus; glaber, ac lignofus.

Folia obpofita, ovata, petiolata, crenata, nervosa.

Fedunculi ex singula ala ramofi.

Flores monopetalii, anomali, tubulati, quinquefidi A. A.

*Fruttuseft. Bacca moilis, ovata, B. calice quinquefido C. contenta, quae transversim fœta D. lamina exhibet minima rotunda E. **

*Ob/ervatio. Difta fuit haec planta cum fibrofrequentibus, Besleria in memoriam Bafilei Besleri Pharmacopaei Norimbergensis, qui vir quam maxime inclaruk editione Operis maximi Horti nempe Eysjletenfis de quo porro vide *Plumier.* in *nov. gen. p. 29.**

TABULA QUADRAGESIMA NONA.

D

JJEsleria Virgseurese foliis, flore luteo minor. Plum, nov.gen. p. 20.

BESLERIA pedunculis simplicibus confertis, foliis lanceolatis." *Linn. fpu.pl* p. 619* no. 2.*

F I G U R A P R I M A .

Cadis lignofus, articulatus, inaequalis.

Folia obpofita, lanceolata, vix petiolata, ferrata, nervosa

Pedun&yx caulem & ex alis proveniunt, fimplices, conferti & copiofi.
^mmores, monopetalii, tubulofii, bilabiati A, calice quinquefido B
^contenti, in fundo gerentes germen fubulatum C.*

*Midus est bacca moilis, globofa D, calici perfiftenti infixafœta semini-
bus minutissimis conferti E.*

Ob-

Obfervatio. Hujus & altera varietas eft, quae *major* a *Plumierio* vocatur,
ac folia sua floresque simili profert modo, fed folia ejus font muko Ion-
giora, angustiora, magisque lanceoJata, ac potius crenata, nee ita
(errata, quorum unum ad latus *Tab. 49. Fig. 2.* exhibui.

Flores ifidem aliis sunt formze, irregulares nempe, tubulofi, ac perfbnati *a*,
calice magno multifido *b*, content!.

Fhithts magis oblongus eft, acuminatus, *c.* transverfim fēlus, pulpam
exhibens *d* repletam (eminibus minutiflmis *e*.



TABULA QUINQUAGESIMA.

H

Hesleria fcādens, criftata, fru6lu nigro. *Plum, nov.gen.p** 29.

B E S L E R I A peduncijis flmpJicibus fbJitariis, inovoJucris pentaphyllis.
JLinn.fpec.pl p. 619, no^ 3.

Caiilis repens, ex fīngulo geniculo fibrillas radicales emittens, ubi
Kami adfeēdunt liberi.

folia ovatz, obpofta, ferrata, petiolata, nervosa.

Pedtmculus ex quavis ala fblitarius, nudus, uniflorus.

Flos excipkur ab iftvolucro pentaphyllo A, quod conftat

Foliolis corcktis, d^ntatis, acuminatis, ferratis B.

%*Corolla* tubulofa, externe hirfuta eft C. limbo quinquefido.

Piftillum mire inflexum eft D, germen proferens E.


Sfamina in fundo varie.coniplicata & contorta funt F.

Involucntr poft floris lapfum'in centro suo placentam videtur proferre bir-
futam G, fcztamyēmibus numeroffimis H.


Obfervalio. Non di^jbium eft, quia haec planta diverfi lit generis a pr-
ecedentibus, ac penitus diftincli, ita ut ad *Martiniam* proxime adcedat,
uti notavit quoque CJ. *Linnaus injpec.pl. I.e.*

Finis Fafciculi Secundū







NERIUM caule volubili tuberoso.



CYNANCHUM foliis ovatis.

NERIUM caule volubili, foliis lanceolatis.






PLI:M IF.K li feliiiv ov<d>>i>WBgia


TAB. XXX.



ASCLEPIAS foliis lanceolatis.

TAB. XXXI.






ARISTOLOCHIA fo liij
ovato -oblongU.obt"


Fig. 2.

ARISTOLOCHIA foliis reniformibus peltatis



ARISTOLOCHIA foliis cordatis, obtusis.


TAH. WMV.




ARISTOLOCHIA foliis cordato-oblongis planis.



ARUM scale, foliis sagittatis, triangulis.



ARUM acaule, foliis cordatis, obtusis.




DRACONTIUM *Coins rottJati*, ioagHwfeu>1fter nervosum*.

TAB. XXXIX.



DRACONTIUM acaule, foliis
lanceolatis, ferratis



TUSSILAGO scapo nudo uniflora.

INULA foliis spatulato-lanceolatis.


V

-JSJⁱ Mill/ ^

TUSSILAGO scapo unifloro, foliis lyxato ovatis.








BAUHINIA inermis, foliorum lobis acuminatis.

TAB. XLV.



BEGONIA.






TAB. XIVIII.



BESLERIA iieilujiruiis raiuolls





BESLERIA pedunculis simplicibus foliariis.

d<*2\

P L A N T A R U M
A M E R I C A N A R U M
F A S C I C U L U S T E R T I U S ,

Continens Plantas, quas olim

C A R O L U S' P L U M I E R I U S ,

Botanicorum Princeps

Detexit, Eruitque,

A l q ' 4 e i n I N S U L I S A N T I L L I S ipfe depinxit.

Has primum in lucem edidit,

Concinnis defcriptionibus, & Obfervationibus,


J E n e i s q u Q Tabulis illuftravit

J O A N N E S B U R M A N N U S , M . D .

*Athenai illuflris, & *in Horto Medico AmfteUdamenfi*

P R O F E S S O R B O T A N I C E S ,

Academic Cafarea Natura Curioforum Socius.



Sumtibus Au&oris,

Projplant Amfleladami in Horto Medico,

Atque

Apud V I D U A M & F X L I U M S . S C H O U ^ E N 3
& L U G D . B A T A F .

Apud GERARD. POTVLIET, & THEODOR. HAAL
M D C C L V I

NOBILISSIMO ac DOCTISSIMO VIRO,

ANDREW ELI.E BUCHNERO,

SACRI ROMANI IMPERII NOBILI,

POTENTISSIMO BORUSSIJE REGI

A CONSILIIS INTIMIS,

MEDICINE AC PHILOSOPHIC NATURALIS

PROT£SSORI PUBLICO ORDINARIO

HALi£ MAGDEBURGICi£.

IMPERIALIS ACADEMIC NATURC CURIOSORUM

PRCSIDI, ET COMITI PALATINO

C I S A R E O ,

H U N C T E R T I U M

FLANTARUM AMERICANARUM

F A S C I C U L U M

OMNI HONORIS CULTU

OBFERT

JOANNES BURMANNUS.,

P L A N T A R U M
AMERICANARUM
 FASCICULUS TERTIUS.



TABULA QUINQUAGESIMA PRIMA.

Ridens Srutefcens; Spondylà folio & facie. *Plum. Cat. pi Amer.pi* io.
Tourn. In/I. p. 462?

VERBESI^ Afoliis alternis, finuatis.

Silphium foliis alternis, pinnato-finuatis *Linn. Jpec. plp. ()i^.\h\^cv\^tAO,*
Ceratocephaloides Acanthi foliis. *Vail Ad* Parif. ann, 1720, p. 425. no. 4.*

P'la&ta ferox & frutefcens, CW&? gerens craflbs ac ramQfbs, alternosj
 ati in Figura marginali adparet.

iFolia pinnatifida, alternata, in quatuor lobos utrinque distin&a lanceolatos, ac finuofbs, cum inpari extremo acuminato, qu^ formâ haec plan*
 ta* perfedte *Spondy Hi* fplia aemulatur.

J^ores copioffimi corymbofi, terminatrices in Corymbum co^mpofitum.
Calix horum nondurri explicatus confpicitur ad Lite A. *Flos* naturali ma-
 gnitudine B.

Flo/culm femineus radii eft. C. *Flojculus* hermaphroditus difci eft D<<
 Idem au6la magnitudihe eft E.

Periantbium, feu Calix cum fructu eft-F. *Semen Ipfum* eft. G.

Obfervatio. Plantae hujus Synonimon adduxit Cl. *Linnaus* in *fpec. pi.* ad
 illuftrationiem *Silpii laciniati*, nee potuit aliter ex nomine divinare,
 qu&mddv no^lrae plantar iigura nullibi exftaret, Folia enim Plumierii
 plantae cum Linneana omnino convenient, quaeque, uti noftra, inter
 omnium altiffima eft, acfiepe *Heliantbo* duplo altior, quales veteres
 fruticofas vulgo dixerunt. Sed flores noftrae plantae longe diverfiflimi
 fiint, & decies minores, -ac copioffiores quam in *Linn&i* planta, qui-
 quejuxta ipfbrum fru6lificationem jam explicata^n declarant ad *P*erde-
 fmam>* ni fallor, efle amandandam, ad quod genus noftram itaque fa-
 pra retuli.

Folia in caule obpofita, ternata, lanceolata, crenata, glabra, in ramis fforiferis, alternata, ternata, minora*

Flores terminatrices, longis propriisque pedunculis infidentes, fblitarii, ra.dia.tj, ex fex petalis tridentatis confantes, radius auten>faape in hifce defideratur floribus, uti id notum eft ex pluribus hujus generis fpe-
ciebus,

, . 1. 1. 0

Semina fuit bidentata, in calice erefto eontenta, altitudine sequah, &
per maturitatem in orbem faepius extenfa, uti in tcone confpicitur.

X) *bfervatio*. Proxime hffic planta adcedii ad ilram fpeciem *Bidentis*, qua?
pilosa a Linn, *mfpec.pl.* />, 832. no. 5. vocatur, & in M *Cfifp.* 399.,
no. 2, proponkur, quurn hsec in fiiprema caulis parte foha ternata aN
quando gerat fimilis cum noſtra figure, turn & quod utriusque plants
feminafint divaricata, ac f«pe undique patentia, quum vero *Phmie**
rii icon cuncla folia tarn infima quam fumma ternata modo pingat, nec
ulla pinnata, non audeo eas conjungere, cſeterum h^ binae plants
quam maxime infe/ Tete convenient, alteriusque icon eleganter deh-
neata eft in *Horto Eltham*. Tab. 43. Fig. ?i.

HITC quoque fpe&at *Cbryfintbemum* Americ. Cicens folio glabo, bellidi\$
maienii^e. *Herm. Parad.Bat* p. 124, quod *Bidens Americana*, tri-
folia, Leticanthemi flore a *Tourn. In/I.* p. 462. vocatur, cujus flores
ac femina cum fubfrequenti planta in multis convenient, de qua plan-
ta Cl-Latmaus latius egit in *Differt.* feu *Centur. 1. Plantar.* Upfal. 1755;
p'2Q no. 84. ubi hujus plantas defcriptio habetur abfoluta, notavitque,
x^ d herba fit *Bidentis frondofa*, (qu* in *fpec. pi.* p. 832. no. 4. mve-
tfiuit) flos vero -Afieris annui &o.

Bidens pentaphylla, flore radiato. *Plum. Cat.pl Am.* p. 10. *Town.*
Inft. p. 462.

J&IDENS foliis quinatis, ac ferratis.

Ceratocephalus foliis" *Pentapteris*, acutis, ferratis, flore radiato. *Fai!*
Ath Parif.ann. 1720. p. 424, no. 18.

FIGU RA S E C t/i VD ^.

JR^r repens, fimplices demittens bifidas fibrillas.

C^quadmnguferis, ereftus, craflus, acnodofus.

Folia pinnataV quinque in communi petiolo obpofita, ovata, acuminata,
ferrata, inferius ad unum latus truncata.

Flores obpofiti, in communi pedunculo quini, quorum petala in radio
fex oblonga, dentata, glabra; reliqua floris pars, feu discus femirloicu-
lis confat in orbem pofitis, qui femina dant bidentata, unde huic ge-
neri nomen *Bidentis* inpoſitum eft.

Obfervatio. Planta hax hodie fat is frequens eft in Hortis Botanicorum,
& primo Nntuitu kk diftinguit flore suo radiato albo. inftar Leucan-
themi pentaphyllo, obfervandum autem eft, quod auſtor flores multo
maiores pinxerit, quam funt in hqrtis noſtris, nee femina ita divergant,
uti in figura confpiciuntur, vocaturque *Careopfis* folus pinnatis, ferra-
tis, radio diverfi colore a Cl, *Linndo* in *Differt.* upra memorata.

44 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA QUINQUAGESIMA QUARTA,

Ignotlia zbor, Fm//?/fdh, ifore/uteo. Plum. Cat.pl. ^mer.p.j.
MM Town. Inft.p. 164.

BIGNONIA fb/iis pinnatis, foliolis knceolatis, ferratis.

Bignonia foliis decompositis, foliolis incisis, articulis cirriferis. Linn,
H. Cliff, p. 317. no. 5. &spec.pl. p. 625. m. 11.

Bignonia Americana, lutea, Fraxini folio, filius angustioribus. Surian.
Hor*. Sice.

Bignonia Fraxini foliis, coccineo flore minore. Catesb. Hifl, Carol, torn*
I. pag. 6\$. Tab. 65.

Clematis Americana, Fraxini folio Digitalis flore, erecta. Plukn. Pbyt.
Tab. 162. Fig. 4,

Planta arborea, caules gerens Ilgno(o«, <?re/^of?, quorum rajmj
Petiolos gerunt binos communes obpo/itos, qui per intr'.*a!a
Foliola gerunt quatuor vel tria fibi in pinna obpofita, lanceolata, acuminate,
profunde , ferrata vix petiolata, cum inpari fimi extremo,
nullo in exemplari noftro adparente cirrho.

Flores in longam terminantur fpicam, qui monopetal & tubulati fu,*»f,
fed ipfbrum tubus longe brevior eft, quam in vulgaji. Americ. fpec^.
quae flore phseniceo Fraxini folio a Tonrref. vocatur.

*Silfu** longa?, lineares, fimplices ex propnis dependent pedunculis, quara
una per medium fe&a confpicitur in bina fepta divifa, ut feminum
fitus adpareat A, quae coalita feu compreffa, & utrinque alatafiint, ut: in
Eg. B & C confpicitur.

Obfervatio, *Plumier*. folia pinxit fimpliciter pinnata & obpofita, uti in
Fraxino. *Pluknet*. vero folia delineat non pinnata, fed bipinnata, feu
decompo/ita, unde & foliis decompositis indigitata eft haec species a
Cl. Linntzo, cui & folia obfcici vataunc tripartita & pinnata in fpecimini
busficcis, ita ut haec species maxime variare & ludere videatur, ca
terum foliorum figura maxime fimilis eft illis *Bignonia?* vulgaris, feu
Icandentis, ad cuius diftinctionem haec arborea quoque dida eft a *Plu
tniero*, quum cirrhis fit deftituta, fed ipfbrum loco radiculos* forte
emittit ad genicula uti *Hedera*, aliasque arborefcentes p'lanta3, quibus
aliarum'arborumramoscompleauntur, fi poftunt hofce adtingere.

TABULA QUINQUAGESIMA QULNTA.

Bignonia bifolia, fcandens, filius latis, & longioribus, feminelatp.
Plum. Cat.pl. Amer.fi. 5, Town. Injl.p. 164.

BIGNONIA foliis conjugatis, cirrhofis, foliolis ovato-lanceolatis, pedunculis bifloris, fiiquis linearibus. *Linn. Jpec. pi. p_t 623. no. 4.*

Bignonia Americana, fiiquis longioribus, fuſcis, femine fpadiceo magno. *Surian. Hort. Sice.*

F I G U R E P R I M A .

Caulis fcandens & volubilis.

Petioſi oppofiti.

Folia in lingulo petiolo bina petiolata, ovato-lanceolata, integerrima, *Cirrus* longus petiolum communem terminat.

Flores bini in eodem pedunculo, ingentes, expanfi.

"*Sq* uelineares, laeves, longiffimse, & latiflimae, uti in marginali figura una ab longitudine diilecta con(picitur, atque hifce a reijquis in primis diftinguitur fpecibus, sed quas in hortis raro prodit haec planta, castorum pedunculi lunt bifl. tri, quod non ita in reliquis obiervatur fpe- ciebus.

BIGNONIA arbor, Buxi folio tenuiore. *Plum. Cat. pi. j4mer. p. 5. Tourn. Injl. ^ . t 64.*

BIGNONIA arborea, foliis pinnatis, rotundis, pedunculis trifloris.

F I G U R A S E C U N D A,

Quilts lignofus, arboreus, erebus.

Folia pinnata, / o / ^ / rt. fubrotunda, obpofita, feſilia, venofa, minima, vix Pifb majora.

Flores in communi pedunculo terni, ingentes, irregulares, quorum limbus eft finufus, in quinque inaequalia segmenta diflinctus, horum bina fuperiora galeam quafi, tria inferiora barbam mentiuntur.

Siliqua binae lineares, glabrae, acuminatae, digitum longas, cequafedc pendent.

Obferyatio. filumier optime Bignonias diftinguit in ereſtas & fcandentes, feu in arboreas & farmenta, haec species inter arbores numeranda eft. Sed folia acleo obfeure delineata funt, ut fere non aufim determinare, utrum fint fimplicia, an vero obpofita an pinnata, hoc vero mihi videatur probabilius, alioquin enim folia eflent alternata, quod in hoc genere non congruum eft, ac negat folium inpar, delineata vero funt juxta ipfbrum iconem, & nihil certi determino haftenus.

46 PLAKTARUM AMERICANARUM

TABULA QUINQUAGESIMA SEXTA.

B *Ignatia bifolia*, scandens, flore violaceo, odoro; fructu ovato, duro. *Plam. Cat. pl. Amer. p. 5. Tourn. Inst. p. 164.*

BIGNONIA foliis conjugatis, cirrhosis, foliolis cordato-ovatis, floribus racemofo paniculatis. *Linn. Spec. pl. p. 623. no. 5.*

FIGURE

P R I M A.

Caulis scandens.
Petioli oppofiti.

oppofita, petiolata, cordato-ovata, acumina-

Cirrhas petiolum communem terminat.



pendent.

O

hlo Ion lus • "gitur, reJiqua quatuor

scandentis species foliis conjugatis, seu

tinaceft non t fli s ^ P^ 165 in P^ T^ Mi dif

digefcis, f p d floribus baeiffimis, ho ip^ Car S ^ S ? Pank ulam

S ft pp e fles i f scandentes cirrhis diphiliis foliolis gerat

B *Ignatia bifolia* scandens, flore luteo purpurascente, inodoro, fructu ovato, duro. *Plam. Cat. pl. Amer. p. 5. Tourn. Instit. p. 164.*

BIGNONIA foliis ovatis, conjugatis, cirrhiferis, pedunculis uni-

Bignonia foliis conjugatis cirrhosis, foliolis cordato-ovatis &c. *Linn. Spec. pl. p. 623. no. 5. Linn. b.*

FIGURE S E C U N D


Caulis scandens.
Tetioli oppofiti.

Folia m. quo vis petiolo bina oppofita, petiolata nvatfl u r
qaam m priore specie. F^ioJata, ovata, obtufa, minora

Grrbus ex petiolorum alls ad caulem, mi & inter bina foil. ^
excrefcit juxta iconera. na foil. ade xtremum

Flares in longum excrefcunt racemum ad pedunculos bino, «k_h r
rum quivis unicum modo profert florem. l_n ^ "J_z I_{ppofitOs} » quo-
l^hbus reliquiae partes mogis regulares nfukool^ f ^ V ^ orum
m pnore planta, quam ab hfcpenitus ^ l ^ T ^ T ^ ut quam

Obferyatio. Inter flumienanas icones hujus & alia species eft; quas *Clematis quadrifolia*, flare *Digitalis lutea* canticulis aduncis vocatur in *defor*, *pi Amer. p. 80. Tab. 94.* quae *Bignonia* foliis conjugatis cirrho brevifimo arcuato, tripartite *Linn. spec. pi p. 623. no. 3.* ubi vide reliqua.



TABULA QUINQUAGESIMA SEPTIMA.

Bignonia arbor, folio singulare undulato, filiis longissimis, & angustissimis. *Plum. Cat. pi. Amer. p. 5. Tourn. Inft. p. 164.*

BIGNONIA arborea, foliis ex uno centro ternis, lanceolatis, & undulatis, filiis angustissimis.

Bignonia foliis simplicibus cordatis, caule eretto, floribus diandris. *Linn. Spec. p. 622. no. 1.*

Tlanta arborea: Caules lignofi, erecti.

Folia termi ut cunqae uno ex ortu, lanceolata, iinuosa, acuminata, ve-

rioſa, petiolata, obpofita.

Cin-hi nulli.

•/?if in caulibus exrema parte corymboſi, in pedunculis obpofitis, regulares, tubulofi, limbis crenatis, feu fimbriatis, diandri, Itamiaibus binis antheriferis, reliquis ternis cafratis juxta Linnaum.

Siliquid lineares, longissimae, plures simul dependentes.

Obfervatio. Haec planta a *Ql Linnxo in Hort. Cliffbrt. p. 317. capLa,* *talpa* vulgo dittajungitur, licet *Plumierii* icon maxime ab ea diliterat foliis angustioribus magisque lanceolatis, qui vero legit plantas vivas, sepius obfervavit in folo spontaneo nee culto, folia effete longe angustiora, & per culturam in folio pingui ac laetiori longe aliam sepius induere formam, faltem duplo&triplolatiōm effe, q^dificrīmēn̄jnhō/tis quotannis etiam videnius in plantis, quae in fiaſibus fervantur, vel suo committuntur genio in libero folo. Caeterum convenit hec planta ficyribus hevibus, ipfbrumque corolla crenata, floribus plurimis paniculatisj filiis teretibus angustiflimis & longissimis, caule erecto arboreo, nee scandente, & tandem quod primarium eft foliis simplicibus e regione plerumque ternis, quae nota quam maxime fpecialis eft; unicuique, quod'dubium mouere poffet, eft foliorum figura angustior in ico-
ne *Plumierii* 5 adeoque haec planta, fi non eadem fit cum *Cfltdpa*, faltem ejus varietas habenda eft foliis angustioribus.

Confule perro *Catesbie & Kampferi* iconem in *Am&niU exotic*, p. 842. videbis obfervationis problema.

48 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA QUINQUAGESIMA OCTAVA.

B *Ignonia* f̄candens bifolia & trifolia, ligno cruce f̄gnato. *Plum, Hifi.*
MJJ: T. v. p. 134.

BIGNONIA foliis conjugatis, cirrhofis, foliolis cordatis, foliis imis ternatis. *Linn, H. Cliff, p. 317. & Jpec. pi p. 624. no. 6. & Roy pr. fi*

Bignonia fcandens, flore atro, flavo, minori /fūbtus albičante &c. *Gronov.*
% *Vng. p. 11.*

Pseudo-Jlpocynum {olWcuYis maximis, obtufis, feminibus amplissimis, alis membranaceis, *Morif. Hift. pi torn. 3. p. 612. Sedh 15. Tab. 3. Fig% 16,* Palega Pajaneli. *H. Malab. torn. 1. 7^44. pag. 77.*

CauJis volubilis, pun6lis inaequalibus (caber, feu muricatus, quo primo ih-tuitu dignof̄citur

Medulla caulis & ligni transverfini f̄e6ta crucem reprseientat, uti in f̄gmento ligni transverfim diife6to marginājī A adp'aret, quod in Convolvulo Turbith di6lo etiam obfervatur.

Folia inferiora ternata, fbperiora conjugata bina, cum-, in afisiujus generis f̄neciebus inferiora folia fint folitaria, feu fimplicia, peculiare eft in hac pi ant a, quod in petiolo communi cirrhofb oriantur, funtque hsec folia cunfla petiolata & ovata, non vero cordata.

Flores ex caule racemofi, bini oppofiti in curtis pedunculis, funtque ingentes, longifTimo conftantes tubo, oris equalibus, intus quatuor confpiciuntur Itamina, bina longiora, bina minora, cum piitillo in medio longiffimo fuperne bifiao, uti in Figura ieparata B confpicitur.

Germen breviflimum eft conicum & coronatum C.

FruClus optime reprfefentat capfulam vulgi, quam Tabaco replent, fe-cumaue portant, uti notatur in *H. Cliff. I. c no. 3*

Objervatio. Hujus & alia obcurrit fpecies, quae in communi petiolo ex uno centro quinque gerit folia ovata ac petiolata, floresque ejusdem funt fermse illi^ Catalpae, quaeque *Bignonia* arbor pentaphylla, flore rofeo major & minor, fwquis pknis a *Plum. Cat pl.Amer.p. 5.* vocatur. Eftque *Bignonia* foliis digitatis. *Linn. H. Cliff, p. 497 & Jper\pi p. 624!* no. 8. quum vero haec optime a *Catesb.* in *Hift. Carol torn 1 Tab W.* lit extobvta, fupetftuum putavi earn denuo delineare ac defcriber'e.

Bignoniam hoc genus vocavit. *Town. I c.* in honorem illufr. Abbatis *Bignonii*, quem fumma fēmper coluit obfervantia, illius vero tredecim ibi enumerat fpecies, fed quum floribus maxime inter fefe differant, ad varia forte reduci poſlbnt genera.

TABULA QUINQUAGESIMA NONA.

Bhai amplissimis foliis, florū vafculis coccineis, *Plum. Nqv, pi. gen.*
p. 50.

MUSA fpadice ere6lo. *Linn.Jpec.pl.* 1043. no. 2.

Tnmcus est *Calmus* humilior quam in *vulgzriMuJh*, teres, glaber, feife
expandens, & terminans in

Folia utcunque fex, ovato-oblonga, obtusa, patentia, feu plana, ere&a,
glabra, integerrima, nervis transversalibus & linea longitudinali meclia
ad angulum re&um egredientibus, quales nervi naturali suo decursum in
folii majoris fragmanto confpiciuntur in infima tabulae parte delineati.
»*Folia* autem bina marginalia Jacerata lacinias exhibent a ventis agitatas,
uti in Musa vulgaris foliis etiam faspe fir.

Petiolus quisvis folium iuftinens glaber e(l, bafi latiore reliquos inftar vagi-
nae ambiens, fenfirn fliperne magis contractus & canaliculatus, dein
fere ad dimidium prope folium in faprema parte teres est, atque per
totam fplū longitudinem decurrit, & ad ejus extremum evanescit.

Spatix in ipfb caudicis centro ortum dicit inter vaginas petiolorum, fimp-
lex, ere&us, teres, glaber, varias in fuprema parte producens fpa-
thas alternas & inbricatas, intra quas flores phures conjundi continentur
mi in MU/Q.

Spatba hse oblongo-bvata?, feu ovato-acuminatas/quam arcliflime fibi'inc-
cumbunt, plurimumque gerunt florū acervum, uti ad Lite A. adpar-
ret, e quibus

Ifyres exrefcunt monopetali, ringentes, in duas partes fefeti, quarum
superior eredla rech'nata, inferior connivens & declinata, uti ad Litt.
B. adparet, cum Neclaro C. & ftaminibus fex fubulatis Jongiflimis e-
re6lis D. germini E infidentibus.

lyifSlus est carnofus, trigonus F, obtufts, foetus feminibus irregularibus
G duris & rugofis, oblongis H, quee rece^ptaculo c15ltsfr5xjari4i3hs>?enti
& fterilia funt.

Observeatio. ^Variet haac planta fru6lu coccineo, fubnigro, & variegato,
uti notatur \Phmierio^ qui licet hanc separaverit a vera Muja^ ac fin-
gulare ex^utrisque conffituerit genus in novis fuls Plantar, ggneribus,
adeo tamen nofra similiis eit Mufa, ut vix differentia (peciftca detegi
queat, ac naturae vim inferre deberemus, si ad varia hse reducantur ge-
nera, unde & fagaciffimus Linnaus has primus optime ad unum re-
tulit genus mfpec. pi. I c. diftinxitque eas in MUSAM Jpadice nuftmfa
dzfpadice eretto, quae nota realis in binis hicce obtinet plantis.

Plunder, verb dick, pifillum abire in fru&um, cum in Mufa calix fiat
fru6lus : Optandum itaque eflet, ut aliquis in folo nata/i ffU(5)ficiatio-
nem hujus accuratius examinaret.

N. B. In ordine jam fequeretur Icon Bonti&^ quae B O N T I A arbo-
relcens, Thymeleese facie vocatur a *Plum.* in nov. gen p, 32. %ubi vi-

PLANTARUM AMERICANARUM

de ', fed quum hsec quam exa&iflime fit delineata & defcripta in *H. Eltham.* pag. 57. Tab. 49. fuperfluum foret, earn hie denuo exhibere.

T A B U L A S E X A G E S I M A .

BOrbonia fru&u oblongo, nigro, calice coccineo. *Plum. nov. pi. gen. P<%*4.*

LAURUS foliis lanceolatis, nervis transverfalibus, fru&us calicibus baccatis. *Linn.H. Cliff, pag. 154. spec. pi.p. 370. no. 7. Roy. pr. p. 226. Gronov.fl. Virgin, p. 46.*

Launis Carolinienfis foliis acuminatis, baccis cseeileis pediculis longis nigris infidentibus. *Catesb. Hjil. Carol, torn. 1. pag. 63. Tab. >63.*

Laurus folus acuminatiSj florc albirante₃ baccis casruleis, pediculis nigris' infidentibus. *Clayt. Ft. Kirg*I. c.*

rjlrbor inftar reliquarum *Lauri* fpecierum elegans , truncum, gerens rectum, glabrum, ramosque lignolbs, in quibus

Folia magna, glabra, utrimque attenuata, feu lanceolata, acuta₃ venofa, nervis distincla transverfalibus, vix petiolata.

Flores pedunculis longis. infident ex foliorum alis ortum ducentibus, qui in plures minores fubdividuntur, ac corymbum florū formant elegantissimum, hi autem in lēx petala fēe expandunt; quorum unus Aab antica septemfidus, quod rarius, alter B a poftica partefexfidusconficitur in tabulae margine, quales flores plerumque in Lauris exotic^* obſervantur.

Frudus autem eftglandiformis,carnofūs, in bina fegmenta divifūs, uti in Figuris separatis patet, ubi ad Litt. C Bacca integra eft fru&u oblongo , D eft baccvt globofa,rfeniiine. transverfim difTe6to.

Ovferwtiflr V??iciv'haec arbor fructu oblongo, 61 ḡtoboso, uti 6c fruttu ex aureo virefcente juxta *Plumier*, qui fingulare ex hac arbore confftituit gonus in (uis nov. gener. p. 4* quum vero proxime ad *Lau*nim acce[^] dat, Cl. *Linnaus*, & cum eo alii pneclari Botanici earn Lauro faferuerunt, ne tamen memoria principis fummi, & Botanices: ardendiffimi, *GastomisBorbonii* interiret, in ejus honorem aliam plantarum familiam *BorbonU*: nomine indigitavit *Linnaus*, ab hac tamen diverfiffimam, qua? recenfetur in *spec. pi. pag. 70J.* de qua dicit in *H. Cliff* p. 494. -,, 'Genus, quod fub *BorbonU* nomine condidit *Plumier*, cum ad *Lait-* „, *ros* amandari debet, recipio nomen Magni Principis G A S T O N I S „, B O R B O N I I ad defignandum fēmpervirens plantarum novum ge- „, nus, ut fancla fit apud omnes, qui rem Botanicam amant , tanti „, Herois, tanti Botanici, Botanicesque cultoris₃&promotoris immor- 35. talis memoria.

TABULA SEXAGESIMA PRIMA.

Borbonia fru&u corallino, flore pentapetalo. *Plum, Hifi. Mjjl T. VL*
p. 14.

L A U R U S foliis compofitis, obovatis, obtufis.

Arbor ramofa, caules gerens fcabros , e quibus

Folia lgngis in pinnis excrefcunt pinnata, feu compofita, obverfe-ovata,
obtufa, venifa, integerrima, per bina paria , inpari extrernurn clau-
dente, petiolata.

Flores in ramorum fammo corymbofi, pentapetali.

Frutlus Olivce formes, feuNuces oblonge,glabrae, pericarpio infidentes
dentato, pedun^afetce, nucleum continentis ovatum , uti in marginâ-
libus cõfpicitur feparat^s partibus, ubi frutus integer cum nucleo in-
tegro & difle&o exhibetur.

Obfervatio. Prior *Borbonia* certiflma erat Lauri fpecies, haec vero arbor
toto genere diverfa erit, quamvis fru&us ipfi fatis fimilis fit, nullum
vero exemplum, quantum fcio, eft in hoc arborum ordine foliis com-
pofitis feupinnatis, uti haec *Borbonia*, adeoque genus erit longealiud,"
fed ignotis ftaminibus & piſillis nemo facile ex Figura fbla determina-
bit ^ ad quodnam pertineat, quod poſterioris ergo erit curse ex floribus
jpfius arboris det*egere.

N. B. In coileftione harum plantarum fequitur icon

Breynia Elseagni foliis , quum vero haec jam optime fit iconē expreila,
ac defcriptione illuftrata a Joanne Philip. *Breynio* in novaprodromorum
Jacobi Breynii editione, (uperfluum puto earn denuo exhibere, re-
cenfio itaque elegantiffimae hujus arboris in memoriam tantorum Bota-
riicorum denominatae hie fiifficiat, de qua porro vide *Plumier, nov. pi*
gen. pag. 39. & Royen. pr. pag. 476. ubi vocatur *Breynia* foJiis ^oblon-
^go-ovalibus, uti & a *Linn, fpec. pi. p. 503.*



TABULA SEXAGESIMA SECUNDA.

Dj3Romelia pyramidata, aculeis nigris. *Plum. nov. gen. p. 46.*

B R O M E L I A foliis radicalibus dentato-fpinofis, caulinis integerrimis.
Linn.fpec. pip. 286. no. 5.

Radix pufilla, Jfimplex, vix fibrofa.

Folia radicalia, latiffima , canaliculata, inferips fefe ampleſſentia, fero-
cia, dentato-fpinofa, uti in 4nanaB fojiis.

51 PLANTARUM AMERICANARUM

Caulina, feu floralia funt inermia, integerrima, lanceolata, nervosa.

Florum racemos, feu culmus fimplex elt, pyramidalis, inferius folia producens, superius, ubi haec definunt, flores profert simplices fine squamis, feu ttaginis, quae in frumenti adfunt.

Flores funt tripetali A, ftamina gerentes fex, ejusdem cum corolla longitudinis.,

FruBus eft oblongus B, qui per medium fechis C femina exhibet ordine locata, ac transverfim feclus ftellulam format D ipfbrum fitu.

Semina flint longiufcula, glabra, cylindracea fere E.

Obfervatio. Quaerit Cl. *Dilknius* in *Hort* Eltbam.* pag. 320. num haec planta fit eademcum *Pinguin* Americ. quod»mihi minus verofimile videtur, cum folia noftrae plantae Spathacea, quae in caule incegerrima pxcrefcunt, adeo fint evidencia, ut primo intuitu earn diftinguant, que in Dillenii planta feu *Pinguin* non adparent, fed ipforum loco fquamæ floribus subcrefcunt, uti in frumente specie, dein fructus inter fefe etiam diffexunt, uti exFigurarum comparatione  stat.



TABULA SEXAGESIMA TERTIA.

B *Romelia pyramidata*, purpurea, foliorum imis aculeatis. *Plum. Bift.*
MjJ. T. v. p. 59.

B R O M E L I A foliis radicalibus brevibus & aculeatis, caulinis longiflisis & integerrimis inermibus.


Radix ratione plantae pufilla, fimplex, vix fibrofa.

Folia radicalia breviffima, feflilia, lanceolata, ad orss Ipinofa, prope radicem minima: *Caulina* fblitaria, omnium longiflisma, integerrima, enfifbrmia, avenia, pendula.

Culmus fimplex, craflua, wticulatus, arundinaceus, in fummo gercns flores in nvrpm; jtf/i W&Z&, inter fquamas tamquam in Ipatha latentes.

Florum corolla tripetala eft A, quorum ftamina fex longiora e flore eminent, B, piftillum autem C ftaminibus duplo longius eft^ und' & ad Hexandriam monogyniam merito a *Linnao* hoc genus refertur.

FruBus oyatus eft D, in tria loculamenta divifus E, fcetus feminibus longiufculis, ac fere cylindraceis F.

Obfervatio. Haec planta fefe maxime diftinguit a reliquis B R O M E L I I S foliis caulinis enfiformibus, integerrimis, longiflimis, pendulis de genere autem nihil certi ftatuere audeo, fed quum ftamina pingat longiora *Plumier.*, quam folent in hoc genere occurrere, & frulum Itar capula? dependentem ex longo pedunculo, nee calicem coro turn, quum cañix juxta *Plumierum*, in *Bromeliis* necefario ah* beat, in fru&urh ovatum, hincmagis accedit ad *Agave* fen 41 ^  *TMtoes genus, quam ad *Bromelias*.

54 PLANTARUM AMERICANARUM TABULA SEXAGESIMA QUINTA.

¶

J3 *Runsfklfici*n flore albo, fru&u croceo, molli. *Plum. nov. gen. p. 12.*

BRUNSFELSIA. *Linn.spec.pl.pag. 191.*

Plmtafrutefcens •--ramps gerens lignofbs, fcabros, feu tuberculofbs*
Folia oblonga, obtufa, feu obverfe ovata₃ integrerrima, venofa, petiolata, in fummo circa flores minora.

Flores plures fpeciofi in apice ramorum extrefcunt monopetali, ex Iongo villofoque tubo fefe expandentes, & divisi in quinque fegirenta finuofa, ex quorum calice piftillum erigitur longiflimum A, quod excrefcit in fruttum globofum B..moJlem & carnofum, vide *Ludwig. dt' figoy entr. 75. no. 1.*

Semina in hoc fru&u in orbem locantur inter corticem & carnem ad latera pericarpii regularia, lubrotunda, uti in fru6liJ <c difledlo patet, ini» de convenit proxime ordine natural] cum *C/iteskaa*.

Observatio, *Plumieriushanc* pjantam BRUNSFELSIAM dixit, facramque fecit memorise *Othonis Brunsfelfii*, cui primus in Germania Herbariam medicinam fere exftin6lam e tenebris denuo eruere tentavit, fcripfitque Herbarium tribus tomis comprehenfum, inpreflum Argentor. 1537. in Folio.

TABULA SEXAGESIMA SEXTA.

B *Ryonia Olivae fru6lu rubro major. Plum. Cat.pl. Amer.p, 3. Tourn., in/lit, p> 102.*

SICYOS foliis cordatis, trilobis, ferratis; floriim petalis lirlearibtis.

FIGURA PRIMA.

*Caul*w flexufus, ^Rn^tUSjct?^?^61" ac viridis,

'Folia nlwu'a, cbodata, ferrata, acumioata, petiolata.
drrhus (implex ex petoli ala oritur.

Flos in quinque petaia linearia diftinftus.

Frutius glaber, Oliv® forma & magnitudine, fimplex.

Observatio. Hujus alia species apud *Plum** in *plantar. Ameri'c. defcript* invenitur, pag. \$j. Tab. 97. quis Bryonia racemofa, foliis Ficulneis vocatur, cujus tamen flores quam maximè ab iliiis nofrse planta: difFemit, qui fmugulares aclineares quafi funt, quales nulla mihi in hoc genere nota planta gerit, ita ut fine dubio din^{fr}infita aliis generis penitus fit species j nee ad *Bryonias* referenda, fummam vero habet fimilitudinem cum *Sicyos angulata*. *Linn. /pec. pi p. 1013.* fed fru&us df" fert. Flos etiam adpi&us reprsfentat conum intra corollam, quali re eft fub corolla in *Sicyoide*. Frudus porro glaber eft, nee ec. ^{1. 3.} K. tus, quo differt. Si eniu fruclus in planta hac *Plumierii* fit n mos_v ad *Sicyos* pertinet, uti & facies externa laudet. ^{nio}nofper-

Brp*

j&Ryotia Olivai fructu rubro, minor. Plum. Cat.pl Amer. p. 3.

M E L O T R I A foliiscordatis, quinquelobis, dentatis, florum petalis denticulatis.

Mehtria Linnti H. Cliff, pag. 490.Jpec.pl. p. 35. Roy. pr p. J2&

Cucumis parva, repens, Virginiana, fructu minima Plukn. Almag. p.

I 3. Tab. 85. Fig. 5.
Cuqlmis Sirp&s murinus. Rumph.Herbar.Ambon.lib.9. Cap. 41 & 73.

FIGURE S E C U N D A.

Caulis huius plants eft debilis, filiformis, tenuis, Ipvis.

Folia plâna, fcabraj^uinqueloba, haud profunde dentata, bad cordata

Gh-büs iu*xta petiolum excrefcit fimplex, folitanus, involutus.

oPedunculus ex ala folitarius; longiffimus, fimplex,- uniflorus.

Fr»fl»J Olivs-formis, glaber, pendulus.in noflra planta aliquando germ-nus juxta iconem.

Obſervatio Qui -pleniorem hujus plantulse defiderat defcriptionem, vi-deat *H·OUffort. & Rumpbii Herbarium Amboinenfe*, mire autem va-^fi~~st~~ hsc ratione loci & coeli externa sua facie modoque crefcendi.

TABULA SEXAGESIMA SEPTIMA.

BUcephahn fructiTracemofo rubro. *Plum, nov. gen. p. 52.*

BUCEPHALON. *Linn.Jpec.pl. pag. 1100.*

FIGURE P R I M Z

Pfontâfrutefcens, caules gerens lignofos, alternos.

FA ovata,"acuminata, finuofa, integra, venofa, alterna, breviihrnis craflisque petiolis infidentia.

Spica ilorum ex singula caulis ala folitana.

llores feminini in icone confpiciuntur, funtque apetah, fed conftafif .ex duobus *ftammifa* ereftis ««,& inftar comu inflexis squae germini infident ^, unde nomint derivatio intelligitur.

Flores vero "maſculini inftar punſtulorum delineati funt in icone, quorum formam ex figure nemo determinare potefit.

Fruthiseft ovatus, ftriatusc, uti videturngonus,acuminatus, &carno-fus, contnetque officulum fragile d, feu pmamen, uti in difTe&ofruo tuiconfpicitur, quod nucleus includit fubrdtuhdum, unde eilbacca

56 PLANTARUM AMERICANARUM

unilocularis, oblonga, flriata Szc. vide *Ludwicb. definit. gener. pi. pi. 313.*: W. i'048..

Obfcrvatio. ISiomen *Bucepbalon*[^] feu *Bovis caput* huic generi datum eft a *Plumierio*'*obfloris* fernineifimilitudinem, quam habent ftamina & Embryo cum capite bovis cornibus fuis ornato, quod peculiare eft in floribus; fed hoc idem quoque obtinere in quibusdam fru&ibus feu fili quis, haud incongruum mihi vifum fuit re ipfa hac occaione demonitr'are, unde & talem fijquam huic Tabula? infculpi fimul curavi, qua per Nautam nofratem olim ex Sina delata fuit, quamque reperi in Gaphophylaceo inrtructiffimo *PP'ilbelmi van der Meuien*, fcrutatoris rerum naturalium curiofibTimi & expertiffimi, quiufe amiciffime hanc mecum communjcavit, ex cuius liberalitate benevolu hanc publici juris facius.

Eft itaque filiqua Isevis, fufca, variis prominentiis insequalis, feu protubefans, utrinque defirrens in apicem attenuatum, deonfum flexum, cornu bovinum perfe6te referentem, totaque filiquafimuKi.mpta caput ffimuj[^] tur bovinum cornibus deorfum flexis; bi i'ero haec manibus agitatur vel moveatur, officulum feuiucleum praebet interne fbnorum, ita ut non dubitanduui fit, quin re'verà li&c subfrantia fit filiqua unilocularis, cornea, & cornuta, alicujus fruticis vel arboris in *Sina* crefcentis, quam ulteriori curae & inveftigationi demandamus illis, qui hanc all quando frequentant regionem,* rerumque naturalium ftupenda inquirunt, & fiunm& venerantur in Dei gloriam admiratione.

Capeba folio orbiculari, non umbilicato. *Plum, now gen. p. 33.*

GISSAMPBLOS foliis margine petiolatis, integris. *Liniufpec. pi p. 1032. no. 2.*

FIGURE S E• C U N D A.

Caulis feme*rotundif*, *flexuof*if, rotundus, glaber.

Folia folitaria, alternate, orbiculata, integerrima, glabra, venofa, longis-infidentia petiolis.

Flares racemofi, penduli, per intervalla in umbellulam quafi collefti, cui fucrrefpit foliolum fubrotundum, acuminatum.

Flofculi funt rofacei, ex quatuor petalis conftru&i, mafculini, steriles, in fuprema racemi parte locati. *Feminei* autem ab his separati *fcnOum* piqvferunt, quietf [^]molliis, fphserica, continensym[^] fubrotundum rugofum, uti haj. partes exhibentur separatae in *Pkmkrii* Tab 29.

Obferyatto. Hujus alia obcurrit fpecies, qu[^] duplifem habet varietatem folvo osbicukri, limbilicato lasvi, & umbilicato tomentofo, quffi *Qematis* baccifera, glabra, villofb rotundo, & umbillc[^] foUo

Tlumier. In *defcript, PL Amer, tag, 7&. Tab. 91* eftoue *Ciffnmhel* [—]C*

1031 • no. 1. ubi vide reliqua.

H>y JP P^L P-

Hæc

H&c vero differt foliis apice non retufis, & petiolis finui folii infertis/ nee ipfa difco, quum umbilicata funt folia: caeterum oblervandum eft, quod in hoc genere fint mares & feminse in diftin&is etiam plantis, uti in *Smilace*, *Rayania*, & *Diofcorea*.

TABULA SEXAGESIMA OCTAVA.

C'*jBfalpina* polyphylla, aculeis horrida. *Plum. nov. gen. p. 28.*

C-/ESALPINIA foliis duplicato-pinnatis, foliolis obovatis, quataor jugis, floribus fpicatis.

Cqfalpinia foliolis s^Dvatis integerrimis. *Linn. fpec.pl. p. 380. no. t.*
Pfeudo-S-ant alum croceum \$loan. *Cat.pl. Jam. p. 213. Hiji. Jam. torn. 1.*
P. 184. Catesb. Hiji. Carol, torn 2. Tab. 51.*

Planta arborea, fpinis, vel aculeis numerous, .breviffimis , fimplicibus horrida.

fifflid duplicato-pinnata. *Foliola* fubovata , integerrima + venofa, qua-*P* tuo^ utcunque pafia, nee retufi, vel obverfe-ovata uti in *Catesb. icone.*" *Stores* in fpicam coJlefti, monopetali, anomali, juxta iconem pentandri, ljuum juxta Linrtæi fyftema decandri deberent efle, quorum piftillun*= a in Tabula separatum exhibetur.

Legumen planum,acuminatum, glabrUm, polyfpermum, fabas continens •> oT)lon^as, ftriatas, uti in' difle&a & aperta filiqua b confpiciuntur, vi-^{T^de} *Ludivib. definit. gener.pl. p. 313. no. 1049.*

*Obfervatio** Poft Phmierii genera edita , in quibus hanc unicam modo recenfet, plures jam innotuere hujus generis fpecies, quarum quatuor n^bet *Linn. infpec. I.e.** ceterum hoc genus in rnemoriam magni *An** "tre*a Cafalpini* nomen fuum obtinuit, qui Romse inclaruit fcriptis suis, ac^raecipue Hifloria plantarum, quse'I'^effa^'eOT^sf^'''^j^qu^ to, turn & libro de metallicis Romae 1596.

TABULA SEXAGESIMA NONA.

Cjinito Colio fubtus aureo, fruftu Oliv^ formi. *Plum. nov.gen. p. iCv*

CHRYSOPHYLLUM. *Linnjpec.pl'p. 192.*

Chryfopbyllum foliis ovatis, fuperne glabris, jarallde ftriatis, fubtus to-mentofis, nitidis. *Linn. H. Cliff, p. 49^*

59 pLANTARUM AMERICANARUM

jinow Foliis fubtus ferrugineis, fru&u majore, lsevi, purpureo, fême ni-
gro, partim rugofb > partim glabro. *Sloan, Cat. pi. Jam.p.* 206. *tiifi. torn.*
2. p> 170. *Tab. 229.*

Pknta arborea, caules gerens lignofbs, glabros, in quibus

• *Folia* alterna; ovato-lanceolata, integerrima, eleganter & parallele ftria⁴-ta, fubcus tomentofa, petiolata.

Pedunculi laterales ex fingula fblii ala, breves, uniflorij numerofiffimi > in orbem pofiti, penduli.

Flores corollam habent campanulatam, laciniis fex patulis, fex vero alterpis interioribus conniventibus.

Stamina fuit filamenta quinque fubulata, & cum laciniis corollse interio- libus alternata. *Stilus* unicus, *ftigma* fimplex.

Fruttus eft mollis, carnofus, oblongus, feu Oliv^e formis, officulum feu putamen gerens oblongum, quod nucleum ccentinet acuminatum, femen autem calyptre involvitur, perfe&e uti in *Lifcio*, unde patet efts adfinitas, quodque in figuris marginalibus exhibetur, ubi Litt. A eft fewen intra roginam. B «{t vagina feminisjfeu calyptra^ quam \$\\Aril- lum vocant. C eft, femen niidum.

Obſervatio. Hujus generis altera eft varietas, quae fruſlum gerit Malifof- mem, qualis in *Figura Sloanea* adparet, cum qua conyenit *Cainito* • fructu Maliformi *Plumieri* L

Hanc arborem eſte ex ordine illo naturali, quern *Veprccuhmi* dixit C> *Linnxus'm Pbilof. Botan** pag. 33. no. 54. ex toto ejus habitu videtur verum* Folia enim gerit akernata, flores plures in pedunculis prop»-iis ad alas uti in *Rhamnis* &c. Calyptre autem feminis hanc probe diftinguiit a *Rhamnis*, a *Celaftro* autem differt fruclu monococco, cum in *Celajiro* fit trilocularis, & femina fimili arillo inclufa.

Nomen hujus generis *Cainito* eft Barbarum Americanum, quod ex Cl. *Lift** n&i dodrina rejiciendum eft, in cujus locum fubftituit *Cbryfopbyllffln*, quia folia hujus generis fubtus colorem gerunt aureum, vide & *CL Ludwicb. definite gener.* p. 23. no. 83.

TABULA SEPTUAGESIMA,

Camaria trifolia, purpurafcente flore. *Plum, nov, gen. p.* 32.

• Lf NT AN A foliis ternis, fpicis oblongis imbricatis. *Linn.fpec?pl.* 1
62,6. no. 1.

Myrobatindum fpicatum, Viburni foliis ex adverlb ternis. *Vaill aft. Paf-*
rif. ann. 1722. /> 277.

-*Cauks* lignofi, quadragonis ftriati, glabrL

Folia e regione terna, ovata, ferrata, acuminata, vix petiolata.

Pedunculi ex alis fblitarii, nudi, obpofiti.

*Flares fpicati, S*x Yt oblonga * absque involucro imbricata, Flores autem monopetalii perfonati, & anomali juxta *Plum. nov. gen pag. 31.* quorum unus in Tabula prona parte A. alter fupina B. confpicituf. C eft collieblio embryonum, quibus flores infident. D eft *Frutlus* mollis, feu bficca, in qua locatur *officulum* E fabrotundum.*

Objervatio. Diftin&iffima eft foliis ternis ad genicula ortis, fed quaerit Cl. *LinMus in/pec. pi. p. 627*, an fit varietas *Camara anniia*, % quurr* tota fua ftru&ura ita convenient inter fe, praefertim quod in hifce duabis fpicæ fint admodum oblongae, & foliolis fubulatis diftin&ae, quod non ita in reliquis obtinet fpeciebus, unde haud inepta eft eujus propofitio,* quum folia ca?terum convenient. Nam folia obpofita in plantis faepe luxuriant foliis ternis, uti quotannis videre eft in *Lytbro^ Lyfitnacia, Anagallide*, aliisque non paucis.



TABULA SEPTUAGESIMA PRIMA.

C'Amara a[ia, fiore variegato, non fpinofa. *Plum. nov. gen. p. 32.*

ANTIANA foliis obpofitis, caule inermi, ramofb, floribus capita*-to-umbellatis. *Linn. fpec. pi. p> 62j.no. 3.*

Lafiana foliis, obpofitis, petiolati SJ floribus capitatis. *Linf. H. Cliff, p** 319. *Roy.pr, p.\o<).*

Viburnum Americ. non fpinofum, Meliflae foliis, floribus coccineisi *Pukn.^Almag. p. 38i. Tab. 114. Fig. 4.*

Viburnum Americ. Urtcae foliis, Lamii odore, floribus miniatis. *Conimel. H. Am/I. torn. i.p.i<\$i. Tab. 78.*

Camara Ruppii Flor. *Jenef. p. 101.*

Caenfa Lamii folio, flore mifto. *Dill. H. Eltham. p. 64. Tab. 6\$.*

Camara Meliflae folio, flore variabili. *Dill. JH^Elfbp.6\$. Tab. 6\$.*

Camara MeiifTa: folio, -floribus luteis T'^^//.i^J^;^<r^S^v^T!S^: 172⁵
pag. 176,

FIGURE PRIMA.

Ohfcrmtio. Inter omnes Americanas plantas hxc vulgatissima ac ~~notifi~~-ma eft planta, queque per ramulos terras conminos quam facit^me propagamr, quumque haec a variis auitoribus, inprimis in *H.A'M^Sc Eltham.* (ubi & aliae hujus obcurrunt varietates) fit defcripta, inutile foret eam^lenuo defcribere, notatum autem volo, mire variare hanc plantarn, faciemque fuam mutare, fi liberiori aeri terraue committatur; fi vero in fiftiH vel Hypocaufto fervetur, penitus diverfa adparet, uti & altera is hortis noftris hujus varietas eft, quae caulem ramosque gerit aculeatos, unde & fpinofa a *Plmnierio* haec voeatur.

60 PLANTARUM AMERICANARUM

C*Amara* arborefcens; Salviae folio. *Plum. nov. gen. p. 32.*

L A N T A N A inermis, foliis obpofitis₃ ovatis₃ dentatis, floribus capita-to-umbellatis, foliofb-involutcratis.

Camara Scorodoniae folio fpplendente, fibre croceo. *Dilkn. H. Eltham. p. 67. Tab. 57. Fig. 67.*

Viburnum Americanum, odoratum, folio parvo, orbiculato, floribus & " baccis folio interceptis. *Plukfi, Almag. p. 386. Tab. 114. Fig*5. Herm. Par ad* Batav. p. 384.*


FIGURE S E C U N D A.

Planta frutefcens, tenerior prsecedente, caules genens obtufe quadranguJos, quortim ramuli teneriores, fed longiores^{Vl"} & rotundiores.

Folia oblongo-ovata, dentata, fibi obpofita, ablique venofa, petiolata, pallide vircmia.

Flores in famulorum fummo oriuntur, longis infidentes pedunculis ex fo-
Jiorum alis obpofitis, atque in umbellatum capitulum involucro folio-
fb cin6lumcolliguntur, colons eleganter crocei, quorum forma ex *Phi-*
mierii & *Dillenii* descriptione ulterius dignofci potest cum reliquis ipfo^
rum partibus.

Ob/ervatio. Cl. *Linnaus* fynonymon *Viburni* odorati *Americ.* *Pluknetiz* in *specchb. pL* junxit *Laniana* fuae annuse, tanquam riae varietates eflent, led quum *annua* flores in fpicam magis, & nofrse in capitulum umbel-
latum involucro foliofo cindum exrefcant, hinc potius separandas cen-
fiii, atque illud fynonymon huic junxi plantse, quee a *Lantana Camar-a*
spec. pi. no. 3. etiam differt, quod umbellaj nun nudae, feu aphyllas fine,
fed foliolis ornatse, unde & foliofb-involutcratas has dixi ad aliarum aiP
tindionem.



TABULA SEPTUAGESIMA SECUNDA.

C*tAmeraria* lato Myrti folio. *Plum. nov. gen. p. 18.*

L X M E R A R I A foliis fubrotundis, utrimque acutis. *Linn. H. Cliff**
fa. J^ec. pi. p. 210, no. i. Roy. pr.p. ^i-\$t

FIGURE P RIM A.

Folia fubovata, acuminata, fubtus transverfaliterparallelæ-flriataper vaf₃
feu nervos qui transverflm e nervo longitudinali ad marginem excur-
runt^ntarfibrarum parallelarum.

Flo-

Flores supremam ramorum occupant partem, fintque monopetali, rotati* quinquefidi, tubulofi.

Frudus plerumque geminus est, filiquofus, auritus, per longitudinem dehincens, femina condens oblonga, foliacea, & fquamatis pofita, uti in figuris marginalibus adparet ad A & B.

Obfervatio. Pertinet hoc genus in ordine naturali ad Contortas *Linnai* Phil. Botan. p. 31. no. 29. una cum *Tnbernamontana*; facilis in multiplicando ^genera *Plumierius* haec duo diftinxit genera *d.f^inca* fblummodo ob frudus foiliculos divaricatos, caetera enim omnia convenient.

Camerarium porro separavit *PJumier*. ob foiliculos tantum ab bafin utramque lobo inftru&os a *Tabernamontana* genere, Fruftus autem figura in hie familia, uti ex Apocynis conflat, valde diverfa est in eodem genere, unde hon opus fufplet diftinguere in duo genera *Taberna** *montanam* & *Camerarium*, atque hsec, quam jam defcripfimus, diftinfilTima est ab omnibus *Contortis* ob folia transverfim pulcherrime ftriata, qualia i^*Jnopyby*/Io Zeylanico etiam obfervantur ^ quibus ha plantae «primo intuitu facile dignofuntur.

*Cam*Ameraria angusto Linariae folio. *Flum. nov. gen. p. 18.*

CAMERARIA foliis linearibus. *Linn. fpec. pi p. 210.no, 2.*


FIGURE S E C U N D A,

Caulis ramofus, frutefcens.

JFolia linearia, obpofita, integerrima, nervo medio decurrente.

j§7o/w & Frullus funt uti in priore Ipecie, fed longe minores, uti & to* ta planta.

Obfervatio. In memoriam Joachimi *Camerarii* vocavit hoc genus *Pithmier.* *Camerarium*, qui Epitomem plantarum fcripfit Andr. *Matthioti* elegantiflimam, rerumque porro naturalium studiofiflimus fiii't, de rffus fatis vide porro. *Plum. nov. gen. p. 18.*



TABU-LA SEPTUAGESIMA TERTIA.

C^ p ^ *Arborescens* Lauri foliis, fruſhi longiffimo. *Plum, Cat. pl.* 

CAPPARIS inermis, foliis ovalibus^ alternis, perennantibus. *Linn. B. Cliff..p. 204. fpec. pi p. 504. no. 2.*

Cynophalopheros, feu penis caninus, Cariba2arum arbor,foliisfubrotundis, clavos pulpiferos phalloides pro filiuis gerens. *Plukn. Almag.p. 126. Tab. 172. Fig. 4.*

FIGURA P R I M A .

Planta arborea.

Folia alternata, ovali-oblonga, obtusa, integerrima, avenia, nervo longitudinali fulcato.

Flores in apice ramorum rariores, ingentes, quadripetali, ftaminon V

Capilli filiquofae, pendulas, teretes, finuofae, intus repletae feminibus, glabris, oblongis, uti in filiqua aperta patet.

Obfervatio. Ob fiimmam adfinitatem, quam hsec arbor gerit cum *Breynia*, inquirit perfpicax *Linnaus* in *H. Cliff*, an hsec fit *BREYNIA Plumieri*? quim hue usque nullibi exftaret ejus icon, dein vero haec pukhre depi&a juxta iconem ipfius *Plumieri* exhibita fuit in Tabula exfculpta *curā Joan. Philip. *Breyni* in nova editione *Prodr. Jacob. Breynii*, ex qua patet, ejus frustum convenire cum hac *Capparide* figura sua, fed differt, quod *Breynia* fru&us fit filiqua bivalvig feminibus alternis, majoribus, Pififormibus. Hujus vero fru&us Cap^aridis non eft biralvis, fed repletus puJpa, in qua femina pliirima nidulantia & fparfa locaiuur, uii CA apcuā Aliqua confpici potest. Dein *Breynia* folia funt lanceolata, hujus vero ovalia. Adeoque collatis hifcp dnabus flguris Plumerianis patet *CYNOPHALLOPHERUM Pluknetii* pertinere ad hanc CAPPARIDEM, nee ad BREYNIAM. Flos etiam in nofra planta quadruplo major eft, pluribusque gaudet ftaminibus, quam in *Breynia**.

CApparis alia arborefcens, Laurifoliis, fructu oblongo, ovate
Plum. Cat. pi Amer. p. 7.

CAPPARIS inermis, foliis ovalibus, alternis, perennantibus, fru&i-
bus ovaVvbus.

Capparis inermis, foliis ovato-oblongis, per fpatia'confertis, perennan-
tibus. *Linn. H Cliff* p. 204. *spec. pi. p. 504. no. 3.*

Capparis Americ arborefcens, Lauri folio, frii&u fubrotundo, flore
albo. *lourn. Inft. p. 16r.*

Capparis inermis, foliis ovalibus, alternis, perennantibus, fru&i-
bus ovaVvbus. *Baditcca Horū. Malab. torn. 6. lab. 57.*

FIGURA

S EC

UN DA.

fhnata^ uti prior, arborea,

X>/&alterna, avenia quoque, ovalia, obtusa, integ-
Flores ramorum fummum occupant, uti i_n nriore *LA* perennan*ia* « que forms,
quam maximē ftaminofi.

FruOtts eft capfula pendula, Jqngiflimo ex pedunculo ovata nh^i r
qua a priore inprimis differt.

Semna in hoc fructu majora, oTea, & in orbem videntur iocata in *fructus*
pumpa.

Ob-

Obfervatio. Hsec arbor fimillima eft praecedenti Capparidi, ut, fl de-*
mas fructum, vix diftinguatur, Fru&us vero facillime variant in ea«
dem plants fpecie, uti id patet in Cucurbitis, Peponibus, Melonibus,
&c.: Non tamen hie varietatem audeo pronunciare in non vifis hifce
virentibus arboribus, praeterquam quod ab omnibus hue usque Bota-
nicis hæ diftin^ae fuerint habitae.



TABULA SEPTUAGESIMA QUARTA.

K'ja rugata latifolia, clavata. *Plum.nov.gen.p.io^*

TILLANDSIA, foliis linearis-linguJatis, integerrimis, bafi ventricofis. *Linn./pec. fit?p.* 286. no. 3.

**Ftfcum Caryophylloides* maximum, capitulis in iTimmitate conglome^ratis. *Sloan, liifi. Jam. torn.* i./>. 189. *Tab. 120.*

Plninta eft pvaftica, crefcens in truncis, & ramis arborum.

gfilia cbnfertiffima, * linearia, lingulata, integerrima, bafi ventricofa, uti in marginali majore adpareat.

jF/(9r^"monopetali, campaniformes, tuHulofi, ad oras plerumque trifidi, hexandri, uti in longitudinaliter aperto flore confpicitur A, ubi ftamina cum fuſs antheris delineata flint. B *Calix* eft cum piftillo. C'to* tus *Flos* eft cum calice & corolla. D *pi/Hllum nudum*.

"*Fruflus* eit oblongus, acuminatus, membranaceus, in tres dehifcens par-
V tes, continens feminâ pappofa, uti in fubfrequenti patet Tabula.

%*ervatio.* Plants h<jus generis parafiticee funt in fummis arboribus de-
fertorum, quarum folia ad bafin dilatata, & ar<5lecanaliculata conftituunt
peivim (quale folium ad Tabulee dextram pulchre delineatum *eft bafi
^Kfiore concava) FoJia vero patentia parte fuperife dilatantur in infun-
^dt^ulnm. ^, qj ln-rnll,j ornjt.jjp.^rei ^ 1 E ^ u a p}t^BiSs depluat jn. pdyjij*
arftiore collo, ne per calorem cliniatis exficcetur, fed TervetUr pura
& limpida prc-avibus fitientibus, animalibus fcendantibus ut Simiis,
, & argente neceffitate etiam hominibus, mira Naturae providentia.



TABULA SEPTUAGESIMA QUINT.A.;

CaraJruata clavata & fpicata, foliis ferratis. *Plum* nov. gen. p. 10.*

TILLANDSIA foliis fupernedentato-fpinofis. *Linn.fpec.pi.p.286.*
no. 2.

Carajruata Quarta Pi/mis Lih\ IV. pag. 194.

FIG : *U R A* *PRIM A.*

Flanta parafitica, in arboribus & putridis crefcens caudicibus, uti prsecedens.

Folia longhTima, aliquot pedes longa , craflaque ut folia *Anana* , tres
quatuorve digitos lata, inftar canalis excavata, atque in ambitu denta-
to-fpinoſa, praefertim ad dimidiam ipforum partem fuperiorem actile's
armata flint curtis & ere6fcis, inferne glabra funt & membranacea, lata
bafi feſe invicem involventia*.

Culmus in ipforum medio adfiirgit, craflus, arundinaceus, altus, hinc inde folios veftitus concavis, acuminatis, 'ipinulofis.

Floris in fpicam collefti flint in caulis fummo, inter folia fquamofi & fpinuofa reconditi, unde florum fpica eleganter variegata eft.

Fhris Corolla longitudinaliter aperta & diflelta confpicitur in Tab. a ut ftaminum fitus cognoscatur. b eft Calix cum frudu. c Semen cum fuo pappo, d Calix cum pistillo.

Obfervatio. Hujus binae alise species in *Plum, nov. £M. p. to. recenfentur* nomine *Caraguata latifoliae & anguftifoliae*, quod barbarum & Ameri- canum eft nomen, atque hinc reputandum, in cuius locum *Tillandſia* reftituta eft a CI. *Linnao* in memoriaiiii *EHa Tillandſii*, priſti & unici Botanici, qui quondam in Finlandia floruit, uti hotatur in *H. Cliff,* pag. 129. Atque edidit Catalogum plantarum circa Abpam, cum Me- dicin33 ProfefTor Aboenfis efTet , ann. 1673. in 8vo. De quo; vicē *Seguierii Bibl. Botan. pag. 193. & Linn. Bibl Bourn, pag. 122.*

Gerardia humilis, Bugulae foliis, Aphodeli radfce. *Plum. nov. gen*
F p. 31.

GERARDIA foliis fubovatis, tomentofisis, repandis; longitudine?
caulis. *Linn. Spec. pi. p. 610.*

*F I G U R A S E C U N D A **


Radix ex plurimis tuberibus, oblongis, perpendicularibus conflat.*

\aWs vix foliis altiores sunt, in fummo gerentes flores *monopetalos*, quorum forma & fructuclura a *Plum.* in nov. gen. p. 3Q. *JT_{ab.}* terius deicnbuntur & exhibentur ad dextram vero Tabulae c o n f ^ a posfica pane a. b calix eft separatus. c *Frudtis calici inCdens*

Obfervatio. Unica modo hujus generis plantula, *Phmkrii* tempore nota erat, d. ftaque a *Plumur.* fuit in memoriam *Jean Gerard AngT*

TOZ planum editum Anno 1611. scilicet 1597. Fol. T. 597.

Kunc autem qumque hujus generis species recenfentur a Linn, free tl v
 610. Atque noſtra quam maximam habet cum Jto//», ad M & tē m &
 fimiditudinem, inpnmis radicibus inftar Afphodeli, uti dixit Plunier
 fed m noſtra fructus videtur a bafi dehifcere, nee a fimm, Vo*
 Kueius, qua nota multum recedit ab nifce.



VERBESINA
foliis alternis, finuptis.

TAB. LII.






*BIDENS foliis
ternatis ac crenatis.*

BIDENS foliis quinquefidae ac Eermitis



BIGNONIA foliis pinnatis.



BIGNONIA arborea,
foliis pinnatis.

BIGNONIA foliis
conjugatis,cirrhois,pedunculis bilobis





Fig. 2.
BIGNONIA
folia gentis


Fig. 1.
BIGNONIA
foliis cordatis cerasifolia

TAB. IVH.




BIGNONIA arborea, folia
ex uno centro IUDAS

TAB. LVIII.



BIGNONIA foliis
conjugatis, cirratis,
levigatis.

B



MUSA spadicea erecta.


T.A.H.L.

y--



LAURUS foliis lanceolatis.

TAB. LXI



Laurus foliis compatis, lobovatis




BROMELIA foliis
radicalibus dentato-spinosis

TAB. LXIII.




TAB. LXIV.





BRUNSFELSIA.



SICYOS foliis corAatis.trilobis.fcrraJtis .

JELOHTA iV.Uls
cortl&li s. quint} ue lobis,drntntis.

Fig. 2.

CISSAMPELOS
foliis margine
petiolatis.





Fig. 1.


BUCEPHALON.



C' Ba8, T.PI N1A folia duplicato-pinnatis.



CHRYSOPHYLLUM.

LANTANA *Mils tern is*



LANTANA folua obpofitir




Fig. 1.

CAMERARIA
foliis subrotundis.

Fig. 2.


CAMERARIA
foliis linearibus.



CAPPARIS
inermis, foliis ovalibus.

t*, APPARIS inermU.

TAB.LXXIV.



TILLANDSIA loliis linaari - litiguiaria*.



TILLANDSIA foliis
superne dentato-spinosis.



Gr^ RAKdA
foliis luWjnli*,
tmncnlofi*.

!***.*†**.

PLANTARUM
AMERICANARUM
FASCICULUS QUARTUS¹,

Continens Plantas, quas olim

CAROLUS PLUMIERIUS[^]

Botanicorunt Princeps

Detexit, Eruitque,

Atque in INSULIS ANTILLIS ipfe depinxit

Has primum in lucerti edidit,

Concinnis defcriptionibus; & Obfervationibiis \$


i*Eneisque Tabulis illuftravit

JOANNES BURMANNUS, M. D,

Athenai illuftrU, & in Horto Medico Amfleladamenfi

P R O F E S S O R B O T A N I C E S ,

Academiit defarea Natura Curioforum Socius.



Sumtibus Au&oris,

Pnoftant Amfleladami in Horto Medico,

Atque

Apud VIDUAM & FILIUM S. SCHOUTEN ,
& LUGD. BATAF.

Apud GERARD. POTVLIET, & THEODOR. HAAK.
M. D C C L V I.

T A B U L A C E N T E S I M A :

C *Ornus racemofa*, trifolia, & quinquefolia, foliis foraminulatis.
Plum. Cat. pi. Amer. p. 19.

ELEMIFERA foliis ternatis & quinatis, ovatis, ferrulatis.

Z³ 'Elemifera foliis ternatis. *Linn. H. Cl. p. 486*".

Fnutex trifolius refinofus ³ flori^{us} tetrapetalis albis racemofis. *Catesb:*
Icbt. 33. T. 3. F. 3.

Planta fruticofa, simplices gerens ramos.

Fojia in communi petiolo alia ternata, alia pinnata seu quinata.

"*Foliola* cuncta ovata, acuminata, obfolete (errata, fubtus villofa, & fo'raminulata juxta *Phimicr.*

-*Panicula terminatrix* ex variis componitur racemis, qui gerunt

"*F/orf^tetrapetalos*, calice quadrifido co"ntentos, quales id figuris marginibus separatim conficiuntur A & B.

Frudus est bacca fubrotunda unilocularis CC.

Semen fubrotundum, ofleum D.

ObferSatid. Inpropre hie frutex a *Phmkrio* ad *Cornum* relatus fuit, quam, folia gerat compofita alternata ac pinnata, prasterquam quod tota facies, modu^{que} florendi penitus obftet, hinc potius ad E L E - ivirFERAM *Linnajm H. Cliff. pag. 486.* propofitam amandandus eft; cuius re vera quoque species eft, quumque ejus character nondum abfolute fit datus, hinc haud incongruum mihi vifum eftjeum hie Coroiii- ijis loco fibjungere.

E L E M I F E R A .

GAL. *Periantbium quadripartitum*, minimum.

C O R. *Petala quatuor oblongiufcula*.

^ T A M . *Filamenta* quatuor fublata, breviffima. *Anthera* oblongae.

P i S T . *Germen* ovstum. *Stilus* breviffimus. *Stigma* obtufum, tetragonum.

P E R . *Bacca* fubrotunda, unilocularis.

S E M E N fubrotundum ofleum.

Finis Fafciculi Quartk

PLANTARUM AMERICANARUM FASCICULUS QUARTUS.



TABULA SEPTUAGESIMA SEXTA.

CAJJfa hexaphylla; filqua bicapfulari. *Plum. Cat. pi. Amer. p. 18.*
*Town. Injl. p. 619.**

CASSIA foliolis trijugatis, ovatis, obtufis; filquis teretibus, finuofls.
CaJJta folioljs trium parium ovatis, glabris, inferioribus rotundioribusj
glandula inter'infima. *Linn. H. Cliff p. 159. Roy. pr. p. 468.*
&?M-glandula interje&a globofa &c. *Linn.fpec.pl.p. 116.no. 5.* ubi additur,
>*cJfJb&Sv arborefcens & glaberrima, ac foliola gerat interiora breviora.*

F / S U R A P R I M A.

Pknta frutlcofa, binorum hominum altitudinem & plus apud nos adtingens, rarius hifce iq terris florens, & quad arborefcens.

Kumi iignofi, alterni, simplices, glaberrimi, uti & totus plantaB habitus. •
Folia pinnata, ex fex foliolis fubrotundis, feu ovato-obtufls compofita,
quorum inferiora fefim minora funt.

Flore's ex pinnarum alis excrefcunr, fpcati quafi in communi simplici pendunculo ex quo alternatim dependent, vulgaris forma?

Si/i^juniotes funt^neares, ieu teretes, & inflexge, adultse vero font cdmpprefie, ad fefima torofe, futuris utrimque prominulis.

*Ojjicula fubrqntuda, glabra, hilo prominente notata, & umbilico Iongo fiiqua? junfta, uti in aperta filiquis parte confpiri poteff in T^ bula**

CASSIA humilis, femine Foeni grsci. *Plum. Cas. pi Amer.p. 18.*

CASSIA foiblis trijugatis, ovatis, exterioribus majoribus, glandula fubj^m inter inferiora. *Linn,fpec.pl p. 376. no. 4.*

Raffia foHolis trium parium oblongo-ovatis: gljidula fubulata inter infima. Roy. pr. p. 468. no. 12.

6§ PLANTARUM AMERICANARUM

Cajjia filjqua quadrangujari. *JJullen. H. Eltbam** p. 72. *Tab. 63. Fig. 73.*
& Thg^L^6.

Cajjia filiquis quadrilatis, foliis plurimis pinnatis a majoribus obovatis.
Brouw. Jtifi. Jam'p' 224.



F I G U R A S EtV N D A.

Planta eft hamilis^ binoſ tresve modo pedes* "alta, ac ramofa.

Folia pinWta, ex foſtolis ovatis ac venofif compofifa, quorum fiiperiora majora flint, interje&a ad ipfbrum ortum glandulā fubrotundā.

Fl̄pres ex ipjjbrum alis excreſcunt rariores, plerumque gemelli.

Siliqua flint teretes, retroflexje, finuofae, nee itaglabrse & ereftae, uti in *H. Ffltham.* iconē, casterum tranſparentes, *femina* oblique cellulis fuis, ubi^rotuberant j cbntinentes, qu3e flintIrregularia, iinuofa, & acuminate, uti in ſeparato femine A adparet.

Qbferatiq. Noftra planta a primariis jungitur Botankis cum ilia *H. Eltbam.* quae iliqua gaudet rebla quadranguiari, quum vero in *Plumierii* iconē filique funt protuberantes, incurvatse, & quafi nodofie, hinc raerito dubitat *H. Eltbam.* auſtor hafce conjungere, quarum vanēYates ut ex collatis Figuris obſervari poſlent, ramulum cum filiquis juxta *Phi-*
mierii delineationem huic Tabulae addidi, cſeterum *DMeni&s* fuam plantam jungit *cum Senna Orientali hexaphylla*, uti & ego hafce in *Tbef-Zeylan.* pag. \$6. recenſui, quae omnes a *CL Linn.* in *Fl. Zeyl.* p. 6 <j. finiū junguntur addita brevi, fed accurata partium hujus plantae deſcriptione.



TABULA SEPTUAGESIMA SEPTIMA.

C*Affia* filiquis planis. *Plum. Cap. pi Am.* p. 18. *Tourn. inft.p.* 619.

CASSIA foliolis quinque jugatis, ovato-lanceolatis, glabris, glandula bafeos petiolorum. *Linn. Jpec. pi.* p. 377. no. 11.

Caffia ftA'n)ia nuiutjuc; yailuiij Ovato-lauviculatiaj glabris j~ glandula flipra bafin petiolorum. *Roy. pr.* p. 468.

Caffia fruticofa, erefta, foliis ovatis, acutis, quinque jugatis, filiqua com- : prefia^, glandula ad imulum. *Brouw. Hift. Jam.p.* 223.

Folia hujus plants, uti in reliquis, funt pinnata, foliolis utrinque quin* que ovatis, acuminatis, giabris, & venofis.

Flares irregularis funt format in hac fpecie, quorum unus A prona parte, r; aiter B poftica parte, C& D ad latera utcunque confpiciuntur depiai, E autem fimplicem exhibet calicem cum pifillo erefto 6>^rcuato.

Siliqua funt longiffimae, dependentes, planae, glabra, ad ferrina t&H3a' - foſt&femtnibus, feu ofTiculisfubrotundis, ſequali ordine locatis mfSK aqjectis cc apertis Uliquis patet,

TABULA SEPTUAGESIMA OCTAVA.

CAJfia minor, arborefcens, filiquis plaais, articulatis. *Plum. Cat.*
p. 18.

CASSIA foliolis quinque jugis, ovato-acuminatis, pedunculis biflorisj
filiquis comprefTis, transverfim fulcatis.

F I G U R 'A P R I M A.

Plant a arborea, ramofa, glabra.

Folia pihnata ex decem foliolis feffilibus, ovatis, utrinque acuminatlsj
venofis, venis parallelis.

Flores gemelli ex communi pedunculo alternato, fblito majores, quorum
petala videntur avenia. , ^ ^ .

Siliqua dependent gemella; ex communi pedunculo alternato, planae, glg-
^ ^ ^ e, ifthmo diftindaa, quafi articulata3, in quibus

Semina latitant ordinata, obliqua, ovata, excavata, feu reniformia, uti
in aperta^fiiqua patct.

CAffia minima, arborefcens, filiquis longis & anguftis. *Plum. Cat.*
l f. 18.

CASSIA foliolis H\$decim jugatis ovatis, glandula fupra bafin petiofe»
rum, filiquis teretibus, laevibus.

Cajfia frusicofa, erecta, foliis plurimis pinnatis, ovato-acutis, filiquis tur-
gidis. *Bromv. Hi/I, jam. p.- 223?*

FIGURE S E C V N B A.

Plant a arborea, ramofa, tenerior.

Folia pinnata ex viginti duo foliolis ovatis, feu ovato-lanceolatis, glabris,
aveniis, qu^c ver^s ad ramos floriferos excrefcunt, minora funt, ac de-
cem tantum conftant foliolis fimilibus, interjeclâ ad fingulorum petio-
lum glandula fubrotundâ.

Flores in lorigam fpicam "excrefcunt ramofam aquafi, pedunculi commu-
nes alterni plures fimul ir^ fummo proferunt flores vulgaris formae.

Siliqua plures fimul dependent longae & anguftae, feu teretes, ac Jasves.

Semina in ipfis locantur regularia, orbiculata, glaberrima, qualia iaaper-
ta confpiciuntur filiqua.

PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA SEPTUAGESIMA y NpNA,

Cyllorea racemofa; flore cruceo, fru&u croceb. *Plum.* nov. pL
'gem p. 10.

JDURANTA inermis. *Linn. Jpec. pi. pag** 637* no. 2.

Plania, uti videtur, arborea, ramos gerens alternos, eret&os.

Folia caulina uti & ramorum inferiorum bina obpofita, obverfe-ovata* acuta, fuperne ferrata. Ramorum floriferorum fuit fere lanceolata* ac fuperne ferrata^ quaterna, seu bina faria sibi obpofita, ac cruciatirr* pofita.

Flores vero juxta *Plumierium* fuit monopetali, acperfornati; quorum labium superius erigitur, inferius vero in tres panes divifum eft; media parte binda. Horum in Tabula unus priora parte A j, alter flipina B separatim confpicitur*. *Calix* cum piftillo C eft.

FruCliis Carnofus eft D, globofusque, fuperius in tres apices ?cutos «?efinens, unicapularis; quatuor femina reeondeis E, uti in transverfim (*cadio* patet, germina angulofafunt F. F. Vide *Ludwig. defin.gen.p.i* 13.W0.1P50.

Obfervatio. Hujus altera species eft, que repens ac fpinofa vocatur *Plumiero*; fed in ejus defideratur iconibus, atque D U R A N T A fpinofa a *Linndo* vocatur, uti hoc novum genus in memoriam (*taftoris Duranti* medici Romani a *Plum.* diftum eft, qui Herbarium Italicum confcripfit Romse impreffum 1585, dein flepius & ultimo Venetik recufum 1667. conftatque 879 Figuris, fed quae admodum pufillae ac ru- dcs fuit.

T A B U L A O C T O G E S I M A .

K^Eltis folio Citrei fubtus aureo; fructu rubro. *Plum. Cat. p. 18.*

CELTIS foliis lanceolatis, crenatis, floribus terminaticibus paniculatis:

Folia hujus arboris lunt lanceoiata, crenata, alternate*, petiolata, fubtus aurea.

Flores in paniculam fpeciofam collefli, quorum pedunculi communes plures proferunt irregulares flores, horum petak fuit revoluta, &, ut ex icono conjicere licet, quaterna cum ftib fubulato A, calici frellato innata, unde haec arbor vix videtur *Celtidis-zftk* species.

Fmtkis fuit baccae fph^ricaes laves & glaberrimse, qua; diflecte B, ofB culum praebent fubrotundum quadripartitum C.

Obfervatio. Ex flore & fru&u videtur primo intuitu fatis fimilis *Cehidi* at vero. calicem D a corollis panicula diftinaiffimum delineavit. *Phmier*, ideoque nequit effe *Celtis*, quae caret omni corolla, & (oxo calice donatur, ne dicam de piftillo bicorni, quod hie fubulatum eCt^ adeoque novi erit generis planta, quodnam vero vix determinari poterit.

TABULA OCTOGESIMA PRIMA.

CEntauriitm minus maritimum, ampio flore coeruleo. *Plum** *Cat, pi.*
f Amcr. pag. 3. Tourn, in I. p. 123.

GENTIANA foliis fefilibus, lanceolatis, trinerviis, panicula dichotoma-, nuda, corollis quinquefidis campanulatis, crenatis.

FIG U R*A PRIMA.

Radix defcndens, firma, in plures laterales fibrillas divift.

Cattlis erectus, fimplex, indivifus, quadragonus, glaber.

folia fefilia, utcuncjue obpofita, lanceolata, obtufa, trinervia, glabra, integerima.

Fiores caulem terminant fpttiofi, pedunculfs dichotomis, dein propriis infidentes fblitarii, illorum petala funt crenata, patentia, ovata aa, ex $\frac{1}{2}$ orum orificio quinque ftamina, bina minora, trialongiora excrefcunt, uti in aperto flore pater.

Cnlix mond^i>Uus, quinque partitus, ereftus, acutus, perfiftens b.

frertryn ovatum c, itigma gerens capitatum, ftaminibus longius.

Pcri'tjfirpium eft capfula ovata, bilocularis d. *femina* condens numeroia, ^r-».
 \ va, °nigricantia e.

•^XhfcrvGlio. Diftinctiffima hascfpecies eft ab omnibus hue uisque notis coh. generibus, panicifk fua longa dichotoma, nuda, terminatrice, ac corona fua in centro corollae depidla.

\yEntaurwm minus fd alas floridum. *Plum, Cat. p. 3.*

GENTIANA ex alis florifera, foliis nervofis, lanceolatis, corollis quinquefidis, infundibiyformibus, floribus verticillatis, fefilibus.

FIGURE S E C U N D A.

Radix ex plurimis conftat fibrillis, sequalibus, ad extremum dichotomis.

Caulis adfeenaens, fimple-p indivifus, glaber, tetragonus.

Folia fefilia, obpofita, Jarkeolata, acuta, glabra, trinervia, nervofaj integra.

Florcs in caulis fumma parte ad alas fefllles ac verticillati, horum unus in Tabula feparatus exhibetur *monopetalus*, fuperne quinquefidus/^calice quinque partito^ infidens, ftilus bifidus b^ frutlus bilocularis i, femina pluriraa continens rotunda, nigricantia k.

Obferunto. Similis huic planta, fed foliis anguftioribus & linearibus diP :<£> flores caeterum eodem modo verticillatos gerens occurrit in decad. 'pi. Jfricp. 206. Tab. 74. Fig. 3- Qpam vocavi ibi Centaurium anguftifolium floribus ex alis fefilibus.

TABULA OCTOGESIMA SECUNDA.

C/£«^Jjpuria,nodoia-, feu *Smilax* afpera, nodofa, radice rubra, major.
Plum.

SMILAX caule inenni tereti, foliis inermibus, caulinis cordatis, ramis ovato-oblongis. *Linn.fpec.pl. p. 1031.no. 13.*

Smilax caule tereti inermi, foliis cordato,-ovatis, acutis, inermibus, petiolis bidentatis. *hiun..H, Cliff*, p. 459. *Gronov.Jl. Virg.p^, 120.*

Smilax Virginiana, spinis innocuis armata, latis Canellas foliis, radice craila, nodofa, arundinacea, & carnofa. *Plukn, Aimag.p. 349. Tab. 170. Fig. 5.*

Smilax afpera fru&u nigro, radice nodofa, magna, laevi, farinacea. *Slodfu Hift, Jam. torn. I. p., 231. Tab. 143. Fig. 1. quae differt foliis oblongis, nee cordatis.*

Smilax Indica, Ipinofa, folioCinnamomi, Pseudo-China quibufdam. *Hermf Muf. Zeyl. p. 22. & Tbef.Zeyl. p. 217.*

Smilax farmento tereti, inferne aculeato, foliis fubrotundo-cordatis, trinerviis, petiolis clavicula una vel altera refertis. *Broiiw^Hift. Jam** p. 359.

Pseudo-Cbina Amboinenfis. *Rumpb. Her bar. torn. ?. pag. 437. Tatftut^ China Mexicana, Reccb. lib. VI. cap. 55. p. 212.*

Jupicanga Pi/on, lib. 4, cap. 62. pag. 99.

Radix ingens, crafla, nodofa, ex plurimis craffis lamellis compaclis & fibi adhserentibus conftans, qualis in fuperiore Tabulae parte repraefentatur. De cujus facultatibus & qualitatibus vide *Herman. Cynofur. Medic. Dale Phamac. Geoffr. mat, medic*, aliofque.

Stolovxs plures ex hac radice excrefcunt, ex quo vis nempe nodo unicus, uti videtur, rarius gemini.

Caules inferius exasperati, uti & ad genicula, spinis acutis, re6lis, va*»* iidis, armati,, casterum, teretes & inermes, q*»*ialis ad finifir^m Tabulae ^pZTte.rr^rcv\{pic\iir delineatji^

Folia per farmenta fparfa, alternata, ovato-acuminata, trinervia, petiolata, glabra*

Cirrhi gemini, maxime intorti, feu spirales.

Ohjhratio. Floras nee *FruQus* adpinxit *Pfaihier^* qui ex-Sloan. & Her*nand. *Hifi. MeXic.* fuppleri poflunt. Auaor enim nofter radicis formam in prirpis videtur voluifle defignare, quum planta fit in variis regiombusfatisobvia, fed cujus radicem nemo hue usque rite delineaverat tepto *Clufion exotic* p. 83. Ver*. autem radicis Cbinx iconem ac defcnptionem fubjunxi *Audmrio Herbarii RumpbianU* qua*, o u turn dvfferat, cum hac comparari ibi poteft, illaque in ipfa hpnn*a* ad plantam vivam ibi delineata eft, quod latius ibi expl*icui.

TABULA OCTOGESIMA TEKTJA;

China Michuacanensis, seu Smilax acerata, ruminor, Boyaux du Diabla^
Plumier.

SMILAX caule aculeato, foliis inermibus, ovatis* fetufa-mucronatis,
, JLinn.Jpet.pLp.1029.no. 4.

Smilax caule angulato aculeato, foliis delato-cordatis, inermibus, acutis
Linn. H.Cif.p.^y. Gronov.fi. Virg. p. 120.

Smilax viticulis aceris Virginiana, folio hederaceo leni, Zarza nobilissima
Phkn. Pbyt. Tab. in. Fig. 2.

Radix, ingens, longa, ac rotunda, fed nodosa; ubique plurima longissimis*
nisi ac flexuofa emittens flagella.

Caules teretes, effetti, angdati, & aculeati in pinis rarioribus, curtis, fed
validis ac latis, interdum geminis hamatis.

fj?ss?funt cordata, acuminata, feptinervia, inermia, ac plurimis trans-
verfls venulis cancellata:

Obseruatio. Plures sunt plants; quae nobilissimam radicem *Salam paril-*
lam Oi5/2snis diffam prabent, ut id constat ex *Geoffroy mater, medic,*
vo. i.pag. 132. & 236. nee non ex *Hernand. Hi/I. Mexic.* p. 288' &c,
a3 (fum & nofiram quoque pertinere puto, quum Auctor tam exable
*b**ic~* radicem delineavit, ut praे omnibus ipsius plants partibus hanc
praetulerit, nec dilatum est, quin hanc in primis in Tabula, sua designi*Vc*
voluerit *Plunder*, quum flores fructusque neglexerit, ut & in antece-
dente Tabula, in qua radicis etiam praे reliquis iconem dedit partibus.



TABULA OCTOGESIMA QUARTA.

Chim. altera, norfolkuleata, foliis amplioribus. *Plum. Hiji. mff/.* v,
p. 135.

SMILAX caule inermi, tereti, foliis inermibus-, cordatis, erarginatis.

Radix nodosa ac protuberans, mediocris, longiflora ejmittens flmplicia
flagella*

Caulis erclus, teres, inermis, ad genicula fquama notatus, ac protuberans.
j^Aalternata, cordata, emarginata, obtusa, quinque nervia, nervis undulatis.
Cirri gemini, simplicissimi ad foliorum ortum.

Flores ex alis pedunculatis, in umbellam extenfi, loco cirrhorum excref
«^t^v hexapetalii, vulgaris formae.

Obseruatio. Hx quoque planta quoad vadkem *Salfeparilla* species eTe vi-
detur, vel forte ejus varietas habenda, atque in climate calidore, ac *folo*
pinsuiore suas deponere spinas, ut id in aliis haud raro obtinet plantis.

TABULA OCTOGESIMA QUINTA.

C*Hina alters*, aculeata, foliis oblongis, cufpidatis. *Plumier.*

SMILAX caule aculeato, tereti, foliis inermibus, ovato-lanceolatis, trinerviis. *Linn.Jpec.p.* 1030.no. 7. *Gronov.fl.* *V^irg*, p. 193.

Smilax laevis, Lauri folio, baccis nigris. *Catesb. Hift* Carol, torn.* 1. *pag** 15. *Tab.* 15.

Radix oblonga, nodofa[•], glabra, plurima undique longiflma emittens fla[•] gella. vix divifa.[~] [^]

Cau/steres, inferius nodofus ac fquamodis, inermis, fuperius, ubi fo[•] lia erumpunt, aculeatus spinulis hamatis.

Folia alternafa, ovato-oblonga, acuminata, qilinquenervia, crafla, integra[•], vix petiolata.

Tetioli geminos proferunt cirrhos longiffimos.

Flores rariores umbellatim pofiti, ex alis pedunculati.

Truths planus, compreflus, acuminatus, uti videtur, bilocuraris *a*, bina fubrotunda continens femina *b. b.*

TABULA OCTOGESIMA SEXTA.

C*hondrilla* foliis anguflrs., & ad oras pun6latis. *Plum. Cat.pl. Amtr.p.* 10.

KNAUTIA caale dichotomo, foliis margine pun<5tatis.

FI G U R A PR £M A.

Radix delcendens, laterales emittens alternatas fibrillas tenues.

Caulis fiibdivifus, inferius geniculatus, fuperi[•] dichotomus ufque ad minimam fubdivifionem.

Folia oppofita, linearia, acuminata, feu lanceflata, ad oras retufa, & punctata, verticalia vero fimpliciter linearia, & nervofa,

Flores exfoliorum alis. in vertice folitarii, pedunculati, fuperius in quinque radios *a* diftinai, cahci magno connivent[•] tripartito *bb* infidemes, hi vero diitineti funt in flofculum radii *c* & flofculos difci *lid.*

Semen eft folitariurn, obtufum, verfus, bafin anguftius, oblongum[^] tri-

Obſervatio. Quin juxta iconem hsec planta gerat calicem longum & angustum, ac folia obpofita, *ChondrUUA* *J.* *Tuit*, sed adſini-

tatem

tatem indicat cum compofitis oppofitifoliis a *Linn*, in *Philof. Botan.* pag. 29. enūmeratis., quumque mini videatur, proxime adcedere ad genus *Knautia*, hinc tarn diu earn ad hoc retuli, donee in viva planta certum fuum genus quis ex ejus chara&ere defignaverit.

Chryfantbemum humile, Ranunculi folio. *Plum, Cat. pi. Amer.p.* 10.
Tourn. infi.p. 492.

ANTHEMIS foliis ovatis, rjrofunde dentatis.

Anthemis foliis triternatis, pedunculis terminalibus ramo longioribus &c.
Linn, fpec.pl. pag. 89\$. no. 14.

Anthemis minima arvenfis, foliolis fuperioribus tridentatis, inferioribus laciniatis. *Brouw. Hift. Jam. p. 320.*

J&uptbalmum foliis ter trifidis, pedunculis ramo altioribus. *L.H.CI.p.414.*
AJktfoides^Americana, minor, annua. *Vaill. All^Parif. 1720. p. 419.*

F f G U R A S E C U N D A.


Plgnta puftsk, annua, vix radicata.

folia radiqiji!^ ovata*, profunde incifa, feudentata, vix petiolata. Cau-
^tnfibreviora ac fefilia, magisque contracta.

Caiiks fongl, vix ramo(i, in fummo gerentes *Jlores* radiato - tridentatos.
jQzja; ibi iola habet Tere eequalia.

Semina oblonga, firaglia, corona deftituta, uti in tribus feparatis in
Tabula patet.

Obferroatio^, Licet haec plantula multum accedat ad Chryfanthemum pa-
*4u(lre, minus j Apii folio. *Sloan. Hi/I. Jam. torn. 1. Tab. 1.55. Fig. 3.*
eandem tamen fpeoiem eflē haud facile crederem, quum foliatura, to-
tufque habitus nimis variet, hinc puto, fi alii Botanici hanc *Phimierit*
vidiflēnt iconem, hafce non conjunxitfent plantas, noflraque multum
participat de *Cbryfogoni^gQnerQ*, nifi quod femina coronulk careant.



TABULA O^TOGESIMA SEPTIMA.

CuLufia flore albo, fru6lu fjoccineo. *Plum, nov.gen.p.* 22.

CLUSIA foliis aveniis. *Linn.fpec.p.'\$o^*.

Clufia arborea^ foliis craffis, nitidis, obovato-fubrotundis, fl. fblitariis.
Brouw. Hift. Jam. p. 236.

Cencl&Rn\$4ea arbor, iaxis adñafcens, folio obrotundo, pingui, fruau po-
miformi; in plurimas capfulas, granula fculn̄ea, ftilo columnari hexa-
gono prfeduro adhaerentia, continentes divifb, Balfamum fundens.
Plukn. Almas:, p. 02. Tab. 1C7? Fig. 2- CatesB. tom.-2. Tab. 99.

78 PLANTARUM AMERICANARUM

Terebinthus folio singulare, rotundo, fuscum, flore tetrapetalo, pallide luteo, fructu majori monopyreno. *Sloan. Cat. pi. Jam. p. 167.* & *Hi/I Jam, torn. 2.pag. gt. Tab. 200. Fig. 1.*
0 *Clufia* flore roseo, major, fructu subviridi. *Plum, nov. gen. p. 21.*

FIGURA PRIMA.


Planla arborea.

Folia oppofita, obverfe-ovata, obtusa, integerrima, vix petiolata, ave-
nia, crafla, & pingua, nitida.

Pedunculi ex alis fblitarii, uniflori, rarius biflori.

Flores monopetali, multifidi, quorum unus *a* antica, alter *b* poftica par-
te in Tabula confpicitur, horum piftillum *c* eft conus obtusus, globu-
lo feu germe *d* cinereum, quod excrefcit in *f*ruſum *e* ovatum, qui per
medium *f*estus, *fex* exhibet cellulas, quae femina continent oblonga
acuminata *j* pulpa tenerima *h* obdu^sta.

Vide Cl. Ludwig* definite gener. p. 179. no, 591*


C*lufia* flore roſeo, minor, fructu flavefcere. *Plum. nob. gen. i* 

CLUSIA foliis venofis. *Linn. fpec. p. 510. no. 2.*

" *Clufia* alia minor, flore albo, fructu flavefcente. *Plum. nov. gen. p. *i.*

FIGURA SECUNDA.

Arbor hæc plura habet communia cum praecedenti, folia faciliter obpofta, vix petiolata, fed hasc venis gaudent nervosis, funque ovata, inferne maxime angustata, integerrima, ac tenuiora. •

Pedunculus in hac specie terminatrix eft, plurimae profert flores *obj^i^tos*, ejusdem caeterum formæ. 

ObferviUiu. In nicuuiiain ^clebcirliiii *Cnroli Clifff hoc plantarum genus*
ab auctore *CLUSIA* vocatum fuit, cuius fata exaaiffime defcripfit
Tournef. in *Ifagogi^e in rem. berbar. p. ag. 4, 1.* Jjbros vere, quos edidit,
recenfet. *Plunder,* in *nov. gen. p. 2i<*

TABULA OCTOGESIMA OCXAVA.

C*o* fcandens, fructu trigemino, subrotundo. *Plum. nov. gen. p. 8.*

HIPPOCRATEA. *Linn. H. Clifff. p. 484. fpec. pl. p. 1191.*

Caulis.

Caulis volubilis, rotundus.

Foha obpofita, ovata, petiolata, obfblete ferrata, vel pojus crenata.

Flores corymbofi, ex aiis foliorum, a, quorum unus b antica pane, alter c poftica parte monopetalus & globofus "quafi", feu campaniformis tonfpicitur in Tabula, cujus calix '& monophyllus.-& quinquefidus eft, corolla urceolaris ee separata,

Fruflas eft compofnus, membranaceus, ex tribus capfulis/conftans bivalvibus g, que femina continent oblonga & alata b. Vide. Cl. *Ludwig.* *definit. gen p. 319. no 1054,*

Objervatio. In honorerri magni *Hippocratis*, Medicorum patris & nunc cipis, HIPPOCRATEA hodie denominatum eft hoc plantarum g^fus a CLLiwido, quum Co A *Plumicrii* fit nimis generale nee nomen/jroprium, ille vero jam vixit anno 350 ante Chriftum natum, fenexque obiit ahnos natus 90, vel ut aliis 100.

tfyjus & altera fpecies inter *Plumierii* icones depifia eit, quae folia gerit obpofita, ovata, iritegerrima, vix^etiola, majora^ Horum fimpie ad LAiu A depiftum eft. *Friiflus* ejus integer ad Litt. B confpicitsr, qui nucleum feu officulum gerit oblongum fbiatum, vocaturque

Coa fcandens frudu amplifimo fingulari. Item *Bignonia* fcandens amygdalas ftre^ns, *Plum.* *lift.* *mjf.* *torn.* v.p., 131. quum vero ilos deeft, de hac iH^scerti definiri poteft. Preterquam quod hujus generis Hippoforia apud Eotanicos fit quam maxime obfeura, nee conflat haftenus, adjuem ordinem naturalem proprie pertincat ; cum Sarmentofis enim ?4?h Linnao in *Philof. Botan.* p. 32. § 49. propofitis, puta Smilace; Diofcorea &c. Ccypjungere vetant folia oppofita feffilia, nee habiuitur* gerit *Tribilatorum* PhiloJ] ibid. § 50. Flores enim quinquefidi, nee fexifidifunt, ftamina & piftilla incognita, adeoque non potuit facile Jiaftenus ordini alicui naturali inferi. Flos quidem feu Corolla refert florem Rufci, fed calix quinquefidus obftat.

T A B U M O C T O G E S I M A N O N A.

Columnefcandens i' Apve phasniceo, fru6lu albo. *Plum. nov, gen.p. 28.*

COLUMNEA. *UrnN^ecp.* 638.

3 *Rapunculus* fruticofus, fftliis oblongis, integris, villofis, ex adverlo fitis, flore purpureo villofb. *Sloan. Cat. pi. Jam. p. 53, Hift, Jam. pi 157. Tab. 100. Fig, 1.*

Achimenes cnajor, herbacea, fubhirfuta, oblique aflurgens, foliis ovatis, ob?y)fitis, alternis minoribus, floribus geminatis ad alas alternas. *Brouw. ^ijjh Jam. p- 270.* ubi ejus character definitur.

ys PLANTARUM AMERICAN ARUM

FIG U R A P R I M A.-

Radix proreperis.

Caulis erexitusj fimplex, indivifus, viHofis.

Folia obpofita, ovata, ferrata, petiolata, inferne villofi.

Corolla villofe, monopetala, cujus separati flores a *Plum*, in Tab. 33. nov. gen. exhibentur, in no/tra vero *A calix* cum piftilio confpicitur *B^fructus* eft globofus & mollis, pericarpio infidens, repletus feminibus pufilis, innumeris *C*, quae font oblonga & obtusa *D*.

Obfervatio. In memoriam Nobiliffimi Romani *Fabii Columns* hoc plan- tarum genus C O U M N E A didlum eft a *Plum*, in nov. pi. gen. ubi ex- cellentiffimi hujus Viri *Opera pag*. 28. recenlet, uti & lourn. in *Ifa- gogefuapag*. 53. qui dick hunc virum cum *G.esnero* primum fuiſe, qui cogitarunt de generibus conftituendis ex flore ac fructu plantarum. Vide porro *Ludwig. defin. gener. p. 76. no. 268.*

COnvohnlus niveus, polyanthos, folio fibrotundo majore. *Plum**.
*Cat. pi. Amer** p. 1. *Tourn. Inji. />. 8 3.*

CONVOLVULUS caule repente, foliis cordatis, pedirunculis w»- bellatis.

^ *Convolvulus* foliis cordatis, pedunculis umbellatis. *Linn.fpec.pl.p: 1*55;*
no, 8.

Convolvulus luteus, polyanthos. *Plum. pi. Amer.p. 88. Tab, 102.*

Convolvulus Americ. vulgaris folio, capfulis triquetiis, numerofls. *Pukn.*
'Aim.p.,174. Tab. 167. Fig, 1.

Convolvulus foliis cordato-acuminatis, floribus umbellatis, Iuteis. *Brouv\ Hift. Jam. p. 1 £4.*

Tim-Tali *H. Malak torn. 11. Tab. 53.*

FIGURE S E C £] N D A.

Caulis .{inrmcntolbs) oc fiv;Aviofa5")^]cpeis; ^o fti'rat^

Folia cordata, acuminata, integra, petiolata, fblitaria.

Pedunculi ex alis longifiimi, plures proferentfs ftsres in umbellam quaſi colleſtds.

Flores vulgaris funt formse ac magnitudinis.

• *Obfervatio.* Pertinet haec species ad iftam Ccnvolvolorum familiam, qua rapk, nee caule volubili fcandit, uti ejus varietas eft a CJ. *Limao* in *Jpec. aliisque recenfita, quā notā ab hac differt.*

Caeterum plures harum varietates, quae folio funt nimirum cordiformi, inter depi&as inveniuntur icones, fed quum fint maxime vulgares, fa- tilquenotae, eas omifimus; uti

Convolvulus ampliflimo folip cordiformi', flore maximo purpureo & fl̄i albo maximo, reliquaequ in *Descript.pl. Amer. zpag, 88. ad'iWn?* inveniuntur. • r̄f̄m 9^l,

T A B U L A N G N A G E S I M A:

GOnvolvus cccineus, heptaphyllus, radice craffissima. *jP/um.Cat.pl.*
Amer. p. i. *Tourn. Lift. p. 84.*

C O N V O L V U L U S radice tuberofa, foliis digitatis, feptenis, lanceo-latis, pedunculis trifloris. ,

'*Convolvulus* Americ. heptaphyllus, flore albo, fundo piipureo', radice tuberofa. *Plukn. Almag. p. 116. Tab. 276. Fig. 5.*

Convolvulus major heptaphyllus, flore fulphureo odorato 4 speciosissimo* *Sloan. Cat. p. \$f. nift. Jam. vol. 1. p. 152. Tab. 96. Fig. 2.*

Ipomoea foliis palmatis, lobis feptenis, lanceolatis, integerrimis. *JL, inn. spec.pl. p. 160. no. 5.*

Ipomoea heptada&yla major, scandens, flore trijori campanulato, calice membranaceo, feminibus majoribus, villosis. *Brouw. Hift.Jam.p. 155.*

FIG U>R ^4 P R + M A.

Radix hujus plant® cräflifflima, brachiata, in fcirculos diflinda, inflar Me-choacanne,

Ctu/is vdlc^lis^ flexuofus, rotundus, glaber.

Folia di^jatj^ lancealata, finuata, acuminata, ex feptem foliolis in com* mhi petiolo positis compofita.

Tti'duncnli plerumque triflori.

^ **ref** regutococcinei, vulga'ris forma?;

COnvolvulns albus, folio laciriato, maritimus. *Plnm. Cat. pi. Amer. p. i. Tourn. Inft.p. 84.*

C O N V O L V U L U S foliis obtiiis, palmato-Iobatis, cauie repence, pedunculis unifloris.

F I G V R A S E C U N D A

>*Planta* per terram pro/ofens, ex cauie, in primis ad nodos, longas emittens radicales fibil^m^

Folia ad nodos petiolata^ m^ajora in feptem, utcunque lobos obtufos \ irregulares, & quafi digitatos diftin6ta, quorum inferiores fenfim decrcunt, minora verd'folia trilobata, in quinque lacinias diviia lunt ir* régulares, cun&a tamén\ntegra, vel obtufe repanda,

Pedunculi longi uniflori, floræ vulgaris formæ gerentes.

Capfulcz feminales sunt fubrotundæ, acuminata^ *Semitia* fibrotunda^ uti, in separato lateralí confpieitur.

Obfervatio. Hujus & alia fpécies apud *Plumier. pag. 91. Tab. 105".* delin- neatur, foia gerens integra, qua? vocatur ab eo *Convolvulus* marinus, catlia^icus, foliis Acetofa?, flore niveo, & a *Linn.fpee.pl p. 158. nō. 26. Convolvulus* foifi, poftice obtufis, cauie reffente, pedunculis unifloris. Notandum enim eft dividi Convol^ulos in eos, qui peduncu- 10 funt unifloro & multifloro. *

go PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA NONAGESIMA PRIMA.

COnvohulus polyphyllus, flore & fflu&u purpureis, maximis. *Plum**
Cat. pi. Amer. pag. i. Tourn. Inft. p. 84.

CONVOLVULUS foliis pedato-palmatis, lobis quinis bavatis, integrimis, pedunculo alato, unifloro.

FT& U R A PRIMA.

fotia ^n cbmmuni petiolo in quinque lobos diftin&a, qui sunt lanceolati, iffltegerimis* venosi, rnedii raaximi, laterales decrecentes.

Tlores ex alis utcunque folitarii, ingentes, pedunculo craflb, alato, & articulato infidentes.

CapfuU feminales fubrotiinda?, torofas, acuirinat®.

Obfervatio. Diflinguitur a Convolvulo paniculate *Linn. fpec. p. 1 fS no. 15.* fructu non tantum maximo, fed inprimis quod peduncui fint uniflori & alati, nee non quod foliorum lobi laterales minus profunde fint divili.

COnvohulus pentaphyllus, folio glabro, dentato, viticulis hirfutis. *Plum. Cat. pi. Amer.p. 1. Tourn. Inft, p. 84.*

CONVOLVULUS foliis digitatis, lobis quiris lanceolatis, denticulatis, pedunculis trifloris, caule pilofb.

Convolvulus pentaphyllus, flore pallide flavefcenfe, caule hirfuto pungeante. *Sloan. Cat. p. \$5. Hifi. torn. I. p. 1J2.*

FIGURASECUNDA.

Catties pilofi, volubiles, rotundi.

Folia quina digitata, «i ^^t-ot-ir<vi>-I j>*«dol» /ofllia, ^jworum intermedia'fo* t liola gradatim majora sunt, cunbla vero lanceolata, ac ferrata, feu denticulata.

Flores ex-alis in communi pedunculo utcunque, terni minores, & vulgaris formae.

Obfervatio. Hujus & alia species est tota quanta pilofa, quiss *Convolve* ii^jw. Americ. villofus pentaphyllus & heptaphyllus major ab *Herm.* in *Cat. H. L.B.p. 183.* vocatur, & ibi icona exhibetur, estque *Ipmoea* foliis digitatis pilofis, caule pilofo *Roy. pr. p. 429.*

Haecautem fatis frequens est in'hortis noftrii, & differ't inprimis foliis integrimis nee dentatis, dein>>flores plerumque fblitarii, rarlus terni iunt vel plures uti in *Plumierii* icona.

TABULA NONAGESIMA SECUNDA:

 *Uumodit* foliis digitatis, flore coccineo. *Plum. Cat. ph Amer. p. 3.*
Tourn. Inft. p. 116.

IPOMOEAE foliis pedatis, Iobis septenatis obtusis, integerrimis, pedunculis trifloris.

F I G U R A P R I M A

Radij. ingens crassa, brachiata, tuberculata.

Canis flexuosis, volubilis, globosa, rotundus.


Folia palmata, seu potius pedata, digitis septem lanceolatis, obtusis, integrimis, glabris, exterioribus minoribus.

Feduncili communes ex aliis triflori.

glores longiflora, tubulosa.

Capulae ieminales oblongae, triloculares, glabrae,

Semina conica, uti in lateralibus figuris patet.

 *Jamoclit* heptaphyllus, flore coccineo, umbellato. *Plum. Cat. pk Anier. p. 3. J'Onrn. Inft. p. 116.*

IPOMOEA foliis digitatis, foliolis septenatis lanceolatis, integerrimis^ pedunculis multifloris, brevijugulis, subumbellatis.

FIGURE S E C U N D A.

folia digitata, petiolata^

Folio septem lanceolata, integriflora, ^minata, fessilia, fere sequalia. *Flores* ex alis corymbos, eopiofissimi in pedunculis multifloris.

Capulae seminales oblongo-trigonae, acuminata?, glabra?.



TABULA NONAGESIMA TERTIA.

 *Uamoclii* foliis amplissimis, cordiformibus. *Plum. Cat. pl Amer. p. 3. Town. Inft. p. 116.*

IPOMOEA foliis cordatis, integerrimis, floribus confertis, corollatis indivisis. *Sauv. Monsp. 114. Linn. Spec. p. 161. no. 8.*

PLANTARUM AMERICAN ARUM

F IG^l U R A P RIM A .

Caulis volubilis, laevis, rotundus.

Folia folitzm, cordate, acute, integerrima, ampliflima > ex loigis pe*
tiolis.

Pedunculi jex.alis longiffimi, multiflori, tres quatuorve flores producen-
tes quafi corynbbfos.

Flores longiflimi, tubulofi, indivifi.

Capula feminales, fubrotundae, obtufe, quadragonae, & quadriloculares,
Semina oblonga^ uti in latetelibus figuris.

Q *Uamoclit Hederae folio trifido.* *Plum. Cat, p. 3. Town. Inft. p.*
n6.

IPOMOEAE foliis cordatk , trilobis, floribus corymbofis, ftaraliibus
prominulis.

F I G VR A S E C U N D A

Qmlis flexuofus, glaber, rotuhdus.

Folia fblitaria, cordata, profunde triloba, glabra, veno'fa ac ~~finu'la~~,
petiolata.

Pedunadi ex alis longiflimi, plurimos gerentes flores corymboBs , &
quafi racemofbs.

Fvres ingentes, tubuloli, indivifi.

Stamina longiffima, prominentia ex corolla, quod peculiare in hac ~~specie~~.

Capfu U feminales fubrotundae, obtufa?, quadriloculares.

Semina ovata, hilo diftin&a* iiti in marginib[us] Figuris.



TABULA NONAGESIMA QUARTA.

Q *Lumoclit fola.nl f<->ll>9 ilv^ic AUXCO. PlwriT^&ae; p* 3. ToUTH* p.*
116.

IPOMOEAE foliis cordatis , acutis, integerrimis, ftoribus folianis.

Roy. prodr. p. 430. Limufpec.pl. p. 161. no. 9.

FIG URA PRIM A.

Caulis volubilis, angulofus, glaber.

^iafolitana, yetiolata, cordata, acuta, venofa, \ntegeTrima.

Peduncuh ex ahs longi, rarouniflori, plerumque multirfori, faltsej iux-
ta Auftoris iconem.

Flores longi, tubulofi; corolla? quinquefida?, patentes, ex quibus Sta*
mwa prominent.

Q *UamodiP* purpurea, fblani-folia, minor. *Plum.* *Hift.* *nijf.* *torn.* 2.
p. 62.

IPOMOEAE foliis cordato-oblongis, finuofis, floribus verticillatis, pe-i
.dunculis brevifimis, confertis.

Convolvulus minor I fcandens, floribus pluribus alaribus, calicibus gla-
« bris , capfulis quadrispermis, foliis oblongo-cordatis. *Brouw.* *Hift:*
Jam. p. 153. no. 6.

FIGURA SECUNDA.

Radix repens, longiffima, ad extremu'm bifurcata.

L'auks, debiles, flexuofi, rotundi, glabri.

7^/^lbitaria, vix petiolata^ cordato-lanceolata, ilnuofa, ac venofa,

Fyres ex alis congefti, minutiflimi, corymbofi, feu verticillati, vix tu?
bulofi ex brevifimis pedunculis.

Corolla rotata, monopetala, quihquefida a, simili calici quinquefido bb
Jnfidens, ^ funt corollce separats in lateralibus figuris.

Cap/da female's quadrifidae, dd quadrispermse,

&&ima fu'BfStanda & angulofa ee,

Qbferv&io. Plurimos fane habent *Convolvulos* Au6lores, fed nullus pul-
thrius eos dephmt qlfam *Plumier.* in fuis iconibus, reliquorum vix va^
ient, quum non ita infpicere & obfervar^ potuerint vivos, ac pluri-
morum funt ex miftulatis fccis plantis, exceptis Dillenianis in *Horto*
Elthamenfi, adeoque maximam lucem huic generi attulit au&or nofter,
quique bptime etiam Convplvulos ab Ipomoeis diftinxit, atque diffe-
rehtias egregie obfervavit, uti ex datis figuris atque ipfarum descriptio-
nibus facile peritiores id detegere valent.



TABULA NONAGESIMA QUINTAL

C Onyza frutefcens, Cydonise folio. *Plum** *Cat, pi. Amer. p. 9.* *Tourn.*
lnft.p. 455- *FailX 4tt.Parif. 1719.^ 3?7-* no. 26.

CONYZA foliis ovatis, caule fruticofb, floribus axillaribus, fblita-
riis, feffilibus.

JLupatorium Americ. frutefcens, Hederae terreflris folio, flore purpuraP
cente. *Plump. 10. Town, Injl. p. 456. PailL I. <*

FIGURA PRIMA.

•84 PLANTARUM AMERICANARUM

P/antafruticofa, ramulis flexuofis, a folio ad folium eleganter inclinatis*.
Folia alternata, ovata, obtusa, undulata, venosa.
Floras folitarii, in quevis sela fofiles.

Flores folitarii, in quavis ala feffiles.

Obfervatio. Diftincla hsc species eft a reliquis congeneribus, floribus non tantum ad alas foliorum fblitariis, fed & feffilibus, multumque participat de *Eupatorio*, uti ex fummorum Botanicorum denominatione, *Tournefort*, & *Vaillant*. patet; quod latius ex *Atl. Parif* innotefcir.

j *Acobda humifusa*, *Hyperici* foliis. *Plum.* Cat. p. ic. Tourn. Inj^k
P' 4S7.

MELAMPodium foliis lanceolatis, caulis procumbentibus.

FIGU'RA SECU.NDA.

*Planta procumbens, ramulos undique fparens simplices, indivisos,
Folia oppofita, feffilia, lanceolata, ad oras villofa, feu ciliata.*

Flores caulinatos terminantes, ex aliis pedunculatis, foliariis, in quinque radios diftindit. pufilli.

Obfervatio. Haec planta ex iconē adeo obfcura eft, ut[^] qqj referenda-
anceps diu hseferim, flores enim ruditer depi6li, ac fruc^{*if}[^](.ioinceK)
ta, proxime tamen ad *Melampodium* vifa fuit pertinere, de-quovide
Cl. *Lmnai lion. Cliff:* p. 42[^], qu?e planta ibi defcrigtaj, fi cum norfia
comparetur, fumمام indicabit adfinitatem.

TABULA NONAGESIMA SEXTA.

C. Onyza arborefcens, lutea, folio trifido. *Plum, Cat. pi. Amer.* p. \$*
Tourn. *Inj. p.* 455. *Vaill. Ad. Parif an.* 1719. p. 3\$7< ^{no}> 3°*

C O N Y Z A foliis haftatis, trilobis.

Conyta folife inferioribus trifidis, superioribus ovato-lanceolatis, bhfolete ferratis, floribus corymbofis. Linn. H. Cliff, p. 405. fpec.pl.p. 862. no. 5. Virga aaria major, five Herba Doria , folio finuato hirfuto. Sloan. Cat, pi. Jam.p.\%^ Hift, Jam, torn. 1.p 260. Tab. 12. Fig. 4.

Cannabis sativa L. var. fulcis exaratus

Folia in petiolos definitia, fcharta, trilobata, obfolete ferrata, fupe-
nora ovato-lanceolata, quintuplo minora.

Florum corymbus ingens, extenfus .. fummos terminat ramos-, floresque ipfi veram declarant Conyzse efTefpeciem, quod confirmat Cl^K FailL in Adis Parif /£ .

TABULA NONAGESIMA SEPTIMA.

COnyza arborefcens, purpurea, folio Verbafci dentato. *Plum. Cat.pL Amer.p. 9. Tourn. Inft. p. 455. Vaill. Ad. Parif. ann. 1719. p. 395. no. 11.*

CONYZA foliis lanceolato-ovatis, ferratis, petiolatis, alternis.

Eupatoria Conyzoides Maderasp. foliis glabris, flore purpurafcente.
Phtkn, Almag.p. 141. no. 2. Pbyt. Tab. 177. Fig 2.*

PJanta frutefcens, ramos gerens ac caules fimplices ere&os.

Folia alternata, petiolata, lanceolato-ovata, ferrata, acuminata.

Flores corymbofi, terminatrices, in varios elegantes minores corymbos parti.

ObQrvatip. Media hasc planta eft inter Conyzam & Eupatorktm, quum ad utrumque genus hæ plants a variis refcranrur au<storibus, flc hujus varietas eft, qua? Conyza arborefcens, purpurea, folio Verbafci undulat a Phmier. vocatur. a Tournef. vero in Inft. pag. 456. dicitur Eupatorium Americ. Verbafci folio, atque a precedenti non differt nififoliatur. rriintegra, cujus fimplex folium in Tabula ad latus confpicitur.

JEff^ue^Eaffitoria Conyzoides, Verbafci folia, feu Baccharis Americana Tuayeolens. Phtkn. Pbyt. Tab. 87. Fig. 1. &

Conyza Q&or2£%^x!^o>:^>e.re€Xd. purpurafcens, corymbofa; foliis ovatis, viiloih: "Hirouw, Hift. Jam. p. 318. &c.

TABULA NONAGESIMA OCTAVA.

COnyza Alopecuroides, Helenii folio, caule alato. *Plum. Cat.pL Amcr. p. 9. Vaill. Atl. Parif. ami. 1719./>. 397. no, 27.*

CONYZA foliis oblongo-lanceolatis, decurrentibus, floribus conglomerato-fpicatis.

FIGURE T R I M A.

R[^] x **N**o **f**^o**r**^m, crafla, fimplex, descendens, in extremo fimplices de-mittens radicales crafas fibras.

Caulur fimplex, ere&us, pentagonus, fulcatus, & alatus.

F A ovato-lanceolata, ferrata, decurrentia, alternata.

Spica vari< capitatae, aggregatos & tubulofbs (uti ex icone videtm) "flores gerentes, qui vero ruditer & inperfe&i delineati sunt, ita ut nil certi de i;s-commentari posse, longe tamen ab illis Conyza? recedere vi<kntur, ac potius Spbarantbiefle speciem putarem; fed quum adcuratifi Fnilljantius, qui raro in generibus fallit, eas ex inftituto examine mAtt. Parif ad Conyza genus retulit, ejus auaoritate freti & ipfas sub hoc genere fervavimus.*

\$6 PLANTARUM AMERICANARUM

COnyza altera, foliis Helenii anguftis, alato caule. *Plum. Cat, pi Amer.** p. 9. *Vaill All. Part, arm.* 1719. >. 397» no. 28.

CONYZA foliis enfiformibus, ferrulatis, decurrentibus, racemo compofito.


FIGURE SECUND A.

Radix Napiformis, fimplex, descendens, vix fibrofā.

Caulis ere6his, liniplex, angulofus, fulcatus, nee ita alatus.

Folia lanceolata, ferrara, angulta, acuta, feflilia, alternata, decurrentia.

Flores paniculati, ex fpicis alternis fimplicibus compofiti, quique lefliles funt, alternatim pofiti, calicibus magnis imbricatis contenti &c.



TABULA NONAGESIMA · NONA.

COnyza fcandens, Solani folio aftgulofb* 'Ph;™ ^{Tl} mff. T.'n. p. 117.

EUPATORIUM caule volubili, foliis cordato-ovatis, denticulatis.

Eupatorium fcandens, fblani folio angulofb. *Vaill. Ad. Parif. ann.* 1719., p. 402. no. 33.

Cocotemecalt) feufunis volubilis acer. *Eernand. I. f. c.* 8. p- 14r.

i3 *Clematitis* novum genus Cucumeris folio, Virginianum. *Plukn. Almag.* p. 109. *Tab,* 163. *Fig.* 3. quod

Eupatorium caule volubili, foliis cordatis, dentatis, acutis. *Linn.Jpec,* pi. p. 836. no, 2. *Roy.pr.p. i\$6.* &c.

Caulis vix volubilis, ac ramofus.

Folia cordato-ovata, denticulata, acuminata, petiolata, obpofita.

Pedunculi ex alis ramofi, *flores* rariores plerumque *gemelli* ac laxi.

Obfervatio. Hanc veram *Eupatorii* efle fpeciera liquet ex *Vaill. Ac-Hs> Parif.* multumque habet commune cum *Eupatorio* volubile *Un-nai*, ita ut crederem ejus tantum efle varietatem, ni *Vaill. fub no.* 33. hanc removerit a przecedenti fub no. 25. plurimis interpoftis aliis plantis, recenfui tamen utrafque, uc ex memoratis au<5loribus inter fe ulterius comparari poſtent.

Fig. 2.

CASSIA foliolis
triangulis, ovatis.

i*N.

Vf

h

A.






Fig. 1.

CASSIA foliolis
niiitnili» nbluli .*






CASSIA. iitliolis underim jugatis.

Fig. 1.


("Assi \ foliolii (uiocque jugatis



DURANTA inermis.




CELTIS foliis lanceolatis.




TAB. LXXXII



SMILAX cæde tereti, foliis inermibus.



S M [I. \ \ C J III U ai-ulcato.
folius ovatus.



S M 11. AX r.nJ^ itii'raii. fnlii* - »n\.,u-



SMILAX caule aculeato,
foliis ovatis-lanceolatis.




Fig. 1.

KNAXTIA caule <liclictor>
foliis sessilibus.



Fig. 2.

ANTHEMIS foliis ovatis.





HIPPOCRATEA.



COLUMNEA

Fig. 1.

Fig. 2.

CONVOLVULUS caule repente, foliis cordatis.



Fig. 1.

CONVOLVULUS
sibiricus digitatis, septenatis,
lanceolatis.



Fig. 2.

CONVOLVULUS
sibiricus obtusis, palmato -
lobatis.



Fig. 1.
CONVOLVULUS
foliis pedato palmatis.

CONVOLVULUS
foliis digitatis.



IPOMOEÀ foliis digitatis.



IPOMOEÀ foliis cordatis.

IPOMOEÀ foliis cordatis, trilobis.





Fig. 1
CONYZA folia ovata,
floribus axillaribus.

MKI. AMPG. 1111 w folia lanceolatis.



CONYZA foliis hafatis, trilobis,



CONYZA feliis lanceolatis-ovatis.



Fig. 1.

CONYZA foliis
oblango lanceolatis.

Fig. 2.

CONYZA foliis eiformibus, ferrulatis.

TAB. sceis



EUPATORIUM
foliis cardato-ovatis

S. H. r.



Li'iViA 1k'lik-A L.tll* timiiti* >t ,iim. 111.

P L A N T A R U M
A M E R I C A N A R U M
F A S C I C U L U S Q U I N T U S ,

Continens Plantasj quas olim

jC A R O L U S P L U M I E R I U S ,

Botanicofum Princeps

Detexitj Eruitque^

A t q u e i n I N S U L I S A N T I L L I S i p f e d e p i n x i t ,

H a s p r i m u m i n l u c e m e d i d i t ^

Concinnis defcriptionibus b & Obfervationibus >


i f c i e i s c j u e Tabulis illiiftravit

J O A N N A S B U R M A N N U S , M . D ,

jithenai illujlris, 6? in Horto Medico AmfteUdamenfi

P R O F E S S O R B O T A N I C E S ,

Academia Cafarea Natura Curioforum Socius.



Sumtibus Auftoris,

Prop ant Amfleladami inJHorto Medico,

Atque

Apud V I D U A M & F I L L I U M S . S C H O U T E N ,

6? L U G B . B A T A F .

Apud GERARD. POTVLIET, & THEODOR, HAAL
M D C C L V I I .

DOCTISSIMO ET CELEBERRIMO*VIRO,

CASIMIRO CHRISTOPHORO
SCHMIDELIO, M. D.

#SERENISS. MARGL BRANDENB. CULMBAG

A CONSIL. AULIC. MEDIC.

ANATOM. Et BOTAN. PROFESS. PUB. ORD.

IN ACADEMIA FRIDERICIANA ERLANGENSI

D I G N I S S I M O₃

A M I C O R O M O P T I M O ,

Q U I N T D M H U N C

PLANTARUM AMERICANARUM

F A S C I C U L U M

SINCERO DEDICAT
ANIMO

JOANNES BURMANNUS.

PLANTARUM
AMERICANARUM
FASCICULUS QUINTUS.

TABULA CENTESIMA PRIMA,

Coralhdendron foJiis Pseudoatacice, fubtus~ tomentofis, flôre luteo*
Plum. Cat. pi. sdmer. p. 21. Toum. inji. p. 662. Roy. pr. p. 537.,
SOPHORA foliis pinnatis* foliolis cordatis* fubtus tomentofis, fpica simplici.

JGalega fruticofa, foliis fubrotundis, pinnatis, fpicis simplicibus terminali*
bus. Brouw. Hi/I. Jam. p. 289. Tab. 31. Fig. 1.

ArborV Coral affinis^non fpinofa, Fraxini folio rotundiore, foliis & ra-
mulis pubefcentibus. Sloan, Cat. pi. Jam. p. 144. Hjil. Jam. torn. 2.
/7>6, 37^, fig. j. »

fhqfeolo affinis arbor Indica, *Coral* difta, polyphyllos, non fpinofa, fo-
jiis moliibus, fubhirfutis? Pkkn. Pbyt. Tab. 104. Pig. 3. cuius folio-
la santum quinata funt in icône.

Planta fruticofa, mollisi & inermis.

Folia pinnata.

Foliola cordata, obtusa, fubtus tomentofa, 0610 vel novem jugata; ob^
pofita, vix petiolata, cum impari extremo.

Flores in longam ac fimplicern ipicam porre&i funt copioffimi, quorum
chara&erem tradidit Cl. Brouw. I. c.

Siliqud pendulae, finuofe, feu torofie, glaberrimas, acuminate.

Obfervatio. Tota sua facie haec planta multum accedit ad *Sopboram* to-
mentofam. Unnai/pec. pi.p. 373.00, 2 qusefub nomine *Colutea* Zeyl.
argentese ab Herm. exhibetur in Cat. H. L. Bat. pag. 171. ubi vero fo-
lia nimis acuminata delineata funt, quae in planta viva hoc anno ^{171*}
rotunda obfervavi, quorum minora tomentofa penitus erant, majora
vero fubtus tantum rincana, reliquae caeterutn partes convenient, ita ut
non dubitem, quin ipfius varietas hgbenda fit, unde ad idem genus
fit ~~ratu~~ retuli.

PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA CENTESIMA SECUMDA,

C. *Orallodendron* folio singulare, oblongo, filia plana. *Plum. Cat.p.*
21. *Town, inf.t.p.* 662.

ERYTHRINA foliis simplicibus, alteriis cordato-oblongis, repandis, ilorum pedunculo Jongiffimo.

FIGURA PRIMA.

Folia cordato-ovata, acuminata, integerrima, venosa, in getitilis repanda, alternata.

Flores in longiflisis pedunculis verticales, copiofi[^] alternatae.

Siliqua pendulae, simplices, planis, glabrae, acuminatse.

Officula fubrotunda, glabra, hilo nota^a.

Obfervatio. Ex florum fructura, tōtoq̄e plantae habitu, vera j fed quam maxime singularis est *Erythrina* species, quae [^]i *Plumier So Xiz* n̄t pinxerit, perios fuos videtur non ad bafin folii, fed infra inferere, ita ut fere peltata ac simul repanda fint, quae singularis fructe nota est in hoc genere.

y^ *Orallodendron* non spinofūra, triphyllum, flore ruberrimo. - *Plumier*[^]

ERYTHRINA inermis, foliis pinnato-ternatis, fructuofb-ovatis, floribus spicatis.

Erythrina arborea, non spinosa, foliis rhombatis, pinnato-ternatis* *Brouui**
Hi/I. Jam. p. 288.

Corallodendron triphyllum, Americ, non spinosum, foliis magis acurni* natis, flore pallide rubente. *Houft. Cat. mff. Treiv. Decad. Tab. vni.*

Coral arbor non spinosa, flore longiore & magis claufo. *Sloan. Cat.pl. Jam. p.* 143. *Hift. Jam. torn. I. Tab. 178. Fig. 1 & 2.*

Coral arbor Americana, non spinosa, feminibus rubris. *Herm. Par. Br. pr.p.* 327.

F I G U R E S B O U N D A.

Flauta arborea, caudicem gerens inermem, glabrum, simplicem vixra[^] modim.

Folia pinnato-ternata, ovato-finuo^a, ac venosi[^] xsiolis Jopgis simplicibus communibus.

Flores in longam ac simplicem spicam porriguntur plures simul coniuncti longiores, magisque cluufi, quam in vulgari spinosa specie, uti optimè notavit *Sloaneus*.

Obfervatfa,

Obfervatio. Hzez planta varietaJ cefenda eft *Corallodendri* fpinofi, nb-
tum enim efK,yaries planted itjiWjyis r&gionibus,] u\$rir^n6ftris hyber-
naculis fpinas exuere, quod omnium evidentiffime prae aliis obfervavi
in *Solano* caule aculeato, fruticofo, foliis lanceolatis, angulofis. *Linn.*
fpec.pl. p. 188. m 22y quae planta fi fit teniera, ilap junidr non mo-
do caules ac ramos fpinis undique armatos gerit j fed foſia: -etiam ab
^utraqe parte aculeis fuit munita, haec fi per paucos annos ji hyberna-
culo fuerit culta, totam fuam faciem ^cfdrma.m.mu(at, mitiffima enin?*
fit, ita ut nullafera fpinkriim vel aculeorum faperfint veftjgia in tota
planta, fed foſia quoque ejus, quis prius profunde finuofa, aCtileata, &
rigida fuit, dein obfervantur integerrima j duplo latiora >Jgete viren-
tia, ac glaberrima &c.

TABULA GENTESIMA TERTIA.

*C*Orxhorus folio UJmi minor. *Plum. Cat.pl. Amer.p. 7.*

CORCHORUS glaber, foliis ovatp-ferratis, capfulis geminis linea-
ribus.

Cprchorus capflilis Jinearibus compreffis, bivalvibus. *Linn. Jpec. p. 529. no. 1.*

*C*o^. ^^^Amerit, minor, Carpini folio, *filiqua anguftiflma, ex lateri-
bus ramulorum proveniente. *Breyn. prpdr. 2. p. 56.*

Cgreta foiiis minoribus, ovatis, crenatis, floribus flngularibus. *Brouvi.*
"Hi/I. Jam. p. 147.

Corcboro affirm Chamaedryos folio, flore flamineo, feminibus atris,
quadrangulis, dupli ferie difpofitis. *Sloan. Hi/I. Jam. torn* 1. pag. 145.*
*Tab. 94. Fig. 1. & C*t. pi. p. 50.*

FIG VRA PRIMA :

Planta mollis, inermis, herbacea, ramoia, diffufa.

Caulis glaber, rotundus, viridis.

*JPo*wovata, ierrata, petiolata, fblitafia, alternata.

Floret ex alis nunc gemini, nunc folitarii, ftaminofi.

Capfula fcminales, feu filiquae glabrae, lineares, obtufe, bifids, ac bi-
valves, uti in separata apertafiliquatetj geminae plerumque in com*
muni pedunculo ex alis produ6ta3.

Setnina oblonga, obtufa, glabra, nigricantia, uti in Icone.

*C*orcborus folio Ulmi major. *Plum. Cat. pi Amer. p. 7.*

CORCHORUS caule pilofq, foliis lanceolato-ferratis, capfulis pilo-
fis EX alis folitariis.

F I Q . U R A SAGUN DA.

Radix brachiata, pliirtmis ex Ebfillls bifurcatis confitans.

Caulis ere&mi, lignofus, pilis undique hirtus ramos producens alternat* tosy;filiiplices.*

Folia ovato-lanceolata, petiolata, ferrata.

Flores ex alis fblitarii, ftaminofi, pifillo bifido a coñftantes j quod microscopio auftum b, ftigma exhibit bifidum & hirfiitum, quale & ger men eft ad bafin, uti in iconē majore feparata diftindte adparet.

Capfula jfeminalis fblitaria, longa, hirfuta, bilocularisj uti in aperta 62 feparata filiqua cc confpicituf.

*Semina plurima, fubrotunda, feparatim pofita d**

Stipula geminse linearifubulats ad foliorum alas circa filiquas locantur; quibus a priori diftertum & quod illoresac fijiquae fblitariae exrefcant, praterquam quod haec cum caule hirfutae fint.



TABULA CENTESIMA QUARTA.

GUazuma frutex, Chamaedryfbla, fnu6lu landginofb", major, oS minor. *Plum.- nov. getkpag. 36:*

GORCHORUS capfulis fubrotundis, Ianatis, foliis ovatis, obtufis, tomentofis. *Linn.Jpec. pi. p. 530. no. 4..*

'Cortborus Americanus, lanuginofus, folio Chamasdryos, filiqua tricap* filari, lahuginofa, & fubafpera. *Breyn. prodr. 2. p. \$&*

Planta fruticosa, ramos gerens alterriatos.

Folia ovata, obtufa, crenata, fblitaria, tomentofa, petiolata.

*Flores ex alis exrefcunt pedunculati, aggregati, rofacei, pentapetali, uti a *Plum. I. c.* ulterius describuntur, & *Tqb. ig.* exhibentur.*

Frudus plures simul dependent ovati, carnofi, & tuberculifi, fulcati, ac lanofi, in quinque loculos diftih6ti, lemina continentes fere reniformia (ubrotunda).

*Gbjervatio. Licet fructus hujus plantse a reliquis *Corcbori* fpecificibus fint diverfiflimi, flores tamen hifce adeo adfines funt, ut *Corcbori* generi Cl. *Breynius & Linnaus Juxtz* doarinam fuaam hanc inferuerint, unde & nomen Barbarum *Guazuma* a *Plumierio* impofnum er (cientia Botanica merito rejicitur.*

TAttULA .CEN^TE^SIMA ; qj-UINTA.

CX^Ordia Nucis juglandis folio, flore purpureo. *Plum. nov.gen. p. 13.*

CORDIA foliis ovatis, integernmis. *LinnJpBf.p.ag. 191. #0, 3.*

f&irafcanthim foliis ovato-oblongis, utrinque produftis, racemis terminis. *Brouw. Hift.Jam.p. 170. Tab. 29. Fig. 3.*

/3 Sebe/lena fcabra, fiore miniato, crifpo. *Dillen. H. Eh bam, p. 340.*
* *Tab. 29. 3.*

Plantà arborea.

Folid fubcordati, ovata, lata, integerfirā, Vénofl¹, vix petiolata, laevia. *Florès corymbofi*, gemelli plerumque ex unico pedunculo, funtque monoperali, infundibiliformes, orisut plurimum repandis, quorum unus calice suo contentus ab *arnicā*, parte in figura marginali a confpiciit, alter a postica parte *b*, tertius per longitudinem apertus *c*, ut ftaminii fitus dignocatur, *d* eft difledlus calix cum genuine & ftilo.

*Frtflu** eft turbinatus, cafnoius *e^* ofliculo foetus /, in diio loculamente *a^* divifus jcontinetque hucleum oblonguiii *b* irregularem, juxta *Plu^* *nierium^* cfijus *T-ab. 14.* cum nofra confem pote(i Vide & *Ludvoig** defiuit. getier. p. 21. nō. 78.

Obfervmio. Cl. Brouwn. ex inftituto examine hujus *CordU* charabi:erem diverfqm obfervaVit a *Plumierii* CO RDIJE charabiere, quern proponit *J^Hifi. Jam.pag. 202*, ubi *Cordia* nomen genericum fervavit, tjuocl *inP lumierii* planta rejicit, fed meo judicio melius feciflet, fi hujus plantae nomen ab autore inpositum retinuiflet, aliique plantae nomea dedifjet novum gerierieum, atque an huic stirpi merito competat nomen *Grajanthi*, judicent alii fyfthematici Critici, ego faltem non video rationem arbitrarias nominis iſtius rejeftionis, quae, fi in re Botanica'tam audaſler quotidie fine ratione inftituatur, chaos confufionis pofteritati tradet inextricabile, unde malui a primario inpositum audore nomen *Cordia* fervare, quod a *Plumieri* ipſi datum eit in memoriam *Palerii Cordi*, cujus merita & faſa recenſentur a *Plum.* in *nov. gen. pag. 13.*

De nofra porro planta defcripta vide *Dillen. I. c. p. 341.* qui dubitat hanc cum sua eonjungeret, quod Parifienſes melius determinare poterunt Botanici.



TABULA CENTESIMA SEXTA.

COrnutia fibre pyramidato czeruleo, foliis incanis. *Plum. nov. gen. A 32.*

CORNUTIA. *Linn. H. Cl.p. 319. dtfpec.pl.p. 62\$.*

Agnanthus Viburni folio. *Vaillant. Jld.Parif. an% 1722. p. 273.*
Collycbiricbiboll Caribaeorum. *Surian. Hort. Sice.*

96 PLANTARUM AMERICANARUM

FIGURE Ep R I M A.

*Cautis ere&us, fimplex \$ vix divifus, lignofas, obfbleto-quádragoniis **
*fcaber \$uti in variis *Lantana* fpeciebus.*

*Folia oppofita, ovata, integerrima, utrinque acuta, mollia; apud nee.
 vero ierrata, virentia, fcabra, ae faetidiffima in viva planta, vix petio
 lata.*

*Florum^ facemiis ere6tUSj pyfaifiidatiis^j compoſltus ex corymbis obpo-
 fitis; plurimos producentibus flores, quorum*

*Calix eft monophyllus; quadrifolius, tubulofus, obtufus, & villofus a**
*Corolla eft monopetala, ringens, tubulata, limbo quadrifido, cujus la-
 bium fuperius ere6lum & tripartitum eft, inferius obtufum, uti ad litt.
 bbb adparent.*

Frudus eft bacca fibrotunda, fuceoia cc j unilocularis. <£

Semen ubrotundum, obtufum e.

Obſervatio. Stilus in hujus plantae florebipartitus eft, inftar duorurri cor-
 nuum inflexus, unde dupli allegoria, fimum & in memoriam *Jacobi*
Cornuti Botanici Parifienfis hoc plantae genuis *Plumier* denominavit
 CORNUTI AM, qui inclaruit defcriptione plantarum mriorum Cana-
 denfium, aliisque Operibus nondum editis, uti fcl. *Plum*, in nov. gen.
 p. 33. memorat. Vide porro *Ludwig*. definit. gener. pi. p. 76. no. 266*

Crona Solis frutefcens, Laureok falio, flore luteo. *PJtw. Cat.pL*
Amer.p. 10. Town, injl.p. 490.

B U P H T H A L M U M fruticofum, foliis fafeiculatis, leffifibus, Iw
 ceolatis, caule dichotomo.

AJlerifais frutefcens, Leucoji foliis viridibus & fplendentibus. *Dillen.*
H. Eltbam. pag. 43, Tab. 38. Fig. 43.

Cbryfanibemum Bermudenfe, Leucoji virentibus foliis craffis. *Plukn. Al-*
mag.p. 102. Ray. torn. 3. pag. 210.

Chryanthemi flore planta Americana frutefcens, foliis viridibus, craflis.
Herm. Parad. Batav. App. p% 6.

Cbryanthemum Bermudenfe, folio rigido viridi. *Morf. Hifi. pi. torn. J.*
pag. 25.

FIGURE

SECUND^t.

Pianla fruticofa, cujus caules & rami perfoliorum lapfum fcabri, & quaſi
 fquamofi, fubdivifi, dichotomi.

Folia falciculata, decuſſatim fibi obpoſita, crafla, femptrvirentia, Ian-
 ceolata, integerrima, decidua.

Flores verticales, folitarii^ pedunculati, r^diat^, quales. a *JOtilUn. iv^H.*
Eltbam. I. c. defcriburitur, & delineantur cum reliquis planta? partibus^
ejufque hiftoria integra.

TABULA GENESIMA SEPTIMA.

Grona Solis frutefcens, Lychnidis folio carnific, flore luteo. *Plum.*
Cat.pl. Amer.p. 10. Tourn. inji.p. 490.

[^] **T**JPHTHALMUM foliis obpofitis, lanceolatis, petiolatis, bidentatis. *Linn. H. Cliff.p. 415. spec.pl. p. 903. Roy. pr.p. 170.*

yififerifcus frutefcens, Leucoji foliis fericeis & incanis. *Dillen. H. Eltb**
p. 44. Tab. 38. Fig. 44.

Chryfantbemum fruticofum, tnaritimum; foliis glaucis, oblongis, fiore luteo. *Sloan. Cat. pi. Jam. p. 125. Hift. Jam, torn. 1. p. 260. Catesb.*
*Hift. Carol, torn. 1. p. ^i^OTab. 93**

Cbryfmbemum ex .infulis, Caribapis, Leucoji incanis & fericeis foliis, xraffis. >*Plukn. Almag. p. 102. & Pbyt. Tab. rrj. Fig. 4. Morif. hift.*
pi. torn. 3 pag: 25. i^y. /ew. 3>>. 211. w. 23. ubi defcript. ex Bobart.

FIGURE P R I M A.

'*Plant-a* fruticofa; caules & rarni erefti, fimplices, vix divifi, lignofi,
 «nodofique.

Folia lanceolata, obpofita, integerrima, fibeffilia, incana.

Flores verticales feu terminatrices, fblitan, pedunculati, radiati, for>**fiifHz* ffifturae, quales eleganter & accurate in *H. Eltbam. I. c.* de-
 fccripti & delineati funt, ubi ulterius examinari poftunt cum tota plan-
 %tx facie; fed cujus petioli bidentati in noflra non obcurrunt icone, ubi
 1 folia feffilia latk bafi caules ambiunt.

Crona Solis mgririma, humilis, folio carnofb, tricupide, ilore luteo. *Plum: Cat. pi. Amer. p. 10. Tourn, inji, p. 490.*

BUPHTHALMUM caule repente, foliis obpofitis, trilobatis, feffilibus.

Corona Solis foliis triaftgularibus conjugatis, ilore albo. *Vaill <4B> Parif ann. 1720. pag, 433. no. 12,*

Vulmraria Indica. Surian. Hort. Sice.

Cbryfantbemuni paluftre, repens, minus, odoratum, folio fcabro, trilobato., *Sloan. Hift, Jam^vol. \. Tab. I^J. Fig. 1.*

& *Cbryfantbemum* Virgin, repens, foliis afperis, binatim feffilibus, acuminatis. *Morif. Hift, torn. 3. p. 25. Ray. torn. 3.p. in.no. 16?*

Cbryfantbemum"Virgin, foliis rigidis, acuminatis, binatim ad caulem abfque
 pediculo appofitis. *Banift. Cat. pi Virgin.*

FIGURA, SECUNDINA.

PKANTARUM AMERICANARUM

Caulis ripensis ad rjodos fibrillas jkmitteJis^r 7{, 3 „
Fa/m obpofita, feflilia, cuneiformia, inferiora acute trilobata, ferrata.
Pedunculi uniflori^, teqirinatrices.,
Moris radius multiplex, tridentatus.

Obfervatio. Licet femiria adpi&a flnt "Ha , ex tota plantariim harurri
-forma \$ habit uconftat, hafce non ad *Coronas Solis*, fed ad *Afterijco*:?
Bupbthalmos hodie dittos pertinere, ad quod genus has itaque juxta Cl.
Linnandum retuli, licet haec pofterior magis ad *Rudbeckias* videatur acce-
dere > ae forte a*Rudbeckiam* ttilobam *Jbinnai* pertineret, fblo natali
mododiverfa, quum hsec caule repente, accrgffioe-ab ea diftinguatur*
ui.' "

jOronilla* fcandens, pentaphylla. *Plum. Hiftt tnff. T n.p. 104.

C O R O N I L A foJiolis quinis ovatis, caule flaccido.

Ajiironih caule fcandente, flaccido.- *Roy. pryp.* 387. *Linn.spec.p.* 743.

F I G U R A T E R T I A.

Radix repentiffima & longifiimai

Caulis ramofus, volubilis, flaccidiis.

Folia ex quinis foliolis ovatis obtufis pinnata.

Pedunculus ex fingukala duplex, ldngus₅ unifldrūs, aculeatus.

Flo'res ampli, papilionaceij quorum ftamina coalita ad bafin cob/f~~cont~~; uti
hae partes separata) in figuris marginalibus confpiciuntur, a à a.

Siliqua floriformis, articulata, glabra b.

Semina oblonga, obtufa, cc.

Obfervatio. *StipuU* bin^ rigidse ad fingulas petioforum & peduriculorum
alas , uti & alia minores in ipfis quoque pedunculis oppofitae depicfce
confpiciuntur,qufe an bradtete fint fuperfluaeex florum lapfumelatet,h3B
autem in planta ficca a Cl. *Adr. v. Royen* communicata non adparentj
in qua plures fiores propriis brevioribus pedunculis infidentes ex folio-
turn alis oriuntur, quorum ftamiria quoque coherent, fed filiquas in ea
funt longiflimce, filiformes, integerrimae, nee articulatae, uti in *Plumie-*
rii ieone, videtur itaque diverfa planta ab hac 2L,*Plumierio* depicta.

TABULA CENTESIMA OCTAVA.

Gortufa arundinacea, amplis Canacori foliis. *Plum, nov.getz. p.%6.*

THALIA. *Roy. pr. p. 11. Linn.spec.p. 1193.*

Maranta folib lanceolato-ovatis, petidlis fupeme ganglionofis j fnu&stu gla-
bro. *Bronw. Hiji. ffam. pag. 112.*

Canna

Canna Indica, radice alba alexiphqfmaca; *Sloan. Cat. pi. Jam. p. 122. Hi/I.*
Jajn. torn. r. p. 25:3. Tab. i^ghftg. 2. ubi fimplex folium.
Radix qusedam in Malacca, quae lkjverfus vulnera fagittis toxicō illitis
fa6ta, prasfentaneum remedium. € Banb. Pin.p. 3<Dr.
Agutliquepo-Obi. Marcgr. Hifi. Brafil.p. 53. Ray. tiift.plp. 1203.

F I G U R A P R I M A .

Radix arundinacea, tuberqfa & nodofa> inferrie plurimas emittens te-
 nuifimas fimplices fibrillas, fuperne varios proferens ftolones.
X^ulmus fimplex, ere&us, folia producens alternata, quorum petioli in-
 ferius extenduhtur in vaginam caulem inveftientem , iiiperius au-
 tern hie culmiis ramofas e(t, atque ex quavis fpatha florem unicum vel
 geminum profert.
Flores hi fiant anomali,pentapefali, ex qufnqie petalis inasqualibus & difli-
 milibus coridantes, quorum tria majora furfum eriguntur concava &
 quaf lacerata , biha inferiora minora ranquam adpendices dependent
 urceolata & qua(i revoluta, uti in Tabula ex separatis florum partibus
 appet, ubi Litt. a flos integer , b ipfius corolla cum germe^ c flos
 jfpathu fua cofrtentus & dbvolutus, ^fimplex mājiis erettum petalum^
 e ipfius floris minus dependens. ffpatha separata.
Frptms eft ovatus, glaberg-, bilocularis h\$ interdum unilocularis i, femi-
 na feu oflicula cominens oblonga, glabra,& fplendentia k k. *germen* au-
 tem cum ftilo eft: /, non vero ipfum *femen*, uti male in *Plum. Tab. 8. ex-*
j2^ca'rat?^(ide porro *Ludwig. definit. gener.p. 316. no. 1066.*
folia hujus planrae funt alternata, ovato-oblonga , integerrima , nervis
¹¹ C̄aralleli^ac transverfis obpofitis inftru6ta, glaberrima.
P/tio/i foliorum teretes, geniculo feu ganglio juxta Cl. *Brouivn.* infl:nu<5li,
 ihferne membranacei & vaginales.
Obfervatio. Ex modo crefcendi, totoque plants habitu, uti & ex Au6lo-
 rum teflmoniis patet, hujus plantse radicem aromaticis & Alexiphar*
 macis eile annumerandam, quales flint *Amomuñ* feu *Zingiber^ Colus^*
Kampferia^ & *Jlpima^* cui & haec maxime adfinis eft, quae ultimas,
 Jicet in ufum Medicū nondum fint introduclae, egregiis tamen fine
 dubio pollent virtutibus medicatis, & inprimis Alexipharmacis.

Roots foliis & radice Scorzonerae. *Plum. Hifi. mff.tom. 3. pag. 142.*

GETHYLLIS foliis enfiformibus, ancipitibus, nervofis.

F I*G U R A S E C U N D A.

Radix ingens, perpendicularis, fufiformis, in varjos annulos quafi diftinfta,
nigricans, quales & funt laterales cratfē dependentes adpendices fibro-
& > illi Scorzonerae fimilis.

166 PLANTARUM AMERICANARUM

Scapits supra terram mox fefe aperit in hna, titi videtur; in ^ oluera membranacea, acuminata, quae totam ir > 4 lvunt plantse compaginem, atque ex quibus erumpunt

Folia longissima, enifidrmia, acuminata, glaberrima; & integerrimai quam maxime nervosa; ancipitia, quae ex tenui principio fennim dilatata\$ in medio latiflma, in mucronem definunt acuminatum.

Flores singuli sua continentur peculiar! fpatha acuminata \$ ad of as dentata; seu ciliata, longo tubo inftru&i, in fex fegmenta divisi, quorum varias formse in separatis iconibus in Tabula exhibentur, fie ad Litt. A flos antica^ B postica parte cum fpatha sua confpicitur, C flos clauflis est cum fpatha apertaj D floris corolla difflclla, ut ftaminum fitus adpareat, E flint ftamina cum germe in fundo floris fita.

Frudus est capula veritrico fa F. trigona, & tfilocularis G.

Semina sunt subrotunda, excavata^ fere reniformia H H.

Observatio. Ex ftaminibus Corolfee brevissimis ac numerosis liquet; hanc plantam non ad *Crocum* sed *Geihyllidem* pertinere, cuius characterem dedit Cl. Linn, in gen. pi. nov. edit. no. 523. cum quo genere ~~act~~ anta penkus convenit, vide St Ludwig. definite gen. no. 158.



TABULA CENTESIMA NONA.

C

v^tT / latifolia, fructu putamine fragili. *Plum. nov; gem p. 2j7*

CRESCENTIA. *Linn./pec.p. 626.*

Crzfcntia arborefcens, foliis singularibus, ovatis/mtidis, fructu minore.

Brouw. *Hift< Jam. p. 266. no. 4.* ubi variae hujus arboris species.

Cucurbitifera arbor Americana, folio fibrotundo. *Sloan. Cat. pU Jamaic. p. 206. Ray. Hift.pl. p. 1667. Harm. Farad. Bat.pr.p. 329. &c.*

Cucurbitifera arbor Americ. folio longo mucronato, fructu oblongo. *Commel.Hort. Amft. torn. I. p. 137. T. 71.* quae foliatura anguftiore differt & convenit cum

Cujete foliis oblongis & anguftis, magno frudlu^ovato. *Plum. nov. gen.*

¹ *P-²I-*

& *Crefeentia* foliis lanceolatis, utrinque attenuatis. *Linn. H. Cliff. p.JZ^*

Plant a arborea , ingens.

Folia ovata-oblongaj alterna, integemmas petiolo cratfo fed curto inildentia.

Flores folkarii, pedunculati, monopetalii, anotnali, utriculati & multifidi, seu ringentes.

Frutlus ovatus, eortice duro teftus, pulpofus, i_n quo nidulantur

5^ plurimacordiformia, uti in transverf_{lm} f_ea_o f_ru a_u <; & feoraratis confpicitur feminibus bk

TMi<_x TM

Calix

Calix verò tyfidus ē germen blleludit, ex quo ftilus longus obtufus, feu piftillum ^porrigitur, ee fnt ^ermina diffe&a.

Qbservatio. Hujus arbdris varias Tunt species j feu, ut aliis placet, variates, quae a *Plum.*, in *nov. gen. p. 23.* recenfentur, uti & a *Brouwn: I.e.* quae in primis differunt, quod folia gerant nunc ovata, nunc lanceolata, vel folitaria vcl conferta, dein & binag fcandenres a Cl. *Brouw.* lifce annumerantur, quae diverfas fane conftituunt species, dein fru6li* bus etiam differunt, qili maxime adfines. fuit illis *Capparidis* antea defcriptae, fed florum corolla toto caelo differt.

[^]Nomen vero genericum *Crejcentia* in memoriam *Petri Crefcentii* Itali Botanici fubflitutum eft a Cl. *Linn&o* in locum *Cujete*, quum hoc fe %< barbarum Americanum merito rejiciendum;

TABULA CENTESIMA DECIMA.

Cupania Caftaneae folio, fru6lu fericeo & racemofb. *Plum. nov. gen.*

)CUPA \$ IA * *Linn. fpec. p. 200.*

Cupdnia arborea, foliis oblongis, crenatb-ferfatis, diftiche & alternatim fiti3, racemis iaxis propendentibus. *Brouw. Hifi. Jam. p. 178.*

Pl ~~rig. wq~~ ~~re~~ ingens, ramos proferens fimplices, in quibus *Folia* alterna, oblonga, obverfe-ovata, obtufa, dentato-ferrata, vix pè- o tjolata^ nervis transverlalibus craflis parallelis.

plows in laxos excrefcunt räcemos, fntque rofacei, pentapetali a, calice triphylo contend I; quinque gerentes fkmina, ac germen obtufum cc. *Frutlus* eft durus, coriaceus, obtufb-ovatus, trifariam ab apice ad bafin dehifcens d^ feminibus *feetus* in quovis Ioculo binis fubrotundis irregulalibus ££, pileolo carnofb feu calyptra frudui adfixis//! Vide *Ltidwig. definit. gen. p. 311. no. 103 3.*

Obfervatio. In memoriam reverendi patris *Franc. Cupani* hoc plantarum genus ab au&ore CUPANIA di&um fuit, qui inclaruit Catalogo in tru6liffimi *Horti Gatholici* circa Siciliam fiti, inpreflb Neapoli 1696. in quarto.

TABULA CENTESIMA UNDECIMA.

Cururu fepdens, enneaphylla, fru6lu racemofb, rubro. *Plum. nov. gen. p. 34.*

PAULLINIA foliis triternatis, foliolis ov^to-fmuofis.

Paullinia foYns biternatis, foliolis ovatis, fubfinuatis. *Linn. fpec. pi. p- 366. no. 5.*

102 PL ANT ARUM AME^IICANARUM

Paullinia foliis decompositis, ternatis > cau! ? inermi. *Linn. H. Cliff*, p. i f 2.
Paullinia farmentofa, foliis ternato-terr) Ais , ad apices crenatis , infimis
minoribus, quandoque tantum auri^s. *Erouw, Hift. Jam.* pag. 212.
Cordis Indi folio & facie frutefcens, CuralTavica, latifolia. *Plukn. Alniag**
p. 120. *Tab. 168. Fig. 6.*

FIGURA PRIMA.

Planta friitcofa & farmentofa, cuius farmentum fcabrum, fpinulofum, cailli-
les vero glabri, ac cirrhi bifidi folio obpofitf.

Folia triplicato-ternata, e petiolis fimplicibus, nee membranaceis orta.

Foliola in communi petiolo novem, in partiali vero tria ovato.oblonga;
repandO'finuata, & crenata, bafi angustata^ feffilia.

Flores racemofi, funtque rofacei, ex qiiatuor utcunque petalis in orberri
fitis conftantes cum calice polyphyilo, uti in Tabula fimplexflos fine
calice a adparet, h cum calice, c idem a p'oftica pafte, d fimplex fioris
petalam, e germen.

FruBus pyrifbrmis eft, triquetef/*, maturus in tres partes a fummo ad
imum dehifcens g, in quavis fua tertia parte g femen continens carno-
fum, calyptia renerrima obduftum bb> quae separata i eft,^ k l'emen ipfa
involutum^ / eft femen nudum.

Obfervatio. Hujus altera fpecies eft a *Plumier.* obfervata, pentaphylla,
quae *Clematis* pentaphylla pediculis alatis &c. ab ipfb vocatur in *defcr.pl*
Amer. pag. 76. *Tab. 91.* eftque *Paullinia* foliis pinnatis, foliolis inci%
petiolis marginatis. *Linn, fpec.pl.* p, 366. no. 7. quae a fub^sesrvfo<
liorum numero inprimis differt.

C

y^*JU*ruru fcandens, triphylla, *Plum. not), gen. p. i^*

PAULLINIA foliis ternatis, foliolis ovatis, fubdentatis, petiolis
marginatis.

Paullinia foliis ternatis, foliolis cuneiformibus, obtufis, fubdentatis. *Linn,*
fpec.p. 365. no. 3.

Paullinia foliis ternatis, foliolis obtufis, vix denticulatis, glabrfSj defi-
nentibus in peiolum proprium. *Linn. //, Cl. p. ^ 1 .*

FIGURE S E C U N D A.

Planta farmentofa, fcandens, caules gerens flexuofbs ac lseves cum cir-
rhis ex foliorum alis, quibus fe aliis figurit.

Folia alterna, ternata; longis petiolis membranaceis feu alatis infidentia.

Foliola ovato-ferrata, feu fubdentata, in petiolos definenua, glabra, ra-
rioribus dentibus verfus apicem"notata.

Racemi floriferl cum cirrho ex foliorum ah flores Scfruttus uti in prsece-
dente; fed fructus in hac pyriformes magis, & attenuati inferius.

TABULA CENTE:|IMA DUODECIMA.

S*Eri* fcandens, polyphylla & racemofa. *Plum. nov. gen. p. 34.*

P A U L L I N I A foliis bipinnatis, foliolis triternatis, ovatis.

Tu&tunia foliis bipinnatis. *Linn. spec. pi. p. 266.no. 6.*

Paillinia foliis fiipra decompositis. *Linn. H. Cl.p. 152. no. 6.*

Cords Indi folio & facie frutefcens, Portoricenfls. *Plukn. Aim. p. 120, Pbyt. Tab. 168. Bg. 5.*,

Plant a fruticofa & farmentofa, caules gerens profunde fulcatus & angulofbs, qui *cirfbos* ad alas emittunt simplices.

Folia triplicato-ternata, feu decomposita, ac pinnata.

Folioia fiboyara, obtusa, finuofa, *rar&* crenula notata, terna in petiolo simplici partiali, atque hi petioli partiales pinnatim excurrent ex petiolo communi feu univerfali membranaceo aut alato, ad bafin, feu ortum la* tiffimo.

Flores paniculati, in longissimam paniculam excrecentes, quis componi-
Cur ex racemis^/implicibus alternatis, atque illi conftant ex quatuor iti'
ydem petalis & calice polypbylo, qui cum fru&ibus latius explicantur
a *Plum.* in *nov. pi. gen. p. 34. Tab. 3 j.* ubi cum *Cururu* chara&ere ul-
terius conferri potest.

TABULA CENTE3TMA DECIMA TERTIA.

C*"sjEri* fcandens, enneaphylia, 6t racemofa. *Plum. nov.gen p. 34,*

P A U L L I N I A foliis triternatis, foliolis cuneiformibus, obtusis, petio-
lis marginatis.

Taullinia foliis biternatis, petiolis marginatis, foliolis curteiformibus inte-
gris. *Linn. spec. p. 3(^6. no. 4.*

Pnillinia foliis ternato-decompositis, caule aculeato. *Linn. H. CLf. 152.*

FIGURE P R I M A.

Planta farmentofa, caules gerens volubiles, glabros, qui ad alas cirrhos
emittunt simplices ac tenues.

itoha triplicato ternata.

Folioia lanceolato-linearia, feu cuneiformia, obnfa, integerrima.

Petioli lati, membranacei, feu alati,

Florum racemus ex alis simplex.

io₄ PL ANT ARUM AMERICAN ARUM

Frudus alternatim dependentes.

Obfervatio. Haec i] >ecies diftin&a eft ay; elquis non modo petiold ūhiver-
fali, & partialibus lanceolatis, ac/marginatis, fed & foliolis vix pe-
tiolo longioribus, cujus nulla veftfgia inveni apud alios au&ores.

C

Eriana fcāndens, triphylla, & racemofa. *Plum. nov. gen. p. 34.*

P A U L L I N I A foliis ternatis, foliolis finuatis, ovato-oblongis, petio-
lis teretiulculis. *Linn. Jpec. p. 365. no. 2,*

Paullinia foliis ternatis, foliolis crenatis, pedunculis cirrhiferis. *Linn, H.
Cl.p. 152. no. 2,*

FIGURE SECUND

4.

*Planta farmentofa & volubilis, ex caulis fimplices ad alas emittens cir-
rhos in fpiram revolutos.*

Folia ternata.

Foliola ovato-oblonga, finuofa ^ nee crenata.

Petioli teretes ac fimplices.

Florum panicula ex fimplicibus conflat racemis, qui *flores* ac *fruttus* ge-
runt, fūntque hi in omnibus *Serianis* fibi fimillimi ^>capfulae nem[le
membranacese, tenuiflīmse, trialatae, &c. Vide *Ludwi'g. definit, genev.*
p. 136. no. 441.

Obfervatio. Diftinguitur haec species a *Paullinia Cvnvm* foliis ternatis ob-
petioles teretiufculos, minimeque marginatos^ miror autem quam max:
me Cl. *Brouwn. p. 231. Hift. Jam.* hanc confudi/Te cui r4 & ^>
quum nullo modo convenient.

Ex binis porro hicce plantarum generibus *Cururu* & *Serjhna*, nimii
fbllcite, uti faepius, a *Plumierio* separatis, unicum conitruxit genus
<ob (ummam florum analogiam *ChJuitmaus*, quod ipfi PAULLINIA
dicitur in memoriam *Simonis Paulli* Dani, qui conferipfit Opus ipfi
Quadrupartitum Botanicum di&um.



TABULA CENTESIMA DECIMA QUARTA.

C*ytifus* fpinofus floribus luteis, ad alas naſcentibus. *Plum. Cat.pl
Atner.p. ig.Tourn. in/I.p. 648.*

C Y T I S U S floribus axillaribus, foliolis lanceolatis, ftipulis fpinōis.

FIGURE P R I M A.

Planta fruticofa, caules gerens lignofos ac fpinofos, fpinis, feu ftipulis
geminis erettis, ad fingulam alam elevatis.

Folia ternata

Foliola lanceolata, veno0, integerrima, communi petiolo infidentia

Flores gemelli plerumque ex alis, lutei, & vulgaris formse. >*

Siliqua pendulse, gemmae, glabrae, oblongs, obtufa?.

Cytifus

V^Ttifus ftutefcensifericeusJfkm..Cat.pi. Ajmr, p. i<). T.:m/2.p.64\$.
CYTISUS mollis, inermis, Tōpolis dblbngō^tutis, florū fpcā fimplici terminatrice.

tytifus Americanism &-AvitBGi ipicato- foliis fubtus lanugine argentatis.*
Jgk Phyt. Tab. 26. Fig. 7. • •

FIG V K A S frt U N D A

Radix in varias lignofas fibrillas diflin&a, descendens.

Caulis erebus, inermis, jfimplex, fruticofus.

Folia ternata.


Foliola oblongo-obtusa, venosa, integerrima, ferjc^a, petiolata.

*Floref racemofi, in fpcam fimplicem congefti, inferius gerhini, fiipe-
 » rius dternati.*

Siliqua geminae, pendulas, intortse, acuminatce,

Semina fubrotunda, reniformia, glaberrima.

*Obfcrvatio. Ex Jeguminibus intortis, & quad articulatis fere crederem,
 hanc eandem effe plantam, qua? *Cytifus Cajan* dicitur a *Linn, mpec.*
plant, \uzrp, exhibui in Tbef. Zeyl. pag. 86. Tab: 37.. ni obflarent in
Plum, icne foliola obtusa, ac petioli aequales, fiorumque fpicalonga
*& ere&a, caeterum memoratum *Cajan* quoque crefcere in America,
 patet ex *Brouw^ Hift. Jam. p. 296.* ubi vocatur *Cytifus* fruticofus tri-
 phylas, foliis fubcinereis oblongis, vexillo variegato, filiqu^ comprefc
 ps>i? v^" HPi^{natoro}^5 uncle hsec varietas \3iverib climati forte adscribenda,
 eftque Pnafelous *Baticus*. -*Humph. Herhar. Ambo. I. 9. c 24. p. 377.***



TABULA CENTESIMA DECIMA QUINTA.

DAmfonium maximum, Plantaginis folio, flore flavefcente, fru6tu globofb. *Plum. Cat.pl. Amer. p. 7. Tourn. inji. p. 257.*

BUTOMUS foliis cordato-ovatis, fru&us involucro triphyollo.

Affma foliis ovatis, fructibus globofis. *Linn.Jpec. p. 343.*
jDzrya/bnium Americ. fru&u globofb majore. F'aill. Ad. Parif.ann. 1719.
pag. 35. no. 2.

*Planta aquatica, natans, varias inferne demittens fimplices fibrillas, fu-
 perne ex uflo centro plures ftolones.*

*Folia natantia longiflimis ex petiolis triangularibus, funque cordato-ova-
 ta, obtusa, nervosa, ac crafla.*

Culmus (implex, nudus, triquierter, in fummo gerens umbellam ex fimplicibus craflis & angularibus pedunculis cpmpositam.

196 PLANTARUM ALIE^ICANARUM

Florum corolla tripetala, eleganter denticulata, calice triphylo contents* intus repleta plurimis flaminuiis in orbech cofitisj uti in *UuW.no*, *Frullus* eft globcfus, acftriatus, invojjcro triphylo contentus, hinc optime ad *Buiomum* accedit.

SetnitM triangularia 5 uti in figuris marginalibus.

Obfervatio. Quum in hac planta f̄capus fit fimplex, umbella unica * ftamina plura, capfulas fimplici ambitu, hinc patet, hsinc proprius accedere ad *Butomww*, quamad *AUsmam*, licet au&ores communi confenfu earn ad hanc retulerint ex, au&toritc.te Cl. *J^aillantii^* de qua porro vide *Ack, Parif. L c.*

TABULA CENTESIMA DECIMA SEXTA.

J^\$ Anunculus aquaticus, Plantaginis folio., flore albo, calice pufpureo.
i \ . ^ ^ . *Cat.pl, Amer.p. 7. Tourn. infl.p. 292.*

SAGITTARIA foliis lanceolato-ovatis, fru&ibus ovatis, glaberrimis.

Sagittaria foliis maximis, fimplicibus, oblongisj utrimque proda6lis, ramulis verticillatis, caule gla^ro. *Brouw. lii/l. Jam. p. 345.*

Damafonium ampio Plantaginis folio 3 flore maximo. *VailL Aft. Parif. mn. 1719. p. 2\$. no* 3.* •

FIG U R A P R I M A .

Planta aquatica, cujus *Radix* craffiffima, tuberofa & nodofa, in va-foy denfos annulos diftinpta, e qua

Folia lanceolata, glaberrima, longiffimis ex petiolis dependentia a nataentia.

Florum culmus ingens ac ramofus, ternos ubique e regione

Flores ingentes tripetalos proferens, lon^is pedunculis infidentes.

Fruflus ovatus, (ubrotundus, glaberrimus, nee firiatu, uti in priore.

Obfervatio. Ex toto plants habitu patet, hanc non elle (peciem *Alifind, Ranunculi*, vel *Damafonii*, fed omnino *Sagittaria^* unde earn ad hoc genus exemplo Cl. *Brouivn.* retuli.

R*Anunculus*, aut *Damfonium repens*, Parnafiise foliis vilbfis. *Plum. Hift. mJJ'*, torn. v. p. 95.

CCMELINA villofa, foliis cordatis, amplexicaulibus, caulibus dif^fufis.

FIGURE S E Q jj jsf B A.

Planta,

Plania, uti videtur, paludofa, ^rōrepens, ad nodos emittens varias fibrillas radieales fasciculatas.

Catties pilofi, decumbentes, feu *afflifi*.

Folia cordata, acuminata, fessilia, implexicaulia, alternata, nervofa, ac viljofa.

Ffove's in corymbo inasquali, fiēpius dichotomy, excrefcunt triangulares, ?fptas dentati, tripetalii, calice triphylo &c.

Obfervatio. Pjanta haec corolla tripetala cum calice triphylo gaudet, uti *Alifma** & *Sagittaria*, ad neutrum vero horum generum pertinere evincit caulis foliofiis, qui in *Butomo* etiam nudus est, si enim quis exempli gratia ad Marciflōs referret plantam caule foliofb, primo intuitu error patefceret; unde & hsec proprius accedit ad *Commelinias* & *Tradescantias*, dantur enim *Commelia* tripe'tala? non tantum, sed & foliofb isto florali cordato involucro daftiutec, & hirfutae, unde mejudice proxime ad hanc accedit, quod genus in rae moriani clariflli mi decellbris mei, in primis *Ca/p. Commelini* diftum est a *Plumier.* in nov. gen. pag. 48. cujus novem jam species recenfentur a *Linn.* mspec. pi. p. 40. &fig.



TABULA CENTESIMA DECIMA SEPTIMA.

D *Iqfiorea* fcandens, foliis Tamni, fructu racemofo. *Plum. nov. gen**

DIQSCQREA foliis cordatis, alternis, caule Isevi. *Linn. IL CL p. 459. y. 28. fpec.pl. p. 103-3. no-* &

Diojcorea foliis cordatis, caule laevi rotundo. *Brouw. Hi/I. Jam.p. 360.*
VolubiUs nigra, folio cordato, nervofb &c. *Sloan. Cat.pl. Jam. p. 46.*
Hi/I. Jam. torn. i.p. 140.

Ricopbera Indica, feu Inhame Malabarica, folio rotundo, in acutifimum apicem mucronato. *Plukn. Almag.p. 321.*

Ubium vulgare *Rutnph* Her bar. Amb> torn. v. p. 346. Tab. 120.* ubi vide obfervationes meas, aliafque plures hujus generis species. *Kumpb.* vero folia pingit obpoxita, quum *Plumier.* fint alternata.

FIGURE P R I M A.

Planta volubilis, nulos emittens ramos, caules gerens laeves, rotundos.
Folia fblitaria, cordata, acuminata, multo longiora, quamplata, nervofa, plurimis jntermixtis venulis cancellatis, glabra, utrinque virentia, petiolata.

Flores in longos excrefcunt racemos.

i^<<^eftcapfula triangularis, trilocularis & triv'alvis a in finguloloculobina femina membranacea condens. Vide *Ludwig. defiit.gener.p. 281. no. 928.*

io8 PL ANT ARUM AMERICAN ARUM

Polygonatum scandens, altiflimum, jibliis Tamni. *Plum. Cat. pi. A**
mer. p. j. *Tourn. infi. p. 78.*

D I O S C O R E A foliis cordatis, feptilerviis, obpofitis, racemis pendulis.-

Diofcorea foliis cordatis, alternis, oppofitifque, caule hevi. *Linn free tl.*
p. 1033. no. 7. &c. *JF^c^F^A.*

Jibium anniveriarium. *RumpL Herb. Amb. lib. 9. cap. x.*

FIGURE S E C U N D A.

Caulis vohibilis, flexuofus,

[^] o b p o f u a, cordata, acuminata, integra, venofa, feptinervia, pe-
fata.

Florum racemi ex *finguhzh* finguli, fimplices, longiffimi, conti_{rentes}
flores laxos, dependentes, fexpartitos.

« [^] a d p i a u s non eft, fed nullum eft dubium, quin verafit *Diofcorea*
pecies, uti & inter *Plumierii* icones exhibetur

lamm tubifera radice fungiformi. *Rum. Cat. pl. Amer. p. 3. qu** ip-
fa eft *Diofcorea* ad alas bulbifera folio cordato. *Linn. H. C/* 459. no. 2.
quum vero ^hc a variis auftoribus fit exhibita, & defcripta, fuperfluum[^]
torēt hane iterum delineare. Hujus porro generis reliquas species vide
delcriptas & iconibus express in *Rumpb. Herbar. Amboin. Mr. 4.*
Pgg- 340. Zzfeqq. H. Malab. torn. 7. a Tab. 33. ad-Tab. 39.

Vbjervatio. Dm anceps haefi de hac planta, ad quodnam proprie pertincet
genus, quum frutus non fit adpiaus, fique mihi CGilffSet, ^
plantam bacciferam fexu diftinaam, in mares nempe & feminas, uti
lamnus turn abfque controverifa ad hoc rvrtineret genus, quum ve/a"
hoc me lateat, tarn diu earn cum aliis Tamnis *Plumier.* ad *Diofcorea M*
retuh.



TABULA CENTESIMA DECIMA OCTAVA.

Dodonxa Aquifolii folio trkuipidato. *Plum. nov. gen. p. 20.*

I L E X foliis pinnatis. *Linn. Jpec. pi. p. J2*, *not* 5.

FIGURE P R I M A.

Plwta fruticofa, quam maxime ramofa.

iww pinnata funt, foliolis vieinti uno feftib^{Hc}
medio utrimque denticulo angulatis, fab^{is} 1^o 7^a ^{t 1 s} enofis, uriinfepatafo--
ho A patet.

Flores racemofii sunt, conftantque ex floribus monopetalis* trifariam divisis aa. quorum irstius antica, alter postica parte confpicitur, atque hinc excludit unam quartam partem numeri petalorum, oeterum ftamina tria₅ ftili tresj petala tria in hac obr^{rv}antur, qua nota differt a congene* ribus.

Fruttus mollis, est bacca oblonga, bifida, bb.

Setpen[^] oblongum continens c,

TxLex aculeata, folio tricuspide. *Plum. Hifi. mjf. T. v. p. 152.*

ILEX foliis cuneiformibus, tricuspidis. *Linn. fpec.p. 125. no. 4.*

F I G U R A S E C U N D A.

Folia alterna[^] cuneiformia, fefiliaj tribus angulis acutis /pinulofis rigida* *Fibres* nee fructus adpiigli font.

Obfervatio. Ad hanc tamen claflem pertinere fuadet totus ipfius habitus, & *Plum.* denomination miror tamen, eum ad *Dodonaam* quoque hanc non reduxifle, uti priorem, an vero fru6tificatione differant, non conflat ex icona: tota csterum plantae (truftura, & confiftentia foliorum adeo' exa.[^]e convenit cum *Aquijvlio*, ut de genere vix dubium superfit, mirum tamen est* folia pinnata ac fimplicia dari. in uno eodemque genere.

Ne tamen memoria incomparabilis Viri *Romb. t)odondi* ex fcientia • JSotanica excludatur, hinc *Cl. Linnaus* alii arbori *Plumierii* DODO-wMm n[^]smen in podiit[^] quae *Stapbylodendron* foliis Lauri angullis a *Plum.* Cat.pl.Amer.pt S vocatur₃dequa vide *H.Clffip.i^dZ 7hef.Zeyh*

TABULA CENTESIMA DECIMA NONA.

TJLJOfJienid Spondylii folio, Dentarise radice. *Plum. nov gen. p. 29.*

D O R S T E NIA folias lobatis, fcapis radicatis.

feorjlenia fcapis radicatis. *Linn. H. Cliff, p. 32.fpec. pip, 121. no: 1.*

9>*D6rftenia* Dentariae radice, Spondylii folio, placenta ovata & quadrangulari, undulata. *Uoufl.Ad. Angl.pag. 218. Fig, 69.*

Drakena radix, *Chif exotic, pag. 83.*

Tuzpatlis. *Hern** *Hift. Mexic. p. 143.*

Radix inftar Cyperi tuberculata[^] ac ncdoiā, varias emittens laterales fibrilks.

i[^]mradicalia, petiolata, fmuofa, aC lobata, in fepteqi utcunque lobos acuminate & ierratos diftintlai & inftar Spondylii divifa.

%io PLANTARUM AME>|ICANARUM

Placenta finuofa, carnofa, florifera, fibrem anomalum formans, qui componiturex floculis rainimis, numerofiflimis, difcum inhabitantibus* quos nemo adhuc rite detegere, vel differvare potuit j forte constat ex quatuor ftaminibus cum fimpliciftilo.

Fru&us eft receptaculum commune, era flu m, carnofum, continens *Semina* folitaria, fubrotunda, acuminata, nidulantia, a & b.

Obfervatio. Mira eft hujus plants fru&ificatio, ficui quam maxime ed^njjs, ita ut videatur *Ficus* quafifxte/z/kfjflofculis obtecl:us, proximeque ad/V rietariam accedit, quum floculi hermaphroditii femineis videantur intermixti, quod ex ubfrequenti ulterius patet planta.

[^]Qdeterum hoc plantse genus in memoriam *Theod. Dorjienii* medici germani DORTENIA dictum eft, qui edidit *Botanicum*[^] plantas continens in primis ufualesj impreflum Francofurt. 1540. putatque Cl. *Linnæus*, hujus plantae radicem veram eſle radicem *Contragerva* ex obfervatis *Houftoni*, de qua porro vide *H. Cliff*, p. 32. Noftra autem planta in eo differt ab ilia *Houjloni*[^] quod placenta non fint orbiculata?, uti in'ipfius defcriptione & iigura, fed quadratae, & finuofe, dein folia noſtræ profundius, magisque laciniata funt, acutiora, multoque acutius (errata; ita ut non eadem, fed varietates ad minimum.

TABULA CENTESIMA VIGESIMA.

P JL *Arietaria latifolia*, humilis, flore glomerato. *Plum. Cat?*p. iu.

DORSTENIA foliis ovatis, dentatis, pedunculis caulinis.

Dorjlenia pedunculis caulinis. *Linn. H. Cliff*, p. 32:spec. pi p- 121, no. i* £ *Dorjlenia* Dentariaj radice, folio minus laciniato, placenta quadrangulari undulata. Aft. *Angl. vol. vi. pag. 218. Fig. 70.*

FIGURE

P R I M A.

Planta humilis, fimplicem emittens caulem.

Radix fi?rofa, in varias fibrillas fafciculatas collepta.

.fo/zfovata, finuofa, denticulata, petiolata, ad caulem utcunque obpj-> fita. *Petioli* longiffimi.

Flores pedunculati, in globum ac placentam collecli, quorum masculini in globo separati videntur excrefcere, quales in Tabulse margine microfcopio auai A & B confpiciuntur cum calice quadriphyllo & ftaminibus quatuor, feminini vero in placentam videntur colleai, & ope microfcopii auai in tabula3 majgine ad C & D confpiciuntur, idem quod obtinet in Parietariis congeneribus _{Uncje} fumma harum plantarum adfinitas adparet, quae ulterius cum alijs plantis comparatur & explicatur a *Linnao* in *Am*

„ Hinc

•₅, Hihc liquet, *Ficum a Dor/lenin, Parietaria, Moroque* in eo tan-
 „ turn differre, quod receptaculum carnofum, magnum, integrum,
 •_n claufum, flores in fiaa cavitatcp contineat &c. DifTert enim *Ficut*
a Dorftenia tantum fru&u piano & concavo, *Dorjienia* a *Parietaria* fe-
 re tantum receptaculo communi & racemo, taritaque praeterea, ratio-
 rie Figurse, *Urtica* & *Parietaria* eft affinitas, ut *Sloane* aliique hsc ge-
 ifem̄ inter fe confundant.

Noftra porro planta differt ab ilia *Houftoni*[^] quod ejus placenta fit qua-
 drata & integra, quum noftras fit divifa , ejus pedifnculi fint radicales[^]
 noftrae plantae caulinī, deñ folia non ita fuit ovata, fed lobata quafi,
 nequeita dentata, magisque acuminata.

P *Arietaria* racemofa₃ foliis ad oras villofis. *Plum, Cat, ph Amer.p.* io.
 UR'PIQA foliis obpofltis, ovatis, & ciUatis.

FIGURE SECONDS.

Radix tenuis, fibrofa[^] ex plurimis limpiçibus capillaribus fibris conflans.
 ^«/ere6li, all P5tam geniculati, fimplices, indivifi.

Folia obpofita, cruciata, ovata% trinervia; venofa, ad oras villofa, pe-
 -tiolata.

Flores ex alis in pedifnculis obpofitis, ramofis.

Gbfervntjg,[^] Ex florū racemis illis *Urtic*_z fīmillimis pdtius hanc ad *Ur*_»
 ticam perfinere judicavi, licet ftrudlura fructificationis adeo inter fefē
 co^nveniat, ut difficultime limites inveniantur, unde & horum genermn
 Ypecies a variis aucloribus inter fefē commixtae funt.

TABULA CENTESIMA VIGESIMA PRIMA.

D *Racunculus humilis*₃ flore & fru6lu albo. *Plum. Cat, p. 5. Town,*
in/I. p. i6r.

ARUM foliis pedatis, foliolis lanceolatis, repandis, fpatha Spadicera
 iuperante.

9> *Arum* foliis pedatis , foliolis lanceolatis, integerrimis , fuperantibus
 fpatham fpadice breviorem. *Roy. pr. p. 7. Linn.fpec. p. 964. no. 2.*

*Arum polyphyllum Dracunculus & Serpentaria di6lum, caule non macu-
 lato, minus & humilius.* *Herm. Cat. H. L. B.p. 60.*

Dracontiw caule immaculato, minus & humilius. *Herm, Par. Bat. p. 88*

FIG U R 4 PRIMA.

112 PLANTARUM AMERICANARUM

Radix crafla, nodofa, ac tuberofa*. plurimos emittens latencies fitnplices fibrillas ciliatas.

Folia palmata, feu potius pedata_s in novem urcunque lacinias diflincta extenfas, feu inflar palmae explicatasj .quarum mediae latiflimae, laterales decrefcientes, & extimae minima?, cum appendiculis, funt veYo omnes lanceolatae, integerrimae, repandae * .glaberrimae* ac venofae*

Petioli radicalesj longiffimi, nudi, fuperne quafi dehifcentes in foſrffaci* nias defcriptas.

Spatba minima₅ radicalis, involvens-floſculos albicantes.

Dracunculus alius humilis, villoſus , flore & fru&u albo. *Plum* Cat. pL Amer. p. 5.*

A R U M foliis palmatis₄ foliolis ovatcr-lanceolatis j integerrimis, caule hifpido.

Arum polyphyllum, *Dracontium* & *Serpentaria* di&urti ^ folio ramofb ^"Tseonias inflar, caule afpero. Zeylanicum. *Herm. Par. Bat.pr.p.* 314-
Arum polyphyllum *Dracunculus* & *Serpentaria* diictum Ceylanicum, caule afpero. *Commel. Cat. H. Amft. p. 38.*

Dracontium Zeylanicum ramofb folio, caule ex viridi & flavo variegato afpero. *Herm. Par. Bat. p. 89.*

Dracunculus Zeylan. polyphyllus caule afpero, ex flavo & viridi colore variegato. *Tourn. infst. p. 160. Tbef. Zeyl. p. 90.*

Serpentaria polyphylla Indica, caule maculato afpero. *Breyn. prodr. 2** p. 9 J. nova, *Edit. p. 95.*

F I G U R A S BGU-N t> J.

Radix eft tuber ingens, craflus, rotundus, fcaber, rariores demittens crailas ac fimplices fbras.

Caudex ereclus, rotundus, variegatus, & exafperatus, feu hifpidus, qualis in marginal! Tabulae iconē confpicitur.

Folia extenfa, lobata, & quafi palmata, in novem lacinias ovato-lanceolatas, integerimas diftin6la , quarum mediae longiflimae & maxima?, laterales fenfim decrefcientes , & extremae qucfi adpendices flint, utl in Paepniae foliis, cofta tamen mediae & maximae laciniae cum folii petiolo fcabra & hirfuta effe videtur, uti ipfe caulis, qualis in dirmifia totius folii parte adparet in Tabula.

Spatba florem involvens crafla , coriacea , gkbra, fmuofa & aeumi. nata A, *Spadix* yero erodus, fpicatus B, flores maſculinos in fumma, femininos in inferiore parte gerens, inter quos intercedebut fquamfa imbricatae , quae in aliis AH. speciebus fseplus filamentofie funt.

TABULA CENTESIMA VIGESMA SECUNDA,

D *Racunculus triphyllus*, laciniatus & perforatus, caule Serpentariam referens *Plum. Cat. pi. Amer. p. 5.*

DE..A-CONTIUM caudice geniculato, foliis tripartitis, laciniis pinnatifidis, perforatis.

/S, *Dracontium Americ.* fcapo puniceo caule j radice Cyclaminis. *Herm, Par. Bat. 18. 93.*

Dracontium fcapo brevifimo, petiolo radicato lacero, foliolis tripartitis, laciniis pinnatifidis. *Linn. H. Cliff, p. ^q.Jpecp, 967. &c.*

Radix tubero^, comprefla, fubrotunda, tuberculofa, pro. plantae gnittidine pufilla, undique breves ac/imp/ices erriittens fibras.

Caulis erodus, fimplex, indivifus, ftriatus, geniculatus, ex variis quafi geniculis compo/itus, ac parvis tuberculis exaiperatus & variegatus^ fuperius in frondem fefe explicans, quae flint ~im^Lr.^

Folia expanfa, tripartita, feu in tres utcunque magnas ladhias diftincta^ quae in tYes niinores fubdividuntur^ atque hæ componuntur ex minoribus laciniis pin*ifiui's, Filicuni more expanfis^ quae funt lanceolatae, finuofae, decurrentes j atque variis. in locis perforat33, & quafi rriaculatae, uti * in fegmento fblii^majore in Tabula eleganter confpiciuntur, ubi & tuberula fcabra in folii divifione adparent quod huic plantar prpprium eft, & quibus ab ilia *Hermannii* & *Horti Cliffort.* diftinguitur.

Obfervatio. Licet flores in *Plumierii* icone non fint delineati, qui facile neX Hermanni Figura fuppleri poflunt, quique rariores ac minimi in hfc fpecie effe fblent, ex tota tamen foliorum figura, caule variegato, ac porro totius pjahtce habitu patet, veram effe *Dracontii* fpeciem, quaeque forma fua exable refpondet cum *Drdcontio polyphyllo Linnai Jpec.p. 967.* ita ut hafce potius varietates quam diftin&as e(& fpecies per* fuafus fim, noftramque inprimis difFerre perforatione foliorum , quod in hoc genere faepius obtinet, uti id patet ex *Dracontio pertufo Linnai fpec.p. ^68-* quod *Arum hederaceum*, amplis perforatis foliis a *Plum.* vocatur in *pi Americ. p. 40. Tab. \$6 & 57.*



»₄ PLANTARUM AM^flICANARUM

TABULA CENTESIMA VIGESIMA TertiA.

E *Chinopiis* frutefceris, ad hodos horidus, Ilicis folio fibris argepteo*
Plum. Cat. pl. Amer. p. 10. Tourn. infi. p. 463.

EICHINOPS foliis lanceolatis, dentatis, capitulis axillaribus.

Echinops capitulis lateralibus, feflliibus. *Linn. Jpec. p. 815. no, 5.*

FIGURE P R I M A.

Planta fruticofa, ramulos gerens alternates, fimplices.

Folia lanceolata, dentata, integra & vix petiolata, ad rariorū divifionem folitaria, magisque ovata, ad *Capitula* utcunque quaterna,, enciata; fefilia, anguftiffima, ae vere lanceolata, fubtus argentea.

fiorum capitula in alis fefilia, orbiculata ; hinc inde rariores ad latera producentia flores tubulofbs, erdos, limbo reflexo, quinqueido &c.

E *Lichryfum* arborefcens, Ilicis cocciglandiferse folisv. *Plum. Cat. pl Amer. p. 9. Tourn. infi. p. 453**

C E N T A U R E A calicibus fquamofisj foliis ovatfc, dbfufis,, fpintflo-
1 fis,, caule fruticofb.

Rbaponiicoides arborefcens, Ilicis coccigiandiferae folio, flore luteo.
Vaill. Ad. Parif. ami. 1719. pag. 390.

FIGURE S E C U N D A,

Planta arborea, fimplices gerens ramulos.

Folia ovata, obtusa, fpinulofa, alternata, venofa, petiolata j ad apices ramulorum iub floribus conferta, & in orbem pofita.

Flores-verticales, aggregate feffiles, calicibus oblongis fquamofis imbri-
catis content!, utcunque claufi feu contrati &a



TABULA CENTESIMA VIGESIMA QUARTA.

E *Lkbfryfum* Lychnidis coronarise folio tomentos & undulato. *Plum. Cat. pl Amer. p. 9. Tourn. ftft. pftfi. Vdli. Ad. Parifann. 1719. p. 833. no. 42.*

GNAPHALIUM caule fruticofo, foliis lanceolatis, finuofis, co-
rumbis faltigatis.

Caulis fruticofliSj ramoflis, fcaber.

Folia conferia, lanceolata, undulata, tomentofa.

Flores aggregati, corymbofi, fefiles, in panicula terminatrice congefti, . caJicibus fquamofis contenti &c.



TABULA CENTESIMA VIGESIMA QUINTA.

EMeru's filiquis longifiumis & anguftiflmis. *Plum. Cat. pi. Amer.*

i f S C H Y N O M E N E leguminibus zequalibus, laevibus, corollis hir-lutis.

Galega Indica, frutefcens, fpinuloia, filiquis anguftis, longiffimis, fo-lio Mimofk *Herm. Muf. Zeyl. p. 64. Burm, The/ ZeyLp. 103. &cr*

FIG U R A . . . *TRIM A.*

Planfa fruticola, ramos gerens> lignofbs.

Folia pinnata; alternata.

Foliola obpofita, ovata, glaberrima, avenia, duodecim utcunque paria.

Flores ex alis in pedunculis ramofis, vulgaris formae;, quorum petala ex-terne hirfilita depinxit *Plunder*, uti in feparato, flqre a liquet.

\$iBqu<z plmes, • alternate, dependentes, "linearesy glaberrimae, longifl- *map, & asquales.

Semina oblonga, glab^a, reniformia, uti in aperto legumine patet.

Obfervatio. Haec planta primo intuitu perfedle refert SESBAN" *Alpini pi. Egypt. Tab. 82.* fed quum *Plumier.* flores pinxit hirfutos, multo-que rariores, nee ita fpicatos, magisque ramofbs, uti & foliaturam rariorem, non audeo hafce combinare, veram tamen eflē *JEfchyno-menès* Ipeciem, ex cun&is ipfius partibus totaque forma liquet.

EJL*Quifetum altissimum, ramofum. Plum. Cat.pl. p, 11.*

E Q U I S E T U M fetis simpliciflmis Ipiciferis, patentibus, nodofis.

\$ *Equifetum* caule ftriato , frondibus fubfimplicibus. *Linn. fpec. pi. p. 1062. no. 4.*

FIGURE *SE C UN D A.*

Dd

Plant

A

•u6 PLANTARUM AM^RICANARUM

Planta aphylla, alta, & ramosa.

Caulis nudus, ftriatus, geniculatus, ac verticillatus, feu r^mofus.

*yerticilli longiffimi, ftriati s nodofi, fimplices, ad apices florefcentes,
feu Ipiciferi.*

Obfervatio. Haec planta proxime accedere videtur ad *Equifetum* fluvia-
tile *Linn&i;*, fed differt, quod multo major fit , atque feta, qui-
bus verticillatus eft caulis, horizontaliter pateant, quod non its in nu-
v.iatili obfervatur; dein *Sloan*, in *Catal pi. Jam. p. 215.* fuam quoque
plantam junxk cum Equifeto majore aquatico.

Finis Fafciculi QuintL



DOCTISSIMO ET EXPERTISSIMO VIRO,
JOANNI PHILIPPO BREYMO,
JAC. FILIO; M. D.
A C''A D. I M P E R. N A T U L C U R I O . S O R U M ,
E T
S O C I E T . R E G . A N G L I C . S O D A t 1 ,
BOTANICO CONSUMMATISSIMO,
S E N I O P T I M O ,
A M I C O I N T E G E R R I M O ,
Q U A R X U M H U N C
FLANTARUM AMERICANARUM
F A S C I C U L U M

IN GRATI ANIMI
TESTIMONIUM
DICAT
JOANNES BURMANNUS:



SOPHORA
filiis pinnatis.







Fig. 2.
ERYTHRINA.
foliis
jiiu)iito-tci-iLtiis-

Fig. 7.
ERYTHRINA
foliis simplicibus, alternis





CORCHORUS
capulis subrotundis, latatis



TAB. CVI.






Fig. 3.

CORONILLA.
foliolis quinque ovatis




Fig. 2.

BUPHTHALMUM
caule repente

Fig. 1.

BUPHTHALMUM
foliis oppositis, lanceolatis








CUPANIA.




*PAULLINIA
foliis trinernatis.*




LVI 1. 1.1 \ IA (oiiii UnmngtM. foliota triwrn.m?

TAB. CXIII.







BUTOMUS
folius cordato-ovatis.







Fig. 1.
SAGITTARIA
Plus lanceolato-ovatis.

COMMELINA villosa.









DORSTENIA
foliis Urti*.

6



URTICA foliis ovatis
& ciliatis.

I>OIt ST KN 1 \
toiiis ov&lii=, ctentatu






J>KACONTU. M
geniculata
folis tripartitis



*CENTAUREA calicibus
sqamosis, foliis ovatis.*

T. I ill S O P S liilits lanceolatis,
dentatis, capitulis axillaribus.



GNAITH VI. II M castile fruticolo.
foliis lanceolatit. is. rorvinihi. i fastigatis.

Fig. 1.
X. SCHYNOMENE
leguminosus aquatica
cordata kirilata




Fig. 2. 1
EQUISETUM fetis
fringed spicifer

P L A N T A R U M
AMERICANARUM
FASCICULUS SEXTUS,

Continens Plantas, quas olim

CAROLUS PLUMIERIUS,

Botanicorum Princeps

Detexit, Eruitque,

AtqDe in INSULIS ANTILLIS ipie depinxit.

Has primum in lucem edidit,

Cencinnis ^descriptio' nihis , fi? Obfervationibus >*


[^]Eneisque Tabulis illuflavit

JOA'NNM BURMANNUS, M. D,

jiptenai ilhjlrts, f&? in Mdrto Medko AmJleUdcmenfi

P R O F E S S O R B O T A N I C E S ,

Academia Cafare<e Natura Curioforum Socius.



Sirintibiiſ Audioris;
Pr oft ant Amfteladami in Horto Medico ,^

Apud PETRUM SCHOUTEN,
Atque>
6? LUGD. FATAF.

Apud GERARD. POTVLIET, & THEODOR. HAAK,
M. D (IC. LVIL

DOCTISSIMO & CELEBERRIMO VIR'o

CHRISTIANO GOTTLIEB
LUDWIGIO,

MED. DOCT. & PROFESSORI

IN ACAD. LIPSIENSI CLARISSIMO.

SOCIETATIS REG. BORUSS. SCIENT.

SODALI DIGNISSIMO

AMICO INTEGERRIMO

H U N C S E X T U M

PLANTARUM AMERICANARUM

F ^ L S C I C U L U M

IN OBSEQUII TESTIMONIUM

OBFERT

JOANNES BURMANNUS.

PLANTARUM AMERICANARUM FASCICULUS SEXTUS,

TABULA CENTESIMA VIGESIMA SEXTA.

T
Jl/Refia foliis Aquifolii longiflimis. *Plum. nov. gen. p. 8. Tab. 25.*

THEGP-H-R.ASTA. *Roy. prodr. p. 728. Linn.fpec. pi.p. 149.*

Caudex Palms nudus, simplicifTimus, apice frondofus.

Folia omnia in apice undique patentia₃ lanceolata, longiflima, dentata, nervis undulatis.

Flores racemofli, diffusif, monopetali A, campanulati, patentes, quinquefidi_aB,,/calice femi^quinquefido perfidente CCC content! ^fiamina gerjstesT|quinque fubulata D; cum germine ovato E.

*Fruit*f<&i ef.eapfula globo/a, mep-ib;anacea, unilocularis FF.

Semua C<^itensis piiifima &Bfo'tunda G. placenta; adfixa H, & in orbem

Objervatio. Fru&ificatio hujus arboris inter folia ad caudicis apicem diffaed in ipius centro, uti id patec in inferiore Tabula? parte ad majaora folia.

Caeterum hoc plantarum genus diflum eft in memoriam magni *Theophrasti* THEOPHRASTA a Cl. *Limido*[^] quum ERESIA fit nomen nimis generale nee proprium, ille autem inter Grascos primus exa_{sliffime} Hiftoriam plantarum conferipfit, natusque fuit *Ereji* in infula L'esbo, annosque vixit qufnque & Odoginta, attamen moriens de brevitate vita? humanae conquerebatur, uti fummus olim HIPPOCRATES, *ars longa*[^] vita brevis &.



TABULA CENTESIMA VIGESIMA SEPTJMA.

E
Uenymus latifolius, racemofas, fructu pentagono, atropurpureo.
Plum. Cat. pi. Amer. p. j 8. Town. in I. /> 617.

PR UN US floribus racemofis, foliis ovatis, obtufis.

Ee

Prunus

120 PLANTARU]Vf AMERICANARUM

Prunus floribus racemofis, foliis deciduis, bad antice glandulofis. *Lim. fpec'p, 173.*

Cera/its f\vt\vrh^~fruQtin\gricante in racemis longis pendulis Phytolaccae inflar congeflis. *Gron.f\i, Virg.p. 54. Roy. pr. p. 537.*

Cera/i fimWk. arbufcBJa Mariana, Padi folio, flore albo, fru&u parvo ^cembfq Pltiky. wantij]. p. 43. Tab. 339. Catesb. Hift. Carol, ivol. !• Tab. 28.*

Plant a arbpf\fa.

Folia ovata, obtu\fa, integerrima, alternata, venof\fa.

Racemi fimplices, longiflimi,

Flores alterhatos gerentes.

Frutlus ovato-quinqueJobus, ud in Euonymis, Diosmate, aliisque.

Obfervatio. Facie iua externa perfe\te jemulatur *Padam* f\eu *Laurocera**

Jtim, fru&us tamen juxta iconem pentagonus videtur obftare, caeterum florum racemus foliaque alternata penitus familia, unde ad hoc gepuo proprius accedit quam ad *Euonymum*, licet fru&us cum hoc genere melius quadret, l\ed quum non perfe&e fit delineatus, ad *Prunutn* potius tam diu hunc reruli juxta *I^innai* ordinem, done* diquis vivatn infpexerit & examinaverit plantam, adeoque inter Juoias tam diu habenda, nam flores in racernum colledli, foliaque alternata repugna^{nt} *Euonymis*, unde cerro certius conrrat hanc plantam non elle ~~WW~~* {speciem, fed alias generis; interea dici poflet *Euonymo* affinis *H. face-* mofis, foliis alternis.

TABULA CENTESIMA VIGESIMA OCTAVA.

EUpatorium frutefcens, Atriplicis folio , flore albo. *Plum. Cat. pl.*
Amer.p.y. Tourn. inji. p. 456. Vaill Ati. Par if. 1719. p. 402.
no. 31.

EUPATORIUM foliis ovatis, obtufis, repando-angulatis, corymbis axillaribus.

0 *Eupatorium* foliis ovatis₃ petiolatis, ferratis. *Linn. fpec. p. \$37. no. 6**
& no. 14,

F I G U R A P R I M A.

Planta fruticof\fa, ac lignof\fa.

Caulis teres, brachiatus, nudiculus.

Folia obpofita, ovata, finuofa, ruditer dentata, petiolata, glabra.

Corymbi axillares, obpofiti, in fuperiore caulis parte.

Flores nunc quini, nunc terni in corymbi fubdivifione, licet femina inpn* ~~mi~~ delineaverit au\tor.

Eu-

E *Upatorium Sophiae* folio, flore purpureo. *Plum. Cat. pl. Amer. p. 9.*
Tourn. inft. p. 456. f^aill. Ad. Parif. p. 399. no. 2.

EUPATORIUM foliis pinnato-multifidis, florū corymbis fafligatis.

FIGURE *S E C U N D A.*

J ~~Upatorium~~ tenera, erepta.

Caulis fimplex indivisus.

Folia pinnata, laciñata, & mulrifida, bins obpofita, ruditer depidta.

Flores corymbofi, terminatrices, feufaftigati, terni pierumque in communi pedunculo, ac quaevis panicula obpofita eft.

Semen autem feparatim piōtum eft ab au&ore, quod cum suo pappo diverft ab *Eupatoriis*, neque hanc plantain etiam commemorat *J^aill.* in *Aflis Parif.* ubi alias recenfet *Eupatorii* fpecies, quique *Plumierii* plantas habuit & examinavir; prasterquam quod ejus foliatura penitus lit dhti *C?.q reliquls Eiipatoriis*, ita ut incerti hue usque fit generis j quod ex fbla icont ^{ix} determinari poteft.



TABULA, CENTESIMA VIGESIMA NONA.


E *JfMorium Petafitidis* folio. *PJ'Jh. Cat. p. 10. Tourn. in/I, p. 456.*
»j?ati. Ail. Parif. J^aq.J4f:p. 390, no. IO.

EUPATORIUM foliis cordato-acuminatis, crenatis, quaternis.

Cauks lignofi, glabri.

Folia maxima, cordata, acuminata, crenata, quaterna.

Flores paniculati, faftigati, panicula alternata, plures fimul gerens flores.



TABULA CENTESIMA TRIGESIMA.

E *ff%atorium frutefcens, Atriplicis* folio, flore casruleo. *Plum. Cat. p* 10. Vaill. Ad. Parif. 1719.p> 402.^0. 32.*

EUPATORIUM foliis cordatis, obtufis, incifb-repandis, corymbis faftigatis.

FIGURA PRIMA.

Planta fruticofa, caules ac rami simplices, vix divifl.
Folia cordata, angulata, obtufa, finuata, obpofita, petiolata.
Flores in panicula faftigata, terni plerumque in communi peduncu'fo.

E *Upatorium* arborefcens, floribus cseruleis. *Plum. Cat. pi. Amer.*
 p. 10.

CONYZA foliis ovatis, fefTibus, acuminatis, floribus ramulorum axillaribus, fefTibus, fblitariis.

Conyzza fruticofa, flore pallide purpureo, capitulis e lateribus ramulorum ipicatim exeuntibus- *Sloan. Cat.pl. Jam. p. 124. Hifi. Jam. voh 1. p. 2<fl. Vaill. At1. Parif.no. 2^.*

Eupatorium eredum, hirftitum, foliis oblongis, rugofis, floribus spica-tis, per ramos terminales declinatis, uno verfu difpofitis. *Br^{nw}"» Hifi. Jam.p. 313.*

FIGURA SECUNDA.

Planta arborca, ramofa, mayores rami obpofiti, minores alternati?
Folia fefllia, cordata, acuminata, integerrima, nutan:ia.
Flores ex quavis ala finguli, jfeffi's, fenfim decrefcentes, re#ilifrit\$r difpofiti.

Obfervatio. Hanc fingularem plantam *Conyzza veram* fpeciem eiiie cou-iirmat *Fail* in *Ad. Parif.* qui accuratiflime *Plumierii* Plantas ex-a-minavit, & illuftravit in *Afts Parif.* raroque in hifce generibus fallir> licet Cl. *Brouw. Sloanei Conyzam* denuo ad *Eupatorium* retuleric*

TABULA CENTESIMA TRIGESIMA PRIMA.

F *Icus* Caftaneas folio, fruftu globofb, maculate *Plum. Cat. pi. Atncr.*
 p. 21. *Town. injl. p. 663.*

FIGUS foliis oblongis, acuminatis, ferratis, fruau racemofb, pun<5lato.

Ficus arborefcens foliis oblongo-ovatis, baccis fubverrucofis. *Brouw Hifi-Jam. p. no?*

£ Perim Teregam. // Malab. Tom. 3. Tab. 61.

F A S C I C U L U S . S E X T U S .

it}

F I C f U R A f R I M A

"*Planta arborea.*

Folia lata, oblongo-acuminata, ferrata, petiolata, parallelle venofa.

Fmftus racemofi, globofi, pun&ati.

Racemus terminatrix.

Flats maxima, Foliis Citri fabrotundis, fructu umbilicato. *Plum. Cat., pi. Am.p. 21. Toupn.inft. 17. 663. Linn. Aman. Acad. p. 219.no.9.*

FIG US foliis ovatis, obtufis, fru6lu ex alis gemello.

Ficus Americana, latiore folio venofb ex Curacao. Pink Pbyh Tak 178.% I.*

*Ficus lQdica₃ folio oblongo, obtufb, fru6lu minore, pallide luteo, fphae**
** rico. *Sloan, Cat. pL yam. p. 189.*

F\CG U R A S E C U N D A.

Folia ovata, obtu6fa, vendfa, integerrima; petiolata.

Frutlys ex alis globofi, conferti, glabri, umbilicati, utcunque gemelli A,

Ficus folio Cit^AacGtiōrē, fructu yridi. *Plum. Cat. p. 21. Tourn. inft* 17. 663. Linnai amanit. Acad. ypL 1.p. 221.no. 22.*

FICUS foliis ovato-acutis, integerrimis j fru6lu ex ala fblitario.

F I G U R A T E R T I A.

Folia ovata, aclita, petio.ata, alternata, venofa, integerrima.

Fruflus ex alis pedunculati, globofi, glabri, ex quavis ala fblitarii.

Kami in hac fpecie videntur quadragonii, quum in reliquis fint rotundi.



TABULA CENTESIMA TRIGESIMA SECUNDA.

FlcuiJolio Citri obtufb, fruflu jfanguineo. *Plum. Cat.pi. Amer.p. 2r. tourn.inft.p. 663. Linn, anuznit. Acad. vol. i.p. 218.*

FICUS foliis ovatis,integerrimis, petiolo inarticulatis, fru5tu pedunculo aggregato. *

Tsjela. *H. Malab. torn. 3. Tab. 63.*

iH PLANTARUM AM.ERIfcANARUM

F I G U R A F R I M A.

Planta arborea; Rami fcabri, qui in reliquis laeves.

/0/wovata, integerrima, petiolata, alternata.

Frudus plures aggregati, pedunculati, glabri, fphaerici, utcunque gemelli, umbilicati,

Obfervatio. H& tres species Citri folio, varietates forte cendifdae sunt, quaeque oranes confiftentiam foliorum Citri gerunt, atque fru&us globos & pedunculati sunt, inprimis vero notabilis est articulatio pec&li ad infertionem folii, quod huic fpeciei proprium. Ceterum Fkus Historia cum fpeciebus in Linn. Amanit. Acad. vol. 1. c. explicata elegant.er habetur.

FIcus alia, foliis Lauri, fru&lu minore. *Plum. Cat. pLAmer. p. 21.
Toitrn. inji.p. 663. Linn, Am&nit. Acad. vol. 1. pag. 219.*

*FICtIS foliis ovato-oblongis, venofis, integerrimis, baccis a^11-ribus;
pedunculatis, confertis.*

*Fkus Indica, folio oblongo, acuminato, minore, atrovirente, fructu.
Iphaericus, pallide luteo, Cerafi magnitudine. Sloan. Cat. pl Jam- P'
189. &c.*

*Supa arbor. Rumpb. Her bar. Amb. Jib. 5. cap. 2. Tab. 86. qua? Ficus pu-
mila. Linn. Difser. de Herbar. Amboin. &c.*

F I G U R A S li^CJJ. N D A.

Folia ovato-oblonga, acuminata, venofa, integerrima, vix petiolata.

*Fru&lus ramos fparfi, ex alis fajpius conferti & pedunculati, pafill?
umbilicati, fphaerici.*



TABULA CENTESIMA TRIGESIMA TERTIA.

t*. -*Uchfia triphylla*, flore coccineo. *Pum. nov. gen. p. 14.*

FUCHSIA. *Linn. fpec. pi.p. 1191.*

F I G U R A P R I M A.

Radix diffusa, brachiata..-

Caiilis simpliciirimus, herbaceus.

Folia e regione terna, fessilia, lanceolata, venosa, integerrima.

Kacemus terminatrix, ere&us.

Flores monopetali, infundibiliformes, multifidi, quorum unus apertus acfēparatus in Tabula? inferiore, parte A conficitur, ut ftaminum fitus intra limbum adpareat, quas quatuor numero obfervantur, cum antheris didymis fubrotundis, ac pistillo oblongo B, quod germini ovato C infidet.

^mFruUus eft bacca ovata, mollis & carnosa D, quadrilocularis E> femina "fibrotunda plura continent, dupli ordine locata.

Obfervatio. RarifTima hsec planta eft, nee apud alios au&ores obvia, videturque eflē Tetrandia nonogynia, calix autem in fru&um abit trun catuS) nee uljis foliolis inftrudus. Caeterum in memoriam *Leonardi Fuchjii* hoc plantarum genus a *Plumier*. FUCHSIA diftum eft; qui hiftoriām ftirpium Germaniae fcripfit abfblutam, & 510 iconibus illas exhibuit eadem forma, quā plantar Au&loris noſtri incifae funt, cujus Herbarium fiepius recufum ef(cum aliis ejus Operibus ad rem medicam*

KjEsnera humilis, flore fkvefcente. Phm. nov.gen. p. 27.

GESNERIA foliis lanceo)atis, ferratis, fessilibus, pedunculis ramofis, trifloris. Linn. fpy. p. 612. no. 1.

F I G U R ^ - ' ~ S E C U N D A.

^&7dzx diffusa, prorepens.

CWwramofus, inferius nudus.

*Folia lanceolata, ferrara, fessilia, in iūmmo aggregata, decidua**

Pedunculi ramofi, triflori.

Flares anomali, monopetalii, perfbnati, incurvati, quorum corolla cum calice inflexa FF, oris dilatatis absque calice G, & aperta, ut ftaminum fitus cognoscatur H.

Calix quinquefidus eft cuih pistillo I, idem cum frutius rudimento K. Calix fru&lu praBgnans L.

Fnithis eftcapula fubrotunda, bilocularis M, continens femina minima, numerofiffima N.

*Obfervatio. In memoriam magni Conradi Gesncri Tigurini hoc planta rum gefeuſ G E S N E R A diſlum eft ab au&ore noſtro, ille autem totius Hiftoriae naturalis parens habendus eft, primusque veram aperuit viam ad plantas cognoscendas & diftinguendas per genera; de diffusib ejusstudioatque incredibili doſlrina unirerfali omftino legenda eftelaboratiffima prasfatio ejus Operibus Botanicis praeſixa, quas *Gesneri* continet vitam, quorum primum tomura nuper edidit dodifT & laborioſifimus Vir Cafimirus Chriftophonis Scbmida Erlangce ProfefTor digni/l*

i26 PL ANT ARUM AMERICANA RUM

mus, cujus opera & studio alterum brevi ex[^]ftamus tomum, cum reliquis do&iflimis & elaboratissimis ipfius Operibus.

Cceterum dolendum eft Gesneri Opera multa efTe perdita vel nondum edita₅ in flore autem sstatis anno nempe 49 ex lue peftifera in Mufeo suo inter Mufarum fatellites obiit.



TABULA CENTESIMA TRIGESIMA QUARTS-

GEsnera amplio Digitalis folio t'omentofb. *Plum. nov. gen. p> 27**

GESNERIA foliis lanceolatis, crenatis, hirfutis, pedunculis lateralibus longiffimis, corymbiferis. *Linn.H.CLP. -\$i%.Jpec.pl.p.6i>n0t2*

*Gesneria ere&a, foliis lanceolatis, rugofis, hirfutis , pedunculis longiffimis, ramofis, ex alis fuperioribus. Brouiv. Hift. Jam., p%2&*v Digitalis folio oblongo, ferrato, ad foliorum alas florins." Sloan, tat. pi-Jam, p. 60. Hift. vol. 1. p. 162. Tab. 104. Fig. ^;"~*

Planta fruticofii.

Folia \2xii lanceolata, ferrata, fblitaria, rugofa, feu tomentofa.

Pedunculi ex alis longiffimi, folitarii, multiflori.

*Flares cum illis Digitalis Acanthoidis Commelini multum conveniunt * 10,^ geque recedunt a priore de{cripc specie, cujus tamen llores hu'c ^e" neri chara&erem juxta P/umierii Tab.y. ioderunt.*

Calix eft perianthium oblongum quinque partitum A, germine prrg^{^ans} iefe extendens & jexplicans B, atque profert

Frutum feu capfulam oblongam C, bilocularem D, & difle6lam, E capfiila inmerfa, & F capfula extenfa feu exempta.



TABULA CENTESIMA TRIGESIMA QUINTA.

GAlega frutelcens, flore purpureo, foliis fericeis. *Plum. Cat.pl-mer. p. 8. Tourn* inft, p. 398.*

CRACCA leguminibus ftrictis, racemo terminali, foliis toraentofis.

(3 G[^]/^herbacea, fubcinerea, villofa, foliis oblongis, pinnatis, spicis laxioribus ad alas. *Brouiv. Hift. Jam. p. 289,*

Plant a fruticofa.

Radix crafia, brachiata, quas lentes profert in extremitatibus, qua frequentes faepe in papilionaceis.

Caulis Jignofus, erectus, fimplex, uti in Tabulse margine.

Folia pinnata.

Foliola numeroſiflma, oblonga, integerrima, tomentofa, jſ^&mpari extreme

Florum fpica fimplex, ere&a.

Siliqua teretes, aequales, acuminatae.

ISe^ina oblonga, cordifprma, hilo notata, uti in aperta & separata filla. A & B.

TABULA CENTESIMA TRIGESIMA SEXTA.

G^3 *Enipa* fructu ovato. *Plum. Cat. p. 20. Tourn. injl.p. 658. Tab, 436*

CENIPA foJiis IanCeolatis, integerrimis, pedunculis multifloris.

Janipaba. Pifon. tibr. 4. cap. 16 pag. 138. & Marcgr.BraJil.p. yi. Phien. Mcattijf. p. 99, &c. ubi vide reliqua.

*

'4\$olia lanceolata, finuofa, venofa, integerrima, lefliia.

Jy%tyeuli multiflori, racemofr.^{^-'^}

f&htfrtezorolh infundibilifyfmis, tubobrevi, Jimbo quinquefido, aqua-
oJi; patente.

Stamina quinque, fiib'ulata, reflexa, corollā duplo breviora, uti in fepa-
ratia floribus liquet, ubi unus cum calice ab anticaparte A, alcer pofti-
ca parte B conipicitur. C eftjlos claufus cum calice, qui receptaculum
germinis integrurn D, ftillumque emittit fimplicem brevem, ovato-
, oblongum E.

Frudus eft Bacca ovata, carnofa F, utrimque acuminata, & quafi trun-
cata, bilocularis G, continetque

Semina plura, angulata," depretfaH, in pulpa nidulantia.

Obfervatio. Novi hujus generis charaſler eleganter definitur a Cl Lin^
nao in ult. edit, gener.plant.no. 229 pag. 7. quod genus mſpecieb. plan-
tar, per incuriam forte Typographi eft praetervifum, vide etiam Ci.
Ludwig, definit. gener. no. 94. p. 25. ubi notat, hoc genus T H E V ^
TI/^% in prima geherum editione a Linnao fuifle diftum, de quo vi-
de H. Cliffort. />. 76.

TABULA CENTESIMA TRIGESIMA SEPTIMA.

Gesnera arborefcens, ampio flore fimbriato & maculofb. *Plum. nov.*
gen. p. 27.

CRANIOLARIA foliis lanceolatis, dentatis. *Linn. fpec. pi.p. 618.*
no. 2.

Planta arborea.

Folia fblitaria, lanceolata, dentato-ferrata.

Pedunculi ex caule longiflimi, multiflori.

*Corolla oblonga, inaequalis, interne pun&ata, margine crifpo, feu ciliato,
calice quinquefido perfiftente contenta.*

Obfervatio. Hanc a *Gesneria* separavit jure Cl. *Linnaus*, quum fru&ifificatio penitus cum floribus diiferat, vocavitque hoc genus CRANIO-LARIAM, quum ipfius fru&lus feu Nux *Cranium* alicujus ferae refwrat, cujus chara&1:erem ab ipfo vide exafte definitum in ipfius *gener. nov. edit. p. 269. no. 670.* Caeterum inter fpecioffimas plantas IOCIIHI-tenet haec floribus condecorata elegantissimas, turn ob crlicem iongum patentem, turn ob corollas fimbriatas more *CoWr/bnia* & *Trichofantbis*, turn demum ob petala interne eleganter pun&lata: Pedunculos vero gerit longiflimos, ac folia alterna oblonga, dentata, uti in *Gesnera* supra descripta, fruftificatio ab hac diverfiflma unde separandae necefTario fuere,

TABULA CENTESIMA TRGESIMA OCTAVA

Granadilla folio hederaceo, flore albo, fru&u globofb, villofb.
*Plum. Cat. pi. Amer. p. 6. Tourn. in ft. p. 241. Linn. ^mdniu
•• Acdd. vol. 1. p. 270.*

PASSIFLORA foliis fubtrilobis, obtufis, fubrotundis. *Linn. fpec.
pi. p. 957. no. 13.*

/S *PajJiflora* foliis trinerviis nitidis, ad apices latioribus, fubtrilobis, Iobis aequalibus. *Brouw, Hift. Jam. p. 328. no. 7.*

FIGURE P R I M ^.

Planta volubilis & farmentofa, glabra.

Folia folitaria, alterna, petiolata, integerrima fubtriloba, obtufa, ac fubrotunda.

Flores ex alis plerumque gemini, -quorum quivis in proprio lons:oque pendunculo excreicit; cum cirrho ipirah. o T r

Frudus globofi, villofi, in quinque segmenta divisi.

Obfervatio. Hujus uti S^ATilbrequentis f⁵specie pulchra figura exhibetur in titulo ad *Barrelieriūvpus* poftthumum de plantis per Galliam, *Hif-*paniam &c. \ utriusque etiam defcriptio invenitur poft praefationem ejus ējēm libri in admonitione fatis ampla juxta *Plumierii* obfervata^A quas fi de reliquis ipfius au&oris plantis edere haud recurrent Botanici Pari- fjenfes, abfblutam ipfarum hiftoriarum obtinerent Botanophili.

Granadilla fructu rubente folio bicorni. *Plum. Cat. p. 6. Linn. Am<£-*nit. Acad. vol. i. p. 269.

*jVSSIFLORA foliis bilobis, cordatis, oblongis₅ petiolatis. *Linn.* fpec.p. 957.no. 12.

Clematis Indica, folio bicorni, flore clavato, fuaverubene, fru⁶lu hexagono, coccineo. *Plum. Amer.p. 68. Tab. 83.* quas non nifi fru&u a prio^Ae differt.

*lb*s PaJJionis* folio media lacinia quāfi obfcifla, flore minore carneo. *Sloan. Cat. pi. Jam. p. 104. Hift. Jam. torn. 1. p. 229.*


Tiffitjfc^A-liis bilobis, bafi emarginatis, petiolatis. *Linn. Amanit. Acad. vol. 1. p. 25^S<3cc.*

FIGURA S E C U N D A.

Folia fuſt biloba, acuminata, divaricata, interjeſlo lobulo acuminato bre* viffimOa Jbafi autem funt cordata ac petiolata.

Floret yulgaris funt formse & magnitudinis, rubentes.

 pyrifor/nis eft, acuminatus, hexagonus, glaber.

 jurima oblonga, injDuIpaiita glaberrima.

Laufis in riac f⁵specie triqueter eft, qui in altera ejus varietate teres eft.

Vhfkrvatio. Ultra vigiati diftin6tae fpecies Botanicis jam innotuere, quae omnes Americam agnoscunt patriam, atque ex variis au&oribus collectas Yecenfentur in *Linn. Amanit. Acad. vol. 1. apag. 244. ad p. 280,* ubi omnia, quae ad hoc genus pertinent, dilucide explicata inveniuntur, quarum plurimae icones a *Plumier.* in *defcript. pi. Americ.* a *Tab. 79. ad Tab. 91.* titulo *Ckmatitidis* Indicae exhibentur, uti & apud *Martin. Dillen. Fevill.* aliosque.

TABULA CENTESIMA TRIGESIMA NONA.

GVT^ARanadilla heterophyHa, flore; albo. *Plum. Cat.pi. Amer.p. 7.*

*ASSfFLORA foliis integerrimis, lanceolatis, ternatis ,pedatis, variisque,

Granadilla folio vario. *Tourn. injl.p. 2<{i.Linn.Am<zn. Acad. vol. 1,p*2ji. Murucuya feuſlos PaJJionis* fecundus. *Marcgr. Hift. p*1i.*

ijo. FLANTARUM AMEFCANARUM

F I G U R A • P R "•/ M A.

Planta tenera, farmentofii, volubilis, caule rotundo.

Radix pufilla, Napiformis, vix fibrofa.

Folia irregularia, inferiora fimplicia, linearia, integerrima, media trifida
feu ternata, linear-lanceolata, fuperiora pedata, in quinque inaequa-
les lobos diftincta, utcunque obtusiflora, quorum medii latiffimi, laterales
minores, inaequaliter divisi, & apice fave trilobi.

Flores mediocris magnitudinis 5 albi, quorum petala cordata flint.

Frudus Olivaeformes, glabri, fulcati, dependentes, pedunculati.

FIlrix fcandens, latifolia, ferrata, *Plum*, idem folium femine onuflum.
Plum. Hyl. MjJ. Tom. v. p. 142.

O S M U N D A fronde pinnata, pinnis cordato-oblongis, alterhis,
fibis, ferratis, racemis frugiferis alternis, fimplicibus linearibus.

Pbyllitidi fcandenti affinis minor, folio craibb oblongiore *Synd. Cyp. pl.*
Jam. p. 15. Hyl. Jam. vol. 1. Tab. 28. Fig. 2.

\$ *Lingua Cervina* fcandens foliis Laurinis ferratis; *i'lum. Filic.p. 102. Tab.*
117. cuius pinnae sunt obpofitae, eftque

Filix "fcandens latifolia, ferrata. *Plum, defer, pi. Amer, p. 8. Tab. 12. &c.*


Panna Valli H. Malab. torn. 12. Tab. 35.

F I G U R A • S E C U N D A.

Caulis repens fuper arborum cortices, filiformis.

Frondes fteriles alternatissim, oblongo-ovato-ferratae, glaberrime, fub quietis
fibrillae lineares excrefcunt, quibus fere figit haec planta arborum corti-
cibus, uti in feparato frondis fegmento adparet.

Frondes fertiles, lineares, contrafce, feurevolutae, feminibus undique lea-
brae, fterilibus duplo longiores, ita ut fint proprie attenuata folia, quibus
fruttificationes adhserent, eodem modo uti in *Strutbiopteri* *Halleri*
& *Ammanni* quod ex *Plum. Tab. 117.* evidens eft.



TABULA CENTESIMA QUADRAGESIMA.

GRojularia, Plantaginis folio lato, fruau minimo cseruleo. *Plum.*
Cat. pi. Amer. p. 18. Tourn. in I. p. 640.

M E L A S T O M A foliis ovato-acuminatis quinque nerviis interferrimis,
floribus paniculatis.

Grof-

GroJjhari <£ fru&u arbe^Tilxima, non fpinofo, Malabathri folio integro, minore, fubtUs ferrugineo. *Sloan. Hift. Jam.* vol. 2. *Tab.* 196. *Fig.* 2. fine flore ac fructu.

\$ *GroJjilaria* folio Plantaginis amplissimo. *Plum. Cat. pl. p.* 18.

Melaftoma foliis denticulatis, ovatis, acutis. *Linn. Jpec. p.* 389. no. j.

Mdaftoma foliis ovato-lanceolatis integerwmis, fubtus fericeis &c. *Linn. H. Cliff p.* 162.

Melaftoma foliis ampliflimis, fubtus ferrugineis, racemis terminatricibus.

" *Brouw. Hift. Jam. p.* 219. no* 6.

^4<cbio den drum Americ. pentaneuron, foliis craffis, hirflitis, ad ambiturfr V*rrioribus ferris. *Plukn. Mant. p.* 4. *Tab.* 159. *Fig.* 1.

t *Planta arborea.*

Kami fimplices, re6li, indivifi.

Folia oj(ata, acuminata, quinquenervia, integerrihia, venis transverfali-** bus parallelis, fimplicibus cancellata, fubtus ferruginea, petiolata, bi-na fibi obpofita.

^^'c^t?rminatrices copiofiirimi, corymbofi, in (picas fibi obpofitas cbl-lett

Frutlus raçemofip^dunculati, rotundi, fuccofi, continentefemina (ex oblonga, in orbem pofita.

Obfervatio. Haec planta varietas eft *GYoJJhhrU* Plantaginis folio amplificimq *Plumier.* nullo modo nifi foliatura integerima difFerens, quum liujus folia fint denticulata, & feptinervia, caeterum tota fades modus-que florendi, a^ fru&us omnino idem, nifi quod omni parte haec fit "inajor, quumque optime a *PJukn. I. c.* fit delineata, fuperfluum foret e^gn hie denuo exhiberè. Caeterum difficillimum eft hafde fpecies rite determinare, quum ex icône non conftet; utrum folia fint glabra, vel fcabra, qua3 differenlia in hoc genere ex foliis inprimis eft obfervanda, quum fpecimina tam raro occurant florentia, a reliquis vero hafce binas diftm6las eflè fpecies nee varietates, docet florum panicula, frudlusque minimi a caeteris penitus diverfi.



TABULA CENTESIMA QUADRAGESIMA PRIMA.

G*Roffidaria* Plantaginis folio anguftiore, hirfuto. *Plum. Cat. pi. Amer. p.* 18. *Tourn. inft. p.* 640.

M E L A S T O M A foliis denticulatis, lanceolatis, quinquenerviis, cau- ie hifpido. *Linn. fpec. pl. p.* 390. no. 3.

Melaftoma foliis ovato-lanceolatis, crerfetis, nervis quinque longitudinali- bus, extimis obfbletioribus. *Linn. H. Cliff p.* 162.

Melaftoma hirfuta, foliis cordatis, reticulatis, Icabris, fioribus laxe race-mofis fpicatis. *Brouw. Hift. Jam. p.* 219. no. 4.

132 ^LANTARUM AMER^ANARUM

Groffularia fru&u non fpinofa, Malabathri fcfliiX. Jonga & ruffa lanugine hirfutis, fru&u majore caeruleo. *Sloan. Cat. pi. Jam. p. 165. Hi/I. Jam. vol. 2. pag. 8j. Tab. 197. Fig. 2. Ray. dendr. p. 26.*

Arbitcuh Jamaicenfis, quinquenervia, minutiffime dentatis foliis, & caule pubefcentibus. *Plukn. Aim. p. 40. Tab. 264. Fig. 1.*

& *Melaftoma* quinquenervia, Jiirta, major, capitulis jfericeis, villofis. *Burm. Tbef. Zeyl. p. 157. Tab. 73. &c.*

Planta fruticofa, totaque hifpida.

Folia lanceolata, acuminata, quinquenervia, acute crenata, obpofita, faperne lseyia, inferne lcabra, ac venis transverfalibus parallelis eleganter cancellata, nunclatiora, nunc angufUora, quibus variat haec planta.

Flores fafligati, in corymbum ramofum colle&i, & laxe fpicati.

Pednnaili obpofiti cum inpari, unde triflori.

Fruflus eft Bacca ventricofa, fphaerica, quinque locularis, calicis fegmen* tiscoronata, hifpida quoque, pulpam continens, in qua

Semina locantur plurima, avenacea, uti in separatis patet iconibus, a b c.

Objervatio. Mire variat hoc plantarum genus fuis fru&ibus, atqu^a-b** a reliquis *Plumierii* fpeciebus penitus diverfa eft, proximeque '^ccedit ad illas species, quas in *Tbef. Zeylanico* olim exhibul, quae fub nomine *Fragarii* rubri & nigri a *Rumpbio* defcribuntur in *Herbar. Ambo*n, lib. 6. cap. 77 & 78. & Tab. 71 & 72. exhibentur.

TABULA CENTESIMA QUADRAGESIMA SECUND.A

GroJJidaria, Plantaginis folio, apicibus candidis & falcatis. *Plu^b.*
Hijl. Mff. T. v. p. 104.

MELASTOMA foliis oblongo-ovatis acuminatis, integerrimis, ft^b- quinquenervibus, floribus corymbofis.

Groffularia fru6tu non fpinofa, Malabathri foliis, fiibtus niveis, fru6lu ra- cemofb, in umbellae modum difpofito. *Sloan. Cat. pi. Jam.p, 165. Hip**
Jam. vol. i.p. 86. Tab. 198. Fig. 1.

Arbor Americana, quinquenervia, comantibus flofculis., foliis ampli\$* mis glabris, prona parte albanticibus. *Plukn. Almag.p. 40. Tab. 264**
Fig. 4.

FIGURE P R I M A.

Folia oblongo-ovata, fub-quinquenervia, venis parallelis obpofitis cancel- lata, integerima, glabra, petiolata, obpofua fubtus colorata, feu albanticia, glabernima.

Florum corymbus terminatrix conflat ex pedunculis obpofitis trifloris.
Florum petala reclinata, ^allamma longiffima, erefta, falciformia, quibus a reliquis haec differt. ^{wnuw,} ^{uiu}

G *RoJJidaria* alia * Flantaginis folio, fructu rariore violaced. *Plum,*
Hiji. MJf. Tom. j~pag. 139.

M E L A S T O M A foliis denriculatis, ovatis, acuminatis, nervis interioribus ante bafin coadunatis. *Linn. fpec. p. 390. no. 2.*

Melajloma foliis amplioribus, per petiolum recurrentibus & contra&is, faiciculis florum Iparfis. *Brouw. Hiji. Jam. p. 219. no. 7, Tab. 24.*

Fig. 2 & 3.

~~V~~ *ffidlor* fructu arbor maxima non fpinofaj Malabathri folio maximo, fTnodo, flore racemofb' albo. *Sloan. Cat. pi. Jam. p. 164. Hiji. Jann vol. 2. p. 84. Tab. 196. Fig. 1. Ray. Suppl.p. 26.*

~~F~~ *Funis* murjenarum mas & femina. *Rumpb. Herb. Amh. lib. 7. cap. 3 f<*

7^35-

~~A~~ *rbor* racemofa, Brafiliana, foliis Malabathri. *Breyn. Cent.p. 32. ubi icon**

F I G U R A S E C U N D A,

Folia óvata, acuminata, acute crenata, quinquenervia₄ nervis longitudinalibus venisque tran3verfalibus ftmplicibus cancellata, petiolata, ob* pofta.

Florum wcemi ex alis foliorum laxi, conftant ex pedunculis obpofitis, utcumque trifloris.



TABULA CENTESIMA QUADRAGESIMA TERTIA,

G *VJUanabanus* frudu aureo^ & mollitef aculeato. *Plum, nov.gen. p. 43.*

A N N O N A foliis ovatis, fru&u imbri cato & aculeato.

**Amona* foliis ovali-lanceolatisj glabris, nitidis, planis, pomis muricatis*
Linn. H. Cl. p. 222. Jgec. pi. p. 536.

Anonaln&cZi latifolia, frudlu fquamofb, afpero, fēminibus ex flavo ni* gricantibus turgida. *Plukn. Aim. 1. 31. Tab. 134. Fig. 2.*

Anona maxima, foliis latis fplendentibus, fr. maximo, tuberculis & fpi* nulis innocentibus afpero. *Sloan. Cat.pl. Jam. p. 203* Hi/I. Jam. vol. 1^Q. Tab. 22\$.*

Annona foliis oblongo-ovatis, nitidis, fru6libus lpinis mollibus₅ tumeritibus, obiitis. *Brouw. Hiji. Jam. p. 255. &e>*

F I G UR A F Rl M A.

*Plant a arborea, Kami lignofi, glabri, rotundi, fimplices,
Folia obverfe-ovata, cum accumine, plana, venofa, nitida, glabra, al-
ternata.
Flores folitarii, feu fimplices, tripetali, ingentes, calice magno tripetalo
contenti.
Fruttus ell conus fubrotundus turbinatus carnofus mollis, in hac fpecie/
imbricatus & molliter aculeatus.*

\^Jf *Uanabanus* fru6lu purpureo. *Plum nov. gen.* p. 43.

A NONA foliis lanceolatis, fructibus ovatis, reticulato-areolatis. *Linn.*
Jpec.plp. S37.no. 3.

Jtnona maxima, foliis oblongis, anguiflis, fru&u maximo luteo, combi-
de, cortice glabro in areolas angulares diftinclo. *Sloan. Cat. pl Jam.*
n. 264. Miiil vol. 2 n. 167. T. 26. Catash Carol. 2 n. 62. T^"*

Anona angustifolia, fru&u cancellato maximo. *Kumph. Herb. Aihb.* I 1.
cap. 39 Tab. 45 *Pluyn Phyt. Tab. 238 Fig. 4-*

Anona f. *rufolu rubicundissimo*. *Herm. Muf. Zeyl* p. 68. *Burm** *Tb* % *ZeyLp-*
31 &c.

F I G U R A S E C U N D A

Plant *a* arborea

Kami fimplices, longi, flexuofi, feu ad folia inclinanres, glabri.

Folia alternata lanceolata glabra vedOfa integerrima

Flores folitarij, tripetalij, angusti, petalis lanceolatis angustiflis, uti ad Lite-

A & B adnparet in aperto & clauso iijore

Pijillum e/l receptaculum fubglobosum, cui undique adhasrent flaminula, eique infidet germen globosum, pundulis undique exasperatum> quae punula flint mera fligmata absque ftilis uti ad C. confpicitur.

Fnitlus ell conus fubrotundus , carnofus & fquamofus, fquamis glabris imbricatis tegulis.

Scmina nidulantur in carnis centro, puluae involute, & in orbem pofita, dura, giabra, oblongo-anguftata D.

Obfervatio. Plures harum arborum fervo icones, quas delineavit *autlor*, ac recenfet in *in novis suis gener.* p. 43, quu_m Vero merfe funt varieta-tes fruaibus in pnmis dittin6be, nine hx datas sufficiant, quique plures J defiderat, adeat *Sloan. Hiji. Jam. vol. 2. a Tab. 2 2 5: ad 2 3o. & Bronw TUft-Jam />.235.*H*cporro arbor per totam laetare crefcit & vagatur India m tam Orientalem quam Occidentalem, prjEfertim vero per America? partem calidiorem, ubi gratum ac fabbrem pr^bent fructus hi cibum prjepi- pue in diarrhaeis & morbis biliofis, uti telata r^w ^ ^ alii que au(^ ores # Cseterum *Guanabanum* nimis barbarum Arneric. nomen rel^{et} fuD- plevit *Annona*, quum incolis prsebeat fugem di'vitem. Je. um p

TABULA CENTE^MA QUADRAGESIMA QUART A.

GUazuma arbor, Ulmi folio, fructu ex purpura nigro. *Plum, nov, gen. p. 36.*

T B E O B R O M A foliis ferratis. *Linn. H. Cliff, p. 370. no. 2 fpec.pi p. 782. Roy. pr.fl. Leid p. 47.*

*l*heobroma* foliis oblongo-cordatis, ferratis, ab altero latere majoribus, fr^&u minore fcabro. *Brouw. Hift. Jam. p. 306.*

Exbramidea Jamaicenfis,. Morifolia, fru&u ovali integro, verrucofb, intus in quinque cellulas, grana fculnea familia includentes, »difpertito. Balfamum olente. *Plukn. Altnag. p 92. & Phjt. Tab. 77. Fig. 2.*

Ani fructu, Morifolia arbor, flore flavo pentapetalo. *Sloan. Cat.pl. Jam. p. 135. & Hift. Jam. torn. 2. p. 18. Ray. dendr. />. 11.*

FIGURE P R I M A.

Pfat7tfkrborea, Rami lignofi, fimplices, fubvilloid.

Folia cordatp-lanceolata ^ ferrata, rugofa, parum obliqua.

Racemi ex quavis ala folitarii, fimplices, longi.

Flores ^alice conftant triphyllo, ac petalis quinque, ere&o patentibus, concgvis, cum plurimis ftaminibus radiorum inllar fitis, uti ad Litt. a, b & c adpareat.

fiittus eft capfulaiub-globofa, lignofa, undique tuberculis Icabra, cor-
•tjite perforatp cribriformi, divila in quinque loculamenta interne d & e.

Zemins in duplici ferie in fingulo loculo funt difpofita, verfus bafin angu-
Ipfq & excavata//^

Obfervatio. Satis frequens in hortis noflris efl, fed fru6lum ibi non fert, qui undique muricatus eft tuberculis obtufis, & capftla lignea undiqfe" poris pertufa. Flores vero non rice depinxit *Plumier.* quum non dif-
tinde notaverit neftaria adeo fingularia, petalis quinque minoribus con-
cavis tegentibus quinque fhmina, apice fingula quinquefido, feu
'quinque antheris inftru6ia perfekte uti in *Cacao*, quse ratio fuit, quod has
binas arbores ad idem genus ex florum analogia reduxerit Cl *Linnaus*
in *H. Cliff I c.* ubi ulterius examina chara6teres, ipfiusque defcriptionem,

INnominata. *Plum. torn. v. p. 117.*

COFCJ-O C A R P U S erefta foliis oblongis. *Linn.fpec.pl p. 176.*

Conocarpus foliis oblongis, petiolis brevibus, floribus in capuc conicum colledis. *Bromv. Hift. Jam. p. 159.*

Conocarpus. *Linn. K Cliff] p. 485. **

Ruabeckia Laurifolia, maritima. *Amm. Herb. p. 585.*

ij6 v.PLANTARUM AMEftlCANARUM

Alnus maritima Myrtifolia coriariorum. ' PN&. Aim. p. 18. Phyt. Tab. 240. Fig. 3.

Alnifnidu Laurifbla arbor Maritima. Sloan. Cat. Jam. p. 135. Hjl. Jam. torn. 2. p. 18. Tab. 161. Fig. 2.

Frutex innominatus fecundus. Marcgr. Hjl. Braf. p. 76.

FIGURE S E C U N D A.

Planta fruticofa, Kami flagellofi, longi, fimplices.

Folia lanceolata, integerrima, in superioribus ramis anguflata, Inferior vero obtusa & cuneiforma, ac fennim angustata & lanceolata.

Strobili fubrotundi, fquamis reflexis imbricatis, villofis, quarum lateri vel difco affiguntur nōfculi singulari methodo, qui num maſculini flores, a femineis separati nondum conſtat, vide Linn. pi. gen. nit. edit. no. 213. pag. 81. & Ludwig. dejin. gener.p. 232. no. 774.



TABULA CENTESIMA QUADRAGESIMA QUINTA.

G *Ujabara racemofa, foliis coriaceis, fubrotundis.* Raifinier. Plumier* OviedJib. 8. cap. 13.

COCCOLOBIS foliis craffis, orbiculatis, finu aperto. *Brouyj. Hi^ Jam. p. 20^.* ubi ejus character definitur.

Uvifera foliis fubrotundis, amplissimis. *Linn. H. Cliff.p. 487.*

Uvifera litorea, foliis amplioribus, fere orbiculatis, craffis, Americana₃ &c. *Plukn. Aim. p. 394. & Phyt. Tab. 236. Fig. 7.*

Uvifera arbor Occidental folio rotundo, O[^]vulgo. *Herm. Par. B.^{at} Pr.p. 185.*

Polygonum foliis fubrotundis, caule arboreo, fruſibus baccatis. *Linn. jpec. pi. p. 365. no. 26.*

Primus maritima, racemofa, folio rotundo, glabro, fruſhi minore pureo. *Sloan. Cat. Jam. p. 183. Hi/I. Jam. vol. 2. p. 129. Tab. 220. Fig. 3. Catesb. Carol, vol. 2. p. 96. Tab. 96.*

Popufa; Americana. *Dalecb. Hifi. p. 1830.*

Populus Americana rotundifolia, C B. Pin. p. 430.

Planta arborea; maritima in primis ficcaque amans loca.

Folia craffa, coriacea, perennia, fuborbiculata, finuofa, ac v--- f --- e nis cum cofta craffa rubentibus juxta Catesb.

Racemi longissimi, fimplices, cqjiofbs gerentes flores

Fruttus excreſcunt coadunatos, funtque hi bact* (7^, i' ^Ul ^ J_{as}, uniloculares, monopperm^, ad apices u m S.f c ^ & T⁵ fubrO t U n d^{as},

Semen eft Nucleus unicus, Jt'ordato-ovatus c, bafi quinquelobus d, putamine tenui lignofb e \$y^te&us.

Objèrvatio. Ad *Polygoni* genus retulit hanc plantam Cl. *Linnaus*[^] quum flores in racemis axillares proferat more *Polygoni* cum o&o ftaminibus ac piftillis triquetris, baccisque monofpermis, dein foliorum petioli interne caulem quoque vaginant, uti in plurimis *Polygoni* specebus, ita ut fane quam maxime adfinis sit haec planra ifti generi, quum vero Cl. *Brouwn.* ejus chara&cerem in viva planta diflin&um obfervavir, cum eo ad novum genus *Coccolobim* retuli.

TABULA CENTESIMA QUADRAGESIMA SEXTA.

G *Uajabara* alia, racemofa, foliis oblongis. *Plum. H. MJf, Tom.v.*
.p. 98.

COCCOLOBIS foliis cordato-oblongis, racemo terminatrice, caule
... arboreo.

Coccotibis foliis oblongo-ovatis, venofis, uvis minoribus pun&tatis. *Brouw.*
Hift. Jam. p. 210. no³.

Uvifera arbor Americana fructu pun6lato. *Plukn. Pbyt. Tab. 237. Fig. 4.*
Arhor Indica Glycyrrhizae foliis subrotundis, fioribus in prselongam
 spicam adusta. *Plukn. Amah.p. 22.pl. 5. Tab. 363. Fig. 4.* quas foliis
 rotundioribus diiFert.

• *F I G U R E* *P R I M A* .

*Planta arborea, Rami I'lgnoCi, geniculati, fimplices, rotundi, Isves.
Folia lata, "ovata, venofa, integerrima, vix petiolata, ad bafin cordara;
* largiflime-emarginata.*

Flores racemofii, feffiles, pentapetali, in fimplici racemo terminatrice colle&i.

Fruflus ignotus, nee depi&us.

Obfervatio. Habet haec planta tantam cum antecedente adflnitatem, ut merito dubium quis movere poflet, utrum fufcienter fpecie diftinguatur, quum folia ac bafin etiam cordato-emarginata fint, & faepius in hortis obfervemus plantas ludere & variare foliis rotundio^{bus} ac magis oblongis, quum vero hujus plants nulli delineati fint fru6lus, alii-que auftores eas feparaverint, nil certi ftatuere pofTum.

Guidonia Ulmi folio, flore rofeo & niveo. *Plum. nov. gen. p. 4.*

SAM YD A foliis ferratis, oblongis, floribus axillaribus fubferrilibus.

XPLANTARUM A^ERfCANARUM

FIGURA SEORDA.

Plantafrmkofc, Rand fimplices, vjx divifi.

/fr/w aiterna, ovato-oblonga, fubfelia, tenuiffime & argute ferrata.

Flares ex quavis ala folitarii, pedunculo breviflimo infidentes, ac fubfef files, quorum *Calix* quinquefidus *a*, nee pentaphyllus, *corolla* nulla.

Stamina fimplici ferie cinbla duodecim *f*, nee plurima uti in *Grewia*.

Germen oblongum in fundo calicis situm, cum ftilo fimplici ere&o c. qui *ftigma* gerit globofum craftiuculum.

Frudus eft capiula fubrotunda, unilocularis quadrivalvis *d* & *e* qua&iful, ca, lineis diftinfa, valvis maturitate recendentibus.

Semina plufima nidulantia in receptaculo ovato pulpofo/~& *g*.

Obfervatlo. Cl. *Boer bavins* in *H. L. Bat.* pag. 259. Credidit hanc Gui* DON 1 AM *Plum*, eflle Synonymon *Grewict Occidentalism* que frequen-
tiffima in noftris Hortis, atque a Cl. *Commel*. defcripta eft in *torn*. 1. *H. Jtmft*. fed ab ilia fpecie quam maxime recedit, quum haec folia orbicurata gerit, flores polypetalos, ftaminaplurima, fruclumque pufillum globofum, ita ut Cl. au&or ipfe fateatur *l. c.* quod *Planner*, fiorem aliter pinxerit ac fru6tum, noftra itaque ab hac penitus diverfa eft, iijfiusqufc fruclificatio omnino fimilis eft SAM YDJE charadteri, quern dedit Cl. *Brouw. Hifl*, *Jam.* p. 217. *Tab.* 23. *Fig.* 3. vide & *Linn. gm.* no. 525-*Am&nit*, *Acad. vol. i.p.* I28. ac *Ludwig. def.gen.* p. 316. no. 106\$*



TABULA CENTESIMA QUADRAGESIMA SEPTIMA.



UUidonia Aurantii foliis, aculeata. *Plum, nov.gen*, p. 4.

SAM YD A fpinofa, foliis ovatis, denticulatis, floribus axillaribus race-
mofis & aggregatis.

Guidonia foliis ovatis, utrimque porre&is, alternis, quandoque *erectis*, racemis laxis alaribus. *Brouw. Hifl. Jam.* p. 249.

FIGURA PRIMA.

Plants fruticofu.

Kami fpinofi, fpinis fblitariis fubulatis.

Folia Qix&9 utrimque acuminata, denticulata, vеноfa, alternata, folitaria* vix petiolata.

i%wpentapetali, axillares, feu ad alas confertL ac elomerati fimum que racemofi.

Frudus trigonus, Olivaeformis, glaber, trilocularis

Semina cov'io&9 glabra, angulofa*, uti in lateralibus figuris.

C

KJ~ Uidonia Nucls Juglandis foliis major. *Plum. Nov. gen. p. 4.*

SAM YD A foliis ovatis acuminatis, quatuor jugis, fl. racemofis axillaribus.

Santyda. *Linn. spec. p. 44j- Am&nit. Acad. vol. i.p. 128. no. 1055.* ubi ejus cara&er.

Samyda foliis ovatis villofis, floribus confertis, faiciculis ipariis. *Broinv. *./#/?. JW?./>. 21 & no. 3.*

WfffA: baccifer, folio oblongo integro, &c. *Shan. Cat. pl. Jam. p. 173;*

F I G U R A S E G U N D A.

OPlanta arborea.

~~*Folia*~~ pihnata.

Foliola ovata, acuminata, integrifolia, quatubr paria, (eu pinnae obpofitte; *T^acemis* ex ala fimplex, Jongiflimus, iaxus.

CalTx quadrifidus.

Corolla quadrifida, uti in Iateralibus figuris, cum ftaminibus in orbem fitis in calicis centr. *

Flores in longis laxisque racemis axillaribus.

Obfervntio. Huju's & altera species in *Plumicr. iconibus* reperitur, qu&/pfi dicitur. *Guidonia* Juglandis folio minor, fed quae pdtius prioris variantas cefenda eft, atque in ed ab alteradiffert, quod foliolum paHa **Sjfrtofto* cuminpari extremo, quasque duplo minora funt, ca'terum ilorum race!ni & ortus iidem, fi quis tamen diverfas efle velit, dici potelt *Samyda* foliis ovatis acuminatis, o&o jugis.



TABULA CENfESIMA QUADRAGESIMA OCTAVA.

H*Edera* arbor, folio haflato. *Plum. Cat. pi. Amer.p. 18. T. in I. p. 613.*

A R A L I A foliis ovatis, Umbellulis terminalibus.

Araha arborea, foliis nitidis, oblohog-bvatis, umbella laxa^ radiis fngulis glandula notatis. *Brouw. Hjyl. Jam.p. 189;*

~~*Amifolia*~~ arbor, flore tetrapetalo, frudu racemofb rotundo cannulato & coronato. *Sloan. Cat. pi. J_am. p. 136. Hift. Jam. vol. 2. Tab. 163** % + 2.

Planta arborea.

Folia ovata, acuminata, petiolata, alternata, integrifolia.

Spka florum corymbo/a.

PLANTARUM AMERICANARUM

Flares in umbellulis propriis.

Calix in fructum abit, hinc potius *Aralia* habenda species.

Fruftus efl bacca globofa, fulcata, ac coronata,

Semina continens oblonga ftriata, uti in separatis ejus partibua patet.

Obfervaiio. Ex hac planta fimmma adfinitas patet inter *Hederas* & *Aralias* in ordine naturali, quod & Cl. *Linn*, in *Phil. Botan.* p. 32. no. 49., itidem obfervavit, hanc tamen proprie ad *Aralias* pertinere cum Cl. *Brouw*. putavi, ex calicis inprimis forma > ac fru&ificatione.

TABULA CENTESIMA QUADRAGESIMA NONA*

H

jLjLEdyfarum triphyllum majus & minus. *Plum. Cat.p.* &

HEDYSARUM foliis ternatis, ovatis, iloribus fpicatis.

Hedyfarum foliis ternatis fubtuis fcabris * floribus racemofis ceijugati?.

Linn.fpec. pi p. 748. no. 16.

Hedyfarum triphyllum fruticofum majus & minus.. *Sloan. Cat. ,p. 73. Hift. vol. i,p. 185. Tab, 116 & 118. & vol. 2. p. 369.*

Hedyfarum triphyltum caulefcens > ereblum, floribus minimis, fpiris laxis terminalibus. *Brouw. Hifi. Jam. p. 300. no. 8.*

Onobrychis Americana, fl. fpicatis» foliis ternis canefcentibus, filiculis afperis. *Plukn.Alm.p** 270. *Pbyt. T> 308. Fig. 5** •

FIGURE P R I M A.

Planta fruticofa.

Kami fimplices, vixdivifi, glabri.

Folia ternata, ovata, inferiora minora, medium majus, petiolata ac flipulata.

Flores fpicati, terminatrices, pedunculati.

Siliqua, cymbae feu falciformes, (uperne glabrae, reftse, ac fulcatae, inferne finuofae feu undulats, glabrze, quse in majori specie juxta iconem quafi articulatae ac sepius geminatae funt, ad ipfarum ortum flipulis & taceis notataj, quae ad petiolorum ortum quoque progerminant. *Florum'-porro* fpica in majore specie ramofa, & quaft ^{pan}icula eft, paniculis alternis, ere^s, ac laxis, e quibus legumina alternatim dependent articulata, articuhs lubrotundis glabri.

E

Edyfarum arborefcens, foliis Mimofae. *PjUfn. Qat. p. 1.*

[^]**SCHYNOMENE** mitis, foliblis linear-ioblono-lc A r
uiongis, peduncuhs ramofis.

Onobrychis Orientalis Mimofae brevioribus folijs ^{rr}tatis, adfaftigiarum mortis. *Plukn. Al_{mal} "hic 1uis" alcatis & den- &-p. 270.1 at?. 309 Fig. 3'*

[^]*Efb*

/8 *JEfcbynomena* caule fcabroJ leguminum articulis medio fcabris. *Linn.*
spec.pl.p. 713. no. 1.

y*Efcbynomena* caule fcabroi Folio infimo quadripenni.; *Low. H.CLP.* ^65. &
Mimofa non fpinofa major Zeylanica. i fr^ . G?**. />. 51. T. 52.
Hedyforum annum majus, Zeylanicum, Mimofie foliis. *Town. inft. p.*
AO2. Bitrm. Th. Zeyl.p. 119. ubi vide reliquos auctores.

F I G U R A & ECUNDA.

J *arborea.*

Caulis amofus, fimplex, ^laber.

Folia pinnata, *foliola* oblonga; fere linearia, d vigiqti ad trigirita paria^
nervo medio crafliore notata, subfemiliia.

Flares ex alis plerumque gemelli, pedunculati, papilionacei.

*C*Siliqu(Z plana3,* leu compreife, articulatae, feu ifthmo.diftindte, In fingu-
*» lo articulo unicum oblongum continentes femen.

Obfervatio. Haec planta tota sua facie adeo similis eft Zeylanicas *Mimofe*
Breynii, ut hanc ab ea separare non audeam, plura enim ejus plantas vi-
dT & habeo specimina, quae glabra penitus; ac florum pedunculos
quodammodo ramofbs gerunt, ita ut haec facile combinari posint, nee
notarealis, quantum video, eas diftinguat.



TABULA QENTESIMA QUINQUAGESIMA,

J

3LjELianthemum Betonicae foliò, caule hifuto. *Plum. Cat. p.?*

T'URNERA hifpida*, pedunculo axillari, geniculato.

F I G V R A P R I M A.

Planta herbacea.

Radix fibrillofa.

Caulis fimplex, erèclus ^ indivifus, hifpidus.

Folia lanceolato-déntata, fcabra, punftata, alternata, vix petiolata.

Flores axillares, fblitarii, pedunculati, pentaphylli, uti in separatiS latd-
ralibiis, a & b patet.

JFrudus, feu capfula féminalis fubrotunda, unilocularis , tribal vis, per
"~~~"maturitatem in tria segmenta dehifcens c:

Semina continens exigua, fubrotunda^, glaberrima.

Obfervatio. Haec planta mihi videtur penitus diverfa & aliena eile a Ciftis,
pauciora enim riorum ftamina, ac peduncui geniculo inftrucli, ut &
folia alternata declarant magis adfinem effe Turnerte, unde & eo tarn
diuhanc reduxi, donee examen in viva dein id'magis confirmat^ flatura
autem ac fades hujus plantse quam maxime fingularis eft.

TT

JIXE Iiantbemum frutefcens; Portulaceae folio. *Plum. Cat. p. 7.*

P O R T U L A C A foliis obovatis, depreffis, caule fruticofo, floribUa racemofis.

F I G U R A S < E C U N D A.

Planta fruticofa, ac ramofa.

Kami fimplices₃ vix divifi.

Folia craffe, avenia, glaberrima, ovato-anguflata, intcgerrima, utctinqüe alternata, ac feffilia.


Florum racemus fimplex, faftigatus[^] rariores ac fblitarios gerens flores j' pedunculosque uniflores ac ftipulatos.

Obfervatio. Dubia haec planta eft, fed quum folia fint erafla & alterñate/ quod vix obtinet in Ciftis, excepta unica forte fpecie, ac calix infuper bifidus fit depittus[^] hinc propius ad *Portulacas* accedit, praeterquam quod vaſculum feminine etiara optime reſpondeat huic generi, ſpi^od uniloculare ac trivalve eft.

Finis Fafciculi Sextū



TAB. CXXVI.





PRUNUS floribunda racemosa



EUPAT. OB MM
foliis j minato multilis V f ***

F. I L'ATOIV'M.: M.
foliis ovatis oblulis.



EUPATORIUM
Cordatum nummularium



Fig. 1
EUPATORIUM
Hispanicum, *Amelia*,
Hispaniolae

Fig. 2
CONYZA
Hispanica

TAB. CXXXI.





Fig. 1.
FICUS
folia ovata, inaequiternis.

Fig. 2.
FICUS
hMns ovato-oblonga.



GE^NERIA

K liui CCat TIM.L
Serratis.


FUCHSIA





CRACCA leguminosa f. stricta.


TAB. CXXXVI.






Ci; AN m.i. • RIA folia lanceolata, dentata.







MELASTOMA hispidissimum




MELASTOMA Sanguineum
stipulatum ciliolatum var. bipido




MELASTOMA
foliis dentatulatis ovatis

MELASTOMA foliis oblongo-ovatis
floribus corymbosis.




TAB. CXLIV.



Theobroma cacao Linn.

Conocarpus erecta folia oblongis.

TAB. CXLV.



COCCOLOBIS siccis crassis.
tebetaria



Fig. 1
COCCOLORIS sive *cordata* Ollanga

Fig. 2
SAMYDA sive *erratica* Ollanga

Fig. 1.

SAMYDA spinosa.
foliis ovatis, dentatis.



Fig. 2

SAMYDA foliis ovatis secundinis.



TAN. Spec. No. 777

ARAIIA filia (var.) umbellifera terminalis



Fig. 1
RIEDYSIUM
Ried. aduncum, Schlecht.

Fig. 2
RIEDYSIA SORDINOMENE, 256.
Golds. Incar. oblonga.



Fig. 2
PORTULACA filiformis

Fig. 1
TURNERA liquidambaroides

P L A N T A R U M
A M E R I C A N A R U M
F A S C I C U L U S S E P T I M U S ,

Continens Plantas, quas olim

C A R O L U S P L U M I E R I U S ,

Botanicorum Princeps

Detexit, Eruitque,

A t q u e i n I N S U L I S A N T I L L I S i p f e d e p i n x i t .

Has primum *in lucem edidit,*

Concinnis defcriptionibus, & Obfervationibus,


iEneisque Tabulis iJluflavit

J O A N N E S B U R M A N N U S , M. D.

Jtthenai illujlris, & in Horto Medico Amjleladamenfi

P R G F E S S O R B O T A N I C E S ,

Academic Cafarea Nature Curioforum Socius, Rcgi<equa Socictath
Sckntiarum Upfalienjis Colega.



Sumtibus Au&oris,
Proflant Amfteladami in Horto Medico,

A t q u e

A p u d P E T R U M S C H O U T E N ,
6? L U G D - B A T A V .

A p u d G E R A R D . P O T V L I E T , & T H E O D O R . H A A K .
M D C C L V I I I

NOBILISSIMO & DOCTISSIMO VIRO,

LAURENTIO HEISTERO,

SERENISSIMI BRUNSVICENSIMUM & LUNEBURGENSIMUM DUCIS

CONSILIARIO AULICO, & ARCHIATRO,

MEDICINE, CHIRURGIuE, & BOTANICES,

I N A C A D E M I A J U L I A C A R O L I N A ,

QUM HELMSTADII EST,

P R O F E S S O R I . C E L E B E R R I M O :

ACADEMIC SCIENTiarum C^ASARE*£*,

R,E G I M Q US LONDINENSIS, ATQUE

BEROLINIENSIS COLLEGE MERITISSIMOj

AMICORUM INTEGERRIMO,

H U N C S E P T I M U M

PLANTARUM AMERICANARUM

F A S C I C U L U M

GRATISSIMO DICAT ANIMO

JOANNES BURMANNUS.

P L A N T A R U M
A M E R I C A N A R U M
F A S C I C U L U S S E P T I M U S.



T A B U L A C E N T E S I M A Q U I N Q U A G E S I M A P R I M A *

Hieracium villofam, Pulraonaria^Gallorum facie. *Plum. Cat.* p. 10.
Tourn. injl.p. 471.

fe R A C I U M caule fimplici, foliis radicalibus, ovato-oblongis, ciliatis.

¹ Hieracium macrocaulon hirfutum folio longiore. *Ray. torn.* 3. p. 169.
Jtieradum Marjanum, Pulmonariae Gallicaee fubrotundis foliis, Laftucae floribus parvis. *Pkkn. Mantiff.p.* 102. *Tab. 426. Fig.* 2.

F I G U R E . P R I M A .

Planta herbacea.

Ratfx fibrofa, in fimplices diffusas fibras jfefe extendens.

Folia radicalia, feffilia, terrse incumbentia, extenfa, ovato-oblonga, finucvfa, ciliata, & villofa.

Caulis ii'mplex, erebus, rarioribus ac ruinoribus fimplicibus foliis gaudens* fliperius flores paniculatos, in quovis pedunculo utcunque ternos ge^ rens, quorum petala ad bras elegamer crenata.

Obfervatio. HEBC planta quam maxime adfinis eft *Hieracio* murorum *Linn.spec.* 802. no. 15, ita ut vix differentia obfervetur, nifi in fo* * Liatura, qua2 non ita dentata, fed finuofa potius, magisque lanata feu'ci liata eft, quae diverfb climapi forte adfcribenda, unde Eropaeae videtuf eflè varietas.

Jacobaa foliis Salicis ad margines villofis. *Plum. Cat.* p. 10. *Tourn. wfi.p.* 487.

V E R B E S I N A foliis linearibus, ciliatis, floribus axijlaribus, feffilibus,

FIGURA

SEC

U'ND

A.

Platt-
L!

t₄6 PLANTARUM AMERICANARUM

Planta herbacea.

Radix descendens, fibrillofa.

Caulis fimplex, erectus, glaber, geniculatus.

i^l/lanceolato-linearia, ciliata, feffilia, obpofita; ad fumnum conferta;
ex quorum alls

Flofculi fblitarii, feffiles, quorum radios licet non rite expreflprit *Plu-*
mier. ex denominatione tamen, feu nomine *Jacob&a.* intelligitur, radio
efle inftrudlos, quum *Tourmfortii* methodo fuerit inbutus au6lorj cse-
terum ex fru6ificatione marginali separata conftat, ad *f^lerhefina.* genus
pertinere hanc plantam.



TABULA CENTESIMA QUINQUAGESIMA SECUNDA-



X^ljLTpericoides frutefcens, ere&a, fiore luteo. *Pkm.nov.gen.p.* 51.

ASCYRUM foliis oblongis, fruticofum, ramis ere&is.

Afcyrum foliis ovatis, caule compreflb. *Linn.spec.pl p.* 788*

Ajcyrwn foliis ovatis. *Hort» Cliff,p.494.* *Grort.FL F*irgki,p.* 88»

FIGURE

P R I M A.

Planta fruticofa, ramofiffima.

Ramidi graciles, ere&i, maiores, dichotomi, qui in rainores trichoto*
mos fubdividuntur.

FAoblonga, feflilia, *Integra*, bina obpofita, nervo medio decurrente.

Flores terminales, fblitarii, quadripetalii, ere&o-patentes, quorum duo
petala obpofita aliis duobus latiora funt, caeterum horum chara^e-
rem exa&ifT definivit *Cl. Brouw.* in *Hifl. Jam.p.* 309. ipfbrumque ut oJ
frutus Figuram optime delineavit. *Plum.* in *nov. gen. Tab. 7.* q^u* u^l*
terius ibi examinari poffunt.



XXTpericoides frutefcens, humifufa fl. luteo. *Plum. nov.gen. p.* £2.

ASCYRUM foliis lanceolato-linearibus, bigl_{an}dulis, ramulis diffufis.

Afcyrum fruticofum minus, fupra^decompoftum, ramulis gracilibus, mar-
ginatis, foliis l._{nearibus}, feflihbus, baG biglandulis. *Brouw. Bifi-*
Jam. p. 309. ubi ejus charafter.

FIG U R A SEC U N D A.

Planta

Planta fubfruticofa, tenera.

Ramuli flaccidi, decumbentes, acdiffifti, fuperius trichotomi.

Folia feffilia, bina obpofita, linearia, lanceolata, juxta *Plumier*, t, c. foraminulis pervia infar *Hyperici vulgaris*, unde & *Hypericoides* denominata fuit ab au6k>re, tanquam planta *Hyperich* accedens. Juxta *Brouw*. binis glandulis foliola fuit inftru&a, atque ex fingulis alis foliola dud trinervia obtufa excrefcunt.

Flores ejufdem fuit formae, eodemque irido oriuntur, uti in priore fpecie.



TABULA CENTEŠIMA QUINQUAGESIMA TERTIA.

Jahotapita pyramidato flore luteo, fru&u rubro. *Plum. nov. gen.p.42.*

OCHNA foliis lanceolato-ovatis, ferratis.

Qckna. *Linn. fl. Zeyl. pag.yi.fpec.pl.p.* 513.

Jabotapita. *Marcgr. Braf.p. 101. Pi/bn. p.* 166.

Arbor baccifera racemofa, *Bafiliana* 5 bacc[^] trigona, prolifera. *Ray*, *bift.pl. p.* 1632. ^{**}

Planta Fruticoifa.

Kami fimplices, vix divifi.

Folia fbiitaria, fpurfa, fubfefilia, lariceolato-ovatai fubtilitef ferrata, ac venofa.

Flores faftigati, in racēnum congefti, ro/acei, pentapetali, quorum unus a ahfica, alter b poftica parte, in Tabula conQ)icitur: c eftcalix quinque partitus, cum ftylo fubulato erefto.

Frudul conftat ex pericarpio fubrotundd truncatb & carnofb d, cui baccae utcunque binae ee adcrefcunt olivas formes, f molles, ofliculum continentes g ejufdem format quod femen continet h oblongo-ovatum.

Obfervatio. Binas detexi arbusculas in *Hermannii Herbar. Zeyl.* quarum una *Bok<zr<z* ibi vocatur, quam defcripsi n& delineandam curavi in *The/.* *Zeyl. p. 123.* cujus frudus optime convenient cum illis *Plumieri* planta?, turn & totus ipfius habitus, ita ut fine dubio hujus fit generis.

Alter a vero *Malkdra* Cingalenibus vocatur, cujus folia fuit latiora an magis ovata, fed fubtiliter quoque ferrata. Flores vero non fpicati, fed plures fimul congefti fuit ac frutlus fimplices olivee formes dependentes fine excrefcientiis j ita ut hanc putem ab hoc genere diverfam, licet *Cl. Linn&us* hanc in *Fl. Zeyl. p. 93.* cum fuperiore planta eonjunxit, quod ibi latius *Tub no.* 209. examinari potefh*

i48 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA CENTESIMA QUINQUAGESIMA QUARTA.

J Acob&a arborefcens, Helenii folio lucido. *Plum. Cat. p. 10. Town. inf. p. 487.*

SOLIDAG.O foliis ovatis, ferratis, glabris, petiolatis, caule a/b/o* refcente, floribus paniculatis, radio quadrifido.

Solidago arborefcens, Helenii folio lucido. Vaill. Ad. Parif. ann. 1720.

Plania arborefcens.

Folia lata, ovato-acuminata, dentata, glabra, nervosa, alternata.

Flores paniculati, copiofi, quadriperali, unde distincta est hsec species a congeneribus, licet omnes Solidagine rariora gerant petala in radio» fed nulla tantum pauca quam haec species, qua? quatuor tantum habet, dein calicem etiam simplicem depinxit au&or, qui in aliis imbricatus est, uti in Tabulae margine patet cum reliquis fructificationis partibus.

TABULA CENTESIMA QUINQUAGESIMA QUINTA.

J *Jlnraja* fcandens, foliis Tamni. *Plum. nov. gen. p. 33.*

R A J A foliis simplicibus, cordatis, acuminatis, feptinerviis.

Rajania foliis cordatis, feptiuerviis. *Lmn. Jpec. pL p. 1032, no? 2.*

FIGURE P R I M A.

Plant a farmentofa, fcandens.

Radix fufiformis, tuberculofa, supernead terras superficiem fibrafi'adtol-lens simplices extenfas.

Caulis teres, flaccidus, fcandens, farmentofus.

jFo/zVzfimplicia, feptinervia, cordato-oblonga, acuminata, reticulata, alternata, petiolata, ex quorum forma iSc habitu fumma hujus generis adfinitas patet cum *Diofcorea*, *Smilace*^ ac *Tamno*,

Flores racemofi, ex alis penduli, nunc quinqu^fidi a₉ nunc Texfldi b, germen continentis fubrotundum comprefTum c.

firuflus est alatus, ab uno latere cinflus al& maxima, obtusa & inflexa d<> ita ut totum femen tegat, estque unicapfularis.

Semen unicum, fubrotundum e.

Obferuatio. Hujus & altera species in *Plum. opere de pi. Amer.* occurrit, quae *Bryonia* fc4iis auriculatis fructu alatop^. 84. vocatur & Tab. 98. exhibetur, quae *Rajania* foliis haftato-cordatis a *Linn* in /bee. P- 1032. vocatur. Caterum hoc genus mniemoriam *Joannis Ratl*^ inter Anglos Botanici fummi R A J A dicendum est ^merita reefentur a *Plu,n. Vnnov.gen.p. 33.* & a *7W*^, ^ p_n ^ p₁ ^ merita

J Anraja (candens, quinquefolia. *Plum, nov.gcn.p.* 33.

R A J A foliis quinis, oblongis, trinerviis.

Rajania foliis quinis. *Linn.fpec. p. 103 2. no. 3.*


FIGURE S E C U N D A.

Planta farmentofa, fcaridens.

Folia ad fingulos articulos quina, petiolata, oblonga, seu ovato-lanceo* <> lata, obtusifcula, integerrima, trinervia, venosa.

Florum racemi in medio internodiorum caulis, quum prioris ex alis dependent.

Observatio. Rariflma haec planta est, ac maxime singularis, quum folia sua producat non in eodem petiolo digitata, uti in *Pentapbyllo*^ sed quinque separata ad singulum caulis geniculum, propriisque petiolis infidencia, turn & racemum florum ex ipso caulis intermedio, non vero ex foliorum alis, uti plerumque in aliis obtinet plantis.



TABULA CENTESIMA QUINQUAGESIMA SEXTA.

J'Asminta arborefr^ns Solani foliis, baccis nigro-violaceis. *Plum. Cat. p. 17. Town. iufi. p. 598.*

L Q N I C E R A foliis lanceolato-ovatis, racemis patulis, corollis infundibiformibus patentibus.

Jfasminum arboreum, foliis Laurinis, ex adverfb nacentibus, oblongis acuminatis, flore albo. *Sloan. Hist. Jam, torn. 2. Tab. 205. Fig% 2.*

· F I G U R A P R I M A .

Planta arborea.

Folia obpofita, lanceolato-ovata, venosa ac finuofa, petiolata.

Mores corymbofi, per ramos fparfi, patentes, infundibiformes, corollis quinquefidis, ftaminibus quinque a, pistillo seu ftilo bifido k

FruClus est bacca didyma sub calice nata c, unde patet hanc plantam proxima adfinitate jungi cum *Lonicera* corymbofa. *Linn.fpec.*

Semina subrotunda, bifida, glabra dd.

150 PLANTARUM AMERICANARUM

Jum arborfcens Lauri foliis, Bore albo adoratissimo. *Ftum. Cat.*
pip. 17. Town. in I, p. 59S.

IXORA foliis lanceolato-ovatis'j ilorum racemis difperfis.

Pavo la foliis oblongo-ovatis, obpofiiis, ftipuhs fetnccis, pet'io'iis interpo/Itis. *Riyuzu.Hift. Jam.p.* 142. *Tak* 6. i./.;. 1.

Ixora fbiis oi'ato-Janceolatis. 7>.,7. /•'. *Zeyl.p.* 12.

In flore tetrapetaloo flavo_s **Benricfaeiii** ii. *Malab. Burnt.* 7
Zeyl. />. 126. ubi vide reliqua.

F I G U R A S B C U N D A.

Pfmna fruticofa,

Romxi fimplices,, fubnodofa.

'obpofita, **ovato-lanceolata**> venola, integerima, petiohta-

Flor orum lumrao corymbofi, laxi, patentes, corollis quadrifidis patentibus tibulofis a, Staminibus quatuor ad tubum fitis, ac germinc fubrotun^OjdcprelTo l>,cu^ **ftilus** fimplex infidet fliperius bifidus c.

Fr U&us e(t bacca iubrotunda d^ unilocularis 1

Semina eontinehs'iblitaria , fubrotundu, quadrifida f.

Objervatio. Q_uum haec planra a variis auftoribus jam fit delineata, cju partcs tantum feparatas exhibuimus , quumque a *Cl. Linnso* ad *Ixor*as fit relata, hinc nomen ejus retinuimus, licet haud **inmerko** ad *Pavo tam* reducatur a *Cl. Broun:*, oh (em^il iblariuiw. qnoiitifiduni. =

" TABULA CENTESIMA QUIXQUAGESIMA SEPTIMA.

J rfsminum aUud arborefcens, foliis Solani minus. *Plum. Cat.* p. 17.

JASMINUM foliis ovato-oblongi.. - floribus per ramos iparfis.

Jasminum Pericl vmeni folio, flore albo, fructu flavu, rotundo, tctrapyreno. *Sloan. Itifl. Jt* Tom. 2. Tab. 294. Fig. ,
Natu Malab. tom. 2. Tab. 55.
ii Erratum minor

F I G U R A P R I M A.

Vknta frmicofa.

Folia fimplicia, lcu ftillaria, ovato-oblonga, peniolata ac venosa.

Flor corymbosi, per ram os /parfi exc mitibus, quales in /7. *Malab.* confpicii intur, ex qu b fijpp¹ fepte fint delineati, longissimis cur icm

J'Jlsminum zrhoreCcGns) racemoftm, foliis Lmri. P/um. Ifi/I. mff. torn.
6. peg. 62.

CITHAREXYLON racerais **longifimis.**

Citbarexylon fruticoium, foiiis fiibelipticis, petiolis pedatis, caficiBus
rruncatis, {picis terminaliSus iongioribus. *Bronw. Hiji. fam*, 265. Tab*
28. Fig. 2.

F I G U R-A S E C U N D A.

I'lanta frutlcofa,
Tiami fimpffces', fiibnodofi.
Folia obpoflta, ovato-acunftnata, veno(a, integerrima, petiolata,
Fforum racemus Jongiiimus, faffigatus, ex fupenorom *ioliorum* alls ex-
crefcens, •
Flares ipfii furit monopetaii, quinque partiri, tubulati *aa*, cum germe
ovato *bb^* uri a *Flam*, depi^li funt, reliqu^e vero fruSlincationis partes
cum ipfarum chara&ere a *CL Bronw. pag. 264.* adcurate denotantur,

TABULA CENTESIMA QUINQUAGESIMA OCTAVA.

I Cago frufiu ex albo rubeicente. *Plum, nov gcn*p. 44.*

C I | R V S O B A L A N U S . f * M . # 4 / > . 513.

Chrysobalanus fruticofcs, foiiis orbicufatl, alternis, floribus kxc race-
moCs. *Bromv. H0. jfam.p. 250.* Tij& 17. /%. 5,
Prtito Sebefiana^ fimlfis 'Americ. *Plukn. Jilmag, 306.* Y^l. 217. /'^, 2.
Primus Icaco *hah at. it in. 3. p. 30.*
Acaja & lbamtara. *Marcgr. Braf. p. 129.*

Planla arborca.

Gm/w & JY/Z tuberculis *scabri.*
iWi/J fubovata, obtuia, integerrima, vcnollt.

Fififftm peta, la qumque patentia, plana rt & *et* im calice quinquefido
pcrficiente c, & ififtjiin *ibus plurimis craciis, quo < Brouisth, eleean-*
ter in sua tabula delu; *cantur.*

Fruilus ovatus, carnofu-i mqj, unilocularis, nutem tegens fragilem,
: rugo(i;u, qutnque fulcis notaram, u in difcio tradi j ^ 5; cxempia
nucc e tidpaiet, quis; niic] *um contineat ovato obtulum e & j.*

Obfervaiio. Variat haec arbor Hits fr uflbus, qutnq; flavi, uncnigri,
& purpurei ob iervantur, u in anetoris denominat ip doccr j qui a *Linnso*
mpec. fuis recc nsentur, quique Barbarum Americ. *Iago nom;n rcjc-*

152 PLANTARUM AMERICA[^] ARUM

cit, Girsecumque compofitum fibftituit a fruftu feu *Balano* aureo defumptum, quod in re Botanica receptum eft.

Sloaneus in *Hift. Jam. torn. i. p. 126.* huic arbori junxit Myrobolanum foam, quae folia gerit pinnata, uti *Condondon Rumpbii lib. 1. Tab. 60.* fed queſe toto cſelo ab hac diſferunt arbore, uti ex figurarum comparatione liquet, unde & Cl. *Linn&us* eum fecutus eft in fpeciebus fuis, adjunxitque noſtrse arbori ex audoritate S^ooanei Myrobolanos iftas, nee potuit aliter, quam diu noitram non viderat iconem, qu^od itaque *ibi rejiciend^ee funt.*



TABULA CENTESIMA QUINQUAGESIMA NONA.

K *Etmia aculeata*, fiore ampliflmo, coccineo. *Plum. Cat. p. 2. Town, inft.p. 101.*

HIBISCUS foliis trilobis, ferratis, caule aculeato.

Narinampuli H. Malab. torn. 6. Tab. 44?

F I G U R A P R I M A,

Planta fruticofa, cujus caulis & rami, ut & foliorum petioli aculeis recurvis exasperati.

Fo/zVztriloba, acuta, ferrata, petiolata, lacinia intermedia majore.

Flares ingentes, patuli," colon's coccinei.

Capfula feminalis ftrigofa, pilisque hirta, unde patet fumma hujus plantae adfinitas cum *tiibifco Sabdarifa & Surattenfi Linn. fpec. p. 695.* a quibus tamen foliis trilobis nee quinquepartitis, ut & corolla coccinea diftert.

K *Etmia alia aculeata*, flore amplifimo ex purpura nigro. *Plum. Cat' pi. Amer.p. 2.*

HIBISCUS foliis inferioribus quinquelobis, palmatis, fuperioribus trilobis, caule aculeato.

F I G U R A S E C U N D A.

Hsec a priori differt, quod folia inferiora fint quinqueloba, latiora, & inftar Vitis expanla feu palmata, casterum ferrata, ac fuperiora inftar prioris triloba, fed non tarn profunde incifa, unde & hujus plantse folium tantum inferius inculpendum curavi, oeterum flores frutlusque conveniunt, excepto quod calix villoſus in hac fit, qui in priore glaber, caulis porro & rami, ut & foliorum petioli, illorumque etiam coft^o aculeis retroflexis & defcendentibus exalperatee funt, ita ut proxime inter fefē convenient^ee, ac fere varietates cenfend^ee fint, quin ha?c propius ad *Sabdariffam* accedat.

TABULA CENTESIMA SEXAGESIMA.

K *Ettnia frutefcens*, Mori folio, flore purpureo. *Phim. Cat. p. 3.*
Tourn. inf. p. 101.

HIBISCUS foliis cordato-ovatis, acuminatis, ferratis.

Althaa Jamaicenfis arborea, foliis oblongis, mucronatis, glabris, floribus amae rubellis. *Plukn. Almog. p. 24. Pbyt. Tab. 259. Fig. 3.*

& *Hikifcus* foliis ovatis, acuminatis, ferratis, caule fimplicifimo. *Linn. Jpec. pi. p. 6g3.no. 1.*

Alcta fbfea peregrina, *Corn, Hift. Canad. p. 144. Tab. 145.*

FIGURE P R I M A.

Planta fruticofa. *Kami* fimplices, indivifi.

Folia cordato-ovata, acuminata, ferrata.

Pedunculi terminales, racemofi.

Florum petala plana, patentia, vulgaris & mediocris formae.

Capfu *U* feminales acuminasae, glabr®, quinque lineis notatse, & quinque capfulares, uti ex integra *a* & diffecta *b* patet.

Semiria subrotunda, reniformia, glabrat:.

K *Etmià amplifimo* folio angulato, fru^lu hifido, clypeato. *Plum**
Cat. p. 3. Tourn. infi. p. 100.

HISJSCUS foliis cordato-angulatis, capfulis truncads, hifidis.

Hibifcv fruticofus, difTufus, foliis cordato-angulatis cum acumine, capfulis interne & externe hirtis, prurigino/is. *Bronw. Hift. Jam. p. 286. no. 8.*

FIGURE S E C U N D A.

Planta fruticofa.

Folia ampliflma, angulato-cordata,, acuminata.

Florum petala contra&a, quinquepartita, revoluta *a*.

Frudus eft capfula, turbinata , truncata *b*. calici amplifimo inmerfa *c*- quinquelocularis *d*.

Semina (ubrotunda, reniformia *e*.

i54 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA CENTESIMA.SEXAGESIMA PRIMA.

D

X *Inus* foliis quinis ab eodem exortu. *Plum. Cat. pi p.* 17.

PIN US foliis quinis, fcabris. *Linn.fpec. p.* 1001.no. 5.

Pinus foliis longiffimis, ex una theca quinis. *Cold. Norib.* 229.

Pinus Virginiana, conis longis, non ut in vulgari echinatis. *Phkn. Almag. p.* 297.

Larix Americana, foliis quinis ab.eodem exortu. *Plum. Town, in/l.p** 586.

Planta arborea.

'Kami [cabri ac fquamofi ex foliorum lapfii,. quoj frequens in omni Pinu.
Folia longiffirn#y]inear,fcabra, quinaiimul ex eodem ortu,feu theca a,
ad fumnum confertiflma, inferne decWua.

Strobili fpithamasi, & quafi fquamofi, constatque ex plurimis fquamis
feu cotyledonibus truncatis & angulatis',qua5 femina continent oblonga₉ irregularia cc.



TABULA CENTESIMA SEXAGESIMA SECUNDA.

L *Avanda* frutefcens, foliis latioribus, crenatis. *Plum^M. pi p.* 6.
Tonrn. in/2, 198.

VER BENA/ diandra, fpicis ovatis, foliis lanceolatis, ferrato-plicto,
caule fruticofb. *Roy. pr.fl. Lugd.* '327. *Linn.fpec,p.* 19. no. 3.

Sberardia nodiflora, Staechadis ferratifolii folio. *Vailljl. ft. p.* 49.

5/i?^Guraflivica, latifdlia, incana. *Herm, Pär. Bat. pr. p.* 379.

[^] *Verbena* fubfruticofa, reclinata , foliis anguftis, ferrato-dentatis, pe-
dunculis longis,fblitariis,floribusconglobatis. *Brouvj.Hifi. Jam.p-1/6>*
Tab. 3. Fig. 1. cuius folia non tam profunde incifa, ac fpicae breviores,
magisque conglobatse, cseterum eadem.

F I G U R A P R I M A.

Planta fruticofa.

Rami nodofi.

Folia lanceolata, ferrato-plicata, vix petiolata.


Florum pedunculi oppofiti, longiffimi, axilfes, fpica ovato-oblonga,
obtuias calyces patentes.

Me

J-VI *Eiiffh* alia fpicafa, Lavandularum fpiraris, minor. *Plum.* *Cat. pi. p. 6.*
 NEPETA foliis ferratis, ovato-acutis, fpicis imbricatis, acuminatis,
 caule exasperato.

FIG U R A S B C U N D A.

Plant® herbacea,
Caulis ere&us, fimplex, quadragonus, cuius anguli aculeis ciliati, feu ex-
 afpefati, quod peculiare in hac planta.
ift/z'ft"bbpopifia, petiolata, ovatd-acuta, lerrata, odorata.
Floruip ipica acuminata, feu pyramidalis, imbricata, peduhculata > axilla-
 ris, binis foliolis fuFFulta.
Fruſlificatio ab audiore inperfeble deiineata, ita ut nil certi de ea com-
 mentari poffim, ex habitu tamen proxime ad *Nepeta* genus pertinere
 videbatur, cſeterum in multis convenit cum Alopecuro-Veronica. *Linn,*
fl.Zeyi.no. 411. cuius defcriptionerh ibi vide; fed differtfoliis petiolatis.



TABULA CENTEŠIMA SEXAGESIMA TERTIA.

MiyijLE4iŁa fpicata, Lavandulam fpirans major. *Plum** *Cat. pi. p. 6.*
 B A L L O T A folijs. qQrdaii. Si fublobatis., flpralibus ovatis, ac ferratis.

F I G U R A P R I M A.

Planta herbacea.
Caulk quadragonus, fimplex.
Folia obpopita, petiolata, cordata-, fublobata, jnseqtialiter dentata; fupe-
 riora, feu floralia ovata, vix petiolata, ac ferrata.
Flores dupHci modo oriuntur, laterales in'denfas fpicas collegli \ caulinii,
 feu fuperiores in craflbs verticillos ad foliorum alas excrefcunt, ma-
 gnis calicibus quinque dentatis fetaceis contend, qui in Tabulae fupe-
 periore parte separati exhibentur, ubi funt a calix integer, b difleftus
 cum germine, c. germe ipfum, d idem diflecl:um, ^w calici infidens,
 f flos^ fimplex,yg calix, in quo fioris rudimentum continetur.
Obſervatio. Licet hsec planta fit maxime obfcura, ex habitu tamen & ca-
 lyce videtur proxime ad *Ballotes* genus pertinere.

MEUJJa altiflima globularia. *Plum.* *Cat. p. 6.*

MEN'THA fruticofa, pedunculis lateValibus nudis, capitatis", globofis,
 foliis ovatis, ferratis.

156 PLA^TARUM AMERICANARUM

F I G U R A S E C U N D A.

Plant a fruticofa.

Kami fim'plices, ere&i, fulcati, fcabri.

Folia obpofna, petiolata, ovata, ierrata.

Florum capitula axillaria, pedunculata, globofa, nuda, quorum calices ab au&ore inprimis delineati exhibentur.

Flos vero quadripartitus separatus eft «, b calix quadrifidatus, c capfala (eminalis, d femina quatuor contenta.

Obseratio. Haec planta proxime adcedit ad Mentham Canariensem, Linn.

fpec. p. 578, a qua tamen differt capitulis foliariis axillaribus nudis, quum altera plures simul & irregulares gerat, nee semper ex alis obpofitos globulos.



TABULA CENTESIMA SEXAGESIMA QUARTA.

JM

Mefophrum humilis, caule hifpido. *Plum. Cat. p. 6.*

MESOPHAERUM foliis cordato-ovatis, ferratis, caule hifpido.

/3 *Mefophrum* hirfiitum, foliis cordatis, ferrato-fubfinatis, floribus verticilliter spicatis. *Brouw. hift. Jam*p. 257.* ubi chara&er.

Marrubium odoratiflimum, Betonicae foliis. *Burnt, Tbef. Zeyl. T. 71.*

Mentafrum maximum, flore caeruleo, Nardi odore. *Sloan, Mil* J&M* vol. 1. Tab. 102. F. z.*

F I G U R A P R I M A.

Planta herbacea.

Caulis erodus, fimplex, hi/pidus.

Folia cordatb-ovata, acuminata, ferrata, petiolata.

Flores ex alis conferti, ab au&ore ruditer delineati, uti in marginalibus figuris appareat, ubi & calix monophyllus, ac tubulofus & dentatus debbat eft, ita ut fru&lificatio hujus plants fit incerta, atque ex *Cl. Brouw.* chara&clere & delineatione ulterius suppleri oporteat, cum quo genere proxime convenire mihi vifa fuit *Plumierii* planta, licet *Marrubium Tbef. Zeyl.* a *Cl. Linn* <zo ad *Monardam* fuerit relatum, de quo vide ejusj?. *Zeyl. p. 9. no. 24.*

I

X^/Igustrum aculeatum, fru&lu tefticulato. *Plum. Cat. p. 17.*

VOLKAMERIA fpinis petiolorum rudimentis. *Linn. fpec. p. 637.*

Clerodendrtim fruticofum, fpinofuin, foliis inferioribus confertis, fuperioribus obpofitis, pedunculiflribus, trifloris, alari bus. *Brouw. Bft. Jam. p. 262. Jab, 3. rig. 2.*

Ligustroides H. Cliff, p. 498.

Douglajta fpinofa, JLigufrifolia. *Amm. Herb.* . \$76.

Paliuro affinis Ligufrifolk_a#fpindfa, flore monopetalo, diiformi. *Sloan**
Cat. Jam. 137. *Hi/I.* 2. p. 137. *Tab.* 166. *Fig.* 2 & 3.

FIGURE S E C U N. B\ si.

Planta fruticofa ac fpinofa.

Kami simplices, vix divisi.

Folia inferius conferta, superius rariora, oblonga, integerrima, venosa,
vix petiolata.

3pti& proveniunt e bafi petiolorum perilstente a fpliis deciduiſ.

Florum pedunculi dichotomai, qui superius triparmi, ternos utcunque pro-
ferunt flores, qui calici magno expanſb infident.

Flores ipfl funt monopetalii, tubulofi, altero latere aperti, uti in Vitice, fta-
minibus longissimis, coroMa diiplo longioribus, quae fex numero deli-
heavit auſlor, quſe juxta CJ. *Brouw*, quatuor modo defcribuntur, ita ut
errorem forte commiferit noſter auſtor, quum vero mutilare ejus figu-
ram noluerim, iconem juxta ejus delineationem dedi.

Fruſlus eft bacca fubrotunda, bifida, binis nucleis referta, pericarpio in-
fidens, uti ex iconē pcfet, quo a *Clerodendro* differt.

NB. In ordineiconum *Phmūrii* fequitur

Lilio-Aphodehs flore umbellato „ albo , cofta purpurea notato , quum
Vero" hie in nulla parte differt, nifi foliatura Crerata a planta *Dilknii* irl
//. *Eltham. Tab.* 160. & a *Commel. pi. rar. Tvb.* 14. exHibitis, super-
fluumfbret, hanc denuo defcriberf. & exhibere, castertum hsec plants
Crinum corollarum apicibus introrfum uriguiculatis a *Linn Jpec.* p. 292.
np. 3. vocatur.

Scl& hilio-Aphodehs bifolius fl. fingulari purpureo & albo *Plum*, quurii
vero haec planta a variis auſtoribus fit delineata, eam'omiſimus, vocatur
autem *Amaryllis* fpatha uniflora, corolla aequali, piilillo declinato a *Linn,*
infpze. p. 292. no. 2. ubi reliqua vide.

i AiiL>i-A CENTESIMA SEXAGESIMA QUINTA.

L *Obelia* frutefcens; Portulaceae^fblia. *PJum. nov. gen. p.* 21. *Catesbi*
Carol. i, p. 79.

L O B E L I A frutefcens, foliis qVali-oblongis, integerrimis. *Linn. FL*
Zeyl.p.ufi. fpec.pl. p. 929.

L *Buglossum* litoreum. *Rwnpb. Herb. Amb. lib.* 6. *cap.* 59. *Tab.* 54.

FIG U R A P R I M A.

158 PLANTARUM AMERICANARUM

Planta fruticosa.

/fowi craffi, teretes, fibrosa.

Folia obverfe-ovata, obtusa, glabra, carnofa, avenia, in petiolos definentia, ad summum conferta, decidua. *

Flores in pedunculis geniculatis excrent, quales cum fructu a *Plum** in ttov. gen I. c. describuntur.

Qbervatio. Haec planta in plurimis optime convenit cum Afiatica, qua a *Rumpb.* describitur, quamque comparat cum *Bola Modagam H* Malab' torn.* 4. Tab. 59. ita ut harum varietates divergo c^lo ac fibro magis sint adscribenda, quam quod divergae sint species.

TX-Jlnaria palufris. Faeniculi folio. *Plum. Cat.* >. 6.

UTRICULARIA caule repente, foliis pinnatifidis, fetaceis*

Utriadaria caule foliofb. *Linn fpec. p.* 18. no. 7.

Utricularia foliis capillaceis, ramofis, capo allurgente nudo, fuperne ramofb. *Brouw. Hi/I. jfam.* p. 119.

Lentibularia Americ. FcBnliculi folio, *VailL A> Parif. ann> i~[i<],p.* 29*

FIGURA . S E C U N D A .

Planta paludofa, caule repente diffusus, qui fibras undique emittit radicales simpliciis.

Folia ad caulem alternatim excrent compofita, feu pinnatifida, ex foliis capillaceis feu fetaccis ramolis alternatisque confrupta.

Florum caput erebus, simplex, rigidus, multiflorus.

Obervatio. Quod haec singularis planta sit vera species *Utricularia* rul-
Jum est dubium» quodque differt & fit species a reliquis, constat ex foliis compofitis, capo rigido multifloro, caule repente fibra aqua; quo modo autem vera nota specifica a reliquis distinguatur, in loco natali ulterius inquirendum, quorū florū ac fructificationis partes ab aliis Slo-
re ruditer & imperfete sint delineatae.

TABULA CENTESIMA QUINQUAGESIMA SEXTA.

TXJlOnkera flore coccineo, baccis ingratis. *Plum. nov. gen. p.* 17,

LORANTUS *Linn fpec.pZ 31.*

Loranthus racemosus, flore coccineo, baccis nigris. *Vaill ACI* Parif.* 1722 p. 274.

F I G U R A P K I M A.

Planta

Planta fruticofa.

Folia in caule obpofita, in ramis alternata, ovata, trinervia, obtufa, *fefilia*, integerrima.

Flores in racemis corymbofis terminalibus & lateralibus, quales ab auctore in *nov.gen. I. c.* cum fru&ificatione defcribuntur.

Obfervatio. Difert hasc planta toto genere a reliquis *Lonkeris*[^] bacca monopyrena, corolla divisa in *fex* partes, ftaminibus *fex*, riequinque uti in *Linnai Loniceris*, unde & *CLVailL* diftin&um ex hac planta confluit genus, de quo vide *I. c.*



±Sj4Jpighia Mali Punici facie. *Plum. nov. gen. p. 46.*

MALPIGHEA foliis ovatis, integerrimis, glabris, pedunculis unifloris. *Linn. H. Cliff, btyfpec. p. 425.*

Malpighia fruticofa, erecta, ramulis ^{gracilis} „ patentibus, floribus foliariis. *Brouw. Hifi. Jam. p. 230. no, 3.*

Cera/us Americanus fru&u tetrabyreno. *Comm. H. Amjl. 1. T. 75.*

Cera/la Ame'ricana. *Merian. Sunn. Fig: 7.*

Cera/us Americ. Myrti conjugatis foliis, fru&lu acerbo, tetrabyreno. *Plukn. Aim. 94. T. 157. F. 7.*

Arbor baccifera, folio fubrotundo, fru&lu Cerafino, fulcato, rubro, po-jypyreno, officulis canaliculatis. *Sloan. Cat. jam. 172. Hift.2. p. ic6. F, 207. F, 2. Ray. dendr.p. 74..*

F I G U R A S E C U N D A.

Planta fruticofa.

Caulis ramofiffimus, brachiatus, in tenellos simplices obpofitos ramulos diftin&us.

Folia obpofita, ovata, utrimque acuta, fubfeffilia, venofa, integrerrima.

Flores axillares, pedunculati, fblitarii, quorum petala eleganter crenata.

Fru&lus funt baccae molles, angulofae, fubrotundae, fulcatae, femina canaliculata & quafi maflicata gerentes, uti in figuris separatis patet.

Obfervatio Licet haec arbucula a variis auctoribus fit denominata & exhibita, a nullis tamen ipfius flores ac fru&us funt delineati, nisi a *Merian*, in cuius icona folia ab Erucis lacerata imperf&a funt, quasqu a noflris recedunt, hujus itaque ramulum tenellum lateralem cum floribus ac fru&libus, ipfbrumque separatis partibus incidendum curavimus, qui adcurate reprae&entat plantam in hortis noflris fatis obviam.

Caeterum hoc plantarum genus in memoriam magni Marcelli *Malpighii* denominatum eft, de quo vide* *Auforem* noftrum in *nov.pl. gen, I c.*

160 PLANTARUM AMERICAN ARUM

TABULA CENTESIMA SEXAGESIMA SEPTIMA.

Malpighia latifolia & anguifolia, folio fubtus fpinofo; *Plum. t*W-*
gen. p. 46.

M A L P I G H I A foliis oblongo-ovatis, fetis decumbentibus rigidis, pedunculis umbellatis, seu unifloris aggregatis. *Linn. spec. p. 4261. no. 2.*

Malpighia viminea, foliis oblongis, hifpidis, racemis alaribus. *Brouvu hift. Jam, p. 229.*

Mefpiks Americ. folio lato, fubtus fpinofb, fru&u rubro. *Tourh. inft' p. 642.*

Arbor baccifera, folio oblongo, fubtilissimis fpinis fubtus ob.fito, fru&u Cerafino, fulcato, polypyreho, officulis canaliculatis. *Sloan. Cat.JAM-112. Hift. 2. p. 196. Tab. 207. i%. 3. Kay. dendt. p. 24.*

F I G U R A P R I M A.

Flania fruticosa.

Folia obpofita, ovato-oblonga, fubtus hifpida, integrima[^] iubfeſliiia.
FJorujn pedunculi ex alis multiflori & quafi umbellati.

Fruſlus eft bacca fucofa, fulcata, tetrapyrerata, intus continens *feminif* quatuor coalita *a* & *b* ab utraque parte confpicua: *c* eft *Jemen., unicum* integrum, *d* eft *nucleus* feminis.

Obfervatki Hodie fatis frequens eft in noſtris hortis, habetq; folia fetis rigidly recurvi. t,a<Jfpcrefa, quae in icone iatis diftin&e riotantur, & quibus manus tangentium pungunt, unde & wrens a. *Linnao* vocatur, ceterum racemi. in hac fpecie axillares funt & aggregati.

Malpigh'm Aquifolii amplioribus foliis. *Plum, Cat.pl. Amcr. in append,*

M A L P I G H I A foliis lanceolatis, dentato-fpinofis, alternis.

Ilex foliis Agrifolii Americana &c. *Phkn. Phyt. Tab. 196. Fig: 3. itidfnl* iola folia fine flore vel fru&u.

• F I G U R A S E C U N D A.

Phtmierius hujus fruticis foliatram fblummodo delineavit, & licet ad *Malpighiam* retulerit, paradoxum tamen ob folia alternata, quae in r^{eo} liquis pleruttique funt obpofita, videtur, unde vix hujus generis eft; ac videtur potius ad *Mancantiliam* ejus Aquifolii foliis pertinefe, quae infra exhibetuf, quod ex flore & fru&ibus in loco natali determinari oportet

TABULA CENTESIMA SEXAGESIMA OCTAVA.

M'*Alpighia* anguftis & acuminatis Aquifolii foliis. *Plum. nov. gen.*
p. 46.

MALPIGHIA foliis Janceolatis, dentato-fpinofis, fubtus hifpidis.
Linn. Spec. p. 426. no. 5.

IGURA PRIMA.

"*Flanta* fruticofa.

Kami fimplicet), vix divifi.

Folia obpofita, lanceoJata, dentato-fpinofa, fuperne glabra, fubtus hiffida.
Frudus ex alis in longis pedunculis plerumque folkarii, rarius gemini, penduli, fūntque *bacc*& fubtotundte, obtuæ, fulcatae^, ēmina varia coiilita *b* in centro continentes, *c* eft *nucleus* feparatus.

Obfervatio. Diftindifllma eft haec species a reliquis foliis fpinofis, adfinitas tamen eft quam maxime *r. renti* ex ētis pungentibus in averfa foliorum pagina, atque ob fruftus ex alis pendulos.



Sx. AJpighia humiiis, Uicis cocciglandiferje foliis. *Plum. nov. gen. p. 46.*

MALPIGHIA foliis fubovatis, dentato-fpinofis. *Linn. spec. p. 426.*

Malpighia humiiis & minus divifa, foliis ovatis, nitidis, baccis durioribus.
Broiav. Hi/I, Jam. p. 230. no. 4.

FIGURE**SECUNBA.**

Planta fubfruticofa.

Kami ikgeloff

Folia fubovata, dentato-fpinofa, obpofita, feffilia.

Flores ex alis fblitarii, longis pedunculis infidentes, quorum calyx, eft trifidus *a*, ac petala ek^anter fimbriata.

Frudus in hac specie puillus & contra&us eft *b* fulcatus tamen uti in re? liquis, fed durior ac rigidior.

N.B. In ordine Iconum *Plumierii* fequitur jam *Magnolia* ampliflomo flore albo, fructu cseruleo, quumi vero hasc arbor jam fit notiflima ex *Diu*
lenii Horto Eltham, ubi eleganter defcripta atque in *Catcsb. Hifi. Carol.** magnificenffime fit delineata, oleum ac operam perderem, fi hanc refufcitarem, prsterquam quod hodie ubi vis fit obvia in hortis Botanicorum.

i62 PLANTARUM AMERICAN ARUM

TABULA CENTESIMA SEXAGESIMA NONA.

M Alva frutefcens, hirfuta; fl. luteis in capitulum congeftis. *Plum.*
Cat. pip. 2. Town, inji.p. 95.

SI D A capitulis pedunculatis, triphyllis, leptemfloris. *Linn. AB. Upfal.*
i743./>, 137. Tab, 2. fpec.pl. p. 685. no. 10.

*Sida hirtajaflurgens** foliis angulato-cordatis, obtufe lobatis & clematis* fL
 congregatis , capitulis foliatis , pedunculis validis alaribus. -*Brouw**
bi/i. Jam. 2Si.n0,10,

Malva cau!e ere&o , hifpido, foliis ereftis crenatis , difFormibus. -nTM.
pr.fl. Lugd.p.itf.

Maha afpera major aquatica, fl. miqore luteo, fêmeine áculeate Sloan.
Cat. Jam. p. 96. bifi. i.p. 217. Ray.fuppl. 320.

FIG U R A PR IMA.

Plania paludofa, fimplicera deorfum radicera emittens perpendicularem
 ac fibrillofam.

Caulis inferne hifpidus.

Folia difFormia, lobata, ac crenata.

Peduncuks involucrum triphyllum multiflorum iliftinet.

Obfervatio. Hsec planta hodie fatis obvia eft in hortis noftris, quique
 ejus defiderat ulteriore defcriptionem & hiftoriam, videat *Ad. Upf.*
I c. ubi eleganter quoque delineata eft. Caeterum hzec quam maxime
 adfinis eft Sidae capitatae fupra *Tab. 19.* ~~etw h i b i p~~ ^..

M Aha folio hederaceoj flore coccineo. *Plum. Cat. pi p. 2. Tora,*
inft. 96.

HIBISCUS foliis cordatis, crenatis; angulis lateralibus extirriisparvis*
 caule arboreo. *Linn. H. Cliff. 34<).Jpec. 694. no. 8. Roy.pr. p. 358.*

Hibifcus arboreus,foliis angulato-cordatis, flore amplio croceo, ligno vio-
 laceo. *Brouw. Hift. Jam. 284.*

jS *Mahavifcus* arborefcens, flore miniato claufb. *Dill, H. Ebb. 210. T.*
170. Fig. 208,

Alcea Indica arborea, folio molli, flore amplio,eleganter coccineo, *Plukn>*
Aim. 14. T. 257. Fig. 1.

FIGURE \$ E C U N D ^[.

Obfervatio. Quum haec planta in *H. Eltb.* adcurate fit defcripta frper-
 fluum foret earn denuo defcribere, atque nofta ab ea non difFeit, nifi
 quod auor florem pinxent magis infundibiliformem & expanfum,
 frudumque capfulatum a. Cfifterum foliatura, forma, color corolla!,
 piftiliumlongum,acitaminaquadrant, unde varietas ex diverfo loco
 forte petenda.

Malva

MAha Hederae terreftris Folio & Facie, capitulis bifurcatis. *Plum.*
Cat. pi. p. 2.

SI DA foliis cordatis, obtufis, caule repente, pedunculis unifloris, cap-
fulis ariftatis.

F I G U R A T E R T I A.

Planta pufilla, herbacea, prorepens.

Folia fubcordata, crenata, rugoſa, fubtus villoſa, petiolis longiflimis ra-
dicialibus.

Pedunculus uniRorus, petiolo longior, radicalis.

Xlapula acuminate? ^a bifulce, ariftatae, Ut in marginalibus figuris.

Obfervatio. Keec planta primo intuitu adeo fimilis eft Malvae Carolinae,
ut facile pro ejus varietate foliis indivifis haberetur, fed fruſlus totoca3-
lo recedit, & declarat veram fed Fmgularem *Sida* efle ſpecienij unde
& ad hoc genus earn reduxi.



TABULA CENTESIMA SEPTUAGESIMA.

Mamei magno fru&u, Perficae fapore. *Plum. nov. gen. p. 44..*

MA MM EA flaminibus flore brevioribus. *Linn. fpec. p. 512. no. 1.*

~~Arbor~~ foliis ovalibus, nitidis, fuſlu fubrotundo, Icabro. *Brouvj. Hifi.*
Jam. p. 249. no. 2.

Mdmeis. J. Eauh. Hi/I. 1: p. 172. Dalecb. Hifl. 1836.

Arbor Indica, Mamei diſla. C. Eauh. pin. 417. Ray. Hifl, 166\$.

*Mains Per/tea maxima, foliis rotundis, fpplendentibus, glabris, fru&u maxi-
mo fcabro, rugofo. Sloan. Cat. Jam. 179. Hift. 2. p. 123[^] Tab. 217.
% 3-*

Planta arborea.

Caulis fcaber.

Folia oblonga, obtuſa[^] obpofita, integerrima, craſla, venofii, fuperne
glab'r'a.

Flores quadrifidi, axillares, folitarii, fubſefilesj *Calix* diphylloſideciduus,
Stamina numeroſa.

Pifillum fubulatiim, uti in feparatis patet partibus.

Fruſlus ingens, muricatus, fubrotundus, apice donatus, carnofus, ac
fucculentus, feminibus faetus quatuor calloſis, fulcatis, oblongis, in
totidem loculis fidjs, uti in frudtu inferiore transverfim feſto patet. At-
que quum illi forma fua *Mamas* quodammodo referunt, hinc *Mammea*
nomen fervavit *Linnaus*, quod caeterum Barba[^]um ex fua Do6lrina rej-
ciendum fuiflet. Vide porro *Ludwich. Def. gen. p. 140. no. 456.*

164 PLAMTARUM AMERICANARUM

TABULA CENTESIMA SEPTUAGESIMA PRIMA.

¶
VSjLancanilla Aquifolii foliis. *Plum.nov. g-en.p.* 50.

HIPPOMANE foliis fubovatis, dentato-fpinofis. *Linn.spec. p.* H9¹
no. 3.

Ilex foliis Aquifolii Americ. *Plukn. Pbyt.* T. 196. Fig. 3?

F I G U R A P R I M A.

Planta fruticofa, *Kami* fcabri.

Folia fubovata, dentato-fpinofa, alterna, venofa.

Racemus ereclus, julis fpicatus alternis corapofitis, maiculinis.

Fructus a floribus hifce separati nafcuntur in inferiore i-amorum parte, funtqec globofi, fuicati, & carnofi, nucleus continentis iignofum ac rugofum, fubrotundum,

Obfervatio. Haec a reliquis fpeciebi's differt non modo foliis fpinofis, fed & fpicis compofitis ad latera minores ipicas emittentibus, quod huic peculiare.

IV

i-VX Ancanilh Lauri foliis oblongis. *Plum, nov* gen. p.* 50.

HIPPOMANEfoliisovato-oblongis, ferratis, bafi glandulofis. *Linn. Jpec. p. 1191. no. 2.*

Hippomane arboreum, la&efcens, ramulis ternatis, petiolis gkndula notatis, floribus fpicatis mixtis. *Bronw. Hi/I. yam. p.* 351, uC charafter ejus dillicide explicatur.

Tithymahs arbor Americ. Mali Medicas foliis amplioribus, tenuiflime erenatis, fucco maxime venoib. *Plukn, Aim.* 369: T. 229. Fig.%*''R?y' fupph 428.

F I G U R A S E C U N D A.

Planta arborea, *Caulis* fcaber. *Kami* fimplices.

Folia ovato-oblonga, ferrata, petiolata, alternata, ad bafin autetn i° iorum duB glandulose meiliferas locantur.

Amentum terminalc, fubulatum, longiflimum, flores maſculinos gerens, ad cujus bafin flores feminini, e quibus fru&us oriuntur.

Obfervatio. Hujus generis & tertia reperitur fpecies, cujus fru&us Py* rum referunt, que eleganter a *Catesb. in Hiji. Carol.* 1. T. 95. exhtbeatur, vocaturque *Hippomane* foliis ovatis ferratis a *Linn, in/pec. I. c.* cum qua in multis noſtra conveñit, fed differt inprimis glandulis iftis duabus ad bafin foliorum protuberantibus, turn & fru6lu, caeterum ^pi^{C3e} in hac aeque ac in ilia fimplices funt; Cl. vero *Brouw.* hanc glandulofam perperam mifcet cum ilia Mancanilla in *Hi ft. Jam.* ubi & HuRA^ ad *Hippomanes* genus refert, qua? toto caelo ac genere differunt.

TABULA CENTESIMA SEPTUAGESIMA SECUNDA.

M'*Anihot Ulmi* folio ampliore & anguftiore. *Plum. Cat. pi. p. 20.*
Tourn. inf. 658.

A C A L Y P H A foliis oblongis, ferratis, cauliis obpofitis, rameis altsrnis, fpicis mafculinis lateralibus.

FIGURE *P R I M A.*

Planta fruticofa.

Kani brachiati, in fummo fpicam gerentes floriferam ex quavis folii ala jna/njlinam.

'*Spica* feminea verticalis, fblitariae, pedunculatae, bra&eis palmatis.

Folia ovata, in ^anguftifoliâ lanceolata, acuta, lerrata, petiolata, in ra>mis floriferis alternata, oblonga, caulina obpofita.

Obfervatio. SinguJaris eft planta, primo quod gerat caulem dichotomum, e cujus dichotomia fpicfe inprimis femineae fblitariae, fecundo quod folia in ramis alternata, ad dichotomiam vero obpofita, tertio quod pro mat fpicas mafcuinas ad lateraex alis foliorum, quarto differt ab Acalypha auftrali bracleis florum feniineorum palmatis, nee indivifis.

M'*dnhot minima,Camsdrifolia. Plum. Cat.ph 20. Tourn. inf. p. 658.*

C R O T O N foliis cordatis, ferratis, glabris*, fpicis terminalibus, caule herbaceo.

Croton frutlulofum, erefium & fubvillofum, foliis cordato-acuminatis, fpicis terminalibus. *Brouw. hi/I. Jam. p. 347. no. 4?*

FIGURE *SEC* *U.N* *D* *A.*

Planta herbacea, feu fruticulofa.

Caules alterni, quafi dichoromi, erefti.

Folia cordato-ovata, alternata, ferrata, petiolata, acuminata.

Flares mafculini fpicati, verticalis, fubquibus flores feminei fparsi ftylis tribus eminentibus confpiciuntur.

FruClus fubrotundus eft ,tricoccus aa^czMce pentaphyllo b contentus, corona tus piftillo trifido p^rfiftente c> involucris & glandulis neftarifeis involutus d, quas omnes partes uti microfcopio au&as magnitudine adpinxit autlor, fie etiam eas exhibere vifum mihi fuit.

. KB. In ordine iconum *Plunrierti* fequitur

Maranta arundinacea, Cannacori foliis *Plum, nov. gen. p. 16.* quae a vulgari non differt, nifi quod cofta foliorum pilofa {it, quumque ilia a *Martin*, in *Centuria Tab. 39.* optime fit exhibita, & defcripta, Botanicos ^d eum ablegamus, quantum vero haec differat a *Canna Indica* radice alexipharmacâ *Sloanei*^ patet ex Icone, quam fupra dedimus *Tab. 108.* ad *Tbaliam*, ita ut hae pianra? fint diverfiflimaD, nee eas conjungi oporteat. Vide *Martin. I. c*

Cffiterum *Maranta* h^c ubivis hodie in Botanicorum hortis facile colitur.

i66 PLANTARUM AMERIGANARUM

TABULA CENTESIMA SEPTUAGESIMA TERTIA.



ISjLArcgravia fcandens, fru&u radiatim pofito. *Plum. nov. gen, p. 7**

M ARCGR. AVIA. *Linn. fpec. pi. p. 503.*

Marcgravia fcandens, foliis caulinis fubrotundis, ad margines glandulatis, ramorum integris, ovatis, alternis, diftiche fitis, floribus umbellatis terminalibus. *Brouiv. Hjil. Jam. p. 244 Tab. 26.*

FIGURE

PRIMA.

Planta fruticofa, fcandens.

Folia ovato-lanceolata, petiolata, alternata, integerrima, venofa.

Caukm terminat *umbella* fimplex, pediculis numerofis sequalibus, in *of* bem fitis, & horizontalirer patentibus, horum flnguli terminantur no- re polypetalo undecim circiter petalopm, piano, rofaceo, patentilii- mOj cselum refpiciente, germine & pifillo vix notabili inftru&to.

fflores hi adfcendentes nudi, corollk, calyceque caducis, flamina exhi* bent, quas petala mentiuntur, fed revera non sunt in Figura. prima, 10 altera Figura fructus reprfentantur. ^In difco feu centro umbella? eri- guntur glandula? ne6lariferae fefTiles, utcunque quinte, forma corolla rifl" gentis monopetalae, bilabiataB, labio superiore galeato, inferiore mini" mo, atque hse flores mafulinos referunt absque fru&u decidentes, nⁿ* • gularis fane ftrutturae.

Ffifilm in feminineis videtur quadrifidum, atque abit in fu<5lum fere fphaericum a mollem & carnofunij in quo nidulantur femina plurima h exigua, rotunda c.

Mattiola folio alpero, fubrotundo, fru&u nigricante. *Plum**noV** *gen. p. 16.*

MATTH1OLA. *Linn.fpec,pi. 1 T92.*

FIGURA S E C U N D A,

Planta arborea, *Ramis* divifis.

Folia fubrotunda, petiolata, obtufa, integerrima, ad apices ramorufl¹ conferta & minora.

Pedunculi longi, fubdivifi, foliolis pinnatis intercepti.

Flores mafulini defunt, *feminei* funt rnonopetal, infundibiliformes, tu^ bam. referentes a, calice-orbiculato & elevato b contend, qui abit in fru6lum mollem c fubrotundum, unicapfularem d, officulo fcetum, i° quo nucleus e continetur.

Obervatio. Hujus plants fru^tificatio tam fingularis eft, ur cum null* comparari poffit, quum vero germen infra fructum gerat corolla infun- • dibiliformis, limbo integro, forte proxime ad Mirabilem accederet, fed ftamina latent, nec ullibi apud alium auclorem obcurrit videturque quoque ad Parafiticas pertinere, unde in loco natali accuratiuseft exami* nimda, ceterum rariffima, & ha&enus maxime obfcura.

TABULA CENTESIMA SEPTUAGESIMA QUARTA.

NyLEntzelia foliis & fru&ibus afperis. *Plum. nov. gen. p. 41.*

MENTZELIA. *Linn. K Cliff.^i./pecp. 516.*

Mentzelia fetis uncinatis munita, foliis lobatis, fru&ibus fingularibus ad divaricationem ramorum. *Brouw. Hi/I. Jam. p. 249.*

Onagra Americ. folio Betonicse, fru&u hifpido. *Tourn. infst. 302.*

F I G U R A P R I M A .

PJanta fufFruticofa.

Kami alterni.

Folia oblonga, ferrata, acuminata, fubfefilia, fcabra.

Flores in^la quavis folitarii, feililes, pentapetali, calice pentaphyllo contenti a & b.

Frudus eft tubus oblongus, truncatus c₉ membranaceus, hifpidus, femina continens ^plurima, exigua, rotunda, form^ fua Caryophyllos aromaticos quodamrnqdo referens. Atque haec planta in honorern *Cbrijiani Mentzelii* ab au&ore denominata eft, qui edidit indicem nominum plantarum Polyglottum, ex Latius, Graecis, & Germanicis Jnguis inprimis compofitum, cui adjecit pugillum plantarum rariorum cum aliquot ipfarum iconibus, &c. de quo vide *Audorem* noftrum in nov. pi: gen. p. 41.

O *Nagra* frutefcens, & hirfuta, Nerii folio, flore magno luteo. *Plum. Cat. p. 7. Tourn. inji. 302.*

OENOTHERA hirfuta, foliis fupra glabris.

Oenotbera afurgens, hirfuta, fioribus fblitariis. *Brouw. Hi/i. Jam. p. 208.*

F I G U R A S E C U N D A .

Planta fruticofa.

Cau/is & Kami hifpidi, alternati.

/^wovato-oblonga, fefBlia, venis parallelis diftincta, fribus fcabra & hirfuta.

Flores in quavis ala fblitarii, feffiles, ingentes, pentapetali, calice magno hifrido quadrifphyollo contenti!.

TABULA CENTESIMA SEPTUAGESIMA QUINTA.

O *Nagra* foliis Perficariae anguftioribus , flore magno luteo. *Plum. Cat**
pi. p. 7. Tourn. infi. p. 302.

OENOTHER. A foliis angufto-lanceolatis, glabris, floribus axillaribys?
remotis.

Oenotbera afTurgens, glabra, foliis lanceolatis, alternis, integerrimis, flo-
ribus fblitariis, alaribus. *Brouzv. Hiji. Jam. p. 208.*

F I G U R A P R I M A .

Planta iubfruticofa, ac ramofa.

Caulis & Kami rotundi, ac glabri.

/b/ lanceolata, minora, feflilia, venis parallelis diftin6la, ac finuofa.

Flcres axillares, feffiles, fblitarii, tubulofi, glabri.

Capfula tubulofa, quadrangularis, glabra.

O *Nagra* foliis Perficae amplioribus, parvo flore luteo. *Thm. Cat. p>*
7. Tourn. infi. 302.

JUSSIVE A foliis lanceolatis, floribus axillaribus, feflilibus.

Jujji<za ere6la, glabra, floribus tetrapetalis, oclandris, feffilibus. *Linn.*
Jpec. p. 388. no. 4.

Ludwicbia capfuhs oblongi*- *JLmn. H. Cliff, p. 401.*

Lyfimachia Parietariae foliis Virginiana. *Plukn. Aim. 235. Tab. 203.*
Fig. 4.

Jasminum Catalonicum, flore luteo. *SeK Thef. vol. 1. Tab. 26. Fig. 3-*

F I G U R A S E C U N D A.

Planta Fubfruticofa.

Caulis lignofus, quadragonus, glaber.

Rami rotundi, fimplices.

Folia lanceolata, finuofa, venofa, petiolata.

Flores in fllis feffiles, fblitarii.

Obfervatio. Haec planta primo intuitu refert Carambu *H. Malah torn. 2.*


Tab. 49. nee differt, nifi quod folia gerat magis petiolata ac glabra j
caeterum flores fru&usque conveniunt, atque hoc genus hodie in hono-
rem ClarifT B. *JuJJiei* Botanici Parifienfis dictum eft JUSSIVE A, q'O^d
cum *Ludwicbia* genere tantam habet adfinitatem, ut a primariis'Botan-
nicis haec commilceantur, illius.vero Ipecies a *Linnxo* commemorantur
in/pec, pi. p. 388. ubi vide rehqua.

Finis F'aficuli Septimi.



Fig. 2
VERBESINA
(Linn.) Boscardus.

HIERACIUM
var. simplici






OCHNA *integerrima*
liseolata - swatii.



SOLIDAGO villosa var. serratis



R. A. J. A. filo
Tunis.


Fig. 1
] { A. J. A. lolus
imolicibusj corfatii

LONICERA folia
lanceolato - ovata.



IXORA folia lanceolato - ovata.








HIBISCUS Mii tridolius

: J

HIBISCUS salicifolius





PINUS
filipes quadrifida


A





BALLOTA
glabra cordata.





1-kliM J. Mil

T u . n . v r



MALPIGHIA solanifolia ovata

K U R X V T | S.




Fig. 2.

MAI, PICHLA
foliis oblongo-ovatis.

Fig. 1.

MAI, PICHLA
foliis oblongo-ovatis.






ANNU. I-IV & II V liliifl.
fibrovatis, d. sinensis,

MALPIGHIA liliifl.
lanceolata, dentato-spatulata.

TAB. CLXIX.







HIPPOMANE foliis subovatis.

Fig. 2.

HIPPOMANE foliis ava.to-oblongo-ovalis.









Fig. 2.
OENOTHERA foliis
angusto-lanceolatis.

J trss i.r. \ tt.iii^ !.....,

PLANTARUM
AMERICANARUM
FASCICULUS OCTAVUS,

Contineiis Plantas, quas olim

CAROLUS PLUMIERIUS,

Botanicorum Printeps

Detexit > Efuitque <,

Atque in INSULIS ANTILLIS ipse depirixit.

Hæc primum in lucerft edidit,

*Concinnis defcriptionib[us] * ^ Qbervationibus^*


i^neisque Tabulis illuftravit

JOANNES BUR.MANNUS, M> D.

Mhenai illujbris, & in Horto Medico Amfldadamenfi

P R O F E S S O R B O T A N I C E S ,

*^Academia Cafarea Natura Curiofotum Sodus, Regiaque Societatis
S-cientiarum Upfalienjis Collga.*



Sumtibus Au6toris,
froflant Anifleczdami in Horto Medico,*

Atque

Apud P- £ T R U M S C Ht O V T E >t₅
6? L U G D. B A T A F.

Apud GfcRARD* POTVLIET, & THEODOR. HAA It.
M. DCC. LVIII L

NOBILISSIMO & CELEBERRIMO VIRO,

ALBERTO HALLERO,

PRiESIDI SOCIETATiS REG. SCIENT. GOTTING.

SODALI ACAD. REG. SCIENT. PARIS. REG. CHIR. GALL.

ACAD. IMPER. BEROLIN. SUECIC. BONONIENS,

SOCIET. SCIENT. BRITTAN. UPSAL. HELVET.

IN SENA.TU SUPREMO BERNENSI DUCENTUMVIRO.

BOTANICORUM CORYPH^O EXIMIO,

AMICORUM INTEGERRIMO,

F A S C I C U L U M H U N C

PLANTARUM AMERICANARUM

O • C T A V U • M L

VENERABUNDUS OFFERT

JOANNES BURMANNUS,

PLANTARUM AMERICANARUM FASCICULUS OCTAVUS.



TABULA CENTESIMA SEPTUAGESIMA SEXTA.

H

jLjLElkhonie graminea, repens, biflora. *Plum. Cat. pi. Amer. p. 9.*

CONVALLARIA? caule articulato, unifolio, bifloro.

?*Joiybis?* Amboinica major. *Rumph. Herbar. Amb. torn. 6. lib. XL cap. i4»/». 116. Tab. 54. Fig. i.fpec. 2.*

FIGURE P R I M A.

Plant a herbacea, repena, 1 adices /pmgcnc *Cinapllces*, fiJifbrmes 5 **fInuo-**
as, inftar vermium prorcpentes.

Caulis repens, articulatus, fetis linearibus cin&us, quae ad lcaporum geni-
culos interdum etiam excrefcunr.

Scap^erefti, nudi, geniculati, duobus floribus pedunculatis, & folio
fimplici, linear, terrninali conftantes.

Qbjervatio. Florum corolla ab au&ore depifla eft quinquefida, quae jux-
ta *Helleborinis*- & *Convallaria* genus fexfida debebat eflē, ita ut una fex-
ta pars deficiat, quum vero hujus plantae petala regularia, ipfiusque
forma proprius ad *Convallarias* accedat, tarn diu ad has retuli, donee
ex viva planta certum ipfi genus defignare vel cenftituere quifpiam Bo-
taniconum poffit. Caeterum plantae ad genus *Helleborinis* a *Plumierio*
relatae quam intricatifTirr^e funt, & ad varia omnino pertinent genera,
uti ex fubfrequentibus dilucide patebit.

T

XTLElleborine Rufci majoris folio. *Plum. Cat. pi. Amer. p. 9.*

R U S C U S? foliis fblitariis, petiolatis, lanceolato-ovatis, bafi racemiferis.

FIGURA SECUNDA.

7 PLANTARUM AMERICANARUM

Planta herbacea, radices demittens simplices, filiformes.

Folium lanceolatoovatum, integerrimum, petiolatum, simplex, 'avenium, craflum.

\npedunculo radiato, simplici, ad infertionem petioli, prodeunt flores in racemum congefti, ex foliolō fquamofb feu vaginali, (uti videtur) prodeuentes.

Obfervatio. Fru&ificatio hujus plantulae, uti & subfrequentis, ab au&ore tñrn obfoire eft delineata, ut nil certi de ea confitui poftit, quum vero, uti in variis *Rufci* fpeciebus, fuum habeat ortum ad foliorum bafin, tamdiu ad hoc genus rētuli, donee quid certi ex viva dein plānta con' cludi poftit; peculiaris autem florendi modus e bafi foliorum declarat, proximè accedere ad di6tum genus.

TT

XILLEborine Ophiogloflb fimilis. *Plum. Cat.pl Amer.p.* 9.

RUSCUS? foliis ovatis, petiolatis, bafi fpiciferis.

FIG U R A T E RT I A.

Planta, uti praecedens, herbacea, radices agens ifimplices, fibrillofas.

Folia simplicia, ovata, oblonga, petiolata, crafla, avenia.

Florum pedunculus ex bafi folii simplex erigitur, flores gerens in fpicarfl feu racemum eredum colledos.

Obfervatio. tjujus plantulae/rublificatio aequi i^bfura fc. incerta eft, ac prascedentis licet ad marginēm feniina cum Fructu dehifcente oblong^ lint addita, undc in natāli folo ulterius ex viva eft inveftiganda, ac determinanda/

TABULzV CENTESIMA SEPTUAGESIMA SEPTIMA.

H

jLXElleborine, florū foliis maculofis & longifiimis. *Plum** *Cat.p.* 9.

E P I D E N D R U M foliis radicalibus, lanceolatis, nervofis; petalis maculatis, caudatis; duobus longifiimis, ereftis.

Planta parafytica, radices agens vermiformes, prorepentes, quibus & *PTM* arbōres prorepit.

Folia radicalia, crafla, nervofa, bina connata. erefta, lanceolata

Scapus simplex erigitur nudus, cintus aliquot fquamis ereftis acutis, quae fupenüs definunt, ubi flores proveniunt.

Flores hi mirabilis font form^, eleganter maculati, quorum petala tria caudata, bina nempe horifontaha brevifima, inferiū dep^tos Iongims, bina rehqua, feu fupenora longiflīma⁵ erefa, fubulat^a callus in ipforum centro locatur; ftamina cum gertnine tenens ta fit diftinffima a reliquis congeneribus *L!K* ^{** w h 8 C} *P^{ia}*, caudatisjongiffimisqueere&is; nee ab ulli *I* ^{ta} *maculatis*, tu ^m & caudatisjongiffimisqueere&is; nee ab *Q^{io}* oblerv^a auctore & piures hujus generis subfrequentes. auctore, uti

Fratris eft filiqua oblonga, carnofa, quinque fulcate I ne gerens, qualis delineata in inferiore Tabu! ^{*Peta Ja emarcida iuper-}

TA

TABULA CENTESIMA SEPTUAGESIMA OCTAVA.

T

X^X Elleborine floribus atropurpureis. *Pkm. Cat. p. 9.*

E P I D E N D R U M foliis 'ubradicalibus, lanceolatis, aeniis; petalis oblongis, florum labio bifido, obtufb.

FIG: U R si F R I M A.

Radix vix fibrosa, fed .potius tuberosa.

Folia teria^ajita, Jaaceolato-obloTiga, craja, avenia.

Cuhnus Breyis, jGrnpfix, nudus, rariores gerens ajternatos

FJores., quorum p^tala sequalia, crafla, oblonga^ *labium* vero dependens Jatiffiqium, obtufum, bifidum.

Fridus eft filiqua oblonga, crafla, carnofa, petalis emarcidis coronata.

H *Elleborine* maculosa, foliis Aloës tarinatis. *Plum. Cat. pi. Amer.*
P- 9-

E P I D E N D R U M foliis radicalibus lanceolatis, carinatis; petalis reni* fofmibus, undatisj: maculatis, labio glabro.

F I G U R i S EC U N D A:

i'lania paraiyтика, radices fpargens longiffimas, filiformes.

Flui radicals, plura simul colle6la, vaginantia, crafla, avenia, carina-
ta, land o atca.

Scapus erebtus, longiiTimus, nudus, rariores ac vagos gerens

Flores alternatos > quorum petala eleganter funt undata, ac maculata, reniformiaj labium vero glabrum ac finuofum eft.

Frudus eft filiqua oblonga, cnalla, fulcata, ac coronata,

Semina continens plurima, minutiflima, uti in difle&a a confpicituy-



TABULA CENTESIMA SEPTUAGESIMA NONA.

H

JLJEHeborine floribus albis, cucullatis. *Plum. Cat. pip. 9.*

E P I D E N D R U M foliis ubradicalibus, fubulatis, fcapis unifloris; petalis linearibus, longiflmis, finuofis; labio indivisib, ciliato.

Satyrium parafiticum, bulbofum, foliis fere gramineis, labio inferiore fimbriato? *Brouw. Hift. Jam. p. 325. no. 8.*

FIGURA PRIMA.

Planta bulbofa, vix fibrofa.

Scapus fimplex, ere&us, fquamis te&us, uniflorus.

Folia fubradicalia, fubulata, avenia, nervo medio diftin&a.

Florit petala longiflma, linearia, finuofa, retroflexa.

Labium fimplex, ovato-acuminatum, indivifum, ad oras ciliatum.

Fruttuseft filicjua, oblonga, fukata, ac finuofa, plurima continens

Semina minutifmma, uti in difle&a a patet.

Obfervatio. Haec planta maxime adfinis eft Epidendro Curaflavico,^{f o"}
lio craflb fulcato *Hermann. Par ad. Bat.p.* 187. cujus petala itidem lin^{ea"}
ria, ac fabium indivifum, ere&um, fed ciiiis deftitutum, quumque folio*
rum forma optime etiam conveniat, ipfius varietas forte cenferi pos-
^et, de hoc porro vide *Linn.fpet.* 953. no. 7. quod ipfi dicitur Epide^{1}}*
drum foliis fubulatis in *H. Cliff*, p. 430. & Epidendrum foliis oblongis
acutis, nodo radicatis. *Afk. Upjal.ann.* 1740. p. 36. Vide & *Pbyt.*
Tab. 117. *Fig. 6.* & *Sloan. Catal.* p. 120.



JLJL *Elkborine gnm\nea.y* foliis rigidis, carinatis. *Plum, Cat. pi. p. 9.*

EPIDENDRUM foliis fubradicalibus, oblongis, aveniisj florutn bio trifido, ciliato, intermedio linearis,

^ /wCaryopbylJoides, foliis Jongis, in apice incifis, fioris labello
albo, trifido, petalis luteis longis, anguftiflimis. *Catesb.. Carol.* ^?
Tab. 68. cujus labium glabrum eft, caeterum convenient.

FIGURA

SECU.N-DA.

Planta parafytica:

Radices nodofie, repentiffimis.

Culmus articulatus, fquamofus.

Folia 4 thecis erurapunt fubradicalia, crafla, avenia, oblonga.

Scapus utcunque biflorus, fquamis acuminatis fubulatis cinQ:us.

Flnrum petala sequalia, horifontalia, lanceolata,

Labium ex ipfbrum centro erigitur ovatum, trifidum, ac ciliatum, bina segmenta lateralia aequalia, intermedium anguftiflimum, lineare.

FruttiS)feu filique glabrae, ac fulcatse b, uti in reliquis.

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA.

T*JOLElkborine coccinea, multiflora. Plum* Cat. p. 9.*

E P I D E N D R U M foliis caulinis lanceolatis, aveniis, inferioribus minoribus; pedunculis unifloris, axillaribus, confertis.

F I G U R A P R I M A.

Planta tuberosa, fimplices demittens capillares fibras:

Scapuj ere&us, fimplex, inferius foliis vaginantibus, ac minoribus vestitus, ex quorum alis plurimi simul erumpunt pedunculi uniflori, quixjiores gefunt planipetalos, regulares, quinquefidos, qui quum ruderiter ab auctore fuit delineati, de iis nil certi definire possum.

/wcaulina fuit lanceolata, longa, crafla, avenia, nervo medio decurrente.

FruEtus ovatus eft ac fulcatus, majora continens fcmina b', contra natu-ram reliquarum hujus generis specierum, ita ut peculiaris & diftin&a a reliquis sit pianta, ulteriori examini in loco natali subjicienda, quum videatur singulare constitutere genus a reliquis congeneribus diverfum, qualis etiam eft Thalia Maravara. *H. Malab.* torn. 12. Tab. 4. cum quae proxihe convenit.

X T*S:LElkbonne ampliflmo flore vario. Plum. Cat. p. 9.*

E ? IO E N D R U M foliis caulinis oblongis, alternis, obtufis. *Linn,* *fpec.p. 952. no. 5.*

Satyrium ere&tum, majus, caule subrotundo, foliis majoribus amplexantibus oblongis, spica terminali. *Brouw. Hifi. Jam.* p. 326. no. 12.

Ponnampu Maravara. H. Malab, torn. 12. Tab. 3,

FIGURE S E C U N D A.

Planta parafitica, longissimas emittens simplices, filiformes, prorepentes radices, pluresque emittens caules fimplices erectos, inferne foliis deftitiuos, subquamofbs, qui superne

Folia gerunt alternata, amplexicaulia, oblonga, avenia, & obtusa.

Flores terminales amplissimi, ex quinque petalis aequalibus confantes *Nedarii* vero labium ingens eft, ac dependens, longum, bifidum, ac revolutum,

FruClus in nostra verticalis, dependens, craflus, carnosus, ac fulcatus, petalis emarginatis coronatus, qualis in inferiore Tabulae parte confpicitur ad A.

Observatio. Hujus caulecentis plures apud autores occurunt species, uti in *H. Malab.* torn. 12. Tab. 3 sub nomine *Ponnampu-Maravara*, cur juss fructus eriguntur plures. In *Rumpb: Herb. Amboin.* torn. 6. a Tab. 45. ad 48. & sub nomine *Vifci Delphinii* flore spud *Sloan*, in *Catal & Hifi. Jamaic.* hoc genus occurrit.

176 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA PRIMA.

L
XX Elkborine foliis rigidis, angustis; & canaliculatis. *Plum. Cat. p. 9-*
LI M O D O R U M foliis fubulatis, carialiculatis, aveniis.

F I G U R A P R I M A.

Radix filiformis, extenfa, {implices ac finuofas emit tens craflas, prorc-
pentes, vermiformes fibrilla\$.

Folia altetoata, fubulata; canaliculata, avenia. >>

Scapus ere&us, fimplex, fquamis vaginantibus, oblongis, iurreftis veflifituf<
Fhres. pedunculati, alternati, quorum petala fibrovata, patentia, tria
majora, reliquis conniventibus.

Fruduscft capfula oblonga, trivalvis^ fuicata, dependens, petalis ~~empar~~
cidis coronata.

L
J^ Elkborine purpureay Aiphodeli radice. *Plum. Cat. p. j?*

LI M O D O R U M foliis aveniis, lanceolatis."

F I G U R A S E C U N D A.

Radix tubercufofa ex plurimis, fimplicibus, longis filiforribus tuberi-
bus conftans.

Folia fubradicalia, ere&a; rariora, lanceolata, avenia.

Scapus ere&us, fimplex, fpathis vaginantibus, rarioribus, vagis cinctus.
Flores feffiles, verticales, plurimi, alternati, quorum petala contra&a, acu-
minata, fubjequalia A.

Frutlus eft capfula, quaifi truncata, trifulca, connivens, feflilis, ere6ta;
qualis in feparata rriajoreB, ac reliquis ipfiusfcapiapparet, quumau^or
jfcapum frugiferum inprimis ob fmguulares fru&us delineaverit.

N. B. In ordine Iconum *Phtmierii* fequitur *Hellebwine* ramofa, Ron*
bus niveis *Cat. p. 9.* quae in omnibus convenit cum *Anantali-Maravav&*
H. Malab. torn. 12. Tab. 7, unde earn denuo infculpi inutile duximus*
atque huicproxime accedit *Angracum* rubrum *Rumph. Herb. AmbJib**
6. cap. 3. Tab. 44. Fig. 2. quod itidem a reliquis congeneneribus difti*¹¹
guitar panicula florum "extenfa. Vocatur autem ifta species a *Linn*, in
spec. plp. 952.no 6. EPIDENDRUM foliis caulinisovatis, amplexi-
caulibus, (Cui pofiet addi) floribus paniculatis.

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA SECUNDA.

T*XJLElkbonne* tenuifolia, repens. *Plum. Cat. p. 9.*

SERAPIAS foliis linearibus; radice repente, iloribus ipicatis.

F I G' U R A P R I M A.

iWz̄x. repentifl̄ma, craſlas undique acfimplices obtufas fpargens vermi-

formes fibrilkss. »

Cmilis ere&us, flmplex.*Folia* per caulem fparpa, fe/Tilia, alternata, linearia, nervo craflb medio decurrente.*Flare's* verticales, alternati, in fpathis feffiles, quos tamen au6lor in iconē non adpinxit:*Frudus* eft capſula obovata, obtuē trigona, tribus fulcis difim&n, ne&a-rio emarcido coronata.*Obſervatio.* Licet flores in iconē deflnt, ex radice tamen repente, ipfius que pJantae forma videtur ad hoc genus proprie pertinere, quod in loco natali in vi-va planta ulterius inquirendum.**XT***JL., JLElkborine* foliis carnipfis^&-^inatis. & falcatis. *Plum. Cat.p. p.*

O ^ H R Y S bulbis filiformibus, petalis ternis/majoribus, reniformibus, bilobis, undatis.

F I G U R A 8 E C U N D A.*Radix* ex tenuiflimis, firnpllicibus, flliformibus bulbulis coriftar.*Folia* fubradicalia', craſla, carnoſa, avenia, carinata, & imbricata, Aloētica, proximeque quadrant cum ifta pumila Aloēs fpecie, quas triangularis vulgo dicitur.*Scapus* ere6rus, fimpJex, nudus, nullis te&us fpathis, in vertice ge-

rens

Flores elegantiffimos, fingularis formae „, quorum nempe tria peiala prā reliquis eminent majora, reniformia, biloba, & undata, extenfa, reJiquis contrastis cum Neclario vix confpicuis.*Frudus* eft capſula oblonga, contorta, ftriata, trigona, dependens, petalis emarcidis coronata.

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA TERTIA.

L*XJiElleborine Spiralis; flore albo. Plum. Cat.p. 9.*

O P H R Y S buibis filiformibus, caule subfoliob, floribus fecundis,
Ne&arii labio quinquefido.

Epipadis floribiis uno veffu difpdfitis. *Fevil Peru'v. torn. 2./>. 726. PI-^{l*}*

F I G U R A P R I M A.

Radix ex plurimis, longis, finuofis, filiformibus bulbis conflat.

Folia paucafupra terram in fcapo eriguntur, lanceolata, feffilia, finuofa>
avenia, craila, ac nervofa.

Scapus ere&us, fimplex, fpathis vaginantibus inferius te6his₅ faperius
F/ores prufciis fcffiles, fpathis involutos, & cum fcapo mirum in too-
' dum in fpiram intortos, illomm petala plerumque funt asqualia, ac con-
niventia, uti in flore a separato liquet.

Nedarium vero dependens, quinquefidum eft^, quodifFertab Ophrydeipi-
rali vulgari, cujus labium integrum eft.

Obfervatio. Haec planta proxime accedit Ophrydi fpirali. *Linn.fpec p>*
94j. no. 3. fēdnoftra triplo fere major eft, & inprimis differt labio Nee-
tarii quinquelobo nee indiviib. Vocatur autem ifta planta IK AEfc
Upfal. nnni 1740./?. 32. NE OTTIA bulbis fafciculatis, Neftarii labio
indivifb.

T*XJiElleborine aphyllos; flore luteo. Plum. Cah p. 9:*

O R C H I S bulbis filiformibus, petalis minutis, Ne&arii labio magno?
bilobo, fubrotundo.

SatyriutnfiphyMum, fcupo ere6to,fimplici,fublquamato, fpicato? *Brouiv.*
llift. Jam.p, 325. no. 7.

F I G U R A S E C U N D A.

Planta aphylla, herbacea.

Radices bulbulofae, filiformes, ac finuofe,

Scapi ere6li, fimplices, fquamis pufillis hinc inde notati.

Flores verticales, alternati, pedunculati, accaudati, quorum petala mi-
nima; *Nedarium* vero ingens, bilobum, fubrotundum.

Fmdus eft capula oblonga, ftriata, petalis emarcidis coronata.

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA QUARTA.

H*Elleborine* purpurea, umbellata. *Plum. Cat. pi p. 9.*

O P. H R Y S bulbis filiformibus, foliis caulinis lanceolatis, aveniis, racemo fibrotundo.

Angr&cum nonum. Rumpb. Herbar. torn. 6. Tab. 46. Fig. 2?

F I G U R A P R I M A.

Planta herbacea, fimplices demittens radicales bulbulos filiformes.

Scapi erebli, fimplices, indivisi, geniculati.

Folia alternata, femi amplexicaulia ^ Janceolata, obtusifolia, crisia, avenia.

Racemus verticalis, fibrotundus, ilores in corymbum coHesos gerens, qui tamen in icona vix aperti videntur, & in *Rumpbii Figuris* adultiores Cv racemo/i funt, cum quibus proxime convenire videtur hsec planta.

H*Elleborine* maculosa; foliis junceis, ac fulcatis. *Plum. Cat. p. 9.*

EPI D E N D R U M foliis radicatis fuulau'a ac fuicatis / capo floribus que macubitis; labio inferiore fubtrilobo.

F I G U R A S E C U N D A.

Planta parafitica, diffusas emittens fibrillas radicales finuofas, & bulbus.

Folia radicalia longiflora, ac copiosa, fubulata ac fulcata, nervo medio craib decurrente, atque haec ad ortum vaginis lanceolatis videntur involucrata.

Scapi erebti, fimplices, ultra medium fuprefm partem rariores gerentes alternatos flores, ubi & maculati *Cunt*, ficuti quoque florum petata, excepto labio, quod fubovatum, obtusum, & fubtrilobum est.

80 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA CENTESIMA OCTOGEQUA QUINTA.

H *Elkborine* ramofa\ floribus minimis, luteis. *Plum. Cat p. 9.*

EPIDENDRUM foliis radicalibus, lanceolatis, trinerviis, racemo compofito, floribus minutis.

Satyrium parafiticum, foliis oblongis, radicalibus, (capo afflurgenti, Iongo, farmentofb, nudo, ad apicem ramofb, labio inferiore floris cordato? *Brouw. Hift Jam.p. 326.no. 14.*

Vifcum Caryophylloides, ramoium, floribus minimis, albis: *Catesb' Carol. 2. Tab. 55.*

¶ *Epid.* is flore albo? *Fevill. Pernv.p. J2i.pl. 18.*

FIGURE

P R I M A.

PJanta herbacea, plurimas emittens fimplices, bulbofas, vermiformes radices.

Folia radicalia, lanceolata, trinervia, ad bafin vaginis involucrata.

Scapi ere6li, fimplices, racemos gerentes ex plurimis floribus compo^ttos, qui minimi ac pufilli funt, fed ruditer ab au&ore. delineati, coloⁿs iutei.

H *Elkborine* cochleato flore. *Plum. Cat. pi. Amer. p. 9.*

EPIDENDRUM foliis fubradicalibus, *lanceolatis, trine'rviis*, petalis linearibus, reflexis, labio cordato.

Vifcum Caryophylloides, Lilii albi foliis; floris hbello brevi, purpureo, - caeteris petalis ex luteo virecentibus. *Catesb. Hift. Car. vol. 2. Tab. 88.*

FIGURE

S E C U N D A.

Planta herbacea, bulbulofiu

i/^mfubradicalia, vaginantia, lanceolata, longiflima, trinervia.

Scapus ex centro erigitur fimplex, ac nudus.

Flores verticales, rariores, petala longiflirria gerentes linearia, ac retroflexa, cum labjo piano, cordato.

Frudus eft filiqua ovata ac fulcata, fuperius petalis emarcidis coronata, (uti in luterali figura) femma gerens minima, compaaa, uti in d^{ta} ^ appetat.

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA SEXTA.

L*JLjElkborine* flore papilionaceo. *Plum. Cat. pi p. 9.***EPI D E N D R U M** foliis fabradicalibus, Janceolatis, aveniis, petaiis oblongis; labio reniformi, bifido.

F I G U R A P R I M A.

Planta parafitica ac bulbofa.*Folia* fibradicalia, vaginaria, longiflma, avenia, nervo medio decurrente.*Scapus* eretus, fibarticulatus, vaginalis, superne divaricatus, rariores gerens*Flores*, quorum petala *Hint* plana¹, oblonga, fere lifrearia, cum labio magno, bifido, reniformi.*Fruthis* flint filiqua?, fibovata³ ac coronatas, fulcata) & angulofce, uti inflat¹ A adparet.**H***Helleborine purpurea*, tuberofo¹ ra⁴ice. *Plum. Cat. pi. Amer.p. 9.***EPI D E N D R U M** foliis i-adicalibus lanceolatis, trinerviis, petalis oblongis, patulis, labio tubulofo, repando.*Anagallis purpurea* Rumpb. Flerbar. Amb. lib. xi. cap. x. Tab. 5?, Fig. i.

FIGURA S E C U N D A.

Planta herbacea, tuberofa, ac terreftris.*Folia* vaginaria, fibradicalia, longiflma, lanceolata, ac trinervia.*Scapus* lateralis, eretus, fibartkulatus.*Flores* ad medianam superiorem partem excrefcunt alternati, pedunculati, & speciofi, quorum petala sunt extensa, seu patula, oblonga, purpurea, cum labio singulari, concavo, seu tubulofo.*Fruflus* est filiqua teres, ac longiflma, variis fulcis notata, uti in separata B adparet.*Obfervatio.* Non dubito, quin haec planta fit eadem, quam descripfit *Kumphius* I. c. de quanotat, quod e terr& progerminet, & post foliorum lapfum tubera quatuor vel quinque supra terram erigantur, in articulos diflinfa, ad quorum latera flor.um facili excrefcunt, uti in nofra planta, flores purpureos quoque, gerentes &c.

TABULA CENTESIMA OCTOGESIMA SEPTIMA.

H *Elkborine ramofiflma, cauliculis & floribus maculofis. Plum. Cat.
pl.p.9.*

EPIDENDRUM foliis lanceolatis, quinquenerviis, racemo floribusque pun&tatis.

Planta caulefcens, bulbos emittens fimplices, vermiformes.

Caulis ere&us, fimplex, articulatus, inferius infeftitus foliis vaginanti' bus, cnaffis, nervofiSj ovatis, fuperius pun&tatis, e quibus •

Folia undique excrefcunt maxima, eniformia, fuperne inflexa, feu repanda, quinque craflls nervis diftin&a, uti inlaterali majore adparet, Hcet ab auclore in minoribus plures nervi per incuriam forte notati fe' csterum fuit crall'a, nervofa, a\^enia, lanceolata, & inferne, uti vi detur, fulcata.

Scapus florifer lateralis excrefcit, radicalis, longiffimus, articulatus, ^an rifque fquamis notatus, fuperius racemofus, ubi eleganter maculatus, ac cum floribus punctatus eft.

*Flores hi irregulares fuit, nee fatis diftin&e ab auclore delineati, ip^rum vero petaia mirum ip modum<:onvoluta & inflexa fuit, proxime que convenient cum illis *V'amillfi. vulgaris*, quam plantam huic fobjunxi cum exalta ipfius icone, ut melior idaea horum petalorum fot' mari poftit, quae iane ex auftoris data figura vix dignofcuntur, vel diftinguuntur.*

Labium horum florum inmaculatum eft, finuofum, ac fubovatum, uti, i^ majori racemi fegmento A adparet.

Frudus fuit filique ingentes, ventricofis, dependentes, in tres rpaiores partes dihinciae ac fulcra?, uti in feparato majori fructu B H quet.*

Obfervatio. Non dubito, quin *Angurek Katongging*, feu *Herba P?* rafitica, folio arundinaceo, flore fcorponem referente, odore mofchi* *Kdfnph, am&nit. exotic*, p. 868. fi non cum noſtr& fit eadem, faltem ejus varietas, & *Epidendri* vera species habenda, cuius iconem ^ defcriptionem ulterius cum noſtr& conferant Botanophili, ut pleni or noſtrae plantse florura forma cognofcatur. Vide porro. Ad. *Upfal.* 1740. ^ 37.

TABULA CENTESIMA OCTOGEŚLMA OCTAVA.

VAriilla flore viridi-, & albo; fructu higricanfe. *Plum. Nbv. Geher. pl Amer.p. 25. Geoffr. mat. Med. vol. 2. p. 362.*

E P I D E N D R U M foliis ovato-oblongis, nervofis, feflibus, caulinis » cirrhis fpiralibus. *Roy.pr.p. 13. Litm.Jpec.p. 952. no. 1.*

Epidendrum foliis ovato - oblongis, pefiolis inferne ample^icaulibus, cirrhis radicatis. *H. Cliff. p. 430.* ubi defcriptio.

Epidendrum fcandens, foliis elliptico-ovatis, nitidiflisis, margine mem* granaceD cinctisj iubfeffibus; irtferioribus claviculis jugatis, fuperioribus oppofitis^ *Brouw. Hi/I. Jam. p. 326.*

Vanillas piperis arbori Jamaicenfis innafcens. *Plukn. Aim. p. 38r. Tab* 320. Fig. 4.*

Vanillo. *Merian. Surin. Tab. 2^S. Dale Pbarmac. p. Ill** ;

JQlubiUs filiquoña, plantaginis folio. *Catesb. Carol. app.p. 7. Tab. 7.*

rolubilis Aixeric. capreolata, Plantaginis foliis, filiuis longis, mofchum, olentibus-. *Moris. Hi/I. pi. torn. 3. p. 612.*

Lobus cbjonus,aromaticus. *Cuf. exotic.p. 72. Sloan. Cdt.pl. Jam.p. 76. Hift. Jam.-vol. i.p. 180,4.*

TiixhCbtv. Herngnd. Hift. Mexic. p. 38.

S Angurek P^arna, feū herba fcandens, parafitica, folio aruhdinaceo, H. variegatOjhexaspetalo , papilionem volantem exprimente, probdfci de brevi. *Katmpir, iwrfontt, exoHc.p. %61?*

Lipeit haec planta a variis au&oribus fit commemorata, atque a paucis ipfius fru&lus, & folia iconē expreflā, a nullo tamen, nifi forte a *Catesb.* Ipfills flores, totaque forma simul exhibita, unde earn ab audlore no&ftro fatis exa&le depiftam in Tabula oculis exponere volui; defcriptio nem vero addere fuperfluum eflet, quum exaftiflime a *Geoffr. l. c.* (uti appetet ex *Plumierii mff*) fit defcriptā, ubi.& aliae hujus species, quae potius varietates habendae, recenfentur; fed inter Au&oris icones altera minor ejus reperitur species, quae *Vanilla* flore albo, fru&u breviore coral lino a *Plum.* in *nov.gen.p. 25.* vocatur; quum vero tantum ipfius flores ac fruchis digitum circiter longi, & quafi truncati depi&i funt; nee fatis exa&e, hinc ulteriori examini in patrio (bio earn felinquis mus.

*84 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA CENT ESIMA OCTOGESIMA NONA.

HUEBORINE; radice arundinacea, foliis amplissimis, lyratis. *Phn.*
Cat. pl. p. 9.

*JJIMO*DORUM* foliis nervosis, lanceohtis, acutis, radice tuberofa.

Limodorum. Roy, pr. p. 16. ubi ejus charader, Linn. fpec. p. 950. &c.

Helkborine Americana, radice tuberöfa, foliis iongis, angutfis, caue nu-
Av. floribus ex rubro pallide purpurascenibus. *Martyn.* Centur.f. 5°
Tab. 50.

Saxifraga ssp. *fluminensis* Scapo florifero partiali, subfrumentoso?
Brouw. *Hil. Jam.* p. 325. no, 10.

Radix tuberosa, arundinacea, prorepens, albicans.

Fdfofubracicalia; vaginantia, crafla, iftrvola, lanceolata, acuta, in natura Vi folo latifiima, inferius fulcata, feu canaYiculata , un in separato " majori folio patet.

Scapis radicalis, longissimus, articulatus, midus usque ad verticeiii > ubi

Flores in thyrum colliguntur, patentes, ex petalis sequalibus conftantes A, quas a fyftematicis ulterius cum ipfbrum partibus defciribuntur.

Frutus est capfula oblonga B, fulcata, & angulolà, petalis emarcidis coronata, uti ex integro & diilao fruau C juxta^v auftoris • -delineationerh patet.

TABULA CENTESIMA NONAGESIMA.

HUEBORINE foliis liliaceis, radice Aphodeli, major & minor. *Plum.*
Cat. p. 5,

LIMODORUM foliis nervofis, oblongis, obtufis, radice bulbofa.

§atyrium ereum, minus, Aphodeli radice, foliis oblongo-ovatis, ^a^a
dicalibus, capo a Turgente, subfquamofo, fpi_{ca}co. *Brouw.Hift.* J^ath
p. 324, no. 4.

Orchis elatior, latifolia, Aphroditi radice, f. p. j. ca. ft. r. i. f. fo. f. a. # Sloan. **Hijst.**
Jam. vol. 1. Tab. 147. Fig. 2.

Epipattis ampio flore luteo. Fevitt. Peruv. torn. 2. p. 729. pL XX

[^]xexplurimisbuIbis, oblongis, acfimpli[^] us conflat **u**ti in Af hode lo .
Folia m majon specie fubradicaha, oblonga, g_ua_gj_ua; m eime f[^] , neer.
 vola, fed ranora exrefcunt[^] in mmori specie quaf D_o l_o t_o a, ?an_y .
 culata, nervofa, latiora, magisque acumimm _{m m a t a}, CU_{M F} :_o l_o t_o a, ?an_L *.
 gantiorem delineationem dedimus. J_US ic onem ob ele-

Scapus ex ipfb centro erigitur, fquamis alternatis ac fubulatis inveftitus, qu# in majori fpecie latiores, oblongs, & amplexicaules videntur, uti in adje&o majoris fpeciei fcapo patet A.

Flores in fuprema parte copioffimi, & quaſi fpicati excreſcunt, quorum forma proxime cum *Limodori* genere convenire videtur, quum vero non fotis exade fint delineati, nū certi ha&enus defcino , & in patrio fblo ukerius inquirendi funt, ita ut inter plantas dubias tarn diu numeranda fit, quum de genere hue usque dubitare liceat ,& quarnvis in Fe-vill. iconē iatis exable fint delineati flores, a noſtris tamen diftindi, nee ita fpicati, tota vero plantas facies fuadet cum noſtrā convenire, & ipfi adiſhem e/le.



TABULA CENTESIMA NONAGESMA PRIMA.

M *Elocattus monoclonos, Rore albo, frudu atropurpureo. Plum. Cat**
pi. p. 19. Tourn. in{, p. 653.

CACTUS^o&angularis, erechis, angulis compreijis; fpinis absque tomento confertjs.

'*Cattus.ereftus*, longus, fubo&angularis, angulis obtufis. *Linn,Jpec.pl.*
,p. 467. <0,.9.

Ca&us novem angularis, longus, ereftus, angulis obtufis. Linn. H. Cliff.
/>. 181.

Cafluscylindraceus, eredlus, fulcatus, major, fummitate obtufiis; aculeis confertis. Brouw. Hi ft. Jam. p. 238. no. 8.

Cerichts craſliflimus, frudu utrimque rubro. Sloani. Cat. pi Jam, p. 196. &
Hift. Jam. vol. 2. p. 157.

Cercits erectus, fruclu rubro, non fp'mofo. Herm. Par ad Bat. p. 114,
Cereus ere&us,maximus Americ. hexangularis,flore aJbo,radiato. Bradl.

Hift.pl/uccul. pag.i.

Caudex fimplex, ereftus, ad fummum indivifus, angulis ac fulcis notatus obtufis, & comprefTis, plerumque oftoangularis, fpinis undique erematusfetaceis, faſciculatis, acftaHaeforribusj ad verticem confertiflimis, ubi caudex in conum terminatur obtufum.

Flores in fumma ipfius parte proveniunt feffiles, fblitarii, fatis frequentes refpeſlu congenerum, ex petaliſ pluribus cordiformibus conftantes, cum fquamis calycinis inermibus&inbricatis,craſlum formantes tubum, intus innumera continentes flamina, cum ftilo prominentे longiffimo, fuperne ftigmate capitato quinquefido inftru6to.

FrutuS) eft Pomum ingens, ovato-oblongum, uniloculare,
Semina plurima, fubrotunda, nidulantia continens, uti in diflecl:o fru^u
in Tabula confpicitur.

186 PLANTARUM AMERICANARUM

Obfervatio. Sub nomine *Cadi* quatuor hodie comprehenduntur genera V
frimo *Cereus*, qui formam vulgo obtinet longam, cylindraceo-angula-
tam.

Secundo *Mclocadm^* cujus fades est fibrotunda, angularis.

Tertio *Opuntia* seu *Tuna*, quae ramosa, dichotoma, acproifera.

Quarto *Percskia*, quae arborea, ac foliosa.

Omnes vero spinosae sunt, externa facie, & florum ac fructuum soft&
proxime inter se convenientes, ita ut CI. *Linnaus* antiquum atque
pferit nomen *Caflum*, quo planta denotatur aculeata, plerumque angu-
laris, edulis, & carnofo &c.



TABULA CENTESIMA NONAGESIMA SEGUNDA.

M *Elocattus* arborefcens, tetragonus*, flore exalbido. *Plum.* *Cat. p**
p. 19. Town. inf. p. 653.

CACTUS brachiatus & articulatus, articulis oblongis, spinosis, caudi-
ce erecto, inermi, quadrangulari, aculeis brachiorum curtis, & con-
fertis.

Opuntia major, spinosa, raulefrens, foliis longis & angustis, pendulis.
Sloane. Cat. pl. Jam. p. 1^5.

Jamacary tertia. *Pison. Hyl. nnt. p. 18^.* & *Mavcgr. p* 126**

Caudex simplex^ erectus, mitis^ quadrangularis.
Rarnibrachiati & articulati, ex plurimis articulis, inaequaliterfatis, & spinosi,
ac spinosae confertes.

Flores ad articulorum extremum proveniunt, iefiles, vagi, ac foliarii,
atque ex tubo longo constat, qui componitur ex squamis calicinis,
oblongis, simplicibus, superne ciliatis ac spinulofis, cum stilo longissimo,
prominente, uti in separatis majoribus conspicitur ipsumbrum partibus
A & B.

Frudus sunt poma ovata C, aculeis vagis armata, quae plurima continent
lemina, in pulpa nidulantis D, uti in diflecto fructu adparet.

Obfervatio. *Mehcadi* hi arborefcentes *Phimhrii*, *Opuntiae* olim die-
tiss verae species habendae sunt, unde ita randum, quod auctor in cataldg⁰
suo illos separaverit, uti ex subfrequentibus ejus *Opuntiis* patebit, quum
nulla generica differentia in iis obfervetur; merito itaque haec omnes
plantae a Botanikis hodiernis ad unum rediguntur *Cadi* genus.

TABULA CENTESIMA NONAGESIMA TERTIA.

MehcaCius arborefcens; folio ftriato, fpinofiflimo, fru&u aureo, tu<<
berculofb. *Plum. Cat. pi />. 19. Tourn. infi. p. 6 \$3.*

. CACTUS ramofflimus , articulis aequalibus, ftriatis , fetis fpinofis
undique armatus.

Opuntia major, fpinofa, caulefcens, foliis atrovirentibus, longis,& ah-
guftis, pendulis, fl. rubro. *Sloan. Cat. p. 195.*

Opuntia foliis longiffimis, atrovirentibus, maxima, Americana. *Breyth
prodf.»2. p. 87.* -

*Jamacary. Marfgr. hlji, Brajil.p. 175. & Jamacary fecunda. "Pi/on, p.
189.*

Caudex flmplex, ereftus, Tnultangularis, ex decem utcunque angulis cori-
ftans Å fpinofiflmis, fpinis undique decuflantibus armarus.

Rami brachiati & articulati, articulis confrantes longiHimis, aequalibua^
feu linearibus, undique ftriatis, ac fetis plurimis cruciatis fpinofifc
firlnis undique armatis.

Flores & frUtlus uti in pnscedente , qui in articulorum fuperiore parte
excrefcunt, hi vero fquamofi & muricati plurima oblonga minutiflma
continent femina B.

TABULA CENTESIMA NONAGESIMA QUARTA.

Meloca&us arborefcens, trigonus, undulolus, aculeis validis mum-
tus, fruclu fubviridi. *Plum. Cat. pi p. 19. Tourn, infi. p. 654.*

CACTUS ramofts;, articulis oblongis, triquetris; caudice fpiriofo,
. triangulo.

Cadus articulato-prolifer, articulis dvato-oblongis, fpinis fetaceis. *Linn.
/pec />. 468. no. 16. ^ ,*

Callus comreilus, articulatus ^ ramofus , articulis ovato-oblongis, fpi-
nis fetaceis. *Linn. H. Cliffp. 183. Roy.pr.p. 280.*

Cadus brachiatus, & articulatus, articulis oblongo-ovatis, compreflis,
caudice tereti, ere&o, fpinofiflimo, aculeis brachiorum brevibus con-
fertis. *Brouw. Hift. Jam. p. 237. no. 3.*

Caudex ere&us, (implex, trigonus^ fpinis fetaceis, fafciculatis ad angu*
lOs armatus. , °

Kami vagi, articulati, articulis confantes rarioribus, oblongis ; trique-
tris, fpinulofis, marline repandis. V

188 PLATARUM AMERICANARUM

Flores ad ipfbrum extremum rariores excrefcunt, ex longis conftantes tubis cum radio extenib, petalis ac ftaminiSus innufneris, & ftilo brevifimo, uti in feparato majore flore A patet.

FruduSy eft pomum fiibrotundo-ovatum, & quafi truncatum, B pulpa refertum molliflima, in qua rariora mdulantur *Jemna*, uti in difle&o conficitur C.



TABULA CENTESIM A NONAGESIMA QUINT A.

Melocadus arborefcens, Cereiformis & Ipinofiflimus, fructu^oblongo fbluteo; feu Melocattus arborefcens, folio ftriato, fpinofifiim^> frudu oblongo, fbluteo. *Plum. Hyl. mjf. Tom. 3./. 26.*

CACTUS eredus, oangularis; angulis rotundatis; fpinis radiatis ac ciliatis.

Cereus ereftus altiffimus, Surinamenfis. *Herm. Farad. Bat. p. i¹,^ P^okkam.fl. Norimb.p.gy.*

Q> Cadus ereftus, fexangnlaris, longus, *Litm.specp.466.no. 5.*

Cereus Americ. octangularis, fpinis albancibüs. *Bradu Hi/I. pi. SUCC.DM* 2. pry Tab. 12.*

F	I	G	U	R	A	PR	IMA.
---	---	---	---	---	---	----	------

Caudex ere&us» fimplexi, iongiffimus, in noftr^ oftangulus, ad angulos fpinis armatus fafciculatis, feu ftelliformibus, fetaceis A.

Flores ex longo conftant tubb B, qui ill primis formatur ex fquamis calicinis flmplicibus, oblongis, atque inermibus, illi vero fuperne. fefe ex^licant in petala plurima extenfa, ad dras crenata C, atque interne innumera continent ftaminaj", uti in reliquis.

Frudus eft conns obtiifus, ^ flmplicibus & inermibus Iquamis te6lus, intus continens fubrotunda femina, in pulpa nidulantia D.

OP«K*s0/altiflirna, Cereiformis, aculeis validiffimis, flore amplio, fift- briato. *Plum. Cat*pi p. 6.*

CACTUS csre&us, oaangularis, fpinis fubulatis , validisfimis , flore fimbriato.

Opuntia major, validisfimis fpinis munita? *Tourn.inft. p. 239.*

Opuntia major, folio oblongo, rotundo, fpinis longisfimis & ~~validisfimis~~ confertimnafcentibus obfito, flore luteo. *Sloan.Catal.pi. p. 13. Hyl. vol. 2. p. 149.*

'*Cereus* eredus, crasfisfimis, maxime angulof_{us} y lpinis albis , pluribus, longisfimis. *Boerb.Ind. H. h.B. torn. 1. 293.*

•0 *Cadus* brzchitztusk artkulatus, articulis ovatis, comprefis, aculeis longisfimis, confertis. *Brouiv: tijjt. Jam. />. 2 3 7. no; 23? &c.*

FIGURA SECUNDA.

Planta akisfima, fimplicem gerens inftar Cereorum caudicem, oclangularem E, spinis jongisfimis faiciculatis & fubulatis armatum, qua? decidulas videntur, uti in trunci fegmento ex ipfarum vestigiis patet, atque ilia? ad angulos in primis videntur excreicere.

Flos non tubulofus eft uti in prioribus, fed potius rofaceus videtur, ex „ petalis ferratis ac ciliatis cum ftilo longisfimo confans F.

Frudus eft pomum fubrotundum, spinulofum, intus continens plurima, fubi'otunda *femina*, ut in di^{Te}lo adparet G.

**TABULA CENTESIMA NONAGESIMA SEXTA.**

O *Puntia arbor*, excelfa, Cereiformis, flore albo, *Plum. Cat.* p. 6.
Town. p. 240.

C A C T U S ere&us, ramofus, undecim-angularis, spinofisflmus.

Cadus ere&us, cyjindraceus, fulcatus, tenuior, fammitate attenuatus, aculeisconfertis. *Bronw. Hjil. yam.* p. 239. no. 9?

Cereus alrifTimus, gracilior, ere6his, fru&u luteo, intus niveo, feminibus nigris pleno- SU^. -CetfTpi. ^dff. p. ^97*

Cereus ere&us, maximus, frudu spinofb rubro? *Herm, Par. Bat.* p. 113.
+Boerk Ind. H. L. B. torn. i, p. 293.

Plarfitt caudex fimplex, ex plurimis afgululis, undecim utcunque confans, fuperne ramofus, ex Variisfimplicibus, irregularibus, & inaequalis longitudinis articulis compofitus, qui spinulis undique fetaceis & faciculatis armantur, uti & tota planta spinbfisfirha; eft.

Flores in fummitate exrefcunt inter (pirias ad angubs fesfile, "ex brevibus eonftantes tubis, atque petala inftar Rofae extenfa gerentes, cum innumerisftaminibus ac ftylo prqminente longisfimo, quales in raa- jori florifero, & obtufi coni fegmento confpiciuntur ad latus Tabula?.

Ob/ervatio. _Haec planta ex externa sua facie modoque florendi rragis *Cereis* quam *Opuntiis* adfinis eft, unddvix patet, quam ob rerri Audlor hanc, potius ad *Qpuntias* retulerit, qui alioquin, ratione Epochae Bdtanicae, inquavixit, fatis accurate, ac fæpe nimis fbllcite genera feparavit; fed quum omnes haec plantae fub uno jam militent genere *Cadi*, nullum Botanicis fcrupulum movebunt.

PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA CENTESIMA NONAGESIMA SEPTIMA.

O*Puntia arbor*, spinoflīma, foliis Portulaceae cordatis. *Plum. Cat. p. 6.*

CACTUS cauletereti, arboreo, spinofb, foliis cuneiformibusj retū*
fīs. *Linn, fpecp. 469.no. 22.*

£ Jamacary fexta. Pi/on. Hiji.natur.p. 10.1.

F I G U R A P R I M A.

Caulis foliis nudus, fed ipforum loco spinis fetaceis fasciculatis armatus.

Folia in ramis cuneiformia, emarginata, crafla, succulenta, alterna per ramos tenellos, inter quae spinae fibrofoliariae 5 fubulatae.

Flores dzfruttus in ramulorum fumrfo excrecunt fiblitarii, rarius gemini? quorum petalarofacea, plana, & cordata.

Frudus font poma fibrotunda, fibanguiofa, nullis foliis fliffulta, uti ifl *Pereskia*, cui tamen haec planta quam maxime adfinis est, & proxim* accedit, & licet (atis exalte ab aulore noftro fit delineata *rereskia*, ipfam tamen huic non fibjungam, quum Botanicis jam fit notiuima ex *H. Ehbam.* optima figura & defcriptione, nee non ex *H. Amjl. torn.** 1. Tab. 70. Quas tamen Cl. *Dillenius* putat eflē diverfas, queseque ubi* vis in Botanicorum hortis est obvia

KJP*Puntia minima, flagilliformis. Plum. Cat. p. 6. Tourn.injl. p. 240.*

CACTUS inermis, aphyllus, ramofiis, ramulis gracilibus, compreffis, articulatis.

Caflus parafiticus, inermis, aphyllus, ramofiis, propendens, ramulis g* eilibus, teretibus, flriatis. *Brouw. Hiji. Jam. p. 238. no. 11.*

FIGURAS CUNDA.

Planta fruticofa, ac ramofa, ex ramulis articulatis, digotomis, & trig* tomis confans.

Flofculi ad ipforum fupremam excrecunt partem, ab auclbre rūditer depifti.

Frudus videntur conuli obtufi, & quafi truncati, quantum ex icone conjicere licet, fed qui in loco natali ulterius fuit inveftigandi, ita* inter dubias plantas haec quoque numeranda, atque vix hujus generis effe videatur, quum vero ab auaore, uti & a Cl. *Brouw. I. c.* ut puto, hue relata fit, non aufus fui, nee potui earn ad aliud reducere genus* quod pofteris curse fit.

TABULA CENTESIMA NONACESIMA OCTAVA.

M *Eldcaflus* ex pluribus globulis Opuntiae modo nafcentibus, fpino-fiffimis. *Plum. Cat.pl. p. 19. tourn. in/I, p. 653.*

V'CACTU'S articulato-prolifer, articulis globofis, glomeratis, (pinofis.

^ *Lifm.Jpec. pi. p. 468. no. 14:*

Phnta fefllis, articulata; ex articulis cbnftans globofis, fibi mutuo in- artiqjlati, feu adcretis inftar proliferarum, atque ill £ fpinas undique emittunt fblitarias, rarius geminas, longas, (ubulatas, acutiffimas.

Flēres in articulis fummis eriguiirjr fefiles, ex Iongo fquamofo tijbo con- fantes,cum pctalis explicatis,finuofis, & ftilo longiflimo prominente, cujus ftigma latifimum, ac multi-partitum eft.

Obferv. Inter omnes Cattorum species hsec rariflima,& maxime fingularis planta eft, anemine ante au&oremnoftrum obfervata & commera- rata.

TABULA CENTESIMA NONAGESIMA NONA*

M *Elocattus* repens..tetraguuus,& pentagonus,lore albo,frufl:ufubro, & coccineo. *Plum. Cat. p. 20. Tourn. inf. p. 653.*

"CACTUS repens, fubquinque angularis. *Linn.fpec.p. 467. no. ir.*

Gic7«s»fcanderis, angulis quinque, pluribusque obtufis. *Linn. H. Cliff. p. T82. Roy. pr. p. 280.*

Cereus Americanus, major, articulatus, flore maximo, no&e fefe ape- riente, & fuaviflimum odorem fpimnte. *J^olk. Hefp. Norimb. 1. p. 133. Tab. 134.*

Cereus ferpens EAOpwy£ feu fblfuga. *Plukn. Mantiff. p. 76. ubi floris pe- ..^Jiaris indeoles denotatur.*

F I G U R A F R I M A.

Planta propriè eft repens, jfique radiculis, quas hie inde emittit j adftan- tes arbores, aliaque fulcra attingere poteft, fcandit, longiffima emit- tens farmenta,plerumque quatuor vel quinque, aliquando plures angu- Jbs formantia,fpinis per interftitia erumpentibus fafciculatis, fetaceis, ftel- Isein modum in orbem expands,quse in Au&oris icone frequentiores de- pi6laefunt,cjuamin noftris obfervantur plantis,qtioequeinpentagona ejus varietate ab au&ore etiam multo rariores& tenuiores delineatas funt.

i^wdiulatet, ac tarde crefcit, conumque primo format obtufum^ fp- nulis fubtiliflimis armatum, quum vero fe(e aperit, ingentem primo

192 PLANTARUM AMERICANARUM

explicat calycetn, ex meris fquamis, quadruplici quidem ftrato fitis* compofitum: Vefperi vero, quum ipfējam florebit; circa horam fep* timam plerumque fefe aperire incipit, duodecima hora candidissimus micat, omniumque amaenissimum & fuaviflimum prsbet fpe&aculum, & odorem, qui per totum fefe diffundit hypocauftum, in quo ut copiofe haec planta floreat, proxime ad fenefras in fi&ilibus vernp tempore deponenda eft, quoque magis Soli exponatur, ejusque radiis illuftretur, eo luxuriofior, magisque florifer obfervatur, ita ut, licet flos Solem videatur fubterfugere, quum per noſlem fefe aperiat[^] planta tamen ipfa E^C>A⁹, feu Solis arnica obfervatur.

Qui hujus porro incomparabilis floris fingularem fcire defiderat flru<Suram, adeat *H. Gliff. L c*, ubi a Cl, *Linn&Q* exactiffime & graphice ejus partes. feparatae explicantur, quae a Cl, *Tr̄c̄rcoio indecur. Tab. 3 k& 32.de** gantiffime delineatse exhibentur.

M*elocactus* repens, trigonus, flore albo, fruſtu violaceo. *Plum. Cat.p. i°-*

CACTUS repens, trigonus, fpinis quaternis, fetaceis*

g *Cadus triangularis*, fcandens, articulatus, *Lim.H.Cliff.p.lZi-tH'-lt*

FIGURE S E C U N D A.

Obfervatio. Licet hsec planta cum *Cereo* trigono articulate, fructu fua viffimo *Herm. Prodr. p> 118.* a Botanicis vulgo jungatur, ex form* tamen articulorum, *Hermannii* iconē, fpinisque inprinatis quaternis, cruciatisque patet, longe aliam eflē plantam, illamque *Hermannii* me'ius convenire cum alia *Plumierii* planta mox fubfecutura, quae fpinas firfj* les ac ilia gerit; ceterum harum plantarum fruſtus dulciflimi, acidodulces, ab incolis in deliciis babentur, quam maximum in ferventibus iftis regionibus refrigerium fitientibus praebentes, quiqye Aurantiorum magnitudinem fiepe adsequant, ita ut licet has'plants fpinis undique armatae, foliis deftitutae, atque inftar ferpentum primo adfpeglu fugien* dae & horrendi, humano tamen generi ob delicatos fruſlus amabiles fint, & in filvis campeftribus, ubi ad arbores adfeendunt, qua'n a^{vib}* diffime a ptaetereuntibus & fitientibus incolis expetantur; omne- p^{or}' TO hse repentes species, ipfarumque varietates eundem habent crefcrndi mbdum; fi nulla inveniant adminicula, quibus fefe fiftinere valent, per terram proferpunt, fi vero arbores, ad quas fefe erigere pjjFJ[^]* adtingant, fibrillas radicales adipfas emittunt, harumque cordcibus it'e figunt, ipfas adfeendunt arbores, atque per illarum frondes fefe exrendant luxuriofifTime tanquam Parafiticas, ex ipfis quoque nutrimentum fug^{nt} per fibrillas ipfis infixas, quum harum plantarum radices terra inhaerentes adeo pufilhe fuit ratione ipfarum magnitudinis, uti id evidentiflme patet in G[^]e r e f t i s, quae yix notabiles gerunt radices fcopulis que tarn firmiter % e infixae fuit, ut ab ii_s f_{me} f_{umma}, s_{f1(}[^] e vix fe parari poffint, unde hoc plantarum genus v^{kk} per fibrillas terr[^] inherences nutrimentum hauhre videtur, q_{Uod} in ^ qu ^{Ophe} fucculentis obtinet plantis, uti id de vanis Aloes, Mefembryanthemi, aliarurnque fpeciebus fatis cuique notum eft.

T .A-

T A B U L A D U C E N T E S I M A .

M'Elocatlus trigonus, brevibus aculeis munitus, flore albo, fru&lu coccineo. *Plum. Cat. pi. p. 19. Toarn. inf. p. 653.*

CACTUS trigonus, repens; fpinulis quaternis, fibaduncis.

Ficoides Americana; feu *Cerms* criftatus, foliis triangularibus, profunde canaliculatis. *Plu&n. jilmag. p. 147. Tab. 29: Fig. 3.*

9> *Cereus* Americ. triangularis, radicofa. *BradLhiJl.pl. Succ. p.4.*

F I G U R A P R I M A .

Haec eodem modo, quo prior crefcjt, fed articuli longiores > profundius fulcati, fpina? que curce rariores & latiores, & quafi aduricae; *Flos* inftar primse repentis fpeciei, fpeciofus, ingens, & ample fefe exten-dens, fed fquamse calicina? inermes penitus, nee ullis fpinulis armatse, uti in aliis fquamis inprimis inferioribus', ita ut hse planta? in plurimis partibus convenient, in paucis difFerant, atque fi quis eas pro varietatibus tantiim' habere velit, per me licet, quum vero *Plumier*. eas diitinx-
Vit i £z ego has separatas proponere debui & volui.

M'Ekcaflus trigonus, alias, repens, fru&u coccineo₃ exinflila Sanc-tas Crucis. *Plum. Hi/I. mif. Tom. -\$.p.\\$<*

CACTUS caule triangulari, arciculato, margine flnuofb, fpinis fafciculatis.

I *Cadus* repens, triangularis. *Linn.fpec.p. 468. no* 13 ?*

Gereus fcandens minor, trigonus, articulatus, fru&u fuaviffimo. *Herm. Pqr&ad. Batav.p. 118. cujus icon cum noſtra optime quadrat. Boerb. fad. H. L.B. torn. \p. 293.*

Caflus debilis, brachiatus, aequalis, trtquetrus, fcandens vel repens, fpinis breviffimis, confertis. *Brouw. tiift. Jam. p. 238- no. 6.*

Cereus Peruvianus, amplexicaulis, articulatus, fr. rotundo, maximo, cocci-
ivto. *Herm. Par. Bat. Pr. f^olk.fl. Norimb p, 97.*

F^Ss- Indica^o\lo triangulari, enififormi, ftellatim aculeato. *Sloan. Cat.ph :ijjam. p. 196. &c,*

FIGURA

SECUNDA.

Idem, uti in prioribus, in hac quoque obfervatur crefcendi modus, unde haec plantse ab au&oriBus quam maxime inter fefe confunduntur, paucas collegi Botanicorum denominations, quas fingulis competere mihi vifas iuere, incertas rejici, novasque, quae magis convenientes vide-bantur, adpofui, Leftor judicet & inquirat, cumque aliis comparet. Quique porro ipfarum crefcendi modum, internamque ftru&uram fci-redefiderat, adeat *Herm. Par ad. Batav. p. 112 & 113.*

i94. PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA DUCENTESIMA PRIMA.

M Elocadus minimus, lanuginofus, & tuberofus. *Plum. Cat. p. i\$**
Tourn. infi.pt 653.

CACTUS fefilis, fibrotundiis, tuberculofus, mammillaris.

Opuntia, Echinomeloc&i efEgie, tuberoiā, fru&u leviffimo, ame~thyftino. Breyn. Prodr. 2. p. 87.

Echinomekaclos minor, Ja&efcens, tuberculis minoribus, Her m. Par ad. Batav.p. 138.

Ficoides, feu MelocaElus minimus, lanuginofus, fpinis mitioribus, iru&U fparfim egrediente. Plukn. Pbyt. Tab^rF. 2. Bradl. decur 3-/>. ***

FIGURA PRIMA.

Planta fefTilis, terrae penitus incumbens, radices undique fpargens fimpli ces, ad extreum bifurcatas, alblicantfes.*

'Tota hujus plantas compages confiru6la eft ex numerofis, oblongisq^e "tuberculis, initar mammillarum protuberantibus, & in fuprema par:e tenuiffimis fpinulis cum lanugine intertexta armatis, quarum paucae ab Au6lore in inferiore plantse parte delin^atae funt, uti & Flofculus a* cum Fru6tu f,& diflēcl:o c, ac feminibus rrrinutiflimis d, ieparatim i^ Tabula confpiciuntur, quas, uti iri altera hujus fpecie Ifuum brtum uniuqe ex papillis, ipfarumque interficiis obtinebunt.

NB. In ordine iconum *Plumierii* fequeretur jam *Meloch&us* purpureus, fpinis in fpiram contortis *Cat. p. 19.* fed quum hie tantum variat fulcis oblique & fere in fpirari duftis a *Melocatto vulgari majorc*, qui cuiyisr¹ notus, & toties jam delineatus eft, cujusque optima Figura m *Bradl: dec. iv. tag. 9.* occurrit, hinc eum omittimus, vocaturque Echinome~loca&tus major, non la&efcens, coflis obliquis ab *Herman Par ad. Bat** p. 136. ubi vide reliqua ad hafce plantas pertinentia.



XVXEdicago arborea, aculeata, pdlyphylla. *Plum. Cat.pi.p. 8.*

M E D I C A G O leguminibus lunatis, margine integerrimis, foliis piiif^tis, foliolis oblongis, caule aculeato, arboreo.

FIGURA SECUNDA.


Planta arborea, cujus caulis & rami aculeati ftipulis geminis, fpinofis, & Z^recurvis ad ortum pinnarum & ramulorum.


Folia pinnata. Foliola oblonga, integerima, nunc novem, nunc fep~tern, nunc quinque, nunc obpofta, nunc alternata, ita ut Natura nul~lurn certum ordinem in hac videatur obfervare planta.

Flores terminales ac racemofi, vulgaris formae.

Legumen eit reniforme, feu lufiplatum, nee dentatum.


Finis Fafciculi Octavi,





EPIDENDRUM

full is rmicalibus.laiiceoL






Fig. 2.

EPIDENDRUM
foliis oblongis, avenis

Fig. 1.

EPIDENDRUM
foliis subulatis; lipis unifloris




Fig. 1.
EPIDENDRUM
foliis caulinis lanceolatis

Fig. 2.
EPIDENDRUM
foliis caulinis oblongis.










Fig. 2.
EPIBENDRUM
foliis radicalibus fibulatis.

Fig. 4.
OPHRYSE
bulbis filiformibus.



Fig. 2.
EPIDENDRUM
folia ubradicalin
lanceolata, unervis.

Fig. 1.
EPIDENDRUM
folia radicalibus








EPIDENDRUM loliis ovato-oblongis, nervosis.




I. i M o b O i: i M ,
ttiiii, in i-voliii. In*(e)* volatiss.




LIMOHOTRIA
folia nervosif. oblonga




CACTUS octangularis, erectus.






CACTUS ramuliflorus, articulis squamibus.




CACTI S *rwjimux urrkuli* oltlongis, triquetris.






C\CT' s . rectus, ramulosus, undecim- angularis.




CACTUS caule tereti,
arborescens, spinoso.

C V I T I S t m i t i f ?, j u u l i M . r a m o l u s



C A . C T I S • " t i c u l a t o - p r o f i l e , a r t i c u l i s g l o b o l i s "

TAB. CXI.





CACTUS caule triangulari articulato.

Fig. 1
CACTUS trigonus, repens spinula quaternis.



M I ! [> ICA-GO Ti; ill! ltilpl]- lunatis.
foliis pittnatii

CACTUS feddei or bergerianus.

P L A N T A R U M
A M E R I C A N A R U M
F A S C I C U L U S N O N U S ,

Continens Pkntas, quas olim

C A R O L U S P L U M I E R I U S ,

Botanicorum Princeps

Detexit > Eruitqiiie*

A t q u e i n I N S U L I S . A N T I L L I S i p f e d e p i n x i t

Has primum in lucem edidit,

Concinnis descriptionibus, & Obfervationibus>


i^Eneisque Tabulis illuftravit

J O A N N E S B U R M A N N U S , M . D ,

Athenai illujlris, & in Horto Medico Amfteladamenji

P R . O F F E S S O f c - B O T A N I C E S ,

*Academic Cafarea Nature Curioforum Socius, Regiaque Societatis
Scientiarum Upfalienjis Collega-*



Sumtibus Au&oris,
fr oft ant Amfteladami in Horto Médico,
Atqiie

Apud P E T R U M S C H O I J T E t f j
6? L U G D. B A T A V.

Apud GERARD. POTVLIET, & THE ODOR. HAAK,
M DCC. LIX,

DOCTISSIMO & CELEBERRIMO VIRO,
JOANNI GESNERO,
MED. DOCT.-
PHYS. & MATHES, PROFESSORI
IN LYCEO THURICENSIS,
REVEREND. SANONICORUM COLLEGII
MEMBRCTDIGNISSIMO;
ACADEM. IMPER. NATUR. CURIOS.
SOCIET. REGIIS SCIENTIAR. BEROLIN. SUECIÆ,
UPSAL. GOTTING.
•PHYSICO-BOTANIC^ FLORENT,
&
PHYSICO-MEDICÆ BASILENSI ADSCRIPTO,
BOTANICO CONSUMMATISSIMO,
AMICO VETERANO CANDIDISSIMO,
N O N U M H U N C
PLANTARUM AMERICANARUM
F A S, C I C U L U M.

EO, QUO PAR EST,
AMORE DEDICAT

JOANNES BURMANNUS.

PLANTARUM AMERICANARUM FASCICULUS NONUS.



TABULA DUCENTESIMA SECUNDA.

M*Mimosa humilis*, frutefcens,⁹ & spinosa, filiis conglobatis. *Plum.*
Cat. pi Amer.p. 17.

MIMOSA aculeata, foliis quadripinnatis, foliolis numerosis ovato-acutis, capitulis globofis.

9> *Mimosa* foliis fibrodigitatim pinnatis, caule aculeato, hispidi. *Linn. fpec**
p. 518. no. T4,

Mimosa caule aculeato, foliis pinnato-palmatis &c. *Linn. H. Cliff Jp.* 208.
no. 3. ubi vide reliquos Aurores.

Planta fruticosa-herbacea, humilis, ramo[^], procumbens.

Radix, late diffusa, brachiata, fibrillosa.

Caides lignosi, aculeis recurvis, vagis, ad ramorum & foliorum ortum geminis exasperati, apud nos fibrigosi & hirsuti, quod ex *Plumierii* icona, non patet.

Petiolum communis quatuor folia pinnata ad apicem fuftinet, que ad tactum fefe contrahunt, & fibi incumbunt, uti in foils occafa.

Foliola numerosa, a decem ad duodecim utcunque obpofita, ovato-oblonga, feu oblongo-acuta, integra, glabra.

Flores in capitula congefti[^] quorum partes in *fpec. pi.* a Cl. *Linriae de**

Legumina flint filiculae planae articulatae, hirtae, plurime[^] adunatae, quafl palmatae, in tres ifthmos, feu articulos diftinctas, uti ex separata marginali patet.

Quam maxime fenitiva est haec species in hortis nostris, & in variis Americas locis vulgatissima, e quibus femina copiose deferuntur, licet & quotannis apud nos maturefcant.

N.B. In *Plumierii* iconibus fequitur •

198 PLANTARUM AMERICANARUM

Mombin arfctor, Fraxini foliis , fru&u luteo racemofb. Plain* nov.
gen. p. 44. quae eft

SPONDI AS. *Linn. H. Cliff.p. 489. Scfpec.p. 371. &*

Spondias foliis plurimis pinnatis, ovatis, racemo terminali &c. *Brown.*
Hi/I. Jam. p. 229. &

Myrobaknus Fraxini folio alato. *Sloan. Hifi. torn. 2. Tab. 219. Fig. 1 & 2.*

Pruhus Americana Merian. Surin. p. 13. T. 13. cuius icon quum faiis accurata fit, illam *Plumierii* non addimus, quae tantum foliaturam & Fru&us continet ex racemo dependences, Foliola vero funt uncicim obpofita cum inpari, ovato-acuminata , venofa , integra , nee ierrata.



TABULA DUCENTESIMA TERTIA.



NjLori/bna, arbor j Nucis Jugl^ndis folio. *Plum. Nov. Gen. p. 36**
MORISONIA. *Linn.fpec.p. 503.*

Planta arborea.

Kami fimplices, teretes, alterni.

i^walterna, petiolata, venofa, ovato-obtufii, glabra.

Flores in ramis lateralibus racemofi, quadripetalii, ab *Jlnftore L c.* ulte-
rius defcripti.

Frudus plures simul dependentes ex pedunculis geniculatis, craffis, *sphæ-*
rici, giabri.

Semina m pulpa nidulantia, reniformia, quina.

Obfervatio. Haec arbor quoad frudus maxime adfinis eft, & in p *jurimis*
convenit cum *Capparidibus* Indicis, unde & a Syftematibus hodiernis
in ordine naturali iis subjungitur; cceterum M ORISON A vocata eft ap
auftore in memoriam Botanici fummi *Kolerti Morifoni^* Profcloris
Oxonienfis, qui integrum Plantarum Hiftoriam in folio confcripHt*
aliisque operibus cuivis Botanico notus eft, fed qui mifere vitam fin¹
vit, e redanempe, utifcribunt, prsecipitatus, & capite *com*molitus
interiit.

TABULA DUCENTESIMA QUARTA.

Morus, quae Tata-Iba, aculeata, fru&u villofo. *Cod. Plum.*

MORUS foliis ovato-lanceolatis, ferratis, ftipulis fubulatis.

Morus foliis ovatis, hirfutis. *Linn.Jpec. p. 986. no. 7.*

Morus Iablefcens, foliis oblongis, acutis, paginis exterioribus productioribus, ligno citrino. *Broinv. Hifi. Jam, p. 339.*

*Mom**, fru&u viridi, ligno fulphureo tinftorio. *Sloan. Hifi. Jam. torn. 2. p. 3. Trff. 158. /%. 1. ..*

Zuntboxykim aculeatum, *Carpini* foliis, Americanum, cortice cinereo. *Plukn. Almag.p. \$96. T. 239. Fig. 3.*

TATA IBA *Marcgr. lib. 3. cap. 14.*

Planta arborea, cortice cinereo, " scabro obdupta.

Folia alterngta, ovato-lanceolata, acuminata, finuofb'ferrata, venofa, craila 5jniiiriuta j fh'pulk fiibulata fupposit^.

Fruttus villofi, ad laterales ramulos coadunati, fefiles, virentes, dulcis, graticque faporis.

Ex *ligno* per coctionem tinclura flava elicetur tingendo apta, de qua vide *Marcgr. & Sloan. I * & licet laudatI auCtores icoacm dederint hujus arboris, omne^ imperfe6iae Hint, multoque inferiores ilia *Plumierii*, quam hinc exhibere oportebat.*



TABULA DUCENTESIMA QUINTA.

Muntingia folio fericeo, molli, fruciū majore. *Plum. Nov. gen. p. 41.*

UUN TIN GIA. *Linn.fpec. p. 509.*

Muntingia pedunculis unifloris. *Linn. H. Cl. p. 203.*

Muntingia fruticofa & villofa, foliis ferratis, oblongis, ab uno latere brevioribus. *Brouw. Hifi. Jam. p. 245.*

Mefpilus Americ. Alni vel Coryli foliis, fru&u mucilaginofb, albo. *Com* met. H. Amft. vol. r p. 145. Tab. 80.*

Calabura alba. *Plukn. Aim. p. 75. Mant. 34. Tab. 152. Fiig. 4.*

Loti Arboris folio anguftiore, Rubi flore, fructu polyfpermo, umbiliato. *Sloan* Cat. p. 162. Hifi. Jam. 2. p. 80. Tab. 194. Fig- 1.*

200 PLANTARUM AMERICANARUM

Flanta fruticofa, in natali fblo arborea juxta *H. Cliff'*, cuius
Kami feniores nudi, fufci, juniores fimplices ac pubefcentes, in quibus
 gemmae villofie, &

Stipula filiformes, pilofae, decidulaa.

Folia alterna, lanceolata, ferrata, nervosa, supra viridia, fubtus tomeri" tofa, oblique cordata, lobo bafeos altero rotundiore, altero obfbleto.

Florss ex quavis ala singuli pedunculati, feu pedunculi axillares, folitarii j uniflori.

Calice contenti hexapetalo, cum totidem *Corolla* petalis, ad unguis angustatis, uti in separatis floribus A & B patet, quibus tamen a prim³ riis fyfematicis *Calyx* quinquepartitus & corollae petala quinque ~~ad-~~ numerantur.

Germen ovato-obtulum, villosum Ĉ.

Fruflits eft *Bacca* globofa, umbilicata, D_y unilocularii E.

Semina numerofa, fubrotunda, in pulpa nidulantia F.

Obfervatio. Unicam hodie *Muntingia* fpeciem modo agnoscimus, ~~bino~~ enim *Jlutoris* fibfquentes fpeciesy potius ad *Rhamnos* pertinent, & licet hasc planta a variis fuerit denominata & iconē denotata, a nemine tamen haētenus genuina ejus figura fuit propofita, quē cū Auctoris comparari poteft, hinc perfe6lam dare neceſlē erat: di6hiſſ · vero ~~fi*~~ hoc genus in memoriam Abrah. *Mimlingii* Botanices ProfeiE Groningenfis, qui variis egregiis inclaruit, & apud Belgas notas eft, op~~J~~th bus, dolendem vero eft, figuræ Phytographiae fias rion tarn fidas efie quam quideiu mtide fiint Im'culptae, plurea cuitu in iia iuvēniuutur fpU* riae, ac naturae contrariae.

TABULA DUCENTESIMA SEXTA.

jSjLUntingia folio Corni, fruftu minore. *Plum, nov.gen.p.* 41.

RHAMNUS inermis, foliis ovato-lanceolatis, obliquis, pubefcentibus, ftipulis lanceolatis, acuminatis, deciduis. *Linn. Sy/l. Natur. edit** decim.

Rhamnus, an *Zizyphus* arborefcens, foliis oblongo-acutis, hirfutis, & l^e* viter ferratis, floribus minimis, racemis alaribus. *Brouw. Hi/I, J^{a/o},* p. 173. ubi caratter & icon.

F I G U R A P R I M A .

*plant**

Plant a arborea.

Rami fimplices, inermes.

Folia alrerna, trinervia, cordato-lanceolata, altcro latere anguftiora, unde parum obliqua, ferrulata, firpra fcabra, fubtus moJJia, petiolata[^]

Stipule membranaceae, ferrugineae, acuminatae, decidulae.

Racemi florum breviflimi in alis, qui umbellas formant axillares, minimas.

Flares fru6lusque uti in *Rbamnis*, unde ad eos pertinet.

M *Untingia* folio Ulmi afpero, fru6lu minimo glomerato. *Plum. nov.*
gen. p. 41.

R H A M N U S inermis, foliis ovato-oblongis, fcabris, ferratis, floribus axiliaribus, fblitariis, fructu pedunculato.

Ulmus frudù baccato *Linn. H. Cl. p. 83.*

Loti arboris folio anguiffimo, arbor baccifera, fru&u minimo, croceo, monopyreno, *Sloan. Cot.p.iftypift. Jam. 2. p. 80.*

Baccifera arbor Indica, florum ftaminibus binis, acinis monopyrenis. *Ray. Hiftp. 97*

Salvifoliav&rbor Orientalis, foliis tenuiffime crenatis. *Plukn. Aim. p. 329.*
Tab. 221. Fig. 4.

Maliam Toddali. // *Malab.Jom*, 4. p. 83. Tab. 40.

F I Q U R A S E C U N D O ^

Planta arborea; in utrisque Indiis crefcens*

Rand tenues ac teretes.

Folia alterna, ovato-oblonga, fere trinervia, fubtiliter ferrata, atrovirenti[^], rigida, afpera, & fcabra, fubtus pubefcentia, mollia, pallidiora, nervis protuberantibds,

Florcs axillares, fimplices, quinquefidi, turbinati &c.

FruEtus bacca pedunculata, unico femine duro fceta, unde ad *Rhamnum* merito pertinet, licet multum de *Ulmo* participet.

In ordine Iconum *Plumier.* fequitur

3fenyantbes Nympha?ae folio, flore albo. *Plum. Cat. p. 3.* fed quum haec optime fit delineata in *H. Malab** torn 11. Tab. 28. earn non exhibemus.



TABULA DUCENTESIMA SEPTIMA.

M *Yrtias* pomifera, latifimis foliis. *Plum, Cat.pl Amer.p. 18.*

M Y R T U S foliis ovatis, frudibusompfis, trilocularibus.

FIG U RA P R I M A.

Aaa

Planta

Pianta fruticofa." Kami dichotomi.

Folia avata^ laevM, acuminata.

FloresbX iFruCluscoacervati.

Obfervatio. . Fades plantas, ac foliatura affinitatem indicant Myrti Zeylanioe, quae vulgarissima in noftris-hortis, fed rarissime floret. Pecujiare autem est, quod auctor, florutn petala pingat quinque, eaque ferrata, turn & fru&us triloculares. Vide porro *Linnai Fl. Zlf%*. 81. *dzjpec.p.* 472, no. 4.

Hujus & akera varietas in *Plumierii* iconibus reperitur, quae est
Myrtus latifolia, floribus purpureis, baccis aut niveis aut nigro-purpureisi
Plum. Cnt.pl. p. i&

piñot& diffent, fructumque profert bilocularem, dimidto minbrem.

*M*yrtus latifolia, etc, foliis longis & angulis. *Plum. Cat. p. 18.*

MYR TVS foliis linearibus; floribus axilkribus, geminis, peduacuhtls.

FIGURE

SECUNDA.

Pianta fruticofa. Rami dichotomi.

Folia obpofita,, ^lbfe^!^, ImawU, ^nm1mn, na<ro crailb decurrente>

Fhres ex alls racemofis, quadripetali, ftarainofi, calyx cuadrifidus A.

Fndus fphasricus, pomofus, tribularis, uti in difTefo B.

Semina tria, angulola, in. pulpa nidulantia C. C.

TABULA DUCENTESltflA OCTAVA.

*M*yrtus foliis Laurinis; baccis e csruleo nigris. *P/«;«, Cat. p. 18.*

MYRUS foliis rovatQ-l^nceplatis, floribus corynbxtis.

Myrtus, arborea, aromatica, foliis Laurinis. Sloan. Cat. p. 161. Hifi.

jam.vol. 2. p. 76. Trt£. 19:: ,%. 1.

P- Myrtus foliis, Janceolato-ovacis. //»»». /7. Zeyl. pag. 83.

F / G U R A PR j M A.

Pianta fruticofa, Rami teretes, vix divifi.

Folia ovato-Janceolata, obpofita, acutiinata, integerritna, cralTa, venou, vix periolata.

Corymbi laterales, compofiti^ Lifidi.

Frulhs, baccaeob^ngKj firiatae, umbilicat®.

Semina oblonga, obtufa.

Myrtus

M_{yrtus}

Cotini folio. *Plum. Cat. pi. p.* 19.

MYRTUS foliis alternis, ovatis.

& *Myrtus* foliis alternis. *Linn. Fl. ZeyLp.* S3.

Myrtus aromaticus India? Occidental, foliis & fruchi rotundis, feminibus fere orbiculatis, planis. *Plukn. Aim. p.* 83. *Tab. 155. Fig. 3.*

FIGURE • S E C U N D ^4.


Planta fruticofā. *liami* fimplices ac breves.

Folia bīata, venofā, vix petiolata, utcunque alternata, integerrima.

Flares terminates, racemofī, pedunculis binis obpofitis, interdum tertius major, medius, ac. fēllis uti ad A.

In Icōnibus *Plumierii* alia subfēquitur species, ipfi di&a, *Myrtus* arborefā cens, Citri foliis glabris, fru&u racemofb, *Caryophylli* fapore. *Plum. Hift. MJJ. vol. 7. p. 79.* qua? eft *Caryophyllum aromaticus*, Americanus, Lauri acuminatis foliis, fru&u orbiculari. *Plukn. Phyt. Tab. 1 ^5. Fig. 4.* quas cum *Auftoris iconē* quadrat, ēarn exhibēre inutile eilet, vocatur h̄j*c porro *Myrtus* foliis obverfē ovatis. *Linn. FL Zeyl p. 82.*

Obfer'vato. Optime^CI. *Ldnnaus* in *FL Zeyl.* notat, quod ha? /ndiccB Myrti species plura hābeant in fructificatione cum *Myrto* communia, fed noh omnia, ita^ut qutifi mediae fint inter *Myrtumdz Caryophyllum** fique eas separare quis velit a *Myrtis*, illas ad *Myrclam* referre poiTe, cuius cara<5terem latius ibi dehnit. • • • >



TĀBULA DUCENTESIMA NONA.

N'Hendiroba

(candens, foliis hederaceis, angulofis. *Plum. nov. gen.* p. 20.)

FEVILLEA foliis cordatis, angulatis. *Linn. spec. p. iōii. no. 1.*

FevilUa foliis crafloribus, glabris, quandoque cordatis, quandoque trilobis. *Brouw. Hift. Jam. p. 374,*

Planta farmentofā, fcandens, hederacea, *cirrbos* ex alis emittens fimplices, spirales.

Folia petiolata, fblitaria, craffa, glabra, cordata, vix angulata, integerrima, feu indivifa, fubdentata, formā Bryonice.

Racemi florū ramofi.

Flores fecundum au&orem monopetalī, rotati, mujifidi, quorum alii fteriles A A, alii foacundi B: juxta *Brouvo.* alii fūnt mafculini, alii feminini, horumque charact:erēr exācle definivit; plantamqie ipfium Dioeciam ftuit inmerito, putatque han'c folia gerere nunc cordata, nunc triloba, ita ut eandem faciat cum fubfēquente, quae tamen penitus diftiptae ac diverfae fūnt plantae^ uti ex iconibus liquet, fed mirum eft, hanc modo folam ab autipre in novis generibus fūnt enumeratam, dum utriusque plantae %uro3 in fuis delineationibus inveniantur, quod forte decepit Cl. *Brouvo.* unde pro unica ambas hab. uit fpecie.

204 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA DUCENTESIMA DECIMA.



1\l *Handiroba* foliis trifidis. *Codic. Plum.*

FEVILL[^]IA foliis trilobis. *Linn. Jpec. p.* 1014.

Ghandiroba feu *Nbandiroba*. *Marcgr. Brafil. lib. i» cap. 22. p. 46. Sloan.*

¹ *Cat. p. 85. Hi ft. Jam. vol. i.p. 200. Ray. Hift. 1875.*

PajJiflora adfinis, *Hederge* folio *Americana*, *Nhandiroba Brafilienibus.*

Piukn. Pbyt. Tab. 210. Fig. 4.,

Phnta haec quoque farmentofa eft ad alas capreolata, qua?, cirrum emit-
tit convolutum, fimplicem.

Folia in ramis fimplicia, petiolata, profunde triloba, laciniis tribus lan-
ceolatis integerrimis, externis bini§³ appendicibus feu auriculis auftis.

Folia ad flores sextuplo minora, triangularia, acuminata, triner-
via.

Flores ad alas feffiles, fblitarii, qui in priore fpecie racemofi ei.^ntj alte-
riusque forma?, ita ut plantse. partes fint penitus diftin&ae.

Frudas ad priorem fpeciem delineati, & ab^auftore in *novis*gener.* /• &
di/tinde defcripti.

Auftoris noiiicen *NharuitTuba* efl baibaiuui *Ainciluuin*, <juoj juxca re-
centiorum fyfema rejiciendum, hinc aliud fubftituit Cl. *Linnaus*, FE-
viLLiEAM nempe in honorem *Ludovici Fevillee^* qui inclaruit PJantis
Peruvianis, aliisque Phyfics Operibus.

TABULA DUCENTESIMA UNDECIMA.

N*Icotiana* arborefcens, fpinofrffima, flore exalbido. *Plum. Cat. pi'*
Amer. p. 38. Town. inji. p. 117,

NICOTIANA foliis cordato-crenatis, corollis racemofis, flbringcn-
tibus, caule arboreo, ftrigofb.

Planta arborea,

CiwZt hirfuti, pungentesque, flrigofi.

Folia maxima, cordato-ovata, crenata, coflis fpinofis, l^irfutis.

Racemi alternati, divifi in fimplices floriferos minores, fuperius revolu-
tos., totosque hifpidos.

Corolla alternata, fubfeffiles, .ringens, calice acuminato, hirto con-
tentia.

Frudus eft *Capfula oblongz*, biocularis, bicprnis, glabra, uti in mar-
ginali Figura.

Obfer-

Obfervatio: In plurimis haec planta convenit cum. *Nictitiana glutinofa* Linn. fpec. p. 181. no. 4. Foliis nempe cordatis, racemis simplicibus, revolutis, & corollarum figura, sed differt caule, petiolia, pedunculis, & calycibus trigonifis, in primis vero foliis crenatis, unde eas combinarne non aufus fui, licet hse fibi maxime fint ad fines, & forte tantum variantes.

K. B. In ordine Iconum *Plumierii* sequitur

Nympbaa foliis carinatis j rmaximis > acute crenatis, flore albo. *Plum. Cat. pi. p. 7. & Tourn. infl. l. 260.* quod est *Ambel. H. Malab. torn. Ki. Tab. 26.* &

Nympbaa foliis carinatis minoribus-jstufé crenatis, flore albo. *Plum. Cat. p. 7. Tourn. inj. p. 26.* quas est

Nympbaa Indica>*major. Rumpb. Herb. Amb* lib. xi. cap. \$0. Tab. 73.*

Quumque hse plantae ab aliis infuper auctoribus sunt defcriptas, & optime iconibus delineatae, hinc superfluum est, eas denuo exhibere, de quibus vide obferv. meas ad *Riimpbii l. c.*



TABULÀ DUCENTESIMA DUODECIMA.

O*Ldenlandia humilis, Hyflbpifolia. Plum. nov. gen. p. 42. Erhet. Tab. 4. Fig. r.*

OLDENLANDIA pedunculis quadrifloris, foliis linear-lanceolatis.

Oldenlandia pedunculis multifloris. Linn. fpec. p. 119. no. 4.

Oldenlandia minor caule teretino, foliis linearibus, opofitis, ramulis minimis floriferis, pedunculis ramofls, vel simplicibus ad alas. Brouw. Hift. Jam. p. 146.

FIGURA P R I M A.

Planta herbacea, humilis.

Radices fibriWofx, pufillae.

Caulis ramofillmus, prostratus, articulatus, geniculis craffiufulculis, ramis alternatis.

Folia opofita, linear-lanceolata, bafi connata, feffilia, integerrima, nervofa.

Pedunculi axillares, folio longiores, superne quadrifidi.

Calyx supra germen, foliolis fulbulatis cVc,

26 PLANTARUM AMERICANARUM

Obfervatio. *Flumierii* tempore unica tantum hujus generis plantila nota erat; nunc quatuor a *Linnao* *mfpec.* recenfentur species, in utrisque Indus nafcetites, qu33 pedunculis floriferis inprimis diftinguuntur, & ab au&zore noftro hoc plantae genus OLDENLANDIA vocatur inmemoriām *Henr. Bern. Oldenlandi* Germani, *Paali Hermanni* Profeflbris Dtfcipuli gnaviffimi, qui plantarum ftudio in Caput Bonae Spei profe<5ta^s fuit, ibique numerum plantarum infignem fedulo collegit, quas ornnes fingulari candore & munificentia nuper mihi obtulit & elargitus eft Collega honoratififimus *Gulielmus Roellius*, Anatomes & Chirurgia? Profeflbr dexterimus, cujus itaque beneficio totum illius Herbari¹¹¹ poffideo.

O*Leafier Antilianus*, baccis in mai Tam compa&is. • *Plum. Hifl> "If*
Tom. v.p. ioo.

CORNUS foliis ovatis , gkbris , obpofitis , alternisque ; corymbis axillaribus, pedunculatis.

FIGURE S E C U N D A.

Planta arborea.

Hand teretes, glabri.

Folia ovata , acuminata, venofa, glabra , integerrirca , petiolata \ ad genicula obpofita, reliqua alterna, quum in aliis Corni fpeciebus Tint obpofita.

Corymbi ex alis pedunculati, copiofas gerentes baccas, oblongiufculas, nudas.

Obfervatio. Videtur media inter *Viburnum nudum*, & *Cornum fanguineum Linnai*, fed quum baccae fint oblongae & nuda, & nucleus unicus 3 hinc magis ad *Cornum* accedit, quum vero flores defunt in ico- ne, in patrio *folo* ulterius indagandum genus.

- N. B. In ordine iconum *Plumierii*[^] species PALMARUM feptendecim¹ subfequuntur, quarum plures quum in *H. Malab. Herbar. Amb. S!/>a^m nei Hi ft. Jam.*, aliisque fint defcripte & exhibits, illas nunc non addemus, fiquemajoriptio frui alio tempore concedatur, forte totam P^amarum hiftoriam, ac species elaborare & extricare conabimur, nunc in separatis pergitus plantis; primaque eft, quae in ordine fequitur *Parkinfonia aculeata*, foliis minutis, uni cofiae adnexit. *Plum. nov. g¹** p. 25.

Dum vero tec a Cl. *Linnao* in *H. Cliff*, p. 15[^]. j_a m optime fit exhibita & defcripta, fuperfluum foret, earn denuo obferre, unde eo oblegamus. Botanicos, vpcaturque *Parkinfonia aculeata*, foliolis minutissimis, pinnatis, penna longiore comprefTa a *Brouw. Hiji. Jam.p.* 222.

TABULA DUCENTESIMA DECIMA TERTIA:;

Oxys lutea, frutefcens, Trifolit bituminofi facie. *Plum,Cat.pl.p,2%*
Ray, Hi/I, torn, 3.I). 548. no. 8.

OXALIS caule fruticofb, foliis ternatis, intermedio petiolato. *Lam,*
Jpec.p.^no. 13.

F I G U R E P R I M A .

Plania fubfrutiçosa, ere&a, vixramofa.

Radix brachiata, diffusa, vix fibrofa.

Petoli longiflimi, vagi.

Folia terna, ovata, venofa, integerrima, medio maximo, petiolato.

Flores verticales, in pedunculis longis trifloris, petala plana, emarginata, qoina.

Frudus, flint filiculse corniculatae, glabrae, uti in congeneribus.

Polygonum aliud., maririum, fruticofum. *Plum, Hift. mj]. torn, iv.*
p. 96.

DAPHNE? floribus terminalibus, pedunculatis, ramis articulatis, fibrillis linearis oblongis, quaternis.

\$ Thymea maritima, Ericae foliis, furculis tumidis & tomentofis. *Sloan,*
Hift. Jam.1. Tab. 202. Fig, 1.

FIGURA S E C U N D A .

Plant a fruticofa ac ramofa.

/fdwi dichotomi, articulati.

Folia ad genicula quaterna, duobus paribus obpofitis, linearis oblonga,
glabra.

Flores terminales, fblitarii, quinquefidi, pedunculati, quorum interna
 itrufturam ex fola iconenemo facile determinabit, unde in fblo natali uke-
 riūs inveftigandi cum reliquis fructus & fruticis partibus, qui quam maxi-
 me fingularis efl:, uti exfoliatura & geniculis patet, hinc forte peculiare
 conftituet genus, alioquin, fi ex forma externa quid concluderem, pu-
 tar.em. accedere 3d Thymelaam maritimam *Sloanei*, vel ad eas Thyme
 /igfpecies, quasexhibui in Decade pi. Afric. quinta, ac prcpfertjm ad
 illam, quæ Tab. 49- Fig- 1. eft delineata, & à Cl. Linnao mspec. p.
 358. wo. 10. ad Dapnem relata eft, ciii crederem *Plumierii* plantam
 proxime accedere & adfinem efl.

208 PLANTARUM AMERICANARUM

tabola DUCENTESIMA DECIMA QUARTA.

P Enaea arborefcens, Buxi folio afpero. *Plum. nov.gen»p. 22.*

POLYGALA floribus inberbibus, lateralibus, fblitariis, caule ar*
boreo, foliis obtufis, petiolatis. *Linn.Jpec.p. 703. no. 8. Aman.Acad.
vol. 2.p. iap.no. 14.*

£ *Polygala arborea*, foliis lanceolato-ovatis; capfulis compreffis, biiobis,
ultra medium divifis. *Brouw. Hi/I. Jam. p. 1287. no. 4.*

FIGURE P R I^r M A.

Plant a arborea.,

Kami fubdivifi, laterales. •

/b/^oblonga, obtufa, petiolata, alterna, integerrima, fcabra.

Flores ex singula ala singuli, pedunculati A.

*FruBus QH capfiila, fubrotunda, B turbinato-cordata, C comprella, bi-
locularis D, bivalvU F.*

*Semina bina, reniformia F, unde patet veram *Polygala..effe* Ipeciem, d^
qua vide *Linn, amanit. Academ.vol. 2. p. 136.**

P Eriploca humi fe Ipargens, Linariae folio. *Plum. Cat. pi. pi 2. Town.
inft.p.93.*

TERIPLICA caule filiformi, foliis linear-lanceolatis, feflibus, ra-
cemis terminalibus.

6 *Papparam. H. Malab. torn. 9. Tab. 17.*

FIGURE S E C 17 N D A.

Planta repens, flagellofa.

Caulis filiformis, flaccidus, finubfiis.

Folia obpofita, linear-lanceolataj feffilia.

Flores racemofi, terminales.

Frudus folliculi, gemini, lineares, connati, pedunculati, acuminati j G.

Semina plurima imbricata H, coronata pappo extenlb L

TABULA DUCENTESIMA DECIMA QUINTA,

P *Eriphca* fcandens Nummulariae foliis, flore albo. *Plum. Cat pip.* 2,
Tourn. injl. 93.

PERIPLOC'A foliis ovatis, acutis, feflibus; pedunculis axillaribus,
unifloris, caule volubili.

FIGURE P R I M A.

Planta filiformis, fcandens, vel repens. -

Caules vane divisi ac finuofi, seu vblubiles.

Folia ovata, acurninata, obpofita, integra, venofa, vix petiblata.

Flores ex quavis foiii ala, uti & Foliiculi glabri, venrrico/i, fubulati, gemini.

Obfervatio. Haec planta in pluripis convenit cum Payparan // . *Malab.*
torn. 9; *Tab.* 17, quae a noflra differt, quod flores verticales, non
vero ex alis proferat, nec tam ramofa, unde propius ad priorem datam
fpeciera pertinere puto.

P *Eriphca* fcandens longif & anguftifU foliis. *Plum, Hift. mff. Tom,*
2. pag. 66.

PERIPLQCA' foliis linearibus, longiffimis, racemis axillaribus, can-
Je volubili..

E I G U R A S E C U N D A.

fjanta herbacea, jflagellofa, fcandens.

Caules fiiiformes, glabri, finuofi, ad folia nodofi.

Folia linearia, seu oblongata, transverfalibus venis diftin6la, integerri-
ma, oppofita, fefFiiia.

Flores ex alis corymbofi, seu umbellatim difpofiti.

Foliiculi utcunque terni, glabri, oblongi, ventricofi.

Semina imbricatim pofta, ovata, in fummō plumofa, a & b uti in con-
generibus.

Obfervatio. Hse tfs fpecies quam maxime flngulares funt, nee apud
alios obviceaudores, fubfrequentes vulgatores, & quas ab aliis defcriptas
funt, tantum enumerabo, quum fatis jam notee, &quaedam in hortis
nollris itidem occurrant.

In ordine kaque Iconum *Plumier.ii* fequitur

Periphca fcandens, foliis Convolvuli fru&u alato. *Plum. Cat. pi. p.* 2.
Toarn. injl. p 93, quas eft

*Cynancbw*n caule volubili, perenni, inferne fuberoft, fiflb, foliis ovato-
cordatis *Linn. H. Cliff*, p. 79. no. 6. ubi ejus defcriptio, & apud *Mo-*
rif. Sett, 15. *Tab.* 3. *Fig.* 61, ejus icon, Turn &

2io- PLANTARUM AMERICANARUM

Periploca fcand<?ns, folio Citri; fru&u maximo. *Plum. Cat.pl.* p. 2. *Tourn.*

f p. 93. qua? eft

...chum caule voiubili, frutico/b, folijs cordatfs, acuminatis, *Linn. H»*

>*[Cliff. p. 79. no. 5. ubi defer, vide &Jpec.p. 212. no. 2 & 3. eftque*

Periploca Carolin. flore minore, flellato *Dill. H. Eltb.p.* 300. *T. 229. F>*

296. ubi icon, & reliqua vide ad hafce plancas fpeclantia.

Tertia species a *Plumkr.* delineata, eft

Periploca repens, umbellata, foliis Citri, flore coccineo. *Plum. Cat.pl.* p. 2. *Tourn. injl.* p. 93. quae eft

Kaymtli-Valli. H. Malab. torn. 9. Tab. 14.

Quse flores gerit terminales, corymboflos, feu. in umbellam digeftosV
cum follipulis copiofis radiatis, acteretibus, foliisque obpoftis, ova-
vis, ac venofis.

Reftant binse alias nondum defcriptae, vel ab au6loribus delineate.

TABULA DUCENTESIMA DECIMA SEXTA.

P *Eriploca* florum divifuris circinatis & crifpis. *1?hm* Hifl. mff. Tom**
2. p. 8a.

NERIUM caule volubili, foliis ovatis, acuminatis, pedunculis alaribus,
racemofis, florum faucibus crifpis.

FIGURE P R I M A.

Plant à herbacea.

Caules volubiles.

Folia ovata, acuminata, integerrima, venofa, petiolata, obpoflta, magna.

Pedunculus ex alis racemofus,

Florum petala, fimbriata, ac retroflexa.

P *Eriploca* alia, floribus amplis, circinatis, & crifpis, feu *Neriurn*
fcandens, radice Bryoniae tuberofe. *Plum. Hi/I. mff. torn. 2.p.\$3-*

NERIUM caule volubili, foliis cordato-oblongis, obtufis, corollis un-
dulatis, folliculis longiflimis connatis.

FIGURE S E C V ND A.

Planta

Planta herbacea, fcandens.

Caulis filiformis, volubilis.

Folia ovato-finiuata, obtufa, obpofita, vix petiolata, crafla, avenia.

Flores ex alis plures, ingentes, tubuJofi, quorum petala fimbriata, ac fitrofa, ad ungues anguftata.

Folliculi gemini, connati, lineares, longiflimi, pedunculati.

Obfervatio. Ex floribus, reliquisque fru&ificationis partibus patet, hanc veram *Contortarum* eile speciem, de quibus vide *Linn&i PbiL Botan.p.* 31.no. 29. quodnam vero fit genus diftinctura, difficillimum est ex fbla icone definire, ceterum binas hafce species apud nulJum ~~autorem~~ detegere potui.



TABULA DUCENTESIMA DECIMA SEPTIMA.

Periclymenum arborefcens, floribus Iuteis. *Plum. Cat. p.* 17.

LONICERA racemis terminalibus, foliis ovato-acutis, integerrimis.

Cbiococca ? fcandens, farmentfs tenuiflimis, & fere indivifis. *Brouw. ffijl. Jam. p.* 16[^]. no. 2.

F I G U R A · P R I M A .

Planta arbo>ea.

*Ramifere*tes ac fimplices.

Folia obpofita, pctiol^a, ovato-acuta, yenofa, integerirha, glabra.

Flores terminales, corymbofi, quinquefidi..

Periclymenum racemofim, flore flavefcente, fru6tu niveo. *Plum. Hi/I., mif.tom. vi.pag.* 69. *Dilk. H. Eltb.p.* 306. *Tab.* -228. *Fig.* 295.

LIGSTRUM foliis ov^tis, acuminatis, racemis alaribus.

/3 *Lonicera* racemis lateralibus, floribus pendulis, foliis integerrimis. *Linn fpec. p.* 175. no. 13.

Lonicera racemis lareralibus, fimplicibus, laxis, floribus obpofitis, pendulis, geniculis compreflis. *Hort. Cliff.*, p. 496.

Cbiococca farmentofa, foliis Myrtinis, oppofitis, fpicis plurimis, tenuifimis & terminalibus, & ex alis fupremis. *Brouw. Hijl. Jam. pag.* 164. ubi caraftter, fed quae male confunditur cum *Pittonia Plumierib^* uti infra patebit ad *Tournefortia* species,

Jasmim folio myrtino acuminato, fl. albicante, racemofb. *Sloan. Cat. 196. Hift. Jam. vol. 2. p.* 97. *Tab.* 1S8, *Fig.* 3.

2i2 PLANTARUM AMERICANARUM

FIGURA S E C U N D A.

Planta arborea. Kami teretes, in laterales obpofitos divisi.
Folia ovato-acuminata, obpofita, vix petiolata, venofa, integerrima.
Flores ex alis racemofis, pentapetali, navi.
Frufius. Baccse fphaericce, umbilicatae, glabrae, albse, racemofe.
Obfervatio. Licet Dillen. in H. Elth. h. c, plantse fuae denominationerr
Plumierii fribus, ex iconibus, ac prae{ertim ex florum forma videntur
*alius efl generis, noftraque potius ad *Ligu/lrum* accedit, atque hinc*
a Town, in inf. p. 597. vocatur
Ligufrum** Armericanum, Lauri »folio, flore flavefcente, **baccis. nivis.
racemofis.



TABULA PUCENTESIMIY* DECIMA OCTAVA!

Per *Eridymenum* arborefcens, ramulis inflexis, flore luteo. *Plum.* ^{*at,}
pkp. 17.

LONICERA racemis fecundis revolutis; foliis lanceoktis, integerimis.

FIGURA PRIM*?.

Planta arborea. Kami teretes, dichotomi.
Folia lanceolata, obpofita, petiolata, venofa, integerrima.
Flores paniculatl, ex racemis revolutis compofiti, tubulop^a, quinq^{ue}
dentati b, cum totidem flaminibus, ac ftylo oblongo, cper cpr iuu
quinque dentatum d eft.

Per *Eridymenum* arborefcens, ramulis inflexis, flore corallino. *Plum.*
Cat. pi. p: 17.

LONICERA racemis fecundis revolutis, foliis ovatis, quaternis.

FIGURA SECUNDA.

Planta arborea. Kami teretes, fimplices.
jFWircruciata, quatuor obpofita, ovato-acuminata, glabra, venofa, integrerrima.
Flores terminales, corymbofi, in racemos colle6li, quorum fuperiores
circinnati.
Corona tubulofa^, ftriata/", quinque dentata g, cum totidem flaminibus
fubulatis b, ac ftylo fubulato bifido i.
Hc8 bins videntur magis varietates, quamdiainclœ species, licet foliatu-
ik differant.

TABULA DUCENTESIMA DECIMA NONA;

P*JL Etiveria* Solani foliis, loculis spinofis. *Plum. nov. gen. p. 50.***PETIVERIA. Linn. H. Cliff, p. 141. spec. pi. p. 342.***Petiveria* foliis oblongo-ovatis, spicis longioribus terminalibus. *Brouv.*,*Hi. Jam. p. 274.* ubi ejus cara&er.*ViKbprsa* aut *Scorodonria*. affinis, anomala, flore albido, calyce-afpero,
-illii odore. *Sloan. Cat.p. 64. Hift. Jam. torn. 1. p. 172.**Planta* fruticofa.*Kami* ftrigofi, teretes,*Folia* ovato-lanceolata, verfys bafin anguftata, alternata, undulata, integra, venosa, petiolata, ad &morum divifioncm majora, & flipulis geminis inflexis notata.*"Spic<z laxae,, ex alis superiorum foliorum, longiflimae, ad fumnum iaflexa?, feu dependentes.**Flows* alterni, remoti, albidi, feffiles, perfiftentes, quales a fyftematicis. & *Broiiw.* in caradere cum fru&ibus ample defcribuntur.*Obfervatio** *Sloan.* <fe hac planta notat, quod Allii odorem praebeat, qui tarn penetrans ^ft, ut fl vacc» kano rlppffrantr, lac ejus faporem adtrahat, immio Bourn caro.hunc fapit, ita ut laniones cogantur jpfis aliud prabere pabulum, antequam maotentur, ne obftet /apor, unde fineMubio hasc planta fumma aperiente virtute praedita eft, quod facile tentki poflet, quum copiofiffime ac facili negotio in hortis quotannis"propagetur tam per femina, quam per furculos feu ramulos terrae commiilbs. Ab außlore autem denominata eft haec planta in memoria JACOBI PETIVERII, Pharacopoei Londinenfis, qui variis fcriptis inclaruit ad Hiftoriā naturalem, exoticarum inprimis, pertinentibus, cuius Mufeum extat. *Lond. 1695. &c.*In *Plumierii* iconibus variae fequiintur. *Phaeolorum* species, quorum primu¹-
-rias ab aliis nondum defcriptas exhibemus, reliquarum nomina dabimus,
& au&ores notabimus, qui eas decripferunt, fie primo occurrit

- 1 *Pbafeohis* ftrumofa radice, flore purpureo, filiqua anguftiffima. *Plum.*
Cat. pi. p. 8. Tourn. infi. 1. p. 414.

Qui eft

Pbafeohis Barbadenf? ere<5lus, filiqua anguftiflma. *Dillen. H. Elth. p.
1:312:- Tab. 232. &c.*

- 2 *Pbafeoks* firumofa radice, flore luteo, filiquis quaſi nodofis. *Plum.*
2CdL pl p- 8, Tourn. infi. 414. eftque.

Pbafeolus fubhirtutus, Americ. exjtoſu?, filiquis [oogis caulinis infi-
-dentibus. *Plukn. Almag.p. 290. Tab. 214. Fig. 2. &*

- *'JEhUcian* "fandens filiquis geminatis, comprefflis, feminibus plurimis
mifcellis oblongis refertis. *Brouiv. Hift* Jam. p. 293,*

2i₄ PLANTARUM AMERICANARUM

- 3 *Phafeolus* anipliflimus, magnoflore, filquis tenuioribus, falcatis. *Plum.*
Cat. p. 8. Tourn. 415. eft
Phafeolus ere&us, major, filiqua tereti, fēmine rubro. *Sloan. Hift** vol.
 1. *Tab. 115. Fig. 2. &*
 PAERU. *H. Malab. tem. 8. Tab. 41.* quorū filiqua? non ita inflexae,
 caeterum eadem.



TABULA DUCENTESIMA VIGESIMA.

- 4~ WyHafeolus Mice tuberofz, efculta, filquis quafr' ardculofis, hir-
 J7 Juris. *Plum. Cat. p. 8. TournAnfi.* 415.

DOLICHOS foliis integerrimis, caule nudo, leguminibus articu-
 latis, pubefcentibus, radice crallā, tuberofā.

- Radix* crafla, tuberofā, efculta, cortice rugofb obdu6la.
Caulis ere6tus, fruticofus, mollis.
 JR?W ternata, petiolata, plana, nitida, ovato-acuminata, integerrima.
Pedunatlus communis, ere6tus, rariores gerens floret, quorum
 •*Corolla* legUminofa» VftxUl«ra,maYimnm TMrAatnm. /^r>
Ltegmn planum, compreflum, ftriatum, transverfim mlcatunij acumi-
 natum.
Semina orbiculata, arillis inclufa, feu putamine durotedla, ac coMprefla*
 uti in fuperiore Tabulae marginali figura patet.
Obfervatio. Haec forte planta ad illud genus referri poflet, quod *Brouy*).
 in *Hi/I. Jam. p. 295.* primus propofuit fiib nomine *Zoopbtalmi*, cuius.
 Charakterem ibi, qui cum hac ulterius conferri potefl, latius define
- 5 *Phafeolus* flore cochleato, filquis falcatis. *Plmn. Cat. pi p. 8. Tourn.*
in/I. 415. eft
Phafeolus perennis, Ca7ara didlus. *Kumpb. Herb. Amb. lib* p. cap, 2p*
Tab. 136. &
Katu Paeru. H. Malab. torn. 8. Tab. 42.

Phafeolus maximus, perennis, fēmine compreflb, lato, nigris maculis
 notato. *Sloan. -Hifiivoh I. Tab. I3i. Fig. 1. t^c.*

- 6 *Phafeolus* frutu minimo, fēmine variegato. *Plum% Cat. pi. p. 81. Tourn**
 *«/?.£, 415. eft
Dolichos minimus, floribus Iuteis. *Linn. H. Cli/Tp* ->6o no 2 ubiicon
 &defcripdo, &
Phafeolus exiguus, glaber, Trifolii foliis, siliqua plana, compressa. *Burm.*
Tbf. Zeyl. p. 188. Tab. 84. Fig. 2. ubi vide reliqua.
7. pt^AfpkT<ff. 17T^ftmine coccineo> niS« TM-» la m.

Pbafeolus maximus, perennis; fl. fpicatis, albis, fpeciofis, filiquis brevibus luteis, &c. *Sloan, Cat.*, p. 67 & *Hifi. vol. 1. Tab. 113. Fig. 1 & 2.* eftque

Pbafeolus fcandens, fpcis laxis terminalibus, filiquis- compreflis, tetraspermatibus, utraque fiitura rugofa. *Brouiv. Hifi. Jam.* p. 297. no, 4. *Plumierii* icon variat, quod singula filicula fit difperma modo, fed fpcis copioffimis gaudenc leguminibus quinquaginta circiter.

8 *Pbafeolus* vexillo amplifimo, filiquis re6lis, teretibus. *Plum. Cat.* p. 8.
Eft

jPhafeohs flore odorato, vexillo ampio,, patulo, *Dillen. H. Elthp.* 313.
Tab.^234. qui eft

Clitoria ioYxis ternatis. *Linn. H. Cliff.* p. 361, &c.

9 *Phafeolus* virgatus, hirfutus, prurigineus. *Plum. Cat.* p. 8. eft
Stizolobium fpcis multifloris ,pendulis, alaribus ,floribus ternatis. *Brouw. Hifi. Jam.* p. 290. &

Pbafolus Americ. foliis molli lanugine obfitis, filiquis plurimis, hirfutis ,pungentibus &c. *Plukn. Aim.* p. 292. Tab. 219. Fig. 1. &

Pbafeolus Indicus, lobis undique pilofis, fru&u lucido, nigro. *Burm. TIT^ y .> 191.* ubi vide reliqua.

)8 *Naccorana*. *H. Malabo torn.* 8. Tdf. 35.

TABULA DUCENTESIMA VIGESIMA PRIMA.

10 **P** *Hafeolus* * hirfutus, filiquis reftis & aduncis: *Plum. Cat.* p. 8.

GL YCIN E caule pilofb, foliis ovato-oblongis, leguminibus cylindricjs, hirtis, aduncis.

Teramnus? triphyllus, fubhirfiitus, foliis oblongo-ovatis, filiquis gra-
Xifjbij compreflis, fpcis laxioribus, alaribus, *Brouw. Hifi. Jam.*
p. iquo. ubi ejus character.

9> *Phafeolus* ereclus, hirfutus, caule quinque angulari, flore viridi, lu-
tefcente, filiqua in roftrum aduncum definente. *Plukn. Aim.* p. 290.
vide *Hernand. Hifi. Mexic.* p. 88/.

Planta fcandens, farmentofii. *Caules* ac *Kami* cum filiquis hirfuti.

Folia ^ternata, ovato-oblonga, petiolata, nervtba.

Spied, laterales, & axillares, ldngifHrhae, hirfutae, fuperne floriferae, laxas.

Flores in parvis corymbis alterriatis rariores, quo^tumperianthiwn par-
vum, quinquepartitum a.

Corolla leguminofa, cuius vexillum refiexum, & alae erecla? b.

Fruflts ^ft legumen> longum, teres, hirfutum, fuperius aduncum &
quafi uncinafum c, multiloculare, bivalve d.

5^Mnumerofa, reniformia e.

ai6 PLANTARUM AMERICANARUM

ObfervatioJ Hujus plantae ffl&us quam maxime fingularis eft, apic
inftru&us inftar unguis avis*, quo maturo prastereuntibus adhaeret le-
gumen, certo indicio, plantam creicere in locis ruderatis, uti ple-
rumque fru&us adhaerentes talibus naicu&ntur locis, qui hinc a Gr**ra**
cis 4I<A<VT{OT6I dicuntur.

- 11 *Phafeolus* floribus coccineis > ex infula Sti Chriftophori. *Plum. Cat. p.*
8. eft

Pbafeolus ereCtus, filiquis gracilibus, teretibus, polypermib⁹, fe-
minibus fubrotundis, hilo nigro. notatis. *Brouw. Hift: J^m.pr.* 292.
110.8.&

Pbafeolus ere&us, minor, femine fphaeric⁹, hilo nigro. *Sloan. Cat.* 14.
p. 72. & Hift. Jam. vol. l.pag. 184. Tab. 117. F'g. 1/2, 3 etc.

TABULA DUCENTESIMA VIGESIMA SECUNDA.

- 12 'WyHhafeolus hirfuuis, filiquis articulatis. *Plum. Cat. p. 8. Tdurn**
J7 inJLp.415.

DOLICHOS caule Kirfuto, foliis ternatis ^ ^rofo-dentatis, legu-
minali que Kirfuto, urcillatio.

Planta fcandens, farmentofa.

Catties hirfuti 3 pungentes.

Foliaternata, ampla, angulofaj.erofb-dentata, petiokta, glabra.

Pedunculus longus, ere&us, glaber, multiflorus.

Leguminia vixt*2i*) plana, transverfe fulcata, feu articulata, acuminata.

- 13 *Pbafeolus amplifimus*, flJqua maxima, fru&lu codcineo, duro. *Plum.*
Cat. p. 8. Tourn. injl.p. 414. eft

Pbafeolus fubere&us, major, filiquis maximis, oblongis, glabris, fu-
tura altera nervo majori utrinque infignita. *Brouw* ffjl* Jam.p'*
291. no. 2. &

Dolicbos leguminibus gladiolatis, dorfb fulcatis, feminibus arillatis.
*Linn.spec. pi, p. 725. H. Clifj. p. 360**

Phafeolus maximus, filiqua eniformi, nervis infignita, femine albo
membranula inclufb; *Sloan. Cat. p. 68. & Hift. torn. 1. Tab. 114**

PbafeolusIndicus, §Iqua magna, fulcata &c. *Plukn. Almag.p. 2p2.*
Lobus machaerooides. *Kumpb. Herb. Amb. lib 9. cap. 23.*

/S ATit^ Tsjandi. *H. Malab. torn. 8. Tab. 43.*

- 14 *Phafeolus maritimus*, frud⁹ duro, femine variegato. *Plum. Cat. >* &
Tourn. p. 41 j. eftque

Phafeolus maritimus, rotundifolius, flore purpureo, filiqua brevi, crif-
tata. 5/ort». *Cat. p. 6\$>*

Pba-



Pbafeolus Indicus, lifqua cartilaginea, rugofa, fufcQ, duplii crista finuata donatus. *Commel. H. Amft. Cat. p. 276.* & *Plukn. Almag. P. 292.*

Lobiis cartilagineus, ex infula Mauririi, *Cluf. exotic lib. 3. cap. 10.*

Lobus quadrangularis. *Rumph. lib. 9. cap. 21. Tab. 133.*

9> Baramareoa. *H. Malab. torn. 8. Tab. 44.*

Dolicbos maritmus, repens, fcliis orbicujatis, nitidis, filiquis compre/Fis, fiitura altera trigona. *Brouw. Hiji. jam. p. 293, no. 4.*

'15 *Pbafeolus* floris vexilio amplissimo, fijquis re6lis, teretibus. *Plum.* • "V C^V. 1).- 8. *Town, p. 41 ^.* qui eft

Pbafeolus caule volubili, floribus laxe fpcatis, alis longitudine vexillL *Lirm.Jpeci p. 725. wo 8. & **

Pbafeolus flore purpureo, alis amplis, longe protenfis. *Dillen. H. Elthp. 314. 7a£. 235. 1%. 303. &*

Dolichus Sinenfis. *Rumpb. Herb. Amb. lib. 9. cap. 22,*

TABULA DUCENTESIMA VIGESIMA TERTIA.

P*Hillyrea* htirrili^ radice crafla, rofea, foliis rotundioribus. *Plum.* *Cat. p. 17. journ.inft.p. iquo. & ..*

Phytyrea humilis; radice cralla, lutea, foliis acuminatis. *Plum. Cat. p. 17, CAS^INE* foliis ovatis, & ovato-acutis, clematis.

£ *Cajfine^plns* oblongis, ferratis. *Linn.fpec.p. 26%.*

Pbyllyrea Capenfis, folio Celafrui. *Dillen H. Eltkp, 315. T. 236.*

Ccltjlrus foliis fabrotundis, finuofis, fiore ac fructu racemofis. *Burnt, dec. pi. Afr. p. 240. Tab. §6.*

FIGURE P R I M A.

Radix longa, lignofa, brachiata, vix fibrofa, nunc lutea, nunc ro/ea. *Caules* fere nulli.

J ~~am~~ irag a c laxi, lignofi.

Folia obpf a, craila, veftofa, mine ovata ac flnuofa, nunc acuminita ac dentata.

Flores ex alis corymbofi, in umbellulas difpofiti, quorum

Corolla quadripartita, calix quadridentatus, perfiftens.

Fruflus eft Bacca unilocularis, globofa.

Semen fabrotundum, uti in separatis partibus patet.

Obfervatio. Hie frutex tantam adfinitatem tarn externa sua forma, quarri modo floredi habet cum Capenfi, ut ab eo feparari vix poftit, unde utrosque conjunxi, cujus plures fpecies^c varietates in *Cap. Bona Spei* inveniuntur, uti patet ex *Decad. Afr. I. c.* ubi vide reliqua.

!i8 PLANTARUM AMERICANARUM

P *Ortulaca marina, latifolia, flore lauverubervte. Plum. Cat.p. 6. Tottnr. infl.p. 236.*

P O R T U L A C A foliis oppofitis, oblongis, pedunculis unifloris, alaribus.

Portulaca Curafavica, angusto, longo, lucidoque folio, procumbens floribus rubris. tierpn. Par. Bat. p. 212.

£ *Portulaca facie marirma, fruticosa, eretica, Americana. Shan. Cat. p. 87. Hift. Jam. torn. 1. p. 205.*

FIGURE S E C U N D A.

Planta humilis, ramosa.

folia oblonga, dichotomae, crassi, succulentae, glabri.

Folia oblonga, effilia, retroflexa, oblonga, obtusa, crassa, succulenta, avenia.

Flores foliarii pedunculis infundit longis, ex aliis provenientes.

Corolla patula, elegans, lauverubens.

Capula pyramidalis, dehincens perpendiculariter.

Observatio. In locis maritimis crescit haec planta, ab aliis penitus diversa, hujusque altera species occurrit rotundifolia, quae faporem habet amarii Timum juxta Plunder.

Ex Cl. Linn*&i* communicatione huc planta genere differt a vera *Portula** *ca*_y quum ipsi proprie Corolla sit nulla, stamina septuaginta, & fty*^i* tres, ipsisque hincdicitur SESUVUM m̄fift> NaUr.. edit, decim. Atque a Lccflingio in itinere Hi/pan.p. 151. no, 67. elegatiter deferibitur, ex cuius annotatione crederet in littonibus maiis Cumari Americee; illi? que colligitur pro cineribus ad conflanda vitra &c.



TABULA DUCENTESIMA VIGESIMA QLARTA.

P *Hytolacca fruticosa, spinosissima, foliis angustis, & crassis. Plum. Hift. mjj: torn. 5. pag. 51.*

S O h A N U M caule fruticofb, aculeato, foliis feffilibus, lanceolato-finuofis, repandis, spiniferis.

£ *Solatium, caule aculeato, fruticofb, foliis lanceolatis kngulofb-dentatk. Linn. H. Cl.p. 6i. fpec.p. 188. no. 22. &c.*

Soianum Bahamenle, spinosum, petalis angustis reflexis. DHL //• E^k p. 363. T. 2y 1. Fig* 350.*

FIGURE P R I M A.

Caulis fruticofus, spinosissimus, quod frequentius in plantis junioribus & fylvefratribus.

i^/Mangifera, feffilia, lanceolato-finuofa, repanda, utrinque spinifera.

Flores foliarii, vix pedunculati, pufilli, petalis reflexis, angustis.

Bacca minima?, rotundse, glabra?.

Observatio. In plurimis convenit cum Solano Bahamenfi Linn. fpec.p. 8S. no, 22, sed differt foliis feffilibus, angustis, repandis, profunde finuofis.

Lyc-

L *Tcopericum* arborefcens, foliis angulatis, Fru&u aureo. *Plum. Cat.*
pi. p. 4. Toum. inf. p. 150.

SOLANUM caulearboeo, inermi, foliis ovatis, finuato-repandis.

£ *Solatium* caule frutefcente, fubinermi, foliis cunaeiformibus, finuato-repandis. *Linn. fpec. p. 185. no. 7.*

Solatium Bonarienfe, arborefcens, Papas floribus. *Dillen. H. Eltb. p. 364 uo. 272. Fig. 351.*

F I G U R A S E C U N D A.

Caulis arbi)reus, i angulofus, fulcatus, inermis.

Folia ovata 1, miiiora cunseiformia, repanda; flnuofa, fimplicia.

Flores feffiles, aggregati, extenfi, quo difiert a *Bonarienjt*, quorum flores pedunculati.

FrudusingenS) angulofus, junior*flibhirfutus, major glaber, fexpartitus.

Semina oblonga 3 nidulantia.

Qbjervatio. Tota fades ac modus crefendi innofra convenit cum Bc* narien^, excepto quod hujus flores fine pedunculati; caeterum Folia & flores maximi, ac ftatura arborea, glabra, excepto injuniore planta, quae tenellis aculeis interdum afperfa, fed qui in adulta decidunt.

TABULA DUCENTESIMA VIGESIMA QUINTA.

P *Lima* fhi6lji croceo, odorato. *Plum. nov. gen. p. 9.*

PLINI A. ijinn.fpec, p. 516.

Planta arborea.

Rami teretes.

F&W pinnata, abrupta, fine inpari.

Foliolafex paria, ovato-lanceolata, integerrima.

Flores per ramos feniiores nudos fparfi, feffiles, quorum

Corolla campanulata, patens, profunde quinquefida aa.

Stamina numeroifTima, in orbem extenla b.

Calyx quinquedentatus, minor cc.

Fruflus eft baccaglobofa d^ multifulcata^, unilocularis, mollis, & edulis*

Nucleus magnus, globofus f.

Obfervatio. Didta fuit ab au&ore haec Arbor PLINI A in memoriam Ca- ji Plinii Secundi Veronenfis, qui Hiftoria fua naturali cuivis notus, & apud omnes inclaruit, qui vero nimis curiofus, & incaucus in Vefu*- vium pra?cipitatus mifere ipfius incendio periit.

220 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA DUCENTESIMA VIGESIMA SEXTA.

p *Luknetia* f^candens, Hederae fdlis ferratis ₅ frutiū tetragono. *Plunf>*
nov. gen, />. 47.

PLUKNETIA. *Linn.fpec.p.* 1192.

0 *Sajor* volubilis, fructibus corniculatis. *Rumpb. Herb. Amb. lib. 1. p^aS'*
194. Tab, 79. Fig. 2.

Plantafcāndens caule volublli.

Fo/wfolitaria-, petiolata, cordata, acuminata, (errata, :
Raccmi compofiti ex fioīculis maſculinis numerqfis, & inferioribus fenai*
ninis rarioribus, ac faepe fblitariis, uti ex iconē patet. Hinc ad *montf*
dam pertiner. Ut vero melius digp.ofcantur, utrorumqye feparatas
partes in Tabula addidimus.

Corolla maſculinge petala quatuor patentia , ovata *a* & *b*, cum ftanurribus
odo breviffimis, cōalitis.

Foemininae petala itidem quatuor *c* cum germine tetragono *d*


Stigma vero peltatum, quadrifidum *e*, & quatuor pun̄tis notatum *f*.

Fruſlus eft *Capfula* deprefla, quadrangularis, & CjHadrilocularis *gg*, 1^o"
culis bivalvibus *bb*.

Seminn fblkciia , fubrotUllua, cumpicliu , acuinata \$i, intra loculuni
membranaceum *k* recondita.

Inmemoriam *Leonard Pluknetii* Botanici Angli hoc genus Pt,uKNE-
T I A abau6tore dittum fuit, ille vero omnium Botanicpmm exoticas
collegit & exhibuit numero ftupendas, ita ut fēx plantarum cliliades
fere completoitur ipfius Opera, propriis fumt:Sas infcptpt, quibus
nemo Botahicorum carere potefit, qui exoticas inquirere vel nofcere
defiderat. Ipfius autem *Almagejum* Londini 1696 impreflum eft, ejus
MantiJJa ibidem 1700, & *Amaltheum* 1705, quorum plurimas icones in
Phytographia Iua exhibentur in 454. Tabulis asneis.

Finis Fafciculi Noni.



MIMOSA iirnie»iH,i<>iii.-; quadripinnatis.

T \ ii . ccm .

S

MORISONIA.



MORUS folinis foliis ovato-lanceolatis.



MUNTINGIA.



RHAMNUS inermis, foliis ovato-lanceolatis.

RHAMNUS foliis ovato-oblongis.



MYRTUS folia linearibus.

SYRTUS

folia ovatis.




Fig. 1.

MYRTUS foliis ovato-lanceolatis.

Fig. 2.

MYRTUS foliis alternis, ovatis.



Levillea filii cardans.



['i:] \ If. I. F. A. inlii.i trilo u





NICOTIANA tabii cordato-cuspidata



OLDENLANDIA pedunculata quadrifoliis.

CORN! S &U ovatis.






POLYGALA Qoribiu iiiki't-bibiu, Inter;ijj>i<,i,



PI'RJITI. OCA foliis ovatis.

PERIPLOCA foliis linearibus.




Llitti TTS TRi-i M fnliU ovate **acumioaia****LONIGERA** racemis teitninalibiw




I . ON It* ERA raremii LWoluiKJqlui tuncealatla



PETIVERIA.




DOLICHO foliis integerrimis




GLYCINE caule piloso.



DOLICHOS foliis ternatis, eroso-dentatis.



PORTULACA foliis oppositis, oblongis.




CASSINE
foliis ovato-
acutis.

CASSINE foliis ovato-
acutis.




Fig. 2.
*SOLANUM caule
fruticolo, sculesto.*

*SOLANUM caule
fruticolo, sculesto.*



PLINIA.



PLANTARUM AMERICANARUM

FASCICULUS DECIMUS,

Continens Plantas, quas olim

CAROLUS PLUMIERIUS,

Botanicorum Princeps

Detexit, Eruitque,

Atque in INSULIS ANTILLIS ipfe depinxit.

Has primum in lucem edidit,

Concinnis deforipationibus, & Obfervationibus[^]


/Eneisque Tabulis illuftravit

JOANNES BURMANNUS, M. D.

Athenai Illujlris 3 £5? in Horto Medico AmJleJadamenfi

P R O F E S S O R B O T A . N I C E S ,

*Academic Cafarea Nature Curioforum Socius, Regiaque Societal is
Scientiarum Upfalienjis Colkga.*



Sumtibus Au&oris,

Yrofiant Amfteladami in Horto Medico 9

Atque %

Apud P E T R U M S Ç H O U T E N ,
tf L U G D. B A T A F.

Aud GERARD. POTVLIET, & THE ODOR. HAAK.
M. D C C. L X.

C U • N C T I S
R E I H E R B A R I A
P E R I T I S E T S T U D I O S I S
L E C T O R I - B U S
S. D.
J O A N N E S B U R M A N N U S.

Prbmiflām aritea, hunc datam folvo, fancieque reddo fidem, exhibeoque vobis, Viri praeftantisfimi; Opus, quod mihi haiid minore confttit labore, quam pretio, quodque veftra potiflimum de cauflā inchb&tūm, atque in veftras uetus & comoda elaboratum eft: Hoc fumma Dei gratia ac favore tandem abfolutum & ad fineih perduclūm videtis.

Ill eo pluriiise habentur rariffimaa, a riemihe Botanico-rūm, tiifi j£ iioftro AucSore obfervatae plantae, quaeque ab nhtic[u]oribus fuere denorritinatae, obfcire admodum, paucifimis exceptis, defcriptae, at raro certis nominibus vel juftis -ibonibUs illuftratae, quum hae calidiffimo clymati adftieta^, & extra patriam cultae, vix totā abfolvunt fruiſtificationem, multumque recedurit a genuinis in patrio fojo Xpohte natis, quales ab Audore ridftro ibi ad ipfam plerumque magnitudinis fojmam exacliflime fuere delineate.

Fateor equidem in *Plwmierii* iconibus eodem modo^quo in reliquis^ priorum Epocharum defiderari internas fexus flbrum partes, ftamina icilicet ac ftilos, fed, quum has ante noftrum feculum a nullo inftauratdre ad fytemā cbndendum fuerint habitat vet adfumptae, haud mirum eft, eas fuifle ab omnibus prioris aevi Botanicis omiflas, nee adcurate delineatas, vel memoratas, quum hi potiflñimm ad externasflorum partes j frucluuinque formam, nunierum, & loculos, feu vaſcula feminaliaadtenderint, atque ex ipfis fyftemata ifua compofuerint.

Nunc vero, postquam nrum Botanicum adfulfit lumen per ingeniofiflimum principis Botanicorum CAROLI LIN-NiEI syftemam sexuale, orines adipterrias florum pastes confugerunt, singulasque ipsorum adtentis luftrare ac perfictrari incepert oculis, ita ut Neotericorum Botanicorum libri, qui dein prodierunt iconesque exhibuere, prse omnibus priorum feculorum hac in ratione maxime excellant, & longe praferendi fint.

Plurimum quoque ad hocce studium exornandum & perficiendum conferunt Botanicorum peregrinationes, yjibus hoc Opus suum debet originem; quod laudabile iofitutum apud quasdam etiam nunc obtinet gentes, in primis sub praefidio Cl. *Linnai*[^] uti ex variis ipius confitat & cuius notum est, Operibus, unde & in ejus *Sytemate Naturae* nuperedito, optime illuftratae sunt exoticae plantae, quas in Indice huic nostro Operi subjmcl:o fursin: ~lo~cis laudavi, ita ut characteres, qui in pluribus adhuc defiderantur exoticis, succelunt temporis emendari, & ad certa genera revocari poterint.

Optandum itaque effet, ut ex peritisfimis Gallorum Botanicis exoriretur aliquis, qui Antillas peteret infulas, ad obfcuras & dubias *Plumieri* plantas ibi adtente examinandas, ut ad jufta genera eas reduceret, quemadmodum varias in elaborando hoc Opere detexi ince,r,tislimas₉ quae in patrio folo ulterius indagandae sunt, quod ad iftas adnotavi plantas, plurimas tamen novas, quotquot iny^ftigarc potui, ad sua genera recensui juxta CL *Linnm Jpecies*, qui huic Operi exornando & illuftrando plurimum opitulatus est, unde antea dubias nunc juftis specificisque denominationibus exhibui, quod equidem haud facile ex foliis mihi patuit iconibus, multoque confltit labore, quern si peritis Botanices arbitris & exaribus gratum acceptumque fuifl cognovero, erit, quod mihi gratuler de fulcepto Opere, & studio hifce rarifimis atque intricatisfimis plantis enodandis inpenfo.

P L A N T A R U M
A M E R I C A N A R U M
F A S C I C U L U S D E C I M U S.

T A B O L A D U C E N T E S I M A V I G E S I M A S E P T I M A.

P*Pifonia aculeata*, fruflu glutinolb & racemoib. *Plum. twv.gen.p.* 7.

PISONIA aculeata. *Linn./pec.p. 1026. H. Cliff.p. 457.*

Pifonia afliirgens, farmento valido, foliis ovatis, utrinque produ&is, fpi-
nisvalidis, recurvis, racemis lateralibus. *Brouiv. Hift. Jam.* p. 358.
ubi ejus cārafter.

Pifonia aculeis rigidiflimis, hamatis, floribus racemofis. *Amm. Herb.\$%i**
Plumbago Americana, fcandenb, aculeata, Beta? folio minore. *Tourn.*
infl.p 14 **

Pentagonetheca Americ. fcandens, aculeata. *J^aillant. Parifan.* 1722, p. 260,
Khamnus, feu *Lycium* Fringego Jamaicensibus di6tum. *Plukn. Aim.* 381.
" Tab. 108. Fig. 1.

Palijrq affinis, arbor fpinofa, flore herbaceo, pentapetaloide, fru&u fic-
co, nudoy cānnulato, - kppaieo: *Sloan. Cat.* p. 137. *Hift. Jam, torn.* 2.
p-. 25. *Tab. 167. Ray. dendr.p.* 9\$.

FIG U R A PRIM A:

PimM frutico/i, affurgens, ramis farmentofis, hamatis.

Folia .ovato-lanceolata, utrinque produdta, petiolata, obpofita, crafla,
glabra, virentia, decidula, ad quorum ortum

Stittd binae, fpinofae, rei-urvae.

Pedunculi laterales à axillares rarnofimmi, flores producentes in raccrhis
extenfis, utcumque trichotomis, qui in Autoris icone longe majores
& ampliores depi*5li* funt, quam apud nos obfervantur, ubi pufilli funt,
• pfseterquam quod raro floreat in noftro clymate, ipfiusque flores nunc
hermaphroditi, alii mares, alii fseminei obfervantur, uti latius a fy[¶]
tematicis defcribuntur cum ipforum fru6libus, & nuperime a Cl. *Lin**
ndo in nova & decima *Syftematis Nature* editione ipfius carader ample
exhibitust eft pag. 1384.

Cseterum hoc plaotarum genus *PisoNiA* ab;au6lore denominatum eft in
memoriam *Guill Ptfonis* Lugd. Batavi, qui itinere Brafilienfi, ejus-
"que Hiftorias naturalis defcriptione cuique Botanico notus eft.

224 PLANTARUM AMERICANARUM

P *Ittonia humilis*, Anchufas folio. *Plum, nov, gen, p* 5.*

TOURNEFORTIA foliis lanceolatis, feffilibus, fpicis fimplicibus, recurvis, lateralibus. *Linn, fpec. p. 141. no. 5. Syjl. Nap, p. 9*7* no. 5.*

Tonrnefortia reclinata, difFuña, & hirftta, fojiis ovatis, ramulis re&isj validi§. Brouiv. Hi/I.: Jam, p. 169, no. 3.

FIGU RA S ECUN D A.

Planta herba'cea, humilis, difFuña, reclinata.

Folia lanceolata, feffilia, integerrima, alterna, flibutus hirfiita.

Spic<2 Jaterales, fimplices, reflexae.

Obfervatio. Proximehaec planta accedit & convenit cum *Tournefirti* & volubili, quæ frequens in noſtris hybernaculis, & aeftivo tempore copioſe floret, fed cujiis racemi funt terminates, caulis fcandens, ac folia magisovata, & utrimque viridia. :; <<.

Pitionid verò nomen huic generi in poſtūc *Plumier*, a praenomine fiimmi Botanici Jos. PITTONIS TOURNEFORTII, quod pottus a cognomine cuique noto ddfumendum ēft, uhdē Cl. *Linnaus* hoc geniis meliore jure vocavit TOUHNEFORTIAM, de cuius dignitatie vide noſtrurrr *Audorem in nov. pi' gen. p. 5.*



TABULA DUCENTESIMA VIGESIMA OCTAVA.

P *Ittonia arborefcens, Chamaedryfolia, major. Plum, Nov* gen. p, 5.*

TOURNEFORTIA foliis ovatis, ferratis petiolis ipineſcentibus, fpicis terminatis, recurvis. *Linn./pec, p. 140. Syfl, Nat. p. 916**

FIGURA TRIM A.

P *Ittonia arborefcens, Chamaedryfolia minor. Plum. nov. gen. p, 5.*

TOURNEFORTIA foliis oblongo-ferratis, petiolis fpineſcentibus, fpicis capitatis, terminalibus.

FIG-U RA S ECU N D A.

*Plant**

Planta arborefcens, cuius rami ad petiolos indinati, ac produ&i, ibique fpinulofi.

Folia ovata, ferrata, acuminata, alterna, petiolo baf*i* inarticulato, (pi* nefcente, petiolis a caule divaricatis.

Pedunculi longiflimi, axillares , fuperne trichotomi, ibique fuftinentes tres fpicas recurvas, racemis fecundis.

Corolu utriusque plantae quam maxime fingulares & ingentes , a reliquis omnibus congeneribus diftin&ae, quae in majori fpecie profunde difflec-tx feu laciniatae, in minore regulariter. ferratae, unde has binae fibi qjuam maxime adfines font, quod inprimis etiam patet ex petiolis fa* pra bafin divergentibus, perfiftente parte inferiore port, foliorum Iap-fum in'duranda, & in fpinam degeneranda, more Volkamm<z fapr delcriptae.

DiiTerunt vero, quod minoris folia fint oblongata, ac petioli curti, ad bafin inflexi, & acute fpinulofij Florumque racemi vix fpicati, multo minus inflexi, fed vere capitati, ac vix pedunculati & terminates, quum in majore fpecie pedunculi fint axillares ac longiflimi: An itaque merae tantum varietates, vix credo.

In *Plumier*. iconibus fequitur *Pittonia* fcandens, baccis niveis, nigris maculis notatis, cuius Figura optirrie convehitcum ilia, quae *BugloJJum lanuginoftm* a *Rumpb.* in *Herb. Amb. Ufa* 6. cap. 60. vocatur, & *Tourneforia* foliis ovati^v acuminatris a *Linn*, in *Jpec^p** 140. no. 3. vocatur, quae planta cum alia minore fcandente fpecie perperam confunditur, atque haec minor a *Sloan** in *Hift. Jnm. tom*, 1. *Tab.* 143, & a *Plukri. PhyU Fab.* 235: *Fig. 6.* exhibetur. -Utraequae in Horto nostro Medico colun*tur, major eft planta arborea, erebla, folia & flores producens, ut in *RumpMiiconyCUJusque* varictas eflè virWnr *Bryonia nigra*, fruticofa, foliis Laurinis, fi. racemofia, fpeciofis. *Sloan. Hi/I. torn.* 1. *Tab.* i4jr< minor vero eft planta icandeo^, ac farmentofa, qualis a *Sloan*, in *Tab.* 143/delineatur, ita ut non conjungenda?, fed diverfe fint species, to-to habitu, modoque crefcendi fefe diftinguentes, eftque *Tournefor-tia volubilis*. *Linn,Jpec.* & fruticofa icandens, *Brouw. Hifl. Jam.* p. 129.

Phmieri autem planta feu major fpecies, *Ramos* gerit lignofbs gl?<. bros:-

%ia 'ovato-oblonga, acuminata, petiolata , alterna.

Spica terminalis, ex plurimis conftans racemis alternis bifurcatis #1 re-curvisj quibus fcandit ac fefe retinet.

Bacca globofe, tribus vel quatior maculis feu punftis notatae, quas maculas in maturis baccis minoris feu volubilis fpeciei hoc anno itidem ob-lervavi menfe Septembri.

226 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA DUCENTESIMA VIGESIMA NONA.

Pittonia hirfutiflma & ramofiffima, baccis albis. *Plum. nov. gen.*
p. \$.

TOURNEFORTIA foliis ovatis, petiolatis[^] caule hirfuto, fpici^s ramofiffimis, terminalibus. *Linn. spec. p. 140. no. 2. Syfi. Nat. p. 9*7. no. 2.*

Heliotropii flore frutex baccifer, ramofus, folio rugofb, foetido, triaximo, fubrotundo, hirfuto, fructu albo. *Sloan. Hiji. Jam. torn. 2. Tk 212. Fig. 1.*

Phnta arborea.

Caules ac Kami hirfuri.

Folia ovata, petiolata, alterna, acuminata, fubtus hirfuta, fuperius glabra.

Racemus terminalis, albus, ramofiffimus, hirfutus,

Flores & Fruttus gerens fecundo^s, regulariter difpositos, Tuperne mⁱflexos ac reclinatos, qups omnium optime noſter ^u6lor notavit, ac delineavit, qui vero a reliquis, ac praefertim in *Sloanai* Figuris ruditer & contra genium ac naturam generis > & ipfarum plantarum depigli funt, uti ex comparatione cuique patebit.

TABULA DUCENTESIMA TRIGESIMA.

Pittonia racemoſa, Nicotians-foliis", foetidiflimis. *Plum. nov. gen.*
p. 5.

TOURNEFORTIA foliis ovato-lanceolatis, fpicis ramofiffimis, pendulis. *Linn. /pec p. 140. nd- 4» Syfi N<t> 917. no. 4.*

Xournefortia: foliis ovato-lanceolatis. *H. Cliff, p. 48. Roy. prodr. p. 408.*

Tournefortia fcandens, foliis hirtis, rugofls, ovatis, fpicis ramofis. *BroUW* HiJl.Jam.p.i69.no.i.*

Heliotropium maximum, Jamaicence, Limonii mali folio, fupra £abro, fubtus lanugine ferrugineo, molli. *Pkkn. Aim. p. 180. Morif* form. 3. p. 452.*

Planta arborea. Kami glabri, ac. fungofi.

i^/wo blonga, lanceolato-ovata, maxima, fibra, fubtus lanugihofa, ferruginea.

*Racemi terminates, ingentes, ramofiflumi, ac. penduli, quibus a reliquis differt ac distinguitur. Atque hinc puto, Cl. Brouw. non rite produxit. Non est synonymum *Sioanei*, quod melius convenire videtur cum praecedenti species, unde *Sioanei* plantam ipsi juris, licet Figura istius auctoris fit perfida, & ut supra notavi, a natura generici cara&eris quam maxime aliena.*



TABULA DUCENTESIMA TRIGESIMA I'RIMA.

Pilmnieria flore riiveo, foliis longis, angustis, & acuminatis. *Plum,*
QaU, pl. p. 20, Town. infi. p. 659.

PLUMIERIA foliis lanceolatis, revolutis, pedunculis fuperne tuberosis. *Linn. Jpec; 2iO.no-. 2. Syll. Nat. p. 944**

Plumieria arborefcens, foliis lanceolatis, floribus fauce ampliatis, fimbriatis. *Brouw. Hi/I, Jam. p. 181.*

Nerium arboreum, altissimum, fplip angustip, flore albo. *Sloan. Catal,*
p. 154. tijfi. Jam. vol. 2. p. 62. Herm. Parad. p. 49.

\$ *Apocynwn* Americ. frutefcens, longiflomo folio, flore albo, odoratiflomo. *Commel, H. Amjl. 2. p. 47. Tab. 24.*

Nerium Americ. Ja&efceho, longiflomo folio, flore albo, odorato. *CaU*
*Hort., Beaunl p. 31**

PJmitakrborea.

Caules fibrosi ex foliorum lapfu, quod huic generi proprium, & in cunctis mihi notis speciebus obtinet.

Folia longifloma, angusta, lanceolata ^ venosa, margine revoluto j petiolata, decidula, caulem cicatrificantia.

Pedunculivertk les, longiflomi, fuperne trifidi, ibique fibrosi seu tuberosi, singulique proprii triflori.

fibres ingentes, tubulofi j petala plana, expanfa, uti in congeneribus, coloris albi, odoris suaviflimi &c.

Foliadi-oblongi, incurvati, acinaciformes, uti in separato A.

Semina per strata, oblongata B pontinentes.

. *Observtio.* Vocavit hoc genus Cl. *Tournefortius* ab inventore *Caro-*
h Plumierio Botanico Regio, PLUMIERIA ob summa ipsius merita, qui tot tantisque novis plantis Botanicam ornavit ac ditavit, ita ut *QLHtm&us* in *H. Cliff, p. 76.* de eo notet. „ Diculum siit hoc genus in
3, faonorem egregii istius Botanici, verique *Tournefortii* Americani,
5? „ *Gdroli'Plumierii* qui triplici itinere, plantarum captus amore, no-
„ vasque vifendi defiderio, flexies infido mari longiflomo itinere fere au-
„ fus fuit committere, quique fere fblus fuit, qui aliquid in arte prsefti-
35 tit inter tot plantarum Americanarum Scriptores: Ucinam prodirent
53 plures *Plumierii* Americani!

228 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA DUCENTESIMA TRIGESIMA SECUNDA.

Plumieria alia, flore niveo, foliis brevioribus & obtusis. *Plum. Hift**
wff. tom. i. p. 133.

PLUMIERIA foliis ovato-oblongis, acuminatis, subfeffilibus.

j8 *Plumieria* foliis ovato-oblongis. *Linn. H. Cliff*, p. 16. *spec. p. 209. Syft**
Nat. p. 944. Roy. pr. p. 412.

Plumieria flore roso odoratissimo. *Catesb. Carol. torn. 2. Tab. 92.* ubi ifores cum foliis seflices.

Plumieria arborefcens, ramulis craflis, foliis oblongo-oyatis, petiolis biglandulis, floribus geminatis per spicas terminates. *Brouw. Hifi. Jo*** p. 181. no. 2.*

Jasminum Indicum *Merian. Surin. Tab. 8.* ubi flores corymbofi, ac folia petiojata.

Nerium Americ. arboreum, folio maximo, obtufoire, flore incarnato.
*Sloan. Cat. Jam. p. 1*4. Hifi. vol 2. p. 61. T. 185.* ubi flores plures ramofii, ac folia sparfa petiolata.

Clematis arborea Amer. Laurinis amplissimis foliis, flore laces? cofore odoratissimo. *Pluken. Mont* 50. Tab. 237. Fig. 2.* ubi fimplex modo flos, ac folium, quod cum noflra planta quadrat.

Planta arborea.

Caulis erodus, fimplex, craffus, funeo^, f^aber, feu tuberculofus & cicatrifatus per foliorum lapsum.

Folia ovato-oblonga, acuminata, subfesilia, venosa, integerrima, in orbem pofita.

Pedunculus ex foliorum centro verticah's, longus, fimplex,

Flores fuftinens in fummo speciofbs, binos tresve ex pediculo commuuii divergente.

Siliqua geminse, quod m hoc genere familiare, connate, oblongas, fez*. bra, per longitudinem dehifcentes, foetae

Seminibus oblongis, foliatis, jmbrikatis, feu fquamatum pofitis, placentae acifixis, uti in separatis patet Figuris.

Observatio. Hoc genus proprium eft in filiis Americanis, ubique fere crefcens in locis humidis ac declivibus^ unde, licet femina fepifimdmittantur, raro jaete apud nos germinat, nee nisi in ealidifimo hyp^* caufo confervandum, ubi tamen rarifime fplendidifimis & odoratissimis floribus cultorem fuum exhilarat.

Cffiterum hujus defcriptae plantae flint varietates plures, modo florendf, foliaque ac flores producendi difTerentes, uti adtentis ex collatis ico-nibus elucefcet; difTerunt itidem floris colore, dum plures funt ni* vei, rarius incarnati, ac rubri, apud nos pufij^ & ante pefein tabefcentes & marcefcentes.

Alba species apud *Rumpk in Herb. Amb. I.* 6. cap. 43, torn. 4. que OC* currit, & ab illio auftore *Flos convohtus* vocatur

Poinciana) feu *Crifla Pavonis* subfequitur, sed qua toties jam descripta ac delineata est, ut cuivis Botanico sit notisfima, de qua latius vide *Rumpk Herb. Amh. lib. 6. cap. 24. Tab. 4.* ibique obfervationem meam.

Portulaca vero latifolia fuprajam in *Fafcic. oftav.pag. 218. Tab. 223.* de- scripta est, cujus altera Au&oris species rotundifolia & amarisfima con- venit cum *Portulaca Curacavica* procumbente, *Capparidis* folio, flore mufcofb. *Herm. Par ad. Batav. p. 213. Tab. 213.* quae est T R I A N - T H E M A. *Linn.fpec.p. 223.*



TABULA DUCENTESIMA TRIGESIMA TERTIA.

P JL *Seudo*Acacia* flore pyramidato, coccineo. *Plum. Cat, p. 19.*

R O B I N I A pedunculo pyramidato, foliis pinnatis, foliolis ovato-ob- tufis.

F I G U R A P R I M A .

Planta arborea, ut videtur, inermis.

Folia pinnata.

Foliola ovata, obtuſa, glabra, septem pariacum inpari.

Racemus pyramidalis, (implex, flores vagos, copiofbs, laxos, oblongatos gerens.

Siliqua teretes, acumjnatae, glabrae, dependentes.

Semina ovata, glaberrirfia.

D X. *Seudo-Acacia* filiquis alatis. *Plum. Cat, p. 19.*

R O B I N I A pedunculis ramo/is, filiquis membranaceis.

F I G U R A S E C U N D A.

Planta arborea.

Folia pinnata, *Foliola* ovata, acuminata, fex obpofita cum inpari, ilijus triatantum suprema in Tabula ob defedtum loci flint notata, curto eras- fbque petiolo, glandulam referente, ipofita.

Pedunculi ramofi, flores vagos gerentes, quorum vexillum ovato-acumi- natum, & erectum.

Siliqua laterales^dependentes, ventricofae, feu quatuor membranis maxi- mis difindiae & aufts.

Semina reniformia, rariora, regularite/ in meditullio locata.

Obfervatio. De hoc genere ac nominis derivatione vide *H% Cliff.p. 354.* cujus plures species recenfentur a *Linn, infpecp. 722.*

2jo PLANT ARUM AMERICANARUM

TABULA DUCENTESIMA TRIGESIMA. QUART A.'

DJTYRETRUXM. Aphyllo. *Plum. H.mff.tom. v.p.* 91.

FIGURE *P R I M A.*

Peculiaris planta est, foliis defituta, radice gaudens lignofa, longa, bra? chiata, caules proferens trichotomos, floribus capitatis terminalibus ex cuncta forma nil certi definire possum, in patrio itaque fibro ulterius investigandi, atquedea genus ex iis constitutendum quod forte non vnum, quum cum nullo mihi noto conveniat; ob singularem vero plantas formam & indolem Botanophilis eam obserre volui.

RAmmailus aquaticus, /iari foliis, ad nodos Umbelliferis. *Pium.Cat. p. 7. Town, inf. p. 286.*

ALISMA foliis cordatis, obtusis. *Litin.spec.p. 343. no. 4.*

Alhma foliis lunulato-fagittatis, venofis, capo affurgeht, ramofb, angulato-fulcato, tamulis ternatis, verticillato-verticillatis. *Broinv, Hjll. nJffim-p> 204.*

Dantafonium ramofum, folio cordiformi. *Vaill. A&. Parif. 171.9; P' 2**
Sagittaria Virginiana, obtusiflore lato folio, floribus minoribus albis. *Morif Hift. 3, p. 618. fett. i\$. TM> 4- F% 6**

FIGURE *S EC U N D A.*

Planta aquatica, natans.

Radices fibrofe, finipliçes, descendentes.

Petoli pentagorii, fulcati longifirai, ex latâ bafi angustati.

Folia obtuse cordata, venosa, decem majoribus nervis distinctis.

Scabys aequaliter, nudus, fulcatus, pedunculos e regione ternos profereb, qui ad articulos pedunculos verticillatos proprios gerunt.

Pdunculi fex septemve simplices, proprios fallientes

Flores hexapetalos, patentes, flaminofbs, quales ulterius cum fructificatio* ne a Syntomatico definiuntur.

TABULA DUCENTESIMA TRIGESIMA QUINTA.

Ranunculus aquaticus. Sagittal folio breviore. *Plum. Cat.* p. 7. *Tourn.*
in I. p. 292.

ALISM A foliis cordato-fagittatis, acutis, ifcapo affargente, fimplici}
"floribus ternatis.

Sagitta Americ. latifolia[^] non ramofa. *Vaill. Aft. Parif. ann,* 1719. />;

33->M-

Sagittaria major; folio obtufb, floribus minoribus, albicantibus. *Morf.*
Hifl. torn. 3. p. 618.

Sagittaria,foliis planta, coglomerato fructu monopyrero, Cdriandri fe-
re figura. *Pufcn. Tab.* 220. *Fig. 7.*

Culit-Tamara. *H. Malab.* Tom. xi. *Tab. 4^.*

FIGURA PR IMA.

Planta aquatica, natans. i?^V^fimplices, defceridentes, extenfie, filifermes.

¹ *Petioliteretes,* adfcendentes; porofi; fed carialiculis humerofis diftin&ii
Jongifllmi.

Folia fagittata, triangula, angulis lateralibus longioribus*, nervis ac ve-
nulis eleganter cancellata.

Scapus afflurgens, fimplex, nudus, teres.

Pedunculi e regibhe terni, fimplices, nee ramoli.

Floras hexapetali, Staminofi &c. *Calyx triphyllus, jetalis major,* per-
fiflens &c.

Rapantium Trachelii folio, flore purpurafcente. *Plum. Cat.* p. 5:
Tourn. infi. p. 163.

LÓBELIA caule ere<5td, foliis ovatis, incifb-ferratis, petiolatfs; ra-
cemo terminali.

Lobelia caule efe&d, foliis cordatis, obfblete deritatis, pietidlatis, co-
rymbo terminali. *Linn. spec.* p. 931. no. iz.jyjt. nat, 1237.110. '3*

j8 *Lobelia* major, brachiataj afflurgens[^] foliis oblongo-ovaris, denticula-
tis, bafi appendiculatis, fpicis terminalibus; *Brouw, Hifl. Jam,* p: 322:

FIGURA SECU NBA.

Pkntaherbacez. *Radix* fibrofa, filiformis.

Caulis eréclus, fimplicifimus, glaber, .ftriatus...

Folia ovata, incifo-ferrata, glabra, petiolata, alterria.

Corymbus caulem terminans, nudus , divifus in tres racemos longiffi*
mos, *Flores* gerentes alternos pedunculatos, quorum labium fuperius
deorfum vergit.

Calyx amplus, extenfus, quinquefidus, perfiftens.

Capfula ovato-obtufa, bifida, bifulca.

Semina numerofa, rotunda, uti in separatis Figuris.

232 PL-ANTARUM AMERICANARUM

Obfero atip: Plires hujus generis species in America occurruunt, quae Tub nomine *Kapuntiab* autore & *Tournefortio* enumerantur, atque a *Morifona*, -aliisque auctore commeribrantur & defribuntur, quaeque in hortis nostris floribus coccineis & violaceis prse reliquis eminent plantis, quumque ubivis obviae, & cuique notse fint, eas omittimus, de quibus vide *H. Cliff*, p. 426. &c.

TABULA DUCENTESIMA TRIGESIMA SEXTA.

D

XV^o* *AvoJia* tetraphylla, angustifolia > *Plum*, nov.gen.p. 19.

R A U W O L F F I A foliis lanceolatis, quaternis, nervosis.

Kawolfia frutic'ofa, foliis verticillatis, fenuiflora villois. *Brouiv. Hifi*» Jam. p. 180,
¶ *frudufruiticofa*, foliis Laurinis oblongis, integris, fubtus.⁴ bifutis,
ilore minore, purpureo. *Sloan. Hi/I. Jam. torn. 2. Tab. 2* u Fig-
quse pufilla.

F I G U R A P R I M A.

Haec planta tam graphice a Cl. Linndo. in *H. Cliff* pag. 75? exarata est, ut earn denuo defcribere superfluum foret, prafertim[^] quum latis lit'ohvia fciv ndftris hortis, ubi tamen rarius flojsit; Planta vero, quam honus noflcr publicus alit, folia gerit vere lanceolata, maxime.nero(a, fubtus pallida, & junipr'a laeviter hirfuta feu villofa, cunfta a3quaiia, feu parallela, nec "Bln[^]" reliquis duobus quadruplo majora, ita lit' viva noftra planta perfecte cum *Plumierii* icone quadrety quae foliis ternis aliquando ludit% ficuti ramulos in ea obfervavi, qui terna tantummodo folia gerebanty Cliffortii itaque" planta proprius accedit fubfrequentia plantae, qwpd exfoliatura & modo florendi fie appetet, uti ex collatis iconibus cuique conftabit,

T

Awolfia tetraphylla, latifolia. *Plum.* nov.gen,p. ip.

R A U W O L F F I A foliis ovatis, venofis, verticillatis.

Rauwolfia: *Linn. H. Cliff*, p. 75*

FIG U R ^ \$ E C U N D A.

Hæc

Haec apriore differt foliis ovatis, subfeffilibus, Iatis, iinuofis, maxime venofis, uti ex *Clifortii* iconē pater. Florum racemi breviores, bini regulariter oppofiti, axillares, pluribusque gaudentes floribus umbelJa-tim congeftis, quorum corollas non modo minores, fed & Jaciniis rotundioribus, nee tam profunde difle&is, difHnguuntur, ita ut hasc plantatam foliis quam florendi modo quadret cum ClifFortiana, fi quis tamaea utrasque tantum pro varietatibus habeat, uti Cl. *Linn.* in *Jpec.*, pag. 208. eas conjungit, per me licet, ambas autem juxta Audloris delineationem proponere oportebat.

Dicitum vero fuit hoc genus in memoriam *Leonardi Rainhoffii*, Botanici egregii, & itineribus per Palaeftinam periculofiflmis clari, cujus fata memor#ra inveniuntur ab *JluEbore* in nov. gen. *L c.* ipfiusque vita graphice defcripta exhibetur ab AmplifE Viro *Joan. Freder. Gronovio'm Flora sua Orientally* ubi methodice recenfet plantas a *Rauzoolffio* in variis itineribus obfervatas & colle&as.

TABULA DUCENTESIMA TRIGESIMA SEPTIMA.

R*Enalmia* ramofiflma > floribus variegatis & circinnatis. *Plum. nov. gen. p. 37.*

RENALMIA foliis radicalibus, breviflimis, caule fubnudo, ramii subdivis, adicendentibus, *Linn. Jpec. p. 286. Syjl. Nat. 974.*

Plant a parafytipa.

Radices fibrofae, iimpllices, defcendentes.

Folia radicalia, breviflma, nūmerofiffima, linearia, integ^rrima.

Cai'Jis fubnudus, ramoiiflminus^

Kami ramofi, adfeendentes.

Florh terminales, ere6li, quorum petala contorta, ac retroflexa.

Stamina longiflma.

yfntbera nutantes.

Stilus ere6tus, adfeendens.

Stigma obtu6im, bifulcum; ita ut horum corolla a fubfrequentibus con-generibus penitus fit diftinda.

TABULA DUCENTESIMA TRIGESIMA OCTAVA.



X. Enalmia clavata, flotibus niveis. Plum. 'mjj. Tom. v. p. 63.

RENALMIA foliis linearibus reclinatis, fcapo fimplici, imbricato, fpica fimplici. *Linn. Jpec. p. 287. no. 3/*

F I G U R E P R I M A .

234 PLANTARUM AMERICANARUM

Phnta parafitica.

Kadix fibrillofa; extenfa.

Folia linearia, reclinata, ex latâ bafi irribricatâ.

Scapus ereditus, fimplex, non ramofus, fblitarius, fpathis imbricatis, cbr-datis, acuminatis te&us, e quibus singulis

Flores fblitarii.

Observeatio. Hujus & altera species, seu varietas in *Plumier*. icoriibus proftat, quae foliis latioribus lanceolatis, imbricatis & reflexis a pridre differt, caeterum fcapus itidem fimplex, & fpathis involutus ac testus est.

REnalniia fpicâ multipli ci, arlguftifolia, flore CtdruJe>5. *Plum.* nov. gen. p. 37.

RENALMf A fcapo fpicis imbricatis lateralibus, foliis linearibus ereclis.

Vtfcum Caryophylloides anguftifblium, floribus caerulis *Catesb.* Hift. Car. torn. 2. p. 89. T. 89. Haec in omnibus eonvenit cum majore *Plumier* ifspecie, quam hie exhibemus, minor est omni pane, ac videnrur tan-tum varietates.

FIGURE S E C U N D A.

Planta parafytica, tenera.

•Rtf^C fibrofa, filiformis.

Scapus ereditus, fimplex, iuperne plures fpcas kterdes imbricatas em it-tens, quae m'ulto rarioes ac minores funt, quam in "altera majore va-rietate, uti ex *Catesb.* & au&oris altera icona conftat.

Folia linearia; sequalia, acuminata, eredla, longe frequentiora ac longiora, quam in majore varietate, atque haec, quam hie exhibemus, teneritudine omnium partium, & humilitate plantae ab altera inprimis differt, quae licet eleganter ab autore nostro fit delineata, non infculpi curavimus, quum omnino quadrat cum fplendidiflma icona *Cafes-baa*, excepto quod folia *Catesb.* fint triplo longiora, & ad fummum df.clinata, feu dependentia, quae ab autore nostro ereta, acuminata, 6^ quafi abrupta depita funt.

C33terum hoc genus ab autore nostro RENALMIA didum fuit in memoriā P/za/i^wrt/^Blefefis, Botanices peritiirimi, uti conftat ex ejus fpecimine plantarum, quo plures rarioes seneis tabulis exhibet plantas, opusque ipfum impreflum eft Parifiis ann. 1611. in quarto.

TABULA DUCENTESIMA TRIGESIMA NONA.

T

Wldnoides Cafraheæ folio. *Plum. Cat. p. 20. Town. infi. 656.*

A C A L Y P H A involucris faemineis hirtis, foliis ovato-lanceolatis, ferratis, caule hispidio.

Acalypba involucris fasmeneis integerrirriis, Foliis lanceolatis, obtufk. *Linn.fpcp. 1004.*

£ *Acalypha* humilior, foliis cordato-crehatis, fpicis alaribus & termina* libus. *Bronvi. Hist. Jam, 346. Tab. 36. Fig. 1.*

FIGURAPRIMA.

Planta fruticofa. *Caiilis* hiriutus ac famoius.

Folia ovato-lanceolata, petiolata, obtula, ferrata, nervofa*

Pedunculi ex fingula ala finguli, fimplices, ere6li, fpicam dimidiatam floribus fffrum verfus fuftinentes.

filores faeminei fefTiles, involucris intègris hirtis infidentes, fuperiores mafculini.

Semina terna, pericarpio hirto inclufa, uti in lateralibus figuris.

R *Icinoides frutefcens*, Althaese folio. *Plum. Xat> p» 20. Tourn. in JL p. 6)6.*

A G A L Y P H A involucris fa?mfries cordatis, denticulatis, ipicis fim* plicibus, alaribus, foliis cordatis, ovato-acuminatis, ferratis.

FIGURE**SECONDS**

Planta fruticofa, glabra.

/b/Mcprdata, ovato-acunxinata, ffrata, petiolata, alterna.

Pedunculus ex fingula ala prodit (implex, fuperne terminatus {pick & Q-rum mafculinorum, inferne foliolis cordatis, denticulatis, (effilibus amplexicaulibus, flores faemineos fbventibus.

Obfervatio. Proxime hasp accedic ad Cupameni.. *H.Malab. torn. 10. Tab. 81.* quae eft *Acalypha* involucris fasmeneis cordatis, fubcfenatis, foliis ovatis *Linn.fpec.p. 1003. no. 2.* nofra vero foliis petiolatis, magisque acuminatis, & involucris feffilibus differt.

236 PLANTARUM AMERICANARUM

TABULA DUCENTESIMA QUADRAGESIMA.

D

Icinoides Elseagni folio. *Plum. Cat. p. 20. Tourn. inft. 656.*

C R O T O N foliis lanceolatis, undulatis, integerrimis i fpicis termipa* libus, caule fruticofb.

Croton fruriculofium, foliis longis, anguftis , fubtus incanis, margine reflexis. *Brouw. HiJi. Jam.p. 347. no. 5.*

FIGURE P R I M A.

Planta fruticofa. *Kami ere6li> fimplices.*

Folia lanceclata , integerrima, unduiata , alternata , petiolata, margine reflexo.

Racemus fimplex, terminalis, inferne flores femineos, ftperne maicuii- nos gerens.

R

Icinoides folio Gitri argenteo, polline confperfb. *Plum. Cat. p. 2a Tourn. inft. p. 6\$6.*

C R O T O N foliis ovato-lanceolatis, integerrimis, nitidrs, fpicis alaribus.

Croton fryticulofum & vilMIim. folii* «sordato-acuminatis, ramulis craf- fioribus, tomentofis? *Brouw. HiJi.Jam.p. 347. no. 3.*

/a *Croton* folii3"ovatis, tomentofis, integris, ferratis. "Linn. H. Cliff.p. 444, no, 2.

FIGURE SECUNDA.

Planta arborea, tomentofa.

Folia ovato-lanceolata, integerrima, nitida, petiolata, alterna.

Pedpnculi axilJares, racemo ere61:6, flares fcemineos inferne gerens\ quo- rum pericarpia fcabra & hirta &c.

In *Plumierii* iconibus occurrit *Ititinoides* arbor, Populi foliis hirfutis, qu# eadem planta eft, ^ *R^cinoides* aromatic a. arbor, Circ^ce/oiiis hir- futis, fl. fpicatis dicitur in *Th. Zeyl. p. 201. Tab. 91.* & *Croton* foliis ovatis, tomentofis, ferrulatis &c. *Linn.fp_ec.p. loo^no.y.fyCrolon* fruticofum,foliis iubrotundo-oyatis alternis. *Brouw.. Hift.p."yA&. Vu- mieriicon* fpicam tantummodo gerit terminalem, quis in *Zeyiam'ca* exlateralibus ramis etiam fpicas profert, csterum totus habitus foliorum & florum convenit.

TABULA DUCENTESIMA QUADRAGESIMA PRIMA.

Rivina fcandens, racemofa, amplis Solani foliis, baccis violaceis.
Plum. nov. gen. p. 48.

RVINA floribus corymbofis, foliis lanceolatis, integerrimis.

Solqnoides Americana, Circaeae foliis glabris. *Town. AB. Parif, an. 1706.*

Rivinia farmentofa, farmentis crafrioribus, foliis ovatis, floribus ipicatis dodecandris. *Brouw. Hift. Jam.p. 149. Tab. 23. Fig. 2.* qua? multo inferior eft iconē noſtri auſloris.

Planta fruticofb-ſcandens.

Folia lanceolata, integerrima, finuofa, acuminata, petiolata.

Corymbus terminalis, compofitus ex pluribus fimplicibus racemis altornis; qui

Flares gerunt pedunculatos alternos, numeroſbs.

Obſervatio: Licet hasc planta ab hodiernis Botariicis conjungatur cum vulgari *Rivim*, ejufque tantum varietas cenfeatur, totus tamen florendi modus & habitus ab ea nimis recedit, quam ut eas combinare poffim, uti examinahti patebit ex optima iconē *Hort. Amjl. torn. 1. Tab. 66.* ubi racemi fimplices, axillares, ac folia cordato-ovata, longe aliam prabentu ipiem, quqim. noſtra exhibita, unde cum CL *Brouwri*. ambas diftio&as eile species cenfeo, atque in eum finem Botanicorum bujjs hanc fubjicere volui.

Cſfererū diftum eft hoc genus ab auttore RIVINAI in memoriam Clarii E Aug. Quir. Rivini, de quo vide Auttor, in nov. gen. I. c. & Linn. H. Cf p. 35.



TABULA DUCENTESIMA QUADRAGESIMA SECUNDA.

Rondetia arboreicens, Tini facie. *Plum. nov. gen. p. 15.*

RONDELETIA foliis feſllibus. *Linn. fpec.p. 172.*

FIGURE

T R IM A.

S₃S PLANTARUM AMERICANARUM

Plant a arborea.

Folia obpofita, cruciata; ovato-oblonga, fefilia, integerrima.

*Pedunadi communes, laterales feu alares, longiffimi, nudi, erecti, ui-
perne corymbum dichotomum formantes, in cujus singuladichotomia
flos fefilis cum duplii ftipula, feu involucro diphyllo locatur.*

*Flores tubulofi, monopetali, ut ab au&ore in nov. gen. I. c. aliisque fytte-
maticis cum reliquis fructificationis partibus ulterius definiuntur.*

*Dictum fuit hoc genus R O N D E L E T i A i n memoriam Guill. Ronfekti,
Monpelienfis, qui de pifcibus egregium edidit opus, pluraque de am-
plicibus medicamentis, atque in Dioſcoridem commentatus eft.*

In ordine iconum Plumierii fequitur *Ruellia humilis*, flore caeruleo, Ai-
phodeli radice, qua3 eft *Ruellia* peduncuili unifloris. *Linn. fpēc. p. 635**
no. 4. Quum vero haec optimè fit defcripta ab *H. Eltb:auRore p. 328.*
& exacla- icone *F. 320.* exhibita, fuperfluum foret earn denū exhibere.
Di6l:um vero fuit hoc genus R U E L L I A in memoriam *Joannis
Ruellii GnWi*, qui Dioſcoridem in Latinum e Græco textu tranſtulit,
atque Canonicus Parifiis obiit 1537.



[^]*Aururus racemofus, feu Botrytes major. Plum. nov. gen. p. 5¹**

PIPER foliis ovato-acuminatis, quinquenerviis.

[^]*Saurums* Botrytes , major, arboreſcens, Plantaginis foliis. *Plum,*
Amer.p. 57. Tab.-75. qui eft

Piper foliis cordatis, **quinquenerviis, reticulatis.** *L. *nnfp *c.p. 29. noJ.*
y *Piper* frutefcens diffuſum, rafas ftexibus, geniculatis, folias ovatis;
quinquenerviis. *Brouzo. Hiji.p. 12i.*

F I G U R A S E C U N D A.

PJanta farmentofa, fcandens.

Jō/wovata, acuminata, quinquenervia, reticulata, integerrima.

Pedunculi cum fpica e regione foliorum.

Stigmata- tria:



[^]*Aururus repens, tetrapbyllus, folio craffiore. Plum. H.mJf tom. 5. p. 13.*

PIPER foliis quaternis, cunaeiformibus, emarginatis.

FIGURE

T E RT I A.

PUmfa

Planta humilis, repens, ramofa, dichotoma, ubi radices agit Jaterales, laxas, ramofas.

Cauliculi erécli, dichotomi.

Folia quaterna, cruciara, cuneiformia, ernarginata, crafla, nervofa.

Spica terminalis, fimplex, flrigofa.

Obfervatio. Plurimas hujus generis species ab au&ore exhibits font in defer, pi. Amer. a Tab. 66. ad 78. inter quas unica modo occurrit huic maxime adfinis, quae foliis term's fubrotundis a nostra differt, queque Tab. 68. delineata est, reliqua? vero *Piperis* species a Linn. mspec.p. 29 & 30. iustis nominibus recenfentur.

In *Plum.* iconibus fequitur *Senna* Liguftri folio, fed quum ha?c optime in *H. Elthi* Tab. 359. fit exhibita & defcripta, earn merito praeterimus. *Senna* autem genus ad *CajJias* hodie a Botanicis refertur, atque a Linn. mspec.p. 378. sub no. 14. hsec plahta recenfetur.

TABULA DUCENTESIMA QUADRAGESIMA TERTIA/

S *Ictioides*, fructu echinato, foliis laciniatis. *Plum. Cat. p. 3. Tourndnft. p. 103.*

SIC YOS foliis laciniatis. *Linn. fpcc.p. 1013. no. i<*

F I G U R A P R I M A.

P\znta farmentofh

Caulis flaccidus, filiformis, convolvulaceus, glaber.

Folia cordate, ac palmata, in profundas insequales lacinias ac lobos divisa, fuperne glabra, inferne fcabra & hirta.

Cirrbi ad alas ramofi, trifidi, quorum medius maximus.

Flores e regione foliorum, feffiles, aggregati.

jFrta&us echinatus, fubrotundus, carnofus.

Obfervatio. Hoc genus jRsiOLAA *Brouw.* in *Hi/I. Jam. p. 147.* votatū'r, ubi tres alias species a nostra differentes defcribit, quce sub nomine *Brijonia* in *Sloan. Hjil. Jam.* occurunt.

C &*ImpiJrumfrutefcens'*, triphyllum, Nafturtii Sapore. *Plum. Cat. p. 6.*

C L E O M E foliis ternatis, foliolis ovali-lanceolatis, crenfilatis, racemis terminalibus.

F I G U R A S E C V N D A.

20 PLANTARUM AMERICANARUM

Planta fruticofa.

Folia alternata, petiolata, ternata.

Foliola ovali-oblonga, acuminata, crenulata, venofa.

Racemus terminalis, fibridivis, ternatus.

Siliqua teretes, torofae, glabrae, alternate.

TABULA DUCENTESIMA QUADRAGESIMA QUARTA.

S

iLoana amplis Caftaneae foliis > fru&u echinato. *Pluni. nQV, gen. p. 49**

SLOANE A foliis cordato-ovatis, denticulatis, stipulis ferratis. *Linn, fpec. p. 512. H. Cliff, p. 210.*

*Apeiba Marcgr. Bragp. 123. T. 124. Ray. hifi. p. 1643**

Sloanea foliis majoribus, oblongo-ovatis, integris, venis arcuatis, re-, flexis. *Brouvij. liift. Jam. p. 250.*

F I G U R A P R I U A.

Planta arborea. Rami fimplices.

Folia cordato-ovata, acuminata, dentkulata, nervola, venis arcuatis diffinda, alterna, decidua.

StipuU ad alas ferrate, fubulatse.

Flores apetali, perianrhio constantes monophyllo, feptifido a & b.

Stamina numerofe, {ibulata, calyce longiora c.

Stylus fubulatus, fitamibus longior^/.

Fruttus eircäpfula magna, angulo/a, fubrotunda, echinata e, quadri-
vdvlsf.

Seming. quatuor ovato-oblonga, in carnofb majore loculo recondita, nucleus oblongi gg.

Didumzft ab au&ore hoc genus SLOANE A in honorem & memoriani Illuftr. Baronis Hans Shane, praefidjs Soçietatis Regise Anglicanae * cui fbli magna ex parte debetur notitia Plantarum Jamaic: de qua vide H. Cliff. I. o. & auftorem in wu. gen.

S

Olanumfruticofum; Perficze foliis, aculeatum* *Plum. CaUp. 4. Tourtu injl.p. 149.*

SOLANUM cauleinermi, fruticofb, foliis lanceolatis, iinegerimis, fpjniferis, racemis cymofis.

F JG U R A SECVNDA.

Plant a fruticofa. Cades inermes, lignofi, Icabri.

Folia Janceolata, integerrima, alterna, petiblata, cofta utrimque spinofa.

Kacemi verticales, alterni, Calyces inermes. Petala plana, exteoia.

Bacca globofa?, nutantes, fecundac.

In *Plumierii* iconibus sequitur *Solarium* frutefcens, Acanthi foliis, quod convenit cum *Solano* Bonarienfi *DHL H. Elib.p. 364. F. 3?r.* excepto quod au&oris noſtri plantd caules ac ramos fpinis vagis, ac /blidis hinc inde armatos gerat, ut & fubtus ad foliorum coftas, quag etiam magis lacinixa funt, caeterum idem modus florendi, calyces, flores, bac-
XB & corymbus eodem modo crefcunt, quodque a *Linn. mfpec.p. 185. no. 7.* vocatur *Solanutnczylo.* frutefcente, fubinermi, foliis cuneiformibus, finuato-repandis; in noira laciniatis.

TABULA DUCENTESIMA QUADRAGESIMA QUINTA.

Solanum frutiedfum, Lauri foliis, aculeatum. *Pjum, Cat. p. 4. Toufn. inft.p. 149.*

SOLANUM caule aculeato, fruticofcij; Fdliis ovato-lanceolat'15, intc-gerrimis, racemis lateralibus, fecundis.

j8 *Solatium* fpiniferum, frutefcens, fpinis igneis Americ. *Pliku. Phyt. Tab. 225. Fig. 5.*

FIG U R A P R I M A.

Plnntd fruticofa.

Caulis ac Kami aculeis curtis exasperati.

Folia fariceblatai fmuofa, venofa, qd petiolum spinofa, caiteruni iner-mia ac mollia.

Kacemi laterales, fmplicesj longiffimi^ plurimos gerentes

Flores fecundos, quorum *petala contrada*, linearia, vix reflexa.

Calyces inermes.

Bacca, globof&i molles, nutantes, secunda?

Solanum tomentofum, Verbafci folio, fru&u parvo, flavefcente. *Plitin. Cat. p. 4. Tourn. injl.p. 150.*

SOLANUM caule inermi, fruticofb, foliis ovatis, tomentofis, in-e-&gejri*ijisi*Aimbellis compo/itis. *Ldnn.Jpec.p. i%^no.\Jy(i. Nat. pQ^d.*

Solanum maxime tomentofum, fpinis carens, Virginianum. *Plukn.\dlm\ P*3 &n T-#k*. 3,6» &&. J: cuj us oorymbus minus compofitrus.*

FIG U R A S E C U N D A.

Ni PLANTARUM AMERICANARUM

Planta fruticofa. ' *Kami* crafli, inermes.

Folia petiolata, ovata, integerrima, crafla, venofa, tomentofa.

Corymbus terminalis, compofitus, in plures pedunculos divifus,

Flores gerentes mediocris magnitudinis, quorum *petala* plana.

Calyces inermes.

Eacca globofie, turgidute.

Solanum candens, foliis tomentofis. Plum, Cat. p. 4. Tourn, inft*

150.

SOLANUM caule inermi, flexuofb, foliis[^] ovatis, tomentofis, pedunculis alaribus, aggregatis.

jS *Solanum* caule inermi, fruticofb, foliis geminis, altero rainore. Linn,
/peep. 184, Syfl. Nat. 934. no. 4.

FIGURE T E R T I A.

Tianta fruticofb-farmentofa.

Kami inermes, flexuofi.

<*Folia* ovata, oppofita, quorum alterum altero majus, petiolata, integerrima, crafla, tomentofa.

Pedunculi ad alas conferti, flmplices, fubumbellati,

Flores ere&os, extenfbs, gerentes.

Calyces inermes, denticulati.

Baccx globo&, nutantes, feu ex propriis pedunculis dependentes,

Solanum arborefcens., Solani hortenfis folio, fru&u parvo, coccineo. Plum', Cat. p. 4. Tourn. inft. p. 150.

SOLANUM caule inermi, fruticofb, foliis ovatis, pedunculis alaribus I calycibus dentatis, repandis'.

FIGURA QUARTA.

Planta fruticofa, ramofiffima.

Folia ovata, fmuofa, integerrima, venofa.

Pcdudculi zfares, inferne fblitarii, fuperne bini tresve obpofiti.

Calyces denticulati, retroflexi.

Baccz fibrotundae.

Solanum arborefcens, Amygdali folio undulato, flore magno, albo, fructu rubro. Plum. Cat. p. 4. Tourn. inft.p, 1 ^o.

SOLANUM caule inermi, fruticofo, foliis oblongis, flore fpeciofo,
axillan, (blitario).

FIGURA

HUINTA:

Planta

Plant a arborea. Kami breves, flexuofi, inermes.

Folia oblonga, acuminata, *fmuoih* ac *venofa*, bina utcunque ex communi orcu.


Pedunculi alares, fblitarii.

Florcs fpeciofi, folitarii, quorum petala magna, expanfi, ad oras crenulata.

Calyces inermes, ftriati. *Bacca* Iphacricae, ere \leq 5toe, mature nutantes.

Obfervatio. Hafce fingulares ac raras *Solanorum* species apud nullos inveni au&ores, quorum itaque partes Botanicorum oculis, 8i ulteriori exam in i fubjicere volui.

In Auctoris iconibus ultimo loco habetur *Solatium* aculeatum, Hyofcyami foliis, flore intus albo, extus purpureo, quod in pluribus convenit cum *Solano* Indico *H. Eli bam.* & *Linn. spec.* p. 187. no. 17. differt vero, quod aculei flnt retroflexi, rec erebi:i, multoque frequcntiores, & ad foliorum coftas excurrant. *Petala* magis coj^racla, Jinearia fere, & revoluta, uti & calyces. Csterum *Bacca* globdBI, & idem plantae habitu's quoad externam formam, & delineationes.



TABULA DUCENTESIMA QUADRAGESIMA SEXTA.

SPartium Portulaca? folio, aculeatum, Ebeni materie. *Plum. Cat.* p. 19. *Tourn. inft.p.* 647.

P T E R O C A R P U S foliis fimplicibus, aggregatis, obovatis, aeniis.

£ *Afphalthus* arboreus, feu Pfeudo-ebenus *Buxi* fo!io₉ flore luteo, patu*k*, iiliqua lata, brevi, chartacea. *Sloan. Hi/I. torn.* 2. *Tab.* 175.

Brya arborefcens, erechi, fpinofa, foliolis confertis, fl. geminatis. *Brouw. Hifi. Jam.* p. 295. *Tab.* 31. *Fig.'2.*

FIGURE P R I M si.

PJanta fruticofa. *Caulis* aculeatus, rotundus, lignofus.

Kami fimplices, longi, in apice floriferi.

Folia ternata, ovata, crallia, carnofa, avenia, inajquaiis magnitudinis_{p9} interpofitis wiinoribus folitariis.

Legumina geminz, ^ pedunculata, reniformia, fcabra, reticulata.

Obfervatio. Hujus' fruticis filique tantam habent cum ditto genere adfinitatem, uti patet ex *Commel. Hift Amfi. torn.* r. *Tab.*, 109. ut vix separari poslit, de quo ulterius vide *Linn. Fl. Zeyl.* p. 196. & *Mat. Medic,* p. 184. praeterquam quod hoc genus plures, jam agnoseat species, quas vide in *Lcefing. itinere pag.* 147 & 168. &c. Quum vero

- flores hujus fruticis mihi nondum iatis innotuere, hinc dubius ha?fito, nura ad *Linndi* genüs, num vero ad *Bryam Brouiv.* pertineat, quod ex viva planta, ulterius inquirendum ac definientium, unde utrumque genüs, quod ab aliis ad alia iterum refertur, proponere volui.

244 PLANTARUM AMERICANARUM

SPartium fcandens, Citri foliis, fioribus albis, ad nodos eonfertim nafcentibus. *Plum. Cat.* p. 19. *Tourn. inft.p.* 64\$.

HEDYSARUM foliis alternis, ovatis, pedunculis alaribus, confer-
tis, ramofis.

Hedyfarum ecaftaphyllum; *Linn, fy ft. not, torn. 2. p. 1169. no. 4.*

Ecaftaphyllum fruteicens, reclinatum, foliis oyato-acuminatis, integris,
alternis. *Bromo. Hift. Jam. p. 299, Tab. 32. Fig. 1.*

FIGURA *S* *E* *C* *'UN* *D* *A*

Planta arborea.

CauHs inermis, angulatus, fcandens.

Folia plana, cordato-ovata, integerrima, venofa, alterna, tria quatuorve
in communi petiolo.

Pedunculi ad alas conferti, fpinulofit; ac ramofi.

Flores vulgaris forma?. *Legumina* defunt.



TABULA DUCENTESIMA QUADRAGESIMA SEPTiMA.

SPrtf^/^ fcandens* fmftu criftato \ & alato; flore rubro. *Pluvt. Hi ft,*
mjf.iomlii.p. H2.

SECURIDACA caule volubili, foliis oblongis; fpicis racemofis.

Securidaca fcandens, foliis oblongis, fpicis racemofls. *Bronw, Hifi > Jam.*
p. 288.

*Securidaca** *Linrt.fpec.p.'jo']*,

FIGURA *P* *RIM* *A.*

Plantà fruticofb-farmentofa, fcandens.

Caulis inermis, filiform is.

Folia pinnata.

Foliola alternaj ovato-oblonga; integerrima, venofa.

Peduncuti communes longiflimi, fimplices, racemofi*.

Legumina plana, alata, obtuf?, oblonga.



[^]*Tapbylodendron* foliis Lauri angustifl. *Plum. Cat.* p. 18.

P T E L E A foliis simplicibus. *Linn spec.* p. 118. no. 2.

Dodon&a. Linn. H. Cliff, p. 114.

Carpinus forte vifcofa, *Salicis* folio integro, oblongo., *Burm>Zeyl.* p. 55.
Tab. 23.

Caryopbyllafter littoreus. *Humph. Herb. Amb. I.* 6. ***. 55. taw. 4.

Triopteris Elaeagni foliis vifcoiis, liete virentibus, Americana. *Plukn. ManLp.*, 185.


Jlrbiiifciili vifcofa, Elaeagni foliis Vete virentibus, Americana, tricoc* cos. *Plukn.- Fhyt.* Tab. 141, Fig. 1. Kamulum fine flore ac fru6lu notat.

[^] *TnopterU* erepta, fruticofa, foliis oblongis, acurninatis, r-amulis gracilibus. *Brouw. Hifi. Jam.p.oigi.* Tab. 18 i%. 1. cuius icon optim.e quadrat cum nohra Zeyl. quos itaque conjungit;

Aceri vel *Paliuro* affinis, angusto oblongo Liguftri folio. *Sloan, Cat.* p. 138. *Hifi. torn.* 2. T. 162. Fig. 3.

FIGURE S E C U N D A

Obfervatio. Vix ulla mihi obvenit arbucula, qu[^] tantopere Botanico-rum ingeniaexercuit, quumque in utrisque indiis habitet, apud plurimos obcurrk au[^]tores, fed omnes ad diverfiim genus earn retulere, uti ex variis denominationibus patet, aeterum fatis exacte descripta habetur in *H. Cliff] Flor. Zelyp.* \$£..& *Tbef.* meb'Zeytanico, excepto quod flores non tantum in fummis ramulif fed ad fbijprurn ajas corymbofi excrefcant,uti ex fbla *Aufioris* & *Sloanei* iconē adpāret, "ipfiusque caracolierem optime dedit. *Brouw. I. c. p.* 192.



TABULA DUCENTESIMA QUADRAGESIMA OCTAVA.

S Partium alterum, fcandens; fru&u alato, flore variegatb; ~i%< *Hifi. jnff. tom. 2. p. U3*<

SEICURIDACA foliis orbiculatis, aeniis, ipicis ramofoj ramis filiformibus!

Scundae~~a~~ fructuofolis fubrotundis, ramulis tenuiffimisj ipicis laxis-termirialibūs. *Brouw. Hifi. Jam. p.* 287.

FIGURE PRIMA.

26 PLANTARUM AMERICANARUM

*Plant a fruticofb-flagellofa. Rami filiformes, fcandentes.
Folia fimplicia, ovata, avenia, alternata, petiolata.
Racemi floriferi terminales, laxi, dependences.
Flores imperfe&e ab au&ore delineati.
Legumina plana, oblonga, alata.*



X *Abern&montana* la&efcens, Citri foliis unduiatis. *Plum. nov. gen. p-i8.*
TABERN^EMONT ANA foliis oppofitis, lanceolatis. *Linn, fpecp. 2io.*
Tubern&montana foliis lanceolatis. *Hort. Cliff, p. 76. Roy.pr.p. 4'3**
Tabernamontana frutefcens, foliis fubnitidis, ovatis , venofis. *Brouw,
Hift. Jam. p. 182.*

FIGURE

SECUN.D4.

*Planta fruticola, Ia6lelcens. Kami fimplices, vix divifi.
i^wobpofita, ovato-lanceolata, undulata, inregerima, petiolata, ve-
nofa, nitida.
Racemi floriferi alares, ramofi, oppofiti.
Flores & Siliqua a fyftematibus & au6lore noflro in nov, gen. accurate cie-
fcribuntur, quas tantam cum Cameraruz genere habent adfinitatem, /U
haec bina genera facile combinari poflint, uti Cururu & Suriana nofm
auftoris fub uno jam genere Paullinid conjun&ae funt. Quantum vero
noftra planta differat a Pala H. Malab. torn. 1. Tab. 46. quoad fru&ificationem & formam, cuivis icones infpicienti facile patebit, fed Carutu
Pala Tab. 47. fine dubio Taberndmontana fpcies eft, hi modo hujus
varietas.
Genus autem hoc ab au&ore no/lro in memoriam J. Th. 7 aberndmonta-
ni diflum eft, cujus fludio prodiit Hiftoria Plantafum generalis Germa-
nice inprella, obiit vero ille Hardelberge ann. 1590.*



TABULA DUCENTESIMA QUADRAGESIMA NONA.



t^Uriana folio Portulaceae angusto. Plum. nov. gen p, 37.

SURIANA. *Linn.Jpec.p. 284. H. Cliff. 492.*

*Suriana maritima, foliolis lanceolatis, floribus Wularibus, flaminibus
fubhifutis. Brouw. Hift. Jam. p. 190.*

*Tbymelaa facie frutex maritimus, tetrafpermous, flore tetrapetaloi Sloan.
Cat. Jam. p. 138. Hift. torn: 2. p. 29. Tab. 162. Fig. 4, fine flore.*

*Jfbor Americana, -Salicis folio,-frondofa, Berrnudienfis. Pkkn.- Ahn.p-
44. 1 ab% 241. tig. 5. absque tlore vel fru&u.*

FIGURA

PRIM A.

Planta

TABULA DUCENTESIMA · QUINQUAGESIMA PRIMA.

T *Hymeua* frutefcens, Rbff*^iHni* folio, flore albo. *Plum. Cat. p. 17**
Tourn. in/I. p. 594:

TOURNEFOR TIA foliis lanceolato-linearibus, confertis, termi*
 nalibus, cäuleifubfruticofb.

Tournefortia fubfruticofa* foliis fubincanis, oblongis, fronde comofa*
Brouw. Hift. Jam. p. 170. no. 5.

FIG U R A P R I M A.

Plania fruticofa. *Caulis* compofitus.

Kami nudi, fcabri, inferius dichqtomi, fuperius omnes trichotomi.

Folia lineafia, nervofa; acuminata, in orberii pofita, ramos terminantia*
Flores inter, folia fparfi, fblitarii, peduticulati.

Bacca globbfie, umbilical, uti in *Tournefortiis\$ fed fblitaricB*, nee ra*
 cemofse, uti in reliquis congeneribus.

*Obfervalio** Q\ Brouw.* hujus^plants Syrtonymum facir, Thymelasæ facie fruticerri maritimum &a *Sloan. Hift. Tab. 162. Fig. 4.* qui nequit eflè hujus generis \$ quum *Shane* calycem pingac ingentem, qui in *Tournefortiisparvus* eft, adeoque alijs efl generisj & ad SURIANAM *Plumierii* proprie pertinet, uti iupra ex hujus fruticis defcriptione confttitit, unde & *Sloanei* yhntam eo retuli.

T *ltbymditiis* arborefcens, foliis Linariae anguflioribus. *Plum. Cat. p.*
 1. *Tourn. inft. p.S\$.*

EUPHORBIA aftieulata, folifs integerrimis, linearibus, pedunculis unifloris.

EtipborHa ere&Z) tenuis, foliis linearibus, fl. terminalibus. *Brouw** *HifA*,
Jam. p. 235. no. 4.

/3 *Euphorbia* foliis oppofitis, integerrimis, lancedlatis, pedunculis uni-
 floris &c. *Linn./peep. 455: no. 24.*

Peplis fruticofa, maritima, geniculata. *Sloan** *Cat.p. 82.*

F IGM RA S E CU ND A.

P/drato arborea, ramoffiffima > *Cauks* didiororni, articulati.

Kami alternati, geniculati.

Folia obpofita, feffilia, linearia; obtufa, nervo/a.

/% ~~res~~ ramulos terminant fblitarii, pedunculati.

PLANTARUM AMERICANARUM

TV

Uymalus heterophyllus. Htm. Hifl. m# torn. 4. p. 7.

EUPHORBIA inermis, foliis ferratis, petiolatis, difformibus, ovatis, lanceolatis, panduriformibus. *Diffr. de Euphorb. p. 13. Linn. spec. p. 453.*

Tithymalus Curaß. Salicis & Atriplicis foliis variis, caulis viridantibus. *Plakn. Alm. p. 369. Phyt. Tab. 112. Fig. 6.*

Tithymalus Curaß. Salicis & Atriplicis foliis hirsutis, caulis subrubentibus. *Morit. Hist. tom. 3. p. 336.*

F I G U R A T E R T I A .

Planta herbacea. Caulk ereaus, vix ramofe
fibrillofa, brachiata, ~~pedunculata~~, ^{decidua}
- ~~forma~~, caulina ovata vel lanceolata, petiolata, finuosa, subfer-
rata. Ramen florifera, nunc lanceolata, sessilia; umbellata, nunc pan-
duriformia, magisque ferrata.
Flores ramicos terminant pedunculati, subumbellat
Inter omnes *Euphorbie* species h
folior ^{V a}_{ffil} ⁶_X reliuis omnibus co^{gn}iss diffintta, ficuti
supra ⁱⁿ_{ZTr} ^{Xhfaimus}, TM simili modo at, omnibus congne-
mis obtinet.

TABULA DUCENTESIMA QUINQUAGESIMA SECUNDA.

T

Ragiafcmdens, longo Betonic*folio. *Plum., tov. gm. p. 14.*

TRA GIA foliis lanceolatis, ferratis, caule filiformi.

7><jjMfoIiiscordato-oblongis, caule volubili. *Linn. spec. p. 980.*
Tragia fcandens, foliis halatis, ferratis, hispidis. *Brouw. Hist. Jam.*
/> 336.

6 i</i<:jracemofa, fcandens, anguifolia >_{twocco} *Sloane. Cat.*
A 38. «j[^]. *Jam. vol. up. 123. TS* «V ^{twocco} *Sloane. Cat.*
* * urens, Virginiana, foUis Quercinis; % *en. Phyt. Tab. 107. F. 5.*

F I G U R A I M A.

Plania fruticofa, in lock maritime crffce"ns.

Kami simplices, fcabri, crafTi, fungofi.

Folia per ramos fparfa, falciculata feu aggregata, oblonga, crafla, fuccii* lenta, avenia:

Flores peduncuiari, plures aggregati, pentapetali, quales a Syiremati- cis ulterius cum fru&ificatione" defcribuntim

SuRiANiE genus ab au&ore noftro denominatum eft in memoriani Jofepb. Donati Surian, Medici Mafiliensis, qui munere Botanici Regii in infulas Americanas prove&us eftj, ibique fedulo plantarum vires indagavit, ita ut meditatus fuerit Pharmacopceam Americanam, fl diutius vixiffet, edere, fed hoc opus cam aurore Mafliae obiit; exftat ramen catalogus plantafum Amerie ad calcem operis, Traité dcs Drogues per Nicol, Lemery^ Parifjis editi &c.

S*Ambucus*. ligno duro, odoratissimo; feu Santalwn racemofum, foliis obtufis. *Plum. Hift. mff. torn. 5. p. 43.*

CASSINE? foliis obovatis, integerrimis, fpar/lis.

Arbor baccifera, iatifolia, aromaticā, fr. viridi, calyculato. *Sloan, Cat, p. 16\$.*

FIGURE S E C U N D A.

Plania arborea. *Kami* diehotonii, fcabri ^ quasi articulati.

Folia verticalia, plura, incerto ordine locata, vix petiolata j obovata^ obtufa, uti in *Coiiho**

Flores'corymbofi) verticales, pentapetali, petalis linearibus; ex quibus patet eflē plantam pentandram, adeoque non adiinem Myrtis, quum vero pistilla deficiantj uti in plurimis Autoris iconibus^ quod dolent dum, hinc fru&ificatio incerta, & in patrio fblo ulterius inveftigandai In iconibus *Plumieri* fequitur *Tannus* tuberifera, radice fungiformi, quse eft *Diofcorea* ad alas bulbifera, de qua vide *Linn. H. Cliff. 4\$9. Jpec, p. 1033. no. 5. Herm. Farad, p. 217. Kwnpb, Herb. Amb. torn. v.p. 346. H.Malab. torn. 7. T. 36.*

TABULA DUCENTESIMA QUINQUAGESIMA;

X*Amnus* racerrioſa, major & minor. *Plum. Cat. p. 3.*

SMI LAX caule inermi, volubili, foliis cordatis, acuminatis^ trinerviis.

FIG U R A P R I M A.

Mm	Plant	a

28 PLANTARUM AMERICANARUM

Planta farmentola, fcandens, herbacea.

Radix diffusa, fibrillofa.

Caulis inermis, rotundus, fcandens, leu volubilis.

Folia petiolata, cordato-ovata, acuminata, trinervia, venosa, integer-rima.

Cirri ex alis fimplices, hinc *Tamnus* efle nequit.

Racemi longiffimi, ramofi, dependentes.

Flares juxta delineationem pentapetali.

Bacca fubrotundze, glabre, plura continentem femina.

Obseratio. Plures font hujus generis species, uti id patet ex *Linn.Jpec»* iO2%&eq. quarum quaedam caules gerunt aculeatos, reliquae inermes, dumque plurimae sunt herbaceae foliis cordatis, hinc incertum au&orum Synonyma laudare, undenulla Auctoris plants fubjurixi, *Tamnus* ve-to non eft, dum Cirrhos gerit, ac fine dubio ex *Smilacis* genere eft. •

Tamnus Anguriae folio. *Plum. Cat. p. 3.* item *Sicyoides* fru&u coral* lino, laevi, *Cat.p.* 3,*

ANGURIA foliis palmatis, integerrimis, fructibus, ovatisj lsevibus*

F I G U R A S E C U 'N D A.

Planta farmentofa.

Radix fusiformis, brachiata, longa, defcendens»

Caulis inermis, rotundus, glaber, ramofus.

Folia palmata, in quinque majoroc & profundas lacinias diftinfla • quarurri media longiffima, suntque oblongse, finuofie, ac venofaEr, quarum ex^ teriores, breviore, & ad inferiorem externam partem ampliatiE funk.

Racemi floriferi, fimplices, longi, fiores alternatim gerentes.

Baccz ovatae, lseves, altematae, uniloculares, *nucleum* fblitarium oblongum continentem.

Obfervatio. Synonyma huic plantae addere difficultimum quoque eft, dum plures Cucurbitiferae sunt plantse, quaeruntur folia gerunt palmata, ex fructu* ficatione vero patet, pertinere ad novum genus *Anguria Djacquierii** In iconibus fequitur

Tdephiodes frutefcens, Hyperici folio. *Hift. mff.tom. 5./>*90,* quae eft

• **Frutex Indicus, baccifer.** *Breyn. Cental, Tab. 5. & MYRSINE Linn. fpec. p. 196.* dein

Terebinthus Piftachiae fructu non eduli. *Plum. Cat. 17,* quae a vulgari dif fert, quod foliolorum paria gerat quatuor cum inpari, suntque ovata, acuminata, & avenia. *Racemi* floriferi plures adpinnarum ortum colle. *Bacca* oblongas, angulofb.

Planta herbacea, laevis, volubilis. *Radix* diffusa, brachiata.

Caulis filiformis, flexilis, decumbens, contra fblem fcandens, laevis.

Folia fblitaria, longe remota, petiolata, haftato-lanceolata, acute ferrata, pilis rigidis fubtus adfperfa, hifpida.

Racemi axillares, fblitarii, fuperne maſculi, *flofculis* viridibus trifidis, & antheris ternis luteis conftantes.

Fnitlus eft capula tricoccos, ex tribus globulis compofita, te&a fetis rigidis j urentibus, pedunculata, alternata* racemofa.

Semina terna, globoſa, glabra, uti in lateralibus figuris*



JL *Ragia* alia^ fcandens, JL Jitiae folio. *Plum. nov. gen*, p. 14.

TRA GIA caule volubili, hifpido, foliis cordato-ovatis, ferratis, ureritibus.

Vrtica racemofa, fruticofa, anguftifolia, fructu tricocco. *Sloan. Hift. Jam.vol.-i. Tab. 16 Fig. 1.*

Ftinis urens. *Rumph. Herb. Amb. lib. 7. cap. 9, Tab. 9.*

Ricinus afprior, Alceae venetae foliis aliquatenus accedens. *Pkkn. Pbyt. Tab. 22a Fig' 2.* cujus folia inferius fublobata.

FIGURE S E C U N D A.


Planta fruticofa, rigida.

Caulis flexuofus, erexitus, hifpidus.

Folia cordato-ovata, acuminata, profunde ferrata, fubtus fetis afperis adfperfa, ui-entia, longe petiolata.

Pedunculus femineus, ex alis fimplex, nudus, inermis, uniflorus.

Spic<£ maſculina?, ex eadem ala, laxag, compofitae ex racemis minoribus, fimplicibus, alternis, qui ex alis foliorum alterni oriuntur, in vertice frequentiores.



TABULA DUCENTESIMA QUINQUAGESIMA TERTIA.,

T *Rachelium* Sonchi folio, flore albo, longiflomo. *Plum. Cn^z. Tourn. inft.p. 131.*

LUBELIA foliis lanceolatis, dentatis, pedunculis breviirimiſ, lateribus, tubo corollae filiformi longiflomo. *Roy.Jl.pr. 241. Linn.spec. p: 970. 9> Bromv. Hift, Jam. 322.*

Rapunculus aquaticus, foliis Cichorei, flore albo, tubo longiflomo. *Sloan. Hift. torn. j. Tab. 101. Fig. 2. manca. c r*

252 PLANTARUM AMERICANARUM

Phnta herbacea, feiTilis, annua.

Radix fufiformis, descendens, brachiata, nee fibrofa.

Fdlia lanceoiata, finuofa, denticulata, uti in Sonchis.

Caulis v-ero villofus, uti in Hyoscyamo.

Flores alternati, vix pedunculati, tubo longiffimo, filiformi, uti in lateralibus Figuris.

Frudus eft capula ventricosa, & angulata, fulcata,

Seminaplurima, rotunda, minora continens, uti in diffe&aadparet.



TABULA DUCENTESIMA QU1NQCJ_{AG}ESIMA QUART A.

T *Ribulus* terreftris, fru&u turbinato, foliis lanuginofis. *Plum.* *Cat.*
P.*y. Town, *inft*, p. 266.

TRIBULUS foliis fenis pinnatis, exterhis majoribus, floribus fingu-Jaribus. *Brouw. Hift. Jam.* p. 220. *Tab. 21. Fig. 3.* pufilla.

Tribulus foliolis trium parium pinnatis. *Linn. H. Cliff*, p. 16c.

Tribulus terreftris major, flore maximo, odorato. *Sloan. Cat. Jam.* p- 90. *HiJi^voLu Tab. 13 2*«

Q> *Tribulus* foliolis quadrijugis exterioribus majoribus. *Linn.fpcc.p** 3^o*

FIG U R A P R I M ^i.

Plant a Uerbacea, repens_a in arenofis ac fleribus crefcens locis.

Caulis ihermis, geniculatus, ramofus.

Folia pinnata, ex .fex foliolis fubovatis conftantia, quorum inferiora mi* nima, omnia vero fefifilia, ovato-oblonga, integerrima, (ubtus hirfiita.

Flores pedunculati, folitarii, ad pinnas axillares, ere6ti.

FruBus nutantes, pedunculati, nee'tam aculeati vel mucronati, quant in congeneribus, unde hoc genus denominatum eft.

Sed hujus plantse frudus eft juxta *H. Cliff. I. c. pyramidalis*, quinqueangularis, decagonus, decem conftans, feminibus, rotatim ftylum. cmbien-tibus, unde & diftinguitur ab" altera aucloris specie, quee ipfi dicitur , *Tribulus* terreftris fr. aculeato, amplis Cifti floribus, que a *Plukn. & Pbyt. Tab. 67** 1% . 4' delineata eft.



X *Ribulus* frutefcens, fpinofiflimus. *Plum. Hiftlmff.tom. j^pi \$8**

RH AMNL1S caule frutefcente, fpinpfo, folios- retufis, (pio\$ axillari-bus, reflexis.

FIGURE

S ECUND-A.

plant*

Planta fubfruticofa. *Caulis* fpinofiflimus.
Rami alterni, alternatim inflexi, fpina terminali.
Foliola fblitaria, feftlia, fubrotunda, reflexa, fuperne utcunque cordata.
Spinaex fingula ala, curta, acuminata.
Flores fblitarii, feffiles, axillares, pufilli.
Frutlus majores, feffiles, undique aculeati & mucronati, feu calyprati.
Obfervatio. Cun&a? *Tfibuli* fpecies hue usque nota? folia gerunt pinna*
ta, atque inermes fnt \ hasc caulem profert fpinofifllmum, ramos ex
fingulis alis fpinofbs, foliaque fblitaria & alternata j unde ha?c nequit
efle *TribuhiS*) fed optime *Rbamnum*[^] vel *Zizypbum* refert[^] unde quam
diu fru6tificatio fit incerta, tuto fub alterutro comprehendl potelt ge-
nere, casterum eft planta quam maxime iingularis, ac rariflima, quam
apud nullum pJum inveni Au&orem.
Sed Tub nomine *Zizypbi* fylvefris, qui frutex huic maxime eft adfiniSjOO-
currit icon apud *Sbavium* in *Catal. pi. Afric. no. 632. Tab. ultima*,
ita ut noflra ad *Zizypbum* eodem jure referri polet.



TABULA DUCENTESIMA QUINQUAGESIMA QUINTA.

JL *Riumfetta* fruflu echinato, racemofb. *Plum. nov. gen. p. 40.*

TRIUMFETTA. *Linn. H. Clif.p. 210. fpec.p.444. Roy.pr.p. 476.*

Triumfetta viilofa, foliis inferioribus angulato-ovatis, ferrato-dentatis,
floribus teraatis, fafciculis geminatis, foliis fubobpofitis. *Brouw. Hift,*
Jam. p. 233.

happula Bermudienfis, Althaeoides, fpicata, fru&u orbicu'lari, majore.

Plukn. Aim. p. 206. Tab. 245. Fig. 7. pufilla.

j4grimonia lappacea, inodora, folio fubrotundo, dentato. *Sloan, Cat.*
Jam. 92. Hifi. i.p.211.

Frutex innominatus, fecundus* *Marcgt. Braf p. 80.*

P/^«^.fruticofa. *Caulis* ere&us, fimplexj teres, fcaber*

Folia alterna₅ remota, fubcordata, quinque angularia, nervis totidem e
bafi adfeendentibus, rugofa, mollia, ac viilofa, viridia, inasqualiter
(errata, patentia, inasqualis magnitudinis, quum ad fummitatem folia
minora, ac vix lobata, fed ovato-acuminata,

Pedunculus fimplex, bifidus vel trifidus, caulem terminans, ac racemura
fofmans jfloriferium.

Flores lutei, calye pentaphyllo (qui /n au&oris lateral! icone fexfidus,
linearis) contenti, petalis nullis, fed ftaminibus fexdecim, & piftillo
fubulato gaudent]uxta *H. Cliff. I. c.*

Frutlus pifi magnitudinis, durus eft, ac fpfoericus, echinatus, quatuor
confans feminibus angulofis, oblongis, uti in feparatis frutus partibus
confpicitur. Eftque hsec planta fatis obvia in noftris hortis.

254 PJLANTARUM AMERICAN ARUM

Diftum eft hoc genus in memoriam *Joannis Baptifld: Triumfetti* Bondnienfis, qui de ortu & interim plantarum obfervations, nee non *nō* Vam Stripium Hiftoriam in quarto edidic Romae 1689. &c.

Jn iconibus fequitur

Turner a frutefcens, *Ulmifolia*. *Plum. nov. gen. p. 15.*

Quum vero haec planta in hortis nqflris jam fit vulgatissima, & ex *Martin. Centur. Tab. 49.* riotiffima, nee non in *H. Cliff*, praetantiflma ejus exftat icon & descript. p. 112. *Tab. 10*, hinc inutile foret, earn de* nuo exhibere*

TABULA DUCENTESLMA QUINQUAGESIMA SEXTA:

VII

V AldiaCzmin folio, fru6iu fubcaeruleo. *Plum. nov.gen.p. 11.*

OVIEDA. L w». ^ . p. 637.

Planta herbacea. *Caulis* ere6lus, firaplex.

Folia obpofita, oblonga, denticulata, petiolata.

Flores corymbofi, terminales, tubulofi, tubo longiflimo, uti in *Catesbaa*, fed Iimbus illorum minus patulus, & trifidus, peculiare auteni eft, quod auctor pingat corollae tubum germini fru6lus infidentem, uti in Mirabili, dum calyx tamen infra fru6tum locetur.

Stamina fex, corollti longiora, *pilillum* unicum.

Calyx quinquefidus a ingens.

FruCtus eft bacca obovata, glabra b.

Semina bina,-uti in diffe&a c, oblonga d.

Obferbatio. Rariflma planta eft, a nemine porro obfervata, cujus. fructificatio in patrio fblo ulteriis rite examinanda.

Di&um eft hoc genus in memoriam *Gonfales Ferd. d^Oviedp*, feu de p^d-rffeHifpani, quijuffu Ferdinandi V.-Hifpan. Regis Hiftoriam naturalem, & plantarum Indian Occidentalism feu in Amērica naſcentium conſcripfit, quae proftat in tertio volumine itinerarii & navigation. Venet. 1556. in folio.

In crdine iconum fequitur *T^erbenaca* arborefcens, Lamii foliis villoſts *H** mff. torn. iv. p 114. Ted quum haec optime a *Slōan*, in *Hi/I. Jam tont.* 1. *Tab. 107. Fig. 7.* fit exhibita, & vulgatissima in hortis no ft r'is, hinc eamomittimus; ad *Verbenas* proprie ha?c planta pertinet, & *Verbena..* foliis obtufe ovalibus, fpica carnōfa, nuda, à *Linn*, in *H. Cliff.p. 10.* VP catur, ubi ipfius habetur descriptio. Cl. vero *Vaitl.* in fingulari traclatu de. ftruſtura. florum hoc genuS olim Nobilili: *Sberardo* cphforavit, ipfique diſta fuit haec planta *Sberardia* Teucrii folio, fl. purpureo. p-49. ubi vide reliqua ad hoc genus pertinentia:



V *Jfcoides* baccis purpureis. *Plum. Hi/I. mff. torn,* vr. pag. 100.

F I G U R A dU I N T A.


Planta fruticofa. *Kami* fimplices, longi; lignofi.

Folia per ramos fparia ac vaga, nunc alternata, nunc obpofita, oblorigo-ovata, inferius anguftata, petiolata, venofa.

Flores corymbofi, per ramos fparfi, pentapetali, calyce quadriphylld cbntenti, quorum racemi dichotomi.

Bacca globofas, - pericarpio quadrifido infidentes, molles, glabrae, pur* purafcentes.

Ob/ervatio. Hanc plantam non eflē *J^ifd* fpeciem patet ex calyce quinquefido, fēd cuius generis incertum, unde in patrio folo ulterius inqurenda, forte novi eft generis, nee videtur planta parafytica: peculiare autem eftj quod corymbos gerat dichotomos.



TABULA DUCENTESIMA QUINQUAGESIMA NONA.

V *Itis* AbutiH folio, aeinis atropurpureis. (*Plum. Cat. p. 18. Tournanjt, p- 613.*

VITIi foliis cdfjatis j -fūbtrijbbis* dentatis, fiibtuſ tomentbfis. *LintU Jpee. p. 203, no. 3. Syft.Nat. 942.*

Vitis fylveftris, farmentis late repentibus, mis minoribus, nigris. *Brouvi* tiifi. jam. p. 178.*

Vitis fru6iu miriore, rubro, acerbo, folio fubrotundo, minus laciñato, fubtusalba lanugine te6to. *Sloan. Hift. Jam. torn. 2. p. 104. Tab. 210.*

Vilis vinifera, fylveftris^ Americana, foliis averfa piarte-denfa lanuginē tedis. *Phtbh Phyt. Tab. 249. Fig. 1**

FIGURE P R t M A.

P/d#tafruticofo-farmentofa, pforepensj fylveftris,
Cirrbi ramofi, axillares.

Folia cordata, orbiculato-acuminata>.prqfundē dentata, venofa; fūbtus villofa, feu tomentofa.

Racemi longi, ex nodis dependentes.

Uva coadunatae, minores, nigriqantes.

258 PLANTARUM AMERICANARUM

¶

V his Hederse folio ferratb. Phlm. Cat. p. 18. Town, inji, p. 613.

VITIS foliis cordatis, dentatis, fubtus villofis, cirrhis racemiferis. *Linn-fpec.p. 202. Syfi. Nat. 942.*

Vitis fylveftris, Indica, acinis rotundis. *Ray. dendr. p. 6f.*
*Labrufca Molucca. Humph*Herb. Amb. lib. 9. cap. 67. Tab. 167.*

FIGURE S E C U N D A.

Vlanta fruticofb-farmentofa, fylveftris.

Folia cordata, ovatd-acumiiata, dentata, alterria, petiolata.

Cirrbi ex nodis & alis, fimplices, dependentes.

Kacemi coFymbofi, fubumbellati.

Uv& fubrotundae acuminatae. Arilli firiiplices.

Hujus & altera fpecies feu varietas irl Auftoris iconibus occurnt, quae yitis fcliis Cyclaminis, uva corymbofa dicitur.

Vltis folio fubrotundo, uva corymbofa, caerulea. *Plum. Cat. p. 18.*
*TournAnJl.p. 613**

VITIS foliis cordato-orbkulatis, integerrimis, racemis corymbofis.

F I G U R A T E R T I A.

Plama fruticofo-farmeritofa. Kani fimplices, nodofi.

*Folia cordata, plana, orbiculata, acuminata, integerrima, finuofa**

Racemi extenfi, corymbofi, fubumbellati.

*Lfoa majores, oblongae, acini's fblitariis**

Cirrbi ad nodos ingentes, bifidi, retrogradi.

Vltis trifolia, uva corymbofa, acinis minoribus rotundis. *Plum. Cat. p. 18. Tourn. infi.p. 613.*

VITIS foliis ternatis, foliolis ovatis, dentato-ferratis, racemis corymbofis.

FIGURE HU ART A.

Planta fruticofo-farmentofa. Rami tortuofi, ftriati, ac nodofi.

Cirrbi fimplices, longiffimi, ex nodis dependentes.

b/ia ternata, dentato-ferrata. Foliola in ramis plana, ovato-acuminata, dentata. Ia ramis floriferis racemis obpofita, contrafta, dependentia, feu nutantia, petiolata.

Racemi corymbofi, fubumbellati, altemi, adnbdos foliolis obpofui.

Pitt

TABULA DUCENTESIMA QUINQUAGESIMA SEPTIMA.

TT

V An Rbeedia folio fubrotundo, fru&u luteo. *Plum, nov. gen. p. 45.*

R H E ED IA. *Linn. fpec. p. 1193.*

Planta arborea. Kami fimplices.

Folia ovata, obpofira, petiolata, integerrima, craffa, nervofa.

Pedunculi axillares, plures, fimplices, uniflori.

Florum p^tala'qUatuor obovata, concava patentia. a. b. ca

Stamina fedeclm, in fingulo petalo quatuor contenta d.

Geymen depreflum e.

'2<ru\$ts citriformis, carnofas, unilocularis /V g.

Nuclei duo vel tres, oblongo-ovgti, ingentes. h, i.

In memoriam Kobiliffimi V'iri, *Henrici van Rbeede*, Malabarici regni quon*
dam Cubernatoris *hoc genus V A N RHEEDiA ab auftore didlum eft,*
cujus inprimis curas & fumpribus fplendidifTimum Opus (Hortum nem-
pe *Malabaricuni*) 12 cohftans voluminibus, & 745 plantarum icones
nitidifiraas eontinens , debemus, de quo ulterius vide *Plum, in nov.*
gen. p. 45.

TABULA DUCENTESIMA QUINQUAGESIMA OCTAVA.

XT

V Ifcum a\$hy\lon> baccis aureis, umbilicatis. *Plum, Cat. p. jf>*

VIS CUM caule aphylo, fpicis trifidis.

yifcum geniculatum, aphyllum, ramis compreflis ; oppo/Itis. *Brouiv.*

Hift. Jam. 337.

\$ Vijcum Q.m\<zprolifero,ramofi{Timo, aphylo,eompreflb. *Linn.fpec. 1023.*

"Vijcum Opuntioides, ramulis compreffis. *Sloan. Cat.p. 168. Hift. Jam.*

p. ejy T. 201. Fig. 1. •

F I G U R A PRIMA.

Tlania parafytica, aphylla, ramofissima, cujus

/></# filiformes, ad genicula articulati, utrimque ramos defcenderites
emittunt, qui cumattigerintalium, mox ita truncantur, ut nullus vel
principiuri vel finem inverriat. In extremis vero ramulis baccas fe-
runt fubrotundas, obpofitasque, fimplices, umbilicatas, aureas.

Hujus singularis plants alia occurrit varietas huic maxime adfinis apud
Sloan, in Hifi. Jam. Tab. 200. quee ipfi dicitur Yifcum Opuntioides ra-
mulis comprefisj uti fupra notavi.

Oo**Vifcum**

20 PfcANTARUM AMERICANARUM

~~V~~

VTcmVonuhczfolik, baccis croceis & racemofis. *PlmuClit p. 1?*

VISCUM caule verticillate foliis obovatis, trinerviis, obtusifis.

Fifcum parasiticum, ramulis *VerticilJatk* *fifv,rifv,ss obovat*, tri nervis,
baccis tridentatis. *Brouv. HifljZ* *fifv,ss*

Yifbum caule; verticillato. *Linn. fpcc fci* *3. no. 5.*

, *Tab. 201. Fig. 2.* & radiatis. *Slean. Cat. 168.*

F. I G U R A S E C U N D A:

Planta parasytica ac fruticosa, ramis utcunque trichotomis, geniculatis.

Folia pinnata, foliolis utcunque fex subovatis, ner

Racemi sub foliatura ex geniculis, simplices, pler

flueculi.

Baccas coadunatae, rotundatae, umbilicatae, croceae.

Vrr u • •

Ifium baccis niveis, racemofis, -foliis Buxi luteis. *Plum. Cat. p. 17.*

VISCUM foliis obovatis, racemis laterallibus. *Linn. Pl. 102. no. 3.*

& *1. 2. p. 95. Tab. 95.*

ifluis Cink

FIGURA T E R T I A si.

Planta parasytica, fruticosa, ramofissima

Rami utcunque articulati, articulati, arriculis curtis, crassifuculis.

Folia opposita, crassifucula, arriculis curtis, crassifuculis.

Racemi simplices, axillares, oppositi, superius fepe geminata.

Baccas rotundatae, umbilicatae, niveae, que & baccas etiam purpureis variat, ut in congenetibus.

~~V~~

V ^ « aliud.r,cernofum; fdliis latifim;s. p/s w. ^ _ ^ , ?>

V^ IS CUM foliis ovatis, venofiq r^ venous, spicis axillaribus, utrimque quaternif*

FIGURE Q U A R T A.

Planta parasytica, fruticosa, ramis simplicibus.

Folia ovata, r^, sinuosa, opposita, petiolata.

Racemi plures erecti, subumbellatae, axillares.

Baccas per intervalla verticillatae, subrotundatae, umbilicatae.

Viscoides

V //«trifolia, minor, corymbofa, acinis nigroribus, turbinatis. *Plum.*
Lai. p. 18. Tourn. in I. p. 613.

VITIS foliis ternatis, foliis, oblongo-ferratis, caule punaato.

0 *Fitis* foliis ternatis, foiiolis fubrotundis, ferratis. *Linn. fpec, r_r p 20?*
n. 5. Syl. Nat. 942.

Folium Caufonis. /& & & & *Herb. Amb. lib. 9. <*>. 66. Tab. 166. Fig; 2.*
•*Vitis* foliis term's, fubrotundis, ferratis. *Ray, dendr. p. 68.*

FIGURE Q[^]U I NT A.

Planta fruticofci-farmentofa. JW curti, nodofi, craffiusculi.
tyrrhi ad nodos fimplices, spirales.

F&lm exnodispetiolata, ternata, fubrotunda, ferrata.

Racemi corymbofi, fubumbella[^]i.

Uva fubrotundas, acuminate, turbinata?, a congeneribus distingue.



TABULA DUCENTESIMA SEXAGESIMA

U*Rtia* arborefcens, baccifera. *Plum. Cat. p. ir.*

UR TIC A foliis alternis, cordatis, dentatis, caule arboreo, aculeato,
calycibus femineis baccatis.

Urtica frutefcens, foliis amplioribus cordatis, finuato-dentatis, nervis,
petiohs, & cauhbus aculeatis. *Brouv., Hifl. Jam. p. 337. no. 9.*

Planta arborefcens, tota aculeata.

Folia cordata, acuminata, finuofis dentibus obvallata, quorum
Lojla fubtus aculeata?.

Racemi ad caules colle&i, retroflexi, feffiles, vagi.

Fruttus plani, cordati, feu baccati.

Hujus altera species, feu varietas in *Plumierii* iconibui reperitur, que ip-
lius mas mini videtur, ipfique dicitur

^ r ^ racemofa : ampio CoryJi folio. *Cat.p. ir. & Tourn. in i. M-*
Lujus petio/t modo lunt aculeati.

i^w cordata & acuminata, profunde dentata, trinervia.

Caules terminant corymbis in plurimos alternatos racemos diflinai, quo-
rum unum labuU infculpi curavi, quique omnes flores masculinos ih-
mineos gerunt, ita ut hax mas, altera ipfius femina videatur efle
quas magis aculeata.

Folia porro gerunt utraque ampla, finua,to-dentata, nervis, petiolis, &
caulibus aculeatis.

Quumque *Plumier.* pingat flores pluribus quam quatuor ftaminibus orna-
tos, forte eft ex pluribus flofculis masculis compofitis.

Calyx, vero femineus, baccatus, bifidus, quod vulgare eft in *Urtica* genere.

a60 PLANTARUM AMERXCANARUM

TABULA DUCENTESIMA SEXAGESIMA PRIMA.

V

UX.hnenia aculeata, florē villofb, fru&u luteo. *Pkm.nov. gen.p.* 6.

XIMENIA foliis folitariis. *Linn.fpec:p.* 1193.

*Ximenia Hort. Cliff** p. 483. *Syfl-. Nat,* 1356.

FIGURE P R I M A

Planta arborea. Cauks lignofi, fimplices, jffpinofi.

Spina fblitaria, fubulata, ex fingula ala, uti & ad ramos.

Folia ovato-oblonga, nlrerna, integerrima, venofa, petiolata.

Peduncuhis racemofus vel ramofus prodit inter fpinam & petiolum.

Flores campanulati, monopetali, tripartiti, petalis oblongis, revoJutis^

Frutluis eft dnipa ovalis, unilocularis. Nuceni glabram contincns, uti d

Plum, in npv, gen. T. 21. fingub ipfius partes exhibentur. Qui hoc

*genus Ximeniam vocavit in memoriam Francifci Ximenes Hispani, qin
de virtutibus abortim & plantarum Regionis Mexicanae fcripfit libros
quatuor in urbe Mexicana inpreflbs 1615. Qui a Joanne de Laet in iuo
opere paflim commendantur.*

X

Ipbion flore e luteo nigricante. *Plum. Cat. p.* 8. *Tourn. infi. p.* 36?-

*IRIS corojlis inberbii)ii^, germinibus fubtrigonis, caule teretri, foliis
enfiformiBOs. Linn.fpec.p. 39. no. 10.*

*Iris Americ. verficolor, ftylo crenato. Dillen. H. Eltb. p. 18S. Td**
155. Fig. 188.

FIGURE S E C U N D A

Radix fibrillofa.

Folia radicalia fubulata, longifllraa, e quorum centro

Scapus florifer, binos tresve gerens, in fummo ex communi vagina floresi

In iconibus fequitur

*Zizyphus fcandens, latifolia > fru6lu croceo; quum vero hxc optin. 16^
exhibita in Hort. Amjb. torn. 1. Fig, 73. ubi vocatur Jujuba Americ
fpinofa, Loti arbon's folio & facie, earn omittimus \ differt vero>
quod in Auftoris icone , aculei fint curti & retroflexi, nee fubulati!
Fruttusque gemini ad alas pedunculati, nee folia tam profunde ^T-
rata.*

T A-

TABULA DUCENTESIMA SEXAGESIMA SECUNDA.

T

\-Jhne Picquante. Plum. Hist. mjf. tom. v.p. 232.

STYRAX? ramis flexuofis, foliis cordato-ovatis, feabris;

FIGURE

P RIM A.

*Radix c_{rdia}, lignoffi, longa, descendens, inferius brachiata.**Lauhs iignoluo, iimplex, ere&us.**Rrmi flexuofi, fimplices.**^ alterna, cordato-ovata, acuminata, f_{cabra}, petiolata.**tkrts corymbofi, pentapetalii, gemini vel terni in communi pedunculo, qui cum fructu in Joco natali ulterius inquirendi, dumqu^e Auftons icon quoad externam formam foliatura nempe & floribus proxime ad Styracem accedat, hinc tarn diu eo reduxi, donee quid certius dein detegatur de hac arbore.*

A i / Caragna Recchi Jib. 3. ^ 17. c^V. P/«^

XIMENIA foliis quaternis^ verticillatis ?

*Planta fruticofa.**^w/obpofiti, fimplices, lignofi.**^cruciatimpo/ita, ianceolara, integerrima, ad nodos feffilia, ubi /r/ov, formes, utcunque terni, unioculares.**Nucleus oblongus, /blitarius.**Flares defideraatur, necdelineati ab Auftore: unde hsc in n^r^n ulterius inquirend, Tam diu vero hanc «J&fZ t_{et}uT c_u^ fructus unioculares oviformes cum hoc genere quadrant**Observeatio. Apud ^. Recchium hujus arboris kon defideratur, descrip no autem a me nofc convenit, excepto quod folia diiorf, S qua? in Auftons icone lanceolata, csterum in cmrh fr,Z**pofita. De floribus vel fruffibus n S t Scd T quoq^{ue} odoratam, & gulfu acrem, ac G u m m e d t Z rem effe**S * enC vltS vag^o q^uls FeCO ^y Ceragnam tabaca, sed vehemen-*

262 PLANTARUM AMERICANARUM

Forte affinis est frutici, qui a *Dillen*, in *Hift. Ehb. Tab. 123.* exhibetur,
ex quo novum genus Conftitutum est in *Differ f. de Flora Jamaic.* quod-
que *Jacquinia* didtum est, atque hinc nostra haud inmerito *Jacquinii*
caule inermi, foliis lanceolatis dici posset.

T

iNnominata *Plum. Hifi. mjf. torn. 5. p. 109.*

SC H IN US foliis pinnatis, foliolis oblongis, petiolo marginato, articulo-
culato, inermi. *Linn. fpec. p. 389. Syft. Nat. 1034.*

Lauro affinis, Jafmini folio alato, cofta media membranulis utrimque ex-
tantibus alata &c. *Sloan. Cat.p. 137. Hi/I.torn. 2.p. 2; Tab. i62>Fig-J.'*
Seo & Sansjo feu *Arbuscula spinosa*, aromaticā, foliis *Fraxineis* *<>*
mine *Fagarae Avicenna*. quod *Piper Japonicum. Kampb. Amarnit. p. %92**
& *Schinoides* petiolis fubtus aculeatis. *Linn. H. Cliff. p. 489.*
jtyrbuscula foliis alatis, ad Jafminum vulgatius accendentibus. *Bnerb. Ml*
H. L. B. torn. 2. p. 263.

FIGURE S E C U N D A.

Planta fruticofa.

Kami alterni, fimplices, hamati.

/b/pinnata, *Foliola* tria, vel quaruor juga, (eu paria, ovata, ferrula-
ta, cum inpari longiore.

Petioli alati feu marginati, ad foliola articulati, inter binps aculeos re-
flexos erefti.

Spica alares, gemina?, vel ternse ereftae.

Bacca ov*2Xi*) monisperma, juxta *H. Cliff.* & figurās marginales.

Obfervatio. P T E R O T A hoc genus a Cl. *BrotnO. Hifi. Jam. 146.* vo-
caturj cuius alteram sp̄eciem subspinofam, foliolis trijugis fine inpari
exhibit *Tab. 5. Fig. i.*

Finis totius Operis.



INDEX

NOMINUM

PLANTARUM

- A** Butilon, *pag.* I. 2. 15.
 Acacia, *pag.* 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 Acacise accedens, *pag.* 2.
 Acaja, 151.
 ACALYPHA, 16j. 235. ZW72 *Syjl. Nat.* 127j.
 Acalyptha, 235.
 Acer, 7. 8. 9.
 Aceri affinis, z+f.
 Achimenes, 7].
 Acinodendrum, 131.
 iEchynomene, 141.).
 M'c n Y N o M E K E > 1 15. 140. *Linn. Syjl. Nat.* i 158.
 />, ^atum, .9.
 Agnarif^us, £5.
 Agrimonia, 253* .
 Ahovai, 10.
 Alcea, 10. 153, 162.
 ALISMA, 236. 231.
 Alisma, 105.230. *Linn. Syjl.* 993.
 Alni fru&u, '13j» 136.
 Alnus, 136.
 Aipina, 11.
 ALPINIA, II. *Linn. Syjl. Nat.* 8*2*
 Alfine, 12.
 ALSINE, 12.
 Althaea, 153,
 Amarantoides, 12.
 Angraecum, 179- iSo^
 Angurek, 183.
 Anguria, 13. 14.
 ANGURIA, 248.
 ANNONA, 133. 134. *Linn. Syjl.* 1083.
 Annona, 133. 13].
 ANTHEMIS, 75,
 Anthemis, 75.
 ANTHYLIIS, 3%'*Linn. Syjl.* 1160. no. 6.
 Apr\iba, 240
 Apocynum, 19 20. 21. 227.
 Agutci guopo-Obi, 99.
 Aralia, 22. 139.
 ARA LIA, 22. 139. *Linn. Syjl.* \$6?.
 Arbor, 246. 247.
 ——baccifera, 159. 160. 201.
 ——racemofa, 133. 137. 147. 163.
 ——filiqua, 14. 132.
 Arbutula, 132. 262.
 Ariftclochia, 22. 23. 24.
 AiUSTOLOCiiA, 22. 23. 24. *Linn. Syjl.* 1249.
 Arum, 24. 25. 25 27. in. 112.
 ARUM, ' 24. 25. 26. 27. in 112. *Lhn. Syjl.* i2ji.
 ASCLEPIAS, 21. *Linn. Syjl.* £46.
 Afclepjas, 21.
 ASCYRUM, 146.
 Afeyrum, iq6. *Linn. Syjl.* 1185.
 Aphaltus, 2^3.
 Alter, 28. 29. 30. *Linn. Syjl.* 1216.
 Aftericus, 9^ 97-
~~Aftericida~~, 35.
 ——arborefcens. *Linn. Syjl.* 933..
- Baducca, 62.
 BALLOT A, 15 j. *Linn. Syjl.* noo*
 BANISTERIA, 7. 8. 9.
 Banifteria, 7. 8. 9. *Linn. Syjl.* 103J;
 Baramareca, 217.
 parleria, S^S^.
 BARLERIA, 31. 32. *Linn. Syjt.* 1121.
 Barba Jo vis, 30*
 Bauhinia, 32.33.
 BAUHINIA, 32. *Linn. Syjl.* 1015.
 Begonia, 33.
- bECONIA, 33. *Linn. Syjl.* 132.
 Bella Dona, 3f.
 Bel Ionia, 35,
 BELLONIA, 35. *Linn. Syjl.* 928v
 Bennudiana, or
 Besleria, 36. 37.
 BESLERI'A, 36.37. *Linn. Syjl.* 1113.
 Bidens, 41. 42.43.
 B1 DENS, 43. *Linn. Syjl.* 1203.
 Bignonia, 44. 45. 46. 47. 48. 77^
 BIGNONIA^ 44.45.4(5.47.48. *Linn. Syjl.* 1114. i11j.
 Bihai, 49.
 Borbonia, 50. 51.
 Bromelia, 51. 52. 53. *Linn. Syjl.* 974-
 BROMELIA, 51. 52.53.
 Broflea, ^3.
 Buoss^EA, 53. *Linn. Syjl.* 1355.
 Brunsfelia, 54.
 BRUNSFCL SIA, 54. *Linn. Syjl.* 936.
 Brya, 243.
 Bryonia, 54. 55-
 Bucephalon, 55. *Linn. Syjl.* 1375.
 BUCEPHAL.ON, 55. *Linn. Syjl.* 1375.
 Bugloffum, 157.
 Buphthalmum, 75.
 BUPHTHALMUM, 96.97. *Linn. Syjl.* 1227.
 BUTOMLS, 105,
 CACTUS, 185.-1f<5.187. i*R T90* J91.192.193-^P1-
 Caftus,i85. 187. 188. J89/190. 191. 192.193. 19)*
Linn. Syjl. 1054.1055.
 Calabara, 199.
 Camara, 58. 59* fa
 Cameraria, 60. 6K
 CAMERARIA, 60.61. *Linn. Syjl.* 945.
 Canito, 57.
 Canna, 59.
 Capeba, 56.
 Capparis, 61. 62.
 CAPPARIS, 61.62, *Linn. Syjl.* 1071.
 Caragua, 26r.
 Caraguaca, 63.
 Carpinus, 245.
 Caryophyllafler, 245.
 Caffia , 67. 6S, 69.
 CASSIA, 67. 63. 69. *Linn. Syjl.* 1016. 1017.
 CASSINE, 217. 247. *Linn. Syjt.*954.^
 Caffine, 217.
 Caftorea, 7c.
 Casfalpinia, 57.
 CM s ALP1N1A, J7«•*Linn. Syft.*\c 1 ♀.
 Celafrus, 217,
 Celtis, 70.
 CELT is, 70.
 Cenchriderasa, 75. 135.
 CENTAUREA, 114.
 Cencaurium minus, 71.
 Cerafus, uo i9.
 Cratocephaloides, 41.
 Ceratoc'ephalus, 42.43.
 CERBERA, 10. Thcvecia *Linn. Syjl.* 944.
 Cereus, 185. 188- 1S9. 191. ^93-
 China, 72.73.
 Chioccca, 211.
 Chondrilla, 74.
 Chryfanthemum, 75.96.97.
 CHRYSODALANUS, 151. *Linn. Syjl.* IC75.
 CHRYSOPHYLLUM, 57. *Linn. Syjl.* 937.
 Chryfophyllura, 57.
 C is SAMPEL os, 56. *Linn. Syjl.* 1298.
 Cicharexylon, 151.
 CITHAREXYLON. *Linn. Syjl.* IH5*

Clematis, 44. KP, 228.

Clematis, f;₅.

Ct-EOMB, 235. *Linn. Syft.* H37.

C!cerodL'Ddrum, ij<5.

Clitoriu, 215,

Clulia, 7T- 7&

CLPSI'A, 75. 76. £*i». 5j/. 13CP,

Locototot ts₅ 135. 137: *Linn. Syft.* 1007.

tcOEcmecalc, J15.

Colycium, 155-

Column, l i 11.

CoLOMSliA, 77, Ifflis. A*v/f.]133.

COMMELINA, 70S.

COXOCARPL'S, 135- iiinu. *Syft.^o-*

Cortacarpus, 135.

CONVALLAK CA, 171.

Convolvulus, 78. 7-

CONVOLVULUS* 78.7*.83. *Linn. Syft.* 203. 221.

ComyM, S3, 84. *j 85. 12?

Co*V'a, 83. S4. Sj- £B

Cora!, pi. p2.

Coral lodent rum, 91. C3,

Corcbo alilijis, i-3.

Corcborus, £3. 94.

CoitCHORBS, 0\$. Of, i

Cordia, py.

CORDIA, 55. *Linn. Syft.* 1005.

Cortic hidi folio, 102'. 103'

Co/eopfis, 7.i'n«. *Syft.* 1228. BHICDS p. 43, **fc.**

Coreta, P3.

Corn us, 87,

CORNIIS, 2C1.

Cornutia, pj. .

OuUNLVIA, pj. JE#wi, .?#. HIS.

Corona Solis," 96. jjj.

CoronilU, p8-

CO.BO'KILLA, 98.

Cortuia, P8.

CSACCA, 125.

CRANioLfiRiA, lag. *Linn. Syft.* IH2,

Crellcentia, ico.

Cm-scEKTiA, ico. *Linn. Syft.* iiiij.

Crocus, op.

CnoTu^j H5y.23C *Linn. Syft.* 1275.

CUCUMIŠ, 13. TJ'nv'. \$?Jt. 127c

Cucurbitifura, 10a

Ciji^tc, ico,

Cülit Taffiara, S31.

Cupania, tot.

CIXFJlltA, 101. L:r;;i. *Syji* 041.

Cururu, ioi. 102.

Cyr,anchum, 2G>. 210.

C\N AKC H c:,(, l: *Linn. Syft.* P4J.

Cynophalfaphorus, Or.

Cytifus, 'J4. ioj.

CVTHU\$, i04- C J- fr, irat ^ - llfi_r-

DatDifoniu, ioj. JCC. 23c.

UAISNE, 207.

Digitalis, iaG.

Dkifcorea, 107. icS.

Dl o s c o a EA, 107. 108. *Linn. Syft.* 1 sjo.

Dodoiiea, ic8. 24J.

DOLicuos, 214.216. *Linn. Syft.* 1162.

Uolichos, 214. ai5. 217.

Uorrtnia, iop. lie.

DoRSTEKIA, IOP. IIO.

concratjetva, *Linn. SCftifcQ,*

Bracofittum, 1 c M , £ & 27, 111. 112. 113,

Dracuficulus, 111. 112. 113.

Drakuna, icy

DUKANTA, 70. *Linn. Syft.* 1121.

Kca(lopfy!lutn, 24.

Kchinomelucalus,

Kciu^oi s, 114.

114 .

Rehi:opus, n.

KLEMI PER K, Sj.

Elenifera*, a^

Ucbryfunt), H

Emeras, 115, '

E i d d rum, 133,

EPIDENDRUM, 172. 173. 174. 175. 176. iga

132. 133. *Linn. Syft.* 1249.

Epipaafe,

Equifetum, 115, 116.

Eq u is ETUM, 115. *Linn. Syft.* 1312.

Eretia, 119.

ERYTHRINA J pa, *Una. Syft.* 1155.

Euouymus, 119.

Kupacoria, gj.

Eupatorium, 83.36: 12-. rar. iaa.

^•rATosiDM 3d 120 iai i

fuirHOfujA, 540 ajo.

bupfiorbia, 24?. *Linn. jpsc.* ICJ?.

Fevillia, 303.

^•^ ILXJRA, 2C3. 204.

Fjcbides, 103. iyt.

JMCUS, 122. 133. 124. I3-l.

j?ICUS, 122. 123. 124. 7.:M, Syft. 1315.

Flos pafiiionis, 123.

roium Caufonis, 259.

Frutex, 87.136. i3Q.

— innominatus, £53.

Fuchfia, 124.

FUCHSIA, 124. L.

Funis, 133.

— uridiis, 251.

Galega, pi. uy. i2(5. *Linn. Syft.* 11^2.

GENIP4, 127.

Grtipa, 127. *Linn. Syft**{tyu

GENTIAMA, 71, LiW 3^.. pj2.

CJerardia, C4.

GER ARBIA, S4. *Linn. Syft.*, iico.

Gerafcanchus, y^.

Gesnera, 12J. IE6. 128.

GESRIERIA, 125.125. /is/, S^ji,inp.

Oft B vi L i s, ilola', apCull

clavam, Li:,

Ghandiroba, 204.'

GLYINK, 215. *Linn. Syft* np-j.

G MAPHALri!M, IIIdL

GOMPHRENA, i:.. Litm, \$;ft. pja

Granadilla, 12a. i1o.

Groflularia, 130. 131. 132. 133.

Guajbara, (36, 1^7.

Guajabanus, 133, 13;

Gupzunia, ^14. 135,

Guidonia, 137. i3g. i3p,

Hedcra, 139.

Hcdyfrtrum, |^, s^j_ 2|,

" E D Y I|0. 3i[4, n; o.

HoJenium, 55,

Ileihamhemum, i4r. 142.

Hehotrojjiufn-, EO5

Hellcorine, 171. i2. 173.174

i78. 179. iao. 181. ik ? 8 i,

Wfniscus, 1. 3js. ,n. rta

Hibtfau, i3. 162. /ji,, 5^.

UM, 145. Mm. Syfi, 1194, 11."

11 POMANE • 164. *Linn. Syfi.* 12J8.

Hippomane, n₆ + *

Hypericoides; i4a.

Jabotapita, i^7

Jacobiea, 84. H j i , ,j

Jasminum, 127.

Janraja, 163. 149.

Janninen, 149. 150. 151. 163. 211. 222.

JAMINPM, 150.

Janciorga, 131.

lago

N O M I N U M P L A N T A R U M.

- Icago, 15T.
 JJLEX, 108. 109. Dodbn.xa *Linn. Syft.* 101.
 Ilex, 109. 160.
 Jnja, 14.
 Inominata, 135. 262.
 INULA, 28. 29. 30. *Linn. Syft.* 121F.
 JPOMOEA, 79, 8i. 82. 83. *Zrfffl. Syft.* 924.
 IRIS, 280.
 Iris, 260.
 Iujuba, 250.
 Iupicanga, 72.
 USSIJE, 168. *Linn. Syft.* 1201.
 Iuffiae, 168.
 JUSTICIA, 31, eft *Ruclua* fol. ovatis intcgerr.
 fpicis ovatis. *LzVm. SyJL* i 120.
 *XM, 35. ;
 .1 x o R A, 150. *Lin Syft.* 893.
 Ixora, 1 jo.
 Kametti Valh, 210.
 Ketmia, 152, 153.
 KNAUTIA, 71.
 , 2J8.
 L, JV-N A, 58.59. & D *Linn. Syft.* n 16.
 Lappuia, 253.
 Larix, 154.
 Laurifolia, 139.
 LAURT/S, 5a. 5N. .
 Laurus, 50, eft *Kbus foUis pinnatis,quinatisjinte-*
gerrimis, ovatis,giabris. *Linn. SyJL* 964.
 Lavandula, 154.
 Lentibularia, 158.
 Liane Picquante, 261.
 Ligufroides, '57.
 Ligufrum, 156.213.
 LJG USTRUM, 211.
 Lilio Afphodelus, 157.
 LIMODORT;M, 176. 184.
 Limodorum, 184.
 Linaria, 158.
 Lobelia, 157. 23 T.
 LOBELIA, 157/231.251. *Linn. Syft.* 1237
 Lobus aromacicus, 1*83. •
 Lo NICER A, 149. 211. 212. *Linn. Syft.* 929.
 Lonicera 158. 2ii_N
 LORANIMUS, JJ£. *Linn. Syft.* 933.
 Lotharboris folio, 19^20.
 Ludwichia, i6'd. *Linn. Syft.* §93.
 Lycium, 223.
 Lycopericum, 219.
 Lyfimachia, 168.
 Magnolia, 161.
 Mailam Toddali, 201.
 MALPIGHIA, 159.160.161. *Linn. Syft.* 1334.1335.
 Malva, 162. 163.
 tyfalvavifcus, 162.
 Malus Perfica, ir.3.
 Mamei, 163.
 Mammea, 163.
 MAMMEA, 163. *Linn'Syft.* 1074.
 Manacilla, 164.
 Manihot, 16f.
 Maranta, p8. 16j.
 Marcgravia, i<53.
 MARCGKAVIA, 165. *Linn. Syft.* 1071.
 Marrubiuoi, ijtf.
 Matthiola, i<55.
 MAX ihioLA, 166. *Linn. Syft.* 1356.
 Medicago, 194.
 MED 1 c A G O, 194- *Linn. Syft.* 1180.
 MELAMPODIUM, 84.
 MELASTOMA, 130.131.132.133. *Linn. Syft.* 1521.
 Melafotoma, 131. 132. 133.
 Melitia, IJJ. 155.
 Melocatus, 185. 186. 187. 183.191. 102.193.194.
 MELOTRIA, 55. Pendula *Linn. SyII.* 862.
 Mentha, 155.
 Menthaftrum, 156.
 Mentzelia, 1*57.
 MENTZELIA, 167. *Linn.Syft.* \o]6.
 MESOPH^RUM, II<^.
 Mefopserum, 156.
 MefpiJus, 199.
- Mimofa, 2. 3. 6. 14. 14j. 197.
 Mombin, 198.
 Nforifona, 198.
 MORISONIA, 198. *Linn. Syft.* 1071.
 Morus, 199.
 MORUS, 199. *Linn. Syft.* 1260. no. 7. A;
 Muntingiaj¹ 199- 200. 201.
 MUNTiNGiA, 199. *Linn. Syft.* 1073.
 Mirucya, 129.
 Mrs A, 49.
 Myrobalanus, 198. .
 Myrobaciodium, 58. 59.
 Myrtus, 201. 202. 203.-
 MYRTUS, 201. 202. 203. *Linn. Syft.* . logd:
 Naga Valli, 33.
 Nandhiroba, 203. 204.
 Nandi Erracam, 150.
 Narinampuli, 152.
 NEPETAJ 155.
 Ncrio adfiDis, 10.
 NERIUM, ig. 2a 210. *Linn. Syft.* 944.
 Nerium, 227. 228.
 Nicotians, 204.
 NICOTIANA, 204. *Linn. Syft.* 932.
 Nymphasa, 2^5.
 OCINA, 147. *Linn. Syft.* 1075.
 Ochna, 147
 O ii N o T u K R A, 167. 168. *Linn. Syft.* 998.
 OldenlaDdia, 205.
 OLJENLANDIA, 205. *Linn. Syft.* £98.
 Olcafter, 206.
 Onagra, 167. 163.
 Onobrychis, 140.
 OPHRY S, 177. 178. 179c
 Opuntia, 186. 187. 188. 189^ 190.
 Orchis, 171. 178. 184.
 OSMUNDA, 130. *Linn. Syft.* 1319.
 OVIEDA* 254. *Linn. Syft.* 1121.
 OXALIS, 207. *Linn. Syft.* 1038. no. 13.
 OxyS, 207.
 J Pacoferoca, 11,
 I Paeru, 214.
 J Palega Pajaneli, 44.
 j Paliuro affinis, 157. 223. 245.
 Papparam, 20S.
 Parieraria, 110. ill.
 PAssiFLORA, 128. 129. *Linn. Syft.* 1248.
 Pafilflora, 128. 129.
 Pafilfone affinis, 204.
 PAULLINIA, XOI. 102.103. 104. *Linn.Syfl.* 1007.
 Pauliinia, 101. 102. 103. 104.
 Pavetta, 150.
 Pen so, 208.
 Pcntagonotheca, 223.
 Peplis, 249.
 Periclymenum, sri. 212.
 Perim Teregam, 122.
 Pcriploca, 208. 209. 210. *Linn. Syfl.* 94 >.
 PERIPLOCA, 208. 209- 211.
 Pctiveria, 213.
 PETIVERIA, 213. *Linn. Syft.* 993.
 Phafeolo affinis, 91.
 Phafeolus, 2^3. 214. 215. 216. *Linn. Syfl.* 1162.
 PHLOX, 9.
 Phyllyrea, 217.
 Phytolacca, 218.
 Pin us, 154.
 PINus, 154. *Linn. Syft.* 1274.
 PIPER, 23b.
 Piper, 238.
 PifoAia, 223.
 Pl s o N 1 A , 223. *Linn. Syfi.* 1314 Jk J384,
 Pittonia, 224. 225. 226.
 Plinia, 219. y
 Plinieria, 219. 228.
 Pluknetia, 220. *Linn. Syfl.* 1075.
 PLUKNERIA, 220. 227^238q. *Linn.Syfl.* 944*
 Plumbago, 223. 228.
 Plumbago, 223. 228.
 Qq 2
 Poi*

INDE 3 & NOMINUM PLANTARUM

- Foinciaha, 229*
- PbLYCAKA**, 203.
- Polygaia, 2C8.
- Polygonatum, 10S..
- Polygonim, 13\$. 207.
- Ponarym Maravara, 175.
- Populus, 335. *
- POR TUIACA**, 142. 233. *Linn.* *Syft.* 1045.
- Ponulaca, 218. 229.
- PRUNUS**, 119. 136- *5*«
- Prunus, 12a 193.
- Pfeudo Acacia, ^23.
- Apocynoi, 48.
- China, 72.
- Santalum, 57.
- PTEL'EA**, ^45. *Linn.* *Syft.* &\$. .
- PTERO CARPUS**, 243.
- PTEUOTA**, 2^2.
- PYRETRUM**, 230.
- Quamoclit. 81. 82. 83.
- Radix, 99*
- RAIA**, 148* M9*
- RAJANIA**, 148* 149* *Linn.* *Syft.* 1293*
- Ranunculus, 1c 6*230, 23U
- Rapunculus, 77* 251.
- Rapuntium, 23#
- RAUWOLFFIA**, 232* *Linn.* *Syft.* 944.
- Ravolfia, 232*
- Renalnua, 233* 234.
- RENA T'NIA**, 233* 23 }• *Linn.* *Syft.* 974*
- Rhamnus, 200* 223*
- RHAMNUS**, Q.CO. 2CU 252.
- Rhaponticoidcs, 114..
- Rin:EDTA, 21s. *Linn.* *Syft.* 135s*
- Rhus, *Linn.* *Syft.* 964, ell Borbonia, *Tab.* 6u pag. \$1*
- Ricinoides, 235* 23^
- Ricinus, 25c 251*
- Ricophora, 107* .
- Rivina, 237*
- RIVIKA**, 237* *Linn.* *Syft.* 899.
- RooiINIA, 229»
- Ronocletia, 237.
- ROINDELETIA**, 377» *Linn.* *Syft.* 928»
- Rudebeckia, 135* *Linn.* *Syft.* 191H.
- Ruellia, 238. "&/>, 31. T. 42. Fig. % eft Ruellia folii ovatis iriCvgcr. Spicis ovacis, *Linn.* *Syf.* JL 1120.
- Ruseus, 17W 172.
- Sagitta, 23U
- SAGITTATR 1 A**, ic(S* *Linn.* *Syft.* 1270*
- SH*g*ictaria, 1cG 23^, 231+
- Salvifolia ar'oor, 201."
- SAH:bukus**, 247.
- SAMYDÅ: 137. ia8# i9* *Linn.* *Syft.* 1025.
- Satyruij : 17:^ i3:i78:i8c* i8|. *Linn.* *Syf.* 1034.
- Saurur) s, 238.
- SchiiU/ides, 262^
- Scr;V.Nus, 262.
- St:teflena, 95*
- Sc CURIDACA**, 244* 245* *Linn.* *Syft.* 1153-
- Scturiokica, 244* 245*.
- Sciinu**, 239.
- SERA PHI AS, i-j. *Linn.* *Syft.* 1174.
- Scriana, 103. 104*
- Serpentaria, 112.
- Scfuvium, 213* *Linn.* *Syft.* 1058*
- Srhcrardia, 254*
- Sicyoides, 239*
- SICYOIDES**, J4, go9# im»# 57/Z. 12<c»
- Si DA, i₂, io. 15* 162* *i63* *Linn.* *Syft.* 1145.
- Sida, 15# iG2.
- Silphium, 41, /, «» 5y/l. 1233*
- Sinapiftum, 239.
- Sloanea, 240.
- SLOANE A**, 240. *Linn.* *Syft.* 1174.
- S^ILLAX**, 72, 73, 74# 247.
- Smilax, 72; 7V 74. 1^»»• ^11. 1003.
- Solanfrudtu, 232.
- Solanoides, 237^
- Solanum, 228. 219* 24^ 24^ 24* * 243*
- SOLANUM**, 218 « 219 * 246 » 2LTS 1153.
- SOLID AC** o5, 148*
- Solidago, 148.
- SOPHOUA**, 91* *Linn.* *Syft.* 1014.
- wSpartiüi, 243* 244* 245*
- SPON DIAS**, 19K»
- Spondias, 198*.
- SCAPHYLODENDRUM**, 109* 245*
- Stizofobium, 2ij#
- STYRAX**, 261*
- Stoechas, 154*
- Suriana, 2^6*
- SUIUANA**, 20* *Linn.* *Syft.* 970*
- Taberneemontanci, 246*
- TARERAMONTANA**, 2^6 *Linn.* *Syft.**9tJ»
- Tajacabo, 24*
- Tamnus, 247# 248.
- Tata-iba, 199*
- Telephoides, 24?^
- Terebinthus^ 76. 2ft.
- THALIA**, 98. *Linn.* *Syft.* 84^.
- THEOBROMA**, 13j* *Linn.* *Syft.** 1183*
- Theobroma, 135*
- THEOPHIUTA**, 119. *Linn.* *Syft.**920*
- Thcvetia, 10.
- Thymelaea, 207* 249.
- Thymelicab facie, 247*
- TVUANDSIA**, 63» *Linn.* *Syft.** 97}•
- Tim Tali, 78*
- Tichymalus, 164* 2|9* 250.
- TOURNEFORTIA**, 224* 220» 2|9* *Hinn.* *oyjt»y iu.y */•
- Tournefortia, 234* 226* 249*
- 'l rachelium, 2Ti#
- TRAGIA**, 250* 251* *Li»».* *Syft.* *254«
Tragia, 250- 251 & i6j* i^* i*i*+!/\$**. *Lf*t
- Tragia folii cordaco-ovatis. Xrjw. oyjt* ^L*
- TRIANTHEMA**, 229»
- Tribulus, 252*
- TIUKULUS**, 2T2*
- TRICHOSANTHES**, 14* Lf»» Sx/i« 1278*
- Triopterus, 7* 245.
- Triumfetta, 253.
- TRIUMFETTA**, 2J3» L^A^t ^J^ IC44*.
- Tsijla, 123.
- TIIHNERA**, HI.
- Turnera, 245^
- TUSSILAGO**, 22. 29» !.*»»• ^ ^ 1214*.
- Tufillat;6**, 28. 29.
- Tuzpathis., 1C9#
- Ubium, IC7. Id8#
- Ulmus, .201.
- UKTICA**, 111* *Linn.* *Syft.* 125j.
- Urtica, 250* 251. 2j9*
- UTIUCULARIA**, 158* — nedlarion conico. *fuc* *ut* *cul*
tibub cernuis, rad'ce foil culo -dcilituta **
it'in. 197* *Linn.* *Syft.* 8j1* no. 7*
- Utricularra, ij8.
- Uvifera, 136. 13%
- Valdia, 25 u
- Vanilla, 183,
- Van Hheedia, 255.
- VERBENA**, IJ% diandra *Linn.* *Syft.* 8p* n0. 3*
- Verbena, 1^}* 254*
- Verbenai affinis, 213*
- Verbenaca, 274.
- VERRESINA**", 41. 42. 145, *Linn.* *Syft.* 12260
- Viburnum, 59. g^
- Virga aurea, « 4 /
- Vi coides, 257.
- Vilcium, 17, 180, 23,* 255.255.
- X. ! SCUM i 255^ 2j6» *Linn.* *Sm.* 1229.
- Vili, 18, 253, 259, 250. *Linn.* *Syf.* 1123.
- Vobis, 251, 252, 253, 254. *Linn.* *Syf.* 1123.
- Vulnaria, D₃.
- Ximenia, s(50)
- Ximenes, 250,
- Xiphidium, 250.
- Xanthoxylum, 190.
- Zinziber, n.
- Ziziphus , 253* 260.



Fig. 1.
PISONIA aculeata.

Fig. 2.
TOURNEFORTIA
lanceolata.



TOURNEFORTIA foliis ovatis.

TOURNEFORTIA
W.H.N oblongo-lεfrata.




TOURNEFORTIA canescens lirilato





Pi, tJMIEJLIA fnliis lancetilittin iwolutis




PLUMIERIA foliae ovato-oblongis.



ROBINIA peduncula cymosa.

Fig. 2.

*ROBINIA peduncula
pyramidalis.*







Fig. 2.
LOBELIA caerulea, caule erecto, foliis ovatis.

Fig. 1.
ALISMA foliis
cordato-ligittatis.




RAUWOLFFIA; 1. *ovata, maii**.

RAUWOLFIJA olji lonce *datissim, vij;*




RENALMIA fcliu \sn*ilTit> m.





k i: N. VLMI. V5J
linearibus res tritatis.

K I. N A L M] A Ir. iimi ipii js tuiliricatis.






CROTON foliis lanceolatis

(KOT(\') foliis
ovato-lanceolatis.



RIVINA floribus corymbosis





PIPER foliis
serratis oblongatis

Fig. 3
P. foliis
fimbribus

RONDELI E n - foliis fimbribus.

'f x 3.00 Mil.







> OI. WUM
caule inermi, fructicolo.



SLOANEA.





SOLANUM folios ovatis.

Fig. 1

SOLANUM
mle aculeajto.

SOLANI M caule florulo.

Fig. 4.

SOLANUM
pedunculatis alatum

Fig. 5.

Sol. ANUM latiss oblongis



HEDYSARUM alpinum

T. EROCA & F.
plus aggregatus



Fig. 1
SECURIDACA
caule variabilis

Fig. 2



SECURIDACA foliis orbiculatis, aveniis.

TABERNÆMONTANA
foliis oppositis.



TAB. CCL.





