


Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS NO.

BOOK No. **BRE-P**

ACC. NO. **B-8701**





GEDANI.
AUTORIS TYPIS ET SUMPTIBUS.

17
12.7
V. 74.
unvaliuh

JACOBI BREYNII
GEDANENSIS
EXOTICARUM
aliarumque
MINUS COGNITARUM
PLANTARUM
CENTURIA
PRIMA-

cum
FIGURIS AENEIS SUMMO
studio elaboratis.



GEDANL

Typis, sumptibus & in aedibus A U T O R I S,
Imprimebat

DAVID-FRIDERICUS RHETIUS.

Anno CID. I^AC. LXXIIX.



ILLUSTRISSIMO

atque

EXCELLENTISSIMO DOMINO,
DOMINO

HIERONYMO

vanBEVERNINGK,

TEILINGÆ TOPARCHÆ* IN-
CLYTA CIVITATIS GOUDA EX-
CONSULIJ ACADEMIC LEIDEN-
SIS CURATORIJ TOTIUS BELGII
FOEDERATI QVONDAM GAZA-
RUM PRAEFECTO FIDELISSIMOj
NUNC IN CONSESSU D. D. OR-
DINUM GENERALIUM ASSESSO-
RI DIGNISSIMO, SEPTEM LEGA-
TIONIBUS, NON MINUS AR-
DUIS, QVAM AUSPICATIS, CON-
SPICUO; NUNC DENUO IN
CONVENTU, QVI NOVIOMAGI
PACIS LEGIBUS CUM TOTIUS
FERE ORBIS EUROPÆI PRINCI-
PIBUS FACIENDIS INSTITUTUS
EST, OCTAVAM SEDULO OB-
VNTI.

MECENATISUO
LONGE GRATIOSISSIMO.

ILLUSTRISIME DOMINE,
GRATIOSISIME MACENAS.



[Apientiffimus Me totius Uni-
Sverfitatis Conditor, ficuti in
Irebus omnibus à fe creatis,
nonfecus acbeiugniifimum
& munificentiffimum Paren-
tem generi humano multifariam fe exhi-
buit, ita cūprimisetiam incomprehen-
fibilem inefEibilisfSuse Bonitatis copiam,
in Operibus die creationis tertio produ-
ctis, fatis abundeque demonftravit. Quae
Majeftati Ejus Divine, infinito numero,
pradenter adeò & concinnè procreare
placuitjUteorummultitudinem, diverfa
genera, diftindtas fpecies & proprietates,
multiplices item virtutes & utilities,
non absque admijratione ingenti, expen-
dentibus, fummo cum ftupore animixinà
cum Rege & Prophetà Davide exclamarelice-
fatrQVAM AMPLA SUNT o-

DEDICATIO.

**PER A TUA, 6 JEHOVA! QVAM EA
OMNIA SAMENTER FECISTI! QVAM
PLENA EST TERRA POSSESSIONE
TUA!** Atque hoc ed magis, quòd in ho-
rum infinito numero, gramen etiam vilis-
simum, pedibus noftais obvium, a Sapien-
tiam aeterni Creatoris imperfcutabilem
manifestè oftendit, & luculentum fcrt
testimonium, reverà & fe Deum, qui il-
lud tàm mirabiliter creaverit, tàm ele-
ganter ornaverit, tàmque fapienter con-
fervet, & florere. languescere, emori, ac
rursùs progerminare faciat. Qui immò
quælibet herbæ & flosculus nos quafi ac-
clamat, digitumque intendit, ut se posita
anxiâ & importuriâ follicitudine, fiduciã
nostram in Deum, omnibus propicien-
tem, devolvamus. Quemadmodum et-
iam ipse veritas, SALVATOR nofter, ad
Lilia agri, quæ: neque fatigantur, neque
nec, nee Salomon, Regum licet O-
pulentissimus, cultus sui splendore illa
square potuit, nos manu ferè ducit, ut
discamus ex iis, quantò majorem Supre-
mum Numen curam habeat nostri, qui

D-EDICATIO.

Lilia hodiè quidem virentia, fed poftero die in clibanum conjicienda, longè fuperamus. Praeterea quoque multa Plantarum ac Florum genera, fubitaneo fuo interim, vitadabentis noftræ fugacitatem, mortis[^]; certitudinem; fuâ per hiemem abfentiâ, noftrâ vitâ fiindtorum quietem; & fvavi fuâ, redeimte vere, propullulatione, certam à mbrtuis refurre&ionem, iiohis ob oculos ponunt; generatimverò pergratâ & amoenâ pulchritudine, ad fui Creatoris, utpotè, qui ea tarn mirabiliter huncinfinem còncfiderit, utper illahonoretur, laudes & gratias fundendas, nos invitant atque alliciunt. Quod fanè fateri mecum coguntur omneſ omninò homines, inprimis verò, qui cortice faltem Studii Botanici minùs contenti, medullam illius fumma cum oble&atione accurate rimantur- E cujus certè exercitio, proximè recenfifcE & Divinse plures alise MEDITATIONES, nee contemnendae in vitâ humanâ confervandâ UTILITATES, fummaque animi DELECTATIO & prQlubium, petenda & haurienda funt.

UTI-

DEDICATIO.

UTILITATES, quas in vit& human& confervandâ prestat, quod concernit, cùm eae à SapientiHimoRegum Salomone (qui teste Sacro Codice, locutus est de Cedro montis Libani adHysfopum, quae egreditur è pariete, & cujus Libri de Naturâ & Facultate Herbarum magno cum dolore ac detrimento posterorum interiëre) à Theophrasto, Dioscoride, Plinio > aliisq; quàm plurimis profundæ Eruditionis Viris Plantarum naturam & virtutem explanantibus, non leviter & perfundoriè, sed solidè & copiosè diducunt (Stæ sint atque explicate, non est quod addam. Neque etiam de fummis utilitatibus, quas aut ligna in extraendis Navibusvaftoactumultuofo mari fulcantibus, & Palatiis, Urbibus, Pagis ac tuguriis, inhabitationi commodis erigendis; aut Panis è frumento pinfitus & mense quotidieobvius largiuntur, quidquam dicam, quoniam hæc omnia cuivis affatim sunt cognita. Certe, Flores amoeniflimi, animum mirum in modum permulcentes, Gramina pergratâ viriditate fuâ

ocu-

DEDICATIO.

oculos jucundissime patientia, Herbal
non folium jumentis praeferentes, &
quicquid vasto hoc in Orbe vivit alentes
ac fospitantes, sed etiam, ceu fulgida &
venusta cum hilaritate micantia iidera,
coelum, veluti currum penilem argento
obducti clavi, summam cum magnificentiam
& majestatem splendide ac incomparabi-
liter ornant; ita tellurem tam ineffabili
pulchritudine, grataque amoenitate ve-
stientes & condecorantes; idmerentur,
ut unicus terras decor & toga quaedam
talaris jure dici debeant. Quod à veri-
tate minus vabesce exinde fiet manife-
stum, si consideretur, quam informe,
quam triste, quam rude ac vastum Chaos
hinc terrarum Orbis esset, si pulcherrimam
fuam, omnivariis floribus longe artificiosius
(quam quod Apellis & omnium qui un-
quam fuerunt, pictoram penicilla imita-
ri valuerunt) interstincta & decorata veste
ac tapete privaretur nudus; appareret;
quam tamen à Creatore suo munificentis-
simo & liberalissimo, tam ornate tectus,
tam varie pictus, tamque cultus, veluti ope-
re

DEDICATIO.

re Phrygio baccatus, & tàm fvavi odore
uberrimè imbutus est, ut omnium omni-
nò hominum vires & facilitates ad expri-
mendas venuftates iftas planè incompa-
rabiles longè multo[^]; imbecilliores fint.
O quàm amentes igitur omnes illi! qui
pulcherrima haec Dei dona & bona, pla-
nè inutilia & vana efse in animum indu-
cunt, fannisque excipiunt, fi quis eomm
exercitio deledetur, aut de iisdem ali-
quid in publicam lucem producat: quail
verò Sapientiffimus rerum Opifex ea-
dem fruifra creâffet; qui tamen, cunda
ilia bona, immò optima efse pronun-
cians, hominem adeo cognofcenda Sa-
pientiâ intrudum, omnium Dominum
conftituit, ut eorum ufurâ in S. S. Nomi-
nis Sui gloriam gauderet & deledaretur.
Quæ dona eximia pro dolor Ifœdifiimo
Pròtoplaftorum lapfu ita perdita & amis-
fa, ut quidquid fcimus & cOgnofcimus,
ex parte faltem & alterum alteri quafi
confarcinando fciamus & cognofcamus.

DELECTATIONEM verò & gratam
fatietatem in Exercitatione Botanicâ

)(* ejus-

DEDICATIO.

ejusque cultura exiflente, multis verborum ambagibus explicare, planè fupervacaneum duco. Nam qualis & quanta fit, inter alios Diocletianus Imperator, qui cum eâ Fafces commutavit & Diadema depofuit: Cyras item Lydorum, & Evax Arabum, Reges; quorum Hie fuâ manu Plantas in libro peculiari delineatas, Thefauri inftar eximii, Neroni Romanorum Imperatori offerre non dubitavit; Ille autem, cui obledamentum in Hortorum culture adeò ingetns fuerat, ut etiam in votis unicè haberet, quò ibi vîta fundo in Hortis, arboribus confitis fertilibus, jufta fierent, abundè & clarè demonftrarent. Ex Principum Chriftianorum numero idem egregiè comprobant Fridericus III. Glorififlimus Imperator, qui in cognitione Stirpium adeò exercitatus fuit, ut Medicorum iftis temporibus, in hac arte pauci cum ipfo comparari potuerint; & Maximilianus II. Imperator laudatifimus, qui non finè fummo ftudio & magnis impenfis, variafanè Plantarum Exoticarum genera,

DEDICATIO.

nera, Hortis fuis intulit & coluit, atq; hanc infirmitatis fuse recreationem aliis longè antepofuit: nee non haud ita pridem, Sereniffimus Dux Aurelianenfis, qui Studio Botanico adeò imbutus, atque expertus fuisse certò asferitur, ut Principem, poft Salomonem, in h&c arte oculatiorem, Orbis terrarum nullum tulerit. Taceo, quòd adhuc hodie plurimi Magnates & Heroes Inclyti, Hortorum fuorum multis Plantarum, Florum, Fraticum & Arborum generibus confitomm ornatu, tanquam per fpeculum pr^ænitens obledamenta, ex hoc tam laudabili & Divino exercitio haufta, dilucidè exprimant atq; significant.[^] Ipfa **ILLUSTRISSIMAM VESTRAM EXCELLENTIAM** vivum exemplum fiſto, utpotè, quae & tùm, ciim falutari Suo Regimine, Confoederatis Belgii Provinciis annos perquàm plnrmos non finè fingulari laude Confiliis pariter ac Fadis laudabili femper effedu Officia Sua praeſtitit, Pacem (5[; almam, Divinâ favente Gratia, cum omnium piorum ac pacisamantium gaudio & oblatione

)(* 2 fepis-

DEDICATIO.

fepisilmè procuravit; (quemadmodum
idinprimis ex confpicuisatq; arduis Le-
gationibus, Londinenfi, Bred'anà, Aquis-
granenfi, Clivicâ, Colonieiifi, &c. quas
ILLUSTRISSIMA EXCELLENTIA VE-
STRA cum inadtimabili Patrice emolu-
mento ac famâ immortalis Nominis, fide-
Mimè peregit, luculenter patet) & jam
quoque reſumendo Neomagi Univer-
ſale illud, quod nuper Colonise Agrippi-
nſe non fucceffit, Paris Negotium, non
finè proprio virium facultatumque dis-
pendio, totius Europe falutem ac quie-
tem unicè intendit: in laudabili tamen
Divinorum Operam Meditatione &
exercitatione gratam animi Sui Publicis
negotiis delaffati obledationem, fuavisfi-
mam quietem ac refocilkitionem quſeſi-
vit, atque adhuc quaerit. Et fanè quan-
tum fibi ILLUSTRISS. EXCELL. VE-
STRA in Divinâ hâc Scientiâ experien-
tiam acquiſiverit, vel folus ILLUSTRISS.
EXCELL. VESTR. Hortus abunde teſta-
fur, quippe qui mirabilium ex omnibus
Orbis terrarum partibus congeſtarum
Plan-

DEDICATIO.

Plantamm abundantia ita excellit, ut omnium fpe&antium oculis non nifi ingenti cum ftupore fefe luftrandum exliibeat.

Recenfitse fupra tresUTILITATES ilbe,Divina nempe & Sacra adDEITER OPT. MAX.gloriam animique falutem fpedtansMEDITATIO/anitati & fustentationi hominis ferviens UTILITAS; ac fvaviffima mentis fummo cum prolubio DELECTATIO,èBotanica exercitatione &Plantarum culturaemergentes,animi quoque mei inclinationem^ quse mihi velut ingenta à teneris ad rem Plantariam foit, in dies foverunt, immò auxerunt- Factum eft inde,ut prater Pietatis exercitium nullibi plenior recreationem, quàm in meditatione reram ad RegnumVegetabilium pertinentium, reperire potuerim. Ex qua seterni Numinis Omnipotentiam, Sapientiam, Providentiam, Mifericordiam, Amorem & Munificentiam tàm luculenter mihi , poftpofita omniterreftrium reram cura, ob oculos pofui, ac fi cogitationes meas

DEDICATIO:

profundiflimâ devotione in Sacris Elogiis
mirâ cum jucunditate paviffem. Etec
omiiia mihi quoque anſam dederunt, ut
nulli fudori, operae ac ſumptui parcerem,
quin t&m Indigenas, quàm Exoticas fldr-
pes inquirerem atq; colligerem. Hie ve-
rò ſingularē LLUSTRISS. EXCELL. VE-
STRA affedum in me finè merito meo
per tot annos uberrimè collatum, retice-
re non poſſum. Non modò enim gra-
tioſiſſimis me literis benigniſſimè recrea-
re; fed meam quoque, quâ Stirpes₅ potis-
ſimùm Exoticas, notitiam (multa ſcilicet
Semina, Bulbos, Plantas, tãrn vivas quàm
reficcatas, immò & ipſiſſimis coloribus
ad vivum artificioſiſſimè depiſtas, atque
ab extremis etiam novi aliquid ſemper
parturientis Africa oris obtentas, libera-
liſſimè mihi communicando) ad augere
Summâ animi Benevolenti[^] dignata eſt*
Quocircà, cùm magno earum numero
prîma hæc mea ſuperbiat Centuria, pla-
cuit eas vel in figurâ apice vel ſub ipſo
nomine aſcriſco notare, ut & ſeſe
innotefcat Poſteritati, quàm laudabili
ftu-

DEDICATIO.

ftudio manuque munificâ^{LL}ILLUSTRISS.
ExcELL. VESTR.D^{winorum} Operum,
hucusque aut pariim aut nihil cognito-
rum,notitiam,rei queLiterariaeapudEu-
ropoeosincrementumpromovere inten-
derit.

Quemadmodum autem omnia in
Oceanum,undeOriginemtraxerant,flu-
mina relabuntur: fimiliter ego jure meri-
toq[;]hancceCenturiamExoticaramPlan-
tarii cum ejusdem Iconibus, in debits fi-
gnum reverentise & animi grati testimo-
nium erga ILLUSTRISS. EXCELL. VE-
STRAM, aquâ nempe coruscumfuum
splendorem accepit, iumma cum humi-
litate depofiturus venio. Suscipe igitur,
ILLUSTRISSE at[^]; EXCELLENTIS-
SIME DOMItfE^DOMINE Gratiofiffime,
lucubrationes hafce meas Botanicas,
quas fubmifsâ cum obfervantiâ in devoti
animi tefferam, gratsec[^]; mentis Symbo-
lumINCLYTO TUO NOMINI infcribo;
mihique porrò benigniffimo gratia* Tuæ
Favonio adfpira,ut & in pofterum de ul-
teriori Plantarum notitiâ Te prorAoven-
te

DEDICATIO.

teacquiſita,gramlarimihipoflim< Vale
ILLUSTRISSIMEMACENAS & adfe-
ram us<^; fene&am vige fospes, vire fal-
vus, flore incolumis, Ivayique Botanices
Studio TE eousc^; recrea, donee tandem
annorum vitaeque fatur, immarcefcibi-
lis ILLE ILLUSTRIS. TUA ANIMA
FLOS in coeleſtes transferatur Hortos.
Dabam ex Muſeo meo Gedani, Anno
M. DC. LXXVII. die XV. Menſis April.

ILLUSTRIS. EXCELL
TUJE

devin&tisſimus atqj humillimus
cliens

JACOBUS BREYNIUS.

PRIVILEGI



De Staten van ftoHanto cube

Weftrieslandt doente i i wfm. . aifo>ns

fcwoottfuJ&oJacobBrayne. Jfoe bat |>iSupplic.
tot fpm groot Poffrn krtbbclaten brufen feePe*
QSocce, gef itttulcm CENTURIA PL ANT A,
Roden alle Moote C, en alfo int fclbe er /
nweyelpcf &dcn roote Co
fientvaren aangewenbf/ foo fnt fd&c fe bruceit
anh<t fnlben ber flatten/ en aljbbctmal*
np&i^c SOienfdjcn/ac&onben wierben/frfe tipt
ft feme luff/ f fdffi>c fou&ctt tno^ett fomen

« fc^nplici ofK&mdEfm/cttalfo>aiED?o<rf bfticmcn ban gftwg&ertert u
tuercifm,- fbo roag fp Suppl far oobtmo^^ fecrfoccfen&c tat filje, mo^t
trferf nicr&cn/cnbc^ fien Suppl. moctc toe^c^am v<rtm^bm ba f
Ea^< in 6m Epfcf dat fcpffien ^aaren nu «rf comenbe met en mogge
flfDrucfofte be pactm natr ^cfnrbm wtxn nod? fenfiede noc^
lc ofc dCg^ nacrcchritcf off re oe S^urcn ttaargdWcbn fy<t u Zanbe
gen der oopen d^e ger b d en op t
oder gmercke hebbende / enbe^cne^en rocfen&c fcrbc&flam bml Suppl. upc
Dnf: ree te Wten h Souvcraineff?<tc^f <n Authoritcyt, bcnf<16m Suppl.
^confentcerdt/ gcaccorderct enbe ^octroyeerd^ ^ctbtn/ confencercn/
accorderm cube oftroyerm mfflbcfen / bat (19 gebupircnbe ben Ztytot 6art
f>fft(en eerfi fomenbe acferer cen fool^cnbc ^arcn bct fcoorg. SQotdi Qtnaamt
CENTURIA PL ANT ARUM EXOTICARUM>(tilftnbcn60oy0. ©nf w
g^anben allcen fall mogen brufen boen brufen upfgcbm en bcrtopen/ i>er-
(febenbe 5arom <t!<n (nbc anen ^clpcf en fict fclbc Qioerf <n^ (fed ofce bed
naar te bruf en ofte dperi naargebruct w^nnn ben fclben jOnfen ganfte t(
Sren^en/ u^t te gc&en oft'ttt bercoopen/op be &erbeu^e frmalle bfmAdr^e#
brucffe in^e^racfele ofte eêrfodjte Exeniplaren, en een ^oete tan trie fonbctt
©ulbe^ baar en (o&ente UvMUm tt applicceren cen berbe ^a<t>oorbcn
Officfr bfe be Calange boen fall/ cen bctbc ^drt feoor ben 2(rmen;ber fplaat*
fe baor ^et casus boorMUN fall/ (nt>t b(t rc(icrcnUi>trt)t tyait boot t><tt
Suppl. 3(Ue0(nbUn 93erflanbe/b<if 0332? ben Suppl.met bcfen£)nfenOAROyc
wilUnix gratificcren tot fcer&ocbtngc 6an f^ne ©c^aabe boor hef ^obvucfen
fctrtif bootg. CBoecf / bacr boor m cen^en &ee(c Kvfaan tori ^n^ouben dan
bten fe authorifcrcn offte fe advovtren; enbe teelminn bct fcl>e ottbetriOnf(
protedic tnbt QSefc^ermfn^e/ <mi\$H meerber Credit aanfun offte Reputa-
tie re pfijen., t^emaar ben Suppl. m cas baar (n pcfq onbthoorfydtfoutomo'
gen influeren,aUe h<t fdbê rot fpnen Saffefak^oubennwfen f(fixramtvoov^
ben; So t bfen cpnbe wel expreflelpcf ^acrenbe/ bat ty albicn ^9 befeniOnfen
OAROye/ boothtt (elbe QBoecf fall wfflen flellen / baar tan geene gcabbre-
feferrbe offfc ^contraheerde mcncricfallmo3^H maefen/ tRemaair gt^oubm
fall

faltttfc/gefthfocoaroy ta'tgcgtlm fottbcr ttnfyt omisfie fetor &oor
re ftuctfn offtc fc boen tyrttfc/ op pcene 9<m &et effeft ban Men tt ferlf#
fen* @n^e fen eynbe &at Suppl. t>den Onfen Confenteente O^royc moge
genfete al^nact lefomt/ Sdficn 1DS> «H< en eenen %tr)& fcunt an
gaen macVctf f9 ^» Suppl. dan ben^nmjjoubc tan befen tocn laten enbe
gebo^en rufldpcf/ fercdclvcC/ cn^c tollcomcnflpcf genicn en geferupecen ces-
ferenfc ode UUtt en^e ^Beberfe^en cer contrarie, @ebacn in den £a»
ge ont>cr ^Dnfcn ^roeen ^egele fytt antocn ^dtt^en/denxn. Januarii me ^acv
© h^) eeren en g l ind f ^ ^ Dpf:n ftfjkt ert ac t e nt fcht ^.

A. WASSENAER

Ter Ordonnantie van de STATEN

HERB, van BEAUMONT.

PRIVILEGIUM SACR[^]; CJESA- REI MAJESTATIS.

LEOTOLDVS T>ivina favente clemen-
tia ele3us %<mianorum Imperator semper
perfgufius, ac (jermania, Hungarite, ¹Bo-
hemia > ^cDalmatia, Croatia, Sclavonia &-c.
^{Rex}, Archidux zAuflrU, Dux ^cBurgun-
dia, Styria, Carinthia, Carniola &- JVir-
temberga, Comes Tyrolis. &-c. Agnofcimm & notumfaci-
mmtenore prafentium univerjis[^] quòd\ cùm nobis Jacobus
Brcynius (fedanenfo, Botanicus, humillimè expofuerit[^] fe
Opus Plantar: Exoticar: iconice exprefarum in certas
Centurias magno labore &-fumptu congerijfe, idpprali
beneficiojuris [^]Publici propriis[^] uis expēfis facere decrevijfe >
vereri autem debere, ne quòd fape fieri foleat, alii quòquocri
alieni captandi cauſa eandem editionem fuam fubdole imi-
tentur[^] feq; italabore juxta ac fumptu fruſtrentun demifſe
proinde fitpplicando, utfe adverſus ejmmodi molitiones Tri-
vilegionoflro Cafareo munire clementer dignaremur:3\ Qos
iis ceptibus uti aquitate nitentibus benignum noſtrum
prabuerimm aſſenſum, ac idcirci omnibus &-ffingulis 2?/-
bliopolis, Typographis &-^cBibliopegis caterisq; quibtu cwij--,
remſeutiegotiationem librarian* exercentibm ferio atq; di-
JlriBè inhibuerimui & vetuerimus, prout perprafentes ſub
pwna decem marc arum auri inhibemm & vetamus, ne eorum
quisquã, praterpradittum Jacobum Brevnium, am eum
cuiis, inſcriptis dederit licentiam, ante fatum Opus intra
quindecim annos ab editionis primã die cpmputandwn, in-
tra Sac. Itym. Imperil %egnorump ac Dominiorum no-
firorum hareditariorum fines, in Jĩmili vel alio typo vel
forma, fiveintoto. fivein parte, recudere vel alii recuden-
dum iare > aut alibi impresum invehere, venundare &
clàm Jeu pal'am distrahere prafumat, Ji quis autem fecus
faciendo [^]rivilegium feu interdiBum hoc noſtrum, quovis
X** modo

modo transgredi fen vtot[ire con at its fuerit, nonfo-
 lum omnibus exemplar thus per per am[st]ippe rect[is] fetsap-
 portatts (qiii[us] quidam d[icitur] Et Impetrans lejusve bareaes f[uerit]
 propna author it ate five z5\lagisl> *atus ejus* loci aux'dio,
 fibi vendicare poterunt) privandunijcd&* fupra dilia de-
 cem marcarum aun pwxk^ Fifco nojiro Imperiali, & parti
 Ufa ex aquo pendenda > omnt fpe venue precisa mulU^n-
 dumdecernunuu Dummodo tamen pradictum Opus teno-
 rem hujus ?iojlri^c Privilegii ad cujttsj, notitiam tnfrontc pr<£-
 imprejsum continent^natuorji ejusdem cxcmpLvrt? ndC&n-
 cellariam noftram ImpertalemAulicayn^uarnpmtum tran r
 mittantur. z5\sfandawuyporro unherfis noflri.s & SACJM
 perit ^egnorumq; & Domtmorum nQJlrowmHtereditario
 run n zjiaagiflratikus, Ecclejhjlicis, & Secu^uribus, cu-
 jusctmm Ordinis, Condtttonts & Status fuerurt, ne quen-
 quam huicnofiro Caf/Privilegio ullatenus imph
 venire patiantur, quinpotius cjurdc^{er}ceri cur^{upf}
 dlispoems alusque modi r iJoneis co^{e n t}, Harum tejl-
 monio d^{MM} mahu noflra fubfchpi^{arum} & Sigilli
 nojlri Ctffarei appre\fane mumtarum, qvæ dabantur in
 Civitate nojlra Fierinae die decima nona, rrrnnsis Maji,
 Anno Domini <S\dilI: fimo, Sexcentefimo > Septnagesmt
 Septimo, Ttpgnorum nojlrorum/Ii, dcamo nono yHnn-
 gariae vi^{efi}ynopcundofBohemia vcro vigefimo primo.

LEOPOLDUS-

V. Leopoldus Guilliclmus,

Comes in Kⁱⁿigsegg.



Ad Mandatum S. Cæs. Maj.

proprium

Chriftoph Beiicr.

*AB. Autor, nullum exemplar hujus Centuria pro suo agnoscit, quod propria sua
 (vel suorum Heredum) manu, in impresso Tituli folio infra in margine iconis
 subscriptum non est.*

AT>
LECTOREM BOTANICUM
PREFATIO-



Uanquam ab ipsâ adoleſcentiâ , nonſolùm in notitiam Indigenarum; ſed Exoticarum etiam Plantarum fingulâri ardore raperer & cupiditate: tamen præter eas, quas dulciſſima Patria, è gremio communis omnium Matris producit, nullas*deſcribere mens ferebat. Poſtquam verb aſpirante fortunâ, magna Exoticarum cõpia, Summi inprimis ac faventiſſimi Maecenatis noſtri, ILLUSTRISSIMI atque EXCELLENTISSIMI DOMINI, DN. HIERONYMI à BEVERNINGK adjumento ad me deveniret: inexcufaibile negligentie in Poſteritatem &c ingens erga illos animi ingrati, à quibus acceperam, indicium futurum arpitrabar, ſi eas tinearum St blattarum ſentire injuriam, nee uſum aliquem mortalibus adferre paterer. Virorum itaque Celeberrimorum Doctiſſimorumq; ſuaſu, quasdamde Exoticis etiam nondum deſcriptis & minimè cognitis, cum intermixtione rariorum quarundam noſtro coelo orientium, in lucem emittere, 6c Germanicâ quidem linguâ, deſtinavi. Verùm enim verb, cum ſtudiorum apud Exteros, Botanicorum maximè, multb majorem quàm apud Noſtrates, Dignitatem conſiderarem 5 ad Cartefii exemplum , Ipfis eundem laborem meum, in linguam Latinam per alium translatum, pariter offerre, tandem mihi placitum fuit. Quem'etiam in finem, Virum literis & doctriinâ præſtantem, exorave-

P R A F A T I O .

ram. Sed quoniam ille Medicinæ & Botanices penitus ignarus erat, atque ego varias ob rationes Medici vel Botanici ad hoc uti operam in dubium omnino vocabam, laborem hunc ipse suscipere, licet tempus aegre ferebat, summo affectu. In quo, Botanicorum ut more ac ftilo, & quidem jam hujus, jam illius loquerer, operam navavi. Hinc quandoque brevem absque omni verborum lenocinio, nonnunquam prolixiore, subinde metaphoricam scribendi rationem, ad evitandum ex crambe Tæpius coacta fastidium, usurpavi. Opere autem hoc vix suscepto, illi, praeter imminentis dirigitur invidias tempestatem, haud leves se offerrebant difficultates. Namque cum per erudito nostro & curiositatis studio Orbem, non solum rarum, sed exactissimo simul etiam ordine digestum Opusculum offerre anniterer, postea illud haud perfici posse animadvertēbar; cum Plantarum quarundam Semine, aliarum Fructu, nonnullarum Floribus destituerer: cogebar igitur fervire occasione, Sc quantum fieri poterat praeferre. Tria autem illa ante commemorata, nobilissimae font partes & Symbola genuina seu genericas & essentielles Plantarum, in iis denominandis, legitimoque Generi subordinandis, observandae, Frustrum in primis & Semen. Quod etiam ex Divinis Scriptis, (*Genes. c. i. liquet*, ubi dicitur; Et „protulit terra herbam virentem, & facientem seminem juxta genus suum, lignumque faciens fructum, & habens unumquodque semen fecundum speciem suam. Hoc autem Veteribus nunquam sed foperiori demum seculo à *Conuio Quesn'ero* primum

P R A F A T I O .


mùm omnium animadverſum, quemadmodum
 ex Epiftolâ ipſius ad *Occonem* (cujus *cthmfo* *bannes*
Bauhinus in *Hift. Plant. Univerſ. Tom. III. lib. 28.*
c. x. 1. p. 234. mentionē fecit) fatis abundēq; patet.
 Ejusdē protinùs veſtigiiſ Nobiliſſimus atq; Ocu-
 latiſſimus Botanicus *F^Wro/«w[^]*, (ut clārè videre
 licet in ejus minùs cognitarum *Stirpium* *£x <p%ofoet₉*
 Parte in primis alterâ, *c. 27, p. 62, & 63.*) inſtititj do-
 nee hiſcè tandem temporibus, Excellentiſſimus
Dominus *^^ de ioriſoh, go* **Bnicorum** in ne
 Decus, è prxdidarum Celebritate conſpicuarum
 Bigarumtramite, viam apertam & publicam, in
 florentiſſimâ ingenuis artibus Britannia, parare,
 dubio procùl brevi interſtitio temporis magis
 planam effeclius, occiperet. Quin & ego pro
 tenuitate meâ, quæ præſtare hæc vice non licuit, ex
 ſuprà commemorato *Frudrũum* *Seminumq;* defe-
 ſbu, me in poſterum emendaturum, Deo volente,
 ſpero. Benevolus interim *Leclror*, *Lucubratio-*
nes hæcè meas, quæ tam diu (ſiquidem ob chartæ
 penuriam detentus fueram) ſub praelolatitârunt,
 aſquo ſuſcipiet animo, donec accuratibres con-
 ièquantur ; cùm non ſolùm haud exigua Planta-
 rum rariorum nondum deſcriptarum copia mi-
 hi reſtet, ſed etiam quàm plurimæ, tam ab *ILLU-*
STRISSIMO NOSTRO MACENATE,
 quàm *Excellentiſſimo Domino Arnolſo Syen 'Profeſ-*
Jõre a5Medicin# & • ^otanices Lugduni 'Batavorum
longè celeberrimo; nec non ab *Excellentiſſimis <s5\le-*
dicis variis in *Aſiæ Regionibus* degentibus, ſim-
 mo cum deſiderio à me exlpecl:entur, Rei Her-
 baria Amatoribus, ſi meas hæcè *Primitias* non in-
 gratas intellexero, ofFerendæ. Caeterùm lubens
)(** 5 itc-

P R A F A T I O .

iterum fatebor, me omnino vereri, ne ex sepius jamrepetito Frustrum &c. defectu plurimos in hoc Opusculo admiserim errores: Exempli gratia; *Chrysanthemum alyoides africanum* (a me non visto) quod ante quatuordecim vel quindecim annos, priusquam femina oculis lustrarem, *Afterem alyoidem* (pro nomine tempore impressionis huius *Tm&ztus* Dn. *facobo Zanonio* editum) ob floris formam, vocare decreveram postmodum cum femina non pappi (censum sed solidum obfervaverim) inferere placuit. Fieri autem posse non nego, quod Planta hanc *Opuntia* aut *Tortulaca* magis firmes, vel plane a nobis cognitae Stirpibus, discrepantes feratrum, eamque ob causam cum *Fico* melius *Indica*, sicuti in *Mis* *Aedictis* *frThilosophicis Hafnienfibus* factum, vel cum *Tortulaca*, ut Excellentissimo Dn. *afrahamo* *Muntingfhcait*, comparandaveniat; vel quod heteroclitam, nostro Orbinotis separandam constituat Plantam, adeoque male a me Chrysanthemo annumeretur. Ob quam atque similes causas, non tantum a Doctore experientissimo, sed ab imperito etiam hortulano reprehendipossent. Factum tamen a me facias. Lector curiose, quantum exiis in promptu erant, conjectura consequi licuit: ingenuè profitens, nihil mihi quidquam carius ci vili & experto futurum Castigatore, cum nihil propius verae felicitati esse existime, quam discere. Itaque non folium discendi, sed etiam cognoscendi & corrigendi errores meos, dum tantum modestè, sine animi impetu (Zoilum atque Altercatorem non euro) exhibeantur, me avidissimum fore promitto. Hanc mihi tantisper sufficient, dum

P R A F A T I O .

Dodtiores ad ulteriorem investigationem earum
Plantarum „quas comple&itur hanc Centuria in-
citavero 5 quod etiam ex animo opto. Hicce va-
le amicissime ac benevole reique Herbariae stu-
dioſe Lector, & contenta in hoc Tradlratu mi-
rabilia longè pulcherrimajmeditandopariter in-
comprehenſibilem SUMMI earundem OPIFI-
CIS Sapientiam bonitatemque imperſcrutabi-
lem perpended.



N O M I N A
ILLUSTRISSIMORUM
H E R O U M,
& ceteromm
EXCELLENTISSIMORUM
atque
CELEBERRIMORUM
V I R O R U M
qui
CENTURIAM HANG
EXOTICARUM PLAN-
T A R U M,

VeiPlantis, vel Scminibus, velrclationibus
gratiofisfimè communicatis, coiidcco-
rare dignati Hint.

*

MICHAEL CASIMIRUS RADZIWI-
LIUS, S. % d. Prince j Ma ni Ducatûs Lith-
vania Fice-CancelUrius & Exercituum Thix Campe-
Jlris &c. nunc veri S. R. \$5M. Polon. T\$mnarri Legatus.

HIERONYMUS van BEYERNINGK,
Teilinga Toparcha; Inclyta Civitatis CfOud* Exconful;
Qjfcademia Leiden Jis Curator; Totius 'Belgii Fcederat
quondam Qa^arum Trafettns; nunc in confefu 2). ©.
Qrdt-

Ordinum Generalium Asessor, & ad Trajectum, qui jam Noviomagi inflituntur Legatus Potentiarum Fcederatarum Belgii Provinciarum. &c.

Prater EOS Ordine Alphabetico
rccenfentur,

ADOLPHUS VORSTIUS Doct. p. m. Lugd.

Batavomrni zSMedichue & Bounices Profesor.

ANDREAS CLEYER c. L. f. L. V. & Chita-
tis T. Satyvia \$Ewa in favalnfula fedicus.

ANTONIUS CHASTELEY ft. / > . . ». Imfido-
dami, Societatis Indie a Orientdis, (fuyana & Novi
*Betgii Curator.

ARNOLDUS HUYBERTUS D. r. f. c.

Vkrajeftenfes.

ARNOLDUS SYEN <£Wedic. T> o & or & > ejusdem
Facultatis atque ISotaniets Lugduni Batavomni Pro-
ftsibr.

BENJAMIN ENGELKEN Chit. Trim. Qedan.

Conful, Adminijlrator Tortorii Senior, Scholarcha > atq;
T\$ibliotbeca (ymnafii Curator, & c.

CAROLUS CHIVRY, p. m. Pharmacopæus Arn-
ftelodamenfis.

CAROLUS SWEIKERUS, ScaUnus (?eda-
nenjis.

FRANCISCUS SEVENHUYSEN, 5PA mi M.
copi Haga-Comitis.,

JACOBUS GOLIUS f m. Lugd. < Bat\$u. £\Lu
thefeos & -Lmgv. Oriental. Profesor.

JOHANNES BRAYNE Tatruelis, *5Mercator
a ArnftelodamēvJh.

JOHANNES COMMELYN *Senator & Commisarius ayfmetelodamenjis.*

JOHANNES ROETERUS *p. m. Secretarius
zJmfelelodenfis.*

JOHANNES SCHMIEDT *VSor tZMedic.
Thyijcus jedanenjif Trimarius.*


ISAACUS VOSSIUS-, *miofopbns celeberrimus,
qui Herbarium %aumlfii perlujlrandum> &- nonnulU
quadam excerpta concessit.*

MATTHAUS *SLKD\JS,T>oBor*Medic.Am~
ftelodamenjis.*

PAULUS HERMANS, *DoBor, Societal Indica
<s5Medicus in Ceylan Infula Ordinarius.*

THEODORUS *GOUUSf.F. V.Lugd.tBa*
tavorumEX'Conful,&-quondanfPr*ton nunc verb cjus-
dem Civit. nomine ad Collegium Archithalatficum, quod
Amjelelodami eft, Delegates.*

WILHELMUS *ten RHYNE ©o&r, ^Magni
Imperatoris faponiaa^Medicus^ "Botanicus & Cby-
micm.*



HONOR1
X 0 2 I L I S

F L () R I B . U S

Scribentis

A U T O R I S

MAximus in.minimis DEUS eft, Floresque
caduci

SUMMI teftantur de Eonitate DEI.

Hi feniũs recreanti aegris medicamina praeftant,
Et quàm fint renjm cundra cadaça/ do-
cent.

SALVATOR MUNDI commendat lilia cam-

Qua^Saionaeisprastulitipfe opibus.(pi,
Haec benè perpendit fcribens de Floribus <tAutor_y
Optandum huic meritb ut floreat &: va-
lcat_.

A- D LINDA-

BENJAMINIS ENGELKEN, COS.

Ad

TACOBUM BREYNIUM
AMICUM, REI HERBARIA
PERITISSIMUM.

ELEqia.

Fonte fer&iata Peregrinas ffr PIPE Plantas,
Qua* tibi dat %Rjfpf3\yLeBor amice
Qua* tibi dat %Rjfpf3\yLeBor amice,matm:
Indefessa legens, per disjita %egna, hbore
Herculeo var'w. India testis erit;
funcia Palaestinae Syria, & Brasilia, Creta,
M Africa, turn Capitis Spes **Bona, Barbaria.**
IndigetUs feliciter infuper Herbas,
Quas tenet Europa, & Prusia Iscta Jimu
Hoc Tracorie brevi Casubia Nostra patebit
Quanta ibi Tlantarum copia, fpreta dm..
Immodicos referam fumtus ? 3(on. i&ra loqvuntur
Artificis, gnavo pollice fculpta, fatis.
Curru veUafagax volucrum zMedea Draconum:
Hacne put as etiam turn penetrasse loca ?
Pallor: zAtOsfafuascognoscitVzYiotiHerbas',
Carmine quas celebresj^rfo To'etajuo.
Unica ret miranda, Senis renovaverit anno9
A:foiris, extemplo qut bene-dock Socrus I
Et vetus ut gravidus ftifesfit faBus Olivx\
Terraque qmtulerit pabula lata fimuL
sAuguror, & - nee vana fides, Vegetabile LullI
G fuit Herbarum maxima, nota Sophis.
Hanc, Fato monfrante viam, Tu montibus altit
Innafciinvenies, candida 'Phabc, tuts.
Adde peregrinisperegrinam protinus Herbam:
Torriget, ecce}. Herbam fda vel ifta Tibi!
Gedani, und.
Anno 1676.

HO-

HONORI&MERITIS,
CELEBERRIMI ERUDITISSIMIq;
BOTANOGRAPHI
DN. JACOBI BREYNII'

Cum
VIRIDARIUM suum EXOTICUM
cderet.

PLantarum ignotas fades-, viresq'- stupendum
Naturae ludentis opus, qui cernere gcftis;
Siftc gradum: Et BREYNI primasvos fiiscipe
foetus.

Congestas augusta dabunt Viridaria mesfes;
Et quondam immensus iparfim quas protulitor-
bis,

Parturit unus ager: Fundunt sua thura Sabaei,
Extremi firmis orbis, & ultima littora Gangis,
Has ergo telluris opes> dum ihente revolvīs,
Quisquis es, 3c variis distin^ras floribus herbas,.
Autorem venerare Deum: nee dicere cesses
GRAMINIS HERBACAROESTJ FLOS
HORTI, GLORIA MUNDL

ARNOLDUS SYEN>
s5\£edicin&&- ^Botanic, in Ac ad.*
*Lugd. *Batav. Trofesfor.*

I:A£ tenu Alii *natas propioribus Herbas*
 QuasT*atrium **large.gignit** 'alitq; Tolum,
 Pervigili jludio, gnavisque exponere curis.
 Content i, **laudum grande** *tulere jubar.*
 Longius ingenio) 'BT^E^P^fT, *exspatiatus, & arte*
Splenauidius 'Docio j\ (o)rk^m in Orbe geris.
 Extremas adtIsfe or as, pfatit, *usq; remotis*
 ColleBas nitide propofuijfe pigis,
 Stirpesque omniginas, *tocuph^s quibus India fulget,*
 (Mas generosa **finu** divite China fovet,
 Artifici pQpulis spe&andas jifiere de; *trà,*
 Htc labor, hoc JIudium ejly **VIT^P** *enerande Tuum.*
 Hoc frincep^{erit} Etbi not, *ine gloria cesfit,*
Sumni idea dudum Te cohere ¥•ri.
 Hmc fcltx patria Theophuflus'dicer is Vrbi,
Iuque (jedaneis 3\obik(fermen agris.
 Aufonis Orajuqs depr^ **dicet undiqm** Cives
 Indigent? plduat (jallia vajla *fuis:*
Nos quoque (/qdanicisgratamu) *justius, trvis,*
 Qua tamo Herbarum **F'mdice** Uta *vigent.*
 Isfimul &• juctimi *a fuis,* idonea F'u^e,
Exhibet *cyg?*ia dexteritate Libris.
 Omnipotes re fern cum quxhbet Herbula 3\ *(Vi5,*
TITteM Be celcbrat *pagina cuncta MA*
NUM.

Amicisfimo fuo BREYNIO

deproperabat

J. SCHMIEDT>

Physicus Medicus Qed.

Ad
 NOBILISSIMUM
 DOMINUM
 AUCTOREM.
 BOTANICUM EXCEL-
 LENTISSIMUM,
 FAUTOREM ac AMICUM
 Colendisfimum.

Q VxStagi'rites nobis, qus civis Erefti,
 Quarq; t)iofcorides_{3z5}\tfattbiolusq; dediti

Q q j f , rna,

I 'Albus a ctffis didlus, vel monte Tabe
 Qnx dudum egregiis asfcruere'librisj
 (jesmri-, ClusI) SchenkJ \$c monumcmta Lobell,
 Et cum *Baubinis qua: Dodonaus habent i
 Horum TE promutn, BREYNI, condumquc
 faluto:

I Nam mcmori quasvis dogmata mentctcncs.
 Non opus, in pi6Bs fcrutari Herbaria chartis:

TU loquere j En fiibito campus & hortus
 adeft/

Jam qua: nullusadhuccalamodepinxei\ uAuct(
 Floras opera, Eois usqj petitalocis,
 Subjiciens oculis, Nomen tranfcribis Olympo,
 Chironisq; * afro proximus eſTe meres.

fi^r.

GEORGIUS SEGERUS,
*Phil. & Med. D. Medicus Regius,
 Physicus (jedanenfis Ordinarius
 Medicinæ atp TbyJicetTro/.Tubi.*

I
A U T b R I S
 CLARIS SI MI
 &
 INGENIOSISSIMI
C E N T . U R I A M
 P L A N T . A R U M
 EXOTICARUM.

* *
 *

Q Falls in atkreo Thaumantias emicat Orbc>
 Stelktis ficut flammat mtilatque pyropis
 Ccelum > tdefolum est, quod tempore frotulit omni
 Arte Viros doBâ celebres, Linguâque difertos,
 O nimum latare igitur mea Tatria dulcis,
 Heroas qua tot numerate quos Tall as adorat,
 Artibus dmnigenis Clarosy<z?Miracula cSMi,
 Sidera quos possis Tatria y^cPhcebosque vocare.
 Hos inter Sophia (/ēdanenfis maximus Atlas
 Keckermarius erat, (fēmō Scriptisque per Orbem
 Cognitus; atefnum Jurat per Secula Zh(omēn
 Mochingere, TWw₅ quodSvada (JMinervaqueccelo
 Inferit, &• Tatria veneratur grata Tericlem.
 Hebraasfracasy<£M'auras Arabumque loqucLu
 Eoas adeò lingual benè calluit omnes
 Fabricius, quempestiferâ ntors, fatce peremit.
 t5\faximus Vranies fultor^hemidisque Sacerdos
 Hevelius ^edaniDecus &• nova gloria vivit,

Floreat & *vigeat feros m̄ J̄ (ētoris dñnos.
 Quid jam non praeflat miri (Fegetabile ^egnum
 Si videos) no fier praclarus Breynius >. omni
 Tempore qui junBus fuerat mihi fidus Achates
 Apuero, J ludiis herbisque intentus, ut ipso
 Vix aliquis par fit jed nullus major in orbe.
 *De *Plantis (jraci fcrtyferunt atque Lati? ii,
 Sive Dioscorides, seu ^linius atque (jalenus,
 Sen quicunque alius ^P Un tarum nomina dixit
 Ha & em K, Herbamm bene composuitque figuras,
 Sive obfcura, gravi nodo plena atque Lahore:
 Omnia, qua Libro pulchrè fpeftanda dedijli
 < Praefentimon J lras veluti fub imagine parva;
 a ^nted qua nunquam pervafus viderat Orbis
 Hic Herbas fpe Bes, qua? dives America mittit,
 Quas Afia ^j Ethiopumque ardens, quasi* atria profert,
 Quas Czpitifundit Bona* Spes, hic cunBa videbis
 T Hanc exquisitis nitide depi Ba figuris,
 Qua certe magno sunt exantlata labore
 Tervigili no B'tj J ludio, J ludioque diei.
Macte Labore Tuo; Divinaque Indole maaci
Pergit & crepisti, Plantarum hfc ribere formds,
 Vt Fama & Virtutis amor super athera fumum
 Altius extollat Te, quamvis deinde fequatur.
 Livor edax, fpargasque Tui monumenta Labor is,
 *Per Te jam Flora mirdcula fumma patefcant,
 Trodeat in Lucem Liber, atmque exuat umbras,
Nec per Te lateat T lantis Herbisque per agros
Pruj incas piBus: Je re creet hi fee
 Patria T lantarum numero facunda; T titensque

* Caput Bonae Spei intelligitur.


)(****

Inge-

*Ingenium dextramque Tuam venerabimur omni
•Tempore penfantes condigna Ldude labor em,
Tatria. Uta Viro tali eft > Tatria que modernis
Eft < i/jttor dignus, vivatjtorerisqucperennat,
Etfua perpetuis infulpat nomina Cedris.*

In
Honorem A U T O R I S
Amici fui Veteris Sc Intimi, Compa-
trisque dile&isfitrii hsecce
pofuit

CAROLUS SVVEDCERUS,
Φιλοβότανος.



I
JA[^]COBI BREYNII
GEDANENSIS.
PLANTARUM EXO-
TICARUM
CENTURIA
PRIMA

*
*
AMYGDALUS ÆTHI-
OPICA, FRUCTU Ha
LOSERICO.

Cap. I.



[Xtremx Africx Promontorium, à
Lufitams, An. M. CCCCXCVI. H.
rdum magna cum molestia & Tum-
ptibus, in Indiam Orientalem per
[Occanum primam tentabant navi-
gationem, à Ipe optima, qu[^] ex a-
moemsima hujus plagx ac refedionis loci invē-
tione oriebatur, non fuftra se tantum laborem,
tamquedifficileiterfufcepisse, Caput Boni ESpei
didimi: non minus florumfvavisfimorū ac hcr-
barum faluberrimarum prcedives hortus; quam
leonum terribilium, aliarumqj bestiarum crudeli-
um, **infinita** penē multitudine ibi degentium/us-
tentaculum: inter arbores ac plantas alias, Orbi
nostro nondumcogiiitas, Amygdalum hanc ve-
nustissimam aiit, vulgari quidem minorem, è con-

A

trario

2 JACOBI BREYNII PLANTAR.

trario autem concinnioribus ramis ac foliis, 8c
 fru&ibus pulchrioribus ornatamjquodexlcone
 raminoftri^&ramoipfbante decem circiter an-
 nos, ex Promontorio memorato, ad Illuftrisfi-
 mum ExcellentisfimumqueDominum HIERO-
 NYMUM à BEyERNINGK, Msecenatem
 noftrum munificentisfimum (qui eum₅unàcum
 aliis compluribus novis plantis, nobis liberalisfi-
 mèdonomifit) transportato,praeclarè patet.

Is ex Virgâ rotunda¹rec1^a,digiti minoris eras-
 fitie, pedali, per' duorum aut trium digitorum in-
 tervalla,geniculis protuberantibus diftinclia, con-
 ftat: cujus Lignum fiibalbidum, haud durum ac
 ferè infipidum; Cortice crasfo,obfcure cinereo,
 multis pun6hilis ferrugineis guttato, ac per lon-
 gitudinem fubtiliter ftriato, nonnihilque lanu-
 ginofoobducium. Quodlibet geniculum,Fdlia
 feptena, coronas modo,fixmmo ordine, Planta-
 rum ftellatarum more circumdant, viridia,furfum
 fpe&antia, Oleandri figurâ, magnitudine, duritie
 atque crasfitie perfimillima 5 pediculis etiam fcm-
 uncialibus & lorioribus inhaerentia j fed venu-
 lisfibrisque crasfioribus&obliquioribus praedi-
 ta, ac circum margines ferrata. In fecundo &
 tertio verb geniculorum inferiorum, fuprafo-
 liorum exortum, Stylifex videntur crasfi, li-
 gnei, ex fufco cinerei & incani, duas aut tres un-
 cias longij qui circum virgain ftellarum formi
 inorbemaguntur. Himirumin modumPaifti-
 busmultis, petiolosbreves₅ crasfos Sc lignofos
 habentibus, ornati, verfus pediculum anguftiori-
 bus, in medio crasfioribus, tumidis & ventriofis,
 anteriùs honnihilreflexis, aut in recurvum fimi-
 iemquc



AMYGDALUS ÆTHIOPICA

FRUCTU HOLO5ERICO

From Rich Selin

Isaac Saut. Sculp.

A

lemque papillis apicem exeuntibus, cernuntur
 caeterum fructus illi cum Amygdalis Europaeis
 formam fuisse pari, quibus magnitudinem quidem non
 nihil cedunt, sed venustate maximè antecellunt,
 ob pulcherrimum, densis villis subtilissimis fericeum,
 ex rubeo colore ad Cinnamomi vergentem
 pulverinatum Callum: quoad elegantiam ab artificiosa
 rerum Magistra Naturam fiint vestiti, ut tactu non
 solum tam lenes ac molles, sed ad pedem etiam &
 in splendore tam squales holperico villosi, ut nec
 praestantissimi Confectoris Holpericorum manus
 elaborare illos elegantiiores posset. Sub pul-
 vinato hoc mirabili callosum latet non nimis
 duro instructum putamine, Nucleum in medio
 continens, cujus saporem coloremque, qui prope
 fitu obdudi, observare accuratè non licuit.
 Refert autem non nemo, qui in Promontorio Bon-
 nae Spei annum penè exegit, Nucleum, quod colo-
 rem saporemque, cum vulgari convenire. Quam-
 vis ego de sapore dubitem, postquam de amaro
 quodam Amygdalo iisdem in locis enato, non
 nihil percepi.


ARBOR RACEMOSA BRASILIANA, FOLIIS MALABATHRI.

Cap. 11.

Banila, Orbis Novae CLXXXV. annos
 detecta, Provincia australis, non solum propter
 mitem Coeli, fanitati humanae maximè
 A 2 falu-

4 JACOBI BREYNII PLANTAR.

**FOLIA ARBORIS RA-
CEMOS[^] BRASILIAN[^].
FOLIIS MALABATHRI.**



ICONES CENTURIA PRIMA. z

ARBOR RACEMOSA BRA-
SILIANA. FOLIIS MALA-
BATHRI.



salutarem temperiem, atque alias humane indigently subvenientes commoditates > *fed* etiam ob varios, quibus beata est, fructus praestantiffimos, immb & propter salutiferas ac mirabiles plantas, quas tanta terra; gremium, tamque larga copii effundit, ut inde addubitent nonnpi, an ulla etiam mundi habitati tegio bxxc ^txferenda fit 5 terrestris quidam America Paradifus multis est habitat.

Non parum ornamenti capit ab Arbore₃ non quidem valde magna & excesa[^], • *fed* foliorum gratia commendabili. Quae Arboris Canellae mediocris fere[^] formae iisdemque concinni feriepositis Ramis ftefert, quorum minores densb tomento obfita > candidiaC lanuginofi & partim brevioribus, partim longioribus articulorum distantis intercepti< Ex quibus Folia bina, adversa, contrarioq; ortu, (erie quaedam cruciformis disposita, pediculis uncialibus inh[^]erentia, exeunt, Folio Malabathro Officinarum valde aemula, nisi quod latiora, & parte proni, sicut pediculi, lanuginofi & alba 5 fipina verb. atro virore splendenti acernuntur: ficcata autem eo, quae yirebant, latere, fiunt nigerrima, instar atramenti scriptorii; inde mira admodum, nee alia apparent, quam si ex corio Hispanico confecta essent. ' Per unius[^] cuiusque Folii longitudinem grandes ac a tergo magis conspicu« transeunt costae quinque; quarum maxima, medium folii transcurrens, recta j. rdi quae autem omnes arcuum modo inflexae j inter quas venae minores[^] eclra[^] veluti parallelae, per latitudinem nonnihil infum tendentes, & ex his fibrae oblique innumerabiles partim per latitudinem,

nem, maximè verb per longitudinem, pulcherri-
mo fpe&aculo discurfitantes, apparent. Ex ra-
mulomm apicibus, Racemus fuam petit origi-
nem, pulcher, palmaris aut dimidib major, ex pe-
diculo, internodiis femuncialibus diftin&o, & C
ramulis direftè fibi oppofitis, confectus; cujus
ramuli praeferim inferiores, in minores iterum
divifi, qui, ut& reliqui, plurimis utrinqj Granu-
lis orbiculatis, à Lunarian racemofe non abhor-
rentibus, aliquantulum modò majoribus, nee
viridibus, fed ex albo ad ferrugineum non nihil
tendentibus, onufti. Hic Racemus, quoniam
planè lanuginofus, aequè ac arboris ramusculij Cum
prona foliorum parte, ad tactum tam mollis eft,
quàm optimus ex Britannia pannus. . An verb
Flores & Fructus ex Botri granulis prodeant, aut
an ita faltem permaneant, ac Semen pulvereum
more Lurxarise proferant, enucleare haud potui,
quotquot etiam illorum difsecui 5c exanimavi.
Curiplbrum fit judicium, in quantum haec Arbor
cum *kShfuha* Brafilianorum conveniat. Nam
propter foliorum fimilitudinem perle adducor, ut
eandem effe credam, nifi botri parerent dubium.
Quoniam in Iconibus ramus nofter debitam fo-
liorum magnitudinem non exhibet, maximum il-
lorum ad vivum cxpreffim ex abundanti hic ad-
jeci. A, candidam, lanuginofam, pronamque
partem: B, fupinam, viridem, laevem indicat.

ARBOR RACEMOSA

BRASILIANA, FOLIIS

APOCYNII.

Cap. III.

NEquē haec Arborum Brasilianarum est vilissima, à Marcgravio quiderh in Hiftoria Plantarum Libro III. Capite XVIII. p. 13 +. absque nomine defcripta, & Icone minùs aptè delineata j qua? errore Typographico in Hiftoriam Naturalem India? Occidentalis præcellentissimam, Domini Do&oris Pifonis Lib. IV. Cap. XXII. p. 158. pro Caffia *Tapyracoaynana* Brasilianorum, cum additis ejusdem filiquis, irrcpfit. Qui error, etiam alios errores progeneravit5 ut ex Jonftoni Dendrographiâ Tabulâ CII. 6c *Erafmi Francifci Ofounb & cfU §nttf<btt2itfoUnb* (St(U& <&Mten I Tabula XXV. numero 2. ubi nimirum pro Caffiâ Brasilianâ reprsefentata, fatis superque elucet. Hinc ad obftruendam pluribus erroribus viam, hanc Arborem innominatam Marcgravii, non nihil fii fiius defcribendam, depingendamque veriùs, sub nomine Arboris racemosiæ Brasiliana5, foliis Apocyni, non incommodum judicavi.

Arbor namque est Pruni altitudinem assequens, Ramis peramoenis umbram jucundâ ipargentibus; fed quodammodo deorsum inflexis. Quibus Folia geminainacutum termihantia, di* rectè fibi invicem opposita, brevibus pediculis appendentj magnitudine & figurâ Apocyni fucundi

cundi jClufii, duriora & rigidiora, fuperiùs lx~
via & hilari virore micantia, inferiùs propter den-
fbs 8c fiibtiliffimos pilos molliufculainftar ferici,
atque ex cinereo argenteoq; colore Iplendentia;
nervo conlpicuo per longitudinem & compluri-
bus venis in latitudine pr^dita. Ramorum Fafti-
gia, inter folia, Flores, in peculiari pediculo triuri-
ciali, brevisfimis petiolis, more Berberis, nume-
rofbs & denfbs dependentes, racematim fufiti-
nent, è quaternis vel quinifoliolis flavis conge-
ftos 5 multis in umbilici ambitu ftaminulis palli-
dis & fiibtilibus praeditos. Quos Baccae tandem
excipiunt rotunda?, Ribefii magnitudine 5 led lu-
tei coloris, quantum ex ficcis obfervare licuit.
Matches eft alba & lenta, falicis ligno (Imilis:
Cortex cinereus.

FRUTEX INDICUS

BACCIFER, VITIS ID^E^

SECUNDA CLUSII FOLIIS.

Cap. IV.

NAicitur in India Orientali, ubi ab Indige-
nis (ut audivi) *Caju manis* appellatur.


Frutex videtur arboreus, pluribus tenui-
bus ramis diffufiis. De quo à Patruale meo Jo-
hanne Breynio, Mercatore Amftelodamenfi, Ra-
mos duos non inelegantes feſquipedales, foliis,
floribus, frudibusque onuftos, confecutus ſum.
Quilignei, teretes, tenues Sclxves, utrinque ra-
mulis inaequali ortu^plùs palmaribus, inftar Fili-
cis

ICONES CENTURIA PRIMA, 3
ARBOR RACEMOSA BRA-
SILIANA. FOLIIS APO-
CYN.



A 3


FOL. III



FRUT. X INDICIA BACCI FER.,
VITIS IDEÆ SECUNDÆ C.

ICONES CENTURIA PRIMA. 5

FRUTEX JETHIOPICUS
BACCIFER, FOLIIS MYR-
TILLI.



Myrsine africana Lin

B

cis plani alati. In quibus pariter, alternatim, tàm planâ dispositione., ab imo usque ad summum Foli-
 amulta, rotunda, Vitis Idææ fecundæ Clusii æ-
 mula, folidiora, præ parte albida, fupinâ viridia,
 se fiunt. Ex foliorum fingulorum fede, vel Flo-
 iculus exiguus, muscosus, Castiæ Monspeliensi-
 um non abfimilis; vel Bacca jam eminet rotun-
 da, nigricans, Piperis magnitudinc, pythmine
 parvo, fex Granulis triangularibus referta.?

Quoriam superius nominis Indici *Caju matiis*
 mentionem fecimus, illud breviter monendum
 duxi, quod *Cayu manis* teste Daper in Afiagraphia 5
 vel *Cats manis*, ut Garzias apud Clusium yult, lin-
 guâ Malajâ, dulce lignum fonet, & ab iisdem Ma-
 lajis Cinnamomo nuperorum tribuatur. De quo
 conlulatur Garzias ab Horto Libro primo, Capi-
 te XV.

FRUTEX iETHIOPI- CUS BACCIFER, FO- LIIS MYRTILLI.

Cap. V.

Solitudo incola non procùl à Promonto-
 rio Bonaj Spei, ubi duæ se species producit: quæ
 baccas nigras, ayibus maximè expetitas, gere-
 re dicuntur Frutices.

Prior, cujus iconem illustramus, lignum ha-
 bens durum & album, cortice è gryfco rufesce-
 te obduhim, in multos dispescitur ramos, & hi
 in plurimos densè conftipatos ramulos quos
 B nulla

io JACOBI BREYNIi PLANTAR.

nullâ ferie digesta, fed confusâ Folia, bre vibus pediculis infidentia, per ambitum leniter ferrata, viridia; siipernè splendentia, infernè nequaquâ, Vitis Idæae angulofae Johannis Bauhini, five Myrtilli Matthiolo foliis paria, nifi quòd crasfiora & folidiora, ambiunt.

Alterâ priore in eo potissimùm differt, quòd denfioribus ramis, ac minoribus, angustioribus & oblongioribus foliolis praeditus est.

THYMELIÆ ÆTHIOPI- CA PASSERINE FOLIIS, ET ARBOR CAMPHORIFE- RA JAPONICA.

Cap. VI.

ET hie Promontorii Bonae Spei Frutex: de
quo Ramus dodrantalis (cum Fruticum bacciferorum Athiopicorū ramis) ILLUSTRIS-
SIMO DOMINO a'BE VERNINGK ex Africa allatus. Istenuis, in ramulos duos alios ductus; quorum finguli rursiis, in virgulas tres aut quatuor rectas, dividuntur: Lignum hujus niveum, cortice obductum rubicundo, qui in candidissimam lanuginem fericeam, corticis instar Sanamundx Clusii, discerpi potest j aequè ac Folia vix femuncialia, arigusta, crasfiuscula atque acuminata, Paflerinas quodammodo asmula, gustu initib paulisper adstringente 5 fed aliquantū manfa mucilaginem abunde reddentia. His Foliolis ttd extremitatem usque, densè & undique stipatae
funt

EXOTICAR. CENTURIA I. n

flint virgulae, ubi tandem circinato congefb, acuminibus furfumtendentibus, illas concludunt, & ex centro fuo furculos duos aut tres perbreves; te-
nuesque mittunt) quorum finguli pariter fiipe-
riore parte, minutioribus quibusdam foliolis, co-
ronati: è foliorum medio, Floſculi tres aut qua-
tuor pallidi, in lacinias quatuor per extremum
diſſe&i, Thymelaeae fimiles emergunt, in imâ par-
te, velut album tomentofum, calyculum often-
dentes.

ARBOR CAMPHORIFERA JAPONICA.

QUamvis hoc caput Thymelaeae Athiopicse
fit dicatum,* attamen in eodem Arboris
camphoriferae japonicas (licet minimè hujus
fit loci) inferemus mentionem 5 quoniam Arbo-
ris hujus ramo mihi tradito, cùm, bonâ primas
Centuriaeparte typis jã expreſſâ, hoc caput recu-
dendum eſſet, commodior occaſio non dabatur.

Arbor verb haec, exuberantecopiâ, in *Satſu-
nîa* Japoniae Provinciâ, Tiliarum noſtrarum inſtar,
ſpecioſâ proceritate, adoleſcit: materie firmâ,
põdeſcâ, ex rufo ſubſuſcâ, multis ſuſcis ſegmen-
tis, ligni inſtar Juglandis fermè ſcarificata 5 ſaporis
amariuſculi & aromatici, odoris vehementioris,
neſcioquid ad Juniperi lignum vergentis; quae
non ſolùm ciſtis aliisque machinis, ſed exſtrueh-
dis etiam Palatiis, in illo Regno inſervit. De hac
*Arbore, Ramu Excellentuſimus Tomims Do Bor Wil-
helmm ten TZJyyne cZ Magni Imperatoris japonia <z OA£edi-
cus, BotanicH5&-Chymicus Anno do. IDC. LXXIV.*

12 JACOBI BREYNII PLANTAR.

**RAMUS ARBORIS
CAMPHORIFERIE JA-
PONIC A.**



ex Japonia. transmifit,, qui fpithamae circiter longitudinis, tenuis, rotundus, laevis, extrinfecus nigricans, intus albidus, fapore aromatico, ad Camphorae accedente. Huic alternation inasquali ferie ieptena adnata funt Folia, femunciali & tenui pediculo ex fufco, fpadiceopraedita, Lauri Leoninenfis Batavorum, quaf formam 8c magnitudinem nondislimilia, nifi quod magis plerumque acuminata, inferiore parte albidiora, fubftantii tenuiore, cum Juglandis foliorum melius conveniente: per cujusvis folii medium fubrufus vel flavefcens nervus porrigitur j ex quo alterno ordine, nonnullae ejusdem quidem coloris, fed magis ad viridem tendentes venas confpicuas furfum in latitudinem fparguntur j inter quas venulae ruriis quaedam tenerae, latitudinem folii transeuntes, ea quodammodo (fi accurate obferves) formam, quaf linear transverfae in folio Arboris caneliferae, apparent. Hxc verb folia contrita, odorem ipirant aromaticum j quemadmodum etiam faporem calefacientem, attenuantem & ad Camphoras vergentem. Et tantum de Arbore camphoriferam Japonicam.

Nunc etiam paucis *Camphoram* ipfam animo luftrabimus, cui prasclaram eruditione ac doctrinam ornatam nonnulli, pro Bitumine habitae frigidam naturam tribuerunt j cum Reidna fit, calidaeque & ficcas qualitatibus ut clare ex fapore acri, odore maxime penetrante, fubftantiam oleaginofam, facili que flammae propter partes filphureas conceptione patet. Et quamvis multis in arte tibus, ut in oculorum inflammationibus, eryfipelate, aestu febrili, atque aliis refrigerantem potestatem obti-

neat; ficut ipfius etiam ufii, calor naturalis faepi-
 uſ disſipatur: attamen hoc non per ſe 5 fed per
 accidens fblum evenit 5 ac eò ferè modo, quo per
 ignis calorem, candelaèq; flammam, aduſti mem-
 bri inflammatio extrahitur; vel ut immoderato
 Piperis ufii, calor natus foràs pellitur, intusque
 debilitatur, eàque ratione corporis temperies in
 frigidam mutatur: cum tamen > eam ob cauſam,
 ignis non frigidum elementum; nee fervidum
 Piper, fruſ frigidus, cenſenda: nifi fblummo-
 do illud reſpicere velis, quod tandem per eadem
 effici poſſet 5 ficq; nix &: glacies non frigida, fed
 calida exiſtimanda; fi quidem creberrimà ipſorū
 traſtatione manus inflammari deprehenduntur.

Vires porrb *Camphor** perpendendo, omninb
 ftatuitur, eandem hominis naturam exficcare ac
 generationem humani generis prorsùs impedire
 poſſe: ubi obſervatu dignum, plurimos Cam-
 phoram quotidie purificantes, tamen foecundos
 & multà atq; copioſà. foecule felices exiſtere 5 nee
 fcio an multa in medium exempla adduci queant,
 Camphorae purificandae operam navantes con-
 queſtos, ſe propter traſtationem Camphorae in o-
 pere conjugali impedimentum atque remoram a-
 liquam ſenſiſſe. Et quanquam non negandum >
 quosdam dari, quorum vis naturae, Camphorà
 penitùs exſtinda, (veluti Piperis nimio ufii, calor
 naturalis diſſipatur, ficut jam ſiiprà didtū) tamē
 non neminem novi, qui contra Veneris irrita-
 menta hanc Refinà uſiis, queriſblitus, ſe multò
 magis eà ad talia opera incitatum. Verum natu-
 rae runt diverſae; neq; falcem ulterius in alienam
 meſlem immittere eſt animus, qui hanc materiam
 evol-

evolvendam atque pertra&andam Medicis, quibus data est à lege au&oritas, virium facere vegetabiliumpericulum, relinquo.

Originem verb *Camphor* à quod concernit, modumque illius conficiendi, hâc de re jam in *Xtifcellaneis* (*jermanorum Curiofs anni quarti actum estj* fed ut eb magis Ledoris benevoli voto fiat fati, ex re ceniûimus ipfaverba, ab *Excellentissimo Domino a^rnoldo Sy&> 'Profefs. <s5Medic. &%otan. Leidenfe* nobis communicata, hie loci iterare, quae hujus funttenoris: De *Camphora* mi-,, hi relata funt ab *aAmplisjimo Domino de *Buchil-» jonjqui* nomine Societatis perplurimos annos,, Praefeduram in Japoniâ gesfit. Teftatur nem-,, pè arbores quae Camphoram praebent, proce-,, ras effe, nostrarum Tiliarum inftar & non abfi-,, mili folio, & quamvis etiam alibi in Taponiâ,, nalcantur, copioiislitas tameninvemn in pro-,, vinciâ *Satfuma* dicta: Arborè autem ccesâ ra-,, dices effodi, minutim concidi & in lebetem,, aheneum cbnjici,tum aquam eâ quantitate fu-,, peraffundi, ut radices rnodicè obtegat: Lebe-,, ti autem imponi pileum vel operculum ftra-,, mineum,inacutumfastigiatum, moxqj ignem,, admoveri modicum, cujus ope partes radicis,, volatiles feparantur; adfeendunt, & dicto pi-,, leo cryftallomm inftar adhaerefunt, qui vicis-,, fim aufertur, mundatur, rurfusq; fuperimponi-,, tur, tantamqj didarum arborum effe copiam, ut,, omnem fuperet expeditionem. Accuratiùs 3, autem haec & fingulatim mihi fe narraturû Am-,, plisimus Virpromifit,cumplurimis aliis huic,, fcopo

i6 JACOB! BREYNII PLANTAR.

⁵⁵ f̄copo infervientibus, ut & hiftoriam *Camphor a de*
⁵⁵ *Borneo*, qua? toto coelo ab hac differt.

Hinc f̄atis f̄uperq; elucet, *Campboram* non Bi-
 tumen, f̄ed Refinam effe; non f̄blum è camphori-
 ferâ Japonicâ, f̄edex aliis quoq; arboribus prove-
niens, quod etiam à Domino Do Bore[^]M. Atthao Sla-
[^]bypoſtquam Obſervationem de Arbore campho-
 riferâ Collegio Curioſorum obtuli, indicatum in
Tra&atu, cujus Titulus; %eçberches&>Obſervations,
3\(\djurelles par <£Monſ: Boccone hiſce verbis : Ca-
⁵⁵ pnurade Borneo, quae melioris notae, & rarior
 „ eſt quàm Japonica, ea in Borneo Infida, ab Ar-
 « bore, ibi *Liono*, didſcâ, profertur, quae arbor mi-
 „ nor, graciliorque eſt Japonicâ (qu« interdum
 „ vaſtam Quercum aequat) ejusq; trunci diame-
 » ter, ſeſptem⁵ praeter propter, digitorum longitu-
 „ dinem obtinet; ipſa fungoſa eſt, medulla? fam-
⁵⁵ bucinon valdè abſimilis; truncus ficuti Arun-
⁵⁵ do variis nodis diſtinguitur, illamq; Arborem,
⁵⁵ qua? *Tyna*ſ dicitur, aemulatur. Huic *Liono* ar-
⁵⁵ boritunc temporis cum Caphura abundare, &
 „ quaſi turgere, ſ[^]z Graci eleganter dicunt, nò-
 „ runt (*Typotbetam hiẽ aliqũd omiſſe exiſtimo*) fub
^{5>} ortum f̄blis aurem applicant, & cnotatudignum
⁵⁵ ftrepitum percipiunt, deinde ipſam amputatam
 « in partes diſſecant, quas findunt, f̄blique, ut fic-
 ?5 centur, exponunt, ficcatas in particulas commi-
 „ nuunt, & Caphura? fruſtula eximunt, cribroq;
 „ à f̄brdibus purgant; flmajufcula fruſtula offen-
^{5>} derint, iis oculos leniter, & leviter confricare
^{5>} f̄blent. Ha?c autem Caphura plurimùm à Ja-
 „ ponicâ diſtat, pretioque illam nimium quan-
 tum ſuperat, magisque clara, & perfpicua eſt,

nee ullo modo, ut Japonica spontè evanescit,
& confiimitur.

Caeterum *Campborant* quoque praestantissimam
Arboris canelliferae Zeilanicas radices prae-
bent, quod prius mihi, quam ullam mentionem ejus
rei quisquam faceret, ante multos jam annos ab
Illustrissimis & Curiosis quibusdam Viris dete-
gitur, quemadmodum id clarius in *zZ\Excellaneis*
Curiosis anni quirti deductum est. Postmodum
T>ominus T>oBor Taulus Hermanns, ex Zeilan Infula,
ILLUSTRISSIMO ac GENEROSISSIMO
DOMINO à BEVERNINGK, & *Excelled*
tissimo Domino Profesori SyeM, Camphoram Corticis
radicum Arboris Cinnamomi per calcem subli-
matamj Camphoram crudam, seu Sal volatile
corticum radicum Arboris cinnamomi crudumj
Camphoram Corticis radicum Arboris cinna-
momi per se sublimatam; cum Oleo ex Corti-
cibus radicum Arboris Cinnamomi, & Aqua ex
foliis Cinnamomi, transmittit: Qua; cum & a in
Encomium indefessae fidelitatis *Excelkntissimi*
Domini DoSòm Hermani, ac in certiore confir-
mationem, quod nimirum Arbor canellifera
etiam Camphoram optimam offerat, hic memo-
rare placuit. Atque ita Benevolo Lectori juxta
promissum in *afAtifcellaneiiCuriosis*, plura de Ar-
bore Camphorifera ejusque Refina vel si mavis
Sale volatili exhibeo, boni consulat amicè ro-
gans, donec clariora experiar, quae itidem fi-
lento haud premere, sed lubens detegere an-
nitar.

i« JACOBI BREYNII PLANTAR.

SANAMUNDIÆ TERTIÆ
CLUSII AFFINIS FOLIIS
POLII, CAPITIS BONIÆ SPEL

Cap. VII.

SI fructus & Semen, nunquam mihi viva, concederentur Fruticem hunc lignosissimam, Rosmarini facie crescentem, nomine Sanamundae Athiopicae foliis Polii donarem: Cujus rami albâ lanugine circumdati; & Foliis viridibus, subtus autem candidis & lanuginosis, conferti, Polii Lavandulae folio *Cassipari* *Tsauhini* perbelle referentibus, quibus verò magnitudine, non autem crassitie cedant. Ex ramorum lateribus, nonnunquam aliquot > pedes circa illorum fastigia, Surculi multi, instar Chrysocomes Columnae in umbellam inordinatam dispositi, unciales & biunciales, foliis minutioribus donati enascuntur > quorum quilibet plerumque unum (raro duo) Pili magnitudine, circa basin parvis angustisq; foliolis cinctum, fertur Capitulum, ex duodecim, tredecim, vel pluribus, Sanamundae tertiae Clusii plane convenientibus tubulis, aut Flocculis, compositum qui extrinsecus plane albidus & tomentosi, in quatuor aut quinque foliola per extremum subtiliter divisi, atque inferius circa pedunculo squamulis nonnullis minutissimis, ferruginei coloris > praediti. Tenuis foliorum appendiculae, in iconem nimis rigidae sunt sculptae.

Hic in gratiam Rei Herbariae dediti Leoris, Sanamundae tertiae Clusii figuram apposui, ut

RAMUS SANAMUNDJE
TERIM CLUSII, ONU-
STUS FLOSCULIS.



ut illius flores eb meliùs cum Athiopicae noſtrae floribus, conferre queat: in eadem etiam intueri licebit ramufculũ Sanamundae primae Cluffii cum fruſibus, qui hunc fuſfruticem reſiùs Vermicularibus marinis, quàm Thymelacae ſpeciebus accenſendum indicant.


ARBOR KAUKI Iſi- DORUM-

Cap. VIII.

KAuki Indorum, ob florum fragrantiam, à Javanis, apud quos oritur, valdè æſtimatas Tiliae ferè ſpecioſà magnitudine & formà, Arbor eſt patula ramis difFuſa, cujus juniores ramuli, cortice laevi ex albido ac incano ſunt obduſi. Foliis ornatur Pyri foliorum faciei, ex circinato nempè oblongis ſeu ovalis figurac, trium ac interdum quatuor unciarum longitudine, latitudine duarum rarò triumve, nervum crasſum per longitudinem, & cvenas tranſverſas habentibus 5 at confiftentià duriore ac firmiore, brevioribusq; pediculis infidentibus. Ex foliorum alis & ramulorum apicibus, Floſculi oriuntur orbicularis ferè formae, parvi, piſi majoris magnitudine, duo, tres, quatuor, pluresve juxta ſè petiolis brevibus lanuginofis infidentes fimul poſiti: quorum quilibet, ex multis petalis anguſtis & parvis, è rubello albicantibus, congeſtus; & calyculo foliolis odo, acuminatis, lanuginofisq; alternatim poſitis, conſtruſto, penitiis ferè cir-

ICONES CENTURA PRIMA 6

THIMELJEA JETHIOPI-
CA PASSERINE
FOLIIS.



Thimeljea jethiopica Passerine
171.

ICONES CENTURIA PRIMA. a

**ARBOR KAUKI IN-
DORUM.**



rè circumvaJiatus. Viem *horum Aofculomm* formam, benigna iliā mater Natura è contrario, veluti gratiam foam in aliis declaratura, {vavisfimo odore compeniāvit. Hinc Infiilae Javae indigene hos fills, aut quorundam foliorum nervis₅ cum *zSMogori & Ttampaca* floribus trajectos, in Urbis Batavias foro venales exponunt. Aqua etiam ex iis odorata &c cordialis elicitur, ejusdem penè illis, cujus nobis rofarum ufus.

FRUTEX JETHIOPICUS CONIFER, FOLDS CNEORI, SALICI AMULUS.

Cap.- IX.

FRuticem Athiopicum arborefcntem, Capitis Bonae Spei inquilinum, hie propono. Is ramofus valdè, ligno duro, fiibalbido,* cortice è gryfèo rufefcente 5 Foliis frequentiffimis, crâsfis, duris 3 Cneori fimilibus j *qax* in furculis paulb minora, quò autem magis mperi- ora versus tendunt, eo majora latioraqj (quod a Caelatore aerario haud obfervatum) fpe6tantur, donee furculorum tandem faftigia coronando finiunt 5 inque fiio meditullio, pariter ac inter furculorum divaricationes, Globulum lanuginofum&penitu's niveum, Salicis capreae Tabernse- montani catulo fimilem, fed minorem, &ctuber- culis fubtiliffimis, ftrobuli inftar immaturi de Pinaftro exafferatum, continet: è quo fiiccre- fcente, Flofculi mufcofi, Salicis quodammodò
C 3 fimiles

fimiles, ftaminulis pallidis conftantes, erumpunt His deciduis Globus ille, in Conum fufcum, uncialem 8c majorem, fquamis in extremitate fua albidis&Ianuginofis^evadit.

Rcperitur quoq; Fruticis hujus coniferi fpecies major, Foliis majoribus, cujusFru&us in icone feorfim fculptus. De qua mihi Anno M. DC. LXIV. ramus ficcus a *Domino T>o3o-reHuykrto &c* Anno M. DC. LXX. alius a ©(?-*tnino Doftore a5\iatthao Slado* communicatus.

ILLUSTRISSIMUS etiam DOMINUS à BEVERNINGK antb tredecim annos ramo ex Africâ, mediam inter hunc &c ilium defcriptum faciem obtinente potitus: qui mihi, nifi varietas fiibfit ratione loci, Naturae lufus videtur.

CUPRESSOPINULUS CAPITIS BON^: SPEL

Cap. X.

CUpresfo-pinulum Arborem quandam voco Africanam, fempervirentem, & ut mihi relatum pumilam. De qua rami aliquot perejantes ILLUSTRISSIMO DOMINO à BEVERNINGK Anno M. DC. LXIIL ex Africâ misii, ob raritatem & peregrinam formâ, Botanicis omnibus, quibus vifi, curiosis, gratisfimi. Qui Virgac funt, pedales circiter, rotundx, pennae crasfitiem fcriptoria2 penè attingentes j ligno fubalbido 5 cortice rufefcente ex cinerco

ICONES CENTURA PBIMA. 9

FRUTEX JETHIOPICUS
CONIFER, FOLIIS CNEO-
RI₃ SALICI AMULUS.



nerco te&ae, foliolisque angustissimis, triangularibus ac mucronatis, Gupresfi in tarramulorum, squamatae. His verb Yirgis, ramuli undique, duas tresve uncias longi, graciles valdeque flexibiles adnati qui foliolis Ericas vulgaris perfirmitatibus, decussatim positis, dense vestiuntur. Quilibet ramulorum superiorum, Strobilo (modo uno, modo pluribus) exiguo orbiculari, lanuginoso & albo, juxta ramulum planiusculo foliolisque firmiter adherentibus subtilissimè scandulato, onustus forma & magnitudine Fragorum, squamulis autem innumeris, intus villosis ac argenteo nitore splendidibus, in anteriore parte foliolum viride monstrantibus, arctissimè compado: cujus squamulae, ut autumno, processu temporis dilatantur. Lignum & cortex rami mei saporem falsum (ex aquae marinae fortassis aspeffione) & nonnihil adstringentem sed foliola cum ramulis ingratum, subadstringentem, cum tantillo amarore praebent.

CHAMIELARIX > SIVE CHENOPODA MONO- MOTAPENSIS.

Cap. XI.

Alunt etiam juxta Bonac Spei Promontorium deferta Fruticem echinatum quendam, frequentissimis ramis undique pilosis divaricatum: qui per interstitia brevia, invicem ambiuntur, à viridibus, Laricis in modum in acervos

cervos congeſtis Foliolis, femunciam vix attingentibus, anguſtis, pilofis,, pallido anteriùs aculeo, & nervo per medium craſſo dotatis. Pert in ramis & ramulis, inter fructulorum divaricationes, Globum album, hirsutum valdè five villoſum, Ceraſi magnitudine, ex foliolis compluribus, iis, qui ramulos veſtiunt, multb hirsutioribus, & arcuum modo inflexis, contextum: in quo, inter foliola, flores flavi enaſci dicuntur.

Si fructus & ſemen cum Echino Alpini cõvenirent, Echini nomen huic inderetur Frutici, eò aptiùs, cùm folia & globi, forma Echini animalis, in orbem congeſti ſe præſentent.

FRUTEX CINERACEUS MUSCOSUS, CAPITIS BONA SPEL

Cap. XII.

FRutex arboreſcens hic, admodum rarus, & mirificè, quaſi cineribus conſperſus 5 lignum obtinet album: ramos frequentiffimos, rigidos & variè divaricates; cortice tomentolo, cinereo, penitùs circumtecl:os; minutisque tenuibus, brevibus, tomentofis ac cinereis, coacervatis, Foliolis miſcoſis, ornatos. Quæ in ramis rariora, majora, &c eà ferme forma, ut flores in Cannabis luteae ſterilis *Contareni* ftolonum fimmitatibus, ftellularum in modum; in ramulis verb denſiora, minora, magisque criſpula, penè inſtar Abrotoni faeminæ tbliolorum collocata funt.

ERI-

ICONES CENTURA PRIMA. 7

SANAMUNDiE TERTLE
CLUSII AFFINIS FOLIIS
POLII, CAPITIS BONA SPEL



ICONES CENTURI.& PRIM&. 10
CUPRESSOPINULUS
CAPITIS BON[^]: SPEI-



Pinus capitata L.

ICONES CENTURIE PRIMA. ii
CHENOPODA MONO
MOTAPENSIS-
*



Apalathu

ICONES CENTURA PRIMA. 12


FRUTEX CINERACE-
US MUSCOSUS, CAPI-
TIS BONI SPEL

*



ICONES CENTUEJA PRIMA. 13

ERICA CORIS FOLIO
HISPIDO, CERINTHOIDES
AFRICANA.



ERICA CORIS FOLIO HISPIDO, CERINTHOI- DES AFRICANA.

Cap. XIIL

EX Ericis quae juxta Promontorium Bonae Spei reperiuntur, quandam jam olim obtinui speciem, quas ob fingularem formam elegantiam, quam inter omnes sibi congenere eminet, Regina earum habenda. Quod ex icone etiam nostra, ad ramum pedalem exculptam, facile colligendum. Lignofus ille, durus, cortice exfubrufo gryfeo, & reticulatus: quern ex omni parte, temere & sine certo ordine, multa ambiunt Folia viridantia, crassa, nervo per longitudinem excurrente, Ericae baccifera* Matthioli magnitudine & forma congruentia, nisi in ambitu, pilis quibusdam rigidis, veluti spinulis, exasperata essent. Flores, Cerinthe floribus aemuli, in ramis apice, brevibus pediculis, deni & duodecim in orbem conferti, ex rubeo colore lepidè purpurascens, hirsiiti, filiformes, ventriosi, in quatuor lacinias parvas, ora divisa habentes 5 & ex totidem foliolis hirsutis acuminatisque, quasi ex calyculo provenientes, admodum magnificè se ostentant: in quorum alveolaamina quaedam, apicibus parvis praedita, cum stylo longiore occultantur.

ARBOR SILIQUOSA
BRASILIANA, SILIQUA HI-
 SPIDA FERRUGINEA CE-
 RATONIA FACIE.

Cap.. XIV.

Dolendum fanè, tot Clarissimorum Virorum labores, quos ingenti molestia & periculo, plantas in Regionibus exoticis conquirituri, suscepunt, iconibus plerumque nihil, aut parum utilibus & descriptionibus nimis inaequiculis, in lucem edi: cum exoticae, in priinis raro parabiles, ac segre nostro sub coelo vernantque plantas, diligentius, quam vulgares describendae, & iconibus accuratioribus lint illustrandae: quod tamen plerumque propter oleum ac operam quam requirunt, non sine gravissimis Botanicorum curiosorum querelis negligitur. Quod impulsus, exoticas quasdam, vel nimis breviter ab aliis jam descriptas, *vel male depictas > quae mihi operas pretio dignae videbantur, in hac Centuria, figuris perfectioribus, prolixioribusque descriptionibus donatas, reliquis prorsus novis intermiscere placuit: quemadmodum inter alias etiam ex hac Arbore siliquosa, siliquis Cera-toniaepatet.

Arbor hasc in Brasiliâ Sorbi facie nascitur, ramis plurimis laterorsum extensis, cortice cinereo, & potissimum circa fastigia instar Rhois subhirsuto vestitis: quibus Folia alternatim adnascuntur, uniuscujusque sesquipalmaris fere longitudinis,

ICONES CENTURIA PRIM A. i?

ARBOR SILIQUOSA

BRASIUANA.SILIQJLJA H!
SPIDA FERRUGINEA CE-
RATONIJL FACIE.



dinis, crasfa? 8chirfut#, dena plerumque ex adversb fita, per intervalla, inhaerentia: fingularia verb Folia, Sorbi quodammodb accedunt 5a quibus potissimùm discrepant, qubd latiora, nullo modo ferrata, Myrti Laureae effigie, fed paulb majbra, ac nervo rufefcente, & venis, fibris, pilisdj ferrugineis, tamiri fupinâ fplendidissimâ, quàm pronâ parte, dotata fint. Flores, brevissimos pedunculos, articulis duobus interceptos, habentes, inramorum extremitatibus, septem pluresve, quasi in fpica brevi coherent, ut credo tubulofl, & albi feu lutei coloris, in modum plerarumque *Ingarum* Brafilienfibus. Hi locum suum postmodii fpontè conceSunt Siliquis subfequentibus, quatuor aut quinque uncias longis, unam latis, compresfis, formâ Ceratoniae, anteritis adunco apice prominentibus, & fecundùm longitudinem ad utrumqj latus, veluti Pifarum filiquae, filo quodam circumdatis; quod invifibile interdum, ob pilos hirtos, ferrugineos, filiquam hanc elegantissimam, impensè itaveftientes, ut tacl:u&afpedu₃ velut ex materiâ holoferrica Batavis *Xt&P* appellata, confeda videatur. Interiora autem filiquae, & feminis formam, non ftm rimatus > quoniam unicam, propter venusta^tern mini maxime charam^confringere verebar.

* *Uxc Arbor Inga Opeapi iba* Brafilianorum, a Marcgravio in Hiftoriâ Plantarum, Libro tertio, pagina 112, figura minùs aptâ, & breviter frequentibus verbis repraesentatur. *Inga Opeapi iba* Brafilienfibus: Arbor est cortice cinereo, in „ multos ramos expansaj Folia fibi diredè op-„, posita habens, duos aut duos, & femis digitos „

3Q JACOBI BREYNII PLANTAR.

notabiles & pulchrac. Proximè frondium fedes, ex ramorū lateribus, furculi palmares prodeunt, bini vel terni, rarb autem folitarii, umbellam Flofculorum plusquàm viginti, ftagrantisfimorum, Primulas florum formac fimillimorum, fed dimidib minorum, in lacinias quinq; anguftiores definientium, fustinentes, coloris lutei, ac ferici inftar molliter fubhirsutorum: quilibet è caliculo dilute virefcente, ftriato, lanuginoso, extremis oris in quinque crenas divifo, petiolum teneaim habente, generatur; atque ftamina ex umbilico multa, crifpula, apicibus luteis onufta (quos fculptor non exprefcit) emittits quae caefariam Ipeftabilem, in inferiore parte luteam, in fuperiore verb ex rubro croceam conficiunt.
5> Floribus decidentibus quòd fit menfe Martio,
,3 (tefte Pifone) Siliquae fuccedunt dukes, tor-
,5 tuofa3 & deformes, primùm quidem virides,
,, mox maturitatem confecutae, fiunt nigrac 8c
,, putrefcunt.

Praeterea. dum Arborishujus naturā confideramus: (ciendum quòd folia ejus noduconniveant, & oriente fble iterum fe aperiant, meridie planè explicent, & hinc iterum paulatim in noftem fe componant, inftar *aArbvr̃is dormientu* à Theophrasto apud Libavium defcriptas: ita ut haec Arbor dormiens nuncupari poffit; nifi fortè quis objiciat, Arbores plurimas leguminofas ejusdem effe naturae, ac proinde idem vindicare fibi nomen poffe.

ICONES CENTURIA PRIM. 15

ARBOR SILIQXJOSA
BRASJLIANA. SILiauA TOR-
TUOSA PUTRESCENS, FB.A-
XINELLA FOLIIS.



IESCHYNOMENE SPINOSA PRIMA, SIVE LATIFOLIA BRASILIANA SILK QUIS RADIATIS.

Cap. XVI.


DE *Jeschynomene spinosa*, camporum Americas meridionalis, floribus abundantissimorum, fummo delicio, ac nostratium hortorum infigni miraculo, nullibi plura genera ac varietates, quam in fertilissimâ reperiuntur Brâfiliâj quarum quinque jam tantum; spinis horridissima, tasta breviter fextâ Africanâ, inferemus mentionem.

Jesibynomene Jpinofa prima, a nemine adhuc depidfa, ac raritate omnibus antecellens: Planta est fruticelcens, *Canles* ramosqj proferens pallidè virentes, quadrangulares, fragiles, medullâ niveâ refertos, & in angulis densissimè ipinarum vallò lutearū munitos. Hi alternatim per inter^ftitia uncialia longiorave, *Frondebw*, (asqub ac rami) quadrarigularibus, spinofisqj ornantur: qnx in extremitate fermè, in duas lemunciam vix attingentes expandun^ur suffragines, quarū fingulae, *foliolii* utriñq; duobus, averfa parte hirsutis, adversa verb glabris Sc̄laete viretibus prae- *
ditae, Senae haud mihoribus ^ nee dissimilibus; excepto, quòd altera eorum pars alteram longitudine&latitudine vincat,&interius fbliolum inferius, multb brevius ferhper be longè minus obfervetur: cujuslibet folii longitudinem, nervus

n JACOBI BREYNH PLANTAR.

vus erectus, fiiperiqji tamen latcri propiùs, quàm inferiori transit,coftas quasdam femilunaris figure, in inferiori latere,cum venulis parvis in utroque fondens. Inter frondium appendices, pilis rigidis exaſperatas,petiolus,vel iblitaris tantum (vel fubinde plures fimul jun&i) angulofus,tenuis,uncialis longitudinis,atqj ſpinulis multis praeditus exitj (*glòbulum* (uſtinens villofum, Acacias dimidiò minorem, ex innumeris tubulofis floſculis,ftaminula pallida emittentibus, purpurei coloris, & ſquamulis compluribus pallidiuſculis ſpinofis, qonfarcinatum. Quem *Siliqua* tandem fiibſeqvuntur membranaceae,novem,decem, immb & duodecim, iſt orbem, Glycyrrhizae Dioſcoridis inſtar, diſpositae,longitudine unciam ſuperantes, pallidi coloris , & pilis longiuſculis *hirix*, circumqj margines longioribus, veluti ſpinulis, radiatas: *hz* per intervalla* ſunt tumidim&ulas, depreſſae interſitiis, ac Securidacae inſtar geniculatae > de quibus, ſemine maturo, filum, utrumqj latus ſimbriae inſtar cingens, folvitur, & filiqua ipſa diſſilit, in capſulas quatuor aut quinque paralleogrammas, in ſingulis *Semen* unicum compreſſum, olivacei coloris, & figurae ovalis, Acacias quadruplò minus, continens, cujus utramqj ſt-perficiem area circularis pingit.

JEſchynomene haec i Marcgravio, nomine /«-
 ^«m"-oww^oBrafiliQnfibus, inHiſtorii Plantarum,
 LibroII.Capite V, pagina64. deſcripta? eſt *h-*
queri, aliis *Caeo*, five Herba caſta vel Mimofa
 prior, *ExcettentisfimiTifonis*, de Medicina Brafili-
 enſi




MIMOSA SPINOSA PRIMA.
S BRASILIANA LATIFOLIA
SILIQVIS RADIATIS.

enfi, LibroIV.Capite9<5. paginâ 117. quoad de
fcriptionem.

Caeterum, quòd hujus Plants ftondes &cfo-
liola concernit, tam admiratione dignae flint na-
turae, ut non folùm vefperi&no&u, Arboris de
more dormientis, led &c omnibus diei horis fe-
fe celerrimè reclinent compliceritque, non ali-
ter ac fl flaccefcerent, quando vel baculo, vel
manu leviter laltem tanguntun paulo poff: au-
tem in priftinam formam rurfus fe erigunt,
non fecus ac fi fenfu praedita eflent; unde &c
hx ejusque generis plantae, à nonnullis Herbas
fenfitiyae, quamvis contra Gvillelmi du Vd
calculum, appellantur. Causa autem mirificas
jam didae proprietatis, nonnullis adeb difficilis
fcrutatu vifa\ ut Philofophum etiam quendam
Malabaricum, dum nimis curiosè hujus plantae
naturam obfervare cupiebat, amentem eflè red-
ditum ferant; idem penè paffus, quod de cele-
berrimo Ariftotele perhibetur, qui cùm fluxum
& refluxum maris capere non potuit, fe ipfum
in mare praecepitavit, quò ab eo caperetur. A-
lii eandem nimis Jevem judicant, ficutiBbntius
diligentiffimus, illam cum Cucumeris Afinini
fru&uum.naturâ comparavitj qui maturitatem
adepti, levisfimo attaftu à petiolomagno irnpe-
tu ftrepituqj folvuntur, ac femine & aquâ con-
tentâ fe exorierant; fed illud profectò flatus,
quò repleti funt, conciliat 5 cùm alia fit JEfchy-
wGwewejjnerviSjfibris, valvulis, geniculis ac po-
ris hoc perficientis, conditio. Plura qui de JE~
fckynomenes frondium foliorumque motu fcire
defiderat, confulat JuiiiiCaefaris Scaligeride Sub-
tilitate

3+ JACOBI BREYNII PLANTAR.

tilitatc ad Cardanũ, Exercitationem CLXXXI, Distinctionem 28. Gvillelmi *du Fal* Philofbphiam Plantarum pag. 210, & fequentibus. Athanafii Kircheri, Mundum fiibterraneum, Libro XII, Scftione quarta, Capite V, pagina 418. Honorati Fabri de Plantis, Librum fecundum, Propofitione CLXXIX, p. 8\$. Roberti Hooke Micrographiam, Obfervatione XVIII, pagina 116. Marcelli Malpighii Anatomes Plantarũ Ideam, pagina 3 & 4 5 ac Henrici Regii Philofbphiam Naturalem, Libro 4, Capite XVII, pagina 390, 391, 392, cujus opinionem, Ledorem laborc evolutionis fiiblevaturi, ad verbupa fixb-junximus.



„ Hsec planta, dum viret, 8c in terrã fubfiftit,
 >, folia ad certain altitudinẽ ut in figura I, habet
 »ere<Sta&expañfã. Si verb quisquam ejus folia
 >, vel levi maniis conta&u attingat^mox^anquam
 „lẽnsũs motũsqj facultate prædita, folia fiia, ut
 „ in Fig. II, ad magnam humilitatem demittit.
 „Eaque, fiibdudã attingentis manu, paulatim
 „poſtea

postea spontaneo motu in priorem altitudinem, Fig. I, eriguntur.

Eaque omnia, per musculos five fibras, nervos, spiritus, valvas 8c poros, hac ratione fiunt: Primum, quia nervi interiores, 1.1, qui in superiores foliorum musculos vel fibras *aa* spectant, fiunt latiores, quam nervi exteriores 2.2, in inferiores foliorum musculos, vel fibras *bb* spectantes; idcirco spiritus five, halitus ex terra *c*, per nervos interiores i. i, ut, [^] pote latiores, copiosius in foliorum fibras superiores *a a* influentes, 8c propter fitum valvularum 3.3, sursum spectantium, in terrain redire nequeunt, dilatant illas secundum latitudinem, 8c abbreviant secundum longitudinem; eoque erigunt folia */*/, quibus **illas** flint infertse, ad illam altitudinem, quam articulatio vel flexibilitas, circa punctum _____ existens, permittit. Huc accedit, quod hac musculorum superiorum inflatione, & foliorum erectione, halitus, qui in inferioribus foliorum musculis five fibris *bb*, existunt, premantur & iique preffocogantur aperire valvas 8c poros 4.4, ex nervis angustioribus 2.2, in nervos latiores 1.1, spectantes 5 atque ita, cum aliis halitibus in latioribus nervis 1.1, existentibus, i. a superiores, foliorum musculos *a a* transire, eaque sursum, attollere; idque tantum magis, quia valvas inferiores circa 1 & 1 atque 2 8c 2 existentes, fitu sursum spectante halituum in terram *c* descensum impediunt. Spiritus verb, ex terra *c*, copiosius 6c fortius per nervos interiores 8c *, latiores 1.1, ascendentes, non patitur val-

3§ JACOBI BREYNII PLANTAR.

„vulas 5-5, ex nervis latioribus in angustiores
„fpe&antes aperiri, halitusque per eas ex latio-
„ribus nervis 1.1, in angustiores 2.2, transire.

„ Cùm autem superiores foliorū partes circa
„*/y, ex.gr. Fig. II, manu attinguntur, tūn spi-
„ritus, in superioribus illis foliorum partibus
«ex illo conta&uehementiūs agitati, tendunt,
„ per nervos interiores latioresque 1.1, deor-
„linn 5 eoq̃ aperiant valvas & poros, qu« fiint
„ circa 5.5, & ex latioribus ac interioribus ner-
„vis in exteriores angustioresque 2.2, fpedant>
„per easque, cum propter obstaculū fursum Ipe-
„ctantium valvularum 6.6, nequeant descende-
„re, ascendant 5 clauduntq̃; suo ascensu valvas
„ 4.4, ex angustioribus nervis in latiores fpedan-
„tesj atque ita necessarib transeunt in inferio-
„res foliorum musculos five fibras *bb*; easq̃jin-
„ilando, & fecundū longitudinem abbrevian-
„do, fledunt folia versū inferiora, quantum ar-
„ticulatio vel flexibilitas, quæ est circa pun&a
„adscripta patitur, in fitum ft. & figuram
„quam Fig. II. exhibet.

„ Postea verb cū folia ista ita, ut Fig. II.
„ostendit, sunt depreffa, & manus ab herbā
„est ablata, halitus per interiores latioresque
„nervos 1.1, valvasque fursum fpecliantes
»3.3, copiosius, quā per exteriores angustio-
„resque 2.2, ex terrā *c* in caulem ascendant?
„eoque claudunt primā valvas, quæ circa 5.5,
„existunt, atq̃ ex latioribus & interioribus ner-
„vis in exteriores 2.2, (peccant; progredien-
„tesq̃. porrb ulterius, traaseunt in superiores fo-
„liorum musculos *aa*, *cosque* inflando, attol-
lunt

- . luntnonnihil folia, quae erantdepreflWij **prc-**,
 muntque iftâ foliorum aliquantâ fublatione,,
 halitus copiofos in inferioribus foliorum mu-
 fculis *b.b*, exiftentes j iique preflî aperiunt in,,
 anguftioribus nervis 2.2, valvulas ex exteriori-
 ribus nervis in interiores fpe&antes 4.4, trans-
 euntque in nervos latiores & interiores 1.15 i-
 bique cûm propter vehementiam halituum ex,,
 terrâ c copiofiusin illosexhalantium,&valvu-
 las 5.5, in anguftiores nervos fpe&antes, clau-
 dentium, neque defcenderc, neque adlaterâ,,
 transire queant; à copiofioribus halitibus, in,,
 nervos illos interiores & latiores perpetuò a-
 fcendentibus,determinantur neceffariò in fupe-
 riores foliorum mufculos *a a*; quos,cum hali-
 tibus ex terrâ per latiores nervos afcendenti-
 bus,ingreflî, attoUunt folia, fecundumfupe-
 riores partes *a a* halitibus copiofioribus reple-
 ta, fecundum inferiores verb *bb* inanita,in il-
 lum fita, quern folia antea habuerunt,qualem-
 que figura I hie nobis oftendit. „

IESCHYNOMENE SPINO- SA SECUNDA, SIVE FO- LIOLIS ACACIA LATIO- RIBUS, SILIQUIS LON- GIS HIRSUTIS.


Cap. XVII.

SEcunda, Radice loi[^]i, crafsâ, tortuosâ, cxtûs
 è, fufco fubluteâ, intiis albâ, odoris **fortis** in-

· ftar Raporum, nititun ac ea ferme, c\fxkprima, facie excrefcit, quanquam major, ramisque pluribus, versùs humum magis inflexis: quibus *Frondes*, per distantias plerumq, laxiores, alternat-im etiam dispositae, adnascuntur 5 palmares, (esquipalmares, quadrangular, tenues atque spinosae > 'a medio usque ad extremum Suifraginibus qpatuor, sex vel o&o biuncialibus praeditae, *foliola* continentibus complurima, fiimmo ordine & pari semper numero, flbi dire&è opposita, laetè virelcentia, Acaciae Farnefianae latiora; quorum fingulorum medium, fed superiorem propius marginem, quàm inferiorem (de more omnium plantarum Afchynomene distarum) tener permeat nervulus, venulas teneriores, vix conspicuas, spargens.

Hae *Frondes* in modum jEfcbynomenes prim* > tam celeris subtilisque sunt iensiis, (si ita loquiconcesum) ut etiam levissimo tactu, tam lemetipfas, quàm earum suffragines, & suffraginum foliola, ocysimè ad spectatoris admirationem, immb Sc ad stuporem animi, ita contrahant complicitque, quàm vitâ &c fingulari abominatione illarum rerum, quibus attrahantur, praeditae. Ad miraculum hoc, contra6bione 5c expansione nervorum perficiendum 5 tam pediculus frondis, quàm ejusdem suffragines, in imo propè exortum, notabilibus 5 6cpedunculi foliorum vix conspicui, occultis geniculis, adeb concinnè & sapienter, à Naturâ sunt inftru&a^ut hoc ipso, ad artificiosissime rerum Magistræ industriam & subtilitatem incomprehensibilem, fiimmis laudibus evehendam exciteris.

Flofculi



MIMOSA SPINOSA SECUNDA.
 FOLIOLIS ACACIÆ LATIORIBUS, SILIQUIS LONGIS HIRSUTIS.


• *Floſculi* vel coloris incarnati, vel ex coeruleo purpurantes, pediculis tenuiſſimis hirtutis, è ramorum lateribus, inter appendiculas frondium prodeuntibus, innafcuntur numeroſi, in globulum iJLſchynomenes primas fimilem congeſti, folio unico tubuloſo, ftaminula pallida inſar floccorum gerente, conſtantes. Hos excipiunt *Siliqu** longae, hirtiſſe > quarum unicuique loculo, *Semen*, circulo in ungve (juxtà harum Plantarum, atque Acacias feminis naturalem teſferam) ductro, minus quàm ſpinoſe Afſchynomenes primae ineſt: nigerrimum 8c ſplenſcens. Quòd nitrata in aqua priùs rnaceratum, dein tempore verno terras commiſſum, 8c ſub pileo retentum vitreo, laetè quidem egerminat, ſed raro ultra pedalem aſſurgit altitudinem, floribusque admodum avarè autumnat, ad hyemem autem cura nunquam pervenit, quamvis perennis in Braſilià, ubi ejus uber proventus.

JEſchynomene vcrbjpinoſa noſkxn fecunda, eſk Caaeo feu Herba viva prima Marcgrayii in Hiſtoria Plantarum, Libro II, Capite XII, pagina/j. Quae *Caaéo five* Herbas Caffae ſpecies prima (quà deſcriptionem 8c iconem) Domini Piſonis, in Hiſtorià Naturali 8c Medicà Indiae Occidentals, Libro IV, Capite XLI, pagina^201, 202 \$ ac *lu** queri, aliis *Caaeo* ſpecies prior, quoad iconem, Sc pollerior, quà deſcriptionem, ejusdem Piſonis de Medicina Braſilienſi, Libro IV, Cap. XCVI. pagina 118.

JESCHYNOMENE SPINO
SA TERTIA, SIVE FOLIO-
LIS ACACIA ANGUSTIO-
RIBUS, SILIQUIS PAR-
VIS ECHINATIS.

Cap. XVIII.

IBi & *tertia*, validioribus spinis undique *hot-*
tens nascitur Frutex, Rofarum magnitudine;
ramis multis, rotundis, hirsutissimo cortice a-
trorubenti obduftis: quos *Fronde*s nullo ordi-
ne & tetnerè nascentes, fescunciam longae, te-
nues, hirsutxque ambiunt; fiibtùs adexortum,
duobus hamatisque fentibus armatae, & superiùs
in quovis latere, quatuor aut subindè quinque
fiif&aginibus, *foliola* obfcure virentia, Acaciae
angustiora habentibus, densè adeb in orbem a-
latse, ut flabellum è plumis confectum perminu-
tum, non malè exprimere videantur. *Cflòbur*
los fecundas fert minores, flosculis rigidibribus
& magis patulis congestos, ternos, fenos, vel
nonnunquam plures tñmul jundos: quibus *Silt'*
qua superveniunt, pilis rigidiis echinatae, tenu-
es, in tres distindae loculos 5 quorum flngulis,
ilngula *Semina* praxedentium paria, fed aliquan-
tò minora, colonis ex spadiceo fufci, iriclusi-
Horum non exiguam cbpiam a *Carolo Chyvri p.* #
Anno M. DC. LX. dono accepi: de quibus
quaedam eZMagnijico, ^obilisjimOjAmplufimok Dorni*
no "BE^fA^MI^ engdfctt Confuli ac Scholar*
cha htijus Vrbis meritisjimo, & Viro jane omnigena re*
runt



MIMOSA SPINOSA TERTIA
SIVE FORJOLI ACATLE, AN
GUSTIO KM. 5 ILKU1S EAR.
VIS ECHINATIS.

*urnfcienttd inftruBisJimo, Tàtrono meo Jtngulari, com-
miüiicavij quorum unum protulcrat plantam,«
quæ proprietatem fiiam mirabilem, non fine in
genti dele&atione 2s(ol?ilisjimi Cuhori* démon-
ûravit.*

Ethxc quidem est ilia *jE/cbynomene (qnx Caaeo*
feu *Herbae vivae tertia {pecies Marcgravii: ac /«-
f«er/,aUisC4<Wpofteriorfive fecunda(qua iconē)*
D. Pifonis, de Medicinâ Brafilienfi, Libro IV,
*Cap. XCVI, pag. 118 > atque in Hiftoriâ Natu-
rali & Medicâ Indias Occidentalis Libro IV,*
Cap. XLI, pag. 203.) cujus ego fœmen cui-
dam *Confingvineorum* meorum tradidi, è quo
*Planta pfogermavit j adquam audaculâ hilaris-
quæ, fed honefta puella deduxi:a,cùm ei figni-
ficaretur,iftam plantam tam miræ efle propieta-
tis^t fi deflorata, folia ejus leviter faltem Attin-
geret, eadem fè mox contraherent, ac fi planè
periisfent: dumque lepida ilia &fvavis adole-
fcentula, in animo cogitans, ifthaec per ludum
& jocum prolataj folia audaciter & intrepido
animo,dextrâ tetigit,verùm momento oculi e-
videnter cernens, ea fubitò moveri & con-
trahi, ita rubore fiifrufa eft, fudorque toto pas-
Cm vultu concidit,ut planè infeia eflet,quid re-
rum agendum, & penè in eas cogitationes deve-
niret, plantam illam fecretum & occultum fvavi-
ura detegere poffe: propemodum fermè ac In-
dus iUe, qui^//w (animalcula fiint Cuniculis fi-
nailia, fca muribus non majoras Nierembergio
teftc) aliquot numero aflatas, cum folio Arboris
Copeja cui numerus *Ftiarum* inferiptus, ad Hifpa-
num quendam deferebat, verùm conficiendo i-*

ter, five fame five gulâ impellente, tres ex iis devoraverat; quòd cùm ei Hifpanus exprobraret, indicaretque allatum folium fibi omnia patefeciffe atque indicâffe, illi reinon folùm fidem tribuit, veritatem fafliis 5 fed & alios Indos, quibus rem geftam narrabat, ab ifti Arbore, ut fibi caverent monuit. Unde apud iftos fama exorta, Arborem *Copejam* cum Hifpanis colloqui, eisque omnia & fingula Indorum fada prodere.

Inquâ perridiculâ Indorum fimplitate major tamen integritas tñi deſtiaque occurrit, qñ am in quodam hujus loci, cui eandem hiftoriam cum *zAmygidi JEthiopice*, (**Arboris campborifer* faponica*, *jEfcbynomenes prirna* & **jennî noBuo* lentUy* in alicujus gratiam ex mariufcriptis meis in calamum (*ci* tamen lege, ut i me fiõ creditam diu, donee Opulculum hocce meum in lucem prodiiflet, filentio involveret) diſtâſ fem' ille autem ame vix diſcedens, fe Do6torem furnum fore putavit y. fi commiffâ fibi de labore meo ebuccinaret, haud fecum reputans, Struthionis fe exornatum pennis, nihil minus quâni Struthionerti efTe, quin immò potiùs tanquam fbrex fiio indicio fc prbdidit, & aperuit fc non nifi alienâ vitulâ arare polfc.

JESCHYNOMENE SPINOSA QUARTA, SIVE FOLIOLIS

ACACIA ANGUSTIORIBUS,
FRONDIBUS VALIDISSI-
MAS SPINAS HABENTIBUS.

Cap. XLIX.

Quarta; Frutex itidem Brafilianus, spinis adhuc validioribus rufescentibus passim armatus, & altius, utpote in Oxyacanthae raagnitudinem excrefcens 5 cortice purpurante, lento, &c in ramis pilosb, tedus. Hujus *FrOndes*, feu *Folia*, Acacias instar flint ramosa, ac observatione profectb digna: illorum enim quodlibet₅ ex pediculo penè dodrantali, crasfo, lignoso, piloque abundanti hirsuto & rufescente confat, per intervalla femuncialia, ofto, decem aut duodecim paria Suffraginum, biuncialis longitudinis, flbi dire6tè opposita[^] habensj *qnxfoliolis* cotnpluribus utrinq? admodum exiguis₅ denfiùs quàm congeneres omnes mirabiliter adeb pennatae, ut tanquaminalis avicularum pennulae appareant: inter cujuslibet Suffraginum paris medium, ex petioli supinà & carinatà parte, aculeus longus & gracilis progeneraturj & in medià suffraginum distantia, utrinque ad petioli latus, crasfae, aduncas, Rosarum fimiles, validissimaeque spinæ; est modo, ut par iemper suffraginum, par spinarurq, & par spinarum, par suffraginum (in medio₃ ficuti didum, aculeum femper tenuem habentium) alternating ordine accu-

ratisfimo fē invicem excipiat. *Floſculos* fert {iii congenerum de more, in globuhim coagmentatos, fedmajorem; dein *Siliqv** hīfūtā ē floris centro^longiſſimae progerminare ,feruntur.

An *Arbor ſenſitiva*, de quā plurimūm Reverendus Dominus Carolus de %occhefort, in Hiſtoriā Naturali Infularum America; mentionem facit j iHos^uilBbmuma^ombre de T>ios usque *Tanama* peragrarunt, commemorasſe, integr^s ibi darifv̄lvas, *Arborem* diſtam *Senſitivam* fereites, quae taſta, magno cum ftrepitu folia &c rāmulos erigat, formam globi repraeſentantia>.


Cacterum an *Herba viva* alia fruticeſcens, Luſitanis *Siha d' aAgoa* did:a, Marcgravii? (q^{uae} *Caaéo* fecunda ſpecies, Luſitanis *Syha do Tray** vulgò dic:a Domini Doſt. Piſonis, in Hiſtoriā Naturali & Mcdicā Indiae Occidētalīs, Libro t V, Capite XL L paginā 202. quantūm ad deſcriptionem attinet) cujus *Siliquas* à Domino Carolo *Cbyvri* acceptas, in icone jEfcbynmenes *fpinofit fecund**9 propoſuiimus.

^SCHYNOMENE SPINQ SA aUINTA, SIVE FOLIOLIS ACACIA LATIORIBUS, FRON- DIBUS LONGISSIMOS ACU- LEOS HABENTIBUS.

Cap. XX.

Quinta, Viri integerrimi Dn. *Sevenbuyfme*,
Pharmacopolas Cclcberrimi. ac Botanici cxi-
mii

ICONES CENTURIA PRIMA, J₉
^SCHYNO MENE SPINO
SA IV, S. FOLIOLIS ACACI_YFI AN-
GUSTIORIBUS, FRONDIBUS VALI-
DISSIMAS SPINAS HABENTIBUS.



ICONES CENTURIA- PRIMA,. 20
iESCHYNOMENE SPINO
SA V, S. FOLIOUS ACACIyE LA-
TIORIBUS,FRONDIBUS ACULEOS
• LONGISSIMOS HABENTLBUS.



mii Hagae Comitum, in horto, jam multos ante annos, ex femine Americano, oblongiusculo, olivacei coloris, tam feliciter exstitit, ut intra annum, ternos in cubitos, in Arbutula pulchra adoleverit. Haec *caudicem* habebat ligneum, rotundum, digiti crassitie, & multis spinis deorsum flexis rigentem: ex quo ramuliconfuso ordine oriebantur spinosi; *Frondebim* inumbrati frequentissimis, *Alfchynomenes* quartae admodum semulantibus, nisi quod tenuiores, multo minus hirsutae, spinisque minoribus ac infirmioribus, aculeis contra altero tanto longioribus praediti effenti 6c suffragines eorum, quae laxius dispositae *foliolis* majoribus, *islfchynomenes* spinolae fecundae melius convenientibus, minus ar&e pennatae. Hae *Frondes*, asque ac antecedentis tatrae, ut & vesperi fine cotredatione, sed tardius paulo foliola complicantes, ita deorsum suffragines detorquebant, ficutin icone alterationis, perbellè demonstratj in qua tamen foliola male expansa, cum complicata vel clausa pida esse debuisfent: alias frons utraque, studiofissime caelata j in qua suffraginum etiam genicula accurate satis exprimuntur.

Huic addendum visum fuit, *fextum* adhuc *jEsfchynomenes Jpinose genus rarissimum*: de quo ramus circiter pedalis, Amstelodami, quendam apudpi6torem, mihi conlpedus: qui (nifime fallit animus) Parisiis in Horto Regip eundem fc collegiflè perhibebatj ubi ex ferifce liifilactZhfadagafcar delato, Arbutula haec rarissima fuit educata. Hic verb *ms*, qui innumeris, omniumque latisfimis, sed infirmis spinis, pallidi

✠§ JACOBI BREYNII PLANTAR.

coloris alatus erat 5 Afchynomenes {pinofie fecundae ferinè obtinebat *Frondeſ* > ſpinis aũte nul*
lis horrentes, nee foliolis dilute, fed obfeuriis
virentibus pennatas, quae, referente poſefebre,
hon minoris fuerunt motus, quàm Afchynome-
narum reliquarum frondes. An Arbutula fen-
ſitiva, in Horto Lutetian Regio viſi, magnique a>
ſtimata, Domini Caroli'a %^chefort ?

Præter genera *Mfchynomes ſupra enarrata*, qu#
ſua præ aliis omnibus plantis, ſingulari rarâque
qualitate & affedru, ingeniis excellentiſſimis, c-
gregias præbent ſpeculationes 5 plurima adhuc
dantur, partim ſpinis pungentia terribiliſſimis,
partim iis penitus carentia : quorum poſterio-
rum, tria præprimis Americana, cum ſtudlu A-
ſiatici in Horto noſtro ficco occurrunt^.

PRIMUM GENUS,

Jive

*Jefchynomene mitis prima, velpotius' Herb A Caſta Ame-
ricana , folio/is Acacia latioribus 9Jiliquis la-
tis compresſis major thus.*

CUbitalis ferme altitudinis eſt Planta, *ramis*
multis faturè viridibus 5 ad purpureum ali-
quando tendentibus: in quibusFroWejma-
gno numero, ejusdem penè formae, cujus Afehy-
nomenes ſpinofiefecundae ſpedantur 5 niſi quòd
tardioris ſint motus, ac aculeis omninb cjtreat,
earumq;- (uiſragines five pennas foliolis obfeurius
virentibus^purpureo quodamfiibinde variegatis
colore,cbmpouitae. Ex frondium ſedcpediculus
exfurgit feſquiunciarũ nudus^cujus cacumini/7/^
res infident tubuloſi, in ſpicâ, Pimpinellas inſtar,
globosâ

glbbosâcondenfâti: *his* evanidis apparent *Siliqua* novem,decem pluresye fimul jun6fca3,unciales, membranaceae, fufcas , compreffae, Geniftae haud multum abhorrentes, tot *in* utroque latere extrinfecus tuberculis praeditae, quot *femina* numerantur intrinfecus, quas nigra, form4& circulis Afchynomenes {pinofae fccvindas paria^.

An Herba lenitiva prima Infulae *Tabago*, Domini k 'R\$chefort!

Abundanter provenire dicitur in *Zarbados* & aliis Infulis Americanis, inde *Siliqua* & Scmina Anno M. DC. LXV. ^fmplisfimo Domino *forbanni Commelyn* allata, qui eadem mecum participavit.

SECUNDUM GENUS,

Jive

Jefchynomene mitis fecunda, vel potius Herba Co-
ft a Zeylanica ,feliquis latis com'
presfis minoribus.

HUjus *Siliqua* ab *ExceUentisfimoDommo Sye*
Fautore plurimâ obfervantia colendiſjtmô,mihi hu-
manisfimè, cum maximo animi mei prolu-
bio communicataeft, fequenti additâ relatione.

Transmitto *Siliquam jEJchynomenes ex Zeilan,,*
Infulâ filiquis parvis Domini Z). Hermans, àBrach-,,
menibus Ladfchini; Malajis verb Totta Vaddi»
di&a?, quas cum quinque aliis, uni adnata fue- ,,
rat petiolo 5 è quarum fcminibus, planta hdc ,,
anno eleganter nobispropullulavit, Mimofe,,
minoris haud abfimiis facie & motu, quae cû5>
inopinato unicae noctlis cafu exaruerit,nee fie-,,
cari, nee depingi potuit.

”
Siliqua

Siliqaa verb, qua ex fpadiceo fufca, nullis articulis intcrceptaj & JW?iquodafrervo, Hei> baeCaftaeprimae pcrquamfamilia lunt; nifi quòd non majora, quàm in icone Mimofae non fpino- (x Zeilanix tub numero 2. exprimuntur.

TERTIUM GENUS,

Jive

7JT>Schynomenemith Americana, foliolis Aacite^g
 / I' Jioribus Siliquis longis angustis, femine quadrat*
 gulari; cujus Semen k 'Dornino. Sevenbuyfen
 accepi: est Mimofa italica five Herba viva fpu-
 ria, Hyacinthi Ambrosini, in Phytologiae Par-
 tis prima?, Tomo primo, pagini 359 & 360. de-
 lineata-?.

QUARTUM GENUS,

Jive

jEfcbynmene mitis ^Americana 9 foliolis Aca-
 cia brevioribus.

A Rbufculae frarissima, in Corocao Infula
 XXnafccns, Frondibus Acaciae, in quibus folio U
 breviora, pedunculis longioribus quàm o-
 mnium Afchynomenes generum infidentia, cer-
 nuntur. ^/oWo/uberrimos, Afchynomenes i^i
 nofaetertiae fimillimos, foliulis verò majoribus,
 elegantioribus, paucioribusque compofitos ge-
 rit. *Siliquarum* figura nos latet.

ADDITAMENTUM-

A Ntequam verò huic capiti Colophonem im-
 Xxponam, non a deb inutile reor, hoc loco
 etiam piucis jEfcbynmenen Antiquorum tan-
 gere ^equaita Libro ^Hift. Plant. Cap. 3. scri-
 pisse

pfiflẽ videtur Theophrastus. 3\(*afcitur circa*,,
 <£A4*empbimpeccularis quxdam materia* (Gaza ver-⁵,
 tit: Gvilandinus autem quiddam: Ptinius ma-[„],
 lè arbor: Bodsetis à Stapel optimè Frutex vel,[„],
 Herba) *non folds, vel rarnis, vel tot à formâ peculiare*»
quid fortita, fed eventu. Quippe faciesejusfpinofa: Foli-[„],
um Filid fimile. {•nrl^m: ita & Gaza. Plin. legit [„],
*tsTZfji?*₃ id eft, pennis.) *Sed qvum ramulos quis-*[„],
quam contigerit, folia veljAti are/centia&-/angvefeentia
contrahi ajunt, (vulgata ex. habent oXp<tj\tvóp£i/cc;,,
Gaz. legit !7raj>3Ai>vo/^va: nam hebetata cõvertit,[„],
 duro fenfu. Leg. & pavo «i/< fieva. cum Scaligero oba-[„],
 refacla) *deinde paulò poft ad vitdm redire &• vivere.*[„],
 Et Plinius, qui Libro XIII, Capite 10. halliicina-
 tus eft, dum úXij^a Theophrasti, cum aliâ qua-
 dam arbore, ab eodem Autore, poft vfa\ fJA memo-
 ratam ftatim defcripta, confunditj Afchyno-
 menes etiam Libro XXIV> Cap. 17, brevibus
 hifce verbis. injecit mentionem: *aJfdjecit his*³⁹
(tApollodorus asfeBator ejw herbam jEfchynomenen, quq-
niam appropinquante ntanu folia contraheret.*

Aft Theophrastj Tlantam fpinofam Filicis folio, ab
 jEfchynomene Tlinii feparare nonnulli voluntj cum
 contrahi non fcribit folia Theophrastus, (fi Ga-
 zam fequatur) led exficcati aut hebetata conci-
 dere. Si autem contentam in Johanne Bauhino
 verfionem, à nobis allegatam, quin & faibendi
 genus, quo natura Mimofae à multis exprimitur,
 trutinaveris 5 haud difficulter conjicies, aliter⁵
 guàm leguntur, intelligenda Gaza? verba. Nos
 igitur Tlinii RJchynomnen, ac Tlantam Filicis
 folio Théophrastj, tarn diu unam & eandem cre-
 demus,

demus, donec Apollo aliquis, differentiam earum dilucidè nobis ostenderit.

Jam verb quaziritur, qualenam *Jefchynomene Fetemm* genus fit plants? hoc perdifficile declaratu, propter brevisfimam Antiquorum descriptionem. Ex quâ tamen colligere tantum licet, Plantam esse, cujus facies ipinofa, foliumque filicibus non abfimile, quae, si quisquam ramulos eorum contigerit, veluti arefcencia & langvefcencia se contrahant. Quâ cum nulla plantarum, mihi cognitarum, convenire melius videtur, quàm *Caeo* Brafilianorum: cujus genera plurima fpeciesque fpinofas; ac foliis pennatis Filici fimilibus, appropinquante (*\$ Tlinii verbis utamur*) **mma fe contrahentibus**, dotatae flint: quapropter etiam *jefcbynomenen* in* digitare decrevimus. Haec leguminofa est Planta, Flolculis tubulofis 5 Siliquis articulatis, (& fi eidem Herbam Caftamnoftram annumerare velis, etiam non articulatis) Semina in utroque latere ovali. circulo Acacias de more infignita, contineritibus. Dequâ Arbores, Frutices & Herbal reperiuntur, eaque fenfibiliter valdè, vel obtusè, immb Sc fenfii (loquor metaphoricè) penitus carentes. Hinc à quibusdam varia fortiturnomina, &c pro diverfis habetur plantis: cùm tamen propter qualitatem & affe<5tum, à fuo averruncanda genere, târn minùs; quàm pruna fylveftria conttipantia, à prunis domefticis laxantibus, quae illorum clafsi accenfenda. Cui verb distingvere Afchynomenen in diverfa leguminiim genera arridet j disjungat illud cum filiquis articulatis, à non articulatis; hocqj *Herbam*

bam Caftamvocct^d differentiam alterius cui no-
men *JEfchynomenes* tribuimus, ficque non^adeo mi-
hi reprehendendus videbitur.

Tantum dē *JEfckynomenēAntiquorum*, oē nōltra,
nomine aliās *Mimofae* decantatisfimā, quod etiam
illi usque eō indidi; donee liberalitate *Zh^ohilis-*
Jimi, Excellentisfimiq\ Domini Syen, I!los, cumio\io,
Siliquā &c Seminibus ad manus pervenēre meas,
Plantae alterius *Hedyfaro clypeato Herbariorum*
valdē affinis, cumque *Mimosā Acoftse* (exceptō
quōd non {pinofa) meliūs, quā *Afchynomenc*
convenientis. *Hujus Siliquae, Hedyfari clypea-*
ti non valdē flint difsimiles, ex fufco autem fpā-
diceae, minūs afperae, majoribusque diffl:incl:a5 ge-
niculis, infingulis Semen *Hedylari clypeati qua-*
druplō majus, 8c flavum cum tempore fpadice-
um₃ nulliscirculis (contra *Afchynomenes Semi-*
nis tefleram naturalem) notatum, concludens.
Quod quidem terrae mandavi, fed irritō conatu,
itā iit nihil ampliūs de plantā hāc rariffimā in me-
dium proferre poffim; nifi fingulari favore,
fchema cum fequenti defcriptione accuratiffi-
mā, *Laudātisjimus Domtnus Syen* nobis transmiſſet,
cui hoc nomine, Botanico dediti ftudio, condi-
gnas debent gratias.

MIMOSA NON SPINOSA MA-
FOR ZEYLANQA DOMINO
HERMANS, EXCELLENTIS-
SIMI DOMINIO SYEN

R Adice firmatur rotunda, &c fiibrūfa, quae pau-
16 infra terras fuperciem, in tres qua-
tuorve partes finditur, 5c rurfus poſtquam pro-
fundius

52 JACOBI BREYNII PLANTAR.

MIMOSA NON SPINOSA
SA MAJOR ZEYLANICA
DOMINO HERMANS, EXCEL-
LENTISSIMI DOMINI SYEN.



fundius delituerit, in plures subdividitur, paulatimque in capillamentum coloris albicantis de-
 finit. Huic innititur *caulis* rotundus, concavus, mollis & tener, coloris dilute viridis, cui alterno ordine adnascuntur *Folia* longa, ex plurimis aliis minoribus lateralibus nervo medio intercurrente, conflata, pari modo ut in aliis Mimosis liquet, nisi quod folium hocce angustius, ac non ramosum, & tota planta praeterea dilutius colorem obtineat, sensuque obtusius fit praedita. Juxta foliorum exortum *Flores* enascuntur papilaceae, nunc singulares, nunc bim-, tertiae, pediculis brevioribus inhaerentes, figura (quantum ex hac planta colligere datum) ad Genistae flores propemodum accedentes, colorisque lutei vel aurei, labello autem inferiori, hirsuto. Hisce succedunt *Siliqua* angustae, compressae & articulate, trium unciarum ut plurimum longitudine, quinque vel sex semina, suis internodiis distincta continentes, quorum numerum externe facile quis distinguat, cum non solum foras promineant, sed & in locis ubi, conspiciuntur femina, filiqua plane fit aspera & scabrosa, articulationibus praeterea, quae eas distinguunt, tam teneris, ut, si leviter tantummodo traentur, facili negotio à se invicem separantur: filiquae extremitati insuper appendicula quaedam ut plurimum adhaeret capillacea. ^Wipsum *Lentis* ferme est magnitudine, coloris ex griseo, vel subfusco flavescens, & exacte renis figuram exhibens, pari modo, ut, in Sparti monospermo altero Bauh. Pin. videre licet. A. 1675. & 1676. feminae atque iterum,

5+ JACOBI BREYNII PLANTAR.

„ femine nobis in horto Academico Lugduno Ba-
 „ tavo, & Praedio nostro fiiburbano, fuit enata :
 „ Verum, cum admodum fit tenera, & non foliis
 „ intensum calorem, • fed & folum apprimè humi-
 „ dum amet, nunquam ulterius quàm ad pedalem
 „ vel paulò majorem excrevit altitudinem: con-
 „ trectata autem folia tàm fegniter contrahebat,
 „ ut vix illud animadverti poffet >.

*Semen ipfum ex Ceylon, infula tOtius Orbis lau-
 „ datiffimà, ad nos transmiferat Eruditiffim' &
 „ Diligentiffimus 'Botanicus Dominus Taulus Herman r>
 „ Societatis Indiae ^Sedlcm Ordinarius> additâ ft-
 „ quenti infcriptione; An jEfchynomene Afollodorl ?
 „ Herba<i5\£imofa Zeylanca major, Dyabibala Cinga~
 „ lenfium, id eft, Tamarindus aquatica 5 *Dya enim
 „ aquam denotat, in qua nafci amat, & Hiemba U
 33 Tamarindum, cum quâ folia fermè habet com-
 33 rnunia-**.

Quibus hiftoriamc5W/w^? nonfpinofe, feu Se*
curidaca clypeata (quod nomen, Hedýfaro clypea-
 to genuinum nomen nondum habenti, ad aliud
 usq; tempus retinemus)/ore/«^o, *Lentis folia Zei-*
lanic^y Siliqua non nihil, fed floribus, foliis 8c Se-
 minibus longè ab ^Sfchynomene discrepantis,
 fimiliter concludimus.

Supereft ut *Herbam Fivam*, & quidem hac vice
 leviter, veluti extremi digiti apice tantum attin-
 gamus. Hanc juxta delineationem Acoftae, Fo-
 liis convenire cum Mimofae non fpinofae Zeilani-
 cae apparet; fi verb exanimentur Flores (de fru-
 dibus enim & femine nihil liquet) tàm à Mimo-
 sâ, quàm Afchynomene longè eft diverfa, ac
 planta fortè Heteroclita habenda.

Et

Ethoc, quantum mihi de JEJibynomene, *Mi-
>wfa> Herba Caſſia, atq; Fi*ua* conſtat: quā de matcriā
clariora fortè Vo&.cn̄ztik[˘] Domino[˘] DoU ore Hermans,
nunc apud Indos degente, atq; commodiori,
quā nos, occaſione Plantas perquirendi exoti-
cas utente, exſpe&anda-?.

^ *EXTLICATIO* TAZVLJE,
in quazSMimofa nonSpinofaZeylanica exprimitur.

1. Mimofam non ſpinofam Zeylanicam,
2. Siliquam Herbce Caſſiae Zeylanicse,
3. Semen Herbal Caſſiae Zeilanicae, indicat.

ET* *qvomam placuit in Tabula 2?, Siliqvas rart ores
Eqvasdarn reprafentdre: brevher easdern etiamhtc de-
fcribendas duximus..*

NVmero IF. diligenter cxprimere curavi-
mus, *Siliqvam Fruticis, foliis Acacia, aStife-
Jbpotarnici*, a Colum̄na, in Rerum Medi-
carum Novas Hiipanise Annotationibus, de-
ſcripti. Quae à Jonanne Pon̄a, in Deſcriptione
Montis Baldi, editionis Italics, pagina 36, 110-
triineCaroba 0 Siliqva, diGvineapurgativa,ptoponitm.
Hanc Siliquam ab ^Amplisfimo, ^obilis/tmo T>omi-
no/Domino ſheodoro Cjolio f. F. 2). Chitatis Lugdmii in
*B&Uvi& Conjulari9&- qvondam Pratorc; nunc verbcjus-
dem nomine ad Collegium Archithalasfecum, qvod Amjlelo-
dami eſt, Delegate y nomine Siliqva ^Qbathaa ex
Per/ia allate, una cum ihgenti farragine ra-
norum, tamadRegnum Vcgetabilium, ac Ani-
malium, quā Mineralium pertinentium Rerum
Naturalium, accepimus.


REPRÆ-

56 JACOBI BREYNII PLANTAR.

REPRÆSENTATIO PLANTÆ ET FRUCTUS

ea in eadem 'Tahdla ZhQmero F.

Silltfuam fzArbom (jvatapana ex *Coracaoln/ula*, cum
Ceratonian^a & Acaciae Parncfianx affinitatem



quādam habentem. Haec Pifi fine cortice duriore infar intorta, compreflā, ac unā parte carinata, alterā convexa eftj corticibus duobus confans, quos inter fiibftantia quaedam filamentofā, & cinerea continetur: Cortex primus five exterior, membranaceus atqjèufcō eft fpadiceus; alter five interior, vel qui mediam Siliquae longitudinem transit, eandemq; ceu paries intergerinus induas partes lēparat, albicans, validior, ar&eq; adeb concretus, ut cavernulas quaedam exiguae, iis tantū in locis (Ceratis ritu) obferventur, ubi *Semen* Ceratise quadantenus accedens, fed multo minus continetur.

CASSIÆ ET HE^JE CZJSTJE,
medius Indite Orientalis Frut ex,

DElineatur *Utymero FI> Siliqua*, Frutici (ut audivimus) venustissimo, floribus Casfise₃ neqj disparibus, fed minoribus foliis exornato, innascens. Quae Anno M. DC. LXVI. ex *Ambon* Indiae Orientalis Infula, fagacissimo ftirpium Inveftigatori Domino *Sevenhuyfen*, nomine *Campang cuning* allata, ejusdem liberalitate in Miifeo nostro aservatur. Ea quā expreflā eft magnitudine; fubftantiā membranaccā vel potiùs papyraceā, èfpadiceo vel ex purpureo obfoletorūfici coloris, planavalde ac comprefTa, ifthfnis quibusdam, multisqj venulis. quafi articulis interceptaj ac intrinfecūs per membranulas in plurimis diftindlra concamerationibus, in fingulis *Semen* Siliginis magnitudine continens oblongum₃ compreflum, è fpadiceo fiifcum, fplendens, circulo in ungve du6to, veluti Afchynome-

5? JACOBI BREYNII PLANTAR.

nes 5c Acacia notatum. Horum quoqj. nonnulla antè annos circiter tres[^] ab *Excellentissimo 'Domino* (tArnoldo Sy&, DoBore &- Trofejfore [^]VLjedicina ac 'Botanices Lugduni [^]Batavorum ₉ longe 'Celeberrimo, cujus ftudio indefeflb in re Botanicâ multum debetur, nomine *Acacia Jimilis ex Terfea*[^] impetramus; quæ autem olivacei erant coloris, nee fplendens.

[^]eprafentavimus tandem J[^]([^]wero[^]7/, Caulefn cum racemo *Filicis India, Ofmund* facie*, Bodaci à Stapel: quæ aculeis omriinò deftituta, 8c cum Plantâ Filicis folio Theophrasti minimè comparanda.?

CASSIA FISTULA BRASILIANA FLORE INCARNATO.

Cap. XXL

Cùm tertio in Capite indicaverim, quænam icon arboris, pro Caffias fistulæ Brafilianæ, multos apud Aucl:ores fit expreffa, meum eft, ut de ipsâ Cafsia nunc paucis etiam agam, S[^] genuinamipfius effigiem, quippe à nemine illuftratam, luci exponam.

Cassia verb *Eac TapyracoayMnaBttfilicnGbus*, infignis elegantia 8c magnitudine arbor₅ caudice reclro, laevi; ex cinereo albicante, rami[^] longè lateque luxuriantibus 5 quos *Folia* amcenissimaveftiunt cylindræa, multa unicofteæ do-drantali, brevisfimispedunculis directè fibi op* pofita, dilutè virefcentia*, lanuginofa, paula'
timque



CASSIA FISTULA

FLORE INCARNATO.

BRASILIANA

Isaac Saul Souley.

timqj femper furre&im ftantia, quorum cujusvis longitudinem fubrubicunda permeat cofta, &c latitudinē venulas complures, quae dire&è femper fibi imminentes, paribus interftitiis ita disponuntur, uffubrotundis inflexisqj extremitatibus, proximè folii marginem concinnâ ferie & ordine concurrant. *Flores* ex alarum fede originem ducentes, tenerisq; fuis Surculis penè fefquipalmaribus, velut in fpicam digefti, uncialibus, lanuginofis, teneris pedicellis appenfi, ex capitulis Capparum paribus prorumpunt, Cafias Alexandrinae longè minores, quinis etiam petalis, fed incarnati coloris, compofiti j horum umbilicum, ftamina o6to occupant, apicibus magnis praedita, & fursùm reflexa, quo* ruminferioratria, fuperiobus duplb longiora: inter quae Stylus confpicitur femilunaris, longus ac lanuginofus^a ficceffii temporis, in iſſi-foarn. talem tamqj grandem evadens, qualis 4 Lobelio & Excel! Domino Pifbne exprefTa, ac 4 Marcgravio in Hiftoriâ Plantarum, libro tertio, capite XVIII, pagina 135. ita defcripta. Poſt Flores feqvuntur Siliquae, immaturae quidem virides, maturae nigraefeu fufcae deorsùm, >ropendentes⁵ quſelibet circiter duos pedes,, longa, quinqj digitos craſTa, paulatim incurvata, ut enſis Polonicus. In uno ejus latere,, eminentia duplex eſt fecundùm longitudinem,, in altero fimpla, quad chorda agglutinataes,, fet fub cortice: Nee rotunda nee teres exa6tè eſt filiqua, fed concifa, nam transverſim incifio ellypfim defcribit. Cortex exteriorius eſt inſtar cortfcis exterioris arboris, interior

„rior lignofiiis & albus. Non poffunt hi cor-
 „>tices fimul frangi, fed malleoconcutidebent:
 „Siliqua porrb intùs transverfim multas habet
 „difindiones, quarum quadibet crasfitiem pen-
 „nae anferinae capit. In qualibet autem cellu-
 »lâ *nucleus* latet, magnitudine & figurâ amy-
 „gdala5, colonis ex albo flavescentis, fplendens,
 3> laevis, durus, per longitudinem lineâ fiibru-
 fâ in uno latere divifus, nûcleum continens
 7> album, corneae fubftantiae. Quaelibet praeter-
 „eacellula continet fubftantiam glabram, glu-
 „tinofâm, brunnam feu fubnigram inftar CafGac
 5,folutivae, fed amari iâporis & ingrati. Ad-
 „ftringendi vim habet. Hucusq; Marcgravius
 qualitaterrâ minùs aptè exprimens, quem ad-
 modum ex fequentibus Pilonis verbis videre
 „licet. Siliquae &c. ingrati & amari faporis,
 3,quae primb ante maturitatem cum aftridione
 „conjun6h eft. Ubi verb gradum ulteriorem
 „maturitatis acquifiverit, lax at alvum. EtLo-
 belius, Cafiae noftrae Brafilianae Siliquae delcri-
 ptionem, in Pharmaceutices Officinâ Rondele-
 tii, paginâ 41. primus exhibens, inquit:Hu-
 jus pulpa*, uncia una plùs purgat, quàm unciac
 duae alterius Caffiae Agyptiacæ. Quod etiam
 Cafparus Bauhinus in Pinace paginâ 403. anno-
 tavit. Ex quibus effulget, Cafiam hanc Arbo-
 ribus purgantibus annumerandam effe, & mini-
 mè non purgantibus, ut à Dodiflimo Laborio-
 fifimoq? Jonftono fadum, cui in Hiftoriâ Na-
 turalide Arboribus, Libro VII, capite 2, articu-
 lo 2, paginâ 384. Cafia fiftula non purgansBra-
 filienfis dicitur.

Insuper aliis judicandum relinquo, an Excellentissimus D. Jonftonus, rectè etiam CassiamBrafilianamLobelii à Marcgravii feparaverit, cumquè Rechii contulerit, quoniamRechii eavidetur, quæ à Domino Carolo de *Hocbèfort*, in Hiftoriâ naturali Infularum Americas defcripta, quam tàm dñx eandemTcum Agyptiacâ exiftimo, donec mihi, in quibus discrepet, ostendatur.

FRUTEX PAVONINUS, SIVE CRISTA

PAVONIS.

Cap. XXII.

Flores adeb fert elegantes, ut fruticem in Leguminosarum tribu, parem vix ullum, pulchriorem certè nullum aliquis reperiat, si *rum* penficulatis in tam concinnâ lerie, in (picâ longèpatulâ dispositorumpyramidali, examinet ubertatem, eorumq; venustissimum è Regio purpureoad rubedinem vergentem, cum avidiiple-dore auri intermixtum colorem>quoaluxunante Naturd, cum omnium efflet gratiosissima, colorati fiint. Taceo *Stamina* eximia, è floris umbilicoadmodum pompose, formâ superbientis pavonis cristæ erumpentia, quorum similitudinis causd nomenCristæ pavoninas, floribus Fruticis hujus aestimatisimis, à Sinenfibus inditum.

• *Frutex* itaq; hic pereximius, cortice læ vi, præprimis in junioribus ramis purpuratus, in *oJm'on* Infulâ, aliisq; India; locis, ad quinq; cubitorum

altitudinem asurgit: *Frondibus* purpureis {pithamae
 longitudinis, sub origine, spinam hami modo in-
 curvam habentibus, alternâ vice, adversus flagran-
 tis folis radios ubertim inumbratus \$ quae per cer-
 tas distantias, Suffraginibus quinque, septem, pau-
 cioribus pluribusve, in quolibet latere biunciali-
 bus, sunt praeditae, purpurei itidem coloris aculeolumque etiam purpureum fimbriarum fingularum exor-
 tum monstrantibus j in harum Suffraginum una-
 quaque octo, decem, duodecim, vel quatuordecim
foliola observantur, Coluteae Scorpioidis ve-
 nofiora, pari semper numero, sibi mutuo opposi-
 ta, ita ut nullum suffraginis extremum claudat.
 Haec *Folia* nimirum, sicuti 8c *Frondes* ipsae, So-
 lem adeo appetunt, ut matutino statim tempore,
 simul ac aureos arguit radios, ad illos in gremio
 suo excipiendos promptissime se expandant, do-
 nee, vesperascente coelo, iterum claudantur ac
 versus humum vergant, absentiam Phoebi quasi
 moerentia, & debitam floribus admirabilis pul-
 chritudinis, qui Fruticem hunc toto die fingu-
 lari amoenitate decorarunt, exhibentes reveren-
 tiam. *Floribus* namque exornatur incomparabilis
 Lavitatis, de quibus plures subinde quam quin-
 quaginta in ramorum fimbriatibus spinam lon-
 gam semper ab Umefformantes numerare licet. Wo-
 rum quilibet triunciali petiolo purpureo, inferius
 juxta fedem spinula, & superius geniculis fascis-
 simè duobus donato fulcitur, ac Casti 2 in mo-
 dum Brasilianae, in globos ante perfectionem
 celatur *Vtriculo*, quinque ex obliquo purpurascen-
 tibus composito foliolis, quorum infimum cari-
 natum extremâ parte inflexum, velut cucullus,
 super



GRISTA

PAVONIS

J. Saut. Sculp.

super reliqua minora, reſupinatur atq; oraw in illis
reconditum tãrn diu occulit donec tandem eo de-
hiſcente, amoeniſſimo fiio captivo, *Flore* ſcilicet
venuſtiſſimo, petalis quinque è purpureo ruben-
tibus & ex aureo fulgore variegatis conſtante,
maximã amicitia ita uniatur, ut ſextum & qui-
dem infimum tantũ folium, feu carina, fit ha-
bendum. Singulorum in medio florum, *Stamina*
ſtant decem purpurea longiſſima, ſiſum verſus
reflexa, flaventes in crocos definientia: inter quæ
ſtylus cuſtoditur prolixus & craſſus, tandem in
S'diqua Pifbrumhaud multum recedentem ex-
creſcens, corticoſam, duram, ex purpureo caſta-
nei faturati coloris, intrinſecus verb albam, ac
valvulis ſpongioſis & craſſis ex cinereo ferrugi-
neis, in novem vel decem ſeparatam cellulas 5
quarum unaquasque *Semen* Ceratias fimile conti-
net, olivacei coloris, cum tempore ex ſpadiceo
rufum ſuſcum, circularibus lineis, inflat Fru-
<ſtus peregrini tanquam torno elaborati argentei
(qui fruſtus *Inimboi* ^*M.zicr*, & SoW«c/> Indorum,
Ponæ in editiõ: Ital.) à Johanne Bauhino deſcripti,
denſiſſimè cinclũ, quod ex pedunculo in margine
ſiliquæ ſupremo dependet. *Yi(i)* \xsfemen primũ
à Domino Carolo Chyri p. m. deinde à S(obilu-
fimo Domino Jacobo Golio, ^obilisfimoq; Domino Ar-
noldo Syey & SpeBatiſimo Domino Sevenhuifene (qui
mihi humaniſſimè per literas ſignificavit, in
Infulã etiam & fmbon Criftam pavoninam aureis
omninb floribus, coli;) 8c aliis, maximam par-
tem nomine *Jcacia Orbis cſmericana aherius, om-
nium pulcherrimo flore*, naſtus ſum, ſed germinare
admodũ moroſum. At inter Semina, quibus
ILLU-

ILLUSTRISSIMUS EXCELLENTISSIMUSQUE DOMINUS, DOMINUS HIERONYMUS à BEVERNINGK ex Aulâ Regis Hispaniae, perfun&us feliciter Legatione Anno M. DC. LXXI. inBelgiam redux, gratiosissimè me exhilaravit s quaedam etiamhujus *Crift** *pavonts* occurrebant, quorum unum anno adhuc praeterlapfb, inaquâ nitratâ aliquot dies maceratum, non iblùm lsetisfimè progerminavit, fed in arbufculam etiampulchramj attamen propter coeli nostri inclementiam, antè hyemis acceffum, à frig&dis autumnalibus pluviis ,cum ingenti meo exftindam dolore, exfurrexit.

CHAMiECRISTA PAVG- NINA BRASILIANA, SILI- QVA SINGULAR!

Cap. XXIII.

PRiusquàm Frutex pavoninus mihi innötuit, pulcherrimam ac prorsu& novam *bane Tlanrtaw*, ChamaecasGam nominavij aft po&ftquam nomen illud Sopherae Alpini, Ecapatli Recchi, Pajomirioba? Marcgravii Rhamno myrti folio Cornuti, eorundem& congenerebus, competere re&iu&us, at&q; *ChamacriHam* no&stram cum Crifta pavoninâ congruere meliù& compen, *Chamacriftoep4vonina* tantilper nomine infignire libuit, dum ab alio certiori donetur. Cujus duo mihi obfervata fimt genera, à nullo adhuc, quòd fciam, defcripta.

Trhnum

ICONES CENTURIA VMMJL 23

CHAMJECRISTA PAVO-
NIS BRASILIANA, SILI-
QUA SINGULAR!.



F 3

T^rimum, èadem penè, quâ Mimofa fpinofa fecunda facie procifcit, quanquam minus, nee adeb ramofum, &c nullo aculeorum vallo munitum. *Caules* namqj exfuâ radice fundit, quadrangulares, rubentes, fpinarum penitus expertes 5 5c ad lingulas foliorum alas, modò in hanc, modò in alteram partem inflexos 5 ac geminatis latis in acutum definentibus, riervofis, circumqj pilofis auriculatos *apfendiculis* 5 inter quas, *Folia* alternatim exoriuntur palmata, pennata, feu ex innumeris pallidè virefcentibus *foliolis*, Acacias haud parum semulantibus, trinerviis, uni costae adnatis fibi invicem oppositis, congesta; quae vespertiâ sese complicant, ut accuratè demonstrat, quam sculpendam curavi, figura. E foliorum alis, fbliatarius plerumqj tantum, tener &c oblongus exit pediculus, cui *Flos* infidet amoenus, Sopherac Alpini quadruplb minor subrubicundique coloris, petalis quinque acutioribus compositus; cujus in medietate *corniculum* falcatum, lanugine densa hirsutum, ftaminula inter multaludit; quod collapsb postmodum flore, hirsutiem suam exuens, in *Siliqvarum* efformatur pulchram, angustam, sextantalem breviorve, Cristae pavonias, sed nigerrimam, quae plurimis intus membranulis, veluti parietibus intergerinis in diversas concamerationes, fingulis *Jeminibus* fingulis repletis, dissepitur. Concinna fanè 8c planè nova est Planta, Brasiliae campos ac colles floriferos diligens, mihi o^c *Excelkntis Jimi Domini %Adolfbii FfU* p. m. communicata.

CHAMiE CRISafA PAVO NIA AMERICANA, SILI- QVA MULTIPLICI.

Cap. XXIV.

Alterum genus, Jive Americanum Sili (fua[^] rnultiplich
venustate ac concihnitate priori in multis
cedens, caukm habet rotundum, ftriatum,
haud inflexum j ramos multos, pilis tenerrimis
pubefcentes, ferentem: horum ala, prioris gene-
ris breviores, earumque foliola pauciora ac am-
pliora, Mimofae Spinofsc fecundse foliorum lo-
bulos fuperantia, & aversa[^] parte fubhirsuta: H^w
dimidio minor₅ quam Brasilianae, 8c copiofius in
fingulis alarum (inibus, pediculobreviori fultus;
quo evanefcente, iucceat-i[^] Si/i[^] nigricans, prio-
ri anguftior, magisqj compreflajac in plures iti-
dem concamerationes divifa, Semen continens
quale eft Brasilianae, fed minus. In Americana
Infula Curacao di&a, oritur.

GENISTA-5FAR HUM. COERULEUM, CAPITIS BONI SPEI.

Cap. XXV.

Genifta-fpartium flore ctmleo JEthioficum, G^{^x}"
frfts vulgaris fermè facie in Bonx Spei Pr^{o*}
montorio nafcens: Frutex denfis 8c crebris
eft ramis, angulofis, flexilibus, non omnino h-
nugine


ICONES CENTUB.LS. PRIMA. 2+

CHAMIECRISTA PAVO
NIS AMERICANA, SILI-
QUA MULTIPLICI.



ICONES CENTUBJA PB. IMA. 25

GENISTASPARTIUM
COERULEUM CAPITIS
BON A SPEI.



Genista aphylla Lin

G

nugine quādamdeftitutis,guftu aromatico; quos *Folia* veftiunt unguem humanum ferè longa, angufta, in fruticis inferiori parte, terna fimul uni petiolo inhaerentia, in fuperiore verb fblitaria, appendiculas juxta bafin anguftiffimas Trifoliorum ritu habentia. Ex ramorum Lateribus, nee non aliquando fiimmitatibus ,/urculi densa lanugine adeò pubescentes, ut canefcant₃ copiofiffimè" pronafcuntur, fbliolis incanis ac carinatis, inftar Sabinae penè ramulorum fquamati. *Flores* in fummis ramulis velutiffpicatos, vel acervatim, ex coeruleo purpurafcentes, & figurà quā Erinaeeae Clufii, gerit 5'ecalyculis ftriatis guttatisquè, in quinq; fegmenta definentibus, ac Hyperici foliorum inftar infinitispropemodum foraminulis,perviis,emicantes. *HoGze.Silifv** excipiunt cxiguae, perbreves, Scorpii fecundi Clufii, fed glabrae₉ &c fpadicei coloris : in quibus è fufco fpadiceum *Semen*, renis inftar fbrmatum, Spartii iecundi Hifpanici Clufio, perquàm fimile, fapore vifcido 5c leguminofb.

**(fenifta-Spartium hoc rartsjimum primb apud IL-
LUSTRISSIMUM DOMINUM HIE-
RONYMUM à BEVERNINGK Anno M.
DC. LXIIir'^fet non ita multb poft à Domi-
no Doctorc Huyberto , & tandem Anno
M. DC. LXXI. à Domino Dodore Slado ob-
tinui.**

GENISTELLA SPINOSA AFRICANA > LARICIS

FOLIO.

Cap. XXVI. .

G¹*Eniftelk* ty/«o/^, quam Caput Bonae Spei genuit, Geniftellae minori afpalathioidi, Johannis Bauhini, quadantenus fimilis: *Sufyr*«/rceftlignofus & fp̄iis horridus. Quin multos dispescitur ramos jhorum minores incani, in quibus {pinse acuta? *£tenuēs {emunciam longae, alterno ordine, aequali quodam intervallo, circumpositae cernuntur. Singularum fpinarum exortui, *Foliola* viridia & tenuia fubnalcuntur, numero decem & tredecim, plura pauciorave semper conjun&im ex uno tuberculo >ut in Larice, aut Corrudâ tertiâ Clufii, quibus fimiliora, prodeuntia. *Flores* verb fuper ipsâ Ipinariî fede, plerumqj fblitarii, faspenero etiam bini oriuntur, neque quicquam â Geniftellae aculeatae recedunt. Hi in *SiliqvU* femuncialibus &c incanis, Spartii minimi montani triphylUColumns, non autem mucrone fûrsum reflexis, *Semina* tria vel quatuor flavescentia Geniftellae, relinquunt-;.

MYRTO-GENISTA CA- PITIS BON^E SPEI

Cap. XXVII.

M¹*Yrto-genifla* iisdem in locis nascens, arborescens est *Fmtex*, ramis multis, quorum juniores fragiles & Geniftae inftar angulofi j quos inconditâ ferie disposita, nullis intervenientibus pedi-

GENISTELLA SPINOSA
AFRJCANA, LARICIS
FOLIO.

*



ICONES CENTURIA PRIMA. 27


MYRTAGENISTA CA-
PITISBONAE SPEI-



Myrtalea capitata (Lam.) Planch.
cap. 5. 132. v. 1.

ICONES CENTURL& PRIMA. *it*
PLANTA LEGUMINa
SA ^THIOPICA, FOLIIS
RUSCI.
*

(J.



pediculis ambiunt *Folia* carnofa, Myrti Laureae foliis fimilia, vel majora, quorum medium in longitudine nervo fulcatur, ex qvo venulae complures diffunduntur, quae omnes extremitatibus fuis non procul à folii margine, fingulari ordine & ferie concurrunt. E ramorum apicibus, & ad fingulorum foliorum exortum, petioli exeunt bini, terni aut quaterni, ex quibus *Flores* aureo colore fulgentes propendent fblitarii, Geniftae aut Cytifi florum efGgiem, repraefentantes 5 quibus delabentibus, *Siliqua* prodeunt longae & compreflâc, Geniftae etiam refpondentes, quantum ex nonnullis minùs maturis colligere licuit.

PLANTA LEGUMINO- SA JETHIOPICA, FO- LIIS RUSCI.

Cap. XXVIII.

V Aldè rara, ac prorsùs nova & haec > qua? an Frutex vel S'ufFrutex, me fiigit, cum^cR[^]tmm tantùm dodrantalis magnitudinis, mihi vifus, ILLUSTRISSIMO DOMINO à BEVERNINGK SUMMO ILLI Botanica? fcientiai ORNAMENTO & PROMOTORI MAXIMO, cum plantis tribus praecedentibus, è Promontorio Bonae Spei Annos abhinc circitei: XI. transmiſſus.

Ilk porrb lignofus, triangularis (quod à fculptore non exprefiim) Sc fuperiùs in ramulos duos divifusj circa quern fine certo ordine fpar- & funt frequentiffima *Folia*, pediculis penitùs

carentia, dura, folida, Rufci aemula, majora autem, & si accuratè eadem obſerves, in ambitu leniter ferrata, anteriùs in mucronem acutissimum 5c pungentem exeuntia, in basi finuosa, & planè ficut corculum, quod pingi fblet, formata, multis nervis fecundùm longitudinem excurrentibus, pallidi coloris, transversim venu-las multas habentibus notata. *Florum* forma me latet. *FruBus* verb ramorum cacuminibus infidentes, Siliquae fime teretes, uncialis longitudinis, rigidae, tumidiufculae, membranaceae & ex purpureo spadiceae 5 quae è calyculis, ejusdem coloris 8c libstantiae, in lacinias quinque definitibus, prominent, Seminibus inanes, nimirum priùs apertae, quàm à me confectae.

COLUTEA iETHIO- PICA> FLORE PUR- PUREO.


Cap. XXIX.

FRutices duo diverſi apud Herbarios, pro *Colutea* in lucem editi: alter, Siliquis articulatis, *Colutea Scorpioides* nuncupatus: alter, Folliculos proferens membranaceos, spiritu veluti quodam distendente turgidos, *Colutea vejicaria* didus. *IUurn*, cum Botanico praecellentissimo Domino Dodore Morifbn, *Securidaca*: Hunc verb *Colutea* annumerb; licet modò fit Frutex, nee Arbor procera, ut Theophrastus Libro III, Capite XVII. Coluteam suam descripsit;.

Non

ICONES CENTURIA PRIM&. 19

COLUTEA JETHIOPICA, FLORE PUR-
PUREO.



H

Non autem mihi est animus de *Coluted vuU*
gari, plurafacere verba: cùm hie in prasentiâ
benevolo Lectori, *novum prorsus germ* ac valde
rarum elegantissimumqj repraesentare consti-
tuerim: quod ex femine Africano, circa Pro-
montorium Bonae Spei colle&um, ante complu-
res annos Amstelodami, in Caroli Chivry p. m.
Pharmacopolae & Botanici peritisfimi horto fe-
liciter enatum, ac autumnalibus mensibus læ-
tissimè floruit. Ubi ex Radice sua, & rplures,
fœsquipedales, lignofos, ftriatos, incanos, me-
dullâ candidissimâ fartos, proferebat, sapore
dulci: in quibus hinc inde iparfa erant *Folia*, è
compluribus incanis *folioli*, Ciceris Sylvestris
angustioribus, uni costas quatuor unciarum utrin-
que inhaerentibus, unoque extremam alam oc-
cupante, composita: è fingulis fermè alarum ca-
vis, *Surculus* prodibat, duorum aut trium digi-
torum transverforum longitudinej/or/toColu-
tese vulgaris longioribus, & florido colore ex
fvave rubente purpurafcentibus, à medio ad
summum cacumen, in fingularem hujus plantas
gloriam decoratus. Quilibet verb illorum flo-
rum ex incano^ftriato, in quinq> fegmenta ex-
panfo emergebat calyce: ex quo, cùm suum e-
legantissimum amittit fbcium, florem nempe
delapsum, *Folliculus* Coluteae vulgaris, admo-
dum fpeclrabilis, & ob floris pulchritudinem
veluti fastu inflatus, tener, membranaceus, pellu-
cidusq5, non fine magna pompâ fuccrefcebat; in
quo, *Semina* ficuti in vulgari continebanturcdm-
preiTa, & forma renis, fiiturse folliculi supremac
pediculis brevibus appensa, quæ autem in medi
pluri-

72. JACOBI* BREYNII PLANTAR.

plurimorumque Botanicorum dolorem, ad justam perfectionem non pervenerunt.

Coetrum ex hujus plantae caulium melleo, infar Glycyrrhizae, 8c tandem fubamaro sapore, etiam decimo quinto adhuc, postquam collecti erant anno perdurante, calidam qualitatem temperatam, humanas naturae finè dubio cum felici successu convenientem, augurari* licet: Folia verb minori dulcedine & amarore majori praedita 5 calidioris & ficcioris fiint naturae.

COLUTEA HV^MILIS

Syriaca, flore violaceo.

R Arum etiam *Colutea genus*, Syriae in locis editis propè Halepum occurrit 5 *adice* fofcâ, amplâ, ad Raphani craffitiem, longitudinemq; accedente: quae Co/zc^o/fundit palmares, terram versùs reflexos, quorum fupremas parti, novem aut decem Lentis adhaerent *Folia* pennata: Inter quae *Flores* emergunt *Coluteae* *Athiopicae*, aft violacei coleris inqj orbem'dispositi: quos *Folliculi* excipiunt *Colutea*;, fed paulò minores. Hanc in Herbario Raulwolfiano obfervavi> qui earn pro Aftragalo Diofcoridis (cui apprimè fimilis) in Itinerario paginâ. 116. defcripfit.

ASTRAGALUS vF%icanus, *flore luteo odorato.*

/^iim Aftragali hoc loco fada fit mentio, V^praetermittere non poffiim, quin novum quendam, in Barbariâ juxta *Qigeri* fj>ontè nafcen-

fcntem breviter hie etiam tangam. Hunc primb *Jtybilisjimus Dominus Carolus Sypeikgrus, Scabinus Tatria &• Jmicmmem Jirtgularis*, Monspelio ficcum transportavit; de quo mihi hoc Anno M. DC. L X X V I. *Excellentissimus Dominus fohannes Schmidt, Thyfecus &- n5A£edicus bujus Vrb'u longè meritisfimus*, frudus & femina (cum plurimis aliis Monspesfulanis, Italicis & Africanis feminibus) liberaliter impertitus est.

*Hac verb Tlanta, Foliis gaudet pennatis, Hedyfari clypeati pofltu, fed multb anguftioribus*₃ *minoribus, magisqj pilofis, in quibus etiam conjugationes longè plures fupputantur. Flores in fpicam circiter dodrantalem Fert, Hedyfari clypeati pariter quà fbrmarn refpondentes, flavos autem & odore cerebrum mirificè obledlantes. Quos Sitiqu** excipiunt unciales, fiibalbidae, Coluteae inftar tumentes, corticofie, durae, intrinfecùs cuticulâ duplici membrana-ceâ_y in duas diftinclse cellulas; in quarum fingulis, *Scmina* tria vel plura_# Coluteae majora[^]ex glauco fublutea, ac molli lanugine albâ pubefcentia, pedunculis fuis inferiori filiquae margini adherent-;.

Si verb hunc *Aftragalum* quis, ad *Onobrychidis Clujii* clafsem amandare mallet, non abhorrebo ab ejus opinionem, cùm haec Siliquas breviores, magis turgidiusculas, nee adeb falcis inftar incurvatas ūcut *Aftragalus*, ferat.

*ASTRAGALO MONSPESSULA**no johanni&TSauhini, vel Onobrychidiprima**Clusii affinis* Syriaca.*

A Stragalus Africanus, mihi *Tragmin alterum* *Diofcorideum* *%amolpii* in memoriam revocatj de quo hoc tantum referre lubet, *Tlantarn* esse leguminosam, *Foliis* Aftragali Monspefulani majoribus, *Floribus* purpureis Onobrychidis primae Clusii j & quae toto ccelo differt à Stoschade Arabica, cui velut affinis à Casparo & Johanne Bauhino (Venerandis Botanicomm Illis Principibus, qui veluti Gigantes, nos pumiliones, humeris suis gestant, quò non-nihil longius propicere queamus) adjungitur.

*POTERIUM LATIFOLW^M**Asiaticum.*

Quia *Toterium*, Aftragali & Onobrychidis non adeb disfimiles fructus fert, *Asiatici* hie *cujmdam*, a nemine adhuc descripti, sed à Rauwolfio in Itinerario pag. 118. nomine Poterii Matthioli paucis tantum delibati, mentionem faciemus.

Suffrutex hie lignosus, ac fœsquipedalifert^/V^ multis lanuginosis, extremum versum magiscrasftscentibus in modum Poterii; è quibus *Sfint* exeunt fœquipalmes longioresve, ad quas *foliola* multa ut plurimum opposita alligata, Traganthx cum rigiditate turn lanugine fimilia, & Senae formâ & magnitudine, in mucronem autem pungentem terminantia. *Flores* virgarutti inhaerent fummitatibus, acervatim dense congesti, ex calyculis crassb tomento candido obdu-

dis,

ICONES CENTURIA PRIMA. 30

OROBUS AMERICA-
NUS LUTEUS, SILI-
QUIS INCANIS.



ctis, hiantes, quorum verb colore obfervare haud licuit, cùm plantam tantùm ficcam viderim, &c quidem finè floribus apud Dominum *Sevenhuyfen*, cumque floribus in Horto *Rauwolfii* ficco, cui *Poterium Matthioli*, à quo tamen foliorum magnitudine, inque aculeum defendantium, permultùm differt, atque genus peculiare rarissimum constituit.

Frequens in Palaeftina, & prope *Sidon* reperitur, ac circa *Haleppum* ubi auctore *Rauwolfio*, ab Indigenis *stilégafac* appellatur, & velut amuletum, contra fascina in aedificiis & in conclavibus fuspenditur.

OROBUS AMERICANUS LUTEUS, SILIQVIS INCANIS.

Cap. XXX.

R Ara ad nos, ex *Curacao* Infiila delata est *Tlanta*, iisdem in locis, Viciae instar nascens, penitiis autem hirsiita ac incana, caules verb proferens reAos, pedales, cubitalesve : quos *Folia* vestiunt alata, dena & aliquando duodena, ex adverso ordine uni rachi biunciali inhaerentia; fingularia verb folia, à *Polygaio Gesneri*, in eò tantùm discedunt, quòd tarn inferiorc quàm (uperiore parte incana, densaque lanugine fint pilosa. *Flores* pufilli *Medicae* fimiles, ex calyculo villofo, in plumatas culpides instar *Lagopi* exeunte, provenientes,


quadrantalibus, immb & longioribus infident pediculis, è foliorum alis exortis, fpicam longam efficientes., flavi : quos *Siliqv** excipiunt incanae, teretes, uncias ternas longze > & acinacis in morem contortae; in quibus multa *Semina*, oblongiuscula, parva, ceu fabeolae minutae formata, obfcure cinerei coloris, nigricantibus maculis intertinda, & fiibdulci guftu, continentur. *'Radix* quâ nititur, referente *Carolo Chivry* p. m. (a quo frudhis cum Seminibus nomine *Conami* accepimus) eandem fermè vim, quam Cocci Orientales _y ad pifces attonitos reddendos, pofidere dicitur.

Hanc plantam, nomine *Orobi*, certâ de caufa hie propofuimus 5 tametfi minor ei cum Orobo, quàm *Fabis* conyenientia, &c meliùs forfan *Aftragalo Boetico Clufii* (cujus tameñ fructus mihi haud vifi) accenferi poffit.

FLOS CLITORIDIS> TERNATENSIBUS-

Cap. XXXI.

L Epidisfitnum fui lpecl:aculum oculis offert, in tanta[^] leguminofarum copia, [^]*anadendras* etiam hece per fe infirma, fed tortilibus virescentibus ramis, proxima admihicula, quas arripere poteft, confeendens *Tlanta*: quam^{/7^} multa ex alterno fitu ambiunt, *Glycyrrhiz*[^] fylveftris Herbariorum quodammodò aemulantiâ, minora verb, pulchriùsque viridia, & bina tan-



FLOS CLITORIUS

tantum, vel terna, ac totidem ex ad versò uni coctae inhaerentia, uno impari extremam alam occupante. E quorum appendicibus, pedicellus tener 6c parvus, circa medietatem, ubi non nihil reflexus, foliolis duobus tenuissimis cinctus, exurgit, *Florem* fustinens admodum magnum, hiantem ac speciosum, quasi papiliaceum, cujus tamen inferius labellum, superiori folio videtur adnatum. Hic *Flos* ex magno calyce libviridi, membranaceo, in quinque lacinias definente, Scfbliola duo rotunda ac membranacea circa basin habente, prorumpens 5 tam faturè profundo coeruleo est colore, ut etiam multos ficcus post annos, aquam, in qua maceratur, brevi temporis spatio, colore adeò fermè coeruleo tingat, velut **Anil*, quod ex Indiis in Europam transfertur. Floribus labentibus, succedunt (ut fertur) *Siliqua* longae 8c tenues, *Serninibus* formam Phaseolorum parvorum exprimentibus, refertae: quorum nonnulla Anno M. DC. LXVII. à Domino *Seventhuyfen*, cum variis rarissimis Indiae Orientalis fructibus atque feminibus sortitus sum, hac additâ relatione, Flores Ternatenibus coAos cibo esse, atque *^Bokyni Cotele' de 'Principi Ise Clitoris* vocari.


7% JACOBI BREYNII PLANTAR.

PLANTA LEGUMINO-
SA BRASILIANA, PHASEO
LI FACIE, FLORE PUR-
PUREO MAXIMO.

Cap. XXXII.

HAud minoris elegantise & raritatis eximi-
um hoc *Tbafcoli* forte *genus*, qvovd farmen-
torum longisiimoram beneficio arborcs 8c
fiutices proximas, fefe iis circumvolvens, afcen-
dit. *Hujus* rami juniores, per intervalla uncia-
rum duarum, triumve, *Folim* tribus oblongis ex
uno .pediculo, uncialibus vel fefcuncialibus ad
fiimum, Terebinthi foliorum inftar duriufcu-
lis, &c admodum venofis, ornantur: ex folio-
rum appendicum finu, petioli exeunt fingulares,
Florem giferentes unicum valde fpeciofiim, *Lathyri* Narbonenfis facie, fed vel quadruplb *ma-*
jorem, gratiorequ purpurâ coloratum, cujus
bafin calyculus, foliolis duobusmembranaceis,
rigidiusculis, conftrudus ambit j &c huic alius
adhuc calyculus fubeft, qui medio petioli ap-
pofitus, & quâ formam, priori fimilis. Oritur
in faltibus & dumetis Brafiliae.

FOK



PLANTA LEGUMINOSA.
BRASILIANA PHASEOLI
FACIE, FLORE PURPUREO
MAXIMO.

FOENUM GRIECUM SYLVESTRE POLYCRA- TION MAJUS CRETICUM.

Cap. XXXIII.

Hedyfarum minimum, in Hiffcoria Univerfa-
li Lugduni excusa^t defcriptum, & Fcenum-
groecum fyheftre alterum T>odon&i j â. Johan-
ne & Cafparo Bauhino, Au6toribus (lim-
mè admirandis, una^t eademq; plant à habentur:
Si autem figuram utriusq; accuratè confideres,
difFerentiam illarum non exiguam perfpicue ob-
fervabis. Qvippe Fcenumgracum jyfoeftre alterum
'Dodomei, Siliqvas longiores ere6tas, folia minùs
obtufa & magis (errata, profert: Hedyfari minimi
Lugd. Siliqvas contrà longè minores, fal-
cata? 8c humum verfùs dependentes -, folia ob-
tufiora minusq; crenata ob(ervantur. Qyas ob
caufas, Hedyfarum minus Lugd. a^t Fosnogneco JyU
veftri akero T>odonai diftingvendum; atq; illud;
Fcenumgracum Jylve&re polycration minus aSfafonspe-
lienfe; hoc Htfpànicum Jiliquis ereBis nuncupandum.

Duobus hi(ce, tertium in Gretà (pontè pro-
veniens adjungo. Hujus femen ab Excellent
tiffimo 'Domino <s^frnoldo Syar, Viro in per(cru-
tandis Naturae latebris. maximè induftrio, annos
ante (ex (eptemve, nomine Vorftiano, Trifo-
Hi falcati Cretici, mihi transmisfiim. Ex quo
T^lanta cnata, ab ^adice alba, longèa, in fibras
multas divaricatà, Caulem fesquipedalis aliquan-

do

do longitudinis errittens, qui ftatim propè radicem, in plures ramos vircscentes ac terrasprumque incumbentes dividiturj à quibus alii minores exeunt ramuli, qui ut caeteri, *Foliis* vestiuntur numerosis, Foenugraeci Sylvestris polycratii Monspeliaci paribus, rlii aliquantb majora, cordata, venis eminentioribus praedita, ac per extremum minùs crenata effent. Ex foliorum alis, *Flofculi* luteoli, plerumque terni vel bini tantùm, Monspeliaci multb majores, loneioribusqj pedicellis innixi emergunt: hi in *Siliayas* dependentes, falcatas & admodùm venofas, triplb Monspeliaci majores, *Semina* lutea itidem grandiora, Galegaenonmale convenientia, continentes, abeunt.

In icone, *Ramufculus Fwnugraci Jyfoeftris polycratii minoris z5\£onspeliaci* > ad differentiam Cretici majoris, exprimitur. Qvâ occasione commemorare non negligendum duxi, *Co*ronopum* ex libro *fohannis %odai 'a Stap el (qvctn* in Theophrasti Erefii Hiftorix Plantarum Commentario, Libro VII, pagina 831- 4?" fcripfit) nihil aliud effe, nifi plantulam, *foliis* orbatam Sc floribus, filiqvulis autem maturis onuftam, fâepiùs jam memorati Foenugraeci minoris Monspeliaci : quemadmodum illud in Herbario Bodaci vivo (quod >\(*Dominus Carols Svpeikgms*, a Clariffimo Johannè Antonide van der Linden p. m. fuis nummis comparavit) clare obftrvavi.



Foeniculum Graecum Silvestre polycoronatum majus
Creticum

33

Foeniculum


43

minus

Monspelicium

35

TRIFOLIUM COCHLEA-
TUM SPINOSUM SYRIA-
CUM[^]LACINIATIS FO-
LIIS.



TRIFOLIUM COCHLE- ATUM SPINOSUM SYRIA- CUM, FOLIIS LACINIATIS.

Cap. XXXIV.

DE *Trifolii cochkati* rarâ quâdam specie, circa Haleppum Syria inter fegetes, cum Lunariâ radiatâ Italogum Lobelii, 6c Trifolio glomerulis tomentosis per caulium longitudinem Johannis Bauhini, copiosè nascente, hoc capite agere operas pretium duxijquas etiam non prociil Monspelio Anno M. DC. LXVI. à *Domino Carolo Scfoeifyro* reperta, mihique cum aliis Monspesulanis compluribus plantis ficcis & fcmminibus allata*.

%gdix humum non admodum profundè nixa petit, alba 6c fibrata: a qua *Cauliculi*, lignofi, rotundi, virides, pedales vel etiam cubitales, in terram reclinati, plurimis praediti ramis, prodeuntj in quibus hinc inde sparfa sunt *Folia* angusta, terna Temper uni petiolo longo inhxrentia, dilutè viridia, Medicae futefcentis, fed profiindiùs ferrata, velpotiùs laciniata. *Floret*, ex folioriim alis, in oblongo pediculo, frequenter bini tantum fimul enafcuntur, flavi coloris, à Trifoliorum cochleatorum floribus nihil diiferentes: quibus *FruBus* cochleae modo circumvoluti, longis 8c rigidiufculis Ipinulis exafqerati, *Trifolii cõchkati* fru-
%ffinofo majore, fed dimidib minores fuccedunt;
L

dunt; *Semina* flava, compreffa, renis infar formata contiientes.


Et quanquam haec *Trifolii cocbleatispecies*, novis & incognitis annumeranda plantis; attamen in Rauwolfii Hodaeporico, parte primâ, Capite IX, paginâ 118. sub nomine €(tl Medica mtf flefpaltmett *RUt'U&tkinl* qvavis fine defcriptione & absqj icone, jam indigitatam comperio. Qvâ in Herbario etiam vivo di6ti Rauwolfii, apud *Ifaacum Vosfium* *Philofophum Clariffimum* C qvâ nifi me fallit memoria, à SERENISSIMA REGINA CHRISTINA SVECORUM dono illud acceperat) Anno M. DC. LXXII adeb pulchrè & curiosè ficcatam, ac fi eodem colleda fuisset anno, confpexi.

TRIFOLIO AFFINIS INDIA[^] ORIENTALIS

XANTHII FACIE.

Cap. XXXV.

ANno à Chrifci Nativitate M. DC. LXXII
fohanni 93raïW Patriueli meo, ex India*
l(qm aliquot cujusdam (ut crêdo) Fruticis, qui Indis *T>aon Lacat Lacat* appellari perhibetur, misfi. Quorum *unum*, cum ramulo & laterali, æri incifum Centuriae huic inferere placuit. // pedalis ferè est longitudinis, Hgnotus, fed valdè tenuis; cortice incano, subviridi, 8c quibusdam in locis obfbletè purpurei colonis, te&us. Huic, alternâ fcric, adnata funt
*Folia**



TRIFOLI to AFFIXIS INDLE ORIENTALIS XANTHII FA cir.

Foha novcm > pediculis longis appenfa, tenera, lata, angulofa, leniter crenata & praefertim fiib-
tùs incana, Xanthii quodammodò aemula, vel
mediam quandam figuram inter pampinea &
Rofae Sinenfis folia obtinentia; in quorum fin-
gulis, ab ipfo ftatim pediculo, coftae fubviri-
des pallidasq; feptem expanduntur, & ex illis
cunAis alii quidam nervi, venas plurimas, cum
tenerrimis fibris, in foliorum carne latentibus,
fundentes. Caeterum, è fingulis penè foliorum
alis, *FmBus* emicat, e petiolo parvo prodiens, qui
bafin plurimorum foliorum ftellatam habet: hie
fru&us conftat quinq; conceptaculis lapaceis,
cinerei coloris, Trifciii fiibterranei, tricocchi,
Regii, *5\£or'ifoni, {eminum involucris fermè
semulis, nifi quòd duplb majora, dura ac pilis
rigidis quafi aculeata; horum quodlibet perfe-
6him à fummo finditur, 8c *Semen* unicum Anò-
nis montanas praecocis purpureac frutescentis,
<£\dorifoni, magnitudine, forma, colore, & bre-
vi incanâq; lanugiiie, perfimile continet.

SISYRINCHIUM EX PHOENICEO SVAVERU- BENTE FLORE ATHIOPICUM.


Cap. XXXVI.

L Eguminofàs meritb *Siliqvofay Silicukfa&ta-*
lpjuiares fubfeqvi deberent, cum autem ordi-
ne, in hacCenturiâ, nullo accurato, ob de-

fe&uum frii&uum feminumq; Plantarum pluri-
marum, uti potuerim: Sc' Bulfosas quasdam exoti*
 c^, qvarum tfrut8cfemina me adhuc fiigiunt,
 in promptu habeam j in medio easdem colloca-
 replacuit: prseprimis cum inter 2?«&0VZ#, quosedam
Säiquofe, multaéq; *Capsulares* habeantur. Agmen
ergò inter has ducet Sijyrinchiurn hoc egregium:
 Qvod altitudine plus quam pedali aslurgit, *Bul-*
bum posfiden?. rotundum, Crpci, aut Sifynri-
 chii Indici Cornuti^ cortice ex fusco cinereo &
 filamentofobdudtum: è qvo &*K&viridis, ut ex-
 iftimo carnofus, exfiirgit, Fo//^partim longis-
 fimis, partim brevioribus, angustis, nervofis,
 vegetisfimâ viriditate coloratis, in modum fere
 Sifyrinchiorum Clufii amiclus; cujus fuperior
 pars, Papaveris erratici infar hiriuta > *Florem* fua
 venustate afpectum dele tantem fuffulcit, Croci,
 aut Syfirinchii Alprenfii Columns grandiorerh>
 foliis fex tenerrimis, è carneo&phoeniceo nee
 non dilutè rofarum purpura. blandè rubentibus,
 adungvem croceis, congeftum; cujus in medio
 jftylus qvadrangularis, crafliis, phoenicei coloris
 occultatur. Atqj haec, quantum ex icone ab
 ILLUSTRISSIMO DOMINO à BEVER-
 NINGK transmittâ fixmmoqj ftudio fiiis colo-
 ribus, ad plantam in Horto ejus floribus deco-
 ratam, adumbratâ, obfcrvare potui.* Nee enim
 pulcherrimum hunc Athiopkarum, non pro-
 cul à Promontorio Bonas Spei remotarum foli-
 tudinum incolam luftrare fortuna dedit-;

<*tAliud adhuc Sifyrinchium eodem in Horto*
 (quod anlufus tantum naturae, an verb pecu-
 liaris fuerit fpecies, me latet) effloruitj priori
 pel-

STRINCHIV
PHOENI
O AVAVE
BENTE
LOI. KTHI
PICUM



perfimile, nifi quòd *Florem* rubedine triftiori & obfbletiori infe&um, & languido collo deorfum dependentem, velut Polygonati ramofi florc luteo Cornuti, pari quoque formà & convolutis foliis, proferebat.

Placuit aliquando EXIMIO MACENATI meo, in nunquam fatis mihi asftimandis Literis fiiis nunciare, monftrare *fe* in inftru&isfimo Horto illo, *Sifyrinchii* qvoddam genus *Caphis* 'Bona Spei, *fioribus fuperbiens candidts/imis*, idque depidhim mihi transmittere animus *Ei* fuerat₃fed quoniam flos, pro more Sifyrinchiorum Clufii admodum fugax, & vix ipedatus, voluntarium ftatim properaverat ad fepuichrum_t intentionem ejus fummo meo dolore fufflaminavit.

SISYRINCHIUM RAMOSUM ^ETHIOPICUM, FOLIIS PLICATIS NERVOSIS ET INCANIS, RADICE TUBEROSA PHOENICEO.

Cap. XXXVIL

A NnoM.DC.LXVIILBENIGNISSIMO
i\l l l I Botano-fophorum PHOEBO, IL-
USTRISSIMO DOMINO à BEVER-
NINGK, integram ciftam "*Bulbis Tuberibmqve
variis*, in Promontorio Bonae Spei juſfu fuo colle-
<ftis,refertam, ex fingulari benevolentia, donare
mihi allibuit: in qua non tantum *Radices* illa-
nim Plantarum, quas in fequentibus quatuor
L 3 capiti-

capitibus defcripfi, unà cum Ornithogali Indici Swertii, Narcisfi Indici punicei gemino latiore folio, Narcisfi Indici liliacei, Narcisfi Indici flore liliaceo fphoerici, à Ferrario jam Pofteritati in fempiternam nominis fui memoriam propofiti > fed aliarum adhuc plurimarum rararum prorsùs ac novarum occurrebant. Praeprimis autem *Tubera* quatuor, ob colorem (uum fangvineum, in teneris etiam jam prognatis germinibus Coralli aemulantem, mihi arridebant.

Horum quodhbety Iridum quadantenus fimile, vix fefcunciam in lohgitudine, ac poUicem transverfiim in latitudine contingens, formà non adeò inconvenièter Cygni corpus repraefentabat 5 fubftanti^ carnoſa, ex phoeniceo crocea, lentam mucilaginem continente, &c cuticulà firmiter inhaerente, tenui, fangvineaque conte&à, cui inſuper cortex, colore & fubftantià Colchici fimilis obduftus foerat, jam reſolutus, quò fangvineus perpulcher radicis color, finè impedimento meliùs oculis luſtrari poſſet. Eà enim %q̄dix h#c eſt natura, ut illo, quò planta optimè augetur tempore, imminuta, venuſtiſſimum coloris folendorem deperdat, formamque ſuam in pedis figuram cònvertat, ſub quà emiſſàs inter fibras nova propago (ut feorſim pi<3:a edocet radix) tandem procreſcit.

Tubera haec, cùm menſe Julio terrae cornmifis* fem, unumquodque paucos poſt *fats*, *Folia* oſto aut decem prdducebat, pollicaria, palmaria, vel etiam pedalia^Iridiſfacie, & quae eò etiam modo in latum expanſa, mutuoque ſe atnplexando naſcebantur, obſcuriùs autem viridia, incana, hirtuta,



ARUM RAMOSUM AETHIOPICUM,
 FOLIIS
 PUCVNI? NERVOSIS ET INCANIS
 RADICE TUBEROSA EHOtNiCEA

hirsiita, nervosa, plicata, 8c ab imo ad medium usque carinâ. amplâ praedita: è quorum mediq, non meo quidem in horto, sed in Flora; amoenissimo nobilique Pandocheo, apud ILLUSTRISSIMUM DOMINUM, DOMINUM à BEVERNINGK, *Caulis* pedalis, rotundus, viridis 5c hirsutus effundebatur, parte inferiori rubicundus; imâ medietate geniculatus, fingula genicula folio angustiore brevioraque cincta, supra verb pluribus ramis(quorum quemvis circa basin, longum angustumque comitabatur foliolum) brachiatus : quos Syfyrinchii Theophrasti Columnae pares, sed grandiores duplb ornabant *Flores*, sex foliolis purpureis, aliquâ flavedine ex phoeniceo colore intermixtis, forisque leniter hirsutis, confusis. His marcescentibus, *FruBus* nascebantur quidem trigoni, nec tamen ut Syfyrinchii Columna; oblongi, sed Hyacinthorum in modum iubarotundi, qui perfectionem debitam non affecti, virides erant & pilis brevibus, velut caulis foliaque hirsuti, intrinsecus verb glabri, in tres parati partes, fingulas *Semina* fingula tantum complectentes quantum ex his ficco enucleare licuit.

GLADIO-

GLADIOLUS AFRICANUS, RADICE TUBEROSE CEPA FOLIIS.

Cap. XXXIIX.

Gladiolorum in Promontorio Bonse Spei
vigentium genera mihi tria innotuere.

Trimum, gladiolus Mthiopcius flore coccineo, à Cornuto vocatum: quod Anno à Chrifto Redemptoris noſtri Nativitate ſexageſimo tertio ſupra milleſimum & ſexcentefimum, copioſiſſimè, caulibus etiã ramoſis, Menſe Odobri & Novembri, in horto publico Amſtelodamenſi, ne^c non *Domini Johanni Commelyn* rariſſimis plantis inſtrudiſſimo, florens vidi.

Secundum: Bulk cinereo 8c longè minore nititur: *Foliis* atque caule multò brevioribus: *Floribus* amplioribus brevioribusque, colorè eleganter violaceo. Cujus effigies cum &&ⁿptione in Centuriâ fecundâ, nomine *Gladioli JEthiopici minoris, flore violaceo, ſequetur.*

Tertium de quo hic agemus, novum planè ac peculiare genus eſt, à Gladiolis omnibus, maximè diverſum. Tuberoſâ namque conſtat %dice> craſſa, perne pugillari₃ fuſcâ foris ex cinereo cum aliquâ flavedine ſordideſcente? intus carnem folidam cerini coloris habente, in &*periore parte colliculi inſtar ſubrotundè elevate, ac fibris multis ex imâ circulari fermè pl^anaque baſidiffuſis: de quâ *binx* radices plerumque ita conjundæ₅ ut facili tamen negotio le*parari



GLADIOLUS
AFRICANUS
TUBERC
CEPÆ. EOVO

parari posint. *Folia* ex colliculorum verticibus proluxa emittit, Cepae vulgaris formâ, colore, ac magnitudine fimulantia, concava, aut materiâ levi, Ipongiosa, ut & spumâ quâdam glutinofi faporis, farctaj hax folia tenucs veluti glauci coloris halitus, fiifFundunt, qui laevisfimo ta&u deflorantur: horum primùm emergentia, inferiore pftte incumbunt terras, fiiperiore autem eâ lè erigunt figurâ, ut cornua penè tauri repræfentent. *Caulem* (ut ferunt) impellit rotundum, foliis minoribus veftitum juncceis, £>tfloribu\$ fvaverubentibus cacumen onerantibus denfiffimè fpicatum: hi, Gladioli Athiopici Cornuto, dimidiò breviores, nee eo modo incurvati, in medio ftamina apicibus luteis donata, complectientes, è calyculo binorum foliolorum membranaceo Cannae Indicae, progengerantur. Figura partim juxta imaginem ab ILLUSTRIS: DN: à BEVERNINGK, transmissam, partim juxta plantam in horto meo ante annos feptem vel octo virentem, partim deniq; juxta ficcatum ratnum floribus onuftum, confect:a. *An'Radix tube" rofa Tromontorii 73on<eSpei collo eximie craffo, Svpertiil*

BULBUS OBLONGUS

ATHIOPICUS, FOLIIS

GUTTATIS ET CILII

INSTAR PILOSIS.

Cap. XXXIX

EX florifero Africa horto, Capite Bonæ Spei, ubi" Aolus furens venuftam illam
M Athio-

Athiopicam Floram fibi conjugavit, & uterque fedem fixit, **Bulbum* accepimus rarissimum, Narcisfbrum aliquā ex parte fimilerru nisi quod fesquipalmaris erat propemodum longitudinis, ad proportionem haud crasfus, fibris autem validis imā bafiHyacinthi inftar mucarii diffufis. B c in BEVERNINGIANO Horto, *Folia* quinqj (in meaduntaxat tria) proferebat glabra, crassa, carnofa, in mucronem parumper exeuntia, fupinā parte fature viridia, pronā dilutiora, quinque vel fex uncias longa; fed ne duas quidem kta, nimirum circiter medium, ubi latisfima> quae confra&a, fubamarè naufeabundum odorem (quamvis Sapor fingularem amaritiem haud prae fe ferret) atque ex venularum cavitatibus in carne delitescientium^tenuisfima araneae inftar fubtilia ftamina in mpdum Eriophori Peruviani praebent. Dignaverb fce6tatuhaec folia reddebant margines, pilis iūbrigidis, fpadiceis, duplici ferie, admodum curiosè &c fere ita flimbriati, ut pro cilis, innumerabilium in alterā folii parte apparentium guttularum five ocellorum haberi qucant: velut Argum quendam, plantae hujus radici & flori, Afriicana prafecisiet Flora. Qui tamen radicem fuam, à Solertii BEVERNINGIANA, quā per Neptunum in Europam deduda, custodire haud potuit: quanquam/^ inHorto etiamILLUSTRISSIMa BEVERNINGK omnium cultisfimo, haftenus occulta'verit; quorum tamen formam Msecenatis nostri gratiā, cui hanc etiam flguram acceptam ferimus, me cogniturum fpero.

BUL-



BULBUS LILIACEUS

VOMITORIUS, CAPITIS

BONA SPEL

Cap. XL,

Raras huic plantae, propter bulbi effectum, (de qvo jam in Miscellaneis Curiosis Medico-Phyficis Academiae Naturae Curiborum, Anni quarti & quinti, Observatione CXXXIV, pagina 143 > nonnulla proposuimus) *Suits vomitorii* nomen tribui, imprimis cum fructus & semen mihi non visa, neque ex florum figura, ad quam plantarum classem propriè pertineat, colligere potuerim.

Quantum autem observare licuit, comperi ejus *Bulbum* Lili miniati Byzantini valde similem, nisi quòd plerumque major, & ex majoribus, crassioribus, faporis initibus viscidis & aquosis, mox autem acerrimi ac linguam instar Ari ferè vellicantis, purpurascens squamis compadum in quibus folia obversis, pundula obscure purpurea dense interspersa, & lineolae quaedam per longitudinem excurrentes, cernuntur. Hic *Sulkus*, Anno millesimo Sexcentesimo sexagesimo octavo, meo in horto, toto aestatis autumnique tempore, finè caulium exortu, finè floris ostentatione ignavus atque inglorius latuit; praeter quòd luxuriantibus tantum foliis, Lili foliorum colorem, formam & totum habitum semulantibus, sed longè angustioribus, infeliciter filvescebat: quorum *Iuxta* feges, flo-

rumetiatur subsequenti anno, Liliorum more, spem mihi fecit, quam tamen infolitum subsequenti hyemis frigus quod hanc omnesque meas rariores exstinxit plantas) plane decollavit. BEVERNINGIANUM autem veluti hortorum plantis rarioribus abundantium Miraculum, floribus liberalissime non destitit suis exornare; ubi *Scapum* ex bulbi centro teretem, diluto virore albicantem, bipedalem ferequicubitalemve impellebat, *Floribus* creberrimis ex subviridi albescentibus, a tertia inferius parte, ad apicem usque, in spicam longam congestis, decoratum. Quorum nondum aperti, immaturis Hyacinthi flore albo floribus fimiles, reliqui autem f^o ^^a sua tam mira & variabili explicabant forma ut numerum eorum figuramque enucleare haud valerem: in quorundam umbilico, Stylus longus, quadrangularis, ante obtusius & velut reflexus? in aliorum e contrario, reflexus, & quasi ex multis, orbicularibus arte conjunctis globulis confusus, apparebat. Ceterum an foliola illa laciniata, in parte florentis leae! inferiores, flores vel faltem eorum appendices relictis foris, certe pronunciare non possum, cum nunquam scapus mihi floribus onustus, conspiciatur; descriptio enim ad imaginem ILt» USTRISSIMI DOMINI a BEVERNINGK (quae nostrae etiam figure praeluxit) composita.

An *ISulbu* rnber Tromontorii Son* Spei adhucj'* **
*cognitus [qvamofm 9 Syperitii; quern finè descriptio**
 ne, finè foliis atque floribus, pagina 66. lib. primo tantum expressit ^ 8c an affinitatem quādam



ifPNr*

BULBUS LILIAC
VOMITONIVS CAVJTIS BON;E SF1LI

(i Sual del et scul

ORNITHOGALO AFFINIS RADICE TUBERpSA, CY.

CLAMINIS FOLIO, CAPITIS

BONÆ SPEI.


FOL. XII



Stephanus Cousius pin

J. Saal delin et sculp





dam cum Scilla^h habeat > Philobotanis ,juriofioribus occasione fortè aliquà ad hanc plantam accuratiùs examinandam oblata^h, judicandum relinquo.

ORNITHOGALO AFFI- NIS RADICE TUBEROSA, CYCLAMINIS FOLIO, CAPI- TIS BONA SPEI.

Cap. XLI.

NOn minoris raritatis *Ornithogalo affinu* hac, quae 3^h fci. nititur tuberosa^h, crassa^h, pugnū penè aequante, coloris purpurei obfoleti, infra in tubera alia, ut futuros haeredes divisa. Ex qua^h, *F0H4* inter Cyclaminis & Dracunculi palustris mediam faciem obtinentia, petiolis longis suffulta prodeunt, atroviridia: inter quae *caulis* sesquipedalis rotundus, viridis > gracilis & penitus nudus exfurgit; quem à medio usque ad extremum apicem > confuso ordine, ambiunt longi pedicelli > *Flosculos* parvos ab Ornithogali Hispanici minoris Clusio haud multo divertis sustinentes , fcnis, *b* candidulo coeruleis & subviridibus foliis obfoletis, constantes.. Hos sine dubio etiam sequuntur *JrùBus* & *femina*, de quibus tamen nihil percepimus: cum solum floribus BEVERNINGIANUM Hortum nobilitaverit, unde *Tuber* 9 cum *Tkntd* *ficca*, *Scicone* (ad quam nostra confeda) ex liberalitate Illurlirisfimi Maecenatis obtinuimus.

y+ JACOBI BREYNII PLANTAR.

ORCHIS CERCOPITHE-
CUM EXPRIMENS LUSI-
TANICA PRIMA ET ALTERA.

Cap. XLII.

Natura in Plantarum formatione ficubi la-
fciviam fiam prodidit, eam certè in Or-
chidibus commonfratam ivit, quorum
Flores maximâ cum admiratione, nunc in for-
mâ Aviculae, Lacertae & aliorum infe&orum;
mine in-Viâ, Mulieris, & quidem vel auferri
pulli alicujus Martii, vel rifum moventis mo-
rionis 5 nunc in Teftudinis ignava, & melan-
cholici Bufonis 5 vel in celerrimae jucundas affa-
nias propinantis Simiae, ita elaboravit : ut
fi non ad rifum movearis, ad fummam certè
admirationem inciteris. Causas verb admirabi-
lis praedidae Orchidum florum metamorpho-
feos quod concernit (quanquam illae, meo qui-
dem judicio, adhuc fâcro involucro à Natura
tegaitur) Lectori curiofo ad palatum, placuit
hie loci ipfisfima Athanafii Kircheri apponere
verba, ita inMundi fiibterranei, Tomo fecundo,
Libro duodecimo, Se6bione prim^, capite IX,
paginâ 349, fcfc habentia. Obfervatum foit ab
5,iis5 qui pecorum, annentorum, & equorum
Mcuram habent, poft commiffâs ad prbpagi-
,,ncm animantes, ubi congregatus fa&us fuit,
,,fequenti anno campum ilium Orchidibus five
53 Satyriis luxuriare, non aliâ de causâ, nifi
33 quod fpermatikus humor fuperfluus humo
Iparfus

EXOTICAR. CENTURIA I

ſparſus Sc unà cum terreftri fucco fermentatus,,
 tandem in huiusmodi herbas adoleſcat, quod,,
 idem contingere ajunt ex femine cadaverum,,
 tùm hominum tùm animalium, qui in campis,,
 vel occiduntur, vel infirmitate quâdam mori-,,
 untur. Quòd fi res ita fe habet, quid mirum,,
 eſt, femen terras conditum tanquam intra ma-,,
 tricem, ibidem paulatim plantam prorsùs e-,,
 juſdem facultatis, quâ pollent animalia, ex,,
 quorum femine deciſiimeſt, educere; unde,,
 non immeritò à virtute, quâ ad Venerem inci-
 tant, Satyria vocantur, videlicet a *Satyromm*,
 fabuloſbrum falacitate: cùm enim Natura,,
 otioſa ſtare non poſſit, ſemper aliquid moli-
 tur & fabricat, & pro conditione feminis ad-
 ſcititii plasmat; Cum itaq; in femine anima-
 lium virtute omnia infint animalis membra,,
 ut ſupra diximus, illaque paulatim calore u-
 teri evolvantur in perfectam animalis fabri-
 cam, vi plasticâ ad fingula membra efforman-
 da negotiante > quid mirum inquam eſt, fe-
 men five hominis, five animalis intrâ con-
 gruam proportionatamq; terras humidas ma-
 tricem receptum, ibidem quoq; ſi non perfe-
 ctum animal, quod ultra ejus vires eſt, faltem
 aliquid analogum five animali, five homini,
 quoad membra, veris non abſimilia moliatur
 & effingat unâ cum facultate femini propriâ
 ad Venerem excitativa; Accedit, quòd huius-
 modi herbas fere omnium primæ ſint, quas
 verno erumpunt tempore, eo videlicet, quò,
 & animalia pleraque oſtro libidinis inſtimu-
 antur. Certe Natura ita comparatum eſt, ut

ad

35 ad firmilia fabricanda non operetur, nifi ope
 3> ejus feminis, quod in perfectis animalibus, unde
 33 decifum fuit deved"fcumque, primb inexfti-
 33 tit: Quòd verb praeter humani corporis mem-
 33 bra, multas alias producat in di&is Satyriis
 33 variorum infe&orum figuras, id diverfitati fe-
 33 minum adferibendum eft 5 fi enim equinum
 33 femē intrā terrain cadens, in di&tam herbam
 33 adoleverit, cū Natura perfectam equi figu-
 33 ram ultra vires fiias producere non poflit, ex
 33 virtute feminis, faltem fimilem iis infe&te,
 33 quac ex equo vivo nafci fbilent, id eft, vespā-
 33 rum flguram erTbrmat; fi verb bovillum fper-
 33 maOrchidem produxerit, nonbovis fed apīs,
 33 quarum origo ex bobus, eft, figuram delineā-
 33 bit, uti in Orchide apiformi patet, & fie de
 33 coteris 5 quòd enim in differentium Orchi-
 33 dum floribus nunc pulicis, modb cimis aut
 33 pediculi, jam muscae figurae fpeftentur, id
 33 certè non nifi ex fpermatīca virtute eorum
 33 animalium₅ ex quibus talia nafcuntur infc&ta,
 33 contingit. Si quis tamen fagaciùs omnia ex-
 33 ploraverit, Temper quoq; in iis quidpiam ei
 33 animali, ex quo decifum fuit, conforme re-
 33 periet. Apes ex bovillo genere nafci, omni-
 33 um tārū veterum, quā modernorum Scri-
 33 ptorum autoritate patet: Siquidem teſte P*Ar-
 ?? rant > Tlinio, Virgilio₃ non ex fimotāntum bo vi-
 33 no, fed 6c ex ejusdem tabido corpore apes
 33 nafcuntur, ajuntq; in Agypto loca quaedam
 3> eſſe, ubi fi defodiatur taurus, ita ut cornua
 33 tantūmfupra terram emineat, eaq; deinde fer-
 33 ra amputentur, apes cum tempore avolent.
 Verūm



ORCHIS CERCOPITHECUM

I-X VRINEE NI'U WITANICA

PRIMA

Verum Doctissimi hujus Viri intentionem fisco in pretio, ac Legatori judicium, relinquo, ad describendas Orchides quasdam novas accessurus.

De his primum nobis occurrit, *Orchis Cerco-pithecurh exprimens Lusitanica prima, geminas agens* %\$dices, testiculorum modo efformatas, unam plenam, alteram marcidam, radicum instar Orchidis Anthropophorae alterius à Columna descriptae, quibus plane etiam conveniunt j liipra quas fibras aliquot expanduntur, foliolis adhaerentes per brevibus > caulis imum velut folliculi contentibus. Ex foliolis didis, *Folia* enascuntur liliacea, nervosa, per ambitum undosae, Orchidis Anthropophorae alterius Columnar, admodum respondentia j inter quae caulis effertur pedalis, minoribus foliis septas, cujus fumum innumeri *Flores* > ex purpureo rubentes, in Quicquam denique dispositi, exornant. Hi *Flores* debent raras & mirabilis fiint formae ut primo intuitu Milites è Draconis à Gadmo prostrati dentibus enati j quod si verb accuriore judicii lance examinentur, Cercopes à Jove, ob fraudulentiam animi in Simios transformati, eile credantur: Singuli autem horum *Florum* > è pediculo subviridi, toroso, contortoque, foliolum fiit > è acuminatum habente, pendent 5 & ex *galea* è purpureo rubente, foliolis tribus acuminatis, nervosis majoribus, quibus interjecta bina minora y constant > in qua ponè calcar cernitur, infra verb foliolum five *label/urn* longum, galeae instar coloratum, punctuiliis purpureis in Versum, quod brachiis, cruribus, cauda & in superiori infuper parte, per extuberationem

nern fiibÿiridē carnofam , tanquam capite mon-
ftrofo, ita iriftru&um, ut Cercopithecī eifigiem
veluti umbra repraefentet. Exa&o Cercopithe-
corum vegetabilium horum tempore , pediculi
eorum tandem intumefcentes, 'mSiHqvas, matu-
ritate fecundū longitudinem, rimis Hellebo-
rines in modum dehifcentes, & *Semine* exiguo
fcobis infar fē exonerantes₃ excrefcunt.

DirTert haec ab *arfthropophorte akerius Column**
Flore quā corpus anguftiore, cruribus latioribus
& minùs expands, ac caudā etiam longiore-;

*Orchidis hujus pulchra, aliam adhuc fpeciem, BE-
VERNINGIANO in HORTO, & Domini
Sevenhuysen, confpeximus* 5 a primā nihil disce-
dentem, nifi *Floribus*, quorum labellum brevius,
brachiis brevidfibus, brevioribus itidem angu-
ftioribusqj atqj expansis magis cruribus dotatum.

. *N(otandum:* Flores in icone, galeis didu-
ftioribus fūnt exprefsi, quò eò meliùs eorun-
dem forma pateat: Flos autem inferior, latitu-
dini caulis impendens, eādē, quā flores facie
nafcentes, fe repraefentat^.

ORCHIS APEM REFE- RENS LUSITANICA'

Cap. XLIII

QVām fpe&atae pulchritudinis, ac raritatis,
priorēs duae ad Moriones & Stratemaiti-
cas pertinentes etiam fīnt Orchides :. ab
hāc tamen & reliquis, quae fequentibus duobus
capiti-

1CONES CENTURLS. PRIMA. <3

ORCHIS APEM REFE-
RENS LUSITANICA-



L 3

capitibus continentur, permultum venustate mirabilique fructu superantur.

Ham verb Orchidem apiferam quod attinet: ex
Bulbo geminato, Serapiadis fecunda? Dodonaei, sapore subdulci & viscoso, *Folia* quaedam angusta striataque, Testiculi vulpini fecundi iphegoidis à Lobelio descripti foliis fimillima emittit; atque *caulem* fesquipalmarem, longioremve, binis vel *terminis* minoribus foliis circumjedum : **cujus Gimmo, Florestres, quatuordecim in fiunt,** calcaribus Orchidum plerarumque Serapiadum de more omnino destituti, *galeam* habentes, è foliolis tribus grandioribus, & duobus angustioribus, brevioribusque albicantibus, vel carneis, immixtis & purpurascentibus conftrudam: sub qua *extuberatio* quasdam crassa, carnosae, subviridis, forma ex oculo prorepentis aviculæ, oculis eminentibus & rostro crasso adunco, curiosè adeò & lepidè se ostendit, ut illa contemplatione non modò digna sed etiam ad pretium atque admirationem flori huic conciliandam sufficere videatur: nisi gloria ejus maxima in dependente veluti lioloferico leniter & breviter villosa, ferruginea, (aut ex cinereo ferrugineo obflecto) ac ventriosae confaret *labio*-, quod Apis mellificantis cadaverculum, magnitudine & figura tam exadè, tamque repræsentat venustè, ut propter bestiolæ dulcissimæ speculum, plantae flores attingere verearis.

Hac amoena Orchis > ab *myode*, *galea* & *altis herbis*, JohannU 'Baubirih in multis discrepans j Thefaurum suum acceptissimum, in HORTO BERNINGIANO ferius aliquantulum, quam priores Orchides & frequentes aperiens j

varias inibi species offerebat: quarum nonnullarum *Jlores*, lituris five notis luteis pulchrisq;, & quibusdam praeterea circulis ejusdem coloris partim uno, partim duobus venustè adeò ornati, ut mutabilem Pro.tei vicisitudinem in iis non finè stupore atque admiratione fingulari liceat perlufrarc).

Floruit etiatn quisedam hujus Orchidis species, Anno M. DC. LXV. in *zjfnplufim*, *tSMagnifici 'Domini*, "*BE^JA^MIU^ (gngdfm* *ConfuTis Tatria*, nee *nonTatroni mei inJtgnu,Hotto*.

ORCHIS MUSCAM MAJOREM COERULEAM REPRASENTANS.

Cap. XLIV.

IN tantâ Orchidum varietate, oculos fiifficientiquoq; voluptate fâtiat *Hae*: quæ *radice, caule &c foliis* a priore Apem referehte, nihil aut parùm differt. *Flos* verb discrepat multurnj namque ejus *galea*, foliis fubviridiis, angustioribus confatj *extuberatio*, quæ *galeae fubeft* carnofa, non adeò diftin&è aviculam exprimitj & *labiunt* hirtutum- fature coeruleum, perbelle fplcndens, pilis circum margines fimbriatum fubrufis, *Mufcam* majorem tàm accuratè repræfentat coeruleam, ut non tantùm in admirationem fummam rapi Spedatorj fèd facilè etiam decipi queat, quò putatitiam hanc fbrdidam muscam, à plantâ abigere allaborer-;.

ORCHIS

ICONES CENTURIA PRIMA. 44

ORCHIS MUSCAM MA-
JOREM COERULEAM
REPR&SENTANS.



ORCHIS SCARABAE-
UM EXPRIMENS

ORCHIS MYODES
LUTEA LUSITAN



ORCHIS MYODES

LUTEA, ET FUSCA, LUSITANICA.

Cap. LXV.

ORchis myodes lutea Narbonensis Lobelii, Eotanophilis omnibus perrara ac elegantissima asstimata, *no&r# Lujitanka tamcnfloribus* palmam concedere cogitur 5 Lobelii aliàs non malè respondentibusj exceptò, quòd eorum *labellum*, Fucum majorem luteum repraesentans₅ latius , brevioribus atque obtusioribus, quàm Lobelii, laciniis praeditum, inteniloreq; aureo colore tin&um, ac maculâ in medio holoftricâ villosâ, majore, magisq; purpureâ & fpe&abiliore est donatum : *extuberatio*, galea? ex flavo viridi, fubnata, aviculam longè crafliorem, ac Testiculi apud Lobelium vulpini majoris refert.

ttAlia adhuc ejusdem, eaq; prorsus nova habetmjpēcief, cui *Orchidis myodisflore fusco*, five, *Scarab<eurn exprimentis* nomen impòfuimus. *Thyrsum* haec emittit aliquantulb altiore, colore oblŕcuius virefcenti 9*foliis* nonnunquam latioribus interceptumj cujus fumrao *Floret* infiint nonnihil fixbinde majores, coeterum ab *Orchidis myodis luteas* florum figurâ penè nihil, aut parumrecedentes, praeter *foliolum* holofericum demiflium, quod pulli feu fuliginofi coloris, Scarab^um nuelius₅ quàm Fucum exprimere videtur.

Nafeitur cum praece&entibus fpontè in Lusitaniâ 5 unde transportatas fiimmo ftudio inHor-

tofuο alendasILLUSTRISSIMUS MACE-
N AS ndfter curavit.In quo, AnnoM.DC.LXIV.
flores abundantissimè ostentantes, MajoMenfe
& Junio, infigni cum dele&atione vidi. Ibidem
inter alias.quàm plurimas partim jam defcriptas,
partim planè novas, quandam etiam *Orchidi* <tAn-
thropophora Oreadi Columna vatdè Jimilem Lujitanicam
obfervavi: cujus *Flofculi*, quà brachia, quà crura
breviores , figuram fbemina; non tamen adeò
perfeclè reddebanLj.

Tandem Orchidum Hiftoriam finiemus, le-
niter adhuc ta6tâ *Orchide, radice repente maculatisfo-
liis*, in opâcis Casfubiaefylvis, quamvis rarissim^
nalcente: Haec ab Orchide radice repente Ca-
merarii, in eo tantùm diftingvenda, quòd folia
maculis pallidis feu fublutei coloris, tefellatim
difpofitis, perbellè fint variegata: fed de hâc in
Viridario meo Borusfiaco plura_?

OXYI AFFINIS PLANTA BULBOSA AFRICANA,FLO- RE PURPUREO MAGNO.

Cap. XLVL

Rarisfima haec è Promontorio Bonae Spei in
Belgium transportataHofçes Anno M.DC
LXVII. in Horto BEVERNINGIANO
omnem laiidis adorem excedente , ILLU-
STRISSIMO DOMINO CULTORIinnu-
tricationis gratiam, *Florem* perpulchrum fuam
atque venuftum, & quidem fortè primâ in Eu-
rope

ICONES CENTURIA PRIMA. 46

OXYT AFFINIS PLANTA
BULBOSA AFRICANA,
FLORE PURPUREO MA-
GNO.

*



M 2

ropâ vice, cum fumâ illorum, qui hoc ftudium
 profeqvuntur, obledatione, obtulit. Qvi ex ci-
 nereo in quinque lacinias angustas profundè dis-
 fedo fubhirsuto calyculo, primùm pyramidali
 formâ convolutus 5 postea verb in folia quinque
 ampla, ex rubeo fâve purpurea, cum coeruleo
 colore mixta explicates, formâ florum Convol-
 vuli Indici majoris (prasterquàm quòd nonmo-
 nophyllus) fê diffundebat. Fulcrum ejus, *cauli-
 culm*cxAt fiibviridis, teres, duas tresve inciaslon-
 gus, carnosus, debilis &c tener: *Foliis* circa me-
 dietatem compluribus, pediculis longis infiden-
 tibus, laetè viridibus, crafliusculis, tergeminis,
 Trifolii fimilibus, comitatus : hujus origo ex_M
 "Bulbulo nigerrimo, Avellanse magnitudinis, mul-
 tis fâqvamis compado, cui etiam planè atrae, ca-
 pillaceae, oblique, appendebant longissimae fl-
 brae. Quantum expidurâ viviscolo/ibiisai Fabre
 exprefsa, Scab_{LL} LUSTRISSIMO DN: ABE-
 VERNINGK nobis transmissa (ad quam icon-
 nostra effida[^] coUigere licuit, Oxyos Speciem
 judicamus, hincque illi affinem voluimus, donec
 nos femina frudusque edoceant certiora.

CENTAURIUM MINUS BRASILIANUM-

Cap. XLVII.

PUlchra haec, reverà, nec minùs rara in Brafl-
 liana fœns, indeque ad nos translata Plantula,
*Rac*ca nititur flavescēte, tenui, fibrosa, uncias
 duas


duas longâ & nonnihil longiore, guftu amaro. Ex quâ Caulis geniculatus, pertenuis, ere&us, dodrantalis altitudine, caudicis loco exit j qui in fummitate, in ramos duos, quafi brachia expa-
fa₃ dividitur, & hi in ramulos rarfiis alios, im-
ciales & inajores₃ alterno ordine plerumque po-
fitos: *Foliis* oblongis dilute viricibus, Genift*
tindoriae formâ haud abfimilibus, binis iemper
adiungulagenicula, fitu adverfo pofitis cindus.
Flofcukm quidem in caulis apicfc inter brachio-
rum juncl:uram, tantum fert unicumj fed plures
tam in extremitatibus ramulorum, quam inter
foliorum illorum alas, perpulchros, purpureos,
tubuloios, in quatuor folia rotunda exeuntes >
Centaurei vulgaris flofculisduplb majores > è
calyculis ipeAabilibus admodum, quadrangula-
ribus, membranaceis & rigidiufculis, venulas
conipicuas, Ec in quolibet angulo fi'mbriam la-
tam habentibus, prodeuntes. Hos, *Capful** an-
guitx, oblong«, Centaurei minoris jemulac, *Se-
minibus* rotundis minutis ac fufcis refertae, &•
qvuntur.

SAXIFRAGA ANGUSTI- FOLIA AUTUMNALIS, FLORE LUTEO GUTTATO.

Cap. XLIIIX.

Rarioremhanc, elegantemque *Saxifragrwh*
humida & mufcofa fundunt prata quosedam
Bonufiae & Cafubiae y praefertim fecunduni
arcem

CENTAURIUM MINUS
BRASILIANUM-



arcem ftfrrttt £rafaft>/ubi Anno M. DC. LII. adhuc puer, ab Augufto in ferum usque autumnum florentem, obfervavi: in hortis autem udo, nee aprico nimis loco, repofita, aliquantibus niaturius, à Julio nempe ad medium Septembrem. Ubi ex *T^adiculis* capillaceis, flx bcandido colore & fapore aftringenti, *Tropagims* multae nibentes, pilis ferrugineis lanuginofac, integros fiepisfimè ceipites ftrpendo occupantes, emittuntur: circa quas *Folia* angufta, carnofa, fubtiliffimis decurrentibus nervulis, flint atrovirentia & rigidiufcula, per marginem fubindè pilofa, cum Polygal^a & Nardi Celticae foliis mediocriter confpirantia; quorum nonnulla in autumnò ficcefcere incipientia, proviridifuotriftem flavum feu rufum induunt colorem, infar Nardi Celticae. Inter prbpagines, *Cauliculi* dodrantes, ut plurimum fumma tellure fparfi₃ tenues, rotundi & virefcetes, inferiori parte fiibrubicundi, fuperiore molli ferruginea feu pallidiore lanugine leniter hirtuti, procrefcunt qui *Foliis* parumper minoribus temerè & confufo ordine, circa radicem densè, in fiiperna autem cauliculi parte fubindè rarerè & parcè veftiuntur. Cauliculorum faftigia in ramulos duos, tres, quatuor pluresve abeuntia, *Flofculos* admodum elegantes, Saxifragse albae, fed luteo colore tindos gerunt, quinis foliolis nervofis, in ungve appendiculas binas Gentianae duodecimo feu punctat« Clufii in modum habentibus₅ confiantes^a in quibus non finè ingenti voluptate eft cernere, quàm nitidè & curiosè Daedala Natura, punctu his innumeris faturè croceis denfiffimè illos confperfe-

O

SAXIFRAGA ANGUSTI-
FOLIA AUTUMNALIS, FLORE
LUTEO GUTTATO, FOLIOLIS FLO-
RUM MAGIS ACUMINATIS,



SAXIFRAGA ANGUSTI-
FOLIA AUTUMNALIS,
FLORE LUTEO GUT-
TATO.



fperferit, & quidem à medio usq; ad umbilicum : *wide Siliqua* fubvirefcens birurcata, loculamentis binis Saxifragiarum more diftirta, inter ftaminula decem, crbcis capitulata, prominet. Qua? deciduo flore, magis magisque intumefcit, juftamque maturitatem confecuta, per cornicula finditur ac *Semine* exiguo, flibrutilo Sc micante fcfē exonerat. Flos a?que ac folia, imprimis verb cauliculi, amariufculo & aftringente flint guftu.

Variat: Quaedam enim riorum petala magis fiint obtufa 5 quacdam magis acuminata: praetercà foliis majoribus & minoribus; dilutioribus & obfcuriùs virentibus, invenitur.

Hac in multis cum *Hirculo Frifeco Clufii* convenit; à quo tamen differt: Si *modbfflrculi* flores fenis petalis conftantes, duplici tantùm punctulorum ferie intertindti; &c folia circa radicem ac in caule tam lata, 8c unico faltem nervo plurimas laterales venulas fundente, praedita fint j ficuti in *Curis* pofterioribus *Clufii*, planta delineatur..

POLYGALA FRUTICE- SCENS.CAPITISBONiE SPEI.

Cap. XLIX.

A Fricse **Meridionalis Delertorum amafia hsc**
-c\.**nova & nunquam** defcripta '*Polygalafrutice-*
fiens, & mam munere **ILLUSTRISSIMI DO-**
O 2 MINI

ios JACOBI BREYNII PLANTAR.

MINI à BEVERNINGK habemus  *^em*
posfidet contortam & pro plants proportione
craffam, extrinfecùs cineream vel albam, intùs
candidisfimatn : exinde *Virguha* asfurgunt do-
drantalia, juncca & viridia, Spartii Hifpanici
Clufio virgulis non abfimilia; *Foliis* raris, angu-
ftis & acuminatis, vix unciam attingentibus,
nullo ordine pofitis veftita. *Flofculos* fert fpica-
tos, Polygalae vulgaris planè fimiles, quorum
color ex viriditate fvave purpurafcit. Nee Fru-
clum, nee fcmen vidi, haud tamen à vulgari
diffèrre exiilimo.

PLANTAGINELLA AU-
REA ALOPECUROIDES
BRASILIANA, FOLIIS
GRAMINEIS.


Cap. L.

EN ex minimis unam, fed rarisfimis charis-
fimisqj noftris plantulis. %*Salix* ejuse*exigua*,
mille flbris niveis comata, *Foliola multa*
graminea & angufta Graminis Luzulae mino-
ris Johanni Baunino, fed omninb glabra, in
orbem diffiindens : ex quorum gremio, *eoliew*
quinquaginta vel plures profiliunt, tenuisfimi,
plantae exilitatem (*flobulis* oblongiufculis lanu-
ginofisque, *TUntaginis angujlifolia faniculis LA**
yopi minbribus, uberrime compeñfantes, finguli,
fingulis coliculis triuncialibus vel breviori-
bus infidentes, compofiti ex pilis lenisfimis lcu-
cophaei

ICONES CENTURIA PRIMA. +9

POLYGALA FRUTE-
SCENS CAPITIS BO-
NÆ SPEI.


*



N

ICONES CENTURIA PRIM A. 50

PLANTAGINELLA AU-
REA ALOPECUROIDES
BRASILIANA, FOLIIS
GRAMINEIS.



N 2

cophsei coloris, inter quos *Flofculi* flavi pei> minuti, fumma amoenitate, veluti punctula aurea, emicant, quod jucundissimum, huic plantulae in Brasilia vigenti, aspe&um conciliate.

AMARANTHO AFFINIS INDL# ORIENTALIS, FLO- RIBUS GLOMERATIS, OCY- MOIDIS FOLIO.

Cap. LI.

HU^vxs ^>Uv^t«, ^b Itvdte eic^etiti flores vcl
potiis capitula, Anno M. DC. LXIV. à
3\j)bilisjimo Excellentisjimoq; Domino facobo (Jo-
liop. rn. TrofeJfore<t5ifathefeos&-OrientaliũLinguarum
Lugduni-'Bauvorum mihiostenfa,* & poflmodum
àFilio ejus (zAmplUfim &• J^oM'sJfmo 7)tu Domino
Theodoro(folio f» V. Z). Civitatis Lugdtmi^Batavomm
Confulari, nomine *Florum'BataomisfoL*: paucos an-
tè annos ex India ipsa pro%ta/^Inaorum, una
cum planta ficca, nee non fiuculibus & femine,
ad manus meas pervenerunt. Hujus *dua dan-
tm Jpecies*, utraque, fi flores feu capitula exci-
pias, eadem, qua Lychnidis ocymoidis flore
purpureo, facie^.

Trima, Jive flore albo: Caulem rotundum, pilo-
fum, geniculatum, medulla nivea fpongiosa re-
fertum, & complurimis ramis dirTiifum, ad bi-
pedalem altitudinem erigit: *Folia* ex intervallo
in contrariis lateribus, alterno ordine & cruci-
formi pofitu proferentem, lychnidis ocymoi-

no JACOBI BREYNII PLANTAR.

dis flore purpureo foliis, temperatè virentk, &c
molli lanugine tàm fiipernà, quàm infernà parte asperfa. Ex horum finu aliquando fimul cum ordinariis ramis, ramuli etiam alii minores exoriuntur: quorum aequè ac ramorum ordinariorum fummo, pervenuftum, gratum oculis opus reddens, globofum infidet *capitulum*, effigie 6c magnitudine penè Lupuli follicularium fruduumj foliolis duobus plerumque, vel quatuor etiam aliquando, Globularise in modum *luteæ* Columnns, juxta basin circumvallatum. Hoc inquam *Capitulum*, ex innumeris, femilunaribus, compressis, Gnaphalii Americani florum squamulis asqualibus membranaceis, argenteo candore nitentibus, compadum est *glumis*; quarum binx semper conjugate, *utriculum* chelarum figurâ efficiunt; ex cujus cavitatis centro *Flofculus* admodum parvus & quinquepartitus, Amaranthi quodammodo respondens, sed omninò niveus Sclanuginofis, tenerum intus tubulum comprehendens, emicat. Qvi successu temporis indureicens, ac ampullulæ in formam crassescens, densâ lanugine candidisCmaita obducitur, quasi humanâ indutria goffipio involutus esct: ac *Vasculum* admodum ptuillum coniforme, ex tenui pelliculâ confedum, Amaranthi fimileoccult 5 in quo *Semen* orbiculare unicum, cum Amaranthi pariter conveniens, sed altero tantb penè majus ac fubrubicundo colore, continetur.

d/Iteraspecies, five flore purpureo: minor nonnunquam & frigofior, magisque ramofa se ostendens, Capitula profert minora, ex lepidisfimis, veget Rosarum purpure nitentibus, oculosque hilari*

ICONES CENTURA PRIM&. >I

AMARANTHO AFFINIS

INDIA ORIENTALIS, FLO-
RIBUS GLOMERATIS, OCY-
MOIDIS FOLIO.



N 3

ICONES CENTURIA PRIMA. 52

AMARANTHO AFFINIS
BRASILIANA, GLOMERA-
TIS PARVISQUE FLO-
SCULIS.



hilari luce perfringentibus glumis, Gnaphalii montani purpurei fiorum squamulas mentientibus, compofita. Quaeob venustatem formae ac pulchritudinem, ab Indis, filorum, quibus flores (*JM'ogorri* trajeant, extremitatibus, globuli loco ornatuſq; gratia, anneduntun eo modo, quo in Ephemeridibus Collegii Naturae Curiosorum annitertii, figurâ t^Sfc[^]om repra[^]ſentatur.

Prater has duas, *tertia* etiam[^]frwinBrafiliâ reperitur, cujus figura inter Icones paginâ 52. per errorem poſita. Hxc nonnihil altior, quàm Afatica flore albo excreſcit; caeterum cum illa convenit; exceptò, quòd *capitula* ejus minora, & ex minoribus glumis compofita, ac circa baſin (quantum obſervare potui) foliis nullis circumvallata ſunt. An, *Planta ex qua fit Anil aliajpecies*, e *argemii*?


THE SINENSIUM, SIVE TSIA JAPONENSIBUS.

Cap. LII.

T^he compluribus & denſis ramis eſt *Frutex*: *Foli*U obſcure viridibus, per circuitum ferratis, non tàm Chamaeſeagni, quàm Spiraeas Theophraſti, ſiibſtantiâ & toto habitu ae[^]uali-
Dus, ſaporis exſiccantis cum quâdam amaritudine: *Flores* proferens (quantum ex pi^hira³, & duobus, at imperfectis *, ex Japonii tranſmiſſis floſculis conjicere potui) Cifti foeminas 8c Goſſipii mediam faciem obtinentes, uberrimos, qui-

ii2 JACOBI BREYNII PLANTAR.

THE SINENSIUM, SIVE
TSIA JAPONENSIBUS-



nisfoliolis albicantibus aut pallidis confiantes.,
 ftaminulis multis medium florem occupantibus.
 His demum succedunt *FruBus*, dum adhuc vi-
 gent (utferunt) virides, reficcati autem cortice
 magis rugoso, ex fpadiceo fusco veiliti: in qui-
 bus non minùs quàm in Coccis Orientalibus ,
 mirabili varietate mutabilis Vértumnus ludit.
 Quidam enim penitùs globosi inftar di&orum
 Coccorum, eâ etiam maenitudine, aut duplb pe-
 ne aliquando sunt maiores, Semen tantum uni-
 cum *contmentes*: alii contra geminati, five in
 duos *loculos* ceu scrotum caninum *dispertiti* :
 alii verb trigoni, formâ & magnitudine, a *Frit*"
8u, *%icino femili, fohannis 'Bauhini, rion admo-*
dùm abludentes j hi maturi ubi le aperiunt, in
 tres j illi in duas, dehiscunt partes, quarum quae-
 libet *Semen* continet: quod vel orbicularis planè,
 ad Styracis; velquia minùs fplendet, ad *FruHum*
exoticum XV. d' facobo Qareto acceptum, Ctu/ii, pro-
piùs accedens, vel in unâ parte iesfilis, nonnun-
quam etiam triquetra est Nucula, tenui putami-
ne & laevi, fpadicei feu iùbrufi coloris, exce-
ptâbafi (quâ parte adhaefit) albidâ, confiansj
quo Nucleus fiibalbidus pallidusve, ac valdd
{fortajje quodd à faponenfibm > fiimulante invidiâ, aqvâ
decoBus, nè apud exteros qvóp plantetur; vel vetutta-
te cormptus; vel antè maturitatem leBw, vel in longinqvo
itinere, continuo ardore Sofa, nimium exficcatu) rugo-
 &s, guftu primùm dulci, postmodùm amaro &
 naufeabundo, tandemque calido & valdè exfic-
 cante , cuticulâ tenui cinereâ obdudus, coiiti-
 netiir.

Plura qui de Frutice hoc nobilissimo (*fui propter fruBûs diver/am formam, tarñ unicapfularibus, qvkm bi-&- tricapfularibus accenferi, & pojl Evonymum baud inepte locari poteſl*) fcire defiderat, cõfulat Johannem Petrum Maffeum Rerum Indicarum iibro VI, pag. 108. & lib. XII, pag. 242. Ludovicum Almeydam in eodem opere, lib. IV, feledt. epift, Petrum Jarricum Tom. II, lib. II. cap. XVII. Matthaeum Ricium de Chriftian. exped. apud Sinas lib. I, cap. VII. Aloifum Frois, in Relat. Japonicâ. Nicolaum Trigautium de Regno Chinae, cap. III, pag. 34. LinfçOtum, capite XXVI. de Infulâ Japoniâ, pagini 35 & 36. Cafparum Bauhinum in Pinace^ pag. 147. Berrihardum Varenium in defcriptiotie Regni Japc>niae, cap. XXIII. pag. 161. Johannis Bauhini, Hiftoriam Univerſalem Plantarum, Tomo tertio; lib. XXVII, cap. I, pag. 5. b. Alexandrum Rhodium, in fiio traftatulo, cui titulus: *Sommaire des divers voyages & zSbfifions Jpo/ioliaves du R^ ¥. Alexahdre de R^yodes de la Compagnie de fefwa la Chine & autres R^jaumes de l' Orient, dvec Joñ ret our de la Chine, à Ityne; de puts l'annee' 1618. juſques a' l' Annee 1653.* pag. 25. Nicolai Tulpii Obſervationes Medicas, libr. IV, cap. LX. pag. 380. Adarni Olearii %>txfiani\$ i 0Je<f^©ef\$inton0/lib. V, cap. XVII, pag. 599. & 600. Johannis Alberti Wrt

lib. I, cap, Xt, pag. 30. Olai Wormii Muſeum, lib. II, cap. XIV, pag. 165. Martini Martini Atlaiitem Sinicum. Dioiiyfii *foncqvet*, Stirpiurri aliquot paulbobfçuriùs Officinis, Arabibus aliisque denominatarum, per Calparum Bauhinum expli-

Explicationem, pag. 25. Jacobi Bontii Hiftoriam Naturalcm & Medicam, libro 6, cap. i, pag. 87, cum annotatione D. Pifonis. Simonis Pauli Commentarium de Abufu Tabaci & Herbae Thee : item ejusdem Quadripartitum Botanicum, Claffe fecundâ, pagina 44. & 45, ibidemq; claffe tertiâ, pagina 49 3. usq; ad pag. 49v *Wilhelmi Leyl* epistolam, apud Simonem Pauli in Commentario de abufu Tabaci &c: pagina 15, b. Joannis JltCU-\$tf\$ ®^amf<\$ap *an ton Kctjcr van China*, pag. 122, 123. &: 124. a. Eratini Francisfi Q. un b

ustund Stats: ©artmp. 291, 292. &c. O. Da pprs Be f^vinge ^ Xetjcrpf* f^an 7^//% of 6<na/p. 226. 227. 228. 229. Arnoldi Montani ©ebWfWactWfle @^fan&tfc&appett am be Katfarm t)an Iapan, pag. 5. Athanasii Kirchneri Chinam Illustratam, & alios de eo tra&antes.


Icon, quam damus, maximam partem ad figuram *Excellentissimi Domini (jmlhelmi ten %hync* Medici, Botanici & Chymici Magni Imperatoris Iaponiae, manu artificiosissimâ ad vivum coloribus expreffam, confecta; quam cum fructibus ILLUSTRISSIMO DOMINO HIERONYMO 4 BEVERNINGK ex *Infula Decima* Anno M. DC. LXXV. transmittit: Qui eandem mihi, Curioso Lectori hic repraesentandam, cum fructibus feminibusq; multis, ex fingulari favore, gratiosissimè concessit;.

RICINUS AMERICANUS, TENUITER DIVISO FOLIO.

Cap. LIIL

Eⁱ purgatrice *Avellana a Monardis*, sub nomine Hispanico *5*Medicina del Spanje*, ex India Occidental, transmissa, in horto plantis insignibus exoticis abundante, *DtybiHsfirm Domini Jobannis Hgeteri p. m. Amstelodami Anno M. DC. LX.* Planta rarissima enata est, *Tapaja* penè arbusculæ junioris formæ; quæ toto æstatis autumnique tempore vix {esquipedalem altitudinem obtinebat. Ea porro *Planta*, & radice, *Caulem* redhim, laevem, rotundum, geniculis omninò destitutum edebat, pollicaris crassitie, ac iuviridis cum purpurascente quodam intermixticoloris, *Serpentariae*q; instar maculis obfoletis aspersum. Hujus frangium *Folium* ornabatur, inferius glaucis, superius atrovirentibus & splendentibus, magnitudine 6c divisiora. *Aconiti* feu *Geranii batrachiodis*, similitudinem autem *Ricini* & quodammodò etiam figuræ: quæ in septem, octo, novem, imò & decem, acuminata, à Coronopi foliorum instar, laciniata segmenta (in quorum singulis nervus nifcens è folii centro exporrigitur) ad Gyrum, in quo segmentorum nervi cœunt unde & pediculus longus averfo foliooriebatur, dividebantur. Inferiora horum foliorum laetissimum ad tempus virorem cum luteo tristi commutabant colore, atq; tandem

RICINUS AMERICANUS
TENUITER DIVISO
FOLIO.



demdecidebarit₅loco fuperioribus conceflb, relidis tamen quibusdam ūbviridium macularum incauli veſtigiis. *Flores* nullos proferebat, multb minùs *Fruſus* 5 quorum tamen poſtremorum copiatn *Domima* ^l(oeteruSy & • *Dominus fohannes Comelyn Senator oAvnftelodamenfis*, cū variis peregrinis frudibus & feminibus humaniſimè mihi dono fuppeditarunt. *Hi* Iuglandis minoris ſunt magnitudine ac ferè facie, rotundi nempe, & à medio corpore paulatim in mucronem definentes, cordisqj humani formam quodammodb repræſentantes j tenui è cinereo candicante, nonnunquam ad fiifcū inclinante cortice, lento 8c molli conſtantes: quiexteriùs ocl:o nervisâfūmmo ad imum dudis, fibris frequentibus intercurſintibus, diſtinguitur: & interiùs₅ in conca-merationes duas ſeparatur 5 In quarum qua' vis *Semen*, magnitudine, colore ut & figurâ, fermè *Avellanam* exoletam, vel potiùs (cum penè triangulare, & alterâ parte* ſemper planum) *Caſtanel-lâm* peregrinam *Johannis Eauhini* referens, continetur; putamine tenui: *J*(ucleo (qui malè concavus à ſculptore fadus) cāndido, fblido, ſubdulci, ſubſtantiâ *Avellansc* haud abſimili. Qui in *Medicinâ* apud *Hiſpanos*, in *Indiâ Occiden-tali* degentes, percelebris, & alvo evacuandas ſcrvit: De quo *Monardem* interim *Ledor* con-iūlat *Curioſus*, donee in *tertiâparte* hujus *Centu-ria*, plura percipiat^.

RICINUS MINOR INDI- CUS, SOLANI FOLIIS-

Cap. LIV.

Sunt mihi ex India, de *%kiño* hoc *minore Solam* folus, *%ami* fcsquipedalis longitudinis duo, teretes, *glabri*, inanes, diluto virme tine* ac *enodes*: quos è contrarib correspondentia *tdu*, *laxis*, *dentibus* circumferrata, *pediculis* pene uncialibus innitentia ambiunt, Solani non admodum disfimilia, longiora verb, magisque xenofa, ac teneriora, & fubftantid Ricim, eo terme etiam colore. utpotè fuperitis faturata, infcnus ddute virentia, ac ibidem nervum, venas, fibrasqi magis confpkuas habentia. E fingulis hommalis, finguli furculi *Flofiulos* longa Iric mufcofos racematim fustinentes, unclales Vominent: in quorum nonnullis, *Fru3us* jam^f unus, in alijs jam duo, pedunculis teneris dependentes vifuntur miquetri, magnitudine, forma & colore à Lathmidis nihil discrepantes, nifi brevi quadam incanâque lanugine, infar Tuliparam caulium, afperfi effent. Hi maturitatem adepti, dishliunt in tres capfulas : quarum qu*libet in partes duas cum impetu fe aperit, & *Semine* colons hvidi, Lathiridis non majore, aft magis lplendente, macuhsque nigris, Ricini in modum mapnis è Gvineâ, eleganter variegato, fe exonerat. *Hwmtuhic novus* &>««««, fimilitudinem aliquam cum 3%w *(*ucleis tsfcofi**) habere videtur, fi Foha, Flores & Frudus, cum Acoftae

figura



figurâ confiderentur. Aft %cInus noBer PJanta tantùm eft haudgrandis, cum ArborcmTineosnucleos zOMahcanos ferentem, magnitudinePyri, afle-
izti&fcojla; hujus Seminajivc lit perperamvocat
Tineos nucleos> ex MagniMogolis Imperio accepi-
 nius, eâ magnitudine 8cfâcie, quâ Ricini vulgaris,
 quæ tatiien foris fufci coloris h̄int, cum aliquâ fla-
 vedine, intûs verb nivei, faporis (ubdulcis, mox
 verò os faucesq̄j, inftar Laureolae baccse, inflam-
 mantes. Haec validisfimè bilem & pituitam fiiper-
 nè ac infernè purgant, & ab Aromatariis quibus-
 damcuriofis, nomine (quâ ratione, fûm nefcius,
 & an non forfan vox ao'(jr̄anadillâ malè petita)
(frana Tilli venduntur.

DATURA INDIGA FOLIIS MALABATHRL

Cap. LV.

Daturarn <zjfcosta, & turpisfimo feminis abu-
 fii, & mirando effe6hi fatis famofam j non-
 nulli *Daturam Clufii, five Turcarum 'BeJleri* vo-
 lunt: de quo tamen femper, cum *Datura Aco-*
ftx fru&us & fēmen mihi magis ad Stramonii
 accedere videantur, addubitavi. Et quidem
 non planè fruftra. Nam cum *Datura vera Indo-*
um Semenmagnâ mihi copiâ Anno 1669. ex
 Indiâ allatum, Stramonii illud perquàm fimile
 reperij ex quo plurimac etiam enatae Plants,
 quæ Stramonip Agyptiaco, (*Datura Contarena*
 ab Alpino dido) ita congruentes fuerunt, ut
 nullum

nullum in utroque discrimen animadvertere potuerim. Nonnullas quidem subviridem habebant caulem[^] pleraeque verb profunde violaceum, Iplendentem, & quasi guttulis intertin&um;

Casterum fieri potest, ut *Datura Turcarum*, 'Besleri, in India quoque *Datura* nuncupetur. Plurimas enim in India dari plantas *Datur** nomen ibidem obtinentes, certum est: neque hoc è verbis tantiim zAcoftai sed ex Ramo etiam, antè sexennium ferme ex India^{fi}ib nomine *Dotterfive T>utroa* (ita enim *Datura* hodiernis Indis & Batavis eo in loco degentibus, vocari fertur) mihi transmissib patet. %amus ille ipcdalis est longitudinis, quadrangularis, hirtus & frequentibus internodiis distinctus: cui *Folia* ex adversb bina adnata sunt₃ uncias quatuor aut quinque longa, duas lata ubi latisfima, nervis, venis & toto habitu Malabathrum exquisitè repræfentantia, nisi quòd substantiâ miniis fblidâ, magis herbaceâ, ac in utrâq; planitie pilis albis, brevibus atque subasperis, ficut & petioli illorum parvi, quibus innituntur, sint obfita; Efoliorumortu, ramusculi eodem ordine 5c ferie, quo folia ipsa procreverunt, foliis itidem geminis; sed quadruplò minoribus condecorati. Geniculum autem superius, ramulorum loco, *Flores* binos, & rami cacumen quaternos, in angulos quatuor aut quinque definentes, Hyofcyarni haud dissimile[^] > sed ex calyculis plane hirsutis, asperis&veluti argenteis, prorumpentes, ostentat 5 quorum observare colorem non licuitj neq; de frudu&femine, an Daturas vel Stramonii redds aequiparanda, quicquam certi habere potui.

An

ICONES CENTURIA PRIMA. 55

DATURA INDICA FO-
LIJS iMALABATHRI-



O 3

An Datura .tertia Acpfhe, aut Hyofcyami tantum species, ob fcminis forsan efficaciam Datura di&a> Hyofcyami enim femina Daturae prof&b maximè reipondet viribus, quemadmodum clapfb abhinc triennio è puellâ fex annorum meo in horto , qua? Hyofcyami Semen, Papaveris loco cômederat, clarè effulfit. Haecpaulb pòft ftupendis correpta Symptomatibus, nunc Simias. geftus exprimere, nun^ mira cantare, nunc dilacerare veftes, aliasqj tractare affanias, nunc veluti infâna parietes infultare, & ex angore animi, velut furibunda inne&ere lè brachiis praefentium coepit, quod ultra duodecim horarum fpatium duravit, donec tandem vomitorio & Theriacâ adhibitis, malû non nihil remifit: quanquam & frequenti adhuc die mira fiipererat animi perturbatio^nam&ctunc continuè manus verfâbat, velliebat vefles, ac fi in maximas adducta anguftias, admisfbrum omnium ignara. Poftmodum planb convaluit, & in hunc usqj diem vit4₃ finè uflâ capitis noxâ&iânitatis detrimento, fruitur.

ALCEA JAVANICA ARBORESCENS, FLO- RE PLENO.

Cap. L V L

INter <id"lce(tsl qua; affinitatem quandam cum
Gof p io habent le^ / vae mu ta g enera, nâ is-
crimine, à nonnullis immifcentur: quamvis *Al-*
cea & sZftddva, duas fint plantae toto coelo diffe-
rentes.

rentes. <£Maha enim in medio floris femina circa ftylum nutritivum orbiculatim in pafilli formam congefta, palàmſubjicit oculis : z/lcea verb ea in vafculo iëminali, in quatuorvel quinq; capſillas diſtin&oecontrarib occultatj &hujus duo praecipuè occurrunt genera. Alterum, fructibus oblongis, 7\$amia j alterum brevioribus & utplurimùm rotundis, Jlcea nuncupatum, dequâ Plantas, Frutices atq; Arbores habentur.

TUnurumimhoxxk noſtris vigentium, e/to vejtcaria Capitis TZona Spei, vilisfima non eft cenfen* da. Haec vulgari eft plerumq; fruticofior & obfcuriùs virens j r^winnftru&apluribus, hirtutioribus, minimè verb aculeatis: Foliis minoribus, rotundioribus magisqj glabris: Vefimlù feu Calyculis triftioribus, pallidis vel magis vireſcentibus, H-neas dilutiores ex ferrugineo ruſeſcentes habentibus 5`e quibus Flores nonnihil elegantiores explicantur.

Inter Fmtices atque Mores, non poſtremum meretur locum, dlcea arboreſcens Syriaca, quae jam in hoſtis Europads, albis, carneisjurpureis & rubenti* hits occurrit floribus: cui antecellit %>fa Sinenſis tàmfoliojior>qm̀mfoliofa>& qvinqueſoliaFerurii; nobis Jlcea Candabarenjis arborea^pampineis foliis, flore mutabilijimplichpleno, &folio/tõre. Atque huic raritate fuâ palmam extorquet, ^E^fa TSAtavico-Indkainodora, feuz5Mahafruteſcens rubra &pallida, Bontii; nobis (uflcea arboreſcens favanica flore mbicundo, & cameo ſimplici : de quâ ſequentes admodùm elegantes ipecies, ex Indiâ obtinuimus.

Trimajivc Jlcea favanica arboreſcens 7florepleno rubicundo: Frutex peramoenus jucundusq; eft, ad pergu-

ALCEA JAVANICA AR-
BORESCENS, FLORE
PLENO.



pergulas_f texendas valdè idoneus, Rosarum ex-
 crefcens altitudinem: quicompluribus oblèquio-
 fis, tenuibus & lentis Ligustri inmpdum divari-
 catur viminibus: per quæ *Folia* cernere licet, lon-
 gis innitentia pediculis, aurículas circa caulem
 habentibus, laevia, tenera, lætè virentia, digito-
 rum triumvel quatuor transverforum longitudi-
 ne, latitudine duorum triumve, crassib₃ modo in
 ambitu dentata, Alca? junioris Syriacæ figurâ j
 aut si minora tantum confideres, cum Gelfimini
 Indici flore phoeniceo Ferrarii foliorum extremis,
 lobis , tam formâ quàm consistentiâ admodum
 convenientia. E ramorum extremitatibus, &
 foliorum proximorum fède, *alabaflri*, circa tem-
 pus floriferum germinare incipiunt virides tria-
 tique₃ longis suffulti petiolis, & à basi usque ad
 medium, foliolis anguillifimis > veluti cancellis
 ita obsepi; ut calyculos eorum geminos jure me-
 ritoque existimare posses. Horum alabastrorum
 singulicū maturitate in quinque lacinias dehi-
 fcentcs, *Florem* admodum ipe&abilem & amplum
 Alcise arborelcentis Sydacæ fimilem 5 petalis
 quinque rubicundis constantem, expandunt: cu-
 jus medium occupat triuncialis fermè stylus, cro-
 cispavonino in apice coronatus, & ab imo usq_j
 ad summum, modò multiplici foliorum fctulu-
 xurians, modò quinis quaternisve foliis, triplici,
 Quadruplici aut numerosiore ferie ita cinctus 5 ut
 nos vel densissimâ foliorum compage omnino
 plenus, vel quasi tres, quatuor aut quinq_j flores
 alii ex aliis enati, spectaculum intuentibus jucun-
 dum oblectationemqve prasbeant.

Altera Species, five Alcea favanica arborefcens flore pleno cameo: nihil peculiare poffidet, in quò a jam delineatà differat, praeterquam quòd Flores ejusdem, (quæ etiam obfcure vel planè nullius odoris) carneo peramoeno colore infecti fint. Inde plura de illà fcribere fupervacaneum judicavi. Non minùs tamen quàm prior, nervis multis per longitudinem foliorum floris difcurrentibus diftin&a. Utraque in hortis Indiae, velut apud nos Rofa colitur.

ALTHAEA AMERICANA PUMILA, FLORE LUTEO SPICATO.

Cap. UVIL

A *Lthaa* & <£*Mafoa*> Sorores duse, perguàm fibi fimiles, femina circa ftylum nutritivum archè in orbem difpofita, formà cafeoli gerentes, parvoque diftantes discrimine: *hac* tantùm eb, quòd magis herbacea plerumque fit, &c Semen in rugofioribus pericarpis ut plurimùm contineat: *ilia* verb, quòd plerumque lignofior, hirtior & fruticofior excrefcat, ac Semen in pericarpis hirtioribus lanuginofioribusve magis comprefum offerat j cui *Akhaam fequentetn Americanam fubjungo.*

Hac Planta lignofa, ramofa atque humilis eft, molli lanugine hirta: *Fohis* Althac vulgaris minoribus, pediculo longo cauliculum alter-

ICONES CENTURIA PRIMA. \$7

ALTHiEA AMERICA-
NA PUMILA, FLORE LU-
TEO SPICATO.



P

alternatim ambientibus; cujus in fummo *Flo-*
fculi quinis foliolis flavis conftantes , densè in
 fpicam congefti cernunturj originem è caly-
 culis gemin[^]tis ac villofisfimis, quorum quisqj
 in partes mucronatas quinq; divifiis, petentes :
 floſculis delapſis fiiccedunt *Semina* comprefſa,
 pericarpiis lanuginofis inclufa, qua? ftylumnutri-
 tivum circulatim & ardè ambiunt, 8Q dimidiò
Althaea? noſtratis funt minora. Abundat in lo-
 cis fàxofis *Infulae Corocao*.

GERANIUM NOCTU OLENS ^THIOPICUM, RADICE TUBEROSA.

Cap. LUX.

DE GeraniotrifiHerbariorum,qu6d jam an-
 tè complures elapſbs annos, inEuropâ po-
 tenti noſtrâ, totum Geraniorum genus praepr-
 mis nobilitavit;, eorumque gloriam maximè ad-
 auxit, fe verb ipſum in cultioribus viretis, târn
 raritate,quàm merâ in florem colledâfvavitaej
 eâque jucundè olente, & notabiliodoris proprie-
 tate expetendum commendâvit: nullum,praeter
 Cornuti, defcriptum invenioj cùm tam envariae
 ejusdem ſpecies circa Promontorium Bonae Spei
 reperiantur. De quibus primus omnium PER-
 ILLUSTRIS ac GENEROSUS HEROS,
 DOMINUS DOMINUS 4 BEVER.
 NINGK très fequentes in Belgium, fumma
 cum Botanicas Scientiae Cultorum voluptate,


transferri curavit, quæ in florifero Ejus Horto lætissimè virentes floruerunt omnes, atque ex parte etiam Semina tulerunt.

PRIMA SPECIES,

Jive

(*geranium nobis olens jfethiopicum, radice tuberosa, foliis* csmjrrhidis latioribus.*

Tuberosam agit *Jivem*, obfoleti coloris purpurei, peramplam & crassam, crassisque balanis, colore & formâ junioribus Carotæ flavæ radicibus haud abfimilibus præditam: quæ, antequam à terrâ erumpit, in furculos aliquot veluti propagines fubinde facescit palmares, *Folia* emittentes Geranii trifidis *Cornuti* majora atque æperiora: ex horum gremio *Caules* deinde in pedalem majoremve elevantur longitudinem, rotundi, inanes, ternis ac quaternis longè distantibus, foliofo margine fimbriatis intercepti geniculis in quorum fingulis Folium conspicitur, inferioribus terras proximis longè minus, in primis, quò altiore in caule gradum obtinet. Sequuntur *Flores*, caulium & pediculorum in cacumine quibusdam foliolis radiato se repræfentantes, novem vel decem in umbellam dispositi, Geranii trifidis *Cornuti* non nihil majores; qui in *Fructus* longos, rostri gruinalis instar formatos abeunt, *Semen* oblongum continentes, coloris (nisi me fallit memoria) olivacei, cujus non solum cum plantis integralibus præterea coloribus vivis affabre illustratâ, Anno M. DC. LXIX. per ILLUSTRISSIMUM DOMINUM à BEVERNII & IGK particeps factus in Anno jam



ERAN.
OCTU
LENS
THIOP
ADICE
BERO
FO
IS
NGU
IORI
S.

CIRANI UM
NOCTU O-
LENS Æ-
THIOFIC UM
RADICE I [-
B LT^OSA >
FOLIIS LA-
TIORIBUS.]

jam pñecedente, ILLUSTRISSIMO etiam huic MACENATI vivâ radice, & ficcâ ipsâ, me exhilararc plantâ complacuit. Ex quo non minùs TANTI HEROIS Cura in promovendis ftudiis laude dignissima, quàm fumma in me immeritum benevolentia, Sole clariùs meridiano effulger_>.

vfLTEltJ STECIES.

Gⁱ *Eranium noBu olens JEthiopicum, radice tuberofâ, foliis a5\dyrrbidis angustioribw, mihi indigiturn :* Priñiac fpeciei in omnibus est fimile; nifi quòd *Flores* ad purpureum obsoletum inclinent colorem 5 *Folia j*; in lacinias plures & angustiores disfe&a, quorum pediculus nonnunquam magis purpurascit.

TE'KTIA STECIES.

R *Adicem* habet pariter tuberofam, *Folia* verb *Aquilegiae*; inde etiam *Geranium noBu olens jEthiopicum, radice tuberosâ, (tAquilegia foliis di6ta.* De quâ in posterurñ, nee non de aliis fpeciebus quibusdam novissimis, quarum piduras *Excellentisfernus* ©. *Wilbelmm ten tyne* nobis Anno M. DC. LXXV. ex Promontorio Bonas Spei transmittit, plura, Deo volente, subsequenter.

Hâc vice à contemplatione Geranii triftis formjB, ad florum inefFabilis, fvavitate praecllentis Moichi, odoris dignissimam admiratu proprietatem convertemur. Hi enim Flores, instar *Hesperidis Theopbrafi* 9 influxum illucentis Solis*^a de6 alpernari videntur, ut ferè integro die nulum j cum Lunas verb accessu odorem inenarrabilis fvavitatis, è meatibus, (invifibj^i modo, fermè

fermè ficut *Colocasia* humorem aqueum è foliorum venis ac poris vifibiliter) difflundant: qui intempcftâ quodj node ad Auroram usque perfeverat, ftatimque cum Solis praefentia. evanescitj quemadmodum illud zCorno jam annotatum, cujus de fiipra di&is caufis, haec est animi fententia: cùm floris fiibftantia rarior, & odorifer humor oleofus, valdè fit tenuis, per apertos meatus levisfimo calore Lunae fideris evocatus, Ipirat fragrantiffimè, intenfiori Solis verb difsipatur. Atque propterea ejusmodi flores interdiu odore deftituuntur, quoniam, inquam, illorum humor oleofus à Sole ita diminuitur, ut inefficax fit atque ineptus fVavitate fuè ferire nares. Et quod de Geranii florum odoris Natura, Naturaeque caufis, jam expedivitnus breviterj etiam de Plantarum omnium, quibus eadem indoles, •intelligendum. Hie verb *no** *tandum*^ quasdam hujus Naturae Plantas, *pro** *prietatem* mirabilem, multb meliis atque clarit̃s exferere, quàm alias: quaedam enim interdiu propemodumnullum, nodu verb fragrantiffimum exhalant odorem; ut (*feranianoBu olentia** *Arbor trifiisy He/peris tårn Tannonica quàm Syriaat*-' è contrarib quaedam etiam interdiu odore quodam; fed multb languidiori quàm nodu, mnt prasdita. Cauſa verb, cur iliac interdiu Plantae lunares etiam fragrent, haec est • quodd earum humor fulphureus ac oleofus, ccpiofior & crasfior, qui calore Solis non adeb,uti priorum, exfugi & confumi poteft, c^u-jus generis perplures reperiuntur, atque *ir\tct easterns fyucojum, Viola, Datnafcena, Super fa**^{ore} *pi %* *.

*pleno: ut & %ofa Egleria fo(ia, quorum fragrantia etiam pōst frigiduſcūlam pluuiam, pra>fertim die in veſperam inclinante, perceptibilis magis animadvertitun idque partim, propter eorum copiam.& magnitudinem, quæ recolledis quadantenus fulphureis ſpiritibus, quamvis illi parcè tantūm prodeant, attamen tār̃ multis viis ſe exferentes, validum ſatis excitant odorem jpartim quia craſſis eorum ac viſcoſus humor refinofus, ipiritus volatiles ſilphureos magis confringit, quapropter diſſipari non penitū̃s, eoq̃ citiū̃s iē recolligere poſſimt. Et ſanè, quòd Roſa Egleria pro foliorum abundantia, in Geranii triſtis florum paucitatis comparatione, nodu odorem haud fortiorem offerat, in cauſa eſt, ipiritus ejusdem fulphureos non tār̃ eiſicaces & ſiibtiles, humoremque eos confringentem craſſioris conſiſtentiae eſſe. Atque hæc me^ pro tenuitate quidem opinio, quam etſi publici juris facere non erat animus, tamen moveri me paſſis ſiim. Tibi verb Modeſte Curioſcque Lector, meliora explorare, in quibus erravi rejicere, & ſi aliquantifper ſemitam inii, viam clarioi*em aperire licet.*

GERANIUM JETHIOPI- CUM MYRRHIDIS FOL: TERT- FLORE MAGNO STRIATO.

Cap. LIX.

G^l *Eranium JEthiopicurnzZMyrrbidis Folio tertium;*
pedales & cubitales profert *caules* hirſutos,
R partim

partim virides, partim rubentes, geniculatos, ramiferos, quorum articulorum juncturis pinnae duae cartilagineae annexae, & *Folia* longis pediculis adhaerent subhirsuta, plurimis segmentis divisa, crenata, & per oras aliquantulum rubentia, faciem mediam inter Geranii Apuli, Coriandrifolio *Columna*, & Geranii trifidis *Cornuto* folia minora, obtinentia, *Flores* in umbella pauci, carnei, speciosi, fructibus purpureis insigniti, foliis quinque amplis, ad imum angustis, conflatis, & calycibus longis, hirsutis, quinquepartitis, exeuntes: quibus *Frustrum* rostratus, & *Semen* Geranii Apuli, Coriandrifolio, succedit.

Perelegantem hanc Geranii Speciem, nusquam, nisi apud ILLUSTRISSIMUM DOMINUM HIERONYMUM A BEVERNINGK, cui ex Africano Bonae Spei Promontorio florum varii generis abundantissimo > Anno reparatae Salutis MDC. LXXIII misimus, vidimus.


CARYOPHYLLATA MONTANA FLORE PLENO PROLIFERO, FOLIO HEDERA TERRESTRIS.

Cap. LX.


G Caryophyllata illa perelegans, a Clusio pro montana tertia, expressa ac descripta, in Borussia etiam nostra nascitur, tam simplicibus, quam plenis, immo nonnunquam etiam proliferis floribus.

ICONES CENTURIA PRIMA. 59

CERANIUM iETHIOPI-
CUM TERTIUM, FLORE
MAGNO STRIATO.



ICONES CENTURIA. PRIM A. do
CARYOPHYLLATA
MONTANA FLORE PLE-
NO PROLIFERO, FOL. HE-
DERI TERRESTRIS.



*ribus. Hujus autem pulchritudinetn Scdiverit-
tatcmz Caryophyllata aqvatica nutantejlore, nutrimcn-
to tantum fuperfluo ac abundantibus pluviis ad-
foibendam, & mutuata ad breve temporis fpa-
tium raritatem, minime durabilem, altero pof-
anno, pereunte hoc adfcito decore, in vulgarem
fiam faciem recedere exiftimo: quod clarius
evolvere in Firidario mco. Bormfiaco meditor.*

Hic verb quandam e jusde penes fpeciei, ab aliis
Caryophyllatis omnibus, quas unquam confoexi,
diverfam fifto. - quae aestimatione non indigna, five
peculiaris fit fpecies, five nobilis forte ab aquatica
vulgari nutante flore tantum varietas 3 quod liqui-
db confirmare non poffum, cum non nifi unicam
plantam, S vecici belli tempore, ex Cafsiibia B mon-
tibus menfe Majo florentem, acceperim. 'Radix
ejus, Caryophyllatas aquaticae tarn colore, & fa-
cie, quam fapore prorsus refpondebat, in aliquot
pariter diducta propagines j ex quibus *Folia* He-
derae terrestris paria, orbiculata fere, per ambitum
modice ferrata, 8c leniter crilpa, pediculis fcs-
cunciatibus innixa virebant; quorum unicum
duntaxat lobulo exiguo, rotundo, utrinque circa
bafin auriculatum. Haec interfolia, *cauliculus* pal-
mas is, erectus & firmus eminebat, ternis vel qua-
ternis, in lacinias tres latas ferratasque, fed non
usque ad pediculum divisus, & inferius feptus;
proxime a fummo fastigio elegantissimum fusti-
nens *Florem*, (anguineum, feu hilaris cinnabaris
fulgore ardentissimum, & mukiplici foliorum
textura ac ferie constantem, Caryophyllatse mon-
tansae tertiae mukiplici flore Clusii propemodum
formam referentem, calyce excepto, e foliolis

multb minoribus conftru&o. Ex *didti* floris centro, cauliculus ad fesquidigiti altitudinem tranfiliebat, flore alio minore ac minùs foliofo, magnificè quafi venuftatematris fiae triumphante ornatus, gratisfimùmq; plantae hujus afpectum, multis etiam exoticis palmam eripientis exhibente. Tota planta lanugine Caryophyllatx vulgaris modopubefcit, eaqj facie & magnitudine, quâ inter icones expreffa, in noftro Herbario vivo fervatur.

PULSATILLA POLYANTHOS VIOLACEA, ANEMONES FOLIO.

Cap. LXI.

Radice nititur nigra, craffa, non admodùm profundâ, inferiùs inplures tenues ramos &c fibras, fuperiùs in multa capita diffusa. Quib novo vere ftatim poft folutas nives, immò nonnunquam fub illis, *caules* multos fesquipalmares & dodrantales, rotundos, inanes, albis tenerisq; pilis planè hirfiitos emittit: horum quivis j#ululum ultrâ medietatem *coronula* in lacinias pluri-
mas difcedtâ, extrinfecùs perquàm villosâ, intrinfecùs glabrâ&cvenulis ftriata, cingitur; in extremitate *Florem* Puſatilla; vulgaris quidem formâ & hirfutie aemulum, fed longè ampliorem, è foliis fex latis coeruleisvelviolaceis compofitum, gerens fpedabilem, odoris dulcis; cujus medium globus, ex denfis capitula lutea geftaritibus conf-
ftipa-

ICONES CENTURIA PRIMA. 61

PULSATILLA POLYANTHOS VIOLACEA. ANEMONES FOLIO.



Q

ftipatus ftaminulis, occupat 5 hujus è centro capillamenta rursus denfa & mollia > incuspide, vel penicilli in morem conjuncta prorumpunt, femina decedente flore altius sese ac latius, in (flobo villosa caesarie comosa Scincanefcente expandentia; ac in cujuscunq; infima caesariei parte, Semen exiguum longiusculum, parvo in pericarpio villoso completentia. *Folia*, praeterlapso floris tempore, primum se conspicienda offerunt, Anemones hortensis latifoliae simplici flore tertiae Clusii, latioribus foliis proxima, longis pediculis hirsutis suffulta, in lacinias tres primarias ad pediculum usque divisa, & has in alias bifidas vel trifidas minus profundas, quarum unaquaeque iterum in anteriore parte disceda: haec folia justam confecta perfectionem, venosa, dura, rigida, & praecipue subtus ac per margines sunt hirsuta^.

An Tulfatilla F₉ Jive folio Anemones fecunda^ vel fubrohndo, à Casparo iaubino in Prodro mo descripta cujus autem floribus petala septem adscribit, & quod inter folia proveniant, affirmat-> >

Asperis, sterilibus &c incultis Borussiae ac Casubiac gaudet locis, ericetis, sylvarumque marginibus: ubi planta una vel altera, floribus Hepaticas rubrae instar pulcherrè rubentibus, repleta. In Polonia candidissimis occurrit floribus, ut ILLUSTRISSIMUS atque CELSISSIMUS PRINCEPS ac DOMINUS, DOMINUS MICHAEL CASIMIRUS RADZIWILIUS, S. R. IMP. PRINCEPS, MAGNI DUCATUS LITHVANIA VIC&CANCELLARIUS & EXERCITUUM DUX

PULSATILLA POLYANTHOS ANEMONES FOLIO,
CUM FOLIIS ET FRUCTIBUS.



ICONES CENTURIA PRIMA. 62

PULSATILLA FLORE
OBSOLETO, CAULE
NUDO.



CAMPESTRIS &c. gratiosissime mihi primum detexit: quæ postea à *Tetro IZreynio* Fratres cum aliis generibus raris nondum descriptis, pubescente Majo, in Alafoviâ inter Warfaviam & Thorunium observata-j>.

Cùm inter icones, Plantaflorens finè foliis tantùm repræsentata in Le&oris gratiam, plantam deflorentem cum foliis & fructibus hic subjunxi.

PULSATILLA FLORE OBSOLETO, CAULE NUDO.

Cap. LXII.

RAdice ac folii Pulsatillae vulgari flore obsoleto perfimiss prater *caules*, qui nudi planè nee ullâ redimiti coronula, cujus fummo contra *Flos* multò major, magisq; patulus, è colosfino obsoletus, foliis oculo confusus ac innumeris crocos flavos gerentibus ftaminulis prasditus, gloriosè infidebat huic plumosa congeries cum Semine, 4 præcedente nihil diversa, tandem succedebat. Hoc *TulfrtilU* genus rarissimum, quale nee ante, nee post vidi, Anno M. DC. LX. cùm Patriam dulcissimam maximo belli incendio Mars furibundus diffringeret, à rhizotomâ mulierculâ ex Castubiae montibus mihi initio Maji allatum.

JACOBIEA ^ETHIOPICA

LAVANDUL^E FOLIO-

Cap. LXIIL

V *Irg**, ex radice quas fiindit, rotundas sunt, ftriatae & incanae, magnitudine Millefolii fylvestris 5 per quas *Folia* viridi-incana, uncias duas longa, culmum lata, nervo per medium decurrente craflb, familia foliis Lavandulae. Virgarum fastigia in fiirculos quosdam, & hi in pediculos duos, tres, quatuor, pluresve, minutissimis donatos foliolis, abeunt 5 quorum finguli F/orewecalyculo^orulis viridibus canaliculato, Jacobaeae gestant minorem, radiatis aureis, per extremum incifis foliis, umbonem concolorem ex multis apicellis, five tubulis conftantem, coronantibus: qui in pappo fiim tandem *Semen* oblongiusculum, Jacobaeae vulgaris non dii par, abit. Gaudet locis herbofis Promontorii Bonae Spei.

JACOBIEA iETHIOPICA


LARICIS FOLIO-

Cap. LXIV.

N Afcitur & inibi *facobaa Species* in ericetis rarior. *Erica facie* ₃ quae nomine *Erica flore* / ' i d . ` f Jb q ^ d 8 fe- / < / ? o', inde una cum Jacobaea praecedente, 8c frequentis fpecie prima, Anno M. DC. LXIV- ad ILLUSTRISSIMUM MACENATEJSI

ICONES CENTURLffl* PRIM A. 63

JACOBIEA ETHIOPI-
CA LAVENDULJE
FOLIO.



Jacobaea longifolia Linn.

ICONES CENTURIA PRIMA. 6+

JACOBiEA iETHIOPI-
CA LARICIS FO-
LIO.

*




Jacoba pinifolia Lin.

ICONES CENTURLS. PRrMA. 6s

JACOBiEA SPICATA
MONOMOTAPENSIS

*



Jacobaea spicata

R

TEM NOSTRUM *miffa*. *H*c* lignofus & parvus est Frutex, *Ericae* fimilis 5 *ramos* (*crcns* multos, dilutè virides, rotundos, ac ftriatos^iaferiùs ubi nudi, tuberculis denfis, five foliorum veftigiis delap{brum, pun<3:ulis veluti, inasqualer utrinque, & in medio pofitis, inftar Evonymi alterius Clufii infignes: caeteroquin, ab imo ad fumum, numerofo ac denfo agtnine *Foliis* uncialibus & dimidib minoribus, anguftisfimis, laetè viridibus, Pinafri tertii Hifpanicumili Clufio, vel Laricis accedentibus, at mollioribus, ita circumdati ftipatiqj, ut ipfos ramos penitùs occultent. *Florem* in ramulorum & furculorum cymis plerumq; folitarium producit aurei coloris, ftellatum, Jacobaeae haud multùm abfimilem, minùs autem foliofum, calyce longiore, maturitate in pappum e vanefcentem & *Semen* nigrum Jacobseae longius relinquentem.

JACOBiEA SPICATA MONOMOTAPENSIS-

Cap. LXV.

DUae iisdeminlocis/^co^T^/V^ reperiuntur {pecies. *Trior*: caule longiori, quàm praedidae, adolefcit, rotundo, ftriato, in ramos diducto: fati longosj quos hinc indè *folia* fepiunt fubrotunda, craffa & ferrata, Euphrafiaefoliis quodammodò accedentia, in mucronem verb acutiorem definientia. *flores* fcanfiles per ramulorum longitudinem ferie quâdam {uccedentes

S

gait,


13\$ JACOBI BREYNII PLANTAR.

gerit, veluti in spicam congestos, flavos, radia-
 tos, disco melino Jacobææ vulgaris minore,
 calyculo quoq; longiore & angustiore, ex nume-
^Λ ^Λ TM ^{quar} i h i f i m b r i a m albam
 ianuginofam habentibus, imbricatim compact.
 Horum florum apice U, in pappos refoluti, unâ
 cum W Jacobus paululum exiliore, avolant.
 lulllr ^I ^f ^U ^a ^h ⁱ ^r & ⁱ ^e ftbaftera, & albâ la-
 nugine obfita conipicitur.
 A, caules itidem striati sunt &
 ramorū, at minus lanuginofi; Foliis pauciori-
 ribus, furculis Lgius-
 culo, fepe forkariis infidentibus, onufti.

JACOBI EIE AFHNIS PLAN- TA TUBEROSA, CAPITIS BONA SPEI.

Cap. LXVI.

Quoniam in Jacobs* Hiftoriam incidimus,
 non abs re fore exiftimo, hic loci Plantam
^r ^S ^E [?] ^m ^{Capitis} ^{Bona} ^{Spei} / ^Λ ^Λ ftudiofo Her-
 bum Contemplatori, antè oculos collocare;
^{qv} ^{*} ^{be} ^{hi} ^{habere} ^{affinitatem} ^{videtur}
 titudinem effufa, Cyclaminis facie.- Fdm molds,
 Cyclaminis etiam h*ud valdè abfimilibus, ex
 fature & dilutiorè amoenâ viriditate eleganter
 variegata, ^{if} ^v ^f ^q ^U ^E ^{caul} ^{wul} ¹ ^{teret} « concavi,
 paucis foliolis fepti, bini, terni, pluresve, do-
 drantalis



Othonna hillebrandii
Lam.

IACOBÆÆ UTINIS PLANTA TUBEROSA,
CAPITIS BONÆ SPEI

Steph. Laus. pinx.

J. Saal. fecit.

ICONES CENTUM* PRIMA. «7
SENECIO VISCOSUS
yiiTHIOPICUS, FLORE
PURPUREO.



Senecio purpureus L.

drantalis longitudinis exfurgunt, *Florem* unicum aureum, *Jacobaeas* latifoliae *Pannonicae* tertiae *Cluffii* fimilem, in pappum abeuntem, fustinentes. Haec in Ramulo ficco, & figurâ coloribus fumo studio, ad plantam, quâ in BEVERNINGIANO HORTO Anno M. DC. LXIIX. floruit, iotarc potui.

SENECIO VISCOSUS JETHIOPICUS, FLORÈ PURPUREO.

Cap. LXVII.

Sesquipedalis, immò & cubitalis est *Planta* *Scaule* folidiore quàm *Senecionis* vulgb noti, & *Jacobaeae* in modum duro ac triato, famis aliquot praedito, praefertim superius, ubi *ImpU*. **Plinii* de more, caulem excedunt *Foliis* multis alternatis latâ basi caulcm amplectentibus, *Senecionis* vulgaris minus laciniatis, quasi circumrostratis ac crispis, quorum extrema pars fastigiata. *Flores* in ramis & caule dense coacervati & aphylli cernuntur, tubulis & faminulis multis purpureis conflatis, ex calyculo triato provenientes, ac vulgaris ritu celerrimè fatifcentes in pappum, fimbria *Semen* longiusculum, cinereum & triatum, nihil à *Senecionis* nostri, nisi quoddam nonnihil majus, differens.

Senecio hic per universum hirsutus ac tadhiviscidus, juxta Promontorium Bonae Spei viget. Inde ILLUSTRISSIMO DOMINO à BE-

VERNINGK miffus, à quo Arino M. DC LXIII. munere, & poſtea à T)n. T>oB. Huyberto ac T)n. Do&. Slado accepimus.

ERIGERON ZEILANICUM LAMP SANIÆ FOLIIS.

Cap. LXIIX.

Magnitudine, folijs, caule & ramis, illi Cichorii generi, *Lamp/and* a Dodonaeo appellato, perfimile; magis tamen hirsutum, *Floribus* uberrimis, pallidi coloris, Conyzae caeruleas acris Caffari Bauhini, minoribus, quos nulla ambiunt petala, onufkum: *Semen* exile pappeſcens Conyzac acris annuae albae Morifbni par, quod vento etiam leniſſimo è refidiis florum calyculis dispellitur. Ex *Zeylan* Inſula, vel propter fbliorum, vel virium fortè quandam convenientiam^ nomine Betonicae Anno M. DC. LXX. accepimus.

EUPATORIUM ERICOIDES CAPITIS

BONA SPEI.

Cap. LXIX.

DXJx inprimis, ſub Eupatorii nomine deſcriptac, inter alias, Plantae, apud Audores reperiuntur. *Vrimz9zyfgrimonia9* quae verum *Dioſcoridis*

ICONES CENTURII PRIMI. 68


ERIGERON ZEILANI
CUM LAMPSANÆ FO-
LIIS.



ICONES CENTUBJA PRIMA. 69

EUPATORIUM ERICOI-
DES CAPITIS BONÆ
SPEI.

*



S

icoridis & aliorum Graecorum Eupatorium existimatur. Altera, *Herba S. Kjt nigundis Tragic* quibusdam Eupatorium *Abvali Ibn-Tfin&y* seu Arabum (fed perperam) creditum. ////, qua: lappulasechinatas ferenseft planta, (t^r//«o//Wnomenj *Huic*, qua? planta pappefcens, *Eupatorii* ^relinquo,, niaximè cum Botanici quidam hujus feculi pr«cellentissimi, veruti ac concinnum in hoc ftudio ordinem venantes, ita hoc disponere (uti ferè patet) cupiant. Quanquam & minimè redarguendi, qui *Agrimonia* y aim Eupatorio Ahtiquorum magis conveniat, £«^or//nomen relidlumj utqj *Eupatorium pappefcens* alii, aut jam di(fro Tragi nomini *Herba S. Iñm'gundis*, fubderetur, prceoptarent. Judicium autem de his, aliis permitto, meqj ad *Supatorium pappefcens* converto: de quo praeter jam ab aliis dekriptas, complures adhuc novas exhibere fpecies in Herbario meo possum.

Et quidem inter easterns *Eupatorium Jfricanum* hoc *rarisfimum*. Quod *Suffrutex* eft lignoms, frequentif Emis ramis, tortuofis & duris divaricatus, ad figuram Ericae Myricaç folio incanae (floribus & fcmine exceptis) tàrn propè accedens, ut noh ovum ovo fimilius": quoniam non rami tantumj fed *Foliola* etiam eorum, quibus denfiffimè Ericai penitùs vulgaris modo contecti, tomento adhaeaente albicantia fimt & incana. *Flofculi* verb in ramorum apicibusy in mufcariOs parvos conglomerati, Eupatorii confpiciuntur perfimiles 5 fed minores multb, & futilioribus fquafnulis purpurafcentibus imbricati y e quorum medio purpureus promi-


net tubulus, *Semini* pappoſb infidens, quod maturum, nigrefcit, nee quicquam ab Eupatorii vulgaris feminibus diverſum.

EUPATORIO AFFINIS PLANTA ZEILANICA, FOLIIS ULMI

Cap. LXX.

ALtius Africano, penè ut vulgare, *Herba S. Kjmigundû* a Trago dictum, *caulibus* rotundis, ftriatis, in viridialiquantulum purpurafcentibus, ſapore (in reficcatis) fâlſo, fruticat j quos *Folia Ulmi* vulgaris ſemula, ſed minora, verſùs pediculum faſtigiata., ac ſenfim latiora, rotundioraqj evadentia, parvis iritervenientibus pediculis alternatim ambiunt. Cauliujn faſtigia in furculos aliquot dividuntur, atqj hi ruſſiis pliies in petioloſ, quibus incompoſiti Horexumbellam mentiuntur, Eupatorii Ericoidis floribus fimiles, ſed pallidi leu ſtraminei coloris, atq; ex compluribus ſtaminulis cõflati. Seqvuntur *Semhu* minufcula Stoechadis citrinae Herbãriorum paria; inter quae, in meditullio calyculi crebris ſquamulis compaãtiles, praeterèa velut ſpadiceus, exiguus &c durus *Fruttus*, feu *Fafculum feminine comforme* excreſcit, ſuperiùs ſepè reflexum, intùs inane & Iplendidum, quântum oblervare licuit.

ICOHES CENTURIA PRIMA. 70
EUPATORIO AFFINIS
PLANTA ZEILANICA.
POLIIS ULMI.



Matthaei indola

CHRYSOCOME JETHIO PICA PLANTAGINIS FOLIO.

Cap. LXXI.

SI *Planta LavanduU affinis ifta verticilkta*, pro *Stoechade Arabica* ubique nota₃ nomen retinere debet *squam ob caufim Cbry/bcoma, Stcechadis citr'ma* nomen poffideant, non video. Nam, fi *Stcscbas Arabica* y citrinis inveniretur floribus, potiore jure *ilia cum Elichryfo duodecimo Cafpari 'Baubini, nomen' Stoechadiscitriñanbi* vendicarent. Commodius igitur₃ *mea opinione, Stmchadibus citrinis Herbariorum*, nomen *Cbryfocomes* cum Clufio tribueretur, quin etiam cum Ghryfocome Antiquorum melius, quàm *Stcechade* conveniunt.

Chryfocome annumerandi er̃go omnes *Cafpari TSauhini Helichryfa, excepto primo, five foliis Abrotani*, qua? planta corymbifera; & *duodecimo, five Stoechade viridi capitulooblongo, qux plantaverticillata*, a[^] Johanne Bauhino optimè *Stoechadi Arabics*₅ cujus vera ipecies, addita. Similiter ad *Chryfocomes vexillum* pertinent (*gnaphalia Cafpari 'Bauhini, praeter primurnjivernaritimum, quod cum feptimo & ottavo Swz rofeo fylveftri & hortenfii, ad Corymbofas amandari debet. Sed pr̃termisfis j am cognitis, ad novas defcribendas, & quidem primò ziCbryfocomen*[^]*ffricanam & lantaginis folio,* 2b **omnibus** aliis diver fam, quàm ex liberalitate ILLUSTRISSIMI DOMINI à BEVERNINGK

habeo,

habeo, 8c postmodum Anno M. DC. LXX.
à T>. *Slado* accipi, me jam accingo.

Haec ex *^adice* nigrâ & fibrosâ, *caulem* fert lignosum, firmum, plus firmè quàm pedalem, fapiàs alios cauliculos producentem, vel minimè, vel parumper 8c quidem superiorem tantum medio lanuginosum, ubi penè nudus, aut pauca faltem foliola habet: inferior verb ejus medietzsyfoliis compluribus condecoratur, virefcentibus & glabris, Plantaginis lanceolatae perbellè aemulantibus 5 fed brevioribus, latioribus, longeque multò rigidioribus, peroras modicè reflexis 8c crispulis, superius apertè eleganter splendens j in quibus nervi quinque infigniter conspicui secundum longitudinem, cum venulis satis validis per latitudinem vario flexu discurrentibus, cernuntur. Horum infima longiusculis 8c latis pediculis fulciunturj reliqua verb finè pediculo cauli adnata, marginibus utrinque in caule a deb devergunt, ut planè alatus videatur. *Floresculi* caulium 8c ramulorum fastigia occupant in comam cohaerentes, Stoechadis citrine Italicae Johannis Bauhini fimillimi, at breviores, è squamulis ex stramineo & ferrugineo mixto colore compactiles, quorum apices medii, cum maturitate in papposum *Semen* exiguum Stoechadis citrinae Germanicae abeunt, 8c aurâ levisfimâ dissipantur.

In locis Capitis Bona[^] Spei sterilibus luxuriat, ubi Vere floret, 8c praeterlapsis aliquot Hebdomadibus Semen magnâ abundantia profert_.



CHRYSOCOME ÆTHIOPICA PLANTAGINIS FOLIO

*CHRYSOCOME PEREGRINA**major frutescens.*

^Vffrutex lignoficiis est atq> ramofus, cubitalis
 vj altitudinis, lanugine candidis fim&obdu&us:
FotiU mxiltis, Chryfocomes Germanicae majori-
 bus: *Floribut* Gnaphalii Americani Clufii, coloris
 verb vel citrini', vcl immortalis aurifulgore re-
 splendentibus, ac fubindè multb longioribus,
 Lupulorum capitula quodammodò aemulantibus.

Colitur in viretis Belgii, ubi Anno M. DC.
 LIII. apud D. Davidem ~~35ra&ant>f~~ nomine (*jñn-*
phalii (*zJlexandrini*, & Anno M. DC. LX. in
 Horto publico Amftelodamenfi, nomine (*jñ6-*
fhalii Imericani majoris flore aureo, legi.

An *Stoechas citrina*, *floru&'magmtudine>* &* colo-
 refpeciofa ₃ fobannis Bauhini

Cff\$ZS0C0*5ME q&B^MADsCJC sA, FLO%₀E
ignejeente, five ex aureo rutilante.

Stoechadi citrinas Germanics latiore folio
 Johannis Bauhini, in omnibus fimilis, practer
 fquamulas florum, quae admodum eleganter ex
 aureo in modum prunae rutilant, & afpe&upul-
 cherrimè jucundis fimèq; felendent. Nafcitur in
 Cafubiflefterilibus arenous & apricis locis₄ prac-
 fertim fublimioribus 5 Julio & Augufto floret j
 Septembri & O&obri perficiuhtur Semina. De
 hujus plantae facie & viribus, jam quaedam in
 ^difcel Uneis CuriofescZMedico-phyficis JcademU 3\£a-
turae Cuirioforum monui.

--- *E qE MANICA,*

flore fangvineo.

Perfimilis antecedenti, Flolculis exceptis^qui
 longiores, & fquamulis fangvinei coloris
 T imbri-

imbricati flint. Planta valde rara, qua; umca untumexCasfubiaemontibus, mihi Anno M.DOLXII. menfe Julio per rhizotomam mulierculam allata»».

CHRYSOCOME SYRIACA,
flore atrorubente.

PUlchra quoq; fpecies Chryfbcomes in Syria reperitur, "*Baccbaris Rauwolno di&a, Foliis pierumq; majoribusquãtñGermanicae; Floribusvctb* brevioribus, quorum fquamulas atrorubenti colore tinctrae, quantum ex plantâ ficcâ Rauwolfianâ, in Monte Libano erutâ, aliisque duabus in Monte Carmel ab *Excellentisfemi Domini facobi Goliip. m. Fratre* colle&is, obfervare licuili.

CH^oYSOCOME SY^oIACJ,
candidisfemis fioribus.

NOn ita pbvia alibi, quàm in Saxofis Libani montis, ubi à Rauwolfio reperta, in cujus Herbario plantam exficcatam vidimus dodrantalem. *Folia* ejus incana, latiora Chryfbcomes Germanicas atque brevioraj F/orar fummis caulibus infident pauci, ex argenteis retorridis fquamulis compa&iles, Gnaphalii montani floribus* rotundioribus candidis haud impares, fed grandiores.

CENTAURIUM MAJUS
AFRICANUM> FLORE
AUREO ODORATO.

^ Cap. LXXIL

PRimâ aliquando, quâferitur, aeftate, nificoeli noftri inclementiâ impediatur, vel altero pbft

ICONES CENTURIA PRIMA. 72

CENTAURIUM MA-
JUS AFRICANUM. FLO-
RE AUB.EO ODORATO.



pbftanno, *caulem* emittit dilute viridem, fesqui-
 cubitalem & procefiozem, craffitudo auricu-
 laris, folidum, durum, friatum, aliquot ramis
 concavum: circa quem glabra, venofa, ac viri-
 dantia funt *folia*, Erucae, vel fi mavis, laceas
 pumilae (in horto culto) Lobelii, in modum la-
 ciniata, dodrantalia & palmaria, ac quò magis in
 fummitate exeunt, et minora profimdiusq; dis-
 fe&ajqva; autemà terrà circa caulis pedem pro-
 veniunt, multò lunt ampliora, pedali nempelon-
 gitudine, latitudine verb quatuor aut quinqj di-
 gitorum, Hippolapathi vel potiùs Armoraciae
 formà, rigida 5 rugofa, per ambitum ferrata, &
 verfus pediculum laciniata. *Capitula* caulis & ra-
 niorum jfummitatibus fingula infident, rotunda,
 in latum turbinem faftigiata, Centaurii majoris
 lutei Cornuti majora, atque pad imbricata fqua-
 niulorum commisfurà, tarn accuratè loricata, ut
 laevia ac quad polka videantur: ex quibusF/or^j
 ftaminei aureo colore perbellè fulgentes, atqj fva-
 viterolentes exeunt. His flaccidis *Semen* album
 Cnici, in fummo, cili infar hir&tum, albà in-
 volutum lanugine, fuccedit. %\$£m nititur lon-
 gâ5 crafsâ, aliquot ramis pradita, fiifcâ foris &
 corticosâ, intus albefcente & refinofâ, faporem
 dulcem ac gummosum habente 5 quae perennis,
 ftigoris autem impatiens & Solis caloris avida.
 Expetit enim folum calidum, Barbarix nempe
 colles & incultos, praefertim non procul (*Nigeri*
 five *Jigel* Urbem Mauritania. Floruit Anno
 M. DC. LXIIX. in horto noftro, ex Semine
 per ZhQ&ilisifimum Dominum Carolum Sypeikgrum, Thi-
 lobotantum & Scabinum Tatria meritisifimum> Mons-
 pelioallato: T2 CHA-


CHAMiEMELUM iETHIO-
PICUM LANUGINOSUM.

Cap. LXXIII.

C^l *Hamamelum* hoc prorsus novum, cujus munificeritiâ ILLUSTRISSIMI DOMINI à BEVERNINGK compos fadus, pulchrum fanè ac perrarum est, eâ fermè, quâ Romanum, facie, ih Promontorio Bonae Spei crescens 5 quam minus ; & ramos teneriores densâ lanugine pubescentes, foargens 5 *Foliis* minoribus lanuginosis, Millefoliilutei junioribus & magnitudine quadantenus &c figura fimilibus. Ex ramulorum cymis, inter folia, *pediculus* palmaris fere, gracilis & laevis exit, qui in fiimmo, in *capitufam* laeve, ftriatum, ex viridi albicans & veluti rorulentum, crenis magnis & obtusis per circumferentiam coronatum, paulatim crasfescens abit: cujus medio *Flos* Chamasmeli vulgaris, difeo ex tubulis mille minutissimis luteis conflato, folioliscandidis, fedperquàm pufillis, ut After[^] cernui Columns. cincl:o, eleganti Ipectaculo infidet. Excusfb flore, *Semen* copiofiim, nigrum, Chamaemeli inodori minus, fequitur.

HaecPlanta, *cpxzm Cbamamelurn* quidemnuncupavij propter capitula tamen, parumper à Chamaemelo recedere, & medium quoddam genus inter hoc & Afterem cernuum Columnar videtur ~~pretendere~~.

CHAMiEMELUM Æ-
THIOPICUM LANU-
GINOSUM.



ICONES CENTURIA PRIMA. 7*

CHAMJEMELUM LU-
SITANICUM LATI-
FOLIUM.



T 2

CHAMJEMELUM LUSI- TANICUM LATIFOLIUM, SIVE CORONOPI FOLIO.

Cap. LXXIV.

ANno M. DC. LXIII. plurimas inter plantas, ex feminibus Lusitanicis in Horto publico Amstelodamensi enatas, *Chamameli Speciem pulcherrimam* Mense Julio florentem collegi j *cauliculis* multis abunda radice prodeuntibus, & fumma tellure magna ex parte sparsis, sesquipedalibus, teneris ac leniter hirsutis, superius maximè: quos *Folia* sine petiolis alterno positu vestiunt, utrinque in lacinias novem aut decem laterales divisi, mediam quandam inter Coronopi maritimi minimi hirsuti, & Tanaceti alpini (adherentia cauliculis folia) Casperi Bauhini, figuram obtinentia. Singuli caules & rami singulos *Flores* producebant, tam capitulo, quam alias Chamameli Romani flore simplici, asquales, quorum candidissima, ad unguem citrina, antennis distincta petala, discum, totum tubulis amplioribus luteis obductum, & ita figuratur ut ab imolatio, in angustum verticem exacuetur, rotatim ambient. De *Semine* mihi non visis, nihil divinare possum.

An Leucanthemum fegetum, folio ferrato, **nondum descriptum** 5 z *SX fagarca Lujitanorum* 9 Domini Gabrielis (Jrisley, Chymiatr 5r. Botanici, in *Firidario Lusoano* 1

iso JACOBI BREYNII PLANTAR.

BUPHTHALMUM CRE-
TICUM COTUL[^] FACIE,
FLORE LUTEO, ET ALBO.

Cap. LXXV.

COntroverfia haud levis inter Dodos viget,
an [^]*Buphthalmum* & *Chrysanthemum Diofcoridis*>
plantae duae fint diffictae, vel una faltem & ea-
dem. . *Qyiunam ejje* credjint₃ fententiam.fijam
his firmare rationibus nituntur : quòd Dio-
fcorides utrique plantae Buphthalmi nomen tri-
buat 5 forma[^] ac viribus convenient j & quòd ea
de Buphthalmo tradiderit Plinius, quae de Chry-
fanthemo prodidit Diofcorides. [^]/contra,
qvi diverfas ejje plantas volunt, ex Diofcoridis
defcriptione fequentia obtendunt discrimina.
Trimurn, quòd Buphthalmo folia infint Foeniculo
fimilia, quae planè capillaria 5 Chryfanthemo verb
multifida. 7)*einde*, Chryfanthemi caulcs in ci-
bis mandi alionim olerum modo fcribit Dio-
fcorides: idqubd de Buphthalmo agens filentio
practeriit. *Tratereà*, quòd flores Buphthalmi red-
diderit Anthemidiù miles: Chryfanthemi verb
luteos & vehementer fplendentes. *Caterum*, de
horum viribus diferehs, Buphthalmi flores, cum
cerato tritos, tumores duritiasque discutere tra-
diditin universum *Zk*, affirmatiye locutus: ve-
rùm poftèa de Chryfanthemo fcribens, hujus
flores ? injnit, Steatomata discutere produntur,
particulariter & Jubiè locutus. Sed dicat quic[^]
quid velit *T>oWufiwM* <&*datthiolus* (cujus addicta
fiint

flint verba) non fatis tamen valida flint jfla argumenta ad reddendam fententiamejus indisfb-
lubilem. *tXamprimo*, quod etiam *Fwniculi* folia
fint multifida, negare nemo poteft: qubdautem
Buphthalmi Matthioli folia, fimilitudinem nul-
lam cumFoeniculi habeant, cuique cernere licet.
Secundb, Diofeorides in deferiberido Buphthalmo
neglexiffe videri poffet commemorare, caules in
cibis mandi aliorum olerum modo? fed quid?
neque tamen ufum hunc impugnat s qui è con-
trariò à Plinio Buphthalmo tribuitur. *Tertiò*,
videre nequeo, in quibus Diofeoridis verba, cum
Buphthalmi flores, Anthemidi reddit flmiles 5
verbis, quibus Chrysanthemi flores exprimere ftu-
duit, repugnent: nifi fortè pro Diofeoridis, Ga-
leni acciperem: verum enim verb turn facilè
Diofeoridis, luteum florum colorem apertè ex-
primentia, in raftam me reducerent femitam, ut
cum eodem Matthiolo (in defcriptione Buph-
thalmi) facilè colligerem, Galenum Buphthalmi
flores, floribus Anthemidis flmiles reddentem,
hoc tantum de eà intelligere Anthemide, qua? lti-
teos profert flores. *Qvartb*, parum etiam eificit
Diofeoridis de Buphthalmi florum viribus, mala
antè memorata relevantibus, verbo illo, *discutiwm*
affirmativè: & in Chrysanthemo additâ vocc *pro-*
ducuntur, dubitativè feripfifle j cum mihi fit per-
fvafiffimum, ilium etiam aliis in locis, de her-
barum viribus, affirmativè nonnulla, fibi non ex-
plorata, fed vel ex aliis tantum Auc:oribus, vel
auditu percepta, tradidiffe: qugd in Biiphthal-
mo etiam accidere potuit. Sed de eo in praesen-
tiam fatis.

Ego pro tenuitate mea^a Dio⁷coridis de Chrys-
 „anthemo descriptionem, ita fehabentcm, libro
 „IV. cap. 5 %. *Chrysanthemum aut Cahha, nonnulli*⁵ *Buph-*
 „*thalmos: herba esltenera fruticosa, laves proferens cau-*
 „*les, & multifida folia: /lores Jūpra modum splendentes,*
 „*y>luteos, orbem oculi imitantes, unde' Buphthalmi nomen*
 „*traxit: prope oppida nascitur. Cujus caules oleris vice*
 „*manduntur. flores cum cerato trit'h fieatomata discu-*
 „*tere produntur: regio morbo correptis, colorem brev*
 „*reddunt, iteq̃uente longo balnei usu, posl exitum ebi-*
 „*bantur; cum Buphthalmi, quā; ha?c est, libro III.*
 „*cap. i*⁶. *Bupbtbalmon (quidam Cachlam vocant) te-*
 „*nues emittit cauliculos, mollesq̃; folia foeniculi: luteum*
 „*Jlorem, antbemide majorem, oculi similitudine, unde no-*
 „*men traxit: circa oppida nascitur, & in campefiribus:*
 „*Flores cum cerato triti, tumores duritiasq̃ discutunt.*
 „*jyjjunt epotam posl exitum abalneis, regio morbo corre-*
 „*ptis, colorem traktu temporis redder**} valdè con-
 cordare fateor; ita ut colligere liceat, Buphthal-
 mum & Chrysanthemum unam & eandem esse
 plantam: atq̃ hoc eò magis, quoniam hanc quo-
 que fovere sententiam videtur Plinius, qui Dio-
 scorideas Buphthalmi & Chrysanthemi descri-
 ptiones in unam, hoc modo breviter contraxit
 „libro XXV. capite 8. *Es*^l & ^c*Bupbtkalmos, Jimilis*
 „*bourn oculis, folio foeniculi, circa oppida nascens, fruti-*
 „*cofa caulibus, q̃vi & manduntur decotti. Quidam Cachlam*
 „*vocant. Hac cum ceraq̃ cirrbomatadiscutit. Attamen*
 de incertis certi quicquam statuere non il iustineo.
 ". Hoc verb liquet, Buphthalmum Diofcori-
 dis plantam (quā formam) esse tenuibus & mol-
 libus cauliculis; foeniculi foliis, & flore luteo
 Anthemide majdli. Quod etiam Alpinus de
 plantis


plantis exoticis libro II. capitulum 49. paginam 321. bene annotavit: qui pro Buphthalmo Dioscoridis, *peregrinum* nunc existimare haud male inclinatur: Huic non admodum dissimilis planta per Dominum Johannem Henricum X. Wittenfeldt (quae eadem in Horto Patavino, & ILLUSTRISSIMI CONTARENICOLLEGGIT) jam dudum fide ad me pervenit.

Hac verba horti mei nunc etiam alumna, Chamaemelo perfimilis, albam possidet *%adi*cem*, densis fibris se in terram figentibus, tenuibus & aliquantulum tortuosis 5 initio nullius manifesti (aporis, sed diutius in ore dentibus pressis, fatis acrem, fermentum Pyrethri linguae relinquens. Ex illa, densa in orbem circa terram *Folia* erumpunt, leniter hirsuta, magnitudine, divisa & forma Pyrethri Bellidis flore Calpari Bauhini plane respondentia: inter quae *vaults* penes cubitalis, nonnunquam etiam duntaxat pedalis, rotundus, mollis, cum tempore durior, coloris viridis, vix viridi albicantis propter hirsutiem, firmit; foliis minoribus, Chamaemeli magis convenientibus, sed crassioribus, in lobulos latiores divisis 5 ex quibus fina, Ax, ut plurimum longitudine caulem superantes, in tali abundantia, praefertim statim circa radicem, prodeunt; ut densa 8c orbiculata planta? effigies si bene videatur ob alarum multitudinem oblique & reflexe se propagantium. *Flores*, cui subest squamosum capitulum, squamulis viridibus lanuginosis, triplici ferie contextum, Buphthalmi Alpini floribus non parum assimilantur; nisi quod illorum petala, tredecim plerumque; numero, majorem, in medio
V pauli-

i5+ JACOBI BREYNII PLANTAR.

paulisper quafi cxfculptum five concavum, ex plurimis flavis tubulis condenfatum orbem, circumambicntia, breviora, latiora, lincis feu plicis ftriata, 8c dilutiore flavedine fint imbuta, inprimis cum ad fenium vergunt, 8c parte inferiore, ubi penè tantùm fulphurea, confpiciuntur. Primus horum florum, in medio plantae fupra caulem menfe Junio exit, deinde alii in alarum majorum cacuminibus, 8c tandem reliqui in ramulis lateralibus, veluti luccedanei ita fe excipiunt, ut planta hsec totam non modò calidam æftatem atq; j audumnũ fertilem, floribus condecoret j fed triftefenium etiam fubindè annijgenialiter coronet; mefTemq; j femper uberrimam, latè compreffum *Semimm* faturè purpureorum^, inter Iqva-
mulas tenues membranaceas 8c latas, ejusdem planè coloris, nitentes, firmiter 8c folidè jacentium proferens j quae tandem ficuti etiam fquamulæ ipfe, Regise iiiæ Iplendorem purpuras, cum illepido colore fpadiceo trifti commutant; & in generis fui confervationem apud nos quotannis funt fèrenda. Planta haec nullius excellentis eft odoris, praeter flores fubdulcem 8c medicatum quadaritenus, fipori calidiufculo ^c arotnatico penè fimilem, fpirantes.

'*Species adhuc alia* ejusdem generis occurrit, '*Bupthalmum Creticum CotuU facie jlore albo* dicta: à priori in eo tantùm discrepans, quòd florum petala, qua? luteum ilium magnumque umbonem circumradiant, non dilutà flavedine aurefcant, fed folendidè argenteo concolore laclefcant. Undò flores, Pyrethri perquàm funt fimiles, tantamq; huic plantae fimilitudinem
cum



cum Chamaemelo conciliant, ut cujuslibet penè confpicientis oculo, fpecies quaedam Chamaemeli vivā fit.

Obfervatumfoc primā vice mihi adhuc adolefcenti Anno M. DC. LIU. in Horto Academico Lugduni Batavorum, & poſteā beneficio *Seminis, ab Excellentifimo, Oſcibilifimo Domino Do&. ^Arnoldo Sye, <^Aiedicina & TotamcesTrofeſfore Celeberrimo* Anno 1673. mihi transmiſſi, meoque in horto enatis ac magnam fui copiam reddentis. Ex quo Anno 1675, inter complures albis floribus > unica etiam de primā fpecie planta, f loribus luteis progerminavit_\

CHRYSANthemum ARBQRESCENS ^ETHIOPICUM, FOLIIS POPULI ALBA.

Cap. LXXVI.

TAmetfi praecedenti Capite, dilucidè fatiſt oſtenſim, nos ab illorum opinione, qui '*Buphtbalmum & Chryſanthemum Dioſeoridis* unum èfle volunt, non abhorre 5 attamen aliudhic plantae genus, à "*Buſhthalgo* noſtro *Cretico* parumper diverſum, nomine *Chryſanthemi* (quoniam illud, apud PraecellentifimosBotanicoSjeo nomine nptum) repraeſentare placuit-;

Et quidem primò *hoc* perrarum: qnad *Fru-tex* eſt crebris & denſis ramis, quorum juniores denſum ob tomentum albidi > in quibus *Foliā* fubrotunda, crasfomodo in ambitu ièrrata, ac lanu-

gine densa raphili in utraque; superficie obducta, Populi albas minoribus fimillima. Flores in ramulorum extremitatibus, aureo colore fulgentes, Chrysanthemi Canadensis bidentis, alato caule, Domini & forifoni, haud maid aemulantes, se praebent, umbone croceo, multis petalis nervosis, anteriore parte denticulatis, radiato, constantes. His demum Semina oblongiulcula, angulosa & folida Chrysanthemorum ritu reliquorum fiiccedunt. Frequens circa Promontorium Bonae Spei & in Regionibus adjacentibus.

Icon ex Ramo ficco ILLUSTRISSIMI MACENATIS, nobis absentibus facta, dimidiam tantum floris partem, & minus feliciter; quam optaremus, repraesentata.

In Tabula Chrysanthemi arborecentis, Ramuli duo Tellidis cujusdam lutea African* repentis* BEVERNINGIANO in Horto a Fratre collecti, nomine Chrysanthemi exotici minoris capitulo apophyllo, propofiti sunt. Hujus Plantae integral iconem, postmodum Excellentissimo Domino oArnoldo Sye, pro innata gratificandi promptitudine, nobis donare complacuit, simul cum Historia frequenti accuratissime concinnata.

**"BELLIS WTEA, SIFE CH<B%SA?h(THE-
mum Capitis 'Bornz Spei repens, flore apophyllo,
Domini Syes.**

Radicibus nititur haec planta teneris, albicantibus, nee ita profundis; ex quibus cauliculi, emergunt rotundi, glabri, coloris pallido virentis, & aliquibus in locis quandoque exfurfurati: dividuntur hi rarius in alios minores.

CHRYSANTHEMUM

ARBORESCENS JETHIO-
PICUM, FOLIIS POPU-

LI ALBA. &jkfi*«~JU*«-~z&}£r<z*~ &>

*



minores, ut plurimum versùs terram procum-³³
bentes, quam, ubi attingere valent, mox novas³³
radiculas emittunt. *Foliis* donatur ex glauco³³
virescentibus, longiusculis, & inordinate inci-³³
fis, ac Coronopi folia quodammodo referenti-³³
bus, caulemque semper ambientibus: in singulis
autem caulibus, unus conspicitur *Flocculus*,³⁵
lutei coloris, ex innumeris flaminulis five exi-⁵⁵
guis tubulis constans, inflexus orbis, five difci,,
floris Chrysanthemi vulgaris, quem nulla amb-,,
iunt folia, quare & aphylli nomen inditum.⁵⁹
Semen maturum exiguum est & fuscus coloris,³⁵
proximeque ad Chrysanthemi vulgaris semen⁵⁵
accedit: quod cum ipso flore odorem spirat³⁵
haud ita gratum. Univerfa autem planta (apud,,
nos) annua est, & facit copiose ex deciduo fe-^M
mine repullulat.

CHRYSANTHEMUM CONYZOIDES LUSI- TANICUM.

Cap. LXXVII

Albam, aliquando ramosam, habet *fydicem*,
fibris dependentibus: ex qua *Caulis* rotun-
dus nascitur cubitalis, lenissimis & minutissi-
mus pilis pubescens, praesertim in summitate, qui
terras partim incumbit, partim se furrigit, & in
ramos multos pandit. *Folia* ejus alternatim abs-
que pediculo sunt posita, lanuginosa, extremita-
tibus nonnihil reflexis, Conyzae minimae Lobe-

lij foliis refpondentia, majora pauJb tamen, Ix-
 tioreque viriditate prsdita, haud crispa vel un-
 dulata: ex horara fede & ramuloram̃ angulis,
 non minus quāmincaulium fastigiis_{MW}>< pro-
 veniunt folitarife ac dura, foliis quinqué, feptern,
 yel etiam quandoque novemcirciter majoribus,
 5c quinq̃ue, vel pluribus minoribus, molliufcu-
 Hs, ymdibus, & radiatim expansis fubtus dona-
 tai in medio verb *Flos* lutei coloris, cujus fo-
 hola per extremum denticulata, orbem ex com-
 plunbus ftaminulis conflatum coronant: quò e-
 vanelcente, parva *Semina*, angulofa & folida, fm-
 pensè incana, argenteique nitoris & ferico tadu,
 luccedunt. Tota hac Planta, pñefertim trita,
 Ōdorem aromaticum & refinofum a ConyzK
 non multum abludentem fpirat. Sapor itidem
 eft aromaticus & ferè fervidus. *

. Si quis, *Chrysanthemum he*, cum vffteroje-
 cundo CM, conferat, convenientiam iUorū fa-
 çile obfervabit. Sunt autemO</&florumpetala,
 longiora: differunt & capitulorum folia viridia;
 quā e contrario minora & pauciora: fie & hir-
 lities, in caule, ramulis & foliis, etiamhifpi-
 diorcertuturi utcuiquefacile, ex primointui-
 tu figurae Clufii, animadvertere licet: prater hxc
 nullmscerti odoris & faporisaClufiomentiofit,
 qui in noftro notabilis.

CHRYSANTHEMUM
CONYZOIDES LUSI-
TANICUM.



K

ICONES CENTURIA PRIMA. 7%

CHRYSANTHEMUM
CONYZOIDES ^THIOPI-
CUM, CAPITULO APHYL-
LO, POLIIS MAJORANA,



Athanas,

CHRYSANTHEMUM

CONYZOIDES JETHIOPI-
CUM, CAPITULO APHYLLO,
FOLIIS MAJORANA.

Cap. LXXVIII.

A *Fricanam quondam Tlantam lignofam, Chrys-*
anthemis quoque adnumeramus : cujus
Flòs, non illius vulgaris ritu, ftellatus; fed Chrys-
anthemi more Valentini Clufii aphyllus: pro-
ptereà autem à Chrysanthemis tàrn minùs fepa-
randam, quàm Chamaemelum nudum & Matrica-
ria flore aphyllò , à fiiis fpeciebus₃ quarum flo-
rum umbones, aequèac Chrysanthemi, petalis
ftellas modo cinguntur.

Lignofus verb hie *Fmtex* pedalis, Conyzas
minim as Lobelii facie quodammodo nafcens 5 in
plurimos fe expandit rarios, rotundos, ftriatos;
quos numerosa & conferta ambiunt^{^/z^} Majoranx
hoitenfis foliorum formam &c Sanamundae
primas Clufii non malè aemulantia, villosiora ta-
men ac parumper minora, odoris & faporis aro-
matici, Menthx corymbiferae, fcu Cofti horten-
fis inftar. Summis ramulis fingularia, eorum au-
tem angulis faepiùs plura infident *capitula*, dura,
villosa, difijpm luteum ftaminulis piurimis con-
ftantem finè radiatis in ambitu nafcentibus folio-
lis, continentia: donee tandem eadem ftaminulo-
rum locò, *Seminibu** folidis & angulofis, excine-
reo colpre albicantibus, Foeniculi feminis ma-
gnitudine, onerentur. In Bonae Spei Promon-
torii

torii locis herbofis, oritur, ubi Menfe Oftobr
8c Novembri vernatj unde fub nomine Conyzae
minoris, faepius jam memorato ILLUSTRIS-
SIMO DOMINO à EE VERNINGK miffim.

CHRYSANTHEMUM

AIZOODES AFRICANUM

PRIMUM, S. LATIFOLIUM.

Cap. LXXIX.

NOvi prorsus *Chrysanthemi* tria genera, mihi
antè duodecim vel tredecim annos *Jjkri*
Abides nuncupata, à nemine, vel verbo etiam
leviter tafta, propono, fubftantiâ Sedo five Ai;
zoo planè familia, fed quantum mihi liquet, nulli
convenientiis, quàm *Chrysanthemo*, in primis
generi *Floris Solis* nomine decantato adjun-
genda[^].

Trimum genus, nobis Chrysanthemum Aizoides
Africanum, latifolium, flore citrino appellatum, antè
plures, quàm XVII. annos, Amici nostri *Caroli*
Chivryp. m. hortus Amftelodami, ex femine à
Promontorio Bong Spei delato, dedit. Cujus
caules cubiti altitudinem contingebant, glabri, te-
retes, fucci pleni & colonis ex viridi albicantis:
Foliis dilutone cinvenufto virore pidis, perlon-
ga intervalla, frequenter binis donafeantur, Por-
tulacae craffitie 8c flicculentidj fed *Calendula*,
quâ figuram 8c magnitudinem ref{>ondentibus:
è quorum alis, ramuli aliquot pullulabant, mi-
nribus foHis, 8c Gemmis jam jam onufti, fed ea-
rum

rum floreaſpes intempeſtivis pruinis praeuſtade-
coxerat. Nam cujuſlibet tantum cauliſ fummi-
tas, *F/orem* faltem unicum peramoenum, ex capi-
tulo viridi, craſſiv'in folia feu lacinias quinque
decuſato, Menſe Septembri vel O&obri oiFere-
bat, cadem qua flos mediocriſ Calthae amplitu-
dinei Floriſ autem Soliſ figura, umbone citrini
coloriſ, quem per circumferentiam concolori-
bus, anguſtiſſimis ac uncialibus petaliſ copioſe
cingunt, conſtante. *Semen* mihi non viſum, fe-
quentium par judico.

Figurae₅adPlantamficcam molliuſculiſ albi-
cantibuſ villiſ praeditam, à Pidore accuratè ex-
preſſae, pili inlunt nimis rigidi & folia aliquantum
anguſtiora_?.

CHRYSANTHEMUM AIZOOIDES AFRICANUM SECUNDUM, S. TERE- TIFOLIUM.

Cap. LXXX.

C*Hrysantbemi akpoidiſ Africani fecundum genus;*
raritate ac venuſtate primum anteceſſens,
lociſ apriciſ atque aſenofiſ iterum iterumqj me-
mdrati Promontorii, cui Flora Athiopica infe-
dit, nee non confinii Inlulae, à Phocarum in illam
demigrantium copia, Bataviſ JKoWm &)l(Mt>
di&ae, deledatur.

Hoc, ex Semine ad fuſcum inclinante, ſubro-
tundo₃ & ejusdemferè qua Hormini magnitudi-

ne,(quod MACENATIS NOSTRI gratis debemus) in horto nostro feliciter An. *clo* Isc LXVIL&LXVIII.fuccrcvit. %diceverb confatabat dodrantali, digitum crasà, tereti, & albà,Raphani minoris oblongi, quā. figuram 8c confitentiam fimili, fāpore tamcn aquco: ex hujus capite, *folia* complura fucculenta, fefquipalmaria, digiti infantis ferb crasfitie, teretia & flavo viridi lsevore nitida edebat, quorum plurima convexa, ac in extremitatibus ficcata. Inter *hxc* duo, tres, vel etiam, ni fallor, *Caules* plures, magnitudine & crasfitie foliis penè asquales, porrigebantur: F/ora«,part:im Hortulani mei negligentia,partimfrigoris ingruentis acerbitate, nullum proferebat; fedinplantarumrariorumabundantisfimo HORTO BEVERNINGIANO, avarum fiii Ipe6taculum, Solis radiati inftar formatum indulgens,fiimma pompā oculos ditabat, eādem quā primi generis figura jnifi quòd duplb penb major, umbone aureo, petalis latioribus &c majoribus fiilphureis, in ipcia parte flavis, radiato> fiierit. Folia inlūper, autlacinise Capitis ftellatse, teretes & falcate erant. Plantam annuam, flore femineq; edito, evaftefcentem judico. Figura noftraadILLUSTRISSIMI DOMINI HIERONYMIàBEVERNINGKpidū ram expreflā^.

CHRYSANTHEMUM
AIZOOIDES AFRICANUM
TERTIUM, SIVE TRIANGULARI
FOLIO, FLORE AUREO*
EJUSQVE SPECIES.

Cap. LXXXI.

T^lertii generis, qmtuor iisdem in locis reperiuntur species: quarum tertian & quartae figura à Domino T>o Bore ten ^Rhyne sub nomine Sedi majoris & minoris trigoni, ex Decima Japonic confini Infula, mihi transmissa.

CHRYSANTHEMI AIZOOIDIS

Africani tertii generis, Jpeciem primam;

Jtve

C¹hrysanthemum Aizooides Jfricanum triangularifolio, ijlore aureo, ctiam Anno CID IDC LXVIII. in horto meo educavi. %adicem habebat fecundQ fimilem j fcdgrandiorem: qu« aliquot humi jacentia, aliquot indefe efferentia, in orbem, velut Aloëpumila cGkt, folia diffiindebat, jucundo virore oculos delecl:antia, dodrantalia₃ digitalis verborum craffitiei & triangularis figurae. Ex illorum medio, caules rotundi ^ex viridi albīcates ^tres aut quatuor, plūsquàm pedales, binis ut plurimùm, &, ut inferioratriquetris 5 fed minoribus/i//^ praditi, prorumpabant. Horum unicuique, fenefcente autumno, crafliim, oblongum, in quinque lacinias angustas disfēcl:um, calycis callofi Avellanae Lombardicae fimile, alabafimm addebatur: quod occultum fuum decus, meo etiam₃ ficut praecedens, hor-

to invidit, quò BEVERNINGIANI maneret proprium ornamentum j ubiftellae in modum, in quinque angulos refolutum > *florem* aureo fulgore comantem protulit, primi generis minorem, umbilico dilutiore, tres vifujucundos virides circulos exhibente, ornatum. Quantùm ex picturâ, (omiffis caulibus) vivis coloribus in membranâ puriffimâ affabrè illuftratâ, atque, ab ILLUSTRISSIMO DOMINO à BEVERNINGK, mihi gratiofiffimè communicata, augurari licuit. Semen Secundi generis minus.

CHRISA HEMI AIZOOIDIS

Affricani tertii generis fecunda jpecies;

Jive

C *Hrysanthemum Ji^poides Africanum triangulari*
^ffolio, flore purpureo : rariffima, 6c quantùm mihi conftat, Europae noftrse, minùs reliquis, nota. Antecedenti perfimilis, nifi quòd plerumq; major, & folia floris umbonem luteum circumdantia, purpurei coloris pulchra à Naturâ pida. Tota hæc planta cum tribus antèdictis & duobus fequentibus, præprimis folia cum capitibus, ut Aizooum fucculenta: Sapor aqueus, nitrofi quid occultans 5 quod in ficcatis ^ quae planè filfae, clariùs pater_>.

CHRISAN THEMI AIZOOIDIS

Africani tertii generis species tertia s

Jive

C¹ *Hrysanthemum Aifyoides aAfricanum triangulari*
Gifolio, flore cameo: Secundæ Ipeciei valde fimilis; exceptò, quòd petala, quibus umbo floris radiatur, carnei fint coloris.

CHRIS-

ICONES CENTURVIA PRIMA. 79

CHRYSANTHEMUM
AIZOOIDES AFRICANUM
PRIMUM, S. LATIFOLIUM.



37
CHRYSAKTJEMIM AIZODES AFBJ CANUM ITJANGIARI
FOLIO, FLORE AITKEO.



CHRISA[^] THEMI AIZOOITHS*Africani tertii generis, quarta species 5**Jive*

C[^]*Hryfanthemum*^{^i}*Kgoides Africanum triangutarifolio minus, flore flavo. Hac quantum ex Domini Do Boris ten[^]byne[^]gm^k transmissa conje&andum, pedalis circiter j rW/te procumbentibus articulatis, quos Folia triquetra, reliquis breviora, & longè angustiora exornât. Flores, m caulibus & ramis fe fblitarios, ut in caeteris praeberentes, parvi fiint 5 capitulo trigono, petalis brevioribus, ac paucioribus quàm primas ipecici, quorum color luteus feu flavus, cincl:o.*

**CHRYSANTHEMUM-
LUM ERICOIDES, CA-
PITIS BONA SPEI.**

Cap. LXXXIL

A Ntè florum proventum, adeb Ericas Coris XjL folio fimile, ut eruditissimus etiam Botanophilus, congenerem ei existimaturus fit. Parvus enim est *Frutex*, complurimos, graciles, lignofos, fubrubentes & velut quibusdam tuberculis obfittos, proferens^{r^w«/ox}: qui in fuperiore, ubi leniter lanuginofi, parte, *Folio/is* Ericae Coris folio Secundae Clufii perfimilibus adeb confertis funt onufti, ut nullum ferè lignum confpiciatur. Summis ramulis, finguli, vel bini aliquando, fepiùs tamen numero plures, quafi in umbellam difpofiti, infident *Flofculi*, Millefolii non multo majores,

petalis multis pallidis, diicum parvum radiantibus 5^e Capitulo, foliolis crebris fibi invicem incumbentibus compacto, prodeuntes. His marcidis, *Semen* ex fusco spadiceum, turbinatum, uva? acinis aequale, sed multo minus, superius verb ubi angustius, denticulis quaternis duriusculis, veluti coronulâ (in modum Chrysanthemi bidentis ferè) donatum*, succedit, in materiâ quâdam villosâ latensjunde, & propter capitula florum, quâ ab Asteris capitulis non valdè abhorrent, olim mihi Asteriscum appellatum.


ABSINTHIUM TENUI- FOLIUM ODORATISSIMUM MONOMOTAPENSE.

Cap. LXXXIII.

A *ABJnthium* hoc, in Africa annis abhinc duodecim non procul à Promontorio Bonae Spei repertum, atq; in Europam allatum, pulcherri-
mum omnium est, Pontico tenuifolio incano
Cassia Bauhiniperfimile; nisi quod *caules* altiores proferat, quos *Folia* nonnihiU majora, candidiora, concinnioribus (egmentis divisa, atq; jetiam ad eorum rachin lobulis elegantissimis prœdita, ambiunt: dividunturhipraeterea superiore parte in plures ramulos, *Flofculis* minoribus densioribusq; instar Abfinthii tenuifolii Auftriaci Clusii, onustos. Sapor infiiper, ac praeprimis odor, jucundior & fragrantior est, quod omnia fui generis praecellit.


LASER-

CHRYSANTHEMU-
LUM ERICOIDES CORO-
NATUM CAPITIS BO-
NAE SPEI.



Brunia verticillata Kun.

ABSINTHIUM TENUI-
FOLIUM ODORATISSIMUM
MONOMOTAPENSE.



LASERPITIUM DAU- COIDES PRUTENICUM VISCOSO SEMINE.

Cap. LXXXIV.

P*Lanta umbellifera*, quæ a nonnullis, primiim
in Umbellas femina pericarpiis inclusa, 8c
Umbellas femina planè nuda gerentes 5 ac post-
modùm quaelibet harum in fias iterum clas-
sæ disponuntur: *infecjuentia novem* abExcellentissimo
Dno Morifono *t/ènera*, pulchrè distributa * ut
funt,

Vmbelh pilifera.

Vmbella ftriato femine

ZJmbella femine alls foliaceis cinHo

XJmbella femine ~~all~~foliaceâ cin&o

Z)mbeila feminevilffolfeu hispido

Vmbella femine echinato, feu aculeato

VmbeHa femine foliaceo fubrotuhdo

Vmbella rojlrata.

Vmbella rotunda,feu teWicuhta.

} *donata.*

Ad quorum *tertium*, lequens etiam *fpeftatLaferpi-
tium* > ericetis & fruticofis nonnullisBorusias col-
libus & Casfibicc gaudens ? præfertim dumetis
occidentem versùs, amoenissimi & pracdiorum
praedivitis Casfubiae pagi ^OppoC/ ubi Julio Men-
fe floribus, Augusto verb ac Septembri floribus
& feminibus onustum, obiervavi.

Hujus %gdixY)mci vulgaris Clufiifimilis, fa-
pore amarocumquâdam^dulcedine^in fibras au-
temcraffiores magis brachiata, hocqj aliquando
ab

ab ipso statim capite > unde *Folia* humi in orbem
 sparguntur dodrantalia, hirsuta, Dauci hortensis
 aliquatenus paria, in laciniis verb pauciores^ ma-
 jores, latiores & obscurius virentes dissecantur. In-
 ter quæ altero, subinde & tertio à fatione anno,
 cubitalis vel altior erigitur, pennae anserinae
 craffitie, rotundus, ftriatus, hirsutus, medulla
 albâ plenus, viridi vel ex albicante (iubviridi co-
 lore) dodrantalibus interstitiis distinctus genniculis,
 è (Juibus fc *folia* proferunt, inferioribus fimi-
 lia, at lobulis latioribus divisa: ex illorum alis
 praefertim superiorum fingulis₃ finguli exoritur
 quorum apices asquè ac caulis uncialibus,
 angustis₅ acuminatis, limbo albo cinctis depen-
 dentibus circumradiantur foliolisj horum egre-
 mio, *Umbella* ampla, radiis subalbidis, vel ali-
 quando amethystinis, bi-8c triuncialibus constans
 confilii, in alias divisa umbellulas, *flocculotum*
 niveorum ex foliolis quinis & totidem faminu-
 lis conftrudtorum, compo{itas 5 sub quorum pe-
 dunculis, foliola parva quaquaversum instar
 jam didi caulis & ramorum apicum radiata
 cernuntur. Flocculis pereuntibus, succedunt
 unicuiqj, *Semina* bina simul juncta, tenuia, ob-
 longa, Panaci Alclee Apuli Columnar minora,
 eâ quâficonnostra accuratè exprimit, magnitu-
 dine; in quorum fingulis, alse membranaceae ac
 pellucidæ, ad fadiceum cum maturitate vergen-
 tes, femper quatuor, utpotè convexâ parte ftu-
 dorifoduae, & totidem in marginibus, observan-
 tur: hæc relido stylo nutritivo facile difiliunt,
 & ad confervationem fui generis tandem deci-
 dunt. Caeterum, y0»e» nostri Laferpitii, viscosa
 qua-



LASERPITIUM DAUCOIDES PRUTENICUM
VISCOSO SEMINE

quâdam materiâ odoratâ manus quâfi inficiente, dum viret, obfitum, contritumqj gratisfimum ex Citro, Benzoino & femine Dauci mixtum aromaticum, cerebrum admodum recreantem odorem fpirat; à quo Sapor oris halitum commendans, multum recedere non videtur, quam magis volatilis, languidior & linguae, amaroore fiio, paulb ingrator. De Laferpitio hoc, quaedam mihi etiam Plants, folia latioraSc minus hirsuta habentes, ex Casubiae non procul bttRo\$V\$&Vfot Rhodano flumini adjacentibus montibus, translatae sunt; cujus varietatis causa, rationi fortè loci adferibenda-?.

SALVIA MINOR iETHIOPICA> FOLIIS CHAM^LAAGNI ASPERIS.

Cap. LXXXV.

Salviae duo reperiuntur^mi juxtâ Promontorium Bonae Spei. *Trimum*, five *Salvia arborescens major, foliis Ferbasci*, ultra duorum hominum altitudinem excrefcens, & iui prodiga fepisfimè magna fruticeta efHciens,â Jacobo Bontio, nomine *Salvia Indiae arborefcensis* jam deicripta est.

Alterum verb, cujus hiftoriam defcribere hic conftitui: Fr«^x*tantum est parvus, *caule* quadrato, lignofo, alpero, quandoq? ipadiceo, feu purpurei obsoleti coloris j ex quorum geniculis alae utrinq; cruciatim alterno verfu oppositse bi-

nae panduntur, itidem quadrate", & ramis aliis decussatae,* *Foliis* Chamaeleagni Dodonaei minoribus, asperioribus & rugosioribus magisque venosis, per genicula binis, cauli & ramis haerentibus. *Flares* in caulis & ramorum summitatibus, in spicam ramosam fiint dispositi, cædem figurâ ac colore, quâ *Salvia?* nostratis, ex paribus etiam calyculis, atque spidioribus, aliquandò pulchrè violaceis, prodeuntes. Odor totius hujus Plantae gravis ad Hormini vergens. Sapor aromaticus.

SALVIA STRUCKI, CISTI FOE MINÆ
foliis, acetabulis <i5\folucca.

Datur etiam *Salviae* admodum raræ genus in Syria, Europae nostrae adhuc incoenitum. *Hoc*, *Salvia*; minoris auriculatae infardentè fruticat, multis ramis brachiatum, ex quorum geniculis adversâ oriuntur *Folia* bina, *Salviae* vulgaris multo minora, circinata; *Cisti foe** minae foliis paria. *Flores* verticillatim circa fummos ramulos nascuntur, è calyculis five acetabulis Moluccas pergrandibus, purpurascentibus prodeuntes, galericulati, ac violacei coloris. *Semen* nigrum.

Salviae hujus rarissimae etiam mentionem fecit *Ifyuwolfius*, in suo Hodaeporico, parte primâ, capite IX, paginâ 119.


ICONES CENTURA PRIMÆ 80

CHRYSANTHEMU M
AIZOOIDES AFRIGANUM
SECUNDUM, S. TERETI-
FOLIUM.



ICONES CENTURA PRIM A. 85

SALVIA MINOR JETHIO-
PICA, FOLIIS CHAM,
LAAGNI ASFERIS.



Y

Salvia chamolagnia Nees Pl. Alp. p. 7.

LEONURUS CAPITIS

BONJE SPEL

Cap. LXXXVI.

PLantarum hoc infigne verticillatarum decus, quod diligentia incomparabili BEVERNINGIANA Anno M. DC. LXIII. primum Europe innotuit 5 mediam cum Lamio, Sideritide & Marrubio affinitatem obtinet, atq; ob florum fimilitudinem, Lamium a quibusdam, non sine ratione judicatur: abje&a fanè vilisq; quà nomen, planta j verum si raritatem ac elegantiam ejus incomparabilem confideres, certè est una plantarum pulcherrima, quam communis omnium Parēs Terra, è gremio suo progeneravit.

Habet autem illa cubitalem *caulem*, ftriatum, quadratum, sed obtusis angulis, brevi ac incana lanugine obduclum j binis angustis atq; incanis *Foliis*, per ambitum j ferratis, alternatim per longa intervalla haerentibus, ut in Sideritide vulgari, sed longioribus: ex quorum finibus, ramuli similiter quadranguli, minoribus foliis amicT:ipronascuntur, atq; hoc ab imo caulis ad fimmos ferme geniculos; quos verticillatim ambiunt innumeri, teneres, ftriati, in aculeolos aliquot exeuntes *utrkuli*, pedunculis parvis juxta basin appendiculas more Marrubii falcatas habentibus, infidentes 5 è quibus *Flores* exeunt galericulati, fistulofi, Lamii floribus formà non abfimiles, sed multò longiores, incomparabilisq; elegantise, ex aureo phoenicei ardentisfimi coloris.

loris, ac molli lanugine hirsuti, labro demisso parvo & trifido, galea longissima, pilis holericeis exphoeniceo pulchreplendentibusfimbriatâj quas prius, quàm è calyce erumpit, Lamiï inftar reflexa, mox verb non finè ingenti Plantae hujus ornamento, animofi inftar Leonis invi&isfimè triumphantis caudle, in sublime erigiturj sub quâstaminaquaedamlongissima, apicibus parvis capitulata, delitefcunt. Elapso florum *tempore, femina* quatuor in quolibet utriculo fiiccedunt, quorum colorem & formam non obfervavi. Sapor hujus plantas amarus, Odor aromaticus, attamen gravis, infimâ praeprimis calyculorum parte, qui etiam duodecimo post collectionem anno contriti, eundem penèquem Marum Matthioli odorem produnt. Vere in omnibus ferme pascuis juxta Promontorium Bonae Spei florets.

Inter plantas illas depictas, quarum munere Anno M. DC. LXX V. *Excellentissimo T>no. ten^c Bj)yne* me condecorare placuit, hæc etiam ernibat elegantissima: quâ occasione *laudatus T>n. ten %byne* hmul expofuit, ejusdem plantas flores alimentum praebere aviculae omnium elegantissimae *Ouriffia* Clufii dicta?, quam cum magna efficcatarum plantarum copiâ in Promontorio B. Spei reliclam, Patrueli meo *T>no fobanni "Brayne* Amftelodamum, perqj eundem pratereâ mihi transmittendam curavit. Verùm, in hunc usq; diem, nee de aviculâ, nee de plantis (quod maximè dolet,) quicquam percipere potuimus.



W. Steud. delin.

Joh. Benj. Meissner sculp.

RAPUNTIUM MTHIO PICUM> VIOLACEO GALEATO

FLORE, FOLIIS PINASTRI.

Cap. LXXXVII.

DE *Rapuntio galeatis floribus*, genera qucedam Africano in Promontorio Bonas Spei nāfcentia, ā nemine adhuc defcripta, ac rei Herbaria? deditis procul dubiō haud ingrata > hie in fceham proferre volui. Quorum primum, ex radice lignosā, *Virgulas* dodrantes profert, interdum etiam ampliores, lignofās, tenues, non valdè ramofas, *Foliis* uncialibus, anguftiffimis, rigidis, triquetris, Pinaſtri aemulantibus, Chamaepeuces Alpini in modum circumquāqj denſb ftipatas. *Flores* in virgularum & ramulorum fummitatibus, ac aliqua'ndo etiam lateribus, pediculis longis innixi, haud multum ā Rapuntii Americani coccinei, five Floris Cardinalis, difc ferunt, coloris autem violacei, Ajugae non multò majores 5 labello antè in lacinias quincj di- viſb, in fiindo verb integro feu fiſtulofb, con- ftantes: è cujus centro cuculli loco, *Jlylus* pro- minet longus, cujus extremitati cra(Tum₅ ob- longum, fubalbidum, anteriùs pilofum caput, Rapuntiorum aliorum galeatorum ritu infidet. *Semen & Fruſum* non vidi₅praeter immaturum, qui, quantùm colligere poteram, cum Rapuntio maximo coccineo fpicato flore, a Columnā, in %erwn sO\Edica,rum 3\ov* Hijpani* 3\jtrcli <tEnto- nil^cRecchi<zJ'nnotationibiis,pag.%79- defcripto,con- gruebai^.

RAPUNTIUM JETHIO- PICUM, COERULEO GA- LEATO FLORE, POLIIS CORONOP L


Cap. LXXXVIII

PErelegans 8c humilis est *TUnta*, plurimis viridibus, hirfiitis 8c tcretibus *prædifica ramulisi* per quos *Folia*, nullo certo, sed confuso ut plurimum ordine posita cernuntur, pollicaria, angusta, hirfiita, in laciniis aliquot laterales, inter Coronopi, vel potius Leucanthemi *alpini Clusii*, divisa. Ramuli in *pediculos* abeunt *graciles*, nudos, laeves, uncias quatuor vel quinque longos; quorum apices saepissime rursus in duos pedicellos unciales dividuntur: in quibus fingulis *Flos* altero tanto, immb 8c triplo major, Cyani five Lazuli coelestis decus aemulans, 8c longa in medio macula albâ notatus; quantius infisfiiras brevioreslatioresquedivifus, 8c ex calyculo quinquefoliato hirsuto, originem suam primae in modum speciei, petit. Hoc cum antecedente Anno M. DC. LXIII. primum in Europam ILLUSTRISSIMO DOMINO HIERONYMO à BEVERNINGK, ex Promontorio Bonae Spei ficcum transmissum.

ICONES CENTURIA PRIM A. s7

RAPUNTIIUM JETHIO
PICUM, VIOLACEO GA-
LEATO FLORE, FOLIIS
PINASTRI.


*



ICONES CENTURL& PRIM A. ss

RAPUNTIIUM JETHIO
PICUM, COERULEO GA-
LEATO FLORE, FOLIIS
CORONOPI.

*



RAPUNTIUM iETHIO- PICUM, COERULEO GA- LEATO FLORE, FOLIO- LIS DENTATIS.

Cap. LXXXIX.

TEnues & humi diffufos habetRapuntii ga-
leati tertium genus *cauliculos*, frequentes,
fesquipedales, interdum ampliores, *Foliis* parvis,
crasfiufculis, per circumferentiam crenatis, al-
ternatim pofitis &c verfus unam partem frequen-
ter fe torquentibus, amictos. *Flores* in extremis
ramulis juxta longitudinem inter folia fpicatum
quadantenus exeunt, figurâ Sc magnitudine pri-
mi generis, coloris autem dilutè coerulei.

Hoc cum duobus pracedentibus, ad tricapfi-
lares galeati flores gerentes pertinens, ex defe-
ctu confortium & ejusdem farinae, ut fixntTra-
chelia & Campanula &c. hie poft galeatas ver-
ticillatas, bb florum fimilitudinem locare volui.
Cui haec difpofitio non arridet, Saxifragae angu-
stifoliae autumnali ea in hoc Opufculo fiibjungat.

ELAPUNTIO AFFINIS LINI FACIE, CAPITIS BONÆ SPEI.

Cap. XC.

NAfcitur *hac* prorfis nova ac venufta Plan-
ta, quam primū ab ILLUSTRISSIMO
DOML

DOMINO a^h BE VERNINGK, poſtea à Z^h.
Huyberto &- ©. Slado accepi, in locis herboſis ?ro-
 montorii Bonae Spei, Lini fylveſtris magnitu-
 dine & facie; fed magis lignoſa, numeroſio-
 ribusq; ramulis qqps *Folia* bina è regionc am-
 biunt , laetà viriditate pida & Lini effigie.
Flores, caulium & ramulorum cymis, ex albo
 fuaviter rubentes, feu humani vultûs formoſam
 temperiem bellè repraeſentantes, innaſeuuitur >
 eodem ordine & figurà,quà Lini fylveſtris, ex
 quinis itidem foliolis conflati: non aliter acſi vo-
 luptate quâdam minùs curioſè contemplantium
 oculis fucum facere, ut verum Lini genus cre-
 dantur,geſtirent. Aftoblongus ſubrotundusq;
 qui flori ſubeſt/r«Sſſcr, plantam hanc Rapuntio
 Altero leptophyllo capitato Columnx magis ar-
 finem declaratj quamvis calyculus ipſi ſiibſideat
 parvus , contra morem Rapuntii.

EaVISETUM JUNCEUM
 NIGRINODUM CAPITIS
 BONA SPEL

Cap. XCI.

ANNO M. DC. LXIV. perrar* cujuſdam
 plantae %amo, circa Promontorium Bon«
 Speiluxuriantis ILLUSTRISSIMO MiS.CE-
 NATI me donare collibitum eſt. Is intrà bi-
 nas ſpithamas ſubſſtit, TW^conſtans calami fru-
 mentacei crasfitudine, nodofb, laſvi; tereti, in
 alterâ tamen parte piano, non adeò, ut Equife-
 ti vul-

ICONES CENTURIA PRIMA. S₉

RAPUNTIIUM JETHIO-
PICUM, COERULEO GA-
LEATO FLORE, FOLIOLIS
DENTATIS.



ICONES CENTURA PRIM A. 90

RAPUNTIO AFFINIS
LINI FACIE CAPITIS
BONit* SPEI.




Z 2

Chironia Lindeae. L.

ICONES CENTURL& PRIM A. 91

EQUISETUM JUNCE-
UM NIGRINODUM CAPI-
TIS BONI SPEI.

#



Z 3

ti vulgaris flexili ac molli, fed magis lignoſa Arū-
dinis inftar, intrinſecus niveo ac concavo, extrin-
ſecus ex obſoleto virore caſtanei coloris, Scquaſi
pun&ulis atris infecto. Genicula foliorū vice, ite-
volucris nigris, ftriatisq; in acūtude finentibus cir-
cumvoluta ſunt: ex quibus *rami* graciles, lentes,
ac obſequioſi, geniculis creberrimis diſtincti,
contrario fitu prorūpunt; qui rurfus ab imo flic-
ces ſive in frequenti adivaricantur vimina, hæc q; iterum
in alia minora, ramoſa, tandemq; in par-
vas furculas, pari, cum caulis, ramorum & vi-
minum colore, terminantia. Totus ille Ramus
caudam non malè equinam repræſentat j unde
hanc plantam, Hippuri quoq; non diſparem,
Equiſetum appellare jam diu placuit, donec in-
dulgente aliquando Fortunâ, Horum, ſipſum
ac Seminis ope certiora edoſtus, cui Pmitarum
claſſi inferenda fit, intelligam.

An Amndinis graminea aculeat Alpini genus?*

Oritur hæc Planta, ut diximus, in Bonæ Spei
abundantiſſimo Plantarum rariſſimarum faluber-
rimarumque Promontorio. Ubi inter alias in-
auditas, etiam *Arbor quadam rariſſima keens, fru-
Bim Halicacabi;*

Arbor fabaria,

Arbor glandular id,

- *Amygdalus Africana arnara,*

Genijia coerulea. flore cœruleo,

Erica ſpicata majoribus oblongis ex cameo purpureis,

Lilium coccineum coronatum & M'ontis Tabulari,

^ (arcifus pharicus, floſculis parvis obſoletis,

Ornithogalum tuberoſum ſpicatum, luteum, odoratum,

*of Monorcbis caule foliis & floribus ex rubro pun-
Batis,*

Z ,

f*co-

*facobaa aS^fontis Tabulari,
 Quinquefolium angujlifolium bulbosum,
 Trifolium bulbofum,
 'Planta Cyclaminis radice, folio Dentis Canini,
 Tlanta Afarifolio,*

Tlanta Tyrol foliis, & Acetofa African*, radice
 tuberosa, reperiuntur: Quas ab Excellentissimo 2) #.
 Hermans* hvuejligatore D^Qatwra Jagacisfemo, Anno M»
 DC. LXXII. in loco prxdido detedse, atque
 inde cum aliis Plantis, radicibus, frudibus, fc-
 minibus, & variis infe&is nondum defcriptis
 ILLUSTRISSIMO DOMINO DNO a
 BEVERNINGK & Excellentissimo T>no Ar-
 noldo Sye transtnife: fed penè omnes, cum in-
 genti rerum Botanicarum ^c India^ copia^ > q^{ul},"
 bus me^arum Cultor ftudiofifimus ex eodetti
 loco donare confituerat, apud Infulam S. Helen*
 ab Anglis, naves Batavorum ex India Orientali
 redeuntes, intercipientibus > lion finè magno
 ftudiorum meorum incommodo, ereptae.*

*Ca3terum etiam abExcellentissimo!Dnoten^Bj>y^{ne}
 (cujus in obfervandis naturaliii induftria, magn^a
 Pofteritatipollicetur) A. M. DC. LXXffl. p l ^
 tx complures novae, partim in Promontorio Bo-
 nae fpei, partim in Saldanha Gnu, obfervatae fiñs
 quas in amicitiae mecum cultae fignum reficcavit>
 8c cum calamo, tum vivis coloribus, affabr^e ^'
 lineavit. De quibus tamen figurae, & quideff^{cl}
 plantarum tantum frequentium ad me pervenere:
 ut fiint: nrfifyon cmciatum Sinus^Saldanbac'h quod Eft*
 lam Indicant vocat Pontius, T>niten %hyne.*

fleode Agoa de Saldanha, 2)». ten ^/».

*Arbo rofea flore flavo, Capit'u *B. S. T>n. ten ^{Rb.}
 Arbor*

Arbor rosea folio infernè incano, T>n. ten %b>.
 (tAfler gnaphdoides flore albo-, Capitis Bona Spei.
 Cbrysocome angustifolia Africana.
 Erica aculeata foliorum lanuginè cinerea <Dn. ten ^rR}>f.
 Erica arborefcens_y capitulis lanuginofls, flore flavo, T>.
 ten ^cRfy?ie. An Chenopoda Monomotapensis >
 Erica ereBa minor flore purpureo spicato,
 Erica florulentis capitulis alba noduligera >
 Erica noduligera capitulis hirtis ex purpureo fusci
 coloris,
 Suffrutex Erica formis, flore elegantis flmb rubro,
 (Geranium flore intensè rubicundo, Cap. Bona Spei,
 (Geranium z! Adaha folio, flore purpureo,
 y'cranium noBu olens, radice tuberosa > longa, flore
 violaceo,
 Ornithogdum amyflifolium Tromontorii Bona Spei y
 Pimpinella zA^fricana maxima, flore purpureo,
 Planta bulbosa, Umbilici Veneris facie
 *Planta Petajitidis folio, Capitis 2\$ona Spei^2). ten ^Rb.
 Ptarmica fimilis plant a angustis fimis foliis, Capitis
 Sotue Spei.
 Sedum maximum arborefcen_y latifolium, flore flavo,
 Capitis Bona Spei, Dn. ten 'Rhyne,
 Solanum spinosum arborefcens, Capitis Bona Spei,
 Tithymalus dendroides aphyllus Capitis ^cBona Spei₉ Dn.
 ten ^cR}vync. An Xabra & Camarronus Rhafis,
 Rauwolfii ?

Prater has Africa? Plantas, Anno M. DC.
 LXXVI. Excellentissimus Dominus Arnoldus Syen (cu-
 jus incomparabilis, quam perfcrutandis impen-
 dit Plantis exbticis diligentia, Botanico ftudio,
 facem lucidissimam promittit) complures adhuc
 rarissimas ex Promontorio Bonae Spei naftus est?

dc quibus frequentia tantum nomina à J. *obit* ino
2). *Tosfesfore* nobis communicata, commemorabi-
mus: *Tfarba foveis* <*Africana.

Cyanus arborefcens Styracis folio <tAfricanus.

Cynoforcbis flore luteo albicante.

(gladiolus flore luteo.

gladiolus edulis flore vario.

Gladiolus radice eduli flore coeruleo.

*(jrladiolus flore trifli; hic apud me in hortoe Academico
floruit^fed nihil cum gladiolo habebat commune, vocavit
Florem Tigridis Africanum, à floris forma^ &" colon.*

(Gladiolus caudatus.

Gladiolus montanus.

*Halicacabum arborefcens. An Arbor lucens, fru-
<ftibus Halicacabi; D. Hermanns >*

Hyacinthus Indicus tuberosus, flore luteo.

Iris juncea₃ flore caruleo.

Orchis flore rubro.

Orchis maximus, flore luteo.

tphalangium aAfricanum ferfoliatum.

Sedum flore rubro pendulo.

Sedum montanum flore odorato.

Senecio fofstida Jfr. 'perennis/oliis confertim nafcet' i0'

Tithymalus Africanus, platyphyllus.

SELAGO INDIE ORIENTALIS, SIVE PLEGMARIA AL- MIRABILIS ZEILANICA.

Cap. XCII.

Z*Eilan, ycl fi mavis Ceylan, continentis Indiæ
confinis Inlula, undc iqgenti terras motu,
quo-*

quorundam opinione abrupta, multis verb Viris do&isfimis *T'aprobana* Antiquorum, immb ab aliis nimis remotè abeuntibus, 8c ab ipfis etiam Indigenis, Paradifi locus credita,- prater "Cinnamomum, quod profert, prseftantisfimum, non vulgarem gloriam etiam à maximâ medicinalium, rariorumque plantarum copiâ, in eâdem occurrentium, reportat. Inter quas *Tlegmari** huic *admirabili*, Anno M. DC. LXIIX. vel IX. # in Europam allatae, non postremus debetur locus: qu*ippe in quâ fingulare miraculum, & admiratione digna dispositi Ojimmbmirandum artificiorum Naturae accurato Contẽplatori obfervandum. Ea tripedalem obtinebat longitudinem, atqj *caule* olorinam fermè pennam craflb confatabat, rotundo, ftriato, ex viridi flavo obsoleto, ad Olivarum conditarum colorem vergente: qui parumper ultra femipedem à radice, in ramos duos penè dodrantes, dividebatur j atque hi in totidem, aliquantb longiores, quorum quilibet rursus in binos, vix triunciales tenues definebat. Di&us caulis, ab infimâ (cui quaedam adhuc radicum fibrae adhacrebant) parte, usque ad extremum apicem, *folds* crasfiufculis, cordis figuram inverfam exprimentibus, femunciam in longitudine & quadrantem uncise in latitudine, vix fuperantibus, ex flavo viridi ad Olivarum colorem inclinantibus, rigidiufculis & fplendentibus, Tithymali paralyi ritu, veluti fquamis denfisfimè obtectus, conlpiciebatur: In unoquoque autem fiipremorum ramorum apice, artificiofum *Tlegma* fesquipalmare, tanto ftudio, tam curiosè & fcite & Naturâ elabora-

turn, ut potiùs artificiale quid, quàm naturale putandutn, fefe oftentaret. Hoc, ped iculo perexiguo innixum, in duas utplurimùm partes primiim dividebatur: fingulae verb deinde plurimis divifis tenerrimis flexilibus claviculis (aut ramulis) in divifione bifidum ordinem frequenter obfervantibus, & tàrn accuratè tandem terminantibus, ac fiformice effentrefe&ae; quxin • univerfum cruciformi ferie, ut Cuprefsi ramufculi₃ planèc6tecT:ae₅{quamulis({eufoliolis>otundis, Sanamuridae tertise Clufii foliis, ex parte re(pondentibuSjfedlongè minoribus_aeodem quò planta intcgra, ejusque folia, colore j quarum flngularum ingremio^{r4}»«/#worbiculare₃albicans & pellucidum, Bombycis-ovi magnitudine & facie latebat, fuperiore medietate ex fculmulâ faepiùs emicans, intus inane, ex denegatâ forfan maturitate: cundta enim hsec Granula, Selaginis primae, fecundas & tertiae (*qua offanis nofiris % ,W\$*)' \$Q6a *appellatur.nec*^C^XcAtKfut iwsZMifcelhneis *Curiofis* (Cfnni tertii &: quarti err ore Typographico expres* Ja) Thalii inftar pulvifculum fulphureum ferre autumo. Hanc ob caufam-, & quòd Plegma etiam, non minimam cum Selaginis clavis habere affinitatem videatur, *Selaginem India Orientalif*, hanc plantam nominavL

SELAqO I^DIJE O%IEJ{JALIS>
trigonis granulis.

IN defcribenda^{^/^^r/^} hujus admirabilis hiftoria **l**occupatum, *Illuftrisfimus T>ominus[†] a B E V E R-* NINGKy^{^w} fibi ex Zeilanlnfula^{^c/>w}, non orbicularibus, fed *trigonis granulis*, effe muTam, U-
 teris

teris me certiore fecit. En evidentiffimum
 filij a curiosasq; diligentib; & accuratiffi-
 ma obfervationis exemplum in ILLUSTRIS-
 SIMO hoc VIRO, MACENATE NO-
 STRO GRATIOSISSIMO/ a quo, priorem
 etiam *Selaginem India Orientalis granulis orbiculatib;*
 ex eadem filiaj^/'d/* (quo in loco è vetufta?
 cujusdam/^ arboris caudice enata) ad cum
 deftinatam, impetravi, ad hiftoriam hanc^itq;
 iconem conficiendam.

An fpecies *Quamjayatl*, Nardi Antonii Rec-
 chi, Rerum Medicarum Novae Hifpania?, libro
 VI. capite LXI, pagina 28: aut Genus *Tlamar-
 cofyui ypapan*, vel *Coapatti*> quæ planta inter
 Imagines Plantarum, ejusdem Audoris, pagina
 414. per Joannem Terrentium Lynceum fuccin-
 &b delineatur.

LUNARIA RACEMOSA MINOR, ADIANTI FOLIO.

Cap. XCIII.

DE Lunariâ racemosa, propter famam Lu-
 nariae Alchymistarum, maximè expetiti,
 species varias in Borufliâ noftrâ & Caflibiâ oc-
 currunt: inter alias hæc etiam rariffima, hec-
 dum defcripta, vulgari foliis laciniatis (cujus
 effigies apud Camerarium in Matthiolo Germa-
 nicè edito, fub numero I Lexftat) per omnia fi-
 milisj

milis j praster folia, quae *Capilli Veneris* five *Adianti foliis Coriandri* in modum eleganter lunt disfe&a.

Nascitur in montibus Caffubiae, fed admodum raraj ita ut duae duntaxat mihi, & Amico jneo dile&isfimo *Domino Carolo Sweifyro* una inde obvenerint.

LUNARIA RACEMOSA MINOR, MATRICARIE

FOLIO.

Cap. XCIV.

Montium CalTubiae etiam est incola, unde à rhizotomà mulierculà Anno M. DC LXX. & LXXVL Julio Menfe fatis copiosè *Dtybilisfimo D. Smikpro* mihiq; allata. Quarum omnium cauliculi magis curtiquàm vulgaris, racemis brevioribus magisq; ramofis, ac foliis brevioribus, plures in lacinias angustiores disfe<etis, Matricariae haud imparibus, onufti erant.

An *Lunaria minor rutaceo folio, Caff art \$auhini* in *Tinace* ?

LUNARIA RACEMOSA MULTIFIDO FOLIO, CA- SPARI BAUHINI.

Cap. XCV.

NE fortè Lunarije anteccdentes, *Lunaria racemosa multifido folio Caspari Bauhini* (quas *iflusi*⁰

LUNARIA RACEMOSA
MINOR, ADIANTUM
FOLIO.



LUNARIA RACEMO-
SA MULTIFIDO FOLIO,
CASPARI BAUHINI.



in Rariarum Plantarum Hiftoria lib. V, cap. XXI, pag. CXIX, nomine Lunariae minoris ramofae, additâ radicem & foliorum finè racemis figurâ à *fohanne IZaubino* verb in Univerfali Plantarum Hiftoriâ, Tomo III, libro XXXV, cap. XIX, pag. 711, fiib nomine Lunarias botryitis ramofae Silefiacae, adjectâ folii & racemi icone, absq^{ue} radicibus, concinnè defcriptâ) exiftimentur: figuram hie fblum, Lunariae hujus integral cum radice, foliis & racemo, fiito; illud tantum adjungens, quòd racemorum granula, aequè ac Lunariae vulgariſ & omnium congenerum, antè maturitatem, materiâ humidâ & fiibluteâ prae-gnent, ac tempore maturitatis eò foetu, in pallescente pulvere exficcato, fe exonerent.

Apud nos, in locis quibusdam arenofis, Menſe Auguſto & Septembri, {uis granulis onufta, reperitur.

FILIX SCANDENS PER- PULCHRA BRASILIANA.

Cap. XCVL

PAlmam fanè inter Filices jure meritoq^{ue} obtinet Brafiliana *Uc* elegantiffima, qua; vicinis fruticibus aliisq^{ue} rebus advolvitur, & ab imis ad fumma repit, farmentorum ope rigidifculorum, fplendentium, è viridi lpadiceorum; ex quibus per intervalla palmaria longiora venoduli, contrariis femper inter fe breviffimis naffentes pediculis Cqui in figurâ non exprefli) pro-

Aa . gene-


ne JACOBI BREYNII PLANTAR.

generantur hirsutij quorum fing^{trm} ^m; q^m ejusdemquo farmenti colonis, proferunt, hirsutam, palmarem & fcsquipalmarem, *foliolis* viridantibus elegantissimis alterno positu alatham, tandemque in longius definientem. Quodlibet verb foliolorum, aliquimodo *Convolvuli folio* 3-*thaa* folk's conveniens, parvo hirsutoq; pediculo innititur, in tres plerumq; divisum lacinias: utpote in duas breviores obtusas, denticulis quatuor, quinquevel sex longis radiatas, unamq; longam nonnunquam fescuncialem (e medio brevium exorientem) denticulis utrinq; infra Pri^{is} f^{is} rostri ab imo ultra medium, atq; inde usq; ad extremum cacumen crenis subtilissimis praeditam. Denticulae di&ae omnes angustae iunt, Coryli nucamentorum figura, in superiore lateris squamulis crispulis, ardi (fime atque curiose vestitae, subtilissimis ferruginei coloris) inter quas *Granula* orbicularia, Selaginis primas Thalii magnitudine & facie occultantur.

An *Filicis fecunda species* ^{eorg.} *sf* *Marcg. in Bifi** *Plant, libro I, Cap* II* > *pagina 2* ? ubi ejus verba ita „fbnant. *Planta* caule lento, farmentoso, ruf- „fescente, ferpit atque fruticibus aliisque plan* „tis se circumvolvit: *folia* ad caulem alternim „funt posita elegantissime discedla, referenda „dentatas illas texturas, quas foeminae solent con- „ficere. Nee florem fert, nec semen. Copio- „se nascitur, propè fluvium *Cap'tbaribi*. Nasci* „tur & *aliaspecies*, haud multum dissimilis, in „Infula *Tamarack* Hucusque Marcgravius. Et certè Plantas inter reficcatas nostras Brasilianas, *Fttat*


ICONES CENTURIA PRIMA. 9+

LUNARIA RACEMOSA
MINOR, MATRICARIA
FOLIO.



ICONES CENTURI-& PRIM&. 96

FILIX SCANDENS
PERPULCHRA BRA-
SILIANA.



Filicis species scandentis etiam alia occurrit, magis ramoia, foliolis minoribus, minusq̃ pulchris.

Praeter hasce memoratas, adhuc complures alias habemus *exoticas Filicis species rarissimas*, quas cū ex Americā, tū ex aliis Orbis partibus impetravimus j de quibus hāc vice decem fb-lūm in medium proferemus.

T%l?MA STECIES*
Jive

F*ilix non ramosa *Brafilianapinnulis crijlatis: adfes-*
quicubitalem excrefcit altitudinem, Filicis
maris noſtratis facie; atris verb *cml'ibus*, quadra-
tis & infignè fplendentibus j^/»W/>obtufis, {upe-
riore tantū margine incifis, Adianti Americani
Cornuti colore, formā & toto habitu aequalibus.

SECV^(T>A STECIES
five

F*ilix non ramosa 'Brajiliana, foliis Afplenii acutiori-*
bus: Has c, Filicifontis admirabilis, ad mar em vul-
*garem non ramofam accedenti, non dentata (*cujus fi-*
gura, pro Filicis tenuisjimè &- frofundè denticulate
zZAfontbelgardica, errore Typographico poſita)
fohannis %>aubini, pcrfimilis eſt 5 major tamen,
tarfiſque ardiuè pennata. %

TERTIA STECIES
Jive

F*ilix non ramosa (jfuyanenjifoliis Afplenii obtujioribus:*
obſervatur magis hircuta quā antecedens,
atque obſcuriùs virens, pinnulis obtufioribus,
pun&ula rariora habentibus.

QUARTA STECIES

five

Illex non ramosa Zeilanica foliis integris, Ftlici vulgari similis: à Filice mare vulgari eò tantum differt, quòd alarum cristae alias aliis annatae.

QUINTA STECIES

five

Filix non ramosa foliis integris ferratis Zeilanica: Cum Hemionitide altera Dalechampii adeò convenit^ ut ab eadem non nisi in foliis, quae majora & argutius crenata, discernenda.?

SEXTA STECIES

five

Filix non ramosa foliis integris ferratis TSrafiliana: Hujus descriptio exstat apud Marcgravium, in Historia Plantarum, libro i, capite 2, pagina 2, sub nomine, *Filix an Tolypodium*

SEPTIMA STECIES

five

Filix non ramosa, foliis integris ferratis Capitis Borut Spei: mediam, inter Filicis non ramosa foliis integris ferratis Zeilanica & Brasiliana Biciem obtinet.

OCTAVA

SEPTIMA STECIES

five

Filix non ramosa, foliis integris non ferratis Zeilanica minor: de hac caulem accepimus pedalem, quintae similem, foliis verb multis crassioribus atque

atque folidioribus, magis venofis & in mucronem obtufam exeuntibus j in quibus crenae nulla confpiciuntur.

NONA SPECIES
five

*F*Ux non ramofa[^]foliis integris non ferratis maxima, India Orientalis: omnium eft maxima, ut quac Viri fiibinde altitudinem fuperat j h«c à Bontio, fiib nomine *Thyllitidis* figuratur.

DECIMA SPECIES
five

*F*ilix Zeilanica *Lonchitidis* facie: fesquipcdales interdum furrit caules, in quibus folia falcata, *Lonchitidis offer* majoris* & *datthioli* fed majora multb atque latiora,

ADIANTUM NOVUM
GERMANICUM, RITLE MU-

RARIIS. FACIE.

Cap. XCVII.

*S*peciofum hoc ac prorsus novum *Adianti* genus, in Franconiâ non procul à pago illo ob *Acidulas* celeberrimo *Sangcn[^]6[^]tt)al6a\$* in umbrofo inter {axa loco enatum, Anno M. DC. LXIV. Menfe Septembri, quamvis rariffimè, obiervavimus.

Hoc, è *Itylice* ex plurimis cirris nigris capillatâ, *coliculos* triginta vel plures fpargit, dodran-

tales, tenues, juxta radicem nigricantes, reli-
quâ verb parte virentes, & in tertiâ fuperiùs
parte *Folior* anguftioribus, hilariore virore præ-
ditis, inque lacinias longiores, anguftiores, quàm
Rutæ murariæ difcedis, ornatos. Convenit
in multis, cum Adianto albo tenuifolio Rutæ
murariæ accedente Johannis Bauhini, à quo ta-
men manifestè differt.;

ADIAS

MAME-

ricanum, pulvere candidissimo aspersum.

Adiantum nigro vulgari non adeo disforme,
exceptis foliis mollioribus, quorum pars
prona, pulvere candidissimo, quasi farinâ asper-
sa est. Ex Brasiliâ & Guyanâ accepimus.

POLYPODIUM INDICUM

SCOLOPENDRIÆ FACIÆ-

Cap. XCIIX.


DE Polypodio Scolopendria? facie, quatuor
frequentes ex Indiâ Orientali species nactus
sum.

POLYPODIUM INDI- CUM SCOLO-
pendria facie frimum.

Radicem agit subdulcem, verrucosam, lon-
gè lateque sub terrâ repentem, infra Po-
lypodii vulgaris j ex qua *Folia* multa, pediculis
firmè nullis aut faltem brevissimis infidentia,
exfurgunt, viridia, acuminata, pedalia & du-
plo longiora, pollices tres lata, Phyllitidis con-
fistit.

ICONES CENTURA PRIMIL 97

ADIANTUM NOVUM
GERMANICUM, RUTJE
MURARIA PACIE.





fiftentiâ & figurâ, inferiùs autem fastigiata, quorum longitudinem nervus crassus, aversâ parte conspicuus ac elatus percurrit 5 â quo ab imo statim ad ambitum quaquaversum ipse etiam apophyses diriguntur. Flores, Polypodii de more, punctulis lanuginosis, sed nigris constantes, in pronâ foliorum parte proveniunt.

***TOLrPOVIV&rf IJ^DICO^M SCOLO-
pendria facie fecundum.***

Radice nititur longiore, tenuiore, ac magis albicante, minutioribus etiam tuberculis & acetabulis praeditâ: ex quâ, Folia pedalia longiorave, pediculis longis splendens multa pronascuntur Phyllitidis facie, in mucronem autem longissimum, fiibinde convexum definita, & juxta basin fastigiata. Horum nonnulla ad Hemionitidis propiis accedunt, atque in lacinias tres divisâ iunt.

***POLYPODII IJ ICI SCOLOPENDRIÆ
facie Jecundi, Jpecies altera.***

Aliam adhuc Secundi speciem aservo, Folia in tres quoque lacinias divisâ 5 cujus lacinia media seu maxima, in ambitu flammæ in modum laxè ferrata vel potius undulata est: ah autem species diversâ, vel idem Polypodium Indicum Scolopendrise facie fit fecundum, affirmare non audeo.

***TQLTPO'DIVz'M W(piCV*fM SCOLO-
pendria facie tertium.***

Tertii Radix, nihil a Secundi differt, nisi quod longior paulò, validior & faturatiore viri_

viriditate colorata. *Folia* pediculis brevioribus suffulciuntur, & non multò longiora, quàm fessiquipalmaria sunt, duas circiter aut tres uncias lata, substantià & formà quidam Phyllitidis, fedduriora, folidiora Scretufa, Limonii Matthioli formam penè aemulantia. In hujus ut & Secundi foliis reficcatis, quae in Herbario aservamus nostro, si Sole ad verbum percipiantur, punctula innumera juxta extremam fibrarum cristitudinem apparent 5 qua, flores imperfectos, in utero antè partum suffocatos, arguere videntur.

SCOLOPENDRIA INDIAE ORIENTALIS MUSAE FACIE.

Cap. XCIX.

Sunt Scolopendriae species variae, quibus Hemionitis etiam accensenda, in hortis Gallias & Italia jam fatis notae: quarum plerarumque varietatis causam vel Naturae tantum lului, vel aetati, vel arti, adscribenda. De quibus hac vice plura non dicam j cum solummodo de exotico ac peculiari quodam genere valde raro, ab aliis nequam observato, paucis in praesentiarum agere non negligendum duxerim.

Constat verb hoc germ, (quod ab Excellentissimo Dno Andrea KJeyer s5 medicinae Doctore & nobis merito in Ildavia, Vrbe India Orientalis Celeberrima, Anno M. DC. LXX. nomine Scolopendriae India, ficcum accepi) ex Radice fibrosa, obfcur-



SCOLO-
INDIA
MUSA.

- PENDRIA
ORIENTALIS
FACIE.

obfcure cinerea feu fufcâ, & ex foliorum jam confumptorum venis & nervis, qui materiam ferrugineam, levem, ipongiofam, fibrarum putrefactarum, tanti copia eaque figuri offerunt, ut eos ante accuratiorem contemplationem, radices mufcofas & lanuginofas exiftimafem. Ex venarum & nervorum Korum reliquorum medio, multa in orbem ordinata, Mufas junioris non difimilia, pediculis ferme carentia prodierunt, tantâ longitudine, quantam ferè cubitus, & latitudine, quantam palma, immò & fefquipalmaiimplerefolet». Subftantiâ Scolopendriae, tenuia & membranacea, colore ex fubalbido viridantia & ad Olivarum conditarum vergentia: horum quodlibet medium, nervus praeter morem craffus & validus, ex purpurafcente cinerei coloris, diffeet à quo rursus utrinque innumerabiles, denfe & fubtiles venae, linearum infar, in lateribus folii rionnihil fufsum tendentes, in teneram usque, quâ cincta, fimbriam, fparguntur. In centro verb foliorum juxta radicem, hirfities quaedam rigida, atra & splendida, velut lana adufta, in globum Juglandis magnitudine conglomerata, occultatur. An verb foliorum pars fupina, Scolopendria in modum vulgaris, pulverulentis areolis rufis virgata fit!, hadenus, nec quidquam de naturâ & viribus percipere potui.

PLANTA MUSCOSA ET PLUMOSA GUYANENSIS

MAJOR.

Cap. C.

A Nnoa Chrifto Nativitate M. DC. LXI, Do-
JTLmini Antonii Chaftelein p. m. curâ, Ramu-
lum Planfce cujusdam clegantis, ex Guyanâ ac-
cepi, palmarem ac penitiis planum. Is,cauliculo
fquamulis ^enfis, Mufci terreftis Lufitanici in
modum contedo, conftat fubtili, aliquot utrin-
que adnatis ramulis expanfo, atq; multis *folio-*
lis tdnerimis peAinatim disppfitis denfo agmi-
ne itaftipato, ut Abietis ramulum haud malè
repræfentare vidcatur: Adeò autem lentus, &
ad proportionem ita eft gravis, ut fublatus,fta-
tim infar pluma? ftruthionis deorsum fledatur;
vinditate infuper venustiffimâ,aureo cuidamin-
termixtafulgori, averfâ inprimis foliorum par-
te, mlingularehujus plants orrAmentum deco-
ratur,yclut fempiternamfam« illius mcmmoriaffl,
quâ ob aui ubertatem celebrata '6lim fiiiit eju5
patna, confervare, Natura artificiofiffima confi-
tuisiet-;

An Mufci denticulati majoris,CafpariBau-
hini genus?

*PLANTA ^MUSCOSA ET ?LV*ZMOSA*

(fuydHenfis minor,

A Liam adhuc lepidiffim* & concinna; nu-
jus Plants fpeciem, eadem ex Regione.ob.
tinui

tinui; priori multb delicatiorcm, minùs ar&è
 fquamatis viticulis^ atque foliolis longè mino-
 ribus. Quà plantulâ gratisfimo virore fuo im-
 mortali oculosmirum in modumpafcente, Cen-
 turiam hancce meam primam, genialiter con-
 cludo.


TIBI AUTEM O SANGTA TRINI-
 TAS , QVA OMNI A BENE FECISTI,
 ET IN OPERIBUS TUIS LATARIS.-TI-
 BI, QTA MIHI SERVO TUO OMNIUM
 INDIGNISSIMO, EAM CONCESSISTI
 GRATIAM, QVO INSTRUMENTUM
 ETIAM DIVULGANDORUM OPE-
 RUM ADMIRABILIIUM TUORUM,
 IN ALTISSIMI TUI NOMINIS GLO-
 RIAM EXISTEREM: TIBI SIT LAUS,
 HONOR ET IMPERIUM IN SE-
 CULA SECULORUM,
 AMEN/

I N D E X P L A N T A R U M >


Qua; i& Me CENTUBJA continentur.

AlS Jintium tenuifolium odoratis JimumcZ Monomota-
penfe. i*⁶
oyfdiantum mgrum Jmericanum, pulvere candidis/in*⁰
asperfum, \$^o
^Adiantum novum JgermanicumfRtitamurariafacie. 18 9
jEfchynomene Antiquorum. 4&
jEfchynomene mitis prima y vide Serb A Cafia America-
na, folioliszAcacitf lationbus.
jEfchynomene mitisJecunda9vid.Herba CaJlaZeylaniçd*
jEfcbynomene mitis tertia, Jive Americana foliolis <zJ c&~
cia anguftioribus,fili<juis longis angujlis, Semine qua-
drangulari. 4^s
jEfchynomene mitis quart a, Jivei^mericana foliolis Aca-
cia brevioribus. ibidem.
jEfchynomenefpinofa prima fJatifolia%rajilianajiliq^m
radiatis. \^l
jEfchynomene fpinofa fecunda, f foliolis <tEcacia latio-
ribusyjiliquis longis hirtutis. 37
jEfchynomene fpinofa tertia^f foliolis aJfeaciaangufiiori-
bus y Jiliquis parvis echinatis. +^o
jEfchynomene fpinofa quarta^f foliolis Acacia angufiio-
ribus, frondibus validisjimas fpinas habentibus. 43
jEfchynomene fpinofa quinta/ffoliolis aJ^cacia latiort-
bu&yfrondibus longisfemos aculeos habentibus. 44
jEfchynomene fpinofa fexta,/. foliolis Acacia latioribut*
ex *5\dadagafcar Infula. 45
nrflcea Candaharenjis arborea, pampineis foliis, floretnu-
tabilijimplici 122, pleno y ibid.foliojioire. ibidem.
Alcea favanica arborefcens, flore cameo fleno. 124
flore carneo limplici. 122. Alcea

PLANTA MUSCOSA
ET PLUMOSA GUYANEN-
SIS PERELEGANS MAJOR.




PLANTA MUSCOSA
ET PLUMOSA GUYANEN-
SIS PERELEGANS MINOR.



ERRATA-

pag.	Menda	(ic emencta.
4	<i>Idea</i>	<i>Idææ</i>
15	<i>putrefcens</i>	<i>putrefcente</i>
16	<i>Mimosa</i>	<i>Rfchynomene</i>
17	<i>Mimosa</i>	<i>FLfchynomene</i>
18	<i>Mimosa</i>	<i>Hjcbyn&nene</i>
ibid.	<i>Acacia</i>	<i>Acacia</i>
19	<i>Mimf</i>	<i>ILfchynoinene</i>
ibid.	<i>frondibus vdtidisjimisfpi- fits armatis</i>	<i>frondibm val'tdisjittuts fpi- not habentibus.</i>
20	<i>lets mututis.</i>	<i>ILfchynomm</i>
ibid.	<i>frondibus longtsfimiwacti- lets mututis.</i>	<i>frondibm acukos longisfi- mos babentibus.</i>
46	<i>Oxii</i>	<i>Oxyi</i>



INDEX.

<i>Alcea favanica arborefcens flore jrubicundopleno.</i>	122
<i>Alcea favanica arborefcens^ flore rubicundo Jimplici.</i>	122
<i>Alcea vejicaria, Capitis Ifona Spei.</i>	122
<i>Althaea Americana pumila, flore luteo fpicato.</i>	12+
<i>Amarantho affinis TSrafiliana glomeratis parvisque flo- Jcults.</i>	in
<i>Amarantho affinis India Orientalis^floribus glomeratis y.</i>	
<i>Ocymoidisfolio, flore albo. 109.flore purpureo.</i>	no
<i>Amygdalus AZthiopica, fruBu boloferico,</i>	1
<i>Arbor camphoriferaexBorneoInfula.</i>	16
<i>Arbor camphorifera faponica.</i>	11
<i>Arbor dormiens*</i>	30
<i>Arbor K^auty.</i>	20
<i>Arbor racemofa Brafiliana ^foliis Apocyni,</i>	7
<i>Arbor racemofa ^BraJiliana, foliis <i5\4alabathri.</i>	3
<i>Arbor fenjitiva 9 Domini a Itychefort.</i>	44.
<i>Arbor Jiliquofa 'Brafeliana prima, ffiliqua^ hispida fer- ruginea^ Ceratonia facie.</i>	26
<i>Arbor Jiliquofa 'Brajiliana fecunda,f Jiliqua tortuosâ pu- trefcente, Fraxinella foliis.</i>	28
<i>AJlragalus Africanus, flore luteo odor at0.</i>	72
<i>Aflragalo n5Monspejfulano fohannis 'Bauhini affinis Syriaca.</i>	74
<i>Avellanapurgatrix oSWonardi, vide ^JRtçinius America- ?ius tenuiter divifo folio.</i>	
B.	
<i>JlYlbus liliaceus vomitorius, Capitis Hona Spei.</i>	91
<i>*Bulbus oblongus JEthiopicus, foliis guttatis & cili infar pilojis.</i>	89
<i>*Bupkhalum Creticum CotuU facie, 15 o,flore albo,</i>	154
<i>flore luteo.</i>	153
C.	
<i>(^Amphora Zeilanica ex radice Arboris CanelU.</i>	17
<i>^</i>	m 3
	Ca.

INDEX.

- Caryophyllata mont'ana* fiore pleno prolifico, folio *Hedera* terrestris. 13
- Caryophyllata montana* tertia *Clusii*, fiore pleno prolifico. tb, 5 *
- Casfia* *fifiula* 'Braziliana, fiore incarnato. 5 *
- Casfia* & -*Herba Casia*, medius India Orientis Frutex. 5 7
- Centaureum majus Africanum* fiore aureo odorato. 146
- Cent annu minus* "Brazilianum. 103
- Chamaecrista* *Tavonis Americana*, filiqua multiplici, 66
- Chamaecrista* *Tavonis* 'Braziliana, filiqua singulari. 64
- Chamaecrista* vide *Chenopoda* *Monomotapensis*. 148
- Chamaemelum* *Ethiopicum lanuginosum*. 148
- Chamaemelum* *Lusitanicum latifolium* f. *Coronopifolium*. iW
- Chenopoda* *Monomotapensis*. 2*
- Chrysanthemum ericoides* *Capitis* *Sona Spei*. 165
- Chrysanthemum alyoides* *Africanum latifolium*. 160
- Chrysanthemum alyoides* *Africanum teretifolium*. 1^1
- Chrysanthemum alyoides* *Africanum triangulare* folio, fiore aureo, 163
- Chrysanthemum alyoides* *Africanum triangulare* folio, fiore cameo. 164
- Chrysanthemum alyoides* *Africanum triangulare* folio, re purpureo. ibid*
- Chrysanthemum alyoides* *Africanum triangulare* folio minus, fiore flavo. 165
- Chrysanthemum arboreum* *Ethiopicum*, foliis *Populi* *M* b*. 155
- Chrysanthemum Capitis* *Bon* *Spei* fiore repens *aphyllo*, D. Sycn. 156
- Chrysanthemum conyzoides* *Ethiopicum*, capitulo *aphyllo* i foliis *5* *fajoran* < e. i\$9
- Chrysanthemum conyzoides* *Lusitanicum*. 15 7
- Chrysocome* *Ethiopica*, *Plantaginifolia*. 1&
- Chrysocome* *Germanica*, fiore ignefiente. 1+\$
- Chry

INDEX.

<i>Chryfocome Qennanica, flore fanguineo.</i>	145
<i>Chryfocome peregrina major frutescens. ibid.</i>	
<i>Chryfocome Syriaca, candidisfimis floribus.</i>	140
<i>Chryfocome Syriaca, flore atrorubente, ibid.</i>	
<i>Colutea JEthiopica, flore purpureo.</i>	70
<i>Colutea humilis Syriaca, flore violaceo.</i>	72
<i>Coronopus ex libro Bodai'a StapeL</i>	8 0
<i>Crifla Tayonis flore aureo.</i>	6 s
<i>Crifla^Pavonis flore variegato.</i>	61
<i>Cupresjo-pinultUi Capitis %ona Spei.</i>	22

2):

<i>Y^don LacatLacatIndorum, vide T.rifolioafflnisIndia</i>	
<i>Orient. Xanthii facie.</i>	
<i>Datura Indica foliis cMalabathri.</i>	119
<i>Datura vera Indorum. ibid.</i>	
<i>Dyahibala Cingalenjtum, vide aSMimofa non fpinofa</i>	
<i>major Zeylanica.</i>	

E.

<i>X^Pifanamunda,</i>	19
<i>Sqvifetum junceum nigrinodum, Capitis^Bon<eSpei.</i>	176
<i>Erica Coris 'folio hispido, CerintboiderzAfricana.</i>	2\$
<i>Erigeron Zeilanicum, Lampfana foliis.</i>	140
<i>EupMorium ericoides Capitis'BonaSpei. ibid.</i>	
<i>Eupatorio affinis plant a Zeilanica, foliis Vlmi.</i>	142

F.

<i>F1&e Indica, Osmund* facie, *Bodd a, StapeL</i>	5 8
<i>Filix non ramofa 'Brafeliana, foliis zAfpkni acutiori-</i>	
<i>bus.</i>	187
<i>Filix non ramofa %rafiliana, pinnulis criflatis. ibid.</i>	
<i>Filix non ramofa, foliis integris non ferratis, maxima,</i>	
<i>India Orientalis.</i>	189
<i>Filix non ramofa, foliis integris non ferratis Zeilanica</i>	9
<i>minor.</i>	188
<i>Filix</i>	

INDEX.

Filix non ramosa, foliis integris ferratis TZraJtlana: 18 S
Filix non ramosa, foliis integris ferratis, Capitis Zona
 Spei. ibiii.
Filix non ramosa, foliis integris ferratis Zeilanica. ibid.
Filix non ramosa Quyanensis, foliis <zdjpleni obtujiori-
hus. i%7
Filix non ramosa Zeilanka₃ foliis integris, Filicivulga-
ri Jimilis. i 88
Filix candens perpulchra BraJiliana. i% \$. species alia 86.
Filix Zeilanica Lonchitidis fade; 189.
Flos Clitoridis. 76
Fosnum gr&cum fyfoeflre polycration Creticum maps. 79
Fanum gracum Jyheflre polycration Hispanicum fiH⁵
ere Bis. 79
F(Bmmgrac.fyhejlre polycration minus ^ Monfpeliacu. ib.
*Frutex jEi biopicus baccifer, fdliis*5\fyrtilli majoribm.* 9
Frutex jEthiopicus baccifer foliis ZMyrtilli minoribus. IO
Frut ex ^Ethiopian tontfer, foliis. Cneori₉ Salici amul M²¹
major, 22. medius; 22. minor.
Frutex cineraceus muscosus, Capitis Bon² e Spei. +
Frutex Indicus baccifer, Vitis Idaa fecunda Clujii foliis. S
Frutex Tavoninus, vide Cri/la Tavonis.

9:

QSmJla-fpartium coeruleum Capitis %on* Spei. 6⁶
(/enistella fpinosa oJ'fricana, Larids folio. 6 8.
(geranium JEthiopicum sUMyrrhidis folio tertium, fiore
magno Jlrato. 129
(geranium noBu olens jEthiopicum, radtce tuberosa, <z/'
quilegite foliis. 127
geranium no&u olens JEthiopicum, radice mberosa joliis
<£Myrrhidis angustioribus. ibid.
*geranium noUu olens JZtbiopicum, radice tuberosa, fill**
cSXdyrrhidis latioribus. 126
Gla-

INDEX.

Gladiolus jEthiopicus flore coccineo, Cornuti. 8 8
Gladiolus jEthiopicus minor, flore violaceo. ibid.
Gladiolus Jfricanus, radice tuberorâ Cepasoliis. ibid.
(Rana Tillt Officinarum, vide *Tinei nuclei* ^*Malucani*
Acotla.

H

Erba Cafta Americana yfoliolis <tlcaci<* latioribus,
 - - *Jilicjuis* Hatîscompresfi? majoribus. 4*

Herba Cafta Zeyknica, Jiliquis latis xomprefiis minori-
 bus. 47

Herba Viva, <iAcoft<e. •• 5 +

JzJ'cobaa jEthiopicâ Laricis folio. 136

facobaa jEthiopica LavanduU folio, ibid.
*facob<ea*fpicata*5 *Monomptapenfis* prima, 117. alter a. 13 8
facobaa affnis Tlanta iuberofa, Capitis Borne Spei. 138

K *Auki Indorum* K-
 i, vide *Arbor Kjtuhî*.

L

Lajfdfchini Brachmenibus, vide *Herba Cafta Zeylanica*.

Laferpitium dauco/des Trutenicum. vifcofo femine. 167

Leonurus Capitis Bonne Spei. 171

Liona Arbor, vide *zJrbor camphorfera exBorneo*.

Lunaria racemofa minor, *Adianti folio*, ' 18 3

Lunaria racemofa minor, n*IMatricarU folio*. 18+

Lunaria racemofa minor, multifido folio, *Cafp. Bauhini*. ib.

Egafac Syrorum, vide *Toterium latifolium Aftaticum*.

^z*SMimofa non fpinofa major Zeylanica*. 51

<£*dyrto-genifta Capitis Bona Spei*. 68

O

O *Rchis Anthropophora Oreâdes Luftamica*. 102

6n*his Apemreferes Lufttanica*. 9^*ejusq; varietas*. ioo

Cc

Orchis

INDEX.

<i>Orchis Cercopithecum exprimens Lufitanica</i> prima. 97. alter*.	98
<i>Orchis ^Aiufcam majorem cosruleam repraefentans.</i>	100
<i>Orchis sSMyodes fufca, five Scarabaumexprimens.</i>	101
<i>Orchis *5\>fyodes lutea Lufetanica</i> ibid.	
<i>Orchis radice repent e_y maculatufo</i> (iis.	102
<i>Ornithogalo of finis radice tuberosa, Cyclaminis folio Ca~pitis</i> BonaSpei.	93
<i>Orobus Americanus luteus, fliquis incanis.</i>	7 5
<i>Oxyi affinis TJama bulbofa sjfricana, flore purpureo ampio.</i>	102

T.

<i>J>Inei nuclei eSMalucani, Acofta.</i>	119
<i>Tlantaginella attrea alopecuroiides 'Brajiliana</i> foliisgrdmineis.	108
<i>Tldnta leguminofa jEthiopiufoliis%ùsci.</i>	69
<i>Tlanta leguminofa 'Brajiliana Thafeoli facie, fore purpureo maximo.</i>	7%
<i>Tlanta mufcofa &> plumofa (juyanenfis perelegans major.</i>	
1914. minor, ibid,	
<i>Tlanta nova, a `T>. Hermans. Anno, 1672 in Tromontorio</i> Bon* Spei deteBa. 177, 178.	
<i>Tlanta novisJima, adExcellentiffimum "D. Arnoldum Syen Anno 1676 exTromontorio</i> BonaSpei transmiff*. 180	
<i>Tlanta rarisjima, dT>.ten IZJgne Anno 1673 in Sim Saldanha &-^cProm6ntorio^cB.Speiobfervata.</i>	178, 179
<i>'Plegmaria mirabilis Zeilanica* granulis orbicularibus.</i>	
180. trigonisgranulis.	182
<i>TolygalafruticefcensCapitis</i> Bona Spei.	107
<i>Tolypodium Indicum Scolopendria facie primum.</i>	190
fecundum. 191 Jecundifpecies ahera. 191. tertium. ibid.	
<i>^oterium latifolium Afiaticum.</i>	74-
<i>Tulfatilla flore obfoleto, caule nudo.</i>	13 5
Tttl	

INDEX.

- Tulfatilla polyanthos Anemones folio*, 132. *alba*. 133. *rubra*. *iss. violacea*. 132
- YhApuntium jEthiopicum epruleo galeatoflore_y folks Coronopi*. 174.: *foliolis dentatis*. 17\$. *violaceo galeato flore, foliis Tinafri*. 173
- Hapuntio of finis Hni facie» Capitis *Bon&- Spei*. 175
- S_cicinus JmericanuSy tenuiter divifo folio*. 116
- 1\$icMus minor Indicus^Solani folris*. 11%
- ^Alvia arborefcensmajor Africana, folds Ferbaſci*. 169
- Salvia minor JEthiopica^foliis Chamdaagni ajperis. ib.*
- Salvia Syriaca, Cifii ſcemina foliis, acetabulis '^Molucca*. 170
- Sanamunda prima, Clufii*. 19
- Sanamunda tertia Clufii. ibid.* .
- Sanamunda tertia Clufii. affinis foliis Tolii, Capitis *Bo-71a Spei*. 18
- Saxifraga angujlifolia amumnalis, flore luteoguttato*. 104.
- Saxifraga anguſlifolia autumnalis₃ flore luteoguttato, foliolis jlormn magis acuminatis*. 106
- Scolopendria India OrientalisjEM. ufafacie*. 192
- Sel ago India Orientalis, vide Tlegmaria mirabilis Zeylanica*.
- Senecio viſcofus JEthiopicus₉ fore purpureo*. 139
- Siliqua aArhoris ſjvatapana*. 56
- Silicſua Fruticis, foliis Acacia, z5\iejbpotamici*. \$5
- Siltqua fhQibatbaa. ibid.*
- Sifyrinchium candidiſimis floribusy Capitis^ona Spei. Z^*
- Sifyrinchium ex phoenice ofvaverubenteflorej Elhiopicum. %l.alterum*. 84
- Stfyrinchium ramofum JEthiopicum, foliis plicatis nervo* fis &• incanis% radice tuberosapbcenicea*, 85.
- Ta-

INDEX.

7:

T *Apocynana Br. ilienfibus, vide Casfia fistula Bra-
Jiliana, jlore mcdrnato.*

Thee` Sinenjium. m


TbymeUt jEthiopiwi`P<isferina foliis. ,10

Tint a Vaddi <s5Malajisy vide Herba Cafta Zeylanica.

Trifolium cochleatum Jpinõ (um Syriacu, fohis laciniatis. 8 x

Trifolio affinis India Orientalis Xantbii facie. 8 2

Tfia faponenjibm, vide Thee.



A P P E N D I X

ad

CENTURIAM
PLANTARUM
EXOTIGARUM,

aliarumque

Minus cognitarum

P R I M A M

JACOBI BREYNII
GEDANENSIS.

APPENDIX ad CENTURIAM PLANTARUM EXOTICARUM PRIMAM.



*Q*uoniam in Centuria Trimâ
jam descriptarum nommllarum FruBus,
quamndam ramos reficcdtos,velimagines[^]
velrelationes[^]afiepe laudatoDn.Do&o-
re ten^cEff[^](JSyCumjam esfet Centuria
mea excujâ, demum impetravi, hie, pro
Ap epdice de iisdem fequentia referre placuit, indiû
tis capite &- paginâ, quibus inferi debent.

FRUCTUS ARBORIS CAMPHORIFERJE JAPONICA.

*o[^]fd Cap, Vl.pag. 13. lineam 22. ante periodum₃ Et
tantum de Arbore Camphoriferâ
Japonicâ.*

DE. Flonbus extremitati ramulorum innâfcen-
tibus, nihiladhuc memoratudignum perci-
pere potui.* His autem *Fructus* fuccedunt (quo-
rum copi2LtriDn. [<]D.ten1{hyne mihi fecit :)odore qua
folia fragrantiores, è calyculo oblongo, versùs
pediculumfastigiato,petiolum tenerum atqjpar-
vuni habente, emicantes, Juniperi baccarum &
facie & magnitudine j cortice pallido ut pluri-
mum,in quibusdam nigro vel fusco & rugoso
constantes 5 **fub** quo JA(J«c«/^orbicularis ex nigro
fu&a, non valdè dura occultatur, intus coloris
nigri & Iplendens, S[^]ucleum continens lubalbi-
dum,

dum, bifidum & pinguem, faporis aromatici, & acrimoniâ haiid ingrata linguam titillantis.

<zAd ejusdem pagin, lineam 23. pofi paragraphum,
Et tantum de Arbore camphoriferâ
Japonicâ.

EX quibus patet, rarissimam hanc Arborem, *Eqmm'DommiD.tenifyne ope cognolcentdaEu-*ropæ primus obtuli, ad glandiferas vel si mavis bacciferas aromaticas, nucleum in binas partes, fe&um continentes pertinere, & *Arbori canellife-*m> vel *Lauro* veluti affinem proximè jungendam esse-?.

WD FI^gtZM EfVSDE&d
Capitis.

TAndem ad Arboris augendam camphoriferas Hiftoriam, *Excerpta fequentia de differentiâ Camphora, ab Excellentissjmo Domino T>. ten %hyne mihicxObfervationibrnJuisfaponiciSyTbyJicis^ ma-*nisfimè communicata, hic evocare in lucem intermittere nolui.

„ Camphora ex natali Solo in Japonenfem,
„ Borneenfem, & Sumatrenlem primarib dispe-
fcitur; una prasftantior alterâ est: ita etiam ut
o) in Japoniâ ac Chinâ totum *Ticolyl*d est Japo-
„ nenfis 125./^ . ibidem non pliiris veneant, quàm
„ *Ik i* Borneenfis vel Sumatranse; idqj ob me-
7? dicaminis energiam (quæ nos etiamnum latet)
qua; in unâ tantum pracvalet alteri. Nostrates
„ Belga5 & casteri in Europâ populi, Camphorâ
„ Japonenfi tantum utuntur: quamperperam di-
„ cunt fterilitatem efficere j cùm Camphora puri-
„ ficatores norim multos. oui uberi fobole fertile-
icunt;

fcunt; eâdem tamen cum ſucceſſu in linimen-
 tis, emplaſtris, fomentis &c. utuntur: necdum
 tamen rationem totam expiſcari potui, cur
 tantb majoris Japonæ faciunt alias Camphoræ
 ſpecies ; retulerunt equidem mihi, ſe iisdem
 procardiaco uti, & collyriis, in oculorum in-
 flammatione, commiſcere ſed hoc ratiocinio
 necdum me contentum agnoſco, nee enim ita
 delirant nationes has, ut nummos fruſtra pro-
 fundant. Japonenſes ſuam ita parum æſtimant,
 Camphoram, ut niſi Noſtrates annopraſceden-
 titantamCamphora; copiam requirant, illi ni-
 hil præparent: Præparent autem coclione &
 combuſtione ex Camphoræ arboris ligno di-
 ſciſſis, quod uberrimè in regione *Satſumâ* pro-
 venit: illi ciſtas & ſcrinia potiùs inde fabri-
 cant, quàm pro Medicinâ uſurpant, adeb ut hinc
 ſcelandorum prævaricatio pateſcatj ad quos,
 cùrri in probam pretioſiſſima ex Inſula *Borneo*
 Camphora mitteretur, remittebant in Indias,
 eandem Japonenſi poſtponentes, quia impu-
 rior erat; ſed etiamſi nos eandem figuram, co-
 lorem ac pondus Japdnenſi conciliemus, ſtatim
 dicent Aromatarii & Medici apud eosdem, non
 eſſe legitimam: quippe ſi i o o. *Ik* utriusque
 Camphors aperto aeri exponantur, intra ſexen-
 nium & ante, Japoniaca tota in auras diſſipa-
 bitur, ubi Borneenſis vix 6. *Ik pcrdct* jattamen
 Japonenſis Camphoras folia ſat gratum & ſti-
 cacem odorem ſpargunt ſi ſta, ſed nimis vola-
 tilis eſt illa vis, & gummi in iis arboribus exi-
 guum reſpectu Boquienſis Sumatrenſis tamen,
 caeteris præſtantior & niſi fallor, uti & Bor-

neenfis certo annitempore ex opimis \$ ut gum-,,
 mifblent, exftillat arboribus & ab incolis ex in-,,
 teftino arboris fufurro percipitur, quandoe-,,
 gresfui propinqua fir_j.

DE CUPRESSOPINULO

Aifinem capitis X.

y\ Rbufculae hujus perrara vel potiùs Fruti-
 XjLcis, ^amulum Anno 1675- T>ominim DoBor
 ten %hyne depiEtum, & anno, tandem praetcrito
 ficcum, nomine *Erica noduligera capitulis hirtis*
ex purpureo fufci colons, nobis trans rint. Hie af-
 finitatemcum Scabiofis quandam praetendere vi-
 detur. Namqj Strobilorum inter fqvamulas *Te-*
ricarpia lanuginofa & dura occultantur, Scabio-
 ex arboirefcentis Creticae haudimparia, conca-
 va intus, Semenq; oblongum iricludentia, in fur
 superiore autem parte, calicis loco membranacei, fo-
 liolis coronataquinq; crasfis ac lanuginofis, quo-
 rum in mediò *Flo/culm* quinis foliolis confrudus,
 Globulariae luteas montanae *Column** accedens 5
 quern (etfl ad flavedinem jnclinat ficcus) pur-
 pureicóloris exiftimo, cum ejusdem etiam colo-
 ris mentionem in Plantae hujus nomine '*Dominus*
ten Rj on faciat.

DE COLUTEA AFRI- CANA, FLORE PURPUREO-

Ad Cap. XXIX\pag. 72. pofl lineam XL

EX %qmo inter Plantas a CL T>. T*o&. ten %hyne
 EjuxtaPrp montorium Bona? Spei colledaspa-
 tet, Coluteam hanc cleg^itisfimam, Fruticem
 natali

natali in loco eflē lignofūm. *Hgmus* enim memoratus, cubitalem circiter longitudinem, & digiti minōris fermē crasfitiem contingens, re&us, durus, rigidus, firmusatque valdē ramdfūs est 5 in castris *Colutea African* in horto* ©. *Caroli Cbivry pi m. enata* perfimilis, cexcepto sapore qui amarus absque ullā dulcedin'c;

DE ABSINTHIO TENUI-FOLIO ODORATISSIMO.

MONOMOTAPENSL

Adcalcem Cap. LXXXIIL

SI cui non placet, quod *Abfintbiuyn<i5Mo?wrnotd~* *pen/è* a nobis hic posuitum, illudqj *Tappefcentes* inter habere defiderat, pbft *Cbryficomen* collocet.

DE EQUISETO JUNCEO NIGRINODO, CAPITIS BONA SPEI.

AdCap.XCI.pag. i77.poftperiodum: An Arundinis gramineae aculeataj <tAlpini
genus \

EQuifeti hujus, Ramum quoque ab Eruditissim^o *Domino D. ten me obtinuimus. 1.*
m ò B ò t a n i c o 3 ^) f
obfeurius virefcens est, guttulis nullis intertictus, & nihil pene ad Ipadiceum tendens: cujus in ramulorum minorum uno, *Congeries fquamularum* quaedam nigdrrimarum, in modum/«w-cifoliàcei capfulis tria^ulis{a fohanne Baubino defcripti) ferme utriculorum\ f\$'pracbet. Qua, nifi abortus,

tus, majorem hujus plantae cum *funds* vel *Qraminibus*, quam *Squifeto* esse cognationem, manifestè indicat.

DE PLEGMARIA ADMIRABILI ZEILANICA-

Adfinem Capitis XC1L

T^{Amctti Selagini India Oriental!}* *me#*, *Tie**
grmarU nomen plegmatum propter formam,
 8c *Zeilanica*, ob *Inflam*, unde ad ILLU-
 STRISSIMUM MACENATEM in Euro-
 pam primùm allata, tribuere decrevi.; tamen pr-
 termittere non possum, quin hie referam, lite-
 ris XXII. Januarii Anno M.DC. LXXVII. à na-
 tivitate Sedemptoris rioftri ad ILLUSTRIS-
 SIMUM DOMINUM, DN. HIERONY-
 MUM àBEVERNINGK, ac *Excellentissimum*
Qominurn Syen, à 3Q>*bilis/imo Domino Hermans Na-*
turae fcrutatore diligentisflmo ex *Zeilan* Infiilâ
 datis, mc;morari 5 *Tlegmariam* meam nondùm a fe
 in *Zeilan* Infill[^] repertam j iednõn procul 1 *Cõ chin*,
 ubi linguâ *\$ancritanenfi* (*\$tu.ditis tantum mo5Ma-*
labar frequentâta) *Tatfin CherraTadha* vocatur, pro-
 venire &c perraram azftimari. Verum enim verb
Tlegmaria qua defcripsi, in *Zeilan* Infula (ut fuo jam
 • notatum loco:) collecta, postmodùm ab aliis
 Rei Herbariae haud imperitis etiam (quarn-
 vis rarissime) observata est*



WILHELMUS ten RHYNE
MEDICI, BOTANICI
& CHYMICI

quondam

MAGNI IMPERATORIS JAPONICÆ

nunc verò

MEDICINÆ ANATOMIÆ
PROFESSORIS

in

BATAVIA Emporio Indian Orientalis
celeberrimo

EXCERPTA

ex

OBSERVATIONIBUS SUI
JAPONICIS PHYSICIS &c;

de

FRUTICE THEE.

Cui accedit

FASCICULUS
RARIORUM

PLANTARUM

ab eodem

D. D. ten RHYNE

In

Promontorio Bonae Spei &c Saldanha Sinus
Anno M DC LXXII collectarum

acj demum


ex India Anno M DC LXXVII. in Europam

ad

JACOBUM BREYNIIUM.

GEDA SEM

transmissarum.



JACOBUS BREYNIUS
GEDANENSIS
AD LECTOREM.

CUm *Centuria Trim Tlantarum Exotica* ^{vltm} ad
ditis *Iconibus*, jam ante trimestre, typis im-
preſſa; ob defe&um tamen Privilegiorum, finè
ullo haifcenus frii&u eſſet detenta: intercà tem-
poris, *literae Excellentiffimi Domini Wilhelmiten %hy-*
wemultò jucundiffimascx^{(Bataviâ; Emporio Indite}
Orientalis ceieberrimo (in quam praeterito anno ex
fajxmiâ Infulâ redux>felicitè devènit:) non finè
ingenti meâ dele&atione & gaudio mihi lunt
redditae: quibus fimul praeter Plantas Exoticas
reficcatas, *Excerpta* quoque nonnulla ex *Obſerva-*
tionibusjûis jFaponicis, l?hyficis, de Frutice perquàm
celebri T/W, ceu fiimma erga me benevolentiae
teſtimonia; humaniffimè offerre placuit. Hinc
mihi ea non foli fervanda ſupprimendaquej ve-
riim Tecum quoque *Lector Amice* >hic communi-
canda ftatui, quib non modò iisdem uti jfedcol-
ligere pariter queas, quas à \$(*obiliffimo* horum
Communicatorè Twi adhuc ſint expèdanda^ Vale.
Gedani AnnoM. DC. LXXIIX. die V. Men-
fis Februarii.

8XCE%TTA

Ex

Obfervationibus Japonicis, Phyficis, 8cc.

WILHELMItcn RHYNE,

De

FRUTICE THEE-



Emen fruticis *Thee* circa menfem *Plantatio*
Februarium terras (ni nimio indu-
rata gelu vel nive altiùs te&a fit)
Imandant Japones fequcntimetho-
fdo , • In terrâ bonâ, dulci, non fair
fâ, neqj limosâ neque arenosâ ni-
mis, fed temperatâ, rotundam ad o6to aut pau-
16 minùs pollicium latitudinetn fcrobem erTodi-
unt, cui'4o. à 50. feminales folliculos confer-
timinjiciunt, exindc fcrobem operientes, ean-
deniqj, inhorrefcentc brumâ, ftramineis ftõreis
tegentes. Hxc autem 40. a 50. feminalia capi-
tula communiter in 6.8.10. à i+. quandoqj plu-
res, quandoquepauciores, frutices propullulant,
quos nature fuoque ingertio relinqvunt agrico-
las, nullo fecùs culturae adhibito artificio, (hie
enimde vulgarihujus fruticis plantatione fer-
mo eft) nifi quòd plerique infelix lolium 6c in-
utiles herbas evellant 'circa ftirpes; qua: quò in
fpisfius glomeramen altioremq;apicem frariis
tamen fupra 4. à 5. pedes) exfurgunt, eò melio-
res judicantur, mollioribus utpotè magis beni-
gnis foliis, qua? rarenter intra primum trienni-
umdecerpunt Japones j decerpunt autem ple-
rumquemenfe fuotertio, quiordinariò juxta

noſtrum Aprilem eſt, nonnunquàm aduſque me-
dium Majiprocurrit (differentiæ autem ratio ab
intercalari anno, quovis triennio hic recurrente,
tredecimque menſibus indifcriminatim, ad in-
ſtitutum Pontificis Maximi *Dairi*, merito pro-
venitj ut alibi latiùs) quando matres cum-fuis
infantibus & ancillis foliola hæc calathis colli-
gunt: Hi quippe frutices ſub initium veris re-
centes ramulos novellaque folia emittunt j ilia
autem novitia Cſubflaveſcente ſuo virore & par-
vitate à veteribus foliis facillimè diſtinguenda)
cū parum adoleverint ficcā tempeſtate, quā-
cunque diei horā, tūc autem inprimis intenſi-
ore foliis aſtu, avellunt, avulſā circa veſperam
portant domum, quandoque ſibi eadem præſepa-
rarites, quandoque aliis, qui ea propter datā opo-
r & ^{co} concedunt, vendunt. Coëmptores autem
Præparatio. 1111 ſingula folia ſiſſe ex ferro patellæ Sinicæ, ni-
tidæ, candenti atque obliquè collocate (ne ma-
nus comburant) irij&ant, eademque manibus
aſtidub convertunt, uſquedum flacceſcerint,
mundis tunc floreis papyro ve imponendā ac per-
flanda flabello, ut frigelcantj hinc in planis, ex a-
rundine Indicā confedis, corbibus conteruntur,
donee compadè criſpentur: hinc iterum in purā
& modice candefacT:ā patellā, uti antea, manibus
continuo verſantiir reverſanturque, donec medi-
ocriter induruerint: Exinde patellæ exemptā fla-
broque frigefada folia inter ſiā ac quartā patellis,
per gradus minùs calefa&is, revolvunt, ut majō-
rem ficcitatem duritiemque contrahant: Tan-
dem ollis intrinſecè vitrcatis bene clauſa ſervant,
& in urbes pagosve venalia transferunt: Poſt-
quàm

quàm autem per fextiduum circiter olli's referata fuere, easdem aperiunt/oliorumque dele&um, minora& teneriora& majoribus Stdurioribusfe- parando, faciunt, ultima&que vice inqvintâ patel- lâ, fecuritatis erg6, ficcant, inannostuncdurabi- lia, fi accurate obturata teneantur. His exami- nibus veritate comprobatis feqiientia fupplemen- to ferviant.

Eiiimverò non levis est culturae ac praeparatio- ^{Cubtr *ae}

.« . . . • ri v- i» ^{preparations}
 nis differentia 5 quern etenim agnolae luo lin- ^{qfa}
 qvunt genio fruticem, folo eradicato Zizanio, ne
 mffocetur, hunc fumma cura ftudioque colunt
 illi, qui ex profeffo pro Magnatibus ac opulentis
 quibusdam civibus T'chia accurant & legunt: Ita
 pfppe t5Midkp urbem locus est, O«/appellatus,
 totius Iaponiawn hoc opere princeps, ubi pro Im-
 peratore, Regibus Majorumque gentium Dyna-
 ftis T'chia colitus praeparaturque: Ubi excul-
 tiffimae terras concrediti frutices a nimia pluvia
 vel intenso ardore frigoreve, caeterisque aeris in-
 juriis, ac pravis purgamentis, volatilibus reptili-
 busve infcdis, ftudiose praemuniuntur, jufto ri-
 gantur tempore, ac reliqua circumfpe&as culture
 adminicula iisdem adnibentur: Ubi congru4
 tempeftate fcrupulofa fotyorum fit electio j tener-
 rimi fruticurn ramufculi primaevis in apice foliis
 nudantiir, quae eapropter cariffima potentiori-
 bus refervantur emptoribus 5' hax autem a me-
 diocribus, haec iterum a majusculis, hornotinis
 tamen fingulis, fegregantur. Ruricolae vero fi-
 ne discrimine, quaevis, horna nihilominus, folia
 mixtim colligunt, colledh foil exponunt, (ante-
 difti in umbra ficcant)manibus comprimunt, te-
 runt,

XII. WILH.ten RHYNE EXCERPTA

runt, fricantj & iriargillaceispatellis,fi careant ferreis, fuprà. relatà methodo ac ordine fuper ignem torrent, donee exficcata ac indurata cri-
Plebeiorum decoctio, fpenduntur. Haec autem,nifi coëmptoribus diven-
 aërint,(hicniminvariasfpecieeadem.dividunt)
 promifcuèin asneo cacabo aquà repleto, lento coqvunt igne,& fie.totb die pro communi potu in foco fufpenfum fervantj donee iteratis tin-
Potentum decoctio, gturis folia ilia debilitatarejiciantur, ingeftispro-
 timhs novis. Primates autem & locupletiores cives quidam nullum in re domefticà opus ma-
 jore diligentia, faftu, nitore, atqj artificio (quippc in' peculiarern jam penè artem illis converfa eft *Tchia* (iispenfatip)'curant, quàm fui *TchU* pr«-
 parationem 5 Quandoquidem qui in casteris par-
 cifimas flint fupelledilis, copiofo ac fuperbo,in-
 ftrumentorumramulorumque apparatu irhpensè, immb ad fuperftitionem usque, geftiunt.

Instrumenta. *Injlrumetita* autem (quae in Magnatum «dibus ac fpecl:ationibus quibusdam diverlbriis ad pom-
 pam proijituuntur.) funt hasc j Ex eledo ophiti-
 deconflatà wo/i(qualinofratesfèmenfinapi con-
 terunt)quâ fuum *Tchia* in tenuem pollinem com-
 molunt: *iprxterczfornacula*, ex mixto cum aliis metallis acre artificiosè fufa,cuiaqua' plenam *cucumam*, ex eadẽ materia confedam, luperpo-
 nunt, ut Temper praefitb fit.lympha fervens: hñe
 exiguis *cochleariks* {ex teftudineo cornu aliove pretioib ligno vel etiammetallis fabreFadis) vi-
 ridem ilium ac benè fragrantempulveremT'vto
cdmibutfwis (qui deformiformofitatẽ illis placentj quò ehim magis distorti ac inaequales funt, eò meliores cenfentur: ex vicina autem Coreà

in Japoniam deferuntur, qui dim propter loci distantiam, tumob argillamritatem, magnocontant, majore, fi fimul vetuftijinfiindunt, ac fii-
perfusâ cum mundato haustro infundibulove aquâ Fervidâ pulverem hunc minutulis, ex arundine Indidicrenarum formâ artificiosè *concifa*, fetis tamdiu quaflant, donee in spumam potio illaelevetur. *Vorrbfimlos* nutriunt ditioresincota, *r*m*it*.
 alios qui *T'cbia* decoquunt, alios qui calices amicis hoipitibus deferant, benè vestiti nitid^{que} comtij quod inPrimomm Oeconomii peculiarè munus cfb ubidecodor*T'cbia* velutiDoctor Medicus gentilitio ritu detonsâ planè comâ à reliquis'discernitur. • Sinenfes autem (quorum methoduih noflxates fcqyuntur) fervefa&am in cupreo cocabo aquam liccis integrisque foliis *Thee*, fingulari olte prius injedis superfundunt, tinduramque extrahunt, quam limpidâ aquâ ad gratam amaritudinem temperatam calidè forbent, faccharumque utplurimum unâ mafticant, uti & noftrates, rariùs autem Japonès, tametfi *γΑυτὸς* CpAo: H«c fecundâ vice repetita tinctura Cminùs tamenefficaci^{cum}praestantiores fcuvo-
 latiliores partesprimâtindturâ maximampartem cextrada? fint, vel in auras abierint) etiamnum valet, quâabfolut^{ut} plurimum¹ rejiciuntur folia, qua; mare vâftum peragrantibus, addito file, oleo ac aceto, acetariorum vices, melioris defectu, fiipplerepoflunt: Japonès autem iisdem foliis rubentes papulas ac cutanea fudamina curant, atque in tin&oriâarteeademfvetufta licet) ufurpant Mauri &c.

Locus natalis. Fruticis hujus natalc folum varium est in Japō-
 nic, uti in Diariomeo ad metropolim/ft/ofpeci-
 atim recensui, * plurimus tamen in regione Fz/fo*
 crefcit: Humo gaudet neque arenosâ neque lu-
 tosâ nimis* neque declivi, neque acclivi nimis,
 apricâ & temperatâ planitie lactior: Multis autem
 in locis inter ipfa frumenta in pulvillorum liris
 (in pulvillos enim dispefcunt agros suos japo-
 nes, ut tantb commodiùs ftercorare, ac inutile
 gramen decerpere queant, turn ut ftagnans in li-
 ns aqua rrumenti radices vicissim Wandiusque
 alat) frutices *Tbei* confitos intuearis.

Pretium. De prctio certi nihil determinari potest, in-
 credibiliter enim variat, - illud faltem in genere
 verum est, pro foliorum magnitudine prctium
 augeri vel minui, *qm̃tum namque magnitudine fur-
 fum deer'tfount, tantum pretio accrefcunt;* ut appofitè
 animadvertit *Excell: Tifo:* Pr«cipua quippe foli-
 orum differentia est inter majuicula, hōna ta-
 men, minora ac minima, recentia ac vetufta, du-
 ra ac mollia. Sihgulares autem funt *to&SMiaty* em-
 porio mercatores, quorū juffu 6c fumptu pro Ma-
 griatibus folia haec colliguntur ac eliguntur: Ubi
 proprium habet *T'chia* mercatores Imperator, alios
 habent reliqui Reges atque Dynaftae. Ab exte-
 ris verb tantum exigunt rarunculi japones, quan-
 tum redimete valent: Tanta etenim est pretii
 discrepantia, ut una libra hujus *T'chia* pluris non-
 nunquam veneat quàm centum librae alterius:
 Namque funt quaedam folia dura, quae non potui,
 fed tindorias arti ferviunt.

*Foliorum
 praefantia.* Foliorum verb bonitas in gratâ fragrantia
 (proxime autem a(j g^ .1 recent] s oc] prem, tan-
 tis per

tisper aromaticum, accediO colore viridi (nam parum masticata frictaque ubi fuerint, virorvividus emicare debet) fapore fubamarè dulci.

Vires autem has tribuunt deco&ioni *Thee Si-* *Vires.*
nenfeSy quas ex eorum fcriptis excerptas transla-
tasque, parilm à me immutatas & *ubi ncceftc au-*
& asparum, minimè tanquam infallibiles, propi-
no: Confulat experientiJE fidem Leftor, &: 6.
fingulos effe&us non comprobe, nunquam fal-
tem, modb crumena rion doleat, frequentioris
ufus paenitebit; Sanguinem igitur puriflcat, hor-
renda pellit inibmnia, vapores à cerebro arcet
malignos, • vertiginem capitisque dolorem (prae-
fertim à crapula ortum) mitigat, hydropicis
conducit, egregieenim diuretica eftj capitis
rheumata exficcat, hiimorum acrimoniam corri-
git, obftru&iones vifcerum tollit, vifum inftau-
rat 5 quippe, quantum ego exiftimo, hæc deco-
&tio *T'cbia* primarium Japonibus eft antidofon
contra visûs imbecillitatem ac pculorum vitia,
illis frequentiffima, ac ex asfiduo orizse calidae
& 'fiii *Sacqui.* potu & ufii (de quibus aliàs proli-
xihis) maximè contrad&ta: aduftos humores tem-
perat, calidum emendat jecur, induratum knit
lienem \$ fbmrium coërcet, in iis praeferim (Jui-
rariùsTiWbibiint: Cujus rationes explicatCon-
fultiffimusTulpius (maximoReip. noftrae, Patria3
Urbis ac eruditi Orbis damno fummoque meo
Iu6b nuper fatifun&us immortalisnominis Se-
nex) loco citahdo, à quo parum discrepat Cla-
rifsimus Pifb in commentar. ad Bontium. Cor-
pora porrb reddit vegeta, inprimi^ autem he-
betiores à lbmno ac torpore fenfus expergefafa-
C cit:

cit; corexhilarat, timoremque propulſat; inteſtinorum tormina ac flatuſ compeſcit, illoſque qui uterum infeſtant, diſcutit 5 viſcera viresq; roborat, reminifcendi vim exſuſcit, ingenium acuit, bilem temperatſ nephritidem tollit medicamen hoc lithontripticumj ego faltem nunquam in japonibus vel minimum calculi, five renum five veſicę, indicium reperi, fat fedulò licet inquifiverim; ac tandem duces in amplexuſ vertit officium thori.

Tulpius. Scripſorum de hoc frutice conniventiam, niſi fit gravis, culpae eorum vetat gravitas: Succindè ac dødè *de herba Thee* Cfrutice, vellem dixiſſe) *AmpHſimus* : *D. Tulpius lib. 4/obſerv. ultimã* j ubi foliorum *T'chia* (ſiquidem reclè jaxta Japonum idioma) formam accuratè deſcribit, cui tamen addipoflèt foliorum ipſiſſitudo, viror, laevor atque nitela, ad inſtar lauri: appoſitè idem de ejusdem viribus ac utendi ratione (ſinenſitum methodo a nunc paſſim nota) in 9F&^u^^per^peⁿrain edoc1:uſ fuerit religioſiſſime veritatis author (quem finè ſummã obſervantiã nominare nequeo) videre eſt ſuprà^ Deſcriptionis autem defectum authorum fertili allegatione compenſit. .;

Bontius. Hſeſitantiiſ de eadem diſputat *JBontius lib. 6. cap. 1.* cui præter Garciam ab Orta iri hiſtoriã rerum naturalium Orientalis Indiy hadenus primæ debentur, qui *foliis Conſolida* (cujus quæſo?) prævaricanter *hxc* folia adſimilat, niſi forſan Prunellam indigitet, quam minorem Conſolidam vocat Matthioluſ, &c turn in ſingulis cum eadem non congruunt folia hæc,

Fufiuſ

Fufius eandem depingit Commentator ejus P. 16.
 Celeberrimus ©/?^: Fallitur autem author in-
 fignis, dum dicit, Japonum *T'chia ob majorem fo-*
liorum contritionem & coBionem nigrum Thee appellari:
 Namque Japonum TVfe ac Sinarum Tfe? commu-
 nia funt nomina, quibus optima acque ac vilissima
 folia figificantur nigrum autem *Thee* nunquam
 faltem ego, vidi > verii vilioris *T'chia* deco&io,
 quòpejor eft, eò majorem flavedinem contrahit
 magisve rufefcit. *t/fbicantibui* equidem fed non
perpetuis fioribm rammculi hujus Fruikis ornatè vejli-
untur j quoniam a. medio circiter fcptimi (qui jux-
 ta noftrum Auguftum eft) ad aliquam partem o&a-
 vilaponenfium menfis flores emittit hic frutex,
 qui tùm decidui feminalia capitula relinqvunt.
Qmnariam exact: è foliorum in unoquoque frutice iijfe-
rentiam ego faltem obfervare nequivi. Seminalia
 autem ilia capitula (*fie* malim vocare, utpotè
 plurium feminum receptacula.) *rotunda* non ad
novas, fed ad plantas producendas mefi aptas, *triers*
nio indigent, Quòd autem in Europais regionibus qua-
darn fanitatis incommoda acque ejfeciter non arceat potus
ille Thee quàm apud Sinas vel Japones, non pra-
 parandi utendive modò adeo imputandum cenfeo,
 quàm quidem afiduitati usûs & temperationi
 viftiis rationi. Tandem in enucleandis viribus
 emphatica" hyperbole utitur ingeniofiis & clari
 nominis decorisque author, cujus de hoc ftuti-
 ce ftatumina laudem fimulacrutinammeren-
 tur. Expreflâ autem fruticis imago mihi
 in fingulis non perplacet.

FASCICULUS
RARIORUM
PLANTARUM.

DN, D. WILHELMO^a ten RHYNE

in

Promontorio Bonae Spei, & Saldanhac
Sinûs contermiais locis

Anno M. DC. LXXIII.
colle&arurn,

atq; demum

ex INDIA Anno M. DC. LXXVII.
in EUROPAM

Ad

JACOBUM BREYN-IUM
GEDANENSEM,
transmiſſarum.

*

TAdem quoque Plantarum^{ib}as ficcis pau-
cos ante menſes i i^{Ekliſſimo} ſæpiùs mēmo-
rato Vomno! Doſore^{^»^w}, Summo Amico meo
ex India donatus ſum, mentionem facere haud
negligam: Etiis quidem ut plurimum nominibus,
quibus à me ſunt inſignita;,- quanquàm plurim*
non ex genuinâ earum teſſeſa, (qdppe â* care-
bant:) fed, uxta id, quod in iUis maxjime notabile
atque conſpicuum fiiit. Certâ ſpe fretus, quo-
vis allud tempore Peritos Aftis debita cum ani-
mi moderatiohe confidcraturos.

Abſin-

A.

sjfbjinthio Senphiofimilis CapituBoiuz SpeL

**Abjtnthium* tenutfolmm odoratisfimum zMonomotapcn-
fe: in Centum **prima** defcriptum.

*Alcea minor Africana, <*Jltb**facie,florepurpureo parvo.*

**Amy*ddmJEthiopicafirudu holojenco: in Centum 1.*

deicripta.

*

*Arbor rofea prim, five Arbutifolio, flore flavo, T>. U tl-
hclmi ten %hyne.*

<tfrbor rofeafecunda,five Styraasfolio, DJVdhchmtcn

Rhyne.

Asphodelus major ramofus Cupitts'Bon*Spa.

B.

BellV Er>c^ /offo incana, Capitis^c BonaSpeL

B^yuglosfwn Jfricamon, Ecbii folio.

Camphoratae fimilis, longius radicata.

Cmphoratax fimilis altera, magis hirsuta.

Cham.e^emjh Capitis Bom Spei:

*Chenopoda finuhs, planta mirabilis Afriatna, Echini Al-
pim facie Jed mimme fpiMfa.*

*Chrysanthemum Afrkanmnpunnlum, folmoJbjinthu al~
pini ttmbellifen mmons.*

*Chrylocome Afrana, flore albo, anguflufimis fohts: e
Radice hujus, V'trgf exeunt multx, pedales 5
nonnunquam ampliorcs, lignofe, firmas in
multos ramos tomentoalbo **candicantes didu-**
cl:x; &c ab imo ad fumum *Foltolis* crebris ac
anguffifimis, *Stoechadis citrinx Italicae Her-*
bariorum dimidib brevioribus, dense ftipatae.
Suinmos verb ramulos *corymbi* occupant admo-
dum elegantes, *GnaphaliiAmericani aClufio*
defcripti floribus valde accedentes, **icd.qua-***

druplò minores, è candidulis infra, aliquando ruffescentibus ita compofiti Iquamulis, utumbonem in medio comprchenfum, duplici & triplici ferie notabiliter circumradient. Unde haec *Tlanta*, aliis forfan *Afteri* potius videri posset accensenda. Verùm hujusmodi minutias non estimamus, multò minùs Naturae figmus legem, quin in his potiùs eidem nos accommodabimus: *Semen* minùs pappefcens, Chryfbfbcomes vulgaris feminibus par.

In herbofis juxta Promontorium Bonae Spei *T)nten %hyne*, ut & duas frequentes collegit, mihi-que cum fingulari meo gaudio communicavit.

Chyfoçme Africana, flore phcsniceo angujlifolia: Planta alba 8c penitùs tomentosa est, Chryfbcome Gejmanicas angustifoliae flore ex aureo rutilante fimilis, nifi quòd ⁷0 & angustiora & breviora, eorumque ex alis ramulos complurimos, foliis minoribus vestitos promittat. *Flores* densissime in glomerulum congesti, multò sunt minores, squamulis exilioribus minùsq; splendidibus ex ignescente phoeniceo coloris imbricati; quorum medium staminula quaedam minutissima, in pappos *femine* appenso perquam pusillo, absque occupant.

Chrysocome Africana, flore phcsniceo, serratifolia: perraras hujus Plantulae caules etiam candicant, multò* tamen infirmiores sunt, inque debiliores 5c longiores ramos divisi; *Foliis* paucioribus multòque brevioribus latioribus, serratis, nervosis, incanis quidem minùs tamen quàm superioris, Euphrasiae latifoliae Italicae *Fabii Coluyntue* quo-

quodammodò abmulantibus fèpti. *Flore & Semine* cum prascedente convenit.

Cbryjbcome Impia, five-Filago difta, CapitisBonaSpei primely jive pumila.

Chryfocome Impia, five Filago diBa, CapitisBona Spei akerà.

**Coktea Rxbiopica ftore purpureo: in Centurià de- fcribitur.*

*Conyf4 Africdna^foliis Stoschadis citrina (fdllica: SuE» frutex pedalis eft vcl AtiotyElichryfoXL Caffari 'Bauhim fimilis, fed magis lignofius, Foliisphiribus Staechadis citrinae Gallicae, fed anguftioribus, *Flore majore, cujusumbopetalislongis & anguftis circumradiatur. %qdix lignofa, multis fibris divaricata: Semen pappèicens. In Africà juxta PromontoriumBonae Spei Excel- lentisfimur&.'ten Ityne collegit.*

Corrudafpinis horrida Jficana prima, Jive Corruda tertia. Clufii.

Corrudajpinif borrida Africana fecunda, five foliis Affragi Sylveftris.

Corruda fpinis borrida Africana tertia,/. Hippuris facie.

**Cuprefso-pinulusJCapitis'BorneSpei: hujus defcriptionem in Centurià & Appefidice dedimus.*

Cyanus Centauroides fruticefcens LavanduU folio Capitis Bona ityè: Frutex mil^i videtur lignofus, quantum ex %ajriis duobus a2)». ©. ten %hynem Promontorio Bonae Spei collectis augurari licuit. Hi quadrati, lignoli nee non incani. funt, binis alternatim ramis, Fo//o/iLavandulas haud difsimilia, {ed breviora è regione habentibus^præditi: quorum iummitatibus^p/>«/^ etiam ex adverfo bina innata, haiidcras(a, pollicem transversum*

verium longa, latis incanarum fquamularum
8c membranaccarum fcandulis, Caryophylli
fpicati *Aldini* calyculorum de more imbricata j
ftaminulis referta Serratulae fimilibus, quorum
color me latet. *Semen* magnum, oblongum *
tpilis molliufculis argenteo colore fplendenti-
bus hirtutum 5 longisfimisque in modum Stoe-
bes Rosmarini folio *Ton* < e_y fed ad phoeniceum
tendentibus coronatum.

Cynoghsfum Africanum < £\ £yrtifolium.

Cynosorcbis Capitis Tona Spei.

E.

Elichryfon minus Africanum, flore aureo.

**Equifetum junceum nijrrinodum*, *Capitis Bona Spei*: quod
in Genturiâ I. deicribitur.

Erica Cm-is folio ELtbiopica ^ flpre purpureo tetrapetalo.

Erica Serpilli folio ILthiopica ^ flore purpureo puicbro,

Evonymus Africanus, foliis *Laurinis jruBu* aculeato: af-
finitatem quandam cum Lauro fylvestri Cre-
tica Alpini prastendere videtur *ifruBilm* exce-
pto ^ qui Betas Creticae inftar in aduleos, in late-
ra rerlexos abeunt.

Eupatorio affinis Suffrutex erko'ides 'capitatus > *Corisfen*
funipenfolio Capitif Bona Spei.

F,

**Frutex Bjbiopicus hoedfer Joliis* < £\ lyrtilli in Cen-
turiâ I. defcriptus:

Frutex Bjbiopicus; foliis *Alaterni*

Frutex Rthiopicus * 5 *Myrtiformis*, *Dn.ten* "Hffyne.

Frutex KthiopicuSyVitis *Idaa primteClufiifolnw*

Frutex oJfricanus, foliis *Buxi*.

Frutex Africanus ^ *Fruticis terribilis Jtyrboncnjuuti ju-*
lio, capitulis oblongis fqudmojis.

Fru-

Frutex anonymos 9foliis i^auri tint minoris.

Frutex cineracem muscosus, Capitis Bon<eSpei: in Cen-
turiàl. additâ. accuratissimâ figurâ descriptus.

Frutex corymbiferw Africanus, Chrysanthemuli ericoidis
facie 3Jtoribus Globularia: Frutex est lignosus, ra-
mis compluribus, cortice ex obsoleto purpu-
rascente vufci coloris te&is j'quorum juniores
•Chrysanthemuli ericoidis (inCenturiâ primâ
capite LXXXII. descripti) adeò fimiles, iis-
demque ftipati^/z/V, ut non facile ab eò di-
stingui possint. Flores ramulorum extremita-
tes lutei occupant, Tanaceti instar riorum qua-
si in umbellam dispositi, orbiculares omninò,
Globulariae seu Aphyllantis Herbariorum
perbellè referentes, minores quidem 8c exf«-
bulis minutissimis quinôjpartitis densè admo-
dum co'nflati, i&dem i&am njinutissimo in Fru-
&u. fixam tenentibus: quern propter immaturi-
tatem exilitatemqjfbtuna examinare mihi noh
co'ncesfiti anveluti Cupresso-pinuli feminum
pericarpia concavus & ferhine refertus j aut an
ipsc Semen illud > Quicquid verb'fit, five ftu-
ctus, five fermen, certo certiùs, illud eodem
penè, quo Abfinthii fermen modo teneras in-
volutum lanugini obfervatur.

Frutex foliis Chamagenijla Crètica.

Frutex leguminosus <z5\syrtifolius, fdiqua^ bîrfutâ, Ano-
nidu montanè pracocis, purpurea frutescentis (à Do-
mino D. Morifondefcriptae)/«>.*

Fucus carnosm coralloides, Capitis Bona Spei.

G.

Geranium <&Aalva folio otioratum, flore purpureo, Ca-
pitis Bona Spei, T>ominiten %hyne.

T>

Qera-

(geranium <E\yrrhidis folio, jEthiopicum parvum.

Qeranium noBu olehs jEthiopicum, foliis *5\yrrhidis
angustioribm minus hirfutis j

Qeranium noBu oleris jEthiopicum lanuginosum, foliis
aSMyrrbidis latioribus minusque laciniatis, flore rubro
vetpurpureopereleganti.

Qenifta aspalathoides polyanthos major jCapitisBonaSpeu

* Qenifta ericoides zAfricana, JiveQenifta-/partiumccer-
leum CapitisBonaSpei, inCenturia. I. aefcripta.

Qenifta of finis Africana, flore coeruleo, alatis&-punBatis
foliis asperiusculis.

Qladiolus flore pendulo.

Qladiolus major laefolius flore rubro maximo, Capitis<Bo-
na Spei. . An Qladiolus maximus Tromontorii Bon*
Spei, flore rubro incarnatOy Smrtiil

Qladiolus major ramofuSyflore coeruleo amplo.

Qladiolus medius flore, majore.

Qladiolus minor gramineus, flore parvo cosruleo.

Qladiolus minor gramineus, flore parvo pulcro variegato.

Qladioli species alia, Caphis Boria Spei.

Qramen triglochin bulbofum sJHonomotapense.

PI.

Hyacinthi&-Cotyledonis faciem mediam obtinens Tlanta

- Africana Morihus luteis longis femis atcjue ftriatis: sub
nomine Gladioli Imperialis, ab jExcellentissimao
D. ten Rhyn e tarh reficcata, quam depiBa nobis trans-
misia.

L. •

Lamella radices Talmitisy Caphis Bona Spei, T>n. ten
%hyne.

M.

<EMarrubium album minus Africanum, calyculis amplis.

sZMonorcbis Capitis Bona Spei.

O.

Olusatrum oAfricanum.

Or-

Ornithogalum umbellatum maximum > *Capitis* 7 *Sona Spei*.

Terfoliato angustifolio montano C o l u m n s *Jimilis* *Tlanta*
umbellifera nova fru Bu t Yiplici *membranace* Oy O Bon. Sp.
Timpinella maxima *Africam* flore *purpure* of D. ten % byne.
Tlanta Corios folio *Africana*.

Tlanta fruticescens *Jfricana* *perrara*, foliis *Teucedani*,
floribus conglomerates *Herba* *Cajla Americana* nonni-
hil Jimilibuf. •

Tlanta foliis %ufci *minoribus*, *Capitis* 'Bona *Spei*.

Tlanta fub riomine T bymbr * *African* * y folio / *piriofo*, in A Bis
aS\i'edicts & Tbilofophicis *Hrfnienjibus* *depi&d:*

S.

Sanamunda *African* *prima*, *Jive* foliis *angustis* *jimis* 'candi-
cantibus.

Sanamunda *Africana* 2, f. foliis *Serpilli* *minoribus* *aspe-*
riufculisy capitulis *Thy mi*.

Sanamunda *Africana* \$ > f foliis *Serpilli* *majoribus* *incanis*.

Sanamunda *Africana* +, f foliis *glabris* *acutis*.

Sanamunda *Africana* 5, f. *ericomes* *major*.

Sanamunda *Africana* 6, f. *ericoides* *minor*, *ramulis* *admo-*
dihn lanuginosis.

* *Sanamunda* *tertia* *Clufii* *affinis* foliis *Tolii* ^ *Capitis* *So-*
fia Spei: in Centuria I. describitur.

Solanum *fpino* fun *arborescens*., *Capitu* I *Zona* *SpeL*

Stcecbadi < t ^ *frabica* jtmilis, *Capitis* ^ *Bona* *Spei*.

T.

Thymelaa. *Rjtbiopica*, foliis *Tasferina* ^ *minor*.

Y.

Virga aurea *Africana*, foliis *Erica* *baccifera*.

Virga aurea < z *Africana* 9 foliis *Linaria* *minoribus*.

Acqu Hi £ *Cetiam*

DEI GLORIAM

difi a f i n t.

••• (•) •••

ERRATA.

IN DEDICATIONE: *p&gin&v.lio. ai.lege quantam.*

IN CENTURIA PRIM A : *pagtna j, W z o. lege qua. / 9. / p. pythmene. p. 9.1,2 y. ab avibus. / u i. / i^partc^ . i j. / . 8. qua. / ^i4^ / . i4 Jpfaruai. / u\$ / . lo. caesl^24. / . / > W / . Abrorani. P.30J.9. fubhurfutorum. / ^w / . i7. Arboris dormientis, Thcophrafti. / > . 33. / . 13* haec. / . 39. / . z i. fpinofa. / . 40. / . ro. iEichynomenes iccundx, p. 41. / . 2. rum, *ibidem*. I. 9, qua. / ? . 41. A 19. di&avi, / > . 43. / . 7. CAP. XIX^# 4V. / • y. ia Arbufculam pulchram. *ibidem*. t* \$i* ji«ubi eSemine exInfula Madagafcar allato. p. 47. / . 21. Siliqua, f. 49. / . iy. fcribat. / ? . 5-3, / • 13. papilionacci. / W^w / . 2? . praeterea. / ? • 5-4. / . j 1. cxaminencur. / ^ . ^9. / . 17^ fupcrioribus* / ^ m / • 33, ellipfin. ^ . 63. / • 28. &dtbipa6fim. Scvenhuy fen. *ibidem antepenult** Americani. / > . <Tf / • 2. qua iEfch^nomcne fpinofa. / ^ / ^ ^ penult. Adolphi. / ? . 6<f* / • 12* jEfcbynomcnscs fpinofx. / > • 78. / . 10. proximos. *ibidem* J* 23. qua. p. 79-1* *. Zi. polyceration. / ? • 79. / • 10. pro uni cademque. ^ . go. / • 181 poiyceracii. ^ . gT« 21. phocnicca. p. 86. / . 23. Ea cnim Radix bujus eft naturae. / . \$n# / . 27, floribust^ . yfa / • 19, quod. / > . jy / . 7% Quod fi. ^« ^y. I. 2i, quodfi. / > . 98. / « 28. Strateumaticas, p. 99.-1.4. quod. 7. 101. / . f. Cap. XLV. ^ . 104^ . / . antepenult. Saxifraganu p* 111. / . 9. anni quarci & quintis *ibidem*. I, if. port *£#* / £# adde: fed brvioribus, craffionbus, in fupcriorc latere magis fplendentibus, inferiorc verò (juniorum praeferum foliorum) Jeniccr hurfutis. / > . ii)« / . 27. tic. p. 116. / • 11. Papayas. p. 117. / . 4. in caule. / ? • 118. U z 1:16. Lathyridis. *ibidem*. U 30. Pincis nucclcis' Malucanis. p. \n. / « zj. 24; rubentibus. f. i2g. / . 19. Hie. / ? . ii^ / - 3.. ante calidiufculam pluvianrv^ i3J» / • 23. quod. / . 13^ / - 23.2+, M« DC. LVII# / ? . 138. / - 28. facurl *ibidem*. I. ix. mtc. p. 1 Jp#. 8- floruit illu, frati. / . 149* A 2o, fimplici scquales. / ^ / ^ w. A 24. cxacuerctur. ptiso . I- > 7. univerfum. / . ryi, / . 2. funtcjus. *ibid*, I jf fentcmiam fuam. / W / . 11. c contrafrio. *ibid*. 1.2?. Diofcoridcm. / ^ w # I 27. 28. produntur. / . if j. I* 4* videatur. / > . 1^8. / . 19. Aftere. *ibidem*, l< 2j. c <*>ncrarib, iW^w. / . < / . notabilcs. / . 159. / . 29, loco. p. 160. / . 11, Afteres, *ibidem* J. 28. qua. / ^ . 161* / . ult. cadcro. / . i6x. / • 6. qua. / . 164. / . 2j. 6i2b\ \$Jbtdem. Uperiult % . ttCS* pto. / > . 167* / . 11. diftributae. / . 169. / . 21. ultra. / . 177. / . i9«intellexero» *ibidem*. L ; i. Tabularis. / ^ . i78« / « 2. Tabularis* / . 181. / 4 jo. paralii. ^ . 18^ / . X2, Anni quarci & quinti. / . 18y. / . 2* Rariorum. / # 187* / . ty. mfigni- ttr. p. 189. / . 3. obtufum. / > . 193. / • xu qua.*

Practer ea. lcgcinquibusdam Excmplaribus: *Vagina lo. Une** 29-Fo- liis^ / ? . 11- / . 7- foliolorum. / > « 1^ . / . 6. 7«provcnicntcm. p. 20. 1.6. Kali, five Vermicularibus marinis. *ibidem*. l> id. facie, / > . 13. / . 1 f. ardisfimi. / . 24. 1.19. hiq. / . 2g#4, £; coropreflae.

IN APPENDICE: *fagina iv. linea y, propinquacft. / . vi. / . 24"* Vcrum. / W^w, / . ztf* ubi poftmodum.

IN EXCELLENTISSIMI DN. D. WILHELMI ten RHYNE EX- CERPTIS &c *Vagmd ix. lined j. Japonicis Phycicis, ibidem, 7. antepenult. benignae p. x ii- / « 23. conflata mola.*

IN FASCICULO: P^wi XXIK / . 21.12, exceptis.

Ernra reliqua, commatum vel punftorum, accentuum %quoque> defcftus vel perverfioncs, Candido Ledori corrigenda rcmittuatur, v

FINIS.

INDIAN BOFANIC GARDEN,
LIBRARY,

PROCESSED



in #d in in HI i

ACCESSION



MII IIMIM tIIMHM

CATALOGUING



.....>>>>

CLASSIFICATION

.....>>>>

DATE 28.7.65

.....>>>>

BOOK CARD
Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

Call No. **BRE-P**.....Acc. No. **BrJ.19J**.....

Author:.....fi. **raynii, J**.....

Title: **Plantarum exoticarum.**

Name of Borrower/Code No.	Date of Issue	Date of Return

INDIAN BOTANIC GARDEN LIBRARY
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

