

Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS NO. 58.85

BOOK No.SMI-P.....

ACC. NO.031590.....



2158
V. 87

PLANTARUM IGONES

H A C T E N U S I N E D I T E ,

P L E R U M Q U E A D P L A N T A S

I N H E R B A R I O L I N N J E A N O

C O N S E R V A T A S D E L I N E A T J E .

A U C T O R E



JACOBO EDVARDO SMITH, M. D.

SOCIET. REG. IJOND. ULTSSIP. AGRON. PARIS. SOCIO, SOC. LINNEANE
LONDINENSIS PRASIDI.

FASCICULUS I.

LONDINI:

TYPIS J. DAVIS*



IMPENSIS BENJ. WHITE ET FILII, IN VICQ¹ DICTQ FLEET-STREET, A/V& QS^{OS} PROSTAT VENAJJS;
ET PARISIIS APUD LUD. NIC. PRSVOST.

MDCCLXWIX.

B O T A N I C O S U M M O ,

M J E C E N A T I O P T I M O ,

ET Q U O D M A X - I M I D U C I T ,

S I B I A M I C I S S I M O ,

JOSEPHO BANKS, BARONETTO,

SOCIETATIS REGIÆ LONDINENSIS PRÆSIDI, MUSEI BRITANNICI

CURATORI, &c. &c.

HUNC FASCICULUM

D. D. D.

AUCTOR.

P R A E F A T I &

DE utilitate Ichnofai in cognitione plantarum prombvendk, quis dubitet? Etfi autem Ichnographiae defcriptiones fcientificas minimè exauclorare liceat, attamen non fieri poteft* quih quiciinque praxin Botanices vel mediocriter excoluerit, fxpe-numerò comperit^m habeat, quod imaginis, rudis licet et imperfèctee, confpe&us moleftise plurimtim dettiat, et dubitationes, quibus vel diuturnae inveftigationes vix aliquid lucis dederint* ipfo intiitu longè arceat. Porrò fpecies plantarum hodiè in tantum augentur, quod rei botanicse ftudiofis omni auxilio opus ell, quo allatas, ritè dijudicent, et dijudicatas mente fervent.

Ooininò igitur optandum eft, quod illi, quos penes fit, fummoperè nitantur, quo paçio Ichhographiam botanicam omnibus numeris abfolutam reddant; adeò ut quæque planta quae in notitiam pervenerit, icone fuâ, hoc vel illo libro inveniendâ, gaudeat. «Nequis aiitem fcientiam figuris anted exfculptis, et ufque ad faftidium repetitis oneret, ne librarium botanicum, etiam nunc ultrâ qudm res pofcit numeroſum, denuò quafi mole fuâ mat; perpaucis fcilicet coemendum, nifi quidem diti-oribus, quorum opes, libros manu quâ decet verfare, nequicquam finunt.

Quò igitur auxilium et a me ad hujufce confilii confummationem detwr, Opus hoc fufcepi; quod profe&ò utile potius quam fpeftabile dici, et plantarum raritate potius^m quam fpecie lubric[^] au[^]iartae aut artis typographicae., gratiam fibi conciliare Velim. Accuratum fore certe fpero, et quo mendis vacet, omnis in hoc fum. Haud tamen animus adeò me fefellit, quod ex omni parte abfolutum audeam dicere, ecquis enim inter rei botanicse vel peritiffimos fit, qui non aliquando in errores vel raviffimos incident?

Memet profe&d ad hoc opus exarandum, fingulari quodam fato obligatuni cenfeo. Herbarium quippe Linnzeanum, quod jam me, felicibusque uti fpero avibus, fucceſſorem habet, plurimas in fe plantas continet, quarum, quamvis optimè a Linnaso verbis defcriptas fuerint, icones nullae extant: continet etiam adhuc longè plures, quarum ne defcriptio quidem hætenus confecta fit. Ex his multae aut huic Herbario proprias funt, aut quod earundem cognitioni plurimùm obfuit, a Botanicis, ex iconum defeclu, malè acceptac funt. Plantae quidem Linnaeanse curas meas fatis fuperque (ut verilimillimum mihi videtur) exercebunt; in animo eft igitur hifce apprimè incumbere. Hos terminos mihi libcnrius appono, quod novae hortorum noſtrorum plantae indies in editionibus fplcndidis Jacquin et L'Heritier evulgantur. Spero equidem et quaedam noſtratum opera in lucem edenda fore quac neque his affurgent.

Haud

Haud me fugit, quod incommodo non tenui, cum ex specimenibus exsiccatis foliari
icones meas licuit adumbrare, obnoxius fum. Hinc etenim imagines mese minùs
elegantes, quam quae ex vivis delineate fuèrint, neceffe evadant: at non minùs ac-
curatas fore, nifi si quidem hie vel illic ipfa specimina deficient, spero: quòd si pra-
ter spem res evenerit, illos oro quibus vivas plantas fors felicior obtulerit, nostros
labores corrigere et emendare. Multae fanè ex his iconibus, a delineationibus quas
olim inventores plantarum unà cum specimenibus Linnaso tranfmiferunt, confecta
funt, v. g. Mutifianae multae: aft aliquod subfidii hifce etiam a me datum est; nam
mihi curae fuit adumbrationes cum plantis ipsis conferre; turn ipse manum ultimam
tabulis imposui; unde sperandum fit, quòd non de incuriâ jure querendum foret.

Obfervandum est, quod saepius plantae dum exsiccantur paulum sese contrahunt;
unde icones ad exsiccatas formatae, vivis plantis paulò minores fiunt. Memoria
autem tenendum est, quòd hie vel defectus verè pretiosus est; ex raritate enim
plantarum oritur j nam si ipsas vivas atque integras licuisset, proculdubio haud
mancas et exsiccatas delineâissem.

In descriptionibus, quicquid momenti fore credidi, inferui, quae autem inutilia
aut incerta dicenda fuit, sciens praetermissi. Differentias specificas, ubicunque opus
fuerit hifce excudere, attentius curavi. Namque in his rite confidendis artis robur
constat; ex his perpauci triumphum fibiducant; has denique plurimi, ex despera-
tione rem ad unguem tractandi, omninò intactas reliquerunt.

Primus hie fasciculus pauculus; qui fequentur adhuc plures plantas ex Herbaria
immortalis, Tournefortii descriptas continebunt. Herbarium hoc in Gallia Botani-
ces decus, Lutetiae fervatur; cui evolvendo, amicissimo Brouffoneto fuadente, ve-
niam liberiùs concessit D. D'Aubenton, cujus benignitatem in Me aequè ac ceteris
rebus agnoscolubens.

Figurae ipse, turn partes fructificationis seorsim positaе, nifi quas auctas esset nomi-
natim monui, ubique magnitudine naturali exhibentur,

F A S C I C U L U S I.

- I CALCEOLARIA nana
a - - - - - plantaginea.
^ - - - - - ovata. -
4 - - * - - - - perfoliata, *Lin.*
5 SALVIA rofaefolia.
6 ROUSSEA fimplex.
7 THOUINIA fpeftabilis.
8 DICHONDRA repens, *Forft.*
9 EHRHARTA panicea.
10 TURR^EA virens, *Lin.*
11 - - - - maculata.
I a - - - - fericea
13 SILENE chloraefolia,
14 STELLARIA dichotoma, *Lin.*
15 .^m - - - - ceraftoides, *Lin.*
16 ARENARIA dianthoides.
iy - - - - cucubaloides.
18 SPERGULA laricina, *Lin.*
19 RUBUS geo^des.
20 - - - Dalibarda, *Lin.*
ai SONCHUS alpinus, *Lin.*
it LOBELIA Columneae, *Lin.*
'23 ARETHUSA biplumata, *Lin.*
24 PASSIFLORA adulterina, *Lin.*
a^ _ - « - mixta, i/Vr.



I
a

b
c

Salceolaria nana.

I.

CALCEOLARIA *nana*

DIANDRIA monogynia,

CHAR, ESSENT. *Cor. ringens, inflata. Caff, bilocularis bivalvis. Cal quadripartitus, aequalis.*

CALCEOLARIA scapis unifloris, foliis ovatis integerrimis.

In America meridionali ad Fretum Magellanicum legit Commerfon. *Tbouin. V-*

RADIX • . .

CAULIS nullus.

FOLIA ad radicem congesta, plurima, ovata obtusiuscula integerrima, fere avenia, oculo armato levissime pubescentia, breviter petiolata.

SCAPI plurimi biunciales uniflori erecti teretes sub-papilloso-scabri.

FLORES pro ratione plantae magni, speciosi, flavi rubro maculati, folitarii.

CALYX pubescens, laciniis ovatis aequalibus inargine inflexis.

COROLLAE *labium superius brevissimum, fornicatum; inferius maximum elongatum pendulum ventricosum, margine membranaceo replicato anguloso.*

STAMINA sub fornice corollae. *Filamenta brevia crassiuscula. Anthera majusculae bilobae flavae, sub anthesi stylo incumbentes.*

PISTILLUM. *Germen globosum. Stylus fetaceus ascendens. Stigma obtusum,*

FRUCTUM non vidi.


OBS. Affinis *C. Fothergilli* *Alton Hort. Kew.* sed differt foliis ovatis nerviis & fere nudis, nec spatulatis, multinerviis, neque apice villosis.

EXPL. TAB.

Planta magnit. nat.

a Germen cum Stylo.

b Stamina.



Calceolaria / (A{t/ff/////tvv.

CALCEOLARIA plantaginea.

CALCEOLARIA fcapis paucifloris, foliis rhombeis ferratis.

In America meridionali ad Fretum Magellanicum legit Commerfon, *Thouin.* n

RADIX perennis fibrofa.


CAUL is nullus.


FOLIA plurima rhombea inaequaliter ferrata nervofa glabra, marginibus pilofis, pilis
Confervae infar articulatis. *Petioli* membranaceo-dilatati.

SCAPI nonnuUi, elongati erefti biflori, apicem verfus magis pubefcentes.

FLORES flavi, bene explicates nondum vidi.

CALYX pubefcens vifcidus.





Calceolaria ovata.

CALCEOLARIA ovata.

CALCEOLARIA caule ramofo, foliis ovatis crenatis*

C. integrifolia Lin. Supp. 86 ? nee Syf. Peg. ed. 13. /. 61.

Ex Peru femina retulit Dombey. Floruit in horto regio Parif. anno 1781, Tfhoun. 0

RADIX annua fibrofa.

CAULIS eredtus ramofus teres, geniculis furfum pauld craffioribus, pilofus.

FOLIA oppofita, breviter petiolata, ovata, crcnata potius quam ferrata, pilofa, pilis
albis pellucidis, fubtus pallidiora.

PEDUNCULI axillares gemini filiformes pubefcentes uniflori.

FLORES parvi flavi.

CALYCIS laciniae tenuiores rhombeae venosae pilosae.

COROLLA C. pinnate.

STAMINA parva lutea.

PISTILLUM. Germen conicum. Stylus filiformis adfeendens. Stigma obtufum*

CAPSULA fubconica obtufiufcula bifurca bivalvis, apice dehifcens, valvulis bifidis.

SEMINA numerofa parva.

OBS. Defcriptio & figura ad fpecimen in horto regio Parifiensi anno 1781-e feminibus
Peruvianis Dombeyi enatum, quod confervatur herbario Linnaei filii, confectae
fui[^]t. Iconi Mutifii in Lin. Supp. pro *C. integrifolia* citatce fat bene, praeterquam
magnitudine, convenit; planta enim noftra, & praecipue corolla, quod forfan ex
deficcatione accidit, illa icone multo minor eft. Anne eadem fit, quum nondum
vidi plantam Mutifii, dubius haereo.

C. integrifolia Lin. Syf. Veg. ed. 13, longe ab utrifque diverfa eft planta, mihi invifa.

Ideoque au&oritatem Feuillei tantum ftabit, eritque differentia ejus fpecifica *C. foliis*,
hmcetoJatis rugofisferratis^floribuspaniculatis terminalibus.

III.



Calceolaria perfoliata. Lin.

CALCEOLARIA, perfoliata, *Lin.*

CALCEOLARIA foliis perfoliatis. fagittatis utrinque villosis,

C. foliis perfoliatis spatulato-fagittatis. *Lin. Supp.* 86.

In Nova Granada invenit Mutis.

Planta speciosissima & valde singularis, tota exceptis corollis villosa.

CAULIS teres pedalis vel bipedalis, foliosus, corymbo multifloro folioso terminatus.

FOLIA connato-perfoliata, venis reticulata, subtus densissime lanata, basi latissima, medium versus attenuata, dein ampliata in lobum maximum deltoideum, margine irregulariter denticulata, parum revoluta.

FLORES fasciculati in summitate ramulorum. *Bradlea* foliis simillimae, sed ovatae, sessiles nec perfoliatae.

PEDUNCULI filiformes, simpliciter vel ramosi.

CALYCIS laciniae subaequales, acutae.

COROLLA flava, magna; figura autem ex plants ficta haud bene erui potest.

STAMINA breviter. *Anthera* bilobae, lobis deflexis, magnae.

PISTILLUM, *Germen* subconicum. *Stylus* filiformis. *Stigma* acutum.

FRUCTUM non vidi.

OBS. Figura mea ad exemplarium in Herb. Lin. delineata est. Partes floris adnexae sunt ex icone Mutisii mutuatae, namque ex planta ficti non satis accurate conficere speravi.

EXPL. TAB.

a Corolla apice ficta, cum staminibus in situ.

bb Stamina cum antheris.

c Calyx cum pistillo.



J 'fl/f/St /fit ft/,,/,,

SALVIA rofaefolia.

DIANDRIA monogynia.

CHAR. ESSENT. *Corolla inaequalis; Filamenta transverse pedicello affixa.*

SALVIA foliis pinnatis incanis: foliolis ferratis, calycibus ringentibus.

S. orientalis, foliis alatis, minoribus & crenatis, odore mari, *Tournef. Cor. II.*

S. foliis ebulli. *Buxb. Cent. 2. 41* / 46 ?*

In Armenia legit Tournefort. % *Herb. Tourn.*

CAULIS suffruticosus humilis teres incanus adspersusque pilis albis raris.

FOLIA opposita pinnata incana* *Petiolus communis canaliculatus. Foliola quinque petiolata obovata versus apicem ferrata nervosa, impari paulo majori.*

FLORES purpurei verticillati in spica terminali; verticillis inferioribus foliis binis bracteiformibus integris suffultis. *Bractea propria una ad funiculum florem ovata, acuta, integra, incana, calyce brevior.*

CALYX tripartitus bilabiatus ringens, labio superiori tridentato, inferiori profunde diviso, dentibus spinosis.


COROLLA calyce duplo longior, fauce ventricosa, labio superiori fornicato emarginato, extus villosa; inferiori ampliato undulato.

STAMINA ut in congeneribus, majuscula.

PISTILLUM. *Stylus incurvus, labio superiori corolla paulo longior. Stigma bifidum acutum.*

FRUCTUM non vidi.

OBS. Si planta Buxbaumii eadem sit cum nostra, figura ejus minimè laudanda est.



a



Roussea simplex.

ROUSSEA.

TETRANDRIA monogynia.

CHAR. ESSENT. *CaL* tetraphyllus. *Cor.* monopetala, campanulata, quadrifida, infera. *Bacca* quadrangularis polyfperma.

*In memoriam cekberrimi Jean Jacques Roufleaû, qui epijiolas amoenijffimas de re botanic d firipjiti Sf amabilem fcientiam ad extremum ufque halltum coluit & ornavit. Lintueus, qui fa plus cum Mo per epijiolas confilia communlcabat^ in manuscriptis plantain nominifuo confecra-verat. Cum vero hcec^ ex Linnceijilii hallucinatlone^ alio nomine (Rujfelia) evulgata eji, genus novum ptdcherrimum & mdxime Jtingulare Rouffeam dixi**

ROUSSEA fimplex.

In infulâ Mauritii legit Commerfon. *Thouin.*

FRUTICULUS per arbores vel rupes, inter mufcos ut videtur, fcandens.

CAULIS craffus carnofus nodofus.

FOLIA oppofita petiolata obovata acuminata dentata, utrinque glaberrima, fubcarnofa, *StipuU* intrafoliaceae membranaceae acutae.

FLORES folitarii axillares breviter pedunculati nutantes magni, fubftantiae valde carnofae. *Bradlea* confertae membranaceae acutae, ftipulis confimiles. *Pedunculi* teretes nudi.

CALYX quadrifidus glaber, laciniis lingulatis acutis reflexis.

COROLLA campanulata extus rugofa fubpubefcens, femiquadrifida^ laciniis acutis revolutis.

STAMINA corollâ revolutâ duplo longiora, ejufdem laciniis alterna. *Filamenta* re6la latiffima, apice parum anguftiora, glabra. *Anthera* parvae fagittatae acutae.

PISTILLUM. *Germen* fuperum pyramidato-quadrangulare glabrum. *Stylus* longitudine ftaminum, perfiftens. *Stigma* fimplex obtufum depreffo-umbilicatum glabrum.

FRUCTUS, quem haud maturum vidi, mihi videtur *bacca* pyramidato-quadrangularis, forte unilocularis, cortice laevi duro, feminibus parvis lenticularibus nidulantibus numeroifilimis repleta.

EXPL. TAB.

a Stamen cum Antherâ.

b Calyx.

c Fru6tus haud maturus.

d Stigma.

e Idem microfcopio auftum.

/ FruftAs fedtio tranfverfa.

g Semina.



Thouinia spectabilis.

VII.

THOUINIA.

PENTANDRIA monogynia.

CHAR. ESSENT. *Corolla* monopetala, campanulata, infera, extus hispida! *Stylus* simplex. *Drupa*

THOUINIA fpe&abilis.

In infula Madagafcar legit Commerfon. *Thoutn.* *h*

ARBOR cortice rugoso duriori.

RAMI teretes, apicem versus fericei, foliis floribusque fasciculatis terminati.

FOLIA sparsa petiolata obovato-lanceolata obtusa glaberrima, nervo valido medium percurrente. *Pedunculi* canaliculati, juniores scircci. *Stipula* nullae.

FLORES axillares folitarii pedunculati subnutantes speciosi hermaphroditici.

PEDUNCULI teretiusculi, apice incrassati, basin versus fericei, medio bracteas duas parvas acutas fericeas oppositas gerentes.

CALYX pentaphyllus persistens; Foliolis subrotundis, tribus exterioribus callosioribus rugosis nudis, duobus interioribus margine membranaceis, dorso fericeis.

COROLLA calyce duplo longior, monopetala campanulata plicata quinquefida, laciniis obtusiflimis, extus fetis creberrimis rigidis fulgentibus hispida, intus margineque inter plicas glabra, apice tomentoso-ciliata.

STAMINA 5, corolla duplo longiora, declinata. *Filamenta* teretia nuda. *Anther** majusculae cordatae bilobae glabrae.


GERMEN superum pilosissimum. *Stylus* longitudine & figurae itaminum, declinatus. *Stigma* simplex obtusum.

" DRUPA globosa magnitudine pruni, calyce persistenti suffulta." *Commerfon* MSS.

OBS. Thouiniam nutantem *Thunbergii* Herbario Lin. filii, qui eam in *Suppl.* descripsit, inveni, primoque intuitu nil nisi *Chionanthum zeylanicum* esse percepi. Nee a *Chionantho* separari debet. Pulcherrimum itaque genus e plantis Commerfonianis, Linnaco filio ab optimo Thouinio liberaliter oblatis, felegi, laetissimus equidem quod in tam gratum reservatus fuit officium, quo observantiam erga amicum optimum testificer, et botanicum dignissimum honoribus dudum meritis condecorem.

EXPL. TAB.

- a* Calyx integer.
- b* Corolla integra.
- c* Floris sectio longitudinalis.
- d* Filamenta
- e e* Antherae.
- f* Stigma.
- g* Germen.
- h* Stylus.
- i* Stigma.



Dichondra repens. Forst.:

D I C H O N D R A . *Forft. Gen. PL 20, tab. 20.*

PENTANDRIA digynia.

CHAR. ESSENT. *Calyx pentaphyllus. Corolla rotata infera. Capfula dicocca.*

DICHONDRA repens. *Forft. loc. cit. Prod. 21?*

Sibthorpia evohulacea, foliis reniformibus integerrimis., Lin. Supp. 288.

E Nova Granada Linftaeo mifit Mutis.

CAULIS profratus repens ramofus teres.

FOLIA alterna petiolata erefla reniformia, fubinde emarginata, fuperne nudiufcula^ inferne fericea, radiato-venofa. *Petoli teretes fericei.*

PEDUNCULI axillares filiformes viniflori fericei, vix longitudine petiolorum, plerumque folitarii.

FLORES parvi fubnutantes.

CALYCIS foliola obovata reticulato-nervofa, eXtus piiofa, intus glabra, perfiftentia*

COROLLA (ex icone Mutilii) monopetala rotata fubcampanulata quinquefida longitudine calycis.

STAMINA quinque fubulata patentia, inter lacinias corollae alternatim fita, duploque breviora. *Anthers fubrotundse.*

PISTILLUM. *Germina duo pilofa. Styli duo divaricati fetacei longitudine ftaminum, "interiis e haji germinum orti" {Forft.) Stigmata capitata.*

CAPSULE binz globofae fubhifutae uniloculares monofpermae.

SEMINA folitaria globofa.

OBS. Defcriptio hujus plantae in Supp. Plant, eft Linnsei patris. Ad Sibthorpiam ex habitu tantum, ignotis floribus dum adhuc delineationes Mutifii nondum receperat, remifit vir illuftris, fed perperam. Differt a Sibthorpiâ floribus pentandris digynis, nee didynamis monogynis, capfulis binis, ut&que monofperma, neque capful^ biloculari polyfperma. A Falkii diftindiffima eft, quamvis foliis quodammodo fimilis.

Figura noftra ad exemplarium Mutifianum, adnexis floris partibus ex ipfius iconc plerumque depromptis, delineata eft. Varia habeo fpecimina in agro Bonarienfi, infulifque Mauritii aGommerfonio Ie6la; aliaque in Herbario Bankfiano Jamaigenfia ct Peruviana vidi, quae varietates tantum puto. Differunt enim foliis utrinque vel fubtus tantum fcriccis, pedunculis petiolifque longioribus vei brevioribus, & hsec inter fpecimina ejufdem regionis valde variant. Nofta omnino fimilis videtur Dichondra fericea Swartz. *Prod.* in Herb. Banks, ut et planta Commerfoniana ex infula Mauritii, qnac Forfteri Dichondra repens, ex qua confers eft character genericus, videtur.

EXPL. TAB.

- a* Flos. mag. nat.**
- b* Idem microscopio auctus.**
- c* Stamen cum Antherâ.**
- d* Idem auctum.**
- e* Germen cum Pistillis.**
- f* Eadem aucta.**
- g* Calyx cum Fructu.**
- h* Eadem aucta.**
- i* Folium calycinum magis auctum.**
- k* Fructus transversè sectus, auctus.**
- / Semen etiam microscopio auctum***



Ehrharta panicca

EHRHARTA,

Thunb. AB. Holm. ann. 1779. Lin. Supp. 28.

HEXANDRIA digynia?

CHAR. ESSENT. *Calyx* Gluma bivalvis uniflora. *Corolla* Gluma duplex, utraque bivalvis: exterior compreffa, acinaciformis, bafi excifa.

EHRHARTA panicea.

EHRHARTA culmo divifo, panicula fubramofa, floribus ereftis digynis.

Ex Capite Bonze Spei adtulit Sonnerat anno 1776. *Herb. l'houl.*

CULMUS fubramofus geniculatus foliofus.

FOLIA vaginantia enfiformia ftriata nuda margine fcabra.

PANICUL.S terminales fubramofae.

PBDUNCULI capillares recti, apice incrassati.

FLORISS quam in *E. capenji* triplo minores, virides erecti.

CALYX bivalvis margine fcariofus, valvula exteriori majori.

COROLLA Gluma duplex mutica calyce duplo longior.

Exterior rudior acinaciformis bivalvis. *Valyda* oblongse obtusae complicate compreffae amplexantes fubaequales triangulares. *Exterior* lsevis, nee rugofa, «
terior bafi excifa, dorfo tranfverfaliter rugofa. *Villos* ad bafin non invent.

Interior bivalvis, exteriori contraria.

Vahuhe complicate glaberrims fubaequales. *Exterior* paulo latior *interiorm* amplcdens.

NeElarium > fi adfit minutiffimum, non vidi.

STAMINA fex. *Filatnenta* breviffima ^qualia. *Anther** lute*, apice blobae, IODIS
divaricatis.

PISTILLUM. *Germen* ovatum minimum glabrum. *Stylus* bifidus. *Strata* duo pern
cilliformia.

SILMEN unicum nudum.

OBS. Figuram ad unicum exemplarium in Kcrbario amiciffimi ^1ⁿⁱ Parifiis delin-
cavi. Vitia etiam exemplarii imitatus fum, ut facilius recognofcatur. Adpofui
partes fructificationis magis vel minus magnitudine audtas.

Ex diis patet quantum differt ab *Ehrharta capenfi*, ^{fi quæ} absolute conjunctis vi-
roru. Ingnlu. n ThunbagU «ut j vidi. * *Ehrharta panicea* vero, quamvis
est. f
stylus
uo habet ftigmata, omnino ut in graminibus vul-
^avibus & in *Oryza*. Hinc potius ad Hexandnam digyniam post *Oryzam*, cui mag-
nam habet affinitatem, referre placet. Dijudicent autoptx.

Speciem aliam in Herbario Bankiano nuper vidi, cui flore, digyn. funt, coroua acu-
minata, extus hhpida, nec tranfverfe rugofa.

EXPL. TAB.

- a* Flos integer, mag. nat**
- b* Calyx lente audus.**
- c* Corolla exterior.**
- d* Corolla interior.**
- e* Corolla interior cum genitalibus.**
- f* Genitalia feparata.**
- g* Stamina magis lente audta.**
- h* Stamen cum Antheri. -%**
- i* StyU cum Stigmatibus. { magnitudine quintuplo aufta.**



Turraea virens. Lin.

T U R R A E A. *Lin. Mant. 2, 150.*

DECANDRIA monogyma.

CHAR. ESSENT, *Calyx* quinque-dentatus. *Petala* quinque. *Nettarium* cylindricum, ore antheras gerens. *Capfula* pentacocca. *Semina* bina.

Turraea dixit Lintiaus in memoriam Georgii à Turre, *Hiftoria Plantarum* anno 1685 ^a"
• *tavii impreffie* ^a aufforis; vel *fotius tnelius* meriti Antonii Turra? Vicentinij qui *dijfertationem de Farfetiâ* edidit.

TURRiEA yirens. *Lin. Mant. 2, 237.*

TURRJE A foliis elliptico-lanccolatis emarginatis glaberrimis, calycibus frutibufque fericeo-villofis.

Inter acervos fcoriarum ad montes quondam arduos Indian Orientalis legit
Kœnig. ♀

ARBOR vel FRUTEX fempervirens.

KAMI fparfi divaricati foliofi, cortice rimofp glabro, in junioribus tantum fericeo^a villofo.

FOLIA alterna petiolata elliptico-lanceolata fubacuminata emarginata integerrima margine^a parum revoluta, utrinque nuda lucida venofa, fubtus pallidiora. *Petoli* breviffimi fericei incurvi. *Stipula* nullae.

PLORES laterales congefti in fpicam minimam axillarem, foliolis aliquot parvis interfiftis. . *Brafte** parvae lineares villofae.

PEDUNCULI angulati uniflori fubfericei.

CALYX parvus 5 angularis perfiftens, totus fericeo-villofus.

PETALA lineari-lanceolata tenera nuda, ex fententia Linnaei flava.

Neclarium tubulofum obliquum, verfus apicem paulò ampliatus, friatum, longitudine petaiorum, marginedecemfido, laciniis linearibus acutis deflexis patentibus.

STAMINA filamenta decem breviffima, intra os nedarii, inter ejufdem lacinias alternatim fita. *dntffera* in fauce nedlarii, fubovatae marginatae.

PXSTILLUM. *Germen* fubrotundum. *Stylus* filiformis dcclinatus, longitudine neftarii, vel ex hujus in plantâ ficci contraaione, parum e fauce eminens, deciduus. *Stigma* craffilufculum obtufum rugofum.

PERICARPIUM. *Capfuia* depreflà pentacocca, fericeo-viliofa, decem valvis, quinque locularis, valvulis longitudinaliter dehifcentibus.

SEMINA in utroque loculamceto bina, reniformia,

OBS.

OBS. Nectario affinis Meliae, Swieteniae, Trichiliae, fructu ab omnibus distinctissima. Clariff. Hellenius in *Afth Holmens*. anno 1788 Turraeam virentem descripsit a Linnaeanâ certè omnino alienam, ut et aliam speciem, aequè mihi ignotam, sub nomine T. pubescentis. Utraque mihi ob antheras in apicibus nectarii, nec inter ejus lacinias, & fructum ignotum, dubiae videntur.

EXPL. TAB.

a Petalum.

b Flos demptis petalis.

c Apex nectarii parum **auflus interne vifus.**

d Stamina in **fitu.**


t **Calyx cum Stylo.**

f **Stigma.**

g **Fru6his integer.**

b **Idem, iingulo loculamento apezto.**

i **Semen.**



Turroea africana.

XI.

T U R R A E A maculata.

TURR/EA foliis nudis, calycibus glabris ciliatis.

In insula Madagafcar legit Commerfon. *T'houin*.

ARBOR foliis, ut videtur, deciduis.

RAMI alterni, cortice rimoso glaberrimo*

FOLIA alterna petiolata elliptica integerrima, utrinque glabra, subtus, praecipue ad nervos, pallide maculata. Petioli recti canaliculati glabri. Stipulae nullae.

FLORES in fasciculis lateralibus, bracteis parvis acutis ciliatis interstitiis.

PEDUNCULI glabri, versus apicem craffiores, uniflori erecti*

CALYX parvus hemisphaericus glaber, margine ciliatus.

PETALA longissima linearia, apice paululum latiora extusque pubescentia, lutea.

Nectarium longitudine & colore petalorum, ex parte cylindricum, valde gracile, glabrum, decem-fidum, margine decemfido laciniis lineari-lanceolatis acutis patentibus.

STAMINA in faucibus nectararii.

PISTILLUM. *Germen* non vidi. *Stylus* longitudine nectararii.

FRUCTUS in exemplario deest.

Expl. TAB.

a Flos nondum apertus.

b Calyx.

c Idem magnitudine auclus.



Turraea sericea.

TURRAEA fericea.

TURRAEA foliis utrinque villofis, calycibus pedunculatè tomentofis.

In infulâ Madagafcar legit Commerfon. *Vhouin.*

ARBOR foliis deciduis.

RAMI alterni, cortice obfcuro leviter pubefcente.

FOLIA alterna petiolata elliptica integerrima, utrinque (juniora laltem) molliflime villofa, nervofa, nervis reëtis. *Petioli* redli villofi. *Stipuhe* nulls.

FLORES e gemmis lateralibus, plerumque folitarii, maximi fpeciofi rubri cernui, dum folia adhuc tenera funt erumpunt. *Btaftea* numerofae acutae villofaBt

PEDUNCULI breves craffi angulati tomentofoincani.

CALYX campanulatus angulatus totus tomentofoincanus nee ciliatus.

PETALA longiflima(quadriuncialia) linearia recurva, apice ovata obtufa, extusincana.

Neflarium longitudine petalorum incurvum, pilofum, apice vix ampliatur, limbo decemfido, laciniis bifidis linearibus acutis patentibus.

STAMINA in fauce nectarii, antheris inter lacinias eminentibus. *Anthera* bicornes.

PISTILLUM. *Germen* mihi ignotum. *Stylus* nectario paulum longius. *Stigma* clavatum.

FRUCTVM non vidi.

EXPL. TAB.


** Apex Nectarii interne vifus.

b Laciniiffi ejus bifidix.

c Antherae in fitu.

d Stamen cum Anthera lente ~~auca~~.

c Stigma.



Silene dioica L.

S I L E N E chloraefolia.

DECANPRIA trigynia.

CHAR. ESSENT. *Cat. vcntricofus. Petala 5 unguiculata; coronata ad faucem. Cap-
fula trilocularis.*

*Sedlio * * * Floribus ex dichotomia caulis.*

SILENE calycibus glabris clavatis, petalis femibifidis, foliis glaucis : inferioribus ovali-
bus, fummis cordatis amplexicaulibus.

Lychnis orientalis vifcofa, Centaurei lutei folio, flore longiflimo. Tcurn. Cor. 24-

In Armenia legit Tournefort.

RADIX perennis ?

CAULES plurimi pedales erefli ramofi dichotomi teretes glabri.

FOLIA oppofita nuda glauca fubcarnofa mucronata, margine fcabra; inferiora ovalia
bafi produfta, fumma cordata amplexicaulia,

PEDUNCULI longi, medio vifcidi.

FLORES erefli maximi.

CALYX glaberrimus decem ftriatus clavatus fubincurvus, ore quinquefido, deiitibus
acutis margine membranaceis.

PETALA unguibus calyce longioribus, limbis cordatis femibifidis patulis, coronata
neftario bifido erefto.

STAMINA 10. 5 longitudine corollae, 5 breviora. *Anthera lineares emarginatae.*

PISTILLUM. *Germen obconicum. Styli ftaminibns longiores. Stigmata revoluta pu-
befcentia.*

FRUCTUS ereftns. *Capfula ovata nitida trilocularis, irregulariter dehifcens, polyfpcrma.*

Expl. TAB.

a Calyx.

b Petalum.

c Neftarium bifidum.

d Limbus Petali.

e Germen.

Iff Anthersc.

g Styli cum Stigmatibus.



¹ tyrf/srrtst f//r4tr/ttut Lin:

STELLARIA dichotoma, *Lin.*

DECANDRIA trigynia.

CHAR. ESSENT. *Cal.* pentaphyllus patens. *Petala* quinque, bipartita. *Caff*, unilocularis, polyfpcrma.

STELLARIA foliis ovatis feffilibus, caule dichotomo, floribus folitariis, pedunculis fructiferis reflexis. *Lin. Sp. Pl. ed. j. 421. eJ. 2. 603.*

Alfine petalis emarginatis, foliis ex cordato-ovatis, acutis. *Gmel Sid. 4.149.*

Habitat in Alpibus Sibiricis.

RADIX annua.

CAULIS teres pubescens ramofiffimus undique patulus, multoties dichotomus, foliofus multiflorus.

FOLIA duo ad omnem caulis divifionem, oppofita ovata acuta feffilia pubefcentia.

FLORES folitarii e dichotomic caulis, nequaquam paniculati, pedunculati,

PEDUNCULI teretes pubefcentes, unciales, floriferi erefti, frfiftifen retrofraai-

CALYX pubescens; foliolis acutis vix ftriatis, nervo medium percurrente, margine fcariofo albo.

COROLLA alba; *Petala* longitudine calycis, ovata, apice biloba, nee profunde divifa, lobis obtufis.

STAMINA 10 filiformia fubaequalia, petalis paulo breviora. *Anthene* fubrotundx.

PISTILLUM. *Gertnen* globofum. *Styli* tres fubdivaricati, longitudine ftaminum, *Stigmata* obtufa rccurva.

CAPSULA ovata glabra quinquevalvis, apice dehifcens, unilocularis polyfperma.

SEMINA nonnulla, angulata, fcabra, in globum congefta.

OBS. A Gmelino accepit Linnxus, nee inveni audloritatfem qua earn in Helvetiâ nafci dixit, botanicis Helveticis ad hanc ufque diem nunquam rcpertam. Hallerus enim pro Stellaria dichotomy Lin. varietatem St. nemorum defcripfit, Sc dcin, more fuo, plantas a fe jjvicem non differe afferuit.

EXPL. TAB.

***a* Calyx.**

***b* Folium calycinum audum.**

***c* Petalum.**

***d* Genitalia.**

***t* Stamen au&um cum Antherâ.**

/ Germen aufum cum Styli.

***g* Gapfula matura.**

***b* Eadem aufa.**

***i* Semen.**

***k* Idem aufum.**

/ Idem tranfverfe fedum,

XV.



1-V, i

Stellaria cerastoides, Lin.

STELLARIA *ceraftoides*, *Lin.*

DECANDRIA trigynia.

STELLARIA foliis oblongis, pedunculis fubbifloris. *Lin. Sp. PI. ed. i. 42a. ed. 2. 604.*
Flo. Suec. 2. No. 394. defcriptio optima.

" Habitat in Alpibus Lapponi* Lulenfis, ubi eandem legi, fed in Flora Lappo-
 " nica omifi obfcuram plantam." *Lin. in Flo. Suec.*

CAULES diffiifi ramofi Mofi; *Ramijkriferi* adfcendentes nudiufculi, teretes, glabri.

FOLIA feffilia oppofita ovato-oblonga obtufa utrinque glaberrima fepe fecunda.

FLORES terminales fubterni longe pedunculati. *Pedmculi* teretes apice incraffati pu-
 befcenti-vifcofi uniflori; medius aphyllus, laterales medio duas gerentes Mtar
 , oppofitas lanceolatas acutas.

CALYCIS foUa lanceolata obtufa « fubpubefcenti-vifcofa.* (LIN.)

PETALA obovata, calyce fere duplp longiora, vix femibifida, alba.

STAMINA 10, aquaUa, calyce breviora. *Anther** fubrotund*.

PISTILLUM. G ^ ^ ovatum, calyce duplo brevius. *Styli* tres, calycem ^quantes.
Stigmata recurva.

FRUCTUM non vidi.

OBS. Defcriptio noftra & figura ad exemplaria originalia, in Sp. Pi. & Flo. Suec. de-
 fcripta, confeaae funt. Unnsus varias plantas diverfis temporibus cum ifta con-
 fudit, ut ex vifu Herbarii ejus patet.

EXPL. TAB.

. a Calyx.

b Petalum.

c Stamen cum Anthera.

d Germen cum Styliis.

.ff


ill \

Acroanthoides

A R E N A R I A dianthoides.

DECANDRIA digynia.

CHAR. ESSENT. *Calyx* 5 phyllus, patens. *Petala* 5, integra. *Cap*/, unilocularis, polyperma.

ARENARIA foliis linearibus margine scabris* floribus capitatis, bracteis ventricosis pedunculis superantibus.

Alfina orientalis, caryophylli folio, flore magno in capitulum congesto. *fourn. Cor.* 17.

Sponte nascitur in Armenia. *Herb. Tournef.* u

RABIX lignosa perennis.

CAULES numerosi erecti pedales teretes glabri articulati, articulis 6 vel 7.

FOLIA opposita basi connato-amplexicaulia linearia acuta glabra margine serrulato-scabra, articulis plerumque longiora, summa bracteis affilimilata breviora.

FLORES in apice vel capitulo denso terminali petiolis brevibus filiformibus, bracteis obvallati, monoici. *Bractea inferiores* maxima? membranacea carinata mucronatae ventricosae calyces superantes; *superiores* abbreviate tenuiores.

CALYCIS foliola ovata obtusa membranacea glabra.

PETALA alba obovata unguiculata, calyce triplo longiora.

GENITALIA in flore masculino.

Stamina 10, 5 longitudine corollae, 5 breviora.

Anthera sagittatae, omnes fertiles.

Germen ovatum abortivum* *Styli* tres, brevissimi, marcescentes*

GENITALIA in flore femineo.

Stamina 10, brevissima. *Anthera* membranacea vacuae.

Germen ovatum. *Styli* tres, longitudine corollae. *Stigmata* reflexa, superne pubescentia.

Capfulam maturam non vidi.

EXPL. TAB.

a Flos masculinus, demptis Petalis.

b Petalum.

cc Stamina.

d Germen abortivum.

e Flos femineus integer, pari bracteolarum munitus.

/ Genitalia floris feminei.

g Stamina abortiva.

h Styli cum Stigmatibus perfectissimis.

*Aicnaria cucubuloides.*

ARENARIA cucubaloides.

ARENARIA foliis linearibus margine scabris, panicula dichotoma pubescente, petalis obovatis.

Alfine orientalis, Garyophylli folio, viscosa, flore magno albo. *Tourn. Cor.* 17.

Alfine viscosa, longiflomis & angustiflomis foliis. *Amman. Ruthen. p.* 66 ?

Sponte nascitur in Armenia. *Herb. Tournef.* v

RADIX perennis sub lignosa.

CAULES numerosi erecti pedales teretes glabri.

FOLIA opposita basi connato-amplexicaulia linearia acuta glabra margine scabra, superiora breviora.

PANICULA terminalis dichotoma patula pubescens viscosa,

FLORRES magnitudine & facie *Lini ujisatljimi*[^] albi. *Brasilece* acuta, margine scariose, pedunculis quadruplo breviores.

CALYCIS folia ovata carinata ftriata acuta pubescentia viscosa, margine scariofa.

PETALA obovata, venis subpellucidis ftriata.

STAMINA 10, quorum 5 longitudine corollae?, 5 breviora.

PISTILLUM. *Germen* subrotundum. *Styli* 3, longitudine corollae.

CAPSULA unilocularis ventricosa nitida, calyce vestita.

SEMINA plurima.

OBS. Differt ab *A. gypsophiloide Lin.* floribus triplo majoribus, petalis obovatis nec lanceolatis.

EXPL. TAB.

a Folium calycinum.

b Petalum.

c Genitalia.

d Anthera aucta.

e Germen cum Pistillis.

f Capsula immatura transversa fecta.

- *g* Columella.

h Semen*

win.



Spargula laricina. Lm.

SPERGULA laricina. *Lin.*

DECANDRIA pentagynia.

CHAR. ESSEN T. *Cah* 5 phyllus. *Pet.* 5, integra. *Cap*/, ovata, 1 locularis, 5 valvis.SPERGULA foliis oppositis fubulatis ciliatis fasciculatis. *Lin. Sp. Pl.* 631.-Alfine foliis oppositis linearibus rigidis fasciculatis, basi ciliatis, petalis integris calyci aequalibus. *Gmel. Sib.* 4. p. 155.In Sibiria. inter Jacutiam & Ochotium invenit Steilerus. *Gmelin.* 4CAULES decumbentes ramofi foliofi teretes. *Rand* floriferi adscendentes simplicis, foliofi, pauciflori, subflexuofi, geniculis parum tumefcentibus, glabri*

FOLIA opposita fetacea, basi membranacea connata* versus basim ciliata, superficie glabra; juniora in fasciculis axillaribus folitariis.

FLORES terminales lateralesque folitarii albi, magnitudine Stellariae holotense. *Bracte*# foliis fimiles sed breviores, nuda*

PEDUNCULI filiformes glabri.

CALYCIS foliola lanceolata acuta trinervia glabra margine membranacea*

PETALA obovata vix calyce longiora.

STAMINA 10; 5 longitudine petalorum, 5 breviora. *Anther** subrotundae*PISTILLUM. *Germen* ovatum obtusum quinque-furcatum *Styl* 5 filiformes patentes, vix filamentibus longiores.**Fructum** non vidi maturum*

Pulchra & rarissima planta, paucifloris nota botanicis, nullis adhuc depicta. Gum Arenariis maxime convenit, nisi foliorum numero. Inter congeneres magis cum Sparguli nodo habet affinitatem, minus cum Sp. saginoide, cui a botanicis Anglicis ejus synonyma saepe tribuuntur.

EXPL. TAB.

a Calyx.

b Folium calycinum separam.


c Petalum.

d Stamen*

t Germen*

f Styli 5.

XIX.



Rubus glaberrimus.

XIX.

R U B U S geoides.

ICOSANDRIA polygynia.

CHAR. ESSENT. *Cal* 5 fidus. *Petala* 5, *Bma* compofita acinis monofpermis.

Sedio * * *Herbacei*

RUBUS foliis fimplicibus ternatifque obtufis ferratis nudis, foliolo impari maxiffio.

In Amerita Meridionali ad Fretutn Magellanicum invenit Commerfon. *Thouin*.

GAULES herbacei breviffimi deprefli*

FOLIA petiolata, plerumque ternata, folioiis irreglariter ferratis obtufis, utrinque glaberrimis, fubtus venofis, impari maximo cordato femarginato. *Pethli* fubvillofi.

FLORES folitarii hermaphroditi, pedunculis brevibus craffiffimis pubefcentibus, petalis fubrotundis.

OBS. A Rubo Dalibard& differt foliis ternatis glabris, ferratis potius quam crenatis, pedunculis brevibus craffis, nee filiformibus longiffimis, petalis fubrotundis nee lanceolatis.

EXPL. TAB.

^a Petalum,



Rubus **r** *Dalibarda*. Lam.

R U B U S Dalibarda, *Lin.*

Se&io ** *Herbacei.*

RUBUS foliis fimplicibus cordatis indivifis crenatis, fcapo aphylo unifloro. *Lin.*

Sp. PL 708.

Dalibarda repens. *Lin. Sp. PL* 1. 491.

E Canada adtulit Kalm. *Herb. Lin.* In horto regio Kewenfi quondam viguit, fed jamdudum periit, et tandem anno 1788 ex America Septentrionali recepta eft. *n*

RADIX repens fibrofa.

STOLONES profrati herbacei.

;V-iA altema petiolata erefta cordata obtufa, inaequaliter crenata, venofa, fupra pilis vris adfperfa, fubtus nuda, Violae familia fed firmiora, fubinde rubicunda. *Petoli pilofi foliis longiores.*

PEDUNCULI folitarii aphylli filiformes pilofi uniflori, longitudine petiolorum.

PLORES hermaphroditi albi parvi.

CALYX quinquepartitus, laciniis lanceolatis acutis pubefcentibus.

PETALA ovato-lanceolata, calyce vix longiora.

STAMINA capillaria, longitudine petalorum, numeroſa. *Anther** parvae fubrotundae.

PISTILLUM. *Germina* 5 ? parva pilofa. *Styli* breviffimi.

PERICARPIUM. *Bacca* compofita exfucca. *Semina* 5, ovata acutiuscula, in planta ficca fuperficie corrugata.

OBS. Hill in peffimo libro *Vegetable Syſtem*, Vol. 16. tab. 11. figuram nomine Rubi Dalibard* evulgavit, quæ nil nifi icon vitioſa Rubi Chamaenori, e Gerardo maculaio, p. 1420, parum mutata, eft. Hinc plantam rariffimam Canadae, in montibus Angliae borealibus naſci, faWb afferuit.

EXPL. TAB.

a Flos.

b Petalum.

c Stamen.

d Fructus maturus.

e Unus ex quinque Acinibus exfuccis microſcopio auſtus.



Chenopodium

SONCHUS alpinus, *Lin.*

SYNGENESIA Polyg. sequalis.

CHAR. ESSENT. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, ventricofus. *Pappus* pilofus.

SONCHUS pedunculis fquamofis, floribus racemofis, *Lin. Sp. PL ed%* i. 794. fbliis runcinatis. *Sp. PL* 2. 1117.

S. Lapponum altiflimus, floribus cacruleis. *Lin. Flo. Lapp.* 231,

Ad latera alpium Lapponiae admodum vnlgarem invenit Linnaeus in itinere celeberrimo anno 1732. 0

CAULIS funplex ere&us teres ftriatus glaucefcens, " faepe humanae altitudinis & majoris." *Lin.*

FOLIA alterna runcinata irregulariter dentata glabra, fubtus glauca, lacinia terminali vix reliquis majori.

RACEMUS compofitus foliofus longiflimus terminalis ereilus multiflorus, floribus erc&is.

PEDUNCULI ramofi, toti obte&i brafteis alternis triangularibus acutis glabris.

CALYX oblongus bafi ventricofus glaber, fquamis lanceolatis acutis viridibus margine pallido.

COROLLA " caerulea." *Lin.*

RECEPTACULUM nudum.

SEMINA coarftata ftriata. *Pappus* fimplex feffilis oculo armato fcaber.

OBS. Sonchum alpinum verum Linnsei in nullo herbario, nifi in meo & Lecheano hodiè apud Nob. Banks, vidi. Omnes enim auftores, negleft^ differentiâ fpecifidi Linnsei, qu« optima, fynonymis ejus qua falfa funt inconfultè fidentes, omnino erraverunt, plantam pro Soncho alpino offerentes nullo modo cum defcriptione ejus convenientem, quae, quamvis in alpibus Europaeis ubique vulgaris, proculdubio eft S. Canadenfis *Lin.* ut ex fpecimine Kalmiano in *Herb. Lin.* e Canadâ patet. Notandum eft quod fynonymon Gronovii ad S. Canadenfem a Linnaeo relatum, reverà ad S. Floridanum pertinet.

EXPL. TAB.

a Flos pedunculo fquamato infidens.

b Flofculus cum genitalibus.

c Semen cum pappo.

d Idem lente audlum*

>n



W'f/ut „</>,i//s,r L!

LOBELIA Columneae, *Lin.*

SYNGENESIA monogamia.

CHAR. ESSENT. *Cat.* 5 fidus. *Cor.* monopetala* irregularis. *Cap*/, infera, bi five tri*
ocularis.

SeFlio * * Foliis integerrimis.

I-OBELI A foliis oblongis obtufis revolutis rugofifiimis fupra lucidis fubtus to-
mentofis.

L. foliis oblongis obtufis crenatis glaberrimis, fubtus tomentofo-albis, caule corollifq;ic
pulverulentis. *Lin. Supp.* 393.

E Nova Granada mifit Mutis. *n* vel *

RAMUS (an Caulis ?) fublignofus angulatus, tomentofo-pulverulentus, praecipue verfus
apicem, foliofus.

IAOLIA fparfa petiolata ovali-oblonga obtufa reticulato-venofa rugofifillma, margine
revoluta, fupra, nifi in junioribus, glabra lucida, fubtus omnia deniffime tomentofa,
venis craffis exftantibus. Margo ipfe foliorum integerrimus; fed cum marginis revo-
lutio ill. Linnasum fefellerit, venularum interftitia, ad margines ultra circumferen-
tiam revolutam prominentia, pro margine habebat, & inde folia *crenata* dixit. *Petiole*
canaliculati pulverulenti.

I^f LORES axillares folitarii pedunculati.

CALYX pulverulentus hemifphericus decangulatus quinquedentatus, dentibus lineari*
bus ereais corolla adpreffis.

COROLLA incurva, medio parum ventricofa, 5 angularis, limbi laciniis inaequalibus
linearibus/externe pulverulenta.

STAMINA corollâ paulo longiora. *Anthr*** coalitae in cylindrum obliquum incurvum.
glabrum, apice fub ftigmate barbatum.

P^jSTILLUM. *Stylus* ftaminibus paulo longior. *Stigma* obtufum.

CAPSULA (unicaquam vidi) quadrivalvis, valvulis apice dehifcentibus recurvis glabris.

Obs, Defcriptio in *Supp. Plant*, quoad maximam partem eft Linnsei patris, non vero
differentia fpecifica; ut patet ex manuſcriptis ejus in bibliothec&. Magnam affini-
ta^{tem} quae quidem me fefellit, fufpicatu[^] erat vir illuftris inter hanc plantam &c
Columneam fcandentem.

EX PL. TAB.

***a* Calyx cum Piftillo.**

***b* Stigma.**

***c* Flos longitudinaliter fiffus cum Staminibus in fitu.**

Omnia ex icone Mutifii.

***d* Antherae coalitae.**

***e* Barbula.**

Ex ipfâ plants in Herb. Lin.



C *Scilla maritima* L. f. *Scilla maritima* L. Lin:

ARETHUSA biplumata, *Lin.fil.*

GYNANDRIA diandria.

CHARJ, ESSENT. ^U *Nectarium* tubulofum intra corollae fundurti : labio inferiore ftylo adnato." *Lin.*

ARETHUSA fcapo vaginato, fpatha cuculiata, petalis duobus inferioribus elongatis fuperiore latere barbatis. *Lin. fil. in Supp.* 405.

In America Meridionali ad Fretum Magellanicum legit Commerfon. *Thoun.*

RADIX

CAULIS fimpliciffimus pedalis ere&us.

FOLIA *radicalia* lineari-lanceolata acuta, bafi membranacea, equitantia; *caulina* 6 vel 7, membranacea acuta vaginantia alterna, caulem obveftientia: fupremum fpathae vicem gerens latius, altitudine floris.

FLOS folitarius terminalis ere6lus formofus purpureus ?

GERMEN inferum obconicum glabrum.


COROLLA pentapctala, petalis duplici ordine pofitis*

PETALA *tria extefiora* longiora irregularia: *fuperius* fubfornicatum acutum nudum; *duo inferiora* fubulata, bafi latiffima, adfcendentia, latere fuperiori verfus apicem pilis vel glandulis ftipitatis fubclavatis barbata.

PETALA *duo interiora* breviora oppofita fubrhombea acuta venis, purpureis reticuiata.

NECTARIUM vel GENITALIA nee Linnaeus neque ipfe vidi.

Oss. Defcriptionem in Supp. quae inter optimas Linnaei filii habeatur, plerumque fecutus fum. Ad iconem plantae magnitudine naturali unum ex petalis barbatis, magnitudine parum audum, adpofui. Vide fig. a.



PASSIFLORA adulterina, *Lin.*

GYNANDRIA pentandria.

CHAR. ESSENT. Trigyna. Petala 10. NeBarium corona. Baeae pedicellata.

Seftio * Fol'tis indivijis. -

PASSIFLORA foliis oblongo-ovalibus integris, floribus tubulosis. *Lin. Supp.* 408.
calycibus triphyllis.

Mifit ex Nova Granada Mutis.

CAULIS scandens angulatus, passim lanuginosus. Cirrhi axillares simpliciter spirales
glabri.

FOLIA alterna petiolata ovata Integra, margine revoluta, subdenticulata, venosa, fupra
glabra, subtus lanuginosa.

Stipulae binae, lineari-lanceolatae, dentatae, acutae.

FLORES foliarii pedunculati axillares penduli purpurei.

Pedunculi teretes glabri.

CALYX triphyllus glaber deciduus, tubo multo brevior.

COROLLA tubulosa ut in Gardenia Thunbergia, perfertens.

Tubus longitudine digiti, subangulatus, glaber.

Umbra decapetalus; petalis ovatis concavis, infra apicem mucronatis; quinque
exterioribus craffioribus, interioribus tenuioribus magisque coloratis.

Neftarium in fauce breviflimum.

OEKXTALIUM Pedicellus longitudine tubi. Stamina prope germen inferta, patentia.

Anthera incumbentes.

STYLI tres, divaricati. Stigmata craffa.

BACCA ovata maculata.

OBS.

OBS. Figurae hujus et ſequentis delineatae ſunt ex iconibus nondum editis Mutifii in
Suppl. Lin. citatis, ad plantam vivam factis; hinc omnia magnitudine naturali repræ-
ſentantur, paſſim ex plantâ ſic & correſta.

EXPL. TAB.


a Corolla longitudinaliter ſiſſa,

b Neſtaria.

cc Antherſe.

dd Stigmata.

Ex iconibus Mutifianis.



Passiflora mixta. Lin:

PASSIFLORA mixta, Lin.

Seftio * * * Foliis trilobis.

PASSIFLORA foliis trifidis ferratis, floribus tubulosis. Lin. Supp. 408. calycibus monophyllis.

Mifit ex Nova Granada Mutis.

CAUL is fcandens angulatus glaber.

Cirrhi axillares simplices spirales glabri.

FOLIA alterna petiolata trifida, lobis aequalibus divaricatis acutis, denticulato-ferrata, utrinque glaberrima, fubtus venofa.

Supuke binse lunares amplexicaules apice acutae, dentatae.

FLORES folitarii pedunculati axillares nutantes rubri.

Pedunculi teretes pubefcentes.

CALYX monophyllus tubulosus pubescens, apice tri-vel quinquefidus, corolla triple brevior.

COROLLA tubulosa, tota ante expansionem moUiffime pubescens.

Tubus longitudine digiti, teres pubescens.

Umbus decapetalus, petalis ovatis; quinque exterioribus dorso pubescentibus, acumine filiformi, pubescenti, infm apicem tenninatis; interior[^] glabns, acumine minimo.

Nettarium in fauce breviflimum.

GENITALmM *Pedicellus* longitudine tubi. *Stamina* prope germen inferta, patentw.

*Anther** incumbentes.

vr YLI tres divaricati. *Stigmata* obtufa.

Bacca obovata, glabra.

OM. EX hisce duabus speciebm p«dpue difcimus *Paffifloram* decapetalam esse, et quod Utap» in W A*. A«i. 1. P. 217. pro involucro habuit, verum esse calycem-

EXPL.

EXPL. TAB.

a Corolla longitudinaliter fiffa.

b Ne&aria.

c Calyx fiffus.

d Calyx marcidus perfiftens*

ee Anthers.

// Stigmata.

g Germen.

h Se£lio Fruft^s maturi.

i Pulpa feminibus repleta.

Ex icone Mutuilana*.

PLANTARUM ICONES

H A C T E N U S I N E D I T I E ,

PLERUMQUE AD PLANTAS

IN HERBARIO LINNÆANO

C O N S E R V A T A S D E L I N E A T E

A U C T O R E

JACOBO EDVARDO SMITH, M. D.

SOCIET. REG. LOND. ULISSIP. TAURIN. AGRON. PARIS. BOTANOPH.
ANDEGAVENS. SOCIO, SOC. L'INNJSANJB LONDINENSIS PRESIDE.

F A S C I C U L U S II.

L O N D I N I i

T T P I S J . D A V I S :

*MPENSIS BENJ. WHITE ET FILII, IN VICO DICTO FLEET-STREET, APUD QUOS PROSTAT
VENALIS; ET PARISHS APUD LUD. NIC. PREVOST.

P. M. AUGUSTO BROUSSONET, M. D.

ACAD. REG. SCIENT. PARIS. ET MONSP. SS. REG. ATQJJE LINN.

LOND. MEDICT^AQUE EDIN. SOCIO,

SOC. REG. AGRONOM. PARIS. A SECRETIS,

NATURE INDEFESSO SGRUTATORI,

AMICO OPTIMO, CANDIDISSIMO,

SEMPER COLENDO,

HUNC FASCICULUM

SACRUM ESSE VOLUIT

AUCTOR.

P R A E F A T I O .

C

SECUNDUS hic noster Fasciculus, aliquantulo tardius quam quod speraverim, Prodit. Haec mora profecto ex rebus quas neque providere neque evitare potui[>] iata est. In animo autem est, modò mens et corpus fanum fit, duos quotannis fasciculos in lucem edere; faltem quamdiu opus nostrum favore et plausu, quo Prius, excipere placeat lectoribus.

Neque profecto timor est ne deficient plantae quas adumbrare fuadeat operis ratio, easque vel pretiosissimas vel rarissimae. Quippe Colleanea Linnasi filii thesaurum qui vix possit exhauriri, coacervant: tum prasterea, eundem per fectis copiosum, araicis plurimis opem ferentibus, indies augeo. Haud tamen hoc jactantius quam ex jure quodam meo palam profero. Longè enim errat qui Botanici decus collethaneis merè peramplis censeat confitere. Hoc demum virtutem rite testetur, usus scilicet eorum quas contulerit, atque honesta tractatio.

Quod ad propositi executionem attinet, cum primum opus hoc aggressus sum, tum etiam animum timor haud mediocris invasit, ne partes plantarum minutiores, dum deficcatas solum prae manibus haberem, detegere frustra laborarem. Sed, ut aut, necessitas virtutem parit. Ufu atque exercitatione, vel jamdudum deficcatarum investigationis artem, in tantum provexi, quod modò flores aquis ferventibus molliendo, modò sub lucis clarioris incidentiâ perspicendo, rarissime fit, quod quid occurrat, quo minus frustruluram partium accuratè expediam; nisi si forsitas plantas succulentiores, aut aliter quod perarò evenit, consilio ex natura quidam adversas, neque vi aut arte in usum cogendas, investigare postuler. Hoc uerum observandum fit, quod haec leges mihi minimi violandas praescripti, ne quid ante oculos lectorum ponere, nisi quod ipse prius vidi, aut auctoritate aliorum maximè fidendorum fretus comprobavi, atque exemplaria ipsorum fideliter imitatus sum. icones modò ad unguem depictae fuerint, parvi refert an ex vivis an ex ficcatis plantis adumbratas sint. Delineatori fan hoc opus, hic labor est, felici ingenio partes deficcatarum tam probè inspicere atque in animo fingere, quod vi vas demum fistat.

Haftenus de ratione operis praefatus sum. Mallem fanè hic quiescere. At profecto nequeo verbis finem imponere, quin summas Domino Lamarckio agam Gratias, quod et me etiam eadem quâ dignissimos viros L'Heritierum, Scopolium Gartnerum reprehensione castigare voluit.

Meri autem moveat cimex Pantilius?

Ne verà quidem, quos Lamarckius studet carpere, ad honores evehit: quippe si quoniam dignior uspiam extiterit, hunc apprimè vellicat invidus. Quid autem? Num libros Lamarckii leaorem referre omjfi, quo me ex auctorum vulgo excerpam, inde opprobriis suis obvisus fiam, putes? Ne minimè quidem; neque enim tum mihi honoris confecturum sperare a sum.

Mei

Mei certè est, quemque librum vel vilioris, si potius sit, pretii quam istius citare, si quidem eruere aliquid detur lucri* At deterritus sum ab Encyclopaediam Lamarckii verfando, ex ipsa operis dispositione. Pejor fanè nequit fieri. Quam enim methodo usus est? Rifum teneatis—Nominum barbarorum technicorum ordine alphabetico! Quo pacto, aut qua arte, in opere tam obscuro quaesita quis inveniat? De Thouinia fpe&abili nostrâ, ignoscat, oro, bonus vir, si quae fanè non novi, ea non protuli—porrò si vel nunc quae de h&c iste plants malè consultus dixerit (five de nomine ipso, - 2^o de historia ratio habeatur) descriptionibus adfciscere nolim meis. Nequedum quae de genere Ehrhartâ scripsit, me quali certiffimum fcientiae suae atque eruditionis signum mirari postulat, plus, me iudice, reportabit laudis. Exinde et lubens fateor, pulchrè edidici, quod mirâ arte, verè sua, duas naturâ diffintiffimas confudit plantas, Ehrhartam capensem Linnaei fcilicet, & Trocheram ftriata Richardi. Haud fanè nequeo fatis mirari quomobrem iste egregius vir adeo irascatur mihi. Cur non studiis liceat alterutri ūus incumbere, quin alteri impedimento esse neceffe videatur? At quid plura? Neque haec dixiffem, nisi iste me temerè prior laceffiviffet. Denique Lamarckius aut ineptias mittat suas, aut faltem quorum animus ad Linnaei sapientiam ritè colendam ducit, ne tantopere opprobriis onerare audeat.

Nolo in ilium aliquid gravius dicere.

ADDENDA ET CORRIGENDA IN NOSTRO PRIMO FASCICULO.

- No. i. Calceolaria nana est C. uniflora Lamarck Encycl.
 2. ——— plantaginea C, biflora *ibid*.
 3. ——— ovata C. dichotoma *ibid*.
 j. Thouinia fpetlabilis. Endrach Lamarck Enc. Vol. 2^a p. 356. Endrachiufl* Juffieu Gen. Pl. p. 133. In descriptione nostrâ, lin. 4, pro Pedunculi lege Petioli. Notandum est quod Thouinia nutantis falsus chara&er in Linn* Supp. a Linnaeo filio, nee Thunbergio, fabricatus est, raonente atxii-ciflimo Dryandro.
 11. Turraea maculata. T. glabra Cavanilles Dijf. VII.
 12. ——— fericea. T, tomentosa *ibid*.
 14. Stellaria dichotoma. In descriptione lege Petala obovata nee ovata.
 15. ——— ceraftoides. Gunner Norveg. No. 951. t. 6. f. 2. Rottboll A&f. Hafn. V. 10. 447. t. 3. /. 12. Oed. Dan. t. 5)2. Hanc plantam nuper in Helvetia invenit et determinavit optimus Davall.
 16. Arenaria dianthoides. Pro digynia lege trigynia.
 21. Sonchus alpinus. In Obf. ad calcem, lin 3, pro qua lege qua.
 23. Arethufa biplumata. Bipinnula Juff. Gen. Pl. p. 6\$. Habitat in agro Bonariensi, nee ad Fretum Magellanicum. Juff. Radix fasciculata. *ib*.
 24 et 25. In chara&lere generico & descriptionibus Pafliflorarum corollâ re&ius decemfida quam decapetala dicenda, laciniis ovatis, Sec.

F A S C I C U L U S II.

- fl6 SALVIA tubiflora L.
- 27 - - - amethystina.
- 28 NERTERIA depressa, Gertm
- 29 LISIANTHUS glaber, Linn.
- 30 ESCALLONIA myrtilloides, Linn
- 31 - - - ferrata.
- 32 EHRHARTIA longiflora.
- 33 ^m - - - calycina.
- 34 DAPHNE pendula*
- 35 ARENARIA juniperina, Linn*
- 36 VATICIA chinensis, Linn.
- 37 HELLEBORUS ranunculoides.
- 38 MENTHA exigua, Linn.
- 39 CASTILLEJA integrifolia, L.f.
- 40 - - - - filifolia, L.f.
- 41 HYPERICUM Brathys.
- 42 ^EGOPRICON betulinum, Linn.
- 43 BEGONIA ifoptera, Dryandr.
- 44 - - - - ferruginea, L.f.
- 45 - - - - urticaefolia, Linn.
- 46 MARATTIA alata, Swartz.
- 47 - - - - - laevis.
- 48 - - - - - fraxinea.
- 49 ACROSTICHUM spicatum, Turin*
- 50 C^ENOPTERIS rhizophylla.



Salvia tubiflora

SALVIA tubiflora.

CHAR. ESSENT. *Fide Num. V.*

SALVIA foliis cordatis crenatis subpilosis, calycibus trifidis, corollis longiflimis tubulosis, flaminibus exfertis.

Habitat *Huauaa* in agro Limenfi. Do «%. *fhou'm.*

CAULIS suffruticosus, subtetragonus, (hiatus, superne* villosus.

FOLIA opposita, petiolata, cordata, crenata, venosa; supra glabriuscula; subtus pallidiora, nervis margineque pilosis. *PetioU* foliis breviores, pilosi. *Stipulanullx.*

SPICA terminalis, verticillata, erecta. *Verticilli* subbiflori. *Bractea* oppositae, ovatae, mucronatae, nervosae, pilosae, deciduae. *Pedunculi* filiformes, calyce breviores, densè lanati, uniflori, fecundi.

CALYX tubulosus, parum ventricosus, nervosus, trifidus, laciniis subaequalibus
• acutis, extus lanatus, intus scaber.

COROLLA calyce triplo longior, tubulosa, incurva, coccinea, extus pilosa; limbo bifido, laciniis ferè aequalibus, vix ringentibus.

STAMINA longissima, exferta, glabra. *Anthera* incumbentes.

PISTILLUM. *Germen non vidi. Stylus* longitudine ftaminum, glaber. *Stigma* bifidum, laciniis acutis, recurvis, glabris.

FRUCTUM nondum vidi.

Obs. Folia exsiccata vix aromatica nee multum amara sunt. Flores admodum speciosos, figurae in hoc genere valde singularis, cum unicum tantum specimen mihi cefferit, ad partes diffecandas delineandasque dilacerare nolui; at probe luci clariori oppositos perspicuiens, ftamina omnino *Salviae* vidi.

Salvia coccinea *him.* formosa *VHerit.* tubiflora & amethystina nostra; oranes affines sunt, quamvis specie distinctae.



Salvia officinalis

S A L V I A amethyftina.

SAL VIA foliis cordatis acutis ferratis fubtus lanatis, verticillis nudis, calycibus trifidis, corollis pubefcentibus.

In Nova Granada legit Efcallonius. *Mutis.*

GAULIS fuffruticofus, obtufè tetragonus, hirtus.

FOLIA oppofita, petiolata, cordato-oblonga, acuta, denfè ferrata, rugofa; fuprà virida, hirta; fubtus denfiffimè lanata, alba, *Petoli* angulati, hirti, vix longitudine foliorum. *Stipula* nullse.

RACEMUS terminalis, eredliufculus, verticillatus. *Verticilli* remotiufculi, fubfexflori, ebradleati. *Pedunculi* vix longitudine calycis, patentes, teretes, hirti, uniflori. Omnes verticilli Bodem ferè tempore unum aut alterum florem trudunt, deinde alios e&dem lege, neque ut in cseteris, infimus verticillus prior omnes flores explicat, inde penultimus, &c.

CALYX campanulatus, angulatus, ringens, hirtus; apice coloratus, intus fcaber. *Labium fuperius* integrum, acutum, mucrone incurvo; *inferius* bifidum.

COROLLA calyce duplo longior, vividiffimè violacea. *Labium fuperius* fornicatum, obtufum, integrum, extus denfè barbatum, ad marginem tantum nudum; *inferius* trilobum, extus pubescens; *palatum* rugofum, glabrum, pallidum.

STAMINA corollâ breviora.

PISTILLUM. *Germen* non vidi. *Stylus* exfertus, incurvus, violaceus, hirtus. *Stigma* bifidum, laciniis patentibus, acutis, glabris.

SEMINA quatuor, obovata, glabra.

OBS. Poft Salviam coccineam *Linn*, collocanda. Odor in plantâ ficcâ nulla, nee guftus aromaticus, fed folia omnium amariffima funt ut ferè radices Gentianarum.

EXPL. TAB.

a Sedtio calycis, cum fruftu in fuo fitu.

b Portio labii calycis inferioris, internè viva, lentè aufta.

c Semen.



T
a



Nerteria depressa. Gart:

N E R T E R I A .

Nertcra. *Gartner Sem. p. 124.*

Gomozia. *Linn. Supp. 17.*

Gomezia. *Mutis MSS.*

TETRANDRIA Digynia.

CHAR. ESSENT. *Corolla* infundibuliformis, quadrifida, fupera. *Bacca* bilocularis. *Semina* folitaria.

Nomen e voce Graeca NipTpos, inferus, fcilicet jüb terra jacens, dedit immortalis Solander.

NERTERIA deprefla.

Nertera deprefla. Gartn. loc. chat. Herb. Banks.

Gomozia Granadenfis. Linn. Supp. 129.

In Novae Granadae locis humidis & paludofis frequentiffimè legit Mutis. 0

RADIX fibrofa, annua.

CAULES herbacei, procumbentes, ad geniculos radicanter, ramofi, foliofi, filiformes, fubangulati, glabri. *Ramuli* axillares, oppofiti, ere6li, uniflori, breves,

FOLIA oppofita, petiolata, orbiculato-cordata, obtuliufula, integerrima, laevia; *caulina* patentia; *ramea* ere&o-adpreffa. *Petiole* teretiufculi, fupra fulcati, longitudine fere foliorum.

FLORES folitarii in apicibus ramulorum, feffiles, pallidi. *BraElea* duae, oppofitae, acutaj, minutiflimae.

CALYX " nullus, nifi margo germinis minimus, vix quadridentatus." *Muth.*

COROLLA monopetala, infundibuliformis. *Tubus* fenfim ampliatus, brevis. *Limbus* quadrifidus, laciniis acutis, reflexis, tubo brevioribus. .

STAMINA. *Filamenta* quatuor* fequalia, bafi corollae inferta, filiformia, ere6to-potentia, longitudine corollae. *Anther** oblongae, biloba?, eredlae, flavx.

PISTILLUM. *Germen* inferum, ovale, fubcompreffum, laeve. *Sty It* duo, bafi connati, filiformes, glabri, longitudine ftaminum. *Stigmata* acuta, reflexa, divaricata.

BACCA globofa, apice punaominimo umbilicata, bilocularis, fucculenta, glaberrima, rubra, magnitudine Pifi.

^{Sfi} MiNA duo, oblonga, introrfum plana, extrorfum convexa.

Oss.

OBS. Descriptionem confeci e speciminibus & manuscriptis Mutifianis, a Linnaeani paulò diverfam. Nomen plants a Linnaeo datum vix mutaviffèni, riifi quod *Gomozia*, omnino abfonum & erroneum, ftare nequit. Neque placet *Gomezia*, cum Mutis in manuscriptis nihil de ratione ejus memorat, nee botanicus ullus hujufce nomùais occurrit. *Nerteriam* itaque ex Nerter& (voce re&iùs ad etymologise normam reformat^), prout in libra claffico Gaertneri jam confecratum fuit, libentiùs cooptavi.

Genus *Manettias* affine.



EXPL. TAB.

a Flos magn. nat.

b Idem au&us.

c Stamen au&itum cum antherà,

d Fru&us mag. nat.

e Idem tranfverfè fe&lus.

ff Semina.

g Semen au&lum tranfverfè fe&itum ex Gaertnero.



Lisianthus glaber Linn.

LISIANTHUS glaber, Linn,

PENTANDRIA Monogynia. *FL monopetaliy inferi^ angioSpermL*

CHAR. ESSENT. *Corolla* infundibuliformis, ventricofa, laciniis recurvatis. *Stigma* bilamellatum. *Cap*/, bilocularis, bivalvis,* diffepimento parallelo e marginibus valvularum inflexis, poiyppermist:

LISIANTHUS glaber, foliis ovatis petiolatis, corymbis terminalibus. *Linn. Supp.* 134,

In Americâ Meridionali legit Mutis.

RADIX

CAULIS ere&us, ramofus, teres, foliofus, glaber uti tota planta. *Ramuli* ex axillis foliorum fuperiorum, apice floriferi.

FOLIA oppofita, petiolata, ovalia potius quam ovata, acuta, integerrima, venofa, fubtus pallidiora. *Petioli* breves, connato-amplexicaules, carinati. *Stipule* nullae#

FLOKEs in umbellis fimplicibus, paucifloris, caulem ramulofque terminantes. P^
dunculi partiales, ere&i, uniflori. *BraSleae* foliis fimiles fed minores, binae vel ternse
ad bafm fingul^ umbelte.

Q^{AI}*YX campanulatus, quinquefidus, laciniisi naequalious, margine membranaceis, acutis.

COROLLA calyce quintuplo longior, campanulato-infndibuliformis, limbo quinquefido, laciniis aequalibus, acutis, lutea.

S^{TAMI}NA. *Filamenta* quinque, tubo corollae verfus bafin inferta, aequalia, longitudille corollas. *Anther** didymae cordato-oblongae, antice dehifcentes.

P^{IS<}TILLUM. *Germen* fuperum, ovatum. *Stylus* cylindricus, longitudine ftaminum, P°ft anthesin contortus. *Stigma* bilobum, laciniis obovatis, planis.

CAPSULA ovata, acuta, bilocularis, bivalvis, valvulis inflexis diffepimentum confituentibus.

SEMINA numerofo, parva.

EXPL. TAB.

a Calyx cum pistillo,

b Corolla longitudinaliter fissâ, cum filamentibus in situ.

c Anthera postice.

d Eadem antice.

e Germen cum stylo.

// Stigma.

g Capsula.

Omnia ex a. figat& icone Mutifianâ.



le. k



c



d



e



b



a

Escallonia myrtilloides Lam.

ESCALLONIA, *Linn. Supp.* 21.

PJSNTANDRIA monogynia.

Flares pentapetali^fuperi.

CHAR. ESSENT, *Bacca bilocularis, polyfperma. Calyx cingens frudlum. Stigma capitatum.*

Nomen dedit Linnaeus filius in honor em Domini Efcallon, in botanicis, philofophicis & mathematicis Mutifii alumni & individui comitis^ qui bane plantam aliafque innumeras rariffimas in peregrinationibus per Novam Granadam invenit & cum Linnao patre & filio com municavit.*

ESCALLONIA myrtilloides. *Linn. Supp.* 156.

ESCALLONIA foliis ferrulatis mucronulatis fubtus venofis.

In Novi Granada legit Efcallonius. ^

FRUTEX ramofus, foliofus.

RAM¹ virgati, obfolete^ angulati, cortice glabro, rimofa, deciduo. *Ramuli alterni, Patentes, angulati, denfè foliofi, uAflori.*

F^{OLIA} alterna, patentia, obovata, obtufa cum mucronulo, minute^ ferrulata, praecipue ^{v^}rfus apicem, utrinque laevia, fupra fere avenia, fubtus pallidiora, venofa, bafi ^{at*}enuata in *Petiolum* brevem, canaliculatnm, deenrrentem, margine magis vel ^{mi}»us glandulofo-ciliatum. *Stipul** nulte.

F^{IORES} terminales, folitarii, pedunculati, erefti. *Braflea?* nullae, nifi folia parva ^{aliis} finiillima, fed manifeftius ferrata, flori approximata.

P^E^{au}**NCUU** reaiufculi, angulati, glandulofi.

C^{ALY}^x quinquefidus, perfiftens; laciniis erefto-patentibus, carinatis, acuminatis, ^a^p^{ice} recurvis, margine fubpubefcentibus.

^{-AL}**A** quinque, erefta, apice recurva, linguaeformia, obtufa, calyce -vix duplo ^{lon}giora.

S^T^{AA}^{INA} laciniis calycis oppofita, petalis alterna brevioraque, adfeendentia. *Fila-menta* glabra. *Anther** dorfo filamentis adnatar, oblonga?, emarginatae^ biloculares, [^]cumbentes.

PISTIL-

PISTILLVM. *Germen* femi-inferum depreffum fubrotundum. *Stylus* erectus* obfoletus angulatus, longitudine flaminum. *Stigma* capitatum, umbilicatum.

BACCA magnitudine pifi, fubrotunda, calyce perfiftente parum augetur, operculata^ ftylo perfiftente terminata. Sero a toto operculo, quod fpontè decideri non videtur, pulpa confpicitur bilocularis, feminibus repleta parvis, nidulantibus numerosiffimis.



EXPL. TAB*

a Folium plantae feperatum cum petiolo glanduloso-ciliato.

b Petalum.

c Stamen cum antherâ anticè vifum.

d Idem a tergo.

e Idem lateraliter.

f Pars fructus quae fupra calycem abfciffa.

g Stylus perfiftens.

h Sectio tranfverfa fructus, cum calyce.

I Sectio fructus longitudinalis cum calyce ftyloque.

k Semen.

/ Idem parum lente augetur.



Escallonia serrata.

ESCALLONIA ferrata.

ESCALLONIA foliis ferratis fubretufis fubtus aveniis.

In Americâ Meridionali ad Fretum Magellanicum legit Commerfon. *fhoul* *

In Terra delfuego. Archib. Menzies. *?

FRUTEX humilis, ramofiffimus, foliofus, glaber, habitu Vaccinii,

KAMI alterni, angulati, fubflexuofi, cortice glabro, pallido. *Ramuli* alterni, re&iuf*
culi, foliofi, uniflori, virides.

FOLIA in ramulis tantum prsefentis anni, decidua[^] alterna, petiolata, obovata, obtufa,
fepe etiam retufa, cum acumine, ferrata, utrinque laevia, fupra obfoletd venofa,
fubtus pallida plane avenia, nervo medium percurrente; bafi attenuata in *Petiolum*
brevem, canaliculatum, carinatum, marginc integerrimum. *Stipuke* nullae*

FLORES terminales, folitarii, pedunculati, erefti, pulcherrimi, la6lei, germine violacoo,
Bra&ea nullae.

PBDUNCULI breves, teretes, apice increffati, incurvi, glabrL

CALYX quinquefidus, perfiftens; laciniis patentibus, deltoideis[^], acutis, carinatis[^]
fubcarnofis, glabris, fubtus pallidis, fupernè coloratis.

P^ETALA quinque, patentia, linguaeformia, obtufa, calyce triplo longiora, laftea.

STAMINA laciniis calycis oppofita inter petala, adfcendentia, petalis duplo breviora.
Ftamenta bafi latiora, glabra. *Anthers* dorfo filamentis adnatae, fubrotunda*,
emarginatae, biloculares, incumbentes.

P*STILLUM. *Germen* femi-inferum, fubrotundum. *Stylus* ere&us, teres, brevis.
Stigma capitatodepreffum,

[^]ACCA parva, fubrotunda, per hyemem perfiftens, calyce cin&a, operculata, ftylo
perfiftente coronata; operculo circumfciffib prope calycem demum decidente, in
confpe&um venit pulpa bilocularis, feminibus parvis nidulantibus repleta.

°BS- Omnes partes fructificationis, exceptis petalis, triplo minorcs funt quam in E.
myrtilloide.

EXPL,

EXPL, TAB.

a Fructus cum calyce styloque.

b Ejusdem flos perpendicularis.

c Calyx.

d Stigma.

e Semina.

f Operculum fructus maturi separamus.

g Fructus maturus, detracto operculo.

h Idem magnitudine auctus, fere dimidio pulpe.

i Petalum.

k Stamen cum anthera.

l Anthera a tergo viva, lente audta.



Echinochloa *f. indica*

EHRHARTA longiflora.

HEXANDRIA Digynia. *pone Oryzam.*

CHAR. ESSENT. *Calyx* Gluma bivalvis, uniflora. *Corolla* duplex; utraque bivalvis: exterior carinata, compreffa.

EHRHARTA culmo simplici, panicula ramosa multiflora, corollae exteriori mucronata tuberculato-hispida, floribus triandris.

Ad Prom. Bonse Spei legit Maffon. *Herb. Banks.* Herb. Lin, ex eadem regione relata adest nescio quo loco botanico.

RADIX fibrosus, albidus.

CULMI plures, simplices, erecti, articulati, foliosi, teretes, striati, glaberrimi.

FOLIA vaginantia, lineari-lanceolata, acuta, nervosa, striata, glabra, margine scabra. *Vagina* fere longitudine articuli caulis, striata, glabra, tumidiuscula, apice coarctata, stipulifera. *Stipula* foliaria, intrafoliacea, erecta, brevis, multifido-laciniata, fusca.

PANICULA terminalis, erecta, multiflora, ramosa. *Rami* conferti, magis vel minus subdivisi, glabri.

PEDUNCULI conferti vel foliarii, simplices vel divisi, capillares, recti, scabri, apice incrassati.

FLORES erecti, magni, hermaphroditi, triandri.

CALYCIS Valvulae carinatae, inaequales, corollae multo breviores, nervosae, nitidae, purpurascentes, muticae; *exterior* ovata, acuta, septemnervia; *interior* subrotunda, obtusa cum mucrone, quinquenervia.

COROLLA Gluma duplex, compreffa, pallide viridis.

Exterior longissima, recta, valvulis subaequalibus, subprimaticis, basi laevibus, rarissime inter angulos obsolete rugosis, apicem versus tuberculato-hispidis, mucronato-pungentibus. *Valvula exterior* obovata, ad basin fasciculo villorum albidorum dorsali munita: *interior* supra alteram imposita, corollam interiorem geothaliaque amplexans, ovata, basi excisa, utrinque ad excisionem fasciculo villorum ornata.

Interior exteriori opposita, nee contraria, multoque brevior, mutica, glabra. *Valvula exterior* ovata, recte compreffa, acuta, nervosa: *interior* multo angustior, lineari-lanceolata, membranacea, dorso sub-bicarinata.

Nectarium nullum inveni.

STAMINA tria, nee in floribus omnibus quos diffecare licuit inveni plura. *Filamentum* brevissima, tenuissima, aequalia. *Antherae* ovatae, apice bifidae bifidae, biloculares, flavae, crescente germine a filamentis avelluntur, & stylis suffulti ad apicem floris elevantur.

PISTILLUM in eodem flore. *Germen* ovale, compressum, glabrum. *Styli* duo brevissimi, erecti. *Stigmata* crinita, albida.

SEMEN unicum, ovale, nudum.

EXPL. TAB.

- a* Flos magnitudine naturali.
- b* Calyx duplo auditus.
- c* Corolla exterior.
- d d* Fasciculi villorum.
- e* Corolla interior.
- f* Genitalia magna, naturalis
- g* Stamen cum anthera multum auditus,
- h* Germen cum stylis.
- i* Germen maturius delapsis stylis.



Eriocharta calycina.

EHRHARTA calycina.

EHRHARTA culmo ramofo, paniculâfubfimplici, calyce colorato corollam aequante.

Aira capensis. Linn. Supp. 108.

E Promontorio Bonae Spei adtulit Sparrmann. Herb. Linn.

CULMUS ramofilimus, geniculatus, foliofus, teres, ftriatus, glaber. *Ram* alternu

FOLIA vaginantia, linearia, acuta, ftriata, fubtus leviflimè pubefcentia, margine fubciliata. *Vagina* geniculo caulis paulo brevior, ftriata, apice coarctata, ftipulifera. *Stipula* foliolaris, intrafoliacea, erecla, multifido-capillaris, alba, utrinque defmens in proceffum laminae folii membranaceum, femilunarem, horizontalem^ fufcum, fetis albis ciliatum, caulem amplexantem, .

PANICULJE terminates, fubfimplices.

PEDUNCULI faepius quaterni, uniflori, rarius biflori, capillares, refti, apice increffati, fubfecundi.

PLORES magnitudine E. panicefe, eredli, monoici.

CALYCIS Valvulae carinatae, fubaequales, longitudine corollae, fcabriufculae, ftriatae, muticae, bafi dorfoque virides, apice margineque coloratae rubrae vel albae. *In**terior ovata; *exterior* parum anguftior, linearis.

COROLLA Gluma duplex, compreffa, mutica, longitudine calycis, viridis, fuperficie plana nee rugofa.

Exterior inaequalis, extus pilofa, valvulis fubdifftantibus. *-Fahula exterior* brevior, Inultum anguftior, linearis, obtufa cum acumine, non vero mucronata; *interior* ovata, obtufa, apice compreffa, fcabriufcula, bafi aequalis, nee manifetè excifa, corollam interiorem genitaliaque ample&ens. *Villis* ad bafin caret

Interior aequalis, exteriori contraria, glabra. *ValvuUc* ovato-lanceolatae, concavae, conniventes, altero margine arctè connexae, genitalia foventes.

Ne5larium. *MembranuLe* duse, alb», integrae, rotundatae, inter calycem et corollam.

STAMINA fex. *Filamenta* breviflima, aequalia. *Anther** lineares, apice bafique bifidae, ereft^, flavae, multo majores quam in E. panice&, totam fere cavitatem corollae interioris occupantes, & demum exfertae. *PifiUU* rudimentum in *fiore wafculino* nulium,

PISTILLUM *in altero jiore*. *Germen* ovale, parvum, glabrum, fetis aliquot longis albis circumdatum, quae forfitan fint filamenta fterilia. *Styli* duo > breves, patuli, albi* *Stigmata* crinita, fufca, altero latere floris exferta inter corouam interiorem & valvulam interiorem exterioris.

SEMEN unicum, nudum.

OBS. Anne flores femper monoici fint nefcio. Gum antheriferi in meo exemplar¹⁰ decuplo numero flores quam foeminei funt, pistilla nondum exferta forfitan in aliquibus latere fufpicatus fum j fed me certiozem facere, abfque totali fpecimin^{is} deftru&ione, non potui.

EXPL. TAB.

- a* Portio folii cum ftipute, magn. nat.
 - b* Eadem lente audta.
 - c* Stipula.
 - d* Proceffus folii.
 - e* Flos magn. nat.
 - f* Calyx duplo au&us,
 - g* Corolla exterior.
 - h* Ne&arium.
 - i* Corolla interior ftamina fovens.
 - k* Eadem aperta cum ftaminibus in fitu.
 - l* Stamen feorfim cum antherâ.
 - m* Flos fcemineus.
 - n* Germen e corollâ feparatum.
 - o* Stigmata.
 - pp* Setae longitudine inaequales.
-

Species Ehrhartae mihi cognitae quinque funt.

* *Floribus monogynis.*

I. *E. cartilaginea* culmo indivifo, paniculâ fimplici, corollâ exteriori retuft fubmuticâ,
foliorum margine cartilagineo crifpo.

E. capenfis. *Thunb. /IEI. Holm. ann. 1779, ?*²¹^«

E. Mnemateia. *Linn. Supp. 200.*

2. *E. bulbofr*^r

^{a*} E. *bulbosa* culmo indiviso, paniculis ramosa multifloris, corollae exteriori retusae
aristata.

Trochera striata. • *Richard, Journal de Botanique*, V. 13, p. 225, tab. 3, qui et observationes bonas addidit.

Hanc speciem confundit cum praecedente diffinitum Lamarckius in *Encyclopaedia*

Floribus digynis.

3- E. *longiflora* descripta et delineata tab. 32.

4- E. *panicea* tab. 9.

E. erecta. *Lamarck Encycl.* V. 2.

5- E. *calycina* tab. 33.

Aira capensis. *Linn. Suppl.* 108.

Patria omnium ni fallor est Prom. Bonae Spei,

OBS. Maxime miror Linnaeum filium hujusce plantae genitalia tam male intellexisse, affinitatemque ejus cum Daphnis nunquam animadvertisse. Dubius haerebam an Daidibus ob involucri praesentiam ascriberem; sed cum fructura floris numerusque partium omnino Daphnes nec Daidis sint; cum praeterea involucrum potius habeas quae in aliquot Daphnis floribus fecilibus conspiciuntur quam involucrum Daidis refert, Daphnis tutius conscribendam censeo.

EXPL. TAB.

- a Flos nondum expansus.
 - b Idem longitudinaliter sectus ut pars interior videatur.
 - c Stamina cum antheris.
 - d Germen in situ.
 - e Idem lente auctum.
 - f Setae germini infidentes.
 - g Stigma.
 - h Stamen auctum cum anthera
 - i Folium separam involucri.
-

Hae plantae itaque ad Daphnen relatae, & Scopolia Jacquinii a Linnaeo patre, nec forsitam immerito, ad Hyoscyamum; cum et Scopolia Forsteri aliam denominationem jamjam ex ipso auctore accepit (*Grifelinia lucida* Forstl. *Prod.* 75)* in hoc felicius contigit illustri nomini, quo nullum magis aureum hunc meruisse honorem, dicere genus.

JOHANNES ANTONIUS SCOPOLI, Florae suae et Entomologiae Carniolicae ubique notus & laudatus, post varios metallurgicos, zoologicos & botanicos labores, tandem Paviae, favore Giesarii, Chemiae & Botanices Trofeorum publicus constitutus est. Horas suas subsecivas impendit vir indefessus in colligendis naturalibus omnibus quae potuerit novis vel obsecuris, unde natus est liber ille splendidus *Delicta Porphyrae Faunae Infuscae*, ultimum ejus infelicis partu opus. Studiis omnibus maximè innoxius devotus, omnibus bonis carissimus, ab omni Europa cum invidiae demum artificumque malorum hominum irretitus, heu quantum quod doluit! Cum se defamatum purgare arderet, Rex optimus suus, eisdem iniuriis eisdem hominibus male indutus (Peges enim faspius ex specie quam ex re necesse judicent), ardentem omnino vicit. Fortuna tecebat, sed animam in libertatem & iustitiam altiori nequiori loco petiit die 8 Maii A. D. 1788. Sit igitur nova

SCOPOLIA

SCOPOLIA.

TODDALIA. *Juff. Gen. p. 371.*

CRANZIA. *Schreb. Gen. p. 143.*

PENTANDRIA Monogynia, *Fl. pentapetaliy inferi.*

CHAR. ESSENT. *Calyx quinquefidus, NeStarium nullum. Stigma capitatum. Cap* fula baccata, quinquelocularis. Semina folitaria.*

Nomen Toddalia barbarum, nee huic plant proprium^ proculdubio rejiciendum est. Cranzii nomen alto generi a Swartzio in Prodromo datur j nee ut duo genera nomine fuo orrentur opus est, quamvis olim ex und fpecie duo genera fabrkavit tpte acutijftmus vir. Vide Länn. Syft. Veg. de Dracand Dracone.*


Hujufce generis fpeciem unicam tantum adhuc vidi,

SCOPOLIA aculeata.

Paullinia aftatica^ foliis ternatis, caule aculeato, cirrhis nullis. Linn. Sp. Pi 524, Ft. Zeyl. No. 143,*

Kaka-toddali. Rheed. Malab. pars 5, /. 41.

In infula^ Borboniae legit Commerfon. Thoun. 2



Aenaria juniperina Linn.

ARENARIA juniperina, *Linn.*

ARENARIA foliis fubulatis fpinofis, caulibus ereftis, calycibus ftriatis, capfulis oblongis. *Linn. Mant. 72**

Habitat *U*

RADIX perennis . . .

GAULES plurimi, ere6ti, femipedales, teretes, pallidi, leviffimè pubefcentes, geniculis nodofi, foliofi, fupernè nudiufculi.

FOLIA oppofita, patentia, ball connata, fubulata, trinervia, fere triquetra, mticronato-
" pungentia, leviffimè pubefcentia; *radicalia* breviffima, obtufa, mutica, cauli ad-
preffa, glabra.

PANICULJE terminales, ere6cae, dichotomse, vix pubefcentes. *Bractee* parvae, ovato-
lanceolatae, acutae, trinerviae, margine fcariofo undulato. *Pedunculi* filiformes,
glabri, eredli, uniflori.

CALYX oblongus, bafi obtufus, laevis, femper claufus. *Folia* ovato-lanceolata,
mucronata, tri-(nec quinque-) nervia j tria exteriora fubinde obliquè flexa, aliaque
ar6tè ample&entia.

PETALA obovato-lanceolata, obtufa, calyce vix duplo longiora, ftriata, alba.

STAMINA filiformia, aequalia, longitudine calycis. *Anthem* fubrotundae, parvae.

PISTILLUM. *Germen* oblongum. *Stylus* tres, longitudine ftaminum.

CAPSULA unilocularis, trivalvis, oblonga, obtufa, nitida, calyce parum longior, apice
dehifcens.

SEMINA numerofa, parva, compreffa, fubrotunda, nigra.

OBS. Nefcio unde habuit Linnasus. Ex facie Sibiricam vel Orientalem fpociem
vellem dicere. Sub fpecimine in herbario ipfius manu infcribitur *Alfine montana*,
foliis angujijjimis rigidis pungentibus^ *Flore albo*, abfque ullà au6toris vel inventoris
citatione. In *Mantiffa* 1, ubi haec planta primò a Linnaeo memorata fuit, de loco
nil reperiendum eft. In *Mant. alter a* vero, p. 514, citatio adeft Gerardi *Flo. Gallo-*
provincialis, & exinde planta noftra Galliac tribuitur. Sed hoc fynonymon ad
Arenariam recurvam Allionii ni fallor pertinet; cum *juniperind* certS nil habet
commune. Synonymon MSS. fupra memoratum fruftrà adhuc apud auftores
quaefivi; fi aliquis felicior invenerit, patriam plantae defcriptioni noftrx addat
obfecro.

Notandum eft quod *Arenarta juniperina* Villarfii Flo. Delphinat. eft *A. grandiflora*
Linn.

EXPL. TAB.

a Folium calycinum.

b Idem au&um.

c Petalum,

d Idem au6tum.

e Genitalia.

f Germen cum ftylis auftum.

g Stamen au6lum cum anther^.

h Gapfula matura dehifcens.

/ Eadem audla*

k Semen,

/ Idem audtum.



Natica chinensis, Linn.

= *Natica laccifera* M. & S. who changed
the name because there is no *laccifera* in
China & because Keyser had already called
this Mount Shuen *laccifera*.

VATICA, Linn. Mant. 2. 152.

DODECANDRIA Monogynia.

CHAR. ESSENT. *Calyx* quinquefidus. *Petala* quinque. *Anthera* quindecim, feffiles, quadriloculares.

De nomlnis ratlone nil memorat Linnaus Anne planta divinationis caufd inter Chinenfes fuperjiitiofos plurimi habit a ?*

VATICA chinensis, Linn. Mant. 2. 242.

Habitat in China. Linn, T?

ARBOR facie Vateriae indicae, cui proxima, fed differt antheris & forte fru6ku.

RAMULI obfoletè angulati, pulverulento-incani, foliofi, multiflori.

FOLIA alterna, ovato-oblonga, obtufè acuminata, integerrima, glabra; *ventis* utrinque etninentibus alternis; *venulis* reticulato-anaftomofantibus. *Petoli* unciales, angulati, ftriati, incani, infra jun6turam folii paululum increffati & valde rugofi. *StipuU* nullae.

PANICULÆ axillares, feffiles, compofitae, multifloras: *Braftea* nullae.

PEDUNCULI alterni, ramofi, angulati, toti cum calyce corollaque ante explicationem pulverulento-incani. *Partiales* breves, apice increffati, ere6ti, uniflori.

CALYX monophyllus, quinquepartitus; *laciniis* ovato-lanceolatis, acutis, ere&is, corollâ triplo brevioribus.

P^TALA quinque, obovata, intus laevia, extus femi-incana, in aliis floribus finiftrorftim, aliis dextrorftum fibi incumbentia, quod maximè fingulare.

STAMINA. *Filamenta* nulla. *Anthem* quindecim, tres in omnis petali ungue feffiles, Parvae, ovatae, glabrae, quadriloculares; *loculi duo exteriores* fpinufâ dorfali interjeftâ eredlâ terminati; *interiores* dimidio breviores, mutici.

P^ISTILLUM. *Germen* fuperum, conicum, obtufum, quinquangulare, incanum. *Stylus* cylindricus, quinquangularis, contortus. *Stigma* obtufiufculum, fubtrilobum.

PERICARPIUM nondum vidi maturum, fed e tenello germine probe infpeao videtur ^{Ca}*pfula* trilocularis, cum femine folitario in utroque loculamento*

OBS.

OBS. Planta rarissima, & fane adhuc inter maximè obfcuras* Nunquam vidi nisi in herbario Linnaeano. Cel. Antonius de Jussieu in libro nuper sub titulo *Genera Plantarum secundum Ordines naturales* divulgato, quo doctiorem vix unquam videbit orbis botanicus, hoc genus ad *Guttiferas* suas optimè retulit ex descriptione Linnæana.

EXPL. TAB.

a Calyx, germen atque stylus.

b Petalum.

c Antherae tres in ungue fertiles.

d Petalum a tergo.

e Anthera.

f Eadem lente ducta, latere anteriore visa.

g Eadem a tergo.

h Ejusdem fertilis transversalis.

i Germen immaturum lente auctum.


k Stylus.

l Stigma.

m Germinis aucti fertilis transversalis.

n Styli aucti fertilis transversalis.

XXXVII.



Helleborus rannunculinus.

HELLEBORUS ranunculinus.

POLYANDRIA Polygynia.

CHAR. ESSENT. *Calyx* nullus. *Petala* quinque vel plura. *Neflaria* tubulofa, bilabiata. *Capfulte* polypermae.

HELLEBORUS floribus folitariis pedunculatis, foliis digitato-multifidis incisis.

H. niger, Orientalis, Ranunculi folio, flore nequaquam globofo. *Tournef. Cor.* 20.

Trollius humilis flore patulo. *Buxb. Cent. j. tab.* 22 ?

In CappadociS. legit Tournefort, u

GAULIS palmaris, erectus, herbaceus, teres, glaber, apice foliofus, 1-vel 2-florus.

FOLIA digitato-multifida, laciniis variè incisis, ferrata, glabra, fubtus pallidiora; *radicalla* longè petiolata; *caulina* fubeffilia, amplexicaulia.

PLORES ex axillis foliorum caulinorum, folitarii, pedunculati, erecti, flavi.

PETALA fubrotunda, patentia, venis lincata. *Neflaria* numerofo, curva, petalis duplo breviora.

STAMINA. *Filamnta* breviflima. *Anthera* lineares, flavse.

PISTILLA

FRUCTUS

OBS. Pofit *Helleborum hyemakm* collocandus, cui maxime affinis, fed magis fpeciofus eft. Porro differt foliis magis compofitis & incisis, floribus pedunculatis, neque folio infidentibus, petalis latioribus magisque patentibus.

Synonymon Tournefortii perperam a Linnaeo pro *Tró/h'o afaticó* citatur. Anne Buxbaumii figura nofram plantam vel *Trollium afiaticum*, neutri certè fimilis, potius defignet quis jure dicat ?



f/f/////', ct' Mutft 11 j ilLi:

MENTHA exigua, Linn.

DIDYNAMIA Gymnospermia.

* *Calyces subquinquefidi.*

CHAR. ESSENT. *Corolla subsequalis, quadrifida, lacinia latiore emarginata. Stamina erefta, distantia.*

MENTHA floribus verticillatis, foliis lanceolato-ovatis glabris acutis integerrimis. *Linn. Sp. PL 806. exclusifyn. Fuchfii > Lobelii & forte Rail.*

Ex Anglii Linnaeo mifit Phil. Miller; de loco ejus natali nihil in fpecimine vel literis Milleri invenio. In Scotiâ ab Houftono ledtam putat Cel. Hudfon. V

RADIX

CAULIS adfcendens, teres, pubefcens, foliofus, ramulis frequentioribus ex axillis foliorum.

FOLIA oppofita, petiolata, ovalia, utrinque acuta, ferraturis utrinque duobus vel tribus obfoletis, fubinde integerrima, venofa, vix pubefcentia, punctata, fubtus pallidiora. *Stipulce* nullae, nifi fafciculi exigui villorum intrafoliacei.

FLORES axillares, verticillati, 12 ad 20 in omni verticillo, fubfeffiles, parvi, carnei.

CALYX tubulofus, fubinflat, ringens, dentibus fuperioribus longioribus, ftriatus, pubefcens.

COROLLA infundibuliformis, incurva, ringens, limbo quadrifido, laciniis obtufis, infimo minimo, fupremo vix manifeftè emarginato.

STAMINA fubsequalia, per paria distantia. *Anthera* parvae, fubrotundae.

PISTILLUM. *Germen* non vidi. *Stylus* filiformis, incurvus, longitudine ftaminum. *Stigma* bifidum, acutum.

°BS. Planta adhuc valde obfcura nee certè Britannise indigena. Synonyma in Speciebus Plantarum proculdubio erronea funt. *Mentha aquatica exigua* Rail eft ^A-gent His Linn, fecundum Dom. Stokes. Herbarium Buddlciamnn in Mufeo ^ritannico mihi nullam adtulit lucem. Qui cum Gl. Hudfono plantain noftram ^arietatem M. *Pukgieflè* putabiu vix enabit.

Expl.

EXPL. TAB.

***a* Calyx lente au&us.**

***b* Corolla magn. nat.**

***c* Eadem au&a.**

***dd* Stamina cum antheris.**

***e* Stylus.**



Castilleja intermedia Linu;

CASTILLEIA, *Linn. Supp.* 47.

DIDYNAMIA Angiospermia.

* *Calyces abque labio inferiore.*

CHAR. ESSENT. *Calyx* tubulosus, compressus: *labium superius* bifidum; *inferius* nullum. *Corolla* labium inferius trifidum, glandulis duabus inter lacinias. *Capfula* bilocularis.

Nomen dedit Mutis in honorem Domini Cajijleji, Botanici Gadenjis.

CASTILLEIA *integrifolia*, *Linn. Supp.* 293.

CASTILLEIA foliis lineari-lanceolatis integris.

In Nova Granada legit Mutis. % ?

RADIX . . .

CAULIS herbaceus, teres, erectus, ramosus, foliosus, leviter hirtus.

FOLIA alterna, sessilia, patentia, lineari-lanceolata, obtusa, integerrima, subcanaliculata, nervosa, utrinque pubescentia, *Stipula* nullae.

FLORES in apicibus elongatis ramorum, racemum quasi formantes, pedunculati, unusquisque ex axilla[^] proprii folii bracteaeformis. *Pedunculi* filiformes, erecti, foliis breviores.

CALYX monophyllus, tubulosus, C. *diffifoliae* similis, sed minor. In icona nostra[^] calyces nimis acuti videntur.

FLORIS fructura C. *diffifoliae* conformis, sed omnes partes in C. *integrifolia* paulo minores sunt.

FRUCTUS ex descriptione in Mutisii manuscriptis in utroque idem esse videtur.

Benevolam leorem, qui fructuram floris in hoc genere rectius intelligat, ad frequentem relegamus plantam, (Tab. XL.) ubi descriptionem amplam figuramque magis accuratas ex propria nostra observatione elaboratas inveniet.

EXPL.

EXPL. TAB.

a Calyx antice huius cum pistillo in situ.

m b Corolla antice.

c Eadem lateraliter.

d d dd Labium inferius, male.

e Corolla antice infra cum filamentis in situ.

f Stamen cum anthera admodum.

g Capsula.

h Ejusdem folio transversalis.

/ Diffusimentum.

k Semina.

Omnia haec ex iconibus Mutifianis; at structura corollae minus quam in tabula nostra

C. filifoliae fidenda est.



Castilleja fissifolia. Linn.

CASTILLEIA fiffifolia, *Linn. Supp.* 293.

CASTILLEIA foliis apice pinnato-incifis*

In Nova Granada legit Mutis. u ?

RADIX ramofa, fibrofa.

CAULIS herbaceus, quandoque fuffruticofus, tri-vel quadripedalis, ere&us, teretiufculus, parum ramofus, foliofus, pubefcens. *Ramuli* axillares, ere&o-patentes, foliofi, multiflori.

FOLIA alterna, feffilia, patentiffima, bafi ovata, integra, apice pinnatifida, laciniis patentibus, obtufis, ferè alternis, utrinque pubefcentia, fubtrinervia. *Stipula* nullae.

FLORES verfus apices ramorum majorum, axillares, folitarii, pedunculati, fpeciofi, coccinei? *BraElete propria* nullae. *Pedunculi* teretes, pubefcentes, ere&li, foliis triplo breviores.

CALYX monophyllus, tubulofus, antice ultra medietatem longitudinaliter fiffus, nervofus, pubefcens, coloratus, bafi fubventricofus, fuperne compreffus: *labium fuperius* bifidum, obtufum; *inferius* plane nullum.

COROLLA monopetala, ringens. *Labium fuperius* longiflimum, incurvum, apice emarginatum, dorfo pubefcens; *inferius* bfeviffimum, trifidum, laciniis acutis.

Ne&arium? corpuscula duo glandulofa, fauci Corollae inferta inter lacinias labii inferioris.

STAMINA. *Filamenta* quatuor, bafi corollas inferta, longitudine labii fuperioris, filiformia, glabra; quorum duo inferiora paulo breviora. *Anthera* didymae, lineares* obliquas.

PISTILLUM. *Germen* fuperum, oblongum, compreffum. *Stylus* filiformis, longitudine ftaminum. *Stigma* fimplex, obtufum.

CAPSULA ovata, acuminata, compreffa, laevis, bilocularis, diflepimento valvulis contrario.

SEMI NA numerofa, parva.

OBS. Descriptionem haud accurate confecit Mutis, nee bene intellexit Linnaeus, praecipue quoad corollae labium inferius, quod in nostra icona (flore scilicet aqua ferventi immerfo & inde rite expanso) longè accuratius depingitur quam in hujus plantae tabula a Mutio transmissa.

EXPL. TAB.

a Calyx.

b Corolla cum genitalibus.

c Labium inferius.

d Idem latere interno visum.

e Idem auctum.

f Glandulae

g Stamina.

h Anthera aucta.

i Stigma.

k Idem auctum.



Hypericum Brathys.

HYPERICUM Brathys.

POLYADELPHIA ? Polyandria.

CHAR. ESSENT. *Calyx* quinquepartitus. *Petala* quinquē. *Filamenta* in quinque phalanges bafi connata. *Capfula*.

Se6lio * *Pentagyna**

HYPERICUM floribus pentagynis monadelphis, caule fruticofo, foliis fubulatis imbricatis glabris.

Brathys juniperina, Linn. *Supp.* 268.

E Nov^ Granada mifit Mutis. *?

FRUTEX facie *Ericae* vel *Diofmae*, ramofiffimus.

RAMI ere&i, undique foliofi, fuperne obfolete` angulati, floribus terminati; *Cortice* glabro, refinofu.

FOLIA imbricata, patentia, fubulata, acuta, glaberrima; fupra canaliculata; fubtus carinata, fulcata, bifariam punftata. *BraSlea* nullae.

FLORES numeroſi, folitarii in apicibus ramulorum, foliis circumdati, feſſiles, flavi?

CALYX profundè quinquefidus, laciniis ereftis, lanceolatis, acutis, margine membranaceis, nervo dorſali utrinque eminente/perſiſtens.

PETALA quinque, calyce duplo longiora, lanceolata, acuta, ftriata, ereſto-recurva, in planta ficca apice tortuoſa.

STAMINA. *Filamenta* plurima, 20 ad 30, longitudine calycis, capillaria, *monadelphay* magis vql minus profundè diviſa, non vero in phalanges diſtinctas ſeparata, perſiſtentia. *Anthem* didymſe, comprefſae, deciduae.

STILLUM. *Germen* fuperum, ovatum, quinque-torulofum, glabrum, refinofum. *Styli* quinque, fubinde tantum tres vel quatuor, altitudine corollae, recurvato patentes, filiformes, perſiſtentes. *Stigmata* capitata, fubrotunda.

CAPSULA ovata, quinquelocularis? quinquevalvis, longitudinaliter dehifcens, & inde valvulis diſtantibus, marginibus inflexis, fructum quinquecapfularem fimulans,


SEMINA plurima, fubrotunda, parva.

OBS. Celeberrimus Antonius de Jussieu quocum hujusce plantae specimen communicavi, affinitatem ejus cum Hypericis primus suspicatus est. Nee ullo modo in istaminum connectione aliis speciebus, quoad fructificationem, differt. & inc genus distinctum, ne naturale lacerem, fervare nolui. Confiteor tamen differentiam haud levem inter stamina omnia basi regulariter connexa, & stamina in tacticulos distinctissimos digesta; sed haec organa in variis speciebus Hyperici valde fructurâ & connectione diversa sunt.

Flores fere semper pentagyni, rarius trigyni, rarissimè tetragyni sunt. Capitula loculamenta semper cum styli numero conveniunt.

EXPL. TAB.

- a* Folium plantae, duplo auctum.
- b* Ejusdem folio transversa.
- c* Flos integer, pari foliorum ad basin pedunculi.
- d* Calyx auctus.
- e* Petalum auctum.
- f* Stamina.
- g* Eadem aucta.
- h* Anthera eorum aucta.
- i* Germen cum styli.
- k* Eadem aucta.
- l* Stigmata.
- m* Fructus maturus.
- n* Idem auctus.
- o* Una ex valvulis fructus eorum.
- p* Eadem transversè secta, ut inflexio laterum videatur.



t I '"/* ftsw/t /y/ttO / / / / / 1A111)

AEGOPRICON, *Linn. Supp.* 63.

Maprounea, Aublet. Guian. 895. Juff. Gen. 391.

MONOECIA Monandria.

CHAR. ESSENT. *Maf* Amentum. *Cah comm.* *tnfulus**; *partialis* tubulofus. *Anther a* quadriloba. *Fcem.* *Flores* folitarii. *Calyx* trifidus. *Corolla* nulla. %//tres, bafi coadunati. *Capfula* tricocca.

Nominis rationem ignoro, fed maxime mlor Cel. yuffieum^ qui nomina Barbara pro tempore tantum, cum omnibus fanis botanicis, tolerAt (vide prof, ejus, p. 2%)9 barbarum et abfonum Maprounea Mgopricon pratulije.

AEGOPRICON. *betulinum, Linn. Supp.* 413.

Maprounea guianensis, Aubl Guian. 895. /. 342.

In Surinamo legit Dalberg, in Guian^ Aublet. \

ARBOR valde rambfa,

RAMULI alterni, varie flexi, foliofi, apice floriferi. *Cortex* fubrugofus, in junioribus laevis.

FOLIA alterna, petiolata, ovata, acuta, integerrima, Myrti firoilia, utrinque lasvia, venofa, decidua. *Stipula* nullae. *Petoli* lineares, terefiufculi, lseves.

PANicuL-aa parvae, terminales. *Pedunculi* communes tuberculati; *partiales* duo vel tres, divaricati, laeves, uniflori.

AMENTUM MASCULUM plerumque folitarium, pedunculum communem terminans, facie Alni, vix magnitudine feminis tritici. *Calyx communis* trifidus, foliolis concavis obtufis, flofculos 20 ad 30 continens; *partialis* tubulofus, trifidus quadridufve.


Stamen unicum, e centro calycis partialis exftans, duploque longius. *Anthera* ovata, quadriloba.

Flores FOEMINEI folitarii in pedunculis partialibus* *Calyx* trifidus, foliolis concavis obtufis. *Corolla* nulla. *Germen* parvum, globofum, glabrum, *Styli* tres, bafi connati apice divaricati. *Stigmata* obtufa. *Capfula* magnitudine Pifi, obfolet tricocca laevis, ftylis perfiftentibus coronata, trilocularis* Semina folitaria.

OBS. Specimina Linnaeana cum Aubletianis apud Illuftr. Bankfium monente
Amiciff. Juffieu contuli, & omnino familia inveni. Cum tamen Aubletius nc^c
flores fcemineos nee fruftum viderit> haud fupervacanea foret figura noftra.

EXPL. TAB.

- a* Amentum mafculum.
- b* Idem au6tum.
- c* Calyx communis.
- d* Flofculus feorfim.
- e* Calyx partialis.
- f* Anthera.
- g* Flos foemineus.
- h* Idem audum.
- i* Calyx feorfim.
- k* Fru6ttis fe&io tranfverfalis^ cum feminibus in fitu.



Begonia isoptera.

BEGONIA ifbptera, Dryand. Begon. in MSS. a pud Soc. Linn. No. 2.

MONOECIA Polyandria.

CHAR. ESSENT. *Maſc. Cal.* nullus. *Corolla* polypetala. *Stamina* numeroſa.

Fcem. Cal. nullus. *Corolla* polypetala, fupera. *Capſula* alata, polyſperma.

BEGONIA cauleſcens, foliis glabris femicordatis obfoletè dentatis, capſulae aliſ
fubaequalibus parallelis. *Dryander he. cit.*

Habitat in Java. *Thouin.*

CAULIS erediſ, carnoſus, obfoletè ftriatus, glaber.

FOLIA alterna, petiolata, femicordata, acuminata, undulata, obfoletè dentata,
venofa, fupra lsetè viridia glaberrima, fubtus pallidè ferruginea, minutiflimè punc-
tata. *Petioli* breves, femiteretes, glabri. *Stipule* . . .

PANTCULA terminals, dichotoma, multiflora, glabra. *Brdttea* oblongſe, membra-
naceae, deciduae, *cicatrkem* femiannularem ad bafin fingulorum pedunculorum &
peJicellorum relinquentes.

PEDUNCULI dichotomi. *Pedicelli* filiformes, uniflori.

PLORES MASCULI fuperiores, magifque numeroſi, parvi. *Corolla* dipetala; *Petalis*
cordato-fubrotundis, integris, obtufis, ante explicationem ardliflimè conniventibus.

Stamina 30 ad 40. *Filamenta* breviflima. *Anther** obcordatae, muticſe, marginatae,
biloculares, uno latere dehifcentes.

FLORES FOEMINEOS non vidi.

Capſula turbinata, trilocularis, trialata. *AUe* omnes aequales, angulis valdè deflexis,
nee adfeendentibus. *Semina* numeroſa, parva.

EXPL. TAB.


^a Flos mafculus magn. nat.

* Petalum auftnm.

^c Stamen cum anthera magn. nat.

^d Eadem au&a a tergo vifa.

^e " ——— antice.



Begonia ferruginea. Linn.

BEGONIA ferruginea, *Linn. Supp.* 419.

BEGONIA caulefcens, foliis inaequaliter cordatis dentatis, floris mafculi petalis oblongis fubafqualibus. *Dryander Joe. cit. No. 7.*

In Nova Granada legit Mutis. *?

CAULJS fuffruticofus, declinatus, teres, carnofus, folidiufculus, la*vis, ramofus. *Ramuli* alterni, breves, patentes, pubefcentes, foliofi.

FOLIA alterna, petiolata, patentia, inaequaliter cordata, acuta, obfoletè crenata, ftibciliata ; fupra intenfè viridia, afperula, ad venas fulcata ; fubtus pallida, fquatnulis minimis, rotundatis, albidis, lucidis, confertiflimis tedta; venis alternis, redlis, divifis, prominentibus, hirtis, *Petioli* pubefcentes, rubicundi, foliis quadruplo breviores. *Stipule* binae, femicordatae, amplexicaules, acutae, integerrimae, fubciliatae; altera duplo major.

PANICULÆ dichotomae, axillares vel terminates. *Pedunculi* teretes, pubefcentes. *BraSlece* binae ad fingulum florem, erebto-patentes, parvas, ovatas, acutas, fubciliatze, deciduas.

FLORES fanguinei, nutantes,

MASCULI numeroftiores. *Petala* quatuor, fubaequalia, lanceolata; *duo exterior a* oppofita, parum longiora, acuta, craffiora, extus pubefcentia; *interior a* obtufa* emarginata, minora, praecipue ante floris expansionem, glabriufcula. *Stamina* corollam aequantia, 9 ad 18, plerumque 12 ad 14, eredta. *Filamenta* breviffima, plana. *Anthera* lineari-lanceolatae, longiffimae, biloculares, flavae, lateraliter dehifcentes, apice roftratae, roftello filiformi, bifido, albo apice rubro, primum convoluto, dein revoluto. *Pijiilli* rudimentum nullum.

FOEMINEI mafculis immixti, paulo majores. *Petala* fex, mafculorum familia; *tria exteriora* acuta angulis germinis, *Interior a* emarginata lateribus germinis oppofita, omnia infra fummitatem ejus inferta. *Stamina* omnino nulla. *Pifiillum*. *Germen* inferum, turbinatum, trigonum, pubefcens, coloratum. *Styli* numerofti, 24 plerumque, in fex phalanges digefti, dichotomi, longitudine inaequales, erebli, corollam vix aequantes. *Stigmata* fimplicia.

Capfula turbinata, triangularis, trilocularis, tuberculo coronata, angulis infra dehifcens; *ala* nullae.

Semina numerofta, parva.

Figura ex Icone Mutifii, e folio cum floribus aliquot mafculis in herb. Linn, ~~comer~~^{er}*
vatis omnino caftigata.

a Flos mafculus.


b Stamen cum antherâ.

c Flos foemineus abfque germine.

d Styli.

e Germen.

ff Capfulae.



BEGONIA urticaefolia, Linn.

BEGONIA caulescens radicans, foliis utrinque hispida inaequaliter ovatis duplicato-ferratis, capulis basi tricornibus. Dryander loc. cit. No¹1¹.

B. urticae, Linn. Supp. 420.

In Nova Granada legit Mutis. % ?

RADIX ramosa, fibrosa, perennis ni fallor

CAULES plurimi, herbacei, pedales, ascendentes, geniculati, ad nodos radicales, ramosi, foliosi, teretifolii, subflexuosi, superne hirti.

FOLIA alterna, petiolata, patentia, ovata, basi valde inaequalia, acuta, duplicato-ferrata, ferraturis apice piliferis, utrinque pilis raris hispida, subtus pallida, fere fere tota rubicunda, Petioli breves, teretes, hirti. Stipulae binae, ovatae, membranaceae, apice setaceo-dentatae, extus subpilosae.

PEDUNCULI axillares, longitudine folii, erecti, filiformes, hirti, subbiflori. Bracteae membranaceae, ciliato-dentatae, coloratae.

FLORES plerumque bini, masculus cum foemineo, parvi, sanguinei.

MASCULORUM Petala quatuor : duo exteriora opposita, ovata, extus versus apicem pilosa; interiora angustiora, vix breviora, pallidiora magisque tenera, glabra. Stamina vix corollam aequantia, 14 ad 18, erecta. Filamenta breviter, irregulariter coalita, albida, glabra. Anthera oblongae, muticae, biloculares, lateribus dehiscentes, flavae. Pistilli rudimentum nullum.

FOEMINEI masculis fimillimi. Petala quinque ? ovata, obtusa. Stamina omnino nulla.

Pistillum. Germen inferum, maximum, pilosum, basi tricorne, apice stylis petalisque coronatum. Styli circiter quinque, erecti, petalis breviores, subfoliacei, quorum unus vel alter latior petala referre videtur. Stigmata simplicia ? subcapitata.

Capula omnino tribuliformis.

EXPL. TAB.

***a* Flos mafculus magnitudine audlus.**

***b* Stamen feorfim ftiagis audhim.**

***c* Flos foemineus au6lus.**

***d* Germen.**

***e* Stylus magis ~~anctus~~.**

/ Stigma.



t *a*

Marattia alata Swartz.

MARATTIA, Swartz Prodr. Flora InL Occ. 128.

Myriothea. Juff. Gen. p. 15, exclufo Caenopteride Bergii.

CRYPTOGAMIA Filices. Fructif. in pagina inferioris

CHAR. ESSENT. *Capfula* ovales, fuperne longitudinaliter dehifcentes, *loculis* utrinque pluribus.

Hoc genus confecravit Cel Swartz Johanni Francifco Maratti, Abbott Fallumbrofanoj opufculorum variorum de Lithophytis nempe et Zoophytis, de Romukd et Saturnidjfedpricipui de verdflorem exiftentid in plantis dorjtferis, auftorij baud inter peritifftimis numerando botanico, fed rara avi in terris ubi artes fuperbientes vix JimpUci Nature cultbrem reliquere.

MARATTIA alata, Swartz loc. cit.

MARATTIA rachibus fquamofis: partialibus alatis, foliolis acutis ferratis.

In Jamaicâ legerunt Rogerus Shakefpear, Everardus Home* Olaus Swartz.
Specimen Illuftr. Bankii benevolentiae debeo. i

STIPES . . .

FRONS bipinnata, pinnis fuboppositis.

RACHIS fere tetragona, fquamofa; *fquamis* fparfis, linearibus, acutis, membranaceis, fufcis: *raches partiales* crebrius fquamofae, alatae; *alts anguftis*, fubftantiae foliorum, fed aveniis & integerrimis, ad foliolorum infertionem contraflis & evanefcentibus.

PINNULJE fuboppositae, feffiles, ovato-lanceolatae, acutè ferratae, praecipuè verfus apicem, venosae, *venulis* fere femper prope originem bifidis, in apices ferraturarum definentibus, fubinde, ficut nervus centralis, minute fquamofis; *inferiores* lobatae; *fuperiores* integrae; *impar* elongata, acuminata, ferrato-lobata.

CAPSULAE folitae, venis partialibus ultra medium infidentes, ante explicationem fubrotundae vel ovaes, magnitudine feminum Papaveris, laeves, fuperne rimâ longitudinali notatae, quae poftea dehifcit, unde feries duplex foraminulorum in confpectum venit, quinque circiter in utraque parte, cum cellulis capfulae communicantes. Dein margo capfulae fifsus & fublobatus fit.

SEMINA . . .

EXPL.

EXPL. TAB.

***a* Capfula nondum aperta magn. nat.**

***b* Eadem auſta.**

***c* Capfula matura raagn. nat.**

***d* Eadem auſta.**

***e* Dimidium capfulae maturae.**

*Marattia laevis.*

MA- R A T T I A laevis.

MARATTIA rachibus lsevibus: partialibus alatis, foliolis apice obtus ferratis: fummis confluentibus.

In Infula Dominica legit Thierry. Thouin.

STIPES

FRONS subtripinnata, pinnis inferioribus alternis.

RACHIS teretiufcula, omnino lsevis : *partiales* complanatae, fupernè alatae; *alls* sub-
ftantiae foliolornm, aveniis, integerrimis, ad foliolorum infertionem contradtis;
pinnae apicem verfus multò latioribus quam in M. alat&.

PINNULJE alternae, rariffimè oppofitae, lanceolatae, glabrae, ferrato-lobatae, bafi fèpius
etiam pinnatae, apice ferratae, ferraturis fubinflexis, obtufis, nee acuminatis, ve-
nofae, venulis glabris, plerumque, nifi in foliolis partialibus, fimplicibus ; *fuperiores*
ovales, obtufè ferratae nee lobatae; *impar* elongata, acuta, obtufè ferrata, bafi
lobata, lobis in pinnulas fupremas confluentibus.

CAPSULE plerumque folitariae, faepe binae in lobo pinnularum, fingula venulae
propriae infidens, subrotundae vel ovales, dimidio fere minores quam in M. alati,
laeves, longitudinaliter dehifcentes, intùs utrinque foraminulis quatuor, rariùs
quinque, margine femper integrae, nee fiflâe, nee lobatae.

SEMINA.

EXPL. TAB.

- a* Folium lente au6lum.
- b* Capfula nondum aperta magn. nat
- c* Eadem au6la.
- d* Capfula matura dehifcens. magn. nat.
- e* Eadem au6la.
- f* Dimidium capfulae ejufdem.
- g* Lobus alter ejufdem capfulae, parte integumentì detracta.



M A R A T T I A fraxinea.

MARATTIA rachibus lsevibus fimplicibus, foliolis lanceolatis ferratis omnibus diftin&is.

Habitat in Infuia Mauriti. *tbouhu U*

FILIX inter majores, fraxinea fronde valde formofa.

STIPES . . .

FRONS impari-bipinnata, pinnis alternis,

RACHIS femi teres, canaliculata, glabra; *partm*h vix ac ne vix verfus apicem membranâ alata.

PINNUL-E alternse, vix petiolatæ, lanceolatae, acuminatae, ferratae, lseves, uniformes, bafin verfus pimue fenfim minores. *Vena partial*^ numerofae, fimplices divifaque alternse, patentes, in apices ferraturarum definentes.

CAPSULJE margines verfus pinnularum, folitarias, venis infidentes, ante explicatdonem ovales, magnitudine feminum Lepidii fativi, laeves; Bis tandem longitudinaliter dehifcentibus, foraminula circiter fex hvutraque parte confpiciuntur.

SEMI NA . . .

EXPL. TAB.

« Capfula nondum dehifcens a fronde feparata.

b Eadem infigniter lente au&ta.

c Capfula matura dehifcens.

d Eadem au&a.

e Dimidium capfulse longitudinaliter divifae.

f Idem cum integumenti portione avulft.

g Capfulae loculamenta.

h Pars integumenti capful* cum foraminulis qua: finguli& refpondent locula[^] mentis.



Acrostichum spicatum. Linn.

ACROSTICHUM fpicatum, Linn; fil

CRYPTOGAMIA Filices. * * *FruSlificationes in pagina inferiors*

C_{HAR}* ESSENT. *FruSlificationes* difcum frondis totum occupantes.

ACROSTICHUM fronde fimplici petiolata lanceolata utrinque attenuata integer-
ma> fpica terminali lineari. Linn. fil. in Supp. 444.

*n Infuia Mauriti legi Commerfon. Thouin. u

C_{HABIX} fibrofa, ramofa, fibrillis tomentofis.

FRONDES pedales, ereftae, petiolatae, fimpliciffimae, lanceolatae, utrinque anguftatse, tegerrimae, glabrae, nervo valido (e petiolo continuato) medium percurrente, venulis partialibus fuboppofitis, flexuofis, obfoletè reticulatis, evanefcentibus.

F_{AUCTIFICATIONES} in appendice lineari, biunciali, fpiciformi, ad apicem frondis, totam paginam inferiorem tegentes, primò te&ae marginibus hujufce appendicis iflexis, dein, reflexis his integumentis, prominulae.

C_{ApslJL}-as numerosiffimae, minutiffimae, pedicellatae, ovatae, nitidae, pallide flavae, an*
nulo proprio, articulate, fulvo, longitudinali, hinc amplexae.

Obs. In Supp. Linn, pro *fronde petiolato-lanceolata* legi debet *fronde petiolata lanceolata* ut ex manucriptis originalibus confirm ante fana ratione patet.

Exp_t. TAB.

^a < * Semina cum annulis magn. aufla.

* Annulus feorfim.

* < " PediceUi.



Y. d. 8

Y. d. 8

*

P

CAENOPTERIS. *Au&ore Sergio in ASl.*

•*Petrop. A. D. 1782,/. 248.*

Darea. *Jujf. Gen. p. 15.*

CRYPTOGAMIA Filices. *Fruft. in pagtna tnferiore.*

CHAR. ESSENT. REFORMAT. *FruBificationes in lineolis fubmarginalibus, lateralibus, membranâ exteriori dehiscente te&is.*

CJENOPTERIS rhizophylla.

C^NOPTERIS fronde bipinnata apice radicante: pinnulis obovatis fubfalcatis. petiolatis: primordialibus lobatis.

In Infula Dominica legit Thierry. 'fbouin. U

STIPES teres, fufcus.

**ONS bipinnata, pinnis alternis.

RACHIS *communis* teres, fufca, glabra; apice elongata, aphylla, bulbifera, radicans: *partiales* virides, complanatae, fubinde alatae.

^JNNuLiE alternae, breviter petiolatse, obovatae, uninerviae; *fru&tificantes* fubfalcatae, apice faepe dentatse, laeves; *fuperiores* plerumque confluentes; omnes obfcure virides.

^RUCTIFICATIONES in lineis brevibus, folitariis, lateralibus, verfus bafin pinnularum, a nervo ortum ducentibus, & ex foliorum anguftis marginem attingentibus, membranâ teftis integrâ, fcarioft, fufcâ, e fubftantiâ ipfius folii enatâ, latere exteriori femper dehiscente, demum reflex^, perfiftenti.

^PLoscun ignoti. Elapfis e rimi fructificante capfulis, extant *jUamenta* numeroſa, bifurca, fufca, nitida, quae annuli funt capfularum expanſi.

oBs - Nomen ineptum (a ***** *novus*, et xfys *flix*) in ſignificantius *Clethripteris*, a «^fl;nt *rima*, mutaviffem, nifi quod mutatio nominum jam typis evulgatorum, m<>do non ultimâ neceſſitate cogenti, fieri non debet. Hujus generis eſt *Afple-nium* cicutarium Swartz. *Prod. Flo. Ind. Occ. Plum. Amer. t. %\$>f. A.*

EXPL. TAB.

- a* Folium plantae fructificantis magnitudine auctum.
- b* Membrana fructificationem tegens, vel, si mavis, bractea, vel spatula.
- c* Capulae cum annulis (sicut *Bergii*).
- d* Annulus fructum, magis auctus.
- e* Capula.

PLANTARUM ICONES

H A C T E N U S ' I N E D I T ^ E ,

PLERUMQUE AD PLANTAS

IN HERBARIO LINNJEANO

G O N S E R V A T A S D E L I N E A T E ,

A U C T O R E

JACOBO EDVARDO SMITH, M.D.

S. S. REG. LOND. TAURIN. NEC NON DELPHIN. SOCIO, ULISSIP. AGRON.
PARIS. ATQUE TAURIN. BOTANOPH. ANDEGAVENS. CORRESPOND*
SOC. LINN. LOND. PRESIDE.

F A S C I C U L U S III.

LONDINI:

TYPIS J. DAVIS:

IMPENSIS BENJ. WHITE ET FILII, IN VICO DICTO FLEET-STREET, APUD QUOS PROSTAT
VENALIS; ET PARSIS APUD LUD. NIC. PREVOST.

VIRO NOBILISSIMO

DIGNISSIMOQUE

HIPPOLITO DURAZZO, #

PATRICIO GENUENSI,

OB SINGULAREM EJUS BENEVOLENTIAM

ET AMICITIAM,

IN GRATI ANIMI PIGNUS,

HUNC FASCICULUM

HUMILLIMÈ UTI PAR EST

D. D. D.

AUCTOR.

P R A E F A T I O .

E

-T AVORE quo duos priores hujusce operis fasciculos rerum naturalium studiose profecti sunt haud mediocriter incitatus, tertium lubentius profero. Si de raritate plantarum agitur, hic caeteris quidem pretiosior ducendus est. Quippe quod ad quinque species Rubi, et tres Valerianae spectat, quas hoc fasciculo delineavi, ne verbum quidem ante me quisquam dedit. In hac etiam parte operis gazas illas vegetabilium prae aliis magnificas, Mexicanarum nempe Syngenefiarum, quas Cel. Mutis communicavit, aggressus sum. Harum plurimae in 111, Linnaei Supplemento descriptae innotuerunt; pittoris tamen ope omnes carent. Non paucas ex his, pro occasione data adumbratas, evulgare spero.

Hic autem notandum est, quod ex septem plantis ex Linn. Supplemento desumptis, quas jam in lucem edo, duae tantummodo species Atracylidis a Linnaeo patre descriptae sunt: quatuor species Eupatorii turn Staehelinam dedit filius. Is praeterea nomina adjecit. Omnia haec ex autographis edidici.

Dum horum illustriff. vestigia follicitus insequor, vel horum etiam jurare in verba nolo, quin, prout quaeque oculis meis viva fuerint, fideliter omnia et verbis et figuris exprimenda curem.

Quartus fasciculus mox proferendus Volumen primum claudet.. Huic adjicietur titulus operis atque index generalis.

Addendum tamen, quod de patria Marattiae laevis et Caenopteridis rhizophyllae, in secundo fasciculo nostro enumeratarum, erroris quidquam irrepsisse suspicor. Patet enim ex D. Thierry nuper defuncti itineribus modo vulgatis, quod insulam Dominicam ipse nunquam adierit. Porro investigatione plantarum a Linn, filio in Gallicae collectionum adhibita, factis compertum habui, quod egregius vir incaute nomen *Dominique* cum *Domingue* confudit. Haec autem insula est quae Hispaniola appellatur, in qua D. Thierry diu commoratus plurimas, easque plantas, pretiosiores, invenit, et inter caeteras verifimiliter filices antedictas.

Dabam Londini, Cal. Mail, 1791.

F A S C I C U L U S III.

- 51 VALERIANA polyftachya.
- 52 - - - - - carnofa.
- 53 - - - - - chaerophylloides.
- 54 AGROSTIS capillaris, *Linn.*
- 55 JUNCUS ftygius, *Linn.*
- 56 MENZIESIA ferruginea.
- 57 ERICA nudiflora, *Linn.*
- 58 ANDROMEDA falicifolia, *Comm.*
- 59 - - - - - buxifblia, *Lamarck.*
- 60 RUBUS rofaefolius.
- 61 - - - - - pyrifolius.
- 62 - - - - - elongatus.
- 63 - - - - - pedatus.
- 64 - - - - - ftellatus.
- 65 ATRACTYLIS purpurata, *Linn.*
- 66 - - - - - Mexicana, *Linn.*
- 67 EUPATORIUM fcabrum, *Linn.*
- 68 - - - - - urticaefolium, *Linn.*
- 69 - - - - - f t o e c h a d i f o l i u m , *Linn.*
- 70 - - - - - microphyllum, *Linn.*
- 71 ST^ErfELINA ilicifolia, *Linn.*
- 72 ASPLENIUM refeaum.
- 73 - - - - - monanthemum, *Linn.*
- 74 ADIANTUM triphyllum, *Comm.*
- 75 FUCUS inflates, *Linn.*



L. polystachya

VALERIANA polytachya.

TRIANDRIA Monogynia. *Fl. fuperi.*

CHAR. ESSENT. *Calyx* nullus. *Corolla* monopetala, bafi hinc gibba, fupera. *Semen* unicum.

VALERIANA floribus triandris, foliis pinnatis, fpicâ compofitâ verticillatâ.

In agri Bonarienfis locis aquofis legit Commerfon. U ?

CAULIS adfcendens, teretiufculus, foliofus, ftriatus, glaber.

FOLIA oppofita, omnia (in unico faltem meo exemplario) impari-pinnata, foliolis 9vein, oppofitis, decurrentibus, lineari-lanceolatis, obtufiufculis, integerrimis, nifi quod impar aliquando fubdentatus inveniatur, inferioribus minoribus, glabris. *Stipula* null* nifi ciliae aliquae minutae intrafoliaceas.

SPICA terminalis, eredta, compofita, brachiata, multiflora. *Spicula* plurimae, oppofitas, pari foliolorum oppofitorum, bafi ciliatorum, ad bafin munitae, acute, verticiHatje, terminalis paulo major; verticilli plurimi, 6 ad io-flori, decuffatim pofiti, *braSteis* fuffulti plurimis, ovatis, acutis, fubcarinatis, glabris.

FLORES albos defcripfit Commerfon in manucriptis.

CALYX nullus nifi margo germinis integerrimus vix notabilis.

COROLLA infundibuliformis, bafi vix gibba; *Umbus* quinquefidus, aequalis, tubo brevior, patulus, laciniis fubovatis, obtufis, trinerviis.

STAMINA tria. *Filamenta* tubo corollae inferta, parumque longiora, patentia. *Anthera* fubrotundae, incumbentes.

PISTILLUM. *Germen* inferum, oblongum, glabrum. *Stylus* ftaminibus dimidio brevior, fubclavatus, pallidus. *Stigma* parvum, obtufiufculum.

SEMEN ovale, non vidi maturum, fed mihi videtur pappo immune effe.

OBS. Inflorefcentia hujufce fpeciei, omnino a congenerum diverfa, *Menthis* fpicatis proximè accedit.

EXPL. TAB.

a Bractea.

b Flos.

c Idem au6lus.

d Stamen cum antherâ.

e Germen cum piftillo.



Valeriana carnosa.

VALERIANA carnofa.

VALERIANA floribus triandris, foliis ovalibus dentatis carnofis glaucis.

In America meridionali ad Fretum Magellanicum invenit Commerfon. *n*

RADIX perennis, caespitofa.

CAULES pedales, erecti, foliosi, teretes, glabri.

FOLIA simplicia, grossi dentata, praecipue basin versus, carnosa, succulenta, glauca; radicalia longius petiolata, ovalia, obtusa; caulina minora, subsessilia, opposita, obovata. *Stipula* nulla.

CYMA terminalis, trichotoma, multiflora. *Bractea* ad omnem ramificationem opposita*, lanceolatae, acutae, submembranaceae. *Pedunculi* partiales femel dichotomi, cum flore folitario ad divaricationem scissili, dein racemosi, simplices, 3 ad 5-flori, floribus sessilibus, bracteolatis, erecto-fecundis.

COROLLA infundibuliformis, purpurea; limbo quinquefido, fere regulari, laciniis obtusis, concavis.

STAMINA tria, corollae paulo longiora, erecto-patentia, filiformia. *Anthera* subcordata.

PISTILLUM. *Germen* inferum, ovato-oblongum, curvum, glabrum. *Stylus* clavatus, longitudine filamentum. *Stigma* simplex, obtusum.

SEMEN figura germinis, folitarium, nudum, vix striatum, denticulis coronatum ut in congeneribus plurimis.

EXPL. TAB.

a Flos.

b Stamen cum antherae augmentum.

c Stylus augmentum.

^ Semen mag. nat.



Valeriana chorophylloides.

VALERIANA chaerophylloides.

VALERIANA floribus triandris, foliis omnibus pinnatis: foliolis pinnatifidis laciniatis, pedunculis axillaribus.

In provincia *Chancay* Peruae, locis humidis inter rapas, legit Cel. Dombey. o

RADIX annua, fibrofa.

CAULIS (implex, adfcendens, foliofus, anceps, ftriatus, glaber.

FOLIA omnia caulina, uniformia, oppofita, petiolata, patentia, impari-pinnata, glabra; *pinnis* plerumque alternis, incondite pinnatifidis laciniatifque, bafi valdè anguftatis, laciniis acutis. *Stipula* nullae nifi pubefcentia brevis ad bafin petiorum ubi cauli inferuntur.

PEDUNCULI axillares, longitudine ferè foliorum, filiformes, terminati *cyma* fimplici, 5 vel 7-florsL *Brattea* oppofitae, lanceolatae, binae fub fingulo flore.

FLORES eredli, rubri ?

COROLLA infundibuliformis, //w^ .quinquefido, regulari, patente.

STAMINA tria, tubo inferta, limbo vix breviora, patentia. *Anther a* oblongae.

PISTILIA4||tf. Gfcwfliparvum, oblongum, glabrum, viride. *Stylus* longitudine fta-roinum, femitrifidus. *Stigmata* fimplicia, parum recurva.

SEMEN ovatum, incurvum, glabrum, pappo vel corona deftitutum.

Obs. A congeneribus habitu paulum abludit haec planta, figure praecipuè foliorum, quorum afpe6lu, ignotis floribus, umbelliferam dices. Situs praeterea florum axillaris, minimè terminalis, de genere ejus fcrupulum forfitan injiciat j confideratis vero floribus et inflorefcentiâ, omnis cedit dubitatio. De qualitatibus herbae nil memorat inventor. Aliquantulum fucculenta videtur, & cum V. Lociifta virtutibus convenire verifimile eft.

EXPL. TAB.

^a Flos magnitudine naturali.


^b Germen cum ftylo.

^c Idem aufum.

^d Stamen cum anther^ audlum.

^e Semen.

^f **— au6lum.



Agrostis capillaris Linn.

AGROSTIS capillaris. Linn.

TRIANDRIA Digynia. Flores uniflori vagi.

CHAR. ESSENT. Calyx bivalvis, uniflorus, corollae paulo minor. Stigmata longitudinaliter bifida.

Sectio *% Mutica.

AGROSTIS panicula capillari patente flexuosa, calycibus subulatis aequalibus glabris coloratis muticis.

^AAgrostis capillaris. Linn, Sp. PL Ed. i. 62. Ed. 2. 93.

^{A*}panicula tenuissima. Linn. Flo. Lapp. No. 45.

E Lapponia, ni fallor, habuit Linnaeus; locus vero in exemplario ejus incriptus est nullus: neque plantam invenerunt recentiores, quamvis in alpinis Lapponiae vulgarem dixit. 0 ?

RADIX . . .

CULMUS ascendens, pedalis, ramosus, teres, laevissimus, geniculis 3 vel 4 obsoletis Purpureis.

FOLIA basi vaginantia, subventricosa, striata, glabra, in laminam angustam, acutam, definita. Stipula brevis, obtusissima, membranacea.

PANICULA terminalis, erecta, multiflora, glaberrima, Ratnuli plurimi ex eodem Ortu, non vero verticillati, multoties subdivisi, saepe flexuosi, filiformes, ad divaricationes nodosi, omnes divaricato-patentes. Pedicelli omnium tenuissimi ut visum esse effugiunt, flexuosi, funiculi definites in Receptaculum fac magnum, obconicum, glabrum, ut in Avenis.

CALYX apice receptaculi infidens, bivalvis, muticus, glaber, rufus; valvulis subaequalibus, ovato-lanceolatis, obtusiusculis, concavis.

COROLLA calyce duplo brevior, tenuissima, bivalvis; valvulis hinc connexis, illinc distantibus, apice obtusissimis, subcrenatis.

GENITALIA, longitudine corollae, in exemplario nostro emarcida, et ob tumorem exilitatem vix eruenda.

SEMEN unicum, ovale, utrinque acutum, glabrum.

OBS. Haud exiguam mihi molestiam creavit hoc gramen, ob characSlerem erroneum fynonymaque confufa. Specimen hocce, ex Herbario Linnaeano delineatum, ip-fiflimum eft quod in Flo. Lapp, et Sp. PI. ed. i, defcribitur. In prima edition^ Florae Suecicae cum hac aliam quoque fpeciem (Agroftidem fcilicet capillarem omnium auftorum) confudit Linnaeus: hinc, in differentiâ fpecifidi, ubique ca-lyces *hlfpidlufculos* defcribit; quas autem de planta dixit in Flo. Lapp, et Sp. P*» ed. I, cum noftr& figurâ omnino convenit, minimè cum vulgari.

Anne potius Milii fpecies ?

EXPL. TAB.

a Calyx receptaculo infidens auflus.

b Corolla pofticè vifa.

c———anticè, cum genitalibus in fitu.



Juncus stygius, Linn.

J U N C U S ftygius. Linn.

HEXANDRIA Monogynia.

**** Flores incompleti.

CHAR. ESSENT. *Calyx* hexaphyllus. *Corolla* nulla. *Cap*/, uni- vel trilocularis.

Seclio * * *Culmis* foliops.

JUNGUS foliis fetaceis deprefliufculis, pedunculis geminis terminalibus, glumis folitariis fubbifloris. Linn. Sp. PL 467.

In Suecise paludibus csfpitofis fylvaticis pirofundis. EK Lapponiâ et Uplandiâ recepit Linnxus. %

RADIX perennis, fimplex, articulata, radiculis folitariis, foliifque emarcidis praecedentis anni tedlse.

CULMUS fpithameus, ereclus, teres, laevis, foliatusi

FOLIA caulina duo: *infimum* longitudine culmi, fubulatum, teretiufculum, comprefiufculum, vix manifeftè ftriatum; apice fufco; bafi vero canaliculatum, marginibus membranaceis, amplexicaulibus: *fuperius* brevius, nee praecedentis altitudinem attingens.

SPATHA (nifi folium velis tertium terminale) fubulata, canaliculata* purpurafcens, apice fufca, uncialis, e qua prodeunt

PEDUNCULI duo, ftri<ai; *exterior* breviflimus; *interior* longitudine fpathx, redlus; uterque terminatus *glum*d bivalvi, biflora, *vahulis* parvis, membranaceis, albidis, concavis, acutiufculis, bafi equitantibus, floribus triplo brevionibus.

GALYCIS lacinix tres *exterior*es lanceolatae, anguftiores, rigidiores, dorfo ftriate, purpurafcentes; *interior* latiores, tenuiores, planiores, albiae, vix purpurafcentes; *emnes* acuts, perfiftentes, maturefcence fructu, attenuate & marcidae.

STAMINA. *Filamenta* fex, capillaria, vix longitudine calycis. *Anther** fubovatae, flav*.

PISTILLUM. *Germen* longitudine fere calycis, ovatum, triquetrum. *Stylus* filiformis, brevis. *Stigmata* tria, recun'a, obtufa, villofa.

CAPSULA calyce longior, nitida, fufca, apice rufa, femitrilocularis, polyfperma. *r«huU* ovat^, obtufiufcute, apice parum recurve *Dijepimenta* e centro valvularum ad bafin, fenfim verfus medium evanefcentia.

SEMINA triquetra, utrinque acuminata, nitida, albida.

OBS* Descriptionem e manuscriptis Linnaeanis quoad maximam partem mutuatus
fum* Cum Junco bufonio, certe distinctissimo, confudit olim Linnaeus, quod for-
fitan fecere alii. Anne Britanniae indigena ?

EXPL. TAB.

a Bractea.

b ——— aucta.

c Flos poll anthemin clausus.

d Idem auctus.

e Stamen cum antherâ,

f ——— auctum.

g Capsulae maturae.

h Valvula capsulae aucta, externè visa

i Eadem e parte internâ

k Semen.

l ——— auctum.



Menziesia ferruginea.

MENZIESIA.

OCTANDRIA Monogynia. *Flares completi.*

CHAR. ESSENT. *Calyx monophyllus, repandus. Corolla monopetala. Filamenta receptaculo inferta. Capfula fupera, quadrilocularis; difepimenta e marginibus inflexis valvularum.*

Nomen dedi in honorem Archibaldi Menzies Scotia, peregrinatoris et botanici indefeji, prifaejldei ac urbanitatis viri, qui hanc plantam aliafque plurimas novas vel rariffimas, in abditiffimis America oris occidentalibus afe ipfo left as, mecum communicavit.

MENZIESIA ferruginea.

In American borealis tradlu occidentali copiofiffime`crèfcit. *Menzies. h*

CAULES fruticofi, bi- vel tripedales, eredto-patentes, determinatè ramofi, teretes, glabri; *cortex albidus, longitudinaliter diffiliens & deciduus. Ramuli patentes, apice foliofi, juniores hirtuti & tomentofi. Gemmae terminales, ovatae, pubefcentes; /quamis ciliatis, exterioribus carini faepe pilofa.*

FOLIA alterna, apicem verfus ramulorum confertiora, petiolata, patentia, obovato-lanceolata, glandulo obtufo terminata, ferrulata, ciliata, pilofa, venofa, fubtus pallidiora et prater venas (quae fsepe pilis atque fetis validiffimis armatas funt), glabra, decidua. *Petoli breves, alati. Stipule nullae.*

FILORES e gemmis praeceidentis anni, cum foliis ramulifque junioribus, erumpunt plurimi, pedunculati, nutantes, ferruginei. *Pedunculi unciales, fubangulati, glandulofo-hifpidi. Braffete nullae nifi fquamac gemmarum deciduae.*

CALYX monophyllus, parvus, planus, margine repandus, vix quadrilobus, ciliatus, *extus bafi incanus, perfiftens.*

COROLLA calyce multo major, ovata, glabra, margine quadrifida, laciniis parvis, obtufis, patulis.

STAMINA. *Filamenta o£to, receptaculo inferta, fubulata, longitudine aequalia, apice aPproximata, corolla breviora, glabra. Anthera ereaae, lineari-oblongae, biloculares, bafi obtufae, bilob*, apice dehifcentes poris duobus, glabrae.*

PISTILLUM. *Germen fuperum, conicum, quadrifulcatum, glabrum. Stylus ftaminibus paulo longior, re£tus, quadrangularis. Stigma obtufum, quadrilobum.*

CAPSULA ere£ta, fubovalis, quadrangularis, quadrifulcata, glabra, fupernè dehifcens, quadrilocularis, quadrivalvis, valvulis fingulis duplicatis, e marginibus valvularum inflex nempe formati. *Columella (implex, longitudine valvularum.*

SEMINA.

SEMINA numerosa, parva, oblonga, angustissima, utrinque acuta.

OBS. Genus habitu Rhododendri Azalearumque Americanarum, flore Andromedae, numero Ericae, capsula Rhododendri, ab omnibus chara & ere supra dato fatis distinctum, inter *Rhododendron Jussieu* (*C. a. Jf. 9. Ord. 2.*) numerandum.

EXPL. TAB.

a Stamina & pistillum, abscisso corolla

b Stamen forficatum.

c Anthera aperta.

d Calyx cum pistillo.

e Eadem aperta.


f Stigma magis apertum.

g Capsula matura.

h Ejusdem sectio transversalis.

i Semen.

k ——— apertum.



ERICA nudiflora. Linn.

OCTANDRIA Monogynia. Flares comply.

CHAR. ESSENT. Calyx tetraphyllus. Corolla quadrifida. K M * receptaculo infata, ^fefcr* hifidae. Ctf/<fr quadrilocularis.

Seftio * * * * Antheris muticis exfertis, foliis ternis.

ERICA antheris muticis exfertis, corollis cylindricis fparfis, foliis ternis, ramis tomentofis. Linn. Mant. 2, p. 229.

E Promontorio Bon* Spei unicum fpecimen habuit Linnaeus.

CAULIS fruticofus, determinate ramofus, teres, tortuofus. Cortex tomento albo obductus, rhnofus, dedduus. W/plurimi, erefti, foliofi, multiflon, denfius tomentofi.

FOUA ttrna, breviter petiohta, ereao-potentia, lineari-lanceoUta, obtufiufcula, fubtusgibba, foko longitudinaU exarata; fupra concaviufcula; utranque glabra, minutiflimè pundlulata; juniora bafi ciliata.

^ORES numeroſi, axillares, pedunculati, fubnutantes. Pedunculi longitudine foliorum, capUlarcs, pubefcentes. BraSteas inveni nullas.

CALYX Hmplex, parvus; foliolis ovato-lanceolatis, acutis, carinatis, bafi gibbis, glabris.

COROLLA campanulato-cylindrica, longitudine dimidii pedunculorum, calyce quadruple fere longior, glabra, margine quadrifida, laciniis parvis, obtufis, ere is.

STAMINA. Filamenta oſto, erefta, parallela, capillaria, corollâ longiora, glabra. Anther* omnino exferte, ereft^, mutica., femibifid*; lobis obtufis, dxvancatis, apxc Poro fubrotundo e parte interna dehifcentibus; bafi intus gibbs, glabr*.

PISTILLUM. Germen parvum, fubrotundum. Stylus ftaminibus longior, capillaris. Stigma capitato-obtufum.

FRUCTUS in exemplario deeft.

O>s. Ifac ERiCT fpocies inter rariffimas et minus cognitâs procul dubio cenfenda eſt, cum acutiffimu, Dryander, qui genus hoc immenſum et difficillimum aUquandm attentifllmo egerit animo, ut in future pretioſifllmo opere, de plantis ranonbus m Wo Kewenſi cultis, abſolutiffimum prodeat, nuUibi nifi in herbano L m m o . eam vidit. Ccleberrimus mfuper Thunbergius, qm monograph™ egreg.am, omnibus botanicis notiffimam, de Erica jamdudum evulgavit, Ericam nud.noram, nefcio quo caſu, planè omifit.

Ex ^ .

EXPL. TAB.

a Pedunculus cum calyce.

b Corolla cum genitalibus.

c Genitalia feorfim.

d Stamen.

e Anthera aufta, poflicè.

f ———— anticè.

g Germen cum ftylo.

h Stigma auctum.



Andromeda salicifolia. Comm.ⁿ

ANDROMEDA falicifolia.

DECANDRIA Monogynia. Flores monopetali, Equates.

CHARESENT. *Calyx* quinquepartitus. *Corolla* ovata, ore quinquifido. *Capfula*
fupera, quinquelocularis; diffepimentis e medio valvularum.

ANDROMEDA racemis fecundis nudis, corollis fubcylindricis, foliis lanceolatis
acutis integerrimis.

A. falicifolia. *Lamarck Etuycl.* 159.

In infula Mauritiæ legit Comracrfon. *Thou'm.*

GAULIS arboreus. *Earrt* viminei, fubflexuofi, teretes, glabri, folion, apice floriferi.

FOLIA perennantia, alterna, petiolata, eredto-patentia, lanceolata, acuminata, inte-
gerrima, margine parum revoluta; fupra viridia, glabra, lincis duabus longitudi-
nalibus nervo parallelis notata, ut fere trinervia videntur; fubtus albida, nervo
valido rubicundo extante, reticulato-venofa. *Petioli* canaliculati, glabri.

RACEMI fubpaniculati, terminates. *Pedlicelli* fecundi, alterni, fimplices, breves, an-
gulati, ebraaeati, floriferi nutantes, fruftiferi eredo-patentes.

CALYX ultra medium quinquefidus, rugofus, carnofus, glaber, fubinde ciliatus, per-
fiftens; *laciniis* deltoidibus, obtufrufculis, fubcarinatis.

COROLLA calyce triplo longior, ovato-cylindrica, margine quinquefido; *lactnus* par-
vis, fubrotundis, obtufis, paulo reflexis.

STAMINA. *Filamenta* corollæ dimidio breviora, fimplicia, curva, viUofa, bafi dilatata.
Anthera ereftx, oblongae, muticx, biloculares, apice poris duobus dehifcentes, bafi
gibbae.

P_ISTILLUM. G_m[^]fubrotundum, obfoletaquinquelobum, glabrum. *Stylus* longi-
tudine fere corollæ, reftus, fubquingularis. *Stigma* obtufum, quinquepapil-
lofum.

CAPSULA lignofa, glabra, oblonga, quinquangularis, quinquevalvis, apice ad angu-
los dehifcens; *valvulis* extus concavis, intus e medio feptiferis.

SEMINA numeroſa, parva, oblonga.

OBS. Effentia generis in capfula fupera, diffepimentis e medio valvularum, nee e
marginibus earundem inflexis (ut in Rhododendro) formatis, confiftit. Hinc
Andromeda Dabeocii, droferoides, & cſrulea ad Ericas removenda funt.

EXPL.

EXPL. TAB.

a Flos.

b Stamen cum antherâ.

c ————— au&um*

d Germen cum ftylo.

e Stigma auftum.

f Capfula.

g Valvula capfulse e parte intern^

h Ejufdem fe6lio tranfverfalis.



Andromeda buxifolia Lamareck.

ANDROMEDA *buxifolia*.

Lamarck Encycl 159.

ANDROMEDA racemis fecundis nudis, corollis subcylindricis, foliis cordato-ovatis integerrimis mucronulatis.

In insula Borboniae legit Commerfon. *Thouin*. *?

CAULIS fruticosus. Ramuli teretes, glabri, foliosi, apice floriferi.

FOLIA perennantia, parva, petiolata, patentia, unguicularia, ovata, basi cordata, obtusa, mucronulata, integerrima, margine subrevoluta; supra laete viridia, glabra; subtus albida, reticulato-venosa, nervo valido extante. Petioli breves, canaliculati, rugosi.

RACEMI ramulorum apicem versus, axillares, vix terminales, repleti, simpliciter multiflori. Pedicelli alterni, simpliciter, angulati, leviter pubescentes, ebracteati, floriferi subnantes, fructiferi erecto-patentes.

FLORES tam feminae A. falcifoliae ut descriptio specialis superflua foret, nisi quod calyx magis ciliatus fit, laciniisque corollae erectae.

FRUCTUS immaturus leviter pubescit, maturus tamen gaudet A. falcifoliae*

OBS. Pulchrae hae duas Andromedae species inter se valde affines sunt, fructificatione enim vix ullo modo discrepant, nec nisi figura (minime fructura) foliorum distinguuntur. Caret vero A. buxifolia lineis nervo foliorum parallelis in lateribus specie tam conspicuis & singularibus.

EXP. TAB.

a Flos.

b Stamen cum anthera.

c ————— auctum.

d Germen cum stylo.

e Stigma auctum,

f Capsula.

g Valvula capsulae e parte interna,

h Valvulae sectio transversalis.

60.



A/HJ 1«J»1,,1J«.

R U B U S rofaefolius.

CHAR. ESSENT. *Fide Num. 19.*

* *Frutescentes.*

RUBUS foliis quinato-pinnatis ternatifque utrinque viridibus, caule petiolifque aculeatis, floribus folitariis.

In infula Mauritii legit Commerfon, *Thouin.* *?

CAULIS fruticosus, teres, pubescens, aculeatus; *aculei* flavescuntibus, apice recurvis.

FOLIA pinnata; *foliis* plerumque quinis, subsessilibus, ovatis, acutis, duplicato-feratis, utrinque viridibus, subsessilibus; impari maximo, elongato, petiolato. *Petiolus communis* canaliculatus, pilosus, aculeatus, aculeis parvis, aduncis* *Stipula* bina?, lineares, acutae, angustifoliae.

PEDUNCULI folitarii, oppositifolii, unciales, patentes, pilosi, uniflori. *Bractea* nullae.

CALYX profunde quinquefidus, laciniis ovatis, longius acuminatis, integris, utrinque pubescentibus.

PETALA calyce paulo breviora, subrotunda, unguiculata, alba?

STAMINA. *Filamenta* petalis dimidio breviora. *Anthem* subrotundae, parvae.

PISTILLUM. *Germina* parva, numerosissima. *Styli* breves. *Stigmata* obtusa.

FRUCTUS globosus, ex acinis numerosissimis glabris compositus, neque valde succulentus videtur.

EXPL. TAB.

a Petalum.

b Stamen.

c ———— audlum.

d Acinus.

^ ———— auitus*

t *



A

• 4 ti/... /lyf-ftf/...

R U B U S pyrifolius.

RUBUS foliis simplicibus ovalibus acuminatis ferratis nudis, caule aculeate paniculato, petalis minutis.

In Java legit Commerfon. *fhouin.* >?

CAULIS fruticosus, subflexuosus, teres, leviter hirsutus, aculeis parvis recurvis.

FOLIA alterna, petiolata, patentia, ovalia, acuminata, ferrata, venosa, glabra, venis utrinque hirsutis. *Petoli* breves, hirsuti. *Stipula* vix ullae.

PANICULA terminate, erecta, subthyroidea, multiflora, alterne ramosa, pubescens. *Pedunculi* e rudimentis florum abortivorum nodosi, subdivisi. *Pedicelli* teretes, vix incrassati. *Bractea* oblonga, multifida, pubescentes, deciduae.

CALYX profundè quinquefidus, laciniis ovatis, acuminatis, exterioribus apice trifidis, utrinque tomentosus.

PETALA minutissima, calyce quadruplo breviora, ovalia, obtusa, apice dentata.

STAMINA. *Filamenta* capillaria, calyce paulo breviora. *Anther** subrotunda, didymae.

PISTILLUM. *Off^* subpubescentia. *Styli* erecti, longitudine filamentum. *Stigmata* obtusa.

FRUCTUS ex acinis paucis ovatis compositus videtur: colorem ejus nescio.

EXPL. TAB.

^a Flos a tergo visus.

^b Petalum.

^c ——— aufum.


^d Stamen cum antherâ.

^{*t} Antheras audra?.

/ Germina cum stylis.

S Fructus acinus fere maturus.

Folia infeavorum edacitate perefa, gallifque occupata, ut in exemplano nostro, repraesentantur.



Rubus elongatus.

R U B U S elongatus.

RUBUS foliis fimplicibus cordatis acuminatis duplicato-crenatis fubtus tomentofis*
caule aculeato, calycibus obtufis.

In Java legit Commerfon. **Thouin*.

CAULIS fruticosus, teres, pubefcens, minute aculeatus.

^pOLIA alterna, petiolata, cordato-oblonga, acuminata, duplicato-crenata, crenaturis
^acutis (in icone noftrS. tamen nimis aliquantulo acuta depinguntur) fupra laevia,
fubtus tomentofo-alba, venofa. *Petoli* foliis breviores, teretiufculi, pubefcentes,
inermes. *Stipula* nullae vel caducae.

PANICULA terminalis, elongata, tomentofa, flexuofa, multiflora, alternè ramofa.
Pedicelli conferti vel folitarii, breves, fupernè paululum incraffati, fericei, ere6li.
BraSlea! oblongae, concavae, extus pubefcentes, apice dentatae, deciduae,

CALYX femiquinquefidus, laciniis obtufis cum mucronulo, fericeus.

P[^]TALA fubrotunda, alba, haud bene explicata vidi.

STAMINA corolla breviora. *Anthera* oblongae.


PISTILLUM. *Germina* fubrotunda. *Styli* breves,

FRUCTUS, auctoritate Commerfonii, ruber.

^εXPL. TAB.

* Petalum pofticè.

^b _____anticè.



R U B U S pedatus.

Se&io** *Herbacei.*

RUBUS foliis pedato-quinatis incisis, pedunculis filiformibus medio bracteatis, calycibus glabriusculis.

In America borealis tractu occidentali legit Archibaidus Menzies, %

RADICES fibrosae, e geniculis caulinis.

CAULIS procumbens, repens, teres, inermis, glaber.

FOLIA erecta, petiolata, ternata, foliolis lateralibus utrinque binatis, hinc folium pedatum videtur; *foliola* breviter petiolata, obovata, incisa, acutè crenata, venosa, utrinque viridia, nuda, ad venas subhirsuta, exteriora saepe hinc obsolete lobata. *Petioles* longissimi, lineares, canaliculati, glabriusculi, inermes. *Stipulae* binae, ad basin petiolorum, subrotundas, concavae, membranaceae, obtusae.

FLORES folitarii, pedunculati, erecti, albi?

PEDUNCULI filiformes, longitudine petiolorum, superne subpubescentes.

BRACTEAE binae, oppositae, medium versus pedunculi, subrotundae, obtusae, glabrae, parvae.

CALYCIS foliola oblonga, reflexa, acutiuscula, utrinque dente uno alterove saepius munita, venosa, glabra vel levissimè pilosa, nec ut in affinibus plurimis tomentosa.

PETALA longitudine calycis, obovata, patentia.

STAMINA petalis breviora. *Antherae* parvae, subrotundae.

PISTILLUM. *Germena* parva, glabra. *Styli* vix longitudine staminum, erecti. *Stigmata* obtusa.

FRUCTUS desideratur.

Obs. Planta tenella delicatula ab omnibus Rubis herbaceis dignoscitur foliis pedatis.

Specimina pulchra communicavit amicissimus Menzies, nec prius vidi.

Ante Rubum faxatilem inferendus.

EXPL. TAB.

^a Folia calycina.

^b Petalum.

^c Stamen cum anthera.

^d Anthera aucta.

* Germina.

/ Unum e germinibus scorum, auctum.

64.



Rubus stellatus.

R U B U S ftellatus.

RUBUS foliis fimplicibus lobatis, caule inermi erefto unifloro, laciniis calycinis lanceolatis acutis.

In Americas torealis traËtu occidentali legit Archibaldus Menzies. *u*

RADIX ramofa, fibrofa.

CAULIS fimplex, ereËtus, omnino herbaceus, brevis, foliofus, teres, inermis, pubescens, uniflorus.

FOLIA tria vel quatuor in caule, alterna, petiolata, patentia, bafi cordata, triloba, acutè inaequaliterque ferrata, rugofa, fupra nuda, fubtus pallidiora venis pilofis. *Petoli* filiformes, pilofi, caulem plerumque fuperantes. *Stipula* binse, ovatae, acutae, membranaceae, nudae.

FLOS breviter pedunculatus, terminalis, folitarius, ereËliufculus, ruber, pro ratione plantas magnus.

CALYX bafi turbinatus, multinervofus, pubescens, perfiftens, laciniis feptem vel odto, nearibus, acuminatis, longiflimis, patentibus.

PETALA laciniis calycis alterna numeroque paria, paululum longiora, obovato-lanceolata, obtufiufcula, patentia.

STAMINA. *Filamenta* calyce multo breviora, incurva, diu perfiftentia. *Anthera* fubcordatae.

PISTILLUM. *Germina* in fundo calycis, parva. *Styli* breves.

FRUCTUS mihi nondum innotuit.

OBS. AfEnis eft Rubo anftico, fed foliis fimplicibus, flore fere feffili diftinfta. A Rubo Chamaemoro diftinguitur facie, at praecipuè laciniis calycinis lineari-lanceolatis nee ovatis. Calyx cum ftaminibus praecedentis anni faepius per hyemem perfiftit in caule marcido.

Inter Rubum arfticum & Chamaemorum Syftemati inferendus*

EXPL. TAB.

^ Lacinia calycis.

t > Petalum.

c Stamen cum antherâ.

d Idem audtum.



Arctostaphylos purpurascens Linn.

ATRACTYLIS purpurata *Linn. Mfs.*

SYNGENESIA Polygamia asqualis.

Flores capitati

CHAR. ESSENT. *Corolla* radiata: corollulis radii tri- vel quinque-dentatis,

ATRACTYLIS (*purpurea*) foliis hastatis runcinatis. *Linn. Supp.* 349.

In Nova Granada legit Mutis.

RADIX . . .

CAULIS teres, densè lanatus, fruticosus ni fallor, specimen enim Mutisianum, cuius iconem hic fingo, apex ramuli foliis floribusque terminati videtur.

FOLIA conferta, dodrantalia, runcinata, acuta, irregulariter dentata, venosa; fupradum primò erumpunt lanâ albâ fugaci tegula, postea laevissima fiunt & viridia; subtus femper alba, densè tomentosa; lobis terminali maximo. *Stipula* nullae.

PEDUNCULI terminales? foliis longiores, ramulosi, angulosi, scabri, lanati, fuperne squamis linearibus, acutis, teretibus.

FLORES magni, erecti, speciosi, purpurei.

CALYX communis imbricatus; foliola lineari-lanceolata, acuminata, margine membranacea, extus scabra, exteriora minora.

COROLLA communis radiata, flocculis omnibus hermaphroditis. Flocculi radii circiter viginti ligulati, bilabiati; labium exterius apice reflexum, tridentatum, extus densè lanatum; interius angustifolium, spirallyter contortum. Fl. difci tubulosi, glabri, margine quinquefidi, aequales, laciniis acutis, reflexis.

STAMINA utrifque Filamenta quinque, capillaria, Anthera lineares, in tubum connexae, flavae.

PISTILLUM. Germen utrifque oblongum, pilosum. Stylus subclavatus, difci brevior. Stigma obtusum, vix bifidum inveni.

SEMEN oblongum, hinc gibbum Pappus longitudine calycis, oculo armato scaber.

RECEPTACULUM nudum. *Linn.*

EXPL.

EXPL, TAB.

a Foliola calycina.

b Flofculus radii, germine avulfo, anticè vifus cum genitalibus in fitu naturali-

c Idem pofticè.

d Genitalia feorfim, aufta.

e Flofculus difci, germiini infidens*

f Corollula audta.

g Genitalia audta.

h Germen cum ftylo, pappo orbatum*



Stachys mexicana Linn.

ATRACTYLIS Mexicana, Linn.

ATRACTYLIS foliis oblongis integerrimis. Linn. Supp. 350.

In agro Mexicano legit Mutis. ^

CAULIS fruticosus.

RAMI simplicissimi, graciles, foliosi, uniflori? subflexuosi, teretes, striati, tomento albo obducti, inermes.

FOLIA alterna, breviter petiolata, lanceolata, acuminata, integerrima, reticulato-venosa; supra nuda, subtus viridia, lucida; subtus nivea, tomentosa, punctis sparsis fere glandulosis inter tomentum. Stipulae nullae. Petioli crassiusculi, carinati, tomentosi.

FLOS in nostro exemplario foliarius, terminalis, nutans, foliis duobus vel tribus diminutis bracteiformibus suffultus.

CALYX communis imbricatus, tomento albissimo obvolutus; foliola lanceolata, acuta, subpungentia, exteriora minora.

COROLLA communis radiata, purpurea.

Flocculi radii numerosi, ligulati, absque labio interiore, apice tridentati, glabri, foeminei? antheras in his faltem non inveni, nec descripsit Linnaeus. Stylus clavatus, corollae brevior, purpureus. Fil. diffusi tubulosi, margine quinquefidi, aequales, laciniis acutis, patentibus.

STAMINA in diffusi flocculis quinque. Antherae in tubum connatae, exsertae, flavae.

PISTILLUM. Stylus ut in flocculis radii, antheris brevior. Germen non vidi.

SEMEN non vidi. Pappus calyce brevior, albus, oculo armato scaber.

RECEPTACULUM paleis brevissimis munitum descripsit Linnaeus.

EXPL. TAB.

a Flocculus diffusi cum staminibus in situ.

b Idem auctus.

c Flocculus radii cum stylo.

d Idem auctus.



EUPATORIUM fcabrum, Linn.

SYNGENESIA Polygamia asqualis. *Difcoide* L.

CHAR. ESSENT. *Receptaculum* nudum. *Pappus* plumofus. *Calyx* imbricatus, oblongus. *Stylus* femibifidus, exfertus.

Sectio * * * *Calycibus fub-oftjloris*.

EUPATORIUM villofum, foliis oppofitis petiolatis ovatis integriufculis rugofis fupra fcabris. Linn. Supp. 354.

In Nova Granada legit Mutis. u

CAULIS fuffruticofus ? ereftus, ramofus, teretiufculus, ftriatus, villofo-fcaber, foliofus, multiflorus. *Ramuli* oppofiti, angulati, apice floriferi.

FOLIA oppofita, brevius petiolata, ere&o-patentia, ovata, acuminata, fubferrata, rarius integra, venofa, fubtrinervia, rugofa, fubtus hirta, fupra fcaberrima. #/- *pulae* nullas.

PANICULÆ terminales, ere&ae, hirtae, multiflorae, coar&atae. *Pedunculi* oppofiti. *Pedicelli* plerumque alterni. *Bractæa* lanceolata, hirtae,

PLORES erefti, flavi?

GALXX cylindricus, imbricatus, glaber: *fquamis* oblongis, obtufis, trinerviis, apice fub-callofis j *exterioribus* brevioribus latioribufque.

FLOSCULI 7 vel 8, vix calyce longiores, tubulofi, pentagoni, ore quinquefido; laciniiis parvis, integris, patulis.

STAMINA. *Filamenta* capillaria, brevia. *Anthera* corollæ paulo longiores, connate, flavae.

PISTILLUM. *Germen* obconicum, tenue, triangulare, obliquum, glabrum. *Stylus* antheras long8 fuperans, femibifidus. *Stigmata* fimplicia, divaricata.

RECEPTACULUM fere cylindricum, obtufum, pun&atum, nudum. *Semina* figura germinis, nigra. *Pappus* vix longitudine corollas, ferratus, vix plumofus, patens.

°BS. Planta exficcata nigrefcit, fragilifque fit, odore et fapore expers, floribus flavefcentibus.

EXPL.

EXPL. TAB,

a Flos integer.

b Squama e basi calycis interna externa vifa.

c Eadem interna.

d Squama calycis interior externa.

e Eadem interna.

f Flocculus feofim aureus.

g Rectum, sacculus, squamis aliquot calycinis ad basin persistentibus.



Epipactis atrorubens Lam.

EUPATORIUM urticaefolium, Linn.

Sectio # * # * *Calycibus quindecimpluribusvejbculis.*

EUPATORIUM hifpidum, foliis petiolatis cordatis incifo-fcrratis, panicula terminal!, calycibus multifloris fubulatis fubpungentibus. *Linn. Supp.* 354.

In Nova Granada legit Mutis. %

CAULIS ereftus, ramofus, teres, ftriatus, pilofus, foliofus.

FOLIA oppofita, petiolata, patentiffima, cordata, obtufiufcuia, profund* atque irregulariter ferrata, venofa, bafi trinervia, utrinque piiifo-hifpida, fubtus palhdiora.

Petoli vix longitudine foliorum, angulati, asquales. Stipula null.*

PANICULA terminalis, fubcymofa, *refla, pUofa. *Pcdicelli alterni, vel confetti. Braße* lineares, paucae.*

FLORES erefli, pallidd purpurei.

CALYX fubcylindricus, patulus, imbricatus, pubefcens: *fquamis lanceolato-fubulatis, mucronato-pungentibus, carinatis, trinerviis, margine attenuatis; exterioribus minoribus.*

FLOSCULI numeroſi, calyce parum bngiores, tubuloſi, ore quinqueſido; ladniis jarvis, ereaiufculis, fubrotundis, obtufis, ferratis, pubefcentibus.

STAMINA. *Filamenta.... Anthera coroM breviores.*

PISTILLUM. *Germen obovatum, angulatum, glabrum. Stylus longe exfertus, bifidus. Stigmata Manfa, clavata, obtufa.*

RECEPTACULUM parvum, hemifphsricum, punftatum, nudum. *Semina nigra. Pappus corolla brevior, albus, oculo armato minutS ferratus.*

OBS. Herba pritno intuitu Urtics fimUlima, fed folia bafi trinervia, ut in Scrophularia nodofa, Arctio Lappa, aliifque, ac fi bafi ad nervos laterales excifa fuiſſent. Confer Linn. Flo. Suec. p. ai8.

EXPL. TAB.

a Flos integer, au&us.

b Squama calycis.

c Floſculus.

d Receptaailum cum portione calycis.



EUPATORIUM ftoechadifolium, *Linn.*

EUPATORIUM tomentofum, foliis petiolatis linearibus crenatis tomentosis fubtu,
canis, panicula terminali. *Linn. Supp. SS5'*

In Nova Granada legit Mutis. %

CAULXS ereflus, fubvimineus, teretiufculus, tomento albo, denfo, molliffimo tedus.

FOLIA oppofita, breviter petiolata, patentia, lineari-lanceolata, obtufa, crenata,
plana, uninervia, venulis numerosis, divaricatis, alternis; fupra viridia, tomen-
tofo-mollia; fubtus denfe lanata, alba, uti et caulis et petioli. *Stipul** null*.

PMC[^]*M* caulem ramulofque terminantes, erea[^], fubcorymbofe, multiflora,
conglomerate *Pedunculi* oppofiti, dein varie divifi, lanati. *BrOm* null* mfi
par foliorum, aliis minorum, ad bafin cujufvis panicute.

VLORES purpurei, calyce rutilante.

CALYX cylindricus, imbricatus, bafⁿ lanatus: / ? W acutis, linea longkudinali yi-
ridi, margine membranaceis, ciliatis; *interim*[^] fublinguiformibus; *exUnorthus*
lanceolatis, minoribus.

FLOSCULI numerosiffimi, longitudine calycis, tubulofi, parum ventricofi, pentagon!,
ore quinquefido; laciniis erefto-patentibus, acutiufculis, integernmis, vix pu-
befcentibus.

STAMINA. *Fllamnta*——*Anthera* indufe.

PISTILLUM. *Germen* obovatum, compreffum, incurvum, glabrum. *Stylus* exfertus,
vix femibifidus. *Stigmata* patentiffima, clavata, obtufa, purpurea.

RECEPTACULUM fubglobofum, alveolatum, non vero fquamofum. *Semina* figura
germinis. *Pappus* corolla brevior, flavefcens, fcaber.

OBS. Linnaeus filius hujufce plants corollam pubefcentem defcripfit, at mihi videtur
glabra.

EXPL. TAB.

- a* Flos magnitudine naturali.
- b* Squama e bafi calycis aufa.
- c* ——— calycis interior aufa.
- d* Flofculus.
- e* Receptaculum.



Eupatorium microphyllum Lam.

EUPATORIUM microphyllum, *Linn.*

EUPATORIUM foliis triangulari-ovatis novemcrenatis subtus tomentosis venosis, panicula conglomerata terminali], pedunculo elongate *Linn. Supp.* 355.

In Nova Granada legit Mutis. *?

CAULIS suffruticosus, lignosus, adscendens, parum ramosus, foliosus, teres, subhirtus.

FOLIA opposita, patentia, petiolata, parva, triangulari-ovata, obtusa, margine revoluta, crenata; crenis utrinque quatuor (rarius tribus vel quinque) cum impari terminali; rigida > coriulcula; supra viridia, glabra; subtus lanata, alba, reticulato-venosa. Petioli longitudine foliorum, pilosi. Stipula nullae.

PANICULA terminalis, longius pedunculata, conglomerata, subcorymbosa. Pedicelli varie divisi, hirti. Bracteae duae ad primam paniculae ramificationem, plerumque lanceolatae, subinde foliis conformes.

PLORES purpurei, pauciores quam in E. thecadiifolio.

CALYX subcylindricus, imbricatus, basi vix pubescens: squamis omnibus lanceolatis, acutis, nervosis, margine attenuatis, ciliatis; exterioribus minoribus et corolliferis.

FLOSCULI numerosi, vix longitudine calycis, tubulosi, superne ventricosi, nequaquam angulati, ore quinquefido; laciniis credlo* patentibus, obtusiusculis, integris, extus dense pubescentibus.

STAMINA. Filamenta brevissima. Anthera inclusae*

PISTILLUM. Germen parvum, obovatum, incurvum, striatum, glabrum. Stylus exsertus, vix bifidus. Stigmata patentissima, obtusa, purpurea.

RECEPTACULUM subconicum, punctatum, nudum. Semina- figura germinis, fusca. Pappus longitudine fere corollae, oculo armato vix manifeste scaber.

Obs. Structura florum in hac et praecedenti valde similis est, quamvis plurimis notis diversa, ut e figuris et descriptionibus nostris intelligi potest.

EXPL. TAB.

* Flos parum auctus.

^ Squama calycis magis aucta.

c Flosculus.

d Corolla stylum exferens feorfim.

e Dimidium calycis cum receptaculo minus aucto.

f Receptaculum feorfim magis auburn.

Jf



Stachelina ilicifolia Linn.

STAEHELINA ilicifolia, Linn.

SYNGENESIA Polyg. aequalis. *Difcoidei*.

CHAR. ESSENT. *Receptaculum* brevissime paleaceum. *Pappus* ramofus five filius. *Anthera* caudatae.

STAEHELINA arborefcens, foliis oppofitis breviffimè petiolatis cordatis dentatis fupra lucidis fubtus tomentofis. Linn. Supp. 358.

In Novae Granadae beatiffimo folo invenit Mutis. J?

ARBOR vel Frutex foliis fempervirentibus, lucidis, difcoloribus, fpe6tabilis; ramulh teretibus, pubefcentibus, denfè foliofis, apice floriferis.

FOLIA oppofita, breviffimè petiolata, patentia, uncialia, cordato-ovata, obtufa, margine parum revoluta, grofsè dentata, reticulato-venofa; fupra viridia, glaber-rima, et quafi vernice illinita, ut verbis Linnaeanis utar; fubtus denfè lanata, alba, Petioli craffi, pubefcentes, incurvi. Stipula omnino nullae.

PANICULA terminalis, fubcymofa, denfè lanata. Pedunculi teretes. Braftea lan-ceolatae.

CALYX hemifphaericus, fubcylindricus, imbricatus, vel potius calyculatus: fquama . oblongs, extusdenfiffimèlanatae; fuperne margineque membranaceae, denudatae; apice lacerato-ciliatae; port florefcentiam arfte inflexae, perfiftentes.

FLOSCULI numeroſi, lutei, infundibuliformes, quinqnangulares, glabri; limbo quin-queſido, obtufo, erefto.

STAMINA. Filamenta capillaria, alba. Anthem inclufae, obtufae, conniventes, bafi bifidae et filamento lateraliter infertae, flavae.

PISTILLUM. Germen oblongum, quadrangulum, glabrum. Stylus ftaminibus paulo longior, apice bifidus. Stigmata divaricata, obtufa.

RECEPTACULUM planiuſculum, denfè paleaceum; paleis brevibus, rigidis, plerum-que bifidis vel trifidis. Semina figura germinis. Pappus corollà brevior, plumofus.

OBS. Nefcio quis ſcrupulus Linnaeo filio injeſtus fuerit, ut dum hanc ſtirpem in Supplemento tradtaret, de genere ejus dubitaret. Cum St. Gnaphalodis, e qua genus olim conſtitutum eſt, charaſtere omnino convenit, neque habitu multum abludit. Specie differt ab Elichryſo arborefcente, Illicis cocciglandiferas folio[^] Plum. Cat. PI Amer. 9. Jc. Burm. t. u&f. 2, quae ejufdem generis eſt, quamvis a Burmanno ad Centaureas malè relatum;

Expl. TAB.

a Foliolum calycis.

b ————— au&um.

c Flofcultis.

d Idem au&tus atque pappo orbatus.

e Semen pappo coronatum.

f Pappi portio magis au&la,

g Germen cum ftylo.

h Stamina cum antheris.

i Receptaculum cum foliolis aliquot calycinis.

kk Paleae receptaculi magis au&tse.



Asplenium rostratum?

ASPLENIUM *refedum*.

CR Y P TOG AMI A Filices. *Fruftif. in pagind inferiors*

CHAR. ESSENT., *Fruftifikationes* in lineolis fparfis. *Integumenta* e venis ortum[^]ducen-
tia, verfus coftam dehifcentia.

Seftio * * * *Fronde pinnatd.*

ASPLENIUM frondibus pinnatis: pinnis trapeziformibus acuminatis incifo-crena-
tis pofticè integris.

In Infulâ Borbonias legit Commerfon. *TAoum. n.*

RADIX repens, fquamofa, nigra, intus alba.

FRONS pedalis, lanceolata, ac[^]ta, pinnata, tota glabra. *Stipes* teres, atro-fufcus,
nitidus, rariffimè fquamulis pauciffimis raris inftruftus.

FOLIOLA numeroſa, alterna, fubfeffilia, patentia, uncialia, elongato-trapeziformia,
obtuſè acuminata; bafi pofticèque integra, hinc ac fi ad nervum refefta fuiſſent;
anticè apicèque inasqualiter incifo-crenata; venoſa, venulis bifidis; inferiora ple-
rumqueoppoſita: impar elongatum, ferè lineare, alternatim ferratum.

LINEOL[^] FRUCTIFICANTES *dux* vel tres, rariffima quatuor, apicem verfus foli-
olorum, plerumque inter marginem pofticum et nervum fits. *Integumentum* mem-
¹branaceum, fufcum, e ven& quadam femper ortum ducens, interiùs, vel nervum
verfus, dehifcens, margine integro, undulato, nunquam reflexum.

CAPSULE fufcae, nitidè, annulo articulado circumligatae.

OBS. Chara6teres genericos filicum, ex modo quo dehifcunt florum integumenta,
interiùs nempe vel exteriùs, primus reformare conatus fum; quâ de cauſ[^] herba-
ria qu« potui omnia *evolve*, ut ſpecies, quantum res finat, ad genera naturalia re-
feram: fed de his rebus aliâ vice plura dicam.

EXPL. TAB.

a Folium feorfim.

b Fruftificatio membranâ tefta, duplo aufta.

c Capſula annulo cindla.

d Capſula cum annulo elafticè diffliente.



Splenium monanthemum Linn.

ASPLENIUM monanthemum, *Linn.*

ASPLENIUM fromHta pinnatis: pinnis trapeziformibus obtusis ferratis poftici in.

ri, line* fructificationis fubfolitaria.
to,

A. monanthes, f ondebis pinnatis: pinnis trapeziis obtusis fupernè crenatis, linea
fructificationisunica. *Linn. Mant. ip.*

Habitat ad Promontorium Bonae Spei. *Linn.* %

re ens, fquamofa, nigra, intus rufa. *RadkuU* glabriufculae.
RADIX P

FRONDES ^{ot-r/p.} numeroxj ^{ad}fcendentes, pedales, fsepe tortuofae, lineari-lanceolatae, acu-
tae, pinnatae, glaberrimae. *Stiptes* iubtetragoni; fupra plani marginibus acutis;
4. ifmli • atro-fufci, nitidi, omnibus partibus glabri.
fubtus teretiucuu, r o

FOLIO A numero ^{ma} fubalterna (in icone noftra nimis oppofita in fuperiori fal-
L arte de ^Pinguntur), feffilia, patentiffima, femiuncialia, trapeziformia, ob^utufif-
fima, haf Pofticeque integra; antice apiceque ferrata, vel acute crenata; venofa;
inferiora oppofita.

LINEA FRUCTIFICANS folitaria (vix ac ne vix unquam du* inveniuntur) medium
fus folioU fita, inter marginem pofteriorem et nervum. *Integumentum* membra-
V6rUS of, fmm venute infidens, nervum verfus dehifcens, margine integro,
naceum> ruicumj
undulato, nunquam reflexum.

CAPSULÆ fufcae, globofe, annulo articulate.

differt a pr^ucedenti ex diftis patet. Utraque in Herbario confudit
OBS. QS^{an} ^mg dum caIamQ nimium feftino Afplenium noftrum *refedium* Afpl.
Linnaeus nius, . Folioloru^u figura quafi dimidiata in his duabus fpecie-
monanthemum fenpnt.
bus maxima notabilis eft.


EXPL. TAB.

a Foliolum feorfim.

b Fructificatioafoliolofeparata.

c Eadem aufta.

i Capfula jam dirupta, cum annulo.



, /i/c,r./At lit /f/v/u/fetal [Tun 11

ADIANTUM triphyllum, Comm. Mfs.

C R Y p T O G A M i A Filices. " Fructif. in paginâ infer

CHÂR. ESSENT. *Fructificationes* in punctis subrotundis, distindlis, fmarginibus
Integumenta e replicato-marginis frondis, interius dehifcentia.

Se&io ** *Fronde compositæ.*

ADIANTUM fronde triphylla: foliis fevilibus lanceolatis pinnatifidis crenatis.

A. triphyllum. Lartierck. *Encycl.* 41.

In agro Bonariensi legit Commerçon. Thouin. n

FILICULA pulcherrima, tenera, fphamsea, tota glabra*

STIPES (implex, erectifculus, fphamaeus^ filiformis, niger, nitidus.

FOLIOLA ternata, fevilli^ patentia, uncialia, ferè aequalia, lanceolata, acutifcula,
irregulariter nee profundè pinnatifida, grofse crenata, finibus bafique cartilagineo-
marginata; fupra viridia; fubtus albida, nervo nigro, nitido, flexuoso, ad bafin
validiffimo, folioli medium verfus evanefcente.

FRUCTIFICATIONES folitariae. in apicibus crenaturarum, fingulae fquamâ tedte subro-
tunda, membranace^, a fubftantiâ folioli distinaiflima, extus fufc^, intus, mar-
gine tenuiori, pallidiore, repando, dehifcente. *Florum* vel *Seminum* ftru&ura non-
dum innotuit.

OBS. Hujufce filicis non ni(i unicum vidi exemplarium, quod in tabula duplici
afpectu, anticè nempe & pofticè, prout res filicina poflulat, vifum eft fiftere.

EXPL. TAB.

a Portio marginis folioli cum fquamis fructificantibus duobus in (itu naturali tri-
plo auctis.



Fucus inflatus Linn.

F U C U S inflatus, Linn.

CRYPTOGAMIA Algae. Aquatic**

CHAR. ESSENT. *Fruffif. fam. Feficula adperfae granis immerfis apice prominulis, Sem. folitaria.*

Se&io—Alati^feu Fronde plana, Jlipite medium percurrnte.

FUGUS frondè plana alata dichotoma integerrima pun&ata inflata: apice divifo.

F. inflatus. Linn. Sp. PL 162 j. Syfi. Veg. ed. 12. 715. Fl Lapp. n. 468. Light/. Fl. Scot. 910.

In Bodotriæ rupibus marinis, non longè ab Edinburgo, copiofiùs crefcentem inveni menfe Junio anno 1782. In Finmarkiæ oris legit Linnaeus.

RADIX nulla, bafi enim ftipitis paulum dilatati rupibus firmiter affigitur, nutrimentum vero ex aqua, per totam frondis fuperficiem, modo congenerum haurit.

STIPES fubcompreffus, brevis, niger, bafin verfus faepe foliolofo-prolifem

FRONS fubpedalis, ereftiufcula, fubinde fpiraliter contorta (Linn.) dichotoma, obtufa, integerrima, bafi tandem ferrato-lacera, apicem verfus papillofo-punftata, atque hinc inde inflata; recens tota atro^olivacea, glabra, nervo medium percurrente.

FRUCTIFICATIONES, quas Linnaeus nunquam vidit, prope apices laciniarum frondis ^paffim collocantur, e congeriebus irregularibus feminum vel capfularum, utrinque prominentium, confantes.

OBS. Nondum me fciente in littoribus Angliæ meridionalibus inventus eft hie Fucus. Celeberrimus enimvero Hudfon varietatem aliquam Fuci fui ceranoidis ad F. inflatum Linnaei refert, fed ilia fpecies enervis a noftra longè differt. Gmelin F. inflatum Linnd, a fe ipfo non vifum, ad F. veficulofum vulgarem hypotheticS, ille malè, retulit, cujus opinionem amplexus eft optimus nuper defundlus Lightfoot, qui et defcriptionem egregiam addidit.

EXPL. TAB.

a a Fru&ificatio.

b Veficula frondis tranfverfè fefta.


m 4i

DIANOTANIC GARDEN,
LIBRARY.


PROCESSED




ACCESSION



CATALOGUING



CLASSIFICATION



DATE

28.7.64

SMC

BOOK CARD
Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

Call No. 8y8j, Ace. No. B/540
Author Smith, T. E.

Title Plantarum Icones.
Fas. I.

Name of Borrower/Code No.	Date of Issue	Date of Return

INDIAN BOTANIC GARDEN LIBRARY
BOTANICAL SURVEY OF INDIA