

Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS NO. 582

BOOK NO. DEC-P

ACC.NO B.413

**PRODROMUS
SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS.**

PARS VII

On trouve aux m^{es} mes adresses •

- D* CANDI^TLE — *Prodromus systematis naturalis regni vegetales*; in-8. Tomi I, II, HI, IV, 'V, Ml. 1824, 1 i837 96 ft.
- Collection de Memoires pour servir à THistoire da regne vegetal, et plasspé- cialeiuent pour servir de complement à quelques paities du *Prodromus*.
- Pieraier Mémoire : sur la famille des *Mélastomacées*; in-/- aver 10 Planches. 1828 ^ xofi.
- Second Mém one : sur la faimle de\$ *Ci assulaçees*; m- 4 avec 13 PI. 18a⁰ 10 fr
- Troisieme et quatrieme Memoire[^]: sur la famille des *Onagraires* et des *Paro- ntucluSes*; in-4 avcc (J Planches 1899... 1 08 ii
- CinquiemeMtmoire: sur la famille dts *Ombe!hférès*; in'4. avec 19 PI. 1829 1 J fr.
- Sixieme Memoire sni la famille des *Loranthacees*; |n-b. Brec ia PI. i830. 10 fr.
- Septieme Memoire sur la famille des *VaUrian't'es*; in-4. avec 4 PI. i83a. 5 fi
- Huitieme Memoire : sur la famille des *Cacties*; in-4 avec ia PI. 183J{ . 10 fi
- Les Meraiores IX. et X, relates a la famille des Compostées, sont sous presse
Us cloiront 1c \olnmede cette Collection.
- L'auteiir n'ayant pu, m dans Ic *Pradromets*, m dans le *Cours de Botanique* qu'il vient de publier, donner sur cci tains points de la science les developpemens qui lui parjissenl neccessaires pour fixei l'attention dcsbotanistes, a cru devoii publicr separemcnt unc scnc de Memoires servant d'elaucissement aux deux ouvrjges ci-dessus mentionnes, »t dont dix foimeront un volume Get ouvruge, atcompaj,ne dc pljnclics , et de même format que Irs *Memoue&du Mu- ste d'Histoue naturdle*, seja douc , a propicment parki, le *Commentaire du Pi^ddromus*
Cheque Memoire sc vend srparem(nt.
- *Regni 'vegetabihs Systema naturale, sive Ordines, (Zenera et Species Plantanun secundum methodi naturalis no? mas digestarum et desenptarum* "Volumen pri- nctum . Sistens Prolegomena et Ordines quinque, nempe *Ranunculaceas*, *Dille- maceas*, *Magnoliætas*, *dnonaceas ct JUcmspermeas*, in-8. de 568 p. 1818. 1 a fr> , Volumen secundum: Sistens Ordines sex, nempe *Barberidas*, *Podophyllas*, *Nymphceaceas*, *Papaveraceas*, *Fumariaceas et Gruciferas*; m-8. de⁵0 pages, xgai i5 ft.
- *Astragalologia, nempe Astragali, Bi ser mice et Oxytropxdis Histona*; enm 50 tab. sencis, 1 vol. petir m-folio '1804. 54 fr.
- Le même ocfvrage, grand in-folio, papier vhn superfin double. c6 fr.
- JAUME SAIWT-HILAIRE — *Exposition des Families naturelles et dc la Germination des Plantes*; 4 vol gr. in-8. a\ec 117 planches en noir. i805. 36 fr.
- Le même; ouvrage, 2 vol. in 4. Planches en conleur, papier ordinaire . 96 fi.
- Le même ouvrage, 2 vol. in-4 Planches en-conleur, panjer ^elin.. . 19a fr.
- HOMDOLDT i A.) et BONPIAND.— *Plantes équinoxiales recueilhes ait JMexique, aux Andes de la Nouvelle-Grenade et au Ptjou*; par MM de Humboldt et Bonpiand, avecclenr description; 17 livraisons form ant a vol. in-folio, avec 144 PI. (Onvrage complet). ^{500 f}».
- HOOKER (J.) et GRKTXT,LB (R. K.). — *Jcones fiheum: ad easpotissimum Species illustrandas delineates, qua hactenus vel in herbarus dehtuerunt prorsus mco- grutce, *vel saltern nondum pericones botanicis mnouerunt; cum tabuhs amcis Le texte m him, avec aJo planches, a vol in-fol. Londres, I^3I. (Ouvrage complet.) Les planches en noir*. 360 fr.
- Le même ouvrage, les planches en conleur. 600 fi
- WALLICH (N.), smintendent du Jardin horamque de Calcutta. — *Plantar Asia ticce rariores*, on Descriptions et ffiguies d'un choix de Plantes medites de L'Inde oiientalc; 3 vol in-fol avec 300 planchts tiessoigneusenicnt coloriees, le texte en langue latme. *Londres, 18S0 a i83?*. (Ouvrage complet). 0,00 fr.

PRODROMUS.
SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS,
SIVE
ENUMERATIO CONTRACTA

ORDINUM, GENERUM, SPECIERUMQUE PLANTARUM

HUC USQUE COGNITARUM, JUXTA METHODI NATURALIS NORMAS

DIGESTA ;

AUCTORE AUG. PYRAMO DE CANDOLLE.

PARS SEPTIMA:

SECTIO PRIOR

Sistens Compositarum tribiis ultimas et ordinis Mantissam.

PARISIIS,

Sumptibus Sociorum TREUTTEL ET WÜRTZ,

via dicta de Lille, n° 17.

VENITQUE IN EORUMDEM BIBLIOPOLIO,

ARGENTORATI

M. Dccc. xxxviii



AVIS.

L'IMMENSK famille des *Composées* s'étant trouvée accrue de plus de trois naiile espèces décrites pour la première fois dans ce *Prodromus*, et la difficulté de distinguer entre eux un si grand nombre d'objets ayant obligé à r^ndre les phrases caractéristiques un peu plus explicites, il en est résulté qu'il a été impossible de renfermer la totalité de la famille dans les deux volumes qui lui étaient primitivement destinés; nous avons cru faireune chose utile aux Botanistes, en publantimmédiatement la première moitié du tome VIP, qui complète cette famille. LS* seconde moitié, qui paraitra plus tar'1, complétera la grande ^lasse des Dicotylédones Calyciflores.

Outre les descriptions de Composées données dans le *Prodromus*, M. De Candolle a cru convenable de publier des figures des genres nouveaux ou peu connus, soit dans le IV^e volume des *Icones selectee* de M. Delessert, soit dans la IX* Dissertation de la *Collection de ses Mémoires* *. Il a cru aussi, dans les IX^e et X^e Mémoires de cette Collection, devoir présenter les résultats généraux sur la classification méthodique et la distribution ḡographique des Composees, résultats que la forme abrégée du *Prodromus* ne lui permettait pas d'y insérer. Cette Collection renferme ainsi sur diverses families, d'un côté les planches et descriptions spécialesde plusieurs espèces peu ou point connucs, de Tautre les considerations generates et philosophiques relatives à ces families, et sous ce double rapport elle sert de complément et de développement au *Prodromus*.

N. B. Les huit premiers Mémoires de la Collection sont publiés ; les neuvième et dixième Mémoires, relatifs à la famille des *Composes*, sont sous presse; ils clorront le volume.

* COLLECTION DE MÉMOIRES POUR SERVIR A X.'HZSTOIRB DU RÈGNE VÉGÉTAL , et plus spicialement pour servir de complément h quelques parties du PRODROMUS RBGNX VEGETABILIS ; un fort volume in-4⁰. enrichi de 99 planches gravées en taille-dooce. Paris, Treattel et Wiirtz, z8a3 k 1838.

PRODROMUS

SYSTEMATIS UNIVERSALIS

REGNI VEGETABILIS.

CONTINUATIO COMPOSITARUM

-- --

Subord. **II. LABIATIFL0RÆ DC, //v>. in it. gall, lect. jamiai.**
1808. *el edit, in ami. mus. Par. ig. (1812.) p. 5y. Dón tirtm
linn. soc. 16. p. 184. T~ Clianthophl0r0j Lag. amcen. h̄ip. I:*
(1811) p. 29. — Perdiciese Spreng. syst. 3. p. 358 et 5o 1.

Cor. pleracque bilabiata, labio exteriore 3-rariūs *4~lobo. interiore
2-iido seu bipartito, rariūs Indiviso.
< > ?

**Trib. VI. MXJTI SIACEJE Less. syn. p. 92. — Mutisiae less, m
linnced]830. p. 23^.** — Mutisieae et Carlinearum gen.r Cass.

Capitulum heterogamitrii, rarissime dioicum, floribus foem. hcrm.
seu neutris, uni- aut pluriserialibus in anibitu. Tnvolucruiu imbrica-
turn. Recept. nudum. Cor. staminigera bilabiata aut irregularis, rarò
regularis, teem, ferè nunquam filiformis. Anllieræ rigidap, alis lalis,
rarissimè ecaudatae. Stilus bicdus superne nodoso-incrasatiiis aut
rrassus, ramis extus convexis et]>uberculis, nunc brevissimis nnn
elongatis truueatis, ix ilivcrpentibii^ aut cicells. Pappus perfects
multiradialus.

Subtrilj. I. HUTISli 1 linn*in i830.^/. 2\|. ijn. p. 98.

Capitulum rarissimt¹ i-florum, saepius floribus foenMn.i-serialibus in ainbitu,
cactens hennaphrod. Stylus cras^us » ratals extus valde cono\is, in herin.
extus a?què ac siyli pars supei. pubeulis aut glabris. Pollen sacpis ireve
ellipticuni. — Frulicesaut beibae miajores, tapilulis sp-ciosis nughis.

Dn. 1 B/IRNXDI <jr r.

Antheiac ecaudal.i.

D1G0TYL. SEU EXOGEN7E.

DCXCVIII. SCHLECHTENDA.UA/; <? «. inlinnced i«3o. p. 7.|i.syn. p. 9,3. non WUld. (i) nee Sgrcng. (a).

dpituhim homogamurn discoidcum r^qualiflorum nniftiflorum. Invol. carujjamilalo-tnrbinationi, squamis niultierviis piJosisciliatis, ext. pungcnlibns subfoliaccis, int. coriaccis Jincaiihus iuerinibus. Recept. Hrnhrillifrtum. Cor. paimata subcoriacca, tubo inliis laciniisquc extiis sericeis. Anth. inclusa? ccaurfata?. Stylus longè exserlus breviter bilobus. Achænum turbinatum breve erostre longè densèque villosum. Pappus i-serialis paleaceus longus, paleis subintegerrimis inæqualibus. — Herba perennis, radice fasciculatâ, caule simplici sericeo-piloso tereti. Folia ad collmn conferta et secùs cuulcm 3-juga sessilia multincrvia lincaria acuminala parcè viloso-sericca. Capitula terminalia. Cor. aurantiac;r.

i. S. LuzLhFOM/Y (Less.! 1. c p. 243. f. 5o-J5). % in Brasiliâ meridionali (Sollow!) in cellihns siccis ad osHam fl. Sanctaj-Laciae et ad Montevideo (Tweed, ex Hook et Am. comp. p. n o). Herb* 9-24 poll. aha. Folia 5-t& jtoU. louga, 2-3 lin. lata. Cor. 7 lin. longae, (•, s. corara. à mäss. reg. berol.)

DCXCIX. 1JAIVNADKSIA linn. f. suppl. 248. Lorn. ill. t. 660. H. B. et Kunth pi. eq. 'J. p. £76. HOV. gen., ^p. i3. DC. man. mns. 19. p. 63. diss. lab. p. 5. Don trans, linn, soc ib. p. ^7'3. — Barnadesia et Diacanha Lag. Less. — Barnadesia et Bacasiic sp. R. et Pav

. Capitulum multiflorum bomognmum, Invol. turbinatum inultiserialc unbricatmn, sqnamis intci ioribns radiantibus. Ilccept. palcis tenuissimis piliformibus spiraliler torus'densè volsitum. Flores aut dissimiles exteriorca biligulati, la bio externo ampio 4-dentalo, hit. b'liformi, centrales tubulosi 5-dentati, aut^omnes bilabiati. Slam, iilam. aut omnium aut exteriorum monadclpba ! Aulkéras ccaudalae. AchiEiium turbinatum densfe senceo-vilosum. Pappus i-serialis^mmcubique plumosus, nunc in peripbaeriâ plumosus in disco ^ctis hirsutis subrigidis constans. — Frutices in Amer. ftustr. habitantes. Aculei sa3piis*slipulapes siJuiLui gemini. Folia allerna integerrima mucronala. Capitula terininalia. Cor.. purpureae viloso-sericcae. Pappus et recpt. pili fulvi. (renus Flotoviae et ChuquittJgcrafriic, sed ab ulroquc diversiim floribus omnibus aut plerisque bilabiatis et slaminibus (ul in Silybeis) moiadclp^bis.

Seel. 1. DIACANTHOIDES. — Barnadesia Less, in linnced i63o. p. S>J4
— Barnadesiae sect. 1. Don. I. c.— Diacantha Lag.?

St.imin.i monadolfrtia. Kiores dis^ynnonnulji tulmlosi.

1. 11. bFirosiA (Linn. f. suppl. 348\ foliis obovatis mucronatis nervosis utriiqne subvillosis, capitulis biibpnienlatis pu^esceutibus, inv. sqnarais exten'orilias ovatis acumiutis adpre&sit.) in Aiidibos TNovo Oianaten>>ilus_T Qijtensilius, Pernvianis (Don), in nemoubus IJrasilianis cxLcis.l. c p. 2|5. H. B. et Kunth pi. cq. 2. p. 17O. t. i3S. Ki-nli. nov. gen.*, p. u|. excl. Lam. syn. Don 1. c. p. 274. Pappus ctycLeorolla sua pluries longior. (v. s. ox herb. itin. Net.)

-x TI DOMKLTANA (Less, in Iipna3a,x83o. p. 946)/ob's oblongo-obovatis'subspinoso-iuocronatis ylabiis, capilulis raniulos teiniipaulibas solitariis,invol. squamis exterioibus ad press is niueiouato-ftpinuloijs. 3 iu Peruviâ. Barnadesia L>m.

(1) Schlechteudalia Willd ast Adcunphyllnm Pers. sou Dyssodiapsp. Cav.

[^]3) Schleclitendalia Spreng. est Mollia. Mait.

- ill. I. 660. f.i. needier Pappus disoi ex Lets, coojia soil brcior, recmvaiuu. (v. ».)
8. B. MEDIA (Don tr. linn. soc. 16. p. »^C>) foliis oboynfs mucronaia sobaveniin nrlintjne ssnsericeis, rapimlis corynii ~~oso-paniculatis~~, invoiti ~~is lanatis, sc;ia-~~ mis extricuiliuh limecul'aus mncronalis, iniimis revolulis, \$ in Peru viâ.
4. B. BBTiciiTATA (Don 1. c. p. 377). foliisi ellipiico-obldncis abrupte mucroM- laiis reliculato-M~~osis st~~ ibtoe sericeis, eapiulissubcorymbosis., iuvolncri sqna- mis adpressis nu<~~tidislii~~ mint is ereclis, j in >L';;f>is Tarmae Peru- vianoram. Cor. vill<~~osissima~~. Spi'isi htiritontaJitci patents.
7. B. LASC:EOT.ATA (lion 1.cj, fnlii ..liov.iio-laHi-i-oliiiiB mncronatis a-rcqiis, jnnio- ribnsutrii!(|ne sericeo-pnijcscputibus/odollia ulal>i's,capitelia soliarils sei&ilrbu;, foliis pancis bntcieati s, involacris subian; tis, [oamis oxt. ovais acomiatis denium revolotis, mtlmis ovatis acuminatis. in Antii Uns I'ernviae. Bacasia lan- ceolutn K. ct Pav. iuisi. Cor. ptirpureae, rndii 9.<i>)r;ulA fvrc pollicari fi-iiervi4 ^ extiis el apice villosa, disci tubilosac a-iiltre, l'olia polKcein lort^a, 4 lin. lata. Spinse recta fuliis ,iequolcs. (v. 6. ex Wvl'. Doiribey eoram. a mi s. reg. par.)

**Sect. 11. BACASIA. —Rateasfse sp. II. ct Pav. — Barnadesia sect. 2.
Don I. c.**

t

lil;iment;t monadclpha. Flos disci so litarius titulosns 5-dentatm.

6. B. roRYWBosA f Oon ir. lin. sqe. 16. p. 278), mennis, foli* sparsia ovato- lanceolatis acmiiinalis nervosis nupra ^labris sulitis villosis, capiinlis coryjabo- sis, in^olncri pubescculis yrjuani ex I. ovatis apnminntis adprefwis, in till) is ekmgato-liniMiibus apice patblili rnlanttbuK. fi'va Andiani ncriori>ns prtjpt! iMmia vicntn IVimue. Bacasia corymbusa R. ct I-av. syst. 1. p. 182. prod. 122. Flores perjpbcriae H-IO, tlisci i.T'ilau. tqldslntufl hiistitns.

**Scut. in. DUCANTIIA. — Diaoantba Less, in linnad 1830. p. 243.
nan Eag.**

Filamenta monadelpn;i. Flos tubnlosas mu ralis nullus, corolla ne mpe omnes bilabial tc.

7. Ti. AIUOKFA (II. B. ft Knatli DOV. jifti. /, p. 1T)), .iculeis axil:irilms reelis, /oliis ol}ov;Uo-nbloif;is irracronatis vi^idulis sn'pva ^labrinscnlis stibtos pnbe- centiliu.s, capitnlis solit.iriis icrmiDalibusflpjisilibus, involocri |mbescent!3sqm>nii<i exter. ovatis acuminato-subspinosis, internis elongato-linearibus. 3 in frigidis Qailcitsiiiri ad moateni Guaman. Diacantha nrliorea Less. I. <, [iarnadeaia spi- nosa WilW. hevh. non «lior. (v. s. <.uinm. a cl. Bonpl.)

Sect IV ? IVvnir.A Don tr, HTU>. soc. 16. p. 280.

T'ilam. siaminmn omnino Jibera, T'lns disci solitarins tuhulosns, — ;.n genus proprium?An potJiu L'lotovia] ppec?

8. B. I-AXA tlhm tr. linn, soo- IC. p. a80), spinosa dif:lus,- raraosksima , foliis ..., capinilis snbsolitai'iis scssilibnB, in\ol. sqnamis N-l- ovatis adpressis tnucronaiis, intimis erfctis radiatis. ") in Brasilia. Cor. bilabial arum Ubinra exter. 5-nervium, int. lh\cari-setaceooi; COUJO ceatratis lubtilosa 5-fida.

DCC. DASYPHTCLUM lf. U. ct Knruh nav. ^cn. 4. p- *7. (. 308. Kunth
syst.

Cnnititum homogaintim miiUiflorui discoideum. In vol. ovatojhe- inispftEerirum, fol. arete uiolacatis pungentibus, interioribus longiori- bus. Recept. dense pilosuni. FJ. circ. raaphr. Cor. profjaido 5-iirla ,Jobis lineariljus extus puberulis. Stam. fil. libera »i;bra, an- ilicr.T firtsei'Ue e^audaUr. Stylus exsertu.; mdvvisus. Acliaeuiuni oblon-

gtiw-comprcssuni erostrc srertcco-birsutum. Pappus l-uriflts plurmosus. — ArbuseuJa rajnis biriuto-lanatis. Aculei gemini pubcsecnics axillares poA fol. ttelapsu pcrsistentes, Folia sparsa con Icia ovaliaapice puri-; antiailrintpiescriceo-aj gentea. Capitula terminalia sessiia coiyinbosoc- congesta. Pili n i recept. aurei, pappi fuscescentes.

I., I), iRGENTEUM (H. B. et Kmuli. II. <>). 3 in siccis propè Nabot et Turche Qukenshim.

DCCI. FULCALDEA Poir. suppl. 5. (i9i%)p, 3;5. ill. t. tjs*. (re. H. ft Bonpl.) Less. in linn. 183f. p. ->Ja. f. 63-65. syn. p. 95. 1 Turpinia //, et Bonpl.pl. &/uin, r. (18c\9.)p\u 3. t. 3..nun Vent. — Vnigt™ Spreng. syst. • (i8>f3.) 3. />. 367 mm Roth, nee tiornsch. — DoDugietylig Cass.dtct. 56. (i8a8.)

Capital inn i -floruiu. fnvoiucnun subcylindraceum, squamis scarioso- Cortaceis adpressis imbricali s, exter. ovatis acutis, Inter, oblongis acu- nimalis, Co:-. sul)coria.cea cxtiis villpsa, mllis nd inserlioncm stam. liarbata, tubulosu , Fance noo distincta, loliirt 5 lubo hrcvioribus, mio subproflBidiis (issd. Anlbera: iriclus- eeaudatae. Stylus cxserlus gla- berrimus infra apicefri inciRSSatiis , lobults •>. aculis snbconcretis. Acliaeniuu cylindracciun pblongum sericco-villosiu]. Pappus plurmosus sequaTis 1-serial is, nalcis nnguslis acumtnalis. — Frulcx Peruvianus, tnuico spiitis bo^riuo. Folia alterna peUQiala obloii^i integerrima -la- bra. CapUula in paiculay terminales dJaposta. Pappus fiavesccns co- rolla lon'gior.—Ad CardiistccAs Kunlb, ad Carlineas Cassmi, ad Mu- lisiea3 Leasing reici'imi! va-YW. Gb-Uquiragae ailinis.

1. F. I, AI;HIFOMA (Poir. 1. c.). 5 » 'alidis Vmlium Perilvi^nortim inter Locar- <Jue et amneiu Macara. Tufpinia Inurffolia II. t>i Honpl.! 1. r. H. I, et Kunth nor.'gea. & [>• \'*- Voiglialaurifclia Sprcog, I. c. (v.a.)

•j- Species escclusa.

* TOMKNTOSA LJSS. z=: MOUOSIS tomentosa.

DIV. ir. EtJMDTISStE <.

AD liter to candalw.

Pappo plttinoso.

CCII. MUTISTA Linn. f. suppl. 5; R. ct Pav. gen.ft. per. 10; t. a3. Lam. HI. t. 690, DC. diss.lah.p. iO, £. 3. /'. 7. Less, in linnod tjsZq. p. ^f>i. Dun >• tin'soc. loud. 16. p. -ijg. — Guanrqma, A>1<phyllmn ct Mutisia Cass.dtct. 33. p. avs, opusc. phyt. 1. j. f. ... v7.

Capit. Ueterogamuin i«Dequalifloiu fals6 radiatum. Invnl. plur- sertale , squatnis integerrhnig planis trfabricftis , cxler. brevioribus. Re- cept. nudura*. L⁷l. disrt hennapl., djsci faeniinei. O T . Ijilaljiatse,, tubo 5-ioM5~nervioj in disco stihlubuJø æ, faueaatubonun distiocl, fi«ibi labio ext. 5-dent. inter. bipartito lobis linearibus ; radii labio exteriore amplio ligulæformi apice 3-dentato, interiore bipartito lobis linearibus interdum deficiente. Antheræ in fl. radii nullæ, in fl. disci exsertæ longissimè caudittat; fil.-tm. papillosa , in fl- radii aut anthers orbittse aut nullæ. Stylus cylindraccns basi Lumidus glaber brviter 'i-fidijs. Achsenitini rostratumcoslatiuia glabrum longum. Pappus bisei'vilisplu- raosus longus ajquaJis , paleis basi conferruminatis et idco unii caducis. — Frntices Sapiis sciimi entes k.ustr.-Ameican. Folia ulterna i>jnii,>

tisecta **ant** indivisa , petiole rommuni ant IUTVO inedio in **ci*rhum** sae-
pius apice **producto**. Ca pi tula solitaria pedunculata. **Florcs** purpurei,
rosei aut **flavf**. — Numerui uervorum cor. variat, uurapè quintus **ubi**
de more ordinis nervuli niarginales nervorum concreti, **decimus** ubi
nervuli marginnes distinct!, quicdecimus ubi **praef'er** ncrvulos inargi-
nates distinclos adsunt nervuli mediani.

§. i, Pi N HATTSECT JE", foliis pinnatisectis, **petio lo in < irrhum trifidum**
producto, segmentis integer/inn's pinnatnerviis, caule scandentc.

— **Mutisia C'a.ts. opusc. phjt**, 2. p. 96.

* irH'ohtcrisqnamis adpressis. —IULUSIA; sect. i^a Less. I.e.

1. M. GRASDIFT.OR\ (H. et Honpl. pi. equin. 1. p. 157. t. 50), caale scandente tcreti, foliis piiiati rtis, segmeiitia 3-/i~jugis peliolulalis oblongis subloa incano-toiueulojiis, inJimit suhicllcxsi.s niiuoribus stipulsfrmibns, capitulis louge peduncalatis, iovol. radio diuidio breviori cylindraceo, sqnamis adprcv sis. J/^siu Andibus Quirtdiensibus Q: B. el Knnih DOV. gen. 4. p. 15. Less. in linn.,TM J330. p. a6ti. Cor. Incarnatee. Capiula pcndnla (5 poll, lougfj, Pendanc. 8-poll. — Eadem dicitor ac M. Clematitia a cl. Don tr. lin. toe. 16 p. 303.
2. M. CLEMMTS (Linn. f. suppl. 373),'canle scandente tereti, foliis pinuaiisectis, se^mcuiis 5-jugis bcvissime pctioUtW sen snbseasilibaa sobta's ca00-10-jnentDs. iniimis redexia brcvionlms Htipulsformibus involucre, edunc*i* fci longiludiuc et cor. radii ictia parlc breviori cylindracco', sqiomia ndpressis. 5^ iu Andibus temperatis IVruviaj et Nov.r (iianaUi*. Cav. ic. 5. 1. 492, Lam. ill. t. 690. f, r, II, \. el Kunth! nov. geii. 4> p- i5- Less, in linu;»a 1830. p. 266. Segmeut*j* Pol, nimis sessilia in ic. Cav. Peduac. i-pollicem Jotiyus. Da-
pitnUim a-poll. Cm'. purpu*a*. (\. a. comnr. it cl. Houpl.J ^H
- i. TM. PEPtwcui.AKis (Cav. ic 4. j>. 62. 1 691). e.iulc scudentp liercit, foltis pinnatisclis, segmerais 10-ii-jpgis sessilibua hincfol.tjs acuiuinatis glabris, pedanoulis involucro quiutuplo longiorabas, fvol. sqnamis alpressis. A ^ in Peravia prope S.-liienaventura. Tcduiit;, pedetu lon*i*, id iavol. orinm i-bacieali. (Jor. radii 8, iuvolocrnm paulo Mipei antes.
4. M. VICI^FOTITA (Civ. ic. 5, p. *Ot. I.* 490), canle scandente irreii, foliis pia-
natiseclis, segmenlis i3-i4-ji*s* sessitibba oblongis acuiitis*J*is gl*b*biis,n'e dunclo involucri <-irc. Inngitudini au<uali, inv. Kqaain*J*s :>iij.:essis. . .) in Chili propri Valparaiso < s. Cav. sed poliiis in Peru via ex *liuu* tr. Jin. MIC. 16 p. 263 et 303. L;im. ill. t. Oyo. f. a. Loss, in liuiuca *iH'io*. p. 267. *Pol. sf* menta approximata sabdeurrenti^, Pcdunc. 1*1* poU. lojigu*s*. *Flosc*. radii 6-
(y. s. sine II- ex li. Dombey a urn!, icg. par. comui. ,1
- ''' *Involucri sqnamis txtenorjhm sqitfrvris rejleMs patulis appendiduhitisvi* —
Mutisiastram Less. I. c.
5. M. ACCMISATA [R. M Pav. syat. 192) , eaule scandt-nie tereti-anulato, (bliis pinna *sectis*, segmentis sessilibus laaceolatfs acnminialis glabris, involucri fiy-
ramidalis iaimgh'osi sqtianijs extctii.uibiis relli-xis. fy ") In prJeraptis uollibuf, Tanu;i- et llamocji-i v. \ n^<> Ckhichiu-Cidma Doni- soc. lin. ifl. p. a6₄. Pe-
dune, (olio {^pposiii. Cur. radii 7 aureas, disci plures i amme ex R. et J':\, mss.
- i\). M. srEi CROSA (B. !.. hot. ijaag. I 2705), raulc scandenie pentagono aptero, foliis pinnali *sectis* g labriiK-nlw, segmentis 5-jugis ellipteo-nMon g acutis dis-
tantibns Ijas i an-pusiutis subtis aia<hnoi(*leis*, pedunculo invojuerp cylind raceo qnadroloplo Longiore, inv. sqnamis etter. -/,-,r*is* acuminatis:,,;,, j,,, ,,,ibus 7 floribus eliam mdti glabris- J ") in Brasilia ad Rio-Janeiro (Gaudich.) s.,,,; a d'EstreTla, Sauctu-Catbarina , etc^Lcas, iu linn. 1830.p. afig. I „iid. I ot. cab. Cor. Invol.
- I t. lUatj, JM nrachnoidea Dqii Irl ImD.spc tfi. >. -i(i, incarnate, l
, tin. louguui. i \

7. M. ~~de~~^{tit}ATA, canle'scandente angnlaio laic sublunngiruj»o, foliis pinnatisectis, segmemis ovatis vix nmcronatis subiiis toiuento albido persistente vestitis, capilulia pcdJceUatisovato-cyliodi ~~racceis~~, tnvol. sqnamis infer, lint;:jii-subulalis a basl ad apicem subtus tomi'mosts, mediis ovatis acnimnatis, suiumia ovaiis motioia ad apioem auhtiu tomeiijojiis, cor, radii snbts lomentosis. \$) in Brasilia legit cl. Sellow. M. speciosa *ft* dcatbata Less.! 1. c. p. 369, Cor. purpareo. Antherae aeride albw. (v.js. comm. ;t mns. reg. berol.)
8. M. oocctssA (S.-llil. voy. Diam. t. p. 186), canle debili angalato^Uccide tourenl ~~oso~~, foli iispinna ~~tisectis~~, segmentis ol tipgo-lanceolalia basi obtnsisapico imicictuilihs obscure dentalia subtos dense ca iortomt-ntosis, rainisapice cirrhom BphyHam gerentibosj ~~III.V.~~1. cyiindiici sqnamis infcviorilxis subovatis aenminatis ap*ice loinrntosis reQexis, super, obloogis, ctvf. radii labio exler. snbtus toneatoso. /) insyti s ~~cædoris~~ pruv. S;mciL-Pauli tion lotige ab arb-Hytu. Cor. radii polchrecoccineto, disci armemucei, Anih. nigricautes.
9. M. MinnnpnYLLA (NVilld. beib.), r-anle scitodenU- angabrtu nptero, foliis pln-Datisectis, segmentfa 4-5-jupis'malts nnici'miaiis bitsi obtnsis siihls dense to-iirnioso-laTians*. . . ij } inter Qnilo et mnnr. ii^iv. Picbiocha cl. llunib. et Bonpl. legeront MKC Jl. M.sptciiH;i microjibylla Less, iu liim.-a IS!JO. p. 269. FoL Kgm. 9 liii. lon^a , 6 lin. lata. (v. s. sint 11. coin ill. it cl. Boopl.)
- *o. M. cAMrAWutATA (Letti! in Iniaea i83o. p. 209), canle scandente angutato-alifo, alis siiiiato-untilnltis, fuliis pioDatisectis, segmcalis 5-fijn^iti ellipiico-oblongis se\$<nltbu5 <idl>ltu ftradanoid«is vix mucronulatisfeasi angustatie, in li in is (Iffirvis stipolieforiijibus, inv-i~~tauci~~ ca impatinlati sqnamis aplce rellrxU, cor. radii ligulls subtis lomeiitoas. 3 Vⁱⁿ I^r-siliä (So How!), to sylvis prov. Mi-naiani ptner. ct Sanctt-Pauli (S.-Hil. voy. Diam. t. >. 387). Pednucala v;riat 3-19. poll, longus. Cor. radii ~~coccineo~~ bipoUicaw*, mine mere liguiani:, nunc bilabiate, (v. s. coium. a pins. reg. ber.)
- ti. M. LAWATA {R. ctPnv. syst. 111.¹ ^fH. pi. t. a')), cauleficandente (-an^ulalo ~~alacto~~, foliis piunati.tectis, ~~segmentis 6-7-jugis lanceola~~ ^K decorrentibins subtus dettselanatis, in»s sttpula-foruiiins, iavolucru suurotnnili sqaiimis appendicnlatis cirrhosis. \$) iri Pent via; nemoribm pfoptManavicQBa inPoz.uzo via. Don 11. lin. soc. (6p. afit. Sci^m. foL ~~•••~~ \ |oll. lonya, G-8-lin, lata. Pedunc. spili.amai. Flosc, radii 18-20 bilabiat.
- §. ?.. Pi NNAT 1 vENtftAi, 7oi«J *Mssilibus *sap 1 us amplexicaulibus, plants f pinnatini*n'iis grossc sisinatate dendeh,fia (ifitr gahgeniive > iicryo media in tirrkvm simpticem bifldunwe ptoducto, caule smndentc.* — GuariruiMe et Aplppliylli sp! Cass. —• Guarlruma et OdonlopLyUuni Less.*
- 2. M. nucunntss (Cav. ic. i- p. Gj. t. 467), caule :icandente subnnglnfn folio-ruin decurrentjis mbalaio, ioliis sessi libds utroqfnt m»rplne (tt<m i.utibps Ian-ceolato-line, j ibiss !), ui integerrimis, inferior'bus :id I^{asim} p^o.nci'l fintflis, III -i'n In ,ii-ilimo bijduu producto, involucri ovnti sqoa mis adpress isovalis appi'iidicnhist.liisis. /) in Chili austifilis prais monl ~~an~~ diuin ad Aut-nt.; (Po»pp.i . Less, in linn; 183o. p. 273. M. belianiba Pu-j>p.! exs. •. 840. Media inter dentatas et integrifolias. (v. *)
13. M. ~~suspens~~^{sp}OSA (Cav. ic. 5. p. 64. t. 49V), caiilc"s«aijdente teretHnbalao, folii.i sessi iiiiisi. basidcurreutibcis In ~~ceolato-lineari~~ baa dentato-spinosu glabiis, nervo iu cirihom simplicem produutto, iuvalacri t-yliadracej sqi^smis appendicolatis. fy ^) in Perovii propc Gaaamantanga (Cav.l, iu Cbilt ;K1 villani Viecziam (Hook, misc. i. p. 10.). 7), et i³ excelsis Cerdilleris adXalcaregajS (C. Gay!). Ca:j,inilt;ni amplam. Li^ula? aurex. (v. s.)
14. M. RETRO.ns, 1 <;\ .1 ic. ». p. 65. l. 498), ci'u\c (candete tereti folionim ~~et~~ etirrcntia sqbjilrito, roljis s^osililius decarrefliibn ^{lanceo} larn-lim ^{carinus} runci-natis subtus tomentoso-lanatis, nervo in cirrhum simplicem produutto, in vi-

lucii cytiidracci aqnamis inferloribas appendicnlatis an^H>)is rdlexls. 3) in extrema Americfi anstr. ad porttmi Desideratara, in Chii ad villain Vicunzaoi, Mendozâ, Sanciuni-Isidorum^el in Patagonia (Hook.). M, runoinata 1\ ilil. :], 3. p. uo6g. Don ir. lino, soai i*ci*. p. -it'''- Hook. misc. 1. p. 8. t. 5. (v. s.)

15. M. SIHDATA (Cav. ic. 5. p. •' 1 -r.i'i;, (fsnte scandeote Ireti foliorum decurrentiis subalain, foliis aejisilibs decurrentibts laoceola to-linear ibus si-miatO'dentatis gbibiinsnlis, rtervo in rinlmm simpljcem proriactp, j'nvollii ori cyiindracei squamia uppclice liniari-siibulata aacts ousnibiis :ere adpreasis. t₁ ^ in Chili moDiSbuK del Plancboe et.del Portillo. Flores lutci -mt albidi ex Don tr. linn. soc. tfl. p. 267 et 303.—Var. loirieiUoati.el rubriflora à Cay. ci-tata est diversa et ad seq. referenda?

16. M. TARAXACIFOLIA (Less, in finnaa TR30. p. 271), ranle flexuoso terrli vix alato, foliis sessilibus angusti decnrrenliluis lanocoUto-úncaubua raucinalo-snuatis ntrinqne aracbflo.ideo-tyinentosU, uervo in macrouein (nee in cii*rham) pruducia . invoJticri cyJindraceJ sqiiamU Lite ovalis in apperidiceju bre vein subulatain producils. ^ in Cbiii 1xcelsis \n ii lms ad Talcaregne (G ay!) M. sinnata var. stihtoieutusfi Cav. ic. 5. p. </6- M. siiuata C/iv.! in b, J'hib. — Flures pnrpnrei. An U juiore saris differt? (v. s.)

17. M. ri,i;(iFoi.iA [Hook. hot. misc. 1. p. 7. t. 4). c^nlesrandente tereli aptero, foliis sessilibus cordato-cicaalibua r^ticnlati*ci* coriar<'is illi rgiae grosse spinoso-dentatis, atlalii ntlqnque glabris, iervo inedio in chrhuui producto, iuvol. oyali-obionfn'Bqnamift exter. ovatis apfce appendictihuis, inler. ob:usis-simis. 3 y in Cliifi ad Tii:ei7.ijin (Hook,), ad C&qaimbo (Macr.IJ,L<ss. syn. p. io'. Poepp.! PXS. n. 580. M. spinosa Hoolt, el Arn. coojp;, 1. p. 107. N<quit esse M, spiuosa K, cl Pav. qni expressis verbis dicunt canlem alatum. {v. s.)

ft- Cavanillei*fi*, foliis jin:oribus sulaiis piaticu-tomfnt'osis, invol. sij[i;iini.s nnn (?) appendiculatis. — in CliiU ad Plauchon et Cuclia-cucha. M. ill~t-ifolia Cav. ic 5. p. (i3. (., 93.
y. trimciii, foliis aordato-oblong imsi tt apiee spino.so-dt*ntntrs, invol. cy-liuhri'i. — in Chili. M. tnincata DOB traus Htm. HOC ifj.p.afy. Videtur M. ilicifolue setas juoior t'\ Hunk, el Arn.

18. M. spiitosA (R. ex Pav. syst. p. 193), caule scandente alis sinuato-tenr*is* instrucio, foliis sessiibtis ovatis grosse i inualo-ihntsniis on membranaceis subtus velutino-tomentosis apice stiliiiiMir.iiis, aei'vo ruedio in cirrhui simplicem producto, involtitfi-iovati squamis exteriori ban cordalis acnrainatialisabiua velutino-tomentosis. 3 y in Chili »j lvis monteis ad Arancu, Conca e! Qnil-Joia, M. butati Bcri. herb. Poepp, exs. n. 223 non Cav. M. auric•nlali) Kunze ex Less. Hock. i-i Arn. CCIIIJ. 1. p. 107. M. spinosa Less. in linnaea 1830. p. 271. (v. s.)

19. JV! LATIFotIA f Don Ir. (in n. soc. 16. p. 270. brit. II. «;trd. ser. a: I. 388), '•;nil« Scandute alis 3 foliaceis dentatis aucto, foliis sessilibus basi decurrentibus cordato-ovalihos al*pi*'(; 1 rotundatis aut emarginatis spinoso-dentatis integerri-misve su btus laijaiis, iaw. cylindrici arachnoideo-lanatis squamis exteriori-bus appendice ovato-lanceolata spinoso-mucronata patente auctis. 3 in Cibili ad Valparaiso (Vidgs.), et Collina (Macr.). Flores radii 1, rosei, disci circ. 30.

20. M. HASTATA (Cav. L. 5. p. 64. t. 494), caule scandente 4-:tato , alis sinuato-n-n tatis hjin¹ j^!;il;iris llinc lanatis, foliis sessilibus hastatis lanceolato-linearibus acuminatis integerrimis subtus cano-lanatis, nervo in cirrhui simplicem pro-diicit, irivoi- <:yiii!rioi squartiis apuniK*li*cce ovata deflexa ferè omnibus auctis. ^) in mouibns Chili Cordillera de! Plauchon dictis. M. sagittata Wld. sp. 3. p. 2070, Flores radii 10 purpurei.

§. 3. U&INEUVJ, foliis sessTuous non decurrentibus nec amplexi-caulibits rigidis Imca/i'subu/atis meninge re voliitis aul mrjssimc planis, H cirrhui simplicem ant mucroiem desinentibus, caule flexuoso erecto rarus scandente. — Guariruma et

phyll hsp, Cass.— Ilolojiliytlun el Applplijllum Less, in linnum
II. cc. et syn. j). 106. excl. sp.

" C\rtknfcne, foliis nempk, saltern snprioribts, *n cirrhnmproductis.

- s.i. M, SDBULATA (R. et I;tv. »y«. it)3. Less.! in linnsea i83o. p. 073), glabra, eaule ffexnosn-seandente teretrascalo aptero, foliis non dcurventibus Uneari-subnlatis margue t-pvlonlis rigtdolia, infciioribus apice mucronaiis, superioribus in cirrbuiti simplicum prodntia, invol. ryJudiici squamis i3-i5,iofe-riqribosbrevisimis appendix braviaabolati petalii aaelis. ^ / in Chili videlor Ireqiien, ad Coceptioneta, "Valparaiso, in ajlvaticia aprics collinm. M, inflexa Civ. ic. C>. I. 43 Hook, hot, misc. t. t. fi. M. rofinlata a. Cavanillesii Hook. et Am. c&ui. i. p. 107. Capil. radii 8 pmjnirci long! angusii. (v, s.)
21. M. ROSKA (I'03pp! exi. n. 676), erachnoideo-tomcntqsa, caole il«xaosn ;m-
gulato i'x Culii angaelissfrae decaurrentibns sabnlato, foliis patnlis [ineari-sabu-
latis rigid is margine rrvoohuis, inferioribas apice BUjcronato-aubapiuosia, sape-
riorfliasin cirrham lire vein sJmplicem productis, invol. cylinhit-i squamisg-io,
extiniis oratu iniobnis stibpatalis breve uppndiculi;lis, ^ in Cibili inier las
Cruxes et Ja Guardia de los Hornillos decemb. Oor. legit el. Ifiepp.! et ad Cam-
brc indium clastrnm cl. Macrae! Less. syn. p. 106. M. snbnlata 0 rosea Hook.
el Am, comjt. 1. p..tor. (lap. radii 8 rosei apice distinct tridentati. Capitn-
lulu dimidio uinus fjuani M. subulaUt*. (v, s.)
- i»3. M. BfiRTBttir, araebnoideo-tomentosa, caule flexuoso ex foliis angnstè tlecar-
renrbns alato-angatato, foliis liuearibns margine revolntis, inferioribns in mn-
cronicu rectum spinescentem, sDperioribas in cirrlium b re vein productis, in-
volucr cylindrici Mjuamis I3-I.1, inferioribos feri Omnibus appendic angnslc
inncronironii snbpcatec anctis, / in saxosiH rujicsiribus muntiinn seenis fln-
men od Rancagua Chilepsium legit cl. Jlertcro! Invol. 5 lin. longnm. Flores
railii 7-S finvi! An M. Mibulata y major Hook, et Arn. cump. 1. p. tog lmjiw
i'orte var.? (v. s.j
22. M. TUIDKKS (Papp.! exs. n. S79. Lew.! syn. p. Io5), < aiilc "labnuscnlo hinc
inde ad basin foliorfn ilotcoso-tonientoao Qcxnoso tt-reti, foliis lato-linearibts
rigidis non decaurrentibus subtus tomentosis margine revolutis apice cirrhiferis
et sub cirrhi origine utrinque dente unico notatis, invol. cylindrici squamis
infer. non cordatis in appendicem subulatam patnlo-reflexam productis. / in
rain pis lapidosis Chili australis ad Antuco legit cl. Poepig. Cap. radii 8 pur-
pnrci. (l. s.)
- " Mdcronifcrsa,/o?i'u nempt omnibus mudrone nee cirrho terminatis.
23. M. ACRROSA (1'ii'pp!. cxs. ii. i;"i. 4ess. syn. 107), glabcmma, canh; flexaoso
terelinsculo apleio, foliis sessilibus distanti iti-f linear-stibnlatis mat'gine revo-
irUJs acrosis mrclone terfn terminatis, involucrl Mjnamis inCsrioribna basi
metobiBD^ceo-dilatatiipioilnciis in appeiidicem liricriri-stibulaiam reciam pun-
gen t cm involocnini lou gitidine .iikrfjiautrm. >, lu Cibili inter ISsCrnzesel la
Ouardia tie los IlorniJlus lejjil cl. Ioepp! ad rrumtos Acorfcapeosea (Bridg.).
M, ulicinit Don pliil. IM.I.;Z i83/, p. 30/. el in C-rtiil. arcb. >. 40;. JnvoJ.
7 lin. tongum, omnium ideu minus. [-6rcaaceites. (v. s.)
24. M. LINE>.u!rnn\ (Civ. ic. 5. pi 6C. *• 5<.), caiilg ccspitoso ereclo tereti
aptero, foliis se wilibUs lincnrihiis margiuc rwolates muci<mr rerto (nee cwrho)
termini tis erectis glaberrimis, ir^rul cylinJriicei sqaaaiis ovatis odpressis ex-
jippendicnlatis. / in AntiilJns Ciiilrsibos. Flose. radii 8 purpurei. Don tr, linn.
60C. 16. p. 273. Hook, Lot. •isc. 1. p. 12. '• 9- L^{ess}- >¹¹- P¹⁰⁸- ('- '0
25. M. tiRFOt-iA (Hook. misc. 1. 11.1u, 1. 9}, glaberrima, nanje fruticoto crec-
linscolo teicti ;iptcrn, foliis confftti- erectis gessilibnslinearibas plania snbacntis
mocrf>rtcf(nec cirphnj tecniinalis, invol. crlindrici sqoamis exteiioribns ovatis
acnmuiatis forr exapjxTidieulatis erect is. \$ in Cliili ad Minas dc (Jspallala, cl
in Andiban Meudocianis (Gill.), ad Talearegué (C. Gay!). Cliila 10 angus-
tissimae tolte flawfacenlrt. (1, s.)

DCCIII. CHUQUrUAtLA Jtss.gen. ifo.Lam'itt.t. 691. Cetss.dict, \$j>. 178. Less. in linncri i83ot/>. a5N. syn. p. 96. Don trans, linn. soc, 16, p. 182. — Johannia Wilid. sp. 3.p. 1706. :: Tou^hsij Pars. — Joarmca \$pr<^{ng}.

Gapilulium Ijomogainiini seqimliflorum discoideurti.. Ittvol turbinattlm arctinibraciim, scjunmis coriaceis siccia plauisacutfs 1-nerviis. HoCpt. dense pilosu-fiuibriliiferilin. Cor. coiacea vUJosa insequaHter 5-partila , fauce inliis barbalà, lobis litienribus apice penmcallatis. Stam. filamenta ex imo lubo seu e disco c^{pigyno} libera. Anthers inclnsae basi biseLosu; ?cti.s l>c^{ris} aut bidⁿlataa. Stjlos djlndrrcus exsertus breviler bi/idus , raninlis uxliis et apice hispidutis, Aciacniurn turbmalumerostre yiUosishmim. Pappus i-suiialis paleaceusplumosus longus, puleis bffsi coadunatis. — Fruices Amer. sinslr. 1 inuosissiini. Folia couferla fillerna nit opposila sessilia corincca ovata*lancealala Jipice spinosa-muci onata, nervo niedio el rniugi nib usiⁿ eras satis. C:t[>iltha Lcrmlnalta soliMiriti crecta. Tuvol. pubescentia ftavida. Cor. aureaeex Don et Bt>ipl.j ,itropur[jureae ex Ltiss.

* Eeticula!;i!, inernws ,/oliis reticnllico->tervitlj>i, nuirgine cnervw mrro medio
•vix a ccctens disti/icto.

1. C. RETicnL.A.T.1, inerntisfoliiseliplicia iunt:roriatis fteieiliHo-i^crTlliosis nervo non iiiarglii.tiis, ranmlsqne ylabris. ,9 in Brmsfli-c prov. Mioaru^m generalium at] Sahara legit el. Vanhier (pi. cxs. u. 2f) U) Invoi. magnit, Cit. insignis ; squama- nisrgine scricou-eiliatA. ialⁿriore« instipi^r dor.O MIIM:;;loma .Folia vid. Jnxe imbtii.-nia , i5 Jin.-lpnga, 0-j Iat3, litrvo vix r.iitetis mayis pmmi nulo. Anil., caudæ iicDuiua ta intell; r^.(v.s)

* * InerniL's, faliis non retictrfads margihatis nervo medio prominent.

2. G. iwsCKfs H1111II). ct llonpl. pi. etj. 1. p. 153), turr mis, foliis imbricatis confeitis oyads apice spincsentlxis rainuiisju'- fjl:tlip"rini;s. 3 in Anelibia Qnitensium , (requens in inonl^AJilisanA. IA-S. in linL;:i iii3c>, p. ??(), Lam, ill. ^-691. Jobiniiiii tnsiⁿis WUltl. sp. 3. p. 1705. Cb. luⁱ.t-i Giucl. B] st. 1205.

»

- Cb. IVruviiua Jnrim. fatn. uat. t. p. 3cj4, Joatmesia intignis Pera. cncL, a p. a(i3. Folia 3-iwivjij , ne^YDoⁿ\ thileraliñis \ 16. p. 2ft3. (v.n³ø!. •2. poll. Kn tborarum reponita-a-qm^lces etew^lDon pi. Leqnsoc. iid.] losiuscolis, vannlis pnhe.scentibos, j in j.. i':.s. t. 43), foliis snbii in niorrftiuis frytdis Pen

3. C. tAWCtOLiA (H. ct Bonpl. pi. eq. 1. p. 153), inermis, foliis refl exts ovato-lanceolalis gluUerriniis, rainulis pul'escentibus. 3 in monte Antisaná Quitenianu t'oliaⁿ-ncrv*i*;i,ncvis lateralini*i* vix manifestis. Invol. sesquipollUcart-squamis ss^{bgl}*i>i-i« <\ Less, in Linn, J³³o. p. 259. Johannia elegans Uilld. beib. ex Less. An pneu-is vai'- utaaluntai Don ti. li». soi. 16. p. 283?

4. C. RCaciFOMA (T)OTli. C. p. 392. et in Guill. arch. 2. p. 468), inerPUi», foliis ova 1 Is avejjiis graoris , rtit-þtaculo favoso. 3 in Anelibia Mendozianis, ad Parantillo tie Uⁿpullala Gill. in Hook. comp. 1. p. 109.

- Acnleat*, aciilcis axfflaribui, folushon reticnatis marginatis nervo medio prominulo.

5. C. sriwosA (Don tr. I'm. soc. 16. p. 235. Less. in linnea i83o. p. 259), am leis jixillaribns i{<-ininis, loins .ilu'inis: ovato-lanceolatis apice spinescentibus coriaceiV, a<lnl[is supra ^;la! oris snbii^{ns} •"presse pubescentibus , invitltit 1 i tin in riali villosi stpiiiiris inlimis folio triph. Jongioribus , stylo longe exerto. 3 in TeroVK tuonlibus rm*<-Jril»tis. Bacazia spinosa R. et Pav. syst. 1 p. 188. In-

vol. 14-15 iin. longum, sqJ-lruia^ fulvo-umds. V.OT. 9 lin. lotj{;a>. Folia alterna ant tujimna Qij)<)Mla, (v. s.)

6. C. OPPOSITIFOLIA (pill, el Don phil. mag. 183a. apil p. 3g^). Gu-11. arch. «. p. 168. Hao k. et A no. compr. up. tig), aculeis axi Haribiis gcinims, foliisbp- pos illis i:i!<i i^rt Inc seolatis a pice * [line seen lilms atrhinne ad invsse serireo-villo- hit. involuci'i iiuliiriui pul pescents, sqwiniis iuiimis folio dnpjo longioribus, stylo brevi exerto. in Clili uiontibus e*eihs. Cli. AlpinaPueup.! ess. n. a8. Less. syn. p. 96. Folia plefitfu e opposita. Ramuli sapi eliaiu oppositi. Kami lorluojii breves in gpecira. verisan. ;i cl. Nee lecto, virguli dnnngali in specim. Pteppigianq forsan snbdiive so. Cap•iluluin iu utnujut; 9-to liu. longiim. Cor. vix fi liri. k>ngu Lasi «labi;c. (v. a.)

" Aeanthopbyllf; iiayleis proprih ntttis , fo!Us suhulatis supra concavis ape
11 / spincsentibus. *

7. C. At I'urjius (Don ll.t'c), foliis subulatis raiuolisque hirwilis, capitalis mnl- lifiorw, receptacblo Tilfosishmo,, tf in Chili ad Cotjuimbo fCoim. Oadich!) Raiui el iuliurecfiXc calvecunu tapiuila .solliaria terminalta foliis obvallata. In- v*l*. sqmaniffi plua-e aciuitiKito-jjpiaosfe, exter; apicc recurva. Axill-e fillorum folio SIE iv. s. coiiim. ;i tl. (iauilitliaiu!. j >H^

8. C. HrsTRix (Don 11, co,), ToUs snbtilatis ramiiistjii*; snbsericeis, capitulis uxi)>! rittus imillifloris , rereptacuo alveolalo,) in audit Us Mendozianis IU as- <cl1.11 1 Porir/.ticlo ad DQIUO del Imperial (Gil,), in or:i orientali T'atayonia' aajtralis (lloch.; <v Hook, conip. 1. [b. 100.

- Q. C. i! RIM A 1 i i Don II. cc.i, foliis subulatis ramulisqoe pnhescentibus, cwpipi- lis (-floris, recpl. j-soso. A in Chili ad los Gegeirs Mentluza (Gill, nx Uriok. I. v.) in Ptaaj-OHi iii binwdi ubi clicirtir Serba del Perdice (Tweed, ex Unuk.) Ate,

10. C. ULIGINA (IIink. comp. 1. p, ro), foliis subr;'.ti' i-jmulisqt*'; tomctnsFs ht-di obseentie -n.-rvU, capitulis multilo >ris, recept.-undiosetilo. ^ io Chiliad f'nqnim'io I'pcili. t'u. nades ia nikkium Huflik. bunt. Beeeb. p.-f%, Gbutj. iuciina J>uu 11. cc.

..... A nomalæ , an/iuc spinosa , recept. gtabrn.

11. C. ANGMAI,1 (ljiji II. cfc.), :iimna, I'oliis linearibus planis spmuloso-mocro- tiati?, spiriis liiscicLilitlis, invol. sqaaitis IMII^issimis <curvat'is, rccept. ^labro. fl in Andtbos Meiulu/aiiiH. infra .1 mijira LI liny a Coluiado ^Gill. ex llo.jk. I. c.)

DCCIV. NARDOPTITLUfr. - - NardoijLylnm sect. ? Goelmatia Don in Hook. ft dm. comji. \, p. HI9.

Capitula 5-flora homogama æqualiflora. Invol. oblongurn , squiimis scariosis imbricatis mucronatis. Recept. <or. ,<-(iii;c. Ani!i. liasi IIIMI.osæ. Styli rami-longiusculi. J. .|.|.ii. pluuioriusi—Frutex Chilepsis ertctu strigidus, r:iiii>t!ho-tomentosis. Folia linearia r nncronaiaiimrgine revoluta subtüs lanuginosa unguicu,:w -iii. Capitula soiLluria. In vol. nl- bum. Pappus cinereo-fulyus.

1. N. REVOLUTUM. in Sancti Lndofici pi'ov. ad La Traversia et La l*anta (Gill.) et in Cordilleris Chilensis (Cunum) Goelmatia revoluta Don 1. c. Pentaphorus rosmarinifolius Gill. ined. 1^ II. el Ai 11. 1. <.

JJCt;V. [XOTOVIA. Speng. syst. 3. p. 359. Less. in limned iS3< /• v48. ^-rt. p. 95. — Chuquiraga sect. Erinesa L

CapiLulum aMjualillonun homo iiinum discoiiieum. Invol. casnpaihu- Uto-tiirliliatiili, sqviitmib obselete multinerviis co i-iiictJi, ext. nviatis

mucronatis int. lincnrihus, demum reflcxis. Rcepl. piloso-iirjbriiljfe-l'um, Cor. siiljcorjacea lOrHcryta naJmuta ant iriaequaliler profunde 5-fida, luliis acntis ;ipjce cqliis liarliatis. Anth. inclusccbrevitercauda tæ. Stylus glaber lon^c exserlus ajice breviter bilol.us. Ach sen turn cylindrica erostre Jimvc dense; longtqnc Villoquin. Pappus persislens paleaceus l-serialis loit^us plumosus.—Fmliecs Urasilienscs, minis tcretihius , aculcis stij.ularibus gem in is. Foli.i alleina pctiolata COtterla ovali-lanceohiUi. Ca pi tula j edimculata subpnniculata rarijis soliuria. Ad Carlineas Cassini (diet. 55. p. 5g8) roJuxit Flotoviam !

* *Foliis bust ttipUnerviissen trinervits. — Eiinesa Don f. c.*

1. V. GLABHA (Spremj. I. c. Less. 1 in linuaa i83o. p. 349). (°^s inermibus oblnnpo-hmceoliiis adnlts iitrimjm- ianisque glabris nriidis, involncrui fiquamis intrrrniibcs, exicriorilm.s apin nonnisi pilosiensl, corollis basi extus g labels. § in Brasilia a^uiuocllali. Joaonea Ki;ijU.ii^ Spreng. nea, entd. -i. p. 133. Chuqnaga latifotia tJon I. <: >. atifj. (v. s. cumni, i i>"s. reg. berol. j
- i. F. TOMEWTDsa (Spreng. 1. c. Less.! in linn. ifijO. p. 250), foliis incnnibns ovalibns sublanfctjl:!!!-, supra nriidis SU/M is ramulisque villoso-pilosis (nee to-meirosis), involuci sfju.mnia serireo-vit!<i>i>, cbix*tl? a liisi extiis gl^ljris, ^ ia BrasiliameriioriaH. Aculei rarisslnu <jc Less., iu spec. uifij mi ill. (v. 9. coniQi. a mas. reg. bernl.)
3. P. sriNE.sCENs (Less. TII liniif'ii i83o. >. 251), f^li* apicc spinorifl ellinticis, ailiiltjs Dtrinque ramisqu e olabrinuitidis, in vol. .squanns exlejiinibnliglabr^ nriidis, corotlis baai ex^us glabris. ^5 " " asilia. A culei rtrli lonyi eat cicbri. C<< pitula solitaria.
- .i. I^h. OnTHACAirtatA, fuliU inerDiibuk clippiicci ntrii'nii- Ktti-rrnaiih ^lal>ri.j, rami; apire pubtscedtUvtlnHni*, aculeii gejnnis Ionyfe patenfi-deflt^is adaxllas |a- Minim inffimiones, iin vol. itquamis dor'soi pabesceDtUlm.s margine tomentoso- cilia I is, exiimih sjiiies^entitjus , cur. busi gyfyrisin II Brawlia detexit cl. Lnntl et veii>im. eamd^m area Jilu de Janeiro legit cl. Guraft- (v. s.)
5. JE. LAHCEOLATI (Lesa. 1. c.), foliis nicrmilm.s lancw-fatis utrirtque ntidis, acu- leis erebiis nucinalis, In vol. sqm. lms fitiis sefii co-pilosis, corollis extis ni; 't villosis. ^ inIivisili:KotjiitiocliaIi. JoaniH'iiinplinci-visSprcn". in h.Gtt ex Less.
6. V. Htsrt>x, ncoleis axillaribus basicoainiiair , foliis cliptiea-ohlonfp'.actimi- niitis it>plinervii sntiiiu rantidisqne sefdsi* , ptddincentis ariTinlii , invftlnci i cylindrjfi S-in ifnrj squamis !>jiiyuoloso-nmrooa(ii. !; in Brasilia. Chuqniraga hispidaDoa 1. c. [i. -J. 7. pjijij.H.s fnhns.
7. I^h. PANieriATA . inpmis, fnHis elliptico-oblongis triplinerviis siib dii* pubes- ce:ilil.ns, capitnlis jbyrsoideS ro-floris, involneri sublnato-campanulati squa- mis iiiitiiis n-votvitis. § in Brasilia. Chuqniraga u<jtlira^a panicalata t),ii I. L. J. 289. An foit^ eadt-m ac Mo to via totin' nlo?
8. I^h •CTI'UKCULATA, soiin^hs, ac 'ilctS liicflfjgasijOa^durfaai.T , foliis o:al'i-Iau- ceolaiiii act)minatis trinerviis titrinque yllnsis deimn >1 bratis, capi >u|i: i||| rsoidcia, im ol' oblongo-cylindrici multiflori squamis intimis radiantibus, antlutrai uiu appendiciila bicuspilatvi. § ad Caracas. Chuqniraga veprecNI;IU Don I. c. j. >>. ["lores alblui. Stylus Uentage mus. Au à gener remove >du ?
- ** *FoliV penninerviis. — Piptocarpha Hook. et Arn. coinp. 1 (1835) p. 110. non Brown. 1817.*
9. T. DurAKTHOides, (Less. syn. 95), fruticosa, capitulis solitariis, invol. squa- mis <orso glabris subtriserialibus, illosculis (semper?) hermaphroditis. § in Chili mistri -sylvis ad Ainu. (Pœpp.!) prope Laguna de Ranas prov. Valdivia (Vidg.) liuij mrga Leucoxylon Pœpp. pl. exs. n. 723. Piptocarpha dia- cant b f d Hook, el AMI. 1. c. Nom. vernac. Palo Mato. (v. s. ex coll. Pœpp.)

10. F. EXCELSA, arborea, capilnlis dense it bñjvilericatis, invol. squamis dorso tomentosis sexserirtibus, ll<venis (sc taper?) aborig tlinit i.s. -) in Gibili circa "Valparai so. Chuquiraga excelsa ¹⁰¹¹> p&I. ^{III:}'p- ^{IH:s>-}. p. ty et in Ghill. ardh.a. p. 468, Arbor. 3o*Go-pcdnUs, trunco y ped. crasso.

IM'LVII. OIJ)i:NP,lfr.GIAV.«5. in Unnaa iS3o. p. 252. f. 69-75.^1. 99.

Capilulum muUiftorura radiali forme bomo^anum, n era pi fl. omnibus hertnaphrod. 1 -serin li bus, bilabial is la bio exter. ampin ligulxformi. Invo in rri s(jnaiii3>iii<niH;slinc:ires:n;iiiniiai;f plitrin»:i-\ i;c, inter, herbaeae. Recpt. mutant. Cor. gin bra, in disco regularis 5-fida lobis apicc i^libosis, in radio biial.iaiajabio ovt. liaguUefornii 5-denlato, int. bi-ii;irii[j sen Inrifutnto scu ipiegro? Filam. layria. Anlh. caudis iutegris liberis. Stylua^b ber, ramis brevissimis ob luais. Achaenhmierostre turbinatum. Pappus lojjgus aefniali s, setis liucaribus ilc.nsi; el breviter plu-niosis. — Suuviitir.es Capi:nscs linhiUi (lislii'-lissimU Co Hum lapvicino-siiin. Folia in rosuJamconesta sc»silia coriacea i-ticrvia liiignlatn ol)ttisa siiii|i ;!i!ia lucirlii, sulih'is dense tonicnlosa baaihirsutissima. Capitula sonaria ampla. Cor. ex s COCO nurpur;i.sceiles.

Sect. 1. Ecoei]ENBURGIA.

Iiivol, sqnaiure actimiii.itissJruaE ajift* glitbrinscnbe sobre cnr^{væ}.

...as. I. e. j., &uli;:i';tniis , foliis Ini^it!.ill¹, m;iii,'itn¹ icvolnls basi utrinque hirsutissimis, cæterum supra "liibi's jitiblits nervo excepto nit. Mpitlo inter f*é*hi sessili, achaen*i*> Vtlo.*f> IIH'vi. ^ if ad Cap. Bonæ-Sj., i (Muntlt ft Mali.), in coloniæ distr. oHwatali (BurcU.! n. 598J.J in dislr. Uitenhagen et Zwellendam (Eckl. ct Zcyh.!) in inunlunis ciro'i Tulbagh (Dri-gel). Caulis l Bsi ploricfp-s *crassus lignosus*. I'li.i -j-2 \ jxill. loaga, 3*4 lin. lata. Cor. in sicco p alii die. (v. s.j

•i.O. AiiiiOscri.\, tauleclongato lilrsnlissiino liysi foliaceo cxtcrum suhajhyllo, (blii>ol)ovato-oblbngia ptiaria soprA *f*[ibii* sublus irtiani In rtervn touentosis, rapilulis atl apicem cmiis ternis ptduncolal is, achaen*i*>glahernnio elongato. t) iu Africil australi a*ai* Zneentobetge nit, 2^-00 pcd. *rg*; cl. Drege uin vulgt (eu*n* Prote*i* coaocarpr>dcnd**) dicinifr Batnvi s Capenilms Kreupuelboom i-i <si nibor nana, in desertis diilr. UUenhagen el. Ec|lon! etindistr. Albany ubi vulfflit dfcilor *IF-agetiboQjn* el arbor ¹⁰⁻¹²-pcd. cradil. Species speciosissinia ! Folia in caiifltR snJrosul:iiii ;-'l poll, longa x -l-> poll, latrt. (fivol. sqriam-e moltisemlcs [iBarts acumiuatj.ssima l(isi:iisiili>siiii,T! apice(sailem citeriores) g labriuscui;L>su])iiJLvx». (v. s.)

Sect. 11. SCVIAI.A. —Scyiala E. Mey.' '« Drege. roll.

Invol. squarii.c exlur. uiuliqni; UCJI•.issinic lainentosæ parçè ac uiuinal; <j in cupu Liin urceoJatani uouniventæ et stricLisbimt imbricatae.

3, 1 t l\cio»im, caulescens, foliis subradicalibus obovatu-oblmigis li:ri longè cuueatib marline mibicMilmiii Hinta i^liiliis Htiliis> vti.un in nervo totentosis, can le floido sn! filwTino Infii'l, <capitulis t-ni>" prduirolaiis, invoi. valdf to-llfnfntoso rillirili. cil.i-dn foli. 3 2 in Africa- ¹ »nstralis ituiijanii cicci Tu-lbagb :ilt. 1-1JM<)<<. it-jill rl. 1) regel Sey'au Vnjlionmn K. M.v.! in Dippe roll, I"ylia (> poll, loii^:'. 1 ^ IOII, lala. Capit. if) tSlin. diam. (Mores agn vidL'sed ex Iruct. imiial'aris et hajjln Inir videtur n-rrn-Uil.i. (1. S.I

DCCTIL PIUNTZtA. Cass. dirt, 'iy.p- 463 et 488, 43. p. 324 Unbl. xni. n. 42.
Less, in finnevad ••'• 'o. p. Ij; . syn. p. 108. Nees ast. p. 985n — fcioydia Neck,
elem. i.p. 4 ? -- Aster Is et Inaj. sp. A'•».

Capilulum h^tcnrgamuni in; equalis lorutn ratliatuin. In vol. squnniu*
3-4-scrialcs lanceolata; Recept. n net inn feveol.ilum* Flores disci lier-
inapbr., radii i-scriales iiMtn. Cor. glabrae S-nerv^ae, disci regniare 5-
lidie laciuiis revoltiis; radii ligulatse aul rarius bilabiatie. Filana. gl.ibra
in Jigulis sterilii. Autlu:: a disci exs irrla? hreyilcr fcasl bicaudaUe. Styli
raibi obtusi ant acitti, in disco breves acqiales ptiberuli, in radio Jon-
giores. Acbaenim crostrc cylimfongiis, setis brevitor i;t>densè pltimosis barb etlalisve. —FruticuliCa-
penses, tamis tcrelibti s tome ntosis. Folia alteniascssiliaconfcta mciw
li:;ii;icea, tomerilo supni suho^jsolulo subliis pcrsisk'nle. Capilula icr-
minalia solitaria, Ligulu; allæ, coenica^ ;uit purpur<æ. Dis-i;us lutcus.
Asterea vera ex Q:ss. el ISces clunsi antbcree piocessilus Ibrsan ::
caudis veris diversis instruct*; potiis Hfuiistacea ex Less.

I. P. BERUII ((:a->s. Less, el Nees. II. c. t'tiliix (IJOVIIUB sen oliftngo-bbova (ia
busf secua radios aa^usti: ttecurr^attliis, im li. N mijMinfl snb.uqua-
libus. § ad Cap. Bona-Spei <d mquie^ Lwm's (Erklonl; in troulis TSTjularia
decliv. bor-occid. fBevg.) ml simmi Algoa (ForbesH, iu AtiU'iiiquunhtiid
(Iiin-b.! cat. n. .) (Y.%). iu disir. C;tk*don (Erkl.!J ijtl /wane! erge (LJrt'pe?)
fnuta cernoia liciff, iijj. "SS, Inula cu;tili'a Limi. immt. i \-. AsU-r pqliolioa
Linn.ap. a. p. 1254. Burn.! prod, II. cap. at!. Astpr p. ippoijis \| illd.ca 5|) teng!
svst.). j> .7.">. lrysifi;i polifulia Tliniti), fl. cap. 692, ex Less. [tii plant.
Mmn. vidif. Cony /a vrtiCD.sa lloutl ! in h. Deless. Aster tomentosus
K. Mey.! in Drege coll. Doni^bi.id. Astt'ftL:iii.i'di|i"ILus Lam >x. Stutid. Spr,
ft Nees scd in ejus oper. nun leperio* Totoealum folio ruin et caul is a nb rules-
ceils. Piipptis rmfn. Li^ol.u cot'tileic, fv. ,^)

- a. P. AHOMATICA (Less. 1- c), fdliis Hm-nribLis niar^iue scbrcvoiutiB obtoeis non
decurieitibus utcincrue oaulcquu i^anu-toniulosts. • /J ;id fiip. Bon'a-Spci.
Itiua urbmicalaLinn. amoeS. ti. II. io3. sp, m^i t-uffweza Calliornia "Willd.
IHTII. ex Less. Coqpzq caqe^eus Y.M.! fxa. n. ai't. Sicb.! pi. <xs. cap. n. n
nonTliiinb. Lcyssera incaaAE. Mey.! in Dregecoll. Ligulas paucii; alli^o, t'sppjis
albiis. (v. ».)
3. P. PTfiUFOLiA^Less. sya. 10S), folitfl lie viter petiolatis < vato-subrotundis den-
ticulatis, invnlucri 3-/, s<:ii, li^ squamia imbnalis, exiertoribus bievoribus,
5 ad Clap. Boua-Spei in KerrS CJj.irum f Kivhs. coll. a.s. iu i6«!) iu Kaf-
ferbud >t icnfitoi'io cesso (-Ei-ki!) ad Win burden Sit. (i-700 pcd. (Dre|pe!) et
forte ad Krbem rivier, OmAta ct Raw-lie ex spectm, sin< flore? (Diegc !)
(v. s.) «f»

DCCVIII. AINSLI.7EA.— I^&is Don prod. jl. ncp. p. iG;, n()« ,S</i/v/. — Perdlcii
-p. Ham.

Capilulum Jriflorum boinogannim. fl<j|ppt. inuluiJ Jni^uslum. Iuvol.
cylindrificum, squamis laclWft^ aciimmintris siabiralis, ext.t breyib, us,
intimis elongatis discq bm viunnii.s. t>oi. Dasi h [jilabiaUr,
labio cxl. 3-, int. v.-lido, lobis ei.mgalis :>)it:c nctiti i 1 t subcullosls sa
revolulis. Antb. ri))>iidic;i!.ji - " ohtusis lac, cuiulilms viv
subbarbatus longis calcarata. Stylus basi iBiualis. Sligm;itâ 2 exserta bre-
vissima obtusagjabriusrna, ssepe »boriu.8ina;qualitacula, irti o uno oin-
nino abortivo! Acbaenim tores uii'inrjiu: vix niicminium villtfsum ses-
sile cr<i#tre. Pappus 1-serialis, setis elegan tcr pluinosis. — Hej*bae

*

I

perennes e nsontibus India. or. ortæ, habitu i Uatridis scu Lobeliae. Folia raj&xicalia potiola in. Caulcs erecti simplices. Flores purpurei. — llcavi cl. doct. WtUelaw Ainslie auctori opens do Mitt'rift inedica [odica i Bo Hedicis utilissimu IU

I. A. EROPO; r., i'il. radicalitim [n'llo o alato, lim lit" <ivaio snbcordato acnmitato vix ili-utii-illatij Milth's eanl'-liu viflosu litanoginoso, capitau stcū can I is »picem sessililias spicifoi-milms. 1* in iVdpalia , Kamaim Ind, or. Liatrts laiil'ilia non pro I, p. \y, Perdicium triiluruni **Bam. mas.** ex Don. Vefnonts IhcliMult's A. \ all'i cat. n. 2927. comp. 37. Centaurei lanata lloxb, li. heng. 6a? ex. **DBo.** Caplta! a erecta. Involu*co*! ;i;i'it;i. (v. s. coinm. ab hon. aaiā mere. tod. or. u\ 'a cl. Ruylc.)

2. <ilhe(cnsis, ci pin ilia paialis imo ^pfactis, ituui. parce lanuginosis. If, in Silhet, Vcrnoni.i lgheljoden rs. Wall. cic. ["out r.itcalia igaota. An species prop-li.i nan satijinoi. (v. s. comm. cum var. at.,]

3. A. IPTEBA, roliuruni radii-iliitin **peflelo** nan ablr*. lliubo |irofuud cordato subertiicafalo dentictilajo aul sin. aato-dentato utrinque caule pje gljbnusculo, eaj*i[ult] pedipellatti in panicnlirn clnnMi.nii dispotitis. if, in ninniilms allisaini.s valk-in Nrpalia" rircnmlantiinis Ici/il i-l. Waillri el in regionibill vicinis cl. Royle, Praeter car, int i. ujftLT. >li ^ . [lifrnpoüa Cnpiulis folii]>.[jae dapiu ferem:ij"ribus semper glaberriinis. S pecim. \ ilicii;m;i el ilaylc.ma uon umnino cdjuruniH el species fo:it-in dnas divtUenda ? (v. s. coiutu, a cl. Wallich. ami. \ K>i it Royle nno j S.V.J.)

BCOIJ., ClftONt)PTERA.

Gapit. muJunomiii radi.itU^Mtic. Invol, campanula turn, squamis pluriscrijilibus, rvicr. foliaceis deutflt^, iutimt^ lifticcolatis iulegcrftnisfl. radii labia v\l. ;equantibus. liccfpi. uudtpi. Cor. onines bilabuita?, radii ctrc. i5 labio exteriore elopgal* ppicc sub*- **3ydeotato**, int. breviore tenuiorc bipariiht; disci longc tubulosaj laliis Kqualibus; ext. 3-den-
tat«, iuL. bipartite). Antli. mdii softc elr^fte, di.sci sulnorneae basi bi-setae, sicta crassis j'libpi'ulis longiusculis. Stylis (ilifurniis nu:u obtusfc cl breviter bilobus. A«Ketia mdii disci compressa **hincsnbalata** <.lniiv erost:ia, juiitira siibpiilienlta, ;nl'alta glabri. Pappus plurise-
rialis alhissinms sriis longe el e!cg:niH!v (• lamosus;.—Herba Chilensis
-i;!cr!-ii)i:i penmnisluibU Tavaxaci oljovati aut b^odontis Chilensis
[oli a rosul;rtain pcliolum brrvmi angustata lute ovala dcniculis **pallosis** actitis iitui^uala. C;ii)itul;i disci el radii flava ^laUra, — Nomcn ex
Xay iix et x:fo ala^ alludtlad pappum uiveum cl plomos'um.

4. C. C wiiMiviA {DC. in Dclss. ic. sel. /, t. 75). if. in ejtclsissimis Andlbos Cliiifnsiu ftgit indefessns Gland. Oay it mwa* enm **plnr.** aliis urusimis to mm. (•, s.)

* * i'lippo piioso scabn> nut iu'ti^err'uno.

DCCX. C.K.ME^ITA Cl. fay in iitt. Decaisn. mss. cum icon./lor.

Capit. multiflorum radiatiforme, heterogamum. Invol. campanulatum, squamis pluriserialibus subæqualibus linearibus acutis, exter. dorso villosis foliaceis, inter. glabris membranaceis. Recept. nudum. Cor. radii niiufi 1-serialis Fiilabjnli, labip cxt. ligulajrormi clotigalo 5-deulato, inter. brevi liir-irtito lopis obtusis arcuati in inflexis. Cor. disci etiam bilabiatae laUiis Iongiti;dine ;r.({ualibu#. Anders: appendicula enriscea superila¹, basi biselosæ, setis long is pilosis, radii eilaUa;, dtsciupollui-

fcne. Sty H cylindriei; apbtnts linearibus e reel is. Achsetia radii efluita, disci . . . Pappus radiict disci piuriserialis albi;ssimus, scis linea ribus inlfgrisaut vix ;ipice denliculais. — llerlia Chiiensis perei-nissubacaulis i-cepbala. Folia subradioflia rosulata linearis-subsp. 'lnt-lala oblusa utrinqt'i'c villuiissinia integen;ipa. Capitulum inter folia sessile magnum. Flor. fluvi.— Hubilus fere Chionoplerae sed pappus pilosus nee longe plumrfeus.

1. C. FORMOSA (Gay! In?rb.). % in petimis suinmaimn Aniliu m Chilen ilom ad Talcaregt; M>|| tlur. legit cl. Guy. (v. s.)

DCCXI. CKRP.ERA Croni in Linn. gen. ed. 1737. cor. p. 16, ed. 1745. n. 747. Less. in linnæa 1830. p. 290 et syn. p. 118. — Aphyllocaulon Lag. aman. 1. p. 38a?—Gerberia Casf. bull. pfiiid'm. i»ijj^ 34. diet. 18.p. 45g, opusc. 2. p. 8. — Arnica ct Dor. nici sp. Auct.

Capitulum multiflorum heterogamum, fl. radii 1-serialibus ligulæfor-mibus. Invol. squamæ oblongæ sublanceolatae adpressæ, inter. longiores subscariosæ. Recept. nudum. Cor. glabrae bilabiatae, lab. ext. 3-dentato in radio elongata in disco intusarem non excedente: inter. in disco bidentato, in radio biunrtid¹, raaais riri'liilbrniilnis. Anlh. in diaco filamentis ghlri^ ca"uiis 1;ic^ris, in radio ntlle Slyii b_nnsia?qunfisrami breves obtusi, in fl. licvnuipbr. (^tiistiini»so-j»iiiv-iiiscut), Achæa imm compressum plus mipliis rostratum papulosuniaju glaburji, (jipimsnisfrw lis setOSO-paleaceus scrr;ilus æqualis. — Hci bæ pe renncs (i r itogeæ. Folia radicalia petioU>tn pi natilobata iiatiu-t-gm. Scapi i-eipiiali. l*ln-res flavi aul crocei, ligmfs extjis subrubentibus. Pappus rufesce

Sect. 1. EUGERBERA. — CrckHkrae secJ. I. Less. 1. c.

Acbaenia dffnsipaitTilosa snbfrostria ntH breviftiuie roslraia. Invomcriaqnam;c florttituridii mnll6 t>i(viores-*fjli:i coriacea supra siitidu. Srap^ plus minus brac-tcoUtua nirt) cbracteatus.

- i. 6. Aapi.sBiFoi.iA (SprengJljiit. ^ p. '>/>), f^ollis piniiitlobaiis subfus fer, n-gineo-tomonfosis, lobi-* sBurolundis ponciivoguib reflexis, tcruiudi r_nliua^ n, n majoi-i, sca'polriato. if, ad Cap. Bonæ-² D*i* iu luonte-Tabnlari i^ h), ad Ura-kenstensberg (Divqc! • in th'lr. Zwellcntlaiif (Eckl.), AIUKM Gerbera Linn. sp. 12/6. Tlitinb. II cap. Vm). Gfrberia Ltnayi("ass.s.flch. if*⁸.p. \ir). Duroni-cum asplenifolium Lam. dir. " p. 14,5" >illilli. ttiigjg f. f.5-5. V²orm. afo. t. 5t. f. 1. i¹uk, aim. t: 3ij. f. O.JA. chermith*deuse pitnthusii] suberostre. (v. s.)

². Buxbaumii, foliis pinnalisHptia, lobis nempe ovfto-lnnTignlaribus ad cos-lam disjnaclis. % Rush. <ipnU^t. **. (v. s. ibliun. ex h. V_IU_I I;oyen.)

2. >. FERROGINEA, foliis peftolf.lis ohlODgis »CUt^d^{ntatis aut subsinuat}s supra petiolis rjne glab<3 snblos tomento f_nrrn gineo persistente vslilio, scapo re-nuis-sijfe pulx:ru lu-velntino squameJlo.so foliis &M¹" tnblovi: tonoJoie, invoj squa-mis Bobtriserialis Bl.abrhisculift^ ad'-ap- " onæ-Spei(T imnli. Hum., in colo-nie parteoricni.ili (Iiuirli.! n. 5701) ad Zw elu-ndanfe^Outi iniqualand (Drege) pl. exs.J. GerBera sinnata L.ehs. iu.] "• P. 292. Doronient n. ^jilciif, pl. Lani. diet, 2. p. 315? viim.i Gerbera Burm. Arnica serrata T linni. fl. cap. 669 PAcbseuum rfeffsi.ps^nlosm'* lirevissmvi restrainm. Media inter asplenifo-lia III el siiualaiu. (v. s.)

3. G. SINUATA (Spreng. syst. ' J< 56 n P " Less.), foliis petiolatis ellipticis obo-vaiisvu basi snbcaneatis plus minus dentatis ,m rotundato-sinuat^s supra

glabris scutis tenuè albido-tomentosis, adultis interdum glabris, scapis sæpius pluribus glabriusculis aut albo-subtomentosis squamellæ iosta folii. i ilupci iripli ^{ve} lon-[iofibris, iiivol, jqnatui- 3-seriatis linearibus glabria, 2f ad Cap. Bonæ-Spei (Th.), circa urbem (Eckl.), ad Worcester et ^{ad} ulha^h (Eckl.). G. rn.H-i-orecjliala Less. Iti It. ^{maea} 1830, p. 295? Arn. ^{ig-i} siniiLila Thuilb. A. cap. 663 ^{!(') i»li >/ v.ij} i ad basin villis a! his stepii is lursuli. Liguta; la-iS. Aduettia brcviiii rosirila parcc piipiiosa. (v. s.)

4. *BURMANNI* (Cass. dic. r-t, t8. p. .Wii. Li^hs. iniionsea 1830, p. at/), foliis pe- Itolatis obovatia ^{ellipticis} basi cancan's minute dnniculatis Dtcagoe {jlabiis, scapo parce Nrujanie lloso ap icft lonuisSiiue vclutino foliis irip!6 qortdroplove longioic*itivol.* nqna mis subtris hiallhns subaraneosis. 2^o ad Cap. Lion; e-Spei I II., ad T ulbagh in motifo (I)iv^h! pi. PXS.T. Arnica ITH.T.I Linn. sj>. 1246? (excl. -i". liutni. syu.). Tbunb. fl. cap. 668. B.irm.! prod. il. caj). i;#E. M<\.! in Drege cnlt. Doronidtini pyrolai/nthim Lam. dioua.jj. !Ji5. Arnica pyrolæ- fulia iL-ui. enh. a. p. [']5%. — **Bamm.** aifr. t. 56. C. a2. ^Lijgal.i; circiter in croceæ. Achænium per authesin siAero*trc pupnlo&aiu. Pctioli variant i-3 pollicarea. (v.s.)

5. G. *TOMESTOSA*, iitiis prlii*iis coriia Usellipitcis veinlegr Uaupn'i glabris nitidis subius loittnt'j (lin.Mi pei'.iiateitii et vclutiuo vestitis, pttioii.s scypis jiivoln- eris...i; lii!-viii-i et dense vflulino-ioint'mfjsis, seapi.i esqnamellosis folio trip!6 qu, itlruj'l(i)<• longJoriba*, invol. sqaiWU 3-benaliItiM acuminatis iipico plus min!, ust ill atis. % ad Cup. Ilmii.i-.Sjici. Cierbera hirsnta Spreug. in Zeyb.l pi. exs. ii. >(. in h. Moric. non Tliunii. GA'h. mturocephalu Leaf, in linnj.i 1830, p. 293?

A. *clippica*, foHU ellipticis iutrgris, invoJ. srdfmlmia .ipcc parce ustulatis, li^huii.s circ. j.u. %, inici' Hottt-ninla-JHolland et ('.iiwlon legit, el. Zeybcr (Kckl. tx.s.), ad T,an ge-kloof (Drege!). t^v- <-)

i. *usutlata*, foliisi oblongis subdentatia basi corriatis, invol. Mjuamia apice lon^ht- iisicil.li is ligalis 10-12. ² ad DiakecnscnWglegircl. Drege! Foliis pan 16 hccilit in! G. ferrugineam. (v. s.)

i. *potyehi-ut*, foliis olio longo-ellipticis basi cordatis de- nalis, invol. squamis mulifseriililai aju'et* ItJii^hf ustulatis, li^hulisi. ^{3-35. 2} ad Drakeenstenfibere Jrd'i el. Dregn! Arnica cOrdala i. Mt-y.! in Dreg. coll. non Lew. Porte> et ^ consti in II Til sjii-nt in all a. distiuctiim? Certt: y it ^ non separamia ctiamti < :j;ihihilu!ji [riplu majus. (v. s.)

Sect. II. IJEPTICA. — PllosclJioiiJcs Less, sr, u8. — Leptica E. Mvy in Drege cdll.

Aclisenii juniora MIII[>]IJU1OS;I Miberostria, atlnlta glahrn aut papnlosa, sem-jwr longisiinic rosralif. luvdl. sqoatna (lonbos radii panlu Lirenores ant iis snb- i-f)Lihra, iinpirite Ijneares acuminatse. — Foliu uou cori>cea. Scapus omuitio- ebracteolatu-s iiirsitins. Species alia African a, ;iliae AsiatMæ.

6. G. *CORDATA* (Less. in Uoiiscä iS30. p. •';)-;. Coliit long* petiolatia rotundo- L-llijtlicis 1.1.; uoriLiis inte^hfiiinis mil dt-iui'tilalajupr^h Sparse pilosU'sabtis tom en I o adj. resso persistente al i.,, invol. posl ;tu*tli'siu omniuo reflexft, ajehw- nii', iiatu*ii*-> i|i,pulosis, % i-J Cap. Bonæ-Spei (Th.) in coIonia; j>u rt; prieti- liili < Ilm-ii!. 11. 5220, ad Znaeurebe rpi^DrcgfilJiudislr. Giteuhagen'(Bftkl.). Ai tit-i cor (hit a Tiun b. ll. cap. 628. Pers. encli. 11. 7 non n, ig. »ec Wulf. Cor. salphrfrcsf. Iniiofriin Ilim seqtiente ^mfnJil < L Sjirciigel, sy>t, 3. p, 568. (v. s.)

7. C. *PILOSELLOIDES* (Cass. dic. 18. p. 461), fuliis >rii<ilaiis nlliptiris oblongisve iulegri« am vix subdentatis supra sparse setotis ylabitsve, subtle ti n! marei- ^{llinen-hirntic} itivot.

2^o in Ctp. IioijjE-Spci f Lull.), circ. uibem (Burch. n. I04. Eckl!), in diatr. Uite1 bapvu (Eckl!), ail Willbci-j;, R-airiviersberg, Oiulata iL Basche.fD'reg!,

pi. exs.). *Arnica piloselloides* Linn, muocn. 6. p. 103. *Dorouicum pUoselloides* Lam. diet. a. p. 3x4. *Leptica ciliata* E. Mey.! iu Dreg. coll. *Ligulae purpurese iS-i5*. — *Arnica pi lobelia* Buini. est onminò diversa et forte Arctotidea. (v. s.)

yS. *discolor*, foliis subtis albo-tomealosis ad Znecarebergen legit cl. Dregel (v. s.)

3. G. OVAMFOLIA, foliis brevishimè petiolatis ovalibus obtusis integerrirais suprà sparsè pilosis margine ciliatis subtis hirsctis, junioiibns ulbidis, invol. post anthesin erecto, acbaeniis papnlosis. *If* in Nepalia* montibus detexit cl. Wallich. *Onoserisovalifolia* Wall.! cat. comp. u. 40! Priori omnino simillima! *Achaeum longius* rostra turn. Scapos apice praesertim densè tomentoso-lanatus. (v. s. comm. ab ampl.-aulâ mere. angl. Ind. or.)
9. G. HIRSUTA. (Less, in LinnaeH 1830. p. 298), foliis longtimè petiolatis ellipticis acutis cordatis suprà glabris juuioribus t birsuto-piloj>is. *If* in monte Barah Arabia; felicis et forte in CbiufexLe&s. syn. 1 ji). *Arnica birMir.t Forst. de.^cr. 1 />i. Yabl syrab.* 3. p. 99. An certè hujus bectiunis?

J- Species* vix notice.

10. G. CORONOPIFOTIA. (Cass. diet. 18. p. 461?), foliis pinnatifidis, lobis linoari- bas. — ad Cap. Lonaj-Spei. *Arnica coruuopifolia* Liun. spec*. 1247:¹ An nici. i G. asperii Tolise var.? An eadem ac Guzama coronopifolia »

11. G. LAGAsCas(Cass. diet. x8. p.462). Species omniuo incertaet ipbiaactoriignota-

J-J- Species vrvlu|n

G. CRENATA Andr. = Maiia crenata.

DCCXII. OREOSERIS. — Oiioseridissp. *U all*

Capitulum niuUiilorum betcro^amum radiatiforme. Invol. squamae linearis-lanceolatae bi- aulplurisrialcsaciiminalae, interiores longiores. Recept. liudum. Flores hennaphr.; radii foiiiniae. Cor. disci pilosiusculae bilabiatae, apice labio extcr. 5-dentato, inter. 2-dcntalo paulo minorc; radii g la brae, labio exter.ligulaeformi 5-dent., inlcr. mullo niinorc bipartito lobis linearibus.Filam. glabra. Antb.disciappendiciilalincari-lanccolata elongate, caudis longis apice sublaceris, radii adstnatcsflbetac. Styli basi oblongo-tumidi rami breves obtusi. AcbaBium oblongum crostre sparse puberulum nee papulosum. Pappus biserialis setaceus serratusanqualis. — fierbic pcrenncs, monliutn ludiajorienL. incolae, babitu Gerberas et Ouoscridis. Folia radicalia lyraia sen pinnatifida seu dentata, subconfacca, suprà glabra, snbliis tomenlosa. Scapus lomentosus i-cephalus. Difiert à Gerbenk achaenio erostri, ab Onoscride floribus disci bilabiatis. Folia radicalia subtis allio-ionicntosa. Scapus tomen-tosus i-ccplialis. Florcs ilavi. —An Gerberae sect.?

1. O. LANUGINOSA (DC. in Deless. ic. scl. t 76), foliis inciso-snLlyraiis, Jobo terminali maximo ovato acuminato, scapo foliis quadriplù longiore, invol. squamis dorso lanalis, iicb.eniis puberibus .suberostribus. ^ in monianis Ind'av oriental is ad Srinagbur et Dboon leg. cl. Wallich et Royle. *Onos< rislaunginosa A et C Wall.! beib. et cat. n. 2929. comp. 30. Cb.ipfalia go&sypiua Itoyle ill. p. 18. 947 et a5i. t. 59. f. 2. Folia coriacoa Hiipiä glabra subtus cum petiolis lanuginosa. Seapus tonictosus Jauaftwe, C-8pollk', bhicteolas i-a aut nullas hinc indegerens. Capilulunnuagnil. Gerberacinoltiflorum nempè25-30-florum.* (v.s.)
2. O. TUSILLA, foliis enneatis basi dentatij, apice obovatis obtusis subdenticulatis, acapo vix foliis longiore. % in montibus Nepaliae legit cl. Wallich. *Oiio.seris lannginosa* var. *Q. ptisilla* Wall.! cat. 11. 2999. romp. n. 39. Herb a 1-2-poHic. Capituljn fereLiol>eikulinic. InyoL bi.seiiale. Vloirs in capitulo if>i(>. /|. s. fomni. all hou. coct> me^rc, nngl. India¹ ör`

S. O.? WIM.A. folib lyrato-pintfattfidis, lobw rolmulaiis integris, inferioribns minoribus magis incisis, super. c^{onvex}is, s^{capitul}is duplo lorfgiore lanuginoso, invol. laxè lanati squamis acuminatis cordillas superantibus. L in Nepalie montibus ad Gossain-Than legit el. Wallich. Arnica nivea Wall. herb. Senecio niveus Wall. cat. n. 3143. comp. n. 253. non Thunb. Folia 3-4-poll, longis, p. ^ lata. Cor. radiis feminea. In secim. meo juniore A. malae TM-vow carart. ffqraro uo« s;this vidi. L'appus rigidalns ocliroleuctii. Acharoiam glnbrioscaluni'. (v. s. comra'. sib hon. cur. mere. aagl. Ind. or.)

DCCXIII. BERNIKRA. — Isnnlhns (seer, Oaoseridis) Uss. in linrtted 1830./J. 333
non Mkhx. — Chaipitalise sp. Don. — Tussilagints sp. Wall.

Capitntuin mutti- et sequalifiorum homogamuta. Recept. nud:in alveolaluni. Jnvo!, subcampanulatitfn 2-3-seriale, squamis laurcolato-Ikicafibus acuminalis disco paulo brevioribus. Corolla? omncs bast tubitfosEe bUabiatae, labio oxt. tridental oerccin , intefiori bipartitp revoluLo. Anthers long*, appeodicibus lanceoJaLi? acUpijnatis suneralsc, caudi is longrs apice siimmo tantum baftatis calcaratae. Stylusbasi nou bulboart s'Uli'chis, lobis obovalis obtusis dorso ad apicem subpu- beruh's. Acbaehiuni elongatum p«ber»-scabruni angijlatum brevitervos-tratuin Papp is plnritfcritifis, s'jlis rigidtilis subscabris seorsim dfeciduis.

Hepji! *Nepal* jnsis pcreunis rtcaulis. Radices fibris fasciculati^teretilms. Folia radicali;. Im ~~ge pet~~ ioiata cordato-sagit^ata iiujmliranacca reticulata supra t^lalicivii.i;i subliis amneosii. Fedunculi sen scapi foliis lonciorcs nufli' i-ccujiali, cum pctialornm *Pasi araneo* »so-lanuginosi. Cor. ex sicco punmrasctntes. — Genus dicavi cl. Franc Beniici- qui inter pntaos saeculo xvn^D India; nrovincias boreali-oQpid en tales adiit et k descitpsit.

i 11. NerAtEKsis (DC. in fleless. Lo sel. 4- «• 77> ¥ⁱⁿ Nepali A , Kamaon el Sillt.-i Perdiciam sentifloscul.tr.- **Ham.** ex **Don.** Chaptalia niaxiinaDon prod.11. „•> 166. Tussilago rryicropbyltui Wall.! caf. D. a^Sg. coup. n. •;„ S^pi^iS po(t. ton gi. Flos ex W. all. uduiatissimus. (v. s. comiu- ab bou. auhi mere, any). Ind. or.)

DCCCTUY. LASIOTUS Cass. bull. pkihm. ifli:.. p- i5z. diet. rt. p. 398. Lew. in
/Wm i old./B. -?/ et 352 : #yahj: iH : ^Episilianslrum % Ef: m /ff.
Capitului H muUinorum betcrogamtmi, H. radii fEifineis biserialibas,
exter. ligulaefo^mibus cxsertLs, inter, brey.ibus subtubulosis labio «xt.
miqimo. luvol. Horibuatfeni^ius, squ amis irregu la rile r itebrica.U*Jan ceo -
j.ais j.liaceis. Recep1. nuriimi. Cur. l.lainalaj : disci lob. c%V. a-, iut,
•a-dciitnto, centoiles subrcgulares : radii inter. ambi|t*, exterieores
lab. ext. longo ligulaformi ^dentato tumidum stylum superius, in
multo minore subbjlobo. Anth. basi bisetosae, longe appendiculatae.
Styli ramuli breves obtusi. Filam. kewia. Achænum cylindraceum sub-
hispidulum, rostratum. Pappus setis filiformibus crassis scabris.—
neiw« Oan'enses perenncs ^carles. Collum lanuginosum. Folia radicalia
ljrevitei-psuolauai elliptica obtusa retrors Ujn suh^nuate. Seapus lanatus
j_cepbaw. CapituKi'm nmpluni aiiirantiacum. — ^abitus Chaptalirtseu
Gerbera? fleet, ucpticai.

L. AMBIGUUS (Cass. diet. 25, p. 2_{n.}), (Mil.) s. brevissimè peti-
subrotundis int. cjjii saoi rcti orsum subsinuat glabrinusc. >*Ia*iis **cJjij**
adultis) cano-tomentosis, scapo apice involucroque villoso-velutinum. Hiibiis:
lòve longiore, chenùs puberulus. 24 in Africâ Capensi ad Zneenro-
Crceu l_yit ^ Di-L-fic³Pcioli ft-J lin. longi. Folia 3 poll. longa, 15-18 lin.
!;,; on coriacea. [igul... dr... v_h Apr* flavae, subr. purpureæ. (v. s.) P*

- 2. L. comACEus, foliis petiolatfs obovato-oblongls basi attenuatis sinnatis out snb-, intcris coriaccis suprà glabris, snbtùs junioribus cano-tomentosis, adultia glabriusculis, petiolis junioribus et scapo v ill is longis mollibns patolis hirsuris , scapo vix foliis duple¹) longiore, invol. sqnamis 1-2-seriatis albido-hirsutis apice pallidis, aobaenii pnbnilis. If ad Cap. Bonaj-Spei in dislr. Uitenbagen legit cl. Ecklon! Scapus 6-pollic. Collumbirsutissimam. Pctioli pollicem longi, demam glabri. Lignlae ao-?4 angustae. (v. s.)
3. L. TIRIDIFOLIUS, foliis petiolatis ellipticis aut oblongis integris ant minutè dentalatis suprà glabris subtùs glabris aut birsotis utrlnqnè viridibns, scapis folio daplo triplò longioribus, invol. squaraigladrinsculis, acLaeniispubernlis. % ia Africà Capensi. Ligula flavec aut subtus sabrabentes. Sea pi fl-io pollic. longi.
- a., *hirsutus*, folia ellipticis subtùs praeserlim secùs nervos hirsntis. — ad Keikama et BuiFelrvier legit cl. Dregc! Scapi à bail ad apiceni hispidi. Petiolx fi-i2lin. longi. (v. s.)
- /g. *medius*, foliis ellipticis subtùs parcè hiftutis. — in Tambukiland legit cl. Ecklon. Petioli 6-12 lin. longi. (v. s.)
- y.? *oblongifolius*, foliis oblongis integiis utrinque glabris auj vix ad'nervi basin nt in. petiolo et scapi baai subhirsatulis. If. ad Klipplatrivier et Zwarteky ah. 3-400 ped. legit cl. Dregc! Petioli 3 liu. loagi. An forte sp. propriu ? (v. 8.)
4. L. CAWDOLLEI, foliis breviperpetiolatis oblongisintcgris cretis ntrinqoe sparsi setosis supràdemiiin glabriS) scapo foliis mnltò longiore basi sparse bispido apice tomentoso-birsuto, invol. sqnamis biseriatis extùs subbirsutis, Achaenii velatiuo-puberulis. Of in interioribus insata Madagascar partibus legit cl. Bojer. Epidinastram Caudollei Bojer 1 in litt. i835. Scipns circ. pedalis. Folia 3 poll. longa, 8-9 lin. lata. Inv. squamae extùs glaben'inac. (v. s.)
5. L. BOJERI, foliis petiolatis subcordatis remotè denticulatis patulis snprå et subtis in nervo sparse setosis buntùs cano-tomentosis, petiolis scapis involcerisque hirsuti-ssimis, acbxniis glabris. If in partibus insulac Madagascar interioribus legit cl. Bojer. Epidinastrum birsntum Bojev! in litt. i835. cam ic. fruct. Folia et habitus ferè Gerbera cordat>. Collum albo-lanuginosum. Hirsutics scapi et invol. intensè rufescens. Lignla circ. ao lineurcs ilavee. Pappasrufus. (v.s.)

DCCXV. SERIS less, in UnnasA i830.^ a53. sjrn.p. 99 non JVUM. (1).

Cipituhim multiflonim, Invol. floribus aequulc ;iut paulò brevius , squamisadpressis Juearibusacuminatiscoriacis. Ueclp. nudum. Flor. cèntraleshermapbr. , r>diu fuemuei..Cor. extiis pilis hrevibus crassis ohsita fl. herni. 5-fida regular-is Ipbis revolntis, fl. faun, ligulata aut bilabiala. Atatherai in U. herm. caudis laceris, in fain, aborlae disliuclae. Filam. glabra. Stylus glatter, rauis ~~U~~CVNIIUS cretis. Aechiamitrocostre oblongo-cylindraceum longè densèque villosum. Pappus uniserialis paleaccus aequalis, paleis lincanibus serratis. — Herbae erclac perenncs inermes Brasilienscs. Caules scaposi simplices teretes lanati. Folia coriacea penninervia radicalia subpetiolaia.autalterna sessilia integrrima aut denticulata reticulalo-voiiosa. Capitula terminalia. Invol. tomentosum.

1. S. POLYMORPHIA (Lest.!). c. p. 254), scapo simplicissimo subaphylio, foliis radicalibus plurimis integerrimis, capitulo radiatu. $\frac{1}{2}$ in Brasiliâ equinoctiali (Sellow!), ad Serro do Frio prov. Minas Geras (Vanh.! n. 316). Onoseris brevifolia Don la c. p. 246 ex Lest. Variat 1°. foliis radicalibus (sen è rhizo-

mate orlis) (tibrotnndisobnvatis et ollontjls, obtnsis acntisve, glabris ant hir-tls; 2". corollis radii Iigulatis ant Iabiatis lab. cxt. 4-dcntato, int. filiformi. (T.fcJ

2. S. DISCOIDEA (Less. l. c. p. 255), canle basi simplici apice paniculato-corym-boso, foliis radicalibus breviter petiolatis rotundo-ellipticis obtusis integerimis mucronulatis, caulinis subsessilibus obovato-oblongis, capitulis discoideis. $\frac{2}{4}$ in Brasilia aeqoinortUH. Folia sn[>ra Incida, sobtiis piloso-iomentosa. Flotes capi-tnii oranes tubulosi 5-fidi.
3. S. DKITTiri.n-i \, MM pis plorimis simplicissimis snbaphyllis, foliis radicalibus Nnb sessilihs ovalis < Jt-jiliculalis. invol. sqaamis acuinatia. % iu nasculs ediiis nrov. Sancti-Padii ad Mngi das Crozes novemb. Ilor. legit cl. Lund. Folia 3 poll long;«, a poll. ials. Kx capit. junioritju.s uonjadioire quaoa'n siut radiata seti for; poliis discoidca. (v. s. coma). « i;J. Lund.)

DCCXVI. AMtilASI'KRAIA hank, in IhtgeL enttm. pl. p. fi₇.

Capilulam inultiElorum keterogamum, floribus radii 1-serialibus H-
atulatis 1'oeininfis, disci tubulosis subbilabatisj lobis longiuseulis revo-
Jutis. ttecept. pntlum tsuBalvcohtum Iiuduni. In vol. carnp»nulatum
pluriseriile inibracatum. Fiam. gin bra. Anlli. caucBitse. Styli raini bre-
vissime pubtuli. Achaeqium erostre papulosum. Pappus pluriserialis
pilosus scabt-r. — Herlja Australasica! imhitu Tricboclines à qua difiert
Ijlnm. glabris el iccept. nudo nuc. fimbrillfiero.

- t. A. si*i'*, ~~ERUM~~ (P.enih. !.->) — in Noya-Jiollandia ad Swan-River. Folia
• lie- pftiulata oblonga sinoato-dentata, sqra glabra, auhtua albo-lanata'
Scapus erectus 1-2-pediilis, sparsè sqaamJger, i-cephalus.

DCCXVII. TIVII IUtO.IM: Cus.bun.phUom. rtvifp. i3. Met. 55.pziS. Less.
in iinna'A i83o. p. 186. — Cbaptalisc sect, F.uityis^l liicheiii^ sp, Don.

CnpiUilum mnltiflorum heterdgamum xqualiflorum radiatiforme.
Inv of. catrpanulati squaiae integerimae plaua? subfoliaceaj. Recepit.
?loso-fimbi illil'ct uiti. Cur. j-nervia bilahiata : disci labiis su aqua
bus, ext. 3-, int. 2-dentatis, radii vaide inaequaibus, ext. ligulaeformi
ampliore 3-dentato, int. lobis 2 distinctis aut coadunatis. Filam. disci
papillosa. Antheræ caudis laceris; radii abortæ. Styli basi æqualis rami
breves obtusi extus supernè in fl. disci puberuli. Achænum erostre
Urrbinamm papulosum. Pappus multiserialis sceloso-puleaceus serratus
longua sqoaiis. — HerlKe Austr.-Amer. perennes irferines, rbizomite
ciM.sso, caulinus scap Mifonuilmis siinpiithus a^hyllis i-cephalis. Folia
ad uolliim conferta. Co;-, ciroeaa.

* Foliis snbtiis dorsi niv&o-tomentosis.

- ✓. T. WCAKA (Cass, diet. 55. p. aifj), oollo deuse lanam, foliis sabtns niveo-to-
mentosis Iiitcgerriuis aot s;rpissime pinnati(Mi's, lobis .suLtrian»n!aribns in-
tegerri"")> involocri sfjaami-, la'icidiaii.s soblus niveo-romentosis acumioaii-
subæqualibus. $\frac{2}{4}$ in Brasina meridionali, Montevideo, Paraguay, Patagonia
boreali et Bandä orientali. Less. ! in linnæa i83o, p. 287. Hook. et Arn. comp.
1. p. 103. Doronieum incanum Lam. dict. 2. p. 513. ill. t. 679. f. 3. Arnica
incana Pers. ench. 2. p. 454. Bichenia sinuata Gill. et Don in phil. mag. i832.
p. J91. ct Ouill. arch. i. ji. ffij. (v. s.)

- ... T. SPECIOSA (Les.H. sjn. 117), collo salilanuginoso, /olils pcltolaiis lanceola-
lis utrinque acutiinatis inliegcrimis 'tibiis nivto-lomentosi scans follia tri-
i., [ongiOrf, invol. Kftiamis la^eeolXlil .icarainalis, exterioribns h erioribus

- linearibus subtus lomentosis, ^ in Brasilia legit cl. Sellow. Dolia 6 poll, long;!, 6 Jin, Jala, Scaptis scsquipudalis. (v. s. comm. à mas. reg. berol.)
3. T. BIACROCKPBALA { Less, in linnaei tS3o. p. 5.88), collo undo, foliissubtiis nivco-tomcQiosis integerimis, sc̄po foliis el involucri Bqo^{m̄is ex} teroribua obtnsis aut acutin. II iu Brasilia aeqninoctiali legit cl. Sellow. Cupitulm mulln ittnplius qnaiii In prioribuii. (v. a. comm. it mm, reg. berol.)
- ij. T. CIWEBARTA (Hook, et Am, comp. i. p. i o 3), foliis petiolatii ovalibns rnegosis snbins toracntoiii'-, sopri ili-mum subglabrat, peii>io liinbo paniatn breliore, scapo folia subu'-qiumr, invol. sqiamu omnibus aCuminatis. IL ml Portezaela in Audibna Mendozianis. ISicbenia cineraria Don iu phil. mag. i83i, p. 3j). t̄t in Uoill. arch. 2. p. 46. Filaio. papilloso ct reetpi. birsntiim : ergo vana Trichocline. Ligij; ti-ncrvias.*
5. T. PLICATA (Hook, et Am. 1. c), :ii;;:i*co-tome* itosa, foliis Bjgn'gatU sessilibus laaceolatis mncrojaoiatis sinuato-jilk:at's, scapo lon^itiuliic fotionuu, invol. Bqnamis ovaio-!ancedl;)ij« planis dentguliitis. % ad 1'oriezuela de Mcndoza et las Aciivas prov. Sancti-Lucia; C'bilfosis, Ilk-ueata plirata pon 1uss.

*' i oUis glabiis am laxe subvillosis.

6. T. 11cHIM* (Lfss.! in linna^ i83"o. p. a^8), foliis stibglabm obovato-oblon • gis .lentis bifvitr pectio'alis inlegeriuwA antwcpii's lyi'ahs pinnalilidive, iavolucri s'qamis intira acuminatia. "K in CrasiKil taeridlminii jn'opc S.-Josu;ul (I Uragnay. (v. s. comm. it mus. reg. berol.)
- O** 0, Tweedti, Foliis, saltern jantoribm, snbtua nl^co-tonicnlOMs, liguli-, .sul, jjerviis. % a1 Moatevidco- li. InnnilisHook. et Am, roinp. r. [i. to3. ||| species propria?
- R** 7. T. HEIKRHYLTA (LtSS. i I. C. p. 28 foliis glabriOMllis ,!Ut lil.ti' v\| lodo-to- uieitosis longe petiolatu oblong is integerimis aH jtintnitiliLlis , iuvoiacri sqnamis intimis (ittn^iy sen a cut is UJ, 1 Line vis parum MCaiiosls neijoc dnduliiti^ If. in Brasilia meridional i cl Monte video. Onoscvis hctero]>b^Illi Sprang, syst. 0 3. p. 603. Chaptalia heterophyDa Don inms. lin. soc. IG. p. 24.^ ^v. 8. comm. a mas. reg. beiol.)
- I** 8. 1 . MAXIMA (Less. ! I. c p. 390^, foliis g labris oblongo-obovalis integeriiois ant. |>itni;tiilidi.s Lbho teriniuill maxim10, inrolucri .sfjnamis oblnsii ant acniU , intifoiaupiclatissirtiesCfflrioHO-Dm inlatiis IL in Rr>sii;i meridional!, (v. H. coniin. a mus. icy. berol.)
9. T. MEa¹OSA (Les. ^, n, p, 11S), canlc simplic! s imo inferne subglabrate folioso apice lonieitdso npb}lk>, fmlis canllnLs npj proximatis integerimis utrinque ncaminalis, ncrvia-. ?> purnllcells, tevol. srjuai^{m̄is ex} let, rotundis, Inter, acuminialis. — iu Tirasiliti. Habhus i CWo^{is diversissimus}] an certe congener?

JH;C\VUI. I.VCOSKIUS Cass. opusc. •>.p. y5et \ \ \ [excl. spec.) lea. i/tlntt a& 183O./J, z56.— DiaJseoxIdis spec, Don. — ©noaeridissp. Willd. h'urnh.— Atra- lylidls sp. Linn./.

C;tjiliimiina?qimliflornru be!erolia turn tip vol. arcleirabri- catummuHiscrale, sqiainisoblo'u^o-fivaltsacuiniMaLisincvinituis, ihtert, longioiiljus. IAccept. jfimbriHoso-pilosuni. Florcsdiscibcrmaphr., radii uniseriales JV*minei. Cor. gbbre, disci regijlartfs 5-fidae lobis p^rte integri brevioribus, radii ligulatae, li^ul'i [LIJO brevlori. Antli. in disco caudis integris filam. Isvibus, in radio al>orta;. Stylus >isi bulbosus, ranris ft. uerm^phr. iuaqialibus, iii disco bispidia, in i;adi<i^la- l>ris, fl, foem- subinriiitsts. Achainiuni erostre? Pappus sBqunlis palceaeus longus^ paleis angustissimis lon^c: «cum inatis serratis. —!U-rl;r siti- J W firi? incrmes. lolia aUerua biyvilar petiolala integra subcoriacea

pennivenia reticulata suprà lucida laevia. Capitula terminalia, semper abortu dioica ex Don. Cor. purpurae.

i. L. MRXICANA (Cass. et Less. 11. cc), foliis penninerviis fntegerriulis sub I i s ramilisqiealbo-tomentosis, capifulis solitariis, pappo 5-paleaceo. t) in Mexico ex Mutis, in temperatis propè Turbaco Novo-Granatensiuni ex Humb. et Bonpl. Onoseris Mexicana Willd. sp. 3. p. 1703. Atractylis Mexican a Linn. f. •iippl. 3ão. Smith ic. 3. t. 66. Onoseris Tnrbacensis Spreng. syst. 3. p. 502. Diazeuxis Mutisiana Don trans, lin. soc. 16. p. 253.

a. L. DENTICULATA (Less, in linnacå 1830. p. 257), foliia penninerviis argutè dentalatis subtùs ramulisqne glabris, pappo raultipaleaceo. — pair, dubia. Onoseris denticulata Willd. herb.

•j- *Species exclusce.*

L. HYSSOPOR*oiiA Cas\$. ±r Onoseria hyssopifolia.

L. TRIPLINBRVIA Less. = Diazeuxis latifolia.

DCCXIX. DIAZEUXIS. *Don trans, linn. soc. 16. p. a5x et a5a. excl. sp. a_a. Less, sijn.p. 97. — Langsdorffia WMd, herb, non alior.*

Capitula dioica multiflora bomocarpa. Invol. spheroideum, squamis imbricatis coriaceis adpressis acuminatis. Recept. alveolatum, alveol. marg. laciniato-timbriatis. <y Cor. disci cylindraceo 5-fida), radii ligulataj labio inter, simplici. Filani. glabra. Anth. basi longè biaristatuj. Stigma pentagonum. Q Cor. filibrimes, centrales :cquals, exteriores diiormes. Stylus basi bulbosus. Sligmala cxserla spirajiter saepè convolutii. Acba3nia compressa linearis oblonga glabra. Pappus (^setis i-serialinis cinercis compianalis spinuoso-denlatis subpenicillatis, ^ tri-serialis conferissimus denticulato-scaber. — Frutices 'Austro-Ainerican. Folia alterna triplincrvia integerrimaseu subdenticulata lanceolata, suprk lajvia lucida, subtùs lanata. Capitula terminalia scssilia Ibeminea masculis triple majora. Cor. purpureae, — An -t Lycosridc genus satis distinclin? et Don asserit enim Lycosridem Mexicanam esse dioicam.

1. D. LATIFOLIA (Don trans, linn. soc. 16. p. 30a), ramis angulatis, foliis basi attenuate. ^ ^d Caracas et C&rbagcnam Less. syu. p. 97. descr. Langsdorffia melastomoides Willd. herb. ex Less,

a. D. INTERMEDIA, ramis teretibus, foliis basi attenuatis. 5 ^ Caracas legit cl. Taigas! Lycoaeris triplinervia Less, in linnxa 1830. p. »57? (• « comm.a cU Vargas.)

3. D. ThxvKnxia (Don trans, linn.soc. 16. p. a53) ,rami» teretibus striatis, foliis basi obuibis. £ ad Guayaquil Peruvianorum. Astrr irinervis R. et Pav. herb. ex Don.

•}• *Species excluscv.*

D. MUTISIANA Don. = Lyoseris Mexicana.

D. SERRATA Don. = Yernonia arctioides.

DCCXX. MOQUINIA DC nbn Spreng. (0- — Spadoula Less. syn. (183a). p. 99 non Fries (1817)-

CajutuladioicJipauci- (5-iGj llora homo^auia. Invol. imbricahini floribus J)revius. Recept. plannni nuduin. Cor. glabraB regiihu-cs 5-fidie,

(i) Moquiuifa Spreng. ~Loranthi (uec Cieinoutiao ut vultRoicheub. ^ aiiecs, Caucus prod. iv.[>303.

lobia linearibus. Anllierajinaiisijaudalae, Foeminct nuiimcnUiriae. Slvlus flor. inasc. glaberriimis. Achrouia tcrctiuscLiki crojslria. Pappus biseriatis setaceus scaber ciassiitsculus. —• FrutfceS ramis sliatiS toiu cutosis. Folia a Item a peliolata integra aut dentata penninei*via sublus tniueu-losa. CapiLula ^arviusculu,— (JSfcnus dixi in bonorcra, cl. Alf. Maquin-Tandnii prof. Tolosan'o qui,circa florum synimetrium et ordinem C! no podcnrum egregiu dissewuit et qui etiam dc zoologiS Hirudinibua ill- lustratis bene meruil.

Sect. i. SFADONI:-^{MA.}

Cor. lobi tnbo longiores aut ei .-equates. Aehu;nta velutina. — Species Americana:.

- M. RACEMOSA, i.liis has! cuueaUs, cupitqliUlonee racnimsis oblriwi^is 4-floris. Sy in Brasilia legit cl. Sdl.ow. Co/ty/«,r:ic<iaosa SjnvHg.sysl, ;. p. 5uH nun RIam. Spadonu racemosa Less. «yn. too. (v.s. comm, ii urns, wi|- iieigl..)
 - M. PANiroLATAj tolih eljjitici'; oblongM-e |>n,i obtissimis, ea pit alia sabbrace-mosn-pflniouliUis longc turbialis a-3-florU. fy in Campus iJi.isiiieiiMiini pi ope S.mcto-Panlo.Spadoiiiia paniculaia Less. syn. p. ioo.
 - M. rnu'MORru,;, (i.ljis ovatis rlllpil, 1 .'. J.iritis iM Hubcordatis , capitolkpa-uli-iliis olyovatis 12-16-floris. in Brasilii (SeJlow!^, ad Kio J;uieio (Gan-dich.l.)!^! Rio Grande (1 weed.), Goohn^iia pt^juiorplia beib. • reg. 1. eroll Spadtjii:i polymorpba Less.! 1. c. ^v. s.)
 - ccanothijolia* (Less. 1. c), foliis ublongis argute serrfatis aciininati.s sub-tus dt*isi> toinr'Uasis.
 - eltxagnifofiu* { Less. 1. c.) foliis oblongis integeminis ncnminalis auhtii dense tomentosis.
 - obttisijolla* (Less. 1. c), /ollis oblongis integerrimts obtusis aubtiis dense tornen tosis.
 - popnljoh'a* (Less. 1. c.,), foliis brevibus subcordatis integenimis sulitiis dense tomentosis.
 - sordida* (Less. I.e.), foliis brevibua integerrimis subtiis laxo tdiisntu.sis. ^!. *htclda*, Joliis ellipjlico-biiicc'ol.itis integerriDjis utntujne ncuiuialis supra lacidis. — in eollibas circa Bahiaiti It^it cLSatznintiTi' Arbuscula io-i6-p(j-ililis. Cor. pallid;!. An spec, projil? (v. s.)
 - M. CISHRBTA, ii.liis laic ovatis ovalibnstjaennieroinalis rarifis(Iriictilatis su-MLI i. .irioso-nitkjis iiihrirs tuiueito brt-vissimo pallide einvto tectis, capitolis 3-6-flom lm-visMjm: pedicellatis saJraccmoaS'-f.isrjciatis, invol matissitbay-lin(Uaceo 6-io-floro, squamis filoso-imanis cili;iiis extreibrii ns oval iHofetosis, iuliniis OIJJL — ;;; p^asilii ad JUg JUopty ex Rio Oiiiide- L ; :: cl, Tweedie. Spadtmia clucicci I! book. et Lm. comp. i. p. i 9.
 - M. HYPOLEUCA, I liis breviter petiolatis ellipticis basi attenuatis apieuesnbombsis mncrpnatis coriacci suprà glabris subnitidis subtus ran inisHjne lomerUu atbo vdptinis jaiut'ilati« lerlinalibus ovalis confertis aphyllis, ca pitnlis fi-7-Ilri, iavolacri sqnamis t'ccis ov ilis nialunei viis ciliatis, achenio oblongo pubis- e, pappi aerie cit. inleiori d . x in Mexici Novi-Leon prov. ad Bio;itciey lept ol. Berlandie! lavol. fustnru. l'appns in: escens. Anth. long; caodalSBaborlivdy? Sfigmata glabra obtusa. Eabitusste Pbyllae oleoitiis aut Pomadercil iliscoloris. [VJ s.j

Sect*? II- S1IMiO.MSMV.

Cor. lobi tubouii illub. *Achiænia pubescens* tia imo gl. **ubeirima.** ^Species AfVIcana.

M. Tjoirfti, Folii obovato-ciliacalls apic; denlatu supra glabris subtus rapu-
Jisqae adijicsst: cauohlonieniosis, panitula ibyt.soicli
etvel; squalis spongo ciliata multivariibus exi: 1) rissiniis, uler. • squalis
elongatis, (jiiuibis jiicis uciilis. §• In in sula Zanzibar! «ruti» (frioa;
noctialis orientalem in sa\yium fl\l luiijiji;:?:, Hvtvai'jim U'^il el. 1*. i\i ! Vernonia

cernna Bojer! in titt. Specim'. fcemin. laultim vidi. Cap. loilora. Cor. *luhus longusteres* biscallosns, lolii aecli brevissim. Stylus rxsertns glaber. Achauit reretlnscula atria to-an ~~gilla~~ a bral; mi pubuscelitiae Paricula c.v cl. I JBijr cer- nilia et antberoc nnd. An gen. is proprium? (v. s. comm. à cl. iiiiv.)

DCCX.XT. GOCIUSATIA //, IS, et Kunth nw. gen. am. 4. p. 19. /. 30g. Kunth
syn. 2. p. "A'vi. (exci. syn.) Cass. diet. i§.p. *49< —Coriinaiai sect, ia et 3<< Less,
in UnfUBii iHio. i>. 260, syn. p. 102.

Capitulum imiltilloruin s;cpis bomogantfum. Involucri subcampaulali squamae inenibranaceaB sicc;e, inter, lougiorcs. Kccept. nudurn aut brtsvissiue viflosum. Cor*, glabra, in fl. berrnaphr. regulans 5-fida, in iretiintis bilabiata^ lal>. ext. ligulseforini 3-deulato, iut. -i-partilo. Atilh. Hiir. hermapbr. lontje caudala;, in fl. foem. aljorla;. Styli basibulbosi raini breves obUisissimi glalni. Achaenia subturbiuata erostria villosissirna. Pappus plnriserinlts pilosus ,sc;ii>er rigtdulvts. —Ilerbae aut suil'nili* os Australi-Americanici. Caules tereles. Folia afclrna rcticulalo-venosa subtiis curu squamfs involucri raniuUsq; tomentosa. Capitula terminalia.

Seel. 1. VERNONIOIU£S.

Capitulum homogauitui sc.uali!tmuni malbfloium discoideutu. Involucrum floribus [previus. Cor, unities J-iiidn: — II-UIIICL-S folia petiulsti.s.

1. G. vERNoitio/iits (H. R. el Knulh nov. gan. >\. p. •'<>. t, 309), fuliis obiou^ii uculis basi rytuuc(atis integer: imis iQCiubranaocis BBBtus lajnalis'tjuc albo-tn-meatosiSj capimlis huligeminiit.) io regio.ne raiidii prov. lii.ir.irnoicnsis ad 1 iji.nn Jinni. Aiiia/oiiuin. Cot', liavit. I'appaua albua. A11III. cautlae sul>ciLiata^p. hivol. squaiu* iipjce Bnbpmigemes.
 - a. G. HOTUWJFOLIA (Lens. syu. 10a), plabergina, lilli.s subr'otnnndis apiculatis deaticnlatis co*riaceis*, capilulis solitarilB. j itt Brasilia. Capittila magnitudiae Griii lidiciojibylli. Rect'pt. brevin»imc piloso-firabrilltfenitu. Aml. caudic la evcx. Cor. viola<ea-i'

Seel. 11. IIEUHAIOI'HVI.I.LM Less. syn. joV

IIIIVIUMCMIII il'irt-s lirnniijibr. ~~aditos æqnans, se~~ iH.imis iiliciiilui.sadpre.ssis. An tUeraruin caadac laceric. — Hrbsc c;ule sablignoto, tnlis sessalibuk cun'érils u - i-^crf'uijis coviacis.

3. *O. CORJ>\TA* (Lefts, in Uniiau 1830. p. Ji63), caule dense tomentoso, foli* - ova-
 (is cordaUa acut.i.s, capitals splcato-rareaiusis distioidfis. If m BrasiliIB iilcri-
 dioalis ((Less. JGxelChubilijitiblissi tsodispil;iniiii'bns ml Portalegre, Rio
 (iran de et ->u .liiqnely. [Tweed, ex liotik. cl Am. i-omfi. 1. p. *»8.) Pappus
 •A Havi scens.
 4. c. , , -n »i - , , (L es. l. s.), , , >; e g ; ln-o, ran is tomentos is, foliis elipticbi seu
 „, l, , vatis acutis basi obtus „, is, ciipitnljs eorywiosii radTiitis. If iu lirusiJu meridio-
 nali. Cor, rai ii bil»biRl:c, lali; exL utgosio, int. bfpjulito. Pappus iutnse li!-a-
 cinu 4. (v.d.ciumi. § inns. teg. Iberol.)

Seel. in. pENTA*iiioRjjs-/2W\ el Am. uo'mp. t.{>- 108. — PenUi-
phortis Z<<n trans. linn. soc. 16. /*, ?t)7-

('apit. A- aeu molfiſlra nggr^ga^ha b>mmg»iita inrjiuililora. LuvoJ, Utiribtis bre-vio8. Autli. caadas intefjrae. -Styli rami piirbreres. — Frolices Chileuses. Folia ssc-silta liasi aiteauata fleuunn ~~glabrat~~ et ieMDnsa. — Aug<nos prpprium?

5. *G. FASCICULATA* us (Don it) Hook. romp. 1. p. 108), *Arlia*s laiuv I.,;!, acatisdeutienlatiis nuihingnt • ifsiis'KO ptiBciatisvcni hosis, ca..imlr. la-ici-L-uJittii nuihiRoris.

- 5 in Ciili*nsibu5 Amlilius ad San-Gabriel et T^A Sepoltuni (Gillies), i't-nlajibt*-ru\$ fascicnlaris Don pbil. mag. i83a. p. 3<ja ci in GuiL^L a rob. 2. p. 468. (v. s. ex itin. Nee.)
6. G. PYRIFOLIA. (Don in Hook. romp. 1. p. 108), foliis clipplicn-oblongis serrnlati's venoais parci lanupinosis , capitolis corymbpsis 5-Iloris. ;) in Amlibnsi ChiknsiamadCiixou del Rio Tlengaiica (Gill.). Peritapbotns pyrifoliis Gill, et Don pbil. mag. i83a. p. 398 et iu Gnili. web. hot. a. p. 468.
7. G. r.iiiiDA (Don in Hook, coin p. 1. p. i»8), foliis oblon^js mnchronnlati.s denticulatis veoosis ratuulisque primum lanuginosis, capitilis 5-florue frijato-corymbosis, invol. sqoaiuis ovatis jnticronatis (ex H. el Arn.) sen lam^eolatis acuminatis (ex Don). 3 " Andibos Cbilensibaw et Mendozianis ('Gill.) et ail Valparaiso (Bridg, Macr,!). —Hue forte ex Hook, et Arn, m mra var. reforrendus Pentapborus foliolus Don trans, lieu. aoc. 16. p. 29^A. (v. s. ex Itin. Macrae cumm. abhou. soc. hortii;. lond.)
8. G, (ji.UTisosA (Don in Hook. comp. 1. p. 108), y^coMs.sima, fdliis tin^{cari-}lanceolatis acuminati.s. mtegerimJs avuiiis, laj'iulis cylindrit'is^floris fasde-laiia, invol. sqaahiis lHnceolalo-.snlm];Uts, ^ »d M#ndcaa" (Cill^, Peniaplioms Gill, et Don pbil. mag. i83n. j>. 'Iga ct in Guill.iicli. 2. p."^JS. I'ijtpuh aluta-CCQS. (v. s. ex ilin. Nee el Hsenk.)

-j- *Species exclusæ.*

Gi ILICIKOLIA Less. r=Anastrapiilia iildfolia.

G. CKMISTOIDESDOII. = Cyclolepis gcnistoides.

G. ror.YMOKruA b. Ber. n: Motjoinia polymnrpli;i.

G, REVOLUTA D o n . = iHardopbyllum revolDtnib.

G. siECTAiiiLijf Don.. E= Leocomeria specclabilis.

DCCXXII. LEUCOMIVRI* Don prod ft. nep. p. iGy twit. Hium, (i)- — GocboBtise seel. »• Less.sjn. 10J.

Capitulum 4-6-floruiH hoiuogaimtm. Recent, mnlnm **aqqustunf**. Tu-vol. cyliliHraceuin imbricatiin, gqnamis ext. brevibus ovalis Mentis , int. longioribus lanceolate - HnearihuS acuminatis. Cor. tnbulosje .0-ii<!a, lolus linearilnis iipice sobcallosTs cxliis in siccata. revolutis. Antler elongntu', caudis batentlni ant recurvo-plmoosis. Stylos by*^i bulbosus inclisiu.s :tut \ix exsc:rtus, ramis brevibus obtusis glarliris. AchifiHiuu leres erostre villis sericcis croc t is on us turn , sum mis pa pp u lli cnlyculi mon; tiircitiniKilUibus. Pappus stLfs jtlorisserialibus scnljris rigidulis achjeuio li[>!o longioiibus. —Fruicfes :i:it herhre NejialcDses, Gaulcs inmosi apgulati, saltcni juniorcs cani scente i. Folia alterna inttgi-a o\>lia utrinque ncuminata, supra clabra, subLua caco-toracntosa. Capitula **fiisciculato-coryinbos;**, peoicellis cauis, invol. **glabris**. Corollaeexsicco purpascentes. AulJiursc all>ae.

- i. L. SPKCTABILI* (Don prod. (I. ury. fjo), arborescens, IAHII leretibns, obtosc jooioribns angulatis, foliispeitiolriacein" "valibiw tHiin^ue airnuatis, capitolis 4-flois. § in RegaliA (.W^ill.), e' Sinua^hn (K:imr. ex Don). DC. in Deless.ic. eel, 4- t. 78. OocijnaUa spectafcills Less, in linn»a i83o. p. 361. Lencomeris special Jills Spreog. syst. i. p. 410. Folia 6-8-p'ollic. longa, 1 fc-b lata. (v. s. comm. a cl- WtHieb IS'JI. snb nora. KnpiitKii, «t a cl, RoyU 1833.)
- . L. MAfhvnYHA , licrbacea , ramis uaiti: uncnlalis , aduliis glabm, i'oliiii bre-viler peliolalia ovali-JanceolatJs ittinqne :t.tuiiJn:iiis si)bmeiubr*nafcii, capi-

(1) Leucomeris Blum, est Vernoniae sect. Strobocalyx.

tulis, 1-ilojis. — itt. Nepalia delexit cl. Wallieh. Cunyza camiicans Wall.! cat. u. *999- "i>ip. n. io(). Sctl vefor nc erroic ftiiodam tiomeo et aurae'mn ad pnoreui icfemnia sinff ~~Pi~~ minivalleafffrinis, gedd ((-mless ~~herbaceet~~ aiopli ~~medal-~~ Kisi di:ir.i. 6-8 lin. I-olta i^-t-iS pull, longa, 4-5 laia. (v. t> eomin. a> boa. aul;i mere. aagl. [ml. or.]

DCCX.XIII. ANASTK APIIA Z>OB m<< M. Zi>i>. soc. lfi. p. 2g 5, — Gocbnatiae sp.
I io.v.

Capital um muki- ct sequaliflorum discoideum. Involucrum ovato-caropanulaTura imbrtcatufti raultiseriale, squamis lanceolatis acumina-tis, bextci. bivevorilus. Rcept. uududn. FidF.ihernphr. Cor. glabra, irregularis, 5-nervia, tu) coriiiceo, limbo 5-pavlpto, lobis Jinearibus rcvuitis. Filam. capillaria glabra e fauce e^secta. AAthrae iongue durae basi ijiscle. Styles cyiindricus (jiec liasi Ijulbosus) glabap a pice eraargtnatus priiui!sii5. Ad^u^uum erosLiu linc'are conipressum sericeo-vil-Tosiini. Pappus ji. rsistens, setis capillaribus subsequaiibus scrrulatis.— Erutex rigidus. llami tefelles tomentoso-albi tU:U\ ciner^i. Folia alterna pctiolatn coriacei elliptic?* spinoso-deutata supra glabra subtiis tomento brcvi alba, onmiuu Quorcus Micis. Capitiila ^cvuinalia sessilia Bolitaria foliis ferre cjtntigna. Cor. pmpureae'. Amheræ a Iba?.—Genus ex ha'bitU StifitiK \n\t\i aHine.

r. A. ILICIVOLIA (Dmi I.e.), ^ in ins. CuJ>a, circa Havnnnm. Goclialia ilitifolia Less. Tn liim^a IS3<J. p. 2(it. syu- p< ro-ji, Vcruunia Inftbns Yabl berb, ex • Less. (v. s. coiiiii. ii cl. Kaiouon di; la Sagrn.)

DCCX\ i V. 6TIPTIA Mttan del. bras, t (x8ao),flora iB-ji. p. 11 3. Cass, diet. 47. p. 5 1 i <•/5 \.p.tj. Lest.in linneea iti3o.p. 363. syn.p. IQ3, £on /r. /i<<. joe. 16. />. aoi. — Augusta Leatid. akad. Aliinch. j>lul. \n.p. aB5. f. 14.no/) /'oA/.— Sanfularia Leimd. i8ai. — Mouua 7)C. //rf, tff ic. 181S. (ee. — Gochualia sp. Kitntli. — [*laau* ftp, Spreng.

Ca^itulum homogamum discoideum miilli- el aequaltilorum. Ipvol. argLc imbricaliun, squaroisfcctriaceiS sicci.s multinerviis pvato-rotundis, iyt. iincartbtH. !req ji:pt. ijudum alveolatum. Cor. siibcortacea glabra regalavis 5-iida lo-iiervia, lobis extiis circuoato-revolulis. Filarn, lajvia. Aui!i. exsertse longe caudal^. Stylus cylindricfts glaber bifidus, ramis brevibus æqualibus acutis. Achænum glabrum elongatum brevissimè rostratum. Pappus multiserialis paleaceus longus inæqualis, paleis linearibus serratis. — Arbores asilienses glabræ. Rami teretes. Folia alterna peliolala oblong acuminata peuninci-via. Capitula tcrmitalia peduiiculis aquaiixii>igeris.

- S. CHRYBAHTBA //Mikmtiyl. (use i, oim ic), folitsli ~~lanceolatis acuminati~~ ~~IUS~~ capitatis solitriis, floribus oapilnli indtfioitis. 5 ^n SnisiiS cirei Kio Janeiro et Bahia Dnti 1. c. Caas. 1. c. Less. !. c. Augnsia grandiflora Lcaiid. I. c. Plaza lini.silien.vis Spreng. neu. enid. 2. p. ij/. s\at. 3. p. 6<>3.Mociuia Jimtuoides DC; diss. «t iu. inetl. Floxes-bitincialea aurei, Pappns croccuS. (v. s.)
- S. r'i,viiT,oBA. (Don 1. c. Less. I. c.j, ffjliis cuncato-laftcolatia, capital is paticulam, Uoriiir^ ia in capital o. 5 in B nsiliaad Campos \avos et-BdRiodaa • ^Corcis. Augusta parvlfiod Leaml. 1. c. t'lazla parvUora Spreng, syst. , p. 3ot. Pajipus flavicans. Cor. Iuiuu-albic^Tittis.

DCCXXT. PROUST IA £<^. ftmce/i. i. p. 33. DC. ann.mm. i_w p, C7 et 70. d(ss. lab. p. ')- Cuss. diet. 33. /; 463 e/ 4fjti. cf 55- /; 3gf). L*JJ. in linncca iS3o. //, a8o. Don tr. linn. *oc, id. J>. i 98.

Capitulum 5-florum aequaltilorum. Invol. turbinatum, squamis coria-

lulls 5-iloils. — in Nepali4 detexit cl. Wallich. Conyza camlicaus Wall.! cat. n. 9999. t-oinp. n. 109. Sed vereor no errore quodam nomen et nuraerns ad ppiot'ein teferenda sint? Priori valde affiuis, sed caules herbacei amplè medullosi diani. 6-8 liu. Folia 12-15 poll, longa, 4-5 lala. (v. s. comm. ab hem. aulâ mere, augl. Ind. gr.)

>

DCCXXIII. ANASTRAPIIIA *Don trans. Linn. soc. lfl. p. 295.* — Gochnatia? sp.
Less.

Capitukijp nultti- et aequaliflorum discoideum. Involucrum ovato-campanulatum iinl)ricatum multiseriale, squamis lanceolatis acuminitis, exter. breviopribns. Rccpt. nudam. Fior. hermaplir. Cor. glabra, regularis, 5-uërvia, tubo coriaceo, limbo 5-partito, lobis linearibus revolutis. Filam. capillaria glabra è fauce exserta. Anthrae longa; dura? basi bisclae. Stylus cyindricus (nee basi bulbosus) glaber apice emarginatus pruinosus. Acjaiiium erosre lincare compressum sericeo-vilosun). Pappus persistcos, seliscapillaribus subaequalibus scrrulatis.— Frulex rigidus. Kami tecftes tonicotoso-albi dein cinerei. Folia alterna peliolnlR cow'acca elliplica spinoso-dentala suprà glabra subtiis tomento brçvi alba, omaind'Quercus Ilicis. Capitula t^nninalia sessilia solitaria foliis ferè continua. Go^r. purpureae. Anlbera? alba3. — Genus ex lia]ilu Stifi'tiac valde ai'One.

1. A. ,inciror 1 A. (Don. 1. c)»£ in in^. Ctjia, cirqa.HWAtwm. Gochuatia ilicifolia Less, fiitinnaea i830. p. 261. syn. p^ 102. "Veraonia bifrons \abl herb, ex Less v. s. 'conuB* u 'cl. Ramon de la Sagra.)

*DCCXXIV. STIFTIA *Mikandl. bras. 1 (1820), flora' 1821./?. 113. Cass. diet. 4., j, *5i'i ec5i.j, f).* Less, in linncea f830./>, 26^. syn. p_p io3. *Don tr. hnn. soc. 16. p. 291.* — Augusta* Leaud. ukad. Mi'inchpitul. wip. ass. t. ililhøn Pohl. — Sauhilaria Leaud. i8ai. — Mocinia DC. diss. et ic, 1815. ined. — Gochuatice ap. Kunth. — I'lazije sp. Spreng.

* Ca^pitulum homogamum discoideum miilti- et aequaliflorum. Ipvol. arclè iiubricalum, squamiscoriaceis siccis multincrviiis ovato-rotundis, iut. linearibus. Re<jppt. nuduin alveolatum. Cor. subcoriacea glabra regularis 5-fida 10-nervia, lobis extiis circinnato-revolutis. Filam. Ia3-via. Anlh. exserttc longè caudatae. Stylus cyindricus glaber bifidus, ram is brevibus aequalibus acutis. Acliasium glabrum clongatum brçvissimè rostratum, V^aPP^{us} multiserialis paleaceuslongusinDequaiis, pa-Icis linearibus serratis. — Arbores B/asiiicnse glabrae. Raini teretes. Folia alterna peliolata oblonga acuminata penuincrvia. Capitula Lcrmi-lalia pedunculis squammigeris.

1. S. CHKYANNA (Mikandl. asc. ii eam j), folñ.sljncoobtis acum. uatu, capitulo- lis solitariis, floribus capituli indelinilis. J in Brasilia dñta Kio Janeiro et Balia Don 1. c. Cass. 1. c. Less. 1. c. Augusta grandiilora Leaud. 1. c. Plazia Brasiliensis Spreng. neu. emd. 2. p. i37- s^st. 3. p. 6o3i'Mocinia matisioides DC. diss. et ie. ined. Flores biunciales aurei. Pappns croceus. (v. a.)

- a. S. PAHVIVLORA. (Don 1. c. Less. 1. c), foliis cuncalo-lanceolatis, capitolispiniculatis, llorihus 12 in capitulo. ft'va IJiasilia ad Campos Novos et ad Rio das Cortas. Augusta paiviflora Leaud. 1. c. Plazia parviflora Spreng. syst. 4. p. 3oi Pappus flavicans. Cor. lulcp-albicantes.

DCCXX'V. PROTJSTIA *Lag. amcen. i. p. 33. DC ann. inns. 19. p. 67 et^o. diss. lab.p. »p Cass. diet. S3. p. 463 et 466. ct 55. p. 3Q5. Less, in tinna'ii j\$30 p. 280. Don tr. linn. soc?|&. p. 198.*

CipituluinS-flonini :rau:iliUumin. Invol. t^irbiualimii squamis coria-

f. *int6grifalta* (YS., et Arn. 1. d, foliis bfevisaime pctioiatis linearis-Janceolatis -stibinlef< riini^ lusi atiena.iis , ji.ippo folvello. (v. s. ex itin.NceaDO.)
y. *ilici/olia* (II. el Arn. 1. c.), foliis brevissimè perioMia obtingis mucronatis iiiJir^inc deiitalo-spmuloMs undjplH+i.srpie basi plernmuae oblasts vel ii'Uncwlis Ktriri'jiu pallide vidiihiis iCttculnto-venosissuiis, pappocinere. — ail Cotmimbo el Mcndoiaui. I, ilicifoia Hook, a Arn. in Beech, bot. p:?.8.

• Species *exclusa*.

P. *Dominica* K*rsrs Sjtr.rz: VerDoiii Domingensis.

p. *MEXICANA* Don. — Dumerilia Hiiinboldlii.

DCCXX>f. CALOPAPPUS Meyen retse. t. p. 315.

Cipitulum5-f1orura homogaijum. Invol. cylindraeeura, squamis liueaVi-iiubularUsl»sisAlilatAtissiihiinbricatis \tfxh crectfs , uxter. liinc inde serrato-sjifheliosis ilorilms I>revioribus. Recpt, tiudum angitis-tun*i*. Cor. oinnea hUajiafc glahrae, labio e\l. 5-flehfaCo, inter, bipar-lilo rcv'iUiio. An"lii. basi lpn^c caudalse. Styli fanu ablireviali apicc bispiduli. Aclaeen glabra leretiuscula eroslria. Papjius palcis circ. i5 J-serinliju liirfeaj-ilms acunrinatis ifftegemmis.—9uffi'.iHex phiCensis 11rFEH (!cnii>sus i<1moso-ce*spitosus mdicans i^laber. Folia subulala marline suhievokta iqteigeniina i-ncrvia concreti>sitii;i. Capitula toi¹-minalia solitai'i:i inter folia surnma sessilin. Cor, purf>ur<æ.

I. C. ATKROSOS (Meyen. 1. c. DG. in Delessel, 4 t. 79). t, in s am mis Cbilensibps CordiUeris, fv. 5. comtu. ; cl. Gay.)

DftCXXVII. MYAMS *Dun in Hook*, <•(Am.comj>. t. p. 108 non Salisb. (i).

Capt 1. /-f>-]oruui libmogainum. In vol. imbricatiuu. Uecept. palea-1 curt , iimlinllis calJo^is lu'evibit.s SHJ acliEcoia iiistruRlum; Cor. bila-llii;il;e, Yah. CXUT. maxima 3-dentato, inter, profnnde III parti to , loins linearilms njyoluis. Filaiai. glabia. An^h. basi bicandaise, scis longis phfmosis. Styli glabri ratoi crassi conrtventes oblixi. Ach^cnia ovato-oblboga veulrtcosa eroslria ro-costa1a. Pap-puspersisteus.S-serialiSjSeJiS pilosis deiiliuilatis ima basi comiaUs,— Herba percouis muiticaafis pubc implex A arg^ateus. Radix re-pens. Caules crecli simpHces »n_gu-Jati. YoWw (Uujjlcv'i) scssilia lanceoIaln-Hoearia acuminata integerrima neqvosa. Cap. panicumto-corymljsa ob1Onga.Cox.albx.^pp¹¹⁵ albus.— Getius Proastiae affinc ox cA. anct.

x. HABSI NTEA (D.J, 1. c). % ;> c:h:ii. — Vernon^{kk} argentea Gill. mss.

*. invol. squamJs obiango-lanceotata acum.naiis apice 3-nerviis. — nd Men-dozaui.

fi. invni. squaminiis ovatti-oUongis acatiuscufis snWiervik. — in prov. Sancti J.m! jva-i, in Pampas Cordovioc (Gili.) in planit. siUsis Palagonite borcatia (Tweed.)

I>CCX VIU. <: YCLOUiVIS GUI. etJjattinphit.mng. t 8la.>• 3,j3 mm M,>fu*n ,834. — 6y clop is C.ujU, arch. 2. p. 408. ~ Goclum) ^{ite seet.} Oyblepis Hook, et Jm.comp. I. p. 1 "9.

C:tplt. imiUifTonirn hom'ogam um aq niiillin'mii. Iitvo.1. muUij.ticloi'

dine .iinhricatum globosum , squarois stibrotundts adpressis scaribsis dilatntis. Recept. riudun/Cor. infundiiniliforihc* Jirbo 5- pariho recjuali revotuto. Filam. kevia. Aiith. basi biseLosae, sclis Jaccris. Styli raini longiiisculi! semi-cylindraceibbtusi r&curvati'glaberrimi. Achxnia longiuscula au^ulata sericca. Pappus long>is persisldis pturiseriaJJs sc-taceo-palcaccns fulvillus, setis apicc penicillatis.—Frulex Australi-Amerirnmis rartiosissimus canescens, ramis dcndatis tcretibps slriati.s. Folia sparsa linear-lanceolate acuta pi an a inlegerrrira sericca. Capitula per ramos sparsa subsessilia. Ana Gochnatia satis diilert?

- i. C. GEKISTOIDES (Oill. et Don 1. c.) 5^{at}l Mendozam(GHI.) et in tatagonife bo-rcali ad Guardia argentina (Tweed.) Goelmatia genlstoidq* Hook, et Am. I, c.' Vulgo Meodozianis tlclt^ Usillo. »

DCCXXIX CUILTAL^THERA R. et Pav, prf>d.fi.per. 106, c, a3. sysc. jgo. DC. ann. mits. it)./ >. 63 et 6{). t. \i.f. diss. lab. p. 7. / . 3- Lag. amivn. I. p. 37. Less. syn. p. i n. Hook, et Arn, couip. 1. p. 104 "" Bonpl.— ClKctHiihera et Chcrina Cuss. Less. — Cbactantbcra, Bicbema, Eotrixia et Proselia Don.

Capitulum niulliHortun heterogamum radiatilbrnie. Invol, Uirltualum campanulatum ve, squ;tiuis planis siccis submembraxiitceis rnarginse se-riosis pluriseriatiSi Uec^pt. nudutt. t'lor.- 8-i5 in disco bermaphrod. in radio fa'ininei. Cor. omaium%ilabfata : disci labiis subtoqual>us, cxt. 5-denlato, inter. Jiidentat.o : radiilabiis yaldexiisparibijs, v\l. amploii-gulaEformiS-iJcntalo t.vliis sericeo; int. lobis 2 distinctis tenuissimis rarissime et forsas casu coadunatis. Filam. la? via. All lie re fl. disci caudatae caudis laceris, (l. radS 11 til lac. Styli cylindrici rami breves ob-tusi conniventes , in fl. disci extiis hispidiuscuii. Achasninn ero^tre tur-liinato-oblon^nm p;ilHilosnijj«Papptis selis pluriserialibus selaceis tetnn- bus serrulalo-plutnosity nivcis, — llcrbae Chilencs gi'aciles pei enncs ;ut Hc>ias anuuae. rolio alterna scssilia i-ttcrvia , lincaria oblongaautspa-thulata , integrrimn s^rrnta aut piimatifida. Capitula leruiualia aolita-ria. Cor. (lava; seu aun-;e.

ISect. 1. BrciiENIA Less. I. r. — Bicheiya Don trans. Ithit. sor. J(>. p. 236.

Invol, sqnwnfflomnrs snhsicce nec nils; f<jlia^c;r. Ligulu multinei vi».—lirrllic perenns scaposoo, i|||-\$ radiculiliu. j.uu.itiluh.iit-, Mtbtis tomentori's. —Seer, habitn TnchocKnes.

1. C. r.cr.naiAN-L {Less. Syn. p. n : , folua ad collum aggregatis pinnatipartitis anbtus tomcn os, r-'•' iiiN-r lol os lobis•» irivgulariter dcntafis, scajHi fo-liis muito longioxfl apice pvaesertim (omtnctwo, invol. 8(Jnamis plaais dbi-sp to-m<ntosis acumioatis. % in ChSli >d Gorflflleiam del Portillo (Nee!), iapnscnis sterillbus mduUs !« Looua (Bert.! \ in [W. Miale (oec nd Coquimbo) Crtmiu. ex Hook, el Km, Bicheuja aureu Dori trans, lino. soc. 16. p. a36. Cha^t. Bcr-tero:ina Hook, comp, r. j). 10/. Onojeris hie rarfbis Bert.I berb. nun Kmuh. LiguU aui<æ. Capit. ferè Gerberæ mag."• (v. s.)
3. C. DafciifflAT.v (Nook, ci Am. com\j- i-]• i<-i)i (pli ad coJlam agj;regati&|»e- tiolatis oanealisropatido-deilTatisdeBinaUs, scapo foHislongfiore, invol..sqti:iihi>. lanceolatis arumioatis cariu.ifi> % " " oitibns Cbileosibiu et Mendoeiams (Gill.) forte ad Cncliacucba ex " J•"•"? .\I-MTIO. BichenNn dealbata Don mss. (v. s.)

Sect. u. GfERINA pthrik. et Am, i. < — Cherina tl LinJptivfti im

sect. Cli.vlantlicra: Lets. sjrtt. p. 1 IJ. — Cherlna Cass. Met. 8
p. /j35. — EuthrixiaDon.

Invol. Hroain3c fere omne« sicc», exlitme omnium mim.na. — Herb* ^{annuae}
glabrsC mnoamimaCj foliis lioeanljus integertimta am scrtilatis.

1. C. UNEAR.S (1*^, svn. p. irs. Ho o A Arn. I. c.DC. in Ddeu. fc. wt). &
I. 80., (♦!») iimiiciuilis, uanlibn.-Mmpluh.H vel umbdlatim ramosis, foliis
HngatiMiine lmwn-sabnlat^spinaloso^rralis, iuvot. wmauiisMtiniU li_neari_
I»oceol«tiasabfoli«cei3_t illaiissensiro majoribasicanosis obtusis (f in Chill
in pascmis sienlihas coUmm calidonira oil Quillota (Beirero n¹^InLuano
tL>«Fl>, r.Cokhagpa (C. Gay !, Valparaiso^ Cn^i, LU^Elay (^ T)
Eothrixia affiniaDoa j,h,1. mag. i8Ja. p. 39i. ctinGuill. arci a. p 467 Ch
Unearfloha PtsppH pi. exs. n. 414. Ligul-n aure;e. (v. s.)
4. C. tmtFOLt.v (L.ss. syn. p. 1₁₂), dabra mukicalu a^ Dnicanlis ramosmima,
canhlui, omleUatim aemei ant plpnes ra.nosis, foliis liiieari-_{sli}bulaiis subinte-
geiriiiiis.myol.sqiamiswiii-i.Mis i-ncriviis, «1^r. lat^ovati, aodtb, inter, ao!-
tmMili.s. (f) _{1U} Unli sa»sis stcnliltus ad moutein la Leuiiu(IJcert !) ad Yalua
raisoin moatibus (Bridge[.] Ononeris lir.ifulia Beit.! herb. Ch,-n,i,j micropiivfl.
liook, etAm. comp. 1. p. 104 Eiithriia .sitlsolt'ides Don irans. liun *oc *i(i
L. a5g.(v. 5.)

f, depailperata (Hook, el Am.), foliis Iiticari-oblDiiyiaimnimls. (v. a.)

fct. in. Kucr/ETANTiiLRA /7««/t. et Am. comp. 1. ». 104. — Chxtanthera 7.^ J/n. p. ,,, 3. bow ^ ,,, 1. — Ch^taphera et Prose-
lia /Jon trans, .we, linn. iG. p. 2i3 e/ ₂₃₅.

Invol. sqoAM-s cxtlmae foHaccae longiores, c<(oi-a; graJalim iinbricata; acntas ant
acuuiitKituj. — Jlciba: aoi-aut mnlticaules, foliis liucaribns mil obovato-lineari-

ift - * Perennes.

5. C. VILLOSA (Gill, in.pon phil. mag. jS'la. p. 3oi.etiii Guilt, arch. 2. p.466)
villoso, oanlu bcevi sitn^lici i-cnphalo versus apicem ciensissima folioso iavol
Erppendioibua|foliisf|ne lin^iri-cuutMtis apice 3-5-deutatis, ligulis radii IIITOID-
cro aabajqaalibaa copiusissiaie. If-? In adscensa aiutis IMuucliou iu Autlibus
Mendozianid. Uook. cl Aiui. comp. 1. p. 104.
6. C Q. I™IS (DC. aim. mns. 19. p. 70. t. ia. f. 8), collo canfccnlos folioaos
ageate <h>roloiiifero, canlibasJlorldis sahsolittfrifa i-ceplialis, follia sobser-
cfis, ratiicalilms snbcnneatisobloigo-likearibus, canlinfs pancis linearibos re-
mote spinuJosyserratis, anmmis circa invol. appioximatis. % hi Jlerilibns
ChiJensifioa :v\ Ri₀.CoK>rado CPoep.I); CucUaonch; (Nee!), prov. Valdivia
CKndg.)> etn, Peidiciain Guilt-use Willd. sp.3. p. 31, y. Ch. serraw R. <i 1'av.
syst. p. it)o? llooket Am. 1. c. Don phil. mag. tSia, p. 3yi. brit. fl. gard.
ser, 1. r. '214. Qixt. sericea Lag.! iu fin. 1807. Prpselia setrataDon iranjt, liun
sue. iii. p. 1 ;,, v. s.)

7. C. Aiici.M 1.1 Dun pliil. mag. jJJIn. p. 3IJ. et in GoQl. nrch. 2. p. 467),
ipilo.ta plijontilia sericco-jmbalWda, cauJibps 1 *ccpljjitis, Mils radicnlibus
cmieato-liu<,nijiji>, sermmiscirta capitnlum eoofferifs', cmtnibus at>ine serratia
invol. sfjuamii ^{acumin}natia. It in steilibus (JffihVrisih^ seeds flam. Cachapnai
ad Rancagua | Pert,!| et Talparaiso (CnmnjO ^{i...-1^-} <' Am. comp. j. ,,, H)'
CU. Ciiicci-is Hert.l herb. Cum priorc vidctur in II. jcruv. confusa. fv 5 ex.
it in, Ntic fit lk:rt.)

8. C. KMWFQJA (Gill, in Don phil. mag. iftf a. p. igi. et'iu Guill, 1. c. DC. iu
.Delesfl. ic.Bel.4. t. 8i., cespit osa tnpltaulisyabra, caulibus r-cephalia fotiis
ntdicalibtaD^asii&sime cunc;to-IiiL'ari]ins versus apicem serratia cauliuisl'ine-
itbus sparsia, sum mis sub cajjtilloapict* i-V.s<;iTatU,uvol. squamis apice fusco-
purpofreit mucronalis. ?L in Cbili prupe Valparaiso (Macr.! Cuimn.) Hook, cI
Am. comp. r.p. 10/, Cb. spinulosa Class, opusc. a. p. M)¹ (v. s M. i. ' b
lu. soc. hortic. lond.)

j6. *eryngioides* (llook. et Am, I.e.), Envoi, sqnaniis I a lumen I is , capitnlo fliajore. *Tf*, in Andibus Mfflodozianis, Cli. cryngioides Gill. eiDou in [»]liil. mag. i83a. p. 3<)i.e{in GniH. I.e.

** *Annucc.*

- g. C. CHIATA (R. et Pav. syat. p. igo. prod. t. 23), glabriusctila , caule slriotr snbsintplici, foilis linearilms basi sublalioribns apice aimrainaiis pei linathu spinnloso-serratis , ciliis utrinque i4-i5, smntnis nuicrouali.s. (1 in eollbus et canipis Cbilcnsibis circâ (ailpuMenu (K. ct, l'av.) propè Gollina (liridf.) et in Cordillciis (Cumin.) Don trans, linn, soc. 10. J. 'J91. Hoolv. et Am. cpnip. 1. - p. io5. Spren^ . systj 3. p. 5o3. excl. syn. Valil. Hcrba 3-8-poIllic. Capitnla ad apices cuulis am ramurum solitaria. (v. 3.)
10. C. MGENcmoiDEs (Lesa. syn. p. II3), subsericeo-villosa , caule crecto sa>p!us apice nuibellaio-ratnoso, foliis oppositis alternisve angosle l|n«aTJbus,intc-gerrimis apice srnnmodeuticulis i-a senaili, sutnmia qirca capitwM confer-tJ3,invol. s'ltainis acate- inticronails, ligulis invol. paulo longioiibus, (j in paschnia saxo^is lapdosia agri Cbiliisis ad Antuco (Po-pp.! n. tiSg.), (Jnillota et ud flutnen Cacb.ipnal (Bcrjtero!) Ch. ramosiasinia var, Hook, et Arn. coin p. 1. p. 10*4. Tariat can! e subsi Implici. LigulM oblonga; superne flavo-atitaatiac. Ovaria pilosa. (v. s.)
11. C. TEMEI.I.A (DC. in Delesa. ic. sel. 4. t. 82), nabescenti^snbvjllosa, canle t-rectp ramusissimo, foliis cuueato-sabl mean Bus basi intogns a isedio Scute serratis, samnaia circa c;[nHJlutn'Conferti>lilearibns apice serra 11 u-is 1-'.) iristractis, invol. sqaamis apice acini* acnniinalUvc , lifnlis vix involucro lonpiorilm.t autsiibbcvrioriLns-Of^in sa>xosislapiclo<isetstWi!iliusadB.anc.iguani etQuilloiatsi Cliilcnsinii legit cl. Bertcro! Cli. (crndla et Kotnliana Less. ayo. p. n/ct n5 . Ch. ramoiissitua rtr. llook. et Arn. conip. t. p. 104. (v. s.)
- i 13. C. MULTCAULIS , glabriaactila ad collum et basin capitnli subtoinenfosa , canibus è cnlo plnrimi.s ^i 111;liuius :m!. panic ramosis, fblis iineari-carieatis spinuloso-serratis, sum mis cirflrcapitulain pectatuxorebrt! spinuloso-serratis, invol. sqn:Luuis mucrojje apidulaüs, Ughlis invol. fere dnplu longiovibus. 00 in pi^cuis sax.osin colliora ad torrentoa circa Tagua-Tngna Chlcnaimm legil cl. Bertcro. C. flabellaia Don phJt. mag. i83a. p. 391. et in Cuill. arch. 2. P- 460 ? Hook, tt Arn. equip, 1.p. io5? Liyulic aareac. (v. s.)
- § *k-prostrata* (Hook, tit Arn¹, I. «'.), fulii.s el invol. sqnanns anpustiotilms inagis obloigis. ;jj in Andibus Cbilensium. Cliaet. prostra'ta Don 11. cc. (v. s.)

Sect. iv. PaiotvoTOPHYi.i.uM Less. syn. rilj.

Invol. squamæ exlriurefi (>>q folhi sn'mma) patcntcs, Julc-m ;, s aptc« ucariosa; obfosre. — Tolia oLlungs-spathulaUi. — Viac i sect, tcrtia 1! vers.

I 13. C. rXCANA (ffoepp.l PXS. n. a8f). Less,! hi lin'ntr! JSJU. J. -84.S\U. p.'ji3), mnltjcautis scriceo-subinrana, r.mlihs «Lriip!iciui,ctilis, follis oppositiis alter-nisve longe cnnciatospa'hiikiis apice serrali.t, .summis circa rn|ut. crniferiis, invol. sqnitniis iuterioribns i;ice seaoiosis rdnnndatis, II-uli., radii obloa^p- obovatis sulphureis. (1 in saxosis iterilibua o;li(iis ad Quillfita Cliilensium (Hert!) et Valparaiso flridg.) Hook, cl Arn. romp. p. no5. Ch. sc;niosfi Dun phil. IIIKII. iS3a. p. 3oi. el in Ouill. arch. 20 (' 46fi. Ch, CbiLenoia Ko.,L el Arn. in Befch. my. p. afj. e.\cl. syn. •• »)

fi. spatlinum (IVpp.! ex%. 11. »75» Less. syn. IT4);, lgn lis radi; ii.no-auifia (JJ emu var. S. Hook, cl Aril. I. c (v. s.)

4- Species extuqee.

C. CAI'VT-T;; 1 SCJI: Less, et Poep!). = T> lloma limb'atnut.

C. UHUTA Less,±b1 ylloma limb'atnut»•

C. rmirATiriVA H. B. < K =ftarionM pinnatifida.

/S. *eryngioides* (Hook, et Arn. 1. a), invol. sqnarais laliuscnlis , capitulo nñ-jore. If, in Andibus Mendozianis. Cb. *eryngioides* Gill, et Don in pbil. mag. i83a. p. 3g.i. e^in Goill. I.e. .

** Annucy.

9. C. *CILIATA* (R. et Pav. syst. p. 190. prod. t. 23), glabrinscula, canle stricto snbsimplici, foliis linearibus basi sublatioribns apice aenrainatis pertinatim spinuloso-serratis , ciliis utrinque 14-15, sum mis mucronatis. (jp in collibus et campus Cbilensibus circà Gnilpuilenu (R. et;Pav.) propc Collina ^Bridg.) et in Coidilleris (Cumm.) Don trans, linn. soc. 16. p. 391. Hook, et Arn. comp. 1. • p. io5. Spreng. systy 3. p. 5o3. excl. syn. "Vabl. Herba 3-8-pollic. Capital a ad apices caulis aut ramorum solitaria. (v. s.) *
10. C. *MOENcioDEs* (Less. syn. p. n3), subsericeo-villosa , canle erecto ssepiùs apice umbellato-ramoso, foliis oppositis alternisve angustè linearibus intc-gerrimis apice siunmodenticulis i-a serratis, summis circà capitulom confer-tis, invol. squamis acute* mucronatis, ligulis invol. Paulò longioribus. (f) in pascuis saxosis lapidosis agri Chilensis ad Antuco (Pccpf.! n.689.) , Quillota et ad flumen Cacbpnal ('Bertero!) Cb. rainosissima var. Hook, et Arn. comp. 1. p. 104. Yariat caalteiftubsimplici. Ligulae oblongae superne flavo-airraniacae. Ovaria pilosa. (v.s.) ^ *
11. C. *TENEILLA* (DC. *in Deless. ic. sel. 4. t. 82), pubescenti-snvillosa, caule erectp ramosissimo, foliis cuneato-sublinearibus basi integris à medio acutè serratis, summis circà capiuluinconfertislineuribns apice serraturiš a-3 instruc-tis, invol. squamis apice acutis acuminatisvc , lignlis vixinvolucro longioribus autsubbrevioribus. (fji" saxosis lapidosis etstetilbusadRancaguam etQiiillotam Cbilensium legit cl. Hertero! Ch. tenellaet K.nntbiana Less. syn. p. 1 i_t et n5. Cb. ramo&issima var. Hook, et Arn. comp. 1. p. 104. (v. s.)
- ia. C. *MULTICAULIS* , g'abriuscula ad collum et basin capitnli snbtomentosn , cauiibus è collo plurimis simplicibus aul parcè ramosis, foliis linear-i-cuncatib spinuloso-serratis, summis circà Wcapiluluin pectinatim crebrè spinuloso-serra-tis , invol. sqn.imis mucrone apiculatis, ligulis invol. ferè doplò longioribus (lj in pascuis sax.osis colliura ad torrentes circà Tagua-Tagna Cbilensium legil cl. Bertero. C. ilabellata Don pbil. mag. i83a. p. 3c)i. et in Guill. arch. 2. P- 4G0 ? Hook, et Arn. comp. i.p. io5? Ligulas anresc. (v. s.)
- &• *prostrata* (Hook, et Ami I.e.; foliis et invol. aqnamis angnstforibus ma-gis oblougis. (ij iq Andibns Cbilensium. Chaet. prostrata Don'11. cc. (v. s.)

Sect. iv. PRIONOTOPHVLLOM Less. syn. n5.

Invol. sqfiaraaeexlcuOrcs (seu folia snmma) patentes, interiores apicescariosa obtusac. — VoYiU oblongo-spatbulata. — Tix'a sect. teHia'diversa.

- i3. C. *INCANA* (fepp.! exs. n. 286. Less.! It^ linhaea x83o. p. a»4. syn. JVII V, innlticaulis sericoo-anbiu-ana, oaulibns 4»impliriu^culi'^, foliis oppositiis alter-nisve longè cuneato-spalhnatis apice serratis, snmmis c|i|^ capit. confertis, invol. squamis' interioribus apire pcariosis rolnndatis, ligulis i.ulii oblougo-bovaiis snlpbnreis. ft, in saxoiis stcnibus calidis ad Quillota Chilensium (Rert.!) et Valparaiso (Bridg.) Hook, et Am. comp. p. io5. Ch* scariosa Doi. pbil. mag. i83i'. p. 391. et in Guill.'*rcb. a. p. 466. Cb. Cbleusis Ijopk. ti Arn. in Beech, voy. p. 2^. excl/syn.jfv. s.)

J2. *spathulata* (Pa-pp! exs. n^a?^ Less. syn- iU):, lgalis Vadii flavQ-amcis (g) cum var. &. flook. et A^ . 1. C. (v. s.)

-j- Species, exelusjue.

C. *CAPUT-TRING/I:* Less, et Pcepp. = Tyloma limbatum.

C. *UMRATA* Less. = Tyloma limbatum.

C. riKNATiFijpA H. U.ctit. =Clarioneaa)innatifida.

C. PUNGEXS H. B. et K. = Clarionea pangens.

C MULTIFLORA. H. et B. = Homoianthus multiflorus.

C. RECURVATA. Spreng. = Ilomoianthus echinalatus.

C. MACELLANICA Spreng. = Zifymoianthus Magellanicus.

DCCXXX. TYLLdtyla Don trans, linn. soc. 16. p. a36 et 301. — Cliactant her select. Less. Hook et Arn.

Capitulum multiflorum heterogamum raaialiforme. Invol. ova turn imhricatum, squamis coriaceis laevibus adpressis niucronulatis. Recept. Tiudum. Flores radii 18-20 foeminei cum stuinibus slerilibus, disci hermaphr. Cor. radij bilabiatae, labio ext. extiis sericeo ligulato obscurè 3-denLato, inter, brevissimo bifido erecto ; fl. disci tubuoso-bilabiatae sericeo-villosae labiis abbre.vii.tis ereclis, ext. 3-, int. '2-dentato. Filam. glabra. Añtii. appcDdicula lanceolala acuminata, caudae sctosae longii> subplumosae. Styli gfabri filiformis rami breves conniventcs obtusi pruinosi. Acbacnia trigona papilloso-muricata. Pappus pluri-serialis deciduus, setis capillaribus basi et apice puberulis.— HerbaeChilenses multiraules procumbeientes. Folia alterna rariis opposita in petioluin angustala ad apices subaggregata cuaeato-lanceolata cornplicata integrima gnuca glandulis slipatis bine inde onusla, limbo recurvato-palulo cordalo calloso truclronuto. Capitula scssilia bracteata. Cor. aurcae. — Qenus afftmo Cbactautberae , sed babitu cohirmante diversum (loibus radii denticulis duobus brevissimis loco labii interioris don at is, pappo vix dentato.

1. T. LiMATICUM (Don 1. c), in ferae glabrum, superne villis loo^islanuginosum, puppo nivfo. Qt in Chili ad Coquimbo tDonJ. iii glareosis montiuin ad Rio Colorado (Pwpp.! laCu<y>ta de Zapata ((ill.) Aconcagua et Cordillera (Niidg.). (JLxanthra Capu^TVinga; Less, in Poepp.! pi. exs. u. 588. Chsclantkera limliala Less. syn. p. ri6. Hook, et <Un. cbiup. 1. p. io5. Ligulai subtùs adpresbe sabsericev, invol. ferè duplò longiores. (v. s.)
1. T. GLABRATua ex oinni parfe glalrinn , pappo niveo. Qj in Chili ad Collina legit cl. Macrae. Priori valde affine sed prxter glabrii(inuniversam differt, foliis piaeseitiin snmnis in petiolam longioiem atlcnuat, invol. scjuamisapice porpnrascentibub. An ineru varietat? (v. 9. coiuiii. ab hou. soc. hortic. lond.)
3. T. PILSULUM (Don in phil. mag. i832. p. 3gi. 8t in Guill. arch. a. p. 4⁶⁷)> niveo-lpnatain , pappo colorato (j? in Andibus Chilensisbus et iVrendozianis. Hook et Arn. comp. x. p. .106: Folioriu liibus ovatus lmcrroHa^ns. Invok squama; ovato-lanceolata¹ acniuinatae colorat<> **

DCCXXXI. PACHYLENA ffon> iii IJ00A. et Arn. comp. 1. /; 106.

Capil. inulliflorum liQterogam 11 nr. Invòl. subrotundum multiplici ordine polyphyllum, squamis oblongia obtusis coriaceis adpressis glabris, intimis longioribus radiantibus. Recept. nudum. Flor. bilabiati, radii foeminei staminibus sterilibus. labio ext. ligulæformi. inter. tenuissimo selaceo bipartite; disci <bermaplir. lab. ext. 3-dentato, int. Ijipartilo spiraliter torto. Filam. glabra. Anth. basi bisctosae, spis npicc laccrato-penicillatis. Styli rami obtusi crassi glabri. Acbaenia cuñata glabra. Pappus nou plumosus. — Herba Chiiensisperennismulti-rauli5<>cespitosaproslrata glaucá. Caulessimplicesleretcs basi foliis abor-livi.9onisti. Folia allerna peliolala latè ovata oblunga erosi denticulala coriarca glnbernma subt^spurpmascentiacoslâ validâ vruisquc promi-

minentibus. Capitium magnum terminata sessile. Cor. albae. Pappus nivcus. — Affine Ptiluro ex aifct.

). P. ATRIPLOCIFOLIA (Gill, et Don 1. c.). % ib dijl'r^ropè Agna del Ceno Pe- lado in adscensa ad El alto de los Manandides in rnpibus fractis (Gill.).

DCCXXXII. BRACHXCLA.DOS *Don in Book* et Am. comp. i. p. 106.*

Gapit. muLtiflorum heterogamum radiatiforme.*^{fnvo1.} 5-phyllum basi bracteolatum, squaruis ovato-lanccolatis acuminatis carinatis. Recept. nudum. Fi. radii l-seriales fceminei, stamin. sterilibus, bilabiati: Jabio exter. ligulaeformi , inter, linearis bifido revoluto., Fl. disci hermapbr. tnbulosi bilabiati, lab. ext. 3-dentato, inter, bipartite. Filam. glabra. Arilh. basi Bisetosae, setis plumosis. Stylus radii indivisus obtusus recurvatus, disci lobis abbreviatis juncatis, Achaenia, cuncta 5-gona erostria dense papillaria. Pappus pluriserialis capillaceus scaber persistens cincreus. — Frutex. rigidus ramosissimus. Folia fasciculata linearia mucronata margine revoluta integerrima. Capitula terminalia solilaria pedunculate. —Affinis Chaelantherae, tanlùm involucro et habitu diversa.

i. B. T.YOIOIDES (Gill, et Don I. c.) Jy in. Audibus MendozianU (Gill.) et in Pata- goniâ boreali (Tweed.).

DCCXXXIII. ISOTYPUS *H. li.* et *Kunthnov. gen. 4.p. 11. t. 307. Cass. dice. 24. p. 30. Less, in linneâ i83o.^? 241. et 345./? 120. — Seris Willd. berl. mag. 1807. p. 139 non Less. — Hilairia DC. mss. 1814.n0/z tl. et B. i8i5.*

Capitulum aequaliflorum bomogamum discoidicum. In vol. ~~subc~~ ^w yjn- dricum , squamis imbi'icentis lmeari-lanccolalis 5-nerviis. Recept. bre- viter et densè piloso-iimbriUfferiun. FJ. 10 hermaphr. Cor. oinnes tulmlosae iiwcqualitcv 5-iiada subbilabiatae. Filam'; Ia3via. Anthers in- clusa3 basi longè caudalai, appendiculâ elongalâ. Stylus basi subbul- bosus teres breviter bilobus, Jobis oblusis Subcoimivenibus. Achaj- nium liticari-buppentagoniiii pyb<<scrns crostrc. Pappus pilosus pluri- serialis deculuus scaber. — Herba Austr.-Amer. ,Folia pinnatifido- lyrata petiolata membranacea subliisalbo-lanata, lobo terminali maximo dentato. Capitula corymbosa pcdunAlata , pedunculi bracteolati. Cor. roseae. —Gfcuis affine Ouoscridi, nee ullo modo Staehelina?.

1. I. oKSEaoIDES (H. V>. et Kunth 1. c.). *² in lipA fl. Tuy orov. Teuezuelse. Less in linrlfcA i83o. p- 345. f. 90. 96-98. Seisi ouoseroides Willd. 1. c. Ono» seris panicalata fl. mex. ic. ined. Hilairia,pankul^ia DC. ohs. Jned. in fl. mex. (v. ic. pict.)

UCCXXXIV. ONOSERIS DC.'ann. mus. 1Q.p. 65. t. 11./. 4. mem.lab.p. 7. 13. /. 4. Kunth nov. gen. 4- p- &— Quosfeiii. et Hippuris Cqss. opusc. 2. p. '95! — Onoseiidij, s.p. WiUd. — OnoseVidis sect. 2. 3 ^ 4 . Leb_s\ syn. 119. —Ono- seris et CentrocJiuiuin *Don.* — 'Atractylidis sp. Lirm.f.

Capit. multiflorum heterogamum radiatiforme. Invol. bemisphaeri* ci^m imbricatum, s^uaniisplanisJinearibui. acuminatis. Recept. nudum. Cor. radii bilabiatae: labio ext. matno ligul:i:foi mi5-dent;Uoextùs villo<<o, int. multò minore bipartiò lobis teiuissiniis apice subcincinnis. Cor. disci tubulosae subrcgulares 5-fidae gisiliros. Filam. scal^riuscula. Anth. basi bisetosae, apoendice cartilagine-a. Achaenium cijostre oblongum i>ubcompreßsum. rapiT* biserialis setaccus -denticulaio-sca]>er. — Herbas ant suffruticcs. Folfa' radical ia aub raulina, pa>piis subtiis to-

mentosa. Capit. terminalia solitaria ebracteata longè pedunculata. Cor. radii albae aut purpureac, disci luteav *

Sect. i. EUONOSERIS. — 'Onoscris Lass, opusc. 2.0. on. — Onoseris Sct. 2^a. Les&. syn. 1 inj.

Receptaculum omnino nūdum. — Herbae perennes s-bacaules, scapis nudis folijs ad collm rosulatis. *

1. O. HIERACIOIDES (H. B. et Knth nov. gen. am. 4. p. 7. t. 304), acanlis, foliis radicalibus lanceolatis infernè sinuato-runcinatis snbtis arachnoideo-pnhescentibus, scapis i-cephalis. % in collibus siccis Novse-Granatz prope Alau&i et montem Sitzan. Cor. radii albae.
2. O. SPECIOSA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. 7. t. 305), acanlis, foliis radicalibns snbtis densè tomentosis lyratis, lobis infer, pancis raritus nullis terminali maximo oordato-dentato, sea pis simplicibus bifidisve 1-2-cephalis'. Of in collibns siccis Novae-Granatae propè Alausi et Sitzan. Ligulae rosæ in-vulcro multò loDgioies. (v. s. comm. à cl. Bonpland.)
3. O. PURPURATA (Willd. sp. 3. p. 1702), subacaulis, foliis radicalibns snbtis densè tomentosis lyratis, lobo terminali maximo subdeltoideo-hastato dentato, scapo ad medium raruotio tricephalo. % in Novà-Granatâ propè Guayavalito. Less, in linnrcâ i830. p. 339. Onoseris purpprea Less. syn. 119. Atractylis pnrruprata Linn. f. suppl. 349. Smith ic. ine& 3. p. 65L Lignae purpnrae invol. paplò superantes.
4. O.? DREVIFOLIA (Don trans, linn. aoc. 16. p. 246), .acaulis, foliis radicalibus snbsessilibus ellipticis denliculatis venosissimis humif&is soprà pilosis subtus scabris, scapo lanato stricto i-cephalo. % in Monte-Video. Floics lutei? Cor. radii labio ext. 4-deutato, int. indiviso. Recept. scabriubculiu. An a "enerè excludenda ?

Sect. 11. CLADOSERIS Lpss. syn. 119. et in linnced i830. p. \$/±|_m — Chaetachlaena Don trans, linn. soc. 16. p. 256.

Rcept. brevissimè pilosnm seu fimbriiferum. — tterbae caolescentes sparse foliosae ramosæ annuae.

5. O. ANNUA (Less, in linnaea i830. p. 34i), caule herbaceo erecto molliter tomentoso, foliis subsessilibus oblongs ntrinque acuminatis subdentatis sublus uiveo-tomentosis, invol. aquamis Ycnrainatis i-r^rvii.s subtis canescenti-tomentosis. (I^in flernvia (Dorab!) ad Chinchin (Los Hook, et Arn. comp. 1. p. 103. in notâ. Folia iulima fere petiolata. (v. s. ex h.JDombev conim. à mus! reg. pañs.)
6. O. CUMMINGII (Hook, et Am. comp. 1. p. 103), cãole hérbaceo..., foliis oblongo-lanceolatis basi valdè attenuataet pseudo-petiolatis, iuvol. squamis interioiibus apicc snbulatis, exte'rioribus orunin^scitacea. (i; in Peruvit boieali ad Limam.
7. O. ODORATA (Hook, et Am. 1. cO» ca#le J^erbaceo. ... foliis se.ssilibus oblongo-lanceolaris basi attenuatis, invol. squamis inter. feta ii^Miosâ limburn ajquante terminatis, exter. omnii^ò sefaceis. (j in ['crufifi prope Purruqbuca. Chae ^ tnrlhxna odorata Don trans, linn. soc. 16. p. 756, ex Hook, et Am. jad dc>cr. vix convenil. I cysera odorata Rniz et Pav. herb. Caulis ex Don dicitur i>ro-cumbens.
8. O. ACERIFOLIA. (H. B. et K.unth nov. gen. am. 4. p. 8), canle herbaceo erccto ramoso lanato et pilis articnlatis patentibus hir*uto, foliis longe petiolatis j>ub-rotnndis leviter cordatis lobato-sinnatis subtis candido-lanatis, pedunculis i-cephalis, invol. glutinosis hirsntis. If. in frigidis prov. Bracamorensis. Cor. disci flavae, radii extùs rabrae intùs albse Recept. hirlum. An tameu certe hnjas loci ?

Sect.? in. HIPPOSERIS Less, in linnced i83o. p. 342. syn. p. n.g.
— Hippseridis et Lycosferidis sp. Cass. -^•Centroeliniuni Don
trans, linn. soc. 16. p. 254«

Kecept. fimbrillis callosis spinseformibus subnlati brevibus ob sessum. Cor! radii vix bilabiate, lobis nempè inter, apt nullo aut bidentato, exter. elongato apice grossè trident a to. — Suffrutices ramosi sparsè foliati, foil'is subtùs tpmmentis inlegris aut subsinuato-dentatis. Discos capituli flavus, radius purpurascens elongatus. — An genus proprium ?

9. O. RBFLEXA (Less. syn. 119), canle berbaceo?, foliis ovato-lanceolatis grossè et irregulariter serratis, peduuculis bracteas selaceas gerentibus, invol. ovati squamis apice reflexis. fy % in Peruviâ, Centroclinim reflexum Hook, bot. mag. t. 3 x 14. Papillae recept. inermes vix conspicuae.
10. O. A DPR ESS A. (Less. syn. 120), oaule fruticoso, foliis lanceolai is snbinteger-riinis pedunculis ebraoteatis, invol. cylindrici *JUHmis linear-iwnceolatis acuminatis erectis adpressis. 5 ^n Peruviâ. Centroclinium adpressnm 'Hook, bot. mag. t. 3 n 5. Recept. evidentiùs aculeatum.
- zi. O. INTEGRIFOLIA (Less, in linnaeâ i83o, p. 343. syn. p. iao) frnticosum, foliis latè elliptico-lanceolatis sinuato-dentatis, peduncnlis f bracteatis, invol. campanulati squamis linear-i Lanceolatis acminatis adpressis. A in Peruvia leger. cl. Née et Dombey. Centroclinium albicans Doal. c. p. 264. (v. s.)
12. O. SALICIFOLIA. (H. B. et Kunth nov. ^en. am. 4. p. 7), caule fruticoso, foliis lanceolatis integerrimis aut sinuato-dentatis, pedunculis ebracfeatis, invol. campanulati squainis linear-setaceis apice recurvato-siibsquarrosis. X in siccis agri Quiteñis. Less, in linnaeâ i83o. p. 34a. t. 4. f. 122-124. (f. s. cult, et sp. comm. à cl. Bonpl.) v
13. O. HYSSOPIFOLIA (H. B. et Knnt nov. gen. am. 4. p. 7. t., 306), caule fruticoso, foliis anguMè linean'bus integerrimis margine revolptis, peduncnlis ebracteatis, invol. ovati squamis lineañi-Lanceolatis adpressis. j in agro Qui tensi propè urbem Ybarre leger. cl. Humboldt et Bonpl.! Lycoseris byssopifolia Cass. opusc. I. p. 102. (v. s.)

•j- *Species* exclusts.*

- O. BREVIFOLIA Don. = Seris polyinorpba.
- O. DENTICDLATA Willd. = Lycoseris dentalata.
- O. HETKROPHY^A Sprang. = Tricbocline heterophylla.
- O. HXERACCOLFS Bert, ss Cbxtanthera Cbilensis.
- O. LANUGIWOSA Wall. = Oreoseris lanuginosa.
- O. LAKUGürosA k Wall. z= Oreoseris pusilla.
- O. LINIFOLIA Bert. = Chaetanthera linifolia..
- O. MACROPHYLLA Wall. = Bernieia Nepalensis.
- O. MBXICAWA Willd. = Lycoseris Mexicana.
- O. MONTB-TIDENSIS Spreng. = Aplopappus diffusus.
- O. OVALIFOLIA Wall. = Gerbera ovalifolia.
- O. PANICULATA fl. mex, = lsotypus onoseroides.
- O. STRIJITA Spreng. r=Trixis stricta.
- O. TURBACENSIS Spreng. = Lycoseris Mexicana.

DCCXXXV. DICOMA Less, in linneâ i83o. p. a₇₉. -^•Dicoma, Madedinm e IN helium Cass. 11. *infra cit.*

Capitulum multiflorum, lu>mo- aut hftc^?gamuin. Invol. campanu latum discum sub<quans, squami> oorfaceis obsoletè muiliuervii; in*

legris acuminatis interdfim pungcntibus. Reccpt. alveolatum. Cor. pilis brevissimis sacpc extiis obsitae, disci regulares 5-partitae lobis tubo longioribus, radii (in'capit. heterog.) neutrae ligulatae bilabiata; aut iercti-ltibulaUc. Filam. glabra. Antherae longè caudata;, caudis barbatis, bnrbis sursiim spectanibus. Styli rami breves crecti obtusi extiis ad apicem hispiduli. Fructus turbinatus villosus saepè io-sulcalus. Pappus argenteus bi- scu pluriseric'ilis, seriebus inter se disparibus confor-nibusve.— Suffrutices plerique Australi-African a?. Folia alterna intcgra aut vix dcntaia. Capitula solitaria.

Sect. i. EDDICOMA, — Dicoma *Cass.bullphil.* 1817. diet. i3. p. ig4- 47- P' ^°3. — Dicomae spct. 1" *Less, fii linnccd* 1. c. — Leucophyton *Less.>syn.* 109 *non Broivn.* -7-Xeropappus Wall.

Capitulum discoideam homogamm. Stylus basi hand bulbosus. Achacnimm To-costatum villosum. Pappus flor. omnium biserialis, scitis exter. linear-setilormibns, int. lincari-lanceolatis margine scariosi.s, omnibus plus minus serratis. — Herbae Gerontogeac acqniociales rraosissima* tomentosac. Folia oblonga intcgerrima mollia. Capitula priuia fronte axillaria, nempè ramulos axillares brevissimos terminantia. Cor. ulbida?.

1. D. *Lanuginosa*, erecta ramosissima lanuginosa, invol. ovati squamis extus glabriusculis, pappi paleis serratis fructu villosissimo vix duplo longioribus. *? in India orientali ad Madras, Segain, Yienanghun, Trichinopoly* (Wall.) Wight.) X.eropajipos lanuginosus Wall.] herb, at cat. comp. n. 90. Onopordon lanatum herb, mindcrasp. Acilepis lanata Spreng. in lilt, ad Wall. Similis D. lomentosaj. (v. s. cuim. ah lion. aul. mere. angl. lad. or. et à cl. Wight.)
2. I), TOMENTOSA (Cass. bull. phil. 1818. diet. x3. p. 195. 47. p. 503), cespitosa ram'osissima tomentosa, invol. ovnli sqamis ejttus lanuginosis, pappi paleis serratis fructu adpresæ sericeo iriplò longioribus. j ^ i n Senegalisc collibns arenosis prop̄ Kfouma'in distr. Walo legit cl. Perrolet. Priori birailis sed certe distincta.^v. .s.)

Sect. if. STEIROCOMA.

Capitulum discbideam heterftgamum , fl. radii i-scrialibus sterilibus brevissimis tubnlo.sis seu sul)lila)ai^lifl. Achacnimm disci 10-costaluin basi villosum, radii ^iborivnni. Pappus radii squamirllis wtifbrmilins vix scabridis, disci biserialis ext. (Krtiformis decidui^, inter^ s^oauellis ba&i subdilalato-membrauaceis plus minus ;ciliatoplmosis. — Hcrbae Capeuses habilu sect, piimae.

3. D. CAPENSIS (Less, in linnreà 1830. p. 277), caule mallicanli diffaso foliisque uJrinque tomentosis petiolatis oblongo-lanceolatis, nndftlito-crenatis, invol. squamis exter. araneo\$ji , intimis glabris scarjosis, acha'niis di^ci sulcatis, radii sierillbns, pap^O ráml seliformi serrato, disci dhplici ext. setiformi, inter, paleis basi meinbranaceis snperne plnraosis albaenio' quadruple* longioribus. 5? ad Cap. Bonae-Spei (Licht.), in deserlo Carro (Dregc!). lierkheya albida Licht. in Willd. herb. Gorteria personataE. Mey.! in Drege coll. Radix lignosa simplex, (v. s.)

72. *leolepis*, invol. squamis Taevissirais, foliis utrinque cano-tomentosis. — in regione Oariepinâ legit cl.' Dregc ! (v. s.)
^ *angitstifolia*, foliis angustè lanceolatis acuminatis ulfinque arancoso-to-
rrentobisv invol. squamis exter. glabriusculis. —inler Graaf-Reynet ct
* Kamrae Ilakka (Bnrch.! u. ^940. Eckl.! exs.). Folia |5 lin. longa, a-3 lata.
Fl. radii breves subbilabiati. (v. s.)

- /, U. M/VCROCEPBATA, caule raultici^iii diffaso, foliis oblongis basi attenuatis mucronatisintegcirimis suprà araneosis demùm glabratilis subtus capo-tomen-
tos, capilnlis foliò, fere lñ iotibns, invol. squamis glabris subscariosis, pappo
radii longis siuo setiformi, disci setia exter. pncis deciduis, inler. basi subdila-

tatis acuminatissimis à basi ad apicem ciliato-plumosis. *If* in Africā australi ad Klipplat-rivier alt. 3-400 ped. legit cl. Drege! Capit. 12-14 lin. longiu. *Acbania sulcata* villosissima. (v. s.)

Sect. III. RHIGIOTHAMNUS *Less. syn. p. 109.* — JDiconiae seel. »
Less, in linn&d i83o.p. 278.

Capitulum radiatum, ligulis i-seriaibns neutrīs. Stylus basi baud bnlbosus Achxnia radii sterilia glabriuscula, disci crassè turbinata villosissima. Pappus radii sqnamellis paucioribas subsetiforniibus linearibus subintegerriuis, disci innl-tiserialibus serial is. — Suffrutex Capensis ramosissiuus.

5. D. RADIATA (*Less, in linnœa i83o. p. 278*), caule fruticoao raniosissimo, lamis striatis in soleis tomentosis, foliis obovatis in petiolum attenualis apice nincronatis i-nerviis integerrimis ntrinque canescētibus, capitulis terminalibus, invol. squamis raultiserialibus rigidis linearibus lougè acuiuinatis longitudinliter lineatis, inter, gradatiū longioribus. 5 ad Cap. Bonae-Spei (Mnnndt et Msirr.), in Carro (Drege!), in distr. Uitenbagen (Eckl.). Leysera picta Tbunb. fl. cap. p. 69a ex Less. In specim. inter se simillimis et cum -descr. Less, cougraeulibus video ligulas unilabialas aut bilabiatas, tubo nunc.longiusculo nuncbrevissimo, fl. disci exter. aequaliter 5-fidoa aut bilabijtos. (v. s.)

Sect. iv. MACLEDN&M *Less. syn. 110.* — Macledium et Nitelium Cass. diet. 34./). 39 et 35. p. 11. — Diconta: sect. 3^a. *Less, in linnced i83o. p. 279.*

Capitulum discoideum homogamum acquallfloruni. Stylus basi lutubsus. Antherae inclusa?. Acbxniani ecostatum ubiqne villosis%iium. Pappus il. oioniuu) muliiserialis, squamellis latis acumiuatis serrulatij*,exter. brevioribus. — Suflrutes Capenses. Folia coriacca integerrima.

6. D. RELHANIOIDES (*Less, in linnœa i83o. p. 279*), foliis enerviis sublanceolati concavis suprà tomcuto&is subtūs glaberrimis. j adi'Cap. I^onsc-Spei.
7. D. DIACANTUOIDES (*Less, in linnœa i83o. p. 279*), foliis uninervijs spatbnlaio-obovatis, suprà junioribus araneoso-tomentosis, adptis vixglabrti^iji, sabfusto raentosfs, invol. squamis exter. longèsubspino.so-acifminatis. £ ad ('ap. Bonae-Spei (Th.), in Carro (Eckl.), ad Langekloof (Diege!). Heliclysum s^inosuni Thunb.il. cap. 664. Willd. sp. 3. p. 190S. exol. iyu.Linn. et Bunii. Stoebe Bergen Spreng.. syst. 3. p. 394. ex Zeyb.! pi. exs. n. 118. in h. Moric. (v. s.)
8. D. BURMAJTNI (*Less. 1. c/Tolli» uninerviis lanceojalis marginē latè revolnti.s, snpr» junioribus pob^centibns, aduhis glabenimit, snbtūs lAmentosis, invol. squaiuis exter. longe spinoso-ac'uminatis, bracteis spinosis secūj pedicellnni sensim in squamis mutatis.* £ ad Cap. Bonae-Spei (Burm. Burch.! n. 7267), ad Zwellendam (Eckl.), ad Langekloof (Eckl.). *Macledium Burnmanni* Cass. dict. 34. p. 39. — Burm. afr. t. 67. f. 3. Folia interdūm dentibus acutis 1-2 notata, 5-6 Jin. longa, 2-3 lati. Invol. ut in pnore sa;pe purpurasceutia. (v. s.)
9. D. LATIFOLIA, foliis nninerviis obo^atii) suprà glaberrimis subtus cano-tomentosis, invol. foliis veris arete brattteaito, invol. squamis exter. breviter spiuoso-acurainatis. J in Africā australi ad Drakeenstensberg legit cl. Drege! Folia 8-12 lin. longa, 6-7 lata. (v. s.)

Sect. v. PTEROCOMA.

Capitulum discoideum homogamum. Stylus basi hand bnlbosus. A ~~b~~ *bulbosus* ~~bulbosus~~ *turbinatum villosissimum. Pappus fl. omnium setis omnibus lougè plumosis.* — Herba Australi-Africana, caule subaraneoso, foliis linear-lanceolatis longissimi, glabris. Capitula ip. paniculam disposita. Invol. multiserialia nitidissima. Cor. prngiireB..

10. D. sufriosA, caule ad wlluni friiiifiioofi bnrh^ceo *eredo Mibaraneoso. basi

simplici a pice ramoso-paniculnto, foliis lineuri-lanceolatis elongatis acutis integrerrirais giabm reticulato-nervulosis, iovol. ovati squamis maltiserialibus nitidissimis acuminatis subconvolulu, ext.'patentibns secùs pedicellH apicem orti.s (ct idrò potiùs bracteis dice nd is). % in Afrièa australi ad OnHanclo et Oncomas legit cl. Diege! Heiba bipedalis. Folia 5 poll, longa, 7-8 liu. lata. Capil. polliccm longum. Antbera; exseitse coiiaceae, caudis retrorstni barbatis. Cor. 5-lidae. (v. s.)

DCCXXXVI. MYRIPNOIS *Bunge enum. pi. chin. bor.p. 38. n. 2i3.*

Capitula 5-g-flora dioica. Invol. i-seriale 5-phylum, squamis oblongis plains obtusis aequalibus. Recept. angustum nudum. — Fl. masc. cor. basi tubulosa bilabiata, Jabio exter. tri-, inter. bilobo. Stain, filam. glabra. Anth. basi caudatac. Stylus cylindraceus apice subincrassatus vix suhbifidus extiis puberulus. Achaen. abortivum capposum. — FJ. foemin. cor. (ex Bunge bilabiata) ligulata olongata apicc 2-5- loba. SUin. filam. h'liformia Jihera. Anth. o. Stylus filiformis glaber, apice bifid us lobis acutis. Aclia3nium terctiusculiim villosum olongatum erostratum. Pappus pluriserialis pilosus scaber corolla? subaequalis. — Suf-frutex J)orcjili-Cliinensis ram is virgatis. Folia oblonga integerrimaacuta viscidulii fragrantia. Capitula è gemmis squamosis orta solilaria. Flores masc. albi, i'om. purpurei. — Genus-disliuclissiroum Dicomae ut videntur affinc.

5 * * - .

1. M. nroirA (Bnnpe! 1. c). & freqnens hi rapestribns bòream spéctantibus mou-
tiurn Zui-Wey-Sohan Chiiae sepleotr. (•. s.conum. à cl. Bunge.)

DCCXXXVII. VEKDWMLag. amccn. x.p. 89. DC.ann. mus. rp. p. 6fi.mem.
lab p. 8. Cass. diet. 55.p. JqJ. Less, in linnied i83o. p. 241 et 348. syn. 1. /;ao
non Ait. necKunth. — Perdicii l'p. Linn. WiUd. — Pardj&iuni IV'. L. Dunn, fl*
cap. Mi. Cass. diet. 33. p. 4G4 et 475. 38./?. 534.

Capituluju multiflorum heterogamum discoideum. Invol. squama*, imbricatac lanceolatac fojfaceae adpresso. Recept. nudum. Fl. disci bermaphr., radii foeminri/CDr. glabrae. bilabialae : disci lab. ext. ina3qualter 3^dentato, inter, bipai^ito : radii tubo longo, limbi labio ext. ligulaeformi 5-dcnlalo/ inter. Iweviore bipartito lobis lincuribus. Anthera3 disci basi bisoto^ae appendiculis oblongo-lanceolatis, radii nullee. Stylus apice breviter bilolms, ramis vix divegentibus semiterelibus obtusis. Achsenium ovato-oblongum apice attenuunto-rostratum ad apicem laeve. Callus terminalis dilatatiis. Pappus annulo circulari secedens, paleis pluriseriatis filiformibus bacbrisT — Herbae Cnpenses bumiles Taraxaci facie. Colluin fimbriollosum. Folia radicalia runcinata glabra. Seapus sublanuginosus folii^* aeqxialis i-ccphaltf. Cor. flavii^{1?} — Sectiones generis inter, se exacte diirerunt ut frerberae sectiones.

Sect. 1. PARDISIUM.

Acbsenia densè papnlosa breviter rostrata.

1. P. TARAXACI (Vabl act. hiffi. 1. p. 9. t.4'), foliis ntrinqae glabris, acbneniis densè pnpulosisbrrviter rostrati*. If. ad Gap. RonjJ-Spei (fturin.), propè Kreedevler (Drege!). Willd. hp. 3. p. 21*7. Less, iu linn:eà i83o. p. 34g. Perd. semiflosculare Linn, ainoen. 6. p. 72. Parrlisium Capense Burm. prod. fl. cap. '26. ex Guill. diet, class. i3. p. 61. (v. sj

Sect. '11. LEIOCARPDM.

Achaenia epapulosa glabra longè rostrata.

2. P. LEIOCARPUM, foliis sahtis araneoso-canescensibus, achaenls liCYtailljis longi rostratia. *If in Africā Capēnsi ad Camisberge legit cl. Drege!* Habitus oinnino" prioris, sed prxter caract. indie, folio ram lobi dentibus acutis callo&is numeris 10 sio rib us quani P. Taraxaci'mstructi. (v. s.)

-|- *Species exclus&b.*

- P. ANANDRIA BrowQ^=r AnanJria Bellidi.tstruin.
 P. BRASILIENSE Linn. == Trixis Brasilitmsis.
 P. BRASILIENSE Mart. = Trixis glutinosa.
 P. CACALIOIDES H. R. K. = Trixis cacaloides.
 P. CALYCINUM Mart. =i'TrixU calycina.
 P. CHTLENSE Willd. = Chaetantliera Chilensis.
 P. CORDATUM Moç. = Acourtia hebeclada.
 P. CORYMBOSUM Moç. = Trixis coryrobosu.
 P. DEF.CURRENS Moç. =1 Trixis decunens.
 P. BXSCAPUM Steud. =Loxodon brevipes.
 P. FLEXCOSUM H. B. K. = Trixis divaricata f6.
 P. GLACIALK Poepp. = Cbabraea glacialis.
 P. HAVANENSE H. B. K. =. TrixU frutescens /S.
 P. LACTUCOIDES Wabl. z=. Homoiantbus Magellanicus.
 P. LiEvGATUM Berg. = Trixis fmtescens \$.
 P. LiTHOSPERMifOLiM Pcepp. r= Cuabrea litbospermifolia.
 P. LONGIFOLIUM Sess. et Moç. = Trixis longifolia.
 P. MAGELLANICUM Linn. =: Clarionea Magellanica.
 P. MEXICANUM Sess. et JMoc. rr= Dumerilia Ifuiubuldrii.
 P. NLRVOSUM Thunb. = Landtia nervosa.
 P. HUTANS Pospp. = Perezia nntans.
 P. OBLONGUN R. et Pav. =¹ Chaptalia ohlqnga.
 P. OVALE R. et Pav. z= Chaptalia ovalls.
 P. VANICUATUM Pcepp. == Leuccria paniculatt.
 P. reDiCDLARIPOLuM Poepp. = Clarionea pedicnlarifDlia.
 P. PILOSEH.OIDES Vahl. = Lieberkuhnibracteata.
 P. porunFOLiUM Sm. c= Nardosruia Gmeliui (i).
 P. PRENANIHOIDE9 Poepp. = Perezia pien^ntboides.
 P. PURPUHEUM Vahl. =^ Cbabraea^purpurea.
 P. RADIALE Linn. = Trixis frutescens.
 P. RI;CURVATUM "Vahl. = Honioianlhns'echiuQlatus.
 P. RECURVATUM Poepp. = Houioianthus linearis.
 P. ROSEUM Poepp. = Chahraea rosea.
 P. SARMEWTOSDM Steud. = CHevreolia stolonifera.
 P. SEMIFLOSCUL4RE Walj. =s Chaptalia tomentosa.
 P. SQDARROSOM Yahl. r= Homoiantbus squarrosus.
 P. SDAVEOLENS d'Urv. = Chabrea *naveolens.
 P. TOMEN7OSUM Thnnb. = A'nandria-Bellidiastrum.

DCCXXXIII: ANANDRIA Sieg. diss. 1737. Linn. diss. 1745. in amccn. acad. 1. p. a53. Less, in linnced i83o. p. 241 e* 346. sjrn, p. lao. — Leibnitzia Cass. diet. a5. (1822). p. 4^o. — Tussilaginis sp. Linn. — Perdicii sp. Thunb. — Chaptalix sp. Spreng. — Chaptalia Ledeb. non Vent.

Capitulum multiflorium heterogamum siibradiatura. Invol. squamae pluriserales imbricatae adpressae obloigo-lanceolatae obtusiusculae apice coloratae. Recept. nudum foveolatum. Fl. disci hermaphr., radii famine! staminibus omnino nullis. Cor. glabra? bilabiata? : disci teretes breves lab. ext. 3-dentalo, int. 2-dentato : radii tubo longo, lab. exter. ligulaeformijint. bipartito minimo. A nth. fl. disci caudatae et appendiculatae. Stylus apice bilobus, ramis obtusis semicylindricis approximatis. Achamium oblongum utrinque altenuatum subrostratum nempē apice supra semen conumcavum subhispidulum. Pappus multisets, setis tenuissimis filiformibus vix subscabris. — Herba Sibirica, habiliu Bellidiastri, valde varians. Radices fasciculato-fibrosa?. Folia radicalia petiolata. Scapus i-ccphalus. Cor. albae aut subroscae. •

x. A. BriTiDiA&TnuM^{9^o}! in apricis Sibiriae circā Irknstk, Okoslk, etc., in Chinā bureali (Jiunge!). Tnssilago Anaudria Linu. sp. i8r3. Perdiclum Anaodria Drown liort. kew. 5. p. 84. An specie*_t dpaे verc distinctae? An uaius fornise at obs. cl. Tarczaninow in statione natali? ^

et. *vernale* (Tuicz.! in litt.), scapo ebracteolato aat parcē "tradeolato, folisque plus niibūs lauaginobis brevius petlolatis lyratis aut sioaatis iinū ovatis, oapitolia j>ubapertis brevius pednnenljlis, pappo corollas disci j>ub-

** aecjoajale, lls radii uiuhō breviori. — Tnssilago Bellidiastruni Linn. hort. |tpa. 25i). t.'3. f. 2. Tuss. lyrata Willd. sp. 3. p. 19G3. Leibnitzia phamogama Cass. diet. 25. p. 422. Chaptalia lyrata Spr. syst. 3. p. 504 non Don. Anandria radiata Less. 1. c. p. 346. — Gniel. sib. t. 67rf. a. (v.s.)

[^]. a|itwrmde(Turc/..!* in litt.)[^], scapoelouqato bracteolal[^], foliisglabrinscu-
llis longē petiolalis lyralis, lobo tenninuli ovatQ slnuao-subdeuiato, caj)italis ui^oiibus longē pedunculatis dmcoideis, pappo corollas longē supe-
rante. — Tussila^{^o}- Anandria Linn. hort. nps. t. J. f. 1. nmccn. 1. p. 253.
t. 11. Willd. sp. 3. p. 196a. var. fcem. Leibnitaia cryptopama Cass. diet.
a5. p. 421. Chaptalia Anandria Spi[^]ng. syst. 3. p. 504. Ledeh.! fl. atl 3.
p. 890. Anandu'a discoidca Lear, in linna?á i<3o.'p. 347. Perdiciam tomen-
tbsain Thunb. fl. jap. 920 ex Less. — Gniel. sib. 2. p. 141. t. 68. f. r.
-*ts.)

Subtrib. II. LERIEM Less, in linnced i83o. p. i^i et 356A.*y<-j>- 120.

Capitulum heterogamum homocarpum, floribns fœmin. pluriserafibus in ambitu, cæteris masculis ex ovario abortivo steritibus. Involuci squamae nneniuranucessē erectse. fl.or. tcneñor glaora iimuu tutuu muaiu, siamnigera 5-nervia, hermaphr. nomiunquain illiformis.» Antherae caudatae, alis integris brevibus. Filain, disrincta. Pollen globosum lanve. Stylus basi bulbosus, ramis eklis superne pubescen^bufl. pappus capillaris. — He'rhae inermes teneras. j^apitula parvula.

DCCXX#ilX. CriAPTALIA Vent, kott.&ls.p.eit.buDt.anh. mus. 19./?. 66.
mem. lab. p. 6. Cehs diet. S.p. 161. Less, in linnced 1^0.p. a^t.syn.p. 121.
non Kunth nee Royle. — Chaptalia! sp. Pers. Don Spreng. — Tnssilaginis sp.
jyilld. — Perdici* sp. Walt.

.Capitulum inultiflorum^lcfogam^m radiaiiformje. Invol. campanu-

la turn, squamis imbricatis linear-lancolatis aculis. Recept. nudum. VI. disci masculi stylo nempè brevi simplici acbaeniiisque aborlivis, radii fertiles biseriales. Cor. disci tubulosa bilabiatse, lab. ext. 3-, int. a-deutato; radii interiores lab. ext. brevi angusto interiore manifesto, exteriores nunc mere ligulatae ligulâ stylo longiori, nunc bilabiatae, lab. int. minimo bipartite. Stylus fl. foem. apice bilobus. Achaenium cylindraceum utrinque subattenuatum suberostre glabrum, disco apice dilatato. Pappus mulliserialis, setis tenuissimis scabreLUS.—Herbae acaules Americanae perennes. Folia radicalia integra dentalia aut lyrata sutyiis torn en to sa. Scapinudi i-cephali. Floresalbi.

* *Corollis radU exterioribus mere ligulatis, labio interiore nullo.*

- z. C. TOMENTOSA ("Vent. hort. eels. t. 61), foliis ovali-oblongis retrorsùin subdentaliculatis, subtùs scapoqne albo-tomentoso-lanatis, suprà junioiibus sublanalis deiuùm glabrib, capitulo nutante. 3£ in sylvis hurnidis Carolinre, Florida. Kill. sketcb 2. p. 45g. Sims bot. iuag. t. 22^7. Less. 1. o. p. 15i. Perdicimii serofloscaliae Walt. car. 204., Tussilago integrifolia WilW. sp. 3. p. 1964. Michx. fl. a. p. 121. (v. v. o. «t s. sp.)
2. C. DENTATA (Cass. diet. 26. p. 104), i'oliis oblongib repando-dentatis villosis, scapo nudo, capitalo erecto. If in ins. Caribacis. Tussilago dentata J^inn. sp. i2i3. Leria dentata Spreug.syst. 3. p. 502. Plum. ed. Barm. t. 40. f. á. Sed ex descr. PJuin. pappus dicitur plumosus et ex icone foſsan stipitatas et Iberia; (jam moneule Spreng.) refereudni. *E
3. C. LYRATA (Don trans, linn. *soc. iC. p. 24H non Sprang.), foliis sessilibus ly-rato-spatlinlatis cib'ato-denticnlatis &nbtùs uiveo-tomentqsi», &capo lanugino.so sub hiacteo a to, capitalo nutante. % in Mexico.^Hieracium'fctipitaUmi Sessb et Moç. ex Don.

** *Corollis radii exterioribus bilabiaMs, lubio cxt. ligulceformi, interiore minorc(i).*

4. C. OBLONGA (Don 1. c pi a4o), foliis loAge'petiolatis oī>kmgis obtusis maugine revolutis obtuse deniocolatib aubtñi lan.itis suprà sublaunginos] & deinùm glabris, scapo bractcolato involucroqiiie valde lanuginosis. % in Peruvisc Ahdibus propè Pauao, Peidicum obloDguin R. et Pav. ined. ex Don.
5. C. oyAi.it, (Don 1. c. p. 241), foliis petiolatisovabbnssnbrotundisvc'coriäcpis marpne levolutis denticulatis(jue^i.u^u, petiolis scapi.sque fulvo-lanatis snpi^ deinum calvis Incidis, capitulo nutante.' If, in ^ernviii ad Huassarhuassi et Churapallanan. Perdicium ovalc 11. et Pay. ined. exiDon.
6. C. ROTUNDIFOLIA (Don. 1. c. p. 242), jiplis petiolatis subrenilbrmibus ffargue revolulis denticulatisque, suprà rugo&is demùm glibrjb, Inbtùs'petiolis scipii que lanatis, capitnlo nutante. If in altis frigidia Peruvia." ad Pillao.

† Species exclusæ.

- C. ANANDRIA Spr. ^ Anandria^Bellidiastruni yS.
- C. EXSCAPA Pospp. = Loxodon Cbtensis.
- C. GOSSYPINA ^oyle. =: Oreoseris lauuginosa.
- C. HETEROPHYLLA Don. = tricbo^lme hetcropybylla.
- C. LYRATA Spr = Anandiia Bell^iastrum *.
- G. MAXIMA Don. z= Bemiera NepaUusisJ.
- C. RUHCINATA H. B. K. = OxyodoB bicolor.

(1) Ex hoc caract. liar sectio accedit ad Lasiopum , sed flores. disci masculi ↘ ruutur nee hermaplir»

DCCXL. LERIA DC. ami. mus. 19. p. 68. mem. lab. p. 10 (excl. sp.). Cass. diet. art. p. 101. Less, in linnccū i83o. p. '656. syn. p. 121. — Tussilaginis >p. Linn. Swartz.

Capi tul urn multiflorum heterogamum radiatum. In vol. squama? linea-
res acuminalw ij regulariter subitnhricatsc. Recept. nudum. Fl. disci
Jicerroaplir , radii foeminei. Cor. disci tubulosae obscurè biiabiatae, labiis
123* dental is • radii interiores brevè biligulatae varic incisai, exteriorcs
longius ligulatæ, lab. int. nullo. Anth. fl. disci basi caudatac apice appen-
diculatæ, in fl. radii omninò nullæ. Stylus filiformis brevissimè bilobus
in fl. herm., longius bilobus ramuhs patenti.-reflexis in fl. fœmineis.
Achaenium oblongum compressum basi subattenuatuni papilloso-pilo-
sulum abruptè desincns in rosrum scmiuc longiris gracile glabrum.
Pappus muitiserialis pilosus , selis tenuissimis vix scabris. — Herbae pe-
rennscs. Folia radicnlia subtis albo-lomentosa basi angustata iu petio-
lum ad basin ferè inarginaluin.'Srapi elongati per aut post anthesin
nntantes lanuginosi i-cepha!i. Pappus subruFescens.

1. L NUTANS (DC 1. c), foliis sublyrafus, lobis laterjlibus parvis obtusis, terini-
nali amplio ovato ant tubcordato denticulis callosis subretiorsis dentato, capi-
tulo pei anlbesin uutante , invol. squaroij* anguslè lined ii-subul.itis. 1£ in siccis
nmbrosis moniosM IVlexici (Don tr. liuu. soc. x6. p. ?48), in montibnspropè
Jala pa m cl San-Andres (Less.inlinnaeY i83o. p. i3r), Novae-Granatae (H. B. et
Kunlb.nov. gen 4. p. 5), Brasilia? propè Babira (Salzin !), Rio-Janeiro (Gaud.!
Liind.!), inQuadalupù(Bert!), Poito-Rirco (Riedl!), Sancto-Domingo (Poir!),
Jamaicà (Swartz!). Tfissilago nutans Linn, aiuoen. 5. p. 406. Swartz! obs. 305.
TussUago lyraia^ Pers. cnch. I. p. 45G. it. 18. (ncc o. 2). Leria lyrata Cass.
diet. 26. p. £02. Xussllago Plum. ed. Barm. t. 4i. f. xlCor. radii purpureae.
(v. s.)
2. L. SINUATA , foliis obiongis siibscsilibus sensira basi augibtatis rotundato-
sinuatis , dentiruhh caiosir ad apices loboloioni, capituloeiecto!*, invol. sqoa-
mis latfa.scnlè linearibus jipice acuminatis. If, in Brasilia legit cl. S el low. L. nu-
tans va?. sinu^ta Le&s! in berb. mus. rcg. berol. (v. s.)
3. L. iNTEGRiForjA Cass. diet. 26. p. io3), foliis ellipiicis oblongis lanceolatisve
subiotegcirrnis, scapo foliis duplo ttiplöve longiore, invol. squamis linearibus
apice bubnlatis, acbaeniis angulatis minutis puberuhs rostro quadruplè brevio-
ribus. % in umbrosis Brasilia' ad Babiam (Salzrn!), in campis prov. Sancti-
Pduli (Lund !), propè Monte-Video (Comm.). Leria nntans integrifolia Less- in
linna?à T83O. p. 3*4. Hook.'et Arn. comp. i. p. io3. Scapus-i -J pedalis. Ca-
pitulum ante authesin erectum , po&^tä nutans. Folia basi attenuate, subtus
albo-tomeotosH, denticulis paucis spinulosis bine indè instrurta, 5-i2 poll,
longa, 15 lin. lata. Ligula? albac. Pappus rufescens. (v.a.) *
4. Ii. LEtoCARRA, foliis oblongo-lanceolatis Mibintegen inn's, scapo foliis triplö
' qnadruplöve longio^e,invol. sqiamic. JiiK-aribus apice subulatis, achacniis angu-
latis'glabeiriniis rosiro triplö bievoribus. % in ijisulà Cuba legit cl. Ramon
dela Sagra. An prioris Var.? Folia 1 J-i poll, longa, 4-J lin. lata, nunc integra
nunc obtuse sinuata, denticulis retrorsis minim is bine indè instructa. (v. s.
comm. à cl; inv.)
5. L. ALDICANS (DC. mem. lab. p. io)J foliis eiliptico-oblongis snbintegerrimis,
scapo foliis qnadruplö longiore, invol. squamis linearibus apice subulatis,
achæniis angulatis sparsè et minutè puberalis rostri sui longitudini æqualibus.
% in graminosis sicc. Jamaicæ occidentalis (Swartz ! Bert.), Sancti-Domini
(Bert.!). Folia 1-1 ; poll. longa, 4 lin. lata , subtus cano-tomentosa. Tussilago
albicansSwartz! fl. 2nd. occid. i348. Leontodon tomentosum Linn, f.suppl. 37.
(v.s.) "
6. L. PUMILAJ(DC. 1. c p. 10. I^ss. syn^pi iai), foliis obovato-oblongis retror-

sùm dentatis aut subrunciuatis, scapo foiiis decies longiore, invol. squam'is linearibos subobtuus, achaen'is sparsè puberulis rostrisni longitndini seqaalibus. Qđin Jamaica; montibus altis calcareis. (Sw.!). Tussilago pumila Swartz! fl. ind. i35o. Tnssilgo sinuata Pers. enr. I. p. ^56. Licberkuua nudipes Cass. diet. ^6. p. 287. Lerla nutans pumila Less, in linnaea 18Jo. p. 355. Folia oinniam minora, 5-6 lin. longa, subtùs danae touentosa. Scapus circ. 5-polWc. (v. s.)

-j- *Species exclusa.*

L. CESPITOSA Spreng. = Cbevreulia stolonifera.

y. EXSCAPA Spreng. = Loxodon brevipes.

L. DENTATA Spreng.,== Cbnptalia dentata.

L. WKRVOSA Spreng.^=Landtia nervosa.

L. SPATHULATA Don.%= Lieberkahua^spthalata.

DCCXLII. LIEBERKUHNA. *Cass^dict. aQ. p. 286. — Licbeikuuhua Less, in linn. i83o. p. 355! syn. p. 122. c.*

Cflpitulum pauci-(i2-i5) (Jorum heterog'a^nlimradiatum. Invol. floribus longius, squamis plurjserialibus lmhricalisoblongo-lanccolatis. Recept. niulum. Flor. disci bermabr., radii unjseries fceminei. Cor. disci irregulariter >ilahiatæ, lab. ext. 3-dentato, iit. bipartito.: radii iigulatae longitudine variac, labio inter, nullo. Antlicrae in J]. lierrn. >asi caudis (iliformibus, smice appendiculâ linearis insluctae, in fl. foen. prorsiis nulla?. Stylus hifonnis in fl.'disci' brevitè bilobus, in fl. radii proTundiis fissus , ramulis magis patulis. AqbaBu^ium subcylindraceum apice attenfiatum papilloso-pilosiluni. Pappvis setis filiformibus multiserialibus senbridis. — Herba perennis'parva acaulis. Folia radicalia petiojata oblongo-lanceolata deutatu aut runcinata suprà glabra subtùs albo-tomenlosa.'Scapus foliis vix longior i-cephalus lomenlosus. Cor. ex Cass. è flavo rubescentes.

1. L. BRACTEATA (Cass. L*c.) foliis obldnfio-lanceolaiis denta,lo-runcinatis, scapo bracteolato. If. in Monte-Video (Vabl) et SancJà-Catbarin^ (Ifolt. et Arn.) Less.! 1. o. p. 35G. Perdicium piloselloidts \abl acr.'soc. hafn. 2. p. ^8. t. 5. luuлаго sinuata piloselloides Pers encli. 2. p. 455. ^v. s. coinq.ä mps- reg. berol

a. L.? spATHutATA, Toliis lanccolato-spatbulatis tJenticulatis, scapofcbracteolato. ¶ in Mexico. *Cacalia spathulata* Sessé et Moc. ex Don. *Leria spathulata* Don trans. linn. soc. 16. p. 249. Huc potius qnàm *Leria* pertinere videtur ob fructum apice vix attenuatum nec rostratum; sed flores centrales masculi (au recte!) dicuntur.

-j- *Species exclusa.*

L. NUDIPES (Inss. = Leria pumiVa.

DCCXLII. OXYODON. — *Ox^yodon* Less, in Knnaea i83o. p. 241 et 3^7. syn. pfa, — *Cliaptaliae* sp^ec. Kunth. — *Loxodontis* &|^u*Cass.

Gapitulum inaequaliflorum. In vole turbinatum floribus longius,squamis linearis-lanceolatis. Recept. "iludbm ? fl. foem. biseriales in* anibitu , ext. radiantes, cæteri herm. Cor. herm. reguiares o-nemata, fum. ligulatae subintegræ, ext. radiantes obovato-lineares, int. obsoletæ stylo breviores. Anth. alis oblongo-ellipticis obtusis, supernè rigido-ciliatis. Stylus basin versùs attenuatus. Achaenium costatum glabrum , rostro longissinio filiformi. Pappus pluriserialis brevis subxqualis. —

Herba pcrennis simplex. Folia ad col I urn rosulata pctiolata oblonga ncuta runcinala, suprà viridia glabra, subtiis tomenlo denso uivea. Scapi apicc squamosi folio longiorcs.

x. O. DiroLoa (Less. 1. c. p. 327). % in rupibus Inonlum Novo-Granatensiain. Chaptalaiunciaata H. B. et Kunth nov. gen. 4. p. 5. t. 303. Loxodon longipcs Cass. diet. 27. p. 155. Taasilago bicolor Willd. berb.

DCCXLIII. LOXODON Cass. diet. 27.). a53. Less, in linneâ 1830./>. 241. syn. p. 122.— Chaptalise sp. Pers. Kunth. — Leriae sp. *DQ, Sprang.

Capitulum multiflorum heterogamum radiatum. Invol. subcampanulatum, squamis 2-3-serialis inaequalibus lanceolalis subfoliaceis. Recept. nudum. Fi. disci hermaphr., radii bi-seu pluriserplis foeminei. Cor. disci tubulosac inecqualiter 5-dentatae : radii ligulatrc, lab. int. nullo, interiores stylo breviores, exteriore stylo longiores. Anth. fl. disci basi bisetosac apicc appendiculâ linearis instructa3. Filain. glabra. Stylus filif. apicc bilbus, lobis in fl. radii irfagis patulis. Achaeniun papuloso-pilosum ovali-oblongum apice attenuatum nee ut in Oxyodonte et Leria longissiniè roslratum. Pappus mulliserialis longus, setis filiformibus scabridis. — llcerbdia caules. Folia omnia radicalia subtiis albo-tomentosa oblonga obovala integra dcnlata aut subl*iiucinaLa. Scapus brcvisimus. Invol. glabra. Flores pa Hidè flavi.

1. L. BREViPEs(Cass. 1. c. p. a54) » foliis ellipticib obtusis margine retrorsum subsilentatis, capiliis srapo brevissirao lanugmoso subsessilibu.s, ligulii exterioibus 2-3-dentatis.. % in Brasilia merid. ad Moute-Video. Tubbil.igo exscapa Peis. enh. 2. p. ^'36. Teria exscapa Sprbng. syst. 3. p. 502. Ferdicum piloselloidcs var. fi. JiibS. berl). Cor. ex Cass. f la vac (foisan alba;?) a pice rubentes, omues (exceptib in ccntra paucib) fecinica: ex Hook, et Am. com p. 1. p. 103. (v. s.)
- a. L. CHILENSIS, foliis clipticls, acatis marline retroraum denlatis, capitulis scapo brevissimo lannginoso bubsessilibns, ligulis extciioribas triildis, lobis Unearibus snbindeciualibus. 2f in Cbili (Pccpp.!), circâ Valparaiso (Beilero'). Gbaptalia exbeapa Pa'pp.! exs. n. 220. Simillimus priori < cum GO à cl. Hook. et AID. mixing, &d folia magis petiolata grossius runcinato-denlata , hgalaj exteriore multo majores ad medium feretrilidae nee 2-j-denlatae, beiierum intci. suBabotiv^c. (v. s.)

◊. foUisqubliis glabratis. If. in Amer. aastr. legit Dombey. (v. J. comui 1 tuus. reg, par.) *

•j- Species exclusa.

L. roiroipES Cass. 1= Oxyodon bicolor.

DCCiLIV." CHEVREULIA' Cow. bnll.philom. 1817. p. 69. diet. 8.p. 5t6.Less. in Utmd 1830. p. i|i et 360. syA. p. 123. = Tagwloginis sp. Pcis. -- Xerauthemi bp. Pet. Th. — Leriae fc'p. DC. Spr.

Capitulum pauciflorum heterogamum subradiatum. Invol. cylindraceum , squamis imbricatis lato-linçaribus apice subscariosis. Recept. nudum. Flor. disci masculi , radii foeminei. Cor. tenuissimæ glabrae, disci tubulosae regulares, 5-fidac, radii ligulalai aut iruncatai. Anth. 11. masc. basj biselosa; Styl. fl. foftm. gracilis bilobus, ramulis subpatulo-reflexis. Achaenium oblon^um glabrum in rôstrum filiforme seinine longius dobiriens. Pappus subuniserialis , setis filifornibus vix scabris. — HerbuLu brevicaules. Eotia subraditalia integra aut sinuata. Pedunruli ant scapi nudi i-cepbali.

1. C. STOLOKIFEHA (Cass.! 11. cc), caule ramoso brevi stioñifero, foliis suhralicalibus linearis-oblongis obovatisve obtusis intragerrimis mucronatis adpressè pubescentibus, scapo foliis longiore, squamis involucri apice obtusissimis. *If* circa Monte-Video (Coimbra!), ad Valparaiso (Math.), Valdivia (Bridg.) et in ins. Tristan d'Acngna (Petit-Thouars.). THssilago sarmentosa Pers. encl. 2. p. 456.
 Leria cespitosa Spreng. syst. 3. p. 502. Gnaphaliuni caiycinum Poir.! suppl. 2. p. 807. Xerantheiinm cespitosuiD Pet.-Th. fl. Trist. d'Ac. p. 3g. t. 8. Cor. flavidse ex Cass. (v. s. ex Monte-Video.)
2. C. FILIFORM is (Hook, et Arn. comp. I. p. 50s), canibus gracillimis, foliis supTa viridibus acuminatis oppositis per caules acqni-distanlihus, ramis floriferis brevibus usque ad capituluin foliosis. — in Sancta-Catharina Brasilia?. Caet. ign.
3. C. ACUMINATA (Less. 1. c. p. 261), foliis superioribus acuminatis oblongo-ellipticis, involucri squamis obtasis. *IL* in collibus montium Serra dos Orgaos Brasilia; propè Rio-Janeiro.
4. G. LYCOPODIOIDES, caule ramoso eesptbso demisso, ramulis folios[^], foliis linearis-oblongis obtusiusculis congestis in Legenimisj Suprà araneosis sulcus albotomentosis, capitulis ramos terrainantibus sessilibns solitariis oblongis, invol. squamis lancolatis acuminatis bnsi subtomentosis cacterùm glabris rufo-fuscis. *If* in collibus midis siccis insul. Maclovianarm legit cl. d'Urvil. Gnaphalimn lycopodioides d'Ijrv.! fl. mal. n. 71. Folia vix a lin. longa. Florum structnramin 9pecemano non satis vidi sed et habitu hûe pertinere videtur.

- * 5. G. PUSILLA, caule brevissimo ramoso-stolonifero, foliis oblongis inargitie subrevolutis integrerrimis mucronatis, suprà iaxè, subtus d^leq^learaneoso-torrentosis, capitulis sessilibus solitariis, invol. squamis apice obtusis & imis. % ad Valparaiso Chilensis. Habitus ferè Omalolhecac supinae var. subacaulis. Achaenia glabra subpapnlosa rostro circ. longitudine aequata. (v. s. comm à cl. Abdia.)

J Species dubia, achasnio villoso donata et verisim. ad Luciliam ex Ifook. et Arn[^] aut ad GnaphaReas ex Don referenda*.

◇ C. ? GIVAPIALIOIDES (Don in Hook, et Am. comp. 1. p. 10a), suffruticosa proenmbens niveo-tomentosa, foliis linearibus mucronatis margine reolintis integrerrimis, capitulis terminalibns subteorymbosis globosis, invol. squamis obtusis, achaeniis hirsutissimis. 5 in Chili? Vagit cl. GiUies. Pappus fulvelins. J. " ! *

7. C? XERANTHMODS (Doh in lolk; et Am. comp. 1. p. 102), suffranticosa proenmbens niveo-tomentosa, foliis linearis-laaceolatis acentis planis integrerrimis, capitulis solitariis, invol. squamis uestis s^lariosis, achariis sericeo-villosis. X in Chili? legit cl. Giljies. Pappns cinereus. f

Subtrib. III. FACEUDEM Less Mn lutnud 1830. ;. 36i. syn. » .ii3.

Cápit. multiflorum heterog^lmum, flor. feemineis uni- aut pluriserialibus in ambitu, paucis Tiliaphortifis seu masculis in centro. Cor. staminiferus regulariter 5-dentata?^ feemineis, «i^lmiserialps) obsoletè ligulatae. Stylus tenerrimus, ramis fl. ^ truncatis incius; is supernè extus puberulus. Acbasnia erostria densd villosa. — Herba? ^ustr.-Americanae Gnaphaloidea? tomentosaa. Capitula oblonga. Gaules foliati.

DCCXLV. LUCILIA Cass. bull, pkilorn. 181% /, 32. did. 27. p. 964. Less, in Unnasa i830 p. ia3. syn. p. taJ. ~ Serratul-c sp. Poir. — Gnaphalii et Heli-chrysi sp. Spreng.

Capitulum multiflorum hetefogatum, fl. radii 2-scriulis faMnineis,

disci paucioribus bermab. Invol. oblongum pluriseriale, squamis elongatis scariosis. Ilccept. angustum nudum. Cor. radii tenuissimae unc an^uslissiiniB ligtilalae, mine tubulosae : disci tubulosa?, 5-dentalae. Acbacnia obovato-oblonga eroslria Pappus duplex, seriei ext. setis basi in f.jsciculos plurimos concretis (quasi polyadeJphis), seriei int. setis paucis liberis. — Herbae Australi-Americanae perennes adscendentes procumbentesve cand-tonientosae. Folia alterna sessilia breviter decurrenlia intgrà. Capitula ad apices ramorum sessilia pauca approximata aut solitaria, bracteis v.-5 folinceis stipata. —Pappus exterior omnino refert pappum Ciadocbactae et Slaebelinie.

Sect. i. EULUCILIA.

Acbaeniissericeo-villosis, coroll's ftiemineis tenuissimè ligulatis. — Species Brasilienses. Folia acuta.

x. L. ACUTIPOLIA (Less.! in linnaea 1830. p. 1a3), foliis lanceolato-linearibus acutis tomento opaco sublanato canis, pappi setis mimitissimè serrulatis. % in Monte- "Video, Portalegro et Parana? ois arenosis. 1'lor. in cap. circ. 20, i5 fcciu., 5 berm.

A. nivea (Less.! 1. c), niveo-tomentosa simplex, foliis omnibus conformibus.

L. aculifolia Cass. drit*.⁷ p. a6» Serratula acutifolia Poir. diet. 6. p. 554.

Gnapbaluun Commersonii Spreng. syst. 3. p. 472. et Heliobrysum Monte- "Vidense Spreng. syst '3. p. 485. nee forte ab ca differt ex Schlect. in litt.

Baccbaris gna]baloides Spreng. sysl. 3. p. 461 nou DC. (v. s.)

yS. microph) //a(Less ! 1. c.), niveo-toraentosa raraosissima, foliis ramorum steriliu multò roinoribus. — Luc. mirrophylla Cass. diet. 27. p. 265. ex

| Less. Haec et prior adsuut inter plautas à mus. imp. bras, ad mus. reg. par. miss a s sub n. 879 et 880 in prov. Rio-Grande lectae. (v. s.)

yrgirescens, viloso-hirsuta subvirescens simplex, ioliis latius lanceolatis erectis 6 lin. longis, se.squilm. lalis. — An sp. propria ? (v. s. cum 2 prior. co aim. à mus.. reg. berol.)'

a. L. NITEWS (Less. I in linnaea 1830. p. 363), foliis lanceolato-linearibus acutis * feiectis tomeuto brevi adpresso splendente sericeis, pappi setis ininutissime serrulatis. If iu Brasila merid. Folia 7-8 lin. longa, 2 lin. lata. Gapit. terminalia^olitaria, Invol. squamae aigenteo-albidae. (v. s. comm. à mus. reg. berol.7

3. L. GNAPHALIOIBES (Less. 1. c), foliis ob^vato-linearibus acutis apice recurvis tomento splende&ti sericeo canis, pappisetis breviter plumosis. % in Brasiliâ merid. ad Gampum del Bacsterta. s

4. L. ARGENTIFA (Hoolt. ct Am. comp. i. p. 102), cauiibus simplicibus oligocephaliis, fohis lanceolato-oblongis rccurvalo-inucronatis utriuqie a?qualiter tomenlOrbrevis.simo splendenti aigeuteo instructis, invol. squamis intimis acuminateis, «apitulo sub-3-floro, pappo raiiter plumoso.— in pascuissiccis et arenosis circa Monte- "Video et Maldonado.

Sect!.iL. LDCLLIODES.

Acbxiis glabiis, co roll is fcemineis tenuissimè tubulosis.— Species Chilensis /oliis obtusis. — An genus proprium?

5. L. CBIIAITSIS (Hook, et Arn. comp. i. p. 102), caulis suffruliculosis rāinosissimis demissis glabiis, ramis^foliisque adpresso cano-tomentosis, foliis obovato-oblongis obtusis basi attenuatis snbenerviis, capitulis 1-2 axill. terminilibusve inter folia suprema bes^ilibns circ. 12. floris, invol. squamis oblongo-liueaiibus biibacuminatis aut obtusiusculis scario&is pallide rufescutibus. If, 3 in Audibns Chilensil>us (Nré! Poeppig!), ad Talcaregue (C. Gay!). Habitus

ferè Alyssi folia a-3 lin. long*, 1-1 7 lata. Fl. herm. 4, foeni. 8. Recept. angustnm nnduin. Gnaphalium frigidam Poepp! pí. exs. chil. n. 888. (v. s.)

DCCXLVI. OLIGANDRA Less. syn. (183a.) 12\$ non Less, in *lunaā* 1834. (1).

Oinnia Luciliae sed corollas fcemineae filiformes et flores disci steriles.

— Herbae suffruticcsve Brasilienses.

1. O. LUCILIOIDES (Less. 1. c), rbizoinate lignoso*foliis oblongo-elliptids e recto-patentibus. !£ in Brasiliā, Folia 4-6 lin. longa, 1-1 £ lata confciissima, iubtum tomento diaphano el argenteo, suprà deusissimo et niveo ve&tita. Ovaria villosa incaua. Capit. 18-flora, 1 masc. in centre /
2. O. LYCOPODIODKS (Less. 1. c), canle fruticuloso, foliis parvis triangularibus, ramis adpiessis. ^ in Brasiliā. Folia 1 2 lin lonpa, iubeñs argenteo-, suprà niveo-toiuento^a. (Japit. i5-ilora, 5 mabc. in cent 10.

DCCXLVII. FACELIS Cass. *bull. philom.jun.* 1819. *diet.* 16./?. 104. *Less, in lin-*
need 1830. p. 364. *syn.p.* ia5. —Gnaphalii sp. *Lam.*

Capitulum inultiflorum heterogítum, fl. radii pluriserialibus fcemineis tubulosis tenuissimis truncalis stylo ct pappo multò brvioribns: disci pancis hermapbr. tubiilosis 5-dentalis paulò crassioribus. Invol. oblongum, squamis huiceolato-linearibusscariosis, exter. ovatis. Recept. angustum nudum. Styl. 11. foem. exsertus simplex, fl. bennapbr. inclusus ramis brevibus. Acbasnia oba^ato-oblonga viloso-scricea. Pappus i-serialis, setis longè plunsosis. — Herbula demissn ex Amer. valde australi or tee ramosae. Folia a Item a oblcuga supra glabra subtiis ca-uotomentosa. Capitula terniinalia sessilia fasciculata aut solitarta. — Gnaphalia ex Gass. Mutisiacearum sect, ex Less.

1. F. AFICULATA (Cass. *diet.* 16. p. 104), foliis lineaiihus basi attenaatis*apice troncatib emarginatisve nervo mediū in apiculiu producto, capitulis conge.sro-fasciculatis. If ? ad Monte-Video (Couim.J, JJucnos-Ayres (Cass.), ad fretmn Sancta?-Catharina? (Sellow!), et ad "Valparaiso Chilensiōn (Kridg.). Gnaphalium retu&um Lain. *diet.* a., p. 758. Helichrys.um retusum Spreng. *syst.* 3. p. 484. Leptalea apiculata Don mss. ex Hook, et Arn.'comp. 1. p. 102. (v. s. comoi. a mns. rtg. her.)

f MUTISIACEM NON SATIS NOT*.

DCCXLVIII. PLAZIA Ruiz et^Pav. *prod.* 1. 104. C*ss. op use. a. p. 185.—Plaziæ

Capitulum multiflorum hornognmurtt. In vol. ovatum, squamis imbricatis lauceolatis erectis. Recept. nudum. Flor. hermaphr. Cor. disci tubulosae 5-fidæ (an æqualiter?) laciniis revolutis radii bilabiatae, labio exteriore ligulæformi 5-dentato, inter. bipartito lacinii; filiformibus. Anthcrarum tubiis curvatus. Stylus bilidus, Joins adpressis (an etiam peractâ antbesi?); Achenium lineari-obiongum angulatum. Pappus pilosus.— Frulex, foliis ovato-l&ncolatis trinerviis. — Ad Nassau viaccas refert cl. Cassini (opusc. i. p. x85) ob stigma bifidum, anheriarum tubum curvatum, capiuluni subradicum, flores radii hermaproditos, etc., ad Mutisiaceas æquo jure rferri posse ob corollanmi disci ut in Sliffiā lobos revohitos, ut in Serido et aliis aequales, ob flores omnes hermaphr. et folia couierta ut in Cluquiragdi, ob stylo ramos adpresso ut in omnibus Mutisiaceis, etc., sed genus vere obscurum n hodiernis ignotum-

(i) Geus Clienopodcum incaute ab ipsissunn ancioro codern uxornine iisgnitum.

i P. CONFERTA (R. et P^{iv}. syst. p. 187). £ in Peruviae praroptisiet sepibus.

* *Species exclusae.*

V. BRAJILIKWSIS Spreng. = *Stiftia cbrysantha*.

P. PARVIFLORA Spreug. = *Stiftia parviiloia*.

HCCXLIX. ATRACTYLODES. — Genus nov.? *Less. spi.* i₂5. — *Atractylis Thunb.fl. jap.* 306. — *Acarna sp.* Willd.

Capitula dioica.

- r. A. LANCEA (Thunb. fl. jap. 806 sob Atracylide), caule erecto ramoso, foliis lanceolatis ciliatis glabris, invol. exteriois squamis hetaceo-pinnatiiklis. — in Japonia. *Acarna lancea* Willd. sp. 3. p. 1700.
- a. A. OVATA (Tbnnb. fl. jap. 306 sub Atractylide), caule erecto simplici, foliis ovatis ciliatis glabris, invol. exteriois squamis ciliato-pinnatifidis. — in Japonia. *Acarna ovata* Willd. sp. 3. 1st701.

Trib. VII. NASSAUFIACEJE *Less. syn. p. 3g6.* — *Nassauviciae Cdss. diet. 8. p. 39<5. opusc. 2 p. 151. Less, in linnatd* 1830i p. 1.

Capitulum radialiforme a[^]qualiflorum bomogamum, paucis- aut inuiflorum, floribus bermaphnojdis, involucro uni- aut pauciseriali, squamis libcris. Corolla 5-nervia, 2-laHiala, teirera, tnbo à. limbo liaAd aut vix distineto, labiis parte integni J)rcvioribus, exteriori ires quintas lotiu[^] cor- paries amplectrante in floribus exteriorib* f[^]radatim majori ligulaeformi radimile, interiori ininori duas nonnisi vov. partes amplectcnlc. Anlherac labia corolla? non excedentes basi i audatae, sacpe incurve,, apice appendiculalae, alis longis latis substantiâ firmiori. Filani. Jibera plana glabra. Pollen laeve globosum. Stylus basi bulbosiih , rainis liberis nec (ut in Cynareis) coadunatis , aequalibus, scmicylindraceis, apice j)lus minùs divergenti- !iis autrevolulis Iruncalis(ferè utinSenecioneis) subpenicillatis,intùs Wigmatis series prominentes apice non confluens gerentibus.

Subtrib- I. NASSAUVIEM *Less, in tinncre* 1830. p. 1. *syn. p. 396-* — Nas- sauvit-is prototype *Cass. iabl. p. 20.*

Capitulum ad summum 5-florin. Involcri dblongi squama; carinatae, seiifi interiofis ni.ргine sese tegentos araplexiflorac 3-5 , quorum dua3 o p- ositac capitulum compressum aut suffpompressum sistunt. Corolla glabra.

* *Pappo* 3- 5-seto.

D(TL. NASSAUTIA *Comm. in Juss. gen. 17J. Lam. ill. t. 721. DC. mem. lab. p. 9 non Arrab.* 1835. — Nas&auviact Mastigophorns *Cass. diet. 34./?. 207 et 32i. opusc. 2. p. 135 ct 176. Less, in linnccū* 1830. p. 2 et 4- exch *Lag. syn. -- Nassavia Pers. endt. n. 1965. -1- Nassavia Spicng. syst. Z.p. 2nd49.*

Capitulum aequaliflorum 4-5-florum. Involucrum oblongo-cylindra- % oeum,niinc biserialc, squamisinterioribus 5 lanceolatis subspincsentibus erectis, ^ evler. hrevioribusadpressis, mine quasi i-seriale, squamis Aterois foiiaccis folia vera subaequantibus. Accept, nudum angustum. Flores hermaphroditi. Cor. bilabiatae, labio ex|. 5-dentato, interiore

bipartite, lobis interdiun concretis. Anlheras articulo crassiusculo ipsidentes, loculis brevibus basi etapice longe appendiculatis. Achaenium obovato-oblongum compressum glabrum. Pappi palcae 5-5 cadudssiinaj lineares acuminatae nrarginne vix ac ne vix ciliolata?.—Herbae aut suflVutices ex extrcmà Ainer. ausir. Folia sessilia semiamplexicaulia integra aut spinuloso-dentutn. Capitula ad apicem caulis sessilia aggregata. Flores flavi.

Sect. i. NASS^EA. — *Nassauvia Cass. I. c. Less. sjrn. p. 398.*

Involuci vere biserialis squamiac exteviores interioribus biviores. Pappus i-se-
rialis, paleis linearibus. —Capitula ex axillis supremis orta iu glomerulun ovatum
aut subrotundum aggregata.

1. N. SUAVEOLENS (Willd. sp. 3. p. 23tj6), «aule herbaceo erecto straplici, foftfr cunealo-ovatibapice grossed acutè incisis apice sribspiiiescentibus snbtus vi> IOMS ripltlis iu racemiim ovatum terminalem dipositis, biaoteis villosis Mmis capitula snperaotibos. % ad frelum Magellanicum. Lam. ill. 7? i. Brongn. voy. coq. t. 56. f. B. N. Corajncrsonii Cass. diet. 38. p. 457 et 11. cc. Herba ex Comm. suaveolens. (v. 9.)
- a. N. MACRACANTHA, glabra, caulesnffiticulo adscendente raniosn, foliis bracteisque lanceolalis rigidis bisi serruto-spinosis in acomen longnm spinosum desineutibus, capitulis ad azillas snpremis rongestis in race iu urn ovatum dispositis, bracfeij. iuferioribus capitula snperantibis. ^ % *ⁿ Chili (Nee?), in Col- dilleris Cbleusibns et Mendozaiuis (H. et Am.). N. Cuuiuingii Hook, et Arn. romp. 1. p. 37 ? N. saavrolens Don pbil. mag. i832. p. 38g non Lain. Folia et bractese aut glabia aut vix pubescenlia. Recept. udnm et capituj^ram dispositio et fabric a genus denionstrant. (v. s.)
3. N. SPRENGELIOIDES, canle fruticoso adscendente ramoso, foliis coriaceis ovalis in acumen bpinoauiii desinentibns subintegerriniis inedlo nninerviis fere paraJ- lelè multinerviis, capitulis ad axillas bractearum aggregatis eas aequantibus in spicaui oblongam dispositis. 5 in Cordillerà del IManchon Chilensium legit d. Nee. Bractaefoliis similes sect basi aUenuata. (v. s.)
4. N. KAMOSISSIMA, caule fruliculoso lamosibsimo, foliis glaucis ovatis spiunlososerratis et aeuminatis , juuioribus inter nervos utriue pubesceatibus, nervis parallelis suprà elevatis, capitnlis in spicain ovat<j-globosam congestis. ^ in Cliili in excelsis Cordilleris ad Talcaregne legit d. C. Gay. (v. s.)
5. N. RINNIGERA (Gill. in Hook. et Arn. comp. 1. p. 37), villoso-pubescent, foliis ovato-lanceolatis recurvis spinuloso-serratis, nervis plurimis impressis paralle- lis striatis in spicam oblongam dispositis & in Cliili ad adscensum montis Plancbon; in Andibus Mendozianis (H. et Arn.) Don pbil. mag. i832. p. 390 jet in Guill. arch. 2. p. 465. ^ cl. Don diritm- biisutis&iina, foljorum cost is sub- distantibus.
- G. N. REVOLUTA (Gill. in Hook. et Arn. comp. 1. p. 37), pnbej.cens, foliis ovatis revolutis spinnlososerratis suprà demùm glabratis, neryis plurimis inipressis parallelis, capitulis in spicam subrotundara digestis. ^ in Andibns Mendozianis ad adscensum montis IMancbon. Don pbil. mag. !832. p. 39a et in Gnil. arch. a. p. 465. Costae folioram rolii«d» contiguw.
7. N. SERPKNs(d'Urv. fl. malouin. p. 4i.n.G7), caule suffriiticoso repente ad- scendente parcè ramoso , foliis pet to tarn caulis lon^itodinem imbricatis am- plexicaulibus laie ovatis serratis flpjee aculis recurvis coriaceis suprà glabiis parallele striatis subtùs^eiiceo-viHosis, capitulis ad bract.prum foliis sabsijni- liura sessiibus et eas requantibus in gloinerulnm ovatùm densè aggregatis. £ in ins. Maclovianis inter rupes montis Chatellux legit cl. d'Urville. Less, inlin- naeai830. p. 4. Brongn. voy. coq. t. 56. f. A. N. Durvillei Cass. diet. 38. p. 456. Acbaenia glabcirñalucida fere semenPlanlaginis Psyllii referenda, (v. s.)
8. N. NivALis (Pcrpn.I cys- "• 9*3. coll. 3. p. aa6. Loss. syu. 399.), caule suffrmi-

0000 vepenN* aAstudente jiarcè rainoso, foliis per toram cauHs longitudinem ifnbritMtis aplexicaulibus latè-ovalis npice reenrvis sutftùs birsutis supra glabris parallele impresso-striatis iategerrimis, capituli In glouicrulum Mib>lobnsum densè aggregatis bracteas paulò superantibus. & in Chill australis glareosii vulcanicis moiitis ignivomi Antucensis ad alt. 7000-500 ped. legit cl. Poep-pig. N. serpeuti siuiillima. (v. s.)

q. N. i>UMiLA.(Pnppp! exs. n. 869), glaberrinia , caale beibaceo erecto ramoso pyginaio, foliis irabricatis basi aplexicanibus niar^ine serrulatis ayuce >subl^t-quetris cpiiaceis patulo-snreflexis, capitnlis ad axillas bracteartim foliib snhs-milium et eas snperantiu in capitulum snbrotundum densè glomeratis. 5 in Chili auslralis fissuris rupiom suinioi Pico de Pilque alt. 7100 ped. legit cl. Pceppig! Habitns ferè Andromeda hypnoidis. (v. s.)

Sect. IT. MASTIGOPIIORUS. — *Mastigophorus* Cass. diet. 34. 222.
opusc. 2. p. 178. Less, in linnced i830. p. 2. syn. D. 3Q6.

Involacrum veruni uniseriale nempe 5-pbylluni extùs stipatum foliis floralibus iuvolnram aeqaanthus et à foliis veris non discrepantibus. Pappus biberialis, pa-leis Iatis obovato-lanceolatis. — Capitula solitaria tenniualia.

10. N. GAUDICHAUDII (Cass.! in herb. Gaud.), caule fruticuloso ramosissiuo ces-pitoso, foliis iruhricatia coriaceis lanceulatis canñatis nervosis apice aontis re-curvis margine spinuloso-serratis, capitulissolitarii terminalibus. ^ in insults Maclovianis legit cl. Gaudichaud! ann. sq. riat. 1825. p. 103. dUiiv.lil. uial. p. 41. Mastigopboras Gaudicbaudii Cass. 1). cc. Gaud.! voy. urun. bot. p. 470 (V. S.)

•j- *Species exclusc.*

N. AXITXARIS Don. = Strongyloma axillare^.

N. GLOMERULOSA Don. = Stiongyloma gloméralosain.

DCCLI.- TRIACHNE Cass. bull, philfm. 1818. p. 4<. diet. 34. p. aai ct 5>
" . . . p. 182. Less:syn. 397.

Capitulum aequaliflorum 5-florum. Involucrum biscriale, exterius squamisovali-mucronatis, interius paulò brevius squamis 5mLMnbra-naceis- Recept. parvum nudum. Flor. hermaphr. Cor. labio ext. 5-den-tato, inter, fortè indiviso. Stam. articulo anther, longo. An the ne basi et apicelongè appendiculatae. Acha3nium obovatum subcostatum. Pnppi paleae 3-5, basi angustoe, apice dilatatae, obtusac, vix margine subdenti-culats.— Plantula sublignosa glabra cespitoña. Folia sessilia imbricata ovalia acuta coriacea, basi dentato-ciliata, apicc recirva. Capitula fd apices congesta, foliis floralibus intermixtis. Cor. verisirn. ilavidae.— An à Nassauvia satis differt? Descr^ . pappo excepto convenit cum JN purailà.

r. T. PYGMJE. (Cass. 11. cc). J % ad fretnm Magellanicanam.

DCCUI. TR1PTILION R. et Pav. prod. ft. per. p. 101. t. aa. mild. sp. 3. p. 1626. Cass. diet. 24-1830. v. i. y. 2-9. opusc. 2. p. 174. Lag. in bot. reg, n. 853. Less, mllnnas 1830. p. 3. Bon trans, linn. soc. 16.p. 219.—Tiiptiliuu DC. mem. labiatifl. p. 9. t. 3. / . 3. ann. mus. ig.p. 60. t. Vi.f. 3.— Nassauvi • sect. 3a. Donphil.mag. 18 3a.

CapitulSnVaequaliflorum. Invol. polyphyllum imbricarum , squamis apicespiemcentiflms. Recept. parvum tumbrellis tenuissimis villosum. Fibres 5 hermapbroditi. Cor. bilabiatac, lalno exter. 5-dentato ia-

j- *Species exclusa.*

T. AXILLARE Lag. = Strongylonia axillare. *

T. owwiERrtosliM Lag. — Strongyloma glonjerulosnm.

DCCOH. STRONGYLOMA. - Aconil..|,liylnm *Hook. et* 35).
p. 37 non C A. May. (,«,). - N^&VL ,p. *Don.* — ^ p. ^ ^

Capit. 5-Horura. Invol. polypTiyllttntimbricatum. Recent, ebracte*
atom vil oso-fuiil.nlliit.rum. Flores henna plnod. Cor aL iltes £31-
Mate, labio ext. siib'rotrnrfo. Aciutnia olipyramidaia-erftlti.* A~ A
.Pappus ,se^lis ^, .qualis ffiZ Ldei^sLgSS

bqmiks Cfiilenses. Folia iutefernma iliformia, primaria allerna bnsi
ilalata pers.stenua apice rigida smncsentia, Kccundaria in ramulis
axUBarilbussabintwiis brevissimis in glomerulku conjugesta. Capitula ses-
silia.— Nomeii <jx tre6yyv>.etp* id omne qnod rotundura in forme com"
Dactum cst, alludit ad glomerulos foliorum.

i. S. AILIARK, folijs primarfis subulatls trigonis basi cnooUato-vaglaatis se-
^andarus fiBciciilahs Urieariboa mucrlfnatis recarratu c-inimlU «,Wrn; * j
jp.n.Wdor. e t MeudOza(Gm.). S ^ S ^ ^ t o ^ ^ a g 4 " a
p. 390 et in rjuill. arch. a. p. 460. Tripillion axiUaro Lie i,, w » « a

calja nir.,rv;s muticis. «|HIOI.s sui;,,nis. 5 ia summū. Audi bus r h; w TM L
III Conliiera del Ioi-lillo (Nee). Triptiliafn glora erulosum Lag amoen. i. p. 1.
ot in bot. ITJ; it. S53. Don trass. Hun. soc. 16. p. 223. Nassauvia glomerulosa
Oon in phil mag, is'ix ct iu Guill. ;irc)i. a. p. 465. (v. s.)

^yjo nwhisito.

PGCLI7 CALOPTILIUM /.^. UMmi «. ,. ^ 34. C<w. AW. C f W 51 /,,, in
(>W«Y; i83o./r. e.yvi.jt.. 400. //oo*. et Arn. camp. i, » 3, -4n h* ' , in
lag, di,s. ined. DC. «,,, Wf1> r0. ;.. C8. m^ . f&. ^ Q. L« «Sff /«5? »? '
««« ahonun (1). — Portal CM :i .Vt;rc« m'je 1. yj. 316?

Capitula in glomeruldm »bsplwricht?m bracteis obvaMatum n^re-
^ata, 5-Hora, homqgama. [hvol. prbprium biseriae, squamis i^riori-
bns5 ovahs umcronaUs erectis membratiaceis, exturioribus 5.5 Kaeari-
bus laxis. l\ecpt..angusttim nuduril. Cor. glabra bilabiate, la'biw
subinffiuuajibi*s, exterioreraajore 5-interiore a-d^ntato. Autboraj bican-
6.RUV. Sty ll rami divergentes. Acbainyim 6l<ivatum compressum elab-
ruui. Pappus i-serinlis dpciduus, paleis longissiraAplutnosis. — HerbuJa
ccspitosa glabra imihicnults vix pollcaris. Folia obovato-cuneata im-
hricatn apice recur vn parallcle uei vt}S(Kstriatasemicoriacea to turn caul em
usque adglomfMiiHim (lorale obtegentia.

H i C LAI-ASC^ (Hook, et Aru. 1. c.)- % "» Amer. aostr. ..li_m Wjt (1) »T.
specim. mei locus pipprius mitiugnoimB, in Andes Chileniam -i! • \ • „
ad Jos Plenqenoa (C.ill.). BpLaerocephialns'Lagsacse Don „,il. mag. 1832.
p. 380 ef in GoM arcb. ... p. tff. Portalesia procombei mcyeu reis, r
p. 316? (v. s. ex iUu. NeianDJ

[,] Spkerocepalus Ualtora- est Agarici spec., Buppj e, t Kchinops, Hillcri est
Trichin t Wecken Muscus qmdam imm satis descriplus.

J Species exclusae.

T. AXIIXARE Lag. = Stroqgyloma axillare.

T. GLOMLRULO&UM Lag. = Strongyloma glooierulosum.

DCCLIII. STRÖNGYLOMA. — *Acanthophyllum Hook, et Am. comp. i (1835). p. 37 non Q. A. Mey. (1831).* — f Nassau vije sp. *Don.* — *Triptilii sp. Lag.*

Capit. 5-floruin. Tnvol. polyphylluirf imbricatum. Recept. ebracteoj-
Jitum villoso-fimbrilliferum. Flores hennaphrod. Cor. aequales bilin-
bintas, Inbio ext. suhrotundo. Achiruia ohpyramidata erostria densè
villosa. Pappus 1-serialis ppleaceus aequalis caducus, paleis-3-5 augustis
subconduplicalis iufcrnc attenuatis apicc ciliatis.—Suilrutices cespitosi
hurniJes Chilenses. Folia integerrima difibrmia, primaria alterna basi
dilalata persistentia apice rigida spinescenlia, secundaria in ramulis
axillaribus abortivis brevissimis in glqnierulum congesta. Capitula ses-
silia. — Nomen ex z<r(6yyv|u/u.* id omne quod rotundum informe com-
pactum est, alludit ad glomerulos foliorum.

1. S. AXIIXARE, foliis primariis subulatis trigonis basi cucallato-vaginatis , se-
candariisf>sciculatls linearibns mucronatis recurvatis, c.ipitulis sublernis. J ad
San-Ibidora et Mendoza (GUI). Nassau via axillaris Don in phil. mag. 183s.
p. 390 et in Guill. arch. 2. p. 46J '11 iptilion axillarc Lag. in Spreng. syst. 3.
p. 50C. Acnntbophyllui axillare Hook, et Arn. 1. c.
2. S. GtoMEuLObUM « ioYiis primariis subulalis babi dilatafis, secnnd.mis compi-
catis incorvis maticis, capitulis solirariis. 3 in sum mis Andibus Chilen&iuui ,
iu Cordillera del Porillo (Née). Triptilium glomerulosom Lag amoen 1. p. /.
' et in bot. reg. n. 853. Don trans, linn. soc. 16. p. 11^ NassauvU gloraerulosa
Don in phil. mag. 18'2 et in Guill. arch. 2. p. 465. (v. ».)

* *Pappo multisvto.*

DCCLIV. CALOPTILIJM Lag. amoen. n. i.p. 3/1. Cass. diet. O.suppl. 5r. less, m
linnaa ^1830.p. 6. syn. p. 400. Hook, et Arn. comp. l.p. 37. — Sphaerocephalus
Lag. diss. ined. DC. ann. mus*. 19. p. 68. mem. lab. p. 9. Don phil. mag. X83.J
non aliorum (1). — Poriale»ia Mey en reise 1. p. 316?

Capitula in glomerulum subspliaenicū bracteis obvallatum aggre-
?ata, 5-flora, homogama. Invol. propriuin biserial, squamis interiori-
bus 5 ovatis mucronalis crectis incembranaceis, exerioribns 5-5 linearib-
bus laxis. Recept. angustum nudum. Cor. glabra bilabiata, labiis
subinajqualibus, extrioremajore 5-inieriore a-den In to. Anthers bican-
datie. Styli rami divergentes. Achajiiuum obovaturm compressnm gla-
brum. Pappus i-scriialis deciduus, palcis longissimèplumrosis.—Herbuln
cespitsa glabra multicaulis viv ollicaris. Folia obovato-cuneata im-
buLcata apicc recurva parallele nervoso-striatasemicoriacea totumcaulem
usque ad glomerulum florale obtegcnlia.

1. C LA<VSCJE (Hook, et Am. 1 c). % in Aroer. austr. olim legit cl. Ne'e sed
bpeciin. mei locus propriu& mihiignotus, in Andibus Chilensium, ad adscensum
ad los Plenquenos (Gill.). Sphaerocephalus Lagascae Don phil. mag. 183a.
p. 389. et in Guill. arch. 2. p. 465. Portalesia procumbens Mcyeu reise 1.
p. 316? (v. h. ex iliu. Nea;ano.)

(1) Sphaerocephalus iialUra est Agarici spec., Ruppii est Kchinops, Halleri est
Tnchia , Neckeiri Muscws quidam non satis dccriptus.

DCCLV. **POLYACHYRUS** *Lag. diss. ined. (i) ex DC. ami. mus. 19. p. 68. mem. lab.p. 10. Cass. diet. 34. p. 116. opusc. 2.p. 183- Don trans, linn. soc. 16.p. 229. Less, in linncéa i83o. p. 5. sjen. p. 400.— Bridgeuā Hook. misc. 1. p. 222. non tjoock. et Arn. nee Bert.— PolyachrnsHook, et Arn. comp. \p. 36.— Diuphoranlhns Meyen reise 1. p. 406 ?*

Capitula bi- seu triflora , in glomerulum congests , bractcis linearis subulatis nonnullis cincta. Invol. 4-5-pbyllum , squamis inocqualibus , effter. majore concavo seu carinato, caeteris scariosis planis. Recept, angustum, palcā inter flores interjectā. Flores cujusque capituli her maphr, inosquales. Cor. bilabiatae glabrae, lab. ext. 5-dentato, int. bipartite Anth. basi bisetae, appendiculā linearis-lanceolatā. Styli rami lineares truncati demū revoluti. Acbaenium erostre, fl. ext. cuneato-oblongum papilloso-scabrum pappo brevissimo piloso scabro corona-tum, fl. int. longius snbtetragonum [>appo duplō triplōve longiore plumoso coronatum. — Herbae Echinopsis Tacie. Caulis teres ramosus. Folia alterna auriculato-amplexicaulia ruueinata aut pinnatih'da. Glomeruli terminales subglobosi secis ramulos c\ inter flores lanati. luvol. glabra nitida. Cor. roseas.

§. 1. *Capitulis bifloris^f- Species Chilensis.*

1. P. POEFIGII (Kunze ex Less, iu liunasā i83o. p. 5. syn. 400), ramis foliisque subtis vix aracinoideo-lanalis, foliis basi amplè et rotundè aurillb subdecurrentibas, lobis lanceolatis acuminatis. *Of in Chili in collibus praeruptis ad littora maris (Pa-pp!) propè Valparaiso (Bridg. Abad! Bert!), ad Cocjuimbo (Macr.). DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 84. P. am'it us Don pbil, mag. i83s. et in Ooill. arch. 2. p. 466. P decurrens Lag. diss ? (v. s.)*
2. P. NIVEUS (Lag. diss. ined.?)_f foliis ramisque niveo-tomenlosis siipernè araneosis basi rotundato-auritis cordatis, lobis obtusis margine sabievolutis. % in Chili olim legit cl. Née! An P. multifidas Don 1. c. Diaphoranthus fuscus Meyen 1. c? (v. s.)

§. 2. *Capitulis trifloris. —Species Peruviana.*

- 1^P_{1'}.^{ECHI_ArOPSOIDES,} un*dique lanuginosa, foliis basi aurito-araplexicaulibus, lobis latis margine sulrevolutis, invol. 5-pbyllis 3-floris. % in PeruA ad Culluy in valle Canta (Hook.) et ad San-Matheo (H. et Am.) Bridgesia echinopsoides Hook. misc. 2. p. 222. t. 92. Pol. sphaerocephalns Don trans, linn soc. 16. p. 229.*

DCCLVI. **PANARGTRUM** *Lag. in DC. diss. lab. p. 9. Don phil. mag r83a er Guill. arch. 2. p. 65. — Panargyrns Lag. arcen. 1. p. 33. Cass. diet. 3/, p. 225. — Nassauviae sp. Pcrpp. —Pentanthus Less. syn. 397. non Hook, et Arn.*

Capit. 5-florum. Invol. cylindraceum biseriale, squamis ext. 5-4 j-udgenibus subfoliaceis, inter, b-5 obtusis margine scariosis. Recept. angustum nudum. Flor. bermaphrDdlti. Cor. bilabiatae aequales, l y'o oxter, subrotundo. Acha3nia oblonga 'erostria glaberrima. Pappi palea? numerosac uni- aut biscriales subpersistentes lineares acuinataB per totam longitudinem confertè ciliato-serrulatae. — Herbae-suHVuticuLosae "Ghilenses à basi raniosissimā?. Folia secis caules cotifera aiicna sessilia. inciso-subpinnatitida, loinis indurato-acuminatis spincsentibus, Capitula fasciculata. Cor. albae. —Nomcn Lagascanum pessimum cùm species ferē om̄nīs sinl glabriusculac, sed ob prioritatem srḡe tantiim vctinui.

§. i. ANARGYRUM.

Pappi paleae biseriales. — Rami et folia glabra.

- i. P. GLOMERATVM (Gill, in Don phil. mag. 183a. p. 3go. et in Gniil. arcb.'a. p. 466), glabrum, foliis lanceolatis dentato-pinnatifidis, capitulis 7-8 sessilibii in glandulari hemicryptophaericina aggregatae. % ^ in squaminis Andibus Chilensis proprie Talpaeque (Gay!), in Andibus Mendozae (Gill.), Hook, et Am. comp.). 1. p. 36 Herba suffruticosa ramosissima cicut. 6-poll. (v. coinm. à cl. C. Gay.)
- 'i. P. OTiGocErnATUA!, glabnira, foliis* lancolatis dentato-pinnatifidis, capitalis scutellibas sohtariis aul (ex Don, Hook, et Am.) bi- quaterniave glomeratis. % 3 in A-rubuj. Cbilrnsibns? (Née!) et Mendozianis (Gill.). Panargyrum unicolor Don 11.cc. Hook. et Arn. 1. c. Priori multo rainas et vix ex specini. meis bipollicare. (v. s. ex herb'. Née.)

§. 2. PIPTOSTEMMA *Donphil. mag. 1832. p. 300 et in Guill. arch* 2.*
p. 446.

Pappi paleac uniserialis — Rami apicem ronferte velutini. Folia glabra.

3. P. SPIITOSUM (*Donphil. mag. iffi^ [p. 30]*), caule finticnoso adfcendente, ramis velatinis, foliis glabris lanceolate^pis pinnatifidis lobis ngidis acnleatis, capitulis ad apices raiDormis rncmosis confertis brevi&simile pedicellatis. J in Andibus Chilensis, in Sierra "Velleida et ad Antuco (Pccpp.)! ad TalearegiK¹ (C. Gay!), ad Pecan (Gill.) et los Ajos df Agna (Bridg.). Nassanvia acnleata Pclpp. ! oxs. 3. n. 885. B. Panargynum spinosum Hook, et Am. comp. p. r. p. J7. Pentantibns acnleatns Lexs. syn. 3g8. Folia in par to canlis infer, conferta, Mipernè sparsa. Pappus invol. longior. (v. s.)

^ 3. EOPANARGYRUM.

Pappi palea;.... vix invol. tequantes. — Caules et folia argenteo-sericea linearis-subulata. j*.

4. P. LAGAsct, undirjnc sericeo-argenteum, caulo herbaceo, foliis uneanf-subulatis, rapitalis congestis. % in Chili."J".

DCCLVII. PENTANTJHUS *Hook, et Am. comp. i.p. 3a. in not. nonLess. (1).*

Capitulum 5-florum homogmnnum. Invol. cylindricum i-seriale, squamis 5 linearis-ohlongis obtusiusculis striatis basi callosis rigidis, 2 inar-r. gine scarioso, rcliquis immarginatis. Recept. glabrum. Flores i-Seriales antè squamas'inv. siti. Gor. bilabiale, labio ext. 3-, inler. 2-fido. Anth. basi ccaudatac. Adliaem'um crostrc glahrifim, caljo basilaris. Pappus pluriserialis scutosus scaber. — Caules suffuticosi ramosi. Folia allerna longè petiolata cordato-subrotunda 5-7-angulato-lobata hinc indè apiculato-dentata, suprà glabra reticulato-venosa, subtus leviter pubescens. Pedicelli fastigiati. Cor. albæ. Pappus sordidè fulvus. — Valde derodit ad Jungiam.

1. P. jujNe.oiDi s i Hook, rt Am. 1. c). 3 in Pern via ad Porrnchura.

Subtiib. II. *TRIXIDEJE Cass. tall.p. if>. Lets, in linnad 1630. p. 6. syn.*
p. 400.

Capitulum plusquam 5-floruni. Involuci i tereti*. squamae onines planas am. aequalifpr magis Aiiñusve cariuatse, seriei exterioris plu^quam quina?.

(1) PeptanthuaiLes!.. = Panargyrum

ortis in paniculam polycephalam ramosissimam dispositis. — in Brasiliâ æquinoctiali ad Port. Alegre et Rio-Grande (Tweed.). Achænia apice longius quam in aliis mihi cognitis attenjata! Marlrasia puljescena Lap. am. i. p. 36. et Cass. opase. a. p. i5\$? J. pyraraidalis Don trans, linn. soc. i(i. p. 299. (v. B. comm. à mus. reg. berol.J

DCCUX. PTILURUS *Don trans, linn. soc. i6./>*. at 8. *Less, sjrt.p. 407.*

Capit. mniUifloLim homogamutn. Inv. squamae biseriales ovato-lanceolatae Srnerviaiagice mcmbranaceae acumii Kitw radianics. Recept. 11 udum. Flores herm. aequalcs. Cor. biiabiatae, labio cxtor. ligulato o-dcn-liculato, inter, bipnrtito lobis revdlutis Ujeari Kus ohlusis. Anlh. a^pendicula linjari-laiitfeolata, caurlx longa; setos. T. Slyli ranii semi-tcretes recurvi ,ij>ice dilatHto-tiincali priiinost. Achamta elliptico-oblonga conipressa dense pacillosa apice attenuata. Pappus biscrialis deciditins, sctis crassiusculis molKssimis plumpsis Jasi dilaiaiu imbrica.tis. — Hcrlii perexinis cespitosa Dauci fncie! Radix i'usifbrrais. Caul is ramosus. Folia supra decomposita *densk* ^tandulosa, lacuiis linearibus. Pcttoli basi dilatati. Capitula lerna semiglobosa. Iovol. lanatum. FJores aibi.

T. P, DAciFOX^Tifl (Don 1. c), in PeriiTiae sum mis Andibas.

UCCLX. LKUCFJUA fi) *Lag. diss. ihed. in DC ann.mus. 19. p. 66. mem. Inbiat. p. 8. Lag. amccn. esp. r. p. S3. Cass. diet. 26. p. t\$. ec ?>5. p. 3yi. Don trans. Hun. soc. 16. p. aia (excl. Cauipcā). Less, in linnet^.* i\$3o. p. 10. syn. p. /(.ui.

G'lptulmn nniltifloinin hm nogamum radiritif'orme. Invol. dupliceuse. Iriplici stint; poiyphyllum imbriCalura, squiirrm acutis scu acuminatis iutimis inter (lores exleriorcs sitis et idco paleis dicendis. Cor. omnes berm; i>hr, bilabiatse, lab. int. ininorebipartite, eatt. majort 3.-derrato in tloribus radii maximo iigulaeformi, in Uoribus centralibus sensim decrescentibus, Anlh. basi biselse, appendibul^ lanceolate terminate. Styli rami stinilcretus OMUSC Iruncati. Achicnium ovali-cun^aum pilosiuscultim uroslre. Papjii sctx nivcae uniserials basi in annulum deciduum subconcretse t>rcvē plomosae. — Herbae A'uslr.-Americanie caulescenLts plus minus lanugine alt>a et interdum pilis ylandulosis vesiitn. Folia pinata Stobata autsu^eriora imlivisa, infima peliolata, cceteja sessilia imo amplexicaulia seu dcciurrentia, Capitula pedunculata paniculata aut corymbosa raro solitaria, Liguhe radianl[«] nervi cxteriores longe intiii marginal[©]! Nervi ideo in iigulis 5 distinct!

Sect. I. EULEUCERIA.

**

Pappi seise liieviicr sf-d diftlincte plnmosae, basi in jinnulnin concrete, luvol. 2-3-aerialu.

§i i.- *Fulus caulinis txm decwr&tii&us.*

i. I». ACAHTtfldms (Don trans, linn. sor. id- p. 21S), raule sotsimplid albo-Innate ft apire pfoso glimduosoj foliis i;n!cnlijns lonpc pccottaiis, profundè pinnatifidis supra glabris subtus niveo-lanatis, lobis tridentatis mucronnlatis, caulinis amplexicaulinbus laciniis lanceolatis acuminatis margine revolutis pilosulo-glandulosis, capitulis 3-7 corymbosis, involuci munitiserialis squamis membranaceis adpressis. 2? ①? in Andibus Chilensis (Cum.), propè Collina

(t) Nomen » plurirnis fxlmium stil> *Leucovria*, *Latcheria*, *Leuchtrria*, srrl cum proveniat ex Aif «oc nlbtiset iftDt lana, [D"tiu\, ('ussinio'tt Doniopr. Tciinttbus, Louce-
idmittenda.

ortis in panicuam polycephalam raraosssimam dispositis.— in Brasiliâ aequinoctiali ad Port. Alegre er Rio-Grande (Tweed.). Achamia apice longiius quam in aliis milal eognitis attenuata ! Martasia pubescens Lag. am. i. p. 3b'. et Cass. opusc. a. p. i5tf? J. pyramidalis Don traas. linn. soc. 16. p. 299. (v. s. com in. à mus. reg. berol.)

DCCLIX. PTILURUS *Don trans, linn. soc. 16.//. a 18. Less, syn.p. 407.*

Capit^muUiflorum homogamum. Inv. squamae biseriales ovato-lançolatae 5-nerviac apice membranacea? acuminataeradianies. Recept. nn-dum. FJores herm. aequales. Cor. bilabiatae, labio exter. ligulato ô-denticulato, inter, bipartito lobis revolutis linearibus obtusis. Anth. appendicula linear-lanceolata, caudae longae setosae. Styli rami semi-teretes rcciirvi npice dilatato-truncati pruinosi. Achaunia elliptico-oblonga compressa densè papillosa apice attenuata. Pappus biserialis deciduus, scliscrassiuscuismolissimisplumosisbasi Hilatalâ imbricalis. — Hcrba pereuuis cespitosa Dauci facie! Radix fusiformis. Gaulis ramosus. Folia suprà decomposita dense glaudulosa, laciniis linearibus. Petioli basi dilatati. Capitula lerna semiglobosa. Invol. lanatum. Flores albi.

I. P. DAUCIFotius (*Don I. c*), in Peruvian summis Andibns.

DCCLX. LEUCERIA (1) *Lag. diss. ined. in DC. ann.mus. 19. p. 66. mem. latiat. p. 8. Lag. amochn. esp. 1. p. 3J. Cass. diet. 26. p. i5. et 55. p. 3yi. Don trans, linn. soc. 1 ◊.?. 21a [excl. Cassiopæa]. Less, in linnaad i83o./;. 10. sgn. p. 401.*

Gnptulum multiflorum homogamum radiatiforme. Invol. dupliciscu triplici scrie polyphyllum imbricatum, squamis acutis seu acuminatis intimis inter (lores extcriores silis et idcò paleis dicendis. Cor. omnes bermaphr. bilabiatae, lab. int. minore bipartito , ext. majore 3-dentato in floribus radii maximo ligulaeformi, in (loribus centralibus sensim decrescentibus. Anth. basi hisela3. Tppendiculâ lanceolalâ terminate. *Styli rami scmitcertes obtuse truncati. Achainium ovali-cuneatum pilo-siusculum erosre. Pappi scta3 niveae uniseriales basi in annulum decidiuum subconcretne brevè plumosae. — Herbae Austr.-Americanac caulescentes plus minus lanugine albâ et interdiim pilis glandulosis vestita. Folia pinnatilobata autsuperiora indivisa, infima petiolata, ccetera sessilia imò amplexicaulia seu dciirrentia. Capitula pcdunculata paniculata aut corymbosa raro solitaria. Liguhe radiantis nervi extcriores longè inlrâ marginales! Nervi ideò in Jigulis 5 distincti.

Sect. I. EULEUCERIA.

Pappi setae breviicr sed distincte plomosa;, basi in annulom concretae. Iovol. a-3-seriale. ;, *

§. i.-*Foliis caulinis non curr&itibus.*

1. L. ACANTHOIDES (*Don trans, linn. soc. 16. p. 218*), caule subsimplici albo-lanato et apioc piloso glanduloso , foliis radiralibns lonpè petiolalis profnndè piouatiddis snprà glabris subtùs niveo-laiiatis, lobis tridentatis niucronnlatis, caulinis amplexicanlibns laciniis htncelatis ararainatis Inargine revolutis pilosulo-glnndnlosis, capitulis 5-^ corymlosis,involucri mnitiserialis squamis membranaceis adpres>sis. ^? Qj? in Andibus Chilensinm (Cam.), propè Colltna

(4) Nonu-n à pluriraids adrnisjum sub> *Lcucaria*, f*Aiucheria*, *Leuchivria* > bvd cùm proveniat exAcuxoc albuset cftov lana, potiùs., *Cassinio* et *Dnniopra* ^euntibus, Lcuceric admiftunda

(Macr. Bridg.) et *ad montera la Leona (Bert.). Hook, et Am. com p. 1. p. 35. DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 85. Chabraa prenantboides Bert.! herb. Flores cyanaei. (v. s.)

- a. L. HIERACIOIDES (Cass. diet. 55* p. 392), caule floccoso-lanato eglandnoso, foliis infimis vix petiolatis pinna'tifidis lobis obtusis den tat is, caulinis semiaplexicaulibus auriculato-sagittatis pinnatifidis, lobis angaslis acntis, omnibus supra arancosis snbtis albo-lanatis, jjaniculâ subaphylki, capiinlis ad apices ramorum solitariis , involuci lanati pluriserialis squamis neutiuseulis externis subconcavis. — in Chili ad maris litora in arenâ mobili propè Valparaiso (Bert.). Color flor. pallidi. Capitula diam. ferè pollicari. Paleoe recept.*ohlongo-lanceolatae aculissimae. Achamia grossè p'iosa. (v. s.)
3. L. FAHICULATA. (Kunze! in Poepp. coll. 3. p. 218), canle basi....., apice laxè panicolato subaphyllo piloso-glanduloso, foliis radicalibus petiolatis subtùs albidò-lanatis profundè pinnatifidis, lobis grossè 7-dentatis, caulinis semiaplexicaulibus lobis linearibus margine revolutis, capitulis subcorymbosis in quoque paniculae ramulo ternis, involuci multiserialis squamis membranaceis planis. — in Chili legit cl. Pceppig. Perdicium paniculatum Pcepp.! pi. exs. n. 740. L. divaricata Don trans. Hun. soc. i83o. p. 2i4^p. Hook, et Ain. com p. 1. p. 35? Flores in sicco cyanei. Capitula 27-30, diam. 7-p, lin. Labia ligulata involucrum duplo fere superantia. Paleoe recept. valde. mem bran aceae obtnsa?. (v. s.)
- 4* L. SENEPIOIDES (Hook, et Arn. bor. Beech. 1. p. 28. com p. p. 35), canle à basi rainoso paniculato pubescente et piloso-glanduloso, foliis omnibus sessifibus amplexicaulibus oblongis sinuato-lobatis dentatis subtùs soblanatis supra piloso-glandulosis, capiinlis longe pedunculafis solitarii, involuci hemispha*rici 2-3-serialis squamis lanceolatis acatis, paleis apice serratis. (f) in pascuis saxosis collum ad Rancagua, Valparaiso, Quillota Chile nsium. Trixis seneциoides Hook. exot. 11. a. t. iot. Chabraea elongata Bert.! in litt. Cor. alba¹. Capitula 6-7 diam. lata (v. s.)
- jS. purpurascens, cbrroltisroseo-purpurascentibas, invol. squamis magis acutiuatis. 'i in Chili pascuis sterilibus ad Rancagua, Valparaiso, moutem la Leona. Chabraea abbreviala Bert.! herb. (v. s.)
5. L. AwnaYAXoiDEs '(DC. ijULDeless. ic. sel. 4. t. 86), lota laxè lannginosa et candicans eglandulosa , canle paniculato , foliis inferioribns petiolatis et caulinis auriculato-niuplexicanibus oblongis profandè pinnatifidis, lobis ovali-lanco-lalis acutis subdentalis, panicula ramis polyccephalis, invol. campanulali lannginosi squamis 2-serialis linearibus mucronatis, paleis ovali-oblongis apice serrati*. — in Chili aridissimis inter Puenla d« "Vizcachas et la Gnardia legir cl. Pappig. Trixis ro*ea Poepp.! exs. n. 24. Lenchcria rosea Pcepp.! cat. 2. n. 118 (24). Less. syn. ACVJ, sed'a Perdicio roseo. seu Chabraa rosea diversissima nudè noraen luutavi ad confna. vitand. L. senecioides var. Hook, et Am. coinp. 1. p. 35. Capitula 5-6 liu. diam. Cor. roscae. (v. 9*)
6. L. TKNUIS (Less. syn. p. 4^oi), eaule tenni hinc in*fé subhfrsutnlo sed pube glandulosâ deslitnto paniculato-ramosissinio , foliis radicalibus petiolatis et o.an-l'nis semiaplexicanibus ntrâ medium pmiatiuîlis glabrinsculis, lobis oblongis dentatis sen linearibub integris, capitulis longè pedunculatis solitariis, involuci squamis oblongis glabris, paleis ruspidaJ's' subserruljatis. (f) in pascuis sterilibus lapidostis collum ad moutem la Leona et ad Qttiliota Toco dfeo la Campanachica Chilensis legit cl. Bertero. DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 87. Chabraea tenuior Bert.! in litt. L. seneçioides. var. Hook, et Arn. eomp. 1. vm^f. Capitula omnium minima. Cor. albic. Ligula? abbreviafa*, (v. s.) tMHk

§. 2. *Foliis caulinis decurrentibus.*

7. L. CONGESTA (Gill, in Don phil. mag. i83a. p, 3S9. et in Goill. arch. 2. p. 2⁴), caule lanuginoso apice rainoso, ramis uraneosis et piloso-glandnlosis, ibliia, infer, petiolatis, super, sessilibus deenrentibus pinnaripartilis snbtis lanatis, lobis lobulisqno acuminatis iubspinescentibus, capitulii paniculato.congestis, invol. basi sublanyiti sqnamis liuearibus acuinii);iii.s. — In Andibus Chilensis ad Coesta^/lel Ing. Hook, et Arp. comp. 1: p. 35. Folionira. snmmornin loif 'nq*üstissTmi* ferè siibuitti. (v. ».in'h. Tiiiliaua'ex'iin. Neacir) • .^ .

8. L. Nh/Ki, caule lanato apice ramoso Mibeglanduloso, foMis cauliis decuircn-tibusMibtns, lanatis .suprà glabris lancooliiis margine revolulis basi incibo-.sub-pirmalilidis, rapitnlis corymbosis Mibglobosis, in vol. .s^uamis ovati.s dor.so la-natis jipice scanosis, obtu&iuscnlis. — in PeiuiA aat Chili legit cl. ;Nee! Prtoi&a/iinis ietl pi.Tter carnvl. indie, cajutula dimidio minora. (v. s. in'h. Thibaiul ex ilin. Nrj'i.)

Sect. n. MACROBOTRYS.

Pappi seta; \ix >cabrae imà basi snbpolyailelphse in annulum non concrete. In-vol. bqjiHino; 4-serialc» imbricata; obtasac. — An geuus proprium?

p

9. L. FLORIJUNDA (DC. in Delcss. ic. sel. 4. t. 8«), caule erecto angqlate gia-briuscuso, foliis infer. super, ses&ihbis oblongis siuDaio-bemipinnaiiidis acute denial is sablfis caieacenti-toiueitosib supra -giabvis, paniculae thyisoideas polycepbakr ramis tomcentosolis, invol. squann\ dor^o louiFuiosis inargiue sub.scaciosls. —jn excclbis Andibus (Jbilensiuiiif legil cl. C. G.y. Folia canlina 5 poll, longa, pollicrm lata, suminj inler panicuK' 1 anios linearia acuininata acutissime dentaio-incisa. Cor. ex Bicco.roseoe? (v. s. coinm. a ol. inv.)

-} - Species (i < It^cu.

L. KBIDOESEII Hook, ct Arn. = Chabraw loincntosa.

L. CANDIDISSIMA Don. == Cbabraia cjndidissima.

L;ciNERA Don. r= Cbabraea cinetea.

L. COWXZQIDES Don, r= Trixis ochioleuca.

L. CCMMTNGII Hook, er Am, = ? Cbabraea glandnlosa

L. EGHOIDES Don. = Trixis llra*iliensis.

L. GILT.iEsir Hook, et Arn.= Chdiiraea ciner»a.

L. pnrc:HErjjL Don. = Chabreaa glacialis.

\. nuNCINATA Don. = Cb.ibraia rosea.

L. ficaonrcuLATA Don. = Cbabraa scrobiculala.

DCCCLXI. CHAPJtYEA DC. diss.pnbl. lect. int. Call 1808. ann. mm. 19.^0.)

e. 5. mem. lab. p. 7. t. 5 (1). Cass. diet. 8.p. 46. — Laworbiza Lag. amocon esp. 1.p. 32. excl. sp. Cass.opnsc. a. /; i5a. (cxcl. exLess.syn. Jt'illd.) Less, in Vmncea 1830. ^ 10 syn.p. 404• — Cbabricaj sp. Spreng. — Leuccu.u sp. Don

Cnpitulum mulliflorum homogamum radialiforme." InvoJ/campam. lntnm*, squamis ohlongis stridè duplice serie dispositis Sed aequalibus ct seriensi unicanj priinâ f'rone sjmulantibus. i\cccept. totum cjialea-r;eum. Cor. omne*: glabrai liermaphr. biiabiala? : disci lob. ext. ^)-den-talo inler. bipartilo lobis sajpe' subconcretis t radii la bio ext. ligulae-ibrnii revoluto 3-dentaro, inter, minorc bipartilo. Anlh. basi bisclosae , apice appendiculatiu. Achaeninm ovalo-rylindraccum erostrc papilloso-pilomluin.ftipptip i-serialis, paleis iiabi in anmilum subcncretis aequa-liluiFsubphmiosis. — Herbre Austr.-Amricanae subacaulcs aul caules-rencrs. Folia pinnaliscta , scgmentis uUinque 6-9 parvis ol)tusò el i;rossè dentalis.—Notncn Chnbrase rclinui non lanLuni ob jus prion-Ínlis, sed quia Lasiorhiza⁴ nomen unirse S]>eciei convenit et imò sensu slricto falsum.

Socl. 1. LASIORHIZA.

~~Ma~~; calpnnnlatnnj, squamis obtnsiusculis. — ITerbac ;u:aules, scapis i-c>j>lit* lis foliis ra^icalibus.

~~Ma~~ nišeï & Annaliunn pxem*plarrbus^ic»u grif oponon JBertolunLc atipe p»r iu pressione^ of trinab> S].ipi tɔɔpius liomoMymurn tune < vul^atftm

1. C. rum'CREJw (DC. ann. mas. 19. p. 65. t. 5. inem. la»). p. 13. t. 3), acaulis, collo scapo et petiolo foliorum lanuginosus, segmentis utrimque 6-7 distauli-lins. *2 ad fietu 111 Magellanica. Perdiriium purpum' Vanl .V hafn. 1. p. 9. Willd. sp. 3. p. 2117. Lasiorhiza purpurea Less, in linncea i83o. p. 11. Ligulae 11. ext. purpureae. (v. a.)
2. C. CANDIDISSIMA, acaulis niveo-lanata, foliis Jnciso-pirinatifldis, lobis oval-oblongis acutis integeminis, scapo nudiusculo i-cephalo. If in Andinm Mendo-zianarum valle delos Ciegos. Leuceria randidi'sima Gill. et Don phil. mag. i832. p. 389. et in Guill. arch. 2. p. 4G4. Proxiua C. pnrpnrea: ex Hook, et Am. corap. 1. p. 36. ,
3. C. SCROBICITLATA, acanlis virens, foliis piolund' pinuatifidis, lobis Iiilobisde-ensatb-irabricatis scapo subnudo i-crbalo. If i» Audibus Chilensis ad la Cuesta dellnga. Leuceria scrobicnlata Gill. et Don 11. re. Hook, et Arn.comp. 1. p. 36.
4. C. GLADRA (DC. in Dpless. ic. sel. 4. '89), aeanlj'. uraliqtieglabra, segmen!is foliorum utrinque 9-10 approximatis. If, in Andibus omtiibns verisim. Chifensibus observavit. Née. Lignx ex siceo videnlnr alba? Onminò irfert iconetn J36. Humb. et Bompl. pi. cquin. sed in meà pappus evidente^ plumosos. (v. s.)

Sect. 11. MACLOVIA.

Invol. turbinatnm, sqnaiuis aenminatis. — Canlis foliosus i-cepbals. Invol valde lanuginosra.

5. C. suÁVEOLrNS, tola praeserlim ad apicem lannginosa, raule fciuplici folio. so l-cepbalo, foliis pionari partitis, infer. petiolatis;snper. sessilibus seniaainplrxl caulinibus, lobis subrotundis integris, invol. srjuarais snblineaibus lauá imincisis. — in insulis M&clovianis sea Falklandianis legit rl. d'UrviHe. Ticris Maclo-viana d'Urv.! olim. pi. ex». Periicum suaveolens d'Urv. fl. mal. (i8a5). 11. 77. LasiohizacptrachifoliaCass. diet. 43 (i825). p. 80. Less, in.limiae i83o. p. 11.
- 1 Lasiorhiza visensa Cass. diet. 43. p. 80. ab hac non differe videtur. Capitnhni teiniinale.longn'-i'adiatum diain. sesqnipollccia'. Lana ad apicem ranls siibi'i crassaticopiosissima, unflè invol.quasi iubturbinalnm. (v. s. exh-lSéoetConuu. a cl. d'Urville.)

[^]ect. in. LEUCERIOIDES. — LeuceriiT seel. Cassiopca Don trans, linn. soc. (i83o) 16. p. 215. nee D. Don (i834).

Tnyolnernm canipanalatmn, aqaamivoenminatis. — Herbae caule rarioio >o Jyceplulo. — Scilio caractere accedena ad Chatham, Sed babitn toto Lnceia-siroilliuia. ,

G. C. ROSEA (DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 90), caule ramoso pedanculisque piloso-glandulosus, foliis caulinis suprà piloso-glandnlosis sobtùs Jilbo-lanatis puinali-pnnitis, lobis distantibus oblongis arutis hinc indè clematis subrevolulis r.i pitnlis long^ pedunnili. itis solitariis, involuci hemispba^rici squamis lati'ceo latis glaudulosis, achaenii >eri-geo-Allosis. — in campis lapidosis alninis Chil anstral is ad Trpvnn-Lrmvu legit cl. Poeppig, ad Tagua^Tagoa cl. Bfirtn-. Chabri?). visoosa >ert,! herb. Perdicinin roseinu Pcepp.! e*?# n. 878. Lrffeoilii/ rosea Poepp.! coll. 3. n. 216. Leucheria runcinata Gill, et Don phil. mag. iS! • p. 389? Hook, et Arn. comp. 1. p. 35? (v. s. ex coll. Bert, et ftepp.)

7. C. CLANDULOSA fDon trans, linn. soc. 16. p. 217. sub Leatterfa), caolepcclun eulisque Miblannglnosis et piloso-glaudnlosis, foliis radicalibus en ea to-oblong is brevè petiolatis aentè sinnato-denijitii, caulinis remohùs dentatis, sammis amplexicanibus integerrimis tripartitis, capitnlispeduncalalis solitariis, imolucri soniislobosi lanuginosi et glaudnlosi squamis imioronnlati. (T) in.Chili ad Coquimbo. Leucboeria Cunimingii Hook, et Am. comp. 1. p. '36? (v. s.?)

H. C. oLaciAr.is (DC. in Deless. ic.ael. 4. t. 91), raulo lauuginoso pilo.sO-glapdn-losos panicnlató, foliis radialibns potiolati oblongis longe run oat is irrcgula^r¹.

, pinnatifidis subtus albo-lanatis supra arachnoideis, caulinis latèplexicaulibus acuminatis laceris supra glandulosis subtus albis, paniculâ polycephalâ, capitulis ad apicem^ Ptduncnli solitariis, invol. squuiuis linearibns acuminatis inaeqnalibus, bus extus glandulosis. — in Chili austr. montibus sum mis in latere raontis ignivomi Antuco alt. 8-S5uo ped. Perdicum glaciale Pcepp.! exs. n. g u. Lasiorhiza glacialis Pcepp.I coll. exs. 3. n. 317. Lest., syn. p. 4,07. Leuceria polchella Don trans, linn.sue. i6.p. 216? Floresciane Capitula ferè Laclucae perennis. (v. s.)

9. G. LITHOSPERMIFOLIA, caule lanuginoso elongato, foliis radicalibus..... caulinis sciniamplexicaulibus oblongo-lanceolatis acurainatissimis integerrimis subtus albo-lanatis supra arachnoideis, paniculae ramis valde elongatis apice 3-cephalis, involuci sublannginosi squamis obloiiigo-linearibus mucronatis. — in Chili auslr. pratis alpinis frigidissimis in Sierra Yelluda And. Anlucensi in alt. 7500 pcd. detexit cl. Poeppig. Perdichim lithospermifolium Poepp.! exs. n. 8^9. Lasiorhiza litbospermifoha Pcepp.! coll. 3. n. 2i5. Less. syn. 406. Ligulae ext. breves. Species distinctissima. (v. s.)
10. C. CINFREA, caule pilis glandulosis et lan& snbaraneosâ vestito, foliis petiolatis pinnatifidis subtus dense, supra leviiis lanalis, lobis &ubrotundis planis dentatis caulinis basi dilatatis latè auiplexicaulibus, capitulis 3-5 pedunculatis, invol. globosi squuiuis elliptico-oblongis mucronolatis. (*T*) in aridis arenosis ad nrbcn Conceptionis, nee <x Peruvia(i). Leuceria cinerea Don trans. linn. soc. i830. p. 21. ^Lasiorhiza cinerea Less. syn. 4o4- Leuchoeria Gilliesii Hook, et Arn. corap. 1. p. 35? Leuchau-ia hieracioides Gill, et Don phil. mag. i83a. p. 38g? non Cass. Cor. rubicunda?. Capitula ferè Senecionis elegantis. (v. s. ex h. Donibey commi. à mus. reg. par.)
11. C. TOMENTOSA, caule adpressè lanato pilos glandulosos panceissimos gerente, foliis subtus albo-tomentosis superne araneosis pinuntiparilis lobis dentatis acuiis, infer, peliolatis, super, aemiamplexicaulibus, capitulis 3-5 cainpanulatis, invol. squamis apice glabriuscalis scariosis fu^co-purpurascens tibus acutis. (D? in Chili arenosis maritimis ad Concon (Pcepp.!), el "Valparaiso (Bert.!). Honiceanibus tomenlosus Pocpp.! exs. n. 162. *Lasiorhiza tomentosa Less, iu linna*a i830.p. 12. Lencheria ISridgcsii Hook, et Arn. comp. 1. p. 36? (v. s.)
- i'. C. Biui/riFiDA., hinc indè lannginosa et glanduli sub sessilibus in canleraois petiolis involvrisque instrnota, caule ramosissimo, foliis pinuatisectis, segmentis pinnatiidis lobulis angustis sacpè dentatis, invol. campanulato. — in Patagonia ad I'ortnin Desideratum legit cl. Née. Species di&tinctissima Dauci aut Athamanthae foliis. Pappus niveus l-serialis plomoſus, (v. s.)

-j- *Species exclusae.*

C. ABBREVIATA Bert. = Lenceria senecioides ^.

C. ELONGATA J5ert. •= Lenceria senecioides a.

C. TENUIOR. Bert. = Louceria tennis.

* *Pappo piloso scabro aut integerrimo.*

DCCLXII. CL/IRIO\$EA *Lag** diss. ined. f8o8. DC. mem. mus. 19.7? 4s. t. 3. f. 2. mem. lab. p: j. t. 3. Don trans, linn. soc. 16. p. 204 non Cass. — Clariana Spreng. syst. n. 2747. — Pereziae sp. *Lag. amccn.* l.p. 3t non Lex. — Perezia et Diozia Cass. opusc. 2. p., 164. i65. et 170 — Pereziae sect, a et6 Less. syn. 410. — Chaetantliera H. B. et Kunth non alior. — Perdicii sp. VahL

Capitulum multiflorum homogamum. Invol. hi- triseriale, squamis insequalibus aut acqualibus, calyculatis aul irnbricatis, ext. spinuloso-

(1) Stirpes herb. Domb. nullam gerunt loci natalis indioationem, sed cum iter fecerit comit. Ruiz et Pavoa, ferè omnino cerium est plautam suam rircà Conreptionia urbem leg s c.

dentalis, internis integris niembranaccis. Recept. nudum glabrum. Cor. bilabiate, lab. ext. 5-dentato in radio ligulaefonni, iot. bipartito lobis linearibus saepè cirrhiformibus. Anth. basi bisetac apice appendiculataj. Filam. glabra. Stylus filiformis, ram 15 lineari-canaliculalis tincialis subrevolntis. Aclaeonium erostrc oblongum papilloso-pilosulum aul sericeo-villosum. Pappus persistens pilosus, selis biserialibus scabris. — Herbae perennes. Folia varia. Capitula terrinalia solitaria. Flores rubri seu albi.

Seel. 1. CLARIONELLA. —Perezia *Lag. amcen.* 1. p. 3i. *Less, in linn.* 1830. p. 23. *nonalior.*

Invol. 2-3-seriale non ver\$ imbricatunr, sqaamis ext. laxis aat calyculatis. Ligulae floram ext. longiores e't radium simnantes.

1. C. MAGBLLA-NICA (DC. mem. mus. 1. c. t. 3), foliis radicalibus pinnalip. nrtitis, lobis integris ciliolatis ovatis, teriniali subrotundo, canle bacapiformi a-3-folio piloso-glanduloso, involncri biserialis squamis exterioibus brevibus patulis, * flor. exr. longè radiantibas. % ad fretain Magclnnicuiu. Perdlcimu Maqellanicnm Liua. f. suppl. 37G. Yahl act. soc. hafn. 1. p. 10. 1. 4. Perezia Mugellanica *Lag. amcen.* 1. p. 3i. Cass. opusc. 2. p. 164. Flores albidi. (v. s.)

Sect. 11. DROZIA *Less, in limited* 1830. p. 20. *sjn.* p. ^ 10.

* *Drozia Cass. opusc.* 2. p. 170.

Invol. verius imbricatum, sqnamis spiuoso-mucronalis, exterioribus spinoso-dentatis foliaceis Snbpatulis. riorum exter. labia extims non scnsim radianfa.

1. C. PILIFERA (*Don phil. mag.* 1833. p. 388. et in *Guill. arch.* 2. p. 463), caule brevissimo i-coph>'ilo, foliis snbradicalibns pinnatisectis glabris rigidolis, lobis lanceolatis indivibis aut bilobis seta eloogutà Irrminatis, petiulo la to setis cilia to , invol. cylindrici squamis margine scariosis. in set am product is. Ifj in excelsis Audi bus Chilensiui [Gay!], ad Ceiro de la Polcare in Andib. Jtfemlo-^ianis (Gill, in Hook, et Am. oonip. I. p. 4C4). Herba uitidula 1-2 pollic. dense foliata. (v. s. comm. à cl. C. Hay.)
- 3.* C. VIREKS (*Don trans, linn. soc.* 16. p. 208), caule prostraio, ramo florid. brevi adscendenli*, foliis sobradicalibus confertis sessilibus rigidulis pinnati partilis, lobis ovalibus integerrimis mucronato-spinnlosis ad iu. irgincs&cabridi», Involncri a 3-seifalis> sqnamis exter. rigidis scmlpatnis serrato-spiuosii.. % u| Chib, vensem. ad monies exceUoj., Comntisita aff. Cbcetanberae Pcepp.! exs. n. 25. Perezia Pceppigii *Less. syn.* 411. Péezia virens Hook, et Arn. comp. 1 p. 34. Heibae a-i-poll. Capuulnm 9-10 lin. longum. Acbaniuin villoso-sublnV satnni. (v. s.)
4. C. rKDicuLAKiFOMA (DC. in *Delcss. ic. sel. 4, t. 97*), foliis radicalibus pinnatipartitis, lobis appoximalis oblongis subincisis incianris rt apice arktalf-spinulosis, caule scapiformi bifolio foliisque glajiduloijs, involucro Liseriali serici exteruae sqnamis pectinatis. %, in Chili austr. berbioUi alpinis ad Pico ls> Pilque in Andib. Antucensibus legit cl. Poeppig. Perditium pedicularifoliun. Pcepp.! exs. n. 824. Perezia pedicularifolia *Less. syn.* /,io. 1^pn.! coll. 3 n. 210. Caulis semipedalis. Capiulom paulò minùs ra4iaus quam C. Mage'll.: nicae. Acbaenia sericeo-villosa. (v. s.)
5. C. CIMARIS (*Don inss. ex Hook, et Arn.*), glabra, <-anle erecro snbramosc foliis lanceolatis mucrone acutuinatis uiembranaceis margine setulis spinulo. ciliatis, caulinis amplexicailibos, radicalibus peiiolatis, rainii i-cephalps, ii-, vol. squamis exterioibus ciliatis intimis latè seariosis. — in Chili sed 10LM- propr. ign. Perezia ciliaris Hook, et Am. comp. lt p. 34. f, s. ex h. Donibc- à mns. reg. par. comm.)
6. C. CIRTHAMOIDES (*Don pbil. mag.* 1832. p.328. et in *Gaill. arch.* 2. p. 464,

- caule eret' to ant adscendente folioso* glabro , foliis radicalibus petiolata pinnatipar'luis, lohis ov.itis spipaloso-seiratis, caulinis periolaris sessilibnsvc indivisis pinuatiidisve spinuloso-serratis, invol. imbricato, squamis exter, spinn-lososerratis , interioribus margine inembranaceis apice mucrona'tis. % in Cibili ad Cordilleia del l'lam-litm legit cl. Nét', ia Aiidibū & circa Mendoza (Gill.) et la Laguna (Rridg.) DC. in Deless. ic. sel. 4. t.(.)>. Perezii* carthamoides Hook. ft Am. com p. i< p. j₄. Herba 5-6 poll. longJi, latē viiens. Invol. varia nempe squamulsserralis pluriinis aut panicissimis. Rewpt. tuberculatui glabrum. (v. s.)
7. G. RUNCINATA. (Lag. in Don. Iraus. linn. soc. 16. p. 207), caiulice brevi lato , ramo elongato scapiforme scabro foliis æquali , foliis radicalibus spathulato-oblongis runcinato-pinnatifidis, lobis rotundatis spinoso-serratis undulatis, involuero polyphyllo imbricato , squamis integerimis prugenti-mucronatis. If in Mexico. Acliincia elongata papilloiO-muricata. An hujus, generis ? snb sect. suā Palest. eabet cl. Don.
8. C. ruNGENs, canle erecio foliosb., foliis radicalibus oblongis basi angustatis, canlinis iemiamplexicaulibus, omnibus deutato-ciliatis ipinulosisque, supra glablis bubliis glanduloso-scabris, involuci squamii. plcrisqae plus minus spinuloso-serratis. If, in montibus ignivoinis Qnitensiui. Chaelautbera pnngens H. et BouplM pi. eq. 146. t. 127. Homanthis pungens H. B. et Kunili nov. "gtai. am. p. I'S. Hoinoianhus pungens DC. mem. lab. t. 3. f. 5. Cass. opusc. I. p. 167. Perezia pnngens Less, in linnaea iS3o. p. 20. byn. p. 410. Recept. 'lburn tuberculiliu. Lignke paìuru.radiantes. (v. s.)
9. C. riNN\TiFinA., acaulis, foliis radicilibns pecfinato-pinnatifidis, petiolo lato labro , lobib approximates ovali-ublongis setoso-ciliatis, scupo bifolio vix folia æquante, involucti oblongi squamis exterioribus dentato-spinosis, inter. membranaceis. If in montanis frigidis Qnitensiui (H. B.), circa Pasco (Hook.). Chætanthera pinnatifida H. et Bonpl. pl. equin. 2. p. 170. t. 136. Homanthis 'pinnatifl(his If. B. et KnntL nov. gen. 4. add. p. 308» Homoiantbus pinnatifidus Don trans, linu. soc. 16. p. 209. Drozia monocephala Cass. opusc. 2. p. 179f.(v.b.)
10. C. DICCPBALA, caule erecto glabro simplici apie bifido 2-cephalo , foliis radicalibus petiolatis ellipticis sinuato-crenatis spinuloso-ciliatis, caulinis semiamplexicaulibus oblongo-lanceolatis inæqualiter et acutè sinuato-dentatis, invol. squamis margine mombranarcii, exterioribus ciliato- et spinulosdklentatis. — patr. ign.-Drozia dicepliala Cass. opusc. 2. p. 170. Perezia diccpbala Less. 1. c.

J' Speeds exclusce.

C. GLABERRIMA Cass. = Homoiantms Magellanicus.

(1). LACTUCIDE3 Don. =z HomoiaulhusMagellanicus.

C. POLYCEPHALA Cass. = Homoiantbus lualtflorens.

G. ttcuRVAT* Hun — Honioiauthus eobinuiatus.

<. sniii-ji Homoiantbus viscosus.

MX.LX.UI. PUREZIA DC. /ton Lag. — X'creim sp. Less.

Capil. imiltiflorum honiogamum. Invol. turbinatum, squamis omnibus siccis integerrimis laiccolato-Hncaribus acuniaatis exude imbricatis gradiilm ab exler. ad iuter. eloiii^alis. Recept. nudum vix ac nc vix subpubcscens. Cor. et sty), ut in Clarioquea et Ilomoiantho. Achaeium teretiusculn crostrc parç glandnoso-pilosulum. Pappus bisezialis pilosus coloralus scaber. ^-Herbae Chilenses^ PrenanLlis aut Lactucae facie, erctae glabr»scsqtipedales. Folia pinnatipartila, radicalia petiolata , cauliua amplevicaulia, lobis am[ilis ovalis, sinuato-dentalis, lontibus spinuloso-aristatis. Capitula paniculata longepedicellata.

i. P, pjiEjfANuoIDea (Less. syu. 4ocj), gltbra, caule.erecto folioso, foliis radica-

ibus peliolatis, caulinis babiattennatis aurito-semiaTuplexu-anlibus, pinnium Iobis ovalis sinualb-den^atis, infeioribus minoribqs subiutegris snhrontiguis, panicnlse pauciilorae ramulis velutinis, capitulis erectis circ. 16-lloris, iavol. basi obtusiusculi sqnamis glafcriimcnlis omnibus integerrimis — in Chili anstral. Andibas valle de Quilai-Leuva in And. Antuceus. (Poepp.). Pepridium prenanthoides Poepp.! pi. exs. n. 896. Perezia-jirenarithoides PoeppJ .coll. 3-u. 14. Pappus violacco-purpureus. (v. s.)

2. P. NUTAWS (Less. syn. 409) i glaberrima , canle erecto subnndo, follis ratic.i-libus subpetiolatis lyrato-pinnatipartilis, Iobis ovatis sinuutis spinulosodentatis , infer, minoribus siibtrian^nlaribus dibtincls, caulinii spinulo.>o-peutinatis ainplexicaulibus paryjs remotis, panicnlx laxé pauicubrye raiuis glabris, capitulis nulaniibus cylindracpo-turbia.'itis i2-i5 iloris. 1C in Chili ant>tr. sylvl s'ombrosis subalpinis ad Mfseta de Antuco legit cl. Pceppig. Pridioiuia nntan. Poepp.! exs. n. 8Q6. Precioza nutans Poepp.! coll. 3. 11. 214. Kami paniculaj glabri. Pappus lufescens involucre brevior. (v. &)
3. P. GAYAN (DC. in Deless. ic. sel. 4. t1 94)', {jlaherrima, cuule crcto subnudo, foliis radicalibus petiolatlis lyrato-pinnatipaitilis ri^idalis, Iobis avails sinuatis spino&o-dentatis, infer, paucis remoris piui^atipartiris, pauoulx laxx* lamis glabris, capitnlis campanulato- turbinatis erectiuscolis '25-30-iJori> % in excelsioribus Cbilensium Andibus Ifgit cl. C. Gay. Stirps rara inloiu duas sp. prioies media! (v. s.)

* Species excluscv.

- P. BECKII H. et Arn. = Hoinoianthns lineaiis.
 P.^CARTHMOIDES H>let Am. r=Clarionea carthamoidcs
 P. CILIARIS H. er Arn. = Claiionea ciliaris.
 P. CUBATAKNIS Less, ss? Hoinoianthns Cubataensis.
 P. DICEPHALA Leas, m Clarionea dicephala.
 P. DON 1 AN A. Less. = Hoinoianthns echinalatu.s.
 P.*FRUTICOSA Lallav. r= Acourtia forraosa.
 P. LACTUCOIDES Less. = Horhoi.'intbus Magellauions.
 P. ii^vis Less. = Homoianthus laevis.
 'V*V»*ABifl Le^3. = Homoianthus linearis.
 P. ^AGELLA^^A Lag. = Clariouea Magdlania.
 P. MOSCHATA Lallav. ==:Acoartia? moscaba.
 P. MULTIFLORA Less. =^Hoinoianihus multiilorus.
 P.-OCBHOLEUCA L^ss. = Trixis ochroleoca.
 P. pEDICULARIFOLIA Poepp. is Clariouea pedicularifolia.
 P. PDNGIENI. Lens. = Claiionea pungens.
 V. PoErpiGii Less, rz Clarionea vireus.
 P. RECURVATA Less. == llomoianhub echinulatus.
 P. SPATHULATA Hook, et Arn. = Homoiar.tbns viscossas
 P. sqejLRROSA. Less. ==: Homctiautbns squariosus.
 P. TURBINATA Lallav. = Acoartia ? turbiuata.
 P. VIRLNIS H. ct Am. = Clarionea virens.
 P. VISCOsa Less. == Homoianthus viscossas.

CCCLXIV. HOMOIANTHUS DC. mem. mus. 19.^ G5.f. 12./. 8.—Isaatlios DC. in herb. Humb. non Michx. — Homceauthus Spreng. syst. 3. p. 503. — Peiv/ia* set. 1. 2 et 5. Less. syn. 411. — Homanthis sp. Kimtk. — Gluriouea Coss. opine. a. p. 165 non alior. —Scolymanthus, TFilid, herb.

Capitulum multiflorum hortiogamum. Invol. 2-5-serialc, s{uaiiiis

ext. ibliaccis subdcnatis, inter. subimbricatis integerrimis. Récept. piloso-fimbrillifenum. Cor. hilabiatac, labio ext. 5-dentato plus minus ligulacformi, inter, bipartite) lobis linearibus saepè cirrhiibrmibus. Anth. basi bisclosae. Styli rami apice truncati puberuli. Achaenia villosa-scricea. Pappi sciu pluriserialcs scabre. —Herbaj imâ basi saepè suftWiliculos;c. Fulig. ulterua, infer, saepe 'peliolala, gl a bra aut rigidè scabra auL ciliatn. Capit. Jerniiualia. Cor. 'saepè coerulescentes.

Sect. i. HOMANTHIS.—*'Homoeanthus Less, in linnced 1830. p. 15.*

In vol. squama; exter. spinoso-dentata? aut apice roucronato-spinosa?

- i. *H. affCTiFLORus* (Don trans, linn. aoc. 16. p. 211), oauleerecto foliosopilosinsculo, foliis amplezicanliiins oblongis siuoato-dciitatis dentibus upice spinulosis, capitnhs terminalibrt'i coryrabao-conglonieratis, iuvolucri squaruis 2-3-seriatis xqialibm iiifgerriuiis, ext. apice spinnoso-inacronaiis. (jin soopulosis inbntis Antiana, in frigidis prov. Cantae, Tarina3,Huanaci, etc. DC. aim. mus. 1. c. t. 3. f. 6. Perezia mnltiflora Less. I.e. p. 19. Scolymanthns enicoides Willd. heib. ex Less. Chictanbera niultiflora H. el lionpl! pi. eq. 2. p. 168. t. 135. Hoiuantkis uiuliiAurns H. B. et Kunlh nov. geu. am. 4- p. *» Clarionea polycepliala Cass. opusc. 2. p. i(7- Hoaeanibns niulliflorns Spreng. 6yst. 3. p. 503. Pappus biibrufescens. Recept. hirsulo-/iuibi/illiferuni. Aeliaeniura hirsutibsiuiuin. (v. s.)
2. *H. CUBATAENSIS* (Less. in herb. mus. reg. berol.), canle erecto folioso hinc indè glandulosi, foliis amplexicanibus lanceolatis sublùs glabris suprà vix pilosiusculis distanter serratis, serratoris et apice aristato-spinulosis, capitulis subpaniculatis, iuvolucri ~~sub~~serialibns subequalibns integrum-nuns, ext. apice aristato-mucronatis.—in Brasilia moridionali ad Sanlaudo Cubatao. Perezia Cubataensis Less, in liunaea i"30. p. 10. Pappus rnfeseus. Acbasriu scriceovillosa. (v. t.).
3. *H. JJEVIS*, canle simffici hispido-pubrscenip apice ramoso polycepLalo, foliis lasvibns laberrimis oLlongo ovatis, sinnato-deutatis, infer, brevè peijolaiis, sninmis seniampKxicnulibii, ramis iuiorescenliaj folia superantibns, involucrisqtiaiDisintegeiTjmis, inlimis acuminatis. If in Brasiliâ. Perezia laevis Less. in linn. 1830. p. 18. syn. p. 409.
4. *H. viscoses*, glaber,cauleereclo subnndo laudalouo,foliis radii-alibus oblongo-ouncatis obtusè sinuatis acutis snbglaiidnlosis, canlinis sessilibns, involucri squauix 1'serialis iutegerrirais hubasqualibns mucronulntis, ovarii villossissimis. % iuChili auslr. pralis subalpinis ad Aleseta d« Autacolegit cl. Peppigin prov. Valdivia (Bridg.). Perdicitum visoo&quin Poccpp.! exs: n. 772. Perezia viscosa Less. syn. 408. Perezia spalhnata Hook, et Arn. comp. 1. p. 33. CUunonia spathulata Lag. in Don-trans. lian. soc. 16. p. 205. Herba scsquai- ai? bipedalis. Ovaria villoso. Recejt. piloso-fimbrillifeLum. J'appub rafcbcenb. (v. s.)
5. *H. SUXRROSUS*, oiiule erecto glandnloso-piloso folioso polycepbalo, foliis glabris lucidis, radicalibus basi attenuatis serratis apice sublanceolatis tñnerviis pinnatifidis, dtfttibns arislatis, caulinis semiamplexicanibus, capitnlis pedunculatis, involucii squamis sub- 3-beialisiregulaiiteriibucuUs, exctr. margine dentato-subspJnulohis.— ad Buenos-Ayres. Perdicimm aqnarrosmn \abl act. soc. li. n. liafn, 1. p. 11. t. 6. Perezia <quarro>a Less, in liunaeà »830. p. 15. H. anibignus Cass. opusc. 2. p. 167. Mfdins ex cl. Cass. inter Clarioneaj et Hoiuoiantbos suos. Certè nobis Hoinoianhi species ob recept. piloso-fimbriliferuni.

Sect. 11. STEPTOPHYLLUM Less, syn. p. 412.

Snvoloci squamaj rigidè et regulariter ciliat. Te lineares nintseriales.

6. *H. LIN EAR* is, caule erecto siuplici i-cephalo aut ramis folioMs monocepbalis, foliis coriaceis linearibus acutis glabris uiargine regolariter et rigidè dliatis,

infiniis conferris patnlis, superioribns sparsis crectinsenlis, involncri sqnamis 3-4-seriatis imbricatis, exter. brevioribus more foliornm ciliatis, intimis margine membranaceis. % in Chili anstr. campis lupidosis et rupestribus convallis Antucensis legit cl. Poeppig. Perdicium recnrvatum Pcepp.! pi. ess. n. 767. Perezia linearis Less. syn. 41Q. Pcepp.! coll. 3. n. 211. Recept. mintus pilosum qnām in sequeute sed certe pilosum et ab eo habitu non separandns. An Perezia Beckii in orā Patagonia; orientali à cl. Eights lecta et in Hook, el Aru. comp. x.p. 34. descr., ab hoc diversa? (v. s.)

7. H. ECHINULATUS (Cass. diet. 38. p. 458), caule erecto aut adscendente tereti glabro dense folioso, foliis coriaceis basi dilatata semiamplexicaulibas linearibns subrecurvisechinulatis, pedunculo subnudo i-cephalo, involucrisquam 3-seriatis oblongo-linearibus, exter. spinuloso-ciliatis, inter, margine membranaceis. % in insulis Maclovianis legerunt cl. d'Urville et Gaudichaud, el forte ad fretum Magellanicum Commerson. Perdicium recurvatum Vahl act. »» h. n. hafn. 1. p. 13. t. 7. d'Urv. fl. mal. p. 43. Gaud.! fl. roal. p. 15 non Don nee Poepp. Chaetanthera recurvata Spreng. syst. 3. p. 503. Perezia recurvata Less. in linnaea 1830. p. 21. syn. 412. Flores ampli ccerulei odorati. Recept. dense pilosum. Perezia Doniana Less. syn. qnae est Clarionea recarvata Don trans. linn. soc. 16. p. 206 ab hac forte nondiffert? (v. s.)

Sect. in. CLABIONOIDES. — *Clarionea* Less, *in linnccd* 1830. *p. "22**
syn. 413. non DC.

Involuci paaciserialis squamae integerrimae inermes. Caules simplices. Folia -iegra.

8. H. MAGELLANICUS, glaberrimns, caule simplici erecto polyphyllo i-cephalo, foliis integerrimis, radicalibus petiobtus lanceolatis, canlinissemiaplexicaulibus cordato-sagittatis oblongo-lanceolatis, invol. squamis 3-seriatis laxè imbricatis ovatis acuminatis margine tenuiter denticulato-firahriatis. — ad fretum Magellanicum. Aster Magellanicas Lam. ill. t. 681. f. 3. Perdicium lactneoides Yahl act. soc. h. nat. hafn. p. 11. t. 5. Clarionea glaberrima Cass. opnsc. a. p. 165. Claronia lactneoides Donl. c. p. 206. Chatanhera Magellanica Spreng, jyst. 3. p. 503. Perezia lactneoides Less. 1. c. Recepf, finibrilloso-betaceum.

•j- *Species exclusae.*

- H. riNHATiFimis H. B. et Knuth. = Clarionea pinnatifida.
H. PUNGEKS H. B. et Knuth. = Clarionea pnngens.
H. TOMEHTOSUS Poëpp. =t Chabraca tomentosa.

DCCLXT. ACOURTIA Don trans, lin. soc. 16. p. 103. — Perezia Lallav. et Lex.
now. gen. rnex. 1. p. 25 non Cass.

Capitulum multi-(io-3o) fiorum liomogamum discoideum. Invol. turbinatum, squamis intlsplci serie imbricatis lanceolatis adpressis basi dilatata cum rachi articulatis deciduis! Recept. nudum. Flor. hermaphr. Cor. aequales bilabiatae, labio exter. iugulato 5-dentato, inter, bipartito lobis revolutis linearibus oblusis. Antb. appendicula linearis lanceolata cartilaginea, caudae simplices obtusae. Styli rami truncati apice papillosi. Achaenium teretiusculuni elongatum papilloso-scabrum. Pappus i-serialis, setis deciduis apice penicillatis. — Plantae fruticosae Mexicanae ramoss glaucae habitu Serratulae. Folia spinuloso-serrata cordata amplexicaulia, auriculis liberis nee adnatis. Capitula 5-iofasciculato-corymbosa. Involucra saepè sanguinea squamis ciliatis. Cor. purpureae aut roseae. Pappus niveus.—Genus ex Don affine Trixidi et ex Less, forte cuni Dumerilia conjugendum! à Trixide difTert pappo 1- nee biseriali,

à Dumcrlia capitulois turbinatis nee oblongis multi- nec 5-floris, achse-
nio non rostra lo , clc.

1. A. FORMOSA (Dou I. c), glaberriraa, foliis cordato-oblongis supernè ferelatio-
ribas, inferioribus subsinuatis, mocrone calloso terminatis, etiam sum mis spi-
nuloso-serrah's. If. in Mexico. Trixis corymbosa Moç. ic. fl. mex. ined. Perezia
fruiicosa Lallav. et Lex. nov. gen. mex. x. p. a6?(v. s. coram. a ol. Luc.
Alaman.)
2. A. RIGINA, glaberrima, foliis cordato-oblongis mucrone calloso terminatis,
inferioribus spinuloso-serratis, summis integrerimis. 3 in Mexici prov. Leoninā
ad occid. nrbis Guanaxuato legit cl. Mendez. Species elegans rigiditate iusignis.
Folia eleganter retioulata. Capitula circ. i5-flora. (v. s.)
3. A. HEBICLADA (DC. in Deless. ic. sel. 4-1. o,5), ramis pube brevi conferta vel-
tinis, foliis cordato-lanceolatis acuminatis spinnlososerratis reticulatis otrin-
que minutè glanduloso-scabridis, invol. turbinati squamis pabescentibus li-
nearibus acuminatis. J in Mexico. Empatorinm affine Mair.! herb, non H. B.
et Knnt. Perdiciam cordatum Moç. fl. mex. ic. ined.? Lallav. et Lex. uov.
gen. niex. I. p. 27?Rami et corolla: purpnrei. Folia rigida. Cor. circ. i5-ao
roseo-purpureaj. (v. s. comm. à cl. Alaiu. et Mairet.)
4. A. MINROCEPHATA, caale herbaceo? ramoso, ramis angnlatis pube glandalosa
subvelatinis, foliis oordato - amplexicanlibas ovatis acutis acutè dentatis
glandulosissnbtùs subpuberulis, cymbro thyrsoideo polycepbalo, invol. sqaa-
mis mucrone acuminatis dorso glandulos-puberulis. — in California le"itcl.
/Douglas. Piori sat affinis sed capitula triplò fere minora. (v. s. comm. ab^ohon.
aoc. bortic. loudin.)

† *Species non satis notice.*

5. A.? TURBIWATA, canleherbaceo glabro apice tricephalo, foliis amplexicanibus
coriaceo-ruembranaceis sinuato-dentatis, dentibns spinosis, invol. turbinato.
*2 in Mexici montibus propè "Vallisolum et la Jordana. Perezia tnrbinata
Lallav. et Lex. nov. veg. mex. i. p. aS. Cor. purpleo-violaceae.
6. A ? MOSCKATA, caule herbaceo simplici, foliis sessilibus subimbricatis ovatis
scarioso-inembranaceis reticulatis acutè serratis, thyrso oblongo conferto , in-
vol. oblongi squamis apice. reflexis. % in raontibus. Mexici Vallisolanis ubi
dicitur *Cola de Serra*. Perezia ? moscbata Lallav. et Lex. nov. veg. me.. i.
p.a6. Planta totaodorem fortissinmin moscbi s^rat. Cor. iniuvol.8-io\iolacesc.

DCCLXVI. DUMERILIA Less, in linneea 1830./>. i3./. -J₇ et 28. syn, p. 407.
non Lag. et DC. (1) nee Cass. (aj).

Capitulum 5-g-florum horaoffamum. Invol. imbricatum 5-seriale •
cyUndraceum, squamis siccis adpressis subciliatis plurincrvii, inter,
grndatim longioribus. Recept. cbractcolatum. Flor. hermaphr. Cor.
glabrs acqualiter hiJabiatiB, labio ext. latiore 5-deatato, int. 2-fido.
Antli. aluc breves caudatac inlegrae basi truncate. Styli rami apice
ovali puberuli. Achaenium rostratum papillosùm, disco epigyno mag no
nectario sLyiformi. Pappus i-serialis paleaceus longus aequalis, paJeis
liucaribus seirulalis.—Frutices inermes Mexican, ramis tcrelibus
puberulis. Folia cxstipulata subimbricato-conferta glandulosa scabra
reticuktla ovata semiainplexiqaulia, auriculis adnatis. Cajilula fascicu-
late brevè pedicellata. Cor. ^albidae. An satis ab Acourtia dlfert?

(1) Duuierilia Lag. dibb. et DC., seu Martrasia Lag. amccu. est Jungia Linn. f. ex
descriptioae pessimā uou recoguosceuda, sedex ejus herb, prubata.

(1) Dumerilia Cass. cst Juugie spec.

1. D. HUMBOLDTTI (Less. 1. c), capitulis 5-floris. />? in Mexico. Perdicin se-necioïdes Willd. herb. non. Less. Proustia Mexican a Don trans, linn. soc. 16. p. 301. ex Less. syn. Perdiclum Mexicanum herb. Sess. et Moç. ex Don.
- a. D. ALAMAH, capitalis 8-floris. \$ in Mexico. — Folia Miperiora 3 poll, longa, a ferè poll, lata irregulariter spinal oso-ser rat a. Achaenia matara sulcata rostrata puberula, juniora teretinscula. Pappus sordidè albidus. (v. s. comm. à cl. Luc. Alaman sub nomine Perdicii Mexican!).)

DCCLXVII. TRIXIS P. Browne jam. 3ia. JLag. amoocn. i.p. 35. DC. ann. mus. i\$-p. 66. Don trans, linn. soc. 16. p. 186. Less, in linne'a iS3o.p. 24. syn. p. 4i3 non Mitch. (1) nec Swartz (2). — Perdicii sp. Linn. Kujith.

Capitulum multiflorum homo^amum. Invol. i-a-serial, seriei internae aut unicae squamae **5-io** erectse, external (bracteae?) pauciores subpatulæ nunc subimbricantes nunc calyculata3, omnes integerriinae. Recept. piloso-fimbrilliferum aut glabrum. Flor. omnes hermaphr. Cor. bilabiate pilosiusculto, lab. ext. 3-dentato ligulaeformi in flor. **exter.** sublougiore, inter, bipartito lobis revolutis, junioribus sa3pè coadunalis. Antb. caudac integra?. Slyli rami semicylindrici truncati. Achacnia subteretia apice uttenuata aut breviter rostrata papilloso-scabra apice glabriusculta. Pappi setae capillaxes biscaliales scabra3. — **Fru-tices** aut herbsc. Folia allerna indivisa integerrima **aut** dentata. Captula saepius corymbosa. Corolla luteae aut albidae.

Sect. i. EUTRIXIS. — *Trixidis* sect. 2, 3 et 4- Less. syn. 414.

Receptacnum piloso-fimbrillifernm.

§. 1. Aplochlaente, *involutro nempè uniseriali*.

1. T. FARADOKA (Cass. opusc. 2. p. 160), canle fruticoso, ramis pnbe¢ibns, foliis sobpetiolatis ellipticis inaequaliter dentatis suprà glabriascnis snblùs pn-besceiiibus, capitulis corymbosis 7-floris, peduoculis bracteolatis, involucro 1-seriali S-phyllo. ^ in Peruvia. Acñxiumpapilloso-pilosnluin subattenuatum. Pappus griseo-rufescens. Cor. flava. (v. s. ex itin. Neuiano?)
2. T. NE^AHA, caule fruticoso, ramulis hirsuto-velutinis, foliis elliptico-oblongis basi in peliolum attenualis inregerrimis acntis suprà glabris sublùs pnbescentibus, capitulis corymbosis 5-floris, invol* 5-phyllo pubescenti-velutino basi bracteolis 7-1* hinc indè aucto, achaenii* papilloso-pilosulis. 5 in Amer. calid., verisim. in Peruvia legit cl. Née sed locus proprius ignotus. Folia sninma pollicem longa, 3-4 Hn. lata. Pappus pallidè ochraceus. (v. s. ex berb. Thibaud.)
3. T. CALYCIWA (Don trans, linn. soc. 16. p. 187), canle fro ticoso erècto, ramulis pilosis glandulosisqne, foliis petiolatis ovatxj-lanceolatis dentatis snbtis latnatis, capitalis laxè corymbosis, involuci sqnamis io snbrnlatis i-serialibos glandulosis flores snperantibus. j in Bahia Brasiliensium. Perdiciom calycinum Mart. ined. Achaenia asperè papillosa. Pappns cinereus. .
4. T. coRYMBOSA(Don trans, linn. soc. 16. p. 188), canle fmiticoso raiuosissiino, foliis petiolatis laneeolatij integeriimis pubeñlis, capitalis laxè corymbosis, peduncalis bracteolatis, involuori sqnamis 8 uniserialitis linear-lanceolatis acntis. ,£ in Mexico. Perdicium coryrobosum Sessé et Moç. ex Don nee ex ic. fl. mex. Flores lnlei 10-ia in involucro. Achaenia papillosa et glandulosa. Pappus flavescentis.

(1) Trixis Mitch. est Prowrpinaca.
(a) Trixis Sw. cst Bailleria.

§. 2. *Macrocllaenae*, *im>olucro nempe biseriali, squamis seriei extermi amplis foliaceis bracteiformibus seu invol. l-seriali bracteis 5-amplis obuallato*. — *Alcithoe sect. Trixidis Don trans, linn. soc. 16.p. igi.*

5. *T. LONGFOLIA* (Don trans, linn. soc. 16. p. 191), caule fruticoso, ramis sub-senecio-pubescentibus, foliis petiolatis lanceolatis acuminatis integrerrmis 1* vibus, corymb.s polycephalis foliosis, pedunculis bracteisque glandulosoTo!puI bescentibus; invol. vero S-phyllo 18-30-floro. fl in Mexico. Perdicium loiLi-folium Sesse et Moç. ex Don. Recept. copiosè villosnm. Pappus falvellus.

6. *T. BRACTEATA*, caule fruticoso, ramulis glanduloso-villosis, foliis oblone-lanceolatis utrinque attenuatis mucronatis integerrimis supra pubescentibus wibtis junioribus sericeo-villosis, capitulis pancis coryrabo&is, bracteis ovato-lanceolatis, invol. squamis dorso glandulosis apice ciliatis et ad apicem intus villosis flores superantibus. &> in America legit cl. *Nee sed locus prone* * * ' e .. (v. s. ex itin. Neaeano.)

7. *T. irvolucRATA* (Don trans, linn. soc. 16. p. i,3), caule fruticoso, ramis villosissimis, foliis confertis sessilibus ovato-lanceolatis integerrimis suberne glandibus pedicellatis copiosè ornatis subtus sericeo-vilosissimis, capitulis 4-5 coimbosis, involucr. glanduloso 8-phyllo, bracteis ovato-lanceolatis. * in Mexico. *El. anrei.* Recept. copiosè villosum. Pappus falvo-cinereus.

8. *V. " 1 ? ! ? 0 " , ? 1 1 " H°n.soc. ,6 p. I,3*, canlefraticoso erecto, ramis pilososcabr.s, folns oblongo-ovat.s acut.s longe decurrentibus denticulatis Scabri-mucronulatis, capitulis corymbosis, pedunculis glanduloso-nilosis, invol. VCr. 8-phyllo a4-floro. *If. in México. Corf aure**. Pappus m'J!

9. *T. DECDRRENS* (fl. mex. ic. ined.), caule suffruticoso? mnltiplid ramoso, foliis confertis ovato-lanceolatis brevè decurrentibus acmr' apice Darc tegris, capitulis terminalibus subsolitariis. *? in Mexici aeris Avan!?!~ Perdicium deenrrrens Sesse et Moç. fl. mex. mss. Coapati Hern. mex T'YrPV~ Cor. aureae. Invol. vernm 8-phylarn. Bractea? 5 ovato-lanceolata;" T'A? affinis videtur sed ex car. Dononio videtur distincta.

10. *T. MICHUVCA* (Lallav. et Lex. nor. yeg. 1. p. »8), resinoso-viscosa ranle herbaceo simplici tomentoso, foliis sessilibus ovatis pimctatis subtus capitulis in ihyrum ovato-oblongum disposes, invol. 8-phyllo, bra^S: 5 ovatis ainphatis. *If. in Mexico propè Vallisoleum. Cor. aurea!, Remt. iS! losnm.*

§. 3. *Vnonanthex, iwlucro biseriali, caulinbusfruticosis ramosis*. — *Trixis (stricto sensu) Less. syn. ^.* — *Prionanthes Schrank pi. rar. t.61.* — *Tenorea Bert. Colla nonalior. -a-Eutrixis Hook et ATT*f*

11. *T. CACALIOIDES* (Don trans. linn. soc. 16. p. 187), caule fruticoso erecto, ramulis hirsutis, foliis brevè petiolatis ellipticis subintegerrimis sericeis, capitulis fasciculato-corymbosis 5-7-floris, invol. squamis 5 lignatis 1-serialibus aut sub-calyculatis obtusis floribus brevioribus. *& in Peruvia in decl. Andium orientali. Perdicium cacalioides H. B. et Knuth nov. gen. am. 4. p. 154, i< frutescens var. denticulata Less. syn. 4₁₄.* Cor. lute* glabra* Acbania hirtolscabra An hujns, an prime divis.?

12. *T. FRUTESCENS* (P. Browne jam. 3i₂. t. 33. f. 1), caule fruticoso erecto raimuhs pubescentibus, foliis brevè petiolatis ovalibus lanceolatis utrinaue attenuatis membranaceis integerrimis aut iudè sinuato-dentatis, panicula polycephala foliosà erecta, invol. squamis subbiseriatis, serici internæ 7-8 oblongo-linearibus ciliatis erectis, externæ 1-3 subbracteiformibus parvis. *& in Jamaica, Sancto-Domingo, Sancta-Lucia, Sancta-Martha, Caracas, Mexico. Less.*

in linn. i830. p. 33. Perdiciam radicale Linn. ap. 1248. Lam. ill. t. 677. f. 2. Inula Trixis Linn, amoen. 5. p. 406. Tenorea Bertcrii Coll a hort. ripul p. iZf. Tenorea calyculata Bert.! herb. Prenanthes fruticosa Willd. herb. Floreslutei.

(v. s.)

\$. *angustifolia*, foliis anguste oblongo-lancolatis integerrimis glabris. jfr in Mexico, Cuba. Perdicium Havanense H. B. et Kunth nov. gen. 4. p. i55. Tr. Havanensis Spreng. syst. 3. p. 5oi. Tr. Mexicana Moç. ined. non Lex. Tr. laevigata Lag. a mem. 1. p. 35. Perdiciam laevigatum Berg. act. holm. 33. t. 7. p. 228. Lam. ill. t 671. f. 1. (v. s.)

y. *obtusifolia* (Less, in linnaea i831. p. 411), foliis integerrimis obtusis circ. pollicem latis, invol. glabratis. — in Mexico propè la Laguna (Don Less.) ad Matamoros (Berl!). Trixis glabra Don trans, lin. soc. 16. p. 297. (v. s.)

13. T. MOLLISSIMA (Don trans, linn. soc. 16. p. 299), caule fruticoso ramosissimo, ramis hirsutis, foliis petiolatis ovato-lanceolatis aenminatis serrulatis basi attenuatis suprà pubescentibus subtùs sericeo-villosis, paniculâ polycephalâ hirsutâ, invol. subbserialis 20-flori pubescenti-Lirsnti squamis 8-10 erectis vix acutis. 5 in Brasiliâ (Sellow!). Trixis flexaosa Less.! in linnaea i830. p. 32. non Spr. Folia 4 poll, longa, sesquipoll. lata. Petiolus 7-10 lin. longus. Cor. ex sicco flavae aut. ochroleucae miñi, albae Lessingio visas, (v. s. com in. à muñ. reg. berol.)

14. T. VAUTHIERI , caule fruticoso , ramis hirsutis, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinqueattenuatissimis suprà pubescentibus subtùs sericeo-villosis, paniculâ polycephalâ hirsutâ, capit. circ. 20-floris, invol. hirsuti bserialis squanis linearibus acumiatis. ?j in Brasilia; prov. M in arum Generarium ad Tejuco legit cl. Vauthier (pi. exs. n. 278!)* Affinis T. mollissitnae sed fol. angustiora (9-10 lin. lata et longiora), invol. squamae multò magis acuninatae et flores in invol. dimidiò pauciores. (v. s.)

15. T. DIVARICATA (Spreng. syst. 3. p. 5oi), caule suffruticoso scandente, ramis pilosiusculis diffusis, foliis sessilibus ovali-lanceolatis acuminatis denticulatis glabriusculis membranaceis, paniculâ virginea nntante polycephalâ, invol. aqua mis bserialibus acuminatis, seriei externae squamis 2-3 linearibus patulis, internac 7-8-lanceolato-linearibus per anthesin erectis. 5 i^Q Peruia et Brasiliâ Less, in linnaea i830. p. 3i.

4. *auriculata*, foliis basi in auriculas obtusa dilatatis. — in Peruia, ad prov. Jaen de Bracamoros, fortè in Brasiliâ. Perdicium divaricatum H. B. et Kunth nov. gen. am. 4. p. i55. t. 355. Trixis auriculata Hook. bot. mag. t. 2765. Grah. in Jam. journ. 1827. p. 178. Cacalia flexuosa Willd. herb, ex Leas. Trixis divaricata et Tr. salicifolia Don trans, lin. soc. 16. p. 190 et 298. Cor. dicuntur ajbae, au rectius ochrolenca ut jam innuit cl. Don 1. c. p. 24C. (v. s.)

(6. *exauriculata*, foliis sessilibus basi attenuatis nee auriculatis. j in Bahia sabulosis maiitimus leger. cl. Salzmann, Lund, Sellow, etc. in agro Qui-teusi (H. et ^B.) Caulis scandens. Paniculae race mi (virginei certe) penduli. Cor. pallide flavae ex Salzin. Prionanthes antimenorpha Schrank pi. rar. h. mon. 2. t. 5T.. Trixis flexuosa Spreng. syst. 3. p. 5oi. Perdicium flexu- sum H. B. et Kunth nov. gen. am. 4- P- T^5. An species propria? fv. s.)

16. T. AUGUSTIFOLIA, caule fruticoso erecto, foliis sessilibus linearibus margine revolutis integerrimis utrinque ramulisqoe birsuto-velutinis, capitulis paucis corymbosis breviter pedicellatis, invol. squamis linearibus acuminatis dorso pubescenti-velutinis. ^ in Mexici prov. Sancti-Ludovici de Potosi ad Cantoue de cerub. fl. legit cl. Berlandier! Folia 1 1/2 poll, longa, circ. 2 lata. Cor. loteae. Achxnia glanduloso-muricata teretia a pice rostrata rostro in tubam ferè apicc dilatato (v.s. ex itin. Berl. sub n. i353.)

17. T. OLIVINOSA (Don trans, linn. soc. 16. p. 189), caule fruticoso erecto, foliis sessilibus oblongis integerrimis coriaceis glnndnlosso-glutinosis subtùs Una tis, capitulis corymbosis, involucri multiflori squamis biscalibus linearis-lan-

- ceolatis coriaceis. ^ in Brasilia prov. Minas-Geraes. Perdicinm Brasiliense Mart, non Linn. Flores aarei. Recept. copiosè •illosam. Pappus albas. Pedauculi glanduloso-viscosi.
18. T. PAPILLOSA (Gill, et Don phil. mag. i832. p. 388. et in Gnil. arch. a. p. 463), glanduloso-pnbescens, foliis sessilibas lanceolatis macronatis integerim is, capitulis corymbosis bracteatis, iuvol. sqnamis lanceolatis acnrinatis. — in prov. Sancti-LndovicI et Mendoza philensium. Hook, et Am. com p. i. p. 33. Flores videnlur albi. ** *
19. T. DISCOLOR (Gill, et Don 11. cc), foliis lanceolatis acaminatis denticulatis snbtùs niveo-tomentosis, capitulis corymboso-paniculatis, invol. squamis linear-lanceolatis acaminatis. —ad la Porta de las Achiras prov. Sancti-Ludovic Chilensim. Hook, et Am. 1. c.
- ao. T. MEXICANA (Lallav. et Lex. nbv. veg. 1. p. 37), canle suffraticoso ramoso snpernè aialo, foliis lanceolatis integerrimis saprà nitidis subtùs tomentosis, capitalis corymbosis, invol. sqaamis seriei internse 8 erectis, extern® 5 linearibas pa tub's. £ in Mexici nrbe Vallisoleti adccenobium de Casamaluapan.-

§. 4« *Polyphyllae, invol. biseriali, caulibus ketbaceis ad inflorescenr**
tiam usque foliatis. —*Polyphyllon sect. Trixidis Less. sjrn. 4i3.*

51. T. VERBASCIFORMIS (Less.! in linnaeå i830. p. 29), canle herbaceo undiqne folioso alato apice folvo-tomentoso, foliis confertis elliptico-lanceolatissubcrenalatis ntrinqne acaminatis sessilibus aut decurrentibus saprà falvo-pilosis sub-tas tomentosis, capitulis in raceraain pyramidatam digestis, involucri subbisezialifi 10-flori villosi squamis internis 6-8 erectis, externis paucis sabbractiformibus. If. in Brasilia aequinoctialiet meridionali. Cor. flavae autpallidae. Pappus rufescens. Recept. pilosum. (v. s. comm. à mus. reg. berol.)
22. T. GLADERRIMA (Less. syii. 4x3), glaberrima, canle herbaceo nsque ad iaflorescentiam confertè foliato, ramulis paniculaj involucrisqae pubescenti-villosis. — in Brasiliâ.
23. T. PALLIDA (Less, in linnaeå i830. p. 30), caule herbaceo glabro parcè ramoso folioso, foliis confertis latè decurrentibus pilosis (adtilts saepè glabrls) subtùs glandulosis dentalatis ciliatis ovatis acatis, rncemis compositis, involacrl biserialis squamis cilia tis glandulosis, internis 5 oblongo-ellipticis, externis paucis brevibus ova tis acuminatis. — in Brasiliâ aequinoctiali. Pappus niveus. Rhi/oma lignosam.
- a4. T. MEGAPOTAMICA (Hook, et Am. comp. i. p. 33), caule herbaceo nsque ad inflorescentiam folioso birsuto-pubescente, foliis superioribus oblongo-lanceolatis mucronatis integenimis vel minatè denticulatis basi attenuatè decurrentibas velsubdecurrentibus utrinque hirsutè pabescentibus, capitulis 8-ra-floris, invol. biserialissquamis9-i3 conformibus linear-oblons^is sabacuminafis extùs sericeis, pappo rofescente. — in montibus prov. Rio-Grande Brasiliae. Racemns compositus.

§. 5. *Oligophyllae, involucTO biseriali, caulibus herbaceis simplicibus basi aut infernè-tantùm foliatis.* —*Oligophyllum sect. Trixidis Less. syn. 46.*

- a5. T. LESSINGII, caule herbaceo simplici, ramis floridis villoso-pubescentibas obvata longis, inferioribus incurvatis, superioribus nioribus remotioribusqne, involucri sub-1-seriati squamis linear-lanceolatis acuminatis subtùs villoso-pubescentibus deminim reflexis, exterioribus foliatis. If. in Brasiliy .rqniuociali. Perdiriuin Brasiliense quoruradam ,non Linn: **Trixis Brasilensis** Less, in linnxå i830. p. 26. (excl. syn.) Hook, et Am, comp. z. p. 33. xcl. »yn. DC
@. *aquatica*, foliis elongatis obovatQ-liaearibus. —cam priore.

16. T. STRICTA (Less.! in linnaeâ i830. p. 28), caule herbaceo tâmplici subnudo piloso-villoso T-3-cephalo, foliis radicalibus sessilibus scaphis integerrimis subrotuudo-ovatis glabris seu ad nervos pilosis, caulinis raris linearibus parvis, involucri Mibbiserialis squamis interioribus acuminatis, exieioribua ioliaceis. (D? in Campo Coloniâ Brasilia raeid. Onoseris stricta Spreng. syst. 3. p. 503. Cor. saltern in sicco llavae. (v. s. comni. à onus. reg. berol.)
27. T. LUNDII, caule'herbaceo basi sparsè piloso apice confertè et brevissimè ve-latio-glanduloso, foliis glabris, radicalibus oblongis basi atennatis acutè serratis, supernè sinuato subserratis, caulinis paucis semiarnplexicaulibns, paniculâ laxâ, pedicellis subebracteatis, invol. biserialis squamis ovali-oblongis mucronatis dorso subglandalosis, achaeniis serieeo-villo&issimis. *1f* in Brasiliâ inter Mugi et S. Panl, in sylvâ secndariâ novemb. fl. legit cl. Land. An genus proprium? (v. s.conim. à cl. inv.)

Sect. 11. CLEANTHES Less. syn. 4^13. — Cleanthes *Don trans, linn,*
soc. i830. p. 1Q4. — *Platycheilus* et *Holocheilus* Cass. — *Platycheilus* sect. *Pereziae* Less.

Receptaculum glabrom. Iuvolucr i-a-serialis sqnmae aeqaales. Acbyenia distinctiis 5-costata. — Herbae perennes habitu Hieracii. Canlis corymboso-polycephalus. Folia saepius indivisa, radfcalia maxima petiolata. Cor. flavae aat albae. Pappus cinerens.

28. T. BajLsiLiENSrs (DC. diss. lab. p: 9 non Less.), caule pilosissimo sticto angulato supernè ramoso subnudo, foliis radicalibus petiolatis palulis elliptico-oblongis subsinuatis calloso-dentatis, caulinis parvis linearibus sessilibus dentatis, involucri squatnis subuni&erialibus extùs hibpidulis lanceoiatis obtusis. % in Brasiliâ propè Rio Parde (Sell.), ad Buenos-Ayres (Gill.) Perdit-ium Brasiliense Linn. mant. u5. "Vabl act. soc. Hafd. 1. p. 12. Trixis oihonnoidqs Less. ! in lion. i830. p. 1^ Hook, et Arn. comp. p. 33. Trixis Sellowi^Less. ex pi. mas. Berol. Cacalia scabra"Vabl symb. 3. p. 92. Cleanthes Brasiliensis *Don trans, linn. soc. 16.*'p. 194. Leuceria echioides Gill, in *Don phil. mag.* i832. p. 38 et in Guill. arch. Flor. lutei. (v. s. mus. reg. berol.)
29. T. OCH&OLEUCA (Hook, et Arn. comp< 1. p. 33), caule simplici apice divis* subnudo, foliis seuiiamplexicaulibus rigidè pilosiusculis, infer, obovalo-snb-rotundis crenatis oalloso-dentatis. % ad Buenos-Ayres et in Audibus Mendo-zianis (Gill. Tw.), in tJraguay (Tweed.) Holocheilus ochroleucus Cass. bull, phil. 1818. p. 73. diet. 21. p. 306. Platycheilub ochroieucus Cass. op. pnyt. 2. p. i53 et i6i. Perezia ocroleuca Less.' in linna-a i830. p. 22. syn. 4i3. Leuceria conyzoides Don mss. Cor. ochxoleuca. Talde aphinis T. Brasiliensis ex" Hook, et Arn.
30. T. HihRA.cioiDEs(Donl. c. p. 197. snb Cleanthe), glabriuscula, caule subnudo, tenui, Atis ruficollis pPrinolat patus oblongo-ovaliatis repinulo-sinuatis, caulinis paucis parvis lineari-lanceolatis subanplexicaulibus, involucri squamis cuneato-lanceolatis acutis. *2f* in Brasiliâ. Cor. alba? A prioribus vix diversa ex Less. syu.
- 3i. T. PINNATIFIDA (Less.! in linneeâ i830. p. 29), hispido-pilosinscnla, canle simplici apice corymboso, foliis petiolatis runcinato-pinnalifilis, sammis oblongi, semi-amplexicaulibus, involucri squamis oblongo-obovatis obtusis ant arutis. % in Brasiliâ xquioctiali (S d qw!), ad Mugi das Cruxes prov. Sancti-Pauli in'locis homidis (Lnnd!). Cor. snlphnrex (Less.) alba? (Lund). (•. ».)

J. Species exclusoe.

T. ROSEA Pa'pp. = Leuceria andryaloides.

T. SEMECIOIDES Hookrr= Leuceria seneciooides.

DCCLXVIII. PJLEOCARPHUS *Don trans, linn. soc. 16. p. a<8. Less.syn.p. 417.*

Capitulum multiflorum homogamum. Invol. 3-seriale imbricatum, squamis lanceolatis acuminatis membranaceis, inter. majoribus. Recept. paleis lanceolatis carinatis margine scariosis onustum. Flor. hermaphr. Cor. bilabiata, al. labio rotundato 3-dentato, revoluta, int. bipartitum, lobis lanceolatis aculis revolutis. Filam. glabra. Anth. appendicula K-neari-lanceolata obtusa, caudal setiformes longaj simplices. Styli filiformis rami teretes obtusi revoluti minutè papillosi. Achaenia pentagona angusta pa pi 11 oso-seabra, disco dilatato. Pappus biserialis persistens, setis copiosissimis minutissimè scabris apice vix penicillatis. — Caulis fruticosus ramosus. Folia sessilia linearia margine revoluta cum ramis glandulatis pedicelatis induta, primaria basi appendicibus 2 stipulaeforinibus sublunatis acuta, ramea basi nuda attenuate. Capitula solitaria glandulosa. Cor. Iutea3. Pappus cinereus.

1. P. REvOLDThs (Don 1. c.). t) in Chili ad Coquimbo..

DCCLXIX. MOSCHARIA R. et Pav.prod.JLper.p. 103. Less, in Unnecd i830. p. Zg. syn. 417 non Heist, nee Forsk. —Moschifera Molin. chil. —Moiigia Sprng. syst. 3 n. 2889.—Gastrocarpha *Don trans. Unn. soc. 16.p. i3i.* —Moscaria Fers. enc. n. 1783.

Capitulum 12-16-florum a?qualiflorum. In vol. squamis 5-6 ovatis membranaceo-foliosisaequalibus. Recept. paleatum, paleis ex terio rib us 8 uniseriatis cucullatis foliaceis aequaliter exteriora sigillatim includentibus, caeteris linearis-lanceolatis scariosis apice i-3-cuspidatis. Flores Jermaphr. Cor. bilabiata, labio ext. liguliforme 5-dentato, extcr. bipartito revoluto. Filam. capillaria glffbra. Antherae basi bisetae apice appendicis linearis-lanceolata antherae longitudine terminate. Styli ranii liiieares compressi divergentes apice truncati hispiduli. Achaenia marginalia obovata dorso gibbosa *Lnevia*, disci 5-gona papillosa. Pappus omnium palceatus brvissimus, paleis i-sen'atis lancolatis mucronatis ciliatis. — Herba erecta ramosa virens glanduloso-villosa (ferè Sonchi facie) moscbum redolens. Folia inferiors pinnatisecta, media runcinata, superiora auriculalo-amplexicaulia; lobi lanceolati dentali. Capitula diffusè paniculata. FJores subrosti aut albi.

1. M. riNifATiFiDA (R. et Pav. «yst. 1. p. 136). (J) in Chili sylvaticis herbidis colliam ad Coquimbo, Talparuso, Qaillota, Rancagna, Corcdlen, etc. Gastrocarpha niocinata Don in Sweet brit. fl. gard. t. aag. Moscharia pinnatifida Lindl. hat. reg. t. i564. Mosi^ia pinnatifida Spreng. syst. 3. p. 661. (v. s. sp. contia. à cl. Bert, et Pcepp. et v. v. c. iu h. Geuev.)

DCCLXX. DOLICHLASIUM *Lag. in DC. diss. labial, p. 3. et in amccn. r. <. 4. Donphil. mag. 389 et in Guill: arch. a.p. 465.*

Capitulum multiflorum bomogamum discoideum ndc radiatiforme. Invol. squama* 5-scriales, serici exterua3 palula3 lancolatae, aliarum erecta; subxqualcs. Recept. iuberculatum fimbrioloso-pilosum. FJor. cxtcr. (in s;)ecimine cor. deciduis)..., disci hermapbr. Cor. longè tuhulosa? biniatse, lab.4xter. 5-dentato, int. bipartito revoluto. Antherae apice nppendice linearis longa ihstructa?, basi bicaudatae, caudis barbato-ciliatis. Stylus h'liformis, ramis 1 semicylindraceis apice obtusis penirilatis inclusis. Achsnium cylindraceum muricalo-bispidum graciapice

desinens in rostrum glabriuscum glandulis pedicellatis paucis instruct urn. Pappus setis scabris acqualibussubbiseriatis basi subconnexis. — Herba glabra glandulis sessilibus secūs caulem folia et invoj. instructa. Folia caulina petiolata pinnatipartita, lobis* ovato-lanceoJatis acutè 1-2-dentatis acutis, ultimis in lobuni trifidum contluenlibus. Capitula solitaria terminalia. Habitus ferè Pamphaleac cardaminefoliac, sed capitula multò majora, aefcaenia rostrata papposa, etc.

- i. D. GLAKDULIFERUM (Lag. ex Hook, et Am. com p. i. p. 34). *If in Chili ad Uspallata et Mendoza. D. Lagascae Gill .in Don 11. cc. (v. s. ex b.Née.)*

••* *Pappo nullo.*

DCCLXXI. PAMPHALEA *Lag. diss. in DC. ann. mus. 19./*. 68. mem. lab. p. 10. Less, in linn." 5. p. 8. syn.p. 400. — Panpbalea Lag. amosn. 1. p. 34- Cass. diet. \$7.p. 3^5.*

Capitulum 10-12-florum homogamum radiatum. Invol. suh cylindracum, squamis subbiseriatis oblongis acqualibusapicc mucronulatis tridentatis margine scariosis, basi bracteolis 5 cinctum. Recept. nudum. Cor. el a brae bilabiatus, ext. 3-dentato ligulaeformi, int. bipartito lobis interdiiin subconcrritis. Anth. in tubum curvulum concretae basi bise- tosae, appendiculā elongatā. Stylus basi lumen, ramissaepè irregulari- bus apice truncatis. Achaenium obovatum oblongumve erosivre pilo- siuscum. Pappus o ! — Hcrbae annuae glabrae aut parcè pilosae. Folia dentata aut pinnatisecta, radicalia aul caulina, alterna. Capitula termi- nalia parva. Flores albidi, nee flavi ut vult Cassini (qui flores in sicctf decoloratos semper flavos dicit.)

- i. P. COMMERSONH (Cass. bull, philom. 18x9. t. 111), radice (rhizoraate) tn- bero&a, foliis radicalibus longè petiolatis cordatis obtusis et obtusè .7-lobatis , canlinis sessilibus linearibus integer!imis. % ? in Monte-Tideo'et Brasiliā me- ndionali Less.I 1. c. Lapsana crassifolia 'Vabl in herb. Juss!. (v. s. comm. à mna. reg. berol.)
- ii. P. BDPLtDR IFOLIA (Le"- in linnaea x830. p. 8), radice fibrosa, foliis radica- hbo* confertis elongatis linear-lanceolatis integrē Trimis.— in Brasiliā meridio- nali.
3. P. HEIOPHYLIA (Less, in linn. i830. p. 8), radice fibrosa, foliis radicalibus brevè petiolatis cordatis mugronatis* snbdensfatis , canlinis sessilibns ovalis acuminalis profundè et acate lobatis (J) in Brasiliā. (v. s. comm. à mas. teg. berol.)
4. P. MAXIMA (Less, in linnaea i830. p. 9), radice fibrosa, foliis radicalibus petiolatis lyrato-pmnatisectis, lobo terminali integro, lateralibus bubrotundis, ramis inflorescentiae prxcipue soperioribus aspeis. — in Brasiliā meridionalis
5. P. CARDAMINKFOLIA (Less.! in linn. i830. p. 9), radice fibrosa, foliis radicalibus petiolatis, caulinis sessilibos, omnibus pinnatilobatis, lobis inferiorom ovato-triangnlaribos dentato-lobais , snperiorūm oblongis integris acutis. () in Brasiliā. Squama* invol. obscuriiis apice tridentatae. (v. s. comm. à maš. reg. berol.)

DCCLXXII. CEPHALOPAPPUS *JNeesct Mart. nov. act. nat. cur. 12. p. 1. p. 5. t. 1. Less, syn.p. 401.*

Capitulum multiflorum homogamum. Invol. squamae Sserialea oblong; u subaequales laxae- Recept. hernisphericum nudum papillosuiti glalirius- culum. Flor. hermaphrod. Cor. tubulosa incurva, limbo brevi bila-

biato, ext. 3-dentato, inter, subbreviore profundiis bifido. Anlh. basi aristatae. Stylus crassus apice bipartitus, obtusus. Achoenia oblongolanceolata subrostrata apice (locopaupi) tuberculo ovato duriusculo coronata. — Herba radice horizontali. Folia radicalia basi cuneata sursuum ovata dentata reticulata, suprà glabra, subtis ad coslam lanuginosa. Scapi lanuginosi apice parce ramosi 2-3-cephali. Ca pi tula longè pedunculata magn. Bellidis. Cor. fulvae. — Natura tuberculi dubia ! An nectarium iuflatum induratum ?

i. C. SONCHIFOLIUS (Nees et Mart. 1. c.). % in Brasiliâ ad flnm. Ilheos juxtâ vîain ad Minas Geraes tendentem. Spargabophorus sonchifolius Spreng. syst. 3. p. 458.

Subord. III. LIGULIFLORJE.

Flores omnes ligulati hermaphroditi, in capitulum radiatifforme hörnqgauium dispositi.

Trib. VIII. *CICHORACEM* VailL act. ac. par. 1721. fuss. gen. 168. *Don in edimb. phil. journ.* 1829./?. 3o5. et in limned i83i. *UtU p. xZQ.Lcss. syn.* 126. — *Lactuceae Adans. fam. i.p.* 111. *Cass. diet. v 20. p. 355. 9. 25. p. 59. 9. 48. p. 422. bull. phil.* 1821/A 188. *opusc. 3.p. i4-* — *Cichoreae Spreng. syst. 3.p. 365.* *Ledeb. Jl. alt. l.p. 125.* — *SemiQosculosae Town, inst, p, 4^7** — *Glossariphytum Neck. elem. 1. p. 44** — *Ligulatae Gcertn.*

Stylus supernè cylindraceus, supernè ramique aequaliter pubescentes obtusiusculi. Stigmatis series prominulae angustae ante medios styli ramos desinentes. Corolla ad latus interius fissa et ideò ligulata plana 5-dentata 5-nervia, aut nervis ad basin bifurcatis ligula 6-nervia. Pollen scabrum multangulatum, plerumque (1) dodecaedrum. — Plantae lactescentes alternifoliae pleraequ in HemisphaT^L boreali spontaneae. — Tribus distinctissima, unanimo consensu ab auctori bus admissa, ad Campanulcas succo lacleo et ad Lobelieas corollis longitudinaliter fissis paululùm accedit.

CONSPECTUS TRIBES.

Subtrib. I. SCOLYMEJE. Recept. paleaceum. Pappus coroniformis aut (saltern extimus) paleaccus.

• Subtrib. II. LAMPSANE^,. Recept. epaleaceum. Pappus nullus.

Subtrib. III. HYOSERIDEiE. Recept. epaleaceum. Pappus ooroniiformis aut multi paleaceus.

Subtrib. IV. HYPOCH^SRIDEiE. Recept. paleaceum. Pappus paleolatus, paleolis angustis saepè pinnatisectis.

Subtrib. V. RODIGIEiE. Recept. paleaceum. Pappus setosus scaber.

(1) Conf. Decaisne ann. &c nat, i834. bot. p. 21.

Subtrib. VI. SCORZONEREAE. Recept. epaleaceum. Pappus paleo-latus, paleolis scabris aut plumosis. * " *

Subtrib. VII. LACTUCEAE. Recept. epaleaceum aut rarissimè paleum. Pappus piliformis fugax mollis argenteus.

Subtrib. VIII; HIERACIEAE. Recept. epaleaceum. ^Pappus piliformis rigidulus fragilis demùm sordidescens seu flavescens.

Subtrib. I. SCOLYMEAE Less. syn. p. 1*7. — Lactucea prototype Scolymeae Cass. op use 3. p. 44*

Recept. paleaceum. Pappus coroniformis aut paleatus, aut si plurUerialis, serie extimâ saltern paleolata. — Herbae spinescentes. Flores, lutei. Capitula foiiis bracteata. Corolla? extùs scabridae.

DCCLXXIII. DIPLOSTEMMA Hochse. et Steud. in pi Sckirnp. n. 853 non Neck.

Capit. pluri- (10-12) florum. Invol. foiiis bractcati squamae paucis serialcs ovali-oblonga? in aristara subspinescentem longè producta?. Recept. paleas floribus breviores apice acutè incisns gerens. Corolla? exter. ligulâ ovali-oblongâ patentc, inter, basi tubulosae limbo ad latus interius iissso caeterium 5-iido et ideò ad cor. ferè lubulosas accedentes, lobis dorso scabridis. Achtenia turbinata, pappo dupli, exter. paleis 5 obtusis ellipticis, inter, selis 5 longioribus. —Herba Arabica, verisim.annua, à basi ramosa rigidula. Folia longè decurrentia lanceolata acuminato-aristata integerrima reticulato-venosa utrinque punclata! Capitula scssilia ad collum conferta, seciis ramos ad dichotomias et foiiis opposita solitaria , foiiis floralibus inter folia et squamas magnitudine et formâ mediis cincla. Cor. flava?. — Genus ex colore florum , foiiis decurrentibus et paleis receptaculi ad Scolymum nee ad Cicbonum accedens, sed à Scolymo pappo dupli et babitu facilè separatum.

1. D. ALATUM. (fj iu monte Sedder aliisque montibus vallis Fa tine Arabia; felicem inter lapides decidua febr.il. legit cl. Schimper! Cichorinm alatum Hochst. et Steud.! pi. Schimp. n. 853. (v. s. ab. union, itiu.)

DCCLXXIV. SCOLTMUS Tourn. inst. itf. Linn. gen. n. 92a. Gcertn.jruct. a. p. 355. t. 107. Desf. fl. atl. 2.p. 340. — Scolymus et Myscolus Cass. Less.

Capit. multiflorum, corollis secùs tubum et in paginâ inf. limbi sparsè pilosis. Invol. foiiis bracteatum , ovatum, imbricalum, squamis adpressis apice subspinosis margine angustè scariosis. Recept. paleaceum , paleis plus minus achasnia involventibus. Achaenia pappo squamelloso scariose superata.—Herbae in rgione Mediterraneâ spontaneae, Onopordi autCentrophylli facie. Caules erecti. Folia plus miniisvc decurrentia pinnatilobata , lobis incisis in spinas abcuntibus. Capitula ramulos terminantia, solitaria aut aggrecata. Flores lutei.

Sect. 1. EUSCOLYMUS. — Scolymus Cass. bull. phil. 1818. /?. 33, diet. 34< P' 86. Lqss. syn. 126. ,,

Achaeniam brevissime rostra turn, pappo coronifonni saperatnm.

i. S. MACUTUS (littau. sp. ix4^), caule simplici glabro foiiis margine cartilagi-

neis decurrentibus alato, capitulis solitariis subcprymbosis pluribracteatis, bracteis pectinalis. (f) ad agrorum margines in totâ regione Mediterraneâ à Lusitaniâ ad Orientem, in Enropâ austr. et Africâ boreali. Lam. ill. t. 65g. Scol. angyospmnos Gaertn. 1. c. Scol. pectinatus Cass. diet. 34. p. 87. Scol. annus Cer. galiopr. 1⁵. — Clus. bist. 2. p. 153. f. x. Antberae fusco-rubentes. Folia saepè albo-maculatai (•. v. et s.)

Sect. 11. MYSCOLUS. — *Myscolus* Cass. *bull. phil.* 1818. p. 33. *diet.*
34. />. 83, *Less. syn.* 126.

Achaenium erostre sqnamellisa angularibus aeqnalibus longis, anâ alterâve breviori accidente, corona tain.

2. S. HisPAwrcus (Lfnn. sp. n43), canle pnbescente apice ramoso foliis decurrentibus glabiinsculis interrnptè alato, capitulis in spicas foliaceas subaggregatis bibracteactis. (2)ex Desf. fl. atl. a. p. 240- % << Ger. ad margines agrom in magnâ Canariâ (C. Sm!), Maderâ (Lowe!), Mauritaniâ (Desf.), Graeciâ (Zucc!), faunâ (Stev!), Siciliâ (Guss.), Italiaâ (Sav. DC!), Hispaniâ totâ (Lag.)> Galliâ Mediterr. et Occident, usque ad Armoricanu australi. DC. fl. fr. et snpl. n. 2999. Sc. vivax Sauv. Monsp. 5col. perennis Ger. gallop. Scol. congest us Lam. il, fr. a. p. 116. *Myscolus microcephalns* Cass. diet. 34. p* 85. (v. v. cts.)
3. S. GRANDrPLORus (Desf.! atl. 2. p. 240. t. 218), canle viloso foliis subvillosis decnrrrentibus alato, floribussolitariisplerumque terminalibus, bracteis 2-4 subverlicillafis. If, in arvis incnlitis Jiarbaria frequens (Desf!), in Siciliâ (Guss. Scbouvy i), in Galliae agro KascinonensI (Benth.! et Am!). *Myscolns* megacephalos Cass. diet. 34.. p.. 84. Sc. chrys. ^Egyptiaens perennis ferocior Yaill. ac. par. 1721. p. 919. (v. 3.)

Subtrib. II. *LAMPSANEM* Less. *syn.* 117. *excl. SoIdcvilla.* — Lactuceae
* Crepldeae *Lampsaneae* Cass. *opuse.* 3. p. 45.

Recept. epaleaceum, Achsenia calva. — Herbae inermes fer6 omnes nnnuse. , Flores jflavJ.

DCCLXXV. *LAMPSANA* Town. *inst.* 479. *Juss.gen.* p. 168. *Cass. diet.* a5. p.210.
Less. syn. ia6. — *Lapsana* Linn. *gen. n.* 919. *Gartn. fruct.* 2. t. i5f.

Capitulum pluri- (8-i a) florum. In vol. cylindrico-campanulatum augulatum , squamis 8 erectis i-seriatis, squamellis 2-5 minutissimis basi stipatis. Recept. angustum nudum. Acbaenia oblonga glabra stria-tula calva caduca intrâ iuvoJucri squamas non involuta. — Herbae Europeae aut Orientales tenerae glabriuscule ercta? ramosa3. Capitula parva pedicellata laxissime paniculato-corymbosae. Cor. flava?.

1. L. COMMUNIS (Linn.sp. 1141), glabra autglabrinscnla, foliis petiolatis dentatis ant inferioribus lyratis, invol. glaberrimis corollas snbaequantibus, calyculo minnio. (J) freqoens in Europa^ cnltis el ruderatis. Fl. dan. t. 500. Engl. bot. t. 844. Schknhr handb, t. 225. (v. v.)
>?. *crispa* (Pers. enh. 2 p. 379)_t foliis duplicato-denlatis subcrispatis. — L. *crispa* Willd. sp.3. p. 162J. (v. s.)
y. pubescens (Rechb. fl. exenrs. 1. p. 249), canle foliisqne pubescentibus auf subhirsatis. — L. pnbescens Horn. h. hafn. suppl. p. 91. (v. s.)
2. L. INTERMEDIA (Bieb. fl. taar. snpl. p. 50), glabra aut pHosiuscnla, foliis anglatodentatis, super, oblongis, infer, lyrato-pinnatifidis, invol. glaberrimo corollisduplò breviore, calycnlo 3-5-phyllo. (T) in Taoria et Caucasi nmbrosis. Accedit ad L. commanem glabritie, sed differt foliis super, magx elongatis et acuminatis nee uon capitnlis magnit. seqnentis. (v. s. comm. à cl. Steven et Godét.)

3. L. GRANDI FLORA (Bieb. fl. taur. et sup pi. n. 1630), glabrincola autpuberula, , foliis angulatodentatis, infer, lyratis, sopor, oblongis, invol. pedicellisque glanduloso-bispidis corollis duplo brevioribus. (f) Bieb. If. ? Willd. in Caucasi alpe Kaischaur (Bieb.), Tauria me rid. (Godt*t!), ad mare Caspiaxn (Willd.) L. lyrata Willd. num. 832. L. glandulifera Gass. diet. a5. p. a.n. Hieracium lampsanoides olim in hoit. par. Illecept. ex.Cass. interdum paleas paucas membranaceas gerens. (v. s. conim. à cl. Godet et Balb.)

/6. caole in femè valde bispido. — ad radices Olympi JBifnymiae legit cl. Auber! (pi. exs. n. 3365). (v. s.)

4. L. VIRGATA (Desf. fl. atl. 2. p. 235. t.~2i5), glabra, foliis radicalibus runcinatis, caulinis panels lanceolatis dentatis amplexicanibus, capitulis paucis longe pedicel I atis, invol. pilosiusculo ecalyculato? corollis dimidiò breviore. % in Barbaria propè La Calle. Grepis patula Poir. itin. 2. p. 227.

•j" *Species exclusae**

J<. CAPILLARIS Linn. = Crepis polymorpha y.

L. FOETIDA Linn. = Aposeris foetida.

L. GRACILIS Lam. = Arnoseris psilla.

L. KOELPINIA Linn. = Koelpinia linearis.

L. LAMPSONEOLIA Mill. = Rbagadiolus edulis-^.

L. LEOPTODONOIDES Scop. = Aposeris foetida.

L. MINIMA Linn. = Arnoseris pasilla.

L. PULCHRA Willd. -=. Crepis pulchra.

L. PUSILLA Willd. r= Arnoseris pusilla.

L. RHAGADIOLUS Linn. = Rbagadiolus stellatus y.

L. STELLATA linn. = Rhagadiolus stellatus.

L. TARAXACOIDES Forsk. r= Hyoseris locida.

L. ZACUTTHA Linn. =s Zacintba verrucosa.

DCCLXXVI. RHAGADIOLUS Tourn. inst. 479. t. 272. Juss. gen. 168. Gcertn. fr. 2. t. iS'j. Cass. diet. 45./?. 302. Less. gen. 127. —Rbagadiolas Reichenb. fl. exc. 1, p. 249. —Rhagadioli sp. Schreb. Willd. —Lapsanae sp. Linn.

Capitulum pluri- (8T12) florum. Invol. i-seriale squamis circ. 8 convolutis, nunc nudum nunc minutè calyculatum. Recept.#iidnm planum. Achaenia calva teretLa inermia , recta aut incurva , exteriora intri squamas invol. involula persistentia, sciniine achacnio breviore apice inaniametquisi rostrata.—Herbae Australi-Europæ nutOrien talcs ereclaera-mosaeteneraeannuae. Folia infer, lyrata sinuataautdentata, super, sessilia integra. Cnptula distantia pedicellata, lateralia subsessilia. Flores lutei.

i. R. STELLATUS, involucre minutè calyculato, acheniis exterioribus stellatis patentibus. (i) in Europâ australi à Lusitanâ ad Orientem frequens in cultis. Schkuhr handb. t. 225. — Lob. ic. t. 240. f. 2. Varietates omnes variant glabi'03 aut in parte infer, canlis et foliis infer, puberulae.

ct. leiocarpus, foliis infer, dentatis, invol. glabro, acbainiis omnibus laevibus. — Rb. stellatos Willd. sp. 3. p. i6a5. Lapsana stellata Linn. hort. ups. 245. (v. v. et s.)

@. intermedius, foliis infer, dentatis aut slnuato-runcinatis, invol. glabrius- cnlo, achoeniis omnibus lasvibus.—Rb. intermedius Ten. fl. med. 2. p. 25 Rh. lampsanoides Desf. cat- h. par. 1829. (v. s.)

y. edulis, foliis infer, lyratis, invol. glabro, acbainiis interioribus hirtellis.— lib. edulis Gaertn. fr. 2. p. 354. Willd. sp. 3. p. 1625. Lapsana Rhagadio-JusLinn. bort. ups. 2*5. (v. v. et s.)

- < *T. hebelamus*, foliis infer, dentatis sinnatisve, invol. hirtello, achamii integroribus hirtellis. (f) in Graeciâ. (v. s.)
2. R- HEDYPNOIS (Fibch. et Mey.! pi. Szow.), invol. ecalychnato, acbaeniis exterritoribus ereclis aut involnis. (I) in Persiae prov. Aderbeischnn circâ Scabanli et in camp's elatis prov. Karabagh. Caolis hirtus. Folia infer, obovato-oblonga birtella aut glabiuluscula. Capitula iateralia se&silia, omnia fructifera conniventia. Acbaenia centralia pubescentia. Habitus Hedypnois. Caract. Rbagadioli. (v. s. comm. à cl. auct.)

{- Species exclusae.

R. SCABER All. = Hyoseris microcephala.

R. STJEILATUS All. = Hyoseris radiata.

R. TARAXACOIDES All. = Thrinacia hispida.

R. ZACINTHA All. = Zacintha verrucosa.

DCCLXXVII. KOELPINIA Pail. itin. ed. germ. 3.p. 755. t. i. / ./. 2. ed. galL cnp. n. 395. t. iof). /. 1. Less syn. 127. — Lapsanae sp. Linn. — Rbagadioli sp. 6cnreb. — Rhagadioli sect. Cass. diet. 45.p. 482.

Capitulum 5-io-florum. Invol. squamis 5-η uoiserialibus constans, squamellis 1 parvis caljculatum. Recept. nudum. Achaenia calva teretia striata aculeis paluli[^] rigidis dorso hispida. — Herba Asiatica annua, radiceexih, caulis pluribus simplicibus subtomentosis aut glabris. Folia linearia integerrima. Capitula terminalia et latralia pèdicellata, unicoad coJlum subsessili. Flores flavi.

1. K. LIWE|RIS (Pall. 11. cc). (*T*) Lapsana Koelpiaia Linn. f. sup pi. 348. Rhagadiolas Koelpmia Willd. sp. 3. p. 1626.

a. *glabra*, c.tullbus glabris, acjeniis in capitlo 5-6. — in deterto Astracanico ad monteni Bogden[^]em (Pall.), in Dabnriâ (Willd.) et Sibiriâ (h. Deless.), in cam pis propè Baku et Sallian (Mey.), in cultis et subsalsis distr Khoi propè Karab.igb (Szow || «idj(eim<incba (Ancb.), ad Ephratem (Cbesn.), nee in Peiu nt dixit Willdenow. (v. s. sp. et v. c.)

\$. *araneosa*, c.mle amneobo-tomentoso, achaeniis in capitlo 5-10. (*T*) inter Bdgdad et Mossul leger. cl. Olivier et Brngniere. (v. s.)

Subtrib. III. HYOSERWEJE Less. syn. 127. — Lactuceae Scorzonerea: Hyoserideae Cass. opusc. 3.p. 46.

Recept. epaleaceum. Pappus aut coroniformis, aut multipaleolatus, paleolis integris latiusculis saepissimè brevibus interdum clongatis rigidis. — Herbae, rariū suffurices. Corolla? flavae aut in Cichorio et Gatanancbe cceruleae.

DCCLXXVIII. APOGON EIL sketch 2.p. 267 non Endl

Capit. 8-10-florum. Invol. 8-io-phyllum, squamis ovatis acuminatis l)iscriatis. Recpt. nudum. Cor. involucro sublongiores. Achainia oblonga teretiuscula, longitudinaliter et minutè nervulata, transversè striatula, capapppsaautpappopaleaceomininiosuperata—Herba 3Boreali-Americanre glabrae. Radices fibrosc. Folia radicalia integra aut subdentata basi attenuata, caulina lanceolata acuminata semiamplexicaulia, summa binasubopposita inter quae exsurgunt pedicelli 2-7 subumbellati Tiudi i-cepbali. Capitula parva. Cor. flava. — Genus Lampsaneas et iiyoserideas ferè conjungens.

1. A. ILLUM (EU.! 1. c.), undique glabenimus, foliis canlinis basi dilatatis, pe-

dicellis binis, achaeniis glabris oraninò epapposis. (f) iu demissis Carolina; mediae et Georgia; fl. april. (v. s. fmctiferura comrn. à cl. Elliott.)

2. **A. GRACILIS**, *glaber ad apices ramorum et pedicellarum hispidulus, foliis caulinis basi vix dilatatis, pedicellis 3-9, achaenii scabris brevissimè papposis.* (I) in Mexico inter Bejar et Austin legit cL-Berlandier I Herba priori elatior et gracilior, circ. 6-Srpollie. Folia ferè linearia parce dentata aut integerrima. (v. s.)

DCCLXXIX. ARNOSERIS *Gcertn. fr. i. p. 355. t. 157. Cceass. diet. 25. p. 63 et 214. Less. syn. 127. — Lapsanaesp. Lam. — Hyoseridis sp. Linn.*

Gapit. imiltiflorum. In vol. post anthesin connivens, cons tans squamis qirc. 12 Hneari-laDceolatis acuminatis, squamellis paucis basi substipa turn. Recept. planum margine alveola turn. Achaenia obovato-pentagona basi attenuala pappo corooiformi brevissimo integro superata, exteriora ob-compressa in alveolis basi subnidulantia.—Herba Europaea annua glabra. Folia radicalia oblonga seu obovata dentata basi attenuata. Caules plurimi aphylli simplices aut ramosi sub capitulis turinnato-inflati caf i. Capitula solitaria termiualia. Cor. flavae.

1. **A. rusILLA.** (Gsertn. 1. c). (Y, in Europe arvis apticis. Hyoseris minima Linn. sp. 11 .18. Fl. dan. t. 201. Engl. bot. t. 94. Schkohr. bandb. t. 224. Lapsanapuilla Willd. sp. 3. p. 1623. Lampsana minima Lam. diet. 3. p. 414. Lampsana gracilis Lam. fl. fr. 2. p. 102. — Clus. hist. 1. p. 143. f. 2. (v. v. et s.)

DCCLXXX. HYOSERIS *Juss. gen. 169. Cass. diet. 22. p. 338. — Hedypnois Gasrtn. fr. 'l. p. 363. f. 160. Less. syn. 128 excl. syn. Tourn. — Hyoseridis sp. Linn.*—Taraxaconastrum *Vaill. act. ac. par. 1721. —Hyoserides acaulea Willd. — Acbyrastrum Neck. elem. 1 p. 67.*

Gapil. multiflo-urn. In vol. i-seriale, brevè calyculatum, squamis sub-concavis achaenia radii foventibus. Recept. nudum. Achcenia rostrata obcompressa. Pappus radii brevissimus palea unà alterrà elongata, disci longior biserialis paleis Jongissimè acuminatis. — Herbae acaules regionis Mediterraneae incolus. Folia radicalia pinuatipartita. Scapi nudi i-cephali. Flores lutei.

§. 1. *Irivolucropost anthesin etiam credo, achcenii disci subulatis omnibus J&htfibus.*

- I. **H. MICROCEPHALA** (Cass. diet. 22, p. 338), scapis i-cephalis apice incrassatis foliis brevioribus ant iis xqnalibns, folia radic. glalni.sant ad contain snbtùs minitissimè puberolis pinnatipartitis, lobis triangularibns apice dentatis, invol. glabro io-phyllo cl'm post antbcsln erecto squamellis 5 minimis snbnlatis calyculato, achaedùs obcompressis, exter. minute papposis, inter, pappo JLO-sqnamellato insegnali longo donalis. (J, in cullis, oliveis et agris regionis Meditrranca; ferè totius. Hyoseris srabra Linn. sp. n38 non Mcencb. Hedypnois scabra Less. syn. 128. Rhagadiolos seaber A^. ped. n. 833. Hyoseris adpersa Moench metb!! 541. Hieracim Tragopogoni capit. Bocc. inns. t. ao6. Capit. 10-flora parva. (v. v. et s.)

y3. *nana*, scapis teretibns folia noivsnperantibas. "If in insula Majorca ad raargines viarom (Delarochel). An Hyoseris nana Poir. snpl. 3. p. 8a ? (v.s.)

§. 2. *Invol, post anthesin stellatim patente, achanii disci cxeiicribus oLcompressi^alatis, intimis scriilibus tcretiusculis.*

- .2. **H. RADIATA**, scapis i-cephalis nudis teretibus foliis duplo lougioribus, folii*

radie. glabris runcinato-pit
corollis dimidiò breviore,
denù patentes subinclusi
piosius papposis, int̄ luis teretibas
y ^ T fgyptoexcepto. Hyosert radiau LinTl
todon rad.atom Lam. fl. f. 2. sp. 114. alga diolu, stellaps AM led' n 35.
rtitis, lobis acutè paudentatis, invol. glabro
is exter. obcompressis intrà invol. squamas
papposis, medius obcom sig sub tis co-
abortivis. % in arV Ull. LTbū. ell. rilibus

K. atm. t. 37. t. 2.

ccc.

§. 3. W. post antkesin erectis, aclimniis radii et disci obcompres-
sis alatis. — Aposeris Cass. diet. 48. p. 422. excl. syn.

magolar, b̄os salde matis, iMvol. s̄q̄aa mi, erectis circ. / o t̄otun.e t̄ Iz-
alat̄ lonpu, pappoj.a. If. in Gr̄cia (Toarn.), in JEgypto d4 "Aewudr ami
(L^orsk.), m S.c.l.i circa Panormm (Gns.,!), in Gracii (Tourn.) W h"ort.
vmd' t̄ ,50. Lapsana taraxaco.des For.k. descr. i45. Aposeri, fetidā Caw

g. iml

atis
cu-

y .setulosa, scapis petiolis neryoque fol. medio setis longis pa tails hispidis
% in Sicilia prope Cataniam (Guss.). H. radical* var seo H IT
Guss! inlitt. Ex oalyculo majore et fiuctn, J££^££'&?£?
tinere videtur : forlè species propria? (v. s.)

•j- Species exclusa.

- H. ACULEATA Pers. = Leontodon hastile.
- H. AMPLEXICAULIS Michx. = Cynthia "Vir^inica.
- H. AWGUSTIFOLIA Michx. = Cynthia Dandelion.
- H. ARBNAHIA Schonsb. = Hedypnois arenaria.
- H. DIFLORA Walt. = Cynthia "Virginica.
- II. CAROLINIANA Walt. = Krigia Caroliniana.
- H. CICHLOROIDES "Vill. = Thrincia hirta.
- H. CREPOIDES Presl. = Hedypnois pendula.
- H. CRETICA Linn. = Hedypnois Cretica.
- H. CRETICA Cav. = Hedypnois polymorpha.
- H. FOETIDA Linn, rz: Aposeris foetida.
- H. GRDMOSA Poir. = Thrincia tenerosa.
- II. HEDYPNOIS Linn. = Hedypnoia polymorpha.
- H. HEDYPNOIS Forsk. = Hedypnois Crelica.
- H. HIRTA Balb. = Barkhauia Balhisiana.
- H. ttXRTA Gaertn.=Thrincia hirta.
- H. HISPID A Scbousb. = Thrincia Maroccana.
- H. INCRASSATA¹ Mcench. r= Hedypnois polymorpha.
- H. MAJOR Walt. = Cynthia Dandelion .
- II. MINIMA L. = Arnoseris pnsilla.
- II. MONSPELIEMSIS Willd. = Hedypnois polymorpha.
- H. MONTANA Michx. = Krigia montana.
- H. pNDur.A Balb. = Hedypnois pendula.

- H. PRKWAMTHOIDES WiUd. = *Cynlbia "Virgmica*.
 H. PYGMIEA Ait. = *Thrincia Maroccana*.
 H. RUAGADIOLOIDES Linn. = *Hedypnois polymorpha*.
 H. RAMOSISSIMA Bert. = *Krigia dichotoma*.
 H. SCABRA Mceneh. = *Hedypnois Crelica*.
Jf. TARAXACOIDES La in. = *Thrincia hirta*.
 H. TARAXACOIDES Till. := *Thrincia hispida*.
 H. TBWELLA Pccpp. = *Fichteae Poeppigii*".
 H. TENELLA Thunb. ^ : *Hypochaeris glabra* &
 H. TUBEFORMIS Ten. z=z *Hedypnois Cretica*.
 H. VIRGINICA Linn. = *Krigia Virginica*.

DCCLXXXI HEDYPNOIS *Tottrn. inst. 478. t. 271. Cass. diet. ao. p. 337,*
WiUd. sp. 3. p. 1616. non Gcertn. nee Less. — Hyoseris Gcertn. fr. a. p. 36a.
t. 160. Less. syn. 127.—Hyoseridis sp. Linn. — Rhagadioloides Vaill. act, ac.
par, 1721. •

Capit. multiflorum. Invol. i-seriale, squamis linearibus convolutis
 achaenia radii involventibus. Recept. nudum. Achaenia cylindracea
 rostrata iocurva. Pappus radii coroniformis dentatus, disci biserialis
 multipaleaceus paleis longissimè acmninatis. — Herbs annuae ssepiis
 caulescentes rariis subacaules, regionis Mediterranean incolae, hispidae
 aut glabra. Rami floridi nudi i-cephali. Folia suepiis integra. Flores
 tutei. ,

1. H. CRETICA (Willd. sp. 1616), canle diffuso ramoso folioso, foliis oblongis
 dentatis, inferioribns baai attenaatis, super, subcordatis aingleziraubibus, pe-
 danculis sab capitalo incrassatis cavis, invol. frucligeii squamis glabris apice
 ninricato-setosis, achaealis fertibns striatis sab lente srabris. (f) in maritimis
 secùs mare Mediterraneanu, in Greta (Linn.), Sicilia (Gu&s!), ad Nicaeam (All.
 Risso !), circà Valentiam et in rndcratis propè Madritnu (Lag.). Hyoseris Cret-
 ica Linn. sp. 1139. Gaertn. fr. a. p. 360. t. 160. f. a. Rhagadiolus Creticus
 All. pcd. n. 832 Hyoseris scabra Moench non Unt». Pappusfl. marginaliam
 brevis coroniforinis dontatnshinc inde in setaro prodntcas. fl. renlr. ilimn du-
 plex, ext. brevis sqaqraellobub, int. setosus rigidas elongatns. (v. v. et s.)

f. *subacauly* foliis pedunoulisquc snbradicalibus. — circa Constantinopo-
 lira (Castagne!), NauplJau. (Zucc!), in Sicilla (GUM! Sohonw!), ItalU
 (Ten.), Hispania (Guss.). Hedypnols tub x- for mis Ten. cat. h. neap.
 1819. p. 60. Horn. h. hafn. add. p. 970., An H. Persica Visch. h. gor.
 1812? liieb. auppl. 539? (v. h.)

2. H. COROHOPIFOLIA (Ten.! cat. h. ne.ip. i8rg..p. 60), cauler suhnullo, foliis
 radicalibns spatbulalo-oWongis grossè inciso-dentatu piloso-«ci»]ris, scapis
 declinatis tcretibns, involneris glabris aut hirfeliis. (T,iji Italiae. Callise anstralis
 pt verisim. totius regionis Mediterranean arvis. Hiibits H. Crticae ;S, sed pe-
 dicelli non sensim incrawati. An adliuc raf. H. polymorphaB? (v. v. et s.)

'5. H. roLTkoiiPHA, cdule diffuso ramoso glabiuiNCulo, foliis oblongis (kntatis
 basi attenuatis sessilibus, pedicellis cylindricis nee «nb capitulo sensim dilata-
 talis, invol. sqnamis glabris aut hirrellis. (T)in rejjouis Mediterraneana; totias
 rmatis asperis et avvis. Hue perlinerc videntar Hyoseris Hedypnois et H. rhaga-
 dioloides Linn. sp. n38 et n3i). Hedypnois Monspeliensis, Manitanira et
 rhagadioloides Willd. sp. 3. p. iti*6. Hedypnois liirfnracca et crepidfformis
 P.eichenb.fl. exc. i5o. Hedypnois plobulifera Lam. fl. fr. a. p. 107. Rhaga-
 diolus Hedypnois All. fl- ped. n. 83 c H. Crelica Cav. ic. I. t. 43. Hyoseris
 Monspeliensis Pers. Hyoseris incrassnta Mdencb. H. Toornefortii, et rhagadio-
 loidcs Caas. .diet. 3o. p. 337- H. Caspicn Horn. h. hafn, suppi. pr. ét H. laci-

ui/lora Viv. fl. lib. 5a. t. 17. f. a. — Lob. ic. t. Z'SQ. f. I. "Varint canle diverse ramoso glabro aut hirtello, foliis formâ subdiversis, invol. glabris aut plus minus hirtellis, etc., sed nee inter plnnfas spontaneas nee inter cultas di.cri- miua certa stabilire qaivi. (v. v. et s.)

4. H. TENDULA, Canle erecto paniclato glabro, foliis oblongis dentatis sabli-
pidulis et ciliatis, infer. obovatis in petiolam attenuatis, pedunculis apice sub-
incrassatis, capitulis autem anthesiu pendulis. (I) in agro Ruseinonensi (Reitr.),
in Hispania austr. (Boiss.), in insulae Zanthi littor. arenosis (Marg.), et
veritJm. in tolâ reg. Medilerr. Hyoseris pendula Balb. in Pers. enh. 2. p. 369.
(v. v. c.)

s& pinnatifida, canle erecto aut diffuso ramoso, foliis infer, pinnatifidis,
invol. squamis dorso apice scabris, pedicillis non incrassatis. (Tj in Hispania
austr. (Roiss.!). Hedyponis pendula Willd sp. 3. p. 1618. An species
diversa PSaepé iu horlis sub noin. H arenanac vagat. An ab hæ satis differt
Hyoseriscrepoles Presl fl. sic. 1. p. xxxi? (v. v. c.)

5. H. AEUNA-RIA, caule erecto ramoso sparsè puberulo, foliis oblongis aenminatis
integris sparsè setosis ciliaris carinâ valde setosis, infer, basi attenuate, su-
per, ses-iilibus.seaii.implexicaulibus, pcdunculis ii«disiucrassaljs,invol.frnctigeri
squamis dorso sc»bris, achaeniis vix subscabiis. (f) in arenâ inobili agri Tingi-
tani (Salzm.). Hyoseris arenaria Scliousb. ma roc. 197. ed. germ. i8'3- Ach*-
nia radii elongata ppoo simplioi brevissimo, disci pappo setoso lougissimo
breviora. H. arenaria Willd. et hurtul. vidctar prior*, var. (v. s. sp.)

'j Species exclusce.

- \. AUTUMNALIS Smith. = Oporinia autauinalis.
H. HIRTA Smith. = Thiincia hirta.
H. BispiDA Smith. = Leontodon bi^pidum.
H. TALDDOSA Scop. = Taraxacum palus>tie?
H. PYRENAICA Vill. zr Leontodon Alpinum.
H. TARAXACI "Vill. = Apargia Taraxaci.
H. TARAXACI Huds. = Oporinia autmniali*.
H. TARAXACUM With. := Taraxacum l)ens-leonis.

DGCLXXXII. APOSERIS Neck. elem. i.p. 5-J. n. io5. non Cass. — Ar_{Hyoseridis} sp. Less. syn. 128. — Hyoieridis et Lap.sana; sp, auct. — Leontodontoid_{en Mich.} gen. 3i. t. 38.

Capitulum multillorum. Invol. calyculatum sen duplex, interius
i-seriale 5-8-phylum, interius ò-phylum brevius. Recept. nudum.
Achaenia oblonga brevitcr rostrata calva! — Hcrlja Europea, Taraxaci
seu Hyoseridis facie, glabra seu t.J ncrvum fol. biiblùs piJosiuscuJu.
Folia radicalia ruijci:iito-pinnntij'artita, lobis cii'C 10-12-jugis subtria;t-
gularibus parcèsinuato-dentatis, inf'erioribus minoribus. Scapi i-ceplujli
nudi, foliis aequales aut paulò longiorcs. Flores flavi. Habitus Hyoscii-
dis. Cor. ferè Lampsaaee.

1. A. FOETID A (Less. syn. ia8. excl. car. geu.). ^ in prati.s et nemoribus montani.s
Helvclias (Reut!), Sabaudia (Tavrod!), Pedemonlii (All.), Apenniu^ruin
Appuanorum(Bert.! Schonw!;, Hungaiis ^Kit.) in monte Untersberg (|oppc! >.
Hyoseris foetida Linn. sp. nS^. Waldst. ft Kit. pi. rar. hung. 1. t. 4<. Lap-
aana leontontoides Scop. earn. ed. 1. p. 397. Lampsana foetid a Scop, cam,
ed. a. p. 989. — Mich. gen. t. 28. Col. ephr. 2. t. 31. (v. s.)

'F Species exvlusa.

- A. FOETIDA Casu.= Hyoseïis lucida.

DCGLXXXIII. HJENSELERA *Bciss. mod. mm Lag.*

Capit. multiflorum. Invol. campanulatum plurisériale iiiihricaluiM , squamis margine membranaceis calloso-acuminatis* Rucepl. inler floret paleas basi carinatas apice acuminatas achaen.is loiigiores gereu.s. Achaenia obpyramidata peutagona. Pappus i-^eiialis, paleis 5 scarioso-pergamaceis basi latis, in fl. exter. brevibus subobtusis,in inter, longionibus acuminatis. — Herba perennis glabra acaulis. Radix cylindracca. aut parcè ramosa. Folia radicalia , exler. obovata dentata, caetra oblonga pinnatilobata,*iobis dentatis. Scapus foiiisduplò triplòvo longinr erectus i-ccphalus. Flores fiuvi. — Genus slriicto sensu ex rerepinc. palcaceo ad Scolymeas roferciidum cssel scd ex habitu toto proj»e Catantanchem ct Gala'im potiis referendum. — Haenseicra Lag. est Phy sospermum. Gonf. prod. IV. p. 246. *

- i. H. GRANATENSIS (Boiss.I desér. eticon. ined.). If in montibus ifani Oiandensis iarissima, uempé in Sierra Nevada loco dicto Cerro da 1 reveukc in declivibasargilloso-cretareis legit etmecum couuinunic. cl.Edm.Boibbier. (v. s.)

DCCLXXXIT. CATANANCHE *Vaill act. ac. par. 1721. p. si5. Linn, gen, n. 9*0. Gatrtn.fr. a. /?. 356. t. 15f. Cass. diet. 7. p. u65. Less. syn. 128. — Catauuicre Toutn. inst. t. 271.*

Gapitulum multifloruni. Invol. squamae scariosa? nulliserialcs imbri- calac. Recept. planum fimbrillifero-pilosum. Styli rami breves ferè ovipideii Achaenia turbinata eiostria sulcato-pentagona adprcessè setosa. Pappus 5:7-paleaceus longus, pilcis longibsimè acuminatis aequalibus denticulatis. — Herba3 re'giouis LMediterraneae incola3. Folia saepñis omnia radicalia lanceolata ferè graminea. Gaules elongati ramosi submidi ramis apice i-cephahs, aut simplices i-cepbali. Cor. ccerulcae aut lutea?.

1. C. COERCLE (Linn. sp. 1142), foliis \illosis liuearibns ihtmdiim basii pinnae tjildls, invol. squamis ovatis uervo medio in mucroneD produclo. % Linn. (T) Ger. in collibusaxosis Gallia: etllspaniaauslrdlib, Ligunae, Bavbaiia. Lani ill. t.658. f. 1. Schkuhr handb. t. 226. — Burr. ic. t. 1134. Dod. pempt. 6\$8 ic. Coiollaa coeruleaj feiè Cichorii. (v. v.)

a. (1. LUTEA. (Linn, sp* T142), fohis tillosii linear-lanceolatis trinerviis dentatis ant integerrimib, invol squamis* exter. ovatisacatis,inter. elongatifs .icnniin.itis.

(1) in arvis regionis Mediterraneæ, in Barbâja (Desf. Salzm !), Cretâ (Alp.), Oriente (Labill.), Siciliâ (Guss.). Splitb.), Pedemontio circa Breglio (All.) Lam. ill. t. 658. f. 2. Schkuhr. handb. t. 226, Reichenb. fl. exc. t. p. 250.

(oxcl. bjin. Cass.). — liarr. ic. t. n 3 i. Bocc. mñs. t. 7. Cap!tula flava panlo fluam priorib minora. (v. s.)

3. C. cfespiTosA. (Desf. fl. atl. I. p. «38), foliis cespitosabubcarnosh, aliis subalatis integerrimis , aliis latioribus inaequaliler drntuis, invol. squamU obasis. % in Atlante propè Tlemser locis dieuo&is. Scapi i-cepbali. Invol. globosom. Flores flavi.

• *Species exclusa.*

C GivECV Linn. = Hj inenonema *Græcum.*

DCCLXXXV. CICHORIUM *Tomn. inst. !.i, hum gen. n. 921. Gtetm f> - p. ^57. t. i5*i.Cass. dice. 8./>. 5a5. — Cicliuuui et Acanthophytou /*

Gapiluliun multi- aut pluritloruinMnvdl. duplex, exlerius breve cm., 5-phyl!um , incriüs longmn'circ.'S-io-phyiluwi.UeccjSi. planjbisculuin r| dleacpuru, inrerdinn parcè alveolito^finiRriilirenim. Acliaerjiaobovato

subcompressa stria ta glabra. Pappus squameHis brevissimis obtusiusculis numerosis i-u-seriatis constans. — Herbae Gerontogeae erectae ramosae. Folia radio, oblonga dentata aut runcinata. Capitula aul ad nxillas fol. sup. sessiliq , aut ramulos tenninianlia. Cor. laetè coeruleae. Herbae amarae , cullurâ mansuetae edules.

Seel. i. EUCICORIUM. — *Cichorium Less.* syn, iq.

, *Capitula multiflora.*

1. C. IHTYBUS (Lion. sp. nki), foliis infer, runcinatis ad carinam bispido-scabris, super, oblongis subintegris, capitulis axillaribus 2-3 sessilibus. % ad iuargines viaruin et agrorum Euro pa? fere tolius. Engl. bot. t. 538. Ileyii. arnz. gew. 2. t. il. Blackw. herb. t. 18\$. 'Variat iloibus rose is albive aut saepissime coernleis; caule saepè fasciato; foliis plus minus hifopidis et raraulis 1-cpphalisad basin capituloroin fa&ciculorum saepius iinferiorum exsertis (conf. fl. dan. t. 907), quod eliam in plantâ cultâ occurrit (Blackw. herb. t. 177.) Hujus videtur mera var. C. Cicorea Dumort. fl. belg. prod. 64. (v. v.)
&, *divarication* , capitulis 2-3 sessilibos et ramolo apice subincrassato i-cephalo ex a.villis fol. superiornm ortis. — in Europâ occidental! et australi, in Zaciutbo (Marg.), Hispaniâ austr. (lioiss.), necnon in Maderâ Lowe!), Barb:itiâ (Schoush.), iilgypto (Coqneb.). Monente cl. Bastard nalin video de»crimen inter stirpes Europeas et Manilanicas. (v. v. et s.)
2. C. EifDivia (Willd. sp. 3. p. 1629), caule laevi bine indè p'loso, foliis infer, oblongis sinuatis dentatisve labriusculis, iloralibus basi anriculato-dilatatis.
C2) Hùe duao var. priori speriei aualog.t- referenda; videutur :
a. *Cosnia*, foliis oblongis siunatis aut bupinnatifidis scabridis, capitulis axillaribus pluribus congestis sessilibus. — in India orient, ad Patna, Gandoyaii, Bakbira, in Kamaoo, Nepaliâ. C. Cosoia Ham.! in Wall, cat. comp. n. i5i. C. Endivia herb. Madr vix indigena herb. Wight! videtur om!iin6 stirps C. Endivia? sylvestris (v. a.)
/2. *sativa*, foliis glabris oblongis denticulatis , capitulis ad axillas foliorani super. 2-4 sessilibns ag^regatis et ramulo elongato i-cephalo. (f) (2) col tain hortis Europae. C. Etulivia Linn. sp. TI4^. et omn. auctorum. Blackw. herb. t. 3i8. Variat foliia laceris et crispis, flore coeruleo et albo. (v. v.)
3. C. TUMILUM (Jacq. obs. 4. p. 3. t. 80), foliis obovatis dentatis caulibusquo infernè scabrid/s, rapitnlifexillaribus geminis sessilibus. (J) patr. ign. An forte C. Intybus var.? Ari satis differt C. ambignum Schult. obs. p. 170?
4. C. GLABK vruM (Presl fl. sic. 1. p. xxxu), caule. . . , foliis radic*libus runcinatis glabris in costâ sedbris, caulinis minim is, capitulis geminfs, uno longè pedunculato, altero bessili, invol. exterioris squaiuis ovatis acutis subciliatis interiore dupld bvevioribus. — in Siciliâ. An adhuc C. Endivias var.?

Sect. 11. ACANTHOPIHYTON. — *Acanthophytion Less.* syn. 125.

Capitula sexflora.

- ^ A. C. SPINOSCM (Linn. sp. 1142), caule indurato dichotomo, ramis demum ap^cc pnngentibus, capitulis aliis ad axilhs sfsbilis subgeniinis, aliis terminalibiis solitariis. (2) Less. (1) Linn. in ins. Cretâ (Sibth.! Oliv.!), Astypalæa (d'Urv.!), Cypro (Auch.!), in Græciâ propè Athenas (herb. ac. Mon.!) et Corinthum (Parol. !), in Siciliâ merid. (Cuss. !), ad littora aprica secca et arenosa. — C. Bauh. prod. t. 62. (v. ».)

'* Species exclusa.

O ALVTLM H. et Sr. = Diplostbraua a|atum.

DCCLXXXVII. CALAIS — *Hyinenonema Hook. fl. hot. am. i. p. 300 non Cass.*

Capit. multiflorum. Invol. duplex, exterius brevius calyculiforme 3-6-pbyllum, inter, cylindraceum io-ia-pbyllum squamis biserialibus. Recept. epaleaceum. Cor. invol. subaequales. Achacnia tcretia apice attenuata rostrala muricata aut scab rid a f Pappus paleis 5 uniserialibus, basi latè scarioso-dilalatis corolla rum conloitarum more invicem SQpet, incumbentibus, apice in selas breviter scabridas desinentibus. — Her bee Californiac glabrae annuae. Radix exilis simplex. Folia radicnlia elongata utrinque acuminata linear-sublanceolata, mine integerrima, saepiis medio inciso-pirmatih'da, lobulis acuminatis. Scapi nudi i-cepbali circ. foliorum longitudinem adaequantes aut iis longiores. Cor. fortè ex sicco flavescentes seu pallidae. — Nomcn bominis cuiusdam mythologici qui squamas dor so gerebat. — An genus dividendum?

Sect. i. EUCLALAS.

Invol. stricto sensu calyculatum, *squamis brevibua. Pappi pale* basi seariosse dilatatae, sen&un in setam product*. — Scapi apice furfuiacei.

1. G. DOUGLASII, scaposa, foliis* glabriuscilib, scapis apice furfuraceo-pube.sceu-tibas, pappi paleis rufj* in betas sensim deMientibus. (J; in California legit cl. Douglas, (v. s. comm. ab bon. soc. boitic. londin.)

Sect. 11. CALOCALAIS.

Invoji. squatnis 3-4 longiusculis basi iustructmu. Pappi pale^u M*aiios» apice Lilidas etex hinn setam proferentes. Scapi caule^ve apice glabeirimi.

2. C. LIWDLEYI, snbsc.iposa, «Iabia, pappi paleis nafe.srt'Uibus apice bifurcatis et ex iinn retain proferentibuft. (J) in Americ.f borealifs oia* occidental!. An ad bane aut ad prioitem referendum Hymenoneiuia laciuafuui bievissime deicrip-tam in Hook. fl. bor. am. i. p. 301? Folia forè piunalipartita. Scapns loceus crassiascnlns forte iistulosus. Acluenia striata. Pappus *kid* lungè membranà sçanosa apice emarginatu insruecliis, disci meuibrauâ brevioii Mibbiida' raar-giuatus. Iu borto j.oc. hoi tic. Londin. ctiitain cl. Lindley iliocomm. (v. s.)
3. C. LINEAWIPOUA, caule baw folioso snbramoso apice nudo, foliis linearibos integerrimis vdlo moll! citiaffi, caeierùm aduitis glabris, pappi jaieis albls longè sranosjs apice bifidis ex siuu setam profit rentibns. (J, in California legit cl. Douglas et circa Fort-Vancouver vi. G.-nry. Kymenoniina > giuuenm Hook II bor. am. I p. 300. Folia inferioia latioia, uaboeulia veluiiua, adnla glibia. In vol. squama? exteriores paucdi I.tnceolata. Acbu*rii.i spbinuiiulnra loiigifi rostrata. («i. non \idi. (v. s.)

DCCLXXXVIII. TOLPIS *Jiivona monogr. 1809. Sjtreng, s) it. 3. p. 670. — tolpis et Schiiidid Less. syn. 129. — Crepidis ft Hieiacii sp. Auct.*

Capii. multiflorum. Invol. p.iuciseriale, exlus bracteis linear-setaceis calycilatiim aut ciicumdatum. Recept. areolatum nuduin. Acbaenia turbinata striata erostria conformia. Pappus i-serialis, setis scabris rigidulis 2-20, rariis in floribus radii nullis, setulisiniminis sqiamellsc-formibus interjectis, aut ubi setae désiderantur pappurn radii totnm conficientibus. — Ierbac, rariu suffrutices, rgionum Mediterranearnni plerumque incolse. Çules subnudi nut foliosi, saepè dichotomi, apice Jaxè corymbosi, pedicellis sub oapitulo incrnnialis et saepè br^cteolatis. Folia lanceolata den tat a incisa aut pinnatifida. Capitula Hav<, intei duni in centra fusca^exsiccalionc plerumqie virescenti*ii*

Sect. i. DJIEPANIA. — *Drepania* Juss. gen. p. 16g. Cass% diet. i3. p. 506. - *Tolpis* 4dans.fam. i. p. 112. GtBrtn.fr. a. p. 160. — *Ghatelania* Neck. clem. i.y? 53.—*Swertia* Ludw.jtl. non Linn.

Achamia radi⁹ coronata pappo brevissimo i -seriali .squamellis minimi's con-.liuite; disci .srtit 2-4 aiistaefo.mibus elongatis, sq a am ell is minimis radio confor-.juhiis iuierjectib. Invol. sqaauiae exler. sulmlal^e filcaliu inierioie.s circiter adae- ejn antes aul eas snpei'antes.

1. T. BARKATA (Gaertn. fr. 2. p. 372. t. 160. f. 1. Lam. ill. t. 65i), caule erecto
ramoso romoso, foliis lanceolatis dentatis, invol. bracteolis inter. invol. pro-
prium superantibus. (I) in arvis agris et apricis sterilibus Europæ australis et
Africa borealis, necnon in insul. Canariis et India orient. verisimil. introducta.
Biv. monog. p. 13. I. 3. Crepis bavbala Linn. sp. 11 "i r. Cart. bot. mag. t. 35
"noii Mill. Crepis Rretica A3 ill. diet. II. 3. Swertia barbata All. ped. n. 157.
Drepania barbata Debf. fl. all. ** p. 25a. DC. II. fr. n. 7.Q5S. Divpania falcata
Roiis.fl. calv. 127. — Moris, ox. a. 7. l. />. f. 3a. Herm. parad. t. J85. Cor.
pallidè flava*, in disco sacpius fusc.r. Herba variat bispidnio-scabr.i ant glabriuA-
cula. Invol. fiubf.uino.sutn. "Vnriat floribns ctiam renlri flavidis. (v. v.)

2. T. UMBELLATA (Bert. pi. gen. Pers. enc. 2. p. 377), caule erecto romoso
nubnudo, foliis oblongo-Hnearibus deatalis, supi'rioribns ititegris, invol. brac-
leolis exterioribos in\ol. proprium atJaequantibiis. (f)(2) in arvis et agris regio-
nisEnropo; olearum ab agro Rnscinonenbi ad Hetmriarn , priore rario. Dre-
pania umbellate D(!. out. b. raonsp. io5. Tolpis qnadaristala Biv. uionogr.
p, g. t. r. Achronia radii pappo subcoroniformi mulii- sed brevi-paleaceo, cen-
tralia 4-aristara. Herba elata, glabrinseula, pednnrlis aplice touentosis. Capi-
I n'a dimidio qn'am T. barbalre luinora, Cor. oinnri) jjallidc flava;;. (v. v. et s.)

Seel. n. SGHHIDTTA. — Schmidtia *Mccnch suppl.* W). *Cass. diet.*
48. p. 433. *Less. syn.* 129.— *jElhonia Donin linna>d litt.* i83o.
p. 1^2. — *Polycbaelia Tausch non Less.*

Aobncnia omnia setis inpequalibns basi dilatatis et subcallosis, rt aliis minimis interjectis coronata. Invol. squama; exteriores in reriebus sensim breviores.

3. T. CRINITA (Lowr! prim. fl. mad. p. 24. n. 38. t. 2. f. i-3), canle ramoso glabro suhrido, foliis radical, ro.^natis oblongis sinuato-dentatis pnberrulo-scapulari, caule prolixi pasciis latae, luteo-purpureis, bracteis ad apicem pedicellorum et basin invol. setaceis invol. ferè aquilibus, pappo 2-5-aristato. (1) in Maderæ collibus apricis vulgaris. Radix longa exilis. Folia interdàm subpinnatifida. Capitula T. barbatæ dimidiò ferè minoria. Pappus disci 4-5-setosus, radii 2-4-J»elosus. Ex hoc carar. et longituilue invol. ext. egregiè jungit Drcpaniam et Schinidtiam. (v. s. comm. à cl. Lowe.)

4. T. GRASDIFLORA (Ten. viagg. p. 128, fl. ufap. app. 5. p. 26. iyil. p. ^07), caule <Mclosnaphyllo gJabro apic<* rarnoso, foliis radiralibns lanceolalis dentatis sparsè hirtellis ad basin decusiùs villosis, invol. farinoso, pappo 6-9-aiis-tato. C2) i» regno Nrapolitano (Ten ! Ouss.! Thom.!) et in Sicilia centrali ad moutem Artesino(Dnby!). CapUnla nitrina , magnit. circiter T. barbatac. Invol. iiquamie exter. subulat;e bieves. Variat foliis glbriuscusculis aut birlis, caule valde ramoso aut subsimplici. (v. s.)

5. T. ALTISSIMA (J^rs, enh. 2. p. 377) , crfule erecto raraoso glabro,foliis elongatis linoari-lanceolatis dentatis, super. linearibn8 integrum, pedicellis invohv crisque pubescenti-farinosis, pappo 6-10-setoso. (2) (1) in olivetis agris et arenosis Liguriæ, Corsicæ et Maurianiæ. Crepis ambigua Balb.! diss. p. 4. t. r. DC. fl fr. 4. p. 40. Drepauia ambigua DC. cat. h. monsp. p. 105. Crepis altissima B. M. f. non h. non sp. n. 6 Schmidia ambigua Coss. Diss. p. 22

Crepis virgata Desf. act. soc. h. n. par. t. 8. fl. atl. 2. p. 230. Tolpis sexaristata Biv. monogr. p. n. t. 2. Folia variant ferè glabra, pubescens am hirtella. Capit. parva flavida. (v. v. et s)

- » T. LAGORODA. (Cbr. Smith! in Buch can. T 4") | caule nngnleto erecto a pic? paniculato ad basin vellere densissimo donato <• rterum glabro, foliis snbse.ssilibDs oblongis basi attenuatés sinuato-deniatis glabris, pappn 6-io-aristato. @ If iñ ins. TeneriftE regione Pini suprà villam Orotavam legit el. Chr. Smith. Invol* sqnainu; ext. breves paivai adpyessa:, int. tomentosae ad carinani glabro¹. (v. 6. comiu. à cl. inv.)
7. T. MACRORHIZA, glaherrima, n:dice crassâ carnosa , caulibns superne paniculatis foliatis, foliis indivisis oblongis dentatis sessilibns subcarnoso-coiiaceis, paniculâ amplâ, invol. farinoso-pubescentibus, pappo i5-ao-seto.so. % in Maderese rupibus. Crepis macrorhiza Danksherb. Hook. hot. mag. t. 2988. Lowe! prim. H. mad. p. 25. n. 40. Pedicellisqnamellosi. Capif. flava, niagnit. ieic T. LarbatsL¹. (v. » comiu. à cl. Lowe.)
8. T. FRUTICOSA (Scbrank pi. rar. 1). uionac. t. r. 46), glabra, canle fruticbso r.'uiioso,foliis oblongis dentatis bieviterpeliatU, 111vol. tomentoso-canescente, squauis aco<ssoriis brevibns, pappo circ. ia-betoso. 5 ' " Madrae (Schr.) ru-ribus inaritimis (Lowe!). Hieracinin frnticosim Willd. sp. 3. p. i5gi. Desk! h. par. Crepis succulent a Ait. kevv. ed. 1. v. 3. p. 128 ex Lowe! in litt.Schmid- tia fruticoba Mcench suppl. 218. (v. v. ets.)
9. T. PKCTINATA, canle snffrutesqente rainoso foliato, ramis diffusis virgatis,foliis pinnatipartitis, rachilobisque lincari-filibrmbas clongatis integerriinis, invol. oane&ceule basi hrevissimf² squamellato, pappo jo-i'i-selo&o. ^ in rnpibüs apiids Maderae nbique. Crepis pectmata Lowe! prim. fl. mad. p. 04. n. 37. Crepis tenuifolia Banks herb, non Willd. Fol. lobi 5-7-jngi. Capit. duplò ma joia quâm T. coronopifoliae cui la men affinis. (v. s. comm. :i el. inv.)
- » T. CORONOPIFOLIA (Kiv. nioiogr. p. 17. t. 5), glabra, caule erecto laxè ramoso init'iné folioso, ioliis pinnatiidis basi atleuuatis, lobis linearis-oblongis sabintegerimis, foliis suiinnis linearibus inlegerrimih,invol. canescente,¹ pappo 5-io.-setoso. (2)i" ins. Canariis (Desf. Link) nee in Siciliâ. Crepis coronopi folia Desf. act. soc. h. n.par. 1. p. J8. t. 9. Chondrilla hinaoioides Roth. cat. 1 p. 101. (v. v. et s.)
- 1 x. T. cRiTHMiroLiJi, glabra , caule erecto laxè ramoso inlerne folioso, foliis in fer. bipinnatiidjs, lobis obloDgo-linearibus dentatis, superiojiljuspinnatipartii) lobis angustè linearibus integerimis, invol. cauescente , squamis exter. hrevissimis, pappo 10-12-setoso. (1 in ins. Teneriffæ aidis calidis (C. Smith!) Crepis erithrinifolia Link in Buch can. 147. Aifinis T. coronopifoliae et cum ea à non-millim coujuncta , sed dnce cl. Link scrvanda videtnr. (v. s.)
- ;i. T. FILIFORMIS, foliis linearis-filiformibus inlegernimis glabris. (%) in Madera Cupis hliforiiis Ait. kew. ed. 1. v. 3. p. 128 non Viv. JEthionia iliformis Don in linn.néa i830.p. 14a. |;

DCCLXXXVIII. FICHTEA Schultz in linneu¹ i835. p. iSe_x. — Hyoseridis sp racpp.

Capihilum mulliolorum. Invol. cniyculalo-suhrimhriritluin , squamis exter. ^ 8 adpressis, inter, i-seriatis. Recept. nudum. Acbaeoia cros-tria. Pappus duplex , ext. brevis paleaceus, inter, selis 5 scaberrirais elongniis rtifis deciduis. — Herba bumillima Cliilensis aunua. Folia rarliclia glabra aul cum apice scapi furfuracea pinnatiprtita, rachi lo-uisque y-o-jugis linearibus acuus, terminali paulo cæteris longiore. Scapi foliis paulò breviores nudi i-cephali. Ligulæ angustæ in sicco è pjjllido et cœrulescenti variae. — Genus affine Krigiae, sed invol. calyculato el pappo facile distinlm.

i. F. POEPPIGII (Schult. 1. c.).(|)in Chili dctexit cl. Po?ppig H?oseris tenclL Pa?pi).! pi. txs. n. OCXTL (v. a.)

PCCLXXXIX. KRIGIA Schreb. gen.pl. n. 1244. WiUd. sp 3, p. 1618. Cass.
• diet. *4 p- 508. Less p. 129. — Hyoseridis sp. Linn. Lam. — Kricia sp.
Nutt.Ell. ^b _t

Capitulum raultillorum. Invol. j-seriale 8-12-phylum. Recept. nudum. Achaenia turbinata erostria subpentagona conformia. Pappus bi-* serialis, exterior paleis 5 latis brevibus oblusissimis imâ basi subconcretis, interior setis 5 longis cum paleis alternantibus et cum acbajnii angulis congruentibus. —Herbae Boreali-Americanai glabriuscula? annus. Scapi i-cephali elongati. Folia lytata dentata aut integerrima. Flores flavi.

- x. K. "VIRGINICA (Willd sp. 3. p. 1618), foliis pritnaiis subrotundis integris, caetenslyiatis, scapis involuciisque glabris. (Jjiu pascais agris et colbas herbosis à Canada ad Floiidam Pursh fl. bor. am. a. p. 504. til. sketch a p 264. Hyoseiis Ynginica Linn, sp n 38 Lam. jouin. List nat. 1. p. 222. t. ia. Cynthia Virginica Beck fl. p. 169. Habitus parvuli Taixaci. Capitnl.i parva. Cor. intense fLuoe. (v. s)
- a. K. CAROLINIAWA (Nutt. gen, am. '• p ia6. Ell {ketch 2. p. 265), fohis omnibus remcinatisinxqualiierdeiitato-iuciitis lobo terminali subtangulari, scapo longissimo sab capitulo glanduloso-piloso. (jj in arenosis Caiolinae (W alt. Michx..!), Floridae ocrulenialis (Nntt). Hyoseris Caroliana Walt. fl. cat 194. Folia pauissimis pilis subiliata. Mores aarantiaci. (v.s. ad L'llu àMithjux com in. sed m ejus llo.i.t ouissa.)
- 3 K. LEPTOPHYLLA , foliis glabiJUSCUIS liueanbns utiinque acumindtis, aliis m-tegenimis, altis lobulo acato utrinque anctis, scapis plnrimis spaise piloaulis. (T) in Caiolinâ mcridjonah ohm legcinnt cl. Fraser et Bosc. Forte Hyoseiis angstifobaquoouradam? Malticaulis erecta. Scapi foliis duplò longioics (v. s.)
- 4. K. DICHOTOMA (Nutt. gen. ainer. 2. p. 127), sulgланca, inferne (ichotouia, foliis spathnl.ito-oblonys subintegns dentative glabiis cihatis, ac.ipls nomellosis longissimis apjee pubeiulo-hutclbs. (j) iu arenos^is Novi-Jersey (Nott.), in Marylandia (B;ul.). K Virginua fi dichotoma Bart. tomp. a. p 91. Hyosens lamosissimaBait. fl phil a. p. QS. (v. s comm. à D^a Duthon.)
- ^. K. MONTANA (Nntt. gen am. 3. p. «7»)» glaberrima procumbensi, folijs lan- ceolatis integriimis. — in altissinais monlibus Carolina} septentrioualis. Hyo- seris inontaua Michx fl. bor. am. 2. p. 87.

f Species exclusæ.

- K. AMPLEXICAULIS Nutt. = Cynthia "Virgiuica.
- K. GHILENSIS Nees. = Microsens pygmaea.
- K. DANDELION Nntt. = Cynthia Boscii.
- K. OFFOSITIFOLIA Kaf. = Sennia cespitosa
- K. PIWWATIFIDA Bert = Microteris pygmaa.
- K. FUSILLA hortul. rrMicio.seiis pygin<ca.

PCCXC. MICROSERTS Donphd. mag. i83a. p. i88. Hook, et Arn comp. 1. p. 30. — Bellardia Colla mem acad. tur 38 p. 40. « 79* *• ^4 non All. nee Schreb. (1) — Lepidonema Fisch et Mey. ind. sem. h. petiop. i835. p. 3i ann. sc. nat. 1836. bot.p. 10c

Gapit. circ. ri-floruin. Invol. duplex, exlerius calculif'orme squamis 7-8 brevibus, interius squamis 8 biserialibus corollas subsquanti-

bus. Recept. nudum. Acbsnia teretiuscula basi attenuata 10-striata erostria. Pappus paleis 10 biseriatis inler se conformibus basi mem bra - naceo-dilalatis supernè in setam rigidam scabridam produci's. — Herba Cbilensis glabra. Radix exilis. Folia radicalia nunc linearia integerrima, niinc dente 1-2 aucla, nunc medio pinnatifida. Scnpiplures cructi foliis longiores i-cephali aphylli sub capitulo puberulo-furfuracei. Cor. flavae, senescentes subpurpurascentes.

1. M. PYCMJEA (Hook. et Arn. 1. c). (I) in pascnis saxosis collium propè Quillota et in raonte la Leonâ Chilensium legit d. Bertero, ad Valparaiso (H. et Arn.). Krigia pinnatifida Bert. ined. Krigia pnsilla hort. monsp. ex F. et M. Lepidodonema Cbilense Fisch, et Mey. 1. c. Krigia Cbilensis Neesl hort. bonn. sem. (v. v. c. et s. sp.)

DCCXCI. CYNTHIA Donin Edinl.phil.journ. i8ag./>. 305. *linacea* i<>30. *Hit.* p. i/2. *Less. sgn.* 129 non *Zoolog.* — Lutheria *Schultz.* in *liimaā* i835./>. 257. — Troximi sp. *Gctrtn.* ^— Tragopogous sp. *Linn.*

Capit. multiflorum. Invol. squamae uni- aut biseriales. Recepit. 1111-dum foveolatum. Achaetia quadrangulata glabra erostria conibrmia. Pappus multiscorialis inaequalis, serie externâ brevissimâ persistentc multipaleacea, reliquis pilifonnibus caducis. — Herbae perennes glaherrimae Boreali-Americanæ?. Folia laevissima oblouga, 1-adicalia lyrata," cauliua superiora integerrinia. Invol. lasve. Cor. aureae.

Sect. 1. EUCYNTHIA.

Invol. calycata in. — Caulis ramo&us 2-4-cephalus.

1. C. ViRGiNiA(Don 1. c), glaura, canle parcè ramoso folioso, foliis radicalibus spathularo-buceolatis, caulinis lineri-lanceolatis¹ amplexicaulibus, *ratals* apice elongatis nndis i-cephalis. 7f in pratis er sylvis umbrosis hnniidis Amer. bor. à Pensylvaniâ ad Caroliuam (Pnrsh). Tragopogon Virginictum Linn. sp..m 1. Hyoseris preuuntboides Willd. sp. 3. p. 1615. Hyoseris biflora Wall, car. p. IQ4. Troximon 'Virginica' Pursh fl. Lor. am. 2. p. 505. Krigia aplexicaulis Natt. gen. am. 3. p. 127. Ell. sketch 2. p. 266. Cynlbia aplexicaulis Beck fl. p. 169. Hyoseris amplexicaulis Micbx. fl. bor. am. 'J. p. 88. Lutheria Virginica Schultz in linnaā i835. p. 267. (v. s.)

Sect. 11. ADOPOGON. —Adopogon Neck, elan. 1. p. 55. car. /also.

Invol. ecalyculatum. — Sea pi ndi i-cephali. Radices tuberifeiae. Fortè genus proprinm ? Caract. geneiici in hac sect, subdabii.

1. C. DANDELION, sobglauca, scapis nndis i-cephalis, foliis Lineari-lanceolati'. 1 integris aut hinc inde dentatis, lignis involucro duplo triplöve longioribus. % in agris et cam pis'a Virginîa ad Carolinam (Pnrsh), in tenitorio Ai-kan-sano (Nutt.). Tragopogon Dandelium Linn. sp. 1111? Willd. sp. 3. p. 1495? Troximon Dandelion Pers. encl. 2. p. 360. Hyoseris major Walt. car. 194. Hyoseria amplexicaulis Ha Micnz. n. nor. am. 2. p. 07. *VHjgja Dandelion Ell. sketch 2, p. a65. Scapns in meo specim. apice glaber. (v. a.)
3. C. lioscir, subglabra, scapis nndis i-cephalis, foliis Hueari-lanceolatis remote et grosse dentato-lobatis, ligulis involuc. paulo longicribus. If. in Carolina (Bosc!), et forte' in Virginia' (Nutt.)? Cacalia tuberosa Bosc ! in litt'. Krigia Dandelion Nett. gen. am. 2. p. 127? Differt à prxcedente corolbi vix invol superantibus nec triplö ferè longioribua, necnon foliis profundius incisis. Radicis fibrae bine inde tuberera snbrotnnduna ad apices gernnt, Fortè piioris syn myma nonnolla hoc jiertinent* (v. s.)

Subtrili. IV. *HYP0CUJEHIDE2E* Less. syn. i3o. *Don in Unnecd* i83 •./</.
p. 1I9. *Schultz ann. sc. ndt.* i835. p. 3oi. — *Lactucoe Scorzoiu-ioai*
*H** [xtchxrideae Cuss, opusc. 3.p. 46.

Recept. paleaceiim. Pappus paleolatus, paleolis augiisissimè semilanceo-
lnlis saltern interioribus et in aclueniis iiterioribus pinnatisctis. — H^rba?
ilioibus flavis.

DCCXII. HTPOCHTLULS. — *Hypocbxridj.1* sp. *Vaill. act. acad. par.* 1721.
Linn gen. n. 918. *Lam. ill. t.* 656. *DC fl. fr. t.p.* 46. — *Hypocbaeridis et*
Acbyiopbori sp. *Gcertn. Less.*

Capitulum jmhiflorum. Iftvol. ovaLo-oblnugiiiu aul subcampanula-
turn , squainis irabricatis. Kecept. paleis inter flores onustum. Acbaunia
glabra iniirculata, nunc omnia suberostria , mine omnia romrata. Pap-
pus biserialis, selis extcr. subfiliformibus brcvioribus, inter, longiori-
bus plomo^is. — llerbae annuae aut biennes , glabrse aot pilosa?, Ger-
togeai, acauics aut siniplicicaulcs aul ramosa?. Folia mine radicalia mine
acaulia, inlegra duntata aut pinnatatio})ata. Flores lulci.

Sect. 1. ARACHNITES.

Achnenia orania suberoslria. Pappus bi.scriulis. — Species annua.

J# H. ARACHNOIDKA. (Poir. diet. 5. p. 57'p), foliib radicalibps aut ex caul is park
iiiferiore ortis oblongis basi attenuatis dentatis glabiis subcjldtih, sCapo ra-
moso, invol. stjuainis dorso sparsè hirtellis aut gl:ibiis, aeliaeuis omuibu* eros-
tribus, p.¶po bivriali, setis interiotibus Ian a co[Si]osa plomoMs. Q^ in Mauri-
tania" (Poir.), in arvis arenosis inaritimis repni Neapolitan! (Ten.). Forte di-
veiia ab H. aratbnoidea Dt'sF. II. all. omend. et Bivon. cent. a. p. 3i. de qua
cl. anrtiores dixenint acharnia rentralnia rosti'ata, et qua*: forte ad H. glabram
pertinrt. Hoc forte perrinct H. bispida Brot. fl. lus. x. p. 33a. aed ferè glabra
aunt apt-rim, nostra equidem culta. (v- v. c.)

Sect. ii. EoHYPOCHiERis'Dubf fat. gall. i. p. 306. — *Hypoohaeris*
Gccrtn.fr. i.p. 374. *t. 16b./! 4-* Less. syn. i3o. — *Achyropho-
rus Tausch in /lord* 189.9. erg. p. ^7. nonScop.

Acb&nia radii suberostria, disci 1 osir.-H;

9. H. GLABRA. (Linn. sp. i i 4 0 , foliis radicalibus lanceolato-oblongis limcinalis
ant sinuato-dentatis glabrit, aut bivtis, scapis glabris nudis raino.sis Jjimplioi-
bnsve, invol. gl:tbiis, acbaeniis radii subcrostiibus, pappo biseriali. Q) in Ea-
ropae .nvis pascuis collibus. l'l, dan. t. 4^4. Lam. ill. t. 64*). f- i- Curt. loud,
t. 149. Scbkukr bandb. t. 225. Hypocb. stellata Gat. fl. mout. 140. H. dimor-
pha 15rot. fl. lus. 1. p. 33a. H. adscendens Brot. pbyt. IIIH. t. a5. Herba vul-
gavis valdc vari»n».

@. *simplex* (DC. fl. fr. 5. p. 4fa), scapis simpbVibus, foliis glabris dentatis
ant Mibiutegris. — H. simplex Merat. fl. par. t*rd. 1. p. 3io, (v. *)

•j. *minima*, bcapib simpliribus, foliis biiiis subraucinatis aut grosse' siniatiH ,
— H. minima Cyr. pi. rnr. neap. fasc. 1. p. JO. Desf. fl. all. a. p. a38?
II. *pusilla* Poir. suppl. 4. p. 53o. (v. s.)

<T *Thracica*, scapis ramo^is, foUis lingulatis setis sparsis rigidulis subscabris.
- in Tbracia ad Lainpsannm. H. Tbracica Stev.! in Iitt. i833. (v. s.)

«. *hirsute*, *capis ramosis, foliis obtuse' sinuato-piuuatifidis-selis conferrij, bir-
snto-hcabris. — in Sicilia legit cl. Gussone. H. bispida Brot. fl. bis. 1
p. 332? (v.s.)

^ *Cnpemis*, scapi» raraasis, folí» liueari-oblonfjis gUbris sinnato-pinnad

tidis. — ad Cap. Bonae-Spei. *H. glabrarE.* Mey.! in Drege coll. If. Cu pensis Less. syn. i3o. *Hyoseris tenella* lliunb. fl. cap. 6i3. *Capilula pauld qudin priorum minora.* (v. s.)

3_f *H. NEAPOLITANA*, radice fasciculata, collo pluricipili, foliis radicalibns oblongis obtusis basi attinualis sinuato-dentalis, juniovibus seabridis, rlemuni glabratiss ciliatis, scapo ramoso involucrisque glabri.s, aehaenii radii breviier, di>ci longe lost rat is, pappo biseriali. *If* in sylvis arenosis maritimis rogni Neapolitaui. *H. diniorpha* Ten. syn. 407. Gnss.l in litt. ib'3i non Brot. Radix, constat fibris plnriuiis crassis è colio ortis. (v. s.)

4. *H. SALZMANNIANA*, radice exili subiimplici, foliis radicalibns obovato-oblongis ubtn&is basi attenuatis sinuato-deutatis ^elulis rigiilis ciliatis, caulinis pancis caule ^ubnudo parcè ramoso setulis parcis brevibus exasperato, peduucnlis sub iuvolacro «ubiucasbato, invol. squamis acuminatis, exlcioribus dorso .setoso-asperis, acbainiis radii erostribus. disci rostratis, pappo biseriali. (f) iu agro Tmgilano detexit cl. Salzmann. *H. dimorpba* Salzin.! pi. exs. (v. s.) *

Sect. 411. PORCELLITES. — *Porcellifis* sp. Cass. — *Achyrophorus Gcerin*.fr, ?? p. 3^ t. i5o. Less. syn. i3o. ncn SCOJJ. — *llypo-chueris Tauschinjlord* 1829. erg.p. 'S*).nonGazrtn.

Achoe'nia ouinia' aequaliter ro&trala.

5. If. *BLLBisir* (Lois. not. 124. DC fl. fr. suppl. p. 452), foliis omnibus radicalibns luncinatis obtusis glabris aut ciliatis, scapis sub rapitulis subincrassatis rawosis polycephalis ant simplicibus i-cephalis, invol. glabris, squamis exter. obtiMs, acbneniis omnibus equaliseret longe rostral, pappo biseriali. (jj(Z)in arvis liobciu.'e (Jucq.), Galliae circà Nanuetes, Lugduuum, Gulloprovinciu;, Vasconia? (Dufour!), Hispanic (Lag.). Scor/onera taraxaciiblia Jacq. ic. rar. t. JCO. coll. 1. p. 52. Hyp. intermedia Richt. fl. lips, et in Vei. hull. i83o. p. 4'>4. II. unilora fi. Poir. suppl. 4. p. 53o. 'Acbyropboius lialbisiillorn.il, bafn. Mippl. 91. Hyp. minima lialb. misc. 1. p. 29. non Cyr. Fortè ex C'iss. v a lie t as *H. glabre* ted acbxnia exteiiora rostrata nee erostria. (v. s.)

6. *H. HADICATA* (Linn. sp. 1140), foliis radicalibns runcinatis obtusis hispidis, scapis nudis glabris ramosis subdiciotomis apice parcè squamrllosis, invol. "laini jut floabridi squamis etiam exterioibns acurainatis, pappo biseriali.(2) ex K<iksh in jkiis pasicuis et sylvis Knropae. Sow. engl. bot. t. 831. Curt. loud, t. 108. Fl.dan. t. i5o. *Achytophorns* ladicatns Scop earn. ed. 2. n. 981. Gxrtm, fr. a. t. 159. *Porcellites* radicata Cass. diet. 43. p. 43. *Seiiola* t.raxacifolia Salym in flora 1821. p. in? — *Lob.* ic. t. a38. f. 1. (v. v.)

'J' Species exclusc,

H. APRGIOIDES Hook, et Am. = *Acbyrophorns apargioides*,

H. ARENARIA Gaudich. = *Acbyropboius arenarins*.

H. AURANTIACA Turci.-•= *Achyrophoms aurantiaens*.

H. BERIERII Colla. r= *Achyrophorns apargioides*.

H. CANESCENS Stev.rz *Picris lacvis*.

H. CHRYSAKTHA Pcepp. = *Acbyrophorns chrysanthbus*,

H. CORSRC Tausch. = *Achyrophoms pinnatifidus*.

H. FOLIOSA Till. = *Achyrophorus* *Helvetir.ua*.

H. GLAUCA l>resl, = *Seriola* l>vigata &.

H. GRAWDIFLORA Ledeb. = *Achyrophoms aurantiacus*.

H. HELVETICA Linn. = *Achyrophorus* *Helveticos*.

H. HISPIDA Willd. = *Achyrophorus hispidus*.

H. MAGRORBIZA Spreng. = *Achyrophorus* *pinnatifidus*.

M. MkryxnTA I inn. r= *Acbyropborns* *nianilatns*.

- H. PIHHATIFIDA Auch. z= Metabasis Hymettia.
 H. PINNATIFIDA Cyr. = Achyrophoras pinna tifidas.
 H. RUPESTRIS Poepp. rz: Achyrophorns apargioides.
 H. SESSILIFLORA Kunth. = Achyrophorns ses&ciliifloms.
 H. SONCHOIDES Bert. = Achyrophoras Scorzonerce.
 H. SONCHOIDES Kunth. = Achyrophoras sonchoides.
 H. TARAXACIFOLIA MtBnch. = Barkbausia albida.
 H. TARAXACOIDES POUIT. = Baikhaasia albida.
 H. TYROLENSIS Schiw. = Achyrophoras maculates y.
 H. UWIFLORA Till, in Achyropliorus Helveticus.
 II. UHIFLORA Hoffm. us Achyrophorus inaculatus.

DCCX.CIII. ACHYROPHORUS *Scop, earn, ed. i. ii. 2.p. 116. Less. syn. 130.*
(excL sp.) non Vail — Hypochaeridis sp. Linn.

Omnia Hypochaeridis sed pappus uniserialis plumosus. — Herbae Gerontogae et Americana? perennes. Capitula rariis ovata, saepius hemisphaerica aut campanulata. Genus medium inter Hypochaeridem et Seriolam, priori iavol. imbricato et pappi setis non dilatalis, posteriori pappo uniseriali affine.

Sect. i. PHANODERIS.

Achaenia oinnia evidenteret longiusculè rostrata, rostro exlerloium brevioie, interioru longiore. — Herbae plerque Gerontogaei.

§. i. *Capitulis oblongis.*

1. A. ANDIKOS, scapo siraplici nudo glabro i-cephalo foliis triplò longiore, foliis radicalibus elongatis oblongo-linearibus aculis basi attenuatis hinc indè lobulato-denfatis membranaceis glabris, invol. oblongi squamis paacis sub-imbricatis oblongo-linearibus nigricantibus dorso puberis, acheniis omnibus rostratis. *If* in Andibus Amer. me rid. Serbia Andina Pee pp.! pi, exs. Ex capit. oblongo paucifloro accedit ad Seriolam, sed ex pappo i-seriali setis plumosis basi nullo modo dilatatis ad Hypochridem aptius pertinere videtur. (v. s.)
2. A. RAMOSUS, caudice radiciformi apice folia sub radicali a cauleraque ramosum Mibnudum gereute, foliis infer, oblongis ntrinque acuniinatis subdentatis, super, linearibus basi subsagittatis, invol. oblongi squamis glaberrimis margine scariosis. % Patr. ign. "Variat caule gibemimo aut ba&i patentim hispidissiuo. Kami panci elongati apice nndi i-cephali. (r. s.)
3. A. HTSPIDUS, radice fusiformi, caule ramo&o laxè subhispido ant glabro, foliis* radicalibus lanceolatis repando-dentatis adpresso et parcè pilosis, canlinis paucis angustè linearibus integerriniis aut basi dentatis, invol. oblongo pilis rigidulis hirto, achaeniis striatis omnibus rostralibus. *If* seu (j) patr. ignota. Hypochieris hispida Willd. hort. berol. t. 46. enum. 831. non Roth. Pappi seta? pluriun-e filiformes nee at in Seriolis basi dilatatae. In icona Willd. capitulum ftre campanulatum nd sequentem nimis accedit. (v. v. el s. c. ex hort. genev.)
4. A: OXTODONTUS, canle erecto folioso sulcato glabro aut foliisqne hinc indè piloso, foliis infer, oblongis basi in pelioinm attenuatis sinuato-pinnatifidis lobis acutis terminali majore, canlinis linear-oblougis integerriniis basi dentibus ntrinque 1-2 acuminatissimis instructis, iuvol. campanulato setis elongatis liispidissimo. *If patr. ign. Seriola Cretensis Desf. hort. par. cat. ed. 3. p. 150. Poir. diet. 7. p. 1ai. non Linn. Porcellites Cretensis Cass. diet. 43. p. 43. Priori valde affinis, sed differt cupitulo campanulato uec oblongo, invol. pilis lougioribus Hingis confertis, foliis raulinis b1 JOI bns acutiis dentatis, etr (v. el s. ex'liort. par.)

§. 2. *Capitulis campanulatis.*

5. A. AMBIGUUS, caule ramoso subangulato glabro aut hinc indē hispidulo snb-nudo, foliis radicalibus oblong is basi in petiolum alenoatis subpinnatifidis lobis acutis terminali longiore, caulinis lincaribus basi rigidè ciliatis, invol. campanul^to birto. *If* pair. igu. Crepis pinnatifida hortuJ. ex Bon jean. Dua-bus prioribus a filiis, fortè varietas? Radix uon verè fusiformis, sed ferè multi-plex, 'collo' fusco subtuberoso. Caulis pars superior raiuosa, ramia elongatis nudis i-cephalis. (v. s. ex liort. Bonjean.)
6. A. SERILOIDES, canle erecto ranio&o basi bispidnlo cseterui glabro, foliis Infer, petiolatis elongatis dentato-runcinatis utrinque hirtellis, caulinis pancis sessilibus ferè linearibus snbirflegris, super, glabris, invol. canipanulato fari-noso-tomentoso setis apice hispidulo. (2) ? in. insula Zacyntho ad vias et agros maio ilor. legit d. Mar got! Affinis A. oxyodonto ambiguo et bispido sed involucre farinoso-touientoso sat differre videtur. Habitns Seriolac, sed pappisetoi . basi noil dilatatic. (v. s. à cl. inv.)
- j. A. PIZTNATIFIDUS, foliis radicalibus pinnatifidis, lobis linear-lauceolatis cus-pidatis sobintegris, caulinis subnudis glabris autbispidis, invol. saepius bispidi-ulis, acbrniis radii breviūs, disci loDgiis rostratis. % in pratis montium regni Neapolitani nempè Samnii, Apritii, Calabriae (Ten.!) et in Corsicâ (SalzmJ). Hypochaeris pinnatifida Cyr. ined. Ten.! syll. p. 406. Poir. snpl. 4. p. 53o. Kobertia pinnatifida Spreng. syst.3. p. ()6i. et Hypochoeris macrorhiza Spreng. 1. c. p. 6C9? Hyp. Corsica Tauscb in florâ 1829. erg. p. 36? Variat caule, foliis imò involucris glabris ant subbispidulis, foliis pinnatipartitis aut roncinatis. (v. s.)
- S. A. MACULATUS (Soop. cam. ed. a. n. 986), foliis mdicalibns ovali-obloDg!s sparse pilosib subintegris aut grossè deutatis, canle subnudo 'pilosnlo parcè brachialo-ramoso, iuvolucro pilis rigidulis scabro, achaeniis omnibus rostratis. *If* in pratis aspen's Europe fere'to tins media? et borealis. Hypochaeris uiacnlat.i Linn. sp. 1140. fl. dan. t. 149. Scbkubr bandb. t. 225. Heyn. arzn. gew. vi. t. 43. — Clus. hist. 2. p. 139. f. 2. Variat ut var. seqq., foliis subintegris , viridibn̄s aut fosco maculatis. (v. v. et s.)
- ♂ monocephalus, scapo simplici i-cepbalo. — Hypochaeris maculata /2DC.
fl. fr. suppl. /⁵i, var. et. (iaud. fl. helv. 5. p. 144. — Engl. hot. t. 225.
Non confuendenda cum A. Helveticō qui in vol. villossissimo gaudet. (v. v.)
y. oblong ifolius, scapo siroplici aut ramoso, foliis elliptico-oblongis subiu-tegerriuiis. — H. Tyrolensis Scbiw. ined. ex Bess.! in litt. (v. s.)
£. microcephaliis, scapo simplici ant rariūs ramoso, foliis obovato-oblongij, subintegris niembranaceis, flonbas paulò iuvolucrum superantibus. — in pralis sylvaticis Dahuriae (Turcz.) et Rossix mediae (Stev.!). H. macn-lata Ledeb. fl. all. 4. p. 164. (v. s.)
9. A. HELVETICUS (Scop, et Less. 11. c.c.), foliis radicalibus oblongo-lanceolatis dentalis hirsntis, caule t-2-folio simplici i-cepbalo hispidolo , invol. birsntis-simo , aohicniis omnibus rostralis. TL in pratis Alpium Helvetiaj, Pedemontii, Italiae boreale, Germanie in ruuclatio (annua...). Hypochaeris helvetica Jacq. ic. var. t. 165. H. uniflora Vill. fl. dauph. 3. p. 6r. t. 23. All. ped. t. 14. f. 3. Gaud. fl. helv. 5. p. 145. H. foliosa Vill. fl. dauph. 86. Cultus aut in solo pin-gui natus interdūm subramosns 2-3-cephalus occnrrit. (v. v. et s.)

Sect. 11. OREOPHILA. — Oreophila *Don phil. mag. 1832. apr.* — Amblachsenium *Turcz. in litt.* — Hypochoeris *H. B. et Kunth noi'. gen. am. non Ocerty.*

Achaenia omnia brevissimè rostrata aut suberostria. — Species perennes ple-jeque Americans (nna Dahurica.)

ru A. AURA*Trccs, caule birto simplici aut rariūs parcè rjMpO*O₂folioso, foliis

ovali-oblougis denlatis secūs nervum medium subiùs densè, caetenjīn sparsè hirtis, invol. squamis exter. ovatis subacuminatis ciliatis et ad cost am hiitis, achceniis erostribus. *If* in pivitis montosis Dahirise (Turcz!) et Sibiriaj AUucae (Gebl. exLedeb.). Hypochaeris grandillora Ledeb. 11. alt. 4. p. 164. ic. 11. ross* ill. t. 44** Auiblachajuium aurantiacum Turcz! in litt. H. aurauliaca Turcz! iu litt. i\$3o. Caulis patentim iraò retrorsùm hiapijlus. Capitula^amiantiaca, magnitudine A. Helveticī ideò duplò ferè majora quāin A. maculali microcephali quocum comparavit cl. Ledebour. (v. s.)

i* A. CHKYSANTHUS, caule simplici glabro i-cephalo, foliis caulinis pluribus sessilibus ovuio-laneolatis acuminatis subiutegerriuiis margine et pagiuâ super, hispidis subiùs glabris, invol. squamis exter. ovatis dorso medio lougè hispidis. *Of* in Chili legit cl. Poepp. Hyuochaeris chry&antha Poepp! pi. exs. Afluis A. amiantiaco sed caulis glaber, folia canlinia acumiata.iuvol. squamae inagis hispidai, etc. (v. v.)

12. A. TKNUIFOLIUS , caule simplici subaphyllo i-cephalo foliis duplò longiore , foliis radicalibus linearibus seu linean-lauceolatis integeirimi dentalis seu pinuatilidis, invol. ovati squamis ovaLq-laneolatis acu.min.4lis. *If* in Chili. Species polyiuorpha. Seriola tenuifolia Hook, et Arn. coipp. i. p, 3o. Oreophila leuufolia Do 11 mss.

a., *linearifolius*, gUber, foliis angustè linearibus integerrimiis, squamis invol. ix apice subtomcutosis. —in altioribus Cordillens legit cl. C. Gay. Folia 6-poll, louga , I-' lin. lala. (v. Si comm. à cl. inv.)

/i. *Gay anus* , foliis glabris liueari-lanceolatis inlegerriuiis, den lair's aut pinnatiidis, scapo ad a pice in et iuvol. squainb toinento albo inolli couferto vestitis. — in Cordilleris demissioribus legit etiam cl. C. Gay, (v. s.)

y. *Neccanus* > foliis glabris linear!-sublauceolatis integerrimiis aut eroso-dentatis aut subpinnatiidis, scapo ad apicem involucroque parcè subtomentosis. — ad Coidilleram del Plauchon legit cl. Née. l'olia 6-7 poll, longa, 3-4 Jin. lala. (v. s.)

13. A. ScORzoNERIE , caule simplici aut vix ramoso hirio i-cepha'o folios, ofoliis elongalo-lauceolatis acuminatis hispidis grosse inciso-deutalis, suinmis augustinibus iulegerriuib, iny.ol. squamis tlorsø dense et longè hispidis margine scariosis. *If* in fruticelis collium ad Quillota Chileusium legit cl. Bertero. Hypochajris sonchoides Bert! in litt. Vulgo *E^corzonera* Chileibibus dicitur. Afluis 11. chrysanthae. Cor. iuleusè luteac, exteriore dorso purpnrascentes. An ex descr. Seriola taraxacoides Hook, et Am. cooip. t. 3o? Oreophila taraxacoides Don 1. c.hue referenda, sed nullam cum Taraxaco afiinitatem video, (v. s.)

/S. *glabrata*, caule glabro striato FIX sub cupitulo hispido, *Foliis* glabris, invol. hispido. *If* in pratis saxosis montis la Leona legit cl. Btfriero. (v. s.)

y. *ramosa*, canle ramoso basi bispidulo superne glabro, foliis superne hispidis subiùs glabris. *If* ad Valparaiso (Abadia !) (v. s.)

14> A. APARcioDEs , caule ramoso glabro aut spât sè hispido , raiuis sub capitulo hispidulis, foliis radicalibus hispidulis elongato-lanceojatis pinnatiidis, lobis acuminatis oblusis.. suminis linearibus integerrimiis, iuvol. .squamis nigri-canibus hispidulis liuearibus obtusis seu subacumiatis. % in agti Chilensis rnpestribus(Pcepp!), circa Quillota (ttert!), Conceptions urbem (d'Urville !), "Valparaiso (H. et A.). Hypochwris apargioides Hook, el Arh. Lot. Beech. 1. p. 28. Seriola apargioides H. et Am. coipp. !* p. 3i. Hyp. Berteii Colla mem. acad. tur. 38. p. 38. t. 33. Hypoch. rupeAris Pcepp! pi. exs. 1*28. Habilus OporinaB.auluuiialis et etiam flor. autnmno. Vulgò Chilensibns *Scorzonera* dicitur. Fortè species dnæ hie latent ex invol. squamis distinguentiaj.

a. caule glabro. — Oreophila apargioides Don phii. ma^ 183J. aju- t*»

(v. s.)

/i. caole*hispido. — Orcoj>hiña picroides Don 1. <

A. PETtor.ARis, caule sub i-cephalct glabro vcl piloso. K*

plòve longiore, foliis jadicalibas binuato-dentatis glabris, peliolis gracibus li,mbo longioibus, iu\oluen glabti squaniis lineaii-lanceolatis, intium» acnmi uatis. —ad Buenos-Ayres beiola petiolaru. Hook, et Ain. conip. i. i>. Jo "An vera Seriolo: species?

16. A ARENARICS, caule uiioso folhsque hispidnlis subscjuamoso -pinnatifidis , radirali*U* minus piofande jncibis, invol. piloso —m iusnl Maclovianu. sea baLLandianib. Hypodiajiis aienana Gaudich. aun. &c. uat. 5 p. ioi Co.t ign.
17. A. SONCHOIDES, glabei, scapo sohtaiio i-cephalo bracteato Mipeine incus salo foliis brevioie, foliis laihcalibus lauccolalis aculis iu peliolum decuuentibus supeme dentaus», m\ol. squama Imeaibus, exter. obtusis, lecept p*ei* lejs tiifidis. *If* ill com alii Quitensi juxtà raoultm ignivomum Piohioha HypocbaeiIs sonchoides H li et Knntb now ijen. am. 4. p. 2. t. ioi. lappu& ieb-silis plumosub.
18. A. SILSSIMILORUS , acaulis glabei, foliib linear-i-lanccolatis giosj>e et lemote dentalis, capitulo iohtauo sessili oblongo, iuvoJ squ.nnii, apice membiduacis subt'renuldtis, iec. paltis indivisjs acuminato-ai'statis *If*, in conxalli Qui-tensium juxtà montem ignivoiunui Picbimba. Hypochcdns sessilifloia H B. et KuDtb nov. gen. am. 4 p. 2., Oieophila sessiliiloia Dou in tians. linn, sor iG p. 17K Cor. ut puoris llava glabra.

-j- Species excluur.

A. BALBISII Horn = Hypocbaeris **Balbisi**.

A» R ADI CAT us Scop. z=:Hypocbaeiis ladicata.

A. ROSEUS Less. = Piaaropappus rot>eu>.

DCCXCIV. SEhlOLA Linn gen. n. 917. Gcrttn. fr 2. p. ^70. t i5(j. Less, syn p. 1J0. —Achyrophorus Faill act. acad.se par. 1721 nonScop.— Pip-topogon et Seiiola Cass diet 48./>. 504 et5o>] —Seiiola et Rodigae sp. Spr. — Seriola ct Agenoia Don in Edinb phil.journ. 1829 p. 78 et m hnnctd ihJo. Utt.p 144.

Capitulum multifloium. Invol. subcylculatum. Recept. paleis membra naceis inter floies instructum Achsema cylindracea Jongè rostrata submuriculata , omuia conformia. Pappus i-j>eriaus, selisangubtè scini-lanceoldto-lineanbus plumosis , plumulis hmc inde deciduis. ~ Herbae regiones Meditenaneas habitautes, magis miniisve hirbiilje. Caule^nudi lamosi. Flo res lute'L.

1. S. ZETHNENSIS (Linn. sp. 1139), caule bnbndo raraoso glabriu&cnlo, foliis radicalibiib obovatib integns aut dentatis plus minus birtis, caulinis paucib p*aiy*U oblongis. Iine*4iibuj*ve integerumis , invol s.squamis doit,o birtis. *pjj* in agiis cultij. et aspeiii region Mediteri. neiupe in GallipioMiiciä, agio Ni-caeensi, Liguna, Italia, Sicilia, Hispania aastr. Barbana, Coibica, Aicbi-pe-lago, Armenia, inont. Athone, etc. Jacq. obs. 4. p. 3 t. 79. Lam. ill. 1. 6'J6. f. 1. S. urens Aii. ped. n. 85i. t. 29. f. 1 non Linn S bispidaMosncb. (\. \ ets.)
2. S. CAFTLNSIS (Linn sp 11 Jo)» ^{caa* e} ^u)*^{1!0^0} paice lamoso glabio, folus ia-dicalibui* mncinatis utiinque hut is, caulinis paacis lincanbns integei 1 inus, m |o|. setii bitrido Of in Gretå (Linn.), Melita ad maigines viarum (d'Uiv), Za-ciuholo (Marg.!), Sicilià prope Panorinum in paj>cuis montosis (Gnss.O Biv. -t lar. sic man. 4 p. x5 t. f). S. uiens Liun. s. nig³ d'Urv. en urn arch, u 757. an S. mbesceus Tineo pi. rar. sic. 1. p. 21 ? Hieiacum , etc. Cup* paup ed lion. t. ii6. (v. s.)

[^] glabrata (Oa&>. pi. rar. 33i)', foffis ^labiiosculi., mvol aiachnoidro t • nc¢ibus bine inde ~~stOM~~* % in Calahuà* dieuosis niaiitiuus

3. *S.j.mviQkTK* (Lino. jp 1189), caule nudo paice ramoso glabio, foliis radicibus obovalo-oblongh dentatis acentiuseulis basi attenuatè glabris, invol subbisciali glabro, squamis ext. lineaiibꝫ pan is. *If* in rupestribus Itaibaride, Sicilisc. Deif. fl. all. 2. p. 237. l. 216. Yahl symb. 2. p. 90. Rodigia kvgata Spieng. neu entd. 1. p. 27*). Piptopogon decipiens Cass. diet. 48. p. 607. Agenord Don 11. cc. Tnvol squarne et peduncul. apices omninò glabri. Achaeonia oninia muriculata bie viler rostrata. Plruulae se tar urn pappi decfdua». (v. s-)
- & > *glanca*, foliis glabris, squamis invol. doiso sen's alhis rigidis scabu's. % m Sicilia. S. glanc.i Tineo pug pi. rar. MC I. p. 19. Schrank in florà 18iq. p. 388. Hypochaerih glaura Presl del. prag. p. 114. Hieraciam chondilloides, etc. Cup ed Bon. t. 137. (v. &)
- y? *albicans*, foliis obovalii suboblongis bi&pjdis, m\ol. squamis pilis nigrii dorso hispidis *If*, in Sicilice monnbus (Guss.!) et fissuris rupiuru Tuneti (Vabl.) » albicans Tineo pi. iic. rar. pug. 1. p. 20. S. aliiata Biv. pi. sic cent. 1. n. S7. t 7. ex specim. Guss. Hypochaeiis albicans Ucna ex Gnss. (v. s.)
4. S. DEPRESS* (Viv. app. alt. fl. cors. (1830) p. 4» ann. st. nat. bol. 4. p. 235), setuloMj-hispida, folijs obovato-dentalis dentatoque runcinatib, canle ramoso depresso, raruìi. patentibus i-cephalii, invol ietaloio-pnngentibus, achaemis oinnibut rostmitis, pappi setis plmmosis basi dilatatis. — in Corsicâ anstr. et Saubuiâ. S. urens 'Viv. prod, fl cors. excl. syn. exipo. An foite S. jEtnensis var. ?
5. S' BRASIT.IENSIS (Less.! &yn. i3i), r^dice fnsifoirui, oanle siinplici erecto >>bbglabro apice paniclato - dicholotno , foliis glabnusculis , inferioribns sea.silibus obovato -lanceolalis bisi attenuatis superne dentatis, snper. lempitis amplexicanibus piñnatiiidi; saepè ciliatis, invol. cylindraceo mibricate hispido , achaemis longè iostidUs Ditidjs muucnlatis. — in Brasilia ad Rio PaquaqHT Rio Pardo , et fietnm Sanctœ-Catbarinae. Porcellites Crasjliensis Lew. in linnaea i8ii. p io3. An S. Biasiliensis Hook, et Am. com p. 1. p. 3 t. omninò eadem, dûra S. Tweedii eorurndeincl. auct. esset nostra S. Brasilien sis? (v. s. couim. à mns. reg. berol. et à cL Gaudich)
- 6* S.? ITCAIRIA (Hook et Am. romp. 2. p. 42), tota tomento decidno cancscens, canle sirnpliri i-ceplialo, foliis radicalibus anguste lineaiibus subnlalo-pungen- thui subiessilibus, extetionbos iutegenimib, intimis pinnatifidis segmentis reiiiotis lincaribus bre\ ibus, invol. squamis laoceolatU acuminatis-. (fl ad S. Ju. • lianum Ainei. anstidlioii.

"|- *Species exclusa.*

- S. ANBIN\ Poepp = Achyrophorns Andinns.
 f. APARfioiDEs H.,et Am. = Achyrophorus apárgioides
 S. CÓMIUTATA Ces:s = Rodigia conirantata.
 S. CRBTENSIS Desf. =: Acbyrophoiousoxyodontus.
 8. TARAX&COIDES Lois. = Robertid taiaxacoiiks-s
 S. UMIFLORA Biv. r= Robertia taraxacoides.
 S. TENUIPOLIA H. et Aril. = Acbyrophorns lenuifolins
 S. TARAXVCOIDFS H.'et Am. = Acbyrophoious Scorzoneinc
 S. pETiotARis H. et Am. = Achyrophorns petlolaris.

DCCXCV. ROBERTIA DC.fl.fr. 5.p. 453. Cass.dict.i5. p. 64 III 48./?. 433
Guss.pl. rar. 330. Less. syn. I3I non Meratnec Scop. (1). — Seriolae sp. *Lois.*
Biv. —Robeitaisp. *Spreng.*

Gapitulum multiflornm. In vol. i-serialc. Recept. paleis membr»-

(1) Robertia Mer. =r Eranthis — Robertia Scop. = SideroxUi sp. ex Jwss die*
 »(nat 45 p 504.

naceis inter flores instructum. Achaenium teres sulcis paucis erratum laeve brevissimè attenuato-rostratum. Pappus i-serialis, setis angustè semi-lanceolato-linearibus plumosis. —Herba glabra reg. Mediterraneae incola, babilu Thrincias referens, subacaulis. Folia radicalia runcinato-pinnatifida, lobis integris, terminali submajore. Scapi plures nudi i-cepbali foliis duplò longiores. Flores citrini—Genus à cl. Richard subodoiatum, affine Seriolae, sed achacnio suberostri el in vol. seriali diversum.

- i. R. TARAXACOIDES (DC. 1. c). % in rupestribus editiorum montium Corsica (Rob.! Req.! Salzm! Tbom.! Rob.!), Sardinia? (Thoin.! Moris!), Liguriae orientals (Bertol.!), Sicilian in regione sterili montis Ethna? (Scboaw! Biv.), Samnii et Aprotii (Guss.!). Variat ex Guss. foliis scapisque ciliato-bispidis. Seriola UDiflora Bivon. pL sic. cent. i. n. 55. Seriola taraxacoides Lois. fl. gall. 53o. t. 18. Hieracium ^ihnense, etc. Cup h. catb. 96. panpb. sic. 2. t. 190.
(T. S.)

ft, tricholcena, involaco bispido. % tab. cum var. priore. R. taraxacoides £. hirta Duby! bot. gall. Folia et scapi gl a be mìni. (v. s.)

-j- *Species exclusa.*

R. PiNNATIADA Spreng. = Achyropboias pinnatifidns.

DCCXCVJ. METABASIS.

Capit. multiflorum. In vol. biseriale squamellis paucis calycnlatum, squamis acuminatis dorso spinellosis. Recept. paleis tenuibus scarifisis inter flores onustum. Achaenia linearis-teretiuscula, radii breviter, disci longè rostrata. Pappus T-serialis, radii squiamellosus brevissimus, disci elongatus plumosus. —Herba Robertise facie. Folia pleraque radicalia Lirtella runcinato-pinnatifida, lobis ncutis, sinubus obtusis. Caules à basi ramosi glabri subnudi apice i-cephali. Flores lutei, exter. Subtiis rubentes. —Genus medium inter Roberliam et Phalacrocerim et à priore ad posterius transitum faciens, unde nomen (*/unat.fiaa-ic, transitus.*)

1. M. HIMETTIJA. % ? in Atticae monte Hymelto detexit cl. Aucher-Eloy ! Hypochaaris pinnatilida Aach.! pi. exs. n. 3354 non Cyr. (v. s. à cl. inv.)

DCCXCVII. PHALACRODERIS.

Capit. multiflorum. Invol. biseriale, squamis acuminatis, ext. brevioribus laxiusculis, int. duplò longioribus subconcavis. Recept. paleis linearibus membranaceis invol. Jongitudinem aiquanlibus onustum. Achaenia linearis leretiuscula glabra in collum clongatuin apicem callousum producta. Pappus subnullus, paleolis nempè minimis in coronulum subconcretis. — Herba Arcipelagicannua erecta aut subdfl'usa. Folia inferiora petiolata pinnalitida, lobis acuminatis, termini majore; caulina paucasessilia, nunc pinnatifida, nunc basi dentata. Raiyi florid! elongati nudi i-cepbali. Cor. flavie. JDVOI. setoso-hispida. — Nonicuex QctxctKpot calvus et <phi> collum, ob uchaenium longè rostratum et primi fronte omnino calvum.

1. P. Cox. (1) in summis montibus insulae Cox legit cl. d'Urville sed in ejus eum, non tutò agnoscerem queo. Crepis seu Barkhausia d'Urv. ! pi. exs. 1820 et ideò fortè Crepis foetida var. Cox d'Urv. eum. n. 754. Herba foliis ad Barkhausiam foetidam sabacedens, seelfruclificatione omnino abeatborrens. (v. s., flomni. à cl. iuv.)

Subtrib. V. RODIGIEM.

Recept. paleaceum. Pappus pilosus scaber.

DCCXCVIII. RODIGIA. Spreng. neu. entd. i. p. 273. excl sp. secund. — Seriolae sp. Less. ^

Capitulum multiflorum. Invol. imbricato - calyculatum , squamis nempè exterioribus biseriatis brevibus, adultis patulis. Recept. paieis membranaceis inter flores insluctum. Achaenia teretiuscula iaevia, radii breviler, disci longe' stipitata. Pappus 1-2-serialis con form is pilosus albissimus nee pluriosus nee im6 dentatus. — Herba regionis Archipelagic&incola, raniosa, pilosa aut culta glabra. Folia radicalia runcinata Jobo terminali majore dentalo, caulina amplexicaulia basi pinnatifida. Kami florales nudi teretes i-cephali. Invol. hispidum. Flores lutei. — Habitus omnino Seriola sed pappus pilosus, Barkbausiae sed recept. paleaceum.

1. R. COMMUTATA (Spreng. 1. c). (*jj* in iusulis man's Ionii Spreng. syst. 3. p. 654 <*xd syn. et habit, hie non relatis. Seriola coiumatata Less. syn. I3I. (v. v. in h. genev.)

¶ *Species exclusa.*

R. L^{AE}VIGATA Spreng. = Seriola laevigata.

Dicitu XCIX. AMMOGETON Schrad. ind. sent. k. gectt. 1833. p. i. et in linncea lite. 1835. p. 69.

Capitulum multiflorum. Invol. imbricatum 3-4-seriale. Recept. paieis linear-lanceolatis acuminatis inter flores instructum. Achaenia ob-compressa glabra laivia, radierostrata, disci brevissimeetercrassè rostrata. Pappus pluriserialis albus setis subscabris. — Herba Boreali-Americanana, except, involucro glabra, perennis, acaulis. Folia radicalia linear-lanceolata elongata utrinque attenuata integerrima, nervo medio compplanata et ferè trinervulata. Scapi foliis aequales teretes nudi. Invol. basi praecipue albo-lanuginosum. Flores lutei.

1. A. scORNERiEFOLiDM (Schrad.I 1. c). If, in Americā boreal! arctica (verisim. ex nomine) in arenosis. Folia 7-8 poll, longa, 3-io lin. lata. (v. s. c. comm. à cl. Schrader.)

CCCC. PACHYLEPIS Less. syn. i3\$. — Slerolepis Monn. ess. kier. p. Sit. k.f. D. non Cass. — Hieracii sp. Linn,

Capit. multiflorum. Invol. ovato-subglobosum, squamissubimbricatis rigidis carinatis postanthesin conniventibus. Recept. planum paleaceum. Achaenia gibberoso-incurvata compressiuscula brviler rostrata, exteriore calva truncate extiis striala inliis unialata, interiors longitudin-literet transversè striata. Pappus pluriserialis albus mollis subdenticulatus. — Herba Boreali-Americanana erecta polycephala. Folia sessilia lanceolata serrata. Capitula subumbellata. Cor. luteae. — Accedit ex achaeiiis ext. inliis i-alatis. ad Pterothecani, ex formâ fructus ad Nemanchenem , ex recept. paieis ad Rodigiam.

1. P. KALMII (Less. 1. c) (*i*) in Americā boreal! ex Linn, sed nnperiores nullam stirpemdescr. Linn, convenientem reperiunt (Parsh.). Hieracium Kalmii Linn. 1. c'sp. ! i'30 non Symons. Sclerolepis Kalmii Monn. 1. c.

DCCCI. PINAROPAPPUS Less. sp. H3.

Gapituluin multiflorum. Invol. ovatum, squamis imbricatis apice pb--
tusiusculis latè scariosis. Recept. paleis scariosis inler flores on us turn,
fchaenia oblonga glabra rosloachaenio longiore superata. Pappus pili-
^ mis sordid us vix scaber pluriserialis.—Herba glabra glaucescens
Mexicana Achyrophori facie. Gaulis simplex aut parcè ramosus, sub-
aphyllus aut folia linearia sparsa gerens. Folia infima pinnatifido-den-
tatn, caetera lancolato-liiaria integerrima. Capitula ad apices caulis
aut ramoruni solitaria. Cor. roseae.

x. P. ROSEUS (Less. &yn. 143). % in Mexico (Alam.! Mair.!), propè Toloccam
(A.ndr.!), in graminosis propè Jalapam et in Serro Colorado (Less.). Achyro-
phorus roseus Less, in linnaea*t* 1830. p. i33. (Y. S.)

Subtrib. VI. SCORZOTSEREJE Less. syn. 131. *Don in linnad* 1831. litt.p. | 3g.
— Lactuceae, Scorzonereae verse *Cass. opusc.* 3. p. 4^— Urospermeas,
Tragopogones, Piciidea et Leontodontese *Schultz anti, sc. nat.* 1835.
p. 3oi.

Recept. epalaceum. Pappus paleolatus, paleolis angustissimè semilanceola-
tis, saltern interioiibus et in aclaeniis interioribus plumosis, rarissimè om-
nibus scabris. — Herbae floribus flavis aut rarissimè purpureis.

DCCCII. THRINCIA Roth cat. |p.c®' DC.fl.fr. ed. 3. <v. t*.p. 5i. — **C** ^iom
Roth in Ram. arch. i. p. 3>j. — Leontocionis sp. Linn. — HyosenH sp.
AIL Sm.

Gapit. multiflorum. Invol. obi on gum aut campanulatum uniseriale
squamis accessoriis basrauctum. Recept. nudum. Achaenia rostrata ,
rostro nunc brevi continuo nunc in floribus centralibus elongate Pap-
pus radii brevis squamellosus aut coroniformis, disci biserialis setis
exter. paucisbrevis subpilosus, inter, longioribus plumosis. — Herbae
plerapque Enropeae, acaules, pilis simplicibus furcatisve plus mintus hispi-
dae. Folia rafdicalia lanceolata, integra sinuata aut pinnatifida. Scapi i-ce-
pbali. Flores lutei.

Sect. i. EUTHRINCIA.

Achaenia disci apice potius breviter attenaata nee sensim rostrata, radii ferè
omnino' erostria.

i. T. HIRTA (DC. fl. fr. ed 3. n. 2965 non Roth.), foliis lanceolatis sinuato-den-
tatis birtellis, pilis simplicibus aut vix apice bifurcatis, invol. campauulato sea-
poque glabriuscule, squamis 10-12 accessoriis aucto. If in aridis erat agrorum
marginis in Mnropâ feie totâ. Reichenb. fl. excurs. 1. p. 181. f. pi. crit. *8.
I. 994. Gaud. fl. helv. 5. p. 50. Leontodon hirtum Linn. sp. 1123. Curt. fl.
lond. a. 1.160. Hedypnois hirta Smith, fl. brit. 1. p. 8^4. Sow. engl. hot. t. 550.
Uyoseris hirta Ga?rttn. fr. a. p. 375. Hyoseris taraxacoides Lam. diet. 3. p. 1*59.
— C. Bauh. prod. p. 63. ic. Radix praemorsa fibris snbfasciculatis tereibos in-
structa. (v. s.)

j psilocalyx, involaco omnino' glabro. —Thr. nadicalyx Lag. elench.
n. 316. Thrinia psilocalyx RHchenb. ic. pi. crit. n. 995. Leontodon psi-
lucalyx Merat ann. sc. nat. 12. p. 106. (v. 5.)

y? arenaria, glabra aut pilis rarib simplicibus hinc inde hispidnla, foliis snhfr
integerrimis ant dentatO'sinuatis, scapia involucrisqne glabris. % in are-
nosis maritirois Galliaeoccid. ab agro Nannetensi ad Hispaniam , frequens
ex cl. Dufour in arenis agri Syrtici prope A reach on. Thr. laevis Lag. sp.

- nov. n. 315. *Leontodon hasile* fi arenarim Duby! bot. gall. i. p. 308*
Achania exter. Isevia, interiora muriculata, extinia ex more generis
 papo abortiva. An forte species propria P (v. v. et s.)
2. T. *HISPIDA* (Roth cat. i. p. 99), foliis lanceolatis obtusis sinnnto-dentatis pilis Q-3-furcatis hispidis, scapis adseendentibus pilosinsculis, invol. campanula hispidulo sqnainis 10-12 accessory's aucto. O ^{tu} arenosis et lapidosis EurojH ferè lotius. DC. fl. fr. n. 29(16. Reicheub. fl. exc. 1. p. 261. ic. pi. crit. t/ff ti. 995. Hyoseris taraxacoides Vill. dauph. 3. p. 166. t. 25. Colobiuin hispidum Roth in Rcem. arch. 1. p. 38. Rhagadiolus taraxacoides All. ped. n. 836. Leontodon saxatile Lam. diet. 3. p. 53i. Thrincia hirta /3 crassa Richt. lips. Thr. taraxacoides et Gaud. fl. helv. 5. p. 49* lariat ut prior, cui simillima, invol. rariū glabro. Differt tan turn radice annua nee perenni. (v. v. et s.)
3. T. *LEYSSERI* (Wallr. sched. crit. 44i)» foliis oblongo-lanceolatis ntrinqne pilis apice bifurcatis parcè hispidis, scapis basi subhirtis cscjuamosis, invol. cylindricosubhirlello,squamis6-8 accessoriis aucto. %. in pascuis et pratis udis Germania; ferè totius et Helvetia? "Valdensis. Reichenb. icon. pi. crit. n. et t. 747. Thrincia hirta Roth cat. bot. 1. p. 98. Spreng. et Willd. excl. syn. plur. Apargia hirta Schkuhr handb. t. 110. opt. Leontodon hirtum Leyss. fl. hal. 191 uon Linn. Leontodon hispidum Poll. pal. 2. p. 382. Thrincia glabra Schleich.! pi. exs. T. taraxacoides var. /‡ Gaud. fl. helv. 5. p. 49. An forte Thr. be vis Lag. elench. p. 24. n. 315. ? (v. s.)

Sect. 11. STRECKERA. — *Sireckera Schultz* in ann. sc. nat, i835.
 p. 302.

Flojam disci achaenia in rostrum elongatura gracile prod net a, radii breviūs sed tamenrodistinctè rostrata.

4. T. *TUBEROSEA* (DC. fl. fr. ed. 3. n. 2967), radice grnmoso-fasciculatā, foliis runcinatis hirtellis, pilis apice bifurcatis, scapo glabriuscubl ebractato , invol. basi hispidulo, achaeniis omnibus in rostrum gracile productis, rostro radii achaenio breviore, disci ei aequali. % in agris subarenosis reg. Mediterraneae, in Mauritaniā (Desf.), Lusitaniā (Brot.), Occitanīa!, Galloprovinciā (Ger.), agro Nicaeensi (All.), Etrusco (Pers.), Romano (Schouw !), Sardiniā, Siciliā (Guss.), Istriā (Reiclib.), Dalmatiā (h. Boiss.!), ad mare Adriaticuin (Host.) , in Archipelago |Linn.) , Zaciutho (Marg.!) , etc. Leontodon tuberosum linn. sp. | ia3. Apargia .tuberosa Willd. sp. 3. p. 530. Thr. grmnosa Brot. fl. lus. 1. p. 3*5. Picris tuberosa All. ped. n. 763. Apargia bulbosa Balb. misc. in mem. ac. tur. i8ott. p. 224. —Lob. ic. t. a32. f. 1. Achaenia radii breviūs rostrata pappo brevissimosubsqiiamellato coronata, disci longiùsrostrata pappo i-ser. plumoso, omnia striata tenuissimè muriculata. Apargia lyrata Ten. fl. neap. prod. p. 46 est hnjas in era varietas foliis rnncinato pinnatifidis, lobis remotis dentatis, teste ipsissimo Teu.insyll. p. 395. Variat invol. et foliis hispidissimis aut glabriiusculis, foliis minūs incisis, etc. (v. s.)

/S. *Oliverii*, foliis latioribus raagis utrinqne hirtellis, invol. ad apicem usque hirsuto, capitulis majoribus. If in iusulā Scioleg. cl. Olivier et Bruguière. (v..sO

5. T. *MAROCCAICA* (Pers. enh. a. p. 308), hispida pilis spars is simplicibns aut apice bifid is, foliis petiolatis lanceolatis sinuato-dentatis, scàpis folia paulò superantibus, invol.squamis ext. linearibushirrellis, interioribus triplò lougioribus concavis glabriusculis, achaeniis muricatis radii breviter, disci longē rostra tis. (Tj in montosis aridis regni IVlaroccani adMogador(Brouss!), ad Mequenesiam (Schousb.), in agro Tingitano (Salzin.!). Hyoseris hispida Schousb. maroc 197- Willd. sp. 3. p. 1614. Thrincia Mauritanica Spreng. syst. 3. p. 666. Radix subfusifoliois parce fibrillosa nee fasciculata. Corolla: exter. sub (üs fuscsc villosx, interiores ad apicem tubi pilosae. (v. s.)

- C. T. *NUDICAULIS* (Lowe! prim. fl. mad. u. 47), hispida pilis simplicibus aut apice bifidin, foliis breviter petiolalis lanceolatis dentatis, dentibns baseos pro-

furu Horibus acutioribus, scapis pi u rib us folia duplō superantibus vix basi hispidulis caeteriu glabris teretibus , iivol. bispidis, squamis accessoriis, vix ullis, achaeniis radii laeviusculis breviter rostratis, disci hubmuricatis longius rostral. (T) in Maderx* apricis freqnens. Affinis T. Maroccanae. An Thr. pygmxa Pers. ench. n. 5. qux Hyoseris pygmaea Ait. kew. 3. p. i3o. eliam è Madera orta,.huc referenda? (v. s. comm. à cl. Lowe.)

DCCCIII.KALBFUSSrA *Schuiuann.sc.nat.* i83fl. i.^378. *etflora\W\$.p.* 7a3.

Capitulum multiflorum. Invol. uniseriale squamis nonnullis arcessoriis basi aucliim. Recept. favosuin nuduin. Achaenia tcretia tuberculato-muricata, radii erostria apice nuda, disci in rostrum breve continuum producta. Pappus radii o , disci duplex, exterior minimus squamellosus, interior constans paleis io basi scarioso-dilatatis caeteriin plumosis. — Herbae reg. Mediterraneae incolae. Folia radicalia oblonga glabriuscula-dentata. Scapi foliis duplō longiores giabri ramosi, ramis i-cephalis apice parcē squamellosis. Flores flavi. Invol. squama? dorso pilosulae. — Genus affine ex caracleribus Thrinaciac, ex habili Oporiniae.

- i. K. SALMANNI (Scbnltz ll. cc.1, foliis obversè lanceolatis sinuato-fleasantis aut pinnaliidis dentibas lobisve pluriuis aactis, invol. glaberrimo., achaiaiis radii iis disci triplō brevioribus apiceni versus latioibus truncatis. (Y)? in Mauritania; vineis circà Tanger legit cl. Salznann. Apargia verna Salzm.! in litt. i8^5. Delil. ind. sem. b. raousp. i836. (v. s.)
- a. K. MULLERI (Scbullzll. cc.), foliis obversè Hneari-lanceolatis subinlegris ant supernè.snu nno alterove lougo plus minus inciiis, lobis obtusis, invol. squamis ad marginem furfuraceo-pubescentibus, achaeniis radiis disci duplō Brevioribus apice vald^e attenuatis. — in Sardinia.

DCCCIT. LEONTODON *Juss. gen.* 170. *DC.fl.fr. ed.* 3. *v. A.* p. 53. *Cass.dict.* 25.p. 65. 27. p. 1. *Less. syn.* x3i excl. hinc inde spec. — *Antodon Neck. elem.* 1.p. 58. — *Yirea Adans.fam.wi.GcBrtn.fr.* 2.p. 3x5. t. x5g.f. 3. — *Apargiae* sp. Schreb. JVilld. non Less. — Leontodontis sp. Linn. Koch. — *Yirea et Apurgia Scop.* — *Dentis-konis* sp. Tourn. — Taraxacoides VailL

Capit. muhiflorum. Invol. subimbricalum, squamis nempē exterio-ibus brcvioribus i-5-seriatis. Recept. nuduin punctatum aul in centro fimbriiferum. Achaenia teretia striata transversè ruguloso-muricata inter se conformia breviter rostrata, rostro continuo sensim attenuato. Pappus biserialis, setis exterioribus brcvioribus pilifornibus paucis, interioribus plumosis basi scarioso dilatatis. — Herbae pleraequc Euro-peac, acaules. Folia ad collum rosulata, dcntata aut pinuatiida. Scapi siin pi ices i-cephali. Pill folio rum et scaporum simplices aut apice 2-5-furcali. Flores lutei.

- 1. L. SQUAMOSUM (Lam. diet. 3. p. 629. DC. fl. fr. 4- n. 1969 non Stev.), g)abruui autpilis sparsis simplicibus birtellum, foliis radicabbus lanceolatis dentatis, scapo foliis longiore squamis parvis apice instrncto, invol. pilis nigris et interdūm vilK) albido subbirtis, acbainiis breviter rostratis, pappo subuniseriali. % in pascuis montanis el alpinis Europac ferè tolius. Leonodon alpinus Jacq. fl. anstr. t. g3. Reicheob. fl. exc. 1. p. a5i. Leontodon Pyrenaienm Gouan ill. p. 55. t. 22. f. T. 2. Picris saxatilis All. ped. n. 766. t. 14. f. 4. Hedypnois Pyrenaica Till. fl. dauph. 3. p. 78. Apargia alpina Willd. sp. 3. p. i547- HoPP^e in Sturm deutscb flor. ic. opt. —Hue etiam Bed vix var. dicendae Leontodon Gouani Schleich. cat.. 1821 et L. crepidifonne Lam. diet. 3. p. 53o. Pappus ferè semper i-serialis plnmosns exacte nt in Millina, rarius selulis 1-2 siniplicibus parvis extus stipatus, inde species media inter Leontodon et Millinam, priori potius adnumeranda ob achaenia brevius rostral. "Variat foliis subhispidis e(tuuc videtur L. Helveticum Merataun. sc. nat. 22. p. xo8. (v. v. et 9.)" *

- a. L. CROCEUM (HaBnk. ia Jacq. coll. 2. p. 16), radice praemorsâ, foliis radicalibus glabris lanceolatis runcinatis, scapo i-cephalo apice sobincrassato parcè squamoso involucroqne pilisnigrishispido. % in Styriae alpibus Judenbergensibns et in monte Buldo (Poll.). L. crocens Reich. fl. exc. x. p. ^52. Apargia crocea Poll. ver. 2. p. 565. t. 2. f. 8. Cor. croceo-aurantiacae. An à L. sqaamoso satis diffart? (v. s. in h. Boiss.) *
- fc. aurantiacum (Kit. in Reichenb. fl. exc. 1. p. 25a), foliis dentatis, scapo parciùs sqaamoso aut esquamato. % in Carpathis et ia Alpibus iiaperii Austriaci. Apargia crocea Sturm deutsch. fl. ic.
- y. breviscapum, scapo tereti vix sqaamoso Folia vix superaute. —in montibas Neapolildnis, in Aprutio (Ten.), ad Magellain (Guss.!). Apargia au- rantiaca Tea. syll. 3p2. (v. s.)
3. L. BOREAHE, glibrat, foliis radicalibus angustis linearis-acuminatis vix' sub-denticulatis ant integerrimis, scapo i-cephalo foliis paulò longiore snbadscen- dente, invol. squainis lanceolato-linearibus acuminatis. % ia Asia? boreal i-orient, iusulâ Sitchâ legit Mertens. Apargia borealis Bong. veg. sitch. n. 79. Pappas sordid as neealbus. Folia 6 poll, longu, vix ultrâ lineam lata. Species distincliissima. (v. s. comni. ab hon. acad. petrop.)
4. L. HASTILE (Linn. sp. ri23), oinninò glabrum, foliis radicalibus elongato-lanceolate basi atteuuatis sinuatodeorsùm denlatis, scapo foliis duplò longiore, invol. sqdaraais linearibus nigricantibus snbscabiinscalis aut glabris, achaeniis lhinutè mnricellatis. *!f in humidiusculis Europoe. Apargia bastilis Hoffm. germ. 4. P- 113. Leontodon Danubiale Jacq. austr. t. 164. Piciis Danubiulis AH. ped. n. 768. t. 70. f. 3. 'Virea hastilis Gasrta. fr. 2. p. 305, t. 159. f. 3, Lqntodon proteifoime var. A, B, C. 'Vll. dauph. 3. p. 87. t. i. Apargia D'antibialis Scop. A. livida Motrnch et A. heterophylla Moenck ex Stend. Capitaloïn antè anthesin nutans. An fortè var. glabra L. hispida? (v. v. et s.)
5. L. HISPIDUM (Linn. sp. 1114), foliis radicalibus oblongis lanceolatisve basi at- tennatis sinuato-dentatis pilis apice bifnrcatis hi.spidis, scapo elongato ebracteolato parcè hispidnlo, invol. pilis simplicibus hiriello, achaeniis muricellatis. % in siccis, moutosis, colliniset ericetis Europae. DC. fl. fr. snpl. p. 453. Cart, fl. lond. 1. t. i6r. L. hispida et L. major Merat ann. sc. nat. v. 22. p. 106. Apargia hispida Hoffm. germ. 4. p. 113. Scbkuhr handb. t. aao. Hedypnois hispida Smith fl. brit. 2. p. 8i3. engl. bot. t. 554. Leont. hispidum a. DC. fl. fr. n. 29 2. (v. v. et s.)
- y. *mafus*, foliis pedalibos parciùs hispidis, scapo apice fistuloso turaidulo. 'C ad ripas fluminum. "Var. ad bastile vergens. (v. v. cts.)
- y. *alpestre*, foliis hispidis denlatis, iavolucro pilis albis long is confer t is sim- plicibas bispido. % in montibas regni Neapolitani legit cl. Gussone. "Vm. L. alpinnm referens. (v. s.)
- «T^e eriolcenum, foliis hispidis remotè piunatipartitis, primordialibus glabrius- culis subdentatis, invol. pilis longis albis simplicibus confertis lanato-his- pido. If in apricis moutosis Aprutii. Ap. hispida Ten.! syll. p. 3g3. Folia ferè L. dubii var. >2, sed pili apice 2-3-furcati. (v. s.)
6. L. TENUIFLORDM , foliis radicalibus oblongis subdentatis pube brevi furea to- pubescentibus, scapo foliis multò longiore parcè et breviter pubeiulo bracteolis parvi? snbnlati apice iusfructo, capitnlo oblongo, sq a a in is acuminatis ciliola- tis, achaeois 10-15 muricatis. % in monlibus Helvetian nubricas propè Lugo* num et ad montem S. Salvador legit cl. Thomas (ex n. Boiss.). Apargia tenui- flora Gaud. fl. helv. 6. p. 362. Ap. angustifolia Schleich. pl. exs.? Habitus L. incani sed herba glabrior, L. alpini sed pili furcati, fortè L. hispida var? (v. s.)
7. L. BERINII (Bartl. in florà 1820. p. 34*. Reichenb. fl. exc. i.p. 53. pl.crit. 8. t. 829. n. 1120), foliis subradicalibus cuneato-lanceolatis sinuato-subdentatis snbtis ad a pice in scabriuscalis, scapo siinplici aut bifido ad apice in cum invo- lncro pnbe stellata brevi conferta canescente, invol. squamis linearibus, exte- llioibus subpatulis t achaeniis rnuricellatis vix rostratis. % in agri Forojuliensis arenosis ad ripas fl. Izonzo (Mor.), propè Togliano, Montfalcone (Berini). Apar-

- gia arenaria Moretti ex Reichb. Apargia Berinii Jan ! pi. exs. Ap. canescens Sieb.! pi. exs. Pappus basi rufus, non strictè uuiserialis (ut depictus à cl. Reichenb.) sed setis paucis extùs stipatus. (v. s.)
8. L. INCANUM (DC. fl. fr. ed. 3. n. 2975), foliis lanceolatis acutis subdenticulatis pube stellatà utrinque cauescentibus, scapis glabriusculis folia inultò snperantibus sqaamellasacuuinas paucas gerentibus, iuvol. pilis .siniplicibus pau-
cis subbispiduo. *If* in rupibus collibus niontosis et pratis alpinin à Delphinatn ad Austrian?, in Carinthiâ (Graaf.), Foro-Jilii (Suffr!), Caruioliâ (Scop.), circa Ratisbonam (Hopp!), Muggendorf (Koch !), »tc. Hieracium incanum Liun. syst. 522. Jacq. fl. austr. t. 287. Apargia incana. Scop. earn. ed. 2. n. 982. Sturm dentschl. fl. ic. Leoutodon Alpinum 'Vill. dauph. 3. p. 94. t. 24 non alior. Apargia angustifolia Scblcicb. exs. ex Gaud. fl. helv. 5. p. 56. (v. s.)
9. L. ASPERUM (Reichenb. fl. exc. 1. p. 25a), foliis radicaiibus dentatis runcinatisve pilis rigidis trifurcatis asperis ciliafisque, caule scaposo i-cephalo (ra-riùs bifido 2-cephalo)glabriaenlo striato, invol. sjquamis dot-so pilis siimplici.bns scabridis, achaeniis elongatis a pice scabridis, pappi setis exteffioribus subplu-
mosis. *If* in Hungarian sylvis lapidosis (Kit.), Germaniâ boreali (Reich.) , in Pyrenaeis ad portum "Venasque (DC.!) forlè in. Siciliâ ex specira. Gussoniano subdubio. Apargia aspera W. et Kit. pi. rar. bung. 2. t. 110. Apargia Guestfa-
lira Bonning. ex Reich, (v. s.)
10. L. SAXATILE (Reichenb. fl. germ. exc. 1. p. 25a), foliis linear-oblongi's den-
tato-pinnatifidis dense hispidis pilis brevibus apice. 3-4-furcatis, scapis folia longè superantibus pilis rarissimis pnberulis, invol. piloaiusculis pilis simplici-
bus aut subfurcatis, acbseniis praesertim apice mnricatis. % in apricis montium calcareornra circa Tergestnm (Hopp. Dnby!), in regno Neapolitano (Ten.! Guss.! Schouw!), iusulaCapraea (Ten.lKeyn!), Corsica (Thoni!), Monspelii (Gir.), Graecia (Auch.). Apargia saxatilis Ten.! cat. 1819. p. 59. fl. neap,
t. 7a. Apargia Tergestina Hopp! pi. exs. Hieaciuni,etc. Col. ecphr. 1. p. 24^.
ic (v. s.)
- zi. L. BORTI (Boiss.! ine(f.), foliis radicalibus pinnatifidis, lobisobtusis subinte-
grb, pilij rigidulis conferris apice trifarcatis hispidis , scapis folia superautibus pilis apice 2-3-furcatis birtellis, invol. oblongo glabro, achaeniis laeviusculis longiùs rostratis, pappi setis exter. paucissimis. *If*, in cam pis aridis Sierrae-
NevadiE regni Grauatensis ad allit. 6700-9500 ped. (Boiss.). Apargia hispida Bory flor. Sierrae-Nev. n. i5. Herba pygrasea affinis L. crispo sed distinctis-
sima. Pili foliorum breves conferti, scaporum longiores rainosi. (v. s. a cl.
inv.)
12. L. CRISPUM ("Vill. dauph. 3. p. 8<. t. 25), foliis radicalibus acutè runcinato-
pinnalipartitis, pilis «pice 2-3-furcatis bispidis snbcansenibus, scapo foliis doplò longiore hispidulo, invol. squarnis dorso hispitlis pilis longis subsimpli-
cibus bifurcatisve, achseniis breviler rostratis regulariter tuberculato-m§ricel-
latis. % in asperisaprictis vallium Alpinarum Delphinutiis, Valesiae, Pedemontii.
DC. fl.fr. suppl. p. 454- Apargia crispa Willd. sp. 3. p. 155i. Leontodon hispi-
dum y fl. fr. n. 2972. (v. v. et s.)
- jg. *glabriusculum*. — in valle Alpinâ Sancti-Nicolai. Renter! (v. <. in herb.
Reut.)
13. L. BISTTELLyEFOLIUM , foliis radicalibus basi in petiolum attenuatis oblongis
pinnatifidis pilis apice 2-3-furcatis hirtis, scapis striatis parce strigillosis sim-
plicibusaut rainis; !ilidis, invol. squamis ciliatis dorso pilosis linearibusacumi-
natis, exterioribus apice reenrvis , achaeniis iunricellatis. *If* in'pascuis siccis
Apennini Neapolitani (Ten. !) et Roinani (Mor.!), in Taurisc herbidis (Bieb.
Siev!). Apargia crispa var. macrorhiza Ten.! syll. 394 non Gunth. %pargia Hispanica Bieb. fl. taur. n. 1600 excl. Cav. syn. Andryala lanata Habl. taur.
i55. ex Bieb. Pubescentia accedit ad L. saxatilem, sed inv. squamis ext. longis
lineari-hubulatis subpatulis difYert. (v. s.)
-)<. L. "VILLARSII (Lois. fl. gall- £14), foliis radicalibus «nblinearibus apice dilai-

tis pinnatiparltis lobis subacutis ferè triangularibns pilis rigidis simplicibus birtis, scapo foliis multò longiore glabro, invol. squamis acuniinatis glabris ant secùs lineam dorsalera parcè setosis, acbaeniis laeviuscolis. % in saxosis lapilosisque apiicis Galliae anstralis ab agio Ruscinonensi ad Delphinatum, in Pedemontio etagro Forojuliensi (Reichenb.) DC. fl. fr. suppl. p. 454. L. hirtom "Vill. dauph. 3. p. 82. t. 2.5. Piciis birra All. ped. n. 765. Apargia 'Villaraii' Willd. sp. 3. p. 422. L. bipinnatum ft. fl. fr. n. 2972. (v. v. et s.)

15. L. ROSANI, foliis radicalibus linearis-oblongis dentato-pinnatifidis obtasis pilis pancis rigidulis simplicibus birtellis, scapo glabriusculo sub antbedio puberulo folia multò superantibus, invol. parcè bipinnati squamis exter. lanceolatolinenibus adpressis, acbaeniis m uricatis. % in collibus regni Neapolitani circa Rosano, Ischiâ, Aprutio, etc. Apargia Rosani Ten.! fl. neap. app. 5. p. 26. syll. 394. Gnss.! in litt. An var. L. Villarsii? In specim. quidque à cl. Ten. et Guss. missis pilos si ro pi ices nee glochidiatos video, (v. s.)

ifi. L. TDCIDUM, glaberrimoa, foliis radicalibus?) oblongo-cuneatis obtasis basi attenuatis obtuse pinnatifidis lobo terninali ovato majore, scapo foliis multò longiore stria to sub capitulo parcè bracteolato, invol. squamis lanceolatis margine subscariosis, acbaeniis mucicatis. ^ in sylvalis circa Sarzanam mense jolio florentem legi, effectam in collibus Engaueis à cl. Scbonw recepi. Videtur eadē ac Apargia lucida Ten. cat. h. neap. app. iSrg. p. 71. in Samnioetad Moute-Miletto lecta, sed in ejus prodr. onjissa etiadeò incerta. Dens-leonis, etc. Bonan. ed. Cup. t. 92? Affinis L. Caucasico et dabo sed acbaenia evidenter et densè muricata. (v. v. et s.)

17. L. GAUCASICUM (Fisch. cat. h. gor. 1812. p. 34 non Stev.), foliis radicalibus nincinato-dentatis basi in petiolum attenuatis pilis simplicibus paucisairais subciliatis, scapo glabro foliis multò longiore, invol. squamis extimis subulatis, caeteris lanceolato-linearibus acuminatis parcè subpilosis, achaeniis stria tis non mucicatis. ^ in subalpinis graminosis Caocasi fld niontem Kaischaur (Bieb.) et Kasbeck (Mey.!) Apargia Caucasca Bieb. fl. et suppl. n. 15g8. (v. s.)

18. L. DUBIUM (Reichenb. fl. exc. 1. p. a5a), foliis obovato-lanceolatis dentatis pilosiusculis, pilis paucis apice furea tis, scapo i-cephalo glabriuscule èbracteato, invol. squamis pilis simplicibus hirtellis, achanio breviter rostrato laevi. % in pratis petrosis et arenosis subalpinis Germanise (Hopp.!), Helvetia? (Scbleich!). Apargia dubia Hopp.! in Sturmdeutsi5bl.fl. cum icon. Species vere mibi dubia sub H form is ex specim. autbenticis appetat.

et. foliis dentatis pilosiusculis. — icon Sturmii citata. (v. 8.)

fi. foliis runcinato-pinnatifidir; pilosiusculis. — (v. s.)

y. foliis runcinato-pinnatiidis glabris. — icon. cit. f. 6. (v. s.)

¶ Species non satis no tee.

19. If. IKNUUM (Vis. ill. pi. p. 39. f. 2. sub Apargia), radice exili, foliis radicalibus basi attenuatis late linearibus luncinato-pinnatifitis rariis integris pilis simplicibus supra et margini bispidis, scapo basi hirsuto foliis longiore superne glabro subincrassato squamuoso, invol. hispido. (jj in ^Egypto. Leontodon asperum Forsk. fl.aeg.-ar. i^S?

20. L. SOBLYUATUM (Merat ann. sc. nat. 22. p. 108), foliis lanceolatis basi sinuato-runcinatis, scapo erecto rigido scabro glabro, invol. ferè glabro. — in Galloprovincia. ^ j".

ax. L- TARAXACOIDES (Mer. ann. sc. nat. 22. p. 108), foliis runcinatis pilis brevibus stellatis scabris, scapo glabro anberecto. — in hnnidis Galliae et Hispaniae. Jlerba 3-4-pollic. f.

22. L. ? HYOSEROIDES, foliis runcinatis birris, pilis simplicibus furcatisque, scapo i-cephalo filiformi glabro, invol. 8-pbylo glabriuscule, achaeniis omnibus erostribos pappo plamoso coronatis. — in Belgio. Apargia hyoseroides 'Vest in flora 1820. p. 7 non Seb. Hyoseris taraxacoides Wulfen. An Thrinciae lirata? ex ipso auctore. f.

- a3. L.? HIERAGIOIDES, caule erecto latnoso birlo, foliis oblongo-lanceolatis dentatis hirtis pilis furcatis, pedunculis squamosis. — in Galatia (Willd.), Mcesia inferiore (Spi.). Apargia bieacioides Willd. sp. 3. p. 1554. Spreng. syst. 3. p. 664.
- 24 L DRUMATI (Schiede in Reichenb fl. exc. 1. p. 253), scapo i-cephalo, iavo-lucio basi laxo. — ad Teigestum. Cxt. igu. |.
25. L. PRESLII, caulibus diffasis ramosis glabris, foliis runcinato-pinnatifidis pilosis, Mipenoiibns hnean-oblongis sinuatis amplexicaulibus, pedunculis longis mciabsatis squamosi* glabris, invol. canescenti-pilosus — in Sicibâ Apargia ciliata Prebl fl. sic 1. p. xxxi Caet. ign.
26. L * VARILGATUM, canle suhnndo ramoso basi villosa, foliis radicahbus dentatib marginae et ad venas villosis, caulinis pmnatifidis, invol imbricati squa-nois spbachelatis niargine villo&is. — in Monje-Video Hieraciam variegatnm Lam. diet 2 p. 36i. Apargia v. iriegata Willd. sp J. p. 1553
27. L ? CHILENSE, canle erecto ramoso glabio folioso, foliis glabris radicahbas si-nuato- sea runcinato-pinnatifidib, caulinis pinuatinidii lobis lmeatibus, invol piloso-bispido squamis circ 50 ronstante. If, in regno Quitensi piope pagum Cbillo Apagia Chilensis H. B. et Kuntb nov. gen. am. 4. p. i. Genus ex ipso auctore valde dubiuin. 'J'
- 28 L p CHONDRILL^FOLIUM (Scop earn. ed. 2. p. 37q), scapo squamuoso, foliis lanceolatis giosse dentatis scapo dapho brevionbas pilosiuscuhs, invol glabrusculo. — in Austria littorali 'Vid Thrinciae sp ant var.
29. L ? ctLiATLM (Scop, earn ed 1. 11. 180 51), scapo ramoso glabro, foliis lanceolatis dentatis ad basin lanuginobis maigine breviter ciliatis, invol. glaberrimo. — in Alpibus Vochinensibus. An Thrinciae aut Oponeiae spec?

• ♀ | Species exclusae.

- L. ALPESTRE Tausch. rz Taraxacum alpestre.
- L. ALPINUM GUSS. = Taraxacum Apenninum.
- L. ALFINUM Hopp = Taraxacum laevigatum
- L. ALPINUM Stev. = Taiaxacara Stevenii.
- L. APEWNINUM Ten. = Taraxacum Apenninum.
- L. ARCHATUM Tausch = Taiaxacum lasvigatum ^
- L. AURKDM Linn. = Crepisauiea
- L. AUIUMNALE Linn. z=Oporinia antmunahs.
- L. AUTDMWALE Fl. dan. =Crepis tectoruin (&.
- L. BOREALE Tnrcz. = Taraxacum boreale.
- L. BULBOSUM Linn.zn iEtbeoihiza bulbosa.
- L. CAROLIKIASOM Walt. = Pynbopappus Carohnianna.
- L. CAUCASICUM Bieb =rTaiaxacum Caurasicum
- L. CERATOPHORDM Lcdeb = Taraxacum ceiatopborum.
- L. cxHORAECM Scbléuh = Taraxacum laevigatum
- L. DEITTATUM Linn = Hieraciam piunellaefohum
- L. DENTATUM Tausch. = Taiaxacum palustre.
- L. ERECTUM Hoffm == Taraxacum palustre 0
- L. ERIOPODUM Don = laraxacum enopodium.
- L. ERIOPUS Spreng. =Taraxacum eriopodium.
- L. GI AUCECFNS Reich = Taraxacum glaucescens.
- L. GLAUCESCENS Wall. = Taraxacum Walbchn.
- L. GUSSONI Spreng. = Barkhau&ia barsifolia
- L. HASTXI B /2 Duby. = Thrincla bu ta y.

- L. HIRSDIUM Hook. r= Tarazacnm hirsutum.
 L. fliRTUM Linn. =z Thrinacia hirfa.
 L. HIRTUM Pall. = Thrinacia Leyssqri.
 L. HISPANICUM Mer.= Asterothrix Hispanic/..
 L. HISPIDDM Cav. zz Asterothrix Hispanica.
 L. HISPIDUM Pall. = Thrinacia Leysseri.
 L. HISPIDUM Vand. = Hieracium iutybaceum.
 L. LJEVIGATUM Willd. = Taraxacum kevigatuni.
 L. LANA-TUM Willd. = Scorzonera lanata.
 L. LKUCANTHUM Ledeb. = Taraxacum bicolor.
 I4. LIVIDUM W. et Kit. = Taraxacum palustre <T
 L. LYRATUM Ledeb. = Taraxacum lyratum.
 L. MEDIUM Chaill. = Taraxacum laevigatnin.
 L. MIIVMUM Brig. = Taraxacum laevigatum JS.
 L. MOKTANUM Lam. = Apargia Taraxaci.
 L. MONTANUM Mey. = Taraxacum montanum.
 L. MUCRONATUM Forsk. n: Zollikoferia chondrilloides.
 L. MURICATUM L'Hér. =. Helminthia asplenioides.
 L. MURICATUM for&k. = Zollikoferia chondrilloides.
 L. NIGRICANS W. et Kit. == Taraxacum palustre dT
 L. OBOVATUM "Willd. = Taraxacum obovatum.
 IJ. OFFICINALE With. = Taraxacum Dens-leonis.
 L. PALUSTRE Sm. = Taraxacum palustre.
 L. PARVULUM Wall. z= Taraxacum parvulm.
 L. FINITATIFIDUM Tauscb. = Taraxacum palustre.
 L. rRATENsrs Reichb. = Oporinia pratensis.
 L. FSILOCALYX Mer. = Thrinacia hirta /S.
 L. RADIATUM Lam. = Hyoseris radiata.
 L. RAI GOU. = Taraxacum palustre.
 IJ. SALINUM Ledeb. = ? Taraxacum collinum.
 L. SAXATILK Lara. =:Thrinacia hispida.
 L. SCORZONERA Roth. =n Taraxacum palustre f.
 L. SEROTINUS W. et Kit. =z Taraxacum serotinum.
 L. SINENSIS Lour. = Taraxacum Sinense.
 L. STEVENH Spreng. = Taraxacum Stevenii.
 L. TA&AXACI Lois. = Apargia Taraxaci.
 L. TARAXACONOIDES Raensch. = Taraxacum laevigatuin.
 L. TARAXACUM Linn. = Taraxacum Denb-leonis.
 L. TARAXACUM With. = Taraxacum palustre.
 L. TEKUIFOLIUM Hop.== Taraxacum palastre y.
 IJ. TERGLOVEMSE Hacq. rr: Hieracium hyoseridifolium.
 L. TOMENTOSUM Linn. = Leria albicans.
 L. TUBEROSUM Linn. = Thrinacia tuberosa.
 II. VULGARK Lam. = Taraxacum Dens-leonis>.

DCCCV. APARGIA Less. syn. i3a. non Scop. — Apargiae sp. Wittd. — Leontodontis sp. Lam. — Hieracii sp. Linn. — Fidelia Schuhz in ann. sc. not. 1845. p. 322? — Leontodon sect, a Dens-Ionis Koch syn.

• Capitulum multiflorum. Invol. i-seriale squamis accessoriis paucis basi auctum. Recept. nudum. Achaenia inter se conformatia teretiuscula in rostrum breve continuum subattenuata. Pappus albissimus biserialis, paleis utriusque serie simillimis linearibus plumosis. — Herbae perennes Alpinae. Folia radicalia oblongo-lanceolata sinuato-dentata aut pinnatifida glabriuscula. Scapi saepiis i-cepliali, rariis 2-cephali, apice hirsuti obconici. Invol. hirsutissima. Flores ilavi. — Genus vix a priore diversum et iorsan, praeeunte cl. Koch, ut Leontodontis sectio Itabendum.

1. A. TARAXACI (Willd. sp. 3. p. 1550), scapis i-cephalis vix folio longioribus. *If. in pialis summariu Alpium à Delphinatu ad Austrian! Uieracum Taraxaci Linn. sp. 112.5. Retz obs. 4. p. 30. t. 2. Sturm deatschl. fl. ic. Leontodon Taraxaci Lois. fl. gall. 3i4- Reichenb. ic. pi. crit. 1. p. 2&1. Picris Taraxaci All. ped. n. 769. t. 3x. f. 1. Leontodon iuonlatum Lam. diet. 3. p. 53i. DC. fl. fr. ed. 3. n. '2970. Hedypnois Taraxaci 'Vill dauph. 3. p. 80. t. 26. (v. v. et s.)*
- *&. longiscapa*, foliis angastioribus, scapis folia duplo superantibus 1-2-cephalis. *If in Alpibus speciatim ad Sanctum-Beruarduin (Reyn.!), Icon Apargiae Taraxaci fl. dau. t. 1523 hue. forte aut ad Oporinain pratensem pertinet. (v. s.)*

¶ Species exclusa.

- A. ALPIHA Jacq. zz: Leontodon squamosam.
- A. ANGUSTIFOLIA Scbleich. = Leontodon tenuiflorum.
- A. AWKUA Vis. =: Leontodon annum.
- A. ARBNARIA Mor. = Leontodon Berinii.
- A. ASPKRA W. et Kit. = Leontodon asperum.
- A. AURAXTIACA W. et Kit. zz: Leontodon croceum *Ji.*
- A. AUREA Hop. = Crepis aurea.
- A. AUTUMITALIS Willd. = Opopanax antuinalis.
- A. BOREALIS Bung. = Leontodon boreale.
- A. BULBOSA Balb. = Thrincia tuberosa.
- A. CANESCENS Sieb. = Leontodon Berinii.
- A. CAUCASICA Bieb. = Leontodon Cancabicus.
- A. CHILEMMS Kuutb. = Leontodon Chileuse.
- A. CICHORA KA Cyr. = Millina leontodontoides.
- A. CIUATA Presl. = Leontodon Preslii. *
- A. coRONorFOLIA Willd. zz. Leontodon corouopifoliam.
- A. CRISPA Stend. = Leontodon crispum.
- A. CRISPA MACRORHIZA Ten. = Leontodon bis-jutellaefoliam.
- A. CROCEA Uxnk. = Leontodon croceum.
- A. DANUBIALIS Scop, zz; Leontodon hastile.
- A. DUBIA Hop. = Leontodon dubium.
- A. FASCZCULATA Biv. = Millina leontodontoides.
- A. GUESTFALICA Bonningh. = Leontodon asperum.
- A. HASTILIS Willd. •= Leontodon hastile.
- A. HRThROPBILLA Mocuch. i^ Leontodon ha. tile.

- A. HIKRACIOIDES Willd. = Leontodon hieracioides.
 A. HIRTA Scop. =r Thrincia hirta.
 A. HISPANICA Willd. = Asteiothrix Hispanica.
 A. HISPIDA Willd. =. Leontodon hispidnm.
 A. HYOSEROIDKS Sieb. = Millina hyoseroides.
 A. INCANA Scop. = Leon tod ou incannro.
 A. INCRASSATA Mcencb. = Thrincia hispida.
 A. LJEVIS Moeuch. r= Thrincia hirta.
 A. LUCIDA Ten.=r Leontodon lucidnm.
 A. LTRAIA Ten. z= Thrincia tuberosa.
 A. PAATERS Link. :zzOporinia pratensis.
 A. PYRBNICA Hop. = Leontodon Alpiniu.
 A. ROSANI Ten. = Leontodon Rosani.
 A. SALINA Fl. Wett. = Taraxacum saxatile.
 A. SAXATILiiTen. = Leontodon baxatile.
 A. SETOSA Moenca. = Barkhau&ia setosa.
 A. SIRIGOSA Bieb. = Aaterothrix asperrima.
 A. TARAXACIFLORA 'Vis. = Picris taraxaciflora.
 A. TEHUIFLORA Gaud. = Leontodon tenuifloram..
 A. TERGESTINA Hop. z= Leontodon saxatile.
 A. TUBEROSA Willd. := Thrincia tuberosa.
 A. "VILLARSII Lois. =. Leontodon "Villarsii.
 A. Verna Salzin. = Kalbfassia Salziuanni.

DCCCVI. OPORINIA *Don in Edinb. phil. journ. 1829, ee in linmed ig3o. lite. p. r4r.* — Oporina *Less. syn. i3-i.* — Soorzoneroides *Mcench rneth. 54g.* — Leontodoatii ap. *Linn.* — Apargiae sp. *Willd.* — Leontodontis sect. Opoinia *Koch.*

Capitulum multiflorum. Invol. obconicum uniscriale, squamis Ian- ceolaiis acuminalis accessoriis ad basin plurimis. Rec. nudum. Achae- ia oblonga teretiuscula utrinque subattenuata transversè rugulosa. Pappus i-serialis, setis plumosis sordide albidis imâ basi scarioso-di- latis. — Herbae Europae perennes. Folia radicalia incise dentata aut pinnatifida. Sea pi saepiis ramosi, ramis i-cephalis. Flores lutei. — Ge- nus vix à duo bus prioribus distingueiduin et forte praeunte cl. Koch sectio Leontodontis.

1. O. AUTDMNALIS (Don 1. c.), foliis piunatifidis, involncre glabro aut puberulo. *IL* in pratis et pascnis Enropae eiSiblia; Altaicæ 'Lcdeh.), etiam (eiisiu. introd.) America; borealis. Flor. aug. ad oct. Leontodon autumnale Linn. sp. n a l. Reicbenb. fl. exc. 1. p. a53. Hedypnois autumnujis Huds. angl. 34i? Sow engl. hot. 1 8^0? Apargia auturanalii Hoffm. germ. 4. p. 113. Schkuhr handb. t a^o. Ap. autumnali* var. ct Gaud. fl. helv. 5. p. 59. Picris diitum- nalis All. ped. n. 767. Scorzoneroides autanmabs Moench inelh. 549. Scorzo- neia autumndlis Lam. fl. fr. 1. p. 82.— Fuchs hist. p. 320. ic "Vaiiat invol. gla- briusculo aut Itirtello, foliis glabris ant secin. nervm hirtllis. An Leontod. couturnin Dnmort. fl. belg. prod. 60. hujus yar.? (v. v. et s.)

0. *simplex* (Daby! hot. gall. i.p. 308), sicapo simplici i-cephalo, invol. pilis albis ba&i hispido. If in agris siccis Va&conia'. (v. s.)
 y. *minima*, bcpo digitali simplici i-cephalo, invol. squamis ad a pice m usque albo-villosis. — in pratis humidis Sierras-Nevadac alt. 7-8000 ped. Jcgilcl. Boiwier! (v. s.)

- f. *Alpina* (Gaud. fl. helv. 5. p. 50. Scbleicb.! pi. exs.), scapo simplici i-cepbulo, involucro pilis nigris hispido. *If* in Alpibus ad sammam moatem Fouly (Schl!), etc. Hall. helv. n. 28. £. (v. s.)
- a. O. PRATENSIS (Less. syn. i3a), scapo ramoso, foliis sinuato-dentatis pinnatifidis glabu's, involucro fusco-villoso. *If* in Germaniae prilis ut videtur rara. Apargia pratensis Liukex Less. 1. c. Horn h. baFn. 2. p. 758. Leo u tod on pratensis Reichenb. £1. exc. 1. p. z55. Species genuina mihi planè ignola. f.
- yS? *Beuteri*, scapo bifido sub capitals biilello, foliis glabris dentato-runcinatis, involucro pilis, aliis albis, aliis nigriis, hispido. *If* in Alpibus ad vallis Albae lacum Conibal legit cl. Renter. Scapi folia duplo supe ante. Capitula subcanipanalutn ad basin et ad apices pedicelloium bracteolata. Pappus in in O. aatumnali rufescens pluniosus. An spcies diversa? (v. s. comiu. a cl. inv.)
3. O? HisprDULA, foliis ad coll am rosalatis lanceolatis deutato-pinnatifidis hispidulis deutibus acutis, scapis erectis 1-2-cephalis basi villosis, supra glabris, invol. imbricato hispidulo. (I) in Ægypto secus vias inter Kabiam et Bakatym (Delil. Bové! Coqueb.! Auch!) et ad ripas Euphrati (Chev.). Crepis hispidula Delil. fl. eg. p. 117. t. 42. f. 1. Scorzonera hispidula Spreng. syst. 3. p. t67- Ach.Tma oblonga, Haas verše sulcato-rugosa, per antbesiu vix apice angustala, demiini apice rostrata. Pappus i-seialis plumosus setulis later, deciduis. Invol. variat glabrum puberulum aut valde birsntum. An Millinae sp.? (v. s.)
4. O. MICROCEPHALA. (Boij.s! ined.), glabra, scapo adscendeute simplici apice parcè squamoso, foliis linearibus ant linearis-sublanceolatis vix basi attenuatis, integerrimis aut subdentatis, invol oblongo nigricante glaberrimo. *If* in vallibus et pratis haraidis regionis supremae jugi Granatensis Sieira Nevada dicti legit cl. Boissie! Oiuninò afdnis Leontod. squamoso sed invol. multd magis angustiu. Genera Leontodontis et Oporiniae jungens. (v. s.)

DCCCVII. MILLINA. — Millina et Deloderium Cass. diet. 3i. ^ 8^. 4^{..}./». 430.
Less. syn. i3a et 143. — Apargiae sp. Ten. Biv. 1 *

Capitulum multiflorum. Invol. subuniseriale, squamis accessoriis linearibus plurimis auctum fer^ calyculatum. Recept. nudum aut ambiguè paleaceum. Achaenia omnia confoi'mia oblonga iransversè stviata in rostrum longum desiuennia. Pappus i-serialis plumosus subsordescens rigidulus. — Herbae Australi-Europex perennes acaules. Folia radicaria glabriuscula aut pilosula runcinato- aut sinuato-dentata. Scapi glabri striati, i-cephali, raniis bifidi, squamis praesertim ad apicem instructi. Invol. pilis simplicibushispidiuum. Flores flavi, extiores dorso purpurascentes.

Sect. 1. EUMILLINA. — Millina Cass. I; c. .

- Recept. nudum. Rostrum achaenio ferè longius. Pappi'setae non basi dilatala?;
1. M. LEOWTODONTOIDES (Cass. 1. c), foliis ellipticis basi runcinato-dentatis, scapo simplici foliis tiplō longiori. *If* in sylvis raontosis jEtba? (Biv. Guss.) ad alt. usque 5aoo ped. (Scbouwi), in pascnis montosis regni Neapolitani (Ten.), in monte Gargano ^Schouw!). Apargia cicboracca Ten.! prod. 46.11-nap. % p. ib6. t- 71. Apargia fascicuiata Biv. st- rar. manip. a. t. I. Habitus ferè Leontodontis squauiosi- Radices grumosae fasciculatae. Invol. mgiicjns snbvillosum pilis albis. (v. s.)

Sect. 11. DELODERIUM. — Deloderium Cass. I. c.

Recept. paleis pancis membranaceis instructum. Rostrum acb.TDlo brevius. ^spetaiaui meuibranace^e dilatat.T. — An genus pioprium ?

2. M. HYOSEROIDBS, folns linear-i-oblongis tinaato pinnatifidis, scapo foliis paulù longioie simplici <ut bifido, rostro achaonio breviori *If* in insulâ Cretâ. Apar-gia hyoscioides Sieb ! pi. exs. Spreug. syst. 4. p 664 Delodeiura taiax<jcifo-lum Cass. ctLess 11 cc. Radices videular fibosa? Folia hirta aut glabruscula. Invol. prillidum glabruscula. Achaenium muiicellatum Pappi setae albidae basi squamofio-dildtdae, plumis valde deciduis. (v. a. in h. Bois&ier.)

DCCCVIII PODOSPERMUM/C./?/r ed 3.-v. 4./. 61. *Cass diet* 4. p. 77.—
Podosperma Less, syn i33 non Labill (x) excl. syn. Roth, et Mccnch. — Scor-zouerae sp Linn

Capitulum multiflorum. Invol cylindraceum imbricatum. Receptaculum epaleaceurn. AchCtna conformia rostrata callo basi aieolam cingente eximiè elongato mdato adulto cavo slipitata. Pappus 1-serial ^s pliimosus conformis. — Herbae regiones Mediterraneas plerque habitantes, biennes aut perennes Folia pleiaque pinnatipai tita. Flores flavi. Kecept. tubercubs stylilbnnibus (pedicelluli florid rebqims) sub-echinatum.

Species genumce,foliis plerisque pinnatipartitis

1. P OCTANGULARE (Roth ex Stead, nora. phan. p. 753), canle erecto stneto glabio, tolus aliis in lobos lineares acatos mfgemimos pinnatipaititis, aliis piaeasetum supenoubus Integerrimis eloagatis, invol glabn (jnmorib octangu-lans) sqnamis acnmioatis. ^ ^ ? in Siciliae, Calabnse, Lacanine, Tauriae, 'Volby-niae, Hisp^uiuje circa Malagam (Boiss '), cam pis argillosis Scoiz. octangulau's Willd sp. 3. p. 1506excl. Goa. syn. Ga&s! pi rar p 32i t 55 f. 2. Scoizo-nera laciniata Jacq austr. f. 356. Ped Jacqumianm Koch syn. 4^5. Vauat caule lsevi ant versus apicem munculato (v. a.)
 2. P. TENORII, canle erecto ramoso, foliis pinnatipartitU, lobis linear-i-lanceo-latis iiintegeriimis, invol. squaims plabnuscnlis apice interne penicillato-tomen-tosis *If*. sen (2) in collibus et caranis argillosis Calabucc et Lncanix. Scoizo-nera Tennrii Presl del prag p. 110 Gnss pi rjr p 3a2 t. 55. f. Ten syll. p 289 DifTeire dicilur a P. octangulan capitulis dnplò majoribus, invol. non, angulalis. * -
 - 3 P cALCITRAMFOiuw (DC. fl. fr. 5. p 4^5), glabram, caolibus ramosis adscen-dentibus, foliis pinnalisectis, segmentis ovahbus oblongisque obtusis, snpcrio-nbas conflueniibus, invol squaims mnticis % in collibas et cam pis aigillosis regioms Meditenaneas, nempe in Hispanâ, Galliâ australi, Italiâ Afncâ Tin-gilanâ, Onente. Scorzonera calcitiapifolia Vahl symb. a. p. 87. Guss. pi. r.ir.,323 Scorz. reiedifoha Retz obs. i p 42 non Linn. Podospermni resedi-fbluim DC. fl fi n. 2983. Scorz. pltirifida Lam. fl. fr. 2. p. H3. — Barr. ic. t. boo (v v. et s)
 4. P. INTERMEDIUM (Guss ' n^Jjyt. snb SIMETZ), glabrum, canle^ erecto ramoso, foliis pinnati&ectis, segmentis oblongis fere lineaubns acutis integris, suinmo longiore cum Mipeuonbus confloente, invol. squamis mulicis. *If*. u prat is Galliae anstialis ciica Albigam, Aginnura et Biigantiura, Pederaontii circâ Ten-dam, Sicili* (Guss '), Caucasi (Mey '), Peisiae piov Adeibeischan (Szow '). Podospeimum calcitiapifohtra Mey.' enum n. 500. — Bnzb cent I t. 2a. Cum P. talc itiapiolio olim et foite non imineitò conjunxi, sed monente cl Gnssone potius nunc dishuguo Icon Barr. t 799 hue fortè pertinct (v. v. et s)
- ? eriolatum , foliorm lobis lalerahbus al)bieviatl, invol cyfindiaceo toraento cano vestito. —adEnphiatem legit cl. Chesney¹ An spec, propr.'

5 P. CANDM (Mey¹ cauc. ennm. n. 499), pnbe cinereâ sabvillosum, ~~caulites~~

(1) Podosperma Labill. est Podotlieca

PODOSPERMUM. COMPOS1T4>C1CHOBACFJE. in

ramosis foliosis, foliis pinnatisectis, segmentis linearibus acutis, invol. squamis exterioribus apice calloso uucinatis. *If* in cam. pis Caucasi ad Talasch, Bakü, etc. alt. circ. 1000 hexap. (Mey!) fortè in Olympo Bithyno (Anch. I n. #33aa). Scorz: laciniata Bieb. fl.* taur. et suppl. u. i57*. Radix fusiformis. (v. s.)

ft. glabratum, foliis glahris lalioribns^ aliis indivisis elongati*, aliis pinnatisectis. % in Caucasi regione alpina (Mey!), ad Guriel Persiae (Szow!). An certè conspeciiica? (v. s.)

6. **P. LACINIATUM** (DC. fl. fr. ed. 3. n. 2984), *glabrinsculum*, caulis suberecjs apice nudis i-cephalis, foliis pinnatisectis, rachi lobisque linearibus integris, invol. squamis apice subuncinatis. (2) in arvis pratis et asperis Europæ australium, et in Gallia et Germania media. *Scorzonera laciniata* Linn. sp. 114. Gaertn. fr. 2. p. 367. t. 159. f. 1. Scorz. paucifida Lam. fl. fr. 2. p. 83. Sc. petiolaris Lapeyr. abr. pyr. 120. excl. syn. ex Benth. (v. v. et s.)

/S. muricatum, caule erecto muricato, foliis aliis indivisis, aliis pinnatisectis. @ in Pedeinontio, GalliS anstrali. *Scorzonera muricata* Balb. misc. salt, p.^25. *Podosp. muricatum* DC. syn. fl. gall. n. 2982. (v. s.)

y. *sub (datum*, caule erecto laevi, foliis linearis-subiilalis. (%) in Galliâ anstr. *Podosp. subulatum* UC. fl. fr. n. 2982. *Scorzon.* *subulata* Lain. fl. fr. a. p. 81? *Scorzonera pinilolia* Goa. ill. 53? (v. s.)

* Species dubice, foliis omnibus linearibus integerrimis.

7. **P.? VILLOSUM** (Stev! in litt.), molliter villoso-lanuginosum, caule erecto folioso polyccephalo, foliis linearibus carinatis integerrimis, invol. squamis exterioribus <lorso lanuginosis, interioribus glabris. % in collibus et cam pestribus Tauriae (Beaup!), circâ Karassubar, Mosdok (Bieb.) et Snudik (Stev.). Scorz. villosa Bieb. fl. taur. n. 1669 non Scop. *Acbaeua spiuulis* sursùm spectantibus aspera ex Bieb., sed in specim. nieis (equidem junioribus) kevia. (v. s.)

8. **P.? CALLOSUM**, caulis è collo plu rimis apice nudis i-cephalis, foliis linearibus planis integerrimis uervosis sparse pilosis apice callosis, invol. squamis acuminatis msirgine scariosis, exterioribus subvillosis, acbxiis laevibus. *If*, in pascuis aridis calcareis Sardiniae versus Arcidano et Oliastra legit cl. Moris. *Scorz. callosa* Moris! elench. 1. p. 29. *Floras* flavi extiispurpurascutes. (v. s.)

9. **P.? COLUMN/K** (Guss! ind. sem. h. bocc. 1825. pi*, rar. 3a 1. t. 54. sub *Scorzonera*), caulis è collo plurimis apice nudis i-cephalis, foliis linearibus carinatis sparse villosis subhirsutis, invol. squamis acuminatis glabris, achaeniis aspero-muricatis. "If in collibus aridis Calabriae et Siciliae. Sc. orientalis<angustifolia sem ill e longo aspero Tourn. cor. 36? Cor. flavae extus purpurascentes. Achsenia attenuata nee ut in Podospermis incrassata. (v. s.)

‡ *Species exclusa,*

P. PODPUREUM Koch ex Stead. = *Syrzonera purpurea*.

DCCCIX. GEROPOTION Linn. gen. 904. *Lam.* ill. t. 646. *Gcertn. fr.i.* p. 3^4. t. 160. *Cass. diet.* i8./>, 498. *Less. syn.* i3i. — *Tragopogonis* sp. *Less.*

Capitulum pluriflorum. Invol. 8-phyllo i-seriale floribus longius. Recept. squarrellis piliformibus ad latus florum exterius onustum. Achsenia cylindrica longissime rosula striala, radii persistentia, disci decidua. Pappus radii circ. 5-paleaceus, paleis angustis acuminatis serrulatis; disci setis plurimis uniserialibus longè plumosis.— Herba annua Austr.-Europaea *Tragopogonis* facie glabra. Caulis simplicis aut rariis ramosus teres. Folia seiniamplexicaulia eloi>gata integrifolia. Capitula ad apices subincrassatos caulis aut ramorum solitaria. Plores purpurascentes.

« *G. GLABRUM* (Linn. sp. 1109). (|) in arvis inter segetes circa Hicaeum (All.),

na

DICOTYL. SEU ^ X O G E N J E.

CALYPOGON.

in Sardinia (Moris!), Graecia (Zacc.), agro Mogadoriensis (Bronss.), in Hispania circa Malagam (Boiss.), ias. Maderia ^Lowe!, Sicilia (Gnss.), Italia (Col.), Tanria (Mey.), etc. G. glaber Jacq. h. vind. i. t. 33. Schknhr handb. t. ai3. Gercygon australis Spreag! syst. 3. p. 663. — Col. ephr. i. p. a3i. ic. (•. v. ct a.)

• Species exulta,

G. CALYCULATUM Linn. =:Scorzonera hirsuta.

G% HIRSUTDM All. = Scorzonera hirsuta.

G. masUTUM d'Urv. =s? Tragopogon porrifolium.

G. HIRSUTUM Linn. = Tragopogon hirsutus.

• DCCCX. TRAGOPOGON Tourn. inst. t. 270. Scop. earn. ed. a. v. i.p. 44- /<<> gen. p. 170. DC.fri. ed. 3.11.4. P 63. Cass. diet. 25.p. 64. Less. syn. 133.— Tragopogonis sp. Tourn. inst. p. 477. ^{Linn.} sen. n. ^{9°5'} infl/w. M- *- 646./. 1. et 2. SchAukr handb. t. 214-/- ^{a-} ³ - 4-

Capit. muhilorum. Invol. i-seriale 8-16-phyllum, squamisimabasi subconcretis demiim reflexis. Recept. epaleaccum foveolatum. Flosc. radii saepè radiantes. Achaenia estipitata, areola laterali donata, pliis miniis muricata, longè rostrata, rostro coitinuo saepiis lasvi. Pappus plurisenalis plumosus conformis, setis subcorneis, quinis apice nudis Ion* cioribus.—Herbae biennes autperennes, Gerontogese pleneque Europea3,* habitu Scorzonerye. Radices crassiusculae valde lactescentes. Caules crecti foliosi. Folia lauceolalo-linearia acuminata integra parallelinervia. Lana flosculosa hinc indè ad axillas caules aut apices peduucolorum obvia Cor. nunc luteae, mine purpurascetes, nunc ex his coloribus in iisdem specie bus variae.

* Pedunculis apice obconicis fistulosis.

- x. T. MUUS (Jacq. fl. austr. t. 29), glabrum, foliis strictis lanceolato-linearibus acamialis integerrimis, pedunculis apice obconicis fistulosis, inv. ia-i5-pbylo ligolas exteriore apice rotundatas superante, achaeniis mnricatis rostrosubbrevioribus. ® in arvis vineis et agris apricis Europae, eriam in desertis Siuaicis (Bovè!), ad marc Caspium (C. A. Mey.). Lam. ill. t. 646. f. 1. Schknhr handb. t.314. ic. fruct. T. dubias Scop. earn. n. 937. T. porrifolius var. C. Fries nov. ed. 2. p- ^39. Flores flavi. Rostrum elorrgatara ad originem pappi torquari villoso instructom. Foriè var. T. porrifolii ex Kries. (v. v. et s.)
2. T. LWESCENS (Bess.! enum. pi. volh. n. 973), glabrum ant sabfloccalosum, foliis strictis lanceolato-linearibns acomioatis iutegerrimis, pedunculh. obconicis fistulosis, invol. 8-9-phylo flosenldi radii vix squantibus, achaeniis spinelloso-muricatis roslo subbrevioribus. — in Galicia ad Tyram propè ^alesn- " syki (Bess.), et in Tauria (Stev. ex Bess, in litt.). Corolla di»colores, suprà ochroleuui, subtus lividi. An forte T. raaoris var.? Tr. dnbins Horn, b hafn. add. p. 970 ex Spreng. syst. 3. p. 662. (v. s. comin. à cl. auct.)
3. T. PTEROCARPUM , glabrum, caule stricio subramoso, foliis lanceolato-linearibns planis strictis caule snbbrevioribus , pednnnculis supernè incrassatis, invol. 6-7-pbylo , arhaeniis aliis (sterilibns) laeviusculis superue sensim atteuatis, aliis pentapteris inuriratis abruptè rostral. (2) in Oriente ad radices niontis Ak-Dag legit cl. Ancher pi. exs. n. 33r 7 ! Herba subglauceicens pappo apice violacea arcedens ad T. coloratarn , sed fructibus peniapleris ab eo et ab omnibus aliis distincliissima. (v. s. à cl. inv.)
4. T. COLORATUM (C. A. Mey.! enum. n. 4(j4), glabram , caule stricto Abramoso, foliis lanceolato-liearibns planis strictis caule ssepius longioribus, pednnnculis* kuperneincrassatis, invol. 5 pbylo flosculos longe superante, achaeniis B U -

ricatis rostro paulò longioribus, pappo violaceo-colorato. — in collibus siccis petrosis montium Talusch Caucasi ad pagum Swant (Mey.!), et in herbicis prov. Aderbeischan propè Badaben (Szow.!). Herba 3-12-pollic. Cor. rubrae. (v. s. com in. à cl. Fisch. et Meyer.)

5. T. ERIOSPERMUM (Ten^fl. roed. i. p. 3. fl. neap. prod. 3. p. ir. syll. p. 388), ^k glabrum, foliis lato-linearibus strictis integerriinis, pedunculis subobconicis fistulosis, invol. circ. io-phyllo ligulas apice denticulatas suba-quantibus, achae-nii rostro ad basim pappi lanuginosus. (2) in pratis acuminatus agri neapolitanii (Guss.!), propè Aguano et Tavoliere (Ten.!). Affinis T. crocifolio quocum coniuncta cl. Reichenbach, sed preter notas in diagn. indicatas differt capitulum inajore, achxiui magis scabris, foliis latioribus, etc. Cor. purpurea. (v. s.)
6. T. porRIFOLIUM (Linn. sp. m o), glabrum, foliis strictis lanceolato-linearibus acuminatis integerriinis, pedunculis apice obconicis fistulosis, invol. 8-phyllo ligulas apice rotundata duplò ferè superante. (1) in collibus pratis Europa? Et in hortisculinariis cultum. Jacq. ic. rar. r. 159. Fl. dan. f. 797. Engl. bot. t. 638. Sfbkahr bandb. t. 212. T. sativum Gat. fl. montanb. i36. T^ porrifolins var. e^ et jg. Fries nov. ed. 2. p. aSg. — Cam. epit. 3i3. ic. Flora roseo-aut flammef purpurascentes. (v. v. et s.)
7. T. CICIPANI (Guss. ex Splitb.! in lilt. 1834), glabrum, foliis basi latè in vaginam concavaius* ample Headem dilatatis apice linearibus acumiitatis integerrimis, pedunculus apice subincassatis fislulosis, invol. 8-phyllo ligulis longiore. — in monte Caprino propè Panormum j[Goss! Splitb.!), in ins. Zacinbo' locis onltis (Marg.!). Fl. aprilii. Stirps speciosa ! Caulis apice ramosus. Cor. purpurascentes. (v. s.)
- S. T. HIRSUTUM (Goa. fl. monsp. 342), caule foliisque subhirsatis, foliis lanceolato-linearibus acuminalis integerriinis strictis, pedunculo apice obconicofistuloso, iuvol. <2-phyllo, corollis radii brevioribus, acliixniis apice muricato-spi-nellosis fostrum circ. longitudine sequantibus. (2) in Galloprovincia (Gar., Ger.), et Occitania (Gou.). D(^. fl. fr> n. 2990. Garid. aix 466. t. 106. Geropogon hirsutum Linn. sp. 1109 excl. sýu. Col. Affine T. viajori. Cor. flavac. (v. si c.)

* * Pedunculus teretibus.

9. T. UNDULATUM (Jacq. ic. rar. t. 158), glabrum, foliis linearibus integerimis undulatis apice tortilibns, pedunculus teretibus, invol. tS-io-phyllo corollas obtusas iequante. (2) in paucis montosiset subalpinis Carpatbonun (Wahlenb.), Cappadociæ (Aueb.!, n. 33;ia), Tauriaj (Bieb. Beaup. IJ, cirræ Astracbnn (Gniel.)- T. revolutus Schwaeg. ex Gerh. in lilt. T: pratensis y Gaud. fl. helv. 5. p. i5. Cor. pallidè flava! Invol. post anthesin omnino reflexum. (v. s.)
- ^ orientate, canic fl^liisque bine inde floccoso-toinentosis. — Cum priore. T. orientale Linn. sp. 1109. T. villosns Habl. taur. p. 15c ex Bieb. taur. n. 1563.— Cam. e^pit. 312. ic. (v. s.) v
10. T. PRAEKSE (Lion. sp. 1109), glabrum, folia subbearipatis inrigorriuSis subundulatis basi dilatatis, pedunculo tereti, invol. 8-phyllo ligulas apice truncatas subaequante. (2) in pratis Eiropae et Orientis fœquaens. Bull. herb. t. 209. 1 Lam. ill. t. 640. f. 2. Sow. engl. bot. t. 434. Ga^rtm. fV. 2. t.]5y. Schkuhr handb. t. 214. — Fuchs. hist. 82c. ic. Ligniae flava? subtus fusco striatae-aul ex Scbkukr pallidae. (v. v. ets.)
- fa. ctiphorum, caule praesertim ad apiceni lanam floe cos am gerente. — in pratis elatioribus Caucasi. T. pratensis var. ^, y A. Rley!. enmp. n. 491. T. sinualis Ave pi. rar. p. 17? Ligulic subtus purpurascentes. Herba 4-5-pollic. (v. s.)
11. T. MINUS (Fries nov. ed. 2. p. 245), glaberrimum, foliis è basi dilatata angustissimis canaliculatis flaccidis secundo curvatis, pedunculus teretibus apice subincassatis, invol. valde ventricoso flosculis æqualibus duplò longiore. — in Scanjæ apicis argillaceis. T. pratensis var. minor. Fries nov. ed. 1. p. 95. Af-

- fine T. pratensi. Cor. flavae, numerosiores quam hujus, sed ester. non radiantes..
12. T. \$AMPESTRE (Bess. enum. volh. T. 1626), glabrum, foliis linearibus, radicibus*vix basi latioribus, caulinis basi late vaginato-dilatatis, pedunculo vix subiricrasalo, in vol. 8-phyllo flosculos superaule, achaeniis. — in canis Bessarabia; et Podolic australis (Bess.), in Tauria* (Godet!). Cor. ex Spreng. syst. 3. p. 663 flavae, ex specim. Godetiano sicco pallida? et purpurascentes. An noslia certe eadeiu ac Besseriana? An eadem ac T. pialense yS? (v. s. com III. à cl. Godet.)
- x3. T. FLOCCOSUM (W. et Kit. pi. rar. hung. 2f§t. 112), floccoso-lanatum, raule 'erecto ranioso, foliis liueari-sabulatis canalicualis integerrimis, pedunculis teretibus, invol. 8-phyllo ligulifli exteripribus brcviore, achaeniis snlcatis elongatis vix in rostrum attenualis, coalis superne serrulatis. (2) iii arenosis subsylvaticis Hungariae circa Pesth, etc. (Kit.), circa Astrachau (Trev.), in summo Liba? Q? (Auch.! n. 3340), ad Tergestum (Reichenb.), ad margines agrorum dicti Kb'oi prov. Aderbeischan (Fisch. et Mey.), deinceps in Bornssiā boreali si T. heterospermum Scbeig. in Koen. arch. nat. 1812. p. 229. hue rite (etiamsi idifTiiuin) relatum. T. canus Willd. sp. 3. p. i4{3. Habitus T. undulati et T. pratensis. Cor. flara?. (v. s.)
- x4. T. GRAMINIFO^IUM, glabrum, aut rariuā hinc indē floccosum, caulis è collo plnrluiis simplicibus sub capitulo teretibus tomentosi# foliis lanceolato-linearibus integerrimis acnir.inatis, i|ivol. 8-phyllo corollis subbreviore, achaeniis apice spinelloso-iniuricatis rostri longitudinern xquantibus. — in Iirieretid legit cl. Szowitz. T. Caucasicnm Fisch. et Mey.! non Bess. Cor. flavae aut ex sicco in iisdem indiv. subpurpurascentes. Achsenia basi laeviuscula 4-striata. (v. s. coinin. à cl. Fisch. et Mey.!)
- x5. T. BRKVEROSTAE, glabruin, foliis lanceoato-linearibus acuminutis integerimis, caulis ramosis, rauis icephalis apic teretibus nudis glabris, invol. circ. 8-j)hyllo floribus snbxquali, acbocao à basi spinelloso-muricalo i^stri longitudinem superante. — ad Caucasm. 1J. Caucasicum Bess.! in litt. non Szow. Cor. ex sicco vid. piipururascentes? (v. <.)
- yf. *intermedium*, pedunculis sub capitulo tomentosis, corollis flay is. — in deserto .Caucasico-caspico legit cl. Godet. T. intermedius Bess. ecum. volh. p! 83 ? ex Godet. (v. s.)
- y. *Podolicum*, caule -ramoso, pedunculis glabris, foliis latioribus, rostro breviori — in pratis Podoliae anstr. et gnb.^ Cbersoncnsis. Tr. Podolicus Bess.! in litt. 1831. (v. ».)
- cT? *Lithuanicum*, caule humili basi foliisque lanuginosis, pedunculo glabro, achscniis sublaevibus. — in subuletis Lithuaniae. Tr. Liihuaicum Bess.! in litt. 1831. Cor. flav*. Ansp. propria, suad. cl. Bess.? (v. s.)
- 1*6. T. CROCIFOLIUM (Linn. sp. m o), glabruin, fojiiis angustè linearibus strictis, pedunculis terelibus, invol. 5-6-phyllo ligulas paulo snperantes, rostro ad oririnem pappi glaberrimo. f^) in pratis apricis montosis Europae australioris et Orientis. DC. fl. fr. u. 2992. — Col. ecphr. f. a3o. Flows violacei. Achxmā niuricato-scaberrima, rostro laevi apice eliam glabro. (v. v. et s.)
- @. *Jlocoulosum*, foliis^11 perne prsesertiin ad axillas floccoso-touientosis. -^ cum var. &. (v. v. et s.)
17. T. finITABILE (Jacc. Tc rar. 1. t. i\$1- misc. 2. p. 3ib), glabruin autadaxihas et basin involueri vix lanulum, foliis semiamplexicaulibus lanceolato-linearibus integris strictis ;utumi»alis, pedunculis teretibus, invol. 8-phyllo corollas radii circ. aMjuante. @ circa Astrachan (Bieb. Stey.!). Cor. nniic pallide albentes, nuncflavidae aut roseaj lineisnbris striata?. Achaen. iudescr. (v. s.)
18. T. RUBRUM (S. G. Gmel. itin. 2. p. 198), junfins araqbaideo-lanatam, caule erecto folioso, foliis lauceolato-linearibassubundulatis canleque glaucis, pedunculis teretibus, invol. suboctophyllo corollis radii diinidiò breviore. If. in campestribus desert! Soongoro-Khirgisisi (Ledeb.), in hortis circa Astrakan

(Trev.). Ledeb-fl.alt. 4. p. i58. ic. il. ross. ill. 1. t. 30. *T. roscus* Tiev. mag. naturf. ges. Berl. 1816. p. i5a. Cor. rosax sea dilutè purpurascentes.

19. *T. COLLINUM*, Unà floccoso-arachnoideâ hlnç indè onustum, foliis lanceo-lato-lineatibnsplerisque undulato-crispis, caule i-cepbalo foliorum longitudine subnudo apice non iucrassato, in vol. S-pb[^]llo corollas radii aequante. — in collijus Caucasi ciicâ Baku (C. A. Mey.!) et in collibus siccis lapido.sis circa Orraiah prov. Aderbëischan (Szow.!). *T. roseus* Mey. enum. n. 489. nou Trev. H[^]rba 3-4-pollic. glaucesceus.. Cor. pnrpuraseenles. Differt a *T. robro* invol* corollas apquanie nee dimidiò bieviore, à *T. niutabil%lanâ niagis copiosa*, foliis undulatis et statinA mult6 mjpare. (v. s. comm. à cl. Fisch. et Mey.)
20. *T. rüsitLUM* (Bieb. suppl.'p. 521), glabrum infernè laxè flocrosum, foliis subradicalibus linearibus basi snbdilatatis integerrimis subtortilibus, caule i-repbalo vix foliis longjori apice tereti, invol. circ. 8-phyllo ligdliis breviori aut subaequali. *)f. in collibus et carapis apricis Armeuix, Iberia* (Bieb.), pvpè Baku (Mey.!), ad Karabagh et in dislr. Khoj IVrsij* (S/ow.l). Refert var. minorem T. undulali. Folia stricta aut apice tortilia. Cor. pallidè flavac, subtùs fusco-itriatae. Yidetur ex Bieb. *J. orientalis* Stev. mem. soc. h. nat. mosc. 4. ^p. 59. (v. s.)
- ai. *T. JUNCEUM* (Wall.! cat. n. 32[^]7- comp. n. 367), giabrum aut vix Jasi sublatum, foliis angustè linearibus carinatis bdsi dilatatis, radicalibus caulem flexuosura saepè aequautibus, pedunculis teretibus, invol. 5-6-phyllo ro roll is breviore, achaeniis breviter rostralis. % in uiontibus excelsioribus Nepaliae, ad Kamaon et in valle Deyra legit cl. Wallich. *T. gracile* Don mem. soc. wern. 3. p. 407. prod: 11. uep. p. 162. Flores Intel. Acbsenla'exteiiora lxvia, interiora nunc lsvia, nnnc muncato-seabra, omnia roslo longiora. Caulis parcè folio&us, saepius 1*cepbalus , rariùs 2-cepbalus. (v. s. comm. ab hon. cset. mere. augl. Ind.or.)

-| *Species non satis nolcc.*

*

- [^]2. *T. VILLOSUM* (Linn. sp. m o), totuin villis albis pbescens ramo&um, foliis longissimis acuminatis, pedunculis teretibus, invol. 9-phyllo corollis radii sesq; qnlougiore. (2) in Uispania (Linn.), Sibiria (Pall. itin. 2. p. 33a). Cor. pallide flafvae. Antberae fuscae. Acbsnia longe rostrata. f.
23. *T. ANGUSTIFOLIUM* (Bell, in Willd. sp. 3. p. i494), glabrum , foliis angustis ttrictis integris, pedunculis teretibus, invol. 8-phyllo corollis radii longiore. (J) in agro Nicaeensi (Bell.). Trag. parviflorum Horn. Ji. hafn. add. p. 970 ex Spreng. *T. crocifolii* var. ex Poir. 'f.

•j" *} " *Species excluscc.*

- T. ACULEATUM Moench. 1= *Urospermum picroides*.
 T. ASPEAVM Linn. = *Urospermum picroides* &.
 T. BICOLOR Moench. = *Urospermum Dalechampii*.
 T. CAPENSE Jacq. = *Urospermum Capense* y.
 T. cos[^]iDATtiM Steud. = *Troximon maiginatum*.
 T. DALECHAMPII Linn. = *Urospermum Dalechampii*.
 T. PRITILLARIOIDE* Less. = *Petrosia longifolia*.
 T. GTAUCUM Steud. = *Troximon glaucam*.
 T. LANATUM linn. = *Scorzonera lanata*.
 T. PICROIDES Linn. = *Urospermum picroides*.
 T. vEATICILLVruitf Lam. = *Urospermum Dalechampii*.
 T. "VIRGIKICUM Linn. = *Cynthis Virginica*.

nCCCXI. UROSPEKMUM *Scop. intr. (1777) n. 366!* *Juss. gen. p. 170. Casi,*
• dice. 56. p. 36g. Less. syn. i33. non Nutt. — Tragopogonoides Vaill. act. ac pat.
1731. — Arnopogon W. illd. sp. 3 (1803). p. 1496. — Tragopogonis.sp. n. f.

In vol. campanula turn, squamis circ. 8uniserialibus basi in tubum urceolatum concretis. Recept. epaleaceum pilosQ-fimbrilliferum. Cor. ad npicein tubi et basin limbi pilosae. AchacniQm eslipitatum jnuricato-aculeatum compressum rostratum, roslo longissimo inani basi*inflato abembryone diapRragmate separate Pappus i-serialis'confbrniisaequalis plumosus. — Herbae monocarpicae, saepius dichotomy, regionem Mediterranean! inco'lentes. Folia magis miniisve pinnatifida semiamplexicaulia pennineirvia. Capitula longè pedunculata nuda Flores Jutei.

I. U. DALECHAMPII (Desf.lcat. b.>par. ed. 1. p. 90), foliis varie ranciuatis dentatis, involucrib pubescenti-velutipis. (2) in agris vineis et versuris Italiae Galiae anstralis et Hispaniae. DC. n. rr. n. 298. *Tragopogon Dalechampii Linn.* sp. 1110. Gærtn. fr. 2. t. 159. f. 4. *Trag. verticillatum Lam. fl. fr. 2. p. 79.* *Trag. bicolor Mænch meth. 539. Arnopogon Dalechampii Willd. sp. 3. p. 1496.* — *Dalech. lugd. 569. f. 1. ic. Cor. in secco subvirescentes. (v. v. et s.)*

— f. folia snbintegris. — in locis piuguibus et in bortis. (v. v.*et s.)

I. U. picRoinRd (Desf. 1. c), foliis runcinatis dentatis, caulinis auricnlato-satatis, iuvolucris tubo setis rigidulis hispidis, / in agris vimn et viarm m*riginibos Graecæ, Italiae, Galliae anstralidis, Hispani-e, Maderse, etc. Etiam receni ex ins. Cuba sed verisiro. bortcu.sis aut int'rod. DC. fl. fr. n. »ogBtfrra«ouo gon picroides Linn. sp. i m. Lam. ill. t. 646, f. 3. Trap, aruleituni ivfcencl ineth.539. Aruopogon picroides, Willd. sp. 3. p. ifoG. — C. Kaub prod n 60 f. a. Vaiiat canle latè aut basi setoso, foliorum neivo medio ltevi auf s»pii» setoso.

ft. *asperum* (DC. et Dnby bot. gall. 1. p. 296), caule snb-i-ecephalo foliis superionbussubimtegns. (J, miocissiccoribos. *Tragopdgon speruini inn'* sp. m i. Urosp. asperura DC. 11. fr..n. 2987. Ca**. Axel. 50. p. 370. *Ai-* *nopogon asper* Willd. sp. 3. p. 14y7. (v. v. et 6.)

y. *Capense*, foliis oaulinis elongatis angustis, involucrij, basi suboclangn-latis. Q) ad Cap. Bonae-Spei ex hortul. sed inler plantas bicas ex Africa austV. lectas nunqu-m vidi. *Tragopogon Capensis Jacq. io rar 3 r 57-* coll. a. p. 3ao. *Arnopogon picroides* A illd. sp. 3. p. .497.^ròspennùm Capense Sp>eng. syst. 3.,p. G62. (v. v. et s.)

J.? *Parolinii*, canle biévisajime setnoso ferè glabro, invol. squamis vix ima basi setosis apic> attenuatis rostro panlò priorum breviore. — in iusuK Megauisi Ar<hipelagi Gr:ci leg. cl. Parolini. E specim. valde impeKfect^ non asserere qneo an sit species propria aut V. picroidia var. (v. s. couim. à cl. inV.) *

DGCCXII. HYMENONEMA *Cass. bull, philom. 1817. diet. aa. p. 3i6.* — *Hy-* menouiena *Less. sju. i33.* — *Catananches et Scorzonerae-sp. Auct.*

Capituluni multiflorum! Tnvol. cylindraceum, squamis adpressis imbricatis ovalis acutis margini membranaceis. Recept. nudum, Styli elongaii ramis brevibus subspalbulatis. Ac^enia eroslria turbinata villosa^aPP^bus^cS^dus^er squamellulis 10 subuniserialiims aequalibus basi scariflo-dilatatis caeteriim. breviter et dense barbellatis. Herbau Gf^c**qui OrientaJcs pcreniies. Folia saepius aspera, radicalia va.iè pinnatilobala. Caules subnudi simplices i-cephali. Capitula macna flava.

1. H. GR,<CUM, foliis radicalibus villosii inegnlarier pinnalisectis, scgmenii*

- injeqnalibus mucionatis saepe dentatis, % in Achipelagi Gtseci losnlin Naxo ul inonteui Zia (Touin. Ohv.), Melo (d'Uiv.), Syia (Auch'), in laygeto (Zncc?) Scorzoneia Giaecea, etc. Tourn voy 1. p 22; \$ Catananche Giaecej Linn sp. 1142 Scorzonera elongata Willd. i p 3 p 1007. Hymenonema Tournefotu Casb diet aa. p. 316. 'Vanat folio rum lobis linearibus et *vatis (v s.)'
- a H ASPERUM, folns scabris raditahbus caulinisque mferioribus elongate remote pinnatifidis, lobis» acuminate integris — in Onente &iuina legit cl. Oliviei bcorzonera asper[^] Desf^{*} ann mus h n par. 1 p iH3 t 9 Peis enh 2 p 3ba. Scorzonera stylosa Peis enh 2 p. 361 Hymenonema Fontanesii Cass». did. aa. p 317.

DCCCXIII- SCORZONERA DC ft fr ed 3. p. 5q. Less syn 134. — Scqr/o nera Gelasia et LasioSpora Cess — Scoizonera et Lasiospermum Fisch, — Scorzoneiae sp Linn. Gasrtu

Capilulum muldflorum Invol lmhcattuin Recept nudum Achaeatum estipilatum Sostic (aut lariis roitratum), areol4 laterali. Pappus ylunseriaKs ronfotmis plomosus aut 1 anüs scaber — Heihae. Radix fu>iforrrns a'ut tubeiosa Folia saepiis Integcuima, rarius dentata aut pinndtihda. Cauhs simplex i-cephalus aut ramosus, rampis i[^]-cepalis Flôres nunc purpuiei, saepius flavi, ligulis subtùs concolonbus aut purpur<isqentibus

Sect. 1. EUSCORZONERA. — Siorzonera Cass. diet. 25. p. 63 et 264*

— Scorzonerae sect. i^a Less. I. c.

Achxma glibra Pappnspluuaohus, paleis inteiiorum quinis apice nadia lougio- iibustjue Capilula mulufloia.

* Floribts purpureis, folus integris aut subdentqtis rarissimè lobatis.

- t. S. ALBICAUUS (Bunge enm pi chin n. ?30), radice tubeio& oblongâ, caule foloso 2-6-cephalo pednncliique dlbo-toroentosis, folns linearibus elongatis basi floccosis[^]Ienium glabratis neivosis, omnibus planij>, invol sqnamis lanceolalib aeudi>, exter basi pnbiscptjbns, achacnus glabns % id radices monantium JDhiuae bepentnonaluiu Mores pallide rosei. Invol cyhndracem (v s couam ab bon acad sc petiop.)
- ? S SzowtT7ii, glabia, radue tnberosa globosa, tabeie superne in trancam cylindiacum longe piodyncto, folns lato linearibus glaucobenfibas canle longio ribns, canle T-cepbalo, invol cylindrIH squamis maigine subscaiosis, infei bievioibus. * in collibus siccis ad Schaban 1 disti Khoi piov Adeibeisclau Peraiae legit cl Szovvit/ S innllis 1 i>ch. elMey ' pi. Szow. med. C01 puipuieo. (v s. corain a cl 1 isch et Mey)
- 3 S. TJWDULATA (Vahl symb a p 86), radicc cylionricd cra[^]& taulc electo simpbci snbscapiformi .mt umoso, ramis a pice sabtomentosis 1-ceplfelis, folns lnncelatis apic^{*} ^ubulatis undulatis tomentobis aut[^]labratis, invol cyludiici squamis acuminatis, extei[^]Jorso tomeutcisisi laxiusculis, inter, giabus. If. m Harbaïir aienosis ^De*f), Crociae saxosis (Touin), inter lapides ad m ante in Sinai (Schimp ' n 129) et in Cibcià (Auch.M. Desf. fl all 2 p aigVLam ill. t. 647 f 2 mala. GapiL magnit b.Hispanicae. Cor. violaceae (v s.)
- i S ARAWEOSA (Siblh fl graec. t 785 ex piod. 9. p 183) radice tuberosa glo-)osa, caule 1 cephalo folns breviore pnlyveulentto tomentoso, folns linearibus lecnivis villosis seu (labiiscnlis, m\ol squamis dorso puiverulento-hnsuiis, txter. ncuniiualib apice recnrvs. % 111 insnl 1 Cypro (Sibttf) AI/IDM S Inbelosae sed capitula ti[^]ilò inajoia, clc I Imih puipuiei (v s siñe locuUesigu a¹ 1 pl*u*ter in Ouenrlrcct }

5. *S. TUBEROSA* (Pall. it. 3. app. n. 757. n. 131. t. v. f. 3. ed. gall. app. n. 392. t. 102. f. 3), radice tuberosa, globosa, collo angusto multiplicata, foliis radicalibus linearibus pubescentibus, squamis al¹dis sabsariosis ad collum, caulis 2-3-cephalis foliis brevioribus, capitulis longe pedicellatis, invol. squamis exter. a pice anguste acuminatis subrecurvis. *If* in campestribus aridis ad flum. Irtysch (Lebed.), circa Wolgam anstalem (Pall.), ad Sareptam (Fisch.!), inter fl. Kuban et Tanaim (Bieb.). — Rauw. itin. 2x7. Clus. hist. 2. p. 145. Buxb. cent. 2. t. 18. f. 2. Iladix Calmucis ed. nlis. Cor. in invol. ^2-15 superne flavae sub Ius pnrpnreae. (v. s.)
6. *S. rusir-LA* (Pall. itin. 2. app. n. 122. t. 1. ed gall. app. n. 3QO. t. 103. f. 3), glabra humilis, radice tuberosa saepè concatenata foliis linearibus convolutis apice filiformibus incurvis cirrhiformibus, caulis subramosis fuliosis i-3-cephalis, invol. squamis lanceolatis acuminatis erectis, corollis tubulosis nee expan-*spans*. *If* in promontoriis circa mare Caspium (Pall.), in arenâ mobili deserti Caucaso-Caspici (Bieb.), in deserto Songoro-Khirpisico (Lebed.). Radicalia tubera saepè concatenata. Cor. pallide purpureae. (v. s. sine nom. comro. à cl. Steven.)
7. *S. ASTRACBAXUCA*, radice tuberosa ad collum attenuata, foliis linearibus convolutis margine denticulato-crispis dorso villosis, canis foliis breviore 2-3-cephalo pedunculisque-tortaentosis, invol. squamis ext. ovatis mucronatis dorso tomentosis, corollis tubulosis nee expansis. *If* circ; AStrachan legit cl. Steven. *S. pusilla* ex Astracban Bieb. fl. taur. 11. f. >75. Cor. pnrpureae. (v. s. comm. à cl. Steven.)
- * * *
8. *S. DELICIOSA* (Gnss. jnd. sem. h. bocc. 1825), radice tuoerosa oblonga, caule simplici aut iroa basi ramoso, ramis i-cephalis, foliis lincaribns acuminatis planis glabris basi farinaeo->ubtoraento&is, invol. squamis glaberrimis, exter. lato-lanceolatis acutiusculis adpressis. % in Siciliae pascuis montosis prope Panormum (Guss. Moric.!), ad moniem Caputo (Splitb.!). Affinis *S. purpurea*; sed certe diversa. An *S. purpurea* Desf. et Poir. circa Lacalle lecta line referenda? Cor. purpureae. Radix varie saccharo confecta aind Panoruillano* maximo usu est quia grafisbima el refrigerans Gnss. in litt. (v. s.)
- g. *S. run-PURE A* (Linn. sp. III3), radice cylindraceo-fusiformi, caule ramoso 2-5-qepqalo, foliis radic. et caninis lincari-subulatis canaliculato-triqnetris, invol. cylindrici squamis laro-lanceolatis non oiliatis, achaenâ laevibus. *If* in colibus apricis et sterilibns Germania?, circa Mognntjain (Ziz. Koch.!), in Thuringia (Wall.!), Austria circa Vindobouam. (Rohde), Bohemia (Presl), Yolhinia (Bess.). Jacq. austr. 1. t. 35. *S. purpurea* circa Lacalle a cl. Poiret lectaest forte diversa. — Clus. hist. p. 13Q. ic. Florespurpurascentes. Podospermum purpurenm Koch ex Sreud. (v. s.)
- & } *GmeJini*, foliis radicalibus liiieari-lanceolatis, caulinis linearibus canaliculato-tiiquestris,* invol. squamis obtusiusculis. *If* in sterilibus et siccis Sibiriao a Jaico flirv. ad Obum el prais. in campis Barbarenibus (Gmel.). *S. purpurea* Lebed. fl. alt. 4. p. ifia. — Gmel. sib. a. p. 7. t. 2. An species propria inter (oseam et purpnrearn media? Cor. coeruleo-carnese, an-ihiris albis purpnreo-striatis.
10. *S. ROSEA* (Waldst. et Kit. pi. rar. hang. 2. p. 127. t. 121), radice cylindrical* fusiformi, caule simplici i-cephalo, foliis radioalibns, elongatis lanceolato-linearibus planis glabris, caulinis pallets carinato-infeuiibus, invol. ad basiu subar-~~ne~~ cyiudrico, squamis lanceolatis acuminatis, achaenâ sncatis angulis supernis. *If* in Alpibus Tridentinis et Apennino (Jan.!), in Croatia et Transylvania (Host. fl. 2. p. 391), Marchia-Brandenburg. (Willd.). *S. pnrparea* Host. syn. 421. non Linn. — Mentz. pug. t. 1. f. 2. Flores rosei. (v. s.)
- U. *S. TRACHYSPERMA* (Gnnth ex Spreng. syst. 3. p. (566), glabra, caule submX-nocephalo simplici aut basi ramoso, foliis linearibus gcummati striatis integreriiuis, invol. cylindrico imbricato, squamis acuti*i*, achyeniis tubercnlati-spirulat*s*. *If* in prnlis Cyrenaicae et Calabria?. *S. serrulata* Viv. fl. libyr. p. 4a

- t. 17. f 4. S. trachysperma Guss pi. rar p 3r9 t. 58. Cor. puipurex. Pappi setae basi plumosae a, pice simplices. Vauat ex Guss foliis pubescenjibus a basi und ^{et} s.
12. S. PAPPOSA, glabra, canle erecto ramoso, folys margine creiidto-nndnlati oblongo-lanceolalis, sum mis linearibns int[^]gemnus, capitals longe pedicellatis oblongis, invol sqnarais exter. lati subobtusis, atbaenus tuberculato-echinulalis, pappi s'etis exter. dense et brcvitei baibato*plumosis confertis 2f in Syria ad Aatab (oliu Daba) legit cl. Ancher pi. exs. n 4316' Cor por-pnrascentes. FruAus fete S.#trachysperma», sed herba diverussinia (V. s. corora. à. cl inv)
- x3. S. INCISA, caule eieclo Farinoso-pobescente parce ramoso, foliis raulinis glabris gblongis acuminatis inciso-semipinnatifidis, infer petmlativ, snnei. sessihbas j>emiarupltxiCdnibus, invol. oblongi &quarais <*xter. lati<> subobtasib, achsenus losvlbus. — m Cappadoci'i ad Euphratcm legit cl. AACBER pi. ex*, u. i3i5' C01. ex sicco purpurascntes. Capit. fereS. pappobse. (v s.toim a cl. inv.)
14. S. PARADOXA (Fiach. et Mey. pi. Szow. ined.), floccoso-lanuginosa snbglabra glauca, foliit integernmis, radicalibns petiolatis ova>is a.cutis, cau[^]nis lanceo-Jatis sobcordatis ses&ilibus f caubbis sub[^]implicibns[^]ub-i-cephalis, pednncubs apice innassatis, invol sqdaniis bisenatis ovatis, extenoibns multo brevjon bus. — mter fidgmenta lapidnm ad la cam Oiimah in piov. Persia: Aderbeibchan. Flores parparei.

Floribus Jlavis.

a. *Foliis subdentatis ant uttegns.*

- *5. S. ^NGUSTIFOTIA (Linn; sp III3), radice cylindracer ad colluiu nndā, caule f-ce|^iaro squamis lmeanbus tecto apice fubincrassito et lannginoso aflat glabro, fokis infer, sessilibus lmeanbus snbttnerviib glabus, invol ovdli-oblongi sqaamjs elongatis lanceolalis,acheenns stnatis laevibns % in montosis Helle-tiac, collibus et planitibus Gallia? in Kurgundiā, Lozerā, Gallo-provinciā, Yasconiae subulosis, in Italiā boreali, Dalmatiā, etc Gaud' il helv 5 p. 19 DC fl. fr. n. 29S0 Afirms bine S. plantagineae, illmc tennifoli-p Synonymia inti-cata. Icones Gmelini et Kitaibelii ad alteYas species referenda; Yauat scapo apice lanugino&o. (v#v et s.)
- 16 S pr ANT AGIN t L (Erbleich ' pi. exs Gaud. fl. helv. 5 p. 20), radice cylindracē a apice nudd, caule pancifolio i-cephalo aprre lanuginoao aot derauni glabro, foliis mfei petiolatis lato-lanceolatis 'J-uei viis apice subcallo&o acuminatis, in%ol ovalUcylinducl sqnamis lanceolatib subobtnsib floribus dnnidio brevioiibus, achamns stiatis«Iaevibus If in piatis hamidis nemonbus nion-tanis» Htlvefiae, Germaniae, Gallise S. hnmlis Willd sp 3. p. 2499 <<•!• Cls syn. Hoiu fl. dan. t. ib£3. S. glastifolia Heg.bely, 2*p i5y. S. ncivosa ccPou diet 7 p 22. (v v. et s.)
- 17 S SEMICVNA, radice cylindracea carnosā, canle erecto folioso ff>lycephalo apice praceitun pedicellisque cano-subtomento&iH, folns ldnceol.itis .intheseos temj^ore glabiusculis, mvol subcanescentis erecti squanus'ldtis adpressis, arhasniis muueatis *2 in montibus Asise minoris prope Mardm lgu cl Aucber pr txs. 11 3335^f Radix esc<lenta> [olia inf. basi attenuata, supei. sessilia s>eniamplexicaulia Pedicelli nudi axillaies fok'o longiores. I'olia jnniora vid<?anej,ccutia , idulta glabra. Floi flavi. (r. s coinh. acl inv)
- 18 S ARISTATA (Raraond in DC. fl. fi. i805 v 4 p 922), glabra, indicV cyhn-diaceā adcollum nudā, foliis radicalibus linear-sublanceolatis valdeelongatis 3-5-neniis intes;erimis ad basin aianeosis, caule i-cephalo sub capitulo paice /lanuginoso, invol o\aii sqnamis exler plmibus elongate laxis margineine-bianacejs, arbaamis tnberculato-marioatis. % in pralis alpims Pyrena?ormn locis dictis Pic dErenlids', Esquier, etc. S grandifloia Lapeyr abi (»8ii) 479 ex Rpntl} (v v et s.)

fL Alpma, foliis caule dimidio feie l)fē\iorflus,«imol. squain!& 2 augusto

acuiiuuatis, <caeteris albo-marginatis. % in Alpibus Austriacis. S. Alpina Hopp.! pi. exs. et in Sturm deulschl. il. i. t. 5c. S. Hoppeaua Sieb. ex Reichenb. il. exc. sp. 27D. (v. s.)

19. S. MACRO&HIZA (Schleich.¹ pi. exs. Gand. fl.helv. 5. p. 22), radice magn'vad coll urn uud: \y canle simplici aut subrarnoso apice pbesoenli-lanugiuoso , foliis radicalibus lanceolatis 5-nerviis⁹, 1'anlinis linearis-lanceolatis 3-nerviis, invol. oblongi sqnamis 91 re. 20 lauceolatis radio brevioribns, ligulis discoloribns. If. in torfaceis montosis Juranis circa lacuin de Joux legit cl. Schleicher! Accedil ad S. plaiUagineam. Certè c^versu à S. parviflora. Ligulas lqjeg subtus purpurascenes. (v. s.)
20. S. CROCIFOLIA (Sibth. fl. graec, t. 785, ined. ex Smith prod. 2. p. 123)", qaulibus basi foliosis erectis simplicibus i-cephali.s, foliis linearibus laxipintererrintis involucroqne glaberriniis, nérvo dilatato pallido, invol. squamis villo albo subtomentoso marginatis. % in insulâ Zaczyntho (Sibth. Marg.!), in rnestribus Melissa (Zncc.!), ad montem Hymettum (Audi. ! n. 333i). Caulis sesquipedalis. Folia .dimidiò breviora lineam lata. Cor. flavae. (v. s.)
- ar. S. TENUIFOMA (Schrad.! in litt. 1809), g^dra» fo|il% radicalibus anguslè linearibus integerrinVis, caule parcissimè folioso simplici i-déphaiq, invol. ovato-oblongi squ.nnis exter. acuminalis, int. acutis, achaeniis striato-angulatis sec us angulos mm.iculaiis. % in pratis alpestribus Pedemontii ad montem Begu propè Tendam ipse legi et circa Bussolino cl. ttalbis! S. Austriaca RalbM misc. alt. p. 2^ non Willd. Differt ab humili collo non iibrillis coronato et achaeniis malicatis. (^ v. et s.)
22. \$; HUMILIS (Linn. sp. lira), radice cylindracea ad coll urn fibrillis coronatt, foliis radicalibus ovali-oblongis ant linearis-lanceolatis glabris, caule subnudo simili i-cephalo, invol. ovali-oj>longi squamij acantis inargine membranaceis. % in pratis coflinis Europae et Sibirice. DC. fl. fr. n. 2979. Sc. ner.vosa Pers. encb. 2. p. 360. n. 2. 9. graminifolia Ledeb. fl. alt. 4« p* 161. S. Austriaca Gaud*, fl. helv. 5. p. 18. Collo fibrillis comosob omnibus ferè generis speciebus differt.
- *. latifolia, foliis elliptico- aut oblongo-lanceolatis plurinerviis. If S. humilis fl. dan. t. 816 (sed fibr. rad. desiderantur). S. graminifolia f. Ledeb. S. lanata Schrank. — Clus. hist. 2. p. 138. frs. S. hnmilis Jacq. fl. anstr. t. 36. franc et seq. commixtas refer, (v. v. et s.)
- jfi. Austriaca, foliis linearis-lanceolatis vix basi attenuatis capitulum fere aequanlibns. — in agro Vindobonensi undò verisim. S. humilis Jacq. sed icon, aut exhortaaut exsolo pingui petita priorem magis refert. S. Austriaca Willd. sp. 3. p. 1498. (v. s.)
- y. linearfolia > foliis linearibus suhglaucescentfbns. — in Sibiria et Ircuia. S. graiirinifolia et Dedeb. fl. fflt. 4. p. 161. S. Gebleri Bess, in litt. S. humilis angustifolia Turcz.! in litt. S. angustifolia Thom. et flor. helv. non Lioji. An species propr.? Tariat foliis inferne et praeserlim caule gjabro aut r.iriùs lanuginoso. (v. s.)
- J.? hrevifolla, fojüs linearis-sbalanceolalis canle triplo' brevioribns, canle bi/ido a cephalo. If. in Chiuâ boreali. Podospermum scorzoneroi.des Turcz.l in litt. Kructus maturos q^on vidi, sed ^ex habiln toto et '^ollo librillocointet-S. homilem etcrispam media,(v.s.comm.acl.Turczaninow.)
- a3. S.CRISPA (Bieb. fl. tanr/a. p. 234), clabra glauceacens, radicis tollo fibrillo.so, foliis radicalibus petiolatis lanceolatis undula/is nervosis atrinmic actinoinatis, canle folia linearis pauc gerent mono- ant oligocephalta, invol. squamis paucis exter. ovatis, int. oblongis. If in Tauriae col lib as apricis. Flores squamis r. ovatis, int. oblongis. If in Tauriae col lib as apricis. Flores hitei. Variat petiolis intedutn basi lanatis et foliis planis nee sensim andalatis. Hanc ultimam e Tauria recepi sub nomine Sc.Presoottii. (v. s.)
24. S. HisPANICA^Linn. sp. 1112), vadice cyliidrica, cade ramoso, ramis nudis. ipice i-rephalis, foliis amplexicaulihns lanceolafis undulatis apt sobdenticulatis glabris SL'u bine in do snbpube^cpniibus, invol. oblongi squamis glabrius-

- c-tulis acuminatis. % in Hispaniâ (Clus.) nbi contrâ -viperarum icts olim usitata, in Thuringia (Wallr.) Blackw. herb. t. 406. Lam. ill. 647. f. 5. S. denticula^a Lam^ fl. fr. 2. p. 82. S. saliva Gater. fl. mont. i56. — Clus. hist. 2. p. 137. f. 1. opt. — in hoîtis culinariis vulgo culta ob radicem eduiem. (v. v. et s.)
- /Si. crispatula*, foliis ad margines crispato-dentaiis. % in Hispania? prov! Malaga in Sierra Mi jar et Bonda legit cl. Ed ID. Bolster. (v. s. à cl. inv.)
25. *S. TAURICA* (Bieb. fl. taur. n. 1558 et suppl.), pubesces, caule erecto folioso polyccephalo, foliis inferioribus lanceolatis integerim acuminatis, super. li- neari-spatulatis, invol. squamis acuminatis subtomentosis. If. in Tauriae et Bessarabia? co* Libns aridis. Aflinis S. Hispanicae sed pnbrs vaga sublomentosa, rami prater peclunculos laterales nulli, invpl. breviu>, etc. Yariat ex Bieb. laM^ine minùs canescens circâ Borystheirem et angustifolia stib-i-cephala a^Plartsanam. (v. s.)
26. *S. MACROSPERMA* (TUFCZ. in lilt. 1833), glabra, caule ereclo tereti fululosò folioso, foliis elongatis lanceolatis plurinerviis semiainplexicaulibus integerimis, capitulis 4-5 corymbosis pedicellatis, invol. squamis exler. ovatis brevibus, ipter. lanceolatis elongatis, acbaenii elongatis. If in Dahirise herbosi* propè Nerczinskoi-Savod et ad fluraen Schilka detexit cl. Turczaninow. Habilu media inter Hispanicam et glastifoliam. Ab omnibus differt achsenio ultrà semen longè producto et quasi rostrato styli basi persistente mucronato. Au sectio pjiopria? (v. s. comrn. à cl. inv.)
27. *S. GLJWITIFOLIA* (Willd. sp.* 3. p. 1499« Reichb. fl. exc. i. p. 976), radice aubrylindraeâ, caule rainoso, ram is apice i-cephalis, foliis ovali-lanceolatis basi amplexicanlibus plauis acntis glbris, invol. oblongi sqnamis glbris acuminatis, achaenio juniore snbpirero. IL in collibus Thuringiae (Wallr.), Germanise, Bohemia, Silesiae (Willd.), Pedemoutii? (Gaud.j, Galliae anstralis (Benih.); S. Hispanica /S. Wallr. fl. jial. suppl. 3 p. 94. S. edulis Mench melb. 548. 'Valde S. Hispanicae affinis et polios var.? (v. v. et s.)
- yS. asphodeloides* (Wallr.! fl. haf. suppl. 3. p. g!), foliis linearibus acuminatis strictis carinaiis basi vaginanibus. % in Germapiâ. S. graminifolia H off in. fl. germ. 272.-8. angustifolia Wahl. ex Wallr. An polios S. montanas var.? (v. a.)
28. *S. MOWTANA* (Mutel fl. dauph. p. 268), radice cylindracea snperne nndâ, caule siraplici aut snbramoso parcè lanuginoso, foliis linear-lanceolatis basi attenuatis subcarinatis apice acuminalis bine indè sublanugiuosis, invol. ovato-oblongi sqnamis 10-12 glbris lanceolatis, exter. brevioribus. % in pratis moutanis Delphinntu^ (Mutel) et Sabaudiae (Bonjean!). Proximè accedit ad S. glastifoliam var. It. sed lanagine caulis et fol. infer, differt? (v. s.).
- Bcetica* (Boiss. ined.^, foliis et invol. sqnamis angustioribus. If. inter meta circâ Estepon. in Hispanorum legit cl. E. Boissier. (v.s. comm. acl. inv.)
29. *S. PARVIFLORA* (Jacq. austr. 4. t. 305 Lebed. fl. lit. 4. p. 161), glabra, collo multiplici nudo, caule adscendente folioso i-cephalo, foliis linear-lanceolatis subensiformibus integerim acuminatis basi attenuatis, invol. cylindrici squamis lanceolatis, int. elongatis, ext. subbracteiformibus, ligulis vir exaneis invol. paulò longioribus, achaenii lasvibus. 2f. in humi^is snblimnis subalsis in Hungariâ ad lacum Neusiedl (DC.), in Galliae littoribus Mediterraneis (Benth.), in Sibiriae Altaicæ (Bess.!), deserto Noryn et ad Salinas Ilezkienses (Pall.), ad Tanaïm (Stev.!), in deserto Sengoro-Khirgisico (Lebed.). S. caricifolia Pall. itin. 3! app. n. 131. t. Ji. cd gall. ap*p. n. 391. t. 99. f. j. Folia 7-8 poll. longa, 4lin. lata. (v. v. et s.)
30. *S. BUPHITHAI-MOINES*, glabra erecta, caule parcè ramoso iblioso, foliis latolinear>ns apice oallosis rigidulis in^tegerrimis, super, basi dilatatis, inv^J. glabro imâ basi tomentoso, squamis acuminallis subpatnlis ligulas snbiquanlibus. % circa Aleppm legit cl. Ancher! S. graminifolia 4uch.! pi. exs. • n. 3533 non Linn. Species insignis ob capitola expansa nee cylindracea, Bnplithalmuin salicifolium foliis etnabilucapitulirefricn?. (v. s. comm. acl. inv.).

- 3c. S. MACROCEPHALA, glabra, canle erecto tereti'subsimplici folioso a pice aphyollo, foliis confer tis sessilibus linearbas mtegerriinis apice feie snbiilatis aculis, capituh 1-2 longe peduncnlatis ovalis grossis, mvol. squamh nnbii-catisobtusiuscuhs (U)? in tolā fere Hisp.mi1 fiequens, et spec in regno "Valentino (Lag.!), in duructis et ad maigines ngroium a Malaga ad alt 5000 ped. in Sfeira Nevada (Boiss ') S. giamimfolia Lag ' in lift. S. graminifoha Lnsitanica Linn, sp ^(jiPexel Sibir. S. Lusitamea gramineo folio, etc. Tooin. inst. 477? Radix, gracilis simplex. Capit. 2 pollic. loDgum, polhcem et ultra Jatnra. Flores flavi. (v. s.)
- 3?. S RADIATA (Fibch.*! in litt.'Ledeb. fl. alt. 4- p 160), radice oblongo-cyhn-di areā, caule eiccto simplici subnudo monocepbalo , folns oblongo-lineaiibus acuimnalis neivosis planis, invol. sqiarois ovato "lauceolatis dei^Kfe glabris, coi. exteiiorib* rlongatis invol duplo longioiibus ladiuni inentif^fbiis Of in]diatis monianis Sibiriac Altaicse etDabuiiae (Fisch¹) et iu Glunā boienli (Bunge). Canhs juuioi plus minus tonaentosus, adultus glabei. Moies lutei —Gmel. sib. 2. p. 2. n 1 t. 1. (v s.)
- f. hneanfolia*, foliis angnste lineatibus, caule involncioque magis tomen-tosis. if in Cbina' boieali. Bunge¹ ennm. pi. chin n. 3Si (v s.)
33. S. STRICT A (Hqrn h hafn. (1813) 2 p 760. Bieb. suppl. p 522), canle ^tiicto simplici tereti apice stnato, foliis basi lanceolato-linearibus apice sum-misque subul.itis i-5 nerviis integerrimib, jiinionbus cauleque villosis, adultis labratis, capitulis i-3 tanulos nudos teuninantibus, l'nvol. sqnamis exteno-jibus vjllosis acnminato-siibulatis deignum tahescentibus —in campestiibus >pncis siccis ad Wolgam infer, ct aiiRhyninnm (Bieb), in agio Cheisonensi (BeauprJ) in deserto Songoro-Khiigislco (Ledeb.). S. villosa Bieb £1 tani. n f56Q.exe! syn S. torneruosa Siev. ex Ledeb Jl alt. 4 p i63 Capit magn. et *Foriiia* S. Hispanieae, lignhk luteis, ext. buntus puipaiascentibas ex Bieb. (v s.)
34. S. HALOPHILA (Fisch et Mey ! pi. Szow. ined.), glaberrima, radice apice .squamosd, folns.radicalrbns planh oblongo-lineanbus lineanbusve mtegerri-mifi acutii, caalibus scapisve erectis simplitbsimis i-cepbalis subapbyllis folia duplo supeiantibus, mvol. flonbus brevioie, squamis Jato-lanceolatis If, in l'ersias diitr. Kboi prov. Adeibeischan loris salsii bum id is, ad Schabanli. l>uxb. cent 2 t ai? Affinis S. caricifohaeet Aostrinac.Radix nunqnām stnposta: (v. s. comra. à cl. auct.)
35. S PVBESCENSJ tota pube brevi confertā sublanaginoso-pubescens, caule erecto basi folioso i-cepbalo, foliis erectis linearibus acutis integerriuis, in\ol. gblongi squamis ovato-lanceolalis acurainatis. — in collibus Altaicis circā Zmeof legit cl. Patnu' Folia 7-8 poll, longa , lineam lata. Capit. q-10 lm lon-gum io-12-floiuin. Cor flavae (v. s comm.abamic B Delesseit)
- 3b. Sv MOLLIS (Bieb. suppU p. 522), adice inulticipiti, foliis linea-sabnlati carina(is lanaginoso-villosis, junioiibus margine undnlato-ciispis, canle bre->issiuio folioso, peduncnlis elongatis subcoiymbosis in\olacerisque Idhuginoso-vjlllo^s. If. ingiollibus^apricit. sicois Tauii.e Hook. bot. mag. t 3o2^ S. tomen-Josa Pall itin 3. p 5i3, etc. non Linn. Folia adulta subglabrata, cauhs lon-gitml. xquantia. Invol squamae extenoies feie intei. .aeqantes C01. lutea* Mifctus purpui,scentes An foite ex Siev. Podōspeimi spec.^p (v. s»)
- :6. *leptopkyl/a*, radice ad collum tnberosā globosā, foliis hneaii-snbnlatis glabns, caule i-2-cephalo fohis-multō bievidrecano-tonientoso, inv squa-mis maigme tomentosis, exter. brevionbus % in prov Aderbeisran Persiaecirca.DeliiDanin colhbns aigillo<iis legit cl. Szowitz S. mollis Fisch. et Mey.' pi Szow. med. An species propiid^p (v. s)
- 37 S TOMEJTOSA (Linn. sp. 1112), tota tomentosa, caule lecto timplici, folns ovatis nervoais sessilibus mtegenimis, ramulis floudis axillaibus vix folio*Ioni-gioubns, bidrtws lai^ceolalis 7/ in Armeniā. ^ Oient. latifolia, etc. Toum cor. 36. Coloi. Hor igu.

&? *lanceolate*, foliis lanceolate-ovatis acutis. If. JS. fomentosa Willd. sp. 3.
p. IJ. 8; Pappus ditifitnr capillaris scaber^et ideò (si descr. exacta) à gene-
nere fortè alieua..

y? *Unearis*, foliis linear-lanceolatis apice subcallosis oblnsis velutino-to-
mentosis. % in Oriente. Jladix lignosa apice multiceps. Folia i -J poll.
longa, a lin. lata. Capitula lateralia f>edicello suo longiora, invol. squa-
mis paucis, ext. dimidiò brevioribus. Pappus more Scoizouerae plumosus.
(v. s.)

38. S. SERICEA (Aucb.! pi. exa. % 3307), acaulis pluriceps, foliis radicalibus li-
nearibus integerri mis strictis apice subcallosis utrinque adpresso sericeis, sea pis
folio vix longioribus sericeo-villosis i-cephalis, invol. squamis glabris linear-
bus aeruginatis. % in excelsipribus montibus Cappadocire id Euphratcm legit
cl. Aucber! Uerba 3-pollic. Habitus* ferè Gelasiae, sed pappi setae basi plumosa?.
Arbaenia glabra. (v. s. comm. à cl. inv.)

39. S. VELUTINA, tota tomento velutino cana, radice cylindracea, foliis radicali-
bus lanceolatis linearibus^ integrerrimis acutis, caulis folio bieboribus sira-
plicibus r-cephalis basi folia 1-2 gerontibus, invol. squamis vix acutis ereclis
dorso lanato-canis. % in Syria legit cl. Ancber pi. exs. n. 33r'i ! An adhuc
S. tomentnsx var.? Pappus rufiduhls basi pinmosns. Cor. flavae. Folia a-3 poll,
longa. Capitula. huplo majora qn'aminS. tomentosse var.^ (v.s, comm. à cl. inv.)

/O. S. FISTULOSA (Brot. fl. lus. i. p. 329), g^bra, caule adscendente articulato
iistuloso, foliis iistulosis cylindraceis apice subulatis, pedunculis apice-Snbvil-
losis, invol. squarais snbearinatis. % hi bnmidis et graminosis Lu^itaniae prov.
Beira. Cor. stramineo-lutesp. Radix fibrosa repens. Acbxn. et papp. indescr.

b' Foliis pinnatifidis.

4i- S. CORONOPIFOLIA (Desf. fl. all. a. p. aao. t. 44) i-pubescenti-'subtomen^sa,
caule erecto subsimplici i-cephalo basifolipo, foliis lanceolatis, aliis indivisis,
pjerisque rachi latâ pinnatifidis, lobis linearibus ina?qualib», invol. sr^iaiuis
mucronatis, exter. ovatis. % in montibus Tunetanis. (Vabl !) et Algeriensibus
(Desf.), S. brevicaulis Vahl symb. a. p. 8S.t. 44- S. laciniata \abl! herb. Fo-
lia ferè. Podospeimi , sed invol. et ff'uctus (immatrns eqnidein) Scorzonerac.
Cor. flavae ad faucem barbatx. (v. s. specim. à Vahl ad L'Hér. miss.)

43. S. CATVFSCENS, foliis'ad collum confertis rigidulis pinnatipartitis, lobis racbi-
quc linearibus subcanaliculatis, junioribus tomentosis, adnltis glabris, scapo
i-cephalo tomentoso foliis breviore, invol. squamis ovato-oblongis acntis, exle-
rioribus tomeutosis, inter, glabris. If in insula Scio leger. cl. Olivier et' Bra-
gûcre. Herba vix 3-pollicaris. Flores lutei. Fol. lobi 3-4-jugi, lobo terminali
exteris triplò longiore incurvo. (v. ».)

iSect. 11. GELASIA. —' Gelasia Cass. bull. phil mart. 1818. diet. sc.
nat. 18. /?' 285. 4^* P' 81 • — Galasia Less. syn'. 13/J-

Pappus inaequalis, setis ad medium usque plus minus scabris nee verè plumosls.
AchaMia glabra.

43. S. PYGM^A (Sibth. fl. gra;c. t. 783. Jned. ex Smitb. prod. 2. p. 122),
acaulis, scapo subnndo i-cephalo longitudine foliorum aut. paulò longiore,
foliis linearibiis aconiinatis canaliculatis snprâ snblan:itis, ihvol. squiinis acu-
minatis extùspubescentibus If iu Oly*nipi Bithynici caeniiine (Sibth. Auch.).
Herba vix 3-pollicaris. Radix longa sublignosa ad colluui niulticqis. Cor. flavae.
Pappus scaber. (v. s. coiuin. àcl. Aucher.snb u. ö308.)

44. S. RIGIDA (Anch.! pi. exs. n. 3309), acaulis, foliis radicalibus linearibns In-
fegerrimis ri^idulis utrinque tomento adpresso canis, scapis • folia quadruplò
superantibus nudis i-cephalis , invol. squamis do^s/* subincanis linear-lanceo-
latis acuminatis marginc subscariosis. If, ia montibus excelsioribus Cappado-
niac ad Euphratem legit cl. Aucheri Folia 2 poll, longa , lineam lata. Cor.
/ Pappus scaber. (v. s. roiiin. à rl. iuv.)

45. S. VITLOSA. (Scop. earn. ed. 1, n. §5*. t. 4\$- mal. non Bieb.), tola pilis sparsis villosa, caule erecto subramoso striato, foliis linearibus carinatis erectis iugerrimis, in vol. cirr. biserialis squamis acuiniuatissimis, arhaeniis rauricato-tuberculatis. ^ ^ i a agro Tergestino (Scop. Moric.!). *Gelasia villosa* Cass. diet. p. 286. Cor. flavae, exterior, capituli subtas ruhentes. (v. s.)

46. S. ANCYRITANA, tota villis cotffertis lanuginoso-villosa, caale erecto tereti, foliis lanccolatis maltinerviis, imferioribns ntrinqne attenuatis, super, basi obtusis subsemiamplexicanibus, invol. sqnamis biseriatis aenruinatis, exter. villoso, inter. glabris, acbaenys laevibas. — in Anatoliâ propè Ancyram nunc Angora sea Angoury (Liston!) et in Armenia (Auch! u. 3344). Radix tuberosa. Cor. ex sicco vid. pallidè flavae. Acbaenia, glabra angulatn-prismatica. Pappns multisetosns rigidus sraber. Stirps speciosissiqâ à clarâ dominâ Liston cum el. Parolini comm. (y. s. coinm. 'fld, Aucher.)

Sect. in. LASIOSPORA Less. syn. 134- — *Lasiospora* Cass, diet. 25.
p. 306. — *Lasiospermum* Fisch. non Lag.

Pappi setae plumosae apice nuda inaeqnales plariserales. Acbaenia villosissima ferè lanafa.

47. S. HiRSUTA (Linn: mant. 278), caalibos adscendentibus i-cephalis apicc subnudih, foliis lirf^aribns carinalis sparsè pilosis, invol. squamis aenminatis glabrf margin'e subsoariosis, % in collibus aridis Occitanjae, Galloprovinciae, Pealiuoutii, regni Neapolitani, Sjciliae. DC. £1. fr. n. 2981. Sc. eiiosperraa Goufill. p. 5a nou Rieb. *Hieracium capiilaceum* All. ped. n. 779. t. 3i. f. 3 ex anctnar. p. 11. *Lasiospermam hirtnm* Fitch. cat. b. gor. 1812. S. bispida For.sk. fl. p. 2i5 ? *Lasiospora* birsuta Cass. diet. 25. p. 308. *Gropogon calycnatus* Linn. syst. veg. 562. Jacq. h. vind. t. TO6. et *Geropogon hirsatus* All. u.u Lin p. ex Sniith in Rees cycl. v. 16. *Gelasia Jaequini* Cass. diet. 25..p. 82. in not A Seorz. Julia Vést in florâ 1820. p. 6. ex Moesl. et Reichb. Cor. flavaj. Invol. glabrura. Canlis et folia variant plus minus glabrata aut pilosa. (v. v. et s.)

48. S. ERIOSPERMA (Bieb. casp. 117. n. 28(excl. syn.) fl. taur. et sopf/i. n. 1570 non Gon.), caule basi adscendente ramoso folioso, ramis floridis nudis, foliis angustè linearibus carinatis basi lanntis, invol. subvilloso aut glabro. *IL* in apicis graminosis Caucasi circâ thormas Constantiuontanas (Ricb.), ad Tiflim (Stev.! Szovv!). *Lasiospermom anguspfolium* Fisch! cat. b. gor. 1812. p. 34. *Lasiospora angustifolia* Cass. diet. a5. p. 306. *Acharnia densissimè* villoso-cana.

49. S. CRETICA (Wjlld. sp. 3. p. T504), caulibns adscendentibus basi ramosis, foliis linearibus planis subciliatis, invol. squamis exter. brevissimis margine pnbresreutibus. *IL* in Cretâ. *Lasiospora Cretica* Cass. diet. 25. p. 308. Scorz. *Cretica angustifolia* seraine tomento candidissimo. Tonrn. cor. 36.

50. S. ENSIFOLIA (Rieb. fl. taur. 2. p. 235 et suppl. p. 523), caule erecto folioso polycepbalo basi lanito, foliis lineari-ensiformibns nervosis apice filiformibns aubvillosis, invol. tauaginosi squamis a*luminatis*. *If.* in arenâ mobili deserti Cjurasico-Casjyci et ad Wolgam inferiorem ad Sareptam, Kiikas, etc. *Lasiospermum ensifolium* Fisch ! cat. h. gor. 1812. p. 34. *Lasiospora ensifolia* Cass. diet. 25. p. 307. (v. s.)

51. S. TANATA (Rieb. fl. taur. et suppl. n. r.^74 }, radice tuberosa, canle i'-ceplialo scapifonui p/arcè lanato folia duplò et nltiR superante, foliis radicalibus linear-lanceolatis nndulatis sericeo-lanuginosis, iuvol. squarais exter. sericeo-lanuguiosis. *If.* in Iberhe collibus siccis circâ Tiflim (Bieb. Szow.I), circâ Derbentuin (Stev.), in Asia miuorc (Auch!) ad pagum Gorluk ad ripas. Euphrati (Chesn!), in Grjeoâ ad Naupliam (Zucc!). *Tragopogon lanatus* Willd. sp. 3. p. 1495. *Leoutodon lanatus* Linii.äincen. 4. p. 287 excl. Ranw. syn. ex Smith. *Lasiospora lanata* FiscliJ et Mey! pi. Saow. ined. *Troximon Tlanarus* Pers. enh. 2. p. 360. — Clus. hist. 2. p. jt45. Cor. flavac invol. paulo longiores. (v. >^

52. S_MI*TIFOIIV, cancscenli-loineniosa, <*NMC erecto folioso polycpbalo, foli¹

oblougis acutis nervis sublongitudinal. notatis, in vol. squainis acutis torn entoso-canescensibus. *If* ill montosis hei»bidis Persiae valle Kadschadnra prov. Nakistcbwan etin montibus Seidschadschiprov. Aderbeischan legit d. Szowitz! Lasiospora laiifolia Fiscli. et Mey.! ind se*i.* b. petr. 1835. p. 30. Aflinis S. ensifoliae, sed folia latiora brevius aouminata, pube brevi toinentosâ subscriceâ ncc villis loogis instructa. (v. s.)

53. 5. ERIOPHORA , tota sericeo-lanata , paule i-cepbalo ad apioem usque paten-
tim birsulissimo foliis non longiore, /oliis phrisqne radicalibus linear-lan-
ceolatis 5-nerviis, invol. sqnamis liuearibus acuminalis ljjulas adxquantibus.
% in Cappadociâ ad Eujibratem detexit cl. Aucber pi. exs. n. 33^! Affinis
SJanatiE. Lfmugo ferè Hieracii eriopbori. Flores flavi. Achaenia lanato-villosa.
Herba 4-pollic. (v. s. comm. à cl. inv.)
54. S. AUCHERIANA , caule erecto rainoso stria to, foliis linear-lanceolalis acumi-
natis trinerviis marginé lœvibus integrerimis parcè sulvelutinis, adultis glabris,
capitulis longè pedicellatis, invol. squamis ligulas subæquantibus dorso sub-
canescensibus. *¶* in Cappadociâ ad Euphratem legit cl. Aucber! S. divaricata
Anch.! pl. exs. n. 3315 non Turez. Aflinis S. latifoliae sed glabrior, folia 3- nec
7-9-Dervia, capitula dimidiò ferè minoia. (v. s. comm. à cl. inv.)
55. S. NERVOSA (Trevir. ex linnaea 1835. lilt. p. 73), canibas ereclis simplicibis
polycephalis, foliis ventiicoso-hmceolalis margine scabris multineiviis araci-
noideis, acba;uiis lauatis. *If* in Armeniâ. Girt. ign. |.

Sect. iv. PENTACHLAMYS.

kivol. squamae 5 nnisciales. Acbxiiiia giabra. Pappi seta? paffcae basl pl||n6sce
apice aristaeformes. — Species Indic. An genus proprinni ? *^

56. S. BUPLEUROIDES (Don prod. fl. nep. 162), caule ereclo i-cephalo glabro,
foliis linear-lanceolatis acantis pla/iis glabris basi villosis caule brevioribus, in-
vol. 5-pbyllo, pappo inaequoalWscabro. (*j*) in Nepaliae montibns legit cl. Wal-
lich. Radix fusiformis. Flores striati involucro breviores. An ex invol. 5-pbyllo
et pappo scabro vera Scorzonerae species?
57. S. ROTLEI „, canibns è basi rapiosis erectis glabris, ramis apice^nudis i-cepbali-
lis, foliis lanceo^alo-linearibus basi dilatata subvaginautibus maigine villosjs
apice callosis glabris, invol. 5-pbyllo, pappi setis basi plumosis apice nudis. —
in fudia orient, legit cl. Royle. Species ab omnibus Eoropjcis distiuctissima.
AflinisjS.buplenroile) videtnr sed flores invol. per anhesin breviores deniùm lon-
giores, pappus ve-re pluinosus et folia basi vaginantia (ferè ut in Alopecuro)
et pallida satis distinguunt, saltern ex dcscr. Doniaua. (v. s. comm. à cl. Royle.)

Sect. V. POLYCLADA.

Capitula 6-8-flora. Invol. squamae 6-8 pluriaerales. — Caules ramosissimi fo-
liosi. Cor. flavx.

58. S. DIVARICATA (Turcz.! Uec. p. n.-n. a3), giabra, radice suffrutescente, cau-
libns ramo.sissimts divaricatis, foliis hrevibus fliforruibus apice uncinato-rcon-
vatis, capitulo pancifloro,invol. cylindrici cano-pube.scentis srjuafuis inter. 3-5
iufer. totidem abbreviatis. % in montosis lajjidosis Mongolia} Cbinensis. Flores
pauci lutescentcs subtùs purpurascentes. Achania glabia. Pappus basi plomo-
sus. (v. s. comm. à cl. auct.)
59. S. RAMOSISSIMA, caule erecto ramosissimo, foliis lineaibus glabris a^mi-
natis, capitulis longè pedicellatis nudis circ. 6^-floris, invol. sqnamis aWmi-
natis lignlas a>quantibus. *If*. in Orients ad tlwend legit cl. Aucber! S. erio-
sperma Audi.! pi. exs. n. 3330, sod differt ab eâ et ab omnibus fere aliis capi-
tulis 6-7- nec nullifloris. Folia cauliua circ. polliccm loiiga , 1-2 lin. lata.
Cor. flafae. (v. s. comm. à cl. inf.)
60. S. virgata , internè sublanata, cæterum glabra , caule ramosissimo , ramis
virgatis, foliis sub origine ramorum linearibus elongatis acutis , capitulis pau-
cifloris , invol. 6-7-phyllo glabro. *¶* in Indiâ bor. occid. legit cl. Royle! Aflis-
nis S. divaricatqe, sed folia Jougiora apice noo unoinala. (v. s. comm. à cl. inv.)

J Species non satis notai.

61. S.? AFRICANA (Poir. diet, suppl. 5. p. n 4), caule suffruticoso credo defcili rainoso, foliis sciamplexicaulibus pinuatilidis denliculatis crassis glabris, pa- niculâ diffnsâ pediinctilistsubnmbeH'atis. /\$ in Africâ orientali propè Mozam- bicuni. SOONK pinnatilida Lour. fl. coib. ed. W. v. a. p. 584. Invol. oblonguin. Cor. dilutè luleae. Pappus pluniosus.
- T2. S. AMBIGUA. foliis glabris Hnearibus aplice callosis, radicemaximâ tuberbsobnjbosâ ia collui supernè attenuatA. If in saxosis insulac Meli (d'Urv.), et in raonte Kougourlon circa Byzantium (d'Urv.). S. arancosa d'Urv.! eunni. n. 729CXCL syn. Differt à J. araneosâ verâ foliis anpusti* glaberrinjis etcapitulo (teste Urvilleo in lilt.) luleo, it S. lanalâ foliis glabris, etc. Ex foliis valdè ac- cedit ad S. crocifoliam Siblh. sed auctores circâ bane loquentes silent dc radice tuberosâ. (v. s. sine flor.)
63. S. CHONDRILLOIDES (Pourr. in Willd. sp. 3. p. 1505), caule subaphyllo ra- luosissimo, foliis radicalibus linearibus *obfusi^ integrU clentatis runcinatisve, pedueulis squamosis.— in Hispaniâ. Facies Choudillae. Pappus Jessilis plu- liosus. Ca?t. ign.
64. S. DALMATICA (Host fl. anstr. 2. p. 391*), caule stria to birsuto supernu aphylllo, foliislinearibus glabris, invol. squamis membranaceis hirsntis cuspi- datis. % in Dalmatiac insulâ Lissâ. Cx't. ign.
65. S. GRAMINTFOLIA (Linn. sp. ni'i), foliis lincari-ensiformibus hilegris caii- nalis. —7 in LusiUnia, Sibiria. Species oraninò obscura. Var. Lusitanica est foliis macroAbhala uo.stra. Yar. Sibirica videtur S. paivillora. Syn.Buxbaju- m. (cent. -2. t. 21) non male S. angustifoliam refert. f.
- GG S. HISPIDA (Forsk. A. seg-ar. p. ac:i), pilis a Ibis rigidis fu re at is hispida, canle erecto subfolioao i~3-ccpbalo, foliis runcinatis, peduealis sub pedunculo in- crassatis, achienis linearbus. — in Galalia. ^Pappus substipijntus plomosns. Au eadern ac Aslcrotbrix aspei rinia ?
67. S. LANDGINOSA (Ibauing. 11. trans. 3. p. 9), molliler et densè lanata, caule erceto augukto striato sujernè rainoso, foliis corymbosis, invbl. squamis ovato-lauoeolutis. If. in a rid is montosis Transylvania; juxtâ Bony ha. Cor. sul- *pburco-lute<£. Abuiri. indescr.

-j- + Species excludm.

- S. ACAULIS Willd. = Taraxacum palustre <£
- S. ASVERADef. =7 Hymenonema asperum.
- S. ASPERRIMA Willd^ = Asterotbrix asperrima.
- S. AUTUMMAiis Linn. = Oporinia aurumnalis.
- S. CALCITKAP!FOLIA Viibl. = Podospeiniuu calcitrapifolinra.
- S. CALLOSA Mov. = Podospermum callosum.*
- S. GAPENSIS Thunb.= Lactuca Capensis >2
- S. CILIATA Forsk. = Pici'dium Tingitanum.
- 3- COLUMN*: Guss. = Podospermum Columnx.
- S. CRPIOIDES Poir. •= Sonchiis crepoides.
- S. DICHOTOMA Yabl. = Microrhyncbus nudicaulis fc,
- S. ERIGATA Willd. = Hymeñonema Giæcnro.
- S. GLANUULOSA POUIT. = Zollikofeia paraila.
- S. GKJECK Linn. =/liymenonema Gra3cum.
- S. ursriDA Bicb. = Asterothrix asperrinia.
- S. HiSPinLA Spreng. = Opprinia bispidala.
- S. XACINATA Bieb. =^Podospernum canum.
- "5. LA^miATA Linn. = Podospermara lacifiatiuii.

- S_f MURICATA Balb. = Podospernum lacuiatum *fi.*
 S_> OCTANGULJVRIS Rotb. = Podospermum octangulare.
 S. ORIBNTALIS Linn. = freridiuin, Orientale.
 S. PETIOLARIS Lapeyr. ~ Podospermum laciniatum.
 S. PICROIDES Linn. 2= Picridium vulgare.
 S. PINFOXIA Gou. = Podobpermuni lacuiatum *y?*
 S. pNWATIFIDA Michx. = Pyrrhopappus Carolinianus.
 S. pLuRiriDA Lam. = Potlo[^]peinuiu cal'citrapifolium.
 S. ITJMILA Cav. = Zollikoferia pmila.
 S. BESEDIFOLIA Linn. = Zollikoferia cbondikloides.
 S. RESEDIFOLIA Retz. = Podospernum calcitrapifolium.
 S. STYLOSA Pers. = Hymenonema asperum.
 & SUIULATA Lam. = Podosperrraunf laciniatum *y*
 S. TARAXACI Roth. = Taraxacum palustre *¶*
 S. TARAXACIFOLIA J[^]cq. = Hypochseris Balbisii.
 S. TENORII Presl. m Podospermum Tenorii.
 S. TINGXTANA Liuu. ^ Pićryliuui[^]iugitanura.
 S. VILI.USA Bieb. zzz Podospēiinum villosum.
 DCCCXIT. ASTEROTHRLX Cass. diet. 48. p. 43*. Less. sjn% U3. — A[^]rcias
 &p. Bieb. — Scorzonerje sp. FFJld.

Capitulum multiflorum. Invol. imbricatum aut subimbricatum, squamis dorso strigosis. Recept. nudum. Achaeuia lerefia in rostrum tecnic ab acha3iiio ipso diversum producta. Pappus* pallidescens pluriscriulis, setis longè plumosis basi non dijatatis omnibus inter se similibus".:— Herbae Australi-Europae saepius cauloscenles et folios[c mono- aut oh'gocephalx. Folia oblongo-lanceolata dentato-inciss. Pili totius plantx rigidi p[^]tuli, onines aut plerique apicem stellato-bi- seu trifurcati. Flores ilflvi.— Genus biñe ScorzOnerae aut' Tragopogoni, illinc Apargiaeafinc.

1. A. ASPERRIMA (Cass. l. c.); caule foliisque pilis confertis stellato-furcatis hirtis, invol. cylindraceo, achaenii præsertim secus rostrum scabridis. *¶* in apriis siccis Caucasi orientalis et Iberia (Bieb.), ad Tiflim (Stev.!), in aridis montium Talusch (Mey.), inter Casbin et Recht Anzely ad mare Caspium (Michx. in h. L'Hér.!). Scorzoneria asperriina Willd. sp. 3. p. 150?. ApLrgia htrigosa Bieb. fl. taur. a. p. 249. Scorzoneria bispida Tieb. casp. add. p. 210. non Forsk. Acbaenia rostro iucrhs'o 9 Hn. longa. (v. a.)
2. A. HISPANICA, caule foliisque sparse binis pilis aliis simplibus, aliis apicem stellato-furcatis, invol. caiupanulato, acbaenii (saltern immaturis) lacinibus. (*ff* in collibus regni Hispano—"Valenlini" (Cav.! Dnfour!). Leonodon bispiduni Cav.! icon. 1 p. 30. I. 149. non Linn. Apargia Hispauica Willd. sp. 3. p. 1553. Leontodon Hispaniulin Merat ann. se. nat. 2a. p. 106. Cbr.'in siccо ut in Tolpide virescentes. Vaffct caule scapejsi i-cephalo aut subraiuoso parce folioso 2-3-cepJialo. (v. s.)

DCCCXY. MICRODERIS. — Crepidis sp. Ait.

Capitulum multiflorum. Invol. biserialis, squamis- extcr.. brevibus linearibus. "ilecept. nudum* Achaenia oblonga[^]teretiuscula longitudina- liter striata apice in collum brevè producta. Pappus imiscriialis plumosus. —Herba Azorica perennis. Folia radicalia elliptica basi cuncata, in parte cuneatā integerima, caeterū grosse duplicato-serrata, selis in paginā superiore sparsis hispida, secūs marginē longè ciliata. Scapus nudus, apice corymbosus, squamis linearis-subulatis parvis ad basin pedicellarum elongatorum et involucrorum. Flores flavi. Differt à Cre-

pide pappo plumoso, à Picride achaeniis non transversè rugosis. —
• Women ex /mmpoc parvus et <T>> cTwia seu «T>>, qollum.

1. M. REGENS. *If*, in insulis Azoriris (Masson ex Ait.). Crepis rigens Ajt. kew. ed.-i. v. 3. p. 127. Scapus* pedicelli et involucra glabra. Folia 6-6 7 poll, longu, 2 poll. lata. (v; s. ex h. kew. in herb. L'Hér.)

DCCGXVI. PICRIS Juss. gen. 170. Gcertn. fr. z.p. 366. t. i5g.f. 2. DC. fl. fr. ed. 3. o. 4. p. 5^ Less. sjn. 132. — Picris et Medicusia Moench Reich. — Pi- cridis sp. Linn.

Capitulum mulLifloram. Recept. liudum. Invol. biserialis, squamis exter. brevibus saepiis patulis. Achámia terctiuscula basi et apice subattenuala transversè rugulosa, areolâ terminali, rostro aut nullo aut achaenio triplò breviora. Pappus saltern, disci plupiosus biserialis, serie exteriori breviori subca^illacea. — Hcrbae pleraequie Euro Lies erectae, vamosac, pilis glochidialis *spere. Capitula. lutea pedunculata. Folia Integra den la la, rariū pinnatifida.

Sect. 1. EUPICRIS.

Achaeniorura omuiuin pappl conformes primosi,

- 1.-P. BIERACIOIDES (Linn. sp. IUS), canle erecto pilis plerisque glochidiatis scabro apię corymboso-ramoso, foliis semiamplexicaulibus lanceolatis grossē t1^Ais scabvis, invdl. squamis exteiioribus laxis pblong^is. (2) nee IL iu EuW̄ab teniperatae versaris agroiti et secūs vias à Galliā ad Caučasam, Engl. bol. t. 196, Lam. ill. t. O48. f. 2. Crepis hieracioides Lam. fl. ft. a. p. i n. HedypRois híeracioi(|ps Huds. angl. 34'2. Ciepis virgata, C. scabra et C. lappacea Lapeyv.abr. pyv, 483# excL syn. Pedicelli elon^ati. Pappus sessilw. (v. s.)
 fi. brachjrpoda, pedicellis capitulorum abbreviatis. (2) in asperis Occitaniaj
 . Liguriae, Taunx. An forte P. crapoides Sauter in floii i83o D. £00. ?
 P. sonchoides Vestln flora 1820. p. 5. (v. s.) ”
 ^. Indica, corymbo magis divaricato. — in* India or. ad Courtallum (Wight!). Forte F. haniulosa WaU.! cat. n.%3255, in TJepalii lecta, ah hac . non diffiert. (v. s.)
 &. ruderalis, corymbo subumbellato, invol. squamis exter. latioribus, — in Bohemia (Schmidt), circa Odessaio (Bes^er!). Picris ruderalis Schmidt in Willd. sp. 3. p. i55B. (v. s. coinv. a cl. Besser.)
 . paleacea, foliis hitpidulis lanceolatis dentatis, „,per. sesilibns, capitolis uinbellato-corymbo!,is. — in demissis -el moutariis Slyri>superioris, Cau- casi. Hicris paleaoca Vest sylf. soc. Ratisb. r. p. 7j{ ex Host fl. austr.! 2. p. 4aj. Lcontodon uurbellatiini Srhrank fl. bav. a. 334. Apargia uuibel- lata Schrank demk. ges. reg* a. p. 66. Picris umbellataNees cotup.fl. germ. a. p. 273. (v. s.)
 a. P. PAUCIFLORA (Willd. sp. 3. p. i55y,), subglaescens pilis plerisque glochidiatis aspera, caule erecto parc ramoso, tollii lanceol.-itia'deutatis, infer, in petiolum alkenuatis, super, aurito-sagittalis ses^ilibus, pedicellis elon^atis uudis, invol. squamis exter. paucis brevibus painlff&ueari-seraceis, inter, con- c-iwis snbtorulosis. (1) in Edropae anstralis apiicis et ruderatis nfjiupè in Gallia ailbtrali, Hispaniâ, llali^, etc. DC. fl. fr. 4. p. 57. ic. rar. t. 20. Picris Chaixi PoiWimpl. 4. p. 4to. Crepis,Sprengeraria All. ped. n" 8ro. ex descr. et ex speciru. Uafbis. Pieris pyrenaica Gaertn. fr. 2. p. 366. t. i5g. t. 2? icris gran- difloni T>n. syll: p.,..^;? ann. st. uat. 4-P. a6a? Crepis lappacea'Willd. sp. 3 p. 1599. Medicijw lappacta Reichenb. fl. exc. r. 254. Capit. flores invol. p'aaii. superantes, in Ic5ne noslri citata nimis ampliae. (v. v. er s.)
 3. P. SrRENGERiAWA(Larn. diet. 4 p. 310), pilis plerisque glochidiatis aspera virescens, caule erecto rainoso in>6 raiuosiwimo, f)lji, lanceolatis den^iis, infer, in petiolum attenuatis^ caulinis auvito-sagittatis sessilibns, pedicellis te- reuibaa, invol. squamis exter. brevibus linear-setuceis patnis, inter, (gitoavis torulouB.£iin aspt-ris et tcpihus liun>p.e Medilcnaueaj ad Malagam, Narbo-

- nenf^ANicieam, iu ins. Zacintho, etc. Hieruoium Sprengerianum Linn. ap. n 3.
Crepis Sprengeriana Willd. sp. 3. p. iSQS.'Mediuuaia Sprengeriana Rēicbeib.
H. exc. L. p. 254. Crepis rhagadioloide's Linn, niaut. Jacq. h. scbce.'ib. t. |AA
'Picris rhagadioloides Pers. enh. Medicnsia aspora JMxKnbc.— Mori's oxon s " " "
t.5. f. i5. (v. v. ets.j. " " " "
- 4- P. LAXA, infernè setis glochidiatis hirta, supernè glabra lax^c r.iniosissima
foliis oblongLshirtis basi attenuatis baslato-amplexicaulibus dentato-subsiuuatis'
summis inimis su^Apullis", pedicellis teretibus clongatis, invol. squamis exter'
dblóngis adpressis, inter. hirtis. (T) in agro ConsfantinopolUano et forte
Daiuasceno legit cl. Ancher pi. exs. n. 3418! et 3416? Capit. dimidio quam
P. hi<racioidis minora. (v. s. c p m. à cl. iuv.) *
5. P^A.DABURKGA (Fisch. in Horn. h. hafn. •suppl. add. p. 155), pilis plerisque
glochidiatis hispidissima, caule erecto stricto ramoso, foliis oblongo-lanceolatis
dentatis, super, acuminatis integerius, invol. hispidissimi squamis exteriori
bns laxis brevibus. (T)? ? in Dahuriā (Fisch.), in herbosis propè Tonca^m
(Taroz.Jj, ad fividornm margines Srbiri.t Altnica? et.iu dese^Ato Songoro-Kbii."
gisico, si ut videnir Picris Kamtsbatica, Lecfeb. fl.: alt. 4. p. 159fbuc addu
cenda. P. Dahijrica Beruh. ex car.'h. tanr. i8ai, p. 43, P. virens DesF. cat. h.
"par. ed. 3. p. 3(j). Certè à P. bieracioidi diversa quidquid dixerit Spreneel!
* Achsbnia ru/escentia muriculato-rugosa apice modiceatteaatu. I'appus flor"
omnium conformis. (v. s. coram. à cl.TTurcxaninow.)
6. P. INTEGRIFOT.IA (Desf.! cat. h. par. 1815), pilis apice glochidiatis ~~aspera~~,
~~caule~~ ~~erecto~~ ~~ramoso~~, ious integrum, inter. obovato-dblong^b obtusis in
petiolam attenuatis, caulinis basi cordatis semiamplexicaulibus acuminatis,
capitulis laxè ~~panien~~latis. pedicellis natentibus characteristicis invol. ~~latis~~
simi squamis exter. patnlis. (I) in Europâ (Desf.), in Oileeute (Michx.'ex spe
cim. h. L'Hér.). Crepis aspera Lam.'diet. 1. p. 180 non Linn. Picris aspera
Poir. snpl. 5. p. 3io in not. Acbaenia rufa snbarenara transverse ru^cosa
ulrinque attenuata. (v. v. el s. c.)
7. P. HAMULOSA (Wall.! comp, n. 365. list. 3266), caule ei;ecto strigpo pani
colato-rainoso, foliis objongis hispidis, radicalibus ba*bi* attenuatis dentatis'
summis acuminatis, petiolam integrum, pedicellis bracteolatis, invol.
squamis exterioribus linearibus paydis ciliolatis, inter. leviusculis. (I) in Ne
paliae ruderatis legit cl. Wallich. Herba sesquipedalis. Pili caulis apice ~~ancri~~
nato-sullulati, foliorum recti ne< sen^Aim hiiJiulosi! Achaenia a pice sub itte
"?" i^c y lindracea. Ab h » 9^b non satis differre videtur P. strigosa Wall.! conip
n. 366. list. n. 3a^b6. noil Bieb. (v. s. conun. ab bon. cfct. mere. angl. In*, or.)
8. P. LAcwiATA (Vis. p. rav. dalm. p. 24. n. 37. in flora 1839), to* pilis apice
gloobidiatis aspera, canle erecto aptce coiymboso, foliis "pinna lira iuciso-denl
tatis dentibus acuminatis. summi corAuo-jjenijaiiplexicaulibus. iiftegerrjinis.
pedicellis snbfistulosis, invol. squamis exterioribus lax^b. (2) i^c ripesribus
Ouai et Ascrivii Dalmatiæ (Vis.), in fruticetis ad Cattaro llum. et in agro Ragu
sino legit cl. Tommasini. Crepis la ppacea Host fl. austre. 2. p. 42: qui à cl.
Tom. recepit, C. hieraciq|ps Schj^Anhr bandb. t. 216. Picris ~~scraberi~~
Guss. syll. 3g6? Crepis ~~midissima~~ Badd, ex R. Reichenb fil. et exc. p.
Picris hispidissima Kosb syn. p. 4ii. Crepes laciniata Scbkuhr n. A^At5 A^Ainc
nia< P. hieracioidis. Capitula payl^b majora. An ide^c-Picris bierac. k sinii ["]%
deb, buc revocanda? (v. s.) *
9. P. sTRIGFsA (RiqJ.fl. taur. n. 1603. C A. Hey.! ennm. cane n 4TM non.
Wall.) „Muleaiibpainlo panicalatp-ramoso pili^b apice fureateHoncinaSri. cum
foliis hispido, Cblis lanceplatis grossè de^Atat's,^pedicellis. parce •bracteolaiis
invol. sqamis exter. patulis linearibus brevil^bs. If, l_n collibus herbidis Cau^A
casi orieutal^b versus mure Caspian* (Bieb.), prope hakan in montibus Taldsch
(Mey.). An 1*. ngida Ledeb. in ,Spreng. sysfc 3. p. 663. ab hac satis diversa?
Actu^c rufescenha, utnnqne vixsiibattenuate, mgi_s transversisparvis notata.
(v. s.)

10. P. GLAUCESCENS, caule erecto laevinscolo angulato paniculato-ramdR, foliis sublincaribns glabris, sMperiojibus inlegurriinis, pedicellHl involucrisque to-nienloso-canescensibus, squamis iny* exter. Hrevibns. — in Iberiā circa Tiflim legit cl. Steven. Ambigit inter laevem et strigosam; à priore caule pilis pau'cis brevibus hino indē stiigilloso, acbamiis aon sensim roslratis et in vol. liagis canescente; à*posierore pilis caulis paucissirais brevibus, foliis glaucescenti-bus disineta. Folia radic. mihi ignota. (v. s. comtn. à cl. Steven.)
11. P. LIEVIS (C.-A. Mey.! enu'm. cane. n. 473), subgularfa, canle assurgente à basi ramoso, foliis subliaearibus siuuato-^leritatJ. s. bperioribus subintegerri-lnis, pedicellis elongatis subnbdis, invol. adpressè'liibcanesceuius squamis lincaribus, e^erioribus paucis brevibus. — in promontorio Cauçasi ad ripas fluviorum. Hypocboeris canescens Stev.! mem. soc. nat. cur. raosq. 4- p< 60. Bieb. snpl. p. 53Q. Achaenia.apice breviter sed'evidenter rostrata. (v. s.)
- ia. P. ANGUSTIFOTIA, pitis pierisqe apice gloAiidialis kirtelia, caule erécto apice parcè ramoso, folifc linearis-sublaneeolyris dentatis ant snbintegeiriiuis, infer, basi attenuatis confertis, superioribns CQ id at is reiuotis, pedicellis leretibus parcè bractcolalis, capiltulis Paxè paniculatis paucis, invol. junllris cane.scentis squamis ext**. brevibus snbpatulis. (l)? in Nov^Uollandia; ora me rid ion. etorien-tali legerunt itin. ItandiriLani socij, et in sylvaticis circa BaYhurst cl. A. Cfningbam! Acbaenia rufa transversè rugulosa ip Stipitem bfevem alteuifara. Fo-lia 3 poll. 16nga, 4 lin. lafa. (v. s. cdrahi. à TUOS. reg. par.)
- i3. fl R SULPHUREA (Delil. fl. xgypt. p. ii^ t. 40. f. 2), pilis apice pie risque glo-cryniatis sparsishirtella, canibus plurimis eeredis<ubramosis parcissiuè foliosis oligocephbalis, foliis radicalibus patuiis lincari-lanc^olatis siuaato-den^atis basi attenuatis, canlinis linearibus integeirimis, invol. squamis exter. linearis-subu-latis ybad.prcessis. (l) in jEgypto ad ripas Nili (Sieb.), in insnlâ Gezyrct El-Dahab propè veterum Kabiruiu (DelH.). Poir. suppl. 4. p. 408. Acbaenia rufa transversè rugnlosa, distinctè sed breviter rostrata, omnia conformia. Cor. sul-pliineoe. (v. s.)
14. P.? UCMILIS, pilis plcrisque simplicibus parcè bispidula, caulis plnrimis parcè foliosis famosis, foliis radicalibus oblon^o-linearibus basi attenuatis apice obtnsiusculis integrk ant parcè lohati.s, 14vol. squamis sparsè pilosulis, ext. parvis, pappi selis rigidis. (j) in SngatTu* ex berb. Leprieur. Radix simplex exilis rigiduia. Caules scapifbimes, folijs^Aplo^ louijfiore.s^crre. 3-pollic. Pap-pus srdridus i-seiia)w. Flores vix noti. An genetice^separanda? (v. s.)
15. P. JARONICAjThunb. fl. jap. 299), caule erecto Vspido paniculato, foliis lan-ceolatis deutatis pilosis,infer.*basi atlenuatis, pedunculis rfpbyllis elongatis in-vo^ucrisque Lisp id is.— in Japoniae montibus l'akoniai. Acbsenia oblonga rugosa. Pappus ^lumosus. Invol. duplex erection.

Sect. 11.' SPITZEI^IA. — Spitielia* Schultz in ann. sc. nat. 3. p. 302.
et in florâ a833. p. 725.

Acbaenim marginalim pappus* abbreviatus^jjosus ant vix pkmosus, pilis inrerdtim ad inedim in coronulam conAetis. -HJitn genus proprium?

<6." P. ALTRIMA (Delil. fl. xgypt^x 16. t. i4'- f. 2), canle erecto pilis apice fur-cato-uncinulatis liispido apice paiciulariawmoso, foliis' strignso-piloHfs, ra'di.. calibus sinuato-dentatis oblongis, snperipribns linearis-lanceolatis vix dentatis, capiulis plcrisque pedicellatis paucis lateralibus subsessiibus, invol. strigo.si squamis exter. brévibus h'ne'aribiis, fl. m. irginaliuii pappo1)reviori*vix'pliiuob. (j}in insulis Niloticis ^Egypti. Helm. Sgyptiaca eudiviae foliis, etc. Vaill. act. par. 1721'. p. 206 ex Delil. Acbaenia apice vix attenuata. (v. s. c. in h. genev.)

17. P. NILOSA (Delil. fl. aegypff' 116. t. 41. f. 1), tota pilis patentibus conferrishis-pida, caule erecto ramoso sufundo, foiiisoblongis dentatis, superioribns snb-integnis, capitulis longè pedunculatis, invol. sqnamis exter. lincari(j^1)rev)biis patulis. (l) Alexandria JEgypti circa agroa hordeaceos et ad FiMum prom.

Spmreiia JEgyptiuca Schultz in flora I. c. et ami. so. mat. ^el. 2. v. i. p. 3<§ (err. African a dicta). *P. Nilolica* Sieb.^x Lee/ syn. 1J4? *Achaenia marginalia* ^enuiora laeviuscula, pappo brevissimoj snperata, caetera ovali-oblonga transversim striata, pappo longo plmioso.

18. *P. RADIGATA* (Less. syn. p. 1^J1)» pilissparsis gloclidiatis hispidnla, caulinbs subaphyllis erecto-diffusis, foliis radicalibus pinnatifido-incisis sublyratis, pedicellis teretibus nudis vix folia superantibus, iuvul. maturo bispidulo eo>ftito, s'quifinis exter. brey&us patulis. (I) in *MgyptQ inferloref We&l!*) ad *Pyranthes* (Korsk ! Sifb.!). *Crepis^radirata* Forsk^fl. /eg. §. 146. Savi c*s. bot.p. iC.Tiev. act. soc. cur. nat.* i3. p. 191. non Sin. *Spilzelia Siebori* Schnltz ann. sc. nat. bot. 6. p. 296. *Thiincia?* sp. Spreng. syst. 4- P- « P. ^04. (v. s.)

0. *lyrapa* (Delil. fl. a^gypt. 116. t. 40- § 3), minus hispidula, foliis rffllicabas patulis oblongis pinnatifido-incisis vel grandidentatis yix snblyralis, scapis .idscendentibns rauiosis folia triplo supciantibus. (T) in [^]crypto propè Alexandrian). *Spitzelia lyrata* Schnltz in flora 1835. p 057. ijpn. sc. nat. bot. 6. p. 296.

19. *P. CORONOPIFOTIA*. (Desf. fl. cat. 2. p. 23jQj». * 4), tota pilis fnrcatis hispida, foliis radicalibus inaequaliter et' ohtusd (tentab-pinnatifidis, scapis folio bie- vioribus i-cephalis a pice *snbbracteolatjs, mvol. hirlo, acbsenjis radii pappo coronaeformi ad iDe.dium in^pilos fisso s up e rat is. %? m arenis deserti propè Caf&am Barbariae. *Leontodon coronopifolium* Desf* fl. all. 2. p. 229**^ 21J. *Apargia coronopifolia* Willd. sp. 3. p. 1503. *Spitzelia coronopifolia* tfMchultz in flora i835\ p. 607. Fideliar? Schnltz. 1834.

J - Species non satis nola.

20. *P.? TARAXACIFLORA*, setnloso-hispida, radice rxili, canlefolioso ramosa, foliis si- nnato-pinnatifldis, capitnl. panicnlatis, invol. squami.s exierioribus la-xis (T)ixk Africâ boreali propè Cyrenem. *Apargia taraxaciflora* Viv. 11. libyc. p. 50. t. aa. f. x. Cerle non efit Leontodon et potius ad Picridem pertjnere videtur. A n ^ *P. radicata* satis diffe^rt? *

J + Species excusa.

- P. ACULEATA Vahl. =: *Helmintbia a^neata*.
- P. ASPLENIOIDES Linn. == *Helminthia asplenoides*
- P. AUTDMNAia^il. =: *Opormia autntnnalis*.
- V. DAJTUBZALIS All. = *Leontodon bastile*.
- P. ECHIOIDKS Linn. = *Helminthia echoifles*.
- P. FOETIDA Lam. = *Barkhausia fctida*. ^
- P. OLQBULIFERA Desf. = *Endoptera Dioscoridi>*.
- V. HIRTA All. = *Leontodon Tillarsii*.
- P. HISPIDA All. = *Leontodon hispid am*.
- P. HUMIFUSA Willd. = *Helmintbiq l^nifnsa*.
- P. REPENS Lour. = *Barkhansia?* r1^psf
- P. RHAGADIOLUS Pers. = *EndopJter^Dioscoridis*.
- P. RUBRA Lam. = *Barkhansia riflja*,
- P. SAXATILIS All. = *Leontodon Alpinnro*.
- P.. SPINOSA Poir. = *Helmiuthia spinosa*.
- i*. STRIATA Spreng. == *Hieraciam Capense*-
- P. TARAXACI All. = *Apargia faraxaci*.
- P. TUBEROSA All. = *Thrinacia tnberosa*.

'Oni»M .nil

DCCCXVII. HELMINVHIA Jiks.gen. p. 170. Qasrth./r. a. p."368. f. Wf. 2.
& w. <fat. 20. p. 4g3. Am. J?H.. ii4.- — Helrainthotheca VailL act. acad pat.
17 a.f. — Pic rid's sp. 'Linn.

Capit. mulliflorum. Invol. duplex, squamis exl. paucis, inter. (8-10)
nn"ustioril>us longioribus. llecepl. epalcftceum. Achaenia p'ano-obcoiji-
pressa elliptica transversè rugulosa npiç laevia rolumlata alquc rostro
gracili i'ngili et aebsnio longiori superala Pappus^uhpluriserajis p!u-
rnosus. — Hcrbft antuue ant J>iennes, in caule et tòliis sacpiis pilis acu-
Jeiforrnibus lùspidx. Gaules diciotomi. Folia Stimiamplexicaulia oblonga
rc^n da. **Cor.** lufeae.

SecU 1. EUHELMINTHIA. — Helitiintna füss Garli.

Invol. exterioriy squamae 3-5 amplae latè ovatae.

1. H. ECHOIDBS (Gacrtn. 1. c), canle erecto,liisp'ido, invol. exteñoris squutim
5 ovato-coiclati. (J) in a gift, syluulis et seies vias Gallic, Angliae Italiae Lam.
ill. t. 641. Cart. lontl. 3. t. 5i. DC. il. tr. ei. 3. n. 2976. Picris echoitles Liuu.
sp. 1114. var. ct. Helm, tuberculala Moench nieth. 54o. Crepis echooides All.
fl. ped. 8u. H. rigida Schult.? ex Sti*ud. —LgJ>. ic. t. 577. f. 1. (v. v. et>.)

13⁴ mollis (Dnby! hot gall. 1. p. 300), oáule et inv^l. sqamis subinermibus.
(J) in prsrtis salisK circa Areulem legit cl. Jj^ch. Richard, (y. s.)
y. angustifolia (l>biss.! incd.) , canie digit an hi.spjdo, foliis oblongis inte-
geri-imis qtrincae atlcnaalis hispid is, invol. bxteriore interius nun
iequantc. (i; in arvis Hispania: onçà Mnlagani legit cl. E. Boissier. (v. s.)
fl. pratensis, buinilior mitior, caule ajpero uep acnealo , foliis augustoribus,
invol. exteriore interiai* stihsequante. Qj in pratis ciicà ParUios. H. pia-
tensis (hev. 11. par. 3. p. 35?..

fe. If., HUMIFIJA (Trev. act. soc. nat.cnr. bonn. i3. p. 1Q5); caule prostrato gla-
bro, invol. exterioris squainis'5 ovalis interins subacqnuntibus. Q, pair. ign.
Picris echooides \$ Linn. sp. 1 n4- Picris hunifusa Willd. in.ig. nat. beil. 1807.
p. ify_m — Hcùn. J>rad. i89. t. 5%. LiUrdlsm in hortis vagat sub nomine falso
Helm, spinoso; Capiuila et folia niiporajfcam in filiis spccictus. (v. v. c.)

*3. J1. SPIHWA (DC. fl. fr. ed. 3. n. 2977- ic gall. rar. t. 21), oanle erecto hispido
coiyinboso, inxol. exteriops squamis S pniulis lapct'olatis intcriore breviori-
bns. ijy in ^y¹¹*¹¹* ex lteil¹: Li'uonn. scd iiuj>efioi< sal>iu in Gallicis non
reperiérunl. l>ieris.spinosa Poir. suppl.-S. p. 408. Folia et in volt exter. denli-
bos spinescutibus ; squaiuae iuv. intfi₁ secùs ncivnun dor&aleiu bcabiac. An ti-
dera HSin. rigida Schult. ex Steuæl? (y. e.)

Sted. 11. VIREA Vahl mss. tiorn* h. hafn. p. 769. non Adans. —
Vir<e sp. Adans, Stop. — Deckera Schultz injtord 1834. M, 3 I.
et in ann. sc. nal.. 3. p. 3o2. -

Invol. exieiiqis squamae lineatii-lajacc^Hp^ jnfrioril)ns ^arùm dissimiles
sed breviores ct paniç iatiories. M

4. H. ASPLI ruoroKs, tota pilis sparsis* scattrw^ifcanle adsc(>ndeinc i-cephulo fcub-
nndo, foliii nidicalibus peiultili nincinMo>pinnafipartii(s, lobis obtusis inae-
qualibus, ultimis majoribvs, foliolis ligulatorliucaribus injegris secùs eaulem
sparsis, invnl. squaiuis exter. patulo-reflexis, % in alienosis maritimis B.irba-
riæ Tanetanae. Picris asplenoides Linn. sp. 1115. Vahl ! synib. 2' p. 90. Desf.
fl. all. ^- p- aaa. Lcontodon luuricatum L'Har. slirp. 173. t. 8a. Virea sea bra
Scop, insnbr. 2..p.^S. t. i3. Crepis sinuatli Lam. diet. a.*p. 179. Helm, hispi-
diosa asplenoides sneco sulphurieo Vaill. i.ct. par. 3721. p. 206? ex Linn.
(v. «)

5. H* ACUT.EATA, pilis crassis sparsis qculeiforniibns scabra, caulis ereclis sub-

UIKR7, foliib radicalibub obovato-oblongis iriaequaluer denJalis subiosuldtis, <an!iiis anguslè oblongis pauus, capiluli* n.uicis subcorymbosis ,pedicetiiiii fistnlobo-inciassalis, invol. squamis dorso pilv>^is, extcr. lanceolatissubadpie<>sis. If in Barbaria? collibus. incullis et in Atl^nte (Desf.), in Sicilia^ (Oiss !; PiciTb aculeata Vdhl »ymb. 2. p. 89 nial et exol^louin syn. Desf fk alt.. 2. p. 23T. Helm, hispida pedunculis floiuin tumentibns "Vaill act. ac p. 1721. pi 206 Acbaeninn Uansverse subru^osnm, longè ad apicem rostratnra. (7. s. éomni. à cl. Guss.)

J. Species exclusa.

H. SPHFNGFRIANA Oacrtn. = Pinis pauciflora.

Subtih VII. LACTUCEJELcst.sjn. i35. Don in linna-a 18J1. litt p. *3y. twn Cats. - Lactucea? verre et Crepidea? Ca&s. opusc, 3. />. 44 et 45.

Rt'iept. epaleaceuin aut rarissimè paleaceum. Papyuspłifoimis argenteus mollissimiis fugax, pilis ex^. ctissimè linearibus nee basi cOmlanatis nee plumosisi.

UCCCXVU1.LACTUCA Tourn mst.p 477. t 267 hmn.gen.n.^q^.Gcertn ft. 2 p. ^6. 168. Less^yn. i35 —Lactuca et Mycehs Cass.

Ciipit. pluri- seu pauciflotVii. Invol. cylindricum calyculato-imbricatum 2-4-senale, seriebus IIIW. brevibus. Rccpt. nudum. Aclenia plano-obcomj.rcssji exalata abruplè in rostrum filiforme prnducta. — Herhae inhemispheri boreali(baucls<xcci)tis) disperse, suepiüs glabra?. Ca pi tula saepiüs panicu^la. plores lu»ei, cceruJ.ei, purpurei aut versicolorcs. *

Sect. 1. SCARIOLA. — Lacluca Cass. did. 25. p &i ct 164. v. 3?^ p. 300.

luvol. a-4-seialc aiit imbiicalnni ant quasi ralycnldlm f hqu.rais exteiioribus dinjidiò tan turn quam luierioieii longii Rostra III suepiüs elongatum.

§. i» Cyanicae nempe floribus cceruleis purpurascentibus aut varian- tibus albis, nunquamjlavis.

1. L PERENNIS (Linn sp. 1120), glabia gJaucescenb, caule erecto teieti apire snbnudo laxe pm'n'ulato-coi*ymboho, fobis omnibus pinnatipaititis, lobis li- neaiibns acu IIIIII a I is snrsuui dejit.itis, pedicullis ekmgais biacleolatis, aoha- nio roitro paulò bie\ote. If, in Kuiopoe collibus et montams asperls apn'cis. Mill, icon "X. 1>7 bot. mag^t. 2i3o. VaïHt floibus cocruleis ?<uisa1biš (Ta- bein kiaut. 486. i. 2), folns latioribus (Tan ki. 487. f. S) vi angustioiibiv* (Chabr. sciagr. 3i7- f- 4) Var. l.mfolia Wallr. scbed. 44o lobo fol. extremo uvato-deltoideo dentato in&ignita, tst frirte L. sonchoides Lipeyr. abr. 4tii>* (v. v.)

2. L. CHHORIFOLIA (DC fl. fr. sup{>l. 434} »gla^{Dja}» caule erecto tereti apicesub-nudo laxe paniculato corymt)OM, foliis infei. bast atteunalis acuminatis rnn- ciuato-dentat*anj*dentib*an* acuminatis subielrobis, buminU integerilimu lan- c<*olato-lineaiibns sagiitjts, pedjcellu. bracteolatis,. . Q^ in, Pyicnaeis orien- tahlms legit cl. Coder. An var. L perennise Bentham? (v. s.)

3.],. IUBLROSA (Jacq in Mun s>t. 7i3. hort. \ind. x. t. 47), glabra, radicr tubviosd fd.<>cirulatA.,caulr lereli subsimplici eierto, folus spinuloso-dentatis oblongis, infei. indivisfc, snperioribus sinuatu-pinnatifidis, racemo snbpanicu- latu tewiimdli, rapilulih ljevjtei pedicellatis, acbacum setoso-scabiidis rosti'o tuplò feie 4>revioi ibiii. % in convallibus raontinm Seidebadscbi piov. Adci>*

- bcisçjnn Pqisiae loci* lapidosis argillosis steribus (Szow exlusch et Mey in litt) Capitala niagn L. perennis Flores coerulei dilate purpuiasrentes Snc xus laeteus*, jeu expositus auiantiacus (Jacq)
4. L. PETKFA (I isch etMey ' in Intj^adice tuberosa, raule erecto glabro sub-siiuplici, folus taulinis sc biiusculis sagittato-amplexicanlibns runcinato-pfn natifidis, lobis pleiumque angulatis inut lonato-dentatis, folns suimnis sagit tali*, lanceolatis subinteg'eiiiinis, capitulis lacemoso- pamcnljtis , pedittlliH ibbitviatis squaniosis glabernmis, acbaenns t^labus rostro vxx longioribas If. 11 Sorachetiae lotis lapidosis raontosis \etsus Scbabnagh legit Szovitz Affinis L tubeiosae , peiem et Wilbemsianaj Canna folioium caul ex I et M spinulosi, in hptcira no&tro ineitiji (v s n mm a cl Fiich etMey)
- 5 L MICROSPHALA, radice tuberosa subiotunda, caule erecto lamoso mferne glabro, 1 amis piloso-gl<milnlosis, folns glabus, mfei petiolatis laucinato-j>iirnalisectii> id basin petioli anuto aiuplexicaulibus, lobis sub lent jtis, tei-linnali lobato, &upeti amplexiciulibas otjlongu* *>ubiuucinatis dentatis, pani cul 1 polytepbaJa, mvol cyhndncis ejlyculatis pmcfiflons bpaise pilosiusculij* — in Ptisia detexit cl Anther pi txs n 3*»i7' C«pit 3 4 hn , ex ssiceo ca rulescenUa? Atbaen ro&truta (v s comm^a cl. iiw)
- 6 "L howcHiFOLiA (Willd bp 3 p 1530. excl syn Tourn | giabra, caule eieclo lereti a-pice paniculato, foliib caulims lunenidtp pinnatihdis lobi& lauceolatis bubiecmiyis minute siibtlenticulalib, foliib floralibns ldnceolatu*, pamculae tamis lacemosis, pedicelliSy biarteolatis, mvol. imJAicato acbdens rostio longioribns If.? in Iduna (Willd), Be&saiabia (Laid^H '), cuca Constantinopolim (Auch'), fortf in*Tataua? (Linn f suppl 346?) Sonchu^s tuberosus fLinn f suppJ 34b) Capitula majora quara<L perennis Refeit L Crelicam, aed cor cu.ru kap (v 8)
- [^] L WILHEMSIANA (Fiscb et Mey Unlitt), glabenima, radice tubeiosa , canle eiedo suiiplici, folns canlinis sagiltato amplexieauhbusi profunde pmnattfldis, <lobis elongatis linean lanceolitis acuniinatis bbdentatia folus btiuimis lanceo 'latis tiubihtgeiiimis, tapitnlit corymboso pamculatis, achaenns obluugis utnn- <jue acutatis lo&tio paulo longioubns If in inontams prov Nakitschiwan Persia;, intei frutices et in glareosis secus Nakilschiwausbai, nee non in* Iberia (Szow ' ; Afiunj) dtritar L queicinae Achaeu rostium ationt, nee album aut vnesceuH An Mnlgedu spec ? (s.)
- 8 L SANGUINKA (Bigel fl bot>t eil i p ^87), glabia, caule eietto, folns auipl(xicaulibus luncinalis subtus glaucis, cauna saLpius setosa, capitulis paniculilis , pedicellis breviler bracleol i t ^ tt^{xo} ^ CTlmdnco (2) enca Bostoniam Amei boi in s-ylvis sitcis Cauhs et invol puipurea Cor pnniceae AcLsema ui^iestentia, oblongo o'.aLa , medio neivigeia lostiata
- ij L PULX:BELLA , caiilt eieclo a pice laxe paniculato, folus subamplexicaulibus ovaro-oblongi¹ ^ omnibumtegris!Tvbiiis, capitulis subfasti^iatispaucis, pedicel hi squaftiosis, invol cylindncis % IU Amei boi, in heibidis feitil bus ad ripas ilnin Missouri Sonchus pukhellus Puisli fl bor am 2 p 5o2 L oblongi folia Nutt in liis (at L integrifoli t Nutr ^en 2 p 124 non Big Capitala wagn et coloie dehorn Intybus Pappus stipitatns Herba 1 J 2 pedahs
- 10 L CTRAMINIFOLIA (Michx fl boi am^1 p ^85), glabra , caule erecto smiplici, folns sessilibus elongatis, radicalibus medio raocinatis veldenfatis basi et apict intr{,Lirimii, caulims hnearibus integns acaminatis, pamcula laxa aphylla, pedicellis longis nudis, dthaemo rostro paulo longioie — in locis SICLIS Ctio hna lnlenous Cor paipureae Ell sketch 2 p 2 5 2. L gram fn* a Spieng syst 3 p 6^9 (v s),
- 11 L. TEWEFRMA (Pouir act toul 3 p 322\ glabia aut ad basin bispidula, caule tereli ereclo lamoso divancato, folns infer 101ibus pinnatipaititis lobis radicalium dentatis tenniuah majore, caalinoroni lineanbus integerriniis, summis sagittatis lineanbus mtegiis, pedirellis subbiarteolatia, mvoj squann ttiani inter lmeauhns, acbxnio lasvi rostn loiitudmc % 'n lujustt b~~as~~ collinus

apncis Hispamae (Willd.), ad Malagam (Bois.), Rarcellonam (Req.¹ Gils/'), in Agro Ruscinouensi ad Olette et Villeframhe (DC') et cmā INaibonam ad S. Paul de Fenoullbedeb (Poun.). Willd *p 3. p. 1629 D<- fl.fi "• 2891. L pciennis y. Lam diet. J. p 409 Capilula minora quam L perennis Yariat in IOCJS nionla/m glab^a, in oalidis tola hispida, obs. cl. L. Roissiei. (v b. et v)

12. L SEGLSIAWV fBalb ! elench fl taur 94. <>sc p 37 t 8), glabia, canle ertcto laiuosi&suuo, foliis infeloiibus alltuualis tej.silibns, supciioubus linea-ribus sagittal s, lamis l-cephalis biacleolatis, invol. sq'umis linearibus, acba?oio laevi iostro ajquali (2° Ill colhbub et \Inels Pedenioutii prope Segusium dele*, cl. Balbis. W#d sp. 3 p.' 1529 DC 11. fr n 2892. Achasua fusta , 111-terdum cheimesina Species L. tenenima? valde affirm, (v. s /
13. LuNDur.ATA (Ledeb fl alt. 4. p 156. ill. 2. t. 129), glabrar glaura, caule tifli - plici, (obj. ladicabbus obovatif lyian'b>, floialibus integris, caubnib pin naHidis undula^is, lobis infcuoiuin oblongo-lanceolatis sabinfgeiinns, (a nitulis corymboso-paniculatis , achaeniis IOSII quadruplè et ultia bievioubus. ^ in Sibnia? Allaiae moutibu: Aika&l et Dolen-Kam (Meyer), in glaeosi* ad toucentem Lavin prov. Adeibeibcban ^Szow !). Heiba b'-io poll. (v. s. coinni. à cl Fisch)

.f. dentata, minoi, foliis dentatis. (ij ad iadire& montis Sinai loco Rejtau dicto legit cl. Scnmpei pi. ex: 11 128 ' (v. j>)
14. L- Dis-tmA (Don piod.fk uep. ib/), caule eieclo piloso lamoso, foliis 111-tenupte bipinnatilidis pilo*nbsculis, lobis lbombeis dentatis, petiolis amplexi ' c^ubbub ba&i £>agittati&, panuulà corymbosà difTusa , pedicellis nudiubculis , acbaemo puuctalo IObtio brevioie. (l) in Nepalia Floies coeulei.
15. L. FISCHERIANA, glabia , caubbus e rollo pluumts erectis paucifoliis, foliis 1adicibus iineaiibns iutegeriimis, caulims lineaii-lauceolaris> aiuplexicaulibus snbdentalij*, panicnlà coiymbosa, invol. adpresse calyculato flo&culis dinudiò bievioie. % P in Sibiià. Pienantbes giaminea FUch. mem soc. nat mo&c. 3 p. 67. Cor. puipureae. Floies in invol. i5 Acbaenia sulcata oblonga 10s-tiata. Ex his caract.^potiu Lachnæe quam Pienanthi adnumeranda sedmihi ignota.

§ 2. Xanhinae , nempc Jtorihus constantcr flavis.

16. WGLABRA (DC in Wight conti p. 26), glahia,*caijle nndo dichotome 1amoso foliibaequali aut puulò longioie, foliis elongato-hnejnbus ligidulis acutih nunc iutpgeriimis, nunc ngidalr cili^o-senalis, capitulu. coiyrbosis longe pedicellariscylindraceisciic. 7 8-flois. Tjnvolutio squamellib lanceolalis calyculato, squama 5-6 bueari-Janceolatis maigine subscaiiosis cahculo tupJò Jon gionbub ,acha?niisin rostrum bieve pieductis *% in Indid oueft. adNeelgei-ly, Kaledguy. Prenantbes glabia Heyn in Wall ' tat com p. 11. Z'jl. Denticuli foboiuum subnulli ant saepius retorsi Folia 2-3 poll longa , aim. lata (v. s coinni ab hon. coet. mere. angl. Iud. 01)
17. L. RIGIDv, glabra, tanle gracili siibau^ulato, foliis lalo-lineaiibus sewibus mtegeiniais ligidulis. nniueiviis, panjculà laxà, pedicelliş elougatis biacteolatis, capituliscylindiaceis 8-11OIJ>, invol. squamii.5 margine scaiiosis conslante bracteoluU triplo bieviofibus calyculato, achdeuiis bieviter lostiatis •— in India orient ad Bayisi sen Raysi le^it cl Hamdton. Pienanhes ligida Ham. in Wall.! cat. comp n. 3^3. { v. 5. j>pecim. imperf. in h. hon. coet. meio. Iud. or.)
- 18^ L LONGIFOLIJL(DC nonLani. nee Mi<hx), glabra , caule teieti errecio apice laxè panienlato coiymboso, foliis hneaii-lanteolatis elongatis acuminati> integreriiuisse&silibushastato-aiuiculatis, auriculis acuminatis, p'edicellis bracteolati., capitulis i7<>2o-floib, invol. s>quanjs exter. lanceolatis, int. lmeanbus du-16 tuplove longioijbus, rostio a'lixnn feie^ongtIndineni aeqnanc % Ill Nepali*, Kainaou ct ad ^linaghm kgu <l Wallich. Choudiilla longifolia

W.ill! car. coin]), D. 383. Ach.enia compressa utrinqne trinervia. ^v. s. couim. ab. hon. cuſ. mere. angl. Ind. or.)

19. L. SALIGHÁ (Linn. sp. 1179), canle Precto tereti glabro apice paniculate, foil is siüberiienlibiiH carinā aculeatū, infer, lanceolatis* pinnatifidis, caplinis linearibusintegerriim's basisagittatis, acbaeniis ;> triads roſt·10 ferē bre^ioribus.(lj in j>aksis et dſperis Enropie, Tanriae, Syriae. Jacq. fl. anstr. t. 'i5o. L. saligna Ruppiana Wallr. sebed. 449. L. vircjsa Habl. ex Stead. —Rupp. jen. 307. t. 4. Barr. ic r. i3G. (v. s. et v.)

??. JVnlhothiana (Wallr.! 1. c), fblis canlinis linearibus carinā laevibns*, caule subadſcendente à basi ramosissimo. L. Wallrotbii SpreDg. pdg. 1. p. 53. (v. s.)

20. L. VIRGATA (Tauscli in flor4 1829. erg. 1. band. p. 36), caule erecto virgato, ftjliis caulinis bastato-amplexicaalibus oblongi* ruocinato-pinnatifidis denticulatis, carinā subtū spinulosā, capitnlis subsrpaticis. — patr. ign. iDflorescenlia L ->algenT3. Folia ferē L. ScnrioLe. 'f

ii. L. SAGITTATA (W. et Kit. pi. rar. Imng. i.p. 1. I. 1), catile lereti crecto glabro apice paniculato subcorymboso, foliis snbtū laevibus basi bagittatis, auri culis pa ūum productis, super, lanreolatis acuminatis integerrimis, achxuo striato rostro longiore. @ iu sylvis Hungariae nd Gödöllö et Nagy-Karoly (W. et K.), in gnbern. Chersoncnsi (Bess.!), Invol. squamellis (anceolatisimbricato calycqlatum. (v. s.)

92. L. CAPBHSIS (Thnnb. fl. cap. 614, I^{ess}. syn. i35), glaberrima, caule erect a tereti laevi basi sitnplici apice laxē panicolato , foHia carinā laevibus, infer, run cinato-pinratifidis, sifper. basi sagittntis lineari-lanceolatis integerrimis aennti nitis, ach.Teniis vix medio wnidervulatis rostro panic brevioribns. — ad Cap. nonæ-speci in cunctis proprie tamen, an inveniuntur, zw.-Buffelri vieret Key (Drege !). Scorzonera Capensis Thunb. prod. 141. fl. cap. 523. Forte species » var. asepatanda, »ed certissimè congener, (v. s. comm. cum var. A à cl. Drege et Ecklon.)

(L. integrifoUa, foliis inlegerrimi.s elongatis. — ad Willbergen, Zw.-Buffelri vieret Key (Drege !). Scorzonera Capensis Thunb. prod. 141. fl. cap. 523. Forte species » var. asepatanda, »ed certissimè congener, (v. s. comm. cum var. A à cl. Drege et Ecklon.)

a3. L. AtTissiMA (Bieb. fl. taur. et aiippi. n. i58'i), 'glabra, canle erecto^jpice panicnlalo-corymboso, foliis denliculatis, imis sinuatis, snprioribus lanceolatis aciinioalis sagittatis, anricnl^ de^rsūm product^ acuminatis, pedicellis minntc bracteolatis, acbaeniis rostro lon^ioribns. — ad rivulorum marginēs propē Caucasi acidulān Narzana, ad monrem Bechtau, et ad Bory&thenem propē Catherinaslaw (Bieb. Stev.). L. orientali's altissima floie lutco Tourn. cor. 36. Capit. magri. L. sativa: Achäsnia nigra (v. s.)

24. L. INDICA (Linn. mant. 27 Blume! bijdr. 887), glabra, caule tereti erecto paniculato, foliis inferioribus cuneato-oblongis, caulinis lineari-lanceolatis sessilis, omnibus inæqualiter dentatis, pedicellis elongatis bracteolatis, invol. ample calyculato, acbaepis rostro longiorib.. — in inder^tis iusclae Javic. Foliaoaulina subintegerrioa, 6-7-poll. longa/seraipoll. lata. Flores ex iicco flidi.(v. s.)

@. robusta(ltnme ! in litt.), e!atior foliis caulinis nemiamplexicanlibas magis basiserratis.— in bumidis montanis Javx interioris. Folia can tin a 8-9'poll, longa, pollicein lala_t subundulata. (v. s. comra cum var. a à cl. Blunj.)

a5. L. LIU<'OPH*A (Sibth. fl. grsec t. jij/i. ex prod. a. p. u 7 j, FoE oblongis, acau<'matis amplexicanlibns duplicato-dontatis subrnncinatis, ' panicula coryin bosa. V? in iu&ula Cypio. L. Oticutalis altisbima Soncb4folio floie uidgno leucopbaeo Tonrn, cor. 35.

af. L. RACEMObA (Willd. b!). .I.p. i524), ^labra, caule ſtruſplici electo apice tim pliciter'iacemoso, foliis Jyiat mucinaiis arumina(i> ainplexieaulibus, summis

lanceolalis integerriinis, squaroibinvol. laxis — in Annan id L Oiirutdlis Dentib-leonis folio flpre leucopAaeo 100 m cor. 35*

- 27 L AUGUSTANA (All ped n. 8*23. t 52 f. 1), taulc electo glabro tereti api#e pampulato, foliis sublus laAibus oblongo lameolatis cili iio-denticulatis basi sagittatis, inferiobus non sinuatis, acbænus stnalis lostro fere bievionibus. (I) in aenosis Pedemontu in vallibus Augstanâ, Segusianâ, etc. (All. Balb.'), in humidis et cultis Persia circa Erivan (Szow.'), in Ægypto superi (Sieb') Proximo L. \irosae, std canna laeis» nee setosa (v. s.)
28. L DRFGLANA, caule eierro tereti baai simplici setis aculeifoimihus hispido dpice ghtbro papiculdt, folus laund aculeaUi s.»gittalo-*enj/«j<ipJex?caahbu», infeiioribus denttd-rnncinatis et ciliato-J>pinalbosis», snpeuoubus Integeinmis, omnibus longe acuminatis, achscenus stnalis lostro paulo bieionbus @?«id Cap Bonae-Spei in Cannaland (Ihunb), ad Zrieturobtigen CDiege') Lact. vuoa Thunb 11 cap p 6i4 uon Lipn (v. s coiun.acl Dicge)
29. L VIROSA (Linn sp 1119), caule electo tereti basi glabro nut aculeato-setoso apice paniculate), foliis horizontalibus caiinâ acoleato-seto&is acute denticulatis obiusis baM sagittatis, infimis sinuatis, acbxniis stuatis ro&tie feie bievionbus. (I in aggenbus et sepibus Europae mediae et præsertim austialis. L sinuata foisk acg. p 215 — Moris, ox. s 7 t 2 f 16. Heiba odore gravi ^uecub præ caetens naicoticuj.. (v. v.)

yS. *maculata*, foliis radicalibus obovatis parpuieo-macalatis. — T. *maculata* Hoin h. bafn 2. p. 7.^ '(v. s. c.)

y? *ambigua*, foliib ladlcabbus obovatis nnmaculatis —patr. ign L. *ambigua* Schrad ' obs in cat. h. goett i834. ann sc. nat. i836. v. 6. p 99. L. *virosa* Heyn aizn. gew 1. t 47* Odor planta; cultae ex Schiad. nullus. (v. &. comm. a cl. Schrad)

to L SCARXOLA (Linn sp. 1119), canle electo tereti basi glabro aut selis hispido apice paniculato, folns \riticabbus cannâ acnlealo-setoiis apice acutis basi sagiltdis runcinato-pinnatilidis, acha?nms stuatis lostro fere bievionbus. (I Linn. (%) Sin. in convallibus et ruderatis Luiopae mediae et australij> a Paiuid (Ste' ') ad Mddei.im ^Low6'), in G.illiâ, Geinaiiii.i, Augiiâ, etc. Hcyn. arzn gew. i.t 47. opt t., sylveslns Cdm epit. 3oo.Sc. Lain. diet. 3. p. 406. L nlyve&iris P Lam. fl. fi. 2.j) 84. L veiticali9 Gdter. 11. mont. 1J8. (v v)

^ *macu'losa*, foliis sanguineis macnlis adspersis, —Herm parad. t. 191

^ *phcata*, canna fohis mermi. — in Graecia ad Mega ram L plica I a Balb ! cal b. tam. i8i3.p 45. (v. s.)

3i. L. CRETICA (Desf. unn rans n p 160 t iq. cor Toain. 44. t 34) glabra, caule bimpli tereti, foliis pinnatiido-dentdtis, bnpeiis Mjuaimfoiniibns mtc-geiriruis acutis canlem an^bieotibus, lacemo terminal], capilulis bieviter'pedicelldtib bidCteolatij*, achxnio lo&tio tnpl feie bievire — in in&ulâ Cietâ (To'mn), Mtlo ,lhera et Astypalxa copiosc m diidis (d'Urv ' enmu p 99) L Cieica Sonchi folioflore pulchro louiu cor .^5 Morc&lutei magnit. L. pe-ienni&. Antheix violacea? (Desf) (v s)

3a. L. EIWGATA (Mojil. iu Willd sp 3 p. 15J5), caule erecto tereti foioso api<e panimlalo, folus subius laevibus luncinalis basi attenuatis, lobit> acuminatis subdentatis, suminib lauceoldis Integeiimis, panicula idXd, pedicellis btacteolatib % ? 1 11 (2) Beck in Ampuca boi .1 Cauadâ ad Catolinam piscipnè in cdmpis recentei ustis ndde Fire JPeed ab Anglo-Ammcanis dicitui , ad Idcuin Huron (Hook.). III. sketch 2. p. a5i» Beck bol. 169 L. Cai.oli-niana V^ alt rai 193. L longifolia Micbx. fl boi am 2 p. 85 L. piou»ia Scbrad ix Bnib.'h taui Vdiiat canl^glabioctm specim Toueyano in feme ie-tis spdisib hispido Acbaenia compre sa Inevid lObtio &ublongiora. (v. s comm. à cl Bosc cl T011)

3i L inii'ORii'OiiA (Bigel boiit ed 2 p 7. 7 nou Nu(1), rdtilc tcieli sti nto apice coufcite paniculdlo, fohu» s<ssihtus iunttolalu* basi sagltnlis *>ubtus

Inermibus pallidioii^s, infiniis paululum erosion, oæteris integrerinnss — I U
AIIIMM boi circa Bostoniam. Forte vai *I. ordinate*

34. L CHAIXI(VI11 ddoph 3. p i54 t 31), caule siuiphci, foliis sirbus la-vi-bns, iddicibns lyrato-runrindtis, caulmis lanceolatis dentatis bds sagittdtis, lobij tiucatis a pice dentatis, capiluhs i icemosis (j) in Delphinalus neraon-bus cue i les Iiaux, Rabou et Cbaudun (apitul.i pedirellata solilaiid. Flues in nival iò-ia flavi suhtus rubentes Specie* dubia post Villaisiuu non obser-vata.].

35 L biRiCTA (Wdldst et Kir. pi. hnng i p 47 t 4^), canle stneto tereti, foliis sublus laevibus, iddicibns mfiuisqut* uincinato-lyratis tleutatis, supei innclinato-pinnatifidte bds iingustatis sagittatis, lobis a<uminatis, panicnlâ coiyhosa C^) in aspens collims vineis et nemoiosis Pedcrnonlu in monrams infia Lcudam post cl Viale legi, in Geimania ad Kosslesen (Walli ^, in Hunganâ id Agriam, Budain, etc. (Kit), in Caucaso (Stev.¹).! act. Vialea Kelt? hæib. et bort. tarn Cicerbila corymbosa Walh schtd 434 L. quetcua Spitng fl. bdl. >i5 non Linn. Caolis 2-5-pedalis. Radix nap'ifoimiti. Acbaema niFFu compiessa stiiaid lostiopauld longioia. Pappus albus (v. v. sp.)

J'i.L QUERCINA (Linn, it.^otl aSq. fl suec. 664. 691), foliis subtus Iwvibus, infei. lacinatis denticniatis basi dilatatis sagiftdlis, pamculâ stnetâ %, in lusulâ Caiohnâ IUltici mans (Linn), in Geimama? (Willd) Affims dicituV L. stictau et cum cä a cl Spreng eqnsociata, sed differt, ex cl. W.ilhobt (scbed R 4^5), lddice pt^nai, capituiis pamculatis stuctis, foliis basi dilatatis. Athaenid, ex Reichenb. fl. exc. n. 1818, fiisiformia nigia inuncato-scabia iostioigido acbac-nio aequali, nee at in L. stiui id bievion Plaata paucis cogmta (Reicbenb.) foite dubia '

37. L TARAXACIFOTA. (Schum. pi gnin<p 380), Cdule siiuplici tereti glabro apice nudo panunlalo, foliis infer, loncinutis ngidnle denhculato-cilialis glabriuscult verticaliDus, pedicellis brevibus bracleolatis, iuvol cylindneo, achae-niis liueaibns ninuulntis lostro quadruplo Inugioribus — in Guineâ ubi dicitui *Ablage*(Thou 11'), in Senegahae regione Walo iu dennessis inuidatis et in sabnlo<is propr Kichaid-Tol (Pent¹) Folia oleracea. C01 flavae Sonchus ta-rrXdcifolms Willd sp. 3. p. i5n Sonch. seirdtus Perr.l m hit. (v. s)

38. L. LACINIATA (Roth cat. 1 p g o), foliis mfenoribus pinuatifldis sublaci-matis, super, rtincinatis, lobis elongatis infimm stipulaiibes, omnibus oblu-sis caiina laevibus, caule a pice paniculato, foliis floialibus coidatis 4W1s f2) patr. ign. L. enspa altera C. Bauh. pin. i11 L. crispa non capitat.iTob ic 942 f. 1. L. pdlmdtd Willd <p 3. p. i5a3. L. sati|a vai Peis ejich 2. p 365. Reichenb. fl exc 1. p. 2^3 Cnltia lariusin hoilis gnlhcis ubi *Laitne-Epinajd* dicitui. Reseda e collo ut^pmacia lenascitui. DC. fl. fi.suppl. p. 43i. (v. v. c.) . ,

39. L. cmsrA, foliis radicalibus non concavis caunâ hinc inde pilosis, cauhnis carinâ inennibtis, omnibus sinnato-cienatis drntdtit undalatis enspis. caule apice pamculdo, folns floralibus cordatis mt< gen inn's, (j^p**¹- ign. vulgò Gal-lis *Laituefrisee* L. cuspa C. Bauh pin. 12J Dod peiupt. 644 ^ a Roth dbb. ^4 Willd. sp. 3. p. iD2i L sativa crispa Linn sp. inH. Lam. diet. 3 p. 4o3. Rosiei diet. agr. An foite L. laciniatae \ai. e cultura oita ? (v. v. c.)

40. L. c^riTATA, foliis radirabbus ante anthesin subrolndis concavis bullalis rieivo inedio snbtus inermi, caule flondo ablucvialo panic ulato. 'l) patr. ign. in hoitis cult*, vnlgò Gal-lis *haitue^ommte* L. capifatd C. Bauh pin. 1 ^3. Dod. prmpm 64^ >c Moiis ox. s 7. t 3 f. 2 I obel ic. t. i|i f 2 L. sativa cdpi-tata Rosier diet, agr Lam diet. 3. p 4o3 "Vdriat folhs pallidionbus, viudibus ant fusco maculldlis (v. v. c.)

41. L. SATIVA (Linn, sp m 8 var. a), foliis non concavis erectis oblongis liasi dngustatis raunâ loevibus, caule elongato folioio (pati dubia foite India orient, vulgò culta sub nom. *Laitue romaine* gal licè. L. Romana longa d'ikis T Binii hist. 2 p 0,98 h fpUo obsrurius viiente seiinc nigo IVlois

- ox. s. 7. t. 'l. f. 9. L. Romana Gars. ic. t. 3x5. L. saliva Blackw. herb. t. 88. Heyne arzn. gew. 7. t. 3o. Wall.! cat. com p. n. 354. (an sponlanea ?). L. sativa longifolia Laiu. diet. 3. p. 4°3. ^'arial foliis atro-viridibus, plus minus fuscatis, seu fusco inacutatis. Achaenia nigrescentia. An ab bac satis differt L. bracteata Wall.! comp. 11. 353 in Nepaliâ lecta ? (v. v. c. et s. ex India.)
- 4a. L. LONGIDKNTATA (Aforis ! sp. sa'd. eleuth. 2. a pp.), glabra, eaule erecto tereti striato apice conferte paniculato, foliis ratalcalibus lanceolato-spatbulatis in petioluui alienuatis, caulinis basi auriculatis decurrentibus, omnibus glaucescenibus, laciuiis lanceolatis acumiiato-^entatis, pedicellis biacleolatis, invol. squamis lauceolatis elongatis acuiuinatis, acbxniis sliatis apice in colum acbxnio brevius proactis. (l) in rupestribus calcareis Sardinia? orientalis. Flores flavi. (v. s. coium. a cl. Moris.) v
- 4'j. L. DELTOIDEA, caule glabro erecto tereti simplici, foliis in petioluui basi semiainplexicaulei eu attenuatis runcinato-pinnaliparilis, lobis dentalis (suiuinis magis coniluentibus) subitus praeseruum ad costam sparse pilosls., paniculu oblonga, fnvol. cylindri; eo' circ. 10-phyllo, squamis ext. duplo qnam inter, brevioribus. -7- in Iberia media (Bieb.), in sylvis montiura Tuliisch versus pagum Orych (Mey.). Prenantbes deltoidea Bieb. 11. taur. suppl. p. 529. Mycelis aiubigua Cass. diet. 48. p. 42ft. Lactuca deltoidea C. A. Mey.! enuni. n. 446. Flores lutei, in invol. 8-10. Acb.Tniuin #mnin6 M^ celidis. "Varial foliis nunc anguste nuuc latissioje dilatatis, auriculis integris dentatisve. (v. s.)
44. L. uisrida, radice tuberosâ, caule fistuloso simplici pilis glandulosis bispidò, foliis iufer. rancinato -pinualiidis dentatis lobo extimo triangulari, caulinis sinuatis basi cordalis amplexicaulibns, paniculâ subcorymbosâ. — in sylvis Iberia. australis versus fontes fl. Akstafa (Slev.), in Cappadociâ ad. Eu-pHTraiem (Aucb.! n. 3513). Prenautbes hispida Bieb. fl. taur. 2. p. 245 nou Pall. Fren. tuberosa Stev. mem. soc. 4. p. 59. Pappus stipitalis undè hue potius fjuâm Preuauthi pertinet. In specim. Aucheriano radix subrotunda Arellano: nucis magnitud. Folia radic. longè petiolata ovato-lancolata indi-visa. (v. s. comm. à cl. Aircli.)
45. L. HASTATA, caule erecto tereti glabriusonlo, foliis secùs petioluo et nervos subtùs subpubemlis, petiojo nunc alato, nunc medio segmentis duabus aucto, nuuc nudoi, limbo cordato aut subhastato dentatb, inferiovum obtuso, snperiorumaruminato, pauicula subracemosâ, capit. longè pedicellatis 20-22-floris, i^fr'- squamis exterioribus cite; 6 dimidiò brevioribus lanceolatis, inter, circ. 1Tlinearibus. — in Nepalia legit cl. Wallich. Chondrilla hastata Wall.! cat. comp. u. 38i. Aflinis L. deltoideaj, sed nurnero iloruin magis adbuc Lactuca: verae affiriis. Rostrum achasnio dimidio brevius. (v. s. comin. ab hou. cur. mere, augl. Ind. or.)

Sect. 11. MYCELIS.—Mycelis Cassi diet. 33. £. 4^3.

Invol, cylindricum iinâ basi minutissimè calycikituiu. Achacnii rostrum dis tinctum, achsenio dimidiò iriplöve brevius.

46'. L. GRACILIFLORA, glabra, caule erecto tereti tistnoso ample et laxè paniculato, foliis petiolalis lyrato-pirinatipartilis, iegmeinis i-3-jugis ovalis denticulatis, terminali majore acuininato, dentibus iuaeqnalibus mncionatis, paniculâ amplissimâ laxâ, capilulis pedicellatis cylindriicis 3-flo-iH, invol. 3-phyllo minuie squaiuellnto, achajniis compressis maltslrialis breviter rostral. — in Nepaliâ, ad Gossain/Qun legit cl. Wallich. Prenanthes gracili-flora Wall.! cat. comp. 370; Herba wrc. 2-pedalis. (v. s. comm. ab hon. ccer. mere, aiogl. Ind. or.)

47- L. MURALIS, glabra, caule erecto teieti apice paniculato., foliis in petioluni a lam ni basi aplexicaulem attenuatis lyrato-pinnatipartitis dentatis nicnibrnaceis, lobo terminali majore angulato, capitulis laxâ paniculatis cylindricis parce calyculatis. (f) in Europa; ncinoribus rnpibus umbrosis et^nu'ris vetu.s-tis. Prenauthes muralis Linu. sp. nm fl. dan. t. 50i). eogl. hot. t. 457.

- Sliknbi handb t. ai8. (hondtilla mmalis Lam dirt a p. 78. Gserm fi 2 t i58. IMycelis angulosa Cass. diet. 55 p. 484 My eel is rouralls Reicbenb 11 exc. |) 272. Gicerhita mutualu* Wallr. sched, 430 (v s. et v)
48. L. EAYSIMIFOTIA , giabra , caul8 erccto tereti apfce panicnlalo, foliisin pelio-lum alatuin bail amplexicaulem altenuatis lyialo-pinnatiparhhs, teuninali \ix niajore, supeiiionbu*) ampleYicauhbus ovato-lanceolalis indivisis, capituli* laxe pamculatis cylindricls pa ice calyculatis (J f 111 Pouto (Wdld.) , in Ibeua¹ =>ubalpinā ad fln|um Ksini (Bieb. Stev.¹) Pienanthes eiysinufolia Willd sp. 3. p r54i Bieb. 11 taur ^/p. 245. >uppl p.. Jaq. Choadnlla orient, maxima, etc , Touin coi. 36 An vai L. muralis ex Stev. et Spr. sed piaetei uotas indicatas iavol. paulo bievius (\. s.)
49. L. GRACTLIS , glabra , canle erccto soirato in pane iuferlore folioso apice nudo dichotomo-pamciilato , folns hncaū-lanceolatis utiinqne acmuinatis intcgcinmis i-nei)iis, pauicnlā laxā .ipice subcoiyubosā , c.ipitulis 8-10-floois , invol cylindru*is raiiile calyiulitis % m Nepalia' et ad Panduah Ind. 01. le git d Wallich C hondrilla ^lacilis Wall.' cat. conip n. 377 Herba 1-1J pc-dalis Folia 3 poll Ionga, 2 lin lata. Capitula 3 lin. longa Ach.cnii robtrum 1Meve (v. s comrn ab. hon cm nitre, angl. Iud 01)
50. L. AURICULA.TA , gldbia ant loferne ?pa^e piloiiuscula, caule erccto lamoso, foliis pinaatipaititis, loKfs oblon^jarvaue inciso-dentatis, ladicahbus petiolatis lunltijngis obtnsis, caiiliuis ba*si in auuculas duab pioudtis, lobu* magis acntis, pauicalā laxā subcoiyubosā, peditollis elongalis subnudis, capitulis cylm-ducis cūe i9-flnis, in\ol sqnamis 6 7 elongatis raaigine scanosis calyculo paivo cinclis, achxnus compressis stiiitis IOSILO acbaeuio longiore giacili su-perati* (J in Nepalia legit cl. W illieb Choudnlla aaricnlata Wall.' cat <orap. n. 3n^. Acbaema fusca lostio albo. (v. s coin in. ab hon. ceet m^ic. angl. Ind or j
- 51 L HFYNKANA, caule vietco glabro teieti apice ndo, folus subradicahbub li^idulisiunciatis grosse setoso-ciliatib caeterum glabris amplexicaulib*: , ca-pitnlis secus lamos diMunlibus subgeuiuib bic\ilei pedicelialis cylindiacis , adiiiius compiessis stiatiitii muiiculatis bieviter losttatis. (J) C2) freqnens in liidcuiM cuca Negapalam Ind. or (Wigbl.) Pienantbe^ soncbifolia Willd. sp- 5 p. i54» Heyu in Wall ' <tt. n. 3286 comp. 376. Lactuca mucinata DC in Wjgbt C(5nlil> p 2» Pienantbes racemosa Roxb i| ind 3' p 405 uon Mi<bx. Gbondulla racomosa Poii snpl a p. Mi Sonchns calycur|ub Roxb. IC. ined. ex Wight ttAřn Ommino diffeit à Lact. soncbifolia et a Pie nanthe luncinata auct Achacnia nigra scabnda Pappus albnsmollis&imus (\. s. comin. ab hon. cm. meic angl Indoor et in h Wighl.)
- ^aa. L 1 «VICTATA , glabra , caule electo tereti siinplici apice laxe coiyomboso, folus linean-lanceolatis subdenticulatis utrinque acuminatiit, mfei peiiolatis, humraib sessilibus , capiulu. 10-12-floib, invol. ^ubcalyculali squamis 8 linea-ribus acutis, achaemo striato^in lostruin aebjenio luevins desiente. %, |x| inontosis J<\a3 occidentalis Ugil cl. IUume Preuantbes laivigata Riiiu* bijdr p 8 Mi noii Wall Heiba vix pedalis I oba infer 6 pollic (cum petiolo 2-poll.) longa, 6 lin lata, sape integerrira Capitola parva (v s. comiu^ a cl Blame)

-j- *Species dubicB.*

»

53. L ? CANADENars (Linn sp. n 19), caule erecto, foliis lanceolato-ensifoimibns aaiptexualibus dentatis, ucemo coiupdRito teuninali If, in sylvis el ad inaignes \iarlm (anadje el No)a5-Angliu (Puish) Souchus palluhih Willd sp. 3. j) i52i iMulgcdnim iDtegiifoliim Cais djet 33. p ?i>8 ° Lact Canadensis al-tis&irna anguilifoliā floic pallide sulphuſto 'louin. inst 1^74 •[.
- 54 L i-siULOSA (Raijp fl Iud. p 58) caule pdvuuculi&quc fisiulo'is, foliU se&siibus ii>iuinatis glabns gl mcib ci .csis, - III Uuloviciā ad At lktp.ls Capi-tula inagna unmerosa. |

55. L. UIRSUTA (Mublenb. in Nult. gen. 2. p. 124) 1 caule infernè foliUque bit-Milo-pilosis, foliis radicalibns lyralis lobis truncatis subdfulatis, fol. anprriovibus subruncinato-pinnaliidis, capirnlis racemosis, iuvol. srjjiamis snbulatis. — in Pensylvan'. à An[#] ex Hook, eadem ac L. elongata?"
56. L.? LUDOVICIANA, glabra erecta, foliis omnibus runcinalis retroihùm et acute dentatis, caulinis semiamplexicaulibris, pedmu-nlis involuciisfjue nndis, jñiñculù divaricatà. — jñ bnmidis planitiebs LouiSi. nae circà Vort-Maidan ad flam. Missouri. Sonchus Lu(Mvi)ianus Nutt. gen. am. a. p. 125. Heiba 3-5-pedaliS. Floras lutei. Pappus conspicuè stipitatus.
57. L. MAURITIANA (Poi. ssppl. 3. p. ap[^]), glabia, caole tereti èreco, foliis linearibus longissimmissagittal is integijl simplicibus irifidisve[^] capimlis spicato-racemosis, pedicellis Wacteolatis, acbaenio vix rostrato. — in insuja Mairritii.
58. L. SAGITTIFOLIA (Kll. sketch a. p. 253), glaftra, caule èreco apice laxepaniculato, foliin oblongo-lanceolatis acutis integeninn's Siibtns pallidioribns arete sessilibus basi sagittatis, invol. cylindrici squamis snbnlatis, achasnio diMinete rostrato. — in Amer. bor. ad flum. Columbia: Cor. luleae?

-j- -j- *Species exclusce.-*

- L. FLAVA Forsk. = Microrhynchus nudicanlia, fa
- L. FLORIDAWA Gaertn. = Mulgedium Floridanum.
- L. INERMIS Forsk. = Cbondrilla prenanthoidps.
- L. INTYBACEA Jacq. = Bracyrampbui intybaceus.
- L. NUDICAULIS Mnrr. = Micro/byncbus iiudicalis.
- L. PRENANTHOIDES Scop. = Cbondrilla prenattLoidei.
- L. REMOTIFLORA DC. = Bruchyaiupbus soncbifolioa.
- L. SARMENTOSA Wight. z= Microrhyncbus sarmentOMis
- L. SPINO\$A Lam. = Soncbus .spinosus.
- L. TATARICA. Mey. = Mnlgedium Tataricuin.
- L. VILLOSA Jacq. -=^ Mulgedinm acuminatum.

DCCCXIX. CHOIVDRILLA Linn, gen., n. 910. excl. sp. Gartn. fmct. a. t. i(i8. Cass.. dice. 9./?. 64. Less. syn. i35.

Capitulum paucifloru^n cylindraceum. Invol. biseriale squamis ad prcessis brevibus calyc^ulatuin. Recept. anguslum nudum. Cor. tubus apice hispidulus. AchJfeniim' lercs èxalatum apioe squamellosa-muricaliuin, squainclis sunimis circ. 5, calycnhun fere siiAuJajtibus, rostro inter eañ exerto longo lenui. Pappus pilnsus albissimus pluriserialis. — HerbscEuropeiT3, rafiis SrU'iric<-aut Orienlaes. Caulcs terctes virgati saepiis Michotomi. ?\$& ra'9l(?alia runciaala, caulinia subinle'gemii)a. Capitula lut/fa angusLa,

- j. C.#RAMOsissiMA(Siblb. fl. grace, t. 19D. ex prod. 2. p. 128), caule davaricato-ramosissimosulcato-angnlalo glauco setis rigidulis flavidis firaesertim secùs angulos scabio, foliis caulinis oinuiboabdtantibus oblongis setoso-dentalis, capitulis sesiribus paucis snbspicatiyahivol, dorso setosis. y. in Grseciâ (Luv*) propè Albenas (Sr'blb.) d'Urv. enmni n. 736. Prenantbes Attica^Spreng. t.ysl. # 3. p. 664. Folia radicalia videnlur snblobata. (v. s. coiuni. à cl. Znccariui.)
- a. C. ASPERÀ (Poir. sup pi. 2. p. ^29) 4 caule tereti ranioso laevi, foliis caulinis sessilibus ellipticis o^|psis glabiatuseculis margine spinuloso-deniioulatis, involuciis cylindricis 8-pbyllis pedicellisque tomentoso-faiinosis, calycnli sqnaiuis ovatis acutis brevibus. — pair- >gn. IVenanthes a^pera Schra^. in lilt, el in Willd. sp. 3. p. i539 n8n MicbK. Flores flavi. Acbaenia apk?c s(ju:jnulo:,a ct

|&

DICOTYLI. SEU EXOGENJE.

CHONDRIILIA.

rostra lat in Chondrilla, Affinis Ch. rātnosissiniac. Folia radicalia ignota. (v. s. c. in h. guett.)

3. C. JUNGEA (Jftin. sp. r 120), caule basi setoso-hispid[^] supernè glabro ramoso subaphyllo, foliis radicalibus ruricinalis substrigosis, super. linearibus partis eciliatis, capituli spicatis subgeininatis distantibus. (2) in locis glareosis et ad agrorum margines Kūropic ferē tbtī's et in Sibiriū Altaica (Ledeb.). Gou. ill. 64. Java, fl. ausir. t. 427? Marti, in flora. 1829.-p. 441.—Clio. hist. 2. p. 144. f. 2. Tabern. liist.-487. Folia rad. lempre antheseos eroarcida. Floret per boras maiiitinas. Liliila? crocea?. Huic pertinet Prenanthes hispida h*ord. par. 1815 et 1&19 non VVilld. nec Pall. (v. v. et s.)

yli rigens, foliis radicalibus spinulosis* caulinis linear-lanceolat^Htrigide ciliatis. — in Palatinatū planicie Rbeni (Koch*!) Valesiā (Mnrr. Clairv. J. DC.!), Jaliaā (Rresl.). Ch. rigens lleichb. fl. exc. 1. p. 271. Ch. latifolia invol. non hispidis Koch! Mi litt. 1828. Ch. Gandini Hcgetschw. 11. hel[^]. 2. p. 16'Jt. Ch. juncea li. Gaud. 11. belv. 5. p. 4 > Mnrr. hot. val. Cn. Clairv. man. ^35. Ch. virgata Presl del. pr&g. n. nO. (v. s.)*

yli acanthophylla, ligulis utriusque f. la vis. — in Germania. Ch. juncceaf Schkubr handb. t. 21 rf. Ch. at-anthophylla Borekh. in Heichenb. fl. exc. 1. p. 271. An à priori satis diversa? (v. a.?)

4. C. BREVITROSTRIS (Fisch. et Mey. ind. tert. hort. petr. 1837. p. 32), caule ramoso, foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus subintegerrimis basi selosis, capitula omnibus pedunculatis, rostis subcrasso persistente achaj-nio triplō hreviorc basi sqflciuiulis oblusis cinclo. — in Sibiria Altaica. Ch. juncea Ledeb. fl. alt. 4. p. 147- excl. syn. Affinis dicitur C. juncesc et gramineae, sed ab omnibus differt achaenii roslo brevissimo.

5. C. STRICTA (Ledeb. fl. alt. 4. p. 146. ill. 1. t. ^7), caule basi hispido raiuoso, foliis radicalibus obovato-runcinatis glabris, caulinis rameisque ovato-oblongisve, ramis involucrisqne arachnoideo-tomentONi's. Tf. iu collibus apricia Sibiria Altaica prop̄ pagum Sogra. Au fortē adbuc Ch. juncea var.?

- J. C. LATIFOLIA (Bieb. fl. taur. 2. p. 244), caule basi piloso raeterūm glabro ramoso, foliis radicalibus runcinatis, caulinis indivisis lato-lanceolatis bine inde rigidū ciliatis, capitulis spicatis secūs rachin subag[^]regatis, invol. squainis dorso setis rigidis patentibus subacneati.i. ^27 ip Tauriūb cam pest ribus (Bieb.), in glureosis ad Nakitschiwanischai (Szovv.!), in Olympo IJithynico (Audi.!). Folia 3-4-poll. longa," pollicem lata v*rigida. (v. s.)

- ✉. C. PAUCIFLORA (Ledeb. fl. alt. j. p. 148. ic. illustr. 2. t. 198 non Don), canle 1 aiuois.simo glabro, foliis radicalibus subruncinatis, canliuis obloDgo-linearibns, capitulis solilariis raiuos terminanlibus 6-floris, invoincio cylintrico 5-phyllo basi incano exterrūra glabro breviter calycentfo. If in arenosis Sibiriae Altaica? adfl. Irtyschā Naleati ad Semipalatinsk. Achaenia apicesubglabra breviter rostra ta'.

- S. C. GRAMINEA (Bieb. fl. taur. 2. p. 3*44>soppl. p. 538). tota glabra, foliis radicalibus ruueinatis, caulinis indivisis, sugrioribus linear-filiformi[^]us, capitulis secūs rainulos racemosis% in arenā mobilē deserti Caucasico-Caspici, et Sibiriae Altaic* ad ostium fl. Baschkaus. (Ledeb.). Prenauthes chondrilloides Pall. itin. 3. p. 537 (ex Bieb.) non Ard. Planta multica[^] ramosissima vir-gata. Achaenii rqstrum brevius quam C. juncea?. (v. s.)

- ⌚. C. PRENANTHOIDES (Vill. voy. i € 2. ^ 16), tota glabra, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis in petiolam attenu^B intcgerrimis seu sjnuato-dentnlis, caule nudjb^Qulo rarooso, capitulis[^]iifwVymbuui la xu in* com posit um fasiigiatam dispositiis. Tf. in Carniolia superiōr[^] (Scop. Moric.!) et calidiore circa Goritz (Bartl.), in agro Foro-Juliensi (Kay hist. 228), ad Monlfalcone* (Mull.!), ad Savum fluvium copiose (Graaf.!), in Rhaetia septentr. (Gaudin), circa Curiac (Bauh. Moritz! Berg.!) Bartl. ia, flora 1820. p. 3/\$? Cnss. diet. /8 (1827). p. 107. Prenanthes cho[^]drilloides Ard. specira. 2. p. 36. t. 17. Linn. raant. p. 427. Schrayk akad. munch. phil. 4. p. 313. ft 14. Chondilla pauciculatu

- Lam. diet. a. p. 78. *Lactuca prenanthoides* Scop. earn. ed. a. v. a. p. 100.
 t. 49. *Lactaca inermis* Forsk. descr. 144. ex 'Vakl symb. i p. go. (v. s.)
 10. C. CHEPOIDES (Linn. syst. veg. T95. Willd. <p. 3. p. x53i), ^{cane} simplici
 setis rarissimis adsperato, foliis sagittalis aimplexiciliibis indivisis oblongis marcie
 et carina scabris, capitulis fthernis breviter pedicellatis, invol. tuberculis rixari*.
 iff seta in nigram allatn exsertis hispido. (^ patr. jgn. An var. C. juncea ex
 Steud. ? — Cb. crepoides Lapeyr. abr^tia, ex capit. terminations videtur di-
 versa.

•j- *Species verisimiliter ycludendce.*

- C PINNATIFIDA Poir. suppl. a. p. 3307 et C CYMOSA Poip. ibid, ex pappo \$es-
 sili à Qiondrillis differunt, bed nescio cui generi adsociari debeut.
 C. SATGITTATA (Wall.! car. n. comp. n. 380). — in Nepaliā legit cl. Wallich. A ce-
 nere videtur aliena, *seu ex speo in, nianco won'descibere queo. (v. s.)

-} - *Species* exclusae.*

- C. ACANTHIFOLIA Poir. = *Pbaenopos acanthifolius*.
 C. ALBA Lam. = *Nabalus suavis*.
 C. AT.TISSIMA Lam. = *Nabalus altissimus*.
 C. AURICULATA Wall. = *Lacluca auriculata*.
 C. CA PIT AT A. = *Loinatolepiti glomerata*.
 C. CHINENSTS Poir. = *Youngia Chinensis*.
 C. DEUILIS Poir. = *Youngia debilis*.
 C. DECANDOLLEI Spreng. = ? *ttarkhausia Candollii*.
 C. UENTATA Poir. = *Youngia dentata*.
 C. ERYSIMIFOTIA Poir. = *Lactuca erysimifolia*.
 C. FoiffTiNAr.is Wall. = *Ixeris fontinalis*.
 C. GHIACILIS Wall. = *Lactuca gracilis*.
 C. BASTATA Poir. = *Youngia hastata*.
 C. HASTATA Wall. = *Lactuca hastata*.
 C. HfERAororoE^Roth. = *Tolpis coronopifolia*.
 C. HISPIDA Poir. = *Prenanthes hispida*.
 C. ILXKOEMSa Poir. = *Uabalus illitocnisis*.
 C. INDICA Sleud. = *Lacluca Hernaneana*.
 C. jA,roi<icA Liijn. = *Youngia Japonica*.
 C. LiCViGAI4 Pursh. = *Pyrrhopapfn^ Caro^nianns*.
 C. LANCEOLATA Poir. = *Youngia lanceolata*.
 C. LowoiFOLrA Ham. = *Ixeris polycephala*.
 C. LONGIFOLIA Wall. = *Lactuca longifolia*.
 C. LYRATA Poir. = *Youngia Thubergiana*.
 C. VULTIFLORA PTSP. = *Yootigia multiflora*.
 C. NUDrrAULis Linn. = *Microrhynclis nudicanlis*.
 (L) PANZCUTATA Lam. = *Chondrilla prmanthoides*.
 C. PAirriFi.ORA Don>c3*PvVrhopapptnlfpaucfflor!is.
 C. PELTIDIUM Moriiz. = *Willpnieta apajgioides*.
 C. PINNAE Lam. = *Sonclius leptocephalus*.
 C. ruLCHRA Lam. = *Crepis pulchra*.
 C. RACBOMSA Poir. = *Lactuca Heyneana*.
 C. REPEVS Lam. = *Choris repens*.

- C. RHOMBU-ULIA Willd. = *Youngia rhombifolia*.
- C. HUDERALIS Giertn. ~ *Lactica tuuralis*.
- C. RUHCINATA Wall. i= *Youngia tuncinala*.
- C. SESS^EANA Don. = *Pyrrhofftppus Sessacanns*.
- C. SESSILIFLOKA Lam. ~ *Phaeuopus vimineos*.
- C. TEN cm Wall. = *Ixeris polycephal^P*
- C. VIMI^A Lain. = *Phxnopus vimiuens*.

DCCCXX. VYRRHOPAPPUS. — Chondrilla; sect. Crinissa Don. — Barkhausia Nutt. Ell. non alior.

Capitium multiflorum. Invol. duplex utrumque polypyllum, squamis linearibus aciuninatis, inter, i-seriate erectum, exter. brevius laxum scu. subpatulum. Recept epaleaceum. Ackaeiia oblonga submuriculata apice attenuata in rostrum gracil[^] elongatum. Pappus pilosus pluriserialis mollis rufescens. — Herbae perennes Boreali-Americanæ? rariis Capenses. Folia linear-lanceolata integra aut pinnatifida. Rami apice nudi i-cephali. Flores intensè lutei. — Ncinea cx wppoc rufus, et watloc pappus. — Ggsnus'fcré medium inter Cbondrillain et Tragopogonem sed pappo rufescente fortè ad Hieracieas potiiis referendum.

Sect. i. CRINISSA Don I. c.

Invol. squama: exteriores liueari-setacca; subpatula?. — Species Americana?.

1. P. CAROLINIAMUS {Nutt. gen. am. 2. p. 126 sub Barkhausia), glaber, caule cieeto ramoso 2-3-cephalo, foliis lanceolatis acutis laciniatis subpinnatifidis aut subiutegris, pedicelkis longissimis, invol. squamis exler., lineari-s[^]ubulatis. % in Amer. bor. frqueus à Virginiam ad Floridam (Nutt.), in Louisiana (Teintur.!), in Carolina? ruderatis (Bosc! Michx.). §11. sketch 2. p. 251. Leontodon Carolianum Walt. 11. car. 19a. Scorzouera pinnalilida Michx. fl. bor. am. 2. y. 89 non Lour. Chondrilla lsevigatu Pnrsh fl. a. p. 497- Flores splendidè citrei. Achscuum rostro brevi. I v. s.)
2. P. MULTICVLIS, glaber, caulis è collo pluriis adscendentibus erectis ramosis, foliis lauceolatis variè pinnatilobatis, lobulis acutis- pedunculis nudis apice involucrue brevissimè pubesc[^]ute-furfuraceo, invol. squamis ext. linearii-subulatis brevibus, inte*r. pappan[^] aequantibus linearibus margine subscariosis. — in Mexico ad Tamaulipas et S. Fernando de Bexar legit cl. Berlandier. Achsenia innricata rostri longiludini aequalia; rostri apex sab pappo aunulo villoso instructus. (v. s.) /
3. P. SCAPOSUS, subpuberulus, foliis radinibns runcinato-pinnal[^]idis subdennatis, scapo foliis duplo longiore nudo f[^]-oef-hulo, invol. squamis extfr. linearii-subulatis brevibus. (2) in*Mexico propè Béjar apijli florentern legit v. Berlandier. Kadix fusiformis subtuberosa. Achaenia in meo specim. desiderantur. Pappus ru/us et habitus omnino generis. (v.*s.) ,
4. P. TAUCIFLORUS, glaber, caule erecto 1-2-cephalp oudinscplo, foliis radicalibus ruuciato-pinnatiddis, suntmis in squamas pinn[^]tilidas abeuntibus, invol. squamis exter. lincari-setceis patalis. If. in Mexico. Chondrilla pauciora Sessé et Mocin. ex Don trans, linn. soc. iC. p. 180 non Ledeb.
5. P. SUSSJEANUS, glaber, caulis pluribus i-cephalis apice squamellosis, foliis radicalibus acuminatis subintegerrimis, caulinb unico lanceolato, invol. squamis exter. linear-lanceolatae. % in Mexico. Chondrilla Sessacana Don trans, linn. soc. 16. p. 180. Invol. squamae sub apice tube re alb' auctae.

Sect. 11. PiESIS.

Invol. squamae exler. ovato-lanceolatae adptessx. -r- Species Capensis.

6 P i R(XACorDE\$, glabei, collo crasso, f>lns radicalibiis<-longiti«, smnato-sub-IUNICIO itab, scapis i-cephdlsnodis foil i] anulum supeiantibus, mv > squami*, <'3ter ovato lanceolate adpiessis If ad Cap Bonae Spei in collibus prope nrbeni (Ecklon'), ad Bnj et 7wait Key 'Diege') \chj_nia apice immcata Rostrum circitei achaenu longit aquale Pappus pallide mfescens (y 9 coraui. «i c) inv)

DCCCXXI TAR4XACUM Hall heh 1 p a3 eicl sp aa juss gen 16 Lam ill t 653 DC fl fr ed 3 <v 4 p 44 Rewhenb fl exe 1 p 7; o Yeonl toilon Adans Jam 1 p na Gcertn fr 7 p 363 / 158 f 7 Schreb gen n 1237 — Dens leonis Tourn mst 266 ^ff/ act ac sc par 1741 — Leontodontis sp Linn — Hedypnois Scop non alioi

Capitulum multiflomm Invol duplex, sqmmis exteuonbus parvi* adpiessis pitulis reflexisve, inter i-stinlibus eiectis, omnibus ssepe apice calloso-conncujatis Reccpt nudum Achaenii oblonga stuttā secus costulat rnuncdla aut apice spmellosi, in lostium longum producta. Pappus pilosus multiSernli^ dblissimus —Herbae fcie omnes Gerontogae, acaules perennes Folia omnia radicalia oblon^i integia sinuata ant runcmato-piunatifida, saepius gldbra Scapi sa?pissime 1cephali fistulosi Capitula flava, ligulis extenonbus sa3pè rubtntibus.

§. 1 Taraxaca spuna, scapis bi-trifidi* 2-3-ccphaht

1 T MONTAWUM , foliis subiadcnlibos finnis glaberninis runcmatis denticnlitis lobis, subfakatis tenninali majoi, «(apo lanuginoso bi tnfido ad ougmes pe' dicelloium subfoliato, imol sqamis exterioubs lanceolaris leHexis, inter glauco pruinosis ecoimculalis , achsennt mmncalis rostro tuplo feie brevionibus % in Caucaso ad cdiumen montis Reschbaimak (Mey ') , in uro\innae Karabagh ville Koschdari IOCH moLobis sitcis I ipidosis (Szow ') Leontodon inont inus C A Mey ' enurn p 5*? lariat scapo folns bieviore, aequ III aut longiore, scapo a basi aut veius apicem bifido (v \ c in h gcnev ets sp . a cl I jich et Mey)

§. 2. Taraxaca vera, scapis simplicib* fistulosis l-ccphahs , achaznus longe rostratis — Leoutodon Taraxacum Linn sp 1122 (1)

* Involuci squamis exterioribus squarrosis etpatuhs

s T DBITS tEOitis ^Desf 11 all 1 p 228), glabeinnum , folns maqaalifer et acute runcinatis lobis tflauguianBus antice dentalu., invol squamis ecormcu latis, exetenonbn> reflexis, acbaenus apice muncatis % in piatis, pisi uis se cus vias Europae, Asue occidentahspt 4fucae boiealis fiequenna marislittoubus adedilisMmas Alpes Lara ill r 653 Leontodoa Taraxacum Linn, sp 11 a 2 Bull herb t 217 Hedvpnois Tai ixacum Stflp cam a" p gy T ofhcimle 'Vill dauph 3 p 72 Leontodon ofbunalis With brit air 679 Leontodon vulg^re Lam fl. fr 2 p n3 Taraxacum Leontodon Dumort piod. p 6t I ucha hist 680 Scapus vanat folns brevior, longioi, aut 1ls seqaahs, semper

* *Phyllocephalum*, mvol squamis exter in folia ampla ovilia mucionata patentia con\eisis - circa Salisburgum legit tl Adr de Lezay (v. s)

3 1 GTMNANIHAM, collo lanigero, folKa atute roncmatu, posr flores nascenti-

(i) Plnriini auctores nupenores et gravissuni uenipe Fries (nov suec ed a p. a/*a), Toith (bull sc nat Ter a p 336), Koch I flora i834 p 49 ann »c' nit i834 r a p 119), etc hujut divisionis stifpes ut umu» speciei vanetites wbent

bus secus peliolium hmc Itide Imatis, invol squamis cteioubus ovatis acn-
Ns subcifVxis inleorduis hineiviis % in Pcjoponeso dicà Naupliam, Po-
100, etc Leontodou gymnautliui Link in linnaca' 183/ p 5R?. Cor. extus
irescunt. Valde dicitui simile T Denti leonis.

/f T MEXirvNUM, folns maquabtei et acute rncinatisgiabris, lobis Inangulari-
bus anticc dentalis, sea pis folio bievionbus spaise subvillosis, in vol. squamis
ecornicilalis, cteuoubus deroum palulis, achaenns pei to tain feie supeificiem
inuncatis. If in Mexici inontibus ctrca uibeui legit cl Berlandier. Niris
T. Dentirleonii. afliue et forte varietas. (v s.)

5. T LATILOBCJM, foliis runcioafis lobis latis tt idngulatis antice {lentatis confertis
supra glabiis subtus sparse et in cost'a media ronfeilius pilosulis, scapo gla-
bio, Invol squamn ecoinculatis, extei. patulo-ieflexis, achaemis pei totam su-
peiffiLiein muncatis. *2 in Tena-Nová Amer. bor. legit cl de la Pylaie Pioxí-
me ad Dentem-leonis accedit (v. s.)

6 1 CAUCASTCUM , glabium, foliis radicalibus. mncmatis, lobis retioibum lm-
biuatis, scapo. ..., in\ol. squanus glabns lanceolato-hneanbus sabcornicu-
latis, exleiioubus patnlis ovato-oblongis margiiatis If in Cauraso ad fl. Te-
reck tuca lataipui (Stev), in Sibmae Altaice collibus aputis (Lcdeb) Leon-
todon Caucasians Stev mem soc mosc 4 p bo ftieb. fl tarn 3 p. 53o.
Lcdeb. fl alt. 4 p 163 I eont Taixaxium Sieveisex Lcdeb Tar Denti-leonis
aftine sed minus et invol. squamae diveisae

7 1 CER^TOPHORUM, foliis glabiis dentato-sinuatis runcinatisve, scapis glabris
jamouibus apicc tomentosis, mvol squamis omnibus erectis sub apice coma
calloso auCtis, ach-Binis apue innronatis loslro suo vquaHbus. 1L in Kaints-
chrftká (licdeb), in Unalaschká (h ac petrop.'), in pratis sylvatit Sablonoi-
ChrtbH Dahuix (lurcz ') Leontodon ceiatophorus Ledeb. IC pi. fl 10& ill
i. r ^4. fl alt 4 p. r4q in adn. Lobi folio rum magnitudine vaili, majores
tuanglati Capitulum duplo majus quajn T Dantis-lcoms et cormculali. (v s)

fl. T. L^EVIGATUM (DC cat h monsp 149.fi ^1 5- P< 45o), glabuusculuin, foliis
ruucinato pinnatipaititis, lobis ina?qualib& lanceolatis acuumatis subdenta-
tis, scapis sacpjus glabeinnis folia subxquanhhus, invol squamis apite callo-
sib subcoimculatis, exter patulis, achaenns pallidis apicc spineloso-muiicatis—
101M0 basi inciassato achxruo longion. % in pratis et pa<(uis sircis raontams
colnisque turopae mediae etaustialis, et Asue ouidentalis. Reicuenb fl. exc.
i. p 270. Leontodon-Bvigatus Willd sp 3 p. 15/b Leont laraxacnm fi are-
naiium Bluff et Fmg fl geim 2 p 606. L medium Ghaill. in lift 1S07 Hue
peitineift (et vix vanetats dicend*; L uchoiaLenm Schleith L. AlpinusHopp.
in Sluim deutsohl fl ic. L taixacoides Hopp ' &n florà 18J1 p 194 m
Edinb phil jouin 1823. p 3a et in Sturm deufschl fl ic L. taraxaroides
Rctusc'b ** L piaerox Kit L AlpinusHopp Ten ' Fisch ' Vanat folns scapis<
que jiinioribus parce et laxe MIOSIS aut glabernmis Capitula paolo minora
quamT Dentia-le^nis (v v^ets)

f arcuatum , folioiuin lobis latn-tnangulaiibus iebuivo-aicu itis vix den-
tatis appioxlmatis, scapis saepe folia duplo snpeiantibns, achaenns basi
tuberculos- apice spmeloso muncatis % 111 montams L arcuatum
1 ausch in florà 1821 p a p 567 L minimum Biiginti ex Guss ' inlitt
(v v. et b.)

ij T. ronwicuLATUM , foliis glabiis dentatis subrncinatisve, scapis glabris sub
capitulo pra?sertim jnioubus tomentosis, invol. squamis sub apice calloso-
cornicnlatis, exterior, patulis, ach-enf apice munculatis rostro sno brevionbns.
If,m pascuis arenosis Hungarian (K.it), ciica Pestbum (Sadl), Austriae (Schult.),
in pratis altiorum Caucasi oucntalis montium prope Kaiabagh (Szow '), ad
Kislars et Kaschaur(C. A Mey.'; m Daburia' ad flum Anpai (TnrczJ) Leon-
todon corniculatus Kit in S4hult. oest. fl. 7. p 40O T. officinale var y Sndl
fl pesth. 2. p. 224. Species elacte media inter T Dentem-lconife et T. ceralo-

pl^oium,'piiou magnhudine capiluli , po&teou coruiculis callosij. iuvol aftinis. (v. s) .

fo. T GLAUCVNTHUM , glabrnra, foliis linraii-Gblongis cicciusculis denlatis si-nuatisve, denlibus subiedexis*, scapis folia supciantibus apice subpilosis, in vol. squanm glaucis infrà apicem comic nlatis, exterioribiw eieoto- patulis, achxmis . .. lostio triplò bievionbus % in herbidis snbsaisis Sihiiite Al-taiae Leonto'don glaacanthus Ledeb fl alt 4 1> i5 icon, fl ro&s. ill t. 33 Cor. pallide flavae

xi. T. GLABRUM, ex omni parte glabenimuin, folus ellptico-oblongis longe m petiolum attenuate nunr Inteqeniinis nunc parce subsmuato-dentatis, scapo. folas paulo longioie , invol. sqnamis extei palulis. iinniargmatis o^ato-lancoc-latis apice callosis , achaeañ lams roslio abbiejⁱito. If in hamidis montanis Dahnuae adNuchu-Doban legit cl Tuic/amnow Hieiatium glabrum,et post-ea Leontodon nov sp. Tnicz ' in lift AftineT glancanthe, sed nt vtdetni di-versam invol nigncantibus nou aat vix coriinulatis, acbaeuu (eqaideim im-matari) lostro brevi, scapo eti.im apice glabeirimo (. s conuu a. cl inv.)

•ia T. s,tRoiiNUM (Sadl fl. pcsib p a43), foliis subglancih ugidnlis utrinque subse.ibrulis, vernalibus submtegiis, csteiis mminato pinnalifidis lobis trian-gulaibus autice acute dentatis., scapis praeseitim apico cano-villosis, invol &qu.iinis lineaibus acnminatis ecormculatis, exteriorbus squiailoso-snreflexis, acb-cniis stnatis apire ranricnlatis rostro fere longioribnii. If m pa&cni* siccis, collibus arenomB et in montams loois argillois a \indobona ad Cancusum. Rchenb fl. exc i p. 271 Leontodon seiotinus Wald&t et Kit. pi. iar hung 2. t. 114. Be&s. enum. n. 989 Capitnla magnit. Dentis-leoms nee olio modo à T. Dente-leonis gcnence di&tingnenda ut vult cl. Baumg. 11 tiau<> 3 p. 14. Mor. à junio ad navemb. (v. s.)

13. T LRYTHROSPFRMUM (Audiz. in Bess. fl. pod. cont. 1. n i586), foliis glabiib runcinato-pinnatipartitih, lobis angnste tnangnlaribns lanceolatisve, scapis folia bubjcquanhbns glabris aut apice subvillois, invol squamis apice calloso-subcorniculatis, ext patulis, acbaeniis intense lulis apice spinellosomuricatis, ioj>tro basi calloso colorato aclaenio longion. If in pascuis siccis Europae fere tolius, sed cumT la?vigato sjepius (foite non immeiito) confasum. Leont obliquum Files nov fl. sneo. ed 2. p 24^ Color fol vix glaucub, lobi angnsti acnti bine inde dentati (^ s)

k, Bessarabicum, achaemis etiam basi tnbercnlato - mnncatis. —m Podo- lia, Bessarabiä, TauriA, etc Leontodon Ressarabicus Fisch. ex Link eiium 2. p i83. L salinus Bess ' cont. 1 n. qqo non alior. (v. s.) ^

14. T. OBOVATUM (DC rapp voy. a. p 83 cat h raonsp. i50.fi fr 5 p. 45c), glabium, foliis ladicibus hurai a^dpressis obovatis vix dentuti^, seiioribns mncinalo-pinnatilidis, scapo folioiuin longitud. subaequnli, invol. squamis apice ralloso-coiniculaus, exteiionbns subpatulis, achaenns mfis rannculatis lostro dnplu brevioiibns If in piatis et cullis Enropas australis, Hispanic (Guss.'), Occitanic, Galloprovincu», Sicilian, elc Leoniodon obovatas Willd sp J p i54^>. boit beiol t. 47 Dens leonis latioie et rotuudiore folio MaJn hot. 85. — J. Baah hist, a. p. 10^7. f Q (V V et s)

ti 1 WALICHII glabrara glancescens , foliis laditalibus obtuse pinnatiparti-tis, lobis subdentalatis, scapis adscendentibus foln cirt longitndme, invol squa-mis apice calloso-coiniculatis, exteiioribus paivis squanoso-ieflexis, achamiis pallidis apice spinelloso-niucatis lostio luplo bicvioribns. If m India oien-tali en ca Oude legit cl. Wallich. Leontodon glaucescens Wall ' cat. com p. n. 356 non Bieb (| s. com in. ab hon. coet meic angl.Ind. 01)'

iG. T ERIOPDTIM, folns glabus obtuse sinuatis aut subpiunatifidis, scapo fer-rngineo lannginoso foliis longiore, invol. squamis apice callosis, exterioribus squarrosa-icflexiSjachaBniisapicaspinelloso-muncatis lostro suo br^vioribus. q in rupibus montinm Nepalia et ad Kamaon legit cl Wallich Leontodon: ciiojjodon Wall' cat. couip n. J55. Don in vver. soe. mem j p 4x3?prod.

fl. nep. 1¹⁸? *Leontodon criopns* Spreng.*syst. 3. p. 658? Herba cespitosa. Radix crassa. Species nostra differt à descr. Donianft foliis nonlineari-runcinatis, basi vix lanuginosis, achaeniis cerlissimè non ls^vibus, etc. (v. s. comm. ah. hon. cur. mere. angl. Ind. or*)

17. T. GLAUCI SCENS (Reichenb. fl. exc. r. p. 270), foliis junioribns basi araneoso-vilosus, adultis glabris glaucescenlibns, lobis approximatis laic triangularibus dentatis, scapo plus minus lanuginoso foliis saepius breviori* invol. squamis apice calioso-subcorniculatis, exterioribus ovato-lanceolatis snhadpressis, iibae-niis rmfis basi tuberculato- apice spinrlloso-muricatis rostri lon{>i!udinem fere aequanlibus. If in pralis humidis subalpinis Caucasi (Mey.!), Persia? (Szow.!), et in montibus India* orientalibus (Royle!). *Leontodon glaucescens* Bieb. fl. laur. suppl. p. 53ol L. eriopodium Don? non Wall. (v. s.)
18. T. LYRATUM, foliis radicalibus glabris lyrato-pinnatifidis, lobo terminali maximo subhastato, lateralibus abbreviatis remOtis, scapis arachnoideis, foliis brevioribns, invol. squamis lanceolatis margine et apice membranaceis, exterioribus ovatis patulis, achaeuii rostro brevi. If in lapidosis sumini montisad fl. Tschnya Sibiriae Altaicae. *Leontodon Lyralns* Ledeb. fl. alt. 4. p. i. fo. icon, fl. ross. ill. t. 497. *Radix repens* videtur ex cl. auct. (v. s. comm. à cl. Bunge.)¹
19. T. ALPESTRE , glaberrimum , foliis runcinato-partitis , lobis remotè denticn-latis utrlnque binis, teriuinalibus maximis, scapo i-cephalo, invol. squamis exterioribus ovatis patulis, rosiro angulato achienio breviore. If in faucibus anujinorum jugornm Sudetorum. *Leontodon alpestre* Tausch in flora 1821. p. 564. t-

** *Involuci squamis exterioribus adpressis.*

30. T. APEWNINDM, glabrum, foliis radicalibus runcinato-pinnatipartitis, lobis trianglnibus vix dentatis recurvis, terminali vix caeteris majore, scapo foliis breviore, invol. sqnamis subacutis eoornioalatis, ext. jnnioribus erectis demum subi>atili», acharniis apice muricatis rostro suo longioribns. If m pratis alpinis Apennini Neapolilani in Aprutio. *Leontodon Apenninus* Ten.! id via" 83 syll. p. 392. *Leontodon Alpinas* Guss.! pi. rar. p. 3,5. Herba deppressa pSmila', rostro brevissimo ab omnibus congeneribus distincta. (v. s)

31. T. PALUSTRE (DC. fl. fr. n. 2953), glabrum, foliis lanceolatis sinuatis snb-runcinatisve, scapo foliis subaequali, invol. squamis apice ecorniculatis, exterioribus lanceolatis acutis, achaMiiis.apice spinelloso-muricatis rostro dimidio triplòe brevioribus. ^ in paliulosis Enropae et' Asiac borealis. *Leontodon pa-ilustre* Smith fl. brit. 2. p. 8a3. Sow. engl. hot. t. 553. L. Taraxacum With, ferit. 679 non Linn. L. piunatitudui Taasch in flora 18J4. p. 284 . L. Raii Gou ill. p. 55. (v. v.ets.)

£. *intermedium*, foliis ljnearibus sinnato-dentatis.—L. crectnm Hoffm. germ. 1. p. 278. Hopp. in Sturm deutschl. fl. ic. L. salinns Poll. n. r35. L. dentatus Taasch in flora¹ 1824- p. 248. *Apargia salina* fl. wetter. An Tarax. leptocephalam Reichb.? Hab. ia paladibus dulcibus at in salinis. (v. v. et s.)

y. *tenuifolium*, foliis linearibus integerrimis, squamis inv. exter. ovato-lanceolatis latè scarioso-marginatis. — *Leontodon tenaifolium* Hoppe in Sturm deulschl. fl. icon. (v. s.)

it? *lanceolatum*, foliis linear-lanceolatis sinaato-rancinatis, squamis inv. ext. ovatis albo-marginatis. % in paludosis. *Taraxacum lanceolatum* Poir. diet. 5. p. 349. L. lividus W. et Kit. pi. rar. bung. a. t. J r5. L. Scorzonera Roth, neu.'beitr. 1. p. 229. Tar. Scorzonera Reichb. fl. exx: 1. p. 270 Scorzonera TaraxaciRoth, beitr. i.p. 120. catal. 1. p. g5. Scorz. acaulin Willd. sp. 3. p. i508. L. palustre fl. dan. t. i7o.S. Hedypnois'pa-ludq,sa Scop. earn. 2. t. 48. Tarax. nigricaus Reichb. fl. exc. 1. D. 27a? (v. v. et s.)

33. T. BICOLOR , glabrnra, foliis linearibns* snbalanceolatis snbintegerrimis vel dentato-rancinatis, scapo foliis subatqnali, invol. squamis ecorniculatis, exte-

noribus ovalis acutis ndpressis albo-iiia*ia»natis, <tib i*niis apice nuiricato-spi
nellosis rostu longitndmi ^iieqnalibus. Zf in piatis bmuidmsculis Silmuse Al-
taiae et Daliunae Lcontc<OT bicoloi Turc7 » in litt. i83o L lcuc.u.tbu<* Le-
cleb fl alt 4 p. IJ4 icon fl ross ill t i3a. Coi albidie aut pallid? ilav<e,
fxtenores vittā fusta subtus notatae (v. s)

a3. T. COTLINUM, foUik spaikuldto (Alongis luncinatis flentitis ant subinttgus
glabns, ad eolhuu jumonbus \illois, stapo /ohoruin longit suba?quali apice
iaepe viloso , invol squainis etoinx ulatis , extei. ovato-lanceolatis adpiessia
marginē subvilosulis, ncbjeniis .ipice spjuelloso muicaiis lostio ruplo bie-
vionbns IL in colibus metis Dakuna&, ms>uhs fl Ieoa, etc foile in Sibmā
Altaicā ^Leontodon salinuj, Ledeb fl. alt 4 p i^3 hue iff(lendus? (v. s.)

/8 integrifolum, folns iategeiiimis, collo glabro, icapis folia duplō buperan-
tibns If ad Ochotsk et in ins Angeia legit cl. lurezauinow (v s)

24 T PARVLJLUM, gldbium, folns radnalibus iuncinatis, I<bi6 subiefiorsis
fiangutanbj* acuhs mlegenimli., scapii folia aequanlibus aut ea pauluhun
supeiantibus , mvol &quainis apic#<>ensim acuminatis rosro suo diuiddiò fcie
brexioibns if. ad Kaiuaon India? ouenlalia legit cl Wallicb Leontodon pai
vulnm Wall ' cat conip n 35^. (v. s coin III ah hon. cm mcic. angl. Ind.
01.)

a5 T STEVEWH , glaberriraum , foliis oblongis apiee lahoijbns lotnndatis mu-
cionatis dentatis sed lyiato-sinuatis, scupo foiis Mibaequah, invol squaoṁ
etornicnlatis lanceoljtis, exteioubus subereclis, i(ba)?no feie rostn longilo-
tmi deqnali IL in hnmidioiibus tohns Caucasi (Mey \ ad inoutem Stbadag
(Stev)» i" aliiionbns montibns Adscbar piov Gutiel (S/ow.) et prov Kaia-
bagb oient (Szow '), et in Sibirā Altaicā (Ledeb.) Leontodon Alpinns'Stev.
act. soc. mosc 4 p 60 Bieb. fl taui 3 p. 53i non Hoppe Leontodon Sle-
'en'n Spieng syst. 3. p. 65U. Ledcb. fl. alt. 4 p i5o. vai. et. (v. s. comm. a
cl. Fi&th ct Mty.i)

(6. sinuatum, folhs sublyrato-sinnatis lobu> lemotib ttiangulaiibus, termiali
nmximo % in Sibiiā Altdica tiica fontes fl.Inja, Sentelek, Uba etlige-
rak Leoniodon Stevemi ^ binuatosLi deb. fl alt 4 p. i5o L species foliib
olei.iceis tenuibus Pall, itm 2. p J68. An species piopua tx ipsisbimo
auctoie? (v s.)

J6 T. HIRSUTUM Hook fl boi am 1 p. 296 iub Leontodonte), nndique
hirsutnm, (olns pinnatifidis lobis iuaeqlalibns lemotis acuminalis, mvol. squa-
mis erectis adpiessis. — in Awei boi. iusula Menzies et^d lipasaieno&as flani.
Columbia: In\ol pih fulvi

§. 3. Taraxacu brevirostria, stapis \-iephalis , achceniiA rostro Ion-
gionbus. — An poliūs invito habitu Crepidih secho?

27 T. BIHYNICDM, glabium, falii-* oblongis basi in petiolum attenuatis paice
dentatis aut subpinuutilidis, stapis folns paulo brevioribus, invol squamis
extei lineaī-1 mieolaus laxeeiectis, loslio acba2uii bre\issimo. If in snmiuo
OLymo Bithynias legit cl. Aucber-Floy pi. exs n 354o' Ad T Stevertii , rile
luoiuutecl Auchei, proxime a^cedit, sed invol evideniūs calycalatum, ros-
timn hieviuSf berba multō minor, (v. a comm à cl. inv)

28 T. (REPIDIFORME, glabrum, foliis oblongis i"etioisuni subdentatis utiinqne
acuminatis, scapis foliis bievi^ibus, m\ol squiaims extei ovato lamceolatis
snbhcanosis laxis dnplo quam Intmoies bievionbus, achaemi lostio brevis-
simi IL in Asiae mmous Alpibns Lazistamcis legit cl Auchei-Elo>, pi ext>. %
p. 3546' tolia i poll longa. Scapi 2-pollic Moies flavi.*(v. s.coinm. a cl. inv)

29. T. LIBANOICUM , foliis brevissimc petiolatis obovatis obtusis supiā glabus
subtūs pulvernento-\elutinis basi inciso-piunatiūdis undique eioso-denticu-
1-ttis, scapis lanuginosis MX folia supeumtibus , invol glabii squamis lineau-
bus, extei. squanosis, atbajDio lostn lougitudinem subaequantc. If in inonlo

Libano legit cl.'Aucher pi. exs. u. 34^9 ! Radix longa teres. Scapi subincurvi circ. 2-3-pollic. Floresflavi. Rostrum breve. Specieſ ex babitn ad T. obovatum paululūm accedit. (v. J. com ID. à cLin.v.)

¶ *Species non satis not a.*

3o. T.P SIWENSE , *I* oliis rfidicalibus glabris ifi orbein expansis oblongis a pice rotundatis inferius runcinatis, sea pis i-cephalis lougis, invol. squamis suberectis apic reflexis. (f) iu Cbinā. Leontodon Siuense Lour. fl. coch. 2. p. 584* Ex pappo pilo&o potiis ad Taraxacum accedere videtur.

-j- -j- *Species exclusa,*

T. CAUESCENS Mor. = Maerorhynchus pterocarpus.

T. BULDUSUM Reichb. = fftheorbiza bulbosa.

T. PUMILUM Gaud. = Macro rby neb us pumilus.

T. SAXATILE Bocc. = Hyoseiis radiata.

DGCCXXU. WILLEMETIA Neck. clem. (1790) up. 50. Cass. diet. 48.p. 427.

Less. sy.n. i36. non Mccrckl. nee Brongn. (1). —Wibelia Rahl. germ. 2. p. 426. Tausch in fiord 1828. erganz p. Si. — Calycoco'Mis Schmidt phys. oek. atits. 1. p. 271.— Aspideum Zollik. in litt. 1817. — Peltidium Zollik. nat. am. 1820. aug. — Zollikoferia Nees in Bluff et Finger, comp. a. p. 305. non DC.*

Gnptulum Inultiflorum. Invol. squamis 10-12 uniserialibus et squamellis iiccessoriis paucis conslatis. liecpt. plauum nuduni. Achaenium subpentagonum exalatum costis apice in tubercula dentiformia productis; rostrum inter tubercula ex apice achænii ortum gracile achænio longius. Pappus 1-serialis pilosus. — Herbae perennes, rhizomate crassiusculo, Leontodontis facie, erectæ, simplices aut parcè ramosæ aphyllae. Folia radicalia oblongo-obovata dentata membranaceaf Capitula lutea ad caulis aut ramorum apices solilaria. —Genus ex caract. fructAs Taruxaco, ex habitu Barkhausiae seu Leontodonti affine.

1. W. APAKGIOIDES (Less. syn. i36)', foliis radicalibns dentatis, scapo polycephalo apic præsertim involucrisque nigro-pilobis. % iu sylvis alpinis et sub-* alpinis Austria3 (Jacq.), Calinlbie (Hopp!), S.ilisburgi, Bavaria? (Pers.), HelvcliaJ orientalls JZolJ.! Moritz!) et in Pyrenaeis ad montera Llaurenti .(Tbom!). Hieracium stipitatum Jacq. fl. austr. t. 293. Crepis »pargioidei» Willd. 1. p. 3. p. 1594. Crepis Apargia Pers. euch. 2. p. 3;5. Wibelia apargioides Roebl. deutscbl.fl. 2. p. 426. Peltidium apargioides Zoll.il. c. Zollikoferia hieracioides Nees 1. c. Chondrilla Peltidium Moritz fl. sebv. p. 36i. Baikbausia apargioides Duby! enh. 1. p. 298. Spreng. syst. 3. p. 65a. Hieracium intermedium lloppe! oliui in pi. ess. Zollikoferia Peltidium Guild, fl. helv. 5. p. 143. (v.s.)
2. W. WIBEROZA (Fjsch.! etMey. in litt. i836), foliis radicalibns lyratis, scapo 1-cephalo glabro. ^ in Vplvaticis prope Lenkovan ad mare Caspiiim legit rev. Hohenacker. Herba glaberrima excepto iri^>l. basi villosa. Scapus omnino apyllus fuliis multo/ lungior. Folia sublùs glauca, lobo terminal! maximo ovato subcordato donata. Fruct. non vidi. (v. s. comm. à cl. anct.)

*

(1) Willeueta Moerckl, (1800) seu Villemetia Moq. «st Echinopsilon. — Willemetia Hrongn. (1827) est CcanoHii scctio nostra Sarcomplialoides, forte nomine geuerico salutauda. Couf. Soyer-Will. in auu. sc. nat. i83/|. v. 2. p. i35.

DCCCXXIII IXERIS Cass bull philom 1821 p. i73; diet i\$.p So — Chon-
dnllae sp. Wall

Gapitium rnuUiflorum. Invol ovatum, conslans squalmis 6-8 uniserialibus et squamelhs 5-5 liunimis ad basin calyculin constituenlibus. Recept nudum Acbaenia oblong| acute 10-coslata lostrata, costis laevibus. Pappus pilots l-senahs albissimus. — Hcrbae anuu% Asiatics glabiJ3 lamosae, habitu I actuae seu bone In Folia elongata, mtegen ima seu pinnatihda Caules apice nudi coiymboso-polycephali. Flores flavi aut vanantes puipuiei seu tibi

1. I POLYCEHAIA (Ca&s. djcl a4 p 50), caule siniphci seu apice ramoso, foliis lineari-subulatis, lufeonbus confertis semidmplexicanhbus stgittatis acute et bubictrorum dentatis subtus pilosulis, supenoribus basi acntissuue sigiltatis remote / in]epafia 'legit cl Wa^lirh' et in mont.anis Jndiai or ad Sobed-'gunj, Goinkporeet Bdgduai cl Hamilton' C hondulla tenuis H^{un}. in Wall cit n 3274. coiup n i84 et Chondhlii lougifoba Ham' ibid 1 olia 4-6 poil longa,3-4bd lata (v. s comui ab bou cur meit angl Ind 01)
- 2 I i-owTiNAiis, taule a basi multjcipi, folns glabei nun's, infimis obtuse senn aicplexjuilibus, extent* acunnuato sagittatis pinnatiulis, lobis acuminate distantibub, foliis siiuimit, latioubus bubueutatis (1, in INepalia, veiibiiniliter ex nomine ad fontes, legit cl Walbcb. Cbondtilia fontmabi Wall ' cat 11 3264, coinp*378 ^v s to mm ab bon cm meic angl Ind or.)
3. I VERsicoLOR, caule paite ramosa, folns lmeau sublanceolalis ~~integerrimis~~ dentatis ant pinnalilobalib, ciubnibseniiamplexicaubbaii obtusis aut bievissilnf sagitlatis, p micula subcorymbosa laxa Q^? in montobis I ipidosis CbiitL bo lealis et Dahunx legei il. Patnu, luiczaninow etc Crepis vcsicoloi I isch ' lnhter 1822 Lagosens vei&coloi I iscb in Link enum 2 p 289 Pienanthes veisicoloi Iuic7 * in litt 1829 Daikb msn veimcoloi bpienj sy&t 3 p 05i Heiba clc^ana valdc vanabilis 1 quoad loll 1 lutegeinina, denlata, piiin <i lida aiU >innatipait4, ad b ism bievitci bagiltata aut obtas<, 2° quoad floien rlavos, auiantiacos, lil icmo-pnitureos et alhos Ad Ixeridein ldata ob acka>nia longitudinaliter et acute io-cobt<ta nee tiau&veise mgulo&a Kostium a**<bai**

'J Species extlusa.

I. MONOCEHAIA Caas. = Macroihynchus pumilus

DCCCXXIV MAGRORHYNCHUS Less sjn H9

Capit multifloium Fnvol campanulatuin lmbncaluni p.tuctben.ile squamis hncan-sublanceolatis dcunnalib, extenoubus loliaceis, intci' glabns corollas aequantibus. Recept. nudum Achamia glabra, teretiuscula, costis nunieiosisnunc alaef01 mibus (ut 111 Ixeji^c) mine callososuberosis exarata, apice in lostrum longum gi acillirnuni attenuata, basi aieolacallosamsti ucta. Pappus pilosusalbissimus pluileilalis Hei ba2 Chilenses annuae viloso-canescenlc 3-i-i-pollic. Radix exihs Gauis basi simplex aut multiple, imâ basi foliatus, apice longe aphyllus i-cephalus apice villosus Folia subiadicaha hneaii-sublancollata, mtegen ima aut dentata aut fere pinnatifida, caule duplo tnplove bieviora. Cor. Iutea3 pei antbesm invol. vixaequales. Achoenia pallida, costis ob tuis 1a3vibus

1. M rTEROCARpus (Fi*ch et Mey ind sem h. petr i835 p. 41 i837 p 4oi)^ invol squaiuis cxtieuoubns >ubbquai 1 OMb vilbb albis biisuh,, acbanus alato-

costatis iottro subbrevionbus (J in Chili ad Quillota in pascuis saxosis legit cl, Berteio¹ laraxacura caulescens MOMS^T inew <cad tor 37 p 108 t 34 'Vanat fulns mtegei nmis dentatis ant feie pinnndlifidis sempei plus minus villosis Scapus folusduplo tnplovelongior, lanus maequalib (v s corom a cl Berteio et Moiii)

- a. M TJEVIC vius (Fisch et Mey md sem h petr i835 p 41 i83^A p 40), mvol squamis exteuonbus subsqaarro&is villis alb is hirsutis, achaen* costu* obtusisbiuiis suberosis instiuctu> (7, in pascuis aieno&is collium et plauiliei ad Rancagn t Chilensim legit cl Beitero' M Chilensis Less syn i^g? Anhnc leferendus M (hilenws Hook et Ain corap a p 4a in insul lalklandlectus? I oha et caulis pnons, sed glabnuscula (v s comm a cl Bertero)
- 3. M ? PorppiGii, mvol glabnuscuuh squamis adpre'sij. (l) in Chili au&tali |A Antnco legit cl Pceppig Baikausia? scapigeia Kunze¹ in Poepp pi es> 3 n. 182 (00) 'Valde accedit ad pnores, &ad folia angustioia Sea pus folns doplu tuplove longiur Jnvol squamae mtei se subaequales glabuu&culae Achaema specini. mei immatuia breviss>iroe lObtiata (v s)
- 4 M AURANTIACUS (I isch etMey md sem h petr i83" p 40), sea pi gems, mVol sqnamib ddpinessi uch-enns obtuse costatis longitudine lostn If, pan ign rloie_d aurantiaci subcupiei
- 5 M ? PUMILUS, mvol villis mfe¢ibus fotte glanduloso hispidis — in insults Macloviam *eu I alklandiams laraxacuui pumilmn Gandich ann sc nat 5 p. TO3 Ixeus moDQcephala Cass diet ig p 5Hq Folia Imei 1a integeirinia Mipra gl ibra subtus villosa , sea pi pluruni giaciles per inthesin polli(5ares dt* mum bipolliaies Capit ia floia Ex in\olacn squdmis extenobus foliacei> Intel lores fere sequantibus et ex patria ad Macroihyuchum pertinere videtni, sed Cassini qui fiactuui jumoiem vidiit achaeni 1 brevi& rostrata et costas suL-alata» dixit

DCCCXXV BARKHAUSIA *Manch meth 53>j DC fl fr ed | <v 4 p 41 Reich Jl* ere 1 p 255 exel sect i^a Less s) n 136 Griess inhnnccd 18Jo p nji —Bdikbusenia tioppc in flora 1829 p 510 —Bo.ikh <usia Bochm Spreng syst 3 p 651 — Boikhiusia et La,oseiis Link en urn 2 p 289 — Bhikhuisii, Paleya et Anisodens Cass —depis Linn sjrst nat —Crepulis Linn etauct —Crenarai jp A dans — ClloiiiospermumiVccA elem 1 p. 54?*

Capit multifloioni Invol calycuiatium nut 1 mus subimbndtum. Reccpt nudiusculum seu piloso-hmbnlliferum AcJisenia ex<ilata tertia, nunc omnu, mine tan turn centi alia in rostrum I on gum sen sun attenuate, mai^malia nunc erostria mine brcviter rostiata Pappus multiscnalis pJosus albus — Herbae pleixquc Europaeae, annuae aut perennes, hubitu Grepides ipfeicntes Folia dentata aut pinnatilobata. Coiollae flavda aut rdiis purpuiascenles

Sect. 1 PALE^A — Paleya Cass diet 3g p Zcfi.

Aihaenia disci et ittdy aeqlaliter et longe rosiiata Invol imbricatum, squama? nempe extenores sensim nee ibrupte in inttnores abeentes

1. B. ALBIDA Cass diet 26 p 62), caule Mibndo siniplu.i autbifido, folnssubcanes<enti-scabndis plensque radicalibus innunato-dent tis, canlinis subainplexicau'hub laueolatn-oblongis % in pratib lapidosis Pyienaeoiam ouent et ceorahum_f Alpium Delphinensiura et Pedemontanarum, ad rupium fissuras in monte Pico de Arvis Astuncensi (Duneu ') et in montib caloareis Hisp Granatensis (BOISJ>) Ciepis albida ill dauph 3 p 139 t 33 All ptd t 3a. f 3 Piondium albidum DC fl fr 4 p 16 Paleya rtdbida Cass diet JQ p 3n3 Lepicaunealbida Lapeyr Invol imbiycatuni squamis iuargme albidis Capit ainplnm palhde flavam feieUiospermi Dalechjinpn Radix cussaposta~ ūea subacduli», cultd Ja?e caulebcens folios 'v v e ts)

Sect. 11. LEPIDOSERIS *Reichenb. fl. exc. i.p. 256.*

\fhjenid omui.i «T(juhter et longè rostiata IQVOI. calyculatuin, squamis calyculi amplis ovatis l.mceolati&ve in a 1 gin e scauMs.

- a. 15. AIPINA (DC. fl. fr ed. 3 v. 4. n. 2946), parce pirberula, canle erecto sttialo apice bifidu aut subcoiybos, foliis dentatis, iufeiioubus obovato-oblongib basi attennatis, snpei. auncuIato-senii<rapIexK.tulibus, (apiluli* longe pedicellatis, invol extenois squamis o\atis sranosii .miplis glabm, intt squamis toiuolosis scabiis> (^ m montibus Gallopiounu*? (Gei.), Pedemontii? (All), Tauna> (Bieb. Stev.!), ad Karabagb (S/ow.), Sibniae (^ Gin el.) ? Asiae minons (Aueb.'). Crcpis Alpina Linn. sp. n34. Gaeitn.fi. 2 p. 354. f. 158. f. 8. Ba\k. scanosa Moench nieib. 537- Crcpis Alpina et C. vesiLaiia Lam. diet. a. p. 178. 179. Acbsema lopgc rohtiata. (v. v. c et s. *p.)
- 3 B. SCARIOSA (Renhenb fl. exc. 1. p. a5ti), piloso-hiitella, caule erecto parcè fohosso apice laxo coryinbos, foliis iddicabbu* peiiolatis lancinato-lyrufis, lobis angulato-dentatis , lerninali majoe], caulmis amplexicaulibus oblongo-lanceolatib basi inciso-dentatis, iuvol. ertei. squamis amplis ovatis nmcionatis bractehque scauosis, inlet canescnlJ-\illosi* eiectis angas#. (l)in Sicilià (Guss!), Apulia (Col.^ralabiià (Ihom '), Liguià (Beltol.) Ciepis scanosa Willd. «p. 3 i^9J. Spreng sy;>t. 3. p. 6^7 Ciepis vesicana £ Linn. sp. n^a. — Cup. punph ed. Bou. t 106. Col eepbr. t. 237. Acbaeuia uiaigm.ilia bië\iter iosiliata,ceutrbba paulo'longius. (v. J>)
4. B. vEsirtKiA. (Spicug. ^yst. 3 p 65?), canle erecto paucifolio scabudo, foliis iadicalib& obovato-oblongis deorsum dentatis aiibsinuatis hii^utiubculis , siuromis lauceolatis subdent.itib, capituh coiybosis, biacleis et invol sqnft-rais> extei coneavis nillfrgine scMnobis (I) in Cieta (Linn.), in ins. Majorcà (Camb. Delaiocb '), m agro Buantino¹ (dT u. ex Camb.) Cnpis ves>itaria Linn. sp. u3a. Camb fl. bal 92. HiiraúumCieticum hiKhviae folns Toum. cor '35. Achsenia bieviler ro&tiata. Invol. squamae intei. uigiicautes at>ruljc. (v. s)
5. B. HANSELERI (Boiss ' ined.), caule erecto bimpiici parcè foli<jso setis spasis hispidulo, foliis acute rnncinatib hispidulis, tadic petiolahs , oaulims st*mi-ainplexicaubbs, lobis mati> acuminatis, corymbo 8-10-cepbalo subcomposito, biacleis lineaibus acumiaatis, mvol. &quauj& subbispidulis maigine scarriosis. (ij in rupibub unibiosis Hispaniae GranatensU ad Alb.msiu legit cl. h Boissier' Capitula diruidio fere raiuoia quara B. vesicariae. Robtium acbaeu ut in ea abbiewatnm (v. 4 comra. à cl mv)
6. B. SPATHUIATI. (Spreng. syst. 3. p 65c. Presl fl. sic. p. xxxi), glabra, raule erecto subnudo bifulo , folus iddit.ilibusobo\ato-oblongis. in petiolum atlfnuatis deoisum dentatis, caulinis]>aacis paivis lmearl-l.mceolatis acutib, raiuis 1-cephdis elongatis paicis&ime bia< teoljitis, invol. squ.iiDis exlei. panel's erectly juier. doiso subhiibUtilis. % in arvis argillosis et piatis> Siciliae detexit cl. Gubboue et \eiisim. in Mauitanu lingitanà , uam ab hac non difieie videtur Uieiacium Tingitanum Salzin.' pi. exs. Ciepis spathulata Guss ! pi. cai. i8ai. p. 73 Herba f-io-pollic. Arhacua apice bieviter io<>tiata. (v. s.)
7. B. MARSCHAILU (C. A. Mey.! enuui. cauc n 456), setulis scabiida, caule erecto foliato timplici, folusoblongih giost>e < t acute dentatis snbinnncinatis, infei.basi atlennatis, snpei. subsagittatis, capitulis in lacmum brevem confertU, pdicellis in\oluclibque piloso-glanntulosis, squami* in\ ext lanceolato-lineaubus iubp.ilnls. (1^ IU launae campis heibidis* ad flu\ium Teiek ct in Ibeua\ UJedià (Bieb.), in pratib \PIMISI u\Aie Caspiunu /Mey.!). Ciepis biennis Bieb. fl tatir.? 1621. excl. syn. Ciepis Tjiuinensis Bieb suppl. p. 537- excl. syn. Folia 7-8-poll. longa. Aclisema longe iostratd.(v. s)
8. B. PURPUREA. (Biv. Mirp. lar. man. 4. p 2 a \ vix pilosinscula, raule credo pdrc (olioho subpaniculato , foliis ladicibus petiolatis 1\ 1 at0-1 muinatis,CMU-linis scuui.iiiplcxicaulib& cqidato-lonceolatib,invol iqu<injj> exter. ovatiit MA-

- riosia aiuplis submucronalis. % in pasciis mbntosis Sicilian circa Panormum (Schonw.! Gnss.! Biv.), Apulia (Col.) et_a Aprotii (Ten.). Grepis purpurea Steud. noni. pbaa. (J3> non Bieb. — Cup. panph. ed. Bon. t. 104 et 107. Col. ecplir. t. 1st. Aceedit ad B. scariosani sed flores non lutei sed dilute aut intense purpurei et achcenia longius rostrata. (v. s.)

2. B. LACINIATA (Lowe! prim. fl. mad. p. iS. n. 42)» caule ramoso paniculato iiiuutissiine puberulo, foliis glabris laciniato- vel runcinuto-pinnatifidis lobis acurainatis, radicalibus peliolatis, caulinis semiamplexicaulibus basi auriculatis, capitulis corymboso-panicnlalis, invol. squamis subnigricantibus farinogopuberulis, exter. laxiusculis lincari-lanceolatis margine subscariosis. (f) in Madera. Capitula inagn. Crepidis biennis. Achaenia longiuscule rostrata.

a. *pinnatifida* (Lowe! 1. c.) foliis profundius divisis. — in yinetis et cultis frequens. (v. s.)

/2. *integrifolia* (Lowe ! 1. c.), foliis integriasculis grosse deutatis — in ruderatis. (v. s.)

10.B. RAPHANIFOMA (Spreng. syst.*3 p. 653), caule erecto superne asperoet corymboso, foliis radicalibus caulinisque inferiorib*ii*) glabris peliolatis pinnatolyratis, lobis s^huatis aut*inferioribus pinnati/idis, caulinis super, amplexicaulibus lanceolatis, inferne iucisis, invol. scabrido-pubejttibus, squamis exter. laxis ovalibus inargine scariosis. If. Willd. (2) Horn.^hatr. ign. Crepis raphanifolia Horn. li. bafn. add. p. 970. Willd. enui. siippl. p. 55. Achaenia in rostrum lougiusculum attenuata. (v. s.)

11. B. TARAXACIFOLIA (DC. fl. fr. ed. 3. n. 2949 non Spreng.), scabrida, caule erecto ad basin purpurascente, foliis radicalibus petiolatis lyrato-ruhcinatis obtusis, caulinis a in plexicaulibus lanccolalis basi deutatis, invol. subtomeutoso-scabiis, squamis exter. maigirie snbmeinbrauaffl^h. (2) in ruderatis, marginibus viarum, pratis lapidosis GalliiB, Italia?, Helvetia;. Crepis taraxacifolia Thuil.! fl. par. ed. i" v. i. p. 409 non Willd. Crepis tectorum Vill. dauph. 3. p. x44 non Linn. Crepis Taurinensis Willd. sp. 3. p. i595. Crepis rubricaulis Pei⁹. enh. 2. p. Crepis ruderalis Bouch.! fl. abbev. 59. Crepis cinerea Oesf. cat. b. par. ed. 1. p. 89. Crepis vesicaria Balb. fl. taur. 93. Crepis biennis Lapcyr. abr. 84*x Arn. Bark, raphanifolia Qiev. fl. par. Crepis rnbealis Juss. et C. polymorpha Pourr. ex Steud. —Lob. ic. t. '239. f. *- Achaenia attenuata in • rostrum, seminis longit. subaequans. (v. v.)

fl.prcecox (Dtiby! bot. gall. x. p. 299), foliis superioribus dilatato-auriculatis. — Crepi*i* priecox Balb.! misc. t. 9. (v. s.)

y. *intybacea* (Duby ! bot. gall. 1: p. 299), foliis superioribus basi auriculatis , involucro glabriuscule. — in Lusitanid , Occitaniā. Crepis intybacea Brot. fl. lus. 1. p. 32i. pbyt. p. 67. t. 26. Bark, intybacea DC fl. fr. 5. p. 449. (y. v. ets.)

¶ *ramosissima*, caule ramosissimo subdiffuso.—in Helvetiā Neocoraensj. Crepis Dioscoridis Gochn. non alior. (v. s.)

• . *hiemalis*, glabrinscula, caulibus subaphyllis. — in Siciliā circā Panormum (liiv. Guss.), in Sardinīā (Tbom!). Tlor. hieme et vere. Crepis hie-ralis(Biv. man. 1. n. 6. t. 2.). Barkh. reilexa Presl del prag. p. 111. Barkb. hiemalis Spreng. syst. 3. p. 652. (v. s.)

J?. B. RECOGNITA , pilosinscula, foliis radic. repando-dentatis caulinis basi parcē lacinulatis, invol. cylindrīci squamis exterioribus ovatis, internis quadruplō longioribus subfarinosis carinat nigro-setosis. (f) (2) ad vias Helvetiae calidioris (Hall, lili.) et in valle Lemauā (Gaud.). Crepis recognita Gaud. fl. helv. 5. p. 134- Desideratur in herb. Hallciano in hort. genev. servato. Affinis dicitur B. teraxacifolia. An eiua var.p i-

Scct. HI. >EGOSERIS.— *iEgoseris et Lagoserides pleraequ Reichenb.*
fl. exc. 1, p. 56.

Achxnia omnia requalilcer voslrata. Invol. calyculalmn, squamis exterioribus
lirica-ri-lauccolatiS parvis non sensib; marginc scaripsis.

Perennes.

3. B. TENUIFOLIA, glabra, collo demium stnpresso, caule erecto supernè ramoso, foliis piunatipartitis, lobis linearibus obtusiusculis subintegeriinis, raiiulis i-cepbalis subcorymbosis, in vol. cylindrico scabrido squamis exterioribus brevibus linearibusubreilexis. *If.* in rupestribus et glarcosis Mongolia; Cbinensis (Turcz.!), Dahuriaj (Finch.! Turcz.!), nec Tauriae ut falsò dix. cl. Willd. Crepis tenuifolia Willd. sp. 3. p. 3i. Lagoseris tenuifolia Keicbb. but. icon. i. p. xi. f. 19 et 20. Ci' epis pulcheirinia Fisch. in lilt. Crepis graiuinifolia Le-deh. ex Reichb. et Spr. Crepis coronopifolia Desf. hue à Steud. annexa est diversissiraa. Achaenii breviter rostiata. (v. s.)
14. B. BURSIFOLIA (Spreng. sysr. 3. p. 653. excl. syn. poster.), glabra, caulinibus cunctis subdiffusis vix foliosis apice subcoryiubosis, foliis radicalibus petiolatis ly-ratu-piunatipartitis, lobis oblongis dentatis teriinali uiajore, caulinis puueis-simis sessilibus nunc piunatidis nunc linearibus integris, invol. bisjido cylindrico squamis linearis-subulatis basi ciusto. *If.* in Siciliae aridis prope Panor-niuin (Guss. IJ, in collibus Cajcta-agii Neap. (Ten.!). Crepis buisifolia Linn, sp. n 3i. Leontodon Gussoui Spreng. syst. §. p. 658 ex speciui. Gussoueano. — Uocc. uius. 147. t. 106 el 112. Cup. ed. 13ou. t. 106 et forte na? Variat foliorum racbi inter lob<MDuila aut irregulariter dentibus lobuliscvc ancta, lobo terminali caeteros icqu'a^e aut duplo majore. Achaenii rostrum triplo achaenio ipso longius, quā notū à B. leontodontoide facile differl. (v. s.)
15. B. BALBIANA, radice tereti subsimplici, caulinibus 1-2 erectis subnudis apice co-rymbosis glabris basi hirtellis, foliis radicalibus petiolatis piunatipartitis, lobis dentatis glabris ad basin petioli hirtellis, caulinis paucissimis linearibus integerrimis, invol. glabro basi subfarinoso cylindrico squamis adpressis linearis-subulatis basi cincto. 24 VI<s in Sicilia (Guss. I). Uyoseris birla Balb! in Willd. sp. 3. p. ^-14. (*Mfrh* hirta Pers. enh. a. p. 377. u. 29. l'edicelli elongati crecu a-J-moift>cephali, 1 saepè bilido. Achrenia lon^e rostrata ut in B. seccioide, sed ab bacerte distincta. A vera B. bursifolia tanitani caulinibus foliis que ad basin et invol. toto glabris nee setosis differt. An satis? (v. s. comm. a cl. Balbis.)
16. B. TARAXACOIDES, hispida, caule adscendente, foliis profundè runcinatis, lobia dentatis a basi ad apiceru petioli crescentibus, pedicellis elongatis squamellosis, invol. squamis ext. ovatis margine scaribsis, inter, lineaikus villosotomeutosis. *If* Desf. @ Willd. in arvis Barbarian. Crepis taraxacoides Desf. fl. atl. 2. p. a3i. Barkhansia taraxacifolia Willd. sp. 3. p. 1503. non Thuill. Desci. ex Desf. sed stirps Willd. forte diversa?
17. B. MACROPHYLIA (Spreng. syst. 3. p. a3i), piloso-hirsuta, caule erecto ramoso, foliis infer, ovato-oblongis inaequaliter de*nlatis super, aiuplexicaulibus lanceolatis, capitulis coryiubosis, invol. exter. squamis laxis ovatis margino scariosis* inter, cylindrici squamis linearibus. — Algeria ad agrorum cultorum limites. Crepis raacophylla Desf. fl. atl. 2. p. a3i. Affinis elicetur Crepidi bienni sed acbienium rostratum.

* * Annuc aut biennes.

18. B. STOSA (DC. fl. fr. ed. 3. v. 4. et suppl. n. 2g5i. ic. gall. r. ar. t. 1g) caule erecto ramoso sparse hispido, foliis grossè dentatis runrinatis, setosis, infer. petiolatis, super. amplexicaulibus sagittatis, capitulis laxè co-rymbosis, involucris hirtis, squamis ext. linearibus patulis. (I in asperis ruderalisne à Galloprovinciâ ad Tauriam, in Corsicâ, Italâ, Hungariâ, Helvetiâ Ticinensi et rarius Valesiacâ, Germaniâ australiori, Tauriâ, etc. Crepis setosa Hall. f. in Roem. arch. (1796) 1. p. 2. p. 1. Schleich. exs. Gaud. fl. helv. 5. p. 135. Crepis hispida Waldst. et Kit. pl. hung. (1802) 1. t. 43. Willd. sp. 3. p. 160, Wilhelma setosa Roebl. deutschl. fl. 2. p. 582. Crepis hispida et setosa Pers. Barkh. hispida et setosa Reich. fl. exc. 1. p. 135. excl. syp. Snt et Bieb. Crepis Bannadca Willd. enum. suppl. p. 55. Achaenii breviter rosirata. ('v. v. tt s.) e. subintegifolia, foliis vix dentatis *basi lobulis 1-2 aneustis el'acutis sagittatis, caule sin. pl. apice oligocephalo. — in rupibus cakaicis Cainolia; Ipgitrl. Moricaud; (v. s.)

19. B. LEONTODONTOIBES (Reichb. fl. exc. I. p. a55"), glabra, caulinis suberectis stibaphyllis ramosis, foliis radicalibus runcinatis dentatis, caulinis paucissimis linearibus integris, pedicellis eiongatis, invol. glabro, squamis exter. liueari-suhulatis, achaeniis bruxiter stipitatis. (T) in sylvise* dumetis Pedemnulii (AIL), Ligurix Genupnsis (DC.) et Sarzanensis (Rertol!), Siciliae (Guss.) Corrasicas (Thorn.). Crepis leontodontoides All. ped. auct. p. i3. Rarkh. Leontodon DC. fl. fr. ed. 3. n. 2Q50. Lagoseris leontodontoides Linkeuura. h. ber. 2. p. 289. Reichfiib. ic. bot. r. t. 18. f. 35. Prenantbes Negrelia Req.! in litt. i83i. B. ten e iri in a Ten. cat. i83o. p. 14. (v. v. c. et s. sp.)
 /&. involucro hispid ulo. — in Siciliae pascuis montosis. Rarkhausia nuda Presl del. prag. p. 112. — Cup. panph. ed. Bon. t. 13». (v. s. comm. à cl. Gussone.)
20. B. FTEXUOSA, glauca glabra, caule ramosissimo, foliis radicalibus petiolatis ohlongis dentatis lyrato-pinnatifidisve, summis sessilibus paucis linearibus integrerimis capitulis terminalibus solitariis, invol. 8-10-phyllo glabro basi breviter calyculafo. 11 in rnestribus montium Arkani et Tschiugistan deserti Songoro-Kirghisici. Prenanthes polymorpha y flexuosa Ledeb. fl. alt. 4. p. 145. illustr. t. 498. Nuuierusfloruin incertus. An forte Phaenopis spec?
21. R. NAITA, glaherrima suhacanlis, scapis pluriufs cōmboso-racemosis polyccephalis vix folia superanlibus bracteolatis, foliis subiadicalibus petiolatis ellipticis iutegeeriis, invol. cylindraccis brevissimè calculatis, achueniis breviter rostratis. (J? in glareosis Sibiriae Ochoiensis inter Aldan et Ochntsk (Tnrcz.) et in petrosis schislosi.sqne America: A ret ice (Hook.). Crepis nana Richards, in Frank 1. journ. 1. cd. 2. app. p. iy. Hook, in Parry voy. a. app. p. 397. t. 1. fl. bor. am. 1 p. 297. Hieracium, etc., Guiel. sib. a. p. 20. n. 18. t. 7. f. 2 et 3. et ideo Prenanthes poiyitiorpha li^K. fl. alt. 4. p. 144-var. integrifoh'a et flaccid^ Pren. pygmwa Ledeb. uiem. ac. pgtersb. 5. p. 553. Invol. squainx margine scariosae. Cor. flavaa. Pappus involucro lougior. (v. s.)
 A?, lyratifolia (Turc/..! in litt. 1837), ^»is »liis inflgris, aliis sinuato-dentatis, aliis s*nbllyrato-pinnatifidis. — in Sibiria Ochotensi. (v. s. comm. à cl. Turcz.)
22. R. SKNEDOMIIS (Spreng. syst. 3. p. 65.. excl. Ralb. syn.), glabriuscna, caulinis plnrimis adscendentibus apice paniculato-ramosis subaphyllis, foliis radicalibus obovato-oblongis acutis dentalis ciliolatis, caulinis paucis sagittato-amplexicaulibus linearibus, iuvol. cylindrico subscabro squamis liueari-subulatis has! aucto. (f) in yEgypto propè Kahirum in agris (Delil. Raddi! Rové!). Crepis senccioides Delil. fl. eg. 118. t. 42. f. 2. Achienia ovoidea longitudinaliter striata, rostro tenui achxnio ipso triplò longiori superata. Radix exilis subsinplex. (v. s.)
 fi. minima (Schimp.! pi. exs. n. 9), caulinis i-cephalis foliorum longiludino non excedentibus.— in arenis JUgypti inferioris ad Abu-Zabel.(v. s.)
23. B. SIFFRENIANA (DC. cat. h. monsp. 83. fl. fr. 5. p. 45° excl. Ten. syn.), onule erectojsimpli basi hispidissimo apice glabro, foliis radicalibus oblongis basi attenuates sinnalis pinnatifidisve, caulinis paucis linearibus integerrinji's, pedicellis i-cephalis paucis subracemosis antè anhesin cernno-reflexis, invol. hispiduli sqnamis exter. brevibus linearibus acutis. QQ in aridis lapidosis Gallo-provindae inter Salonem et Arclatem detexil cl. de Saffren et in Occitania Neinnusensi cl. Requien. Crepis bellidifolia var. Lois. not. 122. Heiba 3-4-pollic. Achienia brevissiine rostrata. A Crepide strictâ quâcuin roiscuit cl. Reicheubach eriè diversa videtur. (v. s.)
24. B. BEILTDFOLIA (DC. fl. fr. 5. p. 449), glabra subcarnosa multicanlis aub-diffusa, foliis subintegerimis, radicalibus obovato-oblongis obtusis basi angustatis, caulinis paucis linearibus basi subanriculatis, invol. squamis exter. parvis linearisubnlati, interioribus pedicellisque snbfarinosis. (Tj in Corsicae locis incolitis (Rob.!) et in insulis SaBguinariis (Salzm.), in maritimis SardinieB (Had.!). Crepis bellidifolia Lois. fl. gall. 527. t. c#. nou Bess. Arliamia gracilia apice in rostrum breve attenuata. \ariat foliis acutioribus uiagls incisis, invol^ hispid ulo. (v. s.)

- 75 B PIRRIFOIA, jlabia glaucescens, caule erecto subnndo apict laxepamru lato, folns radicalibus in petiolum attenuate acuminatis lanceolate integer* umis aut interdum subbastatis, cauhms panus hneaiibua lnle/eiumis, invol sqnamisi acuuinaUs, exter paticis s^>biacteifoinibus. (jj in Nepalia legifcl Wallichet mecum anno 1821 continued in ejus calal>non tuto icpeure quivi. Crepis poiniolia Don piod it nep p 164 \cba.ma apice bievitec sed distincte fostiata Folia interdum ciliato-dent/culata. Habitus Ciepidis pnclira? aut Prenanthis (v s ;
- 26 B ROYLEI, caule aph-ylo erecto apice laxe subcoryinboso hispidulo, sells baseos longioibus, foliis radicalibns obovato oblongis sessilibus basi attenuate crossed iiiegilaritti mciso-dentatis maigiue et secus neivum subtus >ca-buji, mvoF cylindrico scabiustrulo squamis bievibus dcutis calyculato (jj ill Indise orient pi*|inuis boieali occid legit cl Royle Caulis ped ills nudus Bra* teoLe minima. tub lainulia I loies ilavi Acba.rna bievitei lostrata. (v s. com 111. a cl Royle)
- a?. B 11 IKRAC joints (Lowe piim fl mad p 27 n 44)? caule erecto lamoso panicul ito , folioium cosla centiali peduuculis inxolucusque scloso bispidis vel ijubmuicato-spinellosis, folns giabus indivisis denticulis rans spasis minutib subulatis deuticul ilis, radicalibns lane olate oblongs acutis basi attenuatib, c lulinis) o|ato-^uminaii!> b isi dilatato auiitiilalii straiauplexicauhbus, capitulis coiyaiboj.is, *Tulis» clougalis patenlissinns Qj ? 11 MadciT 01a septenti *Vauat fblns Inttguusculis aut pinuatiidis
- 28 B. DUBIA. (Lowe pnm fl mad p. 27 n 1/2), caule erecto stneto e basi ramoso lannsuae foliatis co*>taque fohorum subtus bispidis , folns giabus lut idis indivibis maigine undulatis sinu ito-iuucinatis el deuliculatis, radicalibns elongdtis oblongo-lanceolaiis basi attenuate, canlims basi coidato amplexicauhbus oblongis acum^totis, sum III is hucaiibus Integerumis seiaceo ciliaiis , capitulissubcoimbosis^amubs supeine pedunculis in\olucnsque dense glanduloso pubescentibus fanuaceo-pubeiulis, acbaeuo subrostrato ^ in convallibus Maderae Pioxima B bieracioidi
- ag B DITARICATA (Lowe! prim fl. road p. a6. n. 43), canibus e collq pin rim is ramosis ubapbylhs spaise muucato-bispuids, folns glabns, iddicalibus si-nuato-iunciiiaiis in petiolmn alteuatis , cauhms lanc<olatis acumiatis semi-amplexicauhbus subdentaiis, capitulis sparsis pamculatis, until squamis basi bispidulis supeine giabus exter acuminatis MX patulis ^ ? (Z;* B>dix fusifoimis Acbaeuia breviter rosiata
- A. robusta (Lowe ' 1 c), caulibus polyceplialis eiectis, invol glabuusculis. — in JVladeia ad prom Saucti-Laurenru (v s)
 jg. pumila ^Lowel c ;, ciulibus oligocepahs saepe diffusis, invol hispicioibus — in portus Saucii Spintusauidis.
- 30 B. COMATA (Lowe prim fl mad p 37 n 4b)» caule erecto c basi foliato hirt'o seloso, folns indivisis tienticulaiis, radicalibns glabns, ciulinis summis cihato-cnnitis, ca| Hulis coijmbosis, mvoluciis liik*i*.it*i* imih co.uatis , squamis cunitis — m Madefaisylvis Ciepis comala beib Banks Radix fusifoimis cat nos Achanuiiii evidenlissime robtialura

Sect, iv ANISODERIS Cass. diet. 4^- P- 4^9. — HosLw Mcench suppL p. 221. non Jacq. Pe?s. JVilhL — Barkhausia Link enum. 2 p. S>go non Cass.

Achacnia ladii erostna aut bre\iter rostrata, disci longe tostiata Involucu squanue extei. linean-subulatae [rva? — Herbae annni saepe foetidae
 3i. B BUBKA (Mcench metb 53;), caulibus ima basi follows et i imosis apice nudis, folns plensqe radicalibns runcinato-liyatis peliolalis, caubnis sessilibns lineaiibuh basi incisis, invol squaruis extei lanceolatis ucnminat> glabns, inter scabndis , achaeinis radii bitiwnbus (jj in piscais el set us. vias Dalm i-tia ("Vis' Bias '), Giaeiae (Aucb^r), 7acinibi (Maig '), Apulia; (Linn ;, Apiutii (Ten), Niceae' (All ;, JVlonspelu-* (Sauv), Agimm."f (Saint-Am) Ciepis luhraLinn *p ii3a Heib ainat t 14 Piens rabra lam fl fr r>

- p. 109. (Ire pi? incarnala "Vis! claim, sp. p. 17. t. 6. f. a. Moresincarnati. 'Vat'ial caulinii rrectis aolitnriis ant pluimis adscendehtibus, foliis plus minus pinnalipaititis, (nnnquam tamen adeòindivisis ac in icona Bauh. prod. (>8. f. !. exhibentur), syperficie glabrA aut m%uiè puhei'ilù. Conf. Ten. syll. p. 404. (v. v. c. et » sp.)
32. B. GRAVBOLFH (Link enum. 2. p. 290), sparsè pilosu, cunne erecto ramoso, foliis caulinis amplexicaulibus acntè pinnatifiu's, ped'ceMis elongatis, invol. hreviter villosa-subcanescenlis squamis exter. adpressis linearis-lanceolatis., achaeuis radii breviis rostra) is. (j)patr. ign. Cor. flavae, exteriores subtus rubenes. (v. s.)
33. B. CANDOLLI (Spreng. sysl. 3. p. 6:17. et 4< P> 304. excl. syn.) , caule diffusè ramoso erecto basi pnbbernlo supernè glabro , foliis dlunibus oblongis si- liuato-dentatis seriaraplexicaulibus glabriusculis, ramis elongatis i-cephalis, invol. squamis ext. adpressis brcvibus linearibus , inter, snbtornlosis hispidis. (X) pair. ign. Uerba 1-1 ^-pedalis. Achsenia adulta rostrata, juniora vix sub-rostra ta. An forte Chondrilla De Candollei Spreng. ex Steud. nom. eadem ? (v. v. c. in h. genev.)
34. B. ZACINTHIA (Margot et Reut.! fl. zac. ined.), tota (praesertira in invol.) pilis patnlis eglandulosis bispida , caule à basi ramosissinu' infernè folioso, ramis clongatis subnudis, foliis infer, oblongis infernè attetraatis subdenlatis incisis , rameis sessilibus acuminatis basi incisis, invol. squamis l6ngè hispidis eglandulosis, exier. linearis-subulatis. (f) in insula Zacimho legit cl. Margot! Cor. Havre , marginales subtus rnbentes. Achsenia breviter, disci longe rostrata. Differt à B. glaudulosa et foë till'a pilis eglandulosis, à caeteris ejusdem sect, in-vulcro luultò longius bispido. (v. s. coin in. à cl. inv.)
- 35; B. GLANULOSA (Presl fl. sic. p. xxxi. Griesd^in linncea i830. p. 417), hirto.^cabra , canle basi simplicissimo erecto stricto , foliis infer, petiolatis runcinaris, super, sessilibus sagittafis, lanceolatis basi dentatis, peduncalis corinbosis involucrisque pilis glanduliferis hirtis. (j) in collinis regni Neapolitan!, ad Bocco c' Falco (Cuss.!), in Siciliâ ad Cataniam (Splitg.!) et circa Odessam (Bess.!). Crepis glandulosa Gnss! ind. sem. i8a5. pi. rar. p. 329. t. 56. non Brot. — Cup. panph. ed. Bon. t. 119. H^rba trita odorem Ainyg-dali amarac spirat. Achaenia ext. vix rostrata , inter, longè rostrata. (v. s.)
/f. pinnatipartita, foliis plerisque pinnafipartitis, lobis aliis amplis triangulibus, aliis inteiinediis dentiformibas parvis. — in Sicilia (Guss.!). An forte species propria? (v. s.)
36. B. FOETIDA (DC. fl. fr. ed. 3. p. 2948), hispido-canescens, caule erecto simplici folioso apice corymboso , foliis acutè runcinato.-pinnatifidis, inferioribns petiolatis, super, haslato-lanceolatis basi incisis, capilulis ante anthesin cernuis , invol. pilosis squamis exter. lanceolatis , achaeniis radii breviter rostratis. (I) in Europae mediae et australis versuris rnderatis et agris nee non in Teneriffa (C. Sm:!) et Tauriâ (Bieb. Stev!). Crepis foetida Linn. sp. n33. Sow. engl. hot. t. ^37. Picris fetida Lam. fl. fr. 2. p. 108. Wibelia graved ens fl. Wett. 3. p. 144. A. amygdalina Lag. cat. h. iuadr. 1814. p- 3. excl. syn. Crepis fetens Link in Buch. can. 147. Crepis barbata Mill, non Linn. Hostia foetida Mcench.— Lob. ic. t. 11. f. r. Moris, ox. s. 7. t. 4. f. 4. Magn. bot. t. 128. Herba odore Amygdali amari. "Variat in sterilibus caule simplicissimo i-ce-palo ex Flenrot! in litt. (v. v. et s.)
37. B. RH^EADIFOTIA (Bieb. suppl. p. 538. Reich, fl. exc. 1. p. 25j), diffosa ramosa scabra, foliis runcinatis laciiniisque acuminatis acntè dentatis, involucris glandulosisvillosa-hispidKs.d^ in Iberia (Bieb.), in Germania(Reichenb.). Crepis rhaeadifolia Bieb. fl. taur. n. i6a5. Caulis sulc^tns Folia fere Papaveris Rhaeadis. Squamae inv. ext. subnatae laxaa. Pappus ex fl. taur. sessilis, ex suppl. stipitatis, ex Reichenbach disci stipitatus, radii sessilis. An var. B. foetidse ? 'f
35. B. BYZANTINA, caale erecto ramoso ^plcato infernè bispido supernè scabro, foliis hispidis pinnatipartitis, lobis triangularibns acutis superioribus subdentatis, lobis denlibusve spinuloso-mucronatis, rameis aniplexicaulibns, invol. campanulatiéglandulosi squamis linearis-lanceolatis, acbaeniis radii brevissimv,

disci longe stipitatjs — Ciica Constantinopolim le^oit cl. Auchei pi exs. TI. 3451. Aliinij, vid B ibaeadiolli^e, sed folia Rhaeadem non referunt invol squamae exf. nou subulatae. Capit. muhiflora, 4 Hn longa, t-n lm< lata (v s coiiim. à cl. inv.)

39. B. ACULEATA, infeine touierdoso-cauescens snpeine glabia, canle erectoramoso, fobis infei. lyrato-piuatisectis, lobis aculw, infer muhijngls parvis integris, suuinlo roajore lanceolato dentato, supellol.bns Imearlbns Inteeelriols invol squanus exte^r; niimmis, intei: doiso auleats; aebaniis rad.i bTevissim lostiatis. CU m Syna legu cl. Lnbiaaidiere. AfJine R. foctidae Radix exilis simplex. Capitula laxe-corymbca flava Aculei secus doi^um squam* i-seriales ngidi HabituffEndopteiaesed acbaenia ladn intus non alata (v s)

‡ Species non satis notice.

40. B. SARDOA (Spreng syst. t. p. a. p 304. Moi. el. sard. A. p. 5) (all e fl ^ scendente foliisque ruucinatis lacvibus, caulinib paucissimis sax-ittatis ueduir cnlis solitanij, elongatis, sqoamis mvoluen glabrib niaigine icaiiojis Jm Sardinia; pascais piope Samugbeo. Caet. ign

41. B. riNGUiS (Reichb. fl exc 1. p a5, excl .ssn.), diffusa, foliis lanceolatis mntinato-pinnatifidis obovatique, canlii^ bastalo-lanceolatis ulinqne hidulii, pednncuh elongatis imoliiciisqae glandiilosso-pubescentibus r?M Thuungia Folia crassiu&cula quasi inuncia.

42. B. REPEK, (Spreng sist 3. p 65s Hook, et Am. bot. Beech I. p 194), gbbn, cjuie .epen.e, ffolw lanceolato-linenmbas ob.ns.s .epando denticulatis, pedunc...lise)ongat&, mvol imbilato, intaeioce 88 hyl 1^ Vi, achaeuis lon- onem Sinarum. Pieris repens

43. B. JUVENALIS (Delil. ind sem h monsp 1836. p. 23. ann. sc. nat 1837. bot. p. 286), caule spithameo ramoso furcato corymboso, folis oblongis, acute dentatis sublyratis vel pinnatisido-lyratis, caulinis amplexicaulibus, squamis invol costati octonis subtomentosis dorso echinatis, achaeuis centra- libus longe rostratis, marginibus erostatis, recept areolis margine dentatis. — encà Monspeium ad Pontem Juvenalem Ad sect IV. referenda videtur

44. B. PROSTRATA (Dumort fl belg piod 61), caulinis numerosis prostratis, folis radicalibus caulinisque inferioribus runcinato-pinnatifidis pilosis acutis, super dentatis integrisve, invol glandulosso-pubescentibus (2) in Belgii rude- ratis siccis An forte B. foctidæ var?

45. B. TENERRIMA (len. ann. si t bo f i d i s fcaubl^s adlcenden^rp^eiub! L)^ ^ ^ ^ ^ annati tubsque glabns, peduncobs seris flexnosi f^lvls oblieti, - in umbr osis 1^i- dis circa Neapbm. C*t. ,gn Spec.es *b ipso auct. in openbus snis recentiwl bus oraissa.

'J' 'F' Species exclusc.

B. APARGIOIDES Dub. = Willemetia apargoides

B. ASFERA Reichb = Endopteia aspera

B. MURICATA Spieng = Endoptera aspera.

B. SCAPIGERA Pcepp t= Macioibyncbus Poeppigii

B. SPREXTUELIX H. et Ain := Tioximon? apargoides.

B. YERSIF OLOR Spreng. = Ixer/s versicoloi.

DCCXXVI ^THEORHIZA Cass diet 48. p 425. — Leontodontis sp. Linn. sp. Willd — Crepidia sp. Less. — Taraxaci

Cap.t. inultiflorum. Invol. duplex, exterius calyculatum adpresstim tenori multo minus. Recept. nudum. Achamia obtuse 4-gona m ios-

trum breve sensim attenuata. Pappus pluriserialis pilosus albissimus. — Herba rec. Mediterranean in colla perennis glabra. Radix tuberosa ovata. Caules basi flagelliformes sub terrâ iibroso-radicates. Folia è collo orla ovali-objonga ulringiae acuminata integra aut subdenlata. Scapi errecti a pice suintno cum involucrui basi piloso-glandulosi uphylii simplices, rarissimè bifidi subfoliosi. Flores flavi.

I. JE. BTILBOSA (Cass. 1. c). % in arenis maritimis et etiam rariis In rupium fissaris Galline australioris, Corsica, Italian, Siciliae, Dalmatian, Istriae, Archipelagi. Etiam ex Armorica misit cl. Bonneainaison. Leon tod on bulbosum Linn, sp. 112-2. Hieracium bulbosin Willd. sp. 3. p. 1562. Crepis bulbosa Froel. in Jitt. Prenaiithes bulbosa DC. fl. fr. #n. aS83. Taraxacum bulbosum Reichenb. 11. exc. n. 1792- Hieracium sloloniferum Yiv. fragm. 1. t. 20. — Clus. hist. a. p. 145. f. 2. Lob. icon. 1.160. f. 2. (v. y. et s.)

DCCCXXVII. CREPIS *Manch meth.* 53*. DC. fl. fr. ed.3. v. 4. p. 38. Less, syn. 136. Frcl. in litt. 1837 (1). — Crepis Photcasium el Brachyderea Cass. — Crepidis et Hieracii sp. Linn, et auct.

Capit. multiflorum. Invol. duplex, int. i-seriale, ext. breve calyculiforme. Recept. epaleaceum. Achaenia tereliuscula exalata sensim in rostrum breve attenuata. Pappus pilosus albus mollis multiserialis. — Herbae pleraequa? ainiuae aut biennes erectae ramosa3. Folia sirpius pinnatifida, formâ in iisdem speciebus varia. Flores flavi. Invol. »frê Senecionis. — Genus naturalissimum ciiin ad hoc revocantur species cmnes Hieracii auctorurn pappo nivco don aloe. Ca^teriun specierum liiiiites et diagnoses difficillimae et genus monographiis comineidaluni.

Sect. 1. PHJECASIUM Reichenb. fl. exc. 1. p. 7^. — Phaecasium Cbss. diet, 3g. p. 387.

Capit. paucifloram. Invol. squamae exteriores adpressae.

I. C. PDLCHRA (Linn. sp. 1134), canle erecto basi siimpli apice laxè ptfnicalato, foliis nidicilibaa runcinalis basi atenuatis, cauliis ovato-lanceolatis basi aagitfai dentalis integris, invol. cylindraceo, squamis exter. p:mcis acutis brevibus margine si.riosis.^ (l) in rnderatis et collibus Galliae ferè tolius , Germaniae, 1 taliae , Tanriae, Asiae occid., etc. Choudiilla pulcra Lam. diet. 2.p. 77. Prenanthes paniculata Ma>ch met. 534- Lampsana pulchra Vill. danph. 3. p. 163. Prenanthes hieracifolia Willd. sp. 3. p. 1541. Prenantbes pnchchia DC. il. fr. ed. 3. n. 2882. Phaecasium lampsanoides Cass. diet. 39. p. 387. Hieracium pulchrora J. Bauh. hist. 2. p. 105. Prenanthes viscosa Baumg. — Moris, ox. 8. 7. t. 5. f. 13 et 37. V^{er}iat caule glibro aut pube parva scabro, foliis radical, runcinatis ant vix dentatis. (v. v. et s.)

>2. *lampsanifolia*, *panicula* conferiore, pedunculis brevioribns inagis erectis.
(l) Hierac. leptouacrocaulos Col. ecph. t. 249. Crepis pulchra /S Linn.
1. c. Crepis lapsanifolia Reichenb. fl. exc. x. p. 237. (v. s.)

Sect. 11. BRACHYDEREA. — Brachyderea Cass. diet. 48. p. 429. •

Capit. mnltiflorum. Invol. squamae externae adpressae. Recept. subfimbriliferum.

2. C. RIGIDA II Waldst. et Kit. pi. rar. hong. 1. p. 18. t. 19), snbscabra, caule erecto rigido striato, foliis dentatis rigidis, radicalibus obovatis, caulinis sagit-

(1) Sectiones generis IT, v et VI . a cl. Froelich elaborate suut et uui cum Hiefa-
ciorum synop*i comunicara?.

talis aplexicauhbus, capitulis racemofco-paniculatis, in vol. fainoso-pubescentibus, squamis ext. acamuatis margine scanosis. *If.* m^ campis herbidis et montibns. apncis Hunganse (W. et K.), Tauiae et Cancasi (Bieb Beanp.!), Perse circa Kaiabagh (Szow'). Ciepis latifolia Balb.! hoit. taur cat. Biachydelea ligida Cav^. diet 48 p. 4io. Hieiacum Panuonicum Jacq. coll 5. p 148 Ciep ripjida et latifolia Pers. enh. a. p. n. 10 et 35. Achxninni breviter sed tamen distincte lostiatum. (v. s.)

3. C LACERA (Ten' fl. neap. 2. p. 179. t. 74. syn. p. 40a), caale erecto angukto apice paniculato, foliis hispidulis, radicalibus rjincinato-pinnatipartitis , lobi-* acummatii incisis dentatis, caulis linearibus basi piunatilobatis, capitulis paniculatis, invol. squamis albo-toraentosis, exter. parvis 1£ Teu. (2) Seb. in montibus calcaieis regm Neapolitani (Ten.¹ Gnss.'j, Apenninornm ftomanolm (Selioaw'), et Lalii (Seb.¹). "Vulgo Angina (Ten.), seu *Cichoria di montagna* (Guss) Reichenb icon i.t. 19. CrepiiLatialisSebast.Irom.pl fasc. 2. p. ib t. S.Ciep.bicunis Seb.etMaui.prod. fl. rora. p. -27anonLinn. Ci.erucs-folia Tausch in floia 1839 ^{ei}6- P ^{^4-}^{Heiba} venenatissima (Ten Gnw), pedalis glaucescoas. Yaiiat caule hittelio seu glatriubcolo, invol. squamis nunc fatinoso-iomentobis Inermibus, nunc setulas iigidulas doiso gerentibus. (v. s.)

Sect. III. EUCREPIS. — *Crepis Cass. dict.m. p73c*5. v. 2.5. p. 62.
v. 27. p. 4-

Capital. maltifloram. Invol. squamae exteiiores laxiuscolde. Kecept. nndnm.

4. C. BAXCALENSIS (Ledeb. mem. ac sc. petersb. 5. p. 55g n 45),*glabra, caale erecto apice panicnlato-corymboso, foliis radicahbus petiolatis integris pinna-tidibve, lobis hneaiibus, fol. sumroislineaububinttgeiirais, invol albo-pilosu squamis mfiä apiceni comiculatis maigine soariOMs, extei. bievissimis ^ in lupestubus apiicisbeibidis Sibniae Altaiae et Baicalensis. Ciepis elegans Fisch. Prenanthes diversifolia Ledeb. fl. alt. 4 p. 14^. ill. 1c. t» i5a. Geblera pienanthoides Bess.! in litt. i8ix. Floies flavi. (v. s.)
6. C. iffTERRuPT- (Sibth. fl glaec. t 308. ex pro^. 2. p. 137), caule electo sii-perne nudo latnoso J-4-repbalo pilosiusculo, fojiis radiealibus petiolatis pin-nalipartitis preesertim secus neivum medium icabrij., lobis ovatis lads integris, tetnpialni subcordato majori apice subcoidato, pedicelhs involucrisqne ^abscaur is, sqamis exter. lanceolatis ||x margine membianaceis. ^ dUrv. @ seu (L) Sm. in ipsnlà Creti (Sibth.), ad Cap. Malaca (Sieb !), frequens ia montibus insulae Cois (d'Urv.'), m Zadmho (Marg ') et circa Constantmopolim (Aoch!). Cr. raontanå d'Urv ' enum. pi. aicbipel, p. 101 nonReicbenb. Cr. interrupta Sieb.¹ herb cret. Caulis nunc subaphyllus, nnnc geiens folia i-2-amplexicaulia sublyiata, et summa lineaia integriritoa. (v. s.)

H. C. PMJCIFLORA. (Desf! cat. h. par ed, a. p.^o3. ed 3. p. 147), glabra, canle erecto teretiusculo dichotome ramoso^sul)apbyllo, folns acute pinnatifido-runnnatis, lobis acammatis terrinali majore, ^alycuh sqnamis hueari-lanceolatis acutis adpressis, achaemis lereliutiCuUs utrinque attenuatis sedus costula^ lavi-ns (J) in Algypto. Delil. ill. fl. aeg p. 27. Poir. suppl. 2. p. 3_{gx}. Pedicelli 2-10, nunc lieves nunc cura involucris minute beabridi (v. v. c. et s.)

5. C. FULiGinoSA (Sibth. et Sm. prod. fl. graf. a. p. i38), caule erecto ramo-sissimo sparse hispido, ramis dichotoinis apice corymbosjs, foliis pilounsculis, infer, petiolatis lyratis dentatis, medns sagittato-amplexicaulibas acnius lobatis, sunimis basi in lacmiis tenues iissis, rnvols^ pilis ^nigncantibus hisptdis, squamis ext. paucis linean-setaceis. (f)*ad sepes ins Zacinthi (Sibth Maig-'). An stirps homonyma d'Urv. enuin. n. 753, in ins Melo lecta, omnincyeadem ? Capitula parva flava, ligulis radii extiis rubae-tibas. Achsenia apice sensim atte-nuata (v. s. comrn. à cl. Margot.)

fl. adscendens, caule adsrendente. (T in herbosis bamidioibus. mt>. Zarinthi legit cl. Maigot. (v. s)

8. C. OOHYMHOSA (Ten.! cat. 1819. pi. 60. prod. 47-syll. 401), sellis patulis hispidis, caule erecto apice paniculato-corytnboso, foliis radicalibus spathulato-runcinatis in petiolum attenuatis, caulinis lanceolato-sagittatis basi iacisis, in vol. hispirlis pappum sequanfibus, achaenii oblongis striato-sulcatis glabris. (j) in saxosis Apuliac et Campania; Neapol. (Ten.!). Col. ecpbr. t. a36? Herba pedalis. Capitula parva. Variat caule foliisque plus minus hispidis. Proxime accedit ad C. fñliginosani, sed capitula adibue ruinora, invol. seise non nigricantes, cor. subtus ut videtur flavae. An var.? (v. 9.)
0. *humilis* (Ten.! I. c), c^ulibus brevioribus è collo multiplicibns magis hispido-liirsotis. — cám priore. (v. s.)
9. C. FOTYMKPHA (Wallr.! sched. crit. 426), glnbriaacuia, foliis lanceolatis pinnatifidis, radicalibus petiolatis basi attenuatis, caulinis basi sagittatis et, sa?nè incisis, paniculâ laxâ subeoryrabosa, involucris ovatis demùm costatis pappnm aequantibus, calyculis adpressis muricato-pubescentibus, achaenii oblongis pappo brevioribus secus costulas laevibus. (f) in agris et secus vias passim in Europâ. Crepis viiyns Linn. sp. n34- Gaud.! fl. helv. 5. p. 141. Cr. leiosperma Gaud.! in herb. DC. Cr. nmbellata Thuill. fl. par. 409? fortè Ur. longè-pinnatifida et Cr. palula Chev. fl. par. 2. p. 542, hue etiara refer.? y. *stricta* (Wallr. A ed. 4^6), caule stricto pedunculisque glabriuscatis, foliis inferioribus rancinatis, caulinis sessilibus pectinato-pinnatifidis integrisy. (j) Crepis stricta Scop. earn. 2. p. 49. t- 99- DC. cat. h. monsp. n. 82. fl. fr. 5. p. 4^7. Cr. pinnatifida Willd. sp. 3. p. 1604. Cr. virens Santi viag. montam. i. p. 132. t. 2. Nee satis differre videntur Cr. ueglecta Linn. in ant. 107. Bertol. anioen*. n. 39. Cr. cernua Ten.! prod. 47. syll. 402. "Variat folioium lobis aculis aut obtusis. (v. v. et s.)
- £. *humilis* (Gaud. fl. belv. 5. p. 141), caule erccio fblioso basi subhispidulo, foliis lute lanceolatis ranqinatis, superior, subintegiis, paniculu corymbosa. (T) in pr. itis. Crepis virens DC. fl. fr. suppl. n. 2942. cat. h. monsp. n. 84. Crep. polymorpha k virens Wallr. 1. c. Cr. tectorum Lam. diet. 2. p. 180. — Fuclis icon. 3ao. Tabern. icon. 182. Vari-it caule i-cephalo et tune est Cr. linifolia Thnill. fl. par. 408. (v. v. et s.)
- y. *diffusa* (Wallr. Let Gaud.! 11. cc.), caule deenmbente raraosissimo diffuso, pedicellis Ulifortibns, foliis inferioribus caulinisque amplexicaulibus lanceolato-linearibns parce dentatis. (T) Crep. diffusa DC. cat. h. monsp. p. 98. fl. fr. 5. p. 448. Bluff et King. 2. p. 3oi. Delh. megap. * p. 63. Crepis virens Willd. Cr. virens * hnmifnsa Schlect. Lapsana capillaris Liun. sp. 1, p. 812. Cr. Dioscoridis lloili ex Bluff et Fing. Aa spec. propria? (v. v. et s.)
10. C. RAMOSISSIMA (d'Urv. ennm. pl. arch. p. 102. n. 752), caule erecto scabro supernè ramosissimo, foliis canlinis scabris anriculatis lincaribus longis, pedunculis multoties dicbotomis sub capitulo vix pubescentibus, capitulis minimis nuinerosissimis, invol. sqnajnis dorso ciliatis. (Y) in^ pascnis insuloe Berezca antè flu vs Boryathenem. Affinis dicitur C. angustifoliae d'Urv. quae C. tectorum var. videtur.
11. C. rARVIFLORA (Desf. cat. h. par. ed. r* p. 88. ed. 3. p. 399. l^ers. enh. n. i,| non Mcench), catile erecto angulato apice corymboso-raniosissimo glahro, imo basi bispido, foliis infer, runcinatis, caulinis sagittatis amplexicaulibus linear-lanceolatis integerrimis, invol. sqnamis 6-7 dorso setnlosis, exter. lin-an-ju^ilatis subj>atolis, achaenii paf>po brevioribus secii costulas laevibus. (j) in TTnent (Dej>f), in arvis. ins. Astypaleae Archipel. (d'Urv.!). Capit. matnra vix 3 lin. long^. Ihvol. pappum aequans. An Cr. parviflora Jacq. ex Spreng. syst. 3. p. 634 eadem ? (v. v. fit s.)
- ia. C. XECTORUM (Linn. sp. n35 non Lam. Poll.), glabrinscuia, canle erecto paniculato, foliis-radicalibus rrffcinatis, canlinis inferioribus lanceolato-linearibus sagittalis, super, linearibus integerrimis margine subrevolutis, involucris ovatis pappnm aequantibus pedicel Usque incandescentibus, achenii pappum a?quantibus linearibus apice attenuatis sectus costulas mnricato-scabris.

(l) in luderatis pascuis muris lectisque feofba; totius et Sibiuae. Wallr. sthed. 430 DC. cat. b nionsp. n. 83. fl. h suppl. 5. p 448. Sow. engl. bot. t. 1111. C. Dioscoi idis Poll pal n. 750. Gi våua Moeach An Cr -in-gusti folia d'Urv. euam pi. aich 101. n. 749° Cor. bulphureau (v. v et s.)

@. *segetalis* ('Roth geim n a. 254. Walli. scbed 1. c), caule simplicissimo, foliis infer dentatis, pamculā obgocephalā. (f) in arvis. C. slricia Schullz fl. starg. suppl. 41. ex Bl. et b| Leontodon autnmnale f1 dan. t 5or. (v. s.)

y. *gracilis* (Walli. scbed. 1 c), canle simplici graillimo 3-4-cephalo, folhs caulinis omnibus subintegemmis buearibus. in sterihbns aivis Crep Lachenalii Gochn. diss neb p. ig t 3. DC. fl. fr. 0 p 4^9. cat 1* nionsp. n 80. — An Hall belv. n 3a. (v v et s)

i3.C. AGRESTIS (Waldst et Kit. in Willd. sp 5. p. 160?. pi. rar. hung t 3 220), canle erecto, foliis radicahbus basi attenuatis lanceolatis dentatis lunciuatisve, canbnis lanceolatis sessilibus sagittatis, paniculā subcōymbosā , ped Hell's involucrisque glanduloso-hispidis, achaenns tereti-lineanbus pappo bievioiibus secus coslas *Ixibibus* Qj in agns aggenbhis pratisque siccis Hungriān (W er Kit), Iduilae ^ Stev), in dumetis ad maie Caspinn (Mey), in Bohemiā (Tausoh), Croatiā (Hozi). Ciep Baubiniana Tauscla in florā 1829, eig. p. 33. exReichb sed excl syn Banh. Yatiat bispida aut feie glabia, folns dentatis runcinatisve (v s.)

14. C. ADENANTHA (Vis. in flora i830 p 53) nunutr lintel I a ,caulc erecto simplici sulrato apice corymboso subnado , foliis iadicalibus lyiato-tuncinatis petiolatis, superioubus sessilibus integer lllls lanceolato-lmearibus, peilicelhs iuvoluciisqueseloso-glandulosis , calycuh squamis linranbris acunnatis, achaeniis sulcatis ldBibus (f)m ^p e*li » sylvaticis Dalmatian in montibos ditionis Ascuviensis ('Vis) seii Cattaiensis et ad Pastiowich Albamae Austriarae (Tom ') Rarissiraa' Fl jaUo Peclahs et paulo ultiā. Radix simplex (v s comm. aci. Tom a sin i)

i5 C BIENNIS (Linn, sp ix36), hispidula, canle erecto snlcato, folns infer runcmato-pinnatifidis, supei. lanreolatis dentato-piunatifidis, pauicala corymbo^a, invol. squamis maigiue scariosis, exter linea'-lanceolatis, acba^ morum costis laevibus. (j) in Euiopa; pratis frequens. Sow engk bot. t. i4q Gajitn fr. 2. t 158 f 8 DC. fl fr n 2941 cat h monsp p. 98. C Scanensis Linn it scan. 170 Cr. SabaudatBalb ' herb Hedypnois biennis Huds. augT. 342 Flores flavi, snbtus rnbentes Achacnia longa snhcompressa. Caubs 3-4-pedalis (v v et s)

*prohfera, floribus in mvol longe pedicellatis acbacmisqué subbutellis.— circa Goettingam in tuonte der Hohe Hagen hoc monstrom legit cl. Roepei (v. s)

yS Americana, folns latioibns pleiumque runcinato-dentatis, tarius pmnafidis mine omniñointegernmis.— ad lacum Huion in pascnis Saskatchawan et in montibns rupestribus'Amer. bor. Hook fl. bor. am c p 39^

An sp propna?

16. C irAnRA (Willd. sp. 3. p. 1603), caule erecto striato apice panienfeto-corymboso supeme glabro basi hutello. foliis radicalibus lanceolatis utunque attenuatib subpetiolatis inciso rnncinatr̄s hnto-scabridis, caulinis sessilibns sagittatis, mvol squamis subbirtellis margine scariosis, ext. linearisnbulatis, acbxniis terelinscubs ^tnatfs secus costulas laevibns (J) |n aspens Gallic ans tralisetagNica?ensis DC. cat.b nionsp p j|9 Crep Nicaeensis Balb.! misc alt p. 28 C scabra el Nicasensis Peis. encb 2 p 376 (v. v. et s.)

17. C LODOMERIENSIS (Bess 'gallic a. p J50), snbhispidnla, caol6 sulrato-an gulato apice corymboso, foliis infer, oblon^is saep dentatis bast attenuatis, snp. lingulato-hneanbus basi lobulo angustissimo utnnque auctis CTeterum m-tpgerrimis, pedicellis involuensqe jumoribus farinoso-pnbcscntibus Calyculi squamis hneaiibas acuminatis. — in arenosis herbidis Galciae cinā Dolam (Bess.), Hungarian (Host), Bavaii* (Sthultz), Austnae, bohem*, saxonia

(Reich.), in arvin et rnderatis Dlhiiria (Tuicz.'), Sibiriae (Gmel.) Hieracium, etc Gmel fl. sib 2. p. 28. t. 11 nee 12. Ciepis Graelim Schaltz fl. bav. Cr. agres-tis Saill non W. et Kit. Crepi* tectorum var Ledeb.? (v. s.)

18. C. SILNOMA (Tnicz' in litr. i833), glabernma, caule erecto simplicissirao, foliis lingulato lineaibus, infetioribus obtusis basi attenuatis' denticilatis, s>upe-pei se&ilibns integerriims acutis, paniculâ racemosâ contiactA, capitals ciic. n-flois cylindiacis, calychn t-qaanm parvi* acutis. (2) in salsis Dahun<c «id lacum Taiei et Mongolia? Chinensis detexit cl Tuiczanmow. Heiba sesquipedalis. Fol inf. 3 poll longa, 3 lin. lata Flores lutei Pappus albissimns. Achje-ma lougit. stiata. (v. 8)

19. C. BUNGEI (Ledeb. ex Turcz.' in litt. i833), tenuissirae arachnoidea sea elabriuscula, caule stiictè electo folioso simplici, foliis oblongis integns sea fetrosum dentatis ntnuqne acnminatis, corymbo 2-b-cephalo, pedicellib bqun-mosis apice mvolncruque nigio-pilobis, invol. squamis acnminatii margine bcaiosis, % in insulis Karaicis ft Tschuja et ad fl. Lena Sibma? (Ledeb.), ad Baicalem, in palndobis humidis ad ostium Kiachta Dahuria (Turcz !). Hieraciam strictunitedeb fl. alt \. p i3a excl. indio. icon H. uligmoMim lnicz.! iolitt. — Gmel. sib. I p 30. 11 a>. t. i3 f. 1.—C.Bnngeana Mey. exllunge ! in ht. est vai i-cephala (v. s.)

ao. C. ANI>RYLOOID>3 (Lowe! prim. fl. mad. p 25), sparsè hispida, caule errecto subiistulosu suptine laxe paniculato, foliis omnibus indivisis oblongis acnminatis 1 emote dentatis sahsmuatis sessilihs, sner. acute auricnlato-coida-tis, capitnlis, iemoi*i*, pedicellis divaiitatis, involucusque gldnduloso-hiibutis-siinis. (2) in convallibus OJU heptentr. Madeiae. Achjenia eqmdein vix matuia croitriiT an ex cl! Lowe demuui losiata^p Invol squam. erectae pert>istentcs. Radix carnos. (v. s coium à cl inv.)

Sect. iv< INTYBELLIQIDES. — Intybellia Monn. nee Cass. — Geracii sp. Richenb.

Invol biseriale basi calyculatnm. Acha^nia columnaria. Ca pi tula cylindiacae. Scapns iubpolycephalus. - (Anct. cl. F.alien)

a f. C MAORIJANA (Frcel in latt 1837), scapis cespitosis aphyllis subdicepha-lib, foliis lytiatis glabiis, peduncnlis teiminahbus involucrisque glabii ^ in insulâ Fianciae. Hieiacium Mauutianum ^jfilld. herb. 14637! I'olia lyiata, lobo terminali ovato Miuato denticulato, supia gldbia, subtus setuhs niimniis scabiuicula MoieS lulei minuti, illi&Hier pamculati mmoieb, nnbileb cernui. In\ol babi calycutatuni 12-14 lo&cnL& lefeilum Gennen angul.ituui bcabium. Stiuctua involueri omnino cademac in sequentibus. (v. s. sp comin. à cl. Commers.)

[^] C GMELISI (Froel. in litt. i837 non Schulr.), capo aphylllo, foliis spatlm-Wlanceolatis sinuato-dentatis glabiib, involuciocyhnd.aceo pediinculoinm-qoe ap.ee glanduloso-hispidois % in Slb.ria ad licuiUm et Ojhliam. Hiei — L Gmelini Linn. sp. «127. - Gmel sib. a. p. ^, t. 8 f 1 • bo.i. Scapus vix bpiibtmahs corymbo oligocephalo terminalis Flow, parvi 1'renamh. Chondnll magnitudine et foimâ sinulis. (v. s. sp. in herb. Gaerluenano et Stuttgart. comm. à cl Gmei.)

23. C. PRAMORSA(FICB1 in litt. i837), scapo polyceplulo lacemoso foliisqne obovatissubcieniao-denticqlatis mollitei birtis ,1n\olucio cylndiaceo calyculato glabiusculo, ligulis apice tiuncatis. % in btibidis apnci* niontosis IL<ropac. Sibinae Hieracium pidjmoisum Linn. sp. M 26 Gmel. sib a. p 32 t. i3 f. 1 op* fl dan⁻¹ 9*²- Willd. heib. ibhSi! DC. fl fi. 4. p 18 Hiei. 1 ctucactuiii Scbiank. fide herb. Geiaciuin prjcinorsum Mcsl ct Reiihrnb. « ^ 2 J35^ 1 Intybellia pratmoiia'Monu ess. p. 79 Intybus piaemoisus Frie^{it} ed. 2. p." 245. Hncl Lcdcb adducit Gmel. fl. sib. 2. p. ^2. n. 28. t. n² q₁₁₀d adH. lactucaceum Gmel syst. ii77citatur. Mos luteus

Q, <r|ab|ata_y scapo foliisque glabns. (v. s)

- y. *muluflora*, racemo snbcomposito elougal. (v. s sp. ex subnlpinis Al-gOV)
<T lanceolata, foliis lanceolatis acatis.
t. gstandiflora, floibus duplo' majoribus, herba' lobustiore. (v. s. sp. ex Helvetiâ.
£. petiolata, foliis radic. longius petioldtis (v. s. sp.)
24. C. MUITICAULIS (Ledeb.fl. dlt. 4. p. it**. ic*on. 1 t. 36), scapis i-T è collo erctis dpice i.*inoso-coiymbosis, pedicellis involvusque ghnidulbso-pilosis , foliis radicdlibns oblonps petioLtit lyato pinnatifidis, invol. cylindiaceo squianns ext. 4-5 l.mccol.ilو lineanbns adpressis. % in lapidosis insulainiu fi Isclmja ad ostiuni tl. Knrai Sihuai Alfdica; (Ledrb.). Voha ex Iedcb ufiinque pilosa Pappus achjenio bievor. Ex iconে pioxime ex I'icel. accedit ad C. piæ-ro orsam.
- /6. *Ochotensis* (DC. berb), foliis glabriuscalis denlatis, scapis pobe subaianeoså infiå pube glanduloså p.uce \estiti5. % in Sibhiâ Ocbotensi inter Aldan et Ocbotzk legit cl. Tuiczaniuw. Pappus achaenio aequulis aut longior. (v. 8.)
25. C IWCARWATA. (Le» syn 137. excl syu. ex Vice], inlitt non Vis), scnpu po-Jycephdlo pdniculrfto, foliis oblongo-obovdtif cien<to-dcncitculalis molli'er bir-tis, involucris cylindiacns cilyculatis glabus, lipnlis apice retusis (iiibrntibus). If. in montosis snbdlpims Canntbiae' Carniohae' H incdrnatnm AYulf in Jacq coll. 2 p 127 Jdcq. IC. rar. t. 578! Sturm floi 3p. opt ! Willd. hferb. 14656' H. montanum Scop, earn **. p. 106 t. fo Geiacinm incainatnm Reichenb. Ligulae apice ietusx incarnita? et inflorescentia pamculata, quibus notis a sequenti potissiunum differt. (v. s. sp. comtn à cl Wulfen.)
26. C. FROELKHIANA (DC. herb.), scapo oligocepalo coiyràboso, foliis oblongo-obovatis sobliis raolliterhntis, involucro oyindraceo calyculato glabio, floium ligulisapice truncatis (flavis). ^ in Alpibus Tyrolis austrahs in glaicosis hei-bidis convalbbus Duron et Lnsia !, in valle Susanå ftclvetia?¹, agro "Ver^ncnsi! Hi p.n vifloium Sohleich exsicc 'Gaud fl. belv. 5. p. i?3 Gerarimn parviflo-imn Moesl. et Reicbenb. 1 p. 1^67. Hieraciuro amiculccfoliutrl Willd herb n. 14657. Crcpis auicnlsefolia Froel. in litt. non Sieb. Media inter H pjaeuior-6am et incarnatam , at floiuni color constantissimus. (v. v. s)
- >S. subglabrect, foliis glabnuscnlis. (v. v. in valle Lusia.)
y paticiflora , scapo huniili sub-9-cephalo. (v. v ibidem.)
27. C. OPORINOIDES (Boiss.¹ ined.)_t glabia, caule lamoso subapbyllo , foliis ladiclibns elongatis pionatifidis, lobis lanceoldfis macrouuiatis subintegris, raulinis paupis hntaribus, invol calyculafo subfaunos-pnlxyulo , squidmis i-alyculi fcie snbulatis. % ? ^) ? m Hispaniac Ginnatnnsis Siena Nevidd legir cl. E. liohbici ' qui speciem valde variantem observavit In mpibus aptiris ad i.ulices raontium c.iules eiecti ramosioics, folia angustioia accta magis laci-niata. In lapidosis et excelsioibus scapi deelnbentes, folia obtusiora et m-ferne t.inltuin incisa jut dentata. Oporiniae habitum, praeseiin var. lamosior, exhibet. (DC v. s. comm. à rl. inv.)

Sect. v. HAPALOSTEPIUM *Don.* — *Catonia Cass.*—*Soyeria Mo&n. ess. Hie rat.*

Invol. ovalum multiseriale squamis aliquot exteiionbns elongatis laxis obval-latum Acbeccnia fusifoimia elougaia. —(Auct. cl. Froelch)

28. C. CHRYSANIHA (Fioel. in litt. 1837), glabra, scapo sub-i-rephalo aobuni-fbbo supeine involcioque ovato olnallato laxinsculo hirsnto, fohis oblongo-spalhn²ti* b³si atlenuatis sinuato-denliculatis longe pctiolatis, caulin sessih Limcolato. % in montibns AllBicis circa Ridderfk. Hi era cm m chiysanthnm Letlcb. II. all. 4 P. *²9. ic^{11!} - n(J* IOSS 1. 4⁵6-H. ffigidum Stevcoii litt. ad Zeyhei. Maxime affinis C⁴ alpcbtii. Suipus scuiipedem longus, sujWa*niediimi

folio 1-2 lanceolate auctus, subiubellus Capitulum iugnitudine foiroj et in—
damento seqaenti simile, nigrans, florens vitellinum. Folia longe petiolata
oblongo-spathulata obtusa ptiolo siroplici longiore Involucrin extus squa—
rais 4-6 iongiuscohs lnsutura. (v s. sp. in herb Reichenb comm. a cl Le—
deb. et in heib Zeyheriano comm a cl Steven)

- 39 C ALPESTRIS i Tausch boem. p 79. Ficel. in litt 1837), scapo submonoce—
pbalo subumfoho snpeine foliisque sessilibos lanceolatis acutiusrnlis subrnn—
cinato-Aentatis pubecentibns, involucio oblongo obvallato laxiu^culo glan—
duloso-biisnio. If in Alpibus subalpmis montibus depiessionbus caicareis
Aostiae' Salisburgi' Tyrohs' Bavaiae' Helvetia? Alpibus Sue via. H alpestie
Jacq austr t. 191 bon. Stuim fl t a8. opt Willd. herb j46J9 ' Flos, cro—
ceus Hier blattanoidi sinulis.

A. *glabrescens*, heiba viridis glabiinseula .

{6. *Jacqmntana* (Fce). mss.), scapo monocephalo, foliis spalhulatis dentatis
Jacq. 1 c fig. sinistr (v. v. sp)

y *Gmehniana* (Ffcel tnss), scapo diviso subtricephalo subfohato, folns lun—
cinatij., pedunculis elongatis. Omel. sib 1. p. 22. t. 8. f. 2. opt (v v sp.)

/ *Willdenowiana* (trocl mss), scapo unifolio, foliis mncinato-dentatis.
U. i>pe*.tre Willd beib. 14006'

B *pubescens*, berba cano-pubesces

f. *integriroha*^ In eel. nm.), scapo fohtoso sub i-cephalo, foliis lineaibus in
I tegris (v. v. sp)

£ *foliata* (Froel mss.), caule ramoso folioso polycephalo (v. v. s)

M, *Alhonu* (Froel mss.), caule raraoso oligocephalo foliisque <ams glandu—
loso-visciduhs. Crep. albida All ped t \$2 f. 3. (v. v. c comm a cl
Balb ^

x. **viscidula* (Frcl mss.), scapo foliisque glanduloso-hiitis. (v. v. s)

30. C. GRANDIFLORA (Froel in litt 18^7), viscido-birsnu, caule adscidente
sulcato oligocephalo, pedueuehs apice incrassatis divaricatis, foliis oblongis
gio'sse dentatis, cauliis sagittatis aiuplexicauhbus , involucro obvallatollaxo
diffonnitei birsuto If in subalpinis et Alpibus et piatis Pyrenacorum ' Galliae '—
Helvetia^ lyrolis! Salisburgi' Styria' Hungariae' Bohemia?! H. giandifloiuin
AU*ped n. 794 t 29. f 1 W. et Kit pi. hung. t. 3i opt. 1 DC. fl li 4.
p^33 Wiltd beib. 14696^ Lepicaune giandiflora et ex Benth Lepic mtyba—
cea Lapeyr abr p. 479*

@ *conyzafoha*, caule humih subdicephalo H. conyzoideum Lam fl. fi. 1
p. 197 H conyzaefoliam Gon obs. p 59. (v. v. sp in Alp. JEriponr)

7 *pappoleuca*, caule bumil^uboligocephalo folii&que birsutis nee viscosis
H. pappoleuonm "Vill. dauph 3 p i34. H leucopappum^>eis n. 5a {I.
| v v. m Alp Tyrol)

T. subruncinata (DC. fl. fr. 1. c J), caule elato tamoso polycephalo, foliis
rnncinato-dentatis. H Intybaccura a Lam diet. 2 p ^69 (\. v. sp.)

t. *glabrescens* (Froel. mss), caule &ub-i-<cephalo foliisque glabris, involucro
ciliato. (v. v. sp. ad glacies perpetas Tyrol.)

- 31 C VISCIDUI. (Fioel. mss), glanduloso-birta, caule strialo suberecto oligo—
xiephdlo, folns ladicalibus oblongo -obovatis runcmato-dentatis, involucio
Subsunplici bubimbneato glanduloso-nhato % in graminosis alpmis Godjan
fianatu& m confimbus Walacbiae H. pyrenaicum Roch. banat p (59. f 59.
bon Media intei C grandiflorain el blatlarioidem , puori ex indumento glan—
duloso, posteriori ex babitu proxima Involiicram vix obvallatum nee laxum
Caul is in peduculos ^-3 divisus, totus glanduloso-hirtus : pili glandulifeu ai—
ticulati Pedumuli elongati laxi apice vix incrassati glandulifen. FWes auici.
(v s. sp in heib. Roe in. comm a cl. Hesser, in piopno comm. a cl. Bahm—
gaiteu)

- 32 C BLATTAHiomts (Vill. dauph. Froel. in litt. 1837), caubbos sabccspitosis
foliosi^oligocephalis snpeine snloatis, foliis cauiinis interraediis lanceolatis
~~sagittatis annulus~~ elongatis acntis, irivolncio ol)allrftO» l*i*o simpliu'l n vil—

loso. Of in Alpibns Germania! Helvetiae! Galliae! Sabaudiae! passim. H.blattarioides Linn. sp. 1129. DC fl. fr. 4. p. 33. Gaud.! ll.belv. 5. p. 1C7. H. Pyrenaicuin Willd. sp. 3. p. 1682! herb. 14634! Sturm flor. 3g. ic. lion. C rep is Austriaca Jacq. h. vind. t. 270 opt. Lepicaunemulticaulistet ex Benth. Lepic. turbinata Lap. abr. p. 480 et 481. et ideò H. turbinatum Spreng. syst. Soyeria blatlarioides Monn. ess. p. 76. (v. v. sp.)

£. birsuta , caule polycepbalo, foliis omnibus subintegris. Crep. Austriaca All. ped. t. 3o. f. 1. (v, v. sp.)

y. birsuta, caule polycepbalo, foliis caulinis inferioribus radicalibnsque runcinato-dentatis. Hall. enum. 2. p. 98. Lach. in nov. act. helv. 1. u. 23. (v. v. sp.) " . *

d\ birsnta , capitulis umbellatis. (v. s. s.)

e. caule oligocephalo foliisque hirsQtissimis sulfrncauis. (v. s. sp.)

f. berba tota pilis albis rigidis hispida. (v. s. s.)

3\ caule glahrosesuboligocephalo, foliis hirtis. (v. v. s.)

1. caule foliisque glabriusculis venis sauguineis. (v. ^ in Alp. Fuesseff.)

x. involucro glabrescente. (v.-s. s.)

33. C. SmtrICA (Linu. sp. ir25), ca'le stricto folipso corymboaq, foliis rugosis grossè dentatis scabris , caulinis super, cordato-lanceolatis inferiori riuque petiolis alatis dentatis amplxicautibus*, involucro lax.o liirto. ^ in Alp. Sibirias orient, et in monianis sylvaticis Galliciao, Volhynioe! Hungarise! H. Sibiiicum Lam. diet. 2. p. 368. Willd. sp. 3. p. i583. berb. 14695. fi. 1. Gniel. sib. a. p. 26. \. 10. hoitl Soyeria Sibiica Monn. ess. p. 77. in fioc genere statnra et flores maximi. Fructus elongati fusiformes'ut in antecedentibus speciebus. (v. s.)

Sect. vi. HIERACIOIDES. — Catonia Moench et Reichegb., non P. Browne nee fusJ.

Involocrum multiseriale inibracatuin. Frilbtus columnares. — (Auct. <1. Fioel.)

Scapo monocephalo.

34*. C. CILUMNE (Froal. in lit?. i837), radice prasmorsà , scapis cespitosis fiMor-Djibus l-cephalis foliisque suis lanceolatis runcinato-dentatis' glabriuscnlis, Involnco snbcylindraceo farinoso. % in luonte Pollino Calabria?.. Hieracinn pumilum Ten. viagg. cal. 128. prod. 5. p. a5. non Hoppe. Hierac. Columnae Ten.! syll. p. 398. Apaigia lucida Ten. fl. neap. a. p. 164. t. 70. Hier. parvulum Ten.! in litt. ad DC. i833. Caronia crocea. Mcsl. et Reichenb. flor. p. 1402! Apargiae sen Tljrinciae »peçie^uni b'abitum 4'efit. Scapi juvéniles apice not antes. Flores crocei. Involucrui cylindraceum. (v. s. sp.)

35. C. PIWNATIFIDA (Froel. in litt. 1837), cauo'tomtn/osula, scapo i-cephalo, foliis hirtis runcinato-dentatis, laciniâ anglnatis dentatis tnucronulatis crispis, invol. glandiilos-hispidulo. If. in Annenia^ste Wjld. Hieracium pinnatifidura Willd. sp.. 3. p. i560. Dens-leonis orient, tenuissimè divisus tomentosus et incanus Tonref. cor. 35. teste Willd. Flos ferè magnihijline Taraxaci Dentis-leonis, flavusjCapitulum subovatum. Foliorum iigurâ parùm ab ilia Intybellix purpureae recedit. (v. s. sp. in herb. Willd. 14661 !) — là specimenne Armeno à cl. Auc'her lecto, folia incano-iomentosa nee birta, invol. sqtamae ad carinam nigrse, caeterum albas. (DC.)

36. C. AURKA (Cass. diet. 48. p. 4^8- F'cel. in lilt. 1837), scapis inonocephalis subapbyllis apiceinvolucroque subovato nigro-birsutis, squamis lauceolatis, foliis sp.^lwlati runcinato-dentatis glabris, (floribus croceis). If in Alpibns Europae praserfim austral is. Leon todon an reum Linn. sp. p. n'a'j. Jacq. aostH. r. 197. bona. Hieracium aureom Scop. cam. I. n. 965. DC. £1. fr. 4- p. *7- Sturm fl. 37. opt. Apaigia nurea Hopp. Calllopea aurea Don.(v. s. »p. jW 11 d. berb. 14635!)

- fL. runcinata* (Froel.) mss. scapo i-cephalo, foliis runcinato-pinnatifidis. (v. v. a. in Alp. Algov.)
- y.? *taraxaciformis* (F reel, mss.), scapo monocephalo bnmili crassinsculo, capitulo tnarido giabriusctilo, foliis spathulatis dentafis sessilibus. (v. v. in Taureno Raaviciensi in confinibus Salisburgix et Carintiae supra glacies aeternas). An propria species? Flos magnitudine et formâ Taraxaci Dentis-leonis , etc., sed croceus, scapus vix bipollucaris crassiusculus adseen dens , folia obovato-oblonga vix petiolata , capitulum ovatum erasi usciam.
- f. leiocephala* (Froel. mss.), scapo sub-2-cephalo, involaco glabro.(v. v. in Alp. Algov.)
- f. Halleriana* (Frcel. mss.), scapo diviso dicephalo. Taraxacum calycibus hirsutis bqnainis rectis Hall, hist. n. 5?. t. i. bon. (v. v. cum priore.).
- f. crocea* (Froel. mss.), foliis runeinatis utrinque glabris , caule pancifolio ramoso , ramis longis nadis nnifloris calycibas viloso-nigrescentibas.— Scapus 3-4-cei)halus subfoliatus : pedunculis elongatis laxiusculis. Flos crocens* Involuci figura et indnnientum idem ac in typo. 'Vix propria species et syn. Gmek potius H. alpestri Jacq. adseii bend urn, cum anctor ipse flores flavos praedicat. (v. v. in Taoreno Ranvic.)(i).
37. C. KrTMBELii (Froel. mss.) scapo i-cephalo apbyllo foliisqne glabris , pri- raordialibus integris linearibus , seenndariis lanceolatis acntis sabruncinato- dentatis, involnro glabriuscno (flor. flavis). % in Alpibns Croatiae. Hieracium Alpinum Wild. herb. 14635 ! n. A ! Nimis affinis H. ^lpino à qno differr, monente^l. Kitaibelio in litt*!, flore dimidio minore constanter flavo, involaco ferè glabro basi tantum pilis rarissimis arricnlati adsperso, sqnamis maltu angastioribas linearibas, foliis málto minoribus longe petiolatis. (v. s. «p. corom. à cl. Kit.)
38. C HETÉRÖTRICHA (DC. herb.), acablis, foliis radicalibnM lineari-oblongis. acaroinatis in petiolnm attenuatis fi'empinnatifidis, lobis remotis acominatis pilis rigidis eglandnlosis hi it ell is, scapo foliis triplo longiore i-cephalo scabrp, pilis ad apicra et ad involnrum rigidis glandoliferis, invol. imbricato corollis longiore. *C In Oriente ad Alpes Zcrokou dictas legit cl. Anclier-Eloy! Hieracinm glanrlulosam. Aocb.! pi. cxs. n. 354c) non Schuit. Acbacnia glabra laevia^ Pappus albns raultiscriaUs. Lignlaj flava3 invol. breviores. (DC. v. s. comau. à cl. inv.)
39. C. ARMENA (DC herb.), acanlis breviter glandoloso-pubescentis, foliis radica- libu5 oboiuitis oblongisve in petiolum attenuatis acutè inciso-dentatis, scapo nudo jaiatfoliolum lineare integerritnuin gerente i-cephalo, invol. squamis lanceolato-linearibus acnminatiscirc. biscriatis TjC in Armeniâ legit cl. Aucherpl. exs. n. 3180! Herba3-^pollicaris Leontodontisfacie. (DC v.s. conun. à cl.inv.)
40. C? SIMPI-KX (FroBl. in litt. 3^, sdapo i-cephalo aphylllo aiipern'eincerassato squamoso, involnro simplici cylindraceo, foliis spathulatis sinuato-dentatis. Tf.? in pratis propè Cyrénam^Africaj hor. Hieraciom simplex 'Viv. fl. libyc. et in bot. zeit. i8a5. p. 636. noji Lapeyr. Plantam à me non visam hoc refero ctum auctor fructus sbbrostrafôS indicat. An potius Barkhausiae species? f.
41. C. SCHREBERI (Fropl. in litt. 1837), scapo snbmonocephalo subunifolio, foliis lanceolatis runcinato-pinnatifidis glabru, laciinis linearibus snbdentatia mucronatis, involnro simpliciuscno cano-tomentoso hirsute ?! Hierac. Gmelini Schreb. herb. Habitn affinis H. alpeslri Jacq. à qno differt radicis capite albo-villoso, involnro imbricato nee sqnamis majoribus obvailato, foli rum laciinis dentibusque mucrone albo acuminato terrainatis. (v. s. in herb. Schreb.)

(1) Sub nomine Hier. crocei rrcepi à cl. Turczaniow stirpere in lapiflosisj Traus- baicalensis et arenosis Mongolicis crescentem, variantem caule simplici aut ra- moso irau* p \times lyceplialo, pilis invol. albidis aut nigris. Mihi videtur species propria nempe *Hier. croccum* Lam. diet. 2. p. 360. Willd. sp. 3. p. 1571. Gmel. fl. hib. 2^ j. 22. t. 8. f. r. (DC. v. s.) •Y

** *Scapo polycephalo*

- 4? C SILENIFOLIA (1 roel mss), scapo sabaphyllo polycephilo subpamculalo foliibque oblongo ol»ovatis Mibintegemmis hiibutib, mvolutm olati!> laxiusculis glanduloso-bntis *If*. Sea pus. vix ^pitbauiahs rigidulu* supia medinin in pedunculos 3 4 alteinos sobfastigi<itos divisus subaphylliis kolia conacca bubtusglauci elliptico-bovata petiolata Involutiuni pilis albis longiubcuhs articulatis basi incrassaHs apice glanduhfens inteimixto toniento albo \estitorn (v s in herb 'Vahl)

*** *Caule fohos*

- 4i C SPLICIFOLIA. (Fioel mss), canle stricto folioso corymboso oligocephalo, fobisquc lanteolalis deuhculahs snbtus giauns glabns, cauhms ses&ihbus, peduncabb umilons apite squamosis, IDOUCIO cylmdiaieo scabiobat>i laxiusculo *IL* ad fluMium Len^iu bibitiae Hier canle snpenus ramo&o, foliis paucis 1 inceolatis Gnu 1 sib 2 p 3o t i3 f 1 bon Folia corjacca avenia lanceolata obtubia&cula glanduloso-denticulata glauca subtus nti canlis floccosa Involnec squamae obtui>c doiso ad lent em &e^iht ID llll mis sea brae f eztimas laxmsculae gldbise (v s sp in heib. Schieb ? com in a cl Pallas)

- 44 C HETEROGYNA (Troel mss), caule erecto lamoso paucifubo paniculate*, folns glaucis &ubintegci]mi9 margine ciliatis scibns, ladic spatbulatu-lanceolatih petiol ids, caulmis hessilibus hneaiibns, pcdunculis apice mvouimoque fannosis, stigiu.itihns subtubus % ad tuples prope Ragusam DalmatiT, ad Jaderam Hierac stuppeum Reicbenb fl exc . p ?65 Hiciac glaucum Ascb il. jadi p 202° H I omasinu Host fl austr. 2 p 272? tested Weibeo. Habitus Hier glanci ven sed pappus fqregie albris plunierialii Stigmata sa?piissime i' siugulare in geneie exemplum Cplor herbs glaucus. I oka membranacea nervo piae&ertim ID a 1 pine pilis allib raolibus longissifly Tlubercnlo conico mgro persistenti usidentibus, mde ad lentcm quasi nigro-sennlata. (\ s sp coram a cl Welden)

45. C PCLMONARLXFOLIA (Fioel in ht 1837), caule erecto subaphyllo oligocephnlo, folns meuibianaceis reticnlatis glaticescentibns tiliatis, ladicトイdato-o\atis denticulatis, pcliobs vUlosib, caulin^c paucib biac'eilorimbub, capitulo cyhydraceo glabro gracih *If* in montibns Apennims Caulib \ix spithainalissimplex sur&um m pedunculos i ! dijsu<> gl ibei >oln exakte Pulmonanae officinal is tenuia subdiaphana subtus leticnlata Capitulum gtacile Prenanthidis Pappus frocln columnari dimidio longioi (v.s sp conini ad Jan)

- 46 C PYGMEA (I inn spec n3r), canle basi subranfoso deenmbente folioso, pcdunculis el on gal is subiuonocephalis apice in\luojsque <ano flotto<i>, folns pctiolalis lyiatis, lobo tcinunali mixuno subcoidito tlcudto, p< tfoliubus altcims minifiis *If* m glareoais aummaium Alpium Hefvta?, Sabaudix' Gallia, P-viena-ornin H. pinnellaefohum Gon in obs 57 » 22. f 3 opt. All ped t' i5 fa bon DC. il fr 4]> H Willd heib 1467s¹ Omalochne Cass Monn ew p 70 Hieracium py^m enin Lam II pumilum I inn Leontodon dentatnra Linn Leptitaune pruuella;folia Ltpeyi Achaeniura apice atte nuatum Pappus albns pluiiseualis

-)g mtegrifoha (Frrel ross), folns mtegns oianto-lanceolatih dentatis loDgr petiolanj, Boct mus. 2. p. 33 t 24 (v s sp tx Alp Helv) *
y incanescens (I reel mss), heibå toll praeseitim folns, dlbo-tomentosis m raonte 'Ventoso (v s. sp.)
<T glandulosa/lrat vans), pctiolis involucnsque glanduloso hirsatis (v. s. &p)
<. colorata (Froel mss), venfs fohoiara rafis (Helv. v s sp)

47. C IAWirs^loiDEs (Ticel in ht 1837) , canle striLto fdlioso paniculato-clymboso folmque hntis, mfenoibus lyxatis denlatis basi auuculato amplexi raulibns, supeiiionbus inlegns cprdal is lmplexicaahhus, involuci& lumbicatus atutii pednnruliske glanduloso-hispidib *If* in Pyrentornin otieirf sylva

piatisque' ft III Caiintbiā teste cl. Sfernberg H. lainp~~<~~.anooides Gouan obs. p. ^7 t 21. f 3. bon excl syn. Gmel. Hier. lapsanooides Willd, sp. 3 p. i58o. Soyena lainpsauoides Monn. e'ss p. 77 (v s. s.)

f. *copholepida* (Fioel. mss), caale eldtq lainoso foliisqne glabris, caulinis oblongis mtegus, mvolueri squamis obtusis. — Hieracium lyratam Schleich exs. cult. (v. 3 c. ex bort. gcett taur.)

48. C. SMYRN^EA (DC in litt. adAučb. 1837), caule crecto fohtoso sparse hispidō, foliis hi&pidulis, infēi longe petiolatis Iyiatis lobo teimiaali ovato dentato, super coidato-amplexicaulibus acumioatis acute dentatis, larai* apice corymboso-paniculatis scabns, mvol. glabriusculis — cuca Smyruam legitcl. Aacher-EIoy pi. exs. ri 336o' A/finis C lampsanoidi, sed fohto infetioia basi uon auricaldta , supetiora indivisa , iuvW glabnuscula (v s tomm. a cl. inv.)

49. C "ALUDOSA (Mcench meth 535), caule electo folioso corymboso folusque glabiis 1 etrorsuin denials , ladic oblongis basi attenuatis, cm him hastato-amplexicauhbus, bracteis involucnsque uigio-glandnoso-bispidis 2f in piatis et nemoiosisrivilosib Europe. Hieiacinm paludosuiu Linn. t,p T 129 Goaan obs. p. 76. excl vai f* Lati. ill t 652. f a fl dan t. 928 DC. fl. fi 4 p 3/* Bartfhodus palndosa Banmg. Geracii sp Mces.1 et Reichenb. fl. 2. p i368. Acba*nia cybuduca &tnata lunda sea flavo-fuscescentia Pappus multiseuabs.

/? . *exaltata* (Froel mss), caale sesqaicubitah coiyomboque glandulosu-bispl-dis H. paludosum All. ped t 28 f. 2 Pappab albas ad ni\em vergens. (v. v ad nvulos umbiosos Algoviac)

y. *glabrescens* (Froel. mss), caule oligocephalo, mvolucn paite sapenoie bractei&qc glabris. Bocc. mus t 54. (v. v sp)

§ *subumbeUata* (Tiocl. mss.), capilulis umbellatis. (v & sp)

f. *paciiflora* (Fioel mss.),^aule pedab bimpticli subuionocepbalo. (v. y bfi J^alpestr Algov)

50. C. I^RATA (Fioel. in litt 1837), canle electo Alioso corymboso-pamculato faliisque oblongis dentatis hiisutis, tadic. cauhuit>que infenoribus petiolatis runcematis, snpeiiionbns coidato-amplexicanibus, pedueobs involuciisqne glandulosu-bibpidulis. % ad margines sylvium ad Jeniseam Hieracium lyratam Linn sp 1129 —Gmel. sib 2 p 24. t. 9¹ baud bon Caubs fismlosus cubitalis basi glabrescens, lamis electis flexuosis polyccephalis*. Poba te-nua subdiaphana nid^na subtus subglaucescentia Corymbas coinpositus ad lentem gUndaloso ht>pidus Capitula forma et uiagmtudine H. paludobO simi-jia. (v\ s. sp. comm a cl. Gmel.)

Si. C. HIERACIOIDES (Willd sp. 3 p 1601) , caule electo folioso corymboso fohisque raoljiter Inrtis subintegernmls, ladic elbptico-ovatorum petiolis glabris, caulinis Unceolatis basi coidato-amplexicanibus, pedunculis involutiisqne nigro-bispidis % in sabalpmis Austria? Hungarian' Sabandiae^T Helvetia? Bavaria;¹ et in pratis raontanis Germanise mediae, Flvaci! forte in Labrador si H. molle videtr idem ex Mey' labr p 5q Hieiacium raolle Jacq. fl austr t. 129. Ciepis bieiacioides W|ildst. et Kit pi. bung 1 p. 4- t 70 Less syn. 137. Grracium suc(isaefolium Reichenb. Omaloclme •uccisaefoba Monn Wi-belfa hieacioic^s fl wett. Habitu C. paludosa? L proxiraa , à quā differt pappohiveo et flore anrantiaro Species ob indumenti et foliorum iigura? vanabilitatem passim confusa. Jacquiniana planta heibae hirsutie densa brevi molli et gfandalis mvolucn simplicibns excellit.

^. *Croatica* (Fioel. mss), caule folu&qnc minus hiitis pedoncalis glabrius-cuhs, mvolueri gland ulls simplicibns. — in piatis Hungariae (v s. sp. in beib. Willd. i46i)o'). H Croaticam W. fit %|. pi. hung t 218 Hoffm. flor 2. p 4^4. (DC. v s c.)

y, *succiscffoha'* (real, mss,), canle fohisque buto-bcnbriusj^is , ii)eduncuhs involuciisqup simplicity ^laB^nloso-lunib H. sacc is.crotium All ped 11 786 IDCflfl ffi 4 p. 28. Gmet. fl. bad tf. 'mtcgiifolimn Willd sp 3. p. 1578 ' Stuiin floi Jq opt. (v. v. sp)

- S. *gracilis* (Frcel. mss.), caule simplici oligocephalo foliisque glabriusculis remotè dentatis. Willd. herb. 1/J680! (v. s. s. ibid.)
- s. *glabrifolia* (Froel. mss.), foliis radio, omnino glabris. (v. v. in pratis herbosis udis.) «
- £. *Sternbergii* (Froel. mss.). involucro glandalis clavatis hispidulo. Schrad. in litt. aim. 1828. Glandulae in hac varietate stipitatae clavatae nee sub rotund ae ut in typo, stipite articulato albo: haec nota ex nostrâ observatione haud constans vix propriam speciem indicat. (v. v. sp. et. c.)
- 5a. C. CHONDRILLOIDES (Froel. in litt. 1887. uon Jacq.), caule erecto foliato oligocephalo foliisque linear-lanceolatis glabris, priuordialibus integris, reliquis elongatis angustè runcinatis, involucre oblongo hirsuto glabro. *£ in glareosis et saxosis Alpium orientalium, Hieracium Chondrilloides Jacq. h. vind. p. 273. t. 7. opt. Araciun chondrilloides Less. Caulis humilis i-3-cephalus foliatus. Capitula oblonga fusco-nigricantia. Folia primordialia seu gemmarum coetanearum integra. Pappus pluriserialis. Achaenia C. paladosae, cylindrica, apice partim attenuata.
- ^a. *Norica* (Froel. mss.), pedunculis apice involucrisque glabris cano-flocosis. — in rupestribus et glareosis Alpium Noricarum, Austria: Schneeburg in der Sangrube! Kreyn. P in Carpa this Liptoriensibus! Hungarian! Carintbiae? Jacq. austr. t. 4^9. opt. Willd. herb. 14670. n. 1. 3. 4 ! Lam. enc. 1. p. 364. Host. 2. p. 410. (v. v. sp.)
- y. *Rhaetica* (Froel. mss.), iuvolncris pedunculisque apice nigro-hirsutis. — in alp. Rhaeticis! Salisbnergi! Tyrolis! Bavariae! H. chondrilloides Willd. sp. 3. p. 1573. herb. 14670! n. 2. Schrank bav. n. 1172 ! Sturm flor. 39! DC. il. fr. 4. p. 36. Wahlenb. carp. 3. p. ifc. Crepis chondrilloides Moesl. et Reich, p. x403. Noricam plantam olini ab hac distinff, col lat is postea numerosis utriusque plantae speciminibus iuconstantiam indumenti involucri perspex^ (v. v. sp.)
- if. *dissecta* (Froel. mss.), caule longiore oligocephalo, foliis caulinis bngissmis pinnatifido-runcinatis, laciuiis linear-subulatis. — in Alpibus Algoviae. (v. v. sp.)
- «. *hirsuta* (Froel. mss.), foliis superioribus pedunculis involucrisque hirsutis. — in Alp. Tyrol. (v. v. sp.)
- £. *integrifolia* (Froel. mss.), foliis omnibus linearibns integris. — in Alp. Algov. (v. v. s.)
- w. *nana* (Froel. mss.), foliis caulem monocephalum abquantibus. — in Alp. Algov. (v. v. s.)
53. C. HYOSERIDIFOLIA (Reichenb. el Moesl. fl. n. 4577. Froel. in lit^ 1837), foliis omnibus lyrato-runcinatis glabriusculis caale monocephalo foliato superne incrassato longioribus, involucro crasso hirsutissimo. % in sunnus jugis herbidis Carnioliae, Tyibolis! Algovix! Helvetiae! Hier. hyoseridifolium 'Vill. mém. sur la décov. d'une nouv. esp. cum ic. bon. Zollikof. alp. flor. t. i_M opt. Pers. enh. 2. p. 370. Apargia hyosceridifolia Less. syn. i32. Leo n't. Ter-glovense Heig. pi. ladn. t. a. f. 1. Flos pro planla pygmxa maxim us foliorum fasciculo immerses. (v. v. sp.)
54. C. MONTANA (Reichenb. et Moesl. fl. n. 4578. Froel. in litt. icS37. non d'Urv.), caule erecto folioso monocephalo apice incrassato, foliis dentatis cilifitis, radic. oblongis in petioln'm decurrentibns, canliuis ovato-lanceolatis amplexicaulibus. % in pratis herbidis alpinis Austria!! Styria! Carinthie! Tyrolis! Bavariae! Helvetiae! Galliae! Hieracim inontauum Jacq. austr. t. 190. opt. Willd. herb. 14679 ' DC. fl. fr. 4- P- *9- ^{Vrccl, m} Schrank akad. Munch! phil. "• P- 59. Hypochacris Pontana Linn. sp. p. X140. Andry^a Montana Till, dauph. 3. p. 39^{1- a³}. Soyeria moniana Monn. cm. p. 75. Capiulum in genero* maximum. Recept. magnum convexum, alveolorum membranarum in ttfinissimas lacinulas cissa#hirruni nee villosum. Achania coluinuaia haul apiceqnc sub. attenuata. Involucruii campanulatuui. (v. v. sp.)

yS. *lanceolata* (Froel. mss.), caale i-cephnlo , foliiscaulinis lanceolatis sessili-
biis. (v. v. in Alp. Algov.)

>. *biflora* (Frcel. inss.), caule a-cephalo. (v. v. sp. in iisdem Alibus.)

55. C. FOETENS (Frcel. in litt. 1837. non Linn.), caale erecto ramoso oligocephalo, foliis oblongis lyrato-runcinatis glabris, radical, peliolatis, caulinis hastato-atiriculatis , pedunculis iuvolucrisque corno-lomentosulis. % in Armeniâ. Hieraciurn foetidum Willd. sp. 3. p. i5?5. herb. n. 14646! H-ihitu formac pygmaeae Oep. biennis L. affinis. Canlis subbipollcaris et ultra, rainis palulis suh-i-cephalis. Capiñluro ovatoim imbricalum. Flos lucus. (v. s. sp.)

56. C. FOPKICULACEA (Frcel. in litt. 1837), caale ercta subfolioso paniculato snlcato gliinduloso-hispido, foliis pinnatibclis, segmentis linearibns roncronatis integris partitjsqne inrequalibus basi decurrentibus, pedunculis involucrisque albo-tomentosis. If, ? in iissuris rnpiuin et pratis saxosis Foro-Julii ad Duiuiu (Rrign.), ad montem Zhaun (Graf.:), in Carniolâ circa Quell et L'rusecum, Terfjesti in M. Spaccato. Andryala chondrilloides Scop. earn, x p. 115. t. 5a. haud'bon. Beiniia andryaloides Brign. forojul. p. 60. Crepis chondrilloides Jaçq. vind. p. 3 |i. Crepis Adonis Spreng. png. 1. pJg'S. sysf. 3. p. 6H7. Barkbausia rhomlrl. Bluffer. Fingerh. fl. 2. p. 30|. Flos Crep. rigidae magnitudine et for nta siniilis. Capitulum ovatufn imbricatum. Receptaculurn foveolatnm , fbveolaruui marginē in juvenili planta in denticnlos setaceos aliquot fiso bispidum , dein glabrum. (v. s. s.)

{' Species non satis notce.

57. C. JETHEKSIS «(Presl fl. sic. i.(p. XXXT), caale adscendente sabapbyllo ^oligocepalo , foliis runcinato-pinnatifidis glaberrimis, lobis horizontalibus ovalis, invol. villosis, calyculo adpresso. — in Siciliâ. Cast. ign.

58. C. AAncutifOLIA (Sieb. in Spreng. J^rst. 3. p. 634), scapo bifido oligocephajo ad basin et ad ramificationes lanato, foliis radicalibus spathulatis g'a # be rmm is gliucescentius sur'sura dentatis, involucro albo-touentoso. — in Cretâ. f

59. C. COR i ACE A. (Horn. b. hafn. 2. p. 768), foliis lanceolatis dentatis rigidis glabiis, superioribus linearibus integerriruis , caule paniculato , pedunculis inferioribus longioribns. (2) pair, et caet. car. ign.

(60. C. ETEGANS (Hook! fl. bor. am. 1. p. 297),humilis glaberrima, radicemultiplici, caulinis erectis dichotomis polycephalis, foliis inferioribus spathulatis, snperioribus linearibus, involucris cylindraceis, acbsenii tenuissimè rostratis. — in Amer. boreali ad Assiuboyne river. Afiiuis C. nanae. Au Barkhauiae spec?

61. C. FILIFORMIS (Tiv. fl. libyc. 5r. t. 21. f. T. non Ait.), scapis è collo pluriniis., aliis filiformibus nudis i-cephalis, aliis subfoliosis polycephalis, foliis liueati- lanceolatis elliplicisque iniegris vel remotè sinuato-dentatis, invol. setnoso, squamis calycult linearibns laxis. % in Cyrenaica. Pappus sessilis scaber.

61. C. ^LANDULOSA. (Bast, inDesv. journ. hot. 1814. p. 17. nonGuss.), caule credo basi sulcato hispido, ramis floralibus striatis subnudis, foliis hispidis runcinatis, involucris piloso-glandulosis. — in uiontibns Arvemias propè balnea Moniis-Aurei. Hwba 2-3-pedalis. Calyculus adpressns persistens squann's margine scariosis. Acbaenia striata certè erostria, mndè videtur diversa à Uarkh. pingui Keichenb. (v. s. acha?n.)

T>3 C HYOSEROIDES (Sibth. fl. grac. I. 809 ex prod. 2. p. i3p,), foliis inferioribus obovalis integerriinis, superioribus sngittalis subdentatis, ramis i-t;epbalis, involucro piloso. (ijin caupis Thraciae. Caet. ign.

64. C ia ^WA (Siblli. fl. gra?c. t. 82. ex prod. 2. p. i36. non Lapeyr.) , oaule

patnlo, foliis innecnato pinnatilidis lanatis sessilibas, summis hncelatis, in-
volucns densissime lanatis (f) ID Eaboea

65 C INTEGRIFOLIA ('Vest in florå 1820 p 7), taole tamoso «uloato folioso
coiymboso, ramis supra capitula centiaba pi ccocio^a elihs, folus lutagus et
integeriimis glabns lanceolatis sessilibus, invol pubescentibus sqiitmis acces-
soi lls fihfoi nubus —pit ign

66. C IJEVIGATA (Dumoit fl belg prod 61), caule erecto folii&quc laevissimis
glabns, iadicabbus mcccinatis vel niucinato pmnatihdis, sumni s 1 mceolalis ,
invol. costatis rauicatis (2) in Belgii rupestubai piope Torndciira

67 C² LAPPACEA (Willd ip 3 p 1D99), canle eiccto bispido laims 1 cephbs,
folns sessibbus hispidis oblongis siuato-dentatis pednntulis inciis>>aMs, in-
vol fiuctifens angul ttis, squamis exteuonbus liueaibus- selo&o bispidis. (t)
patr ign An potius Lndopterae spec Affinis E Dioscordis?

68 C MACROCEIHALA, folus radicalibus oblongis clentienlatis, cauTmis fuferioiu
bus sessibbus oblongis dentatis supenoibns lanceolatis integeuimis Mgittdtis,
involucro addresso cauleque Inrsutis If patr ign C giandiflo i Willd enum
suppl 56 non 11 eel I aties C Sibincae Caulis sulcitus Capiti.11 magna co-
lymbosa

69 C³ MDLTII-LORA (Sibtb fl gra?c t 306 ex prod 2 p H8), canle lainosissi-
ino, folns amplexicaulibus runcinatis glabns, supenoribus si^itt His , invol
setosis (T iu cam pis rbiaiaL? An foite Baikhaosio. sp ** Affinis li setosse

70 C NIGRICAWS ('Viv fl hbyb^i T 10 f 3), setuloso bispida, caule ciecto
divancato lamoso, folns cauhnis lauceolatis amplexicaulibus inciso dmtdtis,
summis integeriimis, invol cyhndiico setis nigiellis hispidulo, s [uanns caly-
cuu lineaibus acutis potentibus —in monlibus Cyienaice Pappns dicitnr
sessiUs pibs densissimis simplicibas, ergo ad Picidium at \oluit Spiengel non
referenda *

71 C PANICULATA (Presl fl sic p xxxi), caule erecto* bisi 1 inugiuoso, folus
lyiato-pinnatifidis glabris, lobis omnibus confoi nubus I tuceoldtis smuato in
esis aculis, nifinioium lobo tcnmnali maximo tn ingulari rotuudato capitubs
pameculalis, pedicelhs \lllosullls , involucro tomentoso Cdnescen*e, calyculo
addresso — in Sicibd Ca?t ign

7a C PUNGENS (Desf hoit pai ex Pers enh a n 20), folns oblongis laci-
matis glabns lachi cauleque setoso bispulo, capituhs subcoiymbosiii, non-
nulbs sessibbus, invol muricahssubfarinosis —patr igu

73 C RADICATA (Sibth fl grac t 800 ined ^x prod 2 p i36 non loisk),
scapis i-cepbabs fobolosis, folns iadicdbbus luncinito lyiatis sc ibns,involu-
cro tomentoso, squamis exteuonbus laxiu<cahs % in uenosis in utiinis ad
Ponlum Euxinum piope I mai Ciep Tbracia Spieug syst 3 p 63/f Ci
radicata 1 01 sk est Picudis sp

74 C SAGITTATA (Wend ind sem b maib. 1829 ex linnajd 18 JO litr p 54),
caule eiecto himo snperne subcoryraboso \amoso glabio, foli₁₈ mfenonbuJ
longis in petiolum decurrentibus, super sagittato- implexicaulibus, omnibus
inaeqnaliiei dentatis glabnuscnlis, invol setoso If pdti ign An eadein ac C
grandiflora ?

75 C TRIAWGULA (Pieslfl sic p xxxi del prag (182^) p n'o), caule sc>-
posoadscendenteshabphyllobasipetiolisqiijerfiisino apice poly(ephalo folna
lyi ito-pinnatifidis, lobo teimm ill tuanguJo, invol ^Idbennni sqnimis'ldxis.
00 in pi itis niont mis piope Panormum Sicihaj. Capitula par^feie Baikbai^
siae Leontodont.s,imo m.noia Acbaenimm erostre (ex Piesrffnec ut in ca-
breMter rostiatnm An ceite diveisai"

J J Species exclusoE

C AIBTDA Vill = Baikh-insia albidi

- C. ALBIDA All. = Hieracium alpealre y ex Frail.
- C. ALPIWAL. = Barkhausia Alpina.
- C. ALTISSLMA Balb. =r. Tolpis aliissima.
- C AMBIGUA balb. == Tolpis altissima.
- C APARGIA Pers. = Willeinetia apargioides.
- G. APARGIOIDES Wilid. = Willemetia apargioides
- C. ASPBRA Linn. = Endoptera aspera.
- G. ASVERA l*oir. = Picris iutegri folia.
- C. AUSTRIACA Jacq. = Hieracium blattarioiden.
- C. BANNATICA Willd. = Barkbañsia setosa.
- C. DARDATA Linn. z= Tolpis ba^bata.
- C. BARB VTA Mill. = Barkhauhia feet id a.
- C. BELLIDIFOLIA DC. = Barkhaiihia bellidifolia.
- C. BELLIDIFOHA var. Lois, z^z Barkbatibia Saffreniana.
- C BIENNIS Bieb. = Barkhausia Marschallii.
- G. SIENNIS Lapeyr. t= Baikhausiä taraxacifolia'.
- G. BOETICA Mill. == Tolpis barbata.
- C. BURSIFOLIA Linn. == Barkhausia bafsifplia.
- C. CERNUA Ten. = Barkhaasia Suffreniana.
- C. CINLREA Desf. = Barkhausia taraxacifolia.
- C. CORONO^IFOLIA Desf. = Tolpis coronopifolia.
- C* CRITHMIFOHA Link. == Tolpis crithmifolia.
- C. CROATICA Horn. = Endoptera Dios^oridis.
- G. ECHioiDEFI All. = Helminthia echiooides.
- C. FILIFORMIS Ait. = Tolpis (Iliformis.
- C. FOETEWS Link. = Barkhausia fcetida.
- G. FOETIDA Linn. = Barkhausia foetida.
- C. GLANDULOSA Guss. = Barkhausia glandalosa.
- C. GLOBIFERA Hall. f. = Endoptera Dioscoridis.
- G. GRAMNxFOLIA Ledeb. = Baikhausia tennifolia.
- C. HETLROSPERMA Schrad. = Endoptera Dioscoridis.
- G. BIEMALIS Guss. = Baikhausia taraxacifolia i.
- G. HiERACiDEs Lam. =: Picris hieracioides.
- G. HIERACIOIDES Schkuhr. = Picris laoiniata.
- G. HIRTA Pers. = Barkhausia Balbisiana.
- G. HISPIDA W. et Kit. = Barkfraasia setosa.
- G. HISPIOSSIMA Bartl. = Picris.lajimiata.
- C. UIISPIDULA Delil. = Oporinia hispidula.
- C. INCANA Lapeyr. = Andryala lanata /6.
- C. IWCARKATA Yi_u, = Barkhaasia rubra.
- C. IWTYBACEA Brot_u Barkhausi^ intybacea.
- C. LACIWIATA Schkuhr. = Picris laciniata.
- d LAPPACEA I^pyr. = Picris hieracioides.
- C. LAPPACEA Host. = Picris laciniata.
- G. LKOKTODOHTOXDM All. = Barkhaosia leontodontoides.
- C. MACROPHYM.A Desf. = Baikhausia uacrophylla.
- G. MACRORHIZA Low. = Tolpis macrorhiza.

- C. MURICATA` Si^h. = Endoptera asp era.
- C. NEMAUSEHSIS GOU. r= Ptetrothcca Nemausensis.
- C. NUDA Lam. = Pterotheca Nemausensis.
- C. PATDLA Desf. = Endoptera Dioscoridis.
- C. PATOLA Poir. = Lampsana virgata.
- C. PECTINATA Low. = Tolpis pectinata.
- C. PINNATIFIDA hortul. zzz Achyropappus pinnatifidu*.
- C. POLYMORPHA Pour. = Barkhausia taraxacifolia.
- C. PORRIFOLIA D o n .= Barkhansia porrifolia.
- C. PR^COX Balb.zz: Barkhausia taraxacifolia.
- C. PTEROSPERMA hortul. == Endoptera Dioscoridis.
- C. PULCHEFIRIMA Kisch. == Barkhausia* tenuifolia.
- C. PURPUREA Biv. = Baikhausia purpurea.
- C. PDRPUREA Bieb. = Intybellia purpurea.
- C. RADICATA l'ors»k. z= Picris radicata.
- C. RAPHANIFOLIA. Willd. = Baikhausia raphanifolia.
- G. RECOGNITA Hall. f = Baijthausia recognita.
- C. RHAGADIOLODILS Linn, = E^Qptoi^ rhagadiolus-
- C. RUBRA Linn. = B a r ~~hansia~~ ~~hansia~~ -
- C. RUBRICULALisPcrs. = B^ik]^Kp faraxacifolia.
- C. RUDERATES Beach. = Bä'koansia taraxacifolia.
- C. SCABRA Lapcyr. = Picris liieracioi^s.
- C. SCARTOSA Willfi. == Barkbaosia scariosa.
- C. SENECIOIDES Delil. = Barkhansia senecoides.
- C. SETOSA Hall. f = Barkbausia-setosa.
- C. SIWUATA Lam. = Picris asplenioides.
- C. SPATHULATA` Guss. == Baikhatabi^ spathlnata.
- C. SPRENGERIANA Willd. = Picris paaciflora.
- C. STRIATA Thunb. = Hieracinm Capense.
- C. SUCCULENTA Ait. = Tolpis friiticosa.
- C. SOFFRENIANA Steud. = Barkhausia Suffreniana*
- C. TARAXACIFOLIA Thuil. = Baikhausia taraxacifolia.
- C. TARAXACOIDES Willd. = Barkbausia taraxacifolia.
- C. TAURINENSIS Willd. = Barl^iaubia taraxacifolia.
- C. TAURINENSIS Bieb. = Barkhaasia Marschallii.
- C. TECTORUM Till. = Baikhausia taraxacifolia.
- C. TEicuiFOLiA Willd. = Baikhausia tenuifolia.
- C. TENITIFOLIA Banks. = Tolpis pectinata.
- C. TOMENTOSA Moench. = Endoptera Dioscoridis.
- C. TRICHOTOMA Mcench. = Tolpis coronopifolia.
- C. UMBELLATA Bernh. = Hieracium umbellatnra.
- C. VERSICOLOR Fisch. = Ixeris versicolor.
- C. VKSICARIA Linn, zz Barkhausia vesicaria.
- C. vEsiCARiA^Balb. = Barkhansia taraxacifolia.
- C. TIRGATA Desf. = Tolpis altissima.
- C. VIRGATA Lapeyr. = Picris hieacioides.

DCCGXXVIII. PH[^]NOPUS. — *Phasníxopus* Cass. diet. 39/7. %). 48. p. 4*6, Reichenb. fl. exc. l.p. 272. Less. syn. 137.—*Prenanthis* sp. Linn.—*Lygodesmia* sp. Don.

Capitulum 5-florum, floribus uniserialibus. Invol. cylindraceum subirnbricatum. Recept. angustum nudum. Achajnia teretia exalata in rostrum attenuate. Pappus pluriserialis, setis filiforinibus. —Herbae ramosoe glabrae erectae. Folia radicalia et inferiora pinnatipartita. Capitula secis ramos super, spicato-racemosa. Cor. flavae.—Genus medium inter *Prenanthem* et *Chondrillain*, à priori achaeniis rostratis, à posteriori rostro sensim necabrupteorto uer squamellis basi cincto differt.—Women *Gassiuianum* paululiiin amandavi ut characterem classicum, nee phenomenon, plurimis *Cichoraceis* communem, exprimat ! *paiyo?*TM?, enim graecè sonat: stipes manifestos.

- 1. P. VIMINEUS, caule credo tereli laevi ramoso, ramis inermibns, foliis infer, piuatipartitis, super, indivisis., oiiinii)iis in lairqnam cum caule coadunatam linearem decui rentibus, capitulis spicalo-subracemosis. (2) in lap id osis secis vias vineas et agios Europsc australis et mediae ab Hispauia ad Tauriam. *Prenanthes viminea* Linn., sp. 1120. Jacq. fl. austr." 1. t. 9. All. ped. t. 5i. f. 2. *Chondrilla viminea* I?am. diet. 2. p. 27. Chqpfl. sessiliflora Lam. fl. fv. 2. p. 104. *Phaenixopns deenreqs* Cass. diet. ^k'Jfftfi¹, ^ ^ xⁿi^x* vimiiieus Rcb. fl. exc. 1. p. 272. *Lactuca decorticata* KorsK 1^%> a 18. Caulis albas. Pappus longe et graciliter rostratus. (v. v. el s.) £

yS. *integrifolius*, foliis canlinis ferè omn^>usiJineari-lanceolatis integerriniis.
(%) in Siciliâ ad Messinam legit cl. G'ussftne. (v. s.)

y.? *ramosissimus*, caule humili raiyosissimo, ramis apice rigide spinescentibns. (2) in arenis'uaritimis Nicsca?, Grapiae, Persiae, ad radices moutis Sinai (Schimp.), in Hispania Granatensi (Boiss.) *Prenanthes raiuosissima* AIL ped. n. K3o. t. 33. f. 1. Preu. viminea £. ft. fr. n. 2881. *Chondrilla ramosissima* Zeyh. ex Steud. Pboenixopu^s ramosisiimus Reichenb. fl. exc. 1. p. 27'i. Decurrentiae foliorum duplo breviores quam in var. a. et /?. (v. v. et s.)

- 2. P. TRIQUETEIX, caule erecto acnte triquetro ramoso, foliis infer, obovato-oblongia-acuminatis dentatis, capitulo linear-lanceolatis integerrimis sessilibus, capitulis spicato-racemosis. £ ex Labill. forte (2)? in Libano ad montium radices (Labill. Auch.), in Aderbeidjan (Auch.). *Prenanthes triqueta* Labill. syr. dec. 3. p. 4- 1- 2. Bové! pi. exs. n. 434. *Lygodesmia triqaetra* Don. Achaenia breviter rostrata. (v. s.)

- 3. P.? AC:AKTHIFOLIUS (Cass. diet. 48. p. 4*6 sab Bhsenixopo), foliis lyrato-run-
cinatis denlatis amplexicaulibns glabris basi latiatis, capitulis subsessilihus
glouieratis in spicain Ion gam digestis. If in Creta. *Lactuca Cretica* pereuni⁹
altissima acanthi folio Tourn. cor. 35. *Prenanthes acantbifolia* Willd. sp. 3.
p. 1642. *Chondrilla acanthifolia* Poir. suppl. a. p. 330.

+ Species exclusa.

V. INTTBACEUS Less. = *Brachyramphas intybaceas*.

DCCCXXIX. BRACHYRAMPHUS. — *Sonchi* sp. *auct.*

Capit. io-i5-flornm. Invol. oblongum imbricatum, squamis acumi-natis margine scariosis. Recept. nudum. Achaenia oblonga muricata in roslrtun breve sensim attenuata nee angulala nee costata. Pappus pluriserialis mollis albus pilosus. —^ Herbae regionum orbis subtropicarum ortae erectae glahrae ramosae. Folia runcinata dentata. Gapilula race-

moso-spicata. Florcs lutei. DilTert à Soncho et à Picridio achaeniis a pice iitlenuato-roslralis, à Microrhyncho achaeniis 11011 angulatis, à Phae-nopo numero florum.

1. B. iNTyBACEU\$, cacle tereti laevi apice laxe' paniculato, foli Is roncinatis dentato-ciliatis obtusis amplexicaulibns sagittatis, radicalibus obovatis, capitulis secus rainoi remotis solariis pedicellatU cylindrnceis. (l) ad vias in ins. Sancti-Thomasii (Less.). *Lactuca intybacea* Jacq. ic. rar. T. t. 16a. coll. i. p. 53. Less, in linnxâ 133i. p. 7*21. *I?haenixopijs intybacens* Less. syn. *liy. Cicerbita intybacea* Wallr. scbed. p. 435. Invol. ex icon, videtur subsimplex. Flores sulphnrei. Pappus in descr. Jacq. dicitur sessilis, ex Less, potius breviter stipitatus et achscnia transversè rgnlosa. Cqplnla 14-Aora.
2. B. CAUD/EUS, glaber, caule erecto nudo parcè rainoso, foliis radicalibus sub-sessilibus basi altènnatis oblongis aenminatis inncinaiis ciliato-serratis, capitulis secùs r^mos remolè spicato-raceinosis geminis , pedicellis sqbamellosis. — in Gnadalupi legit cl. Bertero! et in Porto-Ricco cl. Wydler. *Sonbus ta** raxacifolins è Guadalupâ ortns Spreng.! syst. 3. p. 64*« excl. syu. *Acleria breviter rostrata sabinmicata*. Species 15. *intybaceo affinis*. (v. s.)
3. It. GOR^ENSIS, glaber subglauccescens, caule erecto nndiusculo apice ramoso, foliis runcinatis ciliato-spinulosis, capitulis secùs rainos paucis racemoso-spicatis, pedicellis brevibus squamosis. (lj in insuli Afric. occid. Goréc (Lam.), in Senegambix rgione Walo Jocis inundatis ad fl. Senegal (Perr.). *Souchus Gorrceus* Lam. did. 3. P^fe7« Willd. sp. i. p. 1514. *Sonbas ciliatus* Perr.! in litt. *Achaenia muricQlata^friter rostrata*. (v. s.)
4. B. OBTUSUS (DC. in Del ess. ic. sel. 4. t. 96), glaber glaucns, canlibns pluribus erectis dicbotomis subnudis, foliis radicalibus oblongis obtusis ciliato-spi-nellosis obtusè runcinatis, cauiinis paucis acutius lobulatis, capitulis spicato-racemosis. @? in Indiâ orient, ad Sabedguuj legit cl. Hamilton. *Prenantbes obtusa* Ham.I'berb. Wall.! cat. com p. n. 186. Folia rad. basi attenuata Don verè petiolata. *Acbaenia laeviuscula brevissimè rostrata*, ex statu immaturo ju-dicata. (v. s. coimm. ab hon. cur. mere. angl. Ind. or.)
5. B. SONCHIKOLIUS, glaber, caule erecto basi folioso apice nudo parcè rauioso, foliis membranaceis amplexicaulibus obovatis sinnato-subruncinalis iuargine' seto.HO-ciliatis, capitulis secùs rainos remotè spicato-racemosis, pedicellis bre-vissiiniis snbsquamosis. (l) in Indica peninsula frequens (Wight!). *Cacalla son-chifolia* Wall ! oar. n. ^144. var. D. *Lactuca remotiflora* DC. in Wight contrib. p. Q6. *Achrcnia nblonga subcompressa transverse muriculata in rostrnm breve attènuata.*" *Pappus albus niollis*. (v. s.)
6. B. TARAXACOIDES, glaber, caule erecto striato apice panioulato, foliis infer..., snper. hastato-aiuplexicaulibns acuminatirismis grossè et acutè inciso-serratis, capitulis gcmnis ternisve breviter pedicellatis secùs rainos remotè spicato-rn-oemosis, biacieis bractt'olisqne parvis subscariosis. — in Indiâ orieutali legit cl. Rnssel. *Prenanthes taraxacoides* Wall. cat. comp. n. 189. *Caulis bas. crassos iistulosiM. Acbwnia oblonga in rostrum breve attenunta ninriculata. Pappus albus inollissimns.* (v. s. in herb. coet. mere. angl. Ind. or.)

DCCCXXX. CHORISIS. — Cborisma *Don in linneed* 1830. litt. p. 141. non *LindL* — *Pienanbis ^. Linn.*

Gapit. 10-12-floruni. Invol. 8-1 o-phyillum basi calyculaUim, squa-nis scarioVis. llecept. midilin. Achtenia subiusifonna compressa sul-cala glaljra apice allcnuata , disco epigyno dilatalo. Pappus inollisfugax uiserialis. —llerba borcali-Asialica repens glahru. Folia radicalia pe-liolnta tripartita , lobis lateralibus bi-, medio Irilobulato, caulin.i pauca lanceolata denlala^ Capitula 1-3 ad iipiccm caulis. Florcs ccernlei.— Glioësis idem sonat ac Cliorisma. —Genus mihi caracleribus subdu-Iminrsed ex habili distinctissimum.

1. C. REPENS *If*, in insulis Curiensibus (Don.), Kamtschatka (Linn.). Prenanthes repens Linn, aiiccn. acad. 2. p. 360. t. 4. f. 3. Chondilla repetis Lam. diet. 2. p. 79. Caalis hnmifasas sab nodis racKcans. Capit. pro ratione plants inajuscula,

DCCCXXXI. ZACINTHA Tourn. inst. 47*/>. t. 269. Gcertn. fr. 1. p. 358. t. 157. f. 7. Schreb. gen. n. 1*148. Cass. dice. 60*p. 228. Less. syn. i38. — Lapsanae sp. Linn. — Hedypnoidis sp. Juss. — Rhodadioli sp. All.

Capit. pluriflorum. Invol: squamis parvis calyculatum, ceterum 8-phyllo, squamis post anthesin dorso gibbis crassis concavis achacnia extima foventibus apice coDniventibus. Recept. nudum. Achsenia plano-compressa exalata fer& cuneiformia, in rostrum brevissimum attenuta ex Less., erostria ex Gaertn. Pappus uniserialis, setis scabridis caducissimis. — Herba annua dichotoma ferè glabra regionis Mediter* ranca* incola. Folia radicalia runcinata, ramca linearis-subulata integrata sagittata. Capitula terminalia aul lateralia sessilia. Flores lutei.

1. Z. vhRRucosA (Gaenn. 1. c). (ij in agris canticis et sterilibus Galloprovinciae, Ligoriae, Italiae, omnium fere insnl. Mrdileiranearum, Taariae, Barbariae, etc. Z. verrnensa Dejf. i\l. atl. a. p. 233. Lapsana Zacintha Linn. sp. 1141. Zacintha, Math. hist. 389. ic*. Cam. epit. 287. ic. Rbagadiolus Zacintha All. ped. n. 834. Zacintha pendula Racusch. (v. v. et s.)

ji. integrifolia, nana oligocephala, foliis indivisis vix dentatis. (T) in insnl Naxo. Oliv. et Brag.! (v. s.)

DCCCXXXII. HETERACIA Fisch. et Mey. ind. sem. k. petrop. 1835./>. 29. ann. sc. nat. hot. 1836. /?. 121.

Capit. multiflorum. Invol. campanulatum squamis 8 ad medium concretisconstans, basi squamellosum. Recept. planum nudum. Achaenia exteriora obpresso-tetragona suberoso-corticata breviter rostrata papposa, &lcra subtetragona in rostrum longissimum desinentia popoluriseriaii subserrulato capillaceocorouala. — Herba Orientalis annua glabra ramosa. Radix exilis simplex. Can I is fistulosus. Folia sagittata runcinata. Cnptula, alia terminalia, alia inter dichotomies aut lateraliter scciis ramos sessilia solitaria. Cor. flavaj. — Genus valde affine Zacinthae..

1. H. SZOWITZII (F. et M. 11. cc). (J) in cam pis salsis a rid is propè Nakitschiwnn Persia; Rossiae conterminis. (v. s.)

DCCCXXXIII. ENDOPIRA. — Crepidis et Picridis sp. auct.

Capitulum multiflorum. Invol. duplex, squamis ext. brevissimis, inter, convolutis torulosis post anthesin conniventibus achaenia radii tternium invoiventibus. Recept. favoso-areolatum subfimbrilliferum. Achaenia radii erostria aut brevissime rostrata intiis i-alata, disci longiis rostrata intiis exalata. Pappus piliformis pluriserialis tenuissimus. — Herbae Europeae et Oricfitales annuse ercta ramosa*, saepiis pilis rigidiis sparsis asper.-p. Folia caulina semiamplexicaulia, cordata sen sagittata, grossè et irregulariter dentata. Capitula malura subglobosa. Flores lutei. — Nomen ex tvfov intiis et fftipov ala.

Sect. i GATYONA. — Gatyna Cass. diet. <v. 18. p. 184. v. 25. p. 62.

Less. syn. i38.

Achaenia radii lacvia incurvata suberostria, disci transversi Htriata bi-pviev rostrata.

- i. E. DIOSCORIDIS , caule foliisque glabris, invol. sqnamis subcanescentibns, exterioribus linearib-snbulatis parvis.(T)in Galliā"(Linn.).Germaniā anstrali, rfel veliā propē Hasileam (Scbl#cb.!), Hnngariā, Croatiā (Host), Pedemontio (ftalb.!), Belgio (Reicbb.). Crepis Dioscoridis Linn. sp. n33. DC. fl. Ir. n. 2944. ic. gall. t. 18. Scbkubr bandb. t. 222. Crepis globifera Hall. f. in naturw. anz. 1818. p. 91. Picris, globifera Desf! hort. par. cat. ef. 1. Poir. diet, snpl. 4. p. 409. Crepis tomentosa Mceneb et Crepis patula Desf ex Steud. nom-pban. '235. Crepis Croatica Horn. h. bafn. sup pi. p. 90. Gatyona glubulifera Cass. 1. c. Crepis heterosperma Schrad. Crepis pterosperma bortnl. Herb.i pedalis et ultrā. Folia tennia, infer, rrnnrinato-lyrata hasi attenuala. Rami flordi elongati teretiuscoli. (v. v. et s.)

Sect. 11. NEMAUCHENES. — *Nemauchens* Cass. *diet.* 34- *p.* 362.

Less. syn. i38. — *Nemäuchenes* sect. *Barkhausiae* *Reichenb:* fl. *cxc. i. p.* 255.

Achamia radii compressa erostria pnbescenria, alâ in cornn subexsertâ, disci Jongê et gracilè rostra ta.

ft. inermis, caule pilis sparsis longioribns flaccidioribus sabbispido. — Ne-
maucbenes inermis Cass. diet. 34- p- 363. Var. ut videtur ex nlt nr̄a orta.
(v. v. c.)

DCCCCXXXIV. PTEROTHECA *Cass. bult.philom.* 1816. p. 200. 1821. p. 11S.
diet. sc. nat. 25. p. 62. 44. p. 56. *Mey. enum.* p. 28. *non Presl* i83i (1).
Trichoorepis *Vision.* — *Lagoseridis* sp. *Bieb.Jl. taur.* *sdpl.* (1819),?. 538.
Oepidis *Hieracii et Andryala;* sp. *auct.*

Capitulum multiflorum. Invol. campanula turn squamis subbiseriali-
bus constans et squamellis nonnullis parvis basi calyciflalum. Recept.
paleis piliformibus elongatis instructura. Acha3nia radii oblonga su^e-
rosa suberostria, invol. squamis subinvoluta, extiis convexa , intiis cos-
tis 5-5 ataeformibus aucta : disci cylindracea gracilia nspercula rostrata.
Pappus pilosus mollissimus , in fructibus- radii valdè deciduus, forlè
inierdiim. nullus. — Herba regionis. Mediterraneæ incola , annua , plus
minus pilosa aut glauca. Loba rauca uiridu-ovata , den-
tata aut iruncinata. Scapi sæpius plures , apice raro 1-2-cephali , sæpius
corym bosi, basi pilosi , apice piloso-glandulosi. Flores flavi subtus ru-
bentes.

1. P. NEMAUSKHSIS (Cass. 11. cc). ® in agris et aridis GalliaB anstralis, insul. Mediterraneanm, Italiae, Dalnjatia?, Gra?cia?, Caucasi, Palestina?. Hierackm sanctam Linn. sp. 1127. Andryala JVinea?ensis"Vill. danpb. 3. p. 66. t. 26. **DC.** fl. fr. n. 2940. Andryala nndicanlis Lam. diet. i. p. ^ 4. Crepis NetuaQsensis Gon. ill. 60. All. ped. n. 809. t. 76. f. 1. Crepis nnda Lam. fl. fr. 2. p. n.o. Tiicbocrepis bifida Vis.! stirp. dalm. p. 19. t. 7. Cu-pis-burj»ifoia l'all. ex Stead. Van'at glabrioscula, pilosa,aat hispid issimu. (v. 's.)

' 0 PtiTotheea Presl est Cyperacea ad Haplostylidem referenda.

rifcCCXXX'V. LOM ATOLEPIS* Cass. diet. 48. p. 4«(excl. sp. 2»), Less. tyn. 138.

Capit. multiflorum. Invol. subimbricatum, squamis margine scariosis, exterioribus ovatis calyculum ferè simulatibus. Picccpt. nudum. Achacnia glabra coAplanata quadrisulca bialatn, alis sibi oppositis, rostro brevi fragillimo. Pappus inultiserialis, scis filiiurmibus tenuissimis. — Herba glabra TEgyptiaca humilis. Caulis brevis basi foliosus. Folia runcinato-pinnalih'da, lobis obtusis minutè denticulatis, dentibus subscariosis*. Capitula subpaniculata. Flores flavi. Pappus invol. non superans.

I. L. GLOMERATA (Cass, diet. 1. c.). (p? in Kabiri desertis (Sieb.), in Arabiae deseio circa Djeddam nrnon cirra Cisternan ad aggeres (Scbimp ?a. 380). Cbondrilla capita^ Sieb.! pi. exs. reg. Souchus capitatus Sprung, syst. 3. p. (tfo. Subacaulis subglauccstens. (v. s. ex coll. Sieb. el Scbimp.)

-j- *Species exclusa.*

L. HUDICAULIS Cas9. = Microrynecns nudicanlis.

DCCCXXX"VI. INTYBELLIA Cass. bull, phiom. 1821./7. indict. i3.p. 547-
Less. s)7i. il»]. non Monti. — Myo&cris Link inuhi. a (i3aa),/». agi. — Lago-
soridis sp. llcb. — Crepidis &p. Bicb.
*

Capitulum miiltiflorum. Invol. subcampnnulatum calyculutiim, squamis inter, i-serialibus margine subscariosis, cxlcr. paucis, ininimis. Hcccpt. fimbrii lifer um, funbrillis lincari-setaccis nbcicuia fore superantibus palcas simulantibus. Cor. ad npiccm tubi villosae. Acliajuia cylindracca vix utrinque subattenuata croslria striatula. Pappus pluriserialis pilosus albus. — Herba Taurica ^erennis ad collum ramosa et ioliosa. Caulcs nudi saepiis ramosi. Folia runcinato-pinnatifida ptiolala glaucescentia, junior! -pilosiuscula. Flores roseo-purpurei. — Genus fer6 medium inter Crepidem et Soncbum.

1. T. puRpnnEA. % in Tiiuriac. haxosis cretaceis. Uieracium purpiirenm Wlld. sp. 3. p. 156a. Crepis purpurea Bieb. fl. taur. n. 1616. Lagoseris Taurica Biel. suppl. 539. Lagoseris crepoides Biel. pl. ror. ross. 1. t. 30. Lagoseris purpurea Stev. in litt. Myoseris purpurea Link enam. a.p. 291. Intybellia rosea Cass. did. a3. p. 548. Intybellia Taurica Less. jyn. 144. (• ».)

DCCCXXXVII. M1CRORIYNCHUS Less. SJH. i3g. — Khabdoibrea Cass. sc. nnt. 48. p. 424. ct Launxa Cass. diet. a5.p. a3i. opusc. Z.p. 82.

Capit. pluriflorum. Invol. cylindraceum, squamis margine scariosis, exterioribus multò brevioribus csilyculato-imnricatis. Illecept. nudum. Achscuia 4- rariis 5-gona apicc subrostfata roslio nempè brevissimo, in junioribus subnullo, coslis crassis subrugosis aut Jmvibus, sulcis angustis. Pappus pluriserialis pilosus. — Herba? glabrae perenncs regDum veteris orbis calidiorum ortse. Folia grossè dentata aut pinna-tilobatn. Flores fla.vi. —Genus ex stiuctura ad Picridium accedens sed babilus sat diversus.

§: 1. *Caulibus erect is aut diffusis apicc laxe panic ulat is.* — Rhabdotheeca Cass. I. c.

I. M. RUDICAULLS (Less. syn. p. 139), subglaucescens, caulibns erclis parcè ia in o sis nudiascnlis, foliis omnibus fci^ radicallbns runciutti& dcilibu^ apioe

albo-scariobis instructs, iu peiolum attenuatis, caulinis vix ullis, capilnis breviter pedicellatis racenioso-spicalis distantibus bracteolatis. *If.* in TEgypta inferiore ad Pyramides (Uelil.), in palmetis Arabia? propè Meccam (SchiinpJ. n. 856 et 992). Chbndrilla nudicaulis Linn. mant. 278. Laetnca nudicaulis Murr. nov. coniu. goclt. 3. p. ^4. t- 4. Sonchus divaricatus Dolil! **11.** eg. ill. non Desf. (v. s.)

L. 'divaricatus, caule dcccmbente parcù folioso dichotomo, foliis runcinatis, caulinis aurito-amplexicaulibus. — in jEgypto (Desf. Savi! Raddi! Aceib!) in Arabiae petraiae valle Ham me (Schirop.! n. 430), in agro Tunetano? (Vabl!) et in ins. Canariensisbus Teoeriffa Lancerote et magn. Canada (Sin!). Lomatolepis nudicaulis Cass. diet. 48. p. 4^3. Sonebus dichotomus Savi! cos. bot. p. 10. non Bicb. Microrhyncbua nudicaulis Frescn. pi. eg. p. 87. Scorzonera dicbolonia Vabl symb. 2. p. 89? Lactuca (lava) Forsk. ll.aeg.-ar. p. 143? Acbaeniam snbtctragonuai truncaluni transversè luurioatum vix. ac ne vix subrostellatum. (v. s.)

- a. M. PATEKS, subglaucescens, caulibus erectiusculis patentius ramoso-paniculatis basi paixie foliosis, foliis runcinatis dentibus albo-scariosis instructis, radicalibus in pcliolum anguslati, caulinis aurilo-scmiamplexicaulibus, capitnis scapus ramos breviter pedicellatis, pedicellis bractealis. % in Indiā orient, ud Kamaon, Patnn, Oude (Wall.). Prenantbes patens Wall.! cat. co ID p. n. 368. Achxnium obtuse tetragonum, brévissime sed disinctè rustratum. Herba prioits var. /6 simillima, forte à IVh nudicauli non diversa ? (v. 8.)
3. M. AsLEMiFOLius, glaber, caulis plurimis nudiusculis adscendentibus dichotoiuis, foliis radicalibus Hubsessilibus pinnatifidis runciuatisve, lobis obtusis denticulatis, paniculâ laxâ sobnndâ. (2) seu *If* Roxb. in cultis Bengali et arenosis Coromaudelia; Prenantkes asplenifolia Wiild. sp. 3. p. 1540. Hicracium dichotomui Roxb.! fl.ind. 3. p. 404. Prenantbes dicbolonia Wall.! cat. n. 3^5. comp. 385. Acbaenia longitudinaliter costata (ucc ul ia Picridio transversè striata) apice subtruncata. Pappus albus. (v. s.)

§. 2. *Caulibus procumbentibus secpradicantibus, foliis ad collum et nodos fasckulatis sctpe' bistipulatis. — Luunxu Cass.*

- 4> M. 8AHMENTOSUS, caulis fla gel life ris (iliformibus proenmbentibus bine inde radices et folia gerentibus, foliis coofertis sinuato-pinnatiidis, lobis obtusis ant subacutis, pedunculis i-cephalis folio subbrevioribus apice bracteas squamos. # aubimbricatas margine scarosas gerentibus. % in arcrosis maritiinis ^W oricutalis, versus Negapatain (Wight!), in Corooiandeli (Roxb. ;, insulis Pqlo-Piuau (Wall. J, Mauritii (Routon!) et Rorbomi,-c (llory !). Preanlhqs sariucentosa WilW. sp. 3. p. 1540. pbyt. 10. n. 35. t. 6.1¹, a. Wall.! cat. n. 3262. Lactuca sarineilosa Wight ^ontrib. p. 27. «Launca pinnatifida Casn.! ami. sc. nat. a3. p. 85. opuso. 3. p. 82. Acbaenia obtuse tetragona ferè laivia eroslria. — Icon Schaw. «pp. "• **146.** t. 39 hue forte pertinct, sed folia nostra pi. non soot pilose, (v. s.)
5. M. BELI.IDIFOT.IUS, caulis humifusis nagelliformibus, foliis ovalis siibinlcgris obtnsis basi longe attenuatis sinnato-drniatis, pedicellis & nodis inter (olia ortis bracteatis. % in arenis maritiinis insulae Madagascar (Coiuni.), prope pagum Tamaiave (Bojer !). Launwa bellidifolia Cass. diet. 25. p. 3^i. Folia submenibracea, 2 poll, longa, 4-5 lin. ad apicein lata, naiie ptioliformi |i*bo duplo loiigiore. Acbiunia obtuse 4-5-gona, rostro brevi (necnullo aivult cl. auct.) douata. (v. s. comm. à cl. Bojer.)
6. M. DREGKANUS, caulis humifnsis ilagelliforinibus, foliis ohovalis crebrè calloso-denticulali.s obtusis in petiolum brcvissimè altcmialta, pediceliis è nodis **inter** folia fasciculata ortis lacteal is folio brcvioribus. *If* in Africa au»lr.-orientali ad Zwartc Onisanculo et Ouicomias legil cl. Dregc! Folia i poll, longa, pollicein lata, parlo ptiolifonni limbo quinluplo brcviori. Achania obtnsa tetragona , vix ac ne vix subrugulosa, rostro brevissimo doaato. (v. ».)

DCCCXXXVIII PICRIDIU\$ Desf.fl. all. a p. aao DC. fl. fr. 4./». i5 Poif
diet. sc. nat. 40 p 195 Less, syn p 140. excl. Neck. syn. — Reichardu
Roth lot. abh. p. 35 Mcench meth. p. 16 non Roth cat ncc nov gen. —
Scoizonerae sp. Linn. — Sonchi sp Lam.

Gapit. multiflorurn. Invol. ovatum imbiicatum, squamis margine
albu*. Recept. nudum areolatum. Achaenia confonna exalata 4-angu-
lata prismatica transverse' tuberculata aut tugosa a pice truncata eros-
tria. Pappus pluriserialis pilosu\$. — Herbde aut vix sufl'ruLices legioncs
Medilerraneas habitantes. Folia amplexicaulia. Flores lutei. Pedunculi
haepè clavati.

1. P. TINGTANUM (Desf fl. atl J. p ajo), raule herbaceo rarnoso , foliis omni-
bus pipnalihdo-runcinatis seiniamplexicaulibus denticulatis , pedunculi& squa-
matis Ob is , mvol squamij> extenoibus squarrosi'* %. in rupibus maudinis Barba-
riae prxseitit Tingitande , ^Igypti (Foisk.), Sicilh- (Guss.), et m ins. Balean-
cis (Cainb.). Lamdem vrisitu. introductam ia injula 'Van Diemeu Icttam vcli
IQ lieib. Cuna. Scorzoneia Tingitana Linn. sp. 1114. Sonrus Tiagittann^
Lam diet. 3 p 397 Scoiz. Tingitaua et Sc. ciliata Forsk. fl e^. p. 243 ex
Delil. ill 24 Reichaidia Tiugitana Roth. Keichardia tuncinata Mcench. Son-
cibus hispiduli^s Bov% ' pj. ex». u. 30. So neb us pinuatifidu^ Lag. — Herni-
lagdb 6J9 ic. Capitla in iconejnsto minoia; sunt enira P. vulgaiis m.ijoia
• (v. 8)

/S? diversjoliwn, foliis ipferioribns obovatis sinuatis dentatia, bupei piu
natifidis lobis giosse deqtatis. (f)' in a^ro Mogadonensi legit cl. Bious-
sonet. Jnvol. squama; late ut in P. Tingitauo albo-marginataa An sp
piopi ' (v. s)

- a. P. LIGULATUM (Tent malm. p. et t 68), glabrum glaucum , canle hasi fru-
ticoso ramoio, foliis araplexicaulibus ligulatis inaequabret spinuloso-denla-
tis, pedunciis apice inciassatis iubsquamosis, invol. ba&i tumidi squamis im-
bncatis, ext. subcoidatis. ^ in Africâ Mogadonensi (Bioa&b.¹) et forte in
insala Palma Canariensinn (Ch Sm), in Graenac rapibus ad arcem Palainidem
(,Zucc!) t in insula' Zacinljo (Marg ') Sonchus intermedium Jan ' pi exs ex
Siciâ ortus , hue tor&an pertinet. Species mihi dubia! (v. & sp. etc)
- % E, ARABICUM (Hochst et Steud ' in S eh hup pi exs. arab. n 833), caule
herbaceo erecto, foliis infer, obovatis, super, ovato-oblongis, oinibus coi-
dato-amplexicaulibns subciliatis hinc inde snbdentatis, pedicellis vix demum
apice-obconicis, invol. squamis inter, subcordatis. (f)? (Z) ' in palmetis vallis
Arabicne Fa tme pi ope U insert febi flor. legit cl Schimper! An var. latifolia
P. hgulati, aut var. integrifolia P. Tmgitani ? (v. a. ex un itin.)
4. p. VUTGARE (De&f. fl. atl. I p. aji), caule herbaceo parce lamoso apice
nudo, foliis infer, pin natifidis, super mtegiis subdentatis araplexicaulibus,
pedunculis squamosis , invol squamis adpressis 7j , ®m aiviscultib et aspe-
ns regioim Meditenaneae. Scozoneia picroides Linn. sp. 1114. Sonchus pi-
croides Lam diet. i. p. 3y8. All ped. t. 16. f i.Gaertn fr. a p. 359 t i58.
t a. Sonchus squamo»us Lam fl. fi. a. p. 87. Reichardia picroides Roth abh.
p. 35. Reichardia integriifolia Mcench meth. 546 — Lob. ic. t. a36 f. a. Vulgo
Terra crepola ital. (v. v.)
5. P. ORIEKTALE (DC. fl fr adn 4. p 16. Pers. euch. a. p. 36a), caule hnmili
subraraoso unifofo, foliis radicalibus obovatis acute duplicato-denticulatis,
pedunculis nudis, invol. squamis mucroqatis margine late membianacei:
((!) in Oiente (Linn), m Syria (Labill'), ad montem Sinai ^ Auch M. iyorzo-
nera orientalis Linn sp m i . Herba circ. 2-3 pollic. glabra ant hinc indè
subsetulosa, habitn fere Taiaxaci An sati» a P. Tmgitano differt ? (v. a)
6. P. HISPANICUM (Poit. diet &c uat. 40. p. 1^7), caule herbaceo ramoso , foliis
amplexicaulibus oblongis piunatifidis setulo&o cdiatis glaucis utnuqne alba-

punuaim, peduncuhb inciassJtis squimo is, mvol squamib mucionatis bquar rosib (i) m Hispiniae aren&is inaiiliuib cuca Mali^iio et m legno Valentino Sonchus Hispnicus Jwq hoit jchoenbr i p o, t 14? Spieng sy&t 3 p 649 Pinid pinmti'idumLag nov gen et sp. in hoit raadr cat p 24 Hciba strict a bipedali* Folia cauhna4 poll longi

; P DtnoTOMUM (I isch ' et Mey pi Szuvv ined), glaucum glabruui, caule electoapice dichotomo, folns coidato auiplexicauhbus eton^dtissmnuhs spinu loso-duiuculaib, peduuciil tertul us Mbsquamosis, in\ol squamis adpie*bis (2)? mlapido&is abruplib Ctucasi oueui (Bieb), in Iberia circa liilim 'Slev), in glaeosis Airneniae et piov Aderbeisch iu (Szowitz ' Auch ' u 3/, 12)er foile in Syna(Libill ') Sonchus dukotorau-> Bieb 11 taur u i5fc Willd bpf 6 p iDib' Spieng svst 3 p 6 |C Heiba btn< ta hipedalit (olid cauhna 4 poll longa, 5 b III lata , ladicaha jgn Cor ilava? liivolucra paulo lrngiorea

-} Species extlasa

P ALBXDSM DC = Barkbausia albida

DCCCXXXIX. ZOLLIKOIERIAZ)6 nonNees — Scououri* etSoncbisp a<cr

Capitulum niullifloruni Invol ovato-oblonguin unbncaluin, squam|b inaigne sciriosis, extei hixvioribus Recept nuduni Acbaenn cyliudmcca vix subtetagona eiostna, bubtilitti stuala , glabra sen brevjssnne piibescenlia , mimnie tubcimhs c| ispcit ita, unā Jws (bjltem in Z cbonchilloule) coinubu^ 4 bievibus dcorsuni diitctis ln^tiucta Pappusplunserialissessile pilosus niollis —Herbae legionis Mediteirannej3 IDCOKL, glabijc, iainoj>j3 Folia pinnilobata , lobis dpntibusvc demuni ipice albo-callosa Floitslutei —Cum INeesu Zollikoicua ob jus prioitili nomen Willemetia consensu (?enerah obtmuLiit, hoc novum ccnus cl f Zolhkofer Sancto-6allensi botanico iubtns dicavi

* Z ruMiLA, caalebievi erectiusrulo 1 ba&i ramoso, raims i-rephiln ~~rectus~~ bracteatis folus pitin itipartitis 1 icbi lobiAque line mbus apice setifeut et Mbo callosis, capitulis inle aulbcsm nutantibus ovitis, invol squamis mtei adpies bis, ext subpatulis *f 111 Hispamae 'Valentinae mentis id radices uontiom (Cav L Duf'), in agu Murcici collibus cretaceis (Iag), in Navaua ansti, ad Peialla et ludela (Duf), et forte ID Aiabn (si Schimp n 8^71 hue rite refe rend ?) Scorzonei 1 punnla Cav ic 2 p 19 t lai f ^ uial 1 Sdnchus scot zoncraformis Lag nov j.en et sp n 3ii Dufonr' ann be ^nat bot i836 p 49 Piendmin ceinnuni L Duf' in hit Scoizonera pumil 1 etSonibus scor /oner efoimis Spreng Scorz glanduloba l'ouu ex Dufonr Achamn fimuaatui *) LIJVU tylmdracea Pappus pilobiib luvol bquaui* maigine scanioie Habitus fere Podospenni (v s)

* Z CHONDRILLOIDES, cinle electo paniculato ramoso, folus vane pinnatilo bati8,infei basi attenuatis, bupei corduo semiamplexculibub, lobib mte gns dentaljsve, p<*dice'ls paice l)iar>eiin, cipitnlis electis, mvol squamis ~~adpiessis~~ apice subcallosis obtusis If, in ^ypti agns (Bove¹ Auch ') et deser- tis circa Kabiram ((1 01ksk), Retz et Alexandram (Dehl')) Sbeik urope Sachetto(Aceibi'), m Aiabia pelixa (Schimp ' u ao8), in aivis alienosis cn̄ca vcteiem Cditha^mem (Desf), in Sicilia ^Jan¹) »d fjiigenti et (utaniu (Guss) nee ut autumo in Galln et Hispina^ Scoizonera iesedi'olia Lmn sp iria Vahlsymb2 p 87 non Retz 1 eoutodon mucionatum Torbk debCi U4 Son cha.schondiilloidcsDeif fl atl 2 p 22b Souchus] occoni Jan¹ cat 658 sp £3 — ChondidlaSicula, eic Bocc sic li t n t A et C A rnal quoadcapit. Mire vauant (oha Incisnns integns aur dentatis,, latib angustisve (v s)

DCCCXL. SONCHUS Cass. diet. *5. p. 151. Less. syn. p. 140. excl. Lau-
ncca. — Soncbus et Atalnnlhas Don.— Sonchi sp. Linn, et auct.

Cnptulum multiflortim. Invol. imbricatur. Recept. nuclum. A.chae-
nia conformia exalatn compressa crostria , longituainaliter costulata ,
costulis saepè transversè tuberculato-muricatis. Pappus inollis albissi-
mus multiserinhs, scis tenuissimis. — Herbae poiymorphac aut rariis
frutices caule subspongioso. Folia varia. Capitula flava.

Sect. i. ANOLEPTCS.

Capitula multiflora. Achaeninm longitudinaliter stiiatnm, apice attenoatoiu
ferè subiostratura. — Herbre Čapenses peiennes glabrx. Invol. squamae inter,
marginē scaiiosaš.

- i. S. DREGEANUS, glaber glaucns, canlibns erectis teretibus, foliis linearibno ,
radicahbus basi subaltenfatis, tliis integeiriiEis, allis lobulig 1-2 acatis utrin-
que auctis, caalinis basi coidato-anricolatis, capitulis subcorymbosib, invol.
basi tomentosis sqamis int margine scariosis. %, in Prom. Ronae-Spei ad
Khplat-rivier, Zwarkey, Zwaikop-rivier, Zwarte-Storm et Willbergen legit
d. Drege et meciui cotnm. Keiba 3-ia pollic Acbaema 3 lineas fere louga
striata utunque attenuata. (v. &)
3. S. EcKONZAirus, glaber vix gaucescens, canle subnudo tereti sirapiici, foliis*
lineaiibus, radicalibns basi ntenuatis plensque pinnatim imisis lobulatis\ e,
caalmis sessilibus (neo aplexicauhbus), capitulis pant is longe pedicellalis ,
invol. h&i subtomentosi sqajmis inter, margine scaiosis % in Prom. Hono-
Spei distr. Uifenhagen legit cl. Ecklon ct mecam cornm. Pnoii valde affins
sed minor. Capitula 2-3 longè pedicellata. Folia caulina parva bai.i non dilatatai
Acbaema brevioia. (v. s.)
0. foliis caalinis basi lobnlaUs. — Cam priori legit cl.^Ecklon (v. s.)

Sect. ix. EUSONCHUS. — Sonchus Don.

Cay' tola mnltiflora, basi snbtntmentia. Acbaenia apice trnncata.

§. 1. Annui aut Biennes.

3. &, IOHGIFOLIUS (Trev. jjul. sem. sem. vrat. 1818. nov. act. nat. cur. j3.
p. 197), tarfice perpenfKcnlari, caule electo glabio ramoso, foliis glabris ob-
longis sinuatis coidatā basi amplexicaulibus spinaloso-deutatis, pedicellis snb-
nbellatis totnentosisf, achaeniis laevibus stiatiis (j) patr. ign. S. Anstralis
hortnl. Capitula ferè S. arvensis.
4. S. ZACINTHOIDES , caule erecto tereti ramoso, foliis caulinis oblongis snbsi
naatis spinaloso-dentatis amplexicauliibus, anricobs obtnsis, paniculA laxā ,
pedicellis di&tantibus ssepiùs grminis, achaeniis basi attenuatis minute mnucato-
tuberculatib (j) ad Cap. Bonae-Spei legit cl. Drege.
 - a. Cdulibns versūs apicem pilis nigris glandnlosis hispidis. — ad Olifanl-
nvier Folia infima pinnatipatfita, lobis rotuudatis spicoso-ciliatis (v. s.
comm. à tl inv.)
>S. Canlibus glaberrimis. — propè urbein Cap. Folia radicalia mihi ignota
(v. s. comm. à cl inv.)
5. S. ROYLEANUS, <vnle erecto teiel' glabro, foliis inf. . , nperioiibus basi
aoricuhs laticoidalo amplexicaulibus, dentil.ns fjiossis spioul.i molli anstatis
instiuctis, apice .icnmin.itis intcgeniinis, ppdicellis nudis subumbell <tis, Invol
sqamis ext, secus lineam medianam dorsalem spinulas molles geientibns, inier.
glabi, acbaenns oblongis basi subangustatis sectis nervulos imulissnuè muri-
cnlatis. (F) in Ind orient legit cl Royle et mcccuin romm Affuiis S. cilinto, sed

- ut videtur diversus ex anricolis fol. amplissimis et invol. squamis exterioribus dorso setoso-subaculeatis. (v. s.)
6. S. ciliatus (Lam. fl. fr. 2. p. 87. Picard diss. p. i3. cam icon.), canle erectio glabro aut rariis ad apicem piloso-glanduloso, foliis crenulatis amplexicaulis argute dentato-ciliatis runcinatis aut indivisis, anriculis acuminalis, involucris pedicellisque glabriusculis, achaeniis secus nervulos transversè miniculato-rugosis. (f) in cultis Europa et (forte migrata) totius ferè orbis. Species, ut S. fallax, Valde polymorpha, semper tamen rolior. Huius referendi sunt S. oleraceus a et ft Lino. sp. 1116. S. oleraceus et DC. fl. fr. n. 2895. S. oleraceus Wallr. sched. crit. p. 43i. OEd. fl. dan. t. 68a.. Reichenb. fl. ex*c. 1. p. 2.34. S. asper Blackw. herb. t. 30. Gaertn. fr. 2. p. 360. t. 158. n. 6 non Fuchs. Hess., ere. Hieraciura oleracrum Scop. cam. n. 975. S. loevis Vill. dauph. 3. p. 168. S. oleraceus A. B. C. D. E. Wallr. cat. comp. n. 36a. Nee forte satis differt S. Sundiacus Blume bijdr. p. 888. Vaiat caule simplici aut ramoso, lassi aut apice piloso-glanduloso, foliis indivisis aut variè pinnatifido-runcinatis, ciliis molibus aut subrigidulis, etc. Conf. variationes in Wallr. et Picard 11. cc. (v. v. et s.)
 7. S. FALLAX (Wallr. sched. crit. 43a. cum icon.), caule erecto glabro aut rariis ad apicem piloso-glanduloso, foliis amplexicanibns argute elongato-dentatis runcinatis ant indivisis, aariculis rotundatis, pedunculis involucrisque basi subbispidae glabrisve, achaeniis 4-rivernatis. (I) in cultis Europae et (forte migrata) totius ferè orbis. S. spinosus Lam. fl. i'v. a. n. 81. Picard diss. p. io non DC. Species quoad divisiones et spinescentiam foliorum, numerum capituloium, etc., polymorpha, variationes per plurimas complectens, nempe hue referendi: S. asper Fuchs. bist. 674. ic. fl. dan. t. Sp II opt. Bess. gal. n. 925. Reichenb. fl. exc. 1. p. 274. Schkuh bandb. t. 2JB. ic. fr. lion Blackw. nee Gaertn. S. oleraceus y et S. Linn. sp. 1117. S. oleraceus & asper DC. fl. fr. n. 2895. necnon S. umbellatns E. Mey. in Drege coll. S. ferox Wallr. cat. comp. n. 358. S. oleraceus var. P. et G. Wallr. cat. comr V. n. 36a. S. infestus Poepp. pi. exs. h. 236. S. asper Drege. coll. exs. S. umbellifer et S. glaber Thunb. fl. cap. p. 614 ex Less. Quoad vaillantionum caracteres conf. Wallr. et Picard 11. cc. (v. v. et s.)
 8. S. CUSPIDATUS (Blunge! bijdr. p. 888), glaber, radicibus napiformibus, caulo erecto simplici tereti, foliis runcinato-pinnatifidis anricolis rotundatis amplexicaulis aristato-dentatis, summis a pice cuspidato-acuminatis, pedicelis nudis subumbellatis i-cephalis, achaeniis laevibus utrinque 3-nervatis. (J)? ad catarractas fluvii Tjikkondul in montosum Gedeh ins. Javae legit cl. Blume. Herba omnino S. fallaci affinis, sed mitior et radices napiformes ex cl. Blume. (v. s.)
 9. S. ERYNGIOIDES, canle erecto tereti glabro apice ramoso, foliis inferi. sminnis glabris profundè cordato-amplexicaulis orbicularis, profundè spinoso-dentatis, paniculac laxo pedicellis subumbellatis setis glandulosis hispidis, invol. glabris, achaeniis oblongis coriaceis utrinque 5-nervatis laevibus ant snb lente tenuissime puberulatis. (I)? in ins. Mauritii legit cl. Bouton. Plantae pars. inferior mibiignota. An forte S. fallacis var.? (v. s. comm. à cl. inv.)
 10. S. CAROLIMIANS (Walt. fl. car. 192. Ell. sketcb 2. p. ^55), glaber, caule erecto, foliis lanceolatis acutis undulatis spinuloso-dentatis basi auriculatis et semiamplexicaulis, capitulis subumbellatis, achaeniis laevibus utrinque subtriangularibus. (I) in pinguis et humidis ad ripas fluviorum in Carolina (Ell.) et in Louisiana (Teint.). Cor. flavæ. Achænia compressa striata ferè laevia. (v. s.)
 - U. S. spinulosus (Big. fl. bost. ed. 2. p. 292), caule credo laevi paniculato, foliis amplexicanibus oblongis undulatis dentato-spinulosis, capitulis subumbellatis, invol. paulnifirm piloso-glaudulosis. Quidam America; borealis parvulus salsis ciftja Bostoniam. Achænia indescr.
 12. S. WALLICHIANUS (DC. in Delcass. ic. sel. 4. t. ^7), glaber, radice perpendiculari, caule erecto temere, foliis elongatis obtuse auriculatis semiamplexicaulis, lobis ovalis, terminali elongate, pedicelis

subuinbellatis, achaenu* compresso-subcylindraceis bi&i non attenuatis secu*v* costas uiuuculalis (*I*) seu jj*j* in. Indià orienlah^d Hnrdwai, (jlepui, in Nepalià, etc , leger cl Wällich et Hamilton S longifolius Wail' cat n 3^5r. comp. n. 361 roon Tiev. S. oleiaceus A. Wall.¹ cat. n 61^1. S. Cumbulus Ham.! ex Wall, heib (v. s. coram ab bon car. mere angl Ind. or.)

- xi S. REVERSUS (E. Mey.' in Drege coll), caule erecto teieli, foliis*caulimis au- uculis acuminatis amplexicauhbus pinnatilobatis, lobis mtegiis angustis acn ininatis, folns sum mis lanceolato-Uneanbus indivisis, invol squaims extetioii- bus doittO setis reveisis hispidis, achamus mmiculato-tubeiculosis (*j*) in prom JBonaë-Spei ad Niehwevelde legit cl. Dieije' Kami floidi h>spidi Fol. caulis nervus inedrts snbtus parce setigerus. Folia Infeu'oia mibi ignota. (v. s. comin a cl. inv)

J2. -glabratus, caulibus foliisque glabris. (*T*) in piom Bonaj-Spei temtorio cesso legit cl Ecklon! Folia inf pinnatilobata ciliato-spinuloba in petio, lum latum attenujta, lobis dentatib. I*ol bnper. lobii angubti^ integri& (s. coiniD a cl. inv.)

14. S. TENERRI^IUS (Linn sp 1117)1 caule erecto lereti glabro aut ad apices pi- loso-glauduloso, fohis aurito-amplexicaulibns, vane aat ssepùs bipiunatipai- titis, invol. bdsi tomentosis deinuin snbcalvis, acha?niu> an^u&lis nervulatit* t^ansversietnberculato-rugosijj "I s e u ^ in lupibos secus m.ue Medjeiraneum, in Hispanià, Gallia anstialioii, Italia, Sicilià, Baibaria'Stirps tenera poly mo 1- pba, prtescrtim quoad loborum folii foimas sunt nempe lineares oblongi aut ovati, mtegem'i aut obtuse dentati, basi decuuentes aut subpetiolulati, nnde hue referendi videntur S lacerus Willd. sp 3 p. i503 et S tenerumus aact Caulis et rami vauant in ommibub folioium foinus, glabii aut glandulosio- pilosi AnidebS Itahcus Spreug syst 3 p 651, in Sicilià et ad Kiualippum lectub, hue referendus? — Pluk. aim t 93 f. 3. Reichenb hoit.t 1J9. opt (v v et s.)

§. 2. *Herbacei perennes*

15. S PECTINATUS (DC. rapp voy. 2 p 78 11 fr. sUppl. p. 434), caule eieclo angulato glabio, foliis pectmato pinnatipartitii, lobis confertis ovato-subtrian- gulanbus acutis mtegus aut subsinuat, supei. basi aautis, pedicellis viz pi- loso-glandulosis, invol pilifeus, achaeruis teietiusculij obtuse costalis, secus costas tui>eiculato-rugosis. % in rupjbus mantimi:> agri Rusemonensis prope Colliouie, junio flor legi, nee in Galloprov ut volt Spieng. Valde accedit ad S. teneriraum, sed ladix jperennis, caulis angulatus, etc. (v v. et s.)

16. S ANGUSTIFOLIUS (Desf. fl. atl 2. p 22^), radice fu<>ifoimi, caule subnallo, folhs glaucis glabiis pinnatipaititis, lobis lemotis deuticulaus, peduncuhs sqaaínosis folio bievjoribas, invol. sqamis albo-mucronatis. Jf in Mauiitania circa Cafzara Capitura niagnit. S. arven>is. Achjenia<>gn.

17. S. UMGINOSUS (Bicb. fl tani. n. 1578 extl syn. ex suppl. p. 5^5), glaber, tadice repente, canle erecto tereti, fobis snbiunuñatis spinuloso-denlatis am- plexibMubbis, auiicuhs subrotundis, invol. glabris 111la basi subtomentosis, acbaeniis subtelragonis oostulatisj, secus costas crenulatis. *2 in campestribus arundinetis et cnllis subhumidis Tauiias et Ukiania? (Bieb.), ad lanauu (Stev'). Trev,tepeit. nat. cur berol i8i3. p 2. p i5i ex Bieb. S glaber Scbult. obs 161 non Thunb. S. arveniis var x^a. Bess gal. u. 92;\$. (v s)

18. S. BRAHYOTOS, caule erecto tereti foliisque glabiis spinuloso-dentalis, anri- colls bievibus obtusis cottdato-amplexicaulibui'flinuato-sUBL'uncinatis, summis integrii>> capilulis paucislaxe corymbosis, peditiellis jumoibüs subtomentosis, invol. sqnamis extei ovato-lanteolatis, acbaeniis oblongis tompressis laevibus subnervulatis % in campestribus et cultis Sibinae Altaiae (Ledeb), et m salsis Dabuna? (I'urcz!). S ufiginosus Turcz.¹ in litt. Ledeb alt. 4 P '4^ Don Bieb DifFeita S ubginoso veio auiiculi* fol. bievidfibus, foliis multò minus lobatis^"aihaeniis k<evib<, inv. squamis exter mnlio la^ioiibun. Vanat fol. inter

lobos snbintegerrimis aut spinnloso-dentatis. Proximus S. inaritimo. (v. s. comm. à cl. Turczaninow.)

x9> S. WIGHTIAHUS, radice sublignosa, caulis adscendent-erertis subangulatis glabiis, foliis aunculis rotundis amplexicaulibus oblongo-].mceo|ali& inaequaliter et acute dentatis glabris glaucescentibns, suminis ferè line<inbus, pedicellis laxè subcorynibosis involucrisque glandnloso - pilosis, achaeniis oblongis btriatis tenuissimè transversè suhiugosis. % in Peninsulâ Indiae orientals legit cl. Wight! Accedit ad S. raaiitimum serf folia latiora breviora. In vol. squama lineares deinùm reflexae. (v. s.)

ao. S. UENTATOS (Ledeb. fl. air. 4. p. I&I. icon. ill. 1. t. 87), radice repente, canle erecto foliisque glands glabris, infer, oblongis dentutisi snper. lanceolato-linearibus inlegernmis, capitulis raceniosO-corynibosis, involncri bispidi cylindrici squamis apice ciliato-barbatis. % in Sibiiiae Altaic a? subhumidis sal sis (jeberti editi ad fl. Tschuya expansi. Fior. Intei. Pappus jlbidus. Achaenia rufescens-tiaglabia loagitudnliter stnâJa. (v. s. comm. J cl. Bunge.)

ai. S. MARITIMUS (Linn, sp. m o'), glaber, radice repente, oaale erecto aut subdeumbentesnbsiinplici, foliis lanceolatis amplexicaulnt indivisis retrorsimi nrgntè serratis glaucescentibus, pedunculis paucis i-cephalis sspytè subtomelUOhi>, acbaeniuum co&tis laevibas. If in maritimib Mediteiraneis Enropae auHtralis et Maurianiae, secùs Oceanum à Lusitanâ ad Rupellam, etidm secùs fitagnura salsa Conreisoti iti Delphinatu (VH1.) All. fl. pedem. n. 318. t. 16. Cav. ic. 1. t. 61. Soncb. nitidos "Vll. dauph. 3. p. ibo. Souch. angustifobus Neck.'gallop. 3at>. — Ab hoc vix diffeit Soncb. aquatilis Pourr.! act. lol. 3. p. 33o. nisi foliis snbsinnalis, nee verUira. Sonch. littoralis Reich, fl. exc. 1. p. 274, nee Sonch. crispns Poir. suppl..3. p* 289, potius forte ex agio Mogadorieubi quâmex ins. Canariis ortus. (v. ve st)

*a. S. rRASSiFOLius(Poiirr. in Willd. sp. 3. p. 1^09), caule erecto simplici, foliis> crassiOiculis glaucescenribus arplexicaalibus lanceoldtis inaequaliler acuminalo dentatis basi rotundatis, pednncalis snbumbelfatis squaraosis If in Hispaniâ Spieng. syst. 3. p. 648 excl. Thunb. syn. Medius dicitur inter maritimui et arvensem.

i*3. S. AHVEKSIS (Linn. sp. 1116), radice repente, canle erecto glabro, foliis rnnrinato-pinnatifidis spinelloso-dentatis cordato-amplexicaulibus, aimculjs bievihas obtusis, paniculâ nmbellato - corymbosâ, pedicellis involuciisque nispidis , achaeniis subtetragonis seciis costas. transversè rugulos. % in arvis et agns argillosis Kuropae et (verisim. intiod.) in Amer. bor. Fl. dau. t. 606. Engl. hot. t.674^La.sch in linuea 18I9. p. 408. Lepicaune spinulosa Lapeyr. abr. p. 480 et ideo Hieiacium bpinulosui Spreng. syst. 3. p. C4J. — Lob. ic t. ^37. f. i.,(v. v. et b.)

u4. S. PALCSTIUS (Linn, sp. 1116), radice simplici sobtube^osâ, caule elalo basi glabro apice cum pedanculis etinvol. hispido, foliis elongato-Lmceolalis, iufer. rancinatis, sup. indivisis, omnibus spinnloso-ciliatis basi sagitiatis, auriculis longis acutis, coiyombo umbellato polycephalo, jcbaiuiis secùs cobtas minutisainie rugulosis. ^ in prjis paludosis et ad maigines fossarum Europae, usque ad Aiuieniam (Aucb!). Fl. dan. t. 1109. Engl. bor. t. 935. La&ch iu linnaea 18^9. p. 408. Caulis 4-5-pedalis. (v. v. et s.)

§. 3 Fruticosi.

»5. S. SQUARROSUS (DC. cat h. nionsp. i8i3. p. 147), caole fruticoso sapiisramoso, foliis glabris semiamplexicaulibus simiito-repandis, inferioribus pinnatifidis sublyiatis lobis obtusis, super, subiutegris, paniculâ coiybosâ lax.i , pedicellis glabiis, invol. squanm apice patnlis oblusis. J in rupibus altis Madera (Massou! Lowe!). Souchus frnticosus Linn. f. suppl. 346. L'Hér.! atiip. nov. i^r. t. 81. Willd. sp. 3. p. 15IO non Jacq. Achaenia niiunta, traus|erse striato-rugulosa. Caulis crassus spongiosus Vaiiat forma folioruui, seil in\o. Jacro squarioso sjecies facile diatiqcla. (v. v. c. et 5. sp.)

16. S. LJBVIOATUS (Willd. enuin suppl. p 54), caule frnticoso, fohis sublùs gl m-
cis pinnatifidis, lobis oblougo-lanteolatis acutis, teimlnali acuminato, coiyinbo
coarctato, peduncnlis nudis, mvlocons turbinalislaevibus, squaraisinfciioribus
apice reflexis. 3 patr. ign, Differt à S. squarroso foliorum lobia acuminatis uec
obtasis (v. s.)
- @. *lyratus*, folus lyrato-pinnatifidis duplò brevionbus, lobis ovalo-tnangn-
laubos, corymbo divaucato. 3j patr. ign. S. ly rat us Willd. enum. suppl.
p. 53. a priori noa differt ex Spieng syst. 3 p. 647
37. S. QUERCIFOIUS (Desf. fl all a. p. 225. t. 2i3), cauleftaticoso ramoso, fohis
glaucis glabiis cuneiformibus subaniplexicauhbus pinnatilobatis, lobis acQtis
remolis dentals, rainis flondis dichotorais glabris coryrabosis, invol squaims
adpressis ovatis subacatis. A in Mauiltaniā Tunetanā ad montes Cafzdc. Spe-
cies dicitor polbernma, singularis et ommn&distincta. Caulis carnosus 1 a pe-
datis
28. S. JACQUIM (DC cat. h. ruonsp. 1813 p. 147)* cnule frnticoso ramoso, fo-
liis lanteolatis phnnatifido-iuncinatis, lobis acumiuatis&cuatis, senaturis cre-
biis callosis, pedanc&lo folioso amce uiubellifero, pedicel 1 is et invol. basi to
mciitosis, squjinls adpre^sis obthis. 5 in rupibus Insolae Tenenffa? ^Mass 'Brouss!'). S. fiuticosns Jacq. coll. 1. p. i3.ic. tar. 1. t. 101 exel syn. Dicitui
in l è t ei if fa *Lachuga de Pastor*, (v. s. sp. et v. c.)
- L. congestus*, caule siraplici abbieviato, capitulis majonhus. 5 inTeneriffå.
S. congeslus Willd. mag. natnrf. ges. 1807. p, 136. DC cat b monsp.
1813. p. 147. S macranthos P011 suppl. 3 p. 289 beib. amaf t. 3ia
S. Brou2-&ouetii hort par. olim. S abbieviatus Link m Bnch cm 146
S. acauhs Uum.-Cours. in Stead ? Iavol. veta&ta evadunt glabra (v. v. c
ets. &p.)
19. S. PINNATUS (Ait. kew 3. p 116), caule fiuticoso lamoso, foliis glabiis ntriū
que concolonbns pinnatipartitis, lobis linean-Janceolatis antice snbdentatis am
integernVis intervallo angnstioubus, termmal elongato, paniculâ lamosâ co
rymbosa, iavol. squanns adpressis glabiis acuininatjs lioe.in-vix lauceolatis. 5
in Maderå (Ait.), laiior in lupibus (Lowe¹). Lobi foljorum ntiinqtie 7-8 lon-
gioreas nempe, 3 poll, longi, 4-5 lin. lati. (v s. sp. et \. c J
30. S. ACIDCS (Scbousb. in Willd. sp. 3. p 1511), canlo fruticoso ramoso , fohis
glabris utrinque foncoloribns pinnatipaititis, lobis approximatib parallels
lato-lineaii lanceolatis integerrimis, paniculâ lainosâ vix coiybosâ nudA
glabrâ, invol. bqnaniis subpatalis obtusis nigricantibus ^ in impeno Marot
cano (Scbousb.), circa Mogador (Biouss.¹). S. pinnaliOdus Cav anal, scient
nat. 1801. v 4-p 78. (v. s.)
31. S. RADICATDS (Ait! kew 3. p. 116), canle fruticoso brevissimO, fohis subra-
dicalibus pmnatipartito-&ablyratis otrmque lacvibos snbtùs glaucis, lobis
ovatis snbdenticulatis obtnsis, terminali obtuse ttiangnlato," canhnis aaiicnlis
rotundatis amplevicauhbns. corymbo glabro inegulaii,, invol glabii squamis
nigiicantibus e\ter. late ovatis subacatis^ inteiioribu!. lineaii-lanceolatu acu-
minatis. 3 m Maderå (Ait. 1. c), m lenenffå (beib. L'Hci ').
- P.glaucus* (Brouss), squarais invol. exteisionbus magis acuminatii. J in
liai banå circa Mogadoi (Broass.Iex AA illd.) Habni ex cl Bioussonct sine
loci designatione (v. s.)
- 3a. S. GUMMIFKR (Link in Buch can. i4f>), caule baji fruhcoso, fohis glabu
subtus pallid is subiadicalibus piunatifidis, lobis triangulatibus subdentatis acn
tis, teiminah lanceolato oblongo , canlinis aaiicnlis rotnudatis amplexicauh
bus, coiymbo urpgulari glabio oligocepbalo, invol «quinis nigiicantibus
snbadpiessis acuminatis J m iusulalViieiffat.il] "Vcia-Cnw (Smith¹) , m
insul.1 Canaiia ad Garacobico et ins Lanceiotte (I ink) ,1 xacie medius mlci
S. ladacium ct ntulatum. Forte ties species in uuicau^congrgnnd.x,(v s
co mm at cl Uir Smith }

3J S. USTDLATUS (Lowe! prim fl. mad p. 22), caule ad collum finticoso hrevissimo, folris radicalibus confeilis pinnaliiidis glabiis sobtūs inter venas glaucescentibus, scapis aphylhs lamoso-divaricatis, pedicel lis *snbcoiyinbasis nudis, invol. squainis adpresso nigricantibus, exter. brevissimis, inter apice pallidis. 5^{lu} Madcia. S hyoseridifolius limn, h hafn. 9. p. 75a?

- a. *layfohus* (Lowe! 1. c. sub \ar. /2), foliora lobis ovatis mu< ronatis snb- angulatis, terminali basi lotundato apice acuminato. — in rupibns maiitimis (v. s comm. à cl. Lowe.)
- >?. *angustifohus* (Lowe! 1. c. sub vtfi. «), fohorm lobis angastis confertis acumin itis maigme posteriore submtegeirimis.— S, dentatus Banks herb. ex Lowe. (v. s. coium. à rl Cowe.)

Sect. in. ATALANTHUS. — ^talanthus *Don in Edinb. phil. Journ.*
1829. *et in linnced* i830. *htt. p. i44-* — Prenanthis sp. *auct.*

Capilula basi non tumentia 5-ao-floia — Caules fiuticosi.

3'i S. ARnoREUs, canle arboreo teieti inenni, fohis pinnatipai this, lobis linearisublanceolatib lnU'gtrnmib, coiymbis. terminalibns polycepbahs. *> in insul&leneiiffa (Broils*). Pienanhe-j aiborea Brouss.¹ elench k monsp. p. 47." Willd enuni. suppl 54. mag. nat. ges bed. 1807, p. i3n. Link enom 2. p. 2S2. Folia tiplici lmea spiiiaU becuss lanios disposita Folioium lobi appioximati 1-2 lin. lati. Capitula majoia quāu S.)mnati, 15-20*flora. Peractā antbesi apex lami pe'luuculifoiinis exsiccatur el gemma e Mipicina axilla' 01 ta lamam continuat. (v. s. sp. et v. c iii boit. raon&p.)

35. S. LEPTOCEPHAIUS (Cdss. diet. 43. p 281), caule fiuticoso inermi, foliis pinnatipaitilis, lobis liuraii-liliformibus'utegernmis, paniculis terminahbas coryrabosib polycepbahs J in rupibns Tenciiffa2 (Mass Brouss ! C Smith' Chain ! Gaad !). Jacq f. eclog 1. p. io. t. 19. Prenantbes pinnata Linn. f. suppl. -47. uon Ait. Chondnlla pinnata Lam did 2. p. 79 Coi. 5-6 in onpitulo flavoe. Folioium lobi inacqnales remoti vixsemilineain lati Canles subcarnosuli cicatucibus fol veternm notati (v. s sp. et v c)

36. S. SFINOSUS, caule fiuticoso ramosissimo, ram is teicibus diveigeutibos spinosis, fohis sessilibus lineaibus dentato-sinnatis, peduncuhs x-cephalis nndis. £ in colibus Uispamx ad Cuevas Overa (Lag'), in aren< mantimis legnf (jrranatensis (Roi&s'), in fissuns mpiuni Afncae boreahs ab ins Canams! ad Aiabiam ' et monteui Sin.u (Bove'), in tegione Wadi Hebran Arabia? petiaeap nbi Kabat dicitur (Scbimp'), ad Sue/ et Ispahan (Auch!). Pienanthcs spinosa Forsk. de»ci. 144 Vahl symb 2 p 66 Lactoca spinosa Lam diet. 3. p. 408. Desl fl atl a. p 227 Phjcniopus &pinosus Cass diet 48. p 426 — Park iheatr 804 f 7. ex. h kew. Habitus feic Phscnopoium sed achenmrn erostre Invol. cyhndiacenm, squamis uiargine bubscaiiobis. (v.s)

+ *Species non satis notes*

37. S. CAUIASICUS (Ilieb m Horn. h. hafn. suj^pl p. 88), caule hiisutissimo, foliis radical lyratis, caulinis coidatis sessihbs amplexicaulibus giosse serlatis, pednnccuhs apice incrassatis, invol coiybosis ovah., % i_u Caucaso. An forte Mulgedn sp.^p

38. S? CREPIOIDES (Smith in Rees cycl n. 24), canle tereti subpubescente ramohissimo paniculato, foliis sum mis amplexicaohbus lincaii-lanccolatw \i!lobis, invol ovatis pubesceuti- faiinosU — in littonbns Mauntanix prope Lacalle Scorzonera crepioides Poir diet. 7. p. a5 An vcia Ciepidis spec?

39. S. FLEXUOSUS (Ledeb. h. dorp suppl 1 p. 5), caule flexoso, lainis subfaMigiatis, fohis caulinis ova>o-oblongis repando-dentntis rugosis, pednnccuhs incias&alis hispidis — Ca?t ign.

40. S. LACIUCOIDES (BuDgcenum.pl chiu. n. aa8), caule eiccto simplici gla-

brata, foliis radicalibus canliniscae inferioribas in petioluin attenaatis runcinato-pinnatifidis denticolatis snbtus tenuissime floccosis demum glabratris, super, oblongs-linearibus integerriniis denticalatisve, capitulis paniculatis, pedunculis bractealis subglabris, invol. glabro, acheniis compressis glabris. % in China; borealis subbumidis propre Kan-tai. Caet* ign.

4t* S. NIGRICANS (Taasch in flora 1829. erg. p. 35), glaberrimus, canle stricto subangulato, foliis cordato-amplexicaulibus profundè pinnatifidis, lobis linearilanceolatis undulato-dentatis inagine rachique spinulosis, pedunculis umbellatibus confertis involuerisque nigricanibus subglaberrimis. (V) Neapoli ad Puusiliippurn. Invol. cylindrica. Achaenia ignota, juniora marginé alata.

42. S. ORIXENSIS (Roxb. fl. ind. 3. p. 402\$), caule erecto tereti glabro apice glandulo&o-piloso, foliis caulinis finplexicaulibus sagittatis lanceolatis lambris tenuiter sublobatis dentalis, pedunculissubumbellalis pilosis, invol. tomentosis. (Ijin Indiæ orient, propre Saroukota, raros. Car. carpici ign.

43." S. PARVIFLORUS (Lejeuuo in Reichenb. II. exc. 1. p. 274), caule . . . , foliis araplexicaulibus runcinato-pinnatifidis spinuloso-dentatis, pedunculis elongatis corymbosis glabris, iavol. cylindricis setosis, achaenii lavibus glabris. Qp in Belgio circâ Verviers.

44. S. ROSEUS (Bess, in Spreng. syst. 3. p. 65r), ctule ramoso glabro, foliis basi cordatis araplexicaulijws pinnatifilis glabris, lobis divaricatis linearilanceolatis cuspidatis subintegerrimis, pedunculis tomenlosis corymbosia, invol. glabris. — in Podoliæ. Caet. rohi ign.

45. S. AIMPLICISSIMUS (Lag. cat. h. madr. nov. gen. etsp. n. 312), canle simpli&simo, foliis oblongis dentaio-spinosis, pedunculis axillaris squamosis oligocephalis folio brevioribus. % in Hispaniæ propre Quintanos de la Ordan et Aranjuës oppida, alibique in locis argillosis. Caet. ign.

i" i" £p^{ec}i^{es} cxclusce.

- S. ACANTHIFOLIUS Clairv. = Mulgediam PInmieri.
- S. ACUMUATIS Willd. = Malgedium acamihatum.
- S. AORESTIS Sw. = Erecbfkes hieracifolia.
- S. ALBAKUS Stev. = Mulgedium Albaum.
- S. ALPiNusLinn. = Mulgedinm Alpinum.
- S. ALFINUS Smith. = Mulgedium ambigaam.
- S. ASPER Wulf. = Picris sonchoides.
- S. izuREns Lcdeb. = Mulgedium azuream.
- S. BiENias Mcench. = Malgedium Floridannm.
- S. BOCCONI Jan. = Zollikoferia chondrilloides.
- S. cACALiGFOLiS Bieb. = Mulgedium cacaliaefolinm.
- S. GALTULATIS Roxb. = L^cta Ueyneana.
- S. CANADEICSI Presl. = Mulgedium niacrophyllo.
- S. CANADKWSIS With. = Mulgedinm Alpinum.
- S. CAPITATUS Spreng. = Lomatolepis glomerata.
- S. CHONDRILLOIDES Desf. = Zollikoferia chondrilloides.
- S_f COERULEUS Smith. = Mulgediam Alpinam.
- S. coRDifqwus Desf. = Mulgedinm macrophyllnm.
- S. cYAiFiEiS Don. == Mulgedium cyan:nam.
- S. DICHOTOMUS Bieb. = Piciidium dichotomam.
- S. DICBOTOMiS Delil. = Microrhynchus nmicaulis 0.
- S. DIVARICATUS Desf. zz: Microrhynchus nudicaulis «.
- S. FLORIDAHUS Linp. == Mulgedium Floridanom.

- S. OOR^EITSIS Lam. = *Brachyramphus Goroeensis*.
 S. HA STATUS Less. = *Mulgedium hastatara*.
 S. HASTATUS Walt. = *Mulgedium cyaneum*.
 S. HISPANTCUS Jacq. = *Picridiuro Hispanicum*.
 S. HISPIDULUS Bové. = *Picridium Tingitanum*,
 S. HISPIDUS Ledeb. = *Mulgedium liispidum*.
 S. JAVANICTJS Spreng. = *Prenantlies Javanica*.
 S. LAPPÖHICUS Wiljd. = *Malgedium Floridanura* ?
 S. LEucoPHiEus Willd. = *Malgedium lencoph.xnm*.
 S. LuDoviciAwus^Nutt. rrrLactaca Lndoviciana.
 S. MACROPHYLLUS Willd. r= *Mulgedium macrophyllunr.* . .
 S. Moif TAKTJS Larn. = *Mulgedium Alpiaum*.
 S. MULTIFLORDS Desf. = *Mulgediuro multifloram*.
 S. OCCIDKNTALIS Spreng. = *Erech^ites hieracifolia*
 S. PALLIDUS Willd. r= *Lactoca Canadensis*.
 S. PANICULATUS S. et M. = *Trachodes pauciculata*.
 S. PICROIDKS Lam. = *Picridinm vulgare*.
 S. FLUMIRRI Lion. — *Mulgedium Plumieri*.
 S. PRENAMTHOIDKS Dieb. = *Mulgedium prenauthoides*.
 S. PDLCHELLUS Pursh. = *Lactuca pulchella*.
 S. RACEMOSUS Lam. = *Mulgediara ronlifloram*.
 S. ROBUSTUS Wall. = *Mulgedinm roSustain*.
 S. st ORzNERyEFORMis Lag. = *Zollikoferia pumila*.
 S. SKRRATUS Pers. = *Lactuca taraxacifolia*.
 S. SIBIRICUS Linn. = *Mnlsediura Sibiricnm*.
 S. SIBIRICUS var. Bieb. = *Mulgedium Albannra*.
 S. TARAXACIFOUUS Willd. = *Lactuca taraxacifolia*.
 S. TARAXACIFOMUS GUADAT.UPEI7.SIS Spreng. z= *Brachyramphus Caribaeas*.
 S. TATARICUS Linn. = *Mulgedium Tataricum*.
 S. TATARICUS 0. d'Urv. = *Mulgedium Sibiricnm &*.
 S. TINGITANUS Lam. = *Picridium Tingitanum*>
 S. TUBEROSUS Linn. = *Lactuca sonchifolia*.
 S. VIRGATUS Desf. = *Nabalas virgatus*.

DCCCXLI. TRACRODES *Don in trans, linn. soc. 16. p. 182.*

Capit. multiflorum. Invol. imbricatum cylindraceum, squamis exter. obtusis margine scarioSis^, intimis 8 linear-ligulatis. Recept. nudum. Achaenia subfuscifloroia te*ragonala, apiceattenuata, rugis transversis elevatis scabra. Rappus priusus myces minutissimus 3-septans, setis basi solutis. — Herba Mexicana biennis erecta rigida paniculato-ramosa, aculeis minutissimis scabra, basi purpureo maculata. Folia caulinata spathulata sinuato-runcinata spinuloso-denliculata, oaulina amplexicaulia lobata lobis acumina.tis. Flores citrini? Capit. magniti Lactuca? virosae. — An satis à Soncho difFert ?

i. T. PAWICULATA (Don 1. c). (2) in Mexico. Sonchus paniculatus Sesse et Moç. herb, in Don.

DCCCXLII. MALACOTHRIX.

Capitulum multifloruni Invol late campanula turn 2-f-seriale Imbricatum, squamis sublmeanbus margme scanosis Reccpt. nudum G01 ligulae anguste hnciae, extcr. longiores Achaenia glabia obovata eiostua Pappu» i-semilib, setis linearibus ugenteis vix subsenatis.— Heiba Califoinica Hjæ facie sed annua acaulis, junioi MIIIS longis albis mollibus barbata, adulti plus minus glibiatt. Radix simplex perpendicularans. Folia rathcalia laussune mdivisa, fcie omnia pinnalipar Uta,iachi lobisq; linearibus angustissimis Sea pi electi cylinduci i-cephali folns duplèxlongiores. Flores flavi in capitulo innuineti Car ex floi. nou satis evo In its erui. DilTert 'a Soncho pappo l-senah. — Nomen ex /**<txoc molhs ct 8f? capillus.

- 1 M. CALIFORNICA (I) in Californiæ legit d. Dooglas. (v s . comni. ab lion soc. hortic lond)

DCCCXVII. YOUNGIA Cass. opusc* 3 p 8b. — Pienanlliis sp *Thumb*, Blum. ✓
JVall — Ghondjlae sp *Poir.*

Capit enciter 12-ranus i5-20-floium. Invol cylindraccum S-phylum squamis accessoms cue. 5 calyculatum Recept. nudum. Goi ad apicem tubi pilosae Achaenia oblonga, nunc cornpræssa iftnc sacpe 111 nsdem cnptulil subtngona, longitudimhei stnata, eiostn utnnque subattenuata. Pappus pilosus umseriahis hhfoimis vix subdenticulatus albus —Heiba? plcrLquc Indict, paucac MaunUanae, Japonicoi seu Chihenses, saepius ovata; glabia? aut basi pubescntes apice pamculata? Folia infer petiolala lyrata pinnatihda seu grosse dentata membranacea, caulin pauc. Cipitula parva flava Habitus fere Lampsanae — Genus habili et caracteribus ule distmctum, sed specis omnei. u}terion examine cgeut.

- 1 Y. MAURII-JINA, glabra vix basi pilosiascnla, canle electo apice snbnado laxè panicnlato, folns radicalibus petiolatis uiembranaceis snbrancinato-Iyratis, bb> terminal! maximo ublus, caulin paatis ses&ilibas, capitulis pedicel la us i5-16 flons, invol 8-phyllo basi %qnamulis 5 calyculato, icbxnus <ompresso augulosib apice attenuate (f) in agns et cultis insula? Mam itn legit cl L Bouton Yonngia lyrata Cass opusc 3 p 86 Species aff Y. Ihunbergiana 4 glabutie et folns papyraceis diffeire videtur (v s «anim a cl Bouton) |

@. mtegnfoha, folns obovatis sinnalo-dentati^ri^ ram var a Youngia in tegnfoha Cdss 1 c p 87

- a Y IHUNBERGIANA , infeine villosa snpernç^lftr^, caule erecto tereti simplici, foili petiolalis lyrato luncemalis, lohis angm. no dfeulatis, dentibus mucronatis, paniLuld confeita siibcorvmbiformi, capi'ftis pedicellatis i5 10 lions, invol minutiissime calyculato 5 phyllo, icbaenns compiessis stnatis api^subattenaialis (J; in J^ponia(Ihunb), in Chma' (Ji acaJ petiop '). Pieffintlies lyrata Thunh fl jip 303 Honlt sys 9 t 66 f i Chondrilla lyiala P011 suppl 2 p 3ia Herba pedahs Petioh birsuli Cipiuh paiva flava (\ s comm. ab bon atad. jmf>.'petrop ')

- 3 Y RUNc^NATA,glabuustul», cmibns apice subapbyllis, infeinc cum peliobs et ntivis fofioium piibeulis, loins luncinato pinmtipdihtis, lobis subtuan gulaJi>Lis inuironato-dcnldtis acuuis, caulin elnm petiolatis, panitnla elongata lalaxn peditelbs nudis filifounibus, cipituhs 1 ^-16-flois, mvol squainia -S macgint- submembriaiaceib basi immutisMine calyculatis — in Nepalia ct subactjd 01 legit cl Wallich Choudulh riimniaiaWall ' cat comp n 382.

Pappns albas tenais subunisei iahs (v. s. comtn. ab hon. ccēt mere. Angl. Ind. or)

1. Y HAPiFOLiA^giabia ba*<*i subbiisota , caole erecto tereti apicc laxe pantculato snbaphyllo, fohis radicalibus et caulinis infeuoribus petiolatis runcinato-Iyiatis, lohis ovali-ohlongis obtuse sinuatis mucionato-denliculatis, ultimis confluentibns, invol 8-phyllo niinntissime^alycnlato, achaeniis apice atlenuatis. (J)in Silliet Indiae oient Prenantbes napifolid WdH ' cat <oraſ> n 387. Lactuca napifoha DC in Wight conli p 27. Fx achaenio apire raagis acniu-nato fere ad Lactucae sect. Myceliun accedit. (v. s. comm ab hon. car. meic. angl. Ind. 01.)
5. Y. POOSIA , caule teretiasculo a pice panicnlato |glabro ant minutissunē pif-bescente, folus cahlims pinnatipaitito-1^iatis in petiolum attenuatis, lobis obtusis, termin.ih subacaminato, invol 8-pbyllo minute calyculato 10-ia-floio, arbseniis stuaiis snbtiigoms vix apice atlenudtis (T) in India oriental! loto dicto Uahwjrīigun" sen Dhawamgnnj decrab fl<>r legit cl. Hamilton. Pienanthes Paosia Him "beib Prenantbes Poosia Wall.¹ cat, n. 3a65. comp n. 37\$. (v. s. inbeib. hon cui. mere angl. Ind 01.)
6. Y. sTRiATA.caulcbasipubescente caeterum gl ibro stnato snbnudo apice paniculato, folus mfenonbns petiolatis lyrato pinnatifidis, lobis ovatis mucronatis. denticnlatis , būuamis pnncls sessilibus hnean-lanceolatis , invol 8-ph^llo minnte ealyculito 10-ia flor, acbaemis stuatis snbtrigonis utiinqne subiMenaatis (Y in insnlA Javā , nd oitum flum Ijimibie itiontis Euiangtanp Prenantbes stiida Bluine ! bijdr. p. 835 Hriba pedabs nudiuscula Folia subradicalu 3-3 J poll.longa,secus neivvm pubernla (v s. romm. à cl. Blumc.)
7. Y. AMBIGUA, caale angulato stiinto snbnudo apicc paniculatebasi pubescentes fohis radicalibus pilosuscenlis petiolatis luncinato-pinnatipartitis, lobis triangu-nlanbus mucronato dentatis, terminali vix majoie, cauliis paucis sessilibns glabiis, mvol. S-pbyllo minniissime calyculato , achaeniis snbtiigoms striatis apice attenuatis. — in Indiae onenr piov boreali occid leger. cl Wallich et Royle. Affinis Y. stnatae (v s. comm act. inv.)
8. Y. FASTIGIATA, canle tenui subnudo apire snbcoiymboso, foliis inferioibus pctiuldts Iytato iut)Linatis lobis ovatis mucionato^entatis, terminali mnlo nijjoie, snmmis subsessihbus siunatis acununatis, invol 8-phyllo minute calyculato 10-1 ?fli o , achapniis subti Igonis strati. ^x apice altenuatis (|^ |n giaminosis humidis insuloeja|aj circā Buitenzorg. Pieuanthesfif!,tigata Blume! ⁵ 1, P'f.^6 • Herba Inferne folios a pubescens, superne nuda glabra Folia inf 3 poll, longa, polhcem lata, membranacea.(v. s comm a cl Blume)

'E Species non satis notice.

- 9 Y. [?] PROCUMDENS, glabra, cauhbns piocumbcuiibus dicholomis, folus p^ensqe radicahbns, lineaibus nmcinatis, lobis bie|ibus obiusis, lacemis terminahbus, capituhs remote fasciculatis. —>in Bengalo Prenunthes proiumbenslloxb.fi ind. a. p. 404. Floies flavi ao-3o in m\ol cylindrico.
- 10 Y ? ACAULIS, glabia, caulibos e collo plunmis scaposis 4-5-cephalis foliis brevioibus, foliis ladicibus sessihbnslneau-lanceolatis mtegiishevibus, invol. 8-flois. 1^P in Bengali intenois disti. Dinatepoio. Pienanthes "aulis Roxb. fl ind. 3. p.*o3. Mores flavi In\ol^8-pbyllum squamis 3-4 calyculatam.
11. Y. LANCEOLATA, glabra, caule adscendente stnato, foliis mfei. peiiolatis obo-vato-oblongis obtusis integernrais marline re\olutis, supei. amplexi<auhbus, paniculā coaictatā (J mJapomā Prenantbeslanceolata Houlf. pH ³³ 9. p ²⁹ 300! t. 66 f. 2. Willd sp. 3 ^ ^ i534 Pienanthes Integra Ihunb.'fl' jap 300! Chondrilla lanceolata Poir suppl. 1. p 3ay C01. luteae (lh), in capitalo duo-denaj (Houtt) ia y. DKNTATA , glabia, canle erecto stiiato paniculate, folus radicalibus ob-longis com atnm'ne dentatis, canlims amplexioanlibus o\atii acnlis, panicul-

ram is virgatis, pedicellis suburbellalis.—in Japoniâ. *Prenanthes dentata* Thunb. (J. jap. 3oi. Willd. sp. 3. p. i535. *Choudrilla dentata* Poir. suppl. 2. p. 3a8. *Pren. denticulata* Houtt. pfl. syst. g. p. 5o. t. 66. f. 4 Flocot in invol. duodenii*. Caet. ign.

"TM"

13. Y. JAFONJGA, gla-bra, caule erecto debili ramoso subaphyllo, fblis radicalibus lyratis, lobis rotundatis obtusis ciliatis, ultimo maxirao angnato-dentato, paniculâ patente polycephalâ, bracteis setaceis. — in Japoniâ propè JVagasaki, Papeuberg, etc. *Prenanthes Japonica* Linn. mant. 107. Thnnb. fl. jap. 3o3. *Chondrilla Japonica* Lam. diet. a. p. 79. Flores flavi (Th.), in invol. circ. i5 (Linn.).
14. Y.? DEBILIS, glabra, caulis è collo plurimis erectiusculis subnudis, foliis radicalibus petiolatis ovatis obtusis integris, caulinis paucifl sessilibus, capitulis i-3 terminalibus. (j) in Japonia; marginibus viarum vulgaris. *Chondrilla debili* s Poir. suppl. a. p. 33a. *Prenanthes debilis* Thunb. fl. jap. 3oo. Flores lutei. Nuraerus florum non indicatur.
15. Y.? CHIWENSIS, glabra, caule , foliis radicalibus subpetiolatis ensiformi-hu.s, dentatis, caulinis sessilibus, superioribus lanceolatis integris, paniculae pedicel] is cernuis secundis. — in Chi Da et interioribus Japonia;. *Prenanthes Chinensis* Thunb. ft. jap. 3oi. *Chondrilla Chinensis* Poir. suppl. 2. p. 33i.
16. Y.PHASTATA, glabra, caule flexuoso erecto striato ramoso, foliis canlinis seruamplexicaulibus hastalis subspathulatis acutis dentatis, paniculâ subrotundo-coarctatâ. — in Japoniâ. *Prenanthes hastata* Thnnb. fl. jap. 3oi. *Chondrilla hastata* Poir. suppl. a. p. 332. Flores lutei. Nuuierus florum in descr. omissus.
17. Y.? HUMILIS, glabra, ciulibus è collo plurimis decumbentibus subnudis', foliis petiolatis lyratis, lobis obtusis, extimo rnojore, capitulis terminalibus subternii. (j) In Japoniâ. Flores flavi. *Prenanthes humilis* Thunb. fl. jap. 3o2. An Youngix sp.? sed numeras florum omissus.
18. Y.? MULTIPLORA • canle à basi ramoso infernè villoso supernè glabro, foliis glabris petiolatis runcinatis lobis ovatis dentatis, paniculâ fastigiatâ diffuse, (t) in interioribus Japoniae regionibus. *Prenanthes multiflora* Thunb. fl. jap. 3o3. *Chondrilla reultiflora* Uoir. suppl. a. p. 3i2. Color et nomeras flosculorum * ignotus.

DCCCXLIV. DRENANTHES *VailL act. acad. sc. par.* 1721. *Cass. diet.* 34./.; 96. 43.7*. 17'g. A9.p. 279. — *Prenauthissp.* Linn. Wld. etc. — *Chondrille* sp. *Lam.*

Capit. 3-5-florum. Invol. 4-6-p^y^«ni cylindraceum obtusum hasi caJyculatum). Rcc. nudtim. Styli exserti. Achaenia basi attenuata subcylindraca aut sub[en]lagona apice trnnata. Pappus pluriserialis sessilis ptlosus rigidulns nbus. — Herba3 crecta glabra?. Species genuinse Gerontogea?. Folia integra anl dentata. Capitula nutanlia racemosa aut paniculata. Cor. purpurea. — Genus apud hodiernos speciebushelero* geneis oneratum.

. * *Foliis canlinis sessilibus cordato-semiamplexicaulibus.* — Enropaeae.

1. P. TEHUFOMA (Linn. sp. 1120), caule erecto simplici, foliis lincaribus amplexicaulibus integerrimis, paniculâ laxâ, capitulis pedicellatis nutantibus. % in nemoribus montaois Delphinattus, Helvetia;, Pedemontii. All. ped. n. 828. t. 33. f. a. Chundnlla tenuifolid Lam. diet. 2. p. 78. ^v. ».)
- a. P. runruREA (Linn. sp. 11 21), caule erecto simplici, foliis oblongo-lanceolati* corilaio-araplexicaulibus subdenticulatis subiùs glancis, paniculâ laxâ, capitulis longè pedicellatis nutautibus. % in Euro pas nemoribus raontanis. Jacq. fl. aastr.t. 3r7. Gwrtn.fr. a. t. i53. f. 1. Schknhr handb. t. ar8. *Chondrilla* purpurca Lam. diet. 2. p.jrf. *Prenanthes amplexicaalis* Mill. (v. v. ets.)

* * *Folus caulinis petiolatis non amphxicaulibus* —Asiatic*.

3. P. BRUHOHilirA (Wall.¹ cat n 3^78. romp. 388), canle erecto apice paniculalo, foliis CAuhms petiolatis ovatolanceolatis mucionato-deutatis basi snbcoi-datis eE anguste. deemrentibus apice acuminate, surauus lanceolatis ..capitulis cylindncis 3-4-floris. — in Etuodo Kamaonensi Tnd. 01 "Vaiat glabra, ant canle folusqec sec us paginae inf nervum pilosiuscnla Petiolus auguste raaiginatus integer aut dentatus et ideo folia infer, foite snblyrata (v s. coimu ab hon. cui. mere. angl. Ind 01.) *
4. V QUINQUELOBA (Wall ' cat comp ii. 371), caale erecto simplici apice* paniculato, fohis longe petiolatis cord at is giosse et a< ate dentatis snbquinquelobis, sumiuis linear-lanceoiatis inciso-deutatis imo lineanbu^ intgeguinm, invol. 4-5-phyllis 4-5-flois. % ? in Gossain-Tban Nepahac legit cl. Wallich. Radix fasiiculdto-fjbrosa. Herba glabia cue bipedalis. Invol. squamae acutae. (v. s. comm. cum pnore.)
- 5 P AILIARI^IOLIA, canle simplici apice panicolato hinc indépetiolisqueprae-seiliui seufeis, foliis caulinis longe petiolaHis cordatis acuminatis gioj.se dentatis, dentibus mucionatis , fob" paniculae subsessibus linearl-lanceolatis, capit cylindraceis elongatis 3-flons.— In Indiae oient provinens boieali Occident legit cl. Royle Capitula 8 q lin longa. Qor. purpurex. Folia niagnit. et foiniā Alharise Setae taulis et petiolorum bubeibpae sieptulatse. (v s. couini a cl. Royle.)
6. P. RAFHANIFOLIA, glabia, cdiileiecto ramo&Q>paDirulato, foliis caulinis se»sili-bus basi attenuatis pinnatiidis acnminatib, lobis aontis dentatis, dentibus mucionatis, capilulib cylindraceis 3-floris —in India2 orient, piovinciis occid. legit cl. lloyle. Capit 5-6 liu. louga,. Coi puipureae (v s comin. à cl invent)
- 7 P HispinuLA, caule apice lamoso , petiohs folnsque spaise«etoso bispidulis , foliis caulinis aliis ovatis aliis Uiiidis, omuibus^acuminatis dentatis , ilentibm longe et calloae mucronatis, rapitulis glabns cylindiaceis 4-^oij|| — in India? oieut pio id lt l RP M g y Cl 6 7 lin. longa. Pap-pus densius "quain puuium baibellatus (v s. comiu a cl Royle.)
- 8 P ROSIRATA. (Rlume J bijdr. p 836), caule simplici apice panicnlato, toliis mfei pinnatisectis, segmentis 5-7 aiistnto-dentatis ovatis longe acuminatis suppei. puinatipartitis, lobis angustionhus elongatis, omnium termmali rnajore, invol. 3-4 floris — in sylvis allionbus niontiuin ins. Java. — Cauhs teTes «la-bei iistulosus. Ramuh et nervi fol. jnn. pubeiulo-pulveiulenli Pauicula Ton-gissimaovala (v s comm à cl. Blame.)

'J' Species non satis not re.

- <J P.*¹ TRYSMFOTJA (Willd. spec. 3. p. 1543), caule erecto, foliis lyrato-m'n- uatiildis dentatis, lobo teiminalihasiato, coiyombo nudo divancalo duhotoñio — in Ponto. Cbondnlla onentalis maxima Cichorii sylveslns folio. Touin. Go? S6. (>b. eiysimifolia Poir. suppl. 2 p. 331. Caet. ign.
- 10 P? HISPIDv(Pall itin i.app. n IQ6 et ed gall app n 39/fj, caule electo rainoso viigato setis sparsis lmpidnlo, foliis lineaibns nitegen inns basi seto", capitthhs paucis electis 8 lo-flois λ^vol. b-Dhyllis, pappo sessil in i_mperlo Rossico ad upas flam. Rhymni (WTral) montosas lofitOiopolim. Cbond 11₂ luspida Poir. suppl 2 p. 628 Moies pallide rlavi Diffeit a Pienantbe fl. fljvia in in\). 8-10 An Cbondnlla; ex Cass , an potius Youngiaj sp **
 - 11 P.?jAVANicA(Willd sp. 3. p. 15*4), caule erecto simplici•folia canlinis miditc-aniplexicailibus oblongo-laminhtis In.tqualitd dentalis in Java detexii cl Gaicin IVernciuni Ja\anicum fturm.il iud 174. t. 67 f. 1 Pien Javanica Wume bijdi 887 ? Soncbus Javanicus Spieng syst 3 p. 648 ' oijmlms4 oepbalus Invol glabra ec dyculata. Coi puipuica. <x Būim. Pam- <"la pyramnlaia ox Bluine An duea ^lirpes omniito eaedem "• An Mulgedu sp

Capit. ex Willd. snb-5-flora; sed plantam non vidit. Certis simē à Pr. purpurea
ſ diversissima!

12. P.? RHOMBCFOLTA (Willd. sp. 3. p. 1535), canle erecto ramoso, foliis oppositis! petiolatis rhombeo-ovatis duplicato-deutatis, pinniculis filiformibus. —ad Caracas legit cl. de Humboldt. Chondrilla rhombifolia Poir. ssppl. 2. p. 329. ('lores utin Lactuca murali ex W. a genere, forte a tribu, videtur repellenda?')
13. P.? RDNCINATA (Lag.-nov. gen. 24) » foliis radicalibus rancinatis spinulosocijiatis, ramis divaricatis hifidis, capilulis gem in is. solirariisve suboppositis pedicello squamoso longioribus. *1f* ad saxoram calcareorum ripas in Hispanic meridional]. Soucbus reflexis Lag. elencb. p. 15. Cast. ign. An potius Soncbi sp.?
14. P.? SQUARROSA (Thunb. fl. Jap. 303), canle erecto carnosō simplici, foliis sessilibus (Th.) amplexicaulibus (W.) rancinatis, lobis acuminatis recurvis deutatis, paniculā thyrsoidēa. — in Japoniā. Pren. laciniata Houtt. pl. syst. 9. p. 46. t. 66. f. 1. Chondrilla squarrosa Poir. suppl. 2. p. 332.
15. 1\? SUBDENTATA (Hook. misc. ». p. 221), radice repente snbramoſā parce foliosā, foliis lanceolatis, inferioribus infernē longē attenuatis rariū sinuato-dentatis, supremis integrerimis basi arplexicaulibus, invol. cylindrico. — in Peiaviā ad Lnrin prop̄ Liraam. Car. flor. et fruct. vix noli. "!"

♀ ♀ Species exclusae.

- P. ACAWTHIFOLIA Willd. = Phaenopsis acanthifoliae.
- P. ACAULIS R03A). = Youngia acaulis.
- P. ALBA Linn. = Nabalus suavis.
- p; AIBA- Big. = Nabaltis cordatus.
- P. ALBA JS Big^A. = Nabalus nanus.
- P. ALDA Ell. = Nabalas Fraseri. .
- P. ALTISSIMA Linn, rz Nabalas uitissiuinus.
- P. APHYLLA Nutt. = Lygodesmin aphylla.
- P. ASPERA Michx. = Nabalus Illinoensis.
- P. ASPERA Scbrad. = Chondrilla Schraderi.
- P. ASPERA Willd. = Youngia aspera.
- P. ASPLENIFOLIA Willd. r= Mycrorhynchus asplenifoli'115.
- P. AUTUMWALIS Walt. = Nabalus virgatus.
- P. BULBOSA DC. = Etheorhiza bulbosa.
- P. CAZVDOLLIAITA Wall. = Hieraciura Silhetense.
- P. COINENSIS Thunb. = Yonngia Chinensis.
- P. CHONDRILTOIDES Linn. = Chondrilla prenanthoides.
- P. CHONDRIMoittES Pall. = Chondrilla graminea.
- P. COR DATA Parsh. = Nabalus cordatus.
- P. cRKPIDHKA Michx. = Nabalus crepidinjlis.
- P. DBLTOIDEA Bieb. = Lactuca deltoidea.
- P. DELTOIDRA Ell. = Nabalus deltoideus.
- P. DENTATA Tj^unb. = Youngia deniata.
- P. DKKJrcuLATA Hontt. = Youngia dentata.
- P. DICHOTOMY Wall. = MicroMihiichus asplcnifolia#.
- P. DIVEBSIFOLIA Ledeb. z= Crepis Baicalensis.
- P. ERYXMIIFOLIA Willd. = Lactuca erysiinifolia.

- P. FASTIGIATA Bluiue. = *Youngia fastigiata*.
 P.* GIQANTEA Raf. = *Nabalas crepidineus*.
 P. GLABKA Heyn. = *Lactaca glabra*.
 P. GLAUCA Raf. = *Nabalus glaucus*.
 P. GLOMERATA Reichb. == *Senecio pubigerut**.
 P. GRACILIFLORA'Wall. = *Lactuca graciliflavia*.
 P. GRAMIKEA Fisch. = *Lartuca Fischeriana*.
 P. HAST AT A Tbunb. == *Toungia bastata*.
 P. BIERACIFOLIA WULD. = *Crepis pulcra*.
 P. HISPIDA Bieb. = *Phaenopus tuberosus*.
 P. HisriDA Pall. = *Chondrilla juncea*.
 P. BVMiLis Tbnnb. = *Youngia bumilis*.
 P. JAFONICA Linn. = *Youngia Japonica*.
 P. IXXINOENSIS Perj». = *Nabalus Illinoenais*.
 P. IHDICA Klein. = *Lactuca Heyneana*.
 P. XZTEGRA Thunb. = *Yonngia lanceolata*.
 P. JUNCEA Pursh. = *Lygodesmia juncea*.
 P. tiEviGATA Wall. = *Mulgiedium lsevigatuui*.
 P. TANCOLATA Houtt. = *Youngia lanceolata*.
 P. LYRATA Thanb. = *Lactuca lyrata*.
 P. MULTIFLORA Thunb. = *Yonugia multiflora*.
 P. MURATIS Linn. = : *Lactuca muralis*.
 P. NAPPA Torr. = *Nabalus nanus*.
 P. NEGRETII Req. = *Uarkhausia leontodontoides*.
 P. OBTUSA Ham. = *Phaenopus obtusus*.
 P. rAiricciA.TA Mcsneh. = *Crepis pulcra*.
 P. FATEITS Wall. = *Microrhyncbus patent*.
 P. riNNATA Linn. f. = *Sonchus leptocephalus*.
 P. POLYMORPHA > Ledeb. z=z *Crepis flexuosa*.
 P. POOSIA Wall. = *Youngia Poosia*.
 P. PROCUMDENS Roxb. = *Youngia procumbeni*.
 P. rULCHRA DC. = *Crepia pulcra*.
 P. PCMILA Baldw. =; *Lygodesmia ? aphylla* ?
 P. PYGM>EA Ledeb. = *Barkbausia pygmasa*.
 P. RACEMOSA Michx. = *Nabalus racemosus*.
 P. BACEMOSA Roxb. ==*Lactuca Heyneana*.
 P. RAMOSISSIMA All. = *Phaenopus vimineus* £.
 P. REPENS Linn. = *Choris repens*.
 P. RIGIDA Ham. = *Lactuca rigida*.
 P. RUBICDNDA Willd. = *Nabalus Fraseri*.
 P. SARMEKTOSA Willd. = *Microrhynchus sarmentosus*.
 P. 8AKMENTOSA var. Wall. = *Emilia prenanthoides*.
 P. sERENTARiA Pursh. = *Nabalus serpentarius*.
 P. SIMPLEX Puij.b. = *Nabalns virgatus*.
 P. SONCHIFOLIA Willd. = *Lact: ca Heyneana*.
 P. SONCUOIDSS DC. = *Mulgiedium acuminature*.
 P. SPIMOSA Tabl = *Sonchus spinosas*

STRIATA Blume = *Youngia atriata*.

- P. suAvis Salisb. = *Nabalus snavis*.
- P. TARAZACUIDES yVall- = *Microrhynchus taraxacoidei*.
- P. TDDEROSA Stev. = *Ptoaeopus tuberosus*.
- P., VERSICOLOR Tarcz. = *Ixeris vrsicolor*.
- P.* VIMITEA Lion.— *Phaenopus vimineus*.
- P. vRGATA Micbx. = *Nabalns virgatus*.
- P. TISCOSA Ban nig. = *Crepis pulchra*.

DCCCXLV. LTGODESMIA *Don in Edinb. journ. sc. 18*9. p. 3n. et inlinnced*
1830. p. 141. excl. spec. *Hook. ft. bor. am. 1. p. 295.* — *Prenanthis &p; auct.*

**Capit. 5-florum. Invol. tubulatum 5-phyllosum squamis ligulntis cari-
natis apice scariosis, basi squamulis plurimis brevissimis imbricatis
munitum. Receptaculum scrobiculatum. Achaenia linearia compressa
sulcata eroslria. Pappus mul^iserialis subpersistens fuscescens denticu-
lato-scaber. — Herbae Boreali-Americanae glabrae ramosissimae pauci-
ioliae. Folia alterna linearia acuminata, superiora squamiformia. Capit.
terminalia solitaria erecta. Cor. coerulea cavit purpureae.** -7- Species om-
nes mihi ignotae ulteriori egent examine.

1. L. JUNCEA (Don 1. c. Hook. 1. c. t. 103), canle ramosissimo stria to, foliis lineari-subulatis, pappi sefis numerosissirni.s scabris. *If. ad ripas flam, Missouri à River-Plattead montes(Pnrjjb), in planitie bassiccisad Saskatchewan(Drunun.).* Prenanibes j mice a Pursh £1. bor. am. 1 p. 498. Null. gen. am. 2. p. 123. Habilns Chondrillae junceae. Radix snbfusiformis longa. Cor. eceruleae (Hook.), sen purpnrea; (Pursh).
1. L. MINOR (Hook. fl. bor. am. 1. p. i§5. t. 103), caule ramosissimo obscurè slriato, foliis lineari-subulatis brevibus, pappi pills sub-16-plumosis. — in glareosiset alienosis ad ripas flum. Columbia propè Wallawallab frequens. x-2-pedalis. Priori habitu afflnis; an certè cougener?
3. L>? APHYLLA, 'hana snbaphylla, caule subsinpliri sulrato superne nudo, foliis ad basin liaeari-sabulatis angnstis integerrimis paucissimis remotis, ramis 1-cepbalis elongatis, invol. 8-phyllosum 10-ia-floris. % in Floridâ occidentali propè Semary (Nutt.) et in pinetis Georgiae (E11.). Preuantlies apbylla Nutt. gen. am. 2. p. 12H. etin Sillim. amer. journ. 1822. p. 299. Pren. pnmla Baldw.? Caulis Q-pedalis squama' spbacclata ad basin canlis. Flores ampli pal lid i roseo-
rubri, in Sill, journ. dicuntur 12 circuit. ligalati et 12 tubulosi. An ideo Ci-
caboracea?

Subtrib. VIII. HIERACIEM Less, syn 140. Don in Unnasd 1831. litt. p. 131.
excl. gen. — Lactuceae Hieraceae Eaw. ojmsc. 3. p. 45- excl. gen.

**Recept. epaleaceum. Papnus piliformis rigidiusculus fragillimus demùm
xpissimè sordidescens seu flavescens, pfis exactè linearibus nee basi lalio-
ribus nee plumosis.**

DCCCXLVI. HIERACIUM (1) Linn. gen. ed. Schreb. 1228. Juss. gen. 169.
*Tourn. inst. *267. Lam. ill. t. 652. Gcertn. fr. t. 158. Schkuhr t. a'ii.* —
Hieracii spec, et Aracium NecA, elem. 48. — Hieracii sp., Hieracioides, Calonia
(non Cass.) Mocnch meth. — Hieracii sp., OmaJocline, Phaeca&iuio, Ca Ionia
H. Cass. — Hieracii ap., Stenotheca, Aracii, Soyeria; et Crepidis sp. Monn. ess.

(1) Genus ruris cl. J. Al. Froelich Ellwangensis elaboratum et humanissimè com-
muniratum, additis tantum bine indè observatiunculis CandollaeanU.

— Hieracii, Crepidis, Lconlodontis sp., Geracium et Calonia *ReichenK¹*
Hierac. et Crep. sp. *Tausch hot. zeit.* i8a8 (i).

Involucrum ova turn saepè cylindraceum, squarnis linearibus obtusis,
saepè acuminalis, rariis 2 saepissimè plurimum serierum imbricatis, rarò
laxis compositum. Receptaculum iuclum, saepissimè scrobiculatum!
scrobiculorum pcTagonorum margine membranā in denticulos palea-
ceos rarò ciliiformes' niimimos dissectā asperum. Fructirs (Acbaenia)
pentagoni substriati saepissimè clavati erosres aut brevissimè subros-
trati , saepè o*>longi sen coiumnares, rarissime fusiform es. Pappus
persistens i-serialis simplex sessilis saepissimè sordidè albus , setis
rigidis scabris densissimis basi liberis. — Her^{ae} pleracque Europaeae
ruriis Boreali-Asialicac aut Americana?, paucissimae in bemisphaariā
australi orta?, perennes , caulescentes. FoJia alterna. Pili dentati stellati
seu glandulosi. — Species paucae achaenio subrostrato donalae, sua-
dente cl. Lessing, negante ci. Frcelich, forsan generice disinguendae ?

Sect. 1. COPHOLEPIDA.

Involuci squamae interna obtusae.

Subsect. 1. DASYCEPHALA.

Involucro plus minus hirsulo glanrinliferove.

§. 1. Piloſellae, radice ſcepē ſtoloniſcrd, caule ſcapiformi ſub''
aphjrllo, herbce indumento ſapissimè ſimpliſtelliſtallari glanduloso-
liſuto.

* *Stoloniferom*

a. Scapo monocephalo.

1. H. PiLosEtxA (Linn. spec. p. \i5), ſtolonifernm, ſcaſb monocéphalo, foliis
obovato-ellipticis integenimit, pilosis subtūs tomentosis, involuci glanduliferi
sqnamiſ uniformibns, ligulis discoloribns. % in Europa collibus ſiccis pascuis
ct ad vias paſſim Willd. herb. 14644. n. 1 (nee a). flor. dan. t. 1110. Sturm
27. Cave ne cum H. flagellai confundas.
- ^ . *incanum* (Frcel. mss.), foliis anguſtioribus apiculatis ſuprà cano-farino-
ſis ſobglabris, ſubiūs albo-tomenioſis. H. Filosella /g DC. fl. fr. 4. p. 23.
H. velntinum Hegetschweil. mss. (v. s.)
- y. *albo-barhatum* (Frcel. rass.), ſtolonum pilis albis, ſcapo 1-cephalo. (v.
v. s.)
- &. *Barbarossa* (Froel. mss.)%folioram tomento pilisque fernigineis. (v. v. H.)
- . *pilosulum* (Froel. mss.), ſcapo ſub- i-cephalo piloſo, foliis ſubtiis tenuiſ-
ſirae tomentoſis ſubincanis. (v. v. s.)
- f. *concolor* (Frcel. mss.), ſcapo i-cephalo, foliis tenuioribus ſubiūs ſnbini-
canis, involucro glandulifero hirsutoque. (v. v. s.)
- M. *stoloniflorum* (Frcel. mss.), ſtolonibus longiſſimis ramosiſ cephalopho-
riſ. Pilosella Cam. epit. p. 708. ic. (v. v. s.) *
- x. *bifidum* (Frcel. mss.), ſcapo ſubtricephalo, involucro hirsuto. H. flagel-
lare Hort. hall. (v. s. c.)
- a. H. PILOSELLJEFOIME (Sturm fl- 371!), ſtoloniferum, ſcapo i-cephalo apbyllo,
foliis obovaro-ellipticis ſubintegerrimiſ pilosis subtūs toinentoſis, involaci ſqua-
miſ exterioribus ovatiſ albo marginatiſ, ligulis ſubdiscoloribns. % in ſuuiſ

(1) Quoad Hieracii proles byhridas dicta* coufer. Lasclr in linnea A i63o. p. 447.

: *jugis* herbidis Galliae' Helvetiae' Tyrolib' Ravaūae' Caiinthix' monte Daldo' H Pilobella^gidndiJQofaDC. fl. fi.fl.p. 23 H. Hoppeanum Schultz austr.2.p 428 Mona ess. p 18. H Pilo&ella C. macrantham Ten. syll. p Jcig. (v. v. c.)

S. bifloruirij scapo dicepbalo. (v. v. s.¹)

y. *concolor*, liguljs Mib:us concoloibut> (v v s. in Alp Tyrol.)

3. H. PELTETERIAN^I "(DC fl. ft. 6. p 4^7\ stolomferum, scapo monoccipbalo cario-tomentosulo piloboque, foliis elliptico-lanceolatis suhinterimis tomentosis, involucrue squaiuis lanceolatis aculiu&cuhs unifouibus villosissirais, Jigulis discoloibuf. If. in colibus saxosib et ad margines aienosos rivulorum Gallise' Helvelise' Geimaniac' Meiatpai p 3o5 excl. syn. H Pilosella fi Poll. piil. n 7/o Moon e&s H Pilosella y Ser. in Duby but. 1 p. 3o2.

2, *majus* (Froel. mss[^], scapo dicepbalo (v. s s. ex arenosis ciicà Manheim.)

y. *stoloniflorum*, stolbmbus cepbalopbons. (\. s s)

4. H TEHOREANITM (Freel mss), stolomfeinm, scapo i-repbalo snbapbyllo tomentosiilo fobisque elliptico-lanceolalis subintegeniinis. villosis *>nbts tomentosnlis, capituli subiotundi fusco-lanati squanns erectis laxm&culis, lipulU subdiscolonbas. Of in pratis m Aprutii, vulgo *Majola* dicii¹ H P&eudo-Piloella Tenore cat hort neap ?pp t 69 Species capitnli figurâ et Indumento procul • dubio disticta, quibus uotis et ad H. glandubfeium llopp. proxime accedit (v s. &. comm. à cl. Tenor)

/2. *Scapo suprh medium diviso ohocepkalo*

- 5 H FLAGETI MIL (Willd. 5>uppl. p. 54), stoloDiferam, scapo sobaphyllo diviso sub-3-^ephalo, fobis snbmembrañaceis lanceolatjs sabintegeriinns &ubius cano-floccosli, pedunculis elongate cipitalibque globoso-ov.ifis glandulosso-bntis, pappo albidoie % in Hiunganae' Bohemia' pi a tis H. itoloniflo uni Waldst. et Kit. hnng 3¹ p. 3o3.*t 270. H duiicnlnpfoliom Taasch inbeib. bait, beiol. Stolones saepe arepbali. Capitnla llilib II. Pilohellx diraidiò minoia.

/2. *cespitosum* (Vra). inss), inbstolonifernra , scapis congestis ramosib polycipbalis ditbotomib. H colbnum Kostelesky? (v. & s.)

- 6 H BRACHIATUM (Hertol. in DC HOT. h 6. p 442), stoloniferum, scapo sobaphyllo diviso sub-5-cephalotomentoso piloboqe, fohis lanceolatis in petiolum decurrentibns Integeuiniis, &tolumbus nnllis Iangl c. (v. s. s conini à cl. Lang)

y. *hu siuissitnum* (Froel. msis.), stolomfeioft, scapo subdiplyllo diviso polycipbalo foilsque hneari-lanceolatis btrigoso-pilositi subtus tomentobis H. dubinni Sin but 2. p 4<<6? (v. s s)

^ *subumjlorum* (Froel mss), btoloniferum, scapo sub-i-cephalo piloso cano-tomentosulo, folns spathnlatu-lanceolatis subtm, cano- floccosis.

• (v. s s)

«* *polcephalum* (iMcL. n>ss), stolonibus sjepe florifeu's, scapo diviso, pedunculis 2-i-cephahs , folns lato-lanccolatis tenuioiibus snbtus cano-flocosis. (v. s. s)

- « H. nIFURCUM ^Bieb taur. 2.]• a5i), substoloinferum , scapo snbaphyllo divis^ oligocepabalo, fohis obovato-lanceolatis subintegernais iubtus cano-flocosjs, peclnnculis elongalis involucii&que fjauduloso-bispidulis, ligubs unicolonluis % iu pascuis m on to sis lauu?, Hobem* ' Saxmia-' inque \lpibus bilcsi.T!_ Tyiolis Mossl ct Reiibenb flor a p 1^79 'H collinum Gunthti

siles exstcc. Sequent! valde affine et forsan varietas, at scapo altioie crassiore, capitulis duplò fere majonbus pednnculisque glandnloso-scabiis rarò pilia simplicibus intermixtis. (v. v c coimm à cl. Gunther et Reichenb.)

o. simplex (Froel mss), stolombus nnlhs M. R. 1. c

y. subcymosum (Treel, mss), stol. subnulks, capitulis terminahbus 3 congestis bievi-pednnculatis (v. s. s)

i. stoloniflorum (Fioel. mss), stol cephalopboris (v. v. c. in hoit. prapr.)

8. H. SPHJcnoEFHArM (MCPSI et Reichenb. fl. 2. p 1386'), substoloniferum, scapo subdphyllo diviso oligocephalo folnsque spathulato-lanceolatis snbintegemtms subtus cano-floccosis piloso-hispidis, capitulis subiotundis hirsutissimis, peduncuhs elongatis, lignhs subconcoloribns. % in sumnum jngis berbidis AlpiumjTyrol. Sahsburg. Caunth 'HeUet' Bavaiae' Algol' H. dubium Hopp. fascicnl. 1801 p. 39. H. faicatura Hopp ex<-icc. H angustifohum Stuim flor. 3/. nioncente cl Hopp in lift H bybnduui Till voy. p 60 t a. DC. 11 fr. 6 p 443 H. stolonifejrum Desf cat b. par. ed 3. p. 146 Planta polymorpba herba giaciborc, capitalis minoibus., involucro hirsutissimo et pedunculisbirutis sobeglandulobis diffeit. Stolones plants spontaneae brevissimi ant nalg. 'Vix foisanabH. bifurco satis distinctum (v. v &)

. /? *uniflorum* (Froel. mss.), scapo i-cepbalo, stolonibas null is. (v. v. ft in Alp Tyi)

y. terminate (Frcel. mss), capitulis binis brevi-pedanculatis aggregatis, stol nullis (v. s. s)

i. corymbosum (Frcel. mss), scapo polycephalo corymboso, stol. nnlhs. (v. v. s)

[^]*. stoloniflorum* (Froel mss) scapo elato, pedunculis furcatis dicepbalis, stol floiiferib. ((v. v. cult in horl. mopi))

[>]*. parviflorum* (Frcel. mss), scipo subtricepbalo giacili, capilulis dimidio nnoiibus, pedunenhs glanduhfens. (v. v. s)

3-. *discolor* (Frcel. mss), flonbus ei.tus rubellis — H.alpicola. Tausch ! bem. p. 55 Mcsl. et Reichenb 2. p. i38o! (v. v. s. in consortio H. aurantiaci ciesc)

⇒ H. ALPICOLUM (Schleich exsicc n 6' nec Tausch), stoloafbus snbnllis, acapo snbdpbyllo diviso subdicepbalo glabnsculo, peduncuhs elongatis tomentobulis snbvillois snbtus floccosis, capltulu &ubheiuispb.erlcis lanato-barfatis, ligulis coucolonbus, If. in summis Alpibus Helvetiae Habitu proxime ad H. sphaeiocephdlum accedit, capitulo lnride lanato et pappo sordide albotacile distinguendum. Scapus supia mediumin pedunculoJdivisus. (•• 8-«)

y Scapo pul) cephalo corymboso.

10. H. AURICULA (Linn. sp. > p. 1 ia6), stolonifeium, scapo sabumfolio glabro, foil is spntbulato-lanteolatis subundulatis basi cibatis snbtus glaiuis, capitulis terminalibas subquaterms brevitei pednnculalia gldndnloso-bispidulis Europse pascuis et agris humxdiiiftcuhs passim H. Auricula DC. flor ft. p 24. fl. dan t. 1111 lauscbe bem. p 55. Monn. ees p 21 H. dubium Willd sp. pi. 3. p. i563. —her[^]. i46[^]5 n. 1, 3, 6 (exel 2, 4, 5). Sturm flor 37. opt et ommnin fere autt flor. germ. Affine H. apguslifolio. Piae sentem speciem veium H. Aunculam Linn. esse nullus dubitabat, qui viu immortalis flor. soeciam et quae clar Wableuberg et Fiies. monuerunt, rite consulerit. An H. Lactucella Wallr et H. Bessenanom Host hue referenda?

fi. Vahlianum (Fioel. mss), scapo glabro subtetracephalo, capitulis terminalibus con/eitis, stolonibns folnsque lufo-pilosulis. H. Auricula herb. Vabl lectnm circa Langelbladet Ornoja [^]v. s. s)

y. pedunculatum {Y|az| mss), scapo bubtucephalo, capitulis longe pedunculatis, stolonibns elongatis biisutis (v. s. s in beib. Yabl.)

/ . datum (Ficel. mss.), scapo sesquipedali folusque glaucis glabiis (v. « «)

«. polycephalum (Ficel mss), suipo glabro corymboso polycepbalo (v. v. s.)

£. stoloniferum (Vreel uiss.), scapq glabio, siolonibus cephalophoiis (v. t. s)

» *trichocephalurn* (Vreel rass), scapo glabro oligocephalo, involucris hirsutjs (v s s)

& *uniJlorurn* (Free I. mss.), scapo x rephalo, stolonibus snknllis. [y. v. s in Alp. 1 yr)

1 I H. SARMENIOSUM (Frcel. mss.), stoloniferum pilosum, scapo paacifolio polycephilo coymboso, foliis coriaceis hneau-lanceolatis acutis integernmis slngoso-piiosis. pedunculis cauo-floca>sis involuciisqne cylindiacis hirsutis, dlabastiib subcylindiacis. IL in montibus calcareis Hungarian¹ Galiciae' Rannatūs ' liavatie', H. aiiriuloides Lang in syll pi. p i83' II stoloniferutu Bess en p. 9'i teste Lang in litr. H Auncula Smith bnt p 8>8. ex monle Ceniso Capitulorum pai vitate et hirsutie fohoinn densā ugidaque satis distincta species et ah U. fallaci distincta

£. apterum (Tiocl mss.),'stoll nullis, foliis obovato-oblongis. H cymosum y stereotuchum Wimm tt Giab sil p 2i3 fid &pecim (v. s. >>)

y, *oblongum* (Ficel. HIM), stolonjfeium, fuliib latifibus oblongo-lanceolatis (l s a)

cT *leptophyllum* (Froei. mss.), scapo minus piloso, foliis anguste Unearibus, iuvulucio apice glandahftio. (v. s. 6. comm à cl. Kocbel.j

ii H GLAUCI*ctNs* (Bebs fl gallic, a p. i50), glaucum, stolonibm simplicibns repentibus, Scapo basi folia to itncto corymboho glabro, folns submembranaceis lanceolatis acutis subiutegerrnnis cibalis subtus nudis, pedunculis cano-toinrntosuh**, myloneri vaneg.ili squaims snnplici Aerie glanduloso-hirtellis, .il.ilidstns si/bcylndiacis %, in aigillo&is Galiciae Sequenli maxime aflare, dt colorc totius herb<e gljnco, stol simphubati brevionbus xpissirae glabns et lufettcentibus, foliis ngidioubus corymboqe oligocephalo satis distinctum

(£ *oblongifohum* (Fioel mss.), foliis oblongo spathnlatis. H radicanle herb. hort. beiol (v s c.)

y, *stoloniflbrum* (Frcel. mss | intense glaocam_f stol. adbcendentibas basi foliosis ilonfens (v. s. c)

i > H BAUHINI^RCSS. gallic i p x50), glaucescenti-virens, stolombns longis simis lamosis reptantibus biisntis, scapo stneto corymboso- snboligocephalo glabro , foliit submembianaceis lanceolatis acntis subintegernmis nervo maigioeqne (.iliais subtus denudatis, involucr vaiiegati squaruis simplici sene gluudulosis, alabastns cylindiacis %. in pascnis et collibns siccis Poloniac¹ Hungariae¹ Austi~~ja~~¹ Helvetiae, *Palatinarūs' TNes ab Esemb. bot zcit 1822. p 187' H. Auiicula Willd. spec 3. p 1664. — heib. 14645' Proximo accedit ad H. piaiallnin, at scapo prscallo gianli strictissimo, stol longissimis saepe lamosis rddioium mstai quaquā veisum diffusis apice ladicautibus, capitulis valde mediocnbis cymoso-corymbosis, flore pallide flavo, involuci squamis late albo maiginatis facile distin>gnendum Haec species nee alia in heib. Will-denoviano evstat (v v. c)

14 H. RADiorAULE(Tausch' in florā 1828. p. 55),glaaciuu, stolonibas repentibus, scapo electo basi subfoliato hnsuto» folns lineaii-laureolatis acutis subintegeriiniis margue cannāqne snbcibatis¹, capitulis tymoso-coiynibosis oblongo-ovatis gl.mdulosis biisnlisqne, pedicellis farinosis % in tmopae boieali. H. dnbium floi dau t 1044 secundum aichitypnin Kerb "Vahl" Habilu,affine . piaecedenti et feie intermedium inter hoc et H glautescens. Coloi glaucus totius hcibae insigns Capitula majora ovato-oblonga. Jjemiuia imsit cl. Schnltz bub nonune 11 Bauhini (l v c)

15.H riNERtUM (Tansch m florā 1828 Frcel rass), glancum, stolonibns elongatis suhraniosis lepentibus, scapo erecto snb\illoso, foliis longe lanceolatis acutis integeirimis suprà pilosis sabtis subfloccosis, coiytnbi subpamculosis laxe pendanculis tomentosis nivolicusque subiotundo-ovatishusutis, alabastns o|atis *lfj in piatis Bohemix Diftert ab affimbis H cnllinoet H piatensi colore tolius heib he exquisite glanco, inflorescentia pHiiiciilato-coiynibosa laxa , scapo ba>i

folia to superne snbrainoso albo-villoso, pedunculi.s elongatis fastigiatis subramosis, foliis ékngatis anguslē lanceolatis basi longē allenuatis suprā pilosis, capitulis majorrouis ferè H. Pilosellae, invol. sobrotundo ovato obtuso latitadine ferè longitudinem sequante. (v. s. comm. à cl. Tausch et Sternberg.)

f. orthopodium, stolonibus nullis.

y. fceundum, stolonibus floridis.

f. glabrescens, scapo foliisque minùs hirsulis.

16. H. MELAICHJETUM (Tausch in florâ 1828. erg. p. 58), glaucum, stolonibus p rostra t is hirsulis , scapo erecto subhirsuto, foliis linear-lauceolatis acutiusculis subintegerrimis nervo margineque ciliatis subtūs denudatis, corymbo cyraoso compacto polycephalo , pedunculis torquentis involucrue subvariegati squamis obtnsis hirsutis, alabastris obtusis. % in pralis et glareosis Bohemia! Hungarian ! Germaniae! H. Bacbini Scbult. obs. p. 164 non Bess. H. stoloniferum Bess. non^Viv.

f. simplex, stolonibns subnullis. H. Yaillantii Tausch 1. «. p. S7. •

y. pauciflorum, corymbo oligocepalo. H. melacaeturii Tausch 1. c.

undulatum (Tausch! non Ait.), affine H. radiocauli, sed invol. majora crassiora nigranti-hirsula, squamis lanceolatis obtusis latè scarioso-marginatis* Folia rigidiora longiora minùs glauca. Stoloues crassi elougati. Cv. a.)

17. H. colLiNUM (Gochn. cicb. p. 17. t. 1), viride/stolonibns elongatis filiforribus repentibus, scapo paucifolio subfarinoso hirsuto, foliis coriaceis lanceolatis subintegerrimis setoso-bispidis subtūs cano-floccosis glancescentibus, corymbo sulicymoso laxo cano-tomentoso involucrue glauduliferis hirsutisqne. % in pratis apricis montosisque, muris Germanise! Mohemiae! Tyrolis australis! Galliac! H. Auricula Willd. sp. 3. p. i5(H ex herb. 14646- n. i-3 nee feliqni. Nùm H. cymosum Spreng. hal. n. 8^5! nee fig. H. fallax Wallr. »cbed. p. /i4-? H. Rothianni Guerh. pl. exs. H. cymigerum Reichenb. et Mcsl. fl. p. iiN4. H. cymofnni ft longifolium Reich, ic. crit. t. 56. f. 116. Species valde intricate el imiltiformis, habitu H. pratensi niamimè afiinis, nee cum H. fallaci con fund en da. Color herbac intense viridis, stolones prostrali nee radicantes. Pili herbac breviores molliores nee setosi. Capitula nigrantia.

fL. aspemm (Tausch hem. p. 58), stolouiferum , scapo paucifolio foliisque lanceolatis aculis hirsutis. (v. s. s.)

y. Zizianum (Tausch 1. c. p. 61), slol. nullis, caule foliato foliisque oblongo-lanceolatis hispidulis. (v. s. s. comm. à cl. Ziz.)

18. H. PRATEWSE (Tausch bem. p. 56), stolonibus numerosis reptantibus, scapo basi paucifolio foliisque ineubranaceis subtūs denutlatis, rad. obl^pgo-lanceolatis subintegerriniis, reliquis lanceolatis, corymbi pedunculis tomentosis subglanduliferis, involucris nigro-hirsnlis. ?% in muris et collibus apricis Bohemia! Saxonia?! Palat.! Bavar.! Italia?! Sihirrie! H. dubiun Linn.fl. suec. p. 272. spec. I. p. 1115 teste Fries. H. cyraosum Willd. spec. 3; p. i5(?)6! herb. 14657 ! n. 1.I. 3.(excl. synn. Linn. Column.) Poll. pall. n. 743! Neesbot. zeit. 1822. p. 189! Stnnn flor. MO. 3g. Gunth. siles. exsice! H. collinum Willd. herb. 14648! H. Goebuali Mey! eutim.caac. 47O. H. praealtam Hop. pl. exs.? (v. v. s. et c.)

6. longifolium (Froel. mss.), stolonifernin, fol. rad. canlinisqne iuferioribus petiolatis oblongo-lanceolatis — H. cyntDsom longifoliam Sering. exsice! (v. s. c.)

y. stoloniflorm (Freel. mss), stolon, plerisque floriferis, foliis oblongo-lanceolatis brevi-petiolatis. — H. cichoriifolium. hort. bern. (v. s. c.)

i. minus (Freel. mss.), stoloniferum , scapo brevi minùs hirsuto cymoso, foliis elliptico-obovatis subglaucescentibus. — H. glaucescens hort. landshut, (v. v. c.) HERO species, nee alia , diagnosi H. dubii Linn, maximè respondet ex inflorescentia pra»cedenti', ex habitu vero' e| indumento H. »u rantiato proxima.

- . *auriculatum* (Sering. ex sice), stoloniferani, scapo foliato., foliis cauliui* lanceolatis sessilibus. (v. & c. comm. à cl. Sering.)
- £. *paniculaCum* (Ficcl. mss.), stol. nallis, caale ramoso palltenlato , foliis radic. sessilibus. (v. s. c.)
- n. *apteropodum* (Fioel. mss.), stol. nullis[^] scapo simplici cymigero, foliis lanceolatis acntis. (v. s. s.) .
- & *Pisanum* (Frccl. niss.), stolonibns nuraerosis filiformibus rails, sea pi simplicis cymâ pauciflorâ, foliis ellipticis tenuibus. (v. s. comm. à cl.*Targioni ex m. Pisano.)
- 29. H. AURA-NTIACUM (Linn, spec. 2. p. 11 26), stoloniferum obscuré virens, scapo paacifolio foliisqne ovato-oblongis subinlegerrimfs subdenudatis hispidis, coryrubro glomerato cano-tomentosulo glandulifero involncroqoe uigro-bispidis. If in snbalpinis et Alpibus totius Europaç ! Sibiriae! H. aurantiacum WiJld. bcrb. 14659! DC. §1 fr. 4. p. 18. Sturm SLOT. 3g. Jacq. austr. t. 410. Stolones in plantâ spontaneâ pauciores radiculis copiosis terrae infixi. Floret* auiantiaci rarò lutei. Herb a? bir^utes iosignis et rigida.
- yS. *ma jus* (Froel. mas), stoloniferum, foliis lato-ovatis, scapo elato, corymbo polyccephalo. Jacq. 1. c. (v. v. c.)
- y, *stoloniflorum* (Froel. rass.), stolonibas floriferis, scapo corymbo foliisque ut in priore.
- £ *medium* (Froel. mss.), stol. subnollis, scapospithamaeo oligocepbalo, foliis subnullis, foliis lanceolatis dentatis. (v. s. s.)
- «. *denticulatum* (Froel. mss.), stol. subnollis, scapo oligocepbalo subhnmlili , foliis lanceolatis dentatis. (v. s. s.)
- £. *fuscum* (Yill. voy. p. 19. t. 1. f. 2), stol. subnnllis, scapo humili sabdice-phalo, foJiis lanceolatis. H. Alpinum non laciniatnm flore fasco. G. Baub. prodr. p. 65. (v. v. a. in Alp. Tyiol. Algov.)
- ». *chloranthum* (Froel. mss.), stol. subnollis, scapo oligocepbalo, foliis linea-ri-lanceolatis, flor. flavislateis (v. s. i» comm. à cl. Scbleich.)
- d. *angustifolium* (Froel. mss.\ stol subnollis, scapo oligocepbalo, foliis li-neari-lanceolalij, flor. flavis. H. anrantiacoin All. ped. t. 14. f. 1.
- 1. *repens* (Frccl. mss), stoloniferum, bcapo crasso polyccephalo, corymbo composito, foliis oblongis obtusis. H. repens Willd. spec. 3. p. 1564! non Desf. (v. s. c. in herb. Will. i4663 !)
- [^]o. U. HYBRIDUM (Chjix in Till, daapb. 3. p. 100), stoloniferum, scapo paaci-folio furcato-ramoso hubpolycepbalo, pedunculis elongatis subtricephalis sub* eglandulobib luride bir&tatis, foliib oblongo-ovatis sabinteriimis subtùs floccosis, capitulis luride bispidi&simis. If in montosis aylvaticis Delphinatus circa Baux!, et in Pyrenseis. DC. flor. 6. p. 442. Lap. abr. p. 469. H. spurium Cbaix in Till. I. • p. 102. var. c. in notâ excl. syn.Vill. voy. Prcedenti maximè affine prapsertira var. 1, differt inflorescentiâ planè divers dicbotomo-paniculatâ , birsutie pedonculorum involucrique copiosiore sor Jidè flavicante, absentia glanduloram in pedlcellis et involucro et foliis subtùs evidenter caoo-floccosis.
- * *apteropoda*, stolonibas nullis.
- ai. H. "VAHLII (Froel. rass.), scapo subunifolio oligocephalo glabriuscalo, folik spatbulatis integerrimts pilosis margineiubtùsque glandulifetis, capitulis subtribus subcymosis, pedunculis tomentosis involucrisque subrotundis glandulosohirtis. If. iu Hispania? Species singuarU ex indnmento foliorum glanduloso ad g re gem H. amplexicajilis, ex inflorescentiâ verò ad Pilosellas praesertim va-riet.H. aurantiaci pioxime accedit. Flores aurahtiaci videntnr. Capitla ventii-cosa subglobosa den&isbime glanduloso-birta. (v. s. s.? in berb.'Vabliano à tergo folii, cui agglutinata planta est, notatur « ded. amic. Bernades Madrit. 178a •> quare patria dubia.)
- aa. H. ANGUSTIFOLIUM (Hoppe taschenb. 1799. P* 130), stolonibns subnnllis, scapo Mibunifolio , foliis linear - lanceolatis acutis integerrimis pilosis, capitulois ova Us Mjbternis sabrymosis hirsutis , pedanculis tomentosis glan-dulifens hirsutisque If in sumnñ herbidis jugis Alpium Carintbiae! TyiolU

adstr. 1 Sabaadiae! Bavaria;! Helvetia;! inqne Pyrenaeis? H. angastifolium Willd. spec. 3. p. 1465. herb. i564c). n. i. a. 3. 5! DC. fl. fi\ 6. p. 438. Moun. ess. p. aa. Hopp. exsicc. cent. 4! Vill. voy. p. 8g. t. 3. f. 4. H. glaciale Reyn.inem. suffit. p. 114. II. cymosum Schleich. exsicc. ? Habitu affine H. Auriculae. Aceedit quoque ad H. spherocephalai, quocum ipse cl. Hoppe in Sturmii florā confudit. (v. v. s. et sice.)

@. *Jlocosum* (Froel. rass.), scapo floccoso-tomentoso hirsnto. (v. v. s.)

y. *ma jus* (Froel. mss.), scapo elato fluccoso hirsutoque, foliis laDceolatis. (v. v^ . in Alp. Tyrol.)

J. stoloniferum (Froel. mss.)

t. *uniflorum* (Prod. mss.), scapp humili sabanifloro. (v. s. s. ex Alp. Alg.)

a3. H. PILÓSELLOIDES (Vill. delph. 3. p. 100. t. 37 bou.), glancum , stolonibua nullis, scapo stricto glabro subuuifolio, foliis coriaceis linear!-lanceolatis sub-acutis iulcgerimis suprà basique subpilosis, "corymbi ramulis laxiusculis demuii dichotomo-raceinosis" llexuosis , pedunculis involucroque cylindraceo glandulosso-scabris. *If ad ripas glareosas torrentium Alpinoruū et in summis jugis Alpicū Delphinatū, Sabandiae! Etrariae, Carnioliae! Helvetiae! Germ. me-*
rid. in. riorentinm AIL pea. n. 777. vnuu. spec. J. p. IJUJ. U«U, V^AU. U. 3. 51 Species berbae colorfe glauco, corymbi deilorati habitu pfopciq, foliorum corapago rigida coriacea, et floribus iu hue sectione miniuis eg regie distiucta.

y?. *armeriafolium* (Reicbeub. et Moesl. flor. p. 138a), foliis elongatis aogustè linearibus glaucis scapoque glabris. H. Michelii Tausch bem. p. 60. (v. v. s. ii^herb. Reicbenb.)

y. *ramosum* (Froel. mss.), scapo ramososabfoliato, ramis corymbosis. (v.'v. s. in Tyç bor. circà Imbst.)

\$pilosum (Froel. mss.), foliis radical, albo-pilosis. (v. v. s.)

f. *acutifolium* (Vill. voy. p. 59. t. 3), scapo buraili glanco, coryrabo oligocephalo, capitulo centrali xuajore. (v. s. s.)

a4< H. PR^M.TUM (Gocbn. eich. p. 17!), laete virens, stolonibus sabnullis, scapo stricto subuuifolio glabriuscule,foliis submembranaceis oblongo-lanceolatis subintegerrimis basi ciliatis siiblùs glaucescentibus, capitulis subcymosis oblongo-ovatis pedicellisque glandulosso-hispidulis. *If in muris vetustis, pratis montosis asperis inque vineis tptins Genuaniae! Galliae! Uelvetix! Italiae!* H. piacaltum DC. fl. fi\ 6. p. 44iTReichenb. icon. t. 55. f. 114. opt. "Vill. voy. p. 6a. t. 2. f. 1. H. rioreatinum Willd. spec. 3. p. i565i. herb. ;i465o. n. ia. Spi'eng. bal. p. aaa. t. 10. t. 1. opt. Species ob variabilein herbae efindumenti indoleni ajgrè deflnienda. H. piloselloidei aeque ac H. collino per varietates affinis.,Stolones sajpiissiine deficiurit, vere antem nimis pluviosa iisdem saspe ad-
essesolent.

fi. *obscruin* (Froel. mss.), obscurè glaucuui,fol. obovato-lanceolatis glabris uiargine uarinù canleque paucifolio toto pilus, cymse demùm inordinate involueris a,tro-virentibus squiqnis peduncnlUque nigro-glandulosis pilo-
lisque. H. obscuruin Reichenb. icon. t. 55. f. 115. opt. (v. v. s. in m. Thierstin et sice, coinni. à cl. Reichenb.)

y. *multicaufe* (Tansch bem. p. 59; %ol. nullis, scapis cespitosis, cent tali striclo subunifolio, lateralibus adscendentibus foliosis, capitulis glandu-
losis. H. Auricula Gaud. (v. v. a.)

< *pteropodum* (Froel. mss.), slolonibns repentibus scapisqne hirsutulis, ca-
. capitulis submajoribus glanduliferis hirsntisque. (v. v. s.)

<. *hispidulurn* (Froel. mss.), stol. subnllis, scapo basi foliisque piloso-bispidis. (v. v. s.)

&*.parviflorum* (Froel. mss.), stol. subnullis, scapo oligocephalo, capitalis mi-
noribus. (v. s. s.)

a5. H. FALLAX (Willd. cnam. p. 822. herb. 1647. n- ^ a!), cauo-virens, stol# snbnnullis, scapo erecto parc subpiloso, foliis bnceolatis acentis subintegerrimis suprà carinâque pilosulis subt'a cano-tomentosis, capitulis paniculato-corym-
bosis, pedunculis tomentosis involucrisque glandulileris hirsntisque. % in rn-

pibii* et inum antjqim Thunngiae, Saxoniae' Bavaria' H fall ax Reichbenb ic
t J9 f 82 optin DC £1 fr 6 p 443

C hirtelluin (I icel mss), stol nullis, scapo simplici cauo floccosojinto cy-
moso, foil is ineinbranaceis hncoelatis mollnei hirtis subtus cano iloccosis
H cymosnir Stunn fl 67 *bona Ob hirsutieni dcusam mollem brevihsimam
albain ut imque fubi paginain occnpantem foisan propna species (v v
b III Alp lyr Dockboch)

y paradoxum (Pi eel mss), sea pis cespitosis, ceuti di paucifoho erecto, la-
teral idsecudentibus foliosis tynii^ens H paiaadoxum Neeafkot zeit
D 18J? (V S S comm a cl Nees ab Fsemb)

£ decurnbens (f loel mss 1, scapo detumbente 1 a mo so folio so hirsato, larais
elongafis subditephalis, ltivolucus cano-iloccobis glauduloso-hispidis H
decumbens pdoscelloides hoit pans (v s c)

afi H DRLVISCAPUM (DC flor 6 p O*)), »tol nullis, scapo paucifolio toinentoso
folus lme-m-lifiiLti9 integeiumis albo strjosis sublongiore, pednnntlis sub
tnbus tei imnalibus corymbosis tomentosi<> subglandnlifens, involucio cmo-hir
suto % in Pyunaib oneat ad raont Cambiedases in valle Eyocs H pumiluin
lap i_s p 4oyexcl syn H (andollei Monn ess p 28 StatuiaH anga*Lifolio
pioxnum, tx mdmiuento vero H ethiodi maximē afhne Planta pygmaea in
tei coQ^eneies fete minima (v s e) in heib Roem)

/S *langiscapum* (Monut ess /), scapo foliis ttiplo longiore H angastifo
liui k Cuden DC 1 c

y *aurantiacUin* (Monu ess 1 c), floubus anrantiacis (testeMonp)
<? *umflorum* (I icel iuss), & capo i-cephalo foliw sublongioie ^ v 8 s in
hei b /eyh)

27 II ECHioiDts (Lumn pos n 782), stolombas nulhs, scapo basi foliato folus
que 1 inceolato linearibuscoii tceis stngomj. canescntibus capitulis tymosis, pe-
duDculis involucnj. que louu ntosis subbirsutisquc *If.* in collibus aspens apncis
Austr ' Bohemias' Sibiuae¹ Polonix, IUssitabie, 1 IQIIOL, Peisie Willd sp 5
p 1887¹ beib i47iB? Waldst et Kit hung t 8> opt Monn ess p a?
txel var > II lnyiobum Linn sp 1126 ex! lies Lain tnc 2 p 361 Jacq
inisc a p 670 Capitula in cymam conglomei itam collecta, magmtndine H
Auricula, supeianlia, ovata tomeniosa et busutuk Heiba cano torn en to si
I olia stugosa (v \ s)

/2 *multicaule* (I loel mss), scipis cespitosis, lateralibus adscendentibos Co-
hosij^ oligoieph ths (v v s ZuikenslTauf)

y *mvolnratum* (11 ms^, \ cyin 1 polycephalâ baai folus 3 5 congestisinv
luciati (v s s eSibina)

\$ *ramouim* (I r mss), caulc folioso lamoso panicnlato corymboso (v s s)
t *hispidum* ([r mss), villoso-bispidum , caulc praealto folioso corymboso
(v & s)

(. *Wolfgangianum* (Bess in litt ad cl Ztyher), scipo simplicissimo sub-
tucLpb ilo basi foliato folnsqr lineaibus cano tomentosis minus stngos-
sis (v s s com in 1 cl He^sci ad Zeyber)

a8 H SEIOERDM (Tauscb htm p 6?), stol nullis, scipolnsi foharo cano to-
inentoso folnsque lanceol His siibintegeriiinis submembnnaceis longe kiusutis
subtus me mis < oiyombo c unposito fastignto lixioscnlo, ^)ednn(ulis involucus-
que cano-toiuetosis buMilis % in collibus SixonioJ lioliernisp ' Hunguidc'
H cymosuin Spnng h il p J22 \ 10 f a H Rothiaunm Walli Scued
p /117 exel syn H mmouim \ 11 Rilhtent gcim 2 p ab i obs 1 M ixime
afdnne H eelnouli, cujns \aii(»a^{em} ohm ip\$L ttedidi, diifeit veio taule altioie
)uadis 1 imoso hirsufo, pilis ploiyitis patulis mollibns ad lentrni fere plumoso
denialis , f >lns p mlo Icnui mbus sparse et p «ten^ pdosis, sub tub paht btellari
dtnsioiccauo obdudis, capitulis cmbbioubus lon_Dt birj>utis Cauleb ut inpriore
zape ceptoy

~ *Rothianum* (Walli 1 c), beiba tola bnsutissima, scapo foliato laraoso
jtanicnlato (v s s com in 4, cl Rolh)

- y. *muhicaule* (Tausch 1. c.)^t scapis cespitosis pnealtis, lateralibus foliosis minùs iucanis hirsutis, capitulis corymbosis. (v. v. c.) •
 «*T. cynoglofsoides* (Frcl. mss.), scapo elalo foliato, corymbo elongato ramo-
 siore. (v. v. c.)
- ag. H. GLAUCIFONUM (Poepp.! exsicc), stokmibns nullis, scapo stricto. has! fo-
 liato supernè rarnoso paniculato-corymboso, foliis coriaceis elongato-lanceolatis
 subdeniculatis utrinque pilosis glaucis, pedunculis involucrisque glabris cann-
 floccosis. If in graminosis ilpiuis Aiulinin Antncensiun, Chili australis, all.
 6-700[^] ped. Pojpp.! diar. 832. Afiine H. setigero ob pilos foliorum rigidps et
 capitularum figuram. Caulis strictus basi foliatns crassus supcrm* ramosu*, ra-
 mis polycephalis erectis corymbosis. Capitula H. collino similia pa rùm majora.
 Involuta glabra. Folia >8 poll, longa, 4-^ 1 in- lata laoceolata, acutiuscula ob-
 soletè glanduloso-denticulata ulrinque pilosa glauca. (v. s. comin. à cl. Kunze.)
30. H. GLOMERATUM (Froel. mss.), stol. nullis, scapo subunifolio c.jno-floccoso
 subpiloso, foliis coriaceis linear-lanceolati.s aculis integreris subtùs to-
 lento-sulis, cdipulis cyinoso-corymbosis conglomerates bispidulis. If in prat is
 flliccis Borus.siae! Daniae.H. cynosum fl. dan. t. 810. Habilu H. cymigero maximè
 afflne à quo differt scipi indumento rariore, foliis coriaceis auguste lino;ribus,
 pilis brevibus densis hirtis, cymu com pa età oligocephalà , capitulis dirudiò iua-
 joribus, involucris glanduliferis virescutibus necincanis, pilis raiis iutennixtis.
 (v. s. s. in herb, lloieu.)
- f. *fimbriatum* (Fr. ras.s.), foliis lanceolatis denticulatis. (v. s. s.-io herb.
 Schreb. sub nomine H. fimbriatim.)
31. H. CYMOSIM ("Vill. voy. p. ^2 t. 4. f. a. opt. nee Linn.), stol. nnllis, scapo
 paucifolio apice tomeutosulo glanduliferoqe, basi folisquesubiiitegerim.is.se-
 tuloso-liirfis, reliqnis subtùs floccosis , printordialibts obovatis obtusis, reliquis
 ovato-lauceolalis, cyiuā regulari compositaconiMaclà capitulisque sericeo-villo-
 sis. 1\$, in niontibus et collibns saxosis apricis, Galliae, Helvetia;! Sabaudiae!
 Gerroaniac ! Bohemia! Hungarian! Austria; II. cyinosum Reichenb. ic. t. .17.
 opt. DC. flor. 6. p. 440. Species ab auctoribus passim cum afluxibus confnsa ,
 ipsi Willdenovio iugot;i, regionum, ut videtur, meridionaliunf Kuropac incola,
 nee planta^t Linn.X'odescripta, habitu et iiiflorescptiapnrcedentibns'J speciebos
 proxiina , figura folioriini H. aurantiaco et prateni tnagis affinis. Pili foliorum
 constanter densi, jam longiores et rigidiores, jam breviores molles observan-
 tur, rare deiiciunt, quare vix notam differentiae praebere possunt. Capitula mi-
 nuta vix illain H. pilosflloidis magnitudinein acquirunliRadicem in umltisspe-
 ciiniriibus spoutaneis ctcultis nunquam stoloniferam vidi.
- >6 *glanfiuliferum* (Tausch 1. c.)_t capitulis cymosis compactioribus nuinerosis,
 foliis ovatis sparsè molliterque hirtis. H. cymosna Tausch I.e. (v. s- s-
 coram. à cl. Monn/et Kosteleski.)
- y. *AUiortii* (Tansch bem. p. 58), capitulis minimi numerosis cymosis , folii*
 rigidiорibus densis et longius hirsutis. (v. a. s. ex Alp. Pedem[^]jpt Uelveticis
 comm. acl.Balbis et Nctler.)
- t. *muhiflorum* (Vv. mss.), herba longèdeuseqnehirsuta, floribus croceis? H-
 multiflorom^t Gaud. (v. s. s. coram. à cl. Sclileirh.),
- ^. *Nestleri(Vrai)*. mss), cym.T ramis numerosis elongatis polycephalis, caule
 elato foli.lo hirto, foliis omnibus lanceolatis subpriolalis repandodenti-
 culatis hiitulis. H. Nestleri "Vill. voy. p. 62. I. 4. f. i..opt. Kolia nou gla-
 bra sed breviler hirtula. (v. s. s.)
- 3a. H. CYMOSIFORME (Frocl. mss.), siol. nullis, scapo infernè folioso, foliisqae li-
 neari-lanceolatis acutis subintegerrimis floccosis hispido-hirsutis , capitulis ry-
 inoso-corymbosis, coryinbi ramis ereciusculispolycephalib cano-tomentosis in-
 volucrisque ovatis albo-villo*sis. If i> montosis asperis circa W'finlieim inter
 Heidelberg et D.tiinstadt. Plant.iin praecedentibus Auabus speciebus maximè af-
 iinem aegrè distinguo, 4istiucta tamun videtur capitulis plus diiuidiò Inajoribu[^]
 ovatis villosis, inflorescentiacymoso-corymbo&scapoaltio& robustioroifernè

magis folioso, foliis angustè lanceolatis, hiisulif longiore rigidior patentissimè, qnos cbarakteres nee cnltora mulavit. (v. s. s. et cult. comm. à cl Heiai)

**§. 2. Pulmonarise, floribus constantcr nullis, caule folioso 1-00-
cephalo y herbce indumento vecpissime piloso sea glanduloso,**

Foliorum pilis simplicibus.

33. H. ArriNU'a (Linn. spec. 3i p. z 124). viride, caule sub- !-cephalo subum-folio foliisque oblongolanceolatis inlegeirimis subdentatis villosis glanflalifens-qae, capilnlo ventiicoso laxiusculo basi involucrato villoso subobtaso , Jigulis extus pubescentibus If, in Alpiura jngis subheibidis solo tuifoso sicco Europae totjus Asiae! Ameiiae borealis Species ex varii soli natalis et climatis conditiombus quam maxiine pioteiformis. Praeier diveisissimas herbae foimas singulaie offeiant phenomenon : capital* ex floram nnmero duplo tiplöve aacto pra?grandia-et ventucosa Constantes cbaiacteres sunt, bgulæ cxtus pubescentes, folia villoso glandnlifeiaqne, capitola cxtus mvoluciata laxa. H **Alpinum** WillJ sp. 3 p. i56r. heib. i/464o! Tau^{ch} bera p. 61. Monn. ess. p. 59 A. Sow. cngl bot. t 1119 H. pumilam Willd sper. 3. p. a56i ' beib. i/|64i!DC £1 fr.6. p 435. Hopp. exsicc. Stuu flor. 3^! H hybndam \ill. danph. 3 t. 26. (v. v. s.)

A. *orihocephala*, cjpitulîs gracilloribus minonbus snbinvolucratis laxius-cnlis.

/2. *pumilum* (Hoppe), caule i-c°pbalo subunifolio, capitalis obsoletè iovolciatis minus laxis, foliis spathnlato-lanceolatis subintegerumis. Hoppe et anct geim (v. v. s.)

7. *Barbarossa* (Frocl. mss), scapo unifolio z-cepbalo foliisque lufo-villosissi-nns. (v. s. s.)

<T. *canescen'i* (Ficcl mss.1,srapo aphyollo 1 cephalo foliisque linearis-pathalatis Involutroque rano-villosis, (v v ill Alp T^i. meiid.)

«. *pusillum* (Fial mss), caule buiuli i-cepbalo subunifolio, foliis spalhulatis integer^inn's minus \illosis. H. pusillum Puisb? (v. s.s. ex. Alp Lapp.)

£. *deapiens* (Fiocl. mss), caule sub-i-fylio sub-i-cepbalo, foliij spalhulato-lanLeolatisdentutis. H. pumilum Sering. exsicc ! ^v. s. s.)

»». *hybridum* (yill 1. c), caule 1 cephalo subbifolio, folfls lanceolatis denta-tis (v. s. s. comm. à LI. B.ilbis)

d. *flocosum* (FIGL'1. mss), caule suboligocephalo subtrifoliato, foliis lanceo-latis acutis subdentatis subcano-floccosis. (v. s. s.)

1. *myophorum* (11 mss.), caule myophoio (v. \. s.in Alp. Algov)

x. *foliatum* (Frodl. mss.\ caule i-cepbalo tnfoliato superne glan^olifero, foliis Ltnceolatis subdeutaiis. II. Halleri Willd. herb. 14711. n. 2, yS. x exel a-4 \y s. s)

A. *glabrescens* (Fioel, njss.), canle folioso sub-z-cepbalo foliis radical, ovato-lancfol.Uis grosse dentatib. II. Halleri Schleich exsicc Stuu flor. 39! Gaud helv. 6 p 68 Willd spec. 3 p. 1587 nee Heb

,u. *tubulosum* (Schleich exsicc), canle subunifolio subiuonocephalo, floribns tubulosis. H tubulosum Willd. beib. 1470. n. 1. H. pilniilum tubulosum Seiing ! ^v. s s.)

v. *ramosum* (IM mss.), caule raraoso folioso tucephalo. H. Halleri Vill. delph. t.34.j(v.s. s.)

£ *albo-vilosum* (Ficel mss), caule 1 cephalo folia to foliisquo spathulaTo-li-nediibus longealbo villoiissimis squamu.aliquot inteiuis accummatis —F01-ma inteuiedia hanc speciem intei et H villosum. Capifulsubglobosi ventiicosi, squama: exteinæ obtusse, inteinoum 3-5 hneaubus acuminatae. Tolia villosa nAnjectis paurioubus glandulis stipitatis luinimis. Pili longissiroi molles albi strati (v. s. s. comm. à cl. Kiischleger ex Vogesis gpbagnetis)

p. *macrocephala*, capitalis pr.Tgrandibas ex florn% i naineio daplo Iriplövo judo venhicosjslaxis obvallatis.

- o *Willdenown* (Frcel. mss.), 'den<>r villosnm, cinle i-cephalo subfoliato, folius lanceolatis argute dentatis. 11 Hallen Willd. herb. 14711 n. 1 et 4 lunsch bein p. 63 (v. v s.)
ir atncapiUum (Hopp. in litt. 1, canle i-ceplialo subfoliato, foliis rad spathulato-ovovatis dentatis. H Hallen Stuiiu flor* 3q, (v s s comin à cl Hoppe)
f. *leptophyllum* (Frcel TOSS), caule subnDifolio i-cephalo, foliis hneari-lanreolatis integrenns (v v s)
a- *flosculosum* (Fioel ross), caale sub-i-cepbalo subfoliato, floi tubnlosis.
Hoit hafn (v v c)
T. *polytrtchum*, m\ol pills albidis H. polytrichdm Ledeb fl alt ^ p. i3o.
m Sibiria Altaitâ.
- 34* H. BELLIDIFOLIUM (Froel mss.), viride, caule i-cepbalo subanifolio fohisque sabintegerrimis glandulifens, radic. obovato-spathniatis, caulino ovato-se-miamplexicaali, capitulo inviacrato snbimbncato gh>ndnloscabo , ligulij> sobpubescentibas % in Alp Cannthiacis ' Salisburgenibos PHabitu praceidenti maxime affne , sed indaraento partium glandnloso certe diversum Cipitalnm ova t am squamis 4 ex terms laxinsculis Jonfjis bubinvolucralum. PJI peliorum albi denticlati, in foliorum maigme rarissinie pei xtatem evanescant. (v. s s coimm à c) 'Vest)
35. H. SUDKTICUM (Sternb in act soc regensb. 1 p 62 ic.), canle erecto fo-hoso snperne tanioso oligocephalo fohisque glandnloso-dentatis biisutis, radicibus evanidis seu pancissimis, cauhnis ovato-lanteolatis, inferioribus petiolatis, snpenoribns sessilibus, pednnclis erectis involucroqne laxinscnlo nigricante glandulosis liirsntisque, sqnamis suba?qna)ibns obtusis, ligalis glabn*> % in Sndetis (Sternb ' Tausch '), Alpinis Silesia» (Gla/), Caiinth ' (Vest), Algeria?.
•Efauilia H. Alpini Folia mterpilos glandnlis minira sparsa Planta obscurie viridis.
ff *simplex*, caale submonocephalo, foliis lanceolatis snbdentatis (v. s)
y *hirsutum*, caule fohisque villosis H. amplexicaule J2 hirsutom Tausch '
1. c. (v s.)
<T *ramosum*, canle elato ramoso polycepbalo. (v s)
- 36 H. NIGRESCKNS (Willd sp 3 p 15^/), caule electo oligocephalo subaphyllo pnberulo fohisque hirsuhs , radicabbus confertis longe petiolatis o\ atis s ova-to-lanceolatis, mtegris s grosse dentatis, pcdoncuhs patnlis tomctosis involucroqne laxinsrnlo nigricante glanduloso hirsntis, *qnamis aliquot interni* snbulatis, hgnlis glabns % in montib Sudetis Silesiae. Willd. hort beiol. x p 7 t io herb n 14674' Priou maxime affine , variat qnoque canle simplici I cephalo, foliis argutius dentatis integuisque Differt foliis radicahbns plunbus fascicalatis, caule saepissimè aphylllo i-foho nimore solitario, invol nigii laxi squamis 5-6 subulatis intemis, dentibns li^alaiam puberulfc, lamUs. pendunculis patentibus (v. s. conim à cl Tausch)
- 37 H. TRISTE (Willd herb 14662'), caule snbfoliato oligocephalo subpanicu-Jato, foliis radic oblongo-ovovatis integrernmis petiolatis hirsuluhs glanduhfesque, canhnis lanceolatis villosis, capitulissubglobosispedunujjisque lanatis 2f in insula Unalashkà Spreng syst 3 p. 640 Monu. es p 68. Indumentum foliorum duplex ut in H. Alpino Capituli forma et magnitudo H. alpicolo si-minima Flores minutæ ex capitulo parum emergunt Color herbe tristis ex nigricante glaucescens. PIII neduntlnlorumet involucen longissimi hispido-fusci fere inflexi (v. s s. conim à cl Chamisso)
0. *humile* (Frcel nns), caule pygma?o snb-'j-cephalo snbbifolio (v s s.)
>. *multiflorum* (rial mss), caule pedah polycepbalo folioso. (v s s.)
cT. *dentatum* (lice! mss), caule polycepbalo, foliis repando-denticulatis (v s s)
38. H. ARCTICUM (Frcel mss), caule simplici subfoliato ohgocephalo corymboso, folus omnibus pctiolahshiisutuli!. glan< is membranactis, radic< obov it's denti-

culatifi, caulinis lanceolatis, pedunculis simplicibus capituloque ovato-nigro-hirsatis. *If.* in Americā sept. Norfolklantl. Habitus oruninū 11. tristis at capilla inultō ininoru ovata nigro-hirsuta , nee lanata. Caulis gracilis strictus paucifoliussnperne in pedunculos 4-5 corymbos simplices terminates. Folia juniora hirsuta praetereaque pube tenuissiuā articulatā instrincta. Involucrī squaiuis Internis obsoletē obtusis. (v. v. s. COIQIU. à cl. Martius.)

39. H. INTYBACEUM (Jacq. austr. app. t. 4^!), glanduloso-viscidum, canle subrainoso folioso oligocephalo, pedunculis apice incrassatis, foliis liueari-lanceolatis grossē dentatis sessilibus, capitulo laxo involucrato. *If* in glareosis Alpium editoYum ! Pyrenaeorum ! Galliae! Vogesorum! Helvetia;! TyroJis! Carinhiae! Styix! Sabandias! H. intybaceum AH. ped. t. 3i. f. 3. opt. Willd. herb. 14698 ! Monn.ess.p.47.H. albidum "Vill.daiiph.3. p. x33! DC. fl. fr. 4.p. 'ii. Lepicauno intybacea Lapeyr. ;ibr. p. 479^j Leontodon hispidum "Vand. sagg. st. nat. com. 1763. t. a2. H. Alpinō proximani, floribas sulphureis, her bye odore balsameo et visciditate, involucro squauis 4 exterioribus longioribus foliaceis patulis obvallato facile distinctuin. (v. v. s.)

fi. involucratum (Gaud, helv.), involucri squamis aliquot externis foliaceis internas longitudine superantibas. (v. s. s.)

y. parviflorum (L'reel, mss.), minus viscidum gracile glaucescens, capitulis duplo ininorilms. (v. v. c.)

cf. tuBulosuin (Lain. diet. 2. p. 367), foliis angustē linearibus sinuato-dentatis, capitulis minoribus ligulis abbreviatis. II. tubulosum DC. fl. fr. 4. p. 32. Lois. gall. 2. p. 522. (v. s. c.)

«. *balsamicum* (Fra-1. nss.), oanle subrainoso oligocepbalo, foliis rad. aggregal Lanceolatis denlatis caulinis paucis ovato-lauceolatis sciniainpleaticaulibus. Habitus à typo valde recedit nec tauten propria species esse vide In r. (v. s. 8. comin. a cl. Lapeyv. in herb. Rocmei et Willd. n. 14701^h

40. H. PICROIDES ('Vill. voy. p. 22. t. 1. f. 3), glanduloso-hirsuturo, caule orepto Tolioso subrainoso corymboso, foliis canlinis cordato-lancolatis amplexicaulibus denticulatis, pedunculis cano-fauiuosis involucrisque glanduloso-hispidis. % in sumrnis Alpibus Helvetiae! Sabaudiae (Rent.! in h. DC), Pyrenaeorum! M. picroides Moim. ess. p. 34. Gaud. fl. helv. 6. p. n5. H. ocliolcicum Srlileicb. cat. 1821! H. laneolalam Schleich. exsicc! Herbse indumento glanduloso. Ii. amplexiculi proximum. Habitu ad H. prenanthoidem propiusaccedit, capitulo slmplici nee involucrato. Flores flavo-sulphurei. (v. s. s.)

tt. ramosissimum (Hegetschw. beytr. p. 35g), viscido-hirsutum, caule ramosissimo polyceplialo, foliis ovatis dentatis. (v. s. c. in herb. Hegetschw.). H. Sabaudnm lanceolatnm Gaud.

y. pallescens (Froel. HISS.), viscido-hirtam, caule corymboso, foliis caulinis inferioribus radicalibusque petiolatis oblongo-lauceolatis. (v. s. s.)

«T. pubescens (Gaud. 1. c. 0 pilosum), caule inferne foiliisque radicalibus pubescentibus cglandiilosis. (v. s. 5.)

41. H. COTONKIFOLIUM (Lam. diet. 2. p. 3G7 excl. syn. Hall.), aphyllodium, raule erecto folioso subpolycophalo corymboso foliisque lanceolaiis aculis deutatis basi amplexicauli bus subtūs concoloribus villosis scabris, pedunculis involucroque fauiinosis glanduloso-hispidis. % in Alpibus Helvctiae! Tyrolis! Algoviae! Pcdemoulii! CarinthiiL! Pyrenajorium! Habitu H. prennnlhodi maximē affine, à quo differt capilulis dimidiō majoribus magis ventiicosis , peduAculo-rrura involucrisque pilisglanduliferislongioribus et densioribus, herba ex pilorum Jmlbillo ligido-scabra, foliis subtūs nee reticulaiis nee glaucis, lanceolatis dentalis nee panduriformibus.

ζ. *Bocconei* (Frocl. mss.), caule simplici oligocephalo. H. montanqm mali cotonei folio. Bocc. mus. t. 53. f. dextr. (v. v. s.)

y. trichoccephalum (Frcel. mss.), caule elato llexuoso polycephalb, foliis latioribus minus dentatis, invoUicrovilloso, capitulis raajoril>us. H.SieberiTausch bem. p. 75?(?. s. s.)

4a. H. PREKANTHOIDES (Vill. dauph. 3. p. 108!), aphyllopodoro, canle simplici stricto folioso coryiuboso, foliis membranaceis denticulatis ciliatis subfas reticulatis glaucis, caulinis oblongo-lanceolatis amplexicaulibus, inferioribus basi angustatis anriculatis, pedunculis capituliscue oblongis glandulosi-hirris. *IL* in Alpibus Galliae! Helvetia! Sabaudi-e! Bavaria! Austria; inque Sudetis! et Pyrenaeis! H. prenanthoides Vill. voy. p. 58. t. 3. f. 3. bon. Willd. herb! 14721! Geracinn prenanth. Moesl. et Reichenb. flor. i. pl. 36g! H. cydonias-folium Schleich. exsicc! Caule à praecedente et sequentibus 3 speciebus, quibus habim affine, distinguendura. Folia forma varfa, constanter membranacea subtus glauca albidas. rufesceni-reticulata, molliter hirsuta, s. margine tantum ciliata, radicalia florente caule constanter nulla. Cory in bus terminalis simplex oligocephalus s. compositus glutinoso-birtus. Capitila mediocria ma-^{*}niludine H. Auricula?. Synonymiam anxiad exempla archetypa emendavi. (v. v. ^pstin Alo_v, Anstr. Tyr. Bav. Algov.)

S. maximum (Froel. mss.), caule sesquivnbitali densè folioso, corymbo composito nigro-glanduloso, foliis miniis glaucis. (v. s. s.)

y. *denticulatum* (Fioel. mss.), caule stricto folioso paniculato corymboso, foliis lato-ovatis basi cordato-amplexicaulibus deniculatis. H. denticula-tuin Smith engL.bot. t. 2235. Monn. ess. p. 33. excl. var, et. (v. s. s. comm. à el. Koch ex Alp. Scotiae.)

cT. *glastifoUum* (Willd. herb. 14691!), canle graciliore villosulo, foliis lanceolatis glaucis. (v. s. s.)

t. *bupleurifoUum* (Tansch), foliis elliptico-oblongis denticulatis snpra pii-bascentibus snbtiis Ijirsutis minus reticulatis glaucis. If. mont. mali colo-nel folio. Boca mus. 75!). fig. sinistra. (v. v. s.)

£. *spicatum* (All. ped. n. 795. t. 27. f. 3 nee 1), caule villosulo apice corymbo-paniculato, capitnis parvis, foliis membranaceis glaucis. H. spicatum Sut. lielv. a. p. 150. 'Vill. voy-1. c. (v. s. s.)

a. *pauciflorum* (Froel. mss.), caule pedalis simplici minus foliososnbtricephalo. (v. s. s.)

3) *paradoxum* (Froel. mss.) f caule gracili sparse'folia to, foliis l*nnibns snb-pellucidis oblongo-lanceolatis, inferioribus sessilibns nee anriculatis. (v. s. s.)

1. *elongattmiYrcd.* ms.O, villosulum pallide virens, caule folioso paniculato corymboso, pedunculis cano-floccosis involucrisque glandulosi-hispidis foliis denticulatis, snperioribus ovato-oblongis basi cordato-amplexicauli-bus, infer, panduraeformibus, seu oblongo-lanceolatis infra medium constrictis basi denuò in auriculas rotundatas ampliatiss. H. elongatna Lap abr. p. 476J (excl. var. X et Till.) DC. fl. fi. suppl. p. 436. Duby hot! gall. 1. p. 302 teste Monn. H. cerinthoides Monn. e&s. 1. c. (v. s. s. in herb. Riemer comm. à cl. Lapeyr.)

x. *Coderii* (Froel. mss.), foliis membranaceis pellncidis ovatis grossè dentatis petiolatis, petiolis mediorum alatis basi aiirirulato-amplexicanlibiis. Forte propria species, media inter hoc et H. sylvaticum. (v. s. s. epinra. a cl. Coder & Pyrenaeis.)

43. H. PERFOLIATUM (Froel. mss.), aphyllopodium, caule erecto folioso corymboso-paniculato foliisque cordatis acutis lato-amplexicaulibus subdenticulatis submembranaceis hirsutulis subtus glabris reticulatis glaucis, corymbo involucrisque oblongis glandulosi-hirtis. *?* in Helvetia? Species pulcherrima ab affini H. prenanth., foliorum forma et compage singulari foliis Bupleuri perfoliati similis, verè distincta. Folia radic. sub antebis nulla, caulinis plurimis patentia exquisitè cordata et amplexicaulia, ut apiculæ rotundatae caulem moltum su-perent et sibi incumbentes perfoliatae videantur. Capit. medioeria. Inv. squamæ internæ lineares obtasae. (v. s. s.)

44.; H. STRICTISSIMUM (Froel. mss.), aphyllopodium, caule stricto sii.plici folioso apice corymboso hirsulo, foliis coriaceis lanceolatis acutis semiainnlexicaulibus ciliatis subtus glaucescentibus grossè reticulatis, inferioribus elongatis basi angustioribus, corymbo snbeoarctato involucrisqne ovatis glandulosi-hirsutis.

**Ex m subalpims Austrian Schneebeig' et Pyrenaeis? H denticulatum var et Monn. ess p. 34 excl syn Sinilh et Spieog. Habitu et statutâ H pie-nanlh. niaminc afitne, quo Oiuui oliiu conjnnxi, at differt taule iigidiore stncto, folns coiiaceib ligidulis lauceolatis argute serrato-dentatis ciliatis subtus obsolete glaucesceutibus grobse reticulatis. (v. v. s.)*

45. H cYDOWi/cFOLTTJM('Villdanpb 5 p/107), pbyllopodamhirsutnm, cauleeicto folioso 001 ymboso, foliis suLinembranaceis denticulatis subtiis cano-glancis bubielHulatis, radic caujini&que jnfeiioibus petiolatis obovatis, superioribus ovato-lanceolafii sciniamplexioaulibus*, pedunculis capitulisque subiotundo-ovatis glanctilosso-liispidtilis If. in Ajpibus Germamae! Helvetia; Galliaj' If. cydoni&foliuin Willd. quum p 8a4 beib. 14689'Tauscb bem p ^5 ex.cl. syu Slernh H. pienanlboides III Gaud fl. belv 6 p 114 excl. syn. plensque "kabitn H. pienantboidi similliinura, a qno mihi plane differre videtur, statniâ omnium paivum mlnore, pn^enlia folioium ladiculum sub .intbesi, (dulinis batu nunquam cordalis nullo modo annulatis, capitulo breviore fere ajque lougo ac lato (v. v. s.)

JS. lanceolatum (Fkocl mss), foliis lanceolatis subacuminatis argotè dentatis

y. *{enmfohum* (Fioel. mss), foliis luto-ovatis denticular is snprâ glabriasculis tenmbus. (v. s. s.)

40. H CANDOLLEI (Fra'l. mss. non Monn.), pbyllopodnm villosom, caule ramoso ilexuosopolycepbalo, rainiselongatib foliosis&ub-i-cepbabs foliisquelau^eolatiHsnbderiticulalitglaucis, radic. subpetiolatis, ^aubuis sessilibus, involucio imbrirato obtuso villosibimo. % in Alpibus Geunaiix¹ Pyrenaeis. H ambigauinLapeyr. inbeib Ramer. Piaecedenti deque ac vanctatibus ramosis H. |||losos afimeet ab hoc non nisi mteuoie myloncri structuiA distingnendtjin Caubs ssepeab imo in pluies ranios erectos fobosos simpbce** rlongato&diw&us. luvoln-crnm simpliciu&colum iinbricatum valde villo<sinn, glandulis inteuuixtis, squamis lincanbus obtasis. Folia tenuia at in H viloso cano-panc tulata glaaca. (v. 8. s. in heib. Rosiner et piopio)

- 47 H SPFCIOSUM (Link enum 2 p. 2187), sobapbyliopodom glaucum, caale ramoso folioso folnsqne coriaceis oblonjgo-lanceolatis ntunr^ue attenuatis dental in subpetiolatis ciliatis Hot cosis, ranus subfastigiatis fohois oligocepbalis, pedunculis apicc incia^satis squaraoHis cano-toraentosis, involucio obtuso laxinsculo viloso. IL in subalpims Algoviac' Ifelvotiaj' H bpeciosum Hoin. hafn. p 76*' Willd. heib. 14717' Gebb. exsicc ' hort monac. i8a3» H. poly-pbylliD hoit pest Uoch. in litt. Willd. Jierb 1470a n. 2 nee 1 H. villosum £ Monn p 5'}. H flexuosnm h. tanr Balb in hit. Species ob summam cum H viloso (lexuoso et polycepbalo afflmtatera valde dificilis nee nisi squamis involucii obtusis distinguenda Flores maximi intense lutei Capitula ovato-subrotunda subimbruata. Pedunculi apice squamosi et iucrassali Folia omnia brevissnne petiolata acuta, radic. snb anthebi aut nullaaut subemarcida (v. v. c. «t 8. s.)

fi. angustifohum (Froel mss), foliis angustè lanceolatib magis viloso-cibatis. (v s c.)

y. *speciosissimum* ('Willd herb. 147'4¹)» caule simplici oligocepbalo densè folioso, foliis unguste lanceolate acutis ciliatis. Specimen W illd nullo modo à typo diffeil. (v. s. c.)

48. H COMPOSITUM (Lapeyr abr. p 47^'), phyllopednm albo-vilosnm, canle eieclo lamoso folioso paniculato, raruis patulis subpolycephalis, folns dentatis sabtus glaucis, iad. ovatis per petiolum barbatam decaurrentibas, canlinis cor-datis acuminatis amplexiraubbis, pedueuelis tomentosis involucrisque subglan-duliferis ^ iu piatis sicris petrosis Pyieuxoiii oriental ad Prats de Mollo. H. toinf<*^{lm} u^ « fl* fr. 6. p. 444. Spreng sybt. 3. p. 646 Monu ess. p 42. H. borfale" hort berol Pyienacis piopiM JDcola, H jmplexicauli babita A-finis. Involucnio nee lavui nee squamis uiajoubusobvallaluni Tilli petiolo*

rum et capitinis radicis longissimi candidi. Aariculac folioram adeò prolixae ut se invicein ferè tegant.

49. H. BIRSUTUM (Bernh. Tausch!) , aphyllodium ? hirsutum , caule stricto *folioso* polycephalo , foliis infrà medium acutè dentatis subtus&ubrcticulalis; inferioribus oblongis basi attenuatis sessilibus, superioribus coidato-ovatis acutis semiamplexicaulibus, corymbo composito patulo subfolioso, pedunculis superne squamosis involucrisque hirsutis. *If* in Americā horeali teste Reicheiib. Planta speciosa H. sylvestri et Sabaudo habito proxima. Caulis cubitatus et ultrà. Flos magnus. Capitula crassa laxiuscula fusco-viiflora hirsuta. Pedunculi apice subincrassati squauis linearibus patulis obtusis obsiti. (v. s. c. comm. à cl. Reicheub.)
50. H. CANADENSE (Michx. ilor. a. p. 86?), aphyllodium ?, caule Miicto siuiplici folioso pubescente, corymbi compositi fastigiati aphylli pedunculis involucrisque nigro-glandulosi-Jiirtis , foliis ovato-lanceolatis acutis. giosse dentatis sub-sessilibus margine suffusqne hirsutulis. *If* in America sept.?H. virgatum Gerh. exsicc! Pursh flor. bor. am. a. p. 503. H. Kalmii Spreng. syst. 3. p. 646? Habitu ad H. sylvestre proxirae accedit. Caulis foliosus rigidus sesquicubitalis. Corymbus coni positus fastigiatus, ramis a reua to-erectis poiycephalis aphyllis llorem primarium excedentibus. Capitula magnitudine H. ninbellati, nigi'can-tiavdense glanduloso-hispida. Folia in niedio giosse et divaricato-dentata , apice acuta integerrima. H. virgatum Pursh vix hūe pertinet. (v. 6. c. comm. à cl. Gerhard.)
51. H. INCANUM (Bieb. cauc. 2. p. a53), caule stricto folioso superne aphylo cano-tomentosnlo, corymbo composito subfastigiatopliylo, foliis integrerrimis cano-tomentosnlis margine nervo que ciliatis, radic. lalo-ovatis , caulinis ovato-lanceolatis sessilibus, pedicellis iuvolucrisque glandulosi-hirtis. *If* in campis herbidis Caucasi. H. incanum Spreng. syst. 3. p. 6^3. Monn. ess. p. 67. H. sca-hrum Willd. herb. 14697 ! Caulis in culta planta 3-pedalis et ultra solitus rigidus crassns, corymbo decotnposito patnlo terminatus, in feme dense foliosus, superne aphyllus. Capitula magnitudine H. echiodis cauo-tomeutosula at glandulosi-hirta. Folia submembratiacea rigidula undulata (teste Rlerhh.). (v. v. io hort. mohac. 1817. et s. comm. à cl. Reicbb.) •
52. H. COMMERSONN (Monn. ess. p. 42?), caule cresto pauciculato oligocephalo hasi hispidnlo, foliis caulinis lanceolatis acutis subintegerrimis sessilibus glabris, r_{ad}. peliolatis hirsutis, j>edunculis involucrisque cano-tomentosis <glandulosi-hirsutis. *If* in Montevideo Americae rueiu! H. semiglabratum herb. "Vahl. Habitu affinis H. glauco, ex indumento herba? ad Pilosellas accedit. Canlis gracilis inferne foliatus supene aphyllus spithameus. Folia coriacea nervo ujedio valido , rad. spathulatp-ianccolatu petiolata hirsuta, petiolis fulvo-hirsutissimis. Capitula magnitudine H. Auricula: lato - ovata imbricata cano-fariuosula glandulis acutis minimis confertis nigris hirsuta. Specimen "Vahl/anum archetypui videtur à tcrgo folii enim , cui pl^ata adglutinata est, notatur. H. semiglabratum Brasiliense Commerson ex Montevideo dedit Thouiu. Cl. Monu. 1. c. irivolucra subglabra prxdicat. Herbarium musaci pañs, ddtium solvet!
53. H. HIRTUM (Frcel. inss. non Poir.), caule erecto folioso paniculato , ramis strictis foliosis subpolycebalis, foliis lanceolatis utriue nteuuatis hirtisscabriusculis, caulinis inferioribus radicibus usque petiolatis, pedunculis cauo-tomentosulis involucrisque glandulosi-Jpp'diilis. *If* cult. in hort. propr. Habitn H. sylvatici varicatibus gracilioribus afluxe, at capitula mnllò minora, receptaculum alveolatum ciliatum. Caulis ramosus paniculatus. FoMa iigur:) et deniliione illis H. lievigate similia. Involucrum ovatum imbricatum nigrō-vires, glandulis confertissimis iniinitis nigris hirtam, vix31iu. lougum, duas lalum. (v. v.c.)
- ^4. H. CILIATUM (Willd. sp. 3. p. x5S5), caule erecto folioso oligocephalo, foliis hirsutis, radic. oblongo-ovatis basi runcinao-dentatis, eauliuis lanceolatis aubdentatis basi snglnto-ainplexicayibus Juvolucro bispidulo. ^? in Ciclu' , teste Willd. H. ciliatum Willd. Jielb. 14699! Spreug. syst. 3.p.64C Mautu

dubiigenem, habitu Seriolam s Crepidem refert Gipitulum, cajns floies non-duii> explicati, ovatum, squamis hueanbus obtusis dorso pilis ngidis a Ibis bib pidis. Olia tenuia, pilis albis ngidulis utiinquehispidula

55 }H STERNRERGII (1 reel mss.), caule siraphcisnbdicepblo subumfoho foliisque obovatis flubdenticulatis villosis glauas meinbianaceis, involtiro villoso glandubferoquc, ligubs brevissne denticulatis ciliatis. % in M Schlossberg ciicà Toeplitz Hcibitu pioximum H. piloso Scbleith Caul is spithanixus apice IQ pedunculos 9-3 divisus cano-floccosus iufra medium folio unito sessili stipatus. Flores sat magni intense lutei apice concinne et brevissime 5-dentalati Folia tenuia fere diapbana

56 H HUMIE (Host syn. p. ^02'), caule divancato-rainoso folioso flexoso, fobisque petiolatis oblongo-ovntis runcinato-dentatis hirsutis, peduncubs involucrisqe biiis (viientibus) % in pppibns et muris legionnm snbalpinarum. Galliae' Helvetia; Ratiriae' Austr ' Roberniael liansj^vaniac' Italioe¹ H humile Willd heib 1/1672' lauscb bem p 67. Labr et Heg ic helv t 2 H pumilum Jacq austr t i8p exel syn H Jacqnini 'Vill daupb 3 p 12! t a8' DC. fl ft 4 p 35 Gaud helv 6. p 106 Ab H muro.um , cui ppr varietates pioxime accedit, veie diversum 1 olia proter pilos glandubs minimis flavis ad lentein observandis^iaedita, que nota summain cam H Alpino afdmatem prodit (v. v. s.)

fi intermedium (Prcel mss), caule ramosioit polycepbalo, foliis oblong is ntunqie nttenuatis basi petiohsque dlati runcinato-dentatis. H. inteimedum Lap abr p 47'?(v v. s)

y. *lyratum* (I icel niss), raule paucifolio, foliislyiatis basi pinnatifido-nincinatis Vill 1 c t 98 f i (v v. s)

S *Jatquini* (i|| 1 c), canle bumili oligocephalo, foliis oblongis runcinatU dentatis (v v. s)

i. *integnfhom* (Sering), canle hnmili, foliis subdentatis. (v s s coram. a tl. ienng)

[^] *unxflorum* (Pr mss), caule unifloio (v v. s)

57. H. STFLTIOFRUM (I icel mss) cespitosum cano-tonientosalum, pills stellatii, caule subaplylo bifido dicephalo, foliis coriaceis coidato ovatis basi smualo-dentatis snbnndulatis petiolo laevi canabculato viloso dnpl longioribus, invol cano-tomentoso, squ.imis obtusis If, in mpibus Galliae Ckutamczè ad Sami-Guillen le desert Pioxiraum,H innroium, a quo drffcr tomento totius herbac densissimostellato ininuno, omibus cespitosis gi.-ffilitus aphyllis snpià medium bi/urcatis, opitnlis duplo mmoribus, m\ol. rano-tomentosis subhirsntis, foliis verè coiaceis ngidis obtusis glanduloso-mnernulatis, petiobs canabratlatis Isevibus nee striatis quadiuplò brevioubus. (v s s)

58. II vuiGATUM (r rie<>^f), caule erecto subflexuoso paurifoho corymboso, foliis ajiguste lanceolatis utnnque attenuatis giossc deutatis petiolatis \jllnsisT mvola-cro obtns glanduliTero hirsufoque, pappo subniveo % in pctp@sis Suecia; pas-sim, in mont.yV\«burgisbeig circa Ciegpalatin H nmrorum ct afhuibus specibus pei forlnas intermedias maxime affine, diversum tamen videtur babjtu proprio, inflorescentiâ aliena, fobis ongusle Janccolatis snrsum giosse dentatis apice integiis, pappo subniveo, Et heiboe villis raollibus oandidis. Tapituluai Inagnilndinc ct formâ H inolli siinile. (v s s comra a cl. Ties ct Keirbenb)

59 ^H BiFinuM(Kit mbtt j, i«ialcsKpbrinsculo snbunifobo suisum lamosop- mculato , lamis dichotomy fistigiatis, folus roidato-ovatis dentatis glabuusru- lis maigine cibatis subtus glaucescentibus, petiobs radic. snmplicitei MIOSIS , luvolucio obtns hiitulo peduncubsqnc tomentosis, pappo albo % in mpibus alpiuisct subalpinisHungana ' Geuu Austi ? H bi/idum Willd heib 14668 U mniornm k Iausthbeni p 67 Planta 1 cl Kit.ub commumcata spont- nea vixspitbaiuà paulolong'ot supra medium in runos 9-3 bifldos divisus saepe unitolius Folia subconacert molliuscula supia laite viudia subtus glaucescentia, red petiolata dentata , dentibus inferioribus piofundtonbus, petiolis antice «a?pealatis dcute uno alterove Unceolato nactii. Capitula If muroimu magni-

tudine. Involucrinum verè obtusam cftio-tomentosuru. (v. a. s. comm. à cl. Kitaib.)

/2. *mo/us* (Froel. mss.), caule elatowsob-i-folio supernè dichotomoraihoso posso » lycephalo. (v. s. c. coram. à d. Schrad.)

y. *burscrfolium* (Freel. mss.), caule supernè raiuoso subapbyllo paniculato giabro, foliis rad. pinnatifido-runcinatis ciliatis snbtùs glaocis, caulino Jineari-lanceolato. Habitu et colore herb* H. pa lie seen ti affine. An distincta species? (v. s. s. comm. à cl. Vest ex valle Weidisch Garinthiac, cl. ex Alpibus Algoviae.)

60. H. SYLVATICUM (Smith act. soc. linn. 9. p. 23p), caule erecto folioso supernè corymboso paniculato, foliis omnibus petiolatis ovato-lanceolatis utrinque attenuatis dentalis birsutis, pilis serratis, pedunculis cano-tomeutosulis involucrisque oblongis glandnliferis. % passim in sylvis muris et flssunis rupiura totius Germaniae! Helvetia! Galliae! Italiae! Britannia. H. sylvaticum fl. dan. t. in 3 opt. Engl. bot. t. 203i. Wallr. sched. p. 422 (excl. syn. Guuan) Vest in florâ. 18ao. p. 4. H. denndatnm Lapeyr. hist. 473 ex Benlh. Species ob varietatum copiam snmmmqie cum H. murorm afllitatem difficillimè recognoscenda, cuius bistoriam et synonyraa egregiè cl. Smith" exposuit! Involucrum omnino obtusnm glanduloso-hispidulum. Canlis pleramque altior, subramosns cons tan ter foliis plus miùusve numerosis petiolatis ornatus. Folia radic. nujeprosa petiolata hi is ut a , pilis valde dentatis in varietatibus maculatis ferè plomosis, basi constanter attenuata per petiolum subdecurrentia dentata ovalo-lanceolata «. oblongo-lanceolata, nunquàmcordata. (v. v. s.)

jf. *angustifolium* (Gin. bad. 3. p. 323), caule folioso supernè paniculato, foliis rad. cnulinisqae inferioribus petiolatis lanceolatis dentatis. H. angustifolium plur. auct. germ. (v. v. s. et s. s. comm. à cl. Gmel.)

y. *Mertini* (Gmel. bad. 4. p. 50,t), caule sesquicubitali folioso paniculato, foliis lato-Ianccolatis profundè inciso-dentatis. Vix propria species consentientibns cl. Braun et Zeyher. (v. v. c.)

<f. *Lachenalii*(Gmel. bad. 3. p. 3iuet auct. germ.), caule elato folioso super no raraoso-paniculalo, foliis mollioibus petiolatis lato-ovatis sinuato-dentatis. H. luurorum Lach. in nov. act. helv. 1. p. 298. §. 29. (v. s. s. comm. à cl.Grael.) *

•• *corymbosum* (Pers. syn.) . caule folioso apice corymboso, foliis lanceolati⁸. (V. S. S.)

ñ. *petiolosum* { Free], inss.), caule elato folioso, foliis radic. fusco maculatis ». immaculatis , petiolis alatis inciso-dentatis. (v. v. s.)

n. *cruentatum* (Lrcel. mss.), caule folioso, foliis suprà maculis atro-sanguineis. (v. v. s. ex Austria cum Dracoceph. Austriae.)

g'. *tinctinn* (Fr. mss.% foliis subtus rufo indoctis. (v. v. s. ex Sylva uigrâ.)

«. *hirsutmn* (Froel. mss.), oaul» foliisque hirsutissimis. (v. s. »)

K. *canescens* (Ficel. mss.), caule subaphylo apice corymboso oligocepbalo, capituli* raajoribus. H. canescens Schleich. exsicc? H. inuroruin sylvati- feura ^ Gaud. belv. p. 403. H. sylvaticum Willd. herb.^4685? Capitula à vermis destrcta. (v. s. s.)

6r. H. MuaoRUM (Linn. spec. pi. p. 1 « 8), caule subunifolio panicnlato foliisque omnibus petiolatis striatis limbolongioribns, bmbis ovato-cordalis dentaiis sub-hirsutis, pilis serratis, pedunculis tomentosis involucroque obtuso glanduloso-hispidul. % passim in Europæ et Asia spuris, maceriis et rupibus. H. murorum Smith brit. p. 803o β nec & act soc. linn. g. p. 236. Willd. herb. n. 1468, n. 1. 5. 6. Schkuhr comp. t. 2'ii. i- Sturm flor. 39. opt. DC, 11. fr. 4- P? 30. Tabern. krauteib. p. 504. opt. Plantœ vulgatissima*, praecedenti nimis aphinis, bistoriam criticam optine exposuit cl. ^inith 1. c. Inilorescentia el capitulnuru fabrica omnino sirialis precedent! speciei. Caulis folio pléruique solitarip petiolato auctus. Cave ne emm H. atro-virenti confundas. (v. v. s.)

/S. *laciniatum* (Froel. inss.), foliis rad. cordato-oblongis basi iuciso-dentatis , caulino solitario. ft. murornm fi Gaud. belv. Tauscb bem.p. 06 rfLinn. I. r. (i, Pulmonaria gallica fuemincaTabern. krautcrb. p. 504- (v. v. s.)

- y. *villosum* (Froel mss.), foliis co rial is denticulatis cauleque. unifohu villo-
bissimis H muiorum A y Monii. 1. t (v. v s.)
 cT. *diaphanum* (Fues '), caule aphylllo corymboso (v s. s.)
 t *integnfolium* (Fr. mss.), caule unifolio, foliis sabintegiis s. paacidenta,tis.
 (v. 8. S)
 £. *myophonum* (Ur. mss.), caule basi tnbeioso villoso ^v. s s)
 N raſtro *tinctum* (Fr. mss.), foliis subtus rubro inductis. (v. v s.)
 3- *mac n lac urn* (Fi. mss.), folns fusco maculatis (v. s. s)
 i *humile* (Fr mss), caule humili oligorephalo subapbyllo. (v v s)
 K *tubulosum* (Fi. mss), canle aphylllo sub-i-cephalo, hculis bievissimis. (v
 v. s in Alp. &lg.)
 > *micranthemum* (Froel mss.), capitalispeipusillis. (v. s. comm. à cl Tausch.)

** *Fohornm pihs plumosis.*

62. H RUFESTRE (All anct. p. 12 t. I f 2'), glaucum , caule sabdiviso subdi-
 cephalo snbnmfolio, foliisque lanceolsrtis acatis runcinato-dcntatis plutnoso-
 villosis, pedtintuhs apice involucroqup cano-hirsutis, pappo submvco *If.* in
 saxosis Alpium Pedeinontu¹ Vallesiae' H lupestie Willd sp 3 p. |5Sg DC
 fl. fi.G p. 443 Moan. ess. p 46 Gaud belv 0 p 638 excl. jsyn. Host H cal-
 <*Henn Willd heib 14678' H obondrdloides 'Vill daupb 3. p. T14. excl. syn.
 Habit u et statui,t sequenti similhmum. Involucri squaiode obtusae, at 3-4 inte-
 rrioies ncuteae membianacedc, qaare medium inter bane et otylepidoum &ectio-
 rem Heiba glauca (v. s. comrn. à c| Balbis.)
- 63 H. PICTUM (Schleicb cat i8i5'), (mile subraraoso oligocepalo foliisque
 petiolatis uvato-lanceolatis deutalis plnrnoso-birsutis, canlino solitaiio lmcari-
 lanceolato, involucro obtuso hiisuto peduncuhsque cdno-faiinosia, pappo sub-
 niveo. % in sylvi& petiosis vmeisque Helvetiae' el Rossise¹ H. muioruin y
 Gaud. helv. 6. p. 102 (exel syn Waldst et Kit) Monn. ess, p 44. H vulga-
 tom Spieng syst J. p. O44 AD species distmcta a pi lore¹ Planta Thonia-
 siana ef Fiscbciiana ab H. rupebtu All degré distinguenda (v. s. s connn. |
 cl Fischer et Schleich.)
- 64 H. CORDIFOLIUM (lapeci sup pi f). 128), glaucnm, caulibus subcespitosis
 paniculatis piuufolus glabiuscnlis, foliis iad. ellipticis denticulatis nervomar-
 gineque ciliatiH, petiolisbrpvissunis pluraoso-lauuginoscs, c.iulinis cordalis acu-
 tis amplejcuaulibua, luvhicio obtuso pediiculisque glanduhfens, leceptd-
 culo hirtulo % in rupe Baux de J'Afe piope Puts de Mollo Pyren-Oiient
 |9t cciuiboides fi muhicaule Moan, ess p. 4Q. Gaud. helv. 6 p. 112 in notâ.
 H. eloMjdtum un. Itln E^sling 18J0 Habitus omninò H. cerinthoidis, quo-
 cum perpeiam confundituy quo exerapl valor et diſmtas notarum ex «ciu-
 jpusiore involucii eiaraicfc petitatum maximc elucet Capilulnm ovatuiu IUI-
 bricatum virescenti alboquc va,taus glanduliferum. Floies pallide lutei. (v. s.
 comm. ab umone itin. LssliDg.j
- b5. H. MIXTUM (yipeyi. ex Ficel in litt.), sericeo-lanatatn , pi I is pluniosi*, caule
 subramoso oligocephalo ,rfoliis iad obovatis lutegeinnussubpelolatis, caulino
 <>ao subsemidinplexauli, iuvolucio obtuso villosissinio, leceptaculo hiilulo.
 % in l'yienais a la Piqu tte', Ill Delpbinatu? H barbatum Lois gall 2, p 5a3.
 exel syn. Vill. H saxatile^U daupb 3. p 112 t 29 bona DC. fl fi 4 p 22.
 Species elegant* H Lawsouu 'Vill. ptoxima, at leceptaculo birto iacile dislin-
 guenda (v s s comm a cl Zu et in beib. Jlcemei)
- 66 H. TAKATUM (Willd sp 3 p i586 •), plwnosò lanatum,caule simpliti oligo-
 cephalo iufeine folipso, superne subiphylllo glabriuscuso, foliis clougato-lan-
 ceolatis sessibbns, involucio oblusso Ipsnto. If in Alpibns et subalpinib Croa-
 tia? ad Klebicb' H lanatum Waldst. et Kit. huug. p ii5 t. 127! bon. Willd
 heib. i47°8 ' H. Waldsteimi Xauschbem p 65 Monn ess. p. 53. H Lawsonii
 Mossl etReicbenb floi p. 3 589. (excl. syu. 'Vill)H villosojaffinc al involu-
 crum oinnino obtusum, squanus iutenoi lbus glabrestenlibus.

Subsect. 11. LEIOCEPHALA.

Involaqri squamis totis aut sursiu*m* glabris.

§. 1. *Phyllopoda*, *foliis radicalibus sub anthesi prcesentibus seu coetaneis.*

STKNOTHECS *Norm. ess. p. 72.* Capitulis parvis subcylindraceis gracilibns, involnro basi calyculato Lirto. — Species Americana;— An genus proprium ? ex DC.

67. H. SCABRDM (Michx. flor. 2. p. 86), caule striato folioso apice subrnmosopa[^] niculato basi hirsute* scabro, foliis ovntis snbiTrtegerrimis hirsutis, rad. petiolatis, caulinis sessilibus, pedunculis glaudulo-hispidis. *If* in Çanadæ! Pensylvaniæ! Carolina! U. scab rum Pursh fl. 2 p. 304<^Pers. syr 2. p. 374. Monn. ess. p. 3i. K. virgatuni Poepp. exsicc.! H. fas*ciculatiim Torr. exsicc! Habit u et florū figura ad H. raceinosum accedit, pedunculis basiqne involuci maxitnē hispidis facile dignoscendum. Panicula flexuosa polyccephala, ramis subramosis subfastigiatis. Capitula cylindracea saepe glanduloso-denti
- fc. simplex* (Froel. mss.), canle simplici, corymbo oligocephalo simplicins-p culo. (v. s. s. in herb. "Vabl à cl. Rohr.)
- y. bipartitum* (Frcl. mss.), caule suprà basin bipartito, foliis ad divisionem conferlis. (v. s. a. in herb. Schreb.)
- cT hirsutum* (Ficel. mss.), caule foliis involucrique basi fulvc-birsutis. H. Marianum Willd. herb. 14669. n. 1 (nee i-3?). (v. s. s. ibidem.)
- i. leiocephalum* (Frcl. mss.), involucro glabrescente. (v. s. comui. à cl. Schreb.)

68. H. MARIANUM (Willd. sp. 3. p. 1572), canle erecto folioso divaricato paniculato foliisqne ovatis subintegerrimis sessilibus piloso-hispidis, pedunculis vano-tomentosnlis involucrisque basi glanduloso-bispidul. *jf* in PensylvaniA. H. Mariaimin Willd. herb. 1466^A. n. 1 nee 2. Spreng. syst. 3. p. 642. H. Gronovii Pursh fl. 2. p. 603 non Lun. Stenotieca*Mariana Monn. ess. p. 72. H. Mar. pulnion. gall, subrotundo folio Pink. mant. p. 102. t. 4Q0. f. 1. Prx-redenti habitu affine, sed herba multo tenerior et magis glaucescens. Pili caulis et folio rum magis minus ronferti ri»idi breviores albi, bulbillo hemisphaericu albo insistences. Iuvolucruiu calyculatum subcylindriculum basi cum pedunrulis glanduliferum, glandulis sparsis minutis lente observandis. A seqqjte certe diversiu.

69. H. GRONOVII (Linn.sp. p. 1-137), caole erecto basi folioso superné aphylo paniculato, ramis flexuosis patentibus filiformibus, foliis obovatis obtusis integrinmis margine nervoque hirsutis, pedunculis anthodiique basi glanduloso-hispidul. *2f* in sylvis et collibus sicca Pennsylvania! Canada! et Carolinæ! H. Gronovii Willd. herb. n. 14667. fr. 1 (nee 2.). Michx. fl. 2. p. 87. *f.* Pursh flor. 2. p. 602. Torr. comp. 2. p. 279. Gron. virg. t. p. g₀. Seqnenti maxirae affine. Capitula paivaillis H. præmor[^]i similia[^] 2 | lin. longa, linea partm lationa. Paucula? flexuosa? aphyllx rami ulterni erc[^]to-patuli polyccephali sab Jente glanduloso-hispidi. Folia submembjpacea subtiis glauca, juniora tota pilosula, per setalcin deniim suprà glabrescentia, pilis rigidis basi'in-crassatis. (v. s. n. coram. à cl. Bosc, in herb* Vabl. etinh*erb. Willd. coium. i cl. Mnhlenberg.)

70. H. VENOSUM (Linn. sp. p. 1125), canle basi subonifolio glabro, panicula pa-lula? subfastigiatæ ramis filiformibus, foliis obovatis sobdenticqlatis snbtis pubescentibus margine nervoque cilialif, venis coloratis pednnculis apice involucrisque basi glanduloso-scabris. % in sylvis herbosis umbrosis Canada!, Carolina! Pennsylvania!! II. veuosum Willd. herb. 14666! Pursh fl. 2. p. 50a. Torr. comp. 2. p. 279! Stenotheca venosa Monn. ess. p. 72. Differt à priore paninulâ laxioreglabrâ, pednnculis apice taDtum sub lente glandulis minimis luridis ad

lentem sparsis , foliis tenuioribus eleganter sanguineo-venosis. Capiula parva basi tantum sub leuteglaudulifera. (v^s s. d)

(2. *commutatum* (Froel. inss.), scapo subaphyllo, foliis elliptico-spatbulntis. H. Gronovii Willd. herb. 14667. n. 2 uec 1. (v. s. s. in berb. Willd. comm. à cl. Richard.)

71. H. suRNumuM (Froel. ra^s.), scapo erecto basi subunifolio hirsnto supernè glabro, foliis obovatis denticulatis pilosis, paniculâ filifonni divaricatâ, pedunculis apice involucrique basi glaaduloso-scabris. *If* in Americâ septentr. Stenotheca subnuda Monn. es.s. p. 72. H. veuoso proxinmm. Capitula H. paniculati magnitudinc et formâ. Fruclus teste cl. Monnicr fnsiformes. Plantain Monn. non vidi. Uabita affine Filosellis.

. 0. *retusum* (Frcel. iuss.), scapo sabaphyllo glabro, foliis obovato-subrotundis retnsis apiculatis petiolatis pilosis. (v. s. s.) Non paucis à typo notis reredit, distinguere taraen nolui. Folia coriacea glanduloso-denticulata brevissiùe ptiolata suprà viidia pilosa sublùs glauca glabriascula , parùm longiora qnâm lata. luvolucruicaycnalura basi sub lente glanduliferu^r if squamis internis ia-14, externis 4-5 triplò brevioribus instructum. Panicula ferè capillaris.

* # TOLPiDFORMIA. (i). Invol. calychniatis, sqnamis omnibus linearibus, exterioribus brevissimis. — Habitac Tolpidis sed sets pappisetulis minimis nullis interjeotis separate. Radix cylindracea perennis. Folia radicalia. Caulis subnudus apice panicula Ins.

7a. H. CATENSE (Linn, amcen. acad. 6. p. 96), canle snbnudo glabro stricto apice paniculalo, foliia radicalibus obovato-oblongis, obtusis remotè dentatis utrinque scabri.s, caulinis paucissimis sub ramorum exortu sitis liuearibus integerriais , pedicellis clon^atis, invol. farinosi squamis linearibus pauciseriatis. 0/, ad cap. Bonae-Spe. C re pis striata Thnnb. fl. cap. 613. Picris striat.i Spreng. syst. 3. p 264. Scmidtia Capensis Reichenb. in litt. ad Froel. Aehaenia cylindracea glaberriia. Pappus sordidealbescenssubuniserialis. (v. s. com in. à cl. Ecklon.)

/? . foliis obovato-oblongis glabris. — «d Draakensteenberge legit cl. Drege et mecutn comm. (v. s.)

y. foliis elongatis oblongo-linearibus glabris. — in prom. Bonae-Spei legc- runt cl. Ecklon et Drege. (v. s.)

73. H. MADAGASCARIENSE (DC. berb.), caole subnudo tcreti glabro apice parcè • ^inoso-panicnlato, foliis radicalibus oblongis obtusis glabris subintegerirais, caulinis paucissimis linearibus, pedicellis elongatis parcè bracteolatis, invol. farinosi squamis linearibus, exlerioribus brevissimis. *If* ? ad fossas in aridis montis Tananarivou ins. Madagascar legit cl. Bojer. Flores flavi. Achaenia prismaatica tru/icata. Pappus stramincus. Proximè accedit ad U. Capense sed folia glabra Iriplò minor. lierba 7-8-pollic. Caulis non sensiui striatus , "etc. (v. s. comm. à cl. Bojer.)

74. H. SILHETENSE (DC. herb.), glabrum, radice crassâ cylindracea, caolibus c collo plurimis sulcat^aangulatis subnudis apice paniculato-corymbosis , foliis radicalihs ulriuqifc acuminatis intPgerrimis, canlinis paucis lineari-subulntis elongafis , invol. cylindra<(p snbcalyculato 10-1 2-floro, acbaeniis longit. striati. % in Iridisc^orientalis riionlibusSilhet legit cl. Wallich. Prenantbes? Cannoll^aana Wall.! cat. u. 32. conlp. n. 390. (v. s. comm. ab hou. cur. mere. augl. Ind. orient.)

* * * onTioTHECA. Capitulis majoribus ovatis squamis multarum serierum imbricatis. — Herba) colore xpissimè glauco, pedunculis supernè sscpè squamosis.

75. H. sTATiciFOiuM (AU. ped. n. 782. t. 81. f. 2) , canle ramoso oligocephnlo,

(x) Divisio exotica a cl. Freclich ornissa lite a DC> inserta.

pedunculis elongatis laxis apice incrassatis squamosis involucroque acuto farinosis, foliis linear-lanceolatis obtusis* repam!o-subdenicnlati, pappo subniveo. % iu petrosis el glareosis torrentium Alpinorum totius Ceimauiac rneridioD.-ilis! Galliae! Helvetia?! Sabaudiae! H. staticifolium DC fl. fr. 4. p. 25.'Vill. danph. 3. p. 116. t. 27. Sturm flor. 7. Willd. herb. i/653! Flos exsiccando saepissimè more Primularura virescit. Involucri squamis acutis dorso glabris albo-farinosis , indè parlim sect. Oxylepidorura partim Leiocephalorum proximè accedit. (v. v. s.)

/?. *uniflorum* (Frcel. mss.), caule sabaphyllo unifloro. Hall. hist. n. & fi. (t. (v. v. s.)

y. *dentatum*, caule polycephalo subfliato, foliis argute dentatis. H. glauca var. All. ped. t. 81. f. 1. (v. v. s.)

76. H. GRAVEOLENS (Froel. rass.), caule ereclo folioso paniculato basi hirsuto foliis lanceolatis acutis medio angustè dentalis margine nervoque ciliatis sob- coriaceis glaucis, inferioribus petiolatis, pedunculis apice squampsis involu- croque glanduloso-scabro farinosulis , pappo subniveo. If H. calyculatum hort. hafn. anno x8i8. H. aaxatile e Tauschbem. p. 68?Habitu affine H. glauca var. polypbyllo. Folia laevoceolata utrinque attenuata et integra, medio dentibus profundis augustisque excisa, superiora sessilia minus denlata glabresceulia. Involucrum subsqtariosuin obtnsum. (v. v. c.)

J2. *Schullesii* (Froel. mss.), caule elato ramoso, foliis argutiis dentatis. H. calcareum hort. landsbut anno 1818. (v. v. c.)

y. *alutaceum* (Froel. mss.) , caule densè folioso corynj>oso, foliis lanceolatis sessi lib us minus dentali.s hirsutis. (v.Jv. c.)

77. H. GLAUCUM (All. ped. n. 781. t. 28. f. 3! bou.), glabrum glaucum, canle divaricato-ramoso basi subfoliato supernè nndo, foliis coriaceis linear-lanceolatis utrinque attenuat snbinlegerrimi.s sessilibus subtùs denudalis, radicalibus basi ciliatis, pedunculis apice squamosis involucrjue faiinosis, pappo snbni- veo. % in rupibus subalpinis et in glareosis torrentium Pedemontii! Galliae ! Helvetia;! Tyrolis! Austria?! Bavariae , Hngarise! U. glaucum Willd. hrb. 14681. DC. tl. fr. 4. p. 261. Gaud. helv. 6. p. 92. H. saxatil Jacq. ic. rar. t. i63 ! (nee Jacq. observ.). Slurm flor. 3<! Caulis basi tantùm foliis 2-3 ves litn.s, eapteñiu apbyllus, in lamos 2-5dongalos saepè unifloros divisus. Pedunculi s. rami apice squamosi. Involucrum glabrum albido-farinoseum.

/j¹. *dentatum* (Frcel. mss.), caule polycephalo, foliis dentatis< (v. v. >.)

y. fd*Jiosum* (Froel. mss.), caule polycepbalo à basi ad medium folioso. (v. ^ s.)

cT. *tibulosum* (FICEL. m^s.j, canle oligocephalo, floribus tubulosis. (v. a. s.)

c. *capitatum*{ Froel. mss.), capitalo prxgraudi. (v. 9. s.)

f. *simplex* (Froel. mss.) caule subapbyllo monocephalo, foliis perangustu.

H. capillaceam All. ped. t. 3e. f. 3? (nee capit.)

78. H. GRAMINIFOLIUM (Gaud. helv. 5. p. 94), glabrum glaucum, caule ramoso folioso , ramis elongatis rectis apice squamosis, foliis linearibus integrerimis subtùs denudatis, rad. basi subciliatis, involucro hirsutulo-farinoso, pappo al- bido. & in glareosis torrentium Alpinorum Helvetiae ! Algoviae ! Carpat. ! Hun- gariae! Prxcedenti nimis affine et forlè ejusneiu vancias, à quo differt caule aeppissime densè folioso , ramis erectis nee divaricatis , capitulis majoribus plus minus hirsutis. Culturu uon mutatnr*

yg. *Une'rifolium* (Ficel. oliin in linO » caule scsqnipedali densè folioso, ra- mis erectis, foliis lineaibus, radic. subpetiolatis basi glabriosoulis, pe- dunculis apice subincrassatis squamosis , iuvol. farinosohirsnto. H. Willde- nowii Monn. ess. p. r5. H. buplcuroides Gmel.! bad. 3. p. 317. t. 2. opt. (v. v. s. in rupibus Algov.)

>• *polyphyllum* (Schleich. exsicc.)» caule densè folioso oligocephalo, foliis linear-lanceolatis dentatis. II. *polyphyllum* Spreng. syst. 3. p. G44! UocL. in litt. (v. s. s. coinin. à cl. Roth, et Spreng.)

<T. *rigidum* (Froel. mss.), caule dense folioso subcorymboso, foliis lanceo-

latis, dentatis lad. petiolatis, pedonculis tomentosuhs. H denadatum Schult austr. a p. 4H7 (v s. o J)

t. glabiatum (Spreng in ht), caule sticto, ram is erectis elongatis su b fastigatis, foliis lanceolatis acnlis, cauhnus paucis 3-5 lemotis. (v. s. s. em Caipatins)

£. glaberrimum (Spreng. syst. 3 p. 645), caule ramoso pamcalato polycephalo , foliis lanceolatis integernmis, sujferioribus sessilibas Spreng. 1. c.
» *macrocephalum* (T'roel inss.), caule simplici ohgocephdlo spaise fohoso, capitubs praegiandibns (v s. s corara. a cl Chaill.)

£ petiolatum (Fiocl m.ss.) caule folioso subAVxuoso oligocephalo, folus radicahbus luuge petiolatis lanceolatis dentatis, caulims linean-lanceolatis H. poinfohum hoit. landshut 1818. (v. v. c)

794H. SAXATILE (Jacq obs. 2 p. 3o. t. So¹ opt. nee icon, tar), glancescens, canle sticto paniculato-corymboso basi folia to saperne apbyllo , foliis inem-branaceis lanceolatis utnnqae attennatis dentatis subtus floccosis, rad petiola-tis basi criatis, pedunculis subsquamosis, involucro denudato *If. in rupibus calcaieis apncis Austnae circā Baden, et Algov cnca ruesam. H <-axatile Host syn p 43i. ex loco classico' Maximè affine piaecedenti, à rl Jacq in obs optinoe desoriptam et debneatum , in ic rai. anteni peipeiam cum piiore confnsum Distinguitur caule plerumque altiore, folu& membranaceis subtus constanter cano-floccosisminus gl.mcis lanceolatis argute dentatis, petioli*» in-limorum radicaliumque longi^nbns concavis basi ciliatis, involucio denudato nee fannoso.*

So. H PORniFOLiuM'(Jacq. vind. p. 273 t. 6 opt.'), glabrum glaucum, canle ramoso fohoso , ramis iilifoiinibus pntulis, foliis lme.iubus acutis integerrimis aesilibas anineivns , lad basi villosis, pcdutulis apice squamosis mvolucro-qne deuudatis. % in mpibus calcaieis Austi ' cuca SiLottwein, Lilienfeld ' Sa-baudiae¹ ItaliaelH. pornfolium Jacq. austi. t. 2b6'\Villd. beib. 14677' Tausch bem. p. 6\$ Sturm flor.^9. Habitu quidem H. glauco))ioximum , at veie di-versum , capitulis duplo fere niiuonbus, involucro subsquauoso glabio denu-dato, caule ramisque multo gracilionbus , foliis saep< anguslibsitnis sessilibus. (v. v. s)

H. armt rice folium (Froel. mss.), canle simplici oligocephalo, foliis angustis-simis, caulims raiionbus (v. v s) "

y. Dirgatum (KJ mss), caule laine'si&simo pol^cephalo, foliis linearibus longissimis (v^ v. c. in boit. c!. Host)

<£ dentatum (Kioel. m&s), caule polycephalo, foliis bneari-lanoe<lalis den-tatis. (v. v. b in lupibustirca Lilienfeld Austi.)

81. H MARGINATUM (Ficel. mss), glaucnm, caule crectafohoso ramoso , ramis divancatis foobis , foliis hnean-lanceolatis dentatis basi coidato-semiamplfxi-caulibus subcibatis subtus bubretilatis, pedunculis superne squamosis inv-iucroque denudatis *1£. . . H poirifolium Bolb. in lilt, ubi in schedulā ad-monuit: « certediveisum ab eo, quod a te et cl BiigD ex Toiojulio sub eodem nomine acceju. » Capitulorunifabnca et magmtudo piaetedenti siraillimae. I<o-lia rigida maigine caitilagineo a}bo ad lenteni cincta glauca, hneari-lanceo-lata acuta, subtus margmem veisùs grosse reticulata , basi latioia coidata semi-am plexicaulia. PHi cauhs et foborum ngidi senulati basi bulbosi albi. (v. s. c cumin, à cl Balb)*

82 H LIKVICTATDM (Willd. sp. 3. p i5ç)o , glaucescens phyllopodium, caule s trie to tamoso panicnlato-subcoiymboso folioso glabro, folns coriaceis ob-longo -lanceolatis utrinque attenuatis medio pofunde dentatis glabns mar-gine scabris, radicalibns infeiioribusque canlinis petiolatis, in\olncio basi glanduloso-scabuaculopedunculisquecano-tomentosulis. ^ ad ripas Berczinae Bohem. èt in tupibus aicis Sebestein Ansti. mf Willd. hort. t 116. ennu, p &i6. berb ' n 147^2. Spreng syst 5 p 645 U panicolatum hoit. baft, taur landsh

<£ *hirsutulum*, caule bie\i foboram neivo petiohsquc birsutis

y. *incisnm*, canle coiymboso, foliis inciso-dentatis.

J\ *nivale* (Freel.), caule ramoso paniculato polycepliala>, foliis lanceolatis medio serrato-denlatis, radia paucis petiolatis, invol. glandoloso-scabio. — in praernptii montis Ortefc Tyiol. Medium inter H. a/fine et H. lycopifolium, colore glanco et foliis radicalibus persistenibus distinctum. (v.v.)

83. H AFFINE (Taascb in florâ 1. c. p. 70. Frcel. in litt.), apbyllopodnm vinde, caale erecto paniculato glahro, foliis couaceis» oblongo-lanteolatis» utrinqne attennalis medio grouse dentatis &<silbus glabris glancis, inferionbus petiolatis, involuuo basi scabnusculo peduncuhsque cauo-tomeutosulis. 2£ in sylvis caeduis queicetis sepibus Geimaniae, Sueciac, Hungarian, Helvetian H. rigidaia Hailm bcan. p 3o6. H valgatum ludentatum hues. Less. Hartm. H. boreale j8 lacerum Wimm. et Giab' biles, n. iq.5. H Sabaudum Lino. il. suec. exFijes. Folia coiiacea ngida glaucescentia lato-lanceolata ». Lanceolata acnta medio dentibus 4-6 validis lanceolalib antroisùm veisib notata, basi apiceque integra. maigine tennissime scabriuscua, caujina longiora icssilia, rad. petiolata. Fedunculi apice subsquamosi. (v. 4. s. cotnm. à c[^] Steinberg et v. c.)

R. *asperuiriy* canle scabro in feme fohi&quc lartceolatis medio serrulato-dentatis b'usutis rufo-maoalatis.

y. *calcareum*, caule dense folioso iuferne' hirsato, foliis angnstè lanceolatis medio grosse den tat is se[^]silibus bflsi biisutis. H calcaream Gebh.! act. hafn.

cT. *nemorens*e, canle folioso basi birsuto, foliis infeiioribus ovato-lanceolatih minus argutè dentatis.

f. *ambiguum*, canle elato densè folioso foliisqne birsutis. H. ambignin Sthleicb¹ exs. Maxime aflicr H. laevigato à qno colore berbae vindt, fohii ladic. sub antbesi nullis et habitu diffit (v. s.)

84. H. RAMOSUM (Willd. sp. 3. p. 1579¹), phyllopodium, caule erecto folioso ramoso paniculate*, folns submembranaceis omnibus petiolatis oblongo-ovatis basi profunde dentatis subtus glancis raarginé petiolisque cihatis, involucro scabriusculo peduqeuli&que cano- tomento&ulif pappo albo. 3[^] in montosis aylvatieb Hungarian! Gaiintbiac¹ Helvetia; H. raraosum Waldbt' et Kit bung, t. 216! Wilhl. herb. 14686' Schleich. exsicc' Tausck bera. p. 67. Piaccionti proximum nee nullo modo vaietas H. murorum. Involurrum ovatum linbri- catnm cano-viien (loccosum, basi ad lentera s&tulis tievissimis ciassis nigns scabrum. Capitula illis H muroium minoia, folia omnia petiolata, petiolii iadicalium elongatU. Pappus egrégie albus. (v. s. s. couim. a cl. Kitaib. et v. c.)

85. H. WIVALE (Froel. mss), phyllopodam, caale erecto folioso ramoso paniculato glabro, foliis snbcoiiaceis lanceolatis utiinqne acntis medio aerralo-dentatis maigine scabris subtus glVicescentibus, involacrò ovatoglandulosobcabro. % in praruptis glareosis montis Oitels. H. ibitu maxime a/fine H. boieah[^]Ki. at caule magis lamoso gracilore glauco vnescente, capitulis dimidiò minonbus sublente ultra medium glandulis minimis scabns, folns ladicahbussubanthesi praesentibus breviter petiolatis, reliquis omnibus anguste lanceolatis acutiusculis, infii medium seirato-dentati!: dentibus bieibus acuis, sewiUbus glabns maigine scabris sublus glaucescentibus' vere diffene videtm. ^ v. v. s. 1. c.)

86. H TANCEOLATUM ('Vill. daupb. 3. p. i»3. t. 3[^]), canle stricto ramoso folioO corymbofco foliisque ovato-lanceolatis medio deuticulatis subtus glancescentibus hiisutulis, lad. et canlims lufjims petiolatis, reliquis sessilibus, pedunculis apice subsquamosis, mvolucris[^] glandiilosso-scabris. If. in Delphnatu, Italia¹ Styn¹ H syhaticnm Jan in Int. H. ramosum et Lacbenalit hort. landsb. 1818 Habitu ad H sylvaticum actedit, priori quoque multuin afiine. Color herbae glanoescenti-canis. Canlis simplex Mipcine in paucos ramos divisus subfcoryrabosus foliosus, inferne cano-puberulus birsutulus : lamis bubfasti[^]iatis foliahb polycephahs. Capitula ovata obtn&a cano-viientia* basi

praescritim glanduloso-scabra, H mollis magnitudine. Pappos exalbidns. (v. v c)

,Q. genuinum(Y) mss), follis obiongo-evatis a cut Is dentictiatis subsemiamplexicanibus cauleque macis huiMills (v. s. a. comm. a el. Hesl)

y. buglossoides (Fioel mss), caule dertse folioso lursnto , foliis coriaceis oblongo-lanceolatis deuticulatis sessilibus scab 1 is ciliatis (v. v c.)

87. H. CHLOROSPERMUM (Frcl. mss.), phyllopodain, caule ereclo folioso paniculato basi villosulo, foliis inembranaeis subrus glaucis subiecticulatis ciliatis denticulatis , rad petiolatis oalis acntis, caulinis ovato-subcordatis acuminatis sessibns, pedunculis involucro glabriusculis % infrnrticetis Cuinthiae' Ex capituli foimā et maguitudinc H. lacemoso proximurn Cauhs gracilis spaise foliosus simplex seu ramosus glaber glaucescens basi pubescens. Folia tenuia feie pappyacea glabra margine nervoque ciliata , rad ovata acufa basi sensirn atteriuala glandnloso denticulata, petiolis folio paulo brevionbns baibatis, caulinis ovala aruminata basi lotuadata seśilia Capitla ovali-cylindrarea cum pedunculis glabnu&cula viuentia Iavolucri squaiuis liQeaibus obtusis. (v. s. > comm. a cl. Ve&t)

§. 2. Aphyllopoda, foliis'radicalibus sub anthcsi nullis ? pedunculis squamosis, irwolucn squamis plurium sericum.

88. H. DIFFUSUM (Fieel. mss.), aphyllopodium glaucum glabrum, caulis adscendenibus divaricato-subiamosis oligocapliah foliosis, foliis lanteolatis utnnque attcnuaatis denticulatis petiolatis &fibr denudatis, iufcuoubus petiolatis basi ciliatis Aubsemaniplexicaulibus, pedunculis squamosis involucro glabns. % . . . H ambiguum lioit landsh. 1S18. Maxime afhne II glauco quoad lieib.c coloiein et habituinet capituli fonnam et fabricam, at omnino diffeue videtur absentia folio rum radicalium sub anthesi et caulis decumbentibus (v. ^ cJ

JS? huimfusum (P.inz. et Spreng.iQ litt.), caule elongato dccnmbente paniculato polycepbalo. (v. s. c.)

89 H rANICULATUM (Linn sp. 1127), apbyllopodium, caule erecto paniculato basi viloso, foliis lanoeolatis acentis dentatis sessilibus glabns, lamis diubotomis divaricatis capillanbiib, pedunculis involuciisque glabriusculis. If in montibus Canada? ! Pensylvaniae ! Carolina: ! H. pamcnlatuiu Michx. d 1. p. 86. Toir. co cup p. 270 Capitula in gene re minima, basi ad lentem glandulis flavis mia-misscabra.-(v. s. s)

90 H TUCIDUM (Ouss. ind h boccodif 1825), apbyllopodium glabrum, caule stncto densissime folioso coiyboso, foliis ilgide coriaceis ovatis apiculatis integenimis inferioium petiolis basi dilat.it subainplexicaulibus , pedunculis invlucro glabro obtusissiuo glanduloso-scabriuscuh ^ in fissurin rupiura prae laptaiuni Sicilifl. H. lucidum Reicbi nb ic cent. 4. p ^5 Planta speciosa vix spitbamaca, propiii babitus Canlis lignosus angulatus foliis obtectus basi tantum apb^llus. Tolia veiecoiiacea oblongo-ovata apice breu teiminata basi sensim in petioluui decnuentia integernraa glabra subtus glaucescentia , pe-Holis bievoribus basi latioiibus subsemiamplexicauhbus (v s s. c comm. à rl. Oussonne ft Rekbeib.)

Q. H. LACTCCACEUM (Vra 1. nihs non Schrank) f npbyllopodium giabium, caule erecto folioso paniculato, foliis membianaœis ovatis aculusculis seuato-dcn-tatis basi ciliatis subtus gliucih ,caulinis iufnioiibus aggiegatis sessilibus, sup. altemis ovato-coidatis subanjtplexicauhbus , JDeAjneubs cano-subtoraentosalis> involucro glabro. % in Italia. Fonna capituli ct iiguia illi H. tacemosi similes. Caub* ^ r c cubitalis latemoso-pamculatus basi apbyllus, supia basin foliis 'KS'S*ll''' o ^teclus» 'uperno foliis altemis lemoris sparsis 1'olia membran.ii <ea, rad>nulla, caulinis taferiora numerosa lato-ovata apiculata Antata scssiu basi pnbescentia, f?iipenora s part a contnta subacuminata amplexicanlia Pe-

diinclusi cano-touientosui. Involucrum oblongo-ovatum glabrura cano-floccosum , squalens obtusissimis..

91. H. RAXEMOSUM (Waldst. et Kir. haēg. a. p. 211. t. 198 !), «anle erecto folioso compositè raccruosò , ramis strictis, foliis glabriusculis argutè dentatis ciliatis , super, ovato-lanceolatis acutis sessilibus, infer, oblongis basi atenuatis petiolatis, pedicellis tomentosulis iuvolucrum glabrura cylindraceum aequantibus. If in montibus Hungaria?, Austr. H. racemosum Willd. herb. 14718! Schult. austr. 2. p. 447. Tausch. bēm. p. 71'. Monu. ess. p. 36. Corymbus corapositus folia(us. Capitula cylindracea glabriuscula figurā et magnitudine H. foliosi. Caulis saepè villosulus. Folia. margine longè ciliata plus minusve dentata subtus non reticulata. Siugulare in hāc specie pbrenomenon observatur, quod sèpè in sinu squama; involucro proxima; ilosculis solitarius nidulatur, bracteolis 3 stipatus, fructu ligulæ et pappo difformibus. (v. s. s. coim. à cl. Kit.)

J*. *incisum* (Freel. mss.), foliis lato-ovatis basi inciso-dentatis. (v. v. c.)

•). *barb a turn* (Freel. mss. non Lois.), caule fistuloso decumbente folioso longissimè villoso, racemo composito, foliis villosis , infer, oblongis dentatis, super, ovatis acuminate denticulatis, pedunculis tomentosis villosis plandniferis, involucro glabriusculo^H. barbatum Tausch bēm. p. 72. Mocsl. el Keichenb. ilor. a. p. i3g6! IMantaj typicae habitu adeò amissive ut **vix separari mereatur. Herbae indumentum villosum densum et longissimum. Capitula paulò majora et oblongo-cylindracea. Pedicelli sèpè glanduliferi.** (v. a. s. in herb. Reichenb. ad rupes Moraviae circa Adamsthal lect.)

93. H. CRIWITUM (Smith prod. flor. graec. a. p. i34?), aph^ilopodum, caule dense folioso racemoso villosissitudo basi aphylo, foliis glaucescentibus margine nervoque ciliatis, infer, lato-ovatis acutis basi grossè dentatis petiolatis, super, ovatis acuminate sessilibus, pedunculis bracteisque foliaceis villosissimis, iuvolucro glabrescente. If, in rupibus Siciliae ad montes Nebrodeuwes (Guss!), Asiae min. et circa Neapolin ? Caulis adscendens pede altior simplex apice racemosus dense foliosns villosissiinus basi aphyllus à vestigiis foliorum squamosus. Folia inferiora conferta maxima petiolata lato-ovata acutè dentata, dentibus inferiорibus longioribus , superiora multò minora subintegra. Pedunculi tomentosi villosi. Involucrum basi hirtulum supernè glabrescens. (v. s. s. in herb. "Vahl. comm. à cl. Steinberg.)

94. H. JACOBJEJEFOMUM (yrcel. inlitt.), aphyllodium, caule strictofolioso raiuoso paucifoliatu foliisque ova-to-lanceolatis anlorsum grossè dentatis scabris subtus reticulatis , super, sessilibus, infimis subpetiolatis, peduncalis apice squamosis subincrassatis, involucro squarrosulo glabro. % in Pyrénacis! et Cancaso! H. snnchifolium Fisch. herb, nec Bieb. H. nemorosum Lapeyr. inberb. Roemer. Specimeu *Pyrenaicum* caule stricto sursum ramoso paniculato dense folioso glabro scabriuscule sesquicubitali, ramis alternis strictis 3-4-cephalas, pedicellis capitulo duplò longioribus apice paulò incrassatis , foliis caulinis numerosissimis 18-25 coriaceis medio profundè dentatis, basi apiceque integris margine subrevoluto-scabris, dentibus 3-4-(v. ss. 1. c. à cl. Lapeyr. comm.) In specimine *Caucasico* caulis bipedalis basi apiceque aphyllus icidio dense foliosns racemoso-paniculatus subpolycephalus basi scaber birkiilulus. Folia subcoriacea maigine equicicabra ciliataque dentata, dentibus in 3-qnalibns triangularibus 4-7, subtus reticulata ad nervos hirsntula, inferiora conferta lanceolata accta peiollata, sup. remota ovato-lancolata. Capitula in utrâque plantâ mediocria illis H. racemosisimilia glabra s. ad basin sub lente glandulifera. (v. a. s. 1. c. comm. à cl. Fischer.)

95. H. FoK8K.oBLii (Freel. mss.), aphyllodium, caule erecto folioso simplici corymboso foliisque lanceolatis acutis gl:»tluloso-den(iculatis sessilibus scabriiirsutis, pedunculis tomeutosulis scabris, involucro glabro. % ad pagum Belgrad haudprocula Constanlinopoli. H. hispidurá Forsk., descr. cent. 10. p. 78. Medium H. racenosuiu iuter et umbellatum. Caulis simplex flexuoxus me-

dio dense foliosns basi apiceqae nudns hirsulus, pills scabris basi conicè incrassatis rigidis fnlvis. Folia snbraemembranacea angustè lanceolata acuta sessilia denticulis glandulosis niinutis (SS notata-glabra margine subt usque birsuta. Involucrnm cylindraccum glabrmn. (v. s. s. in herb.'Vahl comm. à cl. Forsk.) Specimen obscurum inqnirant autoptse.

96. H. LEDEBOURII (Gerh. exsic. Froel. in Jitt.), aphyilopodnm glancescens, caule erecto à basi ramoso paniculato^folioso, rainis axillaribus subramosis elongatis, foliis angustè lanceolato-hnearibustubintegerrimis sessilibus margine subtùs scabris gnucescentibus, peduuoulis involucrisque cano-farinosulis. 2f pair, ign. H. Ledebourii Fisch. è sem. h. petr.'Canlis suprà basin, in ramos plures (6-8) subpatentes subramosos oligocepbalos elongatos divisus foliatus seabrius-enlus glaucus seu glauco-rufescens. Folia angustè lineadasessilia glabra glauca raris nervis percussa rigidula. Capit. magnit. H. umbellati. Invol. imbricatum cano-virens sqnamis obtusis. Pappus eg regie albus. (v. s.)
97. H. LYCOPSIFLIUM (Frcel. mss.), aphyllpodum ?; canle erecto folioso hirsute supernè glabrescente panipulato, foliis membra naceis sub I'us glaucescentibus hirsutis oblongo-lanceolatis serrrfto-dentatis basi amplexicaulibus, infer, basi attenualis sessilibus, pedunculis involucro obtuso suh^ylindraceo glabvis cano-puberulis. % in Geinaniae mediae sylvaticis raontanis circà Carlsrube et Brisgoviam. H. sylvaticum Spenn. fl. frib. suppl. A4 H. ra^cemosum accedit ex capiul. figurâ sed inilorescentiâ diversum. Caulis fistulosus densè foliosus birsatus bipedalis et ultra, rainis crecto-patulis glabris oligocephalis. Pili longisirni rectò patentes molles scabri basi bulbillo insidentibus. Folia tenuia ferè diapbana hirta subtùs subglaucescentia nee reticulata. Capitula magnitudine et formâ H. umb^bto similia. (v. s. s. com in. à cl. Braun.)
98. H. UMDELLATUM (Linn. spec. p. 1 i3i), apbyllpodum viride, oaul* simplici dense folioso, foliis nniformibus linear-lanceolatis subdentatis margine scabris, capitulis cymoso-corymbosis, involucro glabro basi squarroso (stigmatibus floris). % in dumetis, pratis hnmidiusculis et ad ipargines sylvarum Enropa?! Sibiriae! H. iirnbellatum fl. dan. t. 680. eugl. hot. t. 671. Willd. spec. 3. p. 15gi ! herb. 14725 et 14726. DC. flor. 4. p. 21. Species notissima valdè proteiformis per forinas iutermedias priecedenti et H. sylveatri affine. (v. v. s.)

- A. *glabra*, caule foliisqne glabriuscnlis.
et. polyantkemum (Fr. mss.), cauU supernè ramoso panicnlato polycephalo. (v. s. a.)
(I. integrifolium (Fr. uiss.), caule simplicumbellato, foliis repando-dentatis. (v. v. s.) ^ *
y. coronopifolium (Bernh.), foliis angustè linearibus pinnatifido-dentatis. If. coronopifoliam Willd. suppl. p. 8v.6! Gn>el. bad. 4. p. 5g4! Monn. ess. n. p. 4(. H. ceratophyllum Desf. h. par. ed. 3. p. 126 ex DC. (v. s. s.)
J. Carpathicum(Roch. in litt.1, foliis longissimislinearibus dentatis undulatis. (v. s. s. comm. à cl. Roch.)
%prohferum (Fr. inss.), umbellâ proliferâ. (v. v. s.)
^. strumosum (Fr. mss.) caule medio strumoso s. myopboro. (v.v. s.)
JJ. leptocaulon (Wallr. scbed.), caule debili decumbente oligoccphalo. (v. s. s.)
3-. *lactaris* (Berth.), canle subdicephalo, foliis ovatis subintegrrimis subcnerviis. H. fruticosumangustifoliuiu Dill, in ephem. N. C. 6. t. i3. H. ova-lifolium Monn. ess. p. 40. H. denudatum ? Lapeyr. (v. s. s. comm. à cl. Berth.) .
B. *scabro-hirsuta*, canle foliisqne scabris hirsulisque.
».*Iqlearifolium* (Fr. mss.), caulè foliisqne angustè linearibus subintegermis hirsutis. (v. v. s.)
x. *cervicaruefoliutn* (Fr. mss.), foliis linear-lanceolatis subundnlatiscanleque hirsutis. (v. v. s.)
x. *serotnum* (Host fl. 2. pf ^g), canle umbellato corymbosofoliisque ovato-lanceolatis a cure dematis scabris hirsntis! Forma intermedia inter H.nm-bellatnm et H. sylvesre, ill! capitulorum parvitate et inilorescentiâ, huic

habitu affinis, jiec tamen propnanf spcciein censeo (v v * Vienna*, jn £attciholeyle)

99 A ADRIRUIATUM (Willd herH 14687'), aphyllopoduin, ciulepiocumbente dense folioso ramoso corymboso, folns seswibus lmean lanceolatis ntnnque attenuatis subdentatis sc ibns subtus icticulatis pedunculis apice incrassatis in\olucro imbcato glabio % L auucul itam ^pien ζ syst. 3 p (.46* H prostratuua P«nz in lilt Species, nt videtui, bona nee en III H hrabellato cm habitu capitulorum raagmtudine et infloresrcntia maxime affine, net cam H boreali conjungenda^A. pnoie diffeit pedunculis apice diciassatij, non squa- inosis, myoliuio imbuue tto nee squairoso^ folus sujtus leiuuUti, leticdHs magms oblongis dispuctis, caule piocunibentc (v s. c ex herb Willd.)

fL cervican efohwn (Fi mss), folns minus elongahs grosae deniatis ly v c in hoit erl 1795)

y ramosum (Fr inss), canle ranioso coryraboso, folus ovatis (v s. conini. a cl Roch)

«T hirmtum (Fr mss), caule folusqae valde hnsutis (v v c in hoit erl)

100 H BRFVIFOLIJUM (Jausch in floia 1828 erg p 71), aphyllodium, caule erecto dense folioso tipice corymboso, folu \Rightarrow ugidis brevitet ovttis acutis sieu obtnsis basi rotundatis medio utunque bident ttis sessilibus subtus fflaucis margine bcabust pedunculis caneacentibub, myolucus subimbncatis 1L in Europaastr (Tisch') Galliae montibus Cebennis (DehleU) Caulis itriTliiirtfen" sissime fojobUb b IM nudus hirsufulus snpeme gldbei glauco vntns Toha co- nacea ngida bicviter o|ato acuta basi rotundali subcoidata Tsessih₄ mfenoi 1 retroisun fere lmbncUa , margine in medio dentibus 1 wro S glandulosi's notata, glabra, ad nervum sublus, snbhusula et glauca CapnulaH umbellalo siradia Planta lanschu folns tantutn acutis Lasi obsolete cordatis differt. (* & s com in. a cl JJchle)

^ hahmifohum (Frcel | folns lato-ovatis obtusii utrmque bidentatis, berba^ tota glauca (v s ID h hort beiol)

101 H SYLVESTR (Tanscb bein p 70), aphyllodium, canle stneto dense fo- Jioso^anunhto-coryrobctiO folnsque dentaiis ^ubglab^ls maigine &calpiib^cau- liuis supei ovatis aculis semiamplexic milbus iufci oblongi& se silibus' pe- dunculis tomentobis squamosv., involucris ovatis ghbuubculis inibucatij,Vni gncantibiu), stig.n itibaa. hvidis % m sylvis cadu.>, duinetij et ad luaicines ayWaiam tonus Euiopae H Saba^dum (non Linn.) Smith bur a p 83₄ Wdld he, 147*0 n , 3» Poll p,1 n .47 Caud hejv 5 p J₉Eogl bow t ^ G j r f b j d 3 p 33o ' Bauma en 3 p 3r' e. Li feie auct lerfu Oalliae' Planta vulgaus sero aufcinjio llorens multHm^auat cipi tfflismgncanibus, stigmithus lurid s dcfnwffSgn, heibivindi, et caule den- BisifnefoUoso facile distinguend

ft husutum (Ii mss), caule folnsque subtus Uirsutis oblongu lanceola- tis (v v s)

y hispidum (Ii mss), caule folnsqne* ovato lanceolatis dentatis hirsutm scabns (v v s)

J Tuficaule (Fi mss | caule,rnfesoente foliuque ovatis mci^o-dentatis birt_{is}. (v s O

«. ohganthym (I r mss | nule simplici oligoci pb do (v v s)

«. tenutjohum (Hopp II 2 p U 1 *), hirsutuni, /olus icnmbuj, mfr_{re} tioldtis squauosis, medns iggiepatis subveilicillaris h t₀ ox |(1<i sessij 1D ns^ caule roiymboso oligoceplialo (v \ s. in moutosis C ilenbeiff Auitna^ Umbix filia videtur, uti sequentes vauationes

long folium (ft mss), fol.u, elongato-lanceolatis sabdentati^ caule snb fistulobO ohgocephalo (v s s ;

5 »ubslabrum (Senge exsicc), eiule corymboso folnsqu^ovato-Ianceolatis acute dentatis glibns (v s s couim d cl Senge)

102 H HEiiANTHiForiuM(rr mss), iphyftopodium, caule solido dense fooso btntcoapice co^mboso slnato sulhusuto, folns conaens lanceolajtis acutis

basi attenaatis medio anguste dcmnTatis niaigine scabns*subtus venosis, supē yioubus bessilibus , invol basi sc ibro subsqu nroso peduntuhsqne oano pube mlis % in, America septenluonali H angustifolium hoit landshuf Culla per 18 annos babitum non mutavit Caulis crasbus n_bidus iigufc stualus dense foliosusglabriusculus bicubitdhs 1 ohacauhna uuineosutsmia lanceolata acuim-nata couacea ngida sca^ra intense vludia subtus pallidiora, medio dentibus 4 b tnangulo subulatib notata, basi a picequ'e Integra In\oluciuin fabco virens gla-buusculuui (v v c et sp comrn a cl Schweinitz)

ibH H SVBAUDHM (All pedew n 796 t 27 f 2 /iec Lmn "sneC nee anct tj£tm), aphylloporiqui, ciule stnctjo dense folioso colorato folmque ovatis acuuimatis seirato dentatis semiampleviraulibus scabiis.husutisqq% coiyrabo* lemuuali coin post to, pedunculis tomentosis mvolacusque ovatit> basi hutis ovatis (jjitigmatibns hvidis) % in sylvis móntosis Europae austi^lis America? septenfr^H Sabaudu Lapeyr abi p 478 Willd herb" 14720 a Tausch bem p 7a Mouii esb et p 3* Moesl et Heubenb flor I p i346 H. Cana-densehoit geett H cotoneifolinm Geih ezsicc ' H vugatum hoit gieifsw. iJJo H sylvaticum Lapeyr ex Benth Habitu et stitua minis afhne H syl-vtstu, a quo differt canle saepissime rubro tincto, hefbx birsutie insigmore , peduntuhs toniejitosis involucr;que paile mfeuore bffeviler hiisutis t flonbus pallide luteia, foln& ovatis acununatis ba&i rotundalis seniamblexicauhbas (v^s etc)

ft *Canadense* (Michx fl p 70), canle Hitnplioi coraposito corymboso sca-bio, fob 15 oblongo curd itis dcumin itis ai^nte dentatis hiibulib, pedanralis involmpsque hispidis H vngatum Puish ? (v c s comm a cl, Schiad et Sprenp)

y 'villoisninitm (Afonn ess), caulk folusque albo-birsntis H euphoruin Lapeyr abr 1 c reste Monn (exel &yn DC et baint Am) H^Sabaudain alpicolum (i pilosnm UD ltiu esshug i83o' (v s s)

104 H LATfronuM^Spieng syst 3 p 645 J, aphyllopodium , canle sabsimplici * fitucto dense foliobo folnsqrnl lato-ovatis acentiuscuhs seirato drnticulatis hutis fcal>nsque, supei corddtis scmiainplexic^uhbus^Loymbo teiminali snbsini plfcy ptdunculis toinentosis involncisque subsquarrosis basi hirsntis% in Rossia, i tyyienaeis? H Cioaticuwlapeyi abi p 475(exclii>yn), hort hafn 18 7¹ H Sabaadum Willd heib 14720 n 41 Habitu H Sabado All prox ninm, at caulis bumihor siniplicioi^ coiywbus depiupei ttus , capitula feie di-ludio minora, folia corflati minus aigute dentata nullo modo acnminata. (v v c et s si, com in a cl Huffel Talavera)

J2 *unfytatum* (fi insb), c^aiR densissime folioso hirto, folns imbuo<th>>^-tis pa ruin acutis serrato ffenVdtib yndiqae pihs brevibus ugidihi bulftllo hemispbjjuco inseitislnrsutib, involucns cino vindibushirtis () ,

105 H CORYMDOSUM (Pcts syn^a p ^74)> aphyllopodium, caule sticto dense folioso lmsujo, folnsoblongis nasikordatp seiniamply*xicuilibus argut< dentatis • snbtus relicnhtis birsutis m irtjiue scabns., coi-ymbi snbumbellati divaucati pe danculis teietibus pubescent bus apice nutlmsculis, mvoliicio ovato b isi sub-hirto If H corymbosum Hoit >dorpdt et tubing 1831 H sylvestre fr Tiusch bem p 71 H viioso nnawme affine at d^eisum ranle bicubitah cias sioic capitulis duplo fere ciassioubus ovatis nee cylndncejs, involucio uiibii-cito basi hirtello*, pedunculis teicibus^apice minus biatteolatis, folns argulms deutalis subtus grosse reticuiatis basi coidatis seniamblexicauhbus (v v c cdmm a cl Koch)

106 H* VIROSUM j(Pall itin p 5oi), aphyllopodium , caule sturto dense folioso ba^i husuto, (jpliis o\atis-oblongis)e cordato amplcxPcaulibus ciliatis snbtus le UtulaJis, roiyombo tceuinh subuiubellato, peduncul^s squamosis angulatis apiec incnssatis capitilibqnc cylindiaccis gl ibcirirms 91 m Sibina orient et qcid id Jcnisc uncl IU viueisagiiSmrynfci, Hun^ani, Transyl «niocetTauriaj H viiobum L<deb. fl alt 4 i36 H fohosum Willd heib 147J9 ' spec. 3 p iSBo^ Wildst etKit hung 2 n i55 t 145 Spreng syst i p 64O' lausch

bem. p. 73. — Gmel. sib. 2. p. 36. t. i4*f- 2! Capitula sub anthesi ferè cylindracea magnitudine H. racemosi, basi subquarrosula. Pedunvuli s(fhamosi stria to-subangulati. Folia subtùs glanca concinnè et pulchrè reticulala glahriuscula s. hirsuta. Plantas'Pall. et Gmel. ab ip*s*i auctoribus communicata* cautè examinavi et cum Hungaricis com para vñ Diversa omnino species ab H. corymboso alabastris gr:cilibps cylindraceis, pedunculis apice minus incrassatis, foliis minus argutè dentatis..(v: s. sp.)

jf. *oblongifolium*(Fr. uij>s.), Sbliii> pblongis basi aplexicaulibus glanduloso-apiculatis vel dentalisciatis. Gmel. sib. 1. c. f. 2. Anim. ruth. n. 208; (v. s.-s. in herb. Stuttg. comm. à cl. Gmel.)

y. *cordifolium* (Fr.), foliis oblongo-cordatis, superiorifeus late cordajtis aplexicaulibiis. (v. 9. \$.)

«T. *hispidum* (Fr; inst>), caule foliisque inferioibus himitis. (v. v. c.)

107. H. rnosTRATUM (DC. voy. p. 78), aphylloduni villosissimum pilis simplibus, caule adscendententi-prostrato densè folioso divaricato corymboso, foliis oblongo-ovatis obtusiusculis subdentatis sessilibus, pedunculis tomentosis involucroque hirsuta tandem glabrescentibus. If in arenosis maritimis Gallic ad ostia Atari. H. Jpog^tratum DC. fl. fr. 6. p. 121. act. soc. agr. paris. 1807. p. 10. Willd. herbf 47io! Monu. ess. p. 36. Statinà et babitu sequenti inaximè affine, nee tanic ejusdem. varielas. Herba saepè labrescili. (v. s.)

108. H. KHIOFUORUM (Saint-Am, bull. phil. n. 5s. p. 16. t. I. f. 1), aphylloduni 1 ana turn pilis simplicibus, caule stricto densissimè foHoso, foliis ovato-lauq^olatis ohtusis serrato-dentatis sessilibus, corymbo "terminali subcompacto, involucro lanato sursim glabro. % in arenosis maritimis Aquitaniae circā Ba-jonam et ad oppidum Tête-de-Buch. H. eriophorum DC. fl. fr.'4-p. 21. Lois, gall. 2. p. 522. Willd. 14709! Tola planta, oaulis basi etinvolveri parte superio re except is , longe densissimè lanata. Cl. "Vahlius primus* hanc spe^iem anno 17P9 circā Ba^onam observavit, ut ejus herbarium testatnr. (v. s.)

Series II. OXYLEPIDA, squamis invohwri intends*acittis 5. acuminatis.

Pilis folioruin simplicibus.

109. H. GLANDUMFERUM (Sturm flor. 3^! opt.), gluupescens, caule I-c^phalo subaphylo supernè tomentoso gianduifero, foliis lancedatis aciitis siibinterri-mis subundulatis nniformiter villo&ys glaucesc^titibus, capitulo >iibgk%>i>o la-nato knbrica/o, ligulis glabris. % in sum rays Alpibus Tyrolis ausir.! Helvetia-! Gallia?! Iralla! H. glandulifernm Hopp. exsic.fMo3sl.et Reichenb. flor. 2. *^#J^r^8^! H. Alpinum fl. dan. t. 37. opt. All. ped. n. 771. t. i4> f- 2! Gaud. bflv. 5. p. 66. excl. syn. H. pumtl^ra auct. helv.! H. Piloselia Savi in lilt. Iolia constanter glandulis dextiluta etligulje glabra.

/S. *lineare* (Fr-n>ss.), foliis liniaribus ix widalatis. (v.*., s.)

y. *glabraeum* TSble'ich. exsicc.!, folfcundulatisglabrescentibus. H. Alpi-num minus Gaud. 1. c.

«T. *tubulosifi* (Fr. mss.), foliis linearibus glabns flonbus tubulosis. H. glabra-tum Aibusom Scbleich. exsicc! (v. s. a.)

1x0. H. SCHRADERI (DC. fl. fr. 4- P< 20)/ caule sab'a" ifolio i-cephalo foliisque lincari-spathulatis aubinCegerrimis nufonniriT albo-villosis, involucio acuto -ventricoso subimbricato villosissimo, squamis subaequalibus , ligulis glabris. % ill summi* Alpinm jngis Helvetiae! Tyrolis a/istr.! H. Sebraderi Schleich. exsicc ! H. Alpinum Sturm flor. ^7. Hoppe in litt. H. villosnm Monn. ess. p. 59 excl. syn. Jacq. Willd. Sering. Hopp. Medium inter H. g^nduliferum et villo-sum, à priorè differt capitulo majore ventricoso nec verè glabro, squamis om-nibus subaequalibus acuminatis , ligulis latioribus longioribusque, defectu-glandularuin in canle: à posteriore involuci aquamis externis numeriquam folia-ceis nee taxi's, caule constauter luonorephalo subapbyllo. (v. v. !. in -Ifil^us Tyrolis.)

f. polyanthemum (Fr. mss.), villosissimum, caule ramoso foliato polycephalo. H. glanduloso pilosum foliis parum dentatis. Dill, ellhani. t. 149. (v. s. & comm. à cl. Koch.)

zcj1. H. VILLOSDM.(Linn. spec. p. n30), albo-vilosum, caule subramoso oligocephalo foliato, foliis membranaceis glaucis sobintegerrimis glanduloso-apiculatis, caulinis super, ovatis seU oblongis subamplexicaulibus*, radicalibus obliquis sessuibus, pecuniosus eglandulosus, involucrū villosum squamis laxis ovato-lanceolatis, ligulis glabris. ♀ frequens in pascuis glareosis Alpium Germaniae austr.! Galliae! (exceptis Pyrenaeis), Helvetia?! Pedemontii! Austria; ! Hungarian! Banatus! H. villosum Jacq. anstr. t. 87! Vill. dauph. 3. p. 404! Gniej. bad. 3. p. iag! Willd. herb. 14703! An»H. Aurimontanum Schrank fl. bav. 1. p. 33a hue adduc? Species maxiinē protéifonnis, H.- Schraderi et proximè seqnentibus speciebus af/inis. Involucrum laxum lumidum villosissimum, sguamis internis longis snbulatis, externis saepissimè latioribus acutu foliaceis. Villi bcrbaa longissiui basi bulbosi ullis glandulis intermixtis. Ligulac glabrx.

N

A. grandiflora, capitulo praegrandi ventricoso laxo ^ p villosissimo, squamis exterius foliaceis ovato-lanceolaris acutisip.&

a. *coidifolium* (Frjemss.), caule folioso sub-i-cephalo foliis caulinis super, cbrdato-ovatis. DC. ft. fr. 4. p" ao. ft. Sturm exsicc. Sturm flor. 37. (v. v. s.)

^. *eriophyllum* (Willd. suppl. p. 54!), caule folioso sub-i-oepbalo, foliis oblongis undulatis, intolucri sguamis externis ova^o-lanceroJatis W^ld. herb. I/I705. n. a. 4. 5. 6. H. villosum' iavolucintum Koch. ban. p. (kj. X. 29. f. 60! Clus. rar. p. 141* (v. v. s. et s. comm. à cl. Rocfet)

y. *bracteolatum* (Fr. inss.), caule minus folioso superne bracteis pī u rib us foliaceis onusto, foliisque dentatis glabriasculis. (v. s. s.)

et. *bellidifolium* (Fr. mss.), caule sub-i-cephalo, foliis jaulinis remotis sessilibus, rail, obovatis glabres^entibus minoribA. (v. s. s.)

t. *hixwians* fHegetschtveil. in lilt.), canle ramoso polycephalo, foliis dentatis. (v. s. s. in herb. Hegetschweil.)

f. *trichocephalum* (Willd. siipppl. p. 551), canle elatō foKoso sub-i-cepbalo, foliis oblongis, rad. pctio^atis glabrescentibas. Willd. herb. n. 14706! Link eniu. 2. p. 287. (v. v. s. in Alp. Algov.)

B. orthocephala, capitulo majuscule ventricoso laxo villoso, sguamis extenis vix majoribns nee foliaceis.

J>ygmccum (Fr. inss.), foliis rad. se'seilibns cauleui i-cephālūm aequantibas. Gaud. y. (v. s. s.)

£. *rupicapre* (Schrank naU brief. 2. p. 269!), caule i-cephalo thunili subfoliato, foliis caill. cordato-ovalis. (v. v. s.)

1. *Jissifolium* (Fr. mss.); lignlis brevftsimis 5-partitis. (v. v.s.)

x. *tubulosuiQ.* (Fr. mss.)*floribus tubuio'su. (v. s. s.)

x. *glabrum* (Ifopp. exsicc.ty, caule sub-i-cepbalo subfcifolio basi, foliisque radic. glabris. H. glabratnm Willd. herb. (excl. syn. Willd. spec. pi. et herb.). DC. fl. 6. p. 425. Sturm fl. 37. opt. t. 1. H. Schraderi Gaud. helv. 6. p. 70. in. (v. v. s.)

M. crinitum (Fr. mss.), villosissimum, caule folioso. elngato, /oliis clematis, caulinis oblongis acutis. H. valde-pilosum Willd. (v. s. s. in herb. Vahl coinin. à cl. Vill.)

v. *eriophyllum* (Willd. herb. 14706. n. 1. nee reliq.), caule elato snbpolyccephalo , foliis ovatis denticulatis, caul, subarplexicaulibus. Schl. exsicc.! ft. villosum datum Bering, exsicc! (v. s. s.)

J. *ramosum* (Froel. mss.), caule ramoso divaricato polycephalo, foliis ovato-oblongis* grossè dentatis. H. valde pilosum hort. pest. (v. s. c. comm. à cl. Roch.)

0. *scorzonerifolium* (Till, dauph. 3. p. 111), caule 1-cephalo paucifolio, foliis lintari-lanceolatis acutis dentatis. (v. s. s. in herb. Vahl cumin, à cl. Till.)

w, acutifolium (Hall, ill.), 'caule sub-i-cephalo folioso, foliis linear-lanceolatis acrininatis in leggeri inis, caul, sessilibus. H. pilosum Thoin. exsicc.! H. villosom B. < T. Monn. ess. p. 58. (v. s. s.)

iia. H. ELONGATUM (Willd. herb. n. 14707. n. I. nee Lapeyr..), *vilosum*, caule subramoso oligocephalo folioso, foliis membranaceis glaucis subintegerrimis glauduloso-apicnlalis, radio, oblongis obtusis, caulinis super, oblongo-ovatis basi arupfexicaulibus, invol. villosi imbricati sqnaniisuniformibus, ligulis glabris. If in Alpibus Galliae, Helvetia?, Germanise australis. H. valde pilosum J.. Bauli. hist. 2. p. 1030. f. A. "Vill. in h. Willd. Gaud. fl. helv. 5» p. 98. H. obscurum Zoll. teste Gaud. Differt ab H. villosa birsutie minus copiosa, invol. simpliciore gracifigre minus dense villosa, squainis acantis nee acuminatis conforinibts, exter. imbricatis nee laxis, quibus notis U. flexuoso et longifolio magis procedit. (v. s.)

Xi3. H. FLEXCOSITM (Waldst. et Kit. bung. t. 209), caule subflexioso folioso oligocephalo folisque subvillosis glaucis glanduloso-apiculatis sinuato-subdenticulatis, rad. petiolatis, caulinis lanceolatis sessilibus, pedunculis sub-squamosis eglundulosis, involucro simpliciusculo imbricato villosa. ^ in rupibus Alpinis Gerrauiiae australis! Helvetia! Croatia! Pedemontii! Precedenti Inaximè aifinc, et caute ab illo- distinguendum. Iavolucrum jumpliusculum uec bracteis foliaceis accessoriis inv. olueratum, imbricalum, squamis* subuniformibus externis neque flgnra neqynagnitudine ab interois diversis. Forinac potissimumduae foliis angustioribus et latioribus memorables. Habitu quoque ad H. speciosum proxime accedit, à quo prirno adspecu involaco acanuuato distinguitur.

A. *angustijQliS* foliis linear-lanceolatis glabrescentibus, caule valde folioso, capitulo mediocri.

a. *Kyaibelii* (Froel. mss.)» canle elongato snb-i-ccphalo folioso basi foliisque linearibus glabris ciliatis. JH Hexuosum Willd. sp. 3. p. 1581. herb. U712. n. T, 2! DC. fl. fr. 6. p. 436. Host. flor. 2. p. 414. H. villosum B. £. Monn. ess. p. 57. (v. s. corara. à cl. Kit.)

fi. *glabratum* (Freel. mss.), caule huhili *-cephalo> foliisque angustè lanceolatis glabriusc'nlis. (v. v. a. in AIP. Alg.)

y. *ruficaule* (FTOBI. mss. viUosam), caule sub-2-cephalo llexuoso iqtesscQte, foliis lanceolatis villosis. (v. v. in Tyroli austr.)

B.* *laiifolia*, fuliis larioribus.

< T *bupleuroides* (Froel. mss.), caule elllo subtamoso oligocephalo, foliis latioribus lanceolatis, rad. snb sessilibs. H. bupleuroides Bell. (v. s. s. * comm. à cl. Kalb.)

i. *dentatum* (Hoppe exsicc!), minus villosum, canle sub i-cephalo, foliis lato-lanceolatis dentatis sessilibus. U. ^entatum Sturm, fl 37. Monn. ess. p. 57. H. Schraderi Gaud. 1. c. p. 70. Folia radicalia constanter subsessilia plus minus dentata. (v. y. s. et s. a. comra. à cl. Hoppe.) #

114. H. TILOSUM (Schleich. exsicc!), caule snb i-cephalo subbifoliato foliisque lanceolatis acutis subdentatis villosulis, omnibus petiolatis, involucro simpliciusculo imbricato villosa. % in Helvetia! et Algoviae! Alpibus. Species dubia, H. viltoso nimis affinis, à quo differet videtur, herba multò minis villosa, involucro elongato irabricato simpliciore iuinus villosa, squainis auditis linearibus acutis, foliis membranaceis tennissimis longe petiolatis. (v. s. s. comm. à cl. Schleich.)

ji. *subnudum* (Thorn, exsicc!), caule subaphyllo, foliis Fad. ovato-lanceolatis. (v. s. s. comm. à clar. Schleib. et Thpin.) ;

n5. H. LONdiFotUM (Schleich. cat. 1815) (i), villosum glaucescens, canle stricto folioso suboligocephalo snperne glabro, foliis*subdenliculatis, rad.

(r) An II. louigifolium Horn. li. bafn. suppl. add. p. 155. Link cum. 1» her. ». p. a88. hue pertinet? (DC.)

ovato-lancolatis longè petiolata, eaulin. la'nceola'tis acutis sessilibus, involucro veuhicoso cano-hirsuto, pedunculis elongatis. tomeutosulis glandullferis qae. % in saxbsis alpestribris Helveiae ! Gernianiae anstr. Carnioliae! H. cerinthoides Willd. spec. 3. p. 1580. herb. 14692. n. 1. 3! et '2 ? Tausch bem. p. 76. et omnium ferè bol. Germ. Helv. Flos in generc ferè maximus. Pili foliorum ad lentem serrati Dec plamosi, bulbillo albo hemisphaerico mfxti. Caulis ferè cubitalis in 2-3 pedunculos pulverulentos simplides M'arò dicepbalos divisns". Iijvolucrum iinbriatmu villosum, glandulis laris niinutis intermixtis nt in pedunculis. Ab auctoribus Germ, passim cum H. terinthqide confusum et in hdtis etiam sab noru. H. polyphyJK, c;pitati et corsici occurrit. (v. v. c. et s. s.)

JS. simplex (Frcl, msst), caule sub-i-cephalo glabrihsculo , foliis rad. ova-tis subintegerrimis, peduncnlis subeglandulosis. (v. a.'cj)

y. *polyatithemum* (Frcl. IDSS.), caule ramesissimo polycephalo. Dill, eltii. t. 149. (v. s. c.)

116. H. SCHMIDTII (Tausch 'bem. p. 65), caule erectp soperne sabpaniculato oligocephalo paucifolio, foliis dent alia subtùs glaucis hirsutis, radicalibus ova*tis seu ovato-oblongis breviter petiulatis suprà seloso-pilosis, cauiino subsolitario lanceolato sessili, pedunculis involocriquo ovali^rgamis acutis nigro-glandulosis. % In rupibus Bohemiae ad Trojam PragaeT ^XHelvetia? circa Nieder:Jlberf, in valle Rufl^Tergesti. H. candicans Tausch! bort. canal. H. rupest 10 Schmidt act. boh. 1. p. 58. t. 9. Reich.! fl. exc. u. 265! Thorn.! exs. 11. ovatum bort. vind.! 1818. H. bifidum Ser.! exs. Habitu ad H. muroruin vai⁴. proxime a credit. Pili rigidi subnlati quibus pagina fol. superior, vestitnr Pilosellis communes hanc speciem satis distingnunt. Caulis simplex apic^npeclfinculos 2-3-divisus aphylins seu idbramosus foliis 1-1 vestitus.

jg. *hirsutum*, caule foliisque valde hirsutis. (v. n. sp. coram. à cl. Tausch.)

y. *lanceolatum*, caule simplici oligocepalo, foliis lanceolatis.

£ *ovatum*, canie giabriuscno, foliis minus hirsulis ovatis glncis. (v. s. c. ex sem. h. viud.)

t. *argyrotrichum*, caule aphyollo, foliis niveo-hirsutis. (v. s. sp.)

£. *ramosum*, caule elato foliar rainoso polycephalo. (v. s. c.)

117. H. DECIPIENS (Monn. ess. p. ^3), 'cauil^ subdiviso paucifolio flexuoso oligocephalo, foliis meinbra'naceis dentatis subtùs glaucescentibus cilia tis', r^dicibus Innceolatis acutis ptiolatis, caulinis sessilibus, invol. ventricoso-ovati squamis acuiuinatis, pédifheuliste nigro-glandulosis hirsutisque ; receptaculo subbirtello. % in praernplis herbidis "Vogesorum Hohneck. H. cerinthoides <ngl. hot. 7. t. 2378? Spécies inter H. Schmidtii et H. ceriuthoidein media Vagesis propria videtur. Canlis sesquipedalis flexuosus in 2~3 ramos s. pedunculos elongatds tlivisns, foliis plerutnque 2 vestitus glaber striatus. Folia rad. basi atlenuata petiolo subplumoso hirsuto longiora. Capit. magnitudine fere <H longifolii. Pappus egregiè albus.

418. H. AMPLEXICAULE (Linn. spec. p. 1129),, viscido-hirtam, caule rauioso folioso, foliis dentatis, rad. oblongo-ovatorum petiolis subvillosis, caulinis cordatis amp1exic-aubibus, involucro laxo snbohvallato , receptaculo hirto. If in ijunri. rnpinn calcarearam subalpiuarum Gerniania ! Galliae ||Helvetia;, Pe-dè^nonli! Ilaliac. Hispanic. All. ped. n. 791. t. 15. f. 1. Willd. spec. 3. p. 1582. herb. 1/1G93. DC fl. fr. 4. p. 5i." H. pmilnm Lapcyr. abr. 471. excl. syn. ex Kenth. Tota planta scjissiniè pilis arliculatis confertissimis glanduliieis viscidis obducta. S»pè glandula in parle infeiioie caulis et foliis radicalibus in pilos transennt. Involcri squaiiiw interna;, raro exequiplo, ex acuminato in obtusum line in abeum. Folia caulina xspissimè amplexicaulia rarò sessilia. (v. v.t.) ,

#£. *angustifolium* (Frcl. mss.), caole foliisque angustioribus lauceolatis viscidis, canlinis cordatis. II. cerinthoides Yill. dauph. 3. p. 131. t. 3a. bon. ex spec archilypo in herb. Vahl. H. intybacoum Sturm 11. 3Q ! (v. s\ s, coinin. » * Hopp. et in herb. Vahl,

- y; *pulmonariooides* (Till, dauph. 3. p. i33. t. 34!), viacido-hirtum, foliis caulinis ovatis sessilibus. H. pulnionariooides Spreng. syst. 3. p: 640.
 Folia rad. et petioli saepè sirapliciter hirsuta. (v. s. s. comrn. à cl. Vill. et v. s. in Alp. Salisburg.)
- «*T. hulnile* (Frcel. mss.), caule humili paucifloro. H. pamilum saxatile asperum rad. praeraorsa. C. B. pin. 66. fide Heg. (v. v.V)
4. *pseudocerinthe* (Gaud. helv. 5. 'p n a !), foliis subdentatis apiculabs glancescentibus cauleque glandulosso-hirtis, caulinis cOrdal is aoutis. 11. cerinthoides Sut. helv. «2: p. 147. Hegetschw. helv. 2. p. 179! Thorn. exsicc! (v.s. s.comm. à cl. Tboin.) . *
- £. *grandijlorum* (Froel. mss.), caule , éla to simplici corymboso foliisque denticolatis acutis simpliciter hfrsutis, rad'. oblongo-ovatis, involucri squamis aculis. (v.-s. s. ex m. Apuan.)
- n. *macrophyllum* (Fjoel. mss) caule divaricaio-iamoso glandulifero , foliis latissimis denticulatis uiargue glandulosso-ciliatis glaucescentibus. (v. s. c.)
- 3¹. *ramosum* (Frcel. mss.) caule divaricato ramoso, foliisque grossè dentatis viscidis. (v. s. c.)
- «. *balsameum* (Asso arr.), canle oligocepbalo foliisque omnibus glandulosso-hirtis % caulinis cordatis sessilibus, involucri squarais oblnsiuseulis. I;epicanne balsaueia Lrip. abr. p. 478. Medium inter H. picoides et amplesi- caule. (v. s. s. in h. Rcpin»)
119. H. GRACILE (Frcel. mss.) , caule erecto simplici paucifolio subcorymboso foliisque merobranaceis subdentatis petiolatis villosulis , rad. elliptico-ovalibns, caulino lnnceolato, involacris ovato-cylindraceis acutinseculis pedunculisque glaudnlosso-bispidolis. ^C .in surnmis jngis Alpium Tyr. austr. H. arclico habitn affine. Capitula magnitudine et forma' H. molli siiulia. Caulis gracilis sirapltcissiraus oligocephalns , foliis i-3 vestitis. Folia tenuia ferti dia- phana snbreticulata villosula, pilis brevibus ferè pluiosis, juniora tota albo- villosa. Pedunculi et involucrum glandulis nigris densis pilisquc sparsi , squaiuis internis 4-6 acntis. (v. v. s.)
- *20. H. PALLESCENS (Waldst. et Kit. bnnp. t. 217 !), canle simplicinculo pance- folio oligocepbalo, foliis omnibus peliolatjs basin versùs grossè dentulu ciliatis glaucis, rad. oblongo-ovatis, canlinis lan^olatis acntis, pedunculis slruplidbus bifidisve involucroque achtò cano-lomeutosulis birsutisque. % in subalpinis Croatia! Hungariae! Auatriae! H. pallescens Willd. enom. p. 8i3. Spreug. tyst. 3. p. 640. H. pallidum Willd. herb. 14684! Species intermedia H. glaucum inter et foliosnm. Caulis pedalis scsquipedalis glaucus oltfer simplex ». saperuè ^1 ramos pedunculosque paucos divisus, foliis 'j-4 vëstifus. Folia glauca suprà cinereo-punctata su^membranacea ligidula , a niedio ad basin dentata, deu- tibus inferioribus profundiyrihus acatijJ sacpe in petiolos radicalium affugis. Capitla ovata imbricata birsutula, glandulis%sparsis. Squama; interuae acutae. Pappus albus. (v. s. s. comm. à cl. Kit.)
- £. *Willdenowii* (Frcel. mss.), caule subflexuoso subcorymboso , foliis cilia- tis glancis tenuioribus, pedunculis subdicephalit incanis, pappo albidiore. H. rotundifolium Willd. herb. 14652 ! H. rotundatum Schreb. austr. 2 p. 3og. H. cerinthoides corsicum Horl. monac. 1827. Folia tenuia mollia, rad. obovata obtusa nee scfbiotuda. (v. s. s. in herb. Willd..et v. o.)
- y. *dubium* (Bess, in herb. Rqem.), caule elonga^o raiuso, rumis elongatis bifidis, foliis runcinato-dentatis longc pctiolatis. (v. s. 1. c.)
- «*T. brachiatum* (Frael. mss.), caule bipaltito dicephalo, foliis oblongo-ovatis dentatis. (v. s. s.)
- ill. H. ATRO-VIRENS (Frcel. mss.), caule erecto subumloJio ramoso divaricato-pa - niculato foliisque omnibus petiolatis subbirsutis (viridibus) , rad. ihouiDoideo- ovatis btisi subcordatis, caule subsolitatio minoie, peduncnlis cano-tomentosis involucrisqe oblongis glandulosso - hispidulis. if..... H. mnroruin habiff maxime affine, à qno tamen colore atro viridi, capitulo J longiore graciliore H ferè cylindraceo., involacri squamis internis acutis s. acuminatis, florc niajwte

et foliis orassiusculis fciibcoriaceis lato-ovatis sufcaentis basirhomboideo-cardatis
longc peiiolatis Pappus egregic albas (v. v. c)

rsi2 H HOPPEANEUM (Fi mss. non Scbull), caule siraplici oligocephalo subaphyllo folusque oblongo-ovatis basi grosse dentalis pnbescientibus, petiolis villosis, involucro acuminato pedaneuhsque cano-tomentosnlis birsutis *1f* pas-sim in Alpibus Helvetia¹ Tyrolis¹ Bavaua¹ Salisbuigi¹ H mcisnm Stnim 39^T
H bifidura Thorn exsicc 1829. Species polyraoipha H niuiornm et bifido maxiroe afGnis An hybiida matre H. muioram et patr[^] H villo&o^P Gaulis saepe simplitissimus i-3-ceplialusspithamaens, iarò longiorapice ramosus subcorymlios^s pohycephalus apbyllus s folio solitaio petiolato mmore auctus I olia submembranacea suprà laete vindia plus minusve hirsutula, lad longe petiolata basim versus dentata oblongo-ovata basi saepe sabietusa s lanceolita Involacrnni multo longias qoam m H. maroram biisatum, squam![>] internis elongatis&nbulatis. Flosmagnus intense flavas ^ v. s. et s. s comm a cl. Hoppe)

123. *macranthemum* (Fr mss), c_Hole subapbyllo oligocephalo snrhiisuto, capitnls praegiandibus, (v. v. s.)

y *pnnatifidum* (Fi mss), caule subaphyjlo oligocephalo glabriusclo, fo-his oblongis basi pinnatifido-dentatis. (v. v. s.)

T. petrceum (Fr nisi.), r_Hule sitnplici subdicephalo fohisqoe ovato-subcor-datib dtnticulatis pubescentibas (v... .)[#]

« *integnofohum* (Fc msb), caule sub-i-tephalo, foliis sabintegu's (v. s. s)

£. humile (f 1 mss), caale hnmih sub-1 -cephalo, capitolis minonbus.
(v. s. s.)

21 *maculatum* (Fr. mss), foliis fasco-maculatis H sylvaticum Balb. in litt.
(v. s. s.)

** *Pilis fohorum pliunosis.*

ia3 H SYMPHYTIFOLIUM (I'roel.inss), caule erecto fohoso sub-Vcephalo foliis-que peioliolatis ovato-lanceolatis acomiuatis subintegernmis subplunioso-villosis, peduninh tomenlosis involucroque suhacuto-villosis % in rnpibns Siciliac' Pulin. Gdll Hore Hieracn Lob obs p 317 adveis. p 253. ic comm. H criniuin^P Jan in litt H lucido habili pjulo affine Cauhs digitum s spithanictni longus apice 2-3-cepalus fol^put^o Folia tcnaiia subtus buhreticulata ova-to-lanceolata utiinque acuta vJO&d, pilis plumosis fntemiztis glandulis ruinirais spursis, caulina dcuminata in petiolum oblongum villosum glandnlis ad lentein inteimixtis Squamao magmtudine et forma variant, jajn lineares obtusiusculae, jam longioresatutae.^v s t>.)

124. H LAPEYROUSH (Froel mss), glancum, caule ramoso oligocephalo foliato, folns snbmembranacejs deuticulatis ciliatis, radicaimm oblongo-ovatorum petiolis plumoso-villobis, cauhnis ov ito-cordatis btmianiplexicauhbus, inv ovati sqnamiHacuminatJ>ppdnncnh<ft{ue nigio-hirsutisglandnlosisque % in Pyenaeis Heiba glancedine et mdumtulo subplnlio&o H cerintbodi affinib, distincta videtui ctptulih (magrt H. longifoln) doplo inajoribus, mvol ventirosso ova-to mgncanie j ira glanduhs jam pilis hirsuto, squamis int 2./,3o*acnrijj longionbus, peiluQculis cras>js siipeme nigro-hirsutib glandulosisve, receptaculo snbfunbridto

C *villosum*, canle subdicephalo pantifolio folusque glaucis villosis, peduncubs subglduduloso-4ii!>piduhs, inv villo^o —H. VMIOSDIII Lapiyi abr. P 4"6 excl syn (v. s. s)

y *palhduin*, <a'le se^quipedali folioso subdicephalo foliisqne virenti-flavcs-centibus vil|oi,is, pedunculisglanduloso-hispidolisiinvol viloso. (v. s. s)

T. obovatum, caule efato suhmonoceohalo paucifolio basi glabro, pedunculo cano-loineniosulo in\ohicioqt viftobis, foliis radic obovatu, obtusis. — H obovaluin Eape^i snpl p 129 Monn. ess. var J'

flexuosum, caule flexuoso tainoso folio&o basi glabio, loins rjidioubus oblongis, ppdontulij, nivulucioqne hir*utis. H fleiuosuin L<<peyi dibi p i55

f. senceuiry clmle snb-i-cephalo paucifoho fohisque subtonaceis albo-villosis H senceam Lapeyi. abr. p. 477?

125. *H. CERINTHOIDES* (Lmn. sp p. i '229. excl. syn. Hall), glaucum, taule stricto folioso subiamosu corymboso, folus membranaceis suhintegeirimis cihatis, radicalium obovatorum petiohs subpluinoso-bai balls, cauiinis oblong is jcutis coidatis amplexicaulibus , pectonculisque glandnloso-hispiduhs, letepfaculo. hnt'ello.^{1^} inPyrenaeis orient etcenlrahb. *H. cerinthoides* Gouan obs p 58. t 22. Lapeyr abr p 4^5' WillJ. sp. 3. p. i58o' herb. 14692 n. 5 (nee leh'qui nuiuen) DC fl. fi. 4. p. 27 H alatumXapeyi.-abr crfMonn etH sco-pnloium Lapeyi suppl 124 ex Benth. Differt a pnecedente babitu gracihoie, coloie exquisite glauco, peduncuhs giacihonbus fusco vucentibus, capituh dnplo minoibus magnit.*Ciepidis palndostt, mvol. breviore graulioie, squamis angustioubns mag is acutis muteti n. 16, vnenibus

<*t rhomboidale*, caule oligocephalo subbifolio, foliis oblongo-lanceolatissub-denticulatis inargme petioksque villosulis. Lapeyr. act. tqul. 1 p 215. t. 18 (v s.)

y. *akissimum* (Lapeyr. snpl), caule elato ramoso folioso , foliiscaulinis lato-cordatis acummatis late amplexicaulibus. (v s. s. in b Roeraei ab ipso anct.)

126 *H. LATIFERUM* (Cav. ic. 3 p. 18. t. a34), caule subaphyllo oligoccpbalo glabru, foliis tad oblongo-spathulalisintegeirimi's ^labuusculil, petiobs cauhsqae basi lanatis, pedunculis involutroque glabns?, *eccptacuk). . . 2£ in mpribus montosisiegm 'Valenlmi teste Cavamll. Species mibi ignota, an hujus loci?

127. *H. ORIGANIFOLIUM* (Frcel inss), villosum, caule pancifolio di|iso s>ub-2-cepbalo, pedunculis fastigiditis, ioliis obovatis mtegeinuns petiol itis glaucis#petiolis plumobo-lanalis, involucio viloso, leceptaculo hirlo.9/, in Hispama. Cau- Us digitalis et ultrà supià medium divisus flexuosns, pedunculis fas*igiatis subsquamosis Folia membuaacea glauca, juniora tota cum petiolis lanata , caubna i-2-lanceolata sessilia ,Capitula magnitudine H. villosi Iuvoluciulu imbnneatum villosuni et ad lentexi glanduliferum, squamis internis acuminatis. A/fine priori videtui. (v. s. s. in heib, Vahl.) *

128. *H. PHLOUOIDES* (Frcel mss), taule flrxuoso oligocephalo superne glabio apbylloque, pedunculis divaricatis fastigiatis, foliis oblongo obovatis snbdentculaiis apicnltdts plamoso-villosis lanatis, caulino sessili ovato acuminato , involuci;o glanduhfeio , leceptaculo hiiito. % in Pyienaeis propc Gavarne et Ge-die. U. ceunlboides var exsicc Un. Uin essling. 1831. Afine *H. coodifoliol* à quo distinguirur foliis obovatis glaucis densissiune albo-lanatis, lanà lougiswma pluino<.a, caule subunifolio ohgocephalo glabro basi tantum lanato, involucio basi spaise glauduhfero superne glabio, squauis inteims acuminatis. (v. s. s)

129 *H. LAWSONII* (Vill. dauph. 3. p xi8), caule erecto snbramoso obgocephalo pancifolio subbusuto, folus oblongo-o|atis mtegerrinais subpluinoso-villosis, pednnculis tomentosis involucroque glandulosobirsitulilis, leceptaculo aspero. % in rupibus dpncis Pyrenoeomn^ Delphinatùs. Lapeyi. abi p. 470 exel syn. Vill Willd. spec 3. p. i56ç' heib 1466^, n 2' nee rehq. Spreng. syst. 3* " p 641' Species valde inUicata notU jam mdiratis distincta , act *H. undulatnm* habitu pioxime accedit Involucrum glandnloso-hispidulum Dasi rano-farinosa-Jum, squamis mteinis^ acutis. lolia conacea glauebcentia, radicaha numeiosa figuYå vαιia, basi III petiolum bievissimuny decrescentia. (v s s in heib. 'Vahl coium à cl Vill.) ,

a., *glaucescens* (Fr. mss), caule pedali flexnoso larnoso &nbtucephalo glabro, foliis lanceolatis glauci& minus villosn. Culta planta. (v. s. c. comm. à cl. Nestler, Koch, Spieng.)

y. *humile* (IT. mss), caule hnmili ex ba&i ramoso oligocephalo subaphyllo glabio, folus minus villosis. *H. syWaticum* Gouan var (v. s. s. in heib. 'Vahl à cl. Gouan anno 1789 comm.)

<*T. uniflorum* (IT mss), caule subuuifolio sub-r-cepbalo, foliis lanceolato-ovatis lanatis (v. s. s. ex Pyren)

i30. *H. DASYCEPHALUM* (Frcel. niss.), caule subramoso subfflioso oligocephalo, foliis lanoeolatis dentat*i*9 plumoso-villosis, caulinis sessilibus, pedunculis subfastigiatis involucroqnc villosis, receptacnlis asperis. % in Delphinatu. *H. saxatile* Balb. in hort. taar. 1814 ! *H. Liottardi* 'Vill. daaph. 3. p. 121. t. 29. med. *H. anchusaefolium* Spreng. syst. 3. p. 642? Praecedenti habitu affine. Caulis digitalis ijimus in peduuculos 2-4 fastigiatos[^]altemos divisus glaucus villosas. Folia junioia tota lanata, radicalia lanceolatabasi in petioluih brevissimuni decur re ntia. Involacrum ventricosum ovatum plumoso-lanatum, squamis internis bubulatis. (v. s.s. in herb. 'Vahl à cl. Till, coram.)

i31. *H. TOMENTOSUM* (All. ped. n. 791), lanatum, villis elongatis plumosis, canle erecto folioso ranioso oligocephirio, foliis lato-ovatis acutis subdenticulatis, rad. petiolatis, receptaculo'pubescente. *If. in** rnpibus apricis Helvetia! Ga Iiac ! Pedemontii! Andryala lanata Linn. spec. p. 1137. *H. Lawsonii* Willd. herb. 14664. n. i(nec 2. 3). *H. lanatum* Vill. datiph. 3. p. 120. DC fl. fr. 4. n. 29-10. Gaud. helv. 5. p. 100. ^ffine quidem sequent! at indole receptaculi et indumenti verè diversam. Folia magna lanata qaasi pannosa nt in Verbasco Tb:ipso, pilis prxlongis caudidis infernè plumosis apice scabiis. (v.s. s. et v. c.)

ct. *polyanthemum* (Fr. IDSS.), caule raraoso polycepbalo. Dill. elth. t. i50. (v. v. c.)

132. *H. UNDULATUM* (Ait. kew- 3. p. i34), plamoso-toraentosum, caule subfolioso divaricato-rámoso subcorymboso, foliis oblongo-ovatis basi attendatis ubdnlato-dentatis, involucro acuto, receptaculo syabro. ^ in Hispaniâ. Willd. herb. 14716! Tausch bem. p. 64. Monii. ess. p. 53. Schrank pi. rar. t. 45? Af/ine sequent!. Caulis spithamaens paulò suprà basin ramos 3-4 alternos divariatos i-3-cephalos divisus foliosus. Folia cauo-tomentosa nee verè lanata, rad. petiolata oblongo-ovata basi attenuata crenata dentata undulata , caulinia lanceolata utrinqueattenuata sessilia. In^volucrum acutum. (v. s.s? iuherb. Willd. comm. à cl. Boucbé.)

133. *H. ANDRYALOIDKS* ('Vill. dauph. 3. p. 121. t. 29), piumoso-lanntum, caule subramoso paucifolio oligocephalo , foliis radicali-hus' oblougis basi attenuatis sinuato-dentatis, caulinio linear-lanceolato, involucris subacuminatis, receptaculo. scabio. *If. in* rupibus apricis Helvetiae! Pedemontii, Galliae! *H. andryaloides* 'Vill. voy. p. 57! DC- fl. fr.¹ 4. 11.2911- Spreng. syst. 3. p. 642 excl. syn. *H. Liottardi*. An differt à praecedente, cui habitu et indutnenti indole maximè affine? (v. s. s. comm. à cl. Nestl. Thorn. Scbleicb. Meisner.) •

et. *Irratum* (Frcel. mss.), foliis rad. lyrato-dentatis (J. A. Froelich). (v. s. s. com in. à c). Balb.)

• Species non satis not a.

134. *H. ABSCESSUM* (Less, in linnseâ 1830. p. i32), caule simplici erecto'tereti striato hirto, foliis ad basin caulis conferti supernè remotis sessilibus oblongo-ovatis mucronulato-denticulatis basi amplexicaulibus, capitulis racemosis, invol. calyculati glabri squauis linearibus. — in dnmetis propè Jalapam* Kacemus evolutione centrifugâ simplex aut con%positus. Cor. luteae.

a35. *H. ALBIFLORDM* (Hook. fl. bor. am. :: p. 298), caple folioso infernè rool-liter deflexo-piloso, foliis lato-lanceolalis integerrimis obtusis in peflolutn attenuatis longè albo-pilosis, caulinib reinotinsculissim minoribus sessilibus, paniculâ gracili polycepbala glabra, pedicellis ^ivaricatis, invol. .pilis longib albidis sparsis. —in Amer. bor. sylvis alpinis montiuna scopulosornm (Rocky mountains) ad septentr. iluminis Smoking lat. 56°. Habitus *H. Gronovii*. Flores dicuntur albi! an decolorati?

i36. *H. ALLIOWII* (Tausch in flora 1828. erg. 1. p. 58), stolonibus elongatis reptantibus, scapo basi folioso folisque oblongor-lanceolatis dense hirsutis, corymbo subcyinous involucroque hirsuto. *If in* collibus Pedemontii. *H. cy-* luosum All. ex Balb'. An. *H. cymosi* var.?

137. H. ATTissIMUM (%apeyr. abr. pyr. n 5), cauls subsimplici erecto pilosiuscnlo, foliis radicalibis oblusis ovalis longissimè petiolatis decnrentibns, caulinis latSs amplAcicanibus, osanibus integerrimis pilosis, capitulis paniculatis, pedunculis involucrisqife hispidis. — in pratis huinidiS'inontosis PyrensBorum orienialium.
138. H. AMBIGUUM (Scbult. obs. p. f65. non Schleich.), caule erecto ramoso paniculato, foliis radicalibus lanceolatis, canlinis oviitis omnibus pro fund è dentatis, capitulis paniculatis. — patr. ign. Affine dicitur JH ramoso.
- iSg. H. ANCHUSJEFOLIHM (Bertol. ámcen. 40a), villosissimam, canlè folioso erecto simplici i-cephalo, foliis omnibus lanceolatis integerrimis cuminatis, inferioribus elongatis, invol. hirsntissimo. If in Italiæ Apuarae superiori Tombura.
140. H. ASPERRIMDM (Don prod. fl. nep. 166*), caule ereclo texeti bispidissimo, foliis lanceolatis obtusis mucronatis sinuato-dentatis subtiis setosis, canlinis sessilibus, corymbo»patenle. % inNepaliâ. AnMul^edii sp.?
- i4*. H. ASERUM (Tauscb in florâ 1828. erg*. 1. p- 56. non Gand.) , canle sparsè folioso birsutissimo, foliis lanceolajis glaucescentibus rorymboque subcymoso-birsutis, stolonibus omnibus adscendentibus floriferis. ^ in Palatinatu. Yariat* scapo elatiore subramoso. Affine vid- H. collino.
141. H. ATTENUATUM (Tauschin florâ 1828. erg. 1. p. 56) , scapo subnudo elongato ramoso. slolonibus nullis, ramis attenoatis oorymbosis oligocephalis, foliis lanceolatis glaucescentibus sparsè birsutis. If, in apricis Bobemiae ad Karlstein. Ad sect. Pilosella?.
- i43. H. AVILJB (H. B. et Kunib nov. gen. am. 4- p^x 3), caule erecto simplici ferrngineo-birsutissimo, foliis lanceolatj̄ remotè dentatis birsntis subtiis canescentibus, panicnlâ terminali ramosâ, racbi subflcxuosa, involucro glabro. % in Amer. merid. deversis montis Avilae sen Silla de Caracas.
- I¹44. H. BRA'CTEOTATUM (Sibth. et Sra. prod. fl. grajc. a.p| i35), caule erecto folioso villoso, foliis lyrato-dentatis, paniculâ cymosâ, bracteislinearibus sparsis. % in raontf Atbo (Sibib.).et in Siciliâ. Hier. Cup. panpb. ed. a. t. 137. Huē teste Stnitbio ritè relatnm.
145. H. BROTEKX, foliis oblongo-ovatis crassis snbintegerrimis tomentosis, pedunculis snbramols. % in Lnsitania<id ripas Durii. Hier. lanatura Brot. fl. lus. 1. p. 3T9 non alio\
146. U. CESpITOsuM (Duinort. fl. belg. prod. 62), stoloniferum, ftliis obovato-lanceolatis subintegrh obtusis scapisque hirlis, corymbo multifloro demùm elongato, pedicellis villosis ^landulosis , invol. birtis. If in Belgii ruderatis propè Tornacum. Affine videtur H. dubio seu Pilosellse.
- 147! H. CALCAREUM (Bernh. in Horn. b. hafn. a. p. 762), canle erecto glabro apice paniculato, foliis lanceolatis medio sinuato-dentatis, inferioribus subtiis lanatis, pedunculis apice incrassatis, invol. conicis. (f) patr. ign. An idem ac U. calcareum Scbult. = grayeolens & Frcl.? aut H. calcareum Willd. — H. rupestrn¹ Froel.?
148. H.? CALIFORNICUM, glabrum, quaule erecto striato^apice paniculato, ramis i-cephalis bracteolatis, foliis sessilibus sublauceolato-linearibus acuniinatis ?negris, invol. squamie linearibus imbricalis ,papiM) albo fragili i-seriali. in California legit cv. Douglas. Achsenia immatura tanium vidi et ideo de generc dubito. Cor. ex sicco flavae? snbtùs purpascentes. An generis novipignus? (v.. s_f comm. ab hon. soc hortic. londin.)
- 1^9. H. CANESCENS (Link enurn. h. ber. a. p. 388), foliis basi attenuates sessilibus longéacuteis dentatis, invol. toraentosnlo-canescens. *}, pair", ign. Forte ex cl. auct. H. laevigati var. sed magisfcaneccns.
150. H. CHILENSE (Less, in linnxâ i83c. p# 100), caule credo tereti, infernè sublanato-hirto apice parçè ramoso piloso, foliis sessilibus piloso-ianatis ci- liatisqne intrgerirrais ad basin caitlis confertissirois, invol. cylindracei sqnamis

acuminatis, e. teuoribus hyspidin&culis, inter, glabratis margine scanosin. — m Chili. Affine H Mexicano ied caulk et folia uiagis pilo& In vol. bispidmscula nee villis atns hirsuta.

151. H..rRAssiForiuM i Bernh. ex Horn. h. hafn.sappi. add p. 155), caoleerecto corymboso-paniculato, foliis linear-lanceolatis deitficulatis glabris. If patr. I ign. An ex cl. Froel H. latifolii var. ?
152. DICHOTOMUM (S. G. Gmel. itin. i. p. 9. Groel syst. 1177^ non Roxb), caule erectiusculo dichotorao, foliis ladi calibns oblongis acuminatis sinuatis lanatis —iii" Sibiuâ.
153. H. EniANTHiy (H. B <t Kunthnov. gen. am. 4. p. 4. t. 3os), canle erecto Aimplici infer m* albido-lanato snperne pubescente, ioliis lanceolatis obsolete et remote dentatis suprà pubescensibus subtus albido-tomentosis, panicnlâ ter-niali corymbosA , involucio cano-lanato. If in Amer. med. provinciâ "Venezuelâ "»
154. BRIOPHYLLTJM (Link enora. h. her. 2 p. 286 non Willd), foliis radicalibus oblongis lanceolatisque obtnsiascuhs hasi attenuatis denticulatis lanatis, caule subnudo, involucris canestenhbus. ^ pati ign Sub nomine H. rupes-tris leccpit boit. beiol
155. H. FASCICULATUM (Puish £1. bor am. a. p. 504), glabriusclum, caule erecto folio so simplici glabro, foliis sessilibus oblongis acutis ai^ufè deatatis, dentibus elongalis, lamis paniculjs divaricatis brevibus, pedicelhs subfasciculatis pubescensibus — in Canadâ.
156. H. FITIFERUM (Tanschin floiA 1828. org. p 59), scapo basi folioso corymboque divancato biisnto, foliis angusyo-lanceolatis glaucescentibus ciliatis, stolombns leptantibus. *£ m Palatinatn. An beet Pilosellje ?
157. H. FIIIFORME (Poir suppl. 2. p 560) caule fllifoimi subnndo glaberrnio foliis spalhulato-lyratis vix dentatis &ubciliatis, capitulis minimis laxc paniculatis. — in insulâ Ma^Jiiti.
158. H. GLOBOSUM (Desf. c<it. h par. ed. 3. p. 3g8); villosam erectum, folus infenoubub spalhulatis, snperionbuj lameolatU integeriilnis, peduncuhs elongatis i-cpphahs, capitnlis ante anthe&in globosis dense VIIIOMS. — patr. ign An forte H. villosivai.?
159. H. GTUTINOSUM (Linn. sp. 1130), foliis lanceolatis mncinatis scabiusculis, capitulis unfstellatii. (I; in Galliâ Narbonensi.
160. H. GRACILE (Hook. fl. boi. am. 1. p. 298), scapo nudo seu monophyllo glabro snperne cyino"so-racernoso pubescente involqrisque nigro-pilosis subglandulosis, foliis oblongis obtnsiuscuhs glabris in petiolum longinsculum atte-naatii. membranaceis integernrais, capitnhs parvis — in partibub elatioiinns montiim scopuloiuui (Rocky-ino an tains) Amer. bor. Affine H. venoso ex Hook.
161. H. HUMIFUSUM (Spreng pug. 3 p 76), caulibus. virgatisprocnmbentibus glabiis, folus lanceolatis acuramatis dentatis glancis glabus, invol subpilosis % patr ign. Horn, b bafn snpl. p. go; H. Hexuoso dtcitui pioximnin Cl Spiengel m syst oraisit.
- 162 H INCERIUM, oaule siniplici lanato, foliis radicalibas ^blongis acuminatis viscido-tomentosis. —in Sibma H flexuosum S. G.Gmel. itin p. 9. ex Gmel. syst. 1179 non W. U Kit.
163. H INTERMEDIUM ('Vest in floiA t8?o. p. 5 non Lap. nee Hop), scapo stipe me subaphyllosubrorymboio cum involuens tomentoso birtoque, folns radicalibus petiolatis oblongo-lanceolatis dentatis, dentibus acuminatis, petiolis. hirtis, canlino snbunico hneau — in Slynâ^irca Gratz. — H. intermedium Lap%yr omnino dubium, forte H. hnmlis var. ex Froel. aut H murorum ex Monn
164. H IAGOPUS (Don trans Linn, soc 16 p 175), villosihsimnm, caule ramoso polycphalo nudiusculo , fohis lanceolatis subintegrumis glancis, mvol

loamento et glandulis pedicellatis oinato, ligulu p%fundē 5-fulis. % m Mexico.
Flor. citrini.

ib5. H LoRIETiE (Balb. fl. lyon. a. p 450), caale erecto simplici piloso, foliis infeuonbus oblongo-laTweolatris rariler dentatis, canlims brevionbus senriamplexitaulibus subdentatis, iuvolucns villosinscuhs. — in inonte Pilato prqipe Lagdunnm. An vai.Hiei Sabfcudi ex Monu obs. p. 83?

1C6 MACROPHILLUM(Paishfl. bor. am 2. p 504 non Schleich.), altis^mum, cauleeiecto folioso kispidd" sulcato, fobis cordato-semiamplexica,ulib< ovato-oblongis lemote grosse dentatis nudiusrubs , neiyis v^nisque'snbtus puhesctnibus., panicula divaricato-corymbosa, pedunculis elongatis nudis involutnsque glabns If in Canada An idem ac pienanthoidt-s ex Nutt ?

167 H. MFRITINI (Gmel. fl bad als. 4 p. 5j)i), caule cieeto pubescente-\illoso folioso superne ramoso-paniclato , folhs radicalibus cauhnibque petiolalis late lanceolatis acuminatis a basi ad medium piofunde intiso-dentatis ciliitis, supremis sessihbus If in agro Badensi ciica Werlheim. An H. sylvatici vai.P

ib8. H. MEXICANUM (Less*, in hnnaeà i830. p. i33), caolc erecto simplici-pilobiuscalo apice lamoso foliis mfei petiolat^s oblongo-bovatis mncionulato-deuticulitis ciliatis, supei sessilibus pansi. Linceolatis, capitulia solitams ramos terinmantibjs, invol Lampanalolo pili^ nigTjh longis bispido, acbajnus sui>uin scabridis. — in Mexici monte Oizaba. Achaenia hueau longa.

10Q H MILLER 1 (Link enum b berol 1 p. 287), folriš radicabbns oblongis basi altcnuatis acutis, caulfnis snbaniplcxia^aulibus lauceojatis, omnibD& denticulatis, pedunculis glandulosiš, involcio glandulose biito. If, pair. ign.

170 H MULTIFIORUM (Schleich. pi. exs car i8x5 non f821 e'a Gaud fl helv. ^ P< 87), bipiduro, scapo basi fohtoso, capitulis corymboMs, peduntulis distautibus, foliis lauceol.nis, involuciis toiuento-villosis. 2 2 in Alpibus Yalebiucis Affine dicitui H. auiantiaco sed ladix biennis dicitm, folia angusta, ^orymbus submubellatussxe io-i5-cepba'ns, lapilulis dimidiò minoubus pal-Lidecioceis, invol sii-peine dilatatis griseis molliter* villosis

171 H. rrftuciDUM ^Wablehb fl. suec 2. p. 194), canle fisluloso paucifolio» fohis caulfnis longe petiolatis ovatis glandulose deulatis pellucido-punctatis, ladioulibus infiim3 subcoulati, involucip tenuibus spaise glandulosis. If, in Sueuae sylvis abietinis ad ladices umbiosissimas montium. Hue cl auct. lefert •II diapbanum Fries nov. p..n5 p. 100' a plmimis ad H paludosuin relatum . Cl Lestadius in Pei bull 1827. s. log quaint an HitII muroiuin \.u.'

172. HrLOCFPnALUM (Link enum. b. bei. 2. p. 286), diffeit ex auct ab H. vil-Joso involurro pilis brevionbus fuscescentibus densis obsito. An satis distinc-tnra

173 H. PRASINUM (Duraort. fl belg. JMOJ 62), caule ^lioso basi lannto, foliis praninis iufcine villosis, iufei oblongo-lanteolatis remote dtntalis , suramis ovatis atuypinatis seiuaiplexicaulibus, peduncuhs puheiulemis Of in lielgii nioitdiis prope 'Verviers li glaucum;Leji'un' fl spa 2 p. i U) exDumoifc

174. H PKIMUL^KOLIJUM (Viv. add. fallal fragm ^fl lib p 68^. scapo nudo 1-ocpbalo, foliis ovahbds obsolete denticulatis in ciassiu#pelioJum subdeeuirentibus, involueris cotollas subacquantibus. — in Saidim.i.

175. II. rdMONARiM (Smihengl. fl. 3 p. 362. et 111 Sow. engl l*ot. t a3o7^ canle lamoso panufoho sobdo, foliis lanoeolatis inciso-dentatis , capitnbs cym6sis. Of inScotiac nipestubus montanis. Hook, fl Lrit. 344.H. muioium/g Hook, scot. 1. ji*a3o.H.Halle1iH00k.fi. lond t n3 e\cl syn. AfAhe dicitui U.Hal-lerl et s.ixitili.

17G. H. REPAWDUM (Schrank akad. raunch plur 4, p. 3rg. t 16), caule crccfo paucifloio, foliis lepando-dentatis, ladicahbus elongatis obtfisis dcoisum .ut-tenualis, ihvoluu'n hysotis. If pair ign.

177 H RUBRICAUTE (Diimort fl bclg. piod 62), caule piloso simplici superne

Idioso, foliis sessilibus rordato ovatis acuminatis basi denratis \illosis, ramalibus mtegiis, capitulis lacemoso-corymbosis pilosuhs 2£ in collibns scbistosis Belgii H pienantboides Lejeun fl. spa ex Dutnort.

- 178 H. SCOLYRRI (Hook. fl. bor am. 1. p 298), seroso-pilosu, pilis longis 11-^gidis pdtentibus fibcesrenhbus, canle folioso pamcalato, paniculae araplae po "lycephala lanm erectis, folns lato-lanceolatis subcoriareib rfgidis acutis \ix denValis, ladualibns inpetiolam brevem attenaatis, cauhuis temotiusculis sessilibn^, Involucris fascescenti-pabeseentibas pnbe pilis longfnscuhs glandnlosis iuumixtj — Ad ostia fl Columbia et in Pensyham\ fcx pilis affine H echiodi et cuidain loneyl ineftitse spec. H longipilo
- 179 Q. H. SEKOTIMUM (Host fl. austr 1 p 4i9) canle eiecro sol id o tereti, fohip lanceolatis vel ovato lanceolatis dentatls aspens, capituhs corymbo&is, mvol squamis glabns bupia inediui leflexK If in niontanis sylvaUcis agn Vindobonensis.
- 180 H SONCHIFOLIUM (Bieb. fl. taui. 2 p. 25a), cauiebasi folioso ramoso sob /, cephalo, peduncalis tlongatis, folns runrinatis incanis, mvolucus toinentosis. Of in abiuptis subalpinis Caocasi orieutahs Facies H. glauci. Capitalnm magnt H Pilosellx.
181. H * SQUAMO~~CEM~~ (S. G Gmel itin 1 p. 9. ex Gmel sy&t 1179), folns radiocalibus pmnatis, catilibns sulcatis , ramis sqnamatis -^ in Sibiria. Species omniuo dubia foite excludeuda¹
182. H fciHicTUM (Ledeb fl alt 4 p i3?. ill fl. loss t 380), tennissime aiachnoideo-ldnugiuosnm, oau[e folioso stucto oligo-(i-6-)cephalo, fob is oblougis integciuiiii> vel*dentatis, caulinis angustioribns, pedancnbs squamatis, invol. nnfyiiciati bquamis liitenoihius extenoribus conformibus pa ram minoubus. If. in insuhs Knaiacisfl. Iscbnja et ad il Lena. Ginel sib 2 p. 30 n. 26 1.13 Proximeexcl. auct ad H staticirohunj accedit.
- 183 H SIRIGOSUM (Don tpns. linn soc 16 p. 175), pilosain, canle simpfici eiecto fistuloso, foliis Imean-Ian(eolatis acutis, radicalibns petiolatis, caulinis sessilibus, pamcula lacemos\% in Mexico Pappus dicitur biserMis.
184. H rtNUiFoiuM (Host fl austi. 2 p 4it), caule* piloso erecro oligoce pbalo, folns &fbdeutatis dorso pilosis, infeiioribus oblongis petiolatis remotis, supeuoribus ovatis sessilibus approximatis, involucio pubescente atict If, ^n Austria? sylvis montanis*
185. H TRI\SII (Cambessv ennm pi balear p 91), canleascendenteflexnoso snb-siinplici basi villoso medio glabriusclo apice lanato, folns retrorsum dentatis ciliatis doiso pilosls, ladicdibns spathulatis in petiolum attenuatis, caulinis aessibus ovato-oblongis, peuicol\ 5-8-cepal\ siiuphc, invol biseriali, ic-cep. villosoasco. — in fissuiis inpiuiu ins Majorca pi ope Espoila ad villain dom T'rias.
- 186 H. TMCHOCKPHALUM (Willd, enum sup pi p 55), caule oli^cephalo su-pfcinc villoso, foliis oblongo lanreolatis elongatis subdenticolatis glabeirimia , superiobnbus lessilibus, inylucio villoso^If patr ign.
187. H vnnucui\T<M*(Link enura h bei 2 p. 2S7), canle piloso veuuclato superne glanduloso, foliis subamplo\xiranbus oblongis acini* snblus praesei-tini longe*pilos\>, iuvol subtomentoso glanduloso *If patr ign. Affine dicitui H echiodi. An forte II. s.cabrnm Mitbx ut \ult SpiegeW
188. H. ZIAHUA[^] (lansch in flor\ 1828 eig 1 p. 62), stolombus DUIS, canle spaisifolio birfiuto, folns oblongo-lanceolatis stn'\^osis, coiyombo •snbc^uioso , imolucro oano-villoso % m saxo&is Palatinal\is. Ad sect Pilosellae

†† *Species exclusce.*

H. \TBIDT3M ViH. = Baikbausia albida

If. AIPESIRE Jacq. =Ciepis alpestris

- H. ALPZJTUBI Vill. = Leon tod on Alpinam.
 H. ALPINUM Willd. = Crepis Kitaibelii.
 H. ARVENSE Scop. = Sonchus arvensis.
 H. ASPLEHIOIDLS Breit. == Heloſtnthia asplenoidet*.
 H. AURICULEFOLIUM Willd.*e= Crepis Frœlichiana.
 H. AUSTRIACDM Roehl. = Crepis Austriaca.
 H. BLATTARIOIDES Linn. = Crepis blattarioides
 H. BULBOSUM Willd. == JEtheorhiza bulbosa.
 H. CAPIXACEUM All. = Scorzonera hirsuta.
 H. CHOKDRILLOIDES Jacq. = Crepis chondrilloMes.
 H. CHRYSANTHUM Ledeb. = Crepis chrysanthUa.
 H. COERULETJM Scop. = Maigedium Alpinum.
 H. COLUMNS Ten. = Crepis Columnae.
 H. coNYZIEForinM Gou. = Ciepis grandiflora &.
 H. CONYZOIDEDM Lam. =: Crepis grandiflora fit.
 H. DANUBIALK Roth. = Leontodon hastile.
 H. DICHOTOMUM Roxb. == MicrorhyHchos asplenifolius.
 H. FOENICULACEUM Wulf. = Crepis foenicolacea.
 U. FOETIDUM Willd. = Crepis foetida.
 H. FRUTICOSUM Willd. = Tolpis fraticosa.
 H. GLAUCDM Ascb. = Crepis beterogyna.
 H. GMELIWI Schreb. = Crepis Schreberi.
 H. GMELIWI linn. = Crepis Gmelini.
 H. GRANDIFLORUM Linn. =: Crepis grandiflora.
 H. HETERANIHUM Wall. = Micranchema bispida.
 H* Bi»piouM Don. = Micrauchenia bispida.
 H. HYOSERIDIFOHUM 'Vill. = Crepis hyoseridifolia.
 H. ITCANUM Linn. = Leontodon incanum.
 H. IWCANUM Poll. z=z Laontodon hiipidum.
 H. inqAHNATUM Wnlf, = Crepis incarnata.
 *H.\HTERMEDIUM Hfjp, == Willemetia apargioides.
 H. jAVANifiUMBurm. = Prenanthes Javanica.
 H. JUNCEUM Bernb. = Chondrilla juncea.
 H. KALMII Linn. = Pachylepis K^m^.
 H. LACTUCACEUM Schrank. = Ciepis prjBmorsa..
 H. LAMpsA^roiDES Goa. = CrepU laHqjsanoides.^
 H. LESSERTIANUM Wall. =; BAalgedinni Lc^ertianum.
 H. LEDCQAPPUML Pers. = Crepis grafl^flora y.
 H. LVRATCM Linn. = Crepis lyrata.
 H. MAUBJITIANUM Willd. = Crepis Manritiana.
 H. MOI^E Jacq. m/_> epis hieracioides.
 H. MON^AS|^ S O ^ = Crepis incarnata.
 H. MototiWJM Jacq. ^r Crepis mdntana.
 U^OLERACSUBI Scop. = Sonchus ciliatns.
 H. PANNONI^CUM Jacq, = Crepi# rigida.
 H. PAPOLE'UCUM Vill. r= Crepis grandiflora y.
 H. PARVIFLORUM Schleich; = Crepis Froelichiaoi

- H. piLo&uai Willd. =: *Pieris Pyrenaica*.
 T. PIBINATIFIDUM Willd. = *Crepis pinnatifida*.
 I. PRJCMORSUM Linn. = *Crepis praraorsa*.
 ty. TRUNEIXEFOLIUM Goi. = *Crepis pygmaea*.
 H.%dLCHRUM Froel. rr *Crepis pnlchra*.
 7^ %TMILUM Ten. = *Crepis Columnar*.
 II. FURPUKEUM Willd. = *Intybellia purpurea*.
 H. PYGMEDM Lam. zr *Crepis pygmaea*.
 H. PTRENAICUM Roch. = *Crepis blattarioides*.
 H. RH^ADIFOLIUM Fisch. = *BarWiansia rhaeadifolia*.
 II. SANCTUM Linn. 3 Pterotheca JN[einausensis].
 II. SIBIRICUM Willd. =: *Crepis Sibirica*.
 H. SIMPLEX VJ\.. = G re pis M* pi ex.
 H. srmvLosux Spreng. = *Sonchus arvensis*.
 H. SPRENGERIANUM Lion. = *Picris panciilora*.
 H. STIPITATTTM Jacq. = *Willemelia apargioides*.
 H. STOLONIFERUM "Viv. == JEtheorhlza Bulbosa.
 H. stificIDM Ledeb. r= *CiepisJtangei*.
 H. STDPPEUM Reich. == *Crepis hetcrogyna*.
 H. SUCCIS^FOLTUM All. = ^repis succissfolia.
 H. TARAXACI Linn. = *Apargla T^axaci*.
 II. THOMASINII HO^.. = *Crepis heterogyna*.
 Jf. TINGITAMHH Salzrn.= *Barkhausia Tingitana*.
 II. TUBEROSUM 1)fllb.= *Leoniodon tuberos'nm*.
 H. VAMEGATUM Lam. = *Leontodon variegatam*.
 II. 'VILLRsrr Vill."== *Leontodon Tillarsii*.
 II. ULIGINOSUM Tarcz. = *Crepis Bungei*.

JDCCCXL. ITABALUS Cass. diet. 34 (i8a5)./>. 94. 69./?. 590. Hook.fl. bor. d^m.
 +. P>2&~ Harpalyce Don new edinb. phil. journ. 1829. et in linnced 1830.
 litt.p. 140 non DC. i<25. — Esopon Raf.fl. lud. 1817.jp. '46. — Prenanthis
 j, p. Linn.

Capit. 5-20-florum. In vol. 8-io-phylum^ squamis accessoriis calyculaturn. Recept.'nudum. Styli extrà antherarum vaginam longè exscerti. ^cha^lfe ipblonga subcylindracie^ulcata glabra apice truncata. Pa^pus'Dluriserialis, setis rigidulis (VagiH)>us colonilis scabris. — Herbae erectaj iky^aliM.meriCapB ^rennes. Folia radic. et caulina saepius diversj. Gajifilla racemosa aut paniculau^f nutahtia. Cor. albae ftrpure® suit ocbroleucae. Radices saepè tuUerosae gustu ainarae. — Species dicuntur polyfcorybae nee salis ritè distinc|a3. — Women omoino seasus»expçrs forte jmutaiidum.

* *Foftis pahnato-seu trifidè lobatis*.

1. N. SERPEWTARIUS (Hook. fl. boi\ am. 1. p. 294), foliis denflKis aiferfs Vadicalibns palmato-sinuwlis, canlinis longè petiolatis binuato pinnatilidis sul>llobi% lolw intermedio tripartito, bnimis lanceolatii, racemis tēVminalibus Aubpauiculatis brevibusnulantihs, invol. 8-phyllis i^>florls. 9f in, montibtf "Virginia, Carolina; (Parsh.), Pensylvaniac (Dooel.), Novebo/ace (Beck.).Marylandiae (Bart.), in Canada et tdlacum Hudson (Hook.). Prenanthes serpenaria Pursh 11. bor. am. 2. p. 499- t. i4- Harpalyce serpentaria Don 1. c. Beck Not. p. 167. Cor. pallide pnrpuica:. Pra*stan» specificum ad versus mor.sns bcrpcnlniu ex Pursh.

- £. *Icvis*, caule foliisque laevibus glabris. *If* in Terrâ-Novâ legit cl. Lnpyliae. Capitula pan 16 breviora quâmin ic. Pursh. Pappus slrauiineus. (v. s.)
2. N. ALTISSIMUS (Hook. fl. bor. am. i. p. 294), caule erecto ramoso glabro, foliis trilobis petiolatis angulatis deuticulatis murgine scabris, racemis axillaribus in pauiculam laxam dispositis, invol. cylindricis 5-phylis 5-flois. *If* in montibus Carolina3 (Ell.), in sylvis umbrosis à Canada ad Virginiam (Pursh), in Terrâ-Nova (Hook). Preuanthes allissina Linn. sp. n. a. Willd. sp. 3. p. 1537-Ell. sketch 2. p. a56. Harpalycce altissima Beck bot. p. 167. Chondrilla altissima Lam. diet. 2. p. 78. — Pluk. aim. t. 317. f. a. Florcs flavi. Caulis 4-8-pedalis.
3. N. TRILODATUS (Cass. diet. 34. p. 96), glaber, caule erecto ramoso tereti, foliis infer, ptiolatis tripartitis in petioluui decurrentibus, lobis ovatis acutis medio utrinque lateralibus aculè lobulatis, suinun's ovali-oblongis.basi subatenuatis integerrimis, racemis confertis in pauiculam brevem digestis, invol. cylindrico S-phyllo 10-1 i-floro glaberriino. *If* in Amer. bor. Olim cultam in hort. Pitcairn. legit cl. L'Heritier. Pappus stramiaeus. Cor. albidae. Radix ramosa nee tuberosa. Herba pedalis. Folia sublùs pallida. (v. s.)
4. N. FRASERI, caule erecto ramoso sparsè pubescente, foliis caulinis trifidis deuticulatis subciliatis in petioluui decurrentibus, infer, cordatis, super, basi cu-neatis, supremis oblongis iuciso-dentatis, racemis confertis in paniculam dispositis, invol. cylindricis 8-phylis sparsè puberuiis 8-floris. % iu Carolina meiidionali olim legit cl. Fras. Prenanthes alba Ell. sketch 2. p. 259 nou Linn.? nee Sims nee Salisb. Pren. rubicunda Willd. sp. 3. p. 1537? Nab. trifolialus Cass. diet. 34. p. 95? Pappus straminens nee ut in N. suavi rufus. Flores ochroleuco-albi. Radix ex Mil. tuberosa a marissima, unde Fel terras (*Gall of earth* angl.) dicitur. (v. s. sinerad.)
5. N. NANUS, glaber, caule erecto tereti simplici, foliis radic. canlinis petiolatis triparlitis, lobis lanceoiatis acuminatis subintegerrimis, paniculâ contractâ rache moša, iuvol. cylindricis 8-phylis 10-1 2-flois, squamis apice ciliatis. *If* in Amer. bor. montibus albis(Big. Torr.). Prenanthes alba y0 nana Big. fl. host, ed. 2. p. 286. P. nana Tor. in litt. 1824. Harpalycce alba , Beck. bot. p. 167. Iferba tt-pollic. Folia ex Big. forma varia. Pappus strumieus longit. involucri aequalis. Calyculi squamae breves acuta?. (v. s. comm. à cl. Torrey.)

** *Foliis dentatis angulatis pinnatifidisve.*

6. N. GLAUCU9, caule ramoso stria to glauco, foliis sinuato-pinnatilidis obtuse dentalis glaucis suprà scabris, foliolis calyculi filiformibus. — in Louisiana. Prenanthes glauca Raf. fl. lud. 57. Ksopon glaucum Raf. fl. lud. 149. *Chicoree tisuelle* Rob. louis. p. 424. Aflinis dicilur N. serpentario, sed flores flavi. Invol. polyphyllum. |*
7. N. SUAVIS, glaber, caule tereti striato ramoso, foliis acutè angulatis snbhastatis inptiolum alteualis, racemis brevibus in paniculam dispositis, capitulis nn-tantibus, invol. cylindricis 8-phylis coloratis laevibus 8-10-flois. *If* in, l. o. is siccis Carolina; (Kll.), Novae-Angliae (Pluk.), Virginias (Clayt.). Prenanthes alba Linn. sp. 11211* Sims bot. mag. t. 1079. Ell. sketch a. p. 25Q QON BiTT nee Ell. Pienanthessiavis Salisb. par. t. 85. opt. Chondrilla alba Lam. diet. 2. p. 79. Nab. albus Hook. fl. bor. am. i.p. 294. Raini et invol. rubeutia. Cor*. albae. Acbaenia flava. Pappus cinnamomeus. (v. s.)
8. N. ALATUS (Hook. fl. bor. am. I. p. 294. t. 102), caule simplici erecto glabro, foliis longè petiolatis dt-ltoideisacutissimis sinuato-dentatis, petiolis alatis pauiculâ laxâ parvâ, capitulis nutantibus, foliis supremis pedicellis involucris que pubescenti-hirsntis. (J, ad Fort-Vancouver et in insula Observatory in America; boreali-occideutalis littore. Flores albi? utiu N. suavi cui valde affinis.
9. N. BOOTH, caale erecto simplici apicc pdicellisque subbirsutis, foliis glabris j'integrinscnlia, radicalihs petiolatis obtusis cordatis, inediis cordato-lanceolaiiñ » petioluu attenuatis^uuimisliliarei-lanceolatis acumicatis, ruceino tenuinali

simplici, capitnli 8-xo-flori squamis 8 apice ciliatis, caeterùm glaberrimis. *IL* in Amer. bor. montibus albis, suprà sylvium legionem srat New Hampshiře legit cl. Doot! Hei ba semi-pedalis Cor. palluLe. Pappus stiamineus. An var. N. nani? (v. s comm à cl. in\.)

10. N. CORDATUS (Hook fl. boi. am. i. p. 294), glaber, caule eluto rubicundo apice laxe paniculalo, folii*. infei. petiolatis coidatis dentatis, mt'diis bieviter petioluis lanceolatis sinuato-denlatis, summis subsessilibus integermim, raceims 4-5-ceph.ilis ad apices raraeum nulantibus, invol. cyhndncis 8-phyllis 8-io-flous % in Aiae. bor. , in Canada (Hook.), cuca' Bo<=tou (Big.), in Noveboraco et "Vnginia(Pursh), in Caiolinae raontanis (Ell) Pienanibes alba Big I m htr. 1817. (sed vixfl. host, desc. lespondit) Pienanthescoidaia Willd. bort. ber. t. a5 Ell. sketch 2. p. 257. Puishfl. 2. p. 499 Coi. pallideochioleucae. (v. s.)"
11. N. DELTOIDEUS, canle simplioi glabio, foliis longe petiolatis deltoideis acutriauatis acute denticnlalis glabus subtus subglaucis, race in is axillaribus oligorpphalit, m\ol. 5-phyllis 5-flois. *If*, in Amer. bor ad inontes Saluda. Pre-nantbes deltoidea Ell sketch 2. p 257 non Bieb Cor. puipureac?
12. N. CREPiDiMEUS.canle anglnato ramoso, fohisovato-lanceolatis in petiolom attenuatis inxqunhetei anglnato-dentaiisglabris, panicuiae fasciculis oligocepib ilis nutanhbus, nnol. hispidis io-[2-phyllis snb-20 floris. % in agio Illinoensim et excelsis montib's Carolina? (Michz), in Kentucky (Raf.^r) Prenanthes crepidinea Muhx. fl. boi am 2 p 84 Pursh fl 2. p'499 Prenanthes gigantea Raf.' in hit i^Ji Hieranmu cropidineum Ficel. mss Cor. flaviria? Pappus stramineus. |n Pr. trepidinea til. sketch 2 p. 269, de qua dicitur invol. glabiiusculuui, omniuo eadem? {v s. conatn acr Raf.)

*** *Foliis subintegermis.*

13. N. VIRGATUS, glaber f caale simplissimo , foliis angastè lanceolatis, infer, si-nnatis dentatisve, snper. integeinmis, racenio teiniinali subsiinplici, capitnlis 1-3 lasciculatis pedicellitis 8-10 flois, invol. laevi 8-phyllo. % m plnetis humidis Caroliia» (Mich. Fias ! Bo^c'), et Cieoigi* (HI) Prenanthe vireata Michx. fl. 2 p 8^ Pien. viigata et P. simplex Puish fl. 2. p. 498. Ell. sketchn. a. p. 2*8. Haipalyce virgala Beck hot. p. 167. Prenanthes auturanalis Walt, et Sonchus virgatusDe*f ex Steud. Cor. pallidepuipureae. Pappus straminens. (v. s.)
14. N. INTEGRIFOLIUS ^Cass. diet. 34. p. 96), glaber, foliis caulinis ellipticis acentis integrilis aut subdeniculalis in petiolum bievem atteuuatis, lacemis breibns in paniculamcoaictatam dispo->ilis, invol. cylindncis 8-phyllis 8-io-floris. *IL* in Araer. boi. An Prenanthes alba quoiumdain, ohm culta in hoit Pans.? Pappus pa Hide rufescens. (v. s c.)
15. N. RACEMOSUS (Hook. fl. boi am. i. p. 994), glaber, caole siraphci, foliis omnibus indivisis laevibus, radicahbus ovato-lanceolatis, caulinis semiamplexi-caulibns, tacemis lateralibus fasciculatis in panitulatn lacemifoiinem diapositis, invol hirsutissimo 8-phyllo 9-12-floro. % in Canadà boieali. Pienanthes lace-mosa Michx. fl. boi. am. 2. p 84 non Roxb. Haipalyce racemosa Beck bot. 168 Pappus stramineus. (v. s.)
16. N. ILINOENSXS, caule si m pi id folusqne asperriims, foliis omnibns indivisis ovali-lanceolilis, lacemo elongato hirsnto, fasciculis capitulorum subsessilibus erecis 7f in pratis regionis Illinoensim. Pienanthes aspera Michx. fl. bor. am. 2. p. 8i uon Schiad. Pien. Illinoensis Peis. enh. n. 14. Puish fl 2. p. 200. Chondiilla Illinoensis Poir. suppl. 2. p. 331.

DCCCXLI. RE A Berteroherb i83o! Decaisne in Gitill arch bot. 1. p. 509.—
Dendioseiis Donphd. mag. 18^2. apr. ex Hook, et Arn.comp. 1 p. 32.

Capitulum multiflorum. Invol. imbricatum. Recept. concavum sen plauum, epaleaceum, alveolatum, maigiubus subfimbriifcris. Achaeuia

basi et apice emarginata , compressa vel saepiis trigona, angulis alatis. Pappus sessilis plunserLilis rigidulus sordescens, setis maequalibus scabndis.— Arboies insulae Juan-Femandez incolae, 10-20-pedales, ramosde, ferè omues glabiae, ligno duro, cortice lpevi. Folia formâ et divisuns in vanis imò saepè 111 nsdeni speciebus vana. Capitula in paniculas terminales saepè divai icatas disposiia. Corolla? alba; raiiis croceo-fulvse. Habitus Sonchoruin fiutescenium, sed ex recepl. fimbrilbferoetpappo rigidulo potiisad Andryalam, invito babitu , accedere videtur.

1. R. MACRANTHA (Bert! heib Decaisne ' aich. hot. 1. p. 5i4. t. q. f A. et t. 10. f. 1) , foliis petiolatis oblongis giosse denlatis obtusis basi rotundatis cordatis\ e, suminis auriculato-amplexicaulibiis integnnniis, panicula laxa divaricata, 111-vol. squamis exteiouibus ovatis, inter, oblongo-lmeaiibus. J m -ylvis umbiosis higidis montium editoiumius Juan-Feinandez legit cl Bertero et in Massa fueia Cnining Dendiosens macrophylla Dou 1 c. Hook, et Am. 1. c. aibuscula 8-i5 ped Folia 6-14 poll longa, petiolo 3-4 poll, Invol campanulatum Recept. coucavum fiinbnllifeiuni. Cor. cioceo-fulvae (v. s. comm. à cl inv)
2. R BERTERIANA (Decaisne ! arcb. bor. 1. p. 5x5. t. 9. f. B et 10. f 1) , foliis petiolalis, ahis coidatij. subiotundls, aliis pinnatisectib , lobis ovaljb oblongisve lateralibus indivisis, teiniinali trilobo, pamculâ thyisoideâ, invol. squaiuis ester, snbtotando-ovatis , intei. oblongis obtusis. ty in sylvis fugidis uiontiurn editioium ins Juan-Fernandez loco dicto LI Yunque legit cl. Beitero R. pinna te var. Beit ' bcrb. Oeudiosetis Berteiaua Hook, et Am. 1. c. Recept. glabeiimum. Cor albae.
3. R PINNATA (C. Gay! herb. Decaisne! arch bot. 1. p. 5ib. t. 9. f. a. etB. t. 10. f. i) , foliis petiolatis pinnatisectis, segmeutis 9-10 pleisque biparltis lauceo-lato-linearibns terminal! 3-5 lobo, sumiuis pinnatifidis, panicula laxa, invol. sqnamis ester lmeaii-lancfolatis, inter, linearibus subacutis.^ in fnticosis j)e-trosis montium in> Juan-Feinander leger. cl Berleio et C. Gay Dendrosens pinnata Hook, et Am 1 c Recept. fimbniliferum. Cor. alba Pappus pallescens. (v s. comm. à cl Gay)
4. R> NERCIFOLIA (Decaisne'arcb bot x. p. 5i 7), foliis lineal i-lanoeolatis integrumis obtusiuscubs in petiolum attenaatis, sumiuis sessibus, panicula subcoymbosâ, invol. squamis lanreolatis apice cano-villosis. ^ in convalle El Pangal ins. Juan-Fernandez legit cl Beriero' Rea leucantba Bertero' herb. Dendrosens nerifoba Hook, et Am. 1. c Recept. nudiasculam. C01. albse (v. s. comm. à cl. inv.)
5. R.MICRANTHA (Beiteio'herb Decaisne arch bot 1. p. 5i8 t. 9. f. 1. et D. 1. 10 f. 4) folii* oblongis lanceolatis\ e aculis subintegrmnis , mine in petiolum attenuatis, nunc aunculato-amplexKaulibus, panimlâ laniosissiuia Uxu, bracteis ovatischavasdeciduis, capitnlisbievissime pcditeUatis, iuvol squamis' oblongis obtusis ,5 in sylvis collium el montium locis umbiosis lupestnbus ins. Juan-Fernandez legei.cl Bertero et C. Gay. Dendrosens micianinha Hook et Am. 1. c. Recept. nudum. C01. albas Pappus albidus. ^ v. s. comm. à cl. in_v.)

+ *Species minus no tee.*

6. R. MARGINATA (Bert, ex Decaisne arch bot. 1. p. 519), fols rotundo-ovatis oblongisve obtusis cordatis chaitaceis subtus glaucescentibus breviter petiolatis pelioba limbo deem rente marginalia purpureo-naacnatis dilatato-dmplexi- taulibus. Jj in fruticetis rupestnbus montmin editiorum ins Juan-Fernandez loco dicto I 1 Poitezuelo Dendioseiis maiginata Hook, et Am. 1. c Flor. et fruct ipn. |.
- 7- R MOLLIS (Bert, ex Decaisne arch. bot. 1. p. 519), foliis subincauo-velutinis ovahbus rotundatis brevitei acuminatis peiiolalis, petiobs teietibus. ^ cnin]»ioie. Dendiosens mollis. Hook, et Am. 1. c. Hoi. et fiact. ign. f-

DCCCXLH. ANDRYALA Linn. gen. n. o.i5. DC.fl.fr. ed. 3. v. A. p. 56. — Eriophorns VaiU. act. acad. par. 1721. — Forneuin Adans.fam. i.p. n.a.— Audryala et Voigtia Roth in Ust. mag. 9. p. 17. — Andryala et Rothia Schreh. gen. n. |It|0 et ii|i, Willd. sp. 3. p. 16n. Cass. diet. 25. ??. 64, 66. p. 3i i. Less. sjrn. p. 141.

Capitulum multiflorum. Invol. campanulatum, squamis numerosis linearibus i-serialibus, nonnullis exterioribus accessoriis. Recept. alveolatum, alveolis fimbriifcris in setas productis, interdiim in amplitu paleaceum. Aclaeuia obovato-oblonga 10-striata erostria. Pappus pilosus scaber facile decidiuus i-serialis rigidulus. — Herbae pleracque australi-Europxae biennes aut perennes, tomento brevi stellato-velutino et pilis apice glauculososis praesertim in paribus superioribus donalaj. Capitula flava saepiis corymbosa.

Sect. 1. EUANDRYALA. —Andryala Roth. Schreb* Less. Cass.

Recept. ebracteolatom. Achaenia omnia pappigera.

1. A. AGARDDII (Hansel, herb, ex Boiss.! pi. exs.)], cespitosa humilis basi sufruticosa raulliceps, foliis radicalibus petiolatis ellipticis inlegerrimis utrinque tornento conferto brevi canis, canlibas simplicibas i-cephalis folia i-3 linearia sc^ilia gerentibus tomento sis snerne et iuvolucro pilis nigris glandulososis hispidis. % in suumis Sierra Tejeda freqaens, et in Sierra Nevada Hisp. Granat. rara. Species distinctissima. Caules 4-pollicares foliis duplo longiores. (v. s. conun- à cl. Boiss.)
2. A. RAGUSINA (Linn. sp. 1136), tota tomento brevi velutino confprlo incanesceas seu rufe\$£ens, caulis erectis aut subdiffusis ramosissimis, foliis infer, lyrato-pinnatiidis, mediis acutè dentatis, summis inlegerrimis, capitulis longè pecUcellatis laxissimè corymboso-paniculatis, iuvol. squamis linearisbulatis dorso convexis. If. in agio Ragusino (Herra.), in insulis Arcipelagi (Liuii).- Heriu. lugd. 6. p. 673. ic. Mill. icon. 97. t. 146. f. 2. (v. s. c.)
??. *lyrata*, foliis infer, obtusè lyrato-piumatifidis, caulinis obtusiusculè dentatis. If in areuosis secùs fluminum ripas agri Narbonensis et Rnscinensis. An dr. *lyrata* Pourr.! act. toul. 3. p. 308. DC. fl. fr. suppl. p. 445. lie nth. cat. p. 60. Andr. lacuiata Lam. diet. i. p. i53. Rothia argentea Lapeyr. abr. 485. — Clus. hist. a. p. 143. ic. Lob. ic. a3t. f. 2. Achaenia nt in ct et y omnia papposa. Recept. omnino epaleaceum. (v. v. et s. sp.)
y. *incana*, foliis infer, dentatis, caulinis ferè omnibus integeriimis acutissimis, capitulis minoribus. If in valle Pyrenaeæ Gistain. Crepis incana Lapeyr. ! abr. 483. Andr. incana DC. fl. fr. suppl. p. 445. (v. s.)
y. *ramosissima* (Boiss.! ined.), foliis inferioribus acutè semipinnatifidis, caulinis infer, dentatis, super, inlegem'rois, caule ramosissimo. If in collibus siccis et calcaveis maritimis regni Granatensis usque ad 5000 ped. alril. legit cl. lloissier. (v. s.)
3. A. MACROCF-PHAJA (Boiss. ined.), tota tomento denso albido cana eglandulosa, caule ereclo apice ramoso-subcoryniboso, foliis oblongis subacuminatis basi cuneatis et lobis paucis aoutis semipinnaliidis, invol. tonentoso i-seriali aut bracteolis i-3 stipato. If ad torrentes littorales regni Granatensis legit cl. E. Boissier. Capitula diain. pollicari, aempè duplo quâui ia aliis speciebus ampla. (v. s. coinra. à cl. inv.)
4. A. PINNATIFXDA (Ait. kew. 3. p. 129. excL vav. A), tola pnbe brevi molli confertis tomentosa, invol. piles nigros rigidos plus minus confertos gerente caule erecto rainoso, foliis caulinis seniumplexicaulibns variè pinnatifidis iuciso-dentalisve, lobis dentibnsve obtusis. (2) in rupestribus cl aridis ins. Tenoriffje. A. piumatilida et verisim. coronopifolia et cheiranihofolia Link in Buch cañ. Variat tomento denso et parciori, foliis oblongis aut elongatis,

dentatib aut \ane pinn.itiiidib, lobis dentibusve ob?nsi>,, jiwl num* loto uiguj, pihb ubsito IIURC glabnu&ciilo fiecept. paleis* ouiuiuò clestilutum (v. a. sp et v. c.)

5. A IUGRICANS (Poii voy. I. p 228. Desf.! fl. all 2. p. J36), inferno subglbiat.1, apite pnbe brew [subtomentosa et pilis glandulosis hi spel a, foliis infer, pinnatifidis lyrahsve lobis lineaai-lauceolatis suhintegns, buper. lineaibus sebsilibusintegriimib, cipit toufeite coiyomboMs, invol pilis nigncantibus apice glaudulusis con/eiie hispidis. (2,' in Kaibaua piopè Lacalle A. coiyubosa Biot. fl lus.? ex Sieud. Affinis ea. involucio A pinuatalidic, sed foliis facile differt (v. s)

6. A. DRNTATA (Sibih. fl. gr<>jc. t. 8 n. med ex piodi. 2. p. i40), pobe niolli bie|i (junuu¹) toiuentoba, pilis nigus rigidis egl.mdiiloMs secua pedicel I os tt iuvolucia bispula , cauJe eietlo ramoso , folns caubui& clongalib plerisque piu-Datilidis, capitulis paicis \ix rojymbo&is. (2) in in^ula Milo legit Sibihorp, et beiuina ad d. L'Heut. iuisit. Specimen ineum cum lus est glabiinsLulam , seel pilis mvol. et pedic. rigidib nigus a caeteus diffeit, bed cum A nigritanle ultinus coiupaiandum. (v. s.)

7. A. TENUirouA, pnbe bievi molli plus minus canescens, foliis lanceolatu, snb-denlatis acuminatis, capitulis laceinoso-coiymbosis, IDVOI. piaeler pubein molletn pilos apice mgro-glandnlosos geiente, achaeniis stuatib. (f) in aivis Siciliac piope Panoinium. (lin. Guss'), in arenosis malilinns utei AgoMu et Syiacnsam (Sphtb.¹). Rotbia tenuifolia Tineo cat. b. paicioim 1807. p. 280. Yanat caule tuiico erecto aut plurinib adacentibab, pube parcion ant sub-tomentoså. (v. s)

/6 *lyrata* (Gnss ' in lilt.), folii*. lyato-pinnalifidis supiemijique pilis glanduliferisluspidis, capitulis laxe laremoMs majoribas (T) in Insula L'antellaria An spec, forte distingnenda^p (v. b.)

y *arenaria*, densius tomentoso canescens ad apicem pilis longis glaudulosis subbispidi, caule erecto, capitulis paucis. (T) in arenis manutinis circà Gibiitaram legit el Borsig. Capitula minora quam var. 8. (v. s. comm. à cl. inv.)

Sect. 11. VOICTIA Roth in Rcem. et Ust. mag. 9. p. 17. non Spreng.
— Rolhia Schrcb. gen. n. |2^i, non Pers. nee Lam.

Recept. maigine paleaceuin, paleis imolucio brevionbus 6iibbyabnib — Acbaeuia radii a plurium diruniur calva , bed papposa semper VUL loile ob pappmn deciduum acbaenirt visa fuerant nuda. I'oite inteiduinreveitao paleaium picbsioneiu calva?

8. A. RoiiHA (Pers encb. a p 3^8 n 6), pube molli tomentosa , ad ajnceni sumiiuin pilos glandulosob intermixtos geicns , caule basi lainoso diffuso , folus ovato lanceolalis bubinle^enimis amplexi<anbbus, capituli* coiyombo&is. (| in Ilippania (Roth.). T/oigtia tomentoba Rolb in Art. mag. 10. "p. 17. Rotbia andiyaloules Roth cat. bot i.p. 104 Ga;itu.*i a. p. 37i t. 174. WilUl. *p i p. 1611 Achaenia ladii ill disci pappoba intense btuata. Palte in ambituiecept. 2-3-ber. paiva ex GaJiln. (v. b c.)

9. A. VARIA (Lowe' in lilt 18ia), pube molli plus minus tomentosa, pilis apiee glandulosib secus canlein et in folns biiminis cl mvoluciib intermixhs, <aule erecto apice tamoso, foliib elongalis, ladicabbussaepms sinnalib, caulinib semi-.iiuplevicauhbui. sessilibasve, capitulis coiyomboso^paniculatis 7/ inMadeia Recej)t paleae 2-3-scales in .unbitu lecept. hyalin* acnnjiuatae Achaenia itriaU omnia papposa huadente cl Lowe hue ^al. seqq. collegi'

et *candidissuna*, tota tomenlo conleilo incaua, pihb glandulosis ill caule involuensque numeiosis, iob's >>cniiamplexicauhbus lalo-lanceolatis integrerimis. — patr. ign. Andr. candidjbbima Desf ' cat h. pai ed. 3. p. 399. Cass. diet 40. p. 312. (v. v. et s.)

£ *angusufoha*, tola tomenlo confeito incana, pili> glauduloi* uiiauU,

foliis et invol. numerosis, foliis sessilis lanceolato-lineanbus dense tomenlosis. — patr. ign. Sub nom Andr. Ragusinae in hortis vagdl. (v. v. et a.)

y. *subglabrata*, inferne pubescens, apice aecus ldmos floidos et invol. subtoraentosa pilisqae glanduloiis hispidi, foliis lueaii-sublanceolatis pie-risque submtegenimis snbmeinbranaceis sessilibus, coiyombo paniculato laxo.— in rupibus suburobiosis convallium Mddeu ad dlt. aooo-5ooo ped ubique vulgatissima Andrydla v.ina, var *et Lowe** in litt (l &)

\$. *apnca*, inferne pube brevissiraa pdica pubescens, supeme tomentosa ct pilis glandulosis hispida, foliis Hnean lanceoldtis membianaceis, omnibus submtegeiiinis, supenoribus vix subaiuplexicaulibus.— In convallibus Mdderde ad allit. 3ooo ad 5ooo ped locis mpestribus apricis siccis. A. \ana var *a. subvai. a. Lowe'* in litt. (v 5)

f. *cheiranthifoha*, tota pube brevi confcitissime tomentosa, secùs caulen ramos et invol pilis glandulosis bispida, fob is late oblongis, infer sinuat is obtuse subruncinatisve, super mtegns.— ex Madeiae seminibus in hortis culta. Audi, clieianthifolia L'Hei ' stiip. 35 f 18. Ait kew 5. p nq. Willd sp 3 p. 1609 Sthkuhi bandb. t 119. A glandulosa Laiu diet. 1. p. i54? Andr tomentosa Scop, insub. 2. p. i54. t. 6? (v. s ex L'Her h)

I.' *cruhmifoha*, foliis tomentosis pinnatipartitis, lobis lineaibus elongatia. @ in Madeiae lupibus mautimis valde aiidis. A. valid vai Lowe in litt. A. ciithmifolia Ait kew. 3 p. 129 —Forte etiam A. pmnatiildea vai. Madeiensis buc etiani referenda ?

IO. A. SIKUATA (Linn sp. 1137), infernè glabiata, snperne pube inolh velutma subtomentosa, pilis glatidulosis III pedicelhs et in>ol comiuixtis, caulin errectis paice ramosis apice corymbosis, foliis inferioribus et mediis pinnalipaititis lobis hnearibus subiutegeimuis, bum III is lineaibus indivisis f2) IQ Gallic austrabs colliais DC 11. fi. ed 3. n. 29J9. exd syn. Pouir Rötbia cbcranthifolia Koth cat. bot. 1. p. io5. Willd. sp 3. p 1611 Andi. paiviflora li Lam. fl (r 2. p 117. — Clus bist 1 p. 14^. IMh pedicellorum et in\ol, parcissimi Nomen denpieus potms pinnatiida quam sinuata dicenda. (v. s)

jg. *intermedia*, tonaento paitii, plantx snpei. copiosiore, pilis glandulosis numeinsis. — Cucà Meld as legit cl. Piost. Fere media intei. var. *a. et A. integufoham*. (v. s.)

IX. A. 1STEGRIFOLIA (Linn 8p. xi36), tota pube rnolli velufina plus minùscanescenti-tomeutod , pilis in pedicellis et invol longionbus glandulohis intermixtis, caule ereoto apice coiyinboso, foliis infer oblongis integris deutatia snbrununatisve, super, mtegns basi semidinplexicaulibus. (2^ in arvis agns ruderatis, aienosis et stenibus Euiopse anstialis et mediae occidentalis. DC. fl fi. li. p 3b A, parvifloia vai a Lam. fl fr a. p. 117. Rothia runcinata Roth cat. bot. z. p io5 Willd. sp 3. p. 1611.

ct. *vulgaris*, foliis infer integerrimis aut dentatis, caule apice corytnboso — Yulgaris in reg. Meditenaneis et mediis Europae Andryala lanata "Vill. dauph. 3. p 65 —Dalech Ing 1116 f 2. (v *)

k. *undufata*, foliis omnibus subinregenimit lanceolafis nnulatis, capitulis racemoso-coiybosis,—In biulid. Andr. andulala Presl del. prag. p. iii. Cap. panph ed. Bon. t ia6 (v s)

y. *angustifoha*, foliis omnibus snbinteperiimis linearibns ant angastissimè lanceoldtis — in Sardinia, Arragonia, Gallia, etc., etc. A. mollis Asso' mant. fl air n 1126. (v. s)

^ *diffusa*, caole a' collo iamo<jsirao brevi diffuso. foliis linearibns, c.ipi-tuhs longe pedicpllatii. —in Sialia (Jan'), Corsicâ (Soleir'). Andi. diffusa Jan ' pi. exs (v. s.)

12. A. IAXIFLORA , pube niolli bievi tomentosa et pills apice glandulosis numerosis & ramos et invol. bispida, foliis sessilibus oblongo-lanceolatis subintegerrimis acuminatis, canle basi simplici apice corymboso, invol srjuainis

molliter villoso-lanuginosus. (I) in Mauritaniam circa Tanger legit cl. Salzmann et circa Malagam cl. Boissier. Rothia laxiflora Salzm. pl. exs. 1825. Radix exilis. Capit. majora quam A. integrifoliae. (v. s.)

•j- *Species exclusa%*

- A. CHONDRILLOIDES Scop. = *Crepis chondrilloides*.
- A. LANATA Linn. = *Hieracium tomenlosuin*.
- A. LANATA Habl. = *Leontodon biscutellaefolium*.
- A. NEMAUSEKSIS 'Vill. = *Pterotheca Nemausensis*.
- A. NUDICAULIS Lam. = *Pterotheca Nemausensis*.
- A. POXTANA Vill. = *Hieiacum montanum*.

DCCCXLIII. DUBYAiA.

Capitulum multiflorum. Invol. campanulatum imbricatum. Recept. epaleaceum. Achaenia piano-com pressa striata in collum crassum breve producta. Pappus pluriserialis pilosus albus. — Herbae habitu Sonchi aut Hieracii ant ferè Mulgedii, erectae subramosae. Folia indi-visa dentalia. Capitula pauca subcorymbosa. Invol. extis hispida aut aculeolata. Cor. flavae. — Dixi in bonorem cl. J. E. Duby qui de Bolanicâ Gallicâ et de Algarum historiâ beuè meruit et inonographiam Primula-cearum Prodromo nostro destinalam diligenter parat.

Sect. 1. HIERACIDIUM. — *Hieracii sp. JVall*

In vol. squamaB adpressae. Achaenia margine nou tuberculata.

- x. D. CRISTULATA, glabra, foliis sessilibus oblongis acutè sinuato-deutatis, sumrois subamplexicaulibus, invol. squamis exter. ad carinato-aculeato-cristatis, caeferis giaberrimis. — in Novae-Hollandiae orâ meridionali legerunt Botanici navip. liandinianae. Habitus Sonchi, sed achaenium rostra turn. Pappus albus muhiserialis minus mollis quam Sonchi. Ligulae exteriore snbtus purpli- ra seen tes. Folia 3 poll, louga, 6-8 lin. lala. (v. s. comm. à raus. reg. par.)
- a. p. HISVIDA, caule raraisque pilis fuscis hispidissimis, foliis hispidulis dentatis amplexicaulibus, inferioreibus ovato-cordatis in petiolin late marginatum decurrentibus, sumuiis sessilibns, invol. hispitissimo. % in montibus Iudiac orient. Himalaya et Karoan legit cl. Wallich. *Hieracium hispidum* Don prod, fl. nep. i65. non Forsk. *Hier. heteranthum* Wall. cat. com p. n. 363. (v. s. comm. abhon. cur. mere. angl. Ind. or.)

Sect. ii. SONCHIDIUM. — *Lasiopus D. Don in brit. fl. gard, scr. 2, t. 346 (1836) non Cass. (1817).*

Invol. squama? squarrosoae. Achaenia margine tuberculato-scabra.

- 3. D. SOHCHOIDEA, acaulis, foliis radicalibus patulis oblongis subruncinatis spinulo-so-dentatis glabris, scapis hirsutis 1-2-cephalis, invol. squamis apice rennrvis acutis. If, in Armeniâ. *Lasiopus sonchoides* Don 1. c. Invol. feie bonchi .squarrost.

DCCCXLIV. MULGEDIUM Cass. diet. 33 (18*4). p. 206. 48. p. Aa6 Tess srn 14a. — *Cicerbitae plerunque Wallr. sched. crit.* (1822). p. 433. — *Agathyrsus D. Don in Edinb. phil. journ.* 1828-29. p. 305 ex linnceâ 1830. p. i'38. — *Sonchis. flor. cceruleis Auct.* — *Lactucae sp. Meyer.*

Capit. multilorum. Invol. calyculato-imbricatum, squamis nempè exterioribus multo brevieribus subimbricatis. Recept. nudum foveola-

turn. Achaenia glabra competessa sacpe utrinque nervata superne alternuata in lostrum cum HI haemo naluia confoime breve crassiusculum apice m discum cupulioi me ciliatum expnnsmn. Pappus uni- aut paucisinalis, setis rigid is scabiib soididis aut ulbi[^] — Heibde Emopse Bor.-Americauae, rarius Nepalenses erectae. Folia piunalilobaia aut ni-di visa dentata. Capitula racemosa aut paniculata. Cor. cyanicse nempè ccemlea aut rariu ex albo coerulescentes aut purpureo-cceruleae.

Sect. I. EJMULGEDIUM.

Pappus mveus. Iuvol. lmlmaturifc Cor. coeruleae aut puipureao

Foliis plus minus pinnatdobatis

1. M. ALPINUM (Less, syn 142), caule erecto glabro ad apicem enm bracteis pedicellis Involcrisqne gland uloso-hispido, foliis glabus basi sagittatis iirregulariiterdentatis lyratisve lobo terminah maximo deltouleo, sum mis lanceolato-lineanbiis acuuminalis, racerao simplici longe biakteato. *If*, in montams et subalpnem Emopa; et in Canada. Sonchus Alpinns Linn, sp 1117 Fl. dan. t 182 Don Smith. Sonch.coemleus Sm. il. bnt. 8i5 Engl. Lot. t. a4?5. Sw. but t. 6T7 non Ledeb Sonch montanus Lam. diet. 3. p. 401^a Gaud.¹ fl heh 5 p. 32. Sonchns Canadensis With. bnt. 674. Linn, beib (vensim ex sched. tianspos.) Hieiacir.ro cceruleum Scop cam. n 976 Cicebita Alpina Wallr Aiacium Alpiuuui Monu 1. c. p ^3. — Cam epit 941.1c. (v v et a.)
2. M. PLUMILRI , cule ertcto fohis pamcubsque glabemrnis, foliis jmphs runcinato-pinnatifidis subtus glaucescentibus, pamcuiā snbeorymbosā , hiactds Idinulis floialibus breviobus basi rotunde auueniatis % in montnus umbrosis Helvetiae, Gallisc, Italuc et Hispaniae boicalis. Sonchus Plumieii Linn, sp 1117 DC fl. fi. ed. i. n. 2899 Sonchus acantlnfohiisClairv man vai. a3r Sonchus cichoiaccus Moench Capitula majora et coloie dilutioie quāni M Alpino. (v. v. et s.)
3. M. MACROPHYLLUM, canle stncllo apice hispido, foliis amplis snLlyiatis basi coidatis subtus hiiitis, lobo teiminah maxnnu coidato, pauitulā laxā hispidā in vol. parce bispidis % in Amcr. boreah umbiosis demissis prope fontes a Pensylvania ad Yitginiam, foite etiam in Caiohna std cl Elliott non repeiir. Sonchus macrophyllus Willd. sp. 3. p i3iq Sonch cordifolius Desf. cat b par i8ofl. p 87 Sonchus Canadensis IMOII. in Ust ann. 1 p 29 non alioi Chondulla sylv. alta, rtc Gron. virg u5. Capitula coeulea magnil Cichorii Intybus. (v s.)
- A. M. PRENANTHOIDES, rrule simplici snlcato glabio apice pubescente, fohis ovato oblongis basi lyrato-iuncinatis attenuate, lacemo teunmali composito elongato, pedicellis squamosis viscosis, invol imbiuatis glabu. 7/1 in Cancasi sylvis altioribus Sonchus preuanthoides Bieb fl. tain. 2. p 242. Smith in llees cycl. n 37. T'loies coernlei Capitlnhm magnit Pieuanlhis purpureap. Atb-pnium vix apice lostialum raultistuatum, sliis rainutnn cienuatus ut in M Alpino (v s. com in a cl Ste en et Meyer)
5. M. TAIAnrruM , glabrum subglaucescens, caule erecto simplici supeiuē pani-dulato, folns infer oblongis iunfinatis, ejulinis basi attenuatis, summis mtc-geuimis, pedicellis paniculac sqnamo^{as} *If* in aigilloso-salsis latanse, Dahu-11T, Sibniae, ad fl Iitisch (Mcy.), prope Bamaoul[^]Pati.), ad Lenain (Tmcz.¹), in Tauiia^a niaritim^a (Beaup ' Stev '). versūs mare Caspium (Bieb), in Tolhy-niā (Bess.) Sonchus Tataricus Linn, ruant. 572 Ledeb. fl alt. 4. p. 140 Lac-tuca Tatarica C. A Mey.! enum 444 Mulgediim runcinatum Cass. diet. 33 p ?g6 — Guiel. sib a t. 3 f C C exel caet Vanat ioliis mtegenimis. (v s.)
6. M. A7LREUM, inferne glabi urn apice glanduloso-pilosiusculim, caule erecto simplici, foliis denticnlatis subtus glaucis, infei pHiolatis snblyiatis lobo tei-ninali maxnno ltniformi aut cordato , inedus ihombeo-hastatis acminati&,

summis ferè linearibus parvis, capitulis racemosis brviter pedicellatis. *If* in Sibiriac Ahaicas ericetis ad fl. Mcen et Tsbuja (Bung!). Soncbs azureus fl. ab. 4. p. i3tt. ill. ross. alt. t. 496. Cor. coeruleae. Medium inter bane et seq. divis. (v. s.)

* * *Foliis subindivisis dentatis.*

7. M. RARUNUR.oiDEs, caule erecto simplici glabro apice pubescente racemoso, foliis longè petiolatiscordatis acuminatis dentatis pubeiulo-subbirsutis, suuimis sessilibus augustè lanceolatis, racemo subsimpli remolifloro, invol. oblongi squaniis exter. ad carinam pilosis cajterùm glabris. — in Nepalì legit cl. Wallich et anno 1821 specim. misit, sed in ejus catal. non determinare queo. Habitus ferè Campanula. Pappus albus fragilis. Achamia compressa longiusculè rostrata. (v. s.)
8. M. CYANEUM, inferne glabrum superne densissime glanduloso-pilosnui, foliis erosè denticulalis snblùs glaucis, infer, ovatis acutis indivisis in petiolum attenualis, super, oblongis sinuato-lobatis acuminatis sessilibus, capitulis geminis racemosis, invol. pedicello ferè longioribns. *IL* in Nepaliae momibus excelsis Wall.! Soncbua cyaneus Don fl. nep. 164. Soncb. hastatus Wall.! cat. n. 3a5o. couip. n. 360 non Less. (v. s. coinin. ab hon. ccet. mere. angl. Ind. or.)
- g. M. MULTIFT.ORUM, glalm-um, caule erecto superne paniculato subglaucoscentt*, foliis caulinis pinnatipartilis basi cordato-nmplexicaulibus, lobis acntis, terminali lougioic, racemis plurirais in pauiculam dispositis. *If?* [.] ? ex Desf. Patr. ign. Sonchus racemosus Lam. diet. 3. p. 400. Sonchus multiflorus Desf.! cat. li. par. 1829. P- 45* Differt à M. Floridauo foliis non petiolatis. (v. s. c.)
- xo. M. AL.BANUM, glabrum, caule erecto simplici, foliis infer, lyratis, caulinis ovatis acuminatis acutè et grossè dentaiis, infer, basi attenualis, sup. basi cordato-amplexicaulibns, paniculie coryrnbosw pedicellis squamosis. *If* ad rivulos Gaucasi Iberici sub Alpe Scbadag (Stev.!) et in Persià ?(Anch.! n. 3366?). Sonchns Albanus Siev.! mem. soc. mosc. 4. p. 69. Sonchi Sibirici var. Bieb. fl. taur. suppl. n. i58r. Lactnca Albana C A. Mey.! ennm. n. 445. A M. Sibirico vtdetur satis distinctum foliis duplo latioribus mullò magis dentatis eL patrià. (v. s.)
11. M. SIBIRICUM (Less.! syn. 14a), glabrum, caule erecto subsimpli, foliis lanceolatis sessilibus cordato-subamplicicauibus acuminatis integeriuis dentatisve, capitulis paucis racemoso-corymbosis, pedicellis squamosis. *If* in humidiuscnlis Daburiac (Tnrcz.!), Sibirke Allaiae (Letleb.), Lapponiae Keraensis (Wickstr.'Less.!) et Tornensis (Wahlenb.), in Finlaudia(Wahleub.), in Amer. bor. ad lacum Huron (Hook). Sonchus Sibiricus Linn. sp. 1118. Ledeb. fl. alt. p. 140. Scbkuhr baudb. t. 217. — Gmel. fl. sib. 2. p. 11. t. 3. f. A. B. excl. ca?l. Arom. ruth. n. 211. Folia ferè salicina. Invol. squamae lineares sa>piùs purpurascentes. Mores coeralei aut var. albi. Achoeuia vix rostrata. (v. s.)
jf. indivisum, foliis siuualo-dentatis intrgerriuiisvc. % circa Odessam ad Lazaretbum (d'Urv.!) in Persià ad Guriel (Szow.!). Soucbs Talaricas vai. *fi.* d'Urv.! enum. p. 99. (v. s.)
- la. M. L/EVIGATUM, glaberrimura, caule erecto apice paniculato-räuoso, foliis inferioribus petiolatis pinnatipartilis, lobis allernis ovato-triangularibus snli-sinnatis integrisve, super, anguslè lanceolatis pinuatalidis integerrimisve, paniculà ramosissimâ. — in KainaonIndiae Orientalis legit cl. Blkworth! Viac-nantbes laevigata Wall.! cat. n. 3269. couip. n. 36'g non Blum. Cor. purpurese. Achacnia junioia videntur compressa brevissime rostralra. Pappus albus. An eeriè congener? (v.s. comiu. ab hon. ccet. mere. angl. Ind. or.)
13. M. FLORIDANUM, glabrum, canle erecto superne paniculato purpnrasccute aut glaucescentc, foliis caul, petiolalis luncinalo-pinnatipartitis, lobis pancis sinuato-dentatis, terminali triangulari acuto, paniculà laxa erecta. *If* i" um-brosis et ad iuargines viarum Amer. bnr. à 'Virginià adCarolinam et Floridam. Soucbs floritlanus Linn. sp. 1118. Mulgediium lyratum Cass. diet. 33. p. 197. Soucbs Lapponicus Wild. sp. 3. p. If2o cxul. tyn. ct pair, ex Sprng. syst.

3. p. (>5o. *Lactuca Floridana* Goertn. et *Sonchus biennis* Moenck ex Steud. Capitula parvacerulea. Radix ex Pursh acuara alexitera, vnlgò ab Anglo-Americanis *Gall of the earth* dicta.
- 14- M. ACUMINATUM, caule erecto glabro simplici, foliis caulinis ovatis acutis in petiolam attenuatis paucis dentatis siccis secus nervos adpresso puberulis, paniculam thyrsoideam glabra. (%) in Americam bor. (Willd.) et in urabrosis à Pensylvaniâ ad Virginiam (Pursh) et in Ludoviciâ (Teinturier)! Souchns acuiuinatus Willd. sp. 3. p. 15ii. *Lactuca villosa* Jacq. h. schoenb. 3. t. 367. Prenanthes sonchoides DC. cat. b. monsp. p. 53. sine descr. Cor. pallide cceruleo-purpurascens. Capitula inter Mulgedia parva. Caulis rabescens. Pappus albus facile deciduas. (v. v.c. et s. sp.)
15. M. ROBUSTUM, caule erecto elato fistuloso glabro a pice pedunculisque pilis fuscis confertis hispido, foliis caulinis elliptico-oblongis utrinque acuiuinatis-simis dentatis subtus glabris superne sparse puberulis, surainis linearibus integrerimis hispidulis, invol. oblongi pauciflori squamis exter. his p. id u. I. is, inter, glabris. % in Gossain-Tban Ind. or. legit cl. Wallieb. *Sonchus robustus* Wall.! cat. coinp. n. 35Q. Kolia infer. lobito-subpinnatilida? Cor. ex si ceo videntur porpurascetes? Pappus albus fragilis. Achaenia breviter rostrata. (v. s. coinm. ab lion. cnr. mere. angl. Ind. or.)
16. M. SAGITTATUM (Royle illustr. I. fii.f. a), glabrum, caule erecto tereti, foliis caulinis acutè sauidatis lanceolato-liiie<fibis acumiuatis integerrimis, pauciculam ramosam polycetalam, invol. subimbricato. — in Indiam bor.-occid. Capitula magua M. acuminati. Cor. cceruleae. Achaenium brevissime rostra turn. Icon sola prodiit.""]

Sect. 11. AGALMA.

Pappus sordescens. Invol. calyculatius aut calyculato-imbricatum. Cor. cceruleae aut purpureae.

* *Foliis pinnatilobatis.*

17. M. LEUCOPHAEUM, caule erecto glabro apice paniculato, foliis glabris subelegantibus runcinatis sen irregulariter pinnatipartitis, lobis grossè dentatis acuminatis, paniculae iamis raceino>is squamosis, invol. glabro. f2) ad margines sylvarum Amer. bor. à Novâ-Augliâ ad 'Virginiam (Puish), ad Lacuim Huron (Hook.). *Sonchus spicatas* Lam. diet. 3. p. 401. *Sonchus leucophaeus* Willd. sp. 3. p. 1510. *S. Canadensis* oliin in hort. par. An forte *S. Alpinus* Smith ic. incd. 1. t. 21? Capitula dimidiò fere miuora qua in M. Alpino, juniores albi demum coemlescentes. Nomen Lamarkii etiamsi vetustius sed falsum omisi. Invol. calyculalo-subimbricatum medium inter sect. 1. et xi. (v. v. c. et s.)

* • *Foliis indivisis.*

18. M. CACALIAFOLIUM, canle erecto tereti glabro apice hispidissimo, foliis glabris hastato-triangularibus irregulariter dentatis, infer. petiolis foliaceis amplexicaulibus donatis, super, sessilibus cordato-sagittatis, floralibus lanceolatis acumiuatis hispidis, capituliscorymbosis, invol. subhispidio. If in Iberia (Stev.), in pratis subalpinis Caucasi ad acidulam Narzanaiu (Liitb.) el ad moitem Beschtau (Mey.) *Sonchus cacaliaefolius* BU?b. fl. taur. a. p. 241 • suppl. p. 027. Mey.! enum. n. 1/4a. Hores coerulei. Achoinia laevia vix apice attenuata. Pappus i-septemlobatus sordidè tenuis. (V. s.)
19. M. HISPIDUM, caule erecto hispido, foliis superioribus ovatis lanceolatis amplexicaulibus, capitulis paniculato-corymbosis, pedunculis subsquamosis involuerisque hispidis. & in Sibiræ montibus Werchoturiæ (Gmel.). *Sonchus hispidus* Ledeb. fl. alt. 4. p. 140 in adnot. — Gmel. sib. 2. p. 12. n. 12. t. 4. f. 1. Affine M. cacaliaefolio dicitur.

- ao. M. HASTATUM (Less. syn. 142), glabrum apice summo pubescens, caule simplici erecto, foliis grosse dentatis acumiuatis, iufer. hastatis in petiolam attenuatis, super, sessilibus lanceolatis integris, capitulis paniculatis brevissimè pe-

dicellatis, in vol. glabro i-seriali brevissimè calycuiato. % in Unalascbka (Cham.), in Sitcha (h. ac. petrop.). Sonchushastatus Less, in linuaeà 1831. p. 99. non Wall (v. s. comrn. ab ill. acad. sc. petrop.)
 ai. M. MACRORHIZUM (Royle illnstr. t.6i.f. i), glabrum, radicegrossâ, cunlibus pluriraib ad.scendeutibus, folii* caulinis aroplexicaulibus oblongis obtusis&inuato-dentatis, capilnlis pedicellatis subcoiyinbosis, invol. bjeviter calycnlato. If, in Indiâ boreali occid. Cor. coeruleae. Achaeuuin brevissimè rostratum. Icon sola prodiit. 'f'

M. M.? LESSERTIANUM, caule glabro erecto simplici, foliis subintegerrirais lan-ceolatis, inferioribus basi attenuatis superioribus bemiamplexicaulibus, invol. hispid) subimbricato. — in Indiae orient, montanis ad Kamaon et Emodum legit cl. Wallich. Hieraciuin Lessertianum Wall! cat. comp. n. 364. Sonchi sp. Froel. in Int. Certè non Hieracii sp. fortè genus proprium Monn. in h. DC. Achaenia oblonga coinpressa striata in rostrum crassum longiusculum producta. (v s. comm. ab bon. cur. mere. angl. Ind. or.)

@. *dentatum*, radice tnberosâ, foliis dcnticnlatis, racemo secundo. — in India or. prov. boreali-occid. legit cl. Royle! Fortè species di.stiucta et cum var. et genua sectionemve constitueus. (v. s. coram. à cl. inv.)

DCCCXLV. ANISORAMPHUS.

Capit. multiflorum. Invol. calyculato-imbricatum, sqnamis lato-li-neanbus, extcr. circ. 2-serialibus brevibus, inter, subbiseriatis elongatis. Recept. epaleaceum. Achaenia oblonga (ex immaluro statu) compressa striata rostrata, rostro exteriorum brevi, interiorum longiori. Pappus pilosus nulliserialis subochroieucus. — Herba Capensis peren-nis habitu Hieracii aut Hypocbaeridis. Radix crassu cylindracca. Folia radicalia ohlongn basi subattenuata subrelorsiim deulata glabra, cau-lina paucissima lincaria integerrirna. Caulis submidus basi sulcatus gla-briusculus, apice parcè ramosus circ. 3-cephalus pilis rigidis nigris hirtus. Invol. squameae pilis iisdem confertioribus hirtaj. Flores lutei.

'J^' HYPOCH^RIDEUS. % ad Cap. Bonne-Spei, ad Zwart Klipplatrivier et Zwart Key legit cl. Drege! Herba circ. pedalis. (v. s. comm. à cl. inv.)

DCCCXLTI. PICROSIA Don trans. soc. linn. 16. p. 183. Less. syn. i43.

Capitulum mulliflorum. Invol. i-seriale 8-phylum. Recept. nudum. Achaenia longè rostrata, imò rostro breviora, fusiformia, longitudina-liter sulcata. Pappus pilosus mollis (?) caducus biserialis scabriusculus inaequalis, cincro-fulvus ex Don. — Herba Brasilicensis erecta lavigata glauca parcè rainosa. Folia caulina semiamplexicaulia innceolata inle-gerrima aut vix subdentata. Pedunculi nudi i-cephali. Flores lutei in-vol. longiores, ligulas 4-nerviae. Pappus in meo specim. fortè non satis adulto albus.

1. P. LONGIFOLIA (Don 1. c). % in Alibus Peinviae (R. el Pav.), in Brasilia (Sel-low !), in bum id is circa Bucnos-Ayres et Mendozam (H. et Am. comp. i. p. 3a) Troximon fritillarioides Less. syn. i A3. (v. s. comm. à mus. reg. berol.)

DCCCXLVII. TROXTMON Gartn.fr. 2.p. 360?Nutt. gen. am. n.p. 127. Spreng. sjrst. 3.p. 633. Hook.fl. bor. am. 1. /». 300 non Raf. — Ago&eris Raf.fl. ludov. />. 58

Capit. multiflorum. Invol. imbricatum subconicum, sqnamis latis extus plus minus villosiusculis. Recept. epaleaceum. Achaenia terctius-

cula brevissimè rostrata. Pappus pilosus albus rigidiusculus, setis subdenticulatis basi non dilatatis. — Herbae Boreali-Americanac, excepto involucro pubescenti l. inato glabrae, subacaules, habitu Scorzoneue. Folia subradicalia glaucescenlia subintegernma. Scapi folns paululii in longiores teielcs i-cephah. Flores lutei. — Genus affine hinc Ciepidi sed mvol. imbricatumethabitus diversissimus; illinc Picrosiae sed iiivoi. imbncatum et achaenia brevissimè rostiata.

1. T. or AUCUM (Nutt. in Fias cat.r8i3 gen am i p 128), folus linean ensi-foimibus Inevibus glabiis Integeninus aut laiissime subtentatis, scapo glabio foliis longioie, invol squamis aculis subpalulis hiiMilo-tomentosis *2f in planiciebns Louisiana; supeuoris (Nutt.), ad baikalcha'an in pascnis inonliuin fccopulosorum et ad lipas mails Aictici (Hook.). Puisb fl boi am ?. p. 505 et 495. T. glaucum vai. * Hook. bot. rnat. t 3|62. T'olia fcieScorzoneix, 6-8 poll, longa, 8-9 lin. lala. (v. s. ex boit Barcl.)
2. T. MARGIN VIUM (Nutt. gf'n am. 12. p. 1 *3), foliis lineaii-lanceolatis integr-rimis acuminatis maigine subundulatis floccoso-pubescentibus, scapo so.piis pubescrle, invol. sqnainis glabns adpies>jis acummato-cuspldatis % in bei-bosis pl.mitiebns Louisiana? snperioris frequens (Nutt.), adiipasiluio Missouii (Sims). I¹ cuspidatum Puish fl bur. am I. p. 742. T glaucum Sims bot. mag. t. 1667. An 'Li. glaucuui \ai & Hook bot mag. n. S^bi? 1. cuspidatiim Fursh fl. boi. am I. p. 74*2. Pnon foite vanelas ex Hook 1. c?
3. T ? APARCIODIFS (Less in linn sea IS3I p 50i), foliis nunc ibtegeniinis none dentatis ant subpinualifidi* obtusis elongato-obovatis glabiis, scapo folus vix longiore cnin mvol. basi puhescnne, squ.nnis obtusiusculis. If in California lege: cl Cbamisso et Douglas Uaikausia Leisingii Hook, et Am, bot. Beecli i.p 146. (v s romm. ab bon. soc hortic londin)
4. T AunAHTiACUM (Hook fl bor am. 1 p 300. t io|), foliis oblongo-lanceo-latis oblusis in prtiolum longe altenuafis integeuimissinualo dentatisque, scapo iobis duplò longioie •<, ce puboscente, coiollae faucc vix pilosâ, invol. squamis mtiinis ad medium coadunalis If in piatis alpinis montium scopulosium (Rocky-Moi.nt.um). Cor. aurantiacac. Achaenii equidem junioois lostrum non perspicuum Habitus puoiis An ceite congenei?

* Species exclusc.

- T. FRiTilLiA-RioIDts Les9 = Pici'osia longifolia.
 T. wifVTUM Peis. = Scoizonera lanata.
 T. TIRGINICUM Pnrsh. =z Cynthia "Virginica."
 T. ODOR AT UM, T. r'i.riDUMet T BLLHOSUM Rafm fl luJ. p. 58. e gencu ox ipso Rafinesque excludenda, sed omnibus et foite anclou ipsissiino iguoiaj

† CICHORACEA VIX NOTA.

ARNICA CILIATA (Thunb fl. jap 318.) est (ex Lessing syn. p. 143 qui plantam in herb. Thunb. vidit) Cichoracea recepiaculo paleaceo, pappo plumoso uniseriali, affinis Hypochaerideis. Hæc species habet caulem simplicem i-cephalum, folia amplexicaulia ovata dentata ciliata glabra, capitula rubra maguit. Pyri minoris. Hab. in Japoniâ.

† GENERA COMPOSITARUM

INCERT.E SEDIS,

Nempè aut non salis nota, ant ad locum proprium in scie non relaia,

DCCCXLVIII. ABASOLOA *Lallav. et hex. descr. veg. mex. i.p. n.*

Capitulum radiatum, fl. radii foemineis capillaribus 2-5-serialis, disci tubulosis 4-dentatis hermaphroditis. Invol. squamis 12-16 biserialis. Recept. planum, paleis linearibus acutisciliato-serratis. Ach&nia tetragono-rhomboidea papillâ umbilicata superata. — Stirps ramosissima dichotoma. Folia opposita lineari-Janceolata asperula remotè serrata. Capitula solitaria longè pedunculata è dichotomia orta. Flores disci et radii albi! — An *Helianthea*?

1. A. TABOADA (*Lallav. et Lex. 1. c.*) . — in Mexico in S. Jose del Corral ad ripas Huehueyapae.

DCCCXLIX. ALLENDEA. *Lallav. et Lex. descr. <veg. Ihex. up. 10.*

Capitul. multiflorum, floribus disci tubulosis paucis hermaplirod. 5-tidis, lobis revolutis, radii foemineis pluriserialibus filiformibus?ligulatis?invol. imbricatum, squamis aculis. Recept. convexum paleis (fimbrillis?) minutis apice subaristatis donatum. Achaenium. . . . Pappus pilosus uniformis. — Herba Mexicana orgyalis virgata, tomentososericea. Folia opposita connata latè lanceolata, breviter petiolata, subtiis trinervia, dente glanduloso |-i ulrinque notata. Capitula corymbosa longè pedicellata. Cor. pallide' flavescentes. — An *Mela* in podio affinis?

1. A. LANCEATA (*Lallav. et Lex. 1. c.*) . — in Mexico ad ripas stngni vnlgu *Balsa del Uuei* ia rio seco non longè à S. Jose del Corral.

DCCCL. ANISOPAPPUS *Hook. et Am. hot. beech, p. 196.*

Capitulum radiatum heterogamum, fl. foemineis i-serialibus in ambitu corollas ligulatas gerentibus, tl. disci tubulosis. Invol. squamae lincarcs imbricata) numerosa; pubescenti-tomentosa?. Recept. dense paleaceum. Anthera; basi bisctosae. Stylus disci ramis a pice obtusis inappendicnlatis. Achaeuia confonnia lineari-tetragona e\alata erostria , paleolis compluribus brevibus inaequalibus setisque 4 multò longioribus inter se inycqualibus coronatum. — Herba erecta dense puberula. Folia alterna oblongo-linearia obtuse dentato-serrata. Rami llorigeri i-ccpbali subtcninales corymbosi.

- » A. CHIKENSIS (*Hook. et Arn. 1. c.*) . — in Chinâ. An *Verbesina Chinensis* Linn, ap. 1270. in vol. v. p. 618. memorata, line rrcocanda.'»

DCCCL APATANTHUS *Viv. fi. libyc. p. 5/}. t. 7/ 3. Caw. *fc*. 58./?. 45g.*

Capituli flores omnes hermaphroditici, radii ligulati, disci tubulosi, tuboinferne filiformisupernè incylindrumexpanso, oretruncato. Invol. cylindricurn,squamislinearibusdorsohispidissimis. Recept.paleaceum. Achsenia linearia erostria. Pappus pilosus. —Herba Piloscllic facie boreali-Africana tota hispida annua. Folia obovato-oblonga integerrima ad col kirm rosuiata. Scapus 1-cephalus. Flores lutei. —Car. ex cl. auct. mutuatus sed evidenter erroneus! In capitulis radiatis ligulae enim nullibi sunt hermaphrodite! Cassinio et mihi Apatanthus videtur Cichoracea (fortè Hieracii species?), male descripta. •/.

1. A. CHINITUS ('Viv. 1. c.).(T)iii Cyrenaicis montibus. j\

DCCCLII. ARROWSMITHIA.

Capitulum multiflorum heterogamum, fl. radii ligulatis i-ser. foemineis, disci tubulosis regulari 5-dentatis hermaphr. fortè sterilibus. Invol. cam pa nu la turn imbricalum, squamis subciliatis, ext. ovalis acutis subcoriaceis, int. oblongis obtusis apice membranaceis. Recept. planum fimbriis seu paleis linear-setaceis rigidulis onustum. Cor. omnium tubusmedio villoso-tomentosus. Anlh. ecaudatse. Styli rami breves oblongi dorso puberuli. Achrenia calva radii compressa, disci teretiuscula glabra, areola basilari subcornea. —Suffrutex Capensisramosus Eclopis seu OEderiae facie. Rami teretes glabri. Folia alierna usque ad apices conferta patula sessilia semiamplexicaulia persistentia rigida linear-lanceolata mucrone pungentia integerrima, suprà glabra, subtiis juniora albo-tomentosa, dcmumglabriuscua. Capitula terminalia solilaria lutea. — Genus distincliissimum sed difficile in serie locum proprium obtinens. Differt ab OEderiâ capitulis non glomeratis etstigmate ferè Mutisiacearum, ab Eclope et Printziâ antheris ecaudatis. —An Mutisiacea?

j. A. STYPHETIOIDES (DC. in Del ess.' ic. sel. 4. t. 100). 3 in Africâ Capensi ad Katriversl>erg alt. 4-500 ped. legit cl. Drege! (v. s.)

DCCCLIII. BAERIA *Fisch. et Mey. ind. secund. sem. k. peer. i835./>. 29.— Baeria ann. sc. nat. hot. iH36.^>. 292.*

Capitulum multiflorum heterogamum radiatum. Invol. squamae subdena? aequales planae biserialae. Recept. conicum nudum. Fl. disci hermaphr. 5-denlati, radii foeminei ligulati fertiles i-seriali. Styli rami cono superati. Achseniaomnia conformia fusifoimia compresso-subtetragona laevia glabra calva obtusa, areola terminali parvâ. — Herba Californica annua gracilis erecta ramosa pilis simplicibus paucis adspersa, ramis elongatis apice nudis. Folia opposita sessilia linearia integerrima. Capitula terminalia solitaria. Flores aurei.— Genus affine videtur Helenieis et speciatim Lastheniae, sed achaenia calva, aut Madieis sed folia opposita, recept. nudum, invol. squamae planae.

1. R. CHRYSOSTOMA (Fisch. et Mey. 11. cc.). (T) circa coloniam Ruthenoram Ross, in sinu Bodega Novae-Californiae.

DCCCLIV. CADISCUS *E. Mey.l in Drege coll.*

Capitulum multiflorum heterogamum, fl. radii i-serialibus foemineis latè ligulatis, fl. disci exterioribus hermaphr. fertilibus tubulosis5-den-

tatis subbilabiatis centralibus sterilibus? Invol. uniseriale, sqnamis 8-10 in cupulam 8-10-dentatam concrelis. Recept. convexum alveolatum. Anth. ecaudalae? Styli rami apice summo barbata, Achaenia fertilia teretia striata-sulcata apice breviter rostrata basi subvillosa, carte riim sparsè puberula, embryone tereti elongato; sterilia linearia hævia. Pappus fr. fcril. squamelis 10 rigidulis setiformibus scabris, >asi subdilatatis persistentibus; fr. sleriliurn omnino setiformibus. — Herba Australi-Africana aquatica & labra. Caulis teres ad uodos inferne radicans. Folia alterna semiamplexicaulia linearia elongata intererrima plurivenia. Pedunculi nudi oppositifolii i-cepbali. Cor. ex siccō alba?. — An forie stirps inter Tagelineas collocanda etiamsi eglandulosa aquatica et Gerontogea?

1. C. AQUATICUS :E. Mey. 1. c.). *If. I in Africa australi ad Zwartland, in Dumpfel legit cl. Diege!* (v. s. comra. à cl. inv.)

DCCCLV.DAMATRIS *Cass. hull.philom. septemb. 1817. diet. ia. p. 471.*

Capit. multiflorum radiatum, fl. radii ligulatis fcemueis i-seriatis, disci masculis regularibus. Invol. disco longius, bemispbaericum, squamis adpresso imbricatis, ext. ovatis, int. linearibus apice subulatis. Recept. convexum donatum paleis i-seriaibus inter radium et discum sitis scariosis extiis concavis apice trilobis. Achaenia radii subcylindracea vilbs runis longis hirsuta, pappo biserialisquamellosononala; disci abortiva. — Herba aunua brevicaulis, rainis pedunculiformibus. Folia alterna semiamplexicaulia linear-lanceolata sinuata subliis albo-tomentosa. Capitula solitaria terminalia. Flor. flavi. — Genus inter Arctotideas à cl. auct. admissum, sed uon satis cerium,
i. D. PUDICA (Cass. 11. cc). (J) ad Cap. Bonae-Spei ex herb. Jass.

DCCCLTI. DIMEROSTEMMA *Cass. bull. philom. 1817. Jan. diet sc. nat. x3. p. a53.*

Capit. multiflorum subglobosum homogamum aequaliflorum. Invol. floribus subaequale, squamis pauciseriatis, ext. majoribus ovatis denlatis bracteiformibus, int. oblongis integris. Recept. planiusculum, paleis oblongis acutis subspinescentibus tloresseini-invoiventibus. Cor. regulares. Achaenia gracilia. Pappus paleolis a suhlaceris basi subconcretis conslans. — Herba Brasiliensis erecla villosissima, ramis elonealis. Folia alterna reniota breviter petiola ovalia dentato-crenata subtriplinervia. Capitula terminalia solilaria lutea. — Ad Hclenieas prone Marsballiam refert cl. Cassini. P

1 • D. BRASILIANUM (Cass. 1. c.) — in Brasiliæ ex herb. Jass. et Desf.

DCCCLTII. DIPTEROCOME *Fisch. et Meij. in Stow. pi. exs. ex lite. i83a ind. sem. h. petr. 1835. p. 26.*

Gapitulum pauciflorum heterogamum, fl. omnibus tubulosis r. A'' foemineis infundibuliformi-subbilabiatis, disci filiformibus mLsculis 5-denlatis. Keccpt. angustum ebracteolatum alveolare. Invol imbricatum, squamis ovali-oblongis margine subscariosis. Slam, radii omnino null'a, d. scifi lam. glabnis, anthers basi muticis apice appendiculatis. Stylos radii glaber apice bihdus, ramis pateutibus glabris glandulosis, fAtsci apice incrassatus papillosus subbilobus. Ovarium discf abortivum,

scutulis paucissimis nullisve coronatum. Achaenia radii cylindracea curvata ccmpressa, dorso echinata, apice producta in cornua duo patentia recurvata, uno extcr., altero ad centrum capituli tendente. Setae paucem simplices piliformes inter cornua ortae et iis breviores. Embryo è basi ach&nii ortus, ad apicem usque productus, exalbuminosus. — Herba ininuta annua glabra aut parcè sublanuginosa Persica. Radix exilis. Folia linearia semiamplexicaulia conferta integerrima. Capitula axillaria sessilia flava. — Hauitus fructuum Koelpiniae aut Calendula?, sed à Cichoraceis differt floribus tubulosis heterogamis, à Calenduleis stylo non infra lobos nodoso et pilorum torquati donato. Nuili tain en ordini affnior quām Calendulaceis etiis fortè subjungenda ! An sets inter cornua ortae pappum verum conslituunt ?

- i. D. PUSILLA (Fisch. et Mey.! pi. Szow. ined.). (f) in collhus salsis ad Schabanli in di>tr. Xhoi prov. Aderbeischan legit cl. Szowilz. (v. s. comm. à el. Fisch. et Mey. cum descr. eximiâ.)

DCCCLTIIT. DOLICHOG^NE.

Capitulum 6-8-floruin homogamum. Iuvol. oblongnm , squamis iin-hricatis acuminatis, exter. foliaceis, inter, longioribus scariosis. Recept. nu cl urn. Cor. tubulosae subaequaliter 5-denlatae. Stain, filam. brevia. Anth. ecaudatae apice appendiculatae. Stylus teres. Stigmata 'i cxserla crassa distinclaelongataacuta. Achaeni-i teretiuscula elongata pubescenlia. Pappus 1-2-serialis, setissublamellatis scarioso-rigidulis nee plumosis nee dentatis. — Suffrutices Australi-Amricani ramosi. Folia alterna sessiliairiaria marginerevoluta, Capitula ad ramulorum apices solitaria foliis supremis subcontigua. Cor. flavae. — Ex antheris ecaudatis fortè pertinct ad Barnadesiaceas, sedexhabitudo Luciliae affine; de vcrageneris sede dubito. — Nomen ex «TOMOC longus et^t/vn focmina.

1. D. sTiEHELiNOiDEs, rainulis foliisque glabriuscnlis, pappo cinuamomeo. J in Amer. au&trali verisim. Bonarieu&i, ad Pena blanca in cirapis dictis Pampas legit cl. Née! Staehelina Née! herb. Thib. Folia 5-6 lin. longa subobtusa remotiuscold. (v. s.)
2. D. GNAPHALOIDHS, lamulis foliisque ntrinque cano-lomentobis, pappo palido. J in altis Andibus Chilensis Talcaragué dictis legit indef. Cl. Gay ! Folia 3 lin. longa obtusissima confertissima. (v. s.)

DCCCUX. ELACHIA.

Capit. multiflorum radiatum. In vol. ovato-campanulati squama? pluriseriales, exter. foliaceae obovatae apice denticulatae, ca3terae3 sub-scariosae integerrimae mucronata; Recept. iiudum. Flor. radii5angustè et brevè ligulati steriles, disci 10 tubulosi subbilabiati 5-dentati adfau-cem non dilatati hermaphroditi. Antherae basi brevissimè caudata?. Sty Si-AchaBnia obcompressa erostria oblonga glabra. Pappus pluri-serialis setosus albissimus. — Herba Chilensis tcnella glabra. Radix exilis. Caulis à basi ramosissimus tenuis, ramis oppositis. Folia inferiom opposila, superiora alterna, rigidula obovata glauca, apice serrata basi nn^ustata iulegerrima. Capitula ad apices ramorum solitaria foliis vix ab invol. squamis exler. distinctis obvaliata. InvoJ. squamae intimse corol-laue flavae. — An Mntisiacea affinis Choctantherae? an Senecionea affi-nis Maderacl? — Nomen ex e<<oc parvus.

1. E. EUPHRASIOIDES(DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 99). (f) in excelsis. Andibus Cbi-lensiom legit cl. C. Cay.! (v. s.)

DCCCLX. GALE AN A LdHav. et Lex. descr. 'veg.tnex. i.p. IJ.

Capit. circ. 8-florum, fl. radii 3 ligulatis brevissimis bifidis, disci 5 hermapbrodilis tubulosis 5-dentatis. Invol. squamis 5 aequalibus carinatis constans. Hccept. nudum. Achscnia calva, radii concava margine subdenlalo, disci prisinatica. — Herba procujnbcnsdtchotomo-ramosn. Folia opposita breviter petiolala succulenta hastaro-sagittala sacpiis glabra. Ca pi tula racemosa l)reviterpetiolata, infima e dicbolomiâ longe pedunculata solitaria. Cor. disci tlavae, radii albae. — An forte Galinosoge affinis? aut ad Milleriain acccdcus?

i. G. H\STATA (Lallav. et Lex. 1. c.). — in Mexici satis ad S. Jose del Corral.

nCCCLXI. GALOPHTHALMUM Nees et Mart, in nov. act. soc. nat. cur. ra. p. i.
/>. 7. t. 2.

.Capitulum pluriflorum radiatum, ligulis 3 uniserialibusfcemineis truncato-subdentatis, fl. disci 5-6 tubulosis 5-dentatis hermapbrodilis. Invol. biserialie 8-phyllo, squainis ext. ovatis obtusis, inter, angustis acutis. Accept, nudum punctulatmn. Acha3iiia compresso-telragonâ obconica. Pappus aristis 2-4 rigidis subulatis basi dilatatis et subconcretis constans. — Herba Brasiliensis procumbens suWnspidula. Folia opposita subquaterna petiolala ovata trincvia subserratii. Capitula axiliaria breviter pedicellate soiitarla flava. — An Yerbesinca ? sed rcept. dicitur epaleaceum.

1. G. BaAsiMENSE (Neeset Mart. 1. c.). — ad vium Fclisbertiarn Brasilia;

DCCCLXIT. GIBBARIA Cass. bull. pftfom. 1817. septcmh. diet. 18. p. \$29. 3o.
p. 3^4 et 333. opusc. phyt. ^/>. 70 et S4-

Capit. Innliflorum" radiatum ;fl. radii ligulatis fcemineis 1-seriatis, disci masjMilis regularil>us. InvoT. disco aequale hemispajricum, squamis pauciseriatis imbricatis apice spiuescenibus. Rcept. planum nudum. Acbaenia radii brt:via crassa dorso ^ibba! disci sterilia compressa striata, pappo corotiiformi dimidialo brevissimo irregulariter lacero. — Stirps Gapcnis ramosa. Folia alterna longa semteretia ncuta i-nervia subsemiamplexicciulia glabra. Capitula terminalia solilaria, disco crocco, ligulis supernè albi^ subtùs croceis. — Ailinis viclcur Arctolideis.

1. G. Dicoi-OR (Cass. 11. c<-). — C.tji. l'ona; Si»ei legit I'hnnberg rx herb. Juss. et ide-6 veribim. cadem ac Arctotis quaedam à Thunb. aliis verbis descr. t,

DCCCLXTII. GLYCIDERAS Cass. diet. 5\$. p. 63 et 73. — Glyphia Cass. diet IQ
p. 108.

Capit. multiflorum radiatum, fl. radii ligulatis foemineis 1-seriatis, disci regularibus hermaphr. Invol. floribus subæquale, squamis subbiseriatis ad pressis oblongis inæqualibus. Recept. planum hirsuto-simbriliferum. Ligulæbreves glandulis patulis onustæ. Achænia subcylindracea siriaia inspiuuia. xappus setis filiformibus scabris. — Stirps Madagascafriensis lucida glabcrnma iwig IWJ' »u»tosa. roiiia alterna subsessilia ovata acuminata iutggeriina pellucido-glandulosa. Capitula paniowlat? bractala. Cor. flavixi. — Ad Tagelcas rei'ert cl. auctor.

1. G. LUCIDA (Cass. 1. c.). — in Madagascar.

DCCCLXIV GNAPH&LOPSIS

Capitula mu 111- (40) flora dioica? rf invol cainpanuiatiim, squamis exter. subtoliaccis vaide lanatis, inter siaiosi* ^lahns .luminatis suburnsenati> Recept. nuduin subconvtxuin Cor. tubulcis*, iruniite 5-dentatae. Anth,eioe subsetstlc ecaudatac Stylus mclu^u^ bifidus, iaims gl.i-bris subdifloiniibus. Acb ema stipitati subangulata tcuuis^ima elongita mama • Pappus paleib 5 cicctib scanoM* basi latiusculisapiceacuunnatis saepe subtrifidis coiollâ iongionbus. £,>.... Hci ba Miciupi facie Mexicana ciecta ramosa tota niveo-lomeutesa Fohaattcma ohlons;a obtusa Cipil'iii terniinaba sessiln solitina Floret fla|i — Ex caiacl. stucto ad Baccharea&accedit, sed hibitus divepsitsimus

i G BIICROPOIDES (X >n Mexici prov Novi Leonis ad Monterey legit cl Bei-
ldndiei(pl exs u i40;6)floi januai ^ v. s)

DCCCLXW HISPIDELLA Barnad m Lam diet 3 (1789)P i3i. Cass. diet
2i p 048 —SoldevilU Lag var cienc.i n 19 elench.h. madr (1816)/I 24
Dor* Ekh new phd.journ 182N p 78 ex Unnced i83o lite p'lS^i Less
syn 127

Capitulum multifloiuin radiatum Invol. squanxa? i-serialcs bast con-
cietce apice hl^erae aciitoiinatae doiso setosae post anthesm rnijm\enlcs Recept alveolium , alveol. marginibus in fimbulias produclis Floies 1 adu 1 -sci tales hgulali foeminei^ stigmalibus cylindiacfeis, forl£ antheras steules gerenlc disci tubulbsi 5 dcnlali, genitalibus inclusis Achse-
lla obovata nervulis costulata apice suimmo o-denticulila caeleum epap-
posa. — Heibula Hispamca annua tota setis rufescentibus ln^t ida»et inter seta» tomenlo bievi>snno velulih. Radix giacihs. Ciules a collo 1-2-pollicares snnplices foil5M i-cephili FoHaaltcina oblonga inte-
ginina Floies ex sicco vid tlavi —Genus III sene nalualti tlifdcile collocandum Cl. Lamarck, Lagasca, Ca^sini et Don inti Ci^lioacea^ admiltunt, sed floies dibci evidentei tubulosi cl Jussieu inter Aicto-
tidcas imo in Arctotidis geneie cojlocavit, sed stylt taint a Cynaieis toto ftoclo differunt. Eigo ex planta viva dat lux:^T

i H HispANiCA (Lara 1. c) /l in arenosis andis utrmsque Castelljc (^ g) et speciitum piopc Guadauama oppid. nonprocul a Madnto (Lag ') Hi&p fiajin-
desu(ass diet 21. p 2\$S Soldefilia setosa Lag ' 1 c. Peis each 2 p A.ictotis
Hij»pidel» Juss hei b ex Cass (\ s ^

DCCCLXVI UYSTFRIONICA. JVilld mag d naturf. ges btrl 1807 /; 140

Invol subsequale. Goiolla3 tubulosae Stylus florum foemineoiuin co-
rollâ duplo'longioi. Stigma simplex Papput duplex , mteioi palea-
ceus,c\ter. sc tobis hispidus —Hei ba Bonaxetibis setoso-hispida 1a-
mosa, lamis elopgatis 1-cephalic Folia linciri-lanceolala sessilia obso-
lete dLCiurientia intcgerr^{na} avenia, in cosla et ad niaigincs pileutun
setosa Capitula teiminalia sobtaia. G01. ex WillLL mutuatus , sed 011-
niuo mcompletus^T Caet. Igu —An Composita \eia?

1 H IASION'JIDLS Willd 1 c) — ad Bueos 4yies

COMPOSITE INCERTJE SEDIS.

25

DCCCLXVII. METAZANTHUS Meyen (i834) re^{ck} i. ^.. 356.

Invol. campanulatum polyphyllum 2-scriale, fol. linear-lancollatis acuminatis glabris, involucratis latioribus marginatis. ftocept. ahduni nigro-punctatum. FJosc. omnes ^ tubulosi. Cor., regular. 5-partitae, dentibus non reflexis. Antherae longè exsertae basi connata; ecaudatae apice acuminatae liberæ. Filarn. lata laevia anteapicem incrassata. Sligm. bifidum inclusum, stylo basi incrassalo. Acbaeniiun rostratu/n", sub 5-angularc sriato - sulcalum longum, pappo persis!ente mnliserfali setoso subserrato. — Ad Eupatoreas refert cl. auct.

1. M. GRAHDIFLOROS (Mfyen 1. c). (caole prornmhente crassu ramoso, rajnis floif. erctis angulato-sulcatis, fol. nd basio caolis den^{ss}s sacchentis*%érotam-plexicatilibus irregal. 3-pinnatif., pinnulis dentdto-sobtripartitis t petiolis 3V0-golai'Lus, stipulis altera itemiaupieicjuli Innceolatu' acuatioata. It^ Cordhe-ris Cbilensimn circà luatet igoivomaia Maipo. Involucrnni cnfib& 'floiiicr ct stipui. T violaceac.
2. M. CA€Anoints (Meyen . c). Wfcrbaceus, caule rampsissimo, foj. alternis loogè perioiatis seniamplexicaulibis pinnatifidis carno.sis, lobis Uoeiri-lanceo-latis \cl canéatis acutis glaim.s, caulibus florif. i-floris stipC^aceis, ^tfoL's lanceolatis aoutis nd basin involuci (lensis, itivolucn foliolis «OBollis loa"iaribus ilavis, staminiba* ioagè exserlis, autbeis apice louge sagittatis. Cam priore.

DCCCLXTWI. MICROSPERMUM Lag. gen. et sp. iSi5. p. i5.

Capitulum inulliflorum discoideum homogamum. Inroi. c^mpanu-latum aequilc. Recrpt. niidum. Flores biynes tierinapli. Cor. radii 6-12 majores subbilabialae. Andi Styl.... Achaen.... Pappus denticulis brevissimis ct aristis i-3. — Herlia vix spithamaBa decumbens. Folia opposita brevKssioie ptiolala subrotundo-cordata crenata. ^edunculad apicemcaulis i-5 monocpliali.— Genus ad Nassauvieas du bias re] a turñ à cl. Cfessiui (opusc. Q. p. 187) el Lessing, sed diversum vkiotiir ex foliis opposilis el pappo pauci-aristato. Potiis ad Tagetineas-aut forte Eu-patoriaccas referendum?

- I. M. SDMMDTARI^POLIOM (Lag. 1. c). — in Mexicb ad GnanaxuatojtQaeretaro et Salvatierra. Tabula Sloan, jam. i55. f. u, ad Lavebiam decaubentem k Swartzio citata, kujus plantaj ex Lag. La bit a ID benè.exbibet.

DCCCLXIX. MUNNOZIA Ruiz et Pav. pYod. fl. per. p. 108. t. 33. syst.

Capit. multiflorum heterocjamum raciatum, fl. rádii ligulatis i-scrialibus foemincis 3-dentatis, disci inftindibuliformibus heripphroditis, limbo campanulato 5-dentato, Inw). ^c\vnpanulatum imhriontuni, Sfuanmis inlimis augustis apice 3-denlatii. Kecei>t. favpsum ciliatmi). ^chae-nra obovata truncata striata. Pappus pilosus. — Pkmtae Peniviana suf-fruticosa; lomentosae aut birsutte. Caules crecli raniosi strwti. Folia'opposita ptiolata. Capitula subcorymbosa aut >olitaria. -^- Ad- Vernonia-céasretulit cl. Cašsiui, sed ab eis excludil cl. Lessing in li<n. 18^9. p. 240. Obstant enim folia opposila! Genus ideo quoad sedeni obscurum uec à recentioribus sal is nolum.

1. M. CORYMBOSA (R.ct Pav. syst. p. 195), foliis cordato-triangulaiibas, capi* tulis coi^mbosis. ^ in Fillao circuitu et \ersnris. Soffruticosa biorgyalis.

1. M. TP.J^RVIS(R. et P. 1. c), fQliis hashtis anriculalis dentato-subspinosis trinotvibiis/pediincnlis ternft lougis. j in Peruvi.^ pr.riuptis et segetibus versus Pjcoy et Huassa-Hnassi vicos. Suffruticosa orgyalis.
3. M. vENOBIISMA (R. et P. L c), foliis hastato-sagittatis den tat Li venotissimis, Vic'iYuniculiis terms lopnis. J ID Pern vie moatibis sylvatim versus Pillao vicnm. Shffruticosa biularis.
4. MJILAKCEOLATA (R. el P. 1. c. p. 196), foliisba&tato-Janceolatis serrato-dentata, pedunc*ulis dicfrpbalis brevibus. j in altis frigidis Munâ ail Tambo-Nnevo eV'Sari-iapara tractrfs. Suffmtioosa biulnaris.

DCCCLXX. ODONTOTRTCHUM Zucc. pl. nov. fasc. 1.p. 3ir.

Capit. multifloromliomogamum. Invol. cylindricum i-seriale, squa-Htie8io crecto-adpressis. Recept. pianum epal^accum glnbrum. Cor. tW)Lilos^4-5-iiidaB regulares. St:um filaift. giabra. Antli. ecaudatse.'Sligm. stiniteiefla ol)tusa. Acb*nta elliptica utrinque attenuata multistriata. J;pp'iiS' i-scriialis caducus brevis, setis inaequalihs dentatis. —Herba ^erenni^McxEcanajumosa. Foliaallerfia, radicalia, petiolala caulina'basi auricuUlo-aniplexicaulia multifida, lobis linearibus sul^tiis albido-iawatis. CapiUila corymbosa. FJores albi. —Ex babitu ad Cynareas forlè Ttlfef^ticlajf \$ed ex recept. 'omnino oudo. locus mihi dubius.

1. O. ciRsiiPotruH (Zucc. 1. c). — iu Mexico semina legit Karwinski.

DCCCtXXI. ONOP1X Rafin. fl. ludov. p.*5y.

Capit. mul^iflorunv 111 vol. ventricosum imbricatum parcè^caiycula-Hun, squaaiis'caïnatis nuicrotialis^leruinqtie spinosis. lleccpt, carnosum piloso-iiinbriJliferuin. Cor. tubidosrc inaequales5-fidae. Stigma simplici. Pappus pilosus. —Herbae r.imosin Liulovicianae. Folia piuuatilide iobis spinosis. Capilula soli tana. j.

1. O. sEHICBts (Rafin. 1. c. p. Co), caule stria to , foliis subius cano-sericeis, invol. 5(Q;imis spinoš. ? in Louisiana. Atractylis Robin voy. p. |i|i^. Klor. rtxscoviolacç. '||'
2. O. XNTYBACLUS (Rafin. 1. c), caule sultato, foliis utjjnque plabris, invol. nnar*ai*Utais icflfxis.t'K iu Louisiana. Chardon à feuilles de chicoree Ro-y. p. 428. †.

DCCCLXXII. OPHRVOSPORUS Mejen (18J4) reise i.p. 402.

Iuvol. Cainpannlaliini 7-phyllo, dupl. serio imbricaturh, foliolis liirsulis oblongo-lanccolalis oblusis carinatis 4 exterioribus. Rccc[>t. uudum puiicLaLuiu^Flosc. 6-7 £ tiibuiosi suprà basin constricti hasi globosi. Anthene huears obtus; exclusiu, lam. partc super, in-crassalis (Yilberae distinctae? ^ut^oinalae?) Stigma 2-fidum exsertnm, kciniis divaricatis ap^ce crassis. Acbacuia 5-augularia, pappo i-seriali subpfumoso. —Ad#Eupalorlc's rci'ert cl. auctor.

1. O. Tp.uNGULARis(IVIeyei].c.),frnficosus, caule striatoglanduloso-birautqdense folio!>o, foliji aliernis i>nbfasc*iculalis 3-angularibus dentato-lobatis •btc^is subtus venosis, II. peluuculalis corymbosis in spicam louguni cylindficaiu aggn^ilis. — jn prov. Racillas prov. Coquimbo Cbilensiuna.

DCCCLXXIII. PIPTOCARPHA R. Brown oh. qmp. in trans, sec. linn, lond. 7/. 12 (1817)'et uerisim. />. 121 (non Hook, et Arn.). Cassdict. 41. p. 109, et 5g. p. 342.

Capilulum multifloruin discoideum homoganiuin. luvol. turbinatum imbricatum scariosum. Recept. paleis distinctis deciduis onustum. Cor. ti;bulosae uniformes glabresB limbo revoluto. Anth'.^xsertae basi hisetse. Stigmata h'liformia acula hispidula. Acb&nia. . . Pappus i-se rialis pilosus,— Frutex Brasiliensis ramosissimus decumbens? Folia alterna integerrima subliis incana. Capit. axillaria et terminalia fasciculate glabrata, squamissessilibus oblusiiisculis encrvias texturâ unifor mibus inter se el cum rec. paleis. — De loco in scrite Uicent cl.^Brown et Lessin*, Dubilat cl. Cassini an sit Inulea sen fortè Gnaphaliea.

x. F. BROWNI. 3 • — ^Q Brasiliâ.

DCCCLXXV. PLACUS Lour.fl. coch. ?./?. 60G.

Capitulum multiUorum heterogamum , fl. ainliitus plurimis filibr mibus, centralibus paucis 5-fidis herniaphrodtlis. Invol. turbinati squama? imbricatae lineares. Recept. uudum convexum. Styli rami in radio relief, in disco erccli. Acbaenia oblonga. Pappus pilosus.— Herba? Cochinchincses erectaB ramosac. Folia alterua serrata oyata sessilia. Paniculm terminales. —Gar. ex Lour. Genus valdè incertum cum Conyzâ , Blumeâ aut Plucheâ fortè conjungndum.

1. P. TOMENTOSUS (Lour. 1. o.), foliis obtusis nt^neque tomentosis. —in Cochinchinâ spontaneus et cult us. Dicitur Cue banhit et Hoa tim. Folia Stuc^am daut odoruiu ex quo placentae couficiunlar. Flores violacci.
- a. P. LiEvis (Lonr. 1. c), foliis acaminatis glabris. —in Gochinchiffâ. Floras pallidc lutei.

DCCCLXXT. .PS1LOSTROPHK.

Capitulum plurifloruni heterogamum , fl. radii 3 ligulatis feeniincis , disci 5 tubulosis 5-deutatis hermaphroditis sterilibus. ? .Invol. cylindricum disco dimidiò brevius, squamis linearibus irunculis-ap proxinalis dorso hirsutis. Recept. planum angustum nudiun. Liguloc obovalae antè squamas sita?. Styli radii bipartiti elongati acuti, disci ramis exsertis anice capitellatis. Acbaenia pmnia gracilia \iMosa apice lamellis 2-5 molibus elongatis piliforribus pappi loco instructa , radii subtrigona, disci teuuissima. — Herba Mexican a fnulticaulis crecta basi indurata suffruticosa. Raini teretes lanati. Folia alterna linearia integerrima Janata enervia. Capilula ad apices ramorum pauca congesta. Gor.aureae.—Genus nulli vorè aiBne, Partbenium ramosissimum babitu subreferens, sed receptaculum epaleaceum et achaenia matura ignota.

- i. P. GNAPHLODES. If, \$ in Mexici ditione Sancti-Ludovici de Potosi legit Ber landier (pi. exs. n. 1336). Herba circ. pedalis. (v. s.)

DCCGLXXVI. SERINIA Raf.fl. lud. i4p. # -f.

Invol. g-phyllo patulum post antbesin connivens. Acbrerna ob longa apice calva.—Herba Ludoviciana cespitosa integra angusta , rndicalia sinuata. — Genus" potiis omittenduni, fortè ex ordine exclu vldenuin, omnibus botanicis ignotum etiam auclori ipsi, qui ex Robia umhigiis verbis genus iinxit! t-

x. S. CESPITOSA (Raf. 1. c.). (T) in Louisianâ. Krigia oppositifolia Raf. il.
lad. 5[^]. f. *

DGCCLXXVII. SYNCEPHALANTHA Bartl. ind.'sem. h. gottt. 1836. p. 6.

Capitula sena umbellnto-capitata in glomerulum aggregata , centrale
discoideum, peripheraenca radiantia 1-2-ligulata. Invol. proprium 1-se-
riale J-phylfim. Uecept. birsuto-fimbrilliferum. Achxnum erostre
telraggio-compressum. Pappus i-serialis, paleis in selus scabras in-
aequales fissis. — Ad Senecionideas Tageteas juxtlâ Boeberam refert cl.
auglor, prseserlim ex foliis more Tagetearum pianatipartilis et glandu-
ysis, sed genus noo salis notuin.

1. S. DECLPIENS (Bartl. 1. c.) — in Mexico.

DCCCLXXIIJ. TRIMETRA Moc.f. mex. ic. irted.

Capilulum multiflor[^]m radialum, ligulis 1-serialibus fuernineis,
disci tubulosis hermajrtirod. 5-tlentatis. Iuvol. campanula turn biserialis,
squnmis exter. 5-6 iöJfaceis mucronatis laxis , inter. 5-6 membranaceis.
Rtcept. yaleaceum, paleis obovato-oblongis. Styli in radio bifidi, in
disco irifidi, ramis exsertis gracilibus revolutis luspidis. Actfcenia cylin*
dracea giabra. Pappus mcinbranaceus coroniformis 4"5-dentatus. —
Suiirutex Mexicanus ramosus glaberrimus carnosus. Folia opposite
sublriquclra mtegerrima erassa. Bulbilli carnosi ovales ad axillas f'o-
liorum et ramorum. Capful a terminalia brevissimè pedunculata solita-
ria Jjava. —Genus ip[^]e non novi, sed ex icone nitidissimâ et ob struc-
turam in ordiuc spectabilem praeterire nolui. An in Eclypteis juxta[\]
ftDrrichiam, an in llejiopsideis collocanduin ?— JNomen ex TQI ter, et
~~μωτρα~~ fiiva , alludit ad stigmata disci terna !

x. T. FICOIDEA (fl. III ex. iaed.). ^ in Mexico. Aterocapati Hern. mex. 33 et
34. ic ?

--J- *Genera nominibus tantium jnihi nota.*

GoaifsiA Lallav. reg. trim. mex. 183a. p. 40. non Brown.

KoANorHYLLUM AiTiida ex Kost voy. bres. f. p. 496.

LASIOCKPHALVS Schiect.? in berW mag. nat. fr. 1818.

OTEfiA ^allav. reg. trim. mex. E8\$2. p.4r.

MANTISSA COMP05ITARUM.

Trib. I. VERNONIACEJE,

V.p. n. lin. 35.

*a. OIOSPERMLM WIGTBTIAKLM, *adde* : DC. in Delew. ic. seJ 4. I. i.

'V. p. 12. lin, 4.

1. SPARGAXTOPHORUS VAfLLANTii, *adde*: in ins. Cnba (la Sagra !,

V.p. |i.tin. a'fine 14.

ETHULIA COAYZOIDES. Vdr. A etiani in Syriā legit cl. Aucher-Eloy pi. exj». n. 32/45.

V.p. a4./n. 28.

5i. VFRNONIA CINLREA, *adde*: in Arabia? felicls vdlle Fa I me (Scbimp !). CrusiiOcephalum Fatraense, Hochst. et Steud.! pi. Scbimp. n. 869. (v. t>)

V.p. a5. lin. 45-4^.

57*. V. DEWDIGULENSIS , fiutico^a, ramis villoio-pubescentibus, folns oblongo-lanceolat^otis snbacuniinuis basi in petiolum bie\em villo&nin nliennatis suprà bispidulib subtùs plus minus pubescentibus >en<tr>, setrnturis nuicronalis , co-1 y 111 b'b composito undo, invol. cnpulati squaini:> oblon<is snbpungenti-mucro-uatis versùs apires hirsuto-pnbesrenibus, achaenio glabriusclo, pappo exter. brevi paleaceo. —in iuontibus Dendigul Penlnsul.c [ndicae. Vein. Candolleana Wight cat. n. '1609. Wight et Arn. png. n. 95 non Mart.

V. p. a5. adcalcem.

58*. V. HOOKTRIANA. (Am. pug. n. 97. Wight! in Int.), canle herbaceo ererto ramoso breyissimè pubescente snbstriato, foliis ovato- vel oblongo-IaiiceoLitis iicuminatis in petiolin attennatis suprà glaDris subtùs pnllidis pubescentibns serratis, serratuuiis mncronatis, corymbo LJO composito nnndo, invol/ hemi-spbaericu squamis linoari-oblongisobtasiusculismfnulissimè mueronatin pnbe#sc- centi-villobis, achapnio glabriusclo , pappo ext. bievij»simo. —in Zeylouae montibus alt. 1000 bexapod. Af 11 rib V. conyzoidi,sedinvol. praecipnè disticta. (v. s. comno. H cl. AVigt.)

V.p. 25. adcalcem.

58**. V. SETIGERA (Am. pug. n. 94), snffmticosa?, ramis teretib'is viloso-pnbcs- centibus, foliis o\atis longinscne pelioLus & uminalis sriraTi^ supr;i hiisutulis subtùs pallidis subviloso-pnbesoonribus, coiyinbo polycep.ilo undo (ompo- silo, invol. tmbinaii j.qudmi6 doiso paire pilu-is ldnceolalo-lincaibns in seiarn junocnam longe iicununatib, infer, .ipire srriato-cihatis, aehaen. gl.ibiinscnlis, pappi sev. exter. bievissimâ. /) ?iu Zejlonâ. Afiinii dicilur Y. conjzoili.

'V. p. 26. xid calcem.

64".y WiGiiTiANA'Ain.png. n 92. non Wdll),fiulicosa, caule tereti fnmcnoso, foliii ellipticis obtusi>in petiolum angu^litis sppij parcè %illo*o-pubescentibn> quibtus albido-toinentosis lepando-dentaiib, demil>i, api nl<lis, ron mbo rr- ininali nudo dcnso, capitubs pednnculritis mnliiflois, podnnctflis !,qji..raatis, iu\ol. bcn>is)ba?ico toinenloso, squ.imis lanreTiatis <icuniinatisacl.i>iiio gldbio Mjbpresso inaequ.iliter 4-qaelrcTbasi paulnlüm .ittenunto, papps ext. bie\i snbp.ili-árco. , ^ in Zeyloni. Affmis dicitur V. Zrylonira* sed ioiā his' xnp pen- d icu laid.

'V. p. 29. post lin. 4.

75*. V GOCHNATIOIDES (HooJ^tet Am ' ex specim missa 1836), fruticosa glabra, lamalis angulato-striatis ^Bliis superioribus linen n-oblongis basi attenuate remote et paice demdatis subcouaceis uniner\ns eglandulosis, cyniâ confertâ oom posit'a polyrephala, invol sqnamis obtusis, ext plnnseiialibas brevibnsim- Liicatis, pappi seie exter bPtfiformi. fit in Bonana' Affinis 'V uitidul<e, ut jam Mispic. cl anctores, ct 'V. lucidae, sed certe distiDeta. Pappus albidas (v. ». comro à cl aacf.)

T. p 3i.post lin i|

89* 'V FUKCTICULATA, fruticosa, ramulis teretibus stiatis pnberrhs, folnsbreviter petiolatis ellipticis utunqtie acuminatis ntrinque glabrinculis subtus minute punctulati* wargine subievolutis dentalatis, capitulis pedicellatis coiyombo&is, biacleolis rainimib acatis, invol squamis minnte pbnes>ceniibns o^ ali-oblongis obtusis vix raocronuIatJs snbener\ns, aebsemo glabro. ^ *" ZeylonA legit cl Wjker 'Vem pectinifoimis var. Am' pug n. 93. Affinis "V punctatje prae-serUra et m\ol forma sed ceite cai indir. distincta. (v. s comm a cl Wight.)

V. p. 31 hn. 31, pappo nee rufo, lege • pappo albo nee rufo.

V. p 38. hn 36

132 | ODORATISSIMA, adde: in Guiana Anglica (Schoinb. !)

V.p. 44 lin 43

167. *V. BKKVIFOLIA. Hue ex speciu videtur referenda 'V. eiicsefoha Hook, et Am '

V. p 6a. post hn 5

ifj/* V SCHIMPERI, Miffrnticosa , canle tereti ramo<o, ram is cano-\elniinis, folus oblongis basi attenuatis a pice obtusi& integris suprà Mibvelntims, corymbo laxo oligocepbalo, pedicellis vix bracteolatis, invol squamis breviter appendiculatis, acbecniji puberolc-subhispidis, pappi sene ext. brevi setifoimm j m Tupibus mentis Cara man Rubio confims in Arabia felici legit cl. Scbimper¹ LupajMium? 11 86 Hocbst et Steud ' un. ititi Stigmata elongata hispida et pappi s>euies ext bre\is genus deraonstant (v. s.)

V. p. 63 Itn. 29-30.

27 V* ^ ARKA.NSA.NA, caule berlaceo erecto simplici &tiato ^nfernè glabro snperne cum ramis corymbi puberolo-birsntis, folnssnblanceolato-hnearibns acminatis seirul.itis superne punchculati& subtus j>ecus nervum hittellis, corymb<um bell a to cue xo cephalo , ceutiah sessili, caetens pediculatis, invol squamis nuroeiosissimis in appendicem subulatampiductis, achaeuio btriatо glandoloso et puberulo — in agro Aikansano ex senuoibus a cl de Pourtales lectis culta. Ioha5poll Ionga, 5-7 liu lata Capit nullillora subsphaenca. Cor purpareo-violaceae Pappi series ext bievissima. (v. v c. in. hort. genc\)

|.p 67 hn 1

3 DECANELRUM MOLLS, adde DC in Delejs* IC sel *». t o

'V. p typostln, 12

2*. D pnYLLOLiENUM, canle berbaceo erecto glabrincllo,f oliis oxatis aenminatis grosse senatis suptn sparse pilosib subtus tano-iomenroMs, sDperioribus brevis-Mme inp< fiolum atteuuati>, capituli* ad apices raiuorniu sessiibns aniphssime biucieaiis, biacteis ct iuv sqnamis extei basi cibatis, inter acuminatis. — IQ Indid 01 lent enca Bombay legit cl Poljtlor Roux' Pioxinic (nimis forte) accedit .id D. mollr, sed pra-fei caiact indie, differt capitulis dnplo majonbus, l)iac:eibsiuis triplo et ultra Lievionbus, pappo iufo,etc. M s a oomm. cl iuv)

V p 68. ad calcern

»
13. D ' SCARIOSLM , finticosum , rain is pilis pnrpmeis patentibos huwtis, fob is ~~otrau~~ ntimqiie acuminatis gio&sc mQiuato j.enatis baM integer mui't Mibpe-

tiolatis sDpra hispidis subtiiis palhdis birsuto-pnbescientibns, corymbo oligolepbalo nudo, capitulis subsessilibus, invol oblo[^]gi squamia mncronato-pungentibus subsiauosis, iDtimis linem-oblongiH ^ in Zeylonâ. 'Vtrnonia scario[^]a Arn.' pug n. 97. Me'dia intei Yernoniani ct Decaneurnm Achatnia distmcte 10-costata basi attennata glabia Pappi set ext. jlbida c«dacijsjm« ant nulla aut decidaa minima. (v s coram a cl. aact.)^

\. p. 72. hn. 13

WEBBIA, adde • DC nou Spadi Centre sab eodem nomine à cl Spach eodein anno ac nostium propositum , \ix ab Hypeiico distinct am videtur.

V. p. 73. hn. 4

4 W ARISTATA , adde: DC. in Deless ic. sel. 4 * 3

'V />. 76 hn, 18.

a. STII pifOPAPPUS PRATEKSIS. HDJQS vai magis incano-tomentosam legit cl. Blancbet in Brasilia \alle di Barra pi. Acs. n 2672! (v s.)

'V. p. 80 hn à fine 3.

1 ALBEITIHIAS BRASILIEITSIS ,adde DC. in Deless. ic sel. 4* '• 4-

"V p. 82.'/m. 16.

9. A EHYTHROPAPPA, adde ' DC in Deless ic. sel. 4* t 5.

'V. p 85 hn. 7

i. CHRESTA SPHJEKOCEPHALA , adde - DC in Deless ic. sel 4. t. 6

V p, g3. hn. ag.

1. CEHTAUROPSXS LAICUGINOSA, adde • DC in Deless. ic. sel t 7

"V p 94 lin. à fine 8

LIABEJE , adde caract ' Tiiamenta laevia

V p. g5 hn 3g, adde •

Cl Lessing in linnaed 1831. p 696 foite non unmeritu , in diss inca#le'aide oini*>sa, Anikonldcbiam ad Liabum lednxit ct ideo synonyraa seqtrentia no&trik speuebus addenda.

AXIDROMACHXA. GRANDXFLORA = Liabom giandiflorom Less. 1. c. p. 698.

A. iGiriARXA. = Liabum igniarium Less 1. c. p. 701.

A. SOLIDAGINEA. = Lidbum solidagineum Less p. 700

A. VKRBASCIFOLIA. = Laabam veibaScifohom Less p 700.

A MELASTOB[^]OIDES = Liabum melastomoides Less p 699.

A. WUBIGENA. =;Laabnm nubigenuin Less p. 704.

A. sESSiLiFLORArzLiabiiinsessiliflornni Less p. 703

A. VOLDBILIS. = Liabum volubile Less. p. 704.

V. p q6. post hn. 40 , adde :

Sect. in. PLATYLEPIDEA. - r Platylepis Less, in linnad 1831. p. 401

et 704 non Rich, nee Kunth.

Capit. multi-circ 3o-florum. Invol sqoduia; lata» intimse obtusissnnae.

8*. AI?DROMACHI\ DEPPEAWA (I ess in lmnaM 1831. p. 401), fruticosa, ramn folnsque oppositis, Folns peliolatis tiplinei\ns snpia glabriuscuh sntbs mveo-lomenlosis elliptico-lanteolatis mncionato ieriatis, pamcnla fnstigiata. fy in Mexici regioue tempeiatâ ad -Cuesta grdude del Jacingo. Capit magn. Senecioms palustns Ovava illqsa

\ p. 97. ad Im. à fine 3, adde

i A< OSMXJS synonymis adde Clairv'il ea DC pi oil 5 p 636 — Cacosmia I ebs in linnara 1831. p jo5.

Clairvillea nostra quinqnenervia ex beib. Doinbeyano ficta est & pl.inta quaia cl. Lessfng ad calceni descii suse indicavit Diffei t a Cacosmiâ rugosâ H. et K piaecipue tomrifko densi >ri tiiveo. ramis inflorescentide band oiuninò perfectae omnibus abbieviatis, piimams quam folia sua brevioibus An var ? An species prop illi ?

V.p. \$7*post hn. 21.

2* LIABUM HORIBUNDUM (Less in linnaeâ 183r p. 70?). caule herbaceo , lamis oppositis gliitnosis, foliis petiolatâ ttiangulaibns acrainatis'mncronato-seirulatis supiâ scabiis subtûs laxe tomentosis, stipnlis roinndatis denticulatis. — piope Cuecam Quitensmm. Pamcola suprà decomposita Acbscma pilosa

"V. p. 97. post hn. 32.

§. 3. *Foliis sparsis.* — *Stenopbyllum Less.*

5. L. ERICOIDES (Less, in linnaeâ i83i. p. 704), fmitcosa lamosissima , lamis snpeine toinr*utosis ad ap*ccm usqoe*dense foliatis, foliis sessilibus confeitis lineaiilms margine ie|olutis et intcgcrmuis supiâ lucidis subtus tomentosis, capitulis holit^uis. J in Peimia Conyza encoules Lain. diet. 2. p. 92 Willd. sp. 3. p. 1934. sed A Vernonâ eiicoide Less, diffeit.

'V.p. 106. lm. 7.

Adenosteraraati, lege : Gymnocoroni.

•Trib. II. EUPATORIACEM.

V. p. 106 lm 9.

1. PHALACRJEA LATIFOLIA , adde : DC. in Deless. ic. sel 4. t 8.

'V. p. 106. post lin. 34.

3. GYMNOCORONTS SPILANTHOIDES, fohis elongato-lancolatis hasi caneatis brevissime petiolatis, coiollae tnbo puberalo. — in agio Konaiicni legit <1. Bicle! (pi. exs n. IOQ). Alomia spilauthoides Wight et Arn. in lilt¹ i83b Ueiba 'glabia. Folia snpeiioia 5 poll, longa , b lm. lata, 1 emote calloso dentata Stigmata longe exseitu , a pice clavata, alba. Cor. b re vissinie 5-denta1a, dentibus conniventibus (v. s.)

'V. p. 110. lin. 7.

1. ANISOCH^TA MIKANOIDES , adde : DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 9.

'V. p. i n . hn. 39-40.

9*. ADENOSTLMMA ANGUSTIFOLIUM (Ain. pag. n. 98), glabrum , canle 'erecto subtetragono simpliciisculo, foliis petiolatis hnean-lauceolatis ntrinque attenuatis à medio ad apicem paucidentato-seiratis batli integerrimis subtunerviis , pamcula laxa oligocephila , inv. squamis linearis-oblongis obtusis Levibus glabiis, acbaeniiis (Inimaturij,) obscaie glanduloso-tubcicñlaiis. —in Zeylonâ.

'V. p. 112. hn. 29.

1 j . A. RUGOSUM, adde : DC. in Deless. ic sel. 4 .t ¹⁰

'V. p. 114. hn. à fine 5.

PHANIA MULIICAULIS, adde : DC in Deless. ic. sfl. 4 t 11.

'V. p. 124. hn 10

3 iAi*AFoxiA TEX ANA , adde: Hook. ic. pi. J. I. 148

V;/>. ia6. post lin. 6

3. AGRIAKTHUS COIVYMB&US, foliis obovalo-cuneatisapicecrenatis supeinc glabris subtûs leticulatis secus neivulos bnsutulis, "coiyombo polycephal<j t pedicellis folia dnplb supei.tntibus subiamosis toinenlosis , biacteolis paivis subulhtis. 5 in Biasilia Bahiensi in montibns Jacobin^ diclis legit cl. Blandiel pi. exs. 11 2535' Specie* distinctissima et sectionem propiiam (capit. pedicellate uec

scsilibns) in gencre formans. Rami striati hispiduli apicc hirsnti. Folia 8-9 lin. longa, 3 lin. lata. Cor. exsicco albj^se. (•. s. comm. à cl. inv.)

V. p. 126. post lin. 31.

1*. KUHNIA ARABICA (Hocfa.st. et Steml.! in pi. arab. n. 863.), caole berbaceo ramoso , fblis linearibus hinc hidè subdentalis cauleque minutè pubel>centibns, corynibus oligocepbalis laxis. (f) in monte Gessel- ad pagmn 11 a ram es in valle Fatnie Arabia; felicis febr. flor. legit c!. Schimper ! Radix simplex. Herba 4-5-pollic. erecla. Invol. squamae acnroinatae. Cor. purpureae cylindracee. Stigia nonexscrtum ! Pappi seta? basi prasertim valde'harbatze. (v. ss! to in in. ab union, itin.)

'V. p. 127. lin. x.

5. K. VILLOSA, sp. synon. adde : Scblect, in linnacâ i83^. p. 3.

*V. p. 127. lin. 4^-48.

LXXVI *. CAHMINATIA Moc. fi. mex. ic. ined. DC. in. Deless. ic. sel. 4. t. 98.

Capitulum paucifloruni. Invol. cylindricum, squann's io-i'2 subimbri-catis linearibus acuminalis slriatis siccis , ext. hrevioribus , int. corollas lequantibus. Recc]t. anguslum nuduhi. Cor. lubulosae vix apice bian-tes, dentibus vix ullis. Genilalia inclusa. Anthérac concretx. Achaenia prismatica 5-gona eiongala. Pappus setis 10 longè et eleganlissimè plu-inosis mollibus albis. —Ecrba M̄xicana annua erecta glahra.simplex aut oppositè vamosa. Folia opposita peliolata ovata grossè deniata pa-pyracca. Racrmus clongalus capitula solilaria aut subfasciculata brcvi-UT pedicellula gcrens.. Cor. ex sioco subrubentes. — Gvnus dicatum cl. Carminali qui dc materia medicâ benè ineruiL. AiTine Liatridi et Kubniic. Habitus Ainslieae.

1. C. TENUIFLORA (DC. 1. c.)• (T) iu Mexic! proT* Leoniuâ ad occid. nrbis Guanaxmalo Iegil cl. Mendcz.

V.p. ia8. lin. II.

2. CLAVIGERA SCOPARIA , adde : DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 12.

V.p. ia8. lin. a-i-a3.

DTSYNAPHIA. — Genus novnm? Hook, et Am.

Capitulum 5-florum. Invol. biseri^le, squamis lanceolato-luearibus apiceacumina'tis, 5 inter, erectis , 5 exter. laxis vix brevioribus. Rcept. aDgustunt niidum. Cor. fere' cylindraceae 5-dentatae. Sty li rami elongati vrldè exserti.-Achaenia 5-gona obpyramidata. Pappus biserialis corollâ pauhiliim longior, setis ntriusj(ue scriei conformibus scabris. — Herba habili Kulimæ sen CUVigerae , pube brevissimâ veliitinb-canescens. FoKaalterna linearia inlegerrima utrinque punctata. Rami ad api-cem paniculato-corymbosi, et involucra velutino-lomentosa. Cjapit. pediceilata. Corollaj et setarurii pappi apices purpurascentes.*— Nomen clif duo el o-uvctpua, scries, ob involucri et pappi duplcam seriem.

1. D. MOHTJKVIDENSIS. If.? cii^a Monte-^Video. Eupatorium ? calyculatuiu Hook. et Am. in litt. i836. (v. s. compi. à cl. ancr.)

y. p. i3o. lin. 3.

7. LIATHIS SCARIOSA , adde : in agro Arkansano (Ponriales!).

V. p. i33. post lin. 8.

4. CARPH^PHORUS CORIDIFOLIUS, ranle frnricnloso erecto inferne glabro p.'ice ra-moso, foliis conferfis linearibus inteperrimis j'lbris, capitulis racemosis patici?i, pcdicelliA involcerisque pubescenti-birtellis, squamis Janceolato-Hnearibns 3-ficrviis. j in Brasilia ad Sena do Frio in pro\l. Minainm gt-ner. Irpil cl. V*|i-

tbier! pi. eis. n. 3i4- Accedit ad C. revolutifolium et aterque habitu Liatridis villosae gaudent. Folia vix revolnla ant soblùs longitudinaliter sulcata, 7 lin. loDga. Pappi setae seiratae. Recept. paleoeHj^ares paucae. (v. s. coinin. à cl. iuv.)

y.p. i33. /m.ao.

1. DECACHETA ILEHKEAITA , adde: DC. in Deless. ic. sel. 4. t. i3.

V.p. i34- lin. 27.

4. OOCLINXUM SXDURXTIS, adde : DC. in'Deless. ic. sel. 4. t. 14'.

V. p. iZS.lin. 37.

4. COITOOLNIUM PRAsiiFor-iuM, adde : DC. iu Deless. ic. sel. 4. t. i5.

'V.p. 137. lin. 3i.

3. CAMPULOCYCNIDM PALUSTRE, adde: DC. in Deless. ic. sel. 4. u 16.

'V. p. i38. post lin. So.

4*. BULBOSTYLIS RETiculATA, suffruticosa ramosissima tola brevissimè ~~velutina~~, foliis oppositis aut subalternis brviter petiolatis ovali-oblongis integerimis snblytyleivis elevatis reticulatis , capitulis et axillis foliormu solitariis pedicellatis racernos idtò foliosos constituentibus, invol. squamis imbricatis acuminatis striatis. ^ in Mexico legit cl. Haenke. (v. s. couini. à cl. de Sternberg.)

y.p. i38. lin, lufine's.

5. B. PEDUNCULOSA , adde : DC. in Deless. ic. sel. 4. t- 17.

V. p. i3g. lin. 4.

5\ B. LAKTATA ,«caule suffruticuloso erecto tereti parcè ramoso lanato, foliis oppositis brevitei petiolutia ovalibas grossè et inuncronato-dentatis utrinque lanuginosis reticulato-nervosis, capitulis in axillis solitariis pedicellatis subracementis, iuvol. squarais imbricatis striatis gla))ris, ext. obtusis ciliatis , intimis linearibus eciliatis, achaeniis tereti-striatis villosis. ^ in Mexico ud occidentem urbis Guanaxuato legit cl. iMendez! Species distinctissina Stachydem Geimanicam lanugine alba referens. (v. s. coinm. à cl. inv.)

y. p- 13g. ad calcem.

12. B. tniANGULARis, caule berbaceo erecto tereti petiolisquc higutulis, foliis oppositis petiolalis acutè triangularibus dentatis basi*<5-5-5**erviis, pauculat terñinali laxa, invol. hqaamis acuminatis, recept. præsertini ad margines paleas linen res elongatas persistenie^ gerente. — in Mexico legit cl. Haenke. Habitus II. &pinacia?foliae sed ali hac et ab omnibus differt recept. scmpaleaceo! Achaeua acutè 4-5-gona glabriuscula. Pappus i-serialis setosus. Cor. in specim. malè servatiu videutur geucrico car. conformes. (y. s. 'comm. à cl. de Sternberg.)

i3. B. DIFFUSA , caule herbaceo erecto tereti glabro , foliis oppositis petiolatis rhombeis acuminatis dentatis glabris, paniculat elongata laxissimata , pedicellis capillaris, invol. squamis acuminatis, exter. breviribus, achaeniis glabris. (i) in insulis Cubà (R. de la Sagra!) et Trinitatis (Lockart!) et in Mexico ad Tampico dcMaiuanlipaH et Real del Monte (Berland! n. 270 et 2144). Herba circ. aped. Cor. pallidè vix basi dilaratae. Oenit. inclusa. Invol. squimce de more generis siriativ. Hue refer. Eupatoriuni diffusuui 'Valil. DC. prod. 5. p. 174 cum omnibus synon. et habitat, (v. s.)

y. p. 143. lin. 43-46.-

i3^Y. EnpATORIwi SUBVELUTIWUM, frnticosunt, ramis ramolisque teretibas tenuissiuè breviter et conferte velulinis , foliis ovali - oblongis in peiolin brevem attenuates subniplinerviis remotè dentatis snprà glabriusculis subtùs hirsuto-velutinis glanduloso-punctatis, capitulis pedicellatis ad apices ra^mlorum 3-5 subcoryuabosis cylindraceis 20-iD-floris, invol. squamis sircè imbricatis obtasis striatis glabris, achaeniis acutè pentago'nis glabris. J in Guiana Angliru

MANTISSA COMP0S1TARUM: a6g

legit cl Schombuigh' Kolia 9 lin. louga , 3 lin. lata. Invol. pallida 3 hn. louga.
Stigm longe exserta {v. s. comm ab amic Benthami }

13**. E. SchlkchiENDAiⁱⁱⁱⁱ, fi uticosutn, ramis teretibus striatis pills subglolinosis scabiidis, fol^s oppositis breviter petiolatis ovali-oblongis ntiinque acuminatis medro senato-dentatis tephnerviis supr^ pubeinlis subtus feirugineo-pilosis et glandnloso-puriclalis, panicula rotuudat^ trichotome raniosa, capituhs sub 20 flons cyhndnus, invol squamis apice birtelKsimbncatis, ext. obtusis, int acuminatis J "i^silia Mikania lesinosa Spreng syst 3. p. 423. DC piod. 5. p. 190 ex Schlect. in liniKeu 1837. p 10. Ab Eupatorio lesinoso omnino diveisuin.

y.p. 146 lin 6-7.

30*. E. MARTIUSII, frnticosum, pubeo-hiisutnlam, lamis oppositis teretibus, foliis oppositis ovali-oblongis basi attenuate biewtei petiolatis apice acutis remot^ senalis tnplmeewis , capituhs pedicellatis subteims corymbulosis circ. 12-ilons, in\ol cjl nduci squamis dois^ stiatis, ext bieionbus obtusis, int. longionbnscaloso-subacntis 5 in Biasilia Mart ! herb fl bias n. 270 text, nonduin edito Folia poll ice in longj, 4-5 hn. lata. Pedicelh et capit. 3 lin. longa. Stigmata longc exserta. (v.s. comm. a cl. Marti as.)

"V p. 1^9. hn. 32-3J.

53*. E. TREMLLUM (Hook, et Am ' vp. litt. i836), frulicosum glabernmnm , toliis oppositis liuc.iubus basi altcnualis apice acuminatis distinete titnervi'A senalis subconaceis, pamcula polycephal^ lamosa, capnuhs pedicellatis 5-flois, invol. squamis hieau-oblongis oblusisimbcatis. ^ iuagio Bonaiensi. Afiine E xylopyllonh, sed folia dim id 10 cue. bievioia, 3-4 hn lata , nei'Vis 3 paiallhs instiucta nee leticulato-venosa (v. s. comm a tl auct)

"V. p. 149. lin. 3g-4t>.

54*. E. VAGATUM (Don niss ex Arn ! in litt 18J6 nou Srbrad), fiuticosutu glaberumuun , ramis teittibus, foliis alteinis lineaibus snbconaceis integeuimis ant (ex Arn.) piuntftifidis, pamcula Ltx^ polycephal^ , capituhs oblongis 5-llois longiuscule prdicellatis, invol. sqnamis hneaii-oblongis mhs imbucatis , styli umis longissinus acutis J in Aiuci. anstialis Ilio Uiguay, et teste cl. Airott in moutibus Mendociams. Acluenia J-gona glabra. Pappus achsemo duplo feie lougioi#(v. s comm. a tl. Hook et Am)

"V.p. i5o. Ufa. 23.

5§.V&. ERICOIDES , adde • syn. Chiysocoma Megapotamica Spreng. syst. 3. p 424. ex des'i. eximi^ cl Scblectend. in hnn 18^7. p. 0 ab Eupat. Megapotamica •uiuiuo diversum

V p. |5| lin 26-27.

84. E. PALLSCE^S > Bonarfense, fobis ovati-* , infei. subobtusis, supei bievitei acuniinati", supia pubescentibus, subtiis subTillosis , capjt nfioiis. ft CHCA Buenos-Ayies Eup. pallidain Jook et Am ' in litt i836. folia ut in tt et fc tnplineivia. Rami apice buauli. (v. s. comm a cl auct)

"V.p. 1 54. hn. 26 27

84* E. siLPHinoLiM (Mnt hcib. fl bras. u. I'.O), suffFinlieosuin ?, ramre,tetebus temiei pubesceotibus oppositiobiB divautalo-ramiilosis, fobu, petiolatis subjotutidiset ovato lanreolato basi bievitci ciLU.itis apicepuu,. superionbu< acumualis tuplinrvns grossedcntato-scuatis undiqau glabus subjusadueitoi tenuissiue pubescentibus, coiymbis confeitii polycepahs, capit. bievitei pedicellatis 7-9-Hoiis, iuv squauns o\ab-oblongis obtusiu&culi^ stiialis glabriusculis laxe irabiicatis. J 111 Biasilia: sylvis. Alflnc duitni L. pallescenti

V. p 164. hn 6-7

148* K. DAYADIUM, bcibactnni, laniis stuato suh ulalis leieibub baud lato lursus angnlati tenaissune et molhtei pubescentibus apice fusceocenti-vcluti-

nis, l'araulis erectis, foliis oppositis long(?) petiolatis subrotundatis vel ovato-triangularihs acutis n^argine serrato-crenatis suprâ glabris asperis suhlùs pubescenti-tomentosis, paniculis confertis polycephalis, capitulis breviter pedicellatis subglobosis b'rvo-floris, iuv. laxè iubricato, squainis striatis acutiusculis glabris, ext. brevissimis. fr. in Brasilia sylvis. Eup. popfalfolium Mart. herb, fl. bras. n. 13p non Kunth.

V. p. 168. //a. 33-34.

168*. E. TOMENTELLUM (Schrad.! ind. aeni. h. gcett. 1833. t. 3. DC. prod. 5. p. 184)» frutescens, rainis teieii!»us, petiolis foliisqne subtùs pube brevi conferta velutinis, foliis oppositis petiolalis ovatis basi subtriangularis apice subcordatis late et breviter crenatis saprâ glabriusculis, corymbis trichotomis polycephalis, invol. squamis siit>ae(jialibas acutis dorso pube.sceatibus, capitulis 18-20 floria, at-haeniiM pentagouis subpilosiusculis. ^ in Mexico. Spec. E. Kustameuta a/Hin. Ex cl. Schrad. folior. radicalium laminae obovato-oblongse, caulin. subcordatae. (v. s. c in li. goett. com in. à cl. auct.)

y.p. iO8./m. 2-3.

174*. E: CAHOOLLEAKUM (Hook. et Arn.! in'litt. 1836), suffraticulosum ?, caule tereti rauoso pneserium ad apicem cum petiolis sparse hispidulo-scabris, foliis oppositis petiolatis lanceolatis acuminatis basi breviter cunealis triplinerviis grossè deustaio.serratis subtùs puuctatis seciis nervos scabriusculis suprâ glabriusculis, corymbo 7-8-cepbalo it regulari, pedicellis hispido-soabris, capitulis subrolundis circ. 3o-floris, invol. circ. biseriali squamis linenribus acuminatis, achaenias glabris. 5 *p.>n agro-Bonariensi inter Rios et Rio Grande. Species admodum ex cl. auct. variabilis quoad foliorum magnitudinem et forram. AffinisK. sor-descenti. (v. s. coimm. à cl. auct.)

V. p. 170. lin. 4.

188. E. kxkVSK^adde: Anb. llor. et pom. 183a. t. a3.

M.p. 183. lin. 14.

179. E. MEGAPOTAMICUM. Confer descr. à cl. de Schlectendal ex speciu. Sprengeliano in linnaea 1837. t. i5. cditaui.

y.p. **183. lin. 3o.**

283. E. PERRINIANUM. Conf.'descript. cl. Schlectend. ex speciu. Sprengeliano in linnaea 1837. p. 6. Differt ab Eupatoriis reliquis anthera^um lobis basilaribus non rotundatis sed suhnato-acuminatis.

'V. p. 190. lin, it fine 3.

7. MIRANTA LUNDIANA , fruticosa glaberrima scandens, ramis teretibus striatis, foliis petiolatis ovali-oblongis, saperioribus acuminatis' iutegerriuiis subcoriaceik triplinerviis,, panicula terminali composita laxa^, raniis opposilis patentibus, ~~capitulis sessiliis aut brevissime petiolatis, inv. aqua mis ueqnalibus cuneiformibus apice obtuse truncatis.~~ f) ^>in Brasiliâ legit cl. Lund! ~~Affinis M. acuminata, sed glaberrima, folia coriacea miuus acuminata vix transverse rugosa, etc. Differre videtur~~ a M. houstonis vix nut à capitulis Mibsexsilibus. (v. s. comm. à cl. inv.)

%**. M. ACUMIHATA, fruticosa glabriuscula scandens, ramis teretibus, foliis petiolatis ovali-oblongis acuminatissimis integerrimis subtùs ramnlisqne tenuissimè pubescentibus triplinerviis et pebninerviis, panicula terminali composita laxa pncrulâ, ramis opposilis patentibus, capitulis breviter pedicellatis, inv. aqua mis ueqnalibus cuneiformibus apice obtuse truncatis. f) ^>in Brasiliâ legit cl. Lund! Folia 3 poll. Tonga, 8-10 lin. lata.(v. s. comra. acl.iuv.)

2S. M. SELL'OI. Conf. descript. eximia in ex ipso Sprengeliispecim. » cl. de Schleotendal delineatam. (in linnaea 1837. p. 13.)

"V. p- 19^-post ihK 1 a.

33. M. ELTIRTICA , frulicosu subscandens glabra, ramis tcrelibus vix striatis, fo-

lisis petiolahsellipricis basi subarutuinatis apice oblnsatis integeiutin venoso-retitiilatit, pamculā oblongā polycephala', lcfniis oppositis, capitulis brrvjtei pedicellatis umfe'itis', bracteolā imol bie\ioii et inv. squaruis obtusis apice ciliais, jchaemis glabris /) f in Biasilia Babirnsis montrbas J.icobinx dictis legit rl lilanchet¹ Affim& M. buddleiajfolue «ad glabntv (except. paruenJae rani ul is) per fecta et notis indicates facile diffei t (l. s. comm. a cl. iuv)

'V p 200. Un. 6.

go. M. ruBEscEws, *adde pharsi speaficce*: foths alrinqae pabescenti-\iljosis et locis natahbus : m Lndovini legit cl Tejntuiiei ' Iteiato examine Fupatouum scatulens Walt, ad Mikamamscandeutem n 89 necadpubescentem rcfereyduum.

'V. p. 190 et 203.

1. M. REhiNosA, teleatnr et p 203. speiiebus exclus. inter lin. 36 et 2, adda-tnr. := Lupatonuin Schlecteudalii

'V p. aoi. hn 5.

in IVI ntNiATA. Obsen el. de Scblectendal (mlinnaea 1837. p 12), bac species, a Spiengelio pesbiinedesiuptaet^: geuui excludenda, videim aut Calea pinualifiria piod p 6-4> dU^t SP a^nis

'V p. 204 hn. i>

3. ADENOSTYLES TBUCOPHYFLA Eamdem , m f.iloi, in Olympo Bytbimco legit cl. Anchei n. 2429!

y.p. 206. post hn i5

4*. NARDOSMIA GMELINI, folus ovatis oblongisve vix dtuiis ba*i subacnnimatj* sinuato-denlatis ddulhssnpia glabris snbtu^ niveo-toiiientovis, scapo bi.icteato i-3-cephalo % in Dabuux saxosis intei liknstk et^flum Biela (Guil), miei Aldan el Ochotsk ^luitz \ Folia scapo multo longiora Pi m istula scapo simpliu i-cephdlo, foem. longlor tnfadm J-cephal 1.1<dores albi Peidicum popuhfolum Smith in Refts cycl "V 26 n 4 ei syn lussilaco Cmelini, Taicz ' in lilt*iSj*5 lusMlago n. 122. Gniel il sib. 2. p 141. t 67 f. 1. (l s 011111 a <1. IIIIL/.)

'V.p. ^07. hn 48

2. ADLMOCALON CHILENSL, *addc* v'sx, Chili austi. sylvis Alpmis ad Antuco, Poepp. coll. 3. ii'i. (v. s.-jine floi.)

Trib. 111. ASTEROWEM.

y p_m 216 adcalcem

1*. HETEIXOTHUAMUS SPA RTIOI OH^ (Hook et Am ' in litr. iWO, foliis lemota mirumisfaquoamiforibus acentis integeniflrs.. ^ in Patagonia boieali Capimla laceniosa aut subcoiymbosa. Caules subapbylli lamosissiuui. (v. a. comm. a cl auct)

y p, ?2O. hn 16-17

7*. ILIICIA SCHIMPERI ^Steud et Hocbst¹ pi. Schimp. n. 858 ^, caule Anhcoso deimso lainosissnuo ble^i toi tno^o-subcespitoso, foln«, confeitis lineanbus m-tegcniiuis obtasiuiculis birtelhs, capitnlis solitanis pedicellatis ± jn elai\ piu... montis Cau Arabia! felicis decembi floi. legit cl. SJhnnper' Radi^ ciassa hgnosa Tolia 1 hn loriga. Invol. glabiiscnla, squainii.lineaiibns acentis Scapi V6 liu lougi cano^eUlllnl Ligulae lineaies. Achfcnu pubeuia. (v. ^ comm ab union, itin. 1837)

'V p. 226. hn. 22.

1 BKLIDDIASIRUM MICHEMI, *adde sjn* BfUdiastci montantisDnmoi!. fl. bel ^ piod p. 66 *

\. p. 227. lin. 34.

4. ASTER ARGUNENSIS. Ab hoc non differre videntur Aster intermedium Turcz. in litt. i&36. et Aster flaccid as Buage ! in litt. 1837.

. 'V. p. 227. lin. 39.'

ASTER SILENIFOLIUS, *adde* ; etiam ad flam. Aldan legit cl. Turczaninow. — Saca- liam , *lege* : Jacutiam.

'V. p. 227. I'm. 53*

7. ASTER GRVMIZTIFOLICS, *adde syn.*: Galatella nemoralis Hook. fl. bor. am. 2. p. f5. 'Valde affinis Gal. nemoralis climfoliae dicitur.

T. p. f128. lin. 3o-3i.

i3*. ASTER CHRYSOC^MOIDES (Turcz.! in litt. 1836 et 1837 non Desf.), adpressi" pubescens, cunle erceto simplici r-ccphalo parcè piloso, foliis oblongis oblastis integerrimis, radicalibus busi attenuatis, caulinis sessijibus, invol. squamis oblongo-linearibus aequalihns aciftis, ligulis invol. vix xqnalibns ant nallis, achxniis villosis. ^ in apricis Da%uriae propè Norinchoroi seu Norin>cbo-roiskoi Karaal legit cl. 'I urczaniuw. Variat caule 3-i5 poll, longo, foliis radi-calibns insigniter aut tenuissiinè trinerviis, ligulis coeruleis indivisis, aut 2-3" fildis obtusis disco paululùi brevioribus aut nullis. (v. s. comra. à cl. inv.)

"V."p. 248. lin. 11-12.

- . 151 ? ASTER ? F^TAGINIFOLIUS (Hook, et Arn. bor. Beech, p. 146), caule ramoso, ram is divaricato-patentibus gracilibus fragilibus lanugiuosis, ramulis ultimU elongatis i-cepha'lis, foliis dutantibus oblongo-spathulatis uiocronulatis basi attenuati* venosis dense (snbliis praecipine) brevitcr albido-lanatis, invol. squamis glabrisoblongo-lanceolatis margine membranaceis. fy ? in California. Stig- luata apice aspergilliforii. Ligulx neutraei' quiflus notis ab Asteris genere, ?mò ab Asteroideis stirps videtar removnda, verisim. ad S^necioneas referenda, sed iuihi ignota!

V.p. 248. lin. li-ii,

- 152? ASTER? TOMEKTELLUS (Hook, et Am. bot. Beech, p. 146), canle fraticoso ramoso, ramulis divergentibus lannginosis elongatis versu's a pice m oligocepha- lis, foliis suliadpresbis approxiinatis linear-i-oblongis ligidè mucronatis utrin- que albido-lanatis, pedunculis breviusculis bractt-atis , iuvol. squamis oblongo* s>pathulatis laxis apice tomentosis. ^ in Califotniâ. Prioris congener ex stigma- tibns asporgilliformibus etiguks neutrnis videtar et ad Senccioneas referendns?

y.p. 253. lin. 6.

TRIPOLIUM, *adde*: Eurybia Gray nat. ar. i.p. 464 non Cass.

TRIP, VULGARE , *adde* sjrn.: Enrybia maritima Gray 1. cit.

V.p. a54. lin. 47-

TRIPOLIUM CONSMCUUM. Hue pertinet fiaccharis asteroides Colla mem. acad. tar. 38. p. J4. t. 25. f 1.

' V.p. 057. Hn. 3.

5. GALATELLA. FASTIGIATA , *adde* : ex Nces in linnea' ijB35. litt. p. 117 Aster fastigiatus Ledeb. fl. alt. 2. t. IO'I in aprici* collibas Sibiriae freqnens.

. V. p. a58 lin. 17-18.

* CXP. TOWNSENDIA Hook.f. amer. bor. a./i. 16. t. 119.

Capitulum lieteroganium radiatum. Invol. ovatum, squamis imbrica- tis lincari-subulatis. UecepL nudum alveolato-punctatum. FJ. radii ligulati inargini involuti rueminci i-scrialcs, disci hermaphr. 5-denta»

turn. Stigm. glabra ? Achaniia sericca. Pappus i-serialis ,•radii paleaceo- subulatus inaequalis , disci pilosus elongatus scabriuscus. -* Herba boreali-Americanæ acaulis. Radix lignosa fusiformis. Folia radicalia conferta linearia subspathulata integer rim a adpresso scricea. Capitulum sessile solitarium foliis immersum. Fl. lutei.

1. T. SERICEA^ Hook. I. c.)'2f in Anler. bor. siccis ad flumen Saskalchawan et in montibus scopulosii.

y.p. 264. lin. 16.

2. HELEASTRUM ALBUM, *adde sjrn*, : Diplopappus albus Hook. fl. bor. am. 2. p. 211. Gray in Torr. cyp. p. 226.

'V. p. 269. post lin. 16.

151 JRYBIA Sect. 11. ARGOPHYLUEA , *ad calcem adde species* (mihi ignotas).. à cl. Bentham descr. in enum. pi- Hugel. p. 58/

21*. EURYBIA RUDIS (Benth. I. c), fruticosa, ramis hispidis, foliis semiamplexicaulibus oblongo-cuneatis, super- sablauceolatis versus apicem argutè paucidentatis utrinque viridibus nispero-hispidis, capitulis lenuinalibus solitariis uiultifloris, invol. squamis lanceolato-linearibus nangine membranaceis nervo hispido achaeuiis cylindricis striatis glabris. £ in Novâ-Hollandia ad Swan-river legit cl. Hugel. Folia rain I et capitula quodam modo Asteri Sibirico similia.

/2; *arguta*, foliis longioribus magis dentatis. 5 ad King George's Sound legit cl. Ferd. Bauer.

21**. E. SCABRA (Benth. I. c), tola pilis brevibus rigidis scaberrima, foliis obovato-oblongis cneatatis apice dentatis basi atnplexicaulibus utrinque viridis, pedunculis i-cephalis vel dichotomis paucifloris^ invol. squamis lanceolato-linearibus acutis margine vix meinbiaoaceis dorso scabris, achaeniis subiereatis striatis glaberriuis. ^ in Nov. Holl. (Ferd. Bauer.)

21***. E. GRACILIS (Benth. I. c.), suffrutieosa glabra ramosissima, foliis linearibus ipice subtrideutatis integerrimis e glandulosis, pedunculis elongatis 1-cephalis, invol. squamis margine membranaceis nudis e glandulosis, achaeniis Hubcylindricis glabris. In Nova Hojjandia. Ferd. Bauer. Habitvs fere Trachymenes linearis. Recept. minute alvedlatum. Pappus rufus. Ligula i-serialis nuferosse oblongo-lineares. Achaenia subtetragona, unde potius ad Spongotticijis *sect referenda.

V. p. 272. ad finem.

1. DIPLOSTEHMI UMBELLATUM , *adde sfn*.: Diplopappus Qmbellatus Hook. fl. bor. a in 2. p. 22.

2. D. AMYGDALIMUM, *adde syn* .: Diplopappus amygdalinus Hook. fl. bor. am. 2. p. a3.

y.p. 278. I'm. 22-23.

17. DIPLOPAPPUS CANESCENS (Hook. fl.)>^{oI'}- am- 2. p. 21), pubescenti-canus, foliis 1 in ea ri - la uceol alis iintegerriuis basi valde angustatis , infer, longe petiolatis, canle simplici corymboso; ramulis x-cephalis elongatis foliosis, «invol. squamis angustis acutissimis hirsuto-scabris. — ad Saskatchewan Arner. bor. Forte ex cl. aact. var. seqnentis?

18. D. GRANDIFOLIUS (Hook. fl. bor. am. 2. p. 21), caneiceus, caule subdecum-

• beutc ail basin rainoso, foliis linearis-oblongis, infer, spathulatis, ramis plures ruraque simplicibus i-cephalitis nudiusculis, invol. squatuus angustissiruis acutissimis hirsuto-scabris. — in planiciebus, ad Saskatchewan et pratis monticulis 'copulo&ornm Ainer. bor.

'V. p. 279. lin. 4-

2. RBINACTIHA UNIFLORA, *adde syn.* : Aster ereraophilus Bange! yi litt. 1835 eL 18^7. (v. s. comni. ab ill. acad. sc. petr. et à cl. Bnngg.)

V.p. 28a. lin. 3.

1. POLY ACTINIUM DELPHINIFOLIUM, *adde car. specif.* : foliis plerisque pinnatifidis.

2. POT.YACTIDIUM SPRENGELII ^Scblect in linnaeâ i835. p. 47% sub Polyactide),, fo'lii linearibus batâ attenuatis, odinibus indivisis. — in Brasiliâ. Erigeron dubius et Eriger. lesinobns ^Pff^tf. ^J*^l. 3. p. 519. DC prod. 5. p. 2g3 et ap^., Hue ex speciis. authent. a S. rengeliano species duas refert cl. Schlecteudal. Pappus ut in Polyactidio dnpLex. Glandulae resinosse nullae.

V. p. 2<4- Un. 4-

- *. EJRIGBRON pRUTico&uy, *adde*: Hue refer syn. Terranea Fernandezia Col I a meiu. acad. taur. 38. p. 11. t. a3. excl. descr. in qua ligulae, forsau deciduae, omittuntur. StéviaBei't. herb.

'V. p. 384. lin. 19-20.

- 3*. ERIGEROW GAUDICUAUDI, suffruticosum? birsulum raraosum erectum* aut UUfusui. I'ohU lougf cuncaHs obovaris grossâ paucideatalis, ramulis floridis ex axillis supremis solitariis paucis'subcorymbosis folia ad basin gejentibus 1-rephalis, ligulis libeabibbKstetanissiihlinohlohgigiohlo 5 % PeiuVia ex bei b. Gdii^irUaad. (v. s.)

V. p. 284. lin. 46.

6. E. SPFCIOSUM, *adde tyn.* : Slenach's speciosa Hook. bot. raag. t. 3Gof. Ait veva Stenactidis species etiarasi ligulae jiluiiserales?

'V. p. 286 ltn. 30.

- ao. E. KERIEKTANUM, *adde syn.*: Eriger* 11 fasciculatus Colla act. ac. taui*. 38, p. >;

• V. p. 287. adcalcenx.

- 28*. E. FRIGIDUM (Boiss.! ined.), canibus cespitosis pilosus hirsutus 1-cephaliis radicalibus lanccohitis sablspathulatis, caulinis paucissimis linearibus, omniibus bilisutis integrerrimis, invol. squamis dense larjalis.*>pice acutis, floribus ffinineis omnibus lignatilis 2-3-scriatis disco duplo longioribus, pappo achaenio duplo longiore. If ad summa cacuinina Sieirae Nevadne Hispauiae in glareosis legit cl. Ed. Boissier, alt. 9500 ad nooo ped. Aster Alpinus var. bis-ploa Lag. etlodr. ann. sc. nat. u. 15. p. 987. Habitue E. Alplpi pm?per. var. <1, sed folia spathulata, ligulae latiore! et fl. tubulosi foemidei nulli. (v. s.)

y p. 288. lin. 7-8.

- ?9*. E. TRIFIDUM (Hook. fl. bor. am. a. p. 17. t. 120), subacante, foliis hirsutis, radicalibus longe petiolatis trifidis, laciniis integris, infimis solummodo raro* iterou divisis, rapo i-cephalo folia pauca linearia. integra gerente. If- in innotibns scpnlostis Ainer. bor. Capit. magoit. E. composit! oni videtur iffine.

M. p. ago. aA cajcein*

- E. ACRKVS. — An ab bocNalis differt Erigeronango<osnra Gaud. fl. helv. 5. fid. Koch syn. 11. germ. 35i?

y. p. 291 hn. 18-19.

51*. E. LANATDM (Hook. flor. bor. am a. p 17. r 121), sabacaule lanatnm, fo-
his radicahbus spalhnlati, miius rarissime tnfidit>, scapo subapbyllo MI perne
involurroque densissime lanatit, ligulis radii elongatis patenlibus, atbxniis
glabris. % ad cacununa montinm scopulosium Amer. bor. Affine dicitur L.
Alpino var. y. Lignla? alba; laiūs purpuieae

'V p 291. hn. ^ 47.

53*. E. GRANDIFIORUM (Hook, fl bor am a. p 18. t. III), ubique lanato-bir-
sotum, caule subelongato polycepbalo, folns radicalijaus oblongaf-spathulatis
cauhriislanceolatis, invol. a pice paipueo nndiascnlo caeterum deusissne al-
bo-lanato , ligilib patentibas in vol. duplo longioribus % in snmmis montibas
bcopalosis Amer bor. Capitnrum magnnm, liguhs albis purpuieisve

'V. p. 293 , 394 et 295.

67. £. DOBIUM, et

79. £. RESINOSUM

Deleanor et ad Polyctidium Sprengeln sapra citatum leferantur

69. E FILIFORME, addesyn :Diplopappus pinifolius Less, mheib. leg. beiol.—
Conf. debci a cl.de Sthlectendal in linnacå i835. p, 475 E genere imò e tnbu
-videtui excludendum et ad Eupatonaceas leferenduin. Novum genus formale
videtur, sed non satis notum

y p 295 hn io-n.

85. E. LOW(HOPTILUM (Hook fl. boi. am a p 18), canle el a to bispido sim-
ptici, foliis longib&imis linearibas glabiib peivobis ciliatis, inter linean-spathn-
latLs, racemo terminali fohtoso poycephalo, peduncnlis elongatis foliolosis,
ligulis numerosis angu&tis pappo copioso yix longionbas. — ad Saskatchewan.
Araer boi Species distincti&bima panlnlùm affini dicitar E. glabello, sed car.
flor incompl.

'V p. 395./i/t. 10-II

86, F.? RADICATUM (Hook fl. bor am a p 17 t. 12a), mbacaule, folm iadi-
calibns linean-spathulatis hirj»utulis*8ubcarnosis, scapo monocepbalo pancifo-
Ho, invol. lanato, radii ligulis bienusLulis patentibus If in montibas scopn-
losis Amei bor piope Ja&perVLak». Habitus fere E lanati, sed forte a-geijere
rcmovendum ** Pappus videtur duplex, exter. dentiformis bievi&&imn acutos^
intei. pauciætns sens tenfissimin Invol. paaciseiiale imbricatum. Lignlae i-a'*
senales.. An forte Sleuactidis sp. **

87 E. FLORIFERUM (Hook fl. boi am 2 p 20), caule bieviisculo rainoso pi-
•Joso, folns omnibu* Inuai i-spathulatis pilosinbculjs iny-pëiriinis'glaucij*, ram is
peduncuLfotmibns l-cepalis, mvol. squamis ezter. pubescent! hirsutis, intei
membranaceis fimbrialo-ciliatis, ligulis latmsculis invol duplo longioiibus,
pappi setis albissimis inci.is^atis hirsutulis^ — in Amer. bor. oend ad flam.
Columbia leg cl Lewis rt Claike. — Capit. inter maxima gene 1 is Ligulaa
albae' An Asteus sp.^

"^ P' 297< hn ?

CXLI. MICROGTNE — Ligulae lineares disco vix ac ne VJX longiores et idrō
genus rite ad Eiigeieas lelatum. ^m

x M TRIFURCATA , ad Buenos-Ayres le^ram imsit d Aruott' (v ai

V.P^if* posthn 42

CAXOTIS Ex Bcntb iu Hugel euum p_k 60. in uota adde generi ex coll.
Baaenana species tres, nerape ;

4- C. nHFvisFTA (Benth 1 c), basi birta apice glabnascola tamisisgimti, folus

Hnearibas vel oblongo'-cuneatis integerrimis paaci- denticuintisque, capitulis fructiferis hemisphaericis, aristis 5 obversè aculeatis divaricatis achaenio dimittiò hrevioribus. — in Novà-Hollandià Ferd. Bauer. Achaenia turbinata scabro-hirta.

5. C LAPPULAGFA (Benlh. I. c.), glabra vel parcè pilosa ramosissira , foliis lineaiibus acutishinc indè deutatis, capitulis fructiferis globosis, aristis 3-4 brevibus-, tribns acbaeuio subduplicè longifribus obversè aculeatis apice uncioatis. — in Novà-Hollandià (Bauer). Capit. fructifera ma' nit. Pisi, exact* globosa , aristis validis andique muricata.
6. C MICROPHYLLA (Beutb. I. c.)» hispida raiuosissima , ramis gracilibus apice glabriusculis , foliis infer, peliolatis cuneato-oblongis hiciso-pinnatifidis hirlis, snper. linearibns^ntegerriuii.f, capit. fructiferis globosis, aristis a achsenio sublougoribus obversè aculeatis apice vix unciatis. — in Novà-Hollandià (Bauer.). Capit. pa'rum minorajquaiu M. lappacex, hispidiora, aristis brevioribus minus validis.

V. p. 303. lift. 40.

- i. BKLLIUM CRÀSSIFOLIUM, adde iconein : brit. fl. gard. ser. a. t. 278.

y.p. 304. lin. a'fine -6.

3. BELLIS INTEGRIFOLIA , adde iconein : Hook. bot. mag. t. 3455.

'V. p. 305. lin. 20-ai. adde :

§. 2. Ach&niüs brevissime papposis.

6. BELLIS FAPPULOSA (Boiss.! iued.), foliis subradicalibus obovato-oblongis eretinto-dentatis ultinque adpressè pubescentibus, scapis folio mihiò lonpioribus sub capitulo praesertim dense birsutis, invol. squamis oblongo - linearibas, acbaeniis pappo brevi multiseto subsquamelloso coronatis. if, in Hispaniae Gvanatensis monte Mijas air. 3000-3500legit cl. Boissier. ^imillima B. sylvestri, sed folia non triplinervia, nee acbienia calva. Strictissimo sensa ad Bracbycomem pertinet, sed pallia et habitus obstant. (v. s. à cl. inv.)

V. p. 305. lin. 30 et seqq.

CL*VI. BRACHYCOME. — Brachycome et»Brachystephium Less. sjen. 192 et 388. DC.prod. 5. p. 305. et 6. p. 303. Ex. observ. cl. Bentbaiu in eum. pi. Hugel. p. 5g. generis species sequenti inodo ordinandae.

§. 1. Achcenüs non tompressis, foliis pinnatisectis.

1. B. GLADRA (Benth. 1. c.), adscendeiu ramosa glaberrioia, foliis omnibus pinnatisectis, segmenlis linearis-cuncalis obtusis integerrimis pauciden tat is* incisisve , pedunculis nndis i-ceplialis, invol. squamis oblongis obtusiusculis apice subuiembranaceis, apbaeuis subteretibus clavatis lavibus vel vix tuberculosis pilis paucis bispidulitis apice plicatis, pappo subnullo.— ad Swan-River (Hugel). Habitus ILenfli.s pinnatae et etiam Bellidis annuae. Non multuin differt a Br. Sieberi et hetero-*ihylla.
2. B. IBERDFOLTA (Benth 1. c.) , glaberrira', caule erecto ramoso, foliis piunatiscclis , segmentis liueari-subulatis distuntibiis integerrimis, pedunculis nudis i-cephalis, invol. squamis oblongis aculusculis apice ntembranaceis, acbaeuiis subteretibus clavatis lavibus vel vix tuberculosis pilis paucis bispidulitis apice plicatis, pappo subnullo.— ad Swan-River (Hugel). Habitus ILenfli.s pinnatae et etiam Bellidis annuae. Non multuin differt a Br. Sieberi et hetero-*ihylla.
3. B. DIVERSXFOLIA (Fisch. et Mey. cat. h. petrop. i835. p. 3i. J£i\$) , inferne piloso-biflanta, pilis urticulatis sparsis patulis, canle erecto à%tfsi raino&o, i'oliis piunatiifilis lobis oblongis, intimis lato-petiolatis, mediis semiamplexi-caulibus, snmmis indirisisis, pedunculis nudis i-cepalis, invol. squamis linearibus obtusis, pappo btevissimo. (I} in Novà-Hollaudià. Pyretbrum diversiolum (4raù. list. pi. rar. edinb. 18516. jun. HoAV. exot. bot. '5. t. ai5. Lindl.

Lot. reg t ioa5. Brachystpphimn lencantbemoides Less, syn. 38S DC prod. 6. p 3o4. Hnc ex cl. Fiscb. et Meyer nee non ex cl Benib. 1. c ara.indavi. (v. a.)

§. 2. *Achanis compressis, foliis pinnatisectis.*

4. B. MULTIFIDA, DC prod 5 p. 3o6 sub n. 6.
5. B. ciLiARis, Less, et DC. prod. 5 p 3o6 sub n 5.
6. B. TENERA (Benlh. 1. c), giabeirima, foliis omnibus profunde pinnatifidis pinna-tisetlisxe, lobis* oblongis hmeanbusve confluentibus aculis acutissime paucidentatis lobnlatisve , peduncuhs nudis i-cebalis, inv squamis oblongis obtmisiulit* membranacefe, achapnus^conipressis margine nMegeiiims* disco pleiurnque apice muricatis —in Nova-Hollandia^ (T'crd Baqei). 'V^nat folio-rnm lobis latioribus 3-3 lin latis , ant angastissimis liaeam latis.

§. 3. *Achcenus compressis, folus infer, qneatis, dentibus plerumque obtusis.*

7. B. STRICTA, DC. prod. 5. p io5 sub n. 1
8. B. HBTERODONTA , DC. prod. 5. p. Jo5. sub n a
9. B. LEUCA~~THEM~~ForA (Benib. 1 t), caule eieclo upicē pilii bievibu& ngulr scabro basi folusque glabris, folus iadlcahhus petiolatis obovalo -olion^ois grosse crenatis, caulims paivis oblongis paucidental, super lemotis subintegernmis , mvol squamis pubcscntibus ajHce dbtusis menrtii-indceis, aebxmis valdè compressis alàdentata iuaiginatis TL in ids Vau-Diemeli Hi scapiformis Tar yf DC prod 5 p 3ob (v. s.) *
- xo. B^ SCAPIFORMIS , DC piod. 5 p. 3o6 sub u 5 exel vai |i
- II. B. SIEBEKI, DC. prod. 5. p. 3o6 sab n. 4

§. 4- *Achcenis compressis, foliis acutis, wtegerrimu vel acutt \$&d entatis,*

12. B. SCAPIGERA, glabeuima, caule simplici subaphyllo i-cepbalo, fo!u» ladi-calibus liuean lanceolatis integeiiimis utiinque attenuatis, oaulmis 1.? minimis basi sobauriculatis, invol squamis oblongis obtnsib, pappo brevissituo % lit Nova-Hollandia^ Senecio scapigei 5>ieb ' pi exs uov. boll, n 33a. Spreng. syst 3 p 559 Brachystephium scapigernm DC piod.%6 p. 3o4 Capi-tnlum tiiplp raiuuus quam B "scapifoiiis Scapns a pice incut v us, an ex si oca lione? (v. s.) •
13. B. HETEROPHYLLA (Bentb 1 c), glabeinuid teuej.j foil is oblongis* cuuti-formibusve acutis basi angustatis inlegetmuis vel apice i-deutatis "i-"J-fidisque, pedunculis lonfijis gracilibns, invql. squamis obt&iust uhs, icbn>niis obovahs compressis vix puberulifmargine caloso mtegm. — in Noja-Hollaiddia^ (Ferd Banei.) Affinis Bi Siebeu ied in hac folia obovata obtuse^renata, pedunculi breviores, arbaenia uiagis pnbescentia.
- i4- B OBLONGIFOIHA (Benth 1 c), glabetniiia, folus i>bloiiyis acuhs basi an gastatis integeirimis subtufidisve , prdunculis r-oephalis, invol/squaauas aca-tmscalis pilis raus bispidi^lis, acbaeuhs subcompiessis ^iinuaiginatis lxvibus ciliatis. — in Vau-Diemen fl^eid Bauer.). Pappus diuid latit achainii bievioi stellatns. Ligulac duplo latioies quam B. margiuatx' An U. belerophyllac var • Habitus ligidioi, folia sup mtegerrima et acbdeuia , junioia snlteiii, hnei» a loDgituJtoahtei pilosis ciliata L
15. B. MARGINATA (Benib 1. c) * glabeinma folns ublougo-lineaubuii .icutis basi augustatis integeriinus vel bpsi paucideniatib, pedancuhs lougusinm i-cep^alis, invol. squamis oblongis obtusluscuhs margiue membranaoei^, acbaniis (offipressfs alà fimbriaia inarginatis, disco tuhruiiUto — in Novà»

Hollands (Ferd. Bauer.). Rami elongati adscendentia apice nodi Ligulae angustissimae. Pappus dimid. latit. achaeflii brevir*

16. B. ANGUSTIFOLIA. (Cuon. in DC. prod. 5. p. 3qf).

17. B. LINEARIFOLIA (DC. prod. 5. p. 3o6). An homonyma Benth. 1. c. omnin6 eadem?

• "V. p. 307. ad calcem.

5. LAGENOPHORA HUGELII (Benth. nom. pi. Hagel. i* p; 59), foliis oblongis glabris pubescentibus sine aucto-dentatis basi in petiolurn attenuatis, acbaenii obovatls fucipbus puberulis. — ad Swan-IUver ut King George's Sound. Folia duplo majora quā ill L. Billardieri. Scapus 8-10-pollic. glaber vel basi pubescens. Invol. squamae oblongo-lineares, exteriores subnlatx. Achaenia breviora et ferē dnpiò latio'ra quāra L. Billardieri.

"V. p. 310. I'm. 15.

3. KBKRLIA. bKfttROBAs, adde: DC in Deless. icon. sel. 4. t. 18. #

y.p. 3i3. /in. 5.

i. BRACHYRIS MICROCEPHALA, adde: Hook. ic. pi. 3. t. 147.

V. p. 3i3. Un. a5-a6j

4*. B. RAMOSIHSIMA (Hook. ic. pi. t. 14^), annua glabra paniculatim ~~in~~ ceroosa % ra(nulis gracilibiA anpulatis^ foliis alternis (iliformi-setaceis, capit. "Solitariis, invol. obovato glatinoso, achicuiyt extūs hirsntis, pappo radii coronā brevisimā fimbriatā, disci è paleis 5 liueari-subspathulatis corollam subaequantibus basi in tubum breve in unitis. Q in Texas.

y.p. 314. Un. i3.

LEPIDOPHYLLUM Cass. (1810), adde: non Ad. Brongn. 1828.

y.p. 315. /in. 3z-3Q.

5*. GRINDELIA DIFFUSA (Don ex Am. in litt. 1836), canle basi suffrnticoloso difuso, ramis teretibns glabris, foliis obldhgis sessilibns semiauiplexicaulibns glabria serratis, sefraturis profundis apiculo subscarioso aristatis, capitulis terrninalibus solitariis suprà fol. snpr. breviter exsertis, invol. squarois lanceolato-linearibns adpressil, pappo panciseto caducissiaio. 3 %* "1 Patagoniā boreali. Ferē media iuter Gr. rnicrocephalam et Gr. argutam. Capit. Gr. microcephalac Vix raajo^a. (v. s. comm. à cl. Arnott.)

y.p. 3i5. Un. 44-45.

7*. GRINDELIA HiRsuTutA. (Hook. et Am. bot. Beeon. p. 147)* P¹¹⁸ "Ibidis hirwitnla, caule cespitoso herhaceo parcè ramoso, ramis elongatis i-cephalis, foliis'angusto-oblongjs subamplexicaulibns serratis, invol. tubesnentis squamis linearilanceolatis basi adpressis apice subsquarrosis.— in Californiā. Aflinia dicitur G. angustifoliae."

V. p. 3i5 ad calcem.

9*. GRINDELIA STRICTA, caule herbacea stricto subsimplici basi glabro apice sparse piloaulo, foliis caulinis basi longè attenuatis et integerriniis apice oblongis acuminatis serratis, invol. squamis ereclis Jinearibns acuminatis, pappo. . . Qf in Americā boreali-occid. ad portuin Mulgrave legit cl. Hsenke! Canlis aequipedalis. Folia 3 poll, longa, semipollic. lata. (v. s. in h. Haenke à cl. da Sterubergcomm.)

cf*. GRINDELIA HUILLIS (Hook. et Am. bot. Ceech. p. 147), glabra, caule herbaceo simplici i-cephalo, foliis radica^ibus linearibus obtusis basi altennatijt, caulinis sessilibus, inferioribus angustissimis 4rdc ineariJUS, super, subolatis bracteoliforibus, invol. squamis tntari-lanceolatis Mpiece squarrobis. -r in Californiā.

V. p. 317. Un. 24.

3. HBTEHOTHECA SCABRA, *adde syn.* : *Diplopappus scaber* Hook. fl. bur. am. 'i. p. 11.

* V. p. 327. /ⁱⁿ. & fine 10.

9. CHRTSOPSIS VILLOSA., *adde syn.* : *Dipiopappns villosns* Hook, et Am. i. p. 147. fl. bor. am. 2. p. 22.

V. p. 327. Un. 48-49.

- 9*. C. HISI'IDA, tota pilis patentibas hispida, foliis oblon go-spa tbul a tis basi angnstatis subpetiolatis, ram is *subcovrnosis*, inrol. *squam'is* angustatis acati* giabriascnlis. — ad fortalitium Carlton-house Aracr. bor. *Diplopappas hispidus* Hook. fl. bor. am. 2. p. 22. An fortè eadem ac C. birtella, sed descr. vix conveninnt.

V. p. 329. Un. 20.

1. BIGELOWIA WUDATA, *adde* : DC. coll. mem. ix. t. 5.

*V. p. 329. /in, 2Q-3o.

3. B.? visciDiFLORA. huffruticosa glabcrrima, foliis linear-lanceolatis rigidis integrermis acutissirais uninerviis basi aDgustatis, capitalis fastigiato-coryrabosis; pedunculisfoliiosis, in vol. glutinosi cylindrici 5-flori sqaamisimbricatis oblongis, ext^L minoribus, fi in planitiebas secas flum. ColumbSa et Salmon Amer. bor - ^B- Crinitaria viscidiflora Hook. fl. bor. am. 2. p. 24.

* V. p. 339. Un. 7-8.

- 67*. SOLIDAGO THYRSOIDEA (K. Mey. pi. labr. p. 63. 11. i3?). canle simplicissimo subflexoso snpernè pubescente, foliis ovatis acuminatis in petiolum deenrentibns inacqoaliter argntè serratis glabriascalis, capitalis racfmosis^mediis binatis ecalychnatis, lignlis elongatis% in LabraHoriâ. Affinis dicitnr S. virgaarea; et praesertiñ ejns var. f Catnbris. An adhuc var. ?

*V. p. 342. Un. 17-18.

94. S. MOLLIS (Bartl. ind. sem. h. ggetting. x836. p. 5), canle teretfoliisque pulvralento-pubescentibus margine scabris obovato-oblongis supernè seira^s, floralibus oblongis iutegerrimis, race mis erect is panicnlatis, sqnamis invol. adpiessis acutis glabris, radio discum superante. ^ in America boreali.

*V. p. 343. Un. 9. in car. getter. AMPHIRHAPIS.

Acbaeniis glabris lege acba;niis pilosiusculis nee glabris.

"V.^ 343. Un. 20-21.

- 1*. AMPHIRHAPIS ZEYLANICA, fraticosa ramosa, ramtilis densè cano-pubestentibus, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis ~~trinque attenuatis~~ sursùm parcè serrulatis ~~trinque pubescentibus~~, capitolis corymbosis parvis, invol. squamis linear-oblongis circ. 2-seriatis subæqualibus, ligulis oblongis patulis parvis, acheniis hirsntulis. J. in Zeylonaa montibus alt. rooo bezap. Solidago Geylanica Arri. pogill. n. 99. Acbaenia oblonga compressa. (v. s. comm. a cl. a act.)

V.p. 346. Un. 'a fine).

5. AFLOFAPU& »RUJVET.LOHWS, *addet* cresc. in Chili à plankie arenosat ad pedecn montis ignivomi Aniucensis circa la Cueva, febr. lect. à cl. Poeppig! coll. 3. n. 204. (v. s.)

y.p. 347- Un. 15 et 21.

- 12: A.? SPINULOSUS, *adde sjn.*: *Diplopappus pinnatifidus* Hook. fl. bol*. am. 2. p. 4*?

- i3. A. LÜCERARIFOLIUS. — forlè hoc referendus *Diplopappns-lineari** Hook, fl.tor, urn. 2. p. 21 ?

"V p. 347 hn. a3-24.

rf A** FiUFOLius, incanus, foliis omnibus lmeari-filiformibus, rdmis Jongis sub-corymbosis i-cephalis, invol squamis inibiicatis angustis acutis pubesceiti-&cabus, ligulis flavecentibus, pappo albo — ad flum. Columbia Amer bor Dipiopappus filifoliirs Hook fl. bor am 2. p. 21.

"V.p 3*i*7 hn. à fine 10

12 An puLGHELLus, *adde syn* • Diplopappns punctattis Less, herb, reg. ber ex Poepp ' pi exa. n 205 Conyza punctata Willd. ssp. 3. p. 1937. DC. prod. 5. p 390 ad Antuto (Poepp ')

"V p 3*4*7 hn à fine 3.

13 APL CLUTINOSUS, *adde syn* Poepp pi. chil. 3. n. ao3^r in lupibus alpinis Pico de Pilque And. Antucensim, febr. flo

V p. 348. Hn. a5.

it>. Arr MACROCEPHAJUS, *adde syn* Pcpp.l pi chil. i. n 201. in rupibus sub nlpmis ad Antuco. Cor radii biserials, ext. bilabiatae, labio int. lineaii, ext. ligulatu

V. p. 350. hn. ag-So.

Ad calcem generis APLOPAPPI, adde

"J. Achceniiis indecnpptis.

>) A. HOOKEAIATUS Hue (ex cl. Hook, et Arn), transferenda Bacchdiis flooke-riana DC. piod. 5 p. 414. & B. mucronita H et Am non Knnth

Zo. A. sQUARRObus (Hook et Am. hot Beech. p. 146), frnticosus tamosus, rarae pubescenli-hirsntis, 'fohis semiamplexic.iulihus patentibus obo\alibut^ glabns ligidis resmosis senatib, serr.itous a pice mucionatis leturvis, capitulis versus apicem rarooinm axillanbus subsessilibus , inv Cainpdnuldti squamis foliacei» squarrosis, pappi serie exter dimidio bieviore ^ in California.

'V p 352 hn 18

LINOSTRIS vuLGARib \ai & dele etad Jasomam glatinosam refer.

"V. p. 354- hn. à fine 3

16. CHRTSOCOMA** HUMILIS (Hook fl bot am. 2 p. 24 sub Ciim'tam), jnana vage ramosa, ram is hinc inde hir&utulis , foliis linear-lanceolatfi denticulato-ciliatis mucronulato-acutis, capitulis axiDaubns terminahbusqne, in vol. glibri sqnamis linearibus, exter. majoribus foliacers. (T) ad npas fl. Saskatcbawan Amer bor. occid. Mores fiuctnsque non satis noti

"V.p. 355. hn 29-io, adde •

CHRYSOCOMA MBGAPOTAMICA Spreug. = Eupatorium ei icoides.

"V. p. 368. hn. Yi et to.

x. BLEPHARISPKRMUM rtTiOLARi, *adde* . DC. in Deless. Ic. sel 4* t 19. t. t

a. B SUBSESSILE, *adde-* DC. in Deless. ic sel 4 t 19 f 2.

V.p. 374. hn. 15

1 CYATHOCXUIE LYRATA, *adde syn* * Ailemisia panicalata Rottl. ex Wight.

V p. 375 hn à fine 4

BEKIHELOTIK, *adde*: DC in Deltas, ic. sel 4 t Ji.

_m p. 374. ad calcem

1. GVMNVKHENA MICRAMTHA, *syn adde* Fiankia Schunperi Stead'in Schiinp herb, unron, itin n 899 intei Suez et Toi Anbiae pefiaeae mart flor. legit cl. Schimper^f (v **%) %

V. p. 375. /in. 18.

1. THESPIS DIVARICATA, *adde*: DC. in Deless. ic. sel. 4. t. ao.

V. p. 3Si. *tin.* 6-7.

26*. CONVZA AUCHERI, pnbescen ti-[^]abhirrella, canle erecto ramnlFs lateralibus brevibuspanicnlato, foliis radicalibus petiolgtis in lobos lineares partitis, caulinis sessilis obovatis basi attcnuatis apice sul[^]dentatis, ramulis apice rapitnla 3-7 subsessilia adgregata gerenlibus, invol. syuuiuis ncuminatis. *£ in Orientis monte Eiwiōd legit cl. Aucher-EIoy (pi. exsic. 3109!). Radix snblignosa.Caulis teres pedalis ant paulò ultrà. Achaenia pnberlnla apice villosula , villis pap-pnm externnm ferè simulantibus. (v. s. à cl. inv.)

V. p. 383. *tin.* 8.

- /10. CONYZA FETXOLARIS, *adde* : DC. in Deless. ic. sel. 4- t. 22.

V. p. 390. *lin.* 7.

- g5. CONYZA PUNCTATA, dcleatnr et «id Aplopappam ^ulchellam rcmovatut..

Y.p. 39a. *tin.* 11.

Yernonia ericoides, *lege*: Liabam ericoldes.

V.p. 394. *tin.* 22-[^]3. *adde*:

CONYZA PUJC[^]TATA Willd. = Aplopappus pulchellus.

V. p. 398. *lin.* 37-38.

3. POLYPAPFUS DISCOLOR , foliis ellipticis basi in petioluiu attenuatis iutegeriiuis saprà glabrißnbtlùs raroulsqne adpressè cano-velutinis, capituliscincotyinbum. r[^]mosum dispositis. 5 *ⁿ montibns Jacobinae propè Bahiam legit cl. Blanchet! (pi. exs. n. i5g). Invol. ovata subvelutinn iinbricata squauis apice snbottus minutè nigrellis. Pappns *tf* pluriserialis! utidè stricto sensu ad Polypap-pnm prinet, sed habitus Baccbaridam discoloram et genera forsitan non separanda?

V. p. 405. *lin.* 4.

44. BACCHARIS GLUTIWOSA. — fortè in Californiâ si spec, à cl. Hooker 11. bor. am. p. i/fi deacr. est omnino cadem.

V.p. 408. *tin.* 17.

68. B. GLOMERULIFLORA. — Etiam in .Californiâ legit Menzies ex Hook. fl. boi. am. p. 147- ^{et c[^]* ^c} Chamisso ex Less, ip linnsea 1821. p. 506.

V.p. 413. *tin.* a6.

106. B. LEPTOCEPHALA . — Eaindem ni fallor in Guianâ-Anglicâ legit cl. Schomburgh!

V.p. 4x4.

- zi 2. B. HOOKERIANA, hie delenda el ad Aplopappnm redacenda. Conf. adn. p. 350.

V.p. 4i4- *tin.* 35-361?

114*. B. BLAWCHEJIANA , fruticosa , ramis teretibus velutinis, foliis breviter petiolatis sabrotundis integrerrimis suprà glabn'ssnbtùs vdutino-tomentosis apire vix mucronulatis," capitulis breviter racemulosjs ex axillis fol. super, .ortis, invol. cylindraceo hirsuto, \$qoamis imbricatis snbacutis, achseniis villosis, pappo invol. paulnliim superante. j in montibus Jacobinae propè BahUm legit cl. Blanchet! (pi. exs. n. 256g). Folia 2 poll, longa, i5 lin. lata. Cor.[^]? profundu 5-fidaj glabrae, antheras abortivas grentes. (v. s. *tf* à cl. inv.)

V. p. 4i5. iin. ii.

119. BACCFIARIS GNAPHALIOIDES (DC. excl. syn. SpreDg.). Bach, guapbaloides Spr. est *Lucilia acutifolia* ex Schlect. in lit.

V./?:4i6. iin. 35-36.

1 a8*. B. URVILLEAWA (Rrongn. v^y. coq. t. 61), fruticosa, foliis lanceolatis oppositis! — Descr. nondùm edita.

. V. p. 419. iin. à fine 3.

156. B. CHILQUILLA, syn. adde: B. confertifolia Colla act. ac. tanr. 38. p. i5. n. 57. t. 35 bis.

V. p. 4aa. In. à fine 5-4.

177*. B. DENTICOLATA (Don mss. ex Am.! in litt. 1836), fruticulosa ramosa glabra, ramulis subangulatis, foliis linearibus basi attenuatis apice acutè et grossè 2-3-dentatis coriaceis, capilulis id apicem ramorum conferto-subspicatis oblongis glabris, invol. squamis acuminatis, achjpnlis glabris, pappo invol. paululum superantc. J in Patagonia boreali. Folia 6-8 in. longa, lineam lata. (v. s. Q et tf comm. à cl. Arnott.)

V. p. 4a3. In. 41.

183. B. JDNCBA. —'Ab bac non ^iffere videtur Baccharis snbulata Don mss. è Patagonia orta et mecum à cl. Arnott comin. (v. s.)

V. p. 426. ad calcem.

1-99. B. TRIMFRA., adde:

0? *Carqueja*, capitulis paucis minoribus, canibus ad basin bi- spernètralatis. 3 in Brasilia; Kestinga Marcia legit augusto flor. cl. lltef. Gomez! Vulgo *Carqueja* dicta. Officinalis amarastomachicafibrifuga! Hucverisim. polius quam B. genistelloidi perlinet B. genistelloides Hook. misc. bot. Q. p. 'ja3. t. 94. (v. s. co mm. à cl. Gomez.)

V. p. 4^6. In. ultim.

?06. B. THYOIDES, adde : Hook. misc. bot. 2. p. aa4. t. 93.

V. /;. 427. In. ^5-26.

209*. B. HESINIFLUA (Hochst. et Steud.! in pi. Schimp. 9.872), fruticosa ramosa glabra glutine illinita, foliis linearibus ant linearisublanceolatis ntriuqe acuminatis integern'mis, capilalis ad apices ramorum confertis in racemum compositum ovatum digestis, invol. f^subglobose squamis ovali-oblongis obtusis. X in vallis montium occidentalium propè Tayfam Arabia? feticis decembr. lk>r. legit cl. Schimper! Oinninò Baccharis vera videtur, sed flores raasclos tantum vidi. Arabicè dicitur *Tobak*. (v. s. ab nnion. itin.)

|p. 4*8. In. 18-19.

219V B. MYRSINITES (Pers. enc. 2. p. 4²4)t fruticosa ramosissima, foliis lanceolatis bident^tis, capitolis globosis subcongestis terminalibus. fr in Santo Domingo. Conyzza myrsinoides Lam. diet. 2. p. 92. Affinis dicitur B. magellanae et B. cnneifolise.

V. p. 428. In. 23.

221. B. MJFESCENS. —Conf. descr. à cl. de Scblectendal in lin. 1837. p. 6. nn- per editam. — Est vera Baccharis species ad sect, secundann referenda.

V./». 435. In. 23.

14. BLUM A WIGUTIANI. — Confer, descr. et var. dua» in Arn. pug. pi. hid. or. p. 29. u. too.

'V. 4^5 etseq.

16. B. MUSRA, *adde* : DC. in Deless. ic sel. 4. t. a3.
30. B. SENECIOIDES, *adde*: DC. in Deless. ic sel. 4. t. 24.
78. B. ELONGATA, *adde*: DC. in Deless. ic. sel. 4* t. 25.

"V p. 442. //1. 32-33.

55* B CRINITA (Am.¹ pug. pi. ind. or. D. 101), caule herbaceo eFccto tereti siraplici? lnrutulo-villoso , foliis rigidjs lAequalitei acute seirato-dentatis utrinque liirtis, infer, obovatis obtnsis in petiolum altenuatis* super, ovalibus oblongisve actitis sessilibus vel semiamplexentibus,dentibas callos, capit pedicellatiscoufertis in thyrsus ovato-obloDgum digestis, invol. squamis linearibns subulato-acuminatis harbato-villosis disco longioibus, cor, foemineis glaberrim styllo longe exerto bifido, mabC sub- 20 extus muriculatis a pice penicillatis — in Ceyjani montibus (v s coium à pi Arnott)

'V. p. 440. *adcalc.* gen. Blumeae

96. B. CHINENSIS (Hook, et Am. bot. Beech p. 196), frntcosa?, lamis cano-pubescens, foliis elliptico-oblongis brevitei petiolatis snpii Miidibus aspen's reticulatis sobtus senceo-tomentosis dentato-senalis, senaturis miuimis glandula aculeiforri deciduā apicalis, ramis flougeiib foiosis apice corymbum ohgocephalum gerentibus in panicnlam coryrabifoimem teiminalein dige&lis. J in Chinâ Raccharis Chinensis Loni coch ed W. p. 604?

T. p. 452.

- ia. PLUCHEI MARTLINDICA. — in Louisianâ legit et mecnm com in. cl. Teintnrier! (v. s.)
- x5. P. PURPDRAJENS — etiam in ins. Cobâ legit cl R de la Sagra. (v. s.)
17. P. ODORATA. — in ins. Cubâ (la Sagia!).

V. p 460. *Un* 3g-4o.

a*. MiCROROS CATIFORNICUS (Fisch. et Mey md sem. h petr i835 p l(i), lotus niveo lanatus, foliis oblongo-lanceolatis, capitalis lanuginc rarioic et breviore • veslitis , squamis fructifens compresso-navicularibus lxxibus antice rertilmeis. (f) in Novâ Californiâ circa eoLoiidm»Ruthenorom Ross in portu Bodega Valde si mil is dicilurM. erecfo, sed in M er^clo squamae fructiferse compresso-na\iculares laeves antice gibbae, umâ seim-circulari ex F. etM.

"S. p. 4\$o hn. à fine 8.

3. M. BOMBICINUS , *adde*: m Mesopotamiâ (Auch !).

V p 463. *Un. ult.*

y

1. INULA HELEICUM. — etiam ih Onente ad *Elwend legit cl. Auclier' pi. exs. n. 3a35.

=V.p. 464. *Un.* 25-26.

3*. I CONYZOIDES, tott glanduloso-pubcscens, canle erecto apice paniculato-ramoso, folio caulinis semiamplexicaulibus ovni*: intpgernmis, capitulis t>olitariis ramos teiminantibus , invol. squamis exiei apite brevitei'recurvo squano-315, intimis erectis apice ciliatis, flosc. oraiAbus? fubulo^s 5-denialis berma-phr. If in rupibus et glarcosis ad radices montis Sinai .mg flor. legit cl. Schiupei' Conyza Schiuip.' pi. exs. un. itin. n. i5y. A films I ^^nyza setl notis indicalis et foliis oirc. q hn tan turn longis tajile diffeit. fB». abun. itin)

V.p. 464. *tin. xSafrie.*

5. I. CANDIDA, *adde* : in Olyrapo Thessaliae. (Auch.! n. 3078.)

V.p. 464. *tin. àfine* 3.

8. I. THAFSOIDES. — etiam in Olyrapo Bithyno legit cl. Aucher n. 30^g !

V. p. 465.

9. I. OCULUS CBRISTI, *adde* : var. *et* in Olympo Thesft&lix. (Anch.! n. 3i35.!) .

V. p. 4fl₇.

19. I. GKRMAN&A, *adde:ad* radices Olympi Bithyoiae. (Auch.! n. 3al3.)

V. p. 467. *tin. uleim.*

22. I. BRITANICA. —Eamdetu ni fallor in Cappadociâ ad Euphratein legit cl. Aucher! n. 3087.

V.p. 468. *tin. i5-i6.*

- 2i*. I. AUCHERIANA , collo sericeo-lanuginoso, caule hirto snerne ramoso, foliis glabriusculis ovali-oblongis integerriniis, radicalibns-in petiolom attenuatis, canlinis sessilibus subsemianiplexicaolibus, capitulis ramos hispidos termi* nantibus solitarlis, invol. squamis hirtellis subuquarrosis , achseniis glabris. f2P in Cappadociâ ad Eaphi a tern legit cl. Aucher pi. ezs. n. 3091! Affinis I. Britanicæ sed facile'd is I i net a. Pappi setae circ. 10 scabrae. Ligulae angustè lineares disco dnplò longiorea. (v. s. à cl. inv.)

V.p. 468. I'm. 1⁸6-27.

23. I. MONTBRETrICA (Anch.! pi. ex. n. 3090), parcè sobsericeo-villosa, caule erecto subsimplici 1-2-cephalo, fnliis lanceolatis integenimis, radicalibas in petiolum attenuati^s, invol. sqnauii exte. coriaceis ovatis breviter acuminatis J>asi glnhris a pice vjllosis, infer. linearibiis acutis , achaeniis glabriu.sculis. % in Cappadociâ ad Euphratem. Simillima I. montanx sed minus sericea et involucro achaeniisqUc diveisa. (v. s. a'cl. Aucher b. Montbretii it in. socio.)

• V.p. 468. *tin. àfine* 6.

26. I. GRAVKOTKIVS, *fi. frutescens*. Etiam ad Alex and riaax legit cl. Anchor n. 3aa6! ct ex eo species propria videtnr.

'V. p. ^|. *tin. ii-ia.*

- S*. I. ruucAR INFORM is, tota villosa-hirta, caule erecto ramoso, ramis apice 1-cephalis, foliis caulinis ovalibus ovatisve sessilibus integerriniis, invol. squamis pluriserialibus linearis-subulatis villosis, ligulis minimis, pappo pauciseto. in Persiâ legit cl. Aucher pl. exs. n. 3231 ! Rami sub capitulo hirsuti. Achænia puherula. I. Africanae affiniset cum eâ fortè sect, propriain conficiens. (v. s. à cl. inv.)

V.p. 470. *tin. 10.*

- Sect. LIMBARDA, syn. *addei* Eritheis Graynat. arr. brit. pi. I. p. 464. et Inulw chrithmoidi, Eritheis manliina Gray 1. c.

Y. p. 470. *tin. 31-3a.*

- 35*. I. MULTrACLiS (Fisch. et Mey. ind. sem. h. petr. z835.p. 30), radice lignescente maticadli, caulibus ramosis, ramis patentibus clongatis subnudis x-cephalis, foliis caulinis sessilibus'^tigustè oii longis v. sublinearibns obtusis integreriniis Mibondulatis margine villosis, infer, basi attenuatis , invol. squamis iinearji. Juiccolatis pubescens adpressis, exter. apice pntulis. If in littore orientalrW-nis Caspji locis montosis- Inula saxatili affinis. Eichwald pi. nov. fasc. 1. p. 3.

a5*\ I. ANGUSIIFOITA, caule*electo siraplici basi piaeseum pubero, folus integris minis, ladicibus hneanbus sublauteolatis in petiolom dense villosissimum angustati*, caahnis remotis sessilibus linearibus erectis, capitulis 2-4 pedicellatis discoideis, invol squamis acuniinatis adpressis doiso glanduloso-pubeulis % in Peisiā legit cl. Aacbei pi. exs n istalHeiba pedalis stncta. Acbaen.a pubescenti-villosa Pappus Inultisetus subiufrscens. Floi. etiam extioai tubulosi hermaphr. 5-dentati (v s. à cl. inv.)

V.p. 470. hn 40-41.

36. I. viscos L[^]adde •

fi. laxiflora, panicala^t laxa, capitulis minoribus longe pedicellatis distanibus. 1L in vincis Hispaniae Giauatensis ad Canillas legit cl. E. Boissier. (v s.)

'V p. 475. hn 2

1. PEHTAMEMX DIVARICATUM. — adde • in deseito Mesopotamia; Auch • n. 3846'

V. p. 476 hn. 17.

I FRANCOEURIA CRISPA, adde ad Pyramides et piope Kanke iEgypti infer. (West Schimp'), ad inontem Smai (Schimp'), in Assyria*(Auch.).

V. p. 4^5 ft* à fine 10.

i *IPBIONA JUNIPERIFOLIA, adde : in Aiabiae pelieae rupibus Wadi-Hebran (Scbimp'), ad Hoieb (Auch.!).

V p. 47<5. hn 31..

I IPH SCABRA, adde: in moute Sinai (Auch L), m valle Hampe Arabiae petreae (Sthimp ^).

V.p. 476. hn. 3i.

1 JASONIA GLUTINOSA, adde • in msulis Archipel. et ad Constantinopolim (Anch'), in rupibns calidis totius legniGranatensis (Bois>s.) Hue ex autop- siac Boisieneftit Chrysocomam veiliLalim Lag. gen. et >pet p i5 dpm exdescuzione cum dubio letali ad Linosyridem vulgarem vai. <T

'V. p. 478* ft/i 20.

2 PULICARIA ARABICA, adde: in bumidiusculis arenosis Hispaniae Mediteira*ne* (Bois>s.)

V.p. 479 lm, a 2, a3

7* P ScHiMtERi, pubescens, canle lamo&o, fobis obovftto oblongis obtusis - babi umplexicaulibusdentalis, umis divaiVLalis apice nudis i-ctphalis, invol squainisacutis, liguhs disco duplo longotib., pappo iiitei seti, circ. i5, elt deniato T m planine deserti piQ0|rDjeddam in Aiabia feliu januai floi legit d'^ himpc i P iucisapl e< an itin n 908 non DC dffert a -era P incisa statua multo minore, folus obtusis,, dentatis, uel Incisus, lignlu longionbus, etc. Radix gracilib simplex perpendiculaus (v s ab nn. itin)

y. p. 479 hn vj.

P UNDULATA, adde et ad rupes Aiabiae peUeae ad Wadi-Hebran (Schimp.).

V.p. 479 hn 41*

P ODORA, adde m collibus hlioieis Hispaniae inter Estponam <t Maibillain (Bows.")

V.p. 4tto. ad calcem adde:

CCXLI*. AMBLYOCARPUM Fisch. et Mty. ind.sem. h.petr. i85j.p. 3o.

Capitulum multiflorum heterogamum, fl. radii ligulatis foemineis i-serialibus, disci tubulosis 5-dent. hermapbrod. Invol. squamae 2-3-serieles, exter. foliaceae. Recept. hernisphxricum nudum punctatum, Antherae basi caudatae. Achaenia con formia subfusiformia angulis 5nolata erostria glandulosa obtusa calvn. — Herba erecta annua vel biennis, orientahs, glnbriuscua,, hinc Pulicariae illinc Garpesio ex habitu nffinis. Folia . . . Capitula flava hemisphaerica. Ligulae lubo filiforrai brevi, ligula linearis 1-2 lia. longa, — An Inuleis, an Relhanieis adscribendum?

I. A. INULOIDES (Fi&ch. et Mey. 1. c). — in nemoribus et dametu ad mare Cai-pium propè. Leukoran.

V. p% 481. tin XQ-ao.

CCXLII*. MINUROTHAMNUS.

Capitulum mdltiflorum heterogamum, fl. radii ligulatis foemineis uniscriatis, disci tubulosis 5-dentatis bermapbroditis. Invol. squamis 2-se-riatis, ext. minoribus acuminatis , inter, longioribus obtusis margine submembranaceis. Recept. . . Stam. filain. glabra; antb. breviter bi-caudatac. Styl. apice bifidus, ramis patulis. Achaenia obovata ? albo-vilosissima. Pappus biserialis strictus flavidus , setis 20 dentato-scabris , exter. 10 paululum brevioribus, inter, rigidioribus. — Suffrutex Gapensis habitu Cuphelodontiae, ramis teretibus apice nudis r-cephalis. Folia alterna linearia integerrima subtus adpresso tomentosa supernè glabra. Rami ad apicem et involucra tomento rufo brevissimo subvestita. Cor. flavae. —Videtur inulea. Affinis Cypselodontia? et Pegolettia3. — Nomen ex xivt/foc exilis et ^<c/uvoc frutex.

x. 1V%-VHA.G{TALOID< S. t^ ad Cap.' Bonae-Spei in distr. Caledon legit cl. Eckl!n!
(v. s. à cl. inv.)

V.y>. 48a. lin. 11-12.

CCXL TIR. CTPSELODONTIA.

Gapitul. multiflorum , fl. radii uniserialibus ligulatis neutris, disci profundè 5-fidis hermaphr. Invol. pluriseriale imi)ricatum , squamis Lineanbus, ext. suf)squarrosis. Recept. alveolis margine dcnlatis! Stam. filam. breviahirtella; antheraeiA appendicem coriaceam productae, basi bicaudatae,, caudis barbntis. S t ^ fl. disci lobis subadglulinatis obtusis dorso ad apicem puberis, Actiffinia radii abortiva glabra basi pilorum peiticillo cincta, disci obovata rufo-vilosissimn. Pappus setis crassiusculis albidens-tato-scabris, radii paucis, disci raultiseraiiibus.—Suffrutex Gapensis ramosissimus, ramis striatis apice subaphyllis i-cephalis. Folia alterna obovato-oblonga subobtusa basi cuneata mucronata integerrima subtus canescens-villosa sugernè glabra unincrvia. Gapitula terminalia solitaria nuda. Gor. flavaj. — Videtur Inulea post Pegolettiam inserenda. — Nomen ex x.v|i> alveare et <To> dens.

x. C ECKLONXAVA. j ad Cap, Bonae-Spei in dislr. Uitenhagen legit cl. Bcklon |
(v. s. à d. inv.)

V. p. 48a. lin. 11-1 a.

C_CXLIir*. HOCHSTETTERIA DC coll. mem. ix. / . 6. — Novura genus?
Hochst. et Steud. pl. Schimp. union, itin. 1837. «• 864-)

Gapitulum multiflorum discoideum homogamum. Juvol. squamae pluriseriales subaequalcs linearis-lanceolata? acumiuatae rigidaedorsu nervulis sub-3-striatae. Recept. hirsulo-fimbrilliferum. Cor. tubo tereti, lobis tubi longitudine linearibus. Anther[©] breviter caudatae. Slyli rami erecti oblongi dorso subconvexi. Achsenia subturbifiata verostria à basi villosa, villis accliaenium superantibus et primâ fronte pappum externum simulantibus. Pappus paleolis 10 linearibus acuminatis dense ciliatis subsquamullosis constans. — Herba Arabica glabra erecta basi forte sufl'ruticulosa, caule anguloso-striato ramoso, ramis à pice i-ccphalis. Folia alterna ovalia minute denticulata basi in petiohim atenuata, ad basin petiolâ subauriculata. Capitula terminalia lutea. — Dux in honorem cl. Prof. Hochstetter Wurzburgensis, botanici periti, unionis itiueraiae strenui promotoris.

1. H. ScBy»pERi. 5 -p iⁿ montibns ad vallem Fatmensem Arabia; felicis febr. flor. legit cl. Schimper. (v. s. ab anion. itin.)

'V. p. 483. lin. à fine 3.

~~DUPETHALMUM~~ AWGUSTIFOLIDM, ad Le * forte Mnesitheon Raf. potius ad Eclip-tai pertinet, sed onioiaò obscuram. .

y.p. 485. lin. 37.

1. TELBKIA CORDIFOUA, adde: Telekia speciosa Hook. bot. roag. t. 3466.

Y.p. 486. lin. 28-29.

3. AsTBRIr.us AQUATICUS, adde :

y. tpjgmeeus, caule brevissimo i-a-cepha}o\ (I) in monlanis sicclis vallin Hebra in Arabia) petreae ScWuip.! n. 336> in Gssuris rupium montis Sinai et atl thodum (Auch.! n. 3093 et 3094). (v. s.)

V.^ 486. lin. 33.

3. A. GRAVEOLENS, adde : et in Arabiâ petraeâ loco dicto Uzed legit cl Schimper. pi. exs. n. 719 non 507.

Y.p. 486. lin. 35-36.

3*. A. LAHUGiNOSus(Auch! p]. exs. n." 3229), 'caulibus e collo plurimia heibacels. erectis gracilibos vix a pice raniosis foliisquc junioribus lanuginosis dermùm glabratib, foliis lanceo^ntis integerrimis utrinque acuminatis, infer, in petiolin attenuatis, tamulis ;ipi p i-cephalis, capit. vix bracteaiis. Tf. inrupibus ad Da inasum legit cl. Aucher! Herba pedalis. (v. s.' à cl. inv.)

y.p. 488. lin. 30-3i.

4. CERUANA MONTANA (Auch! pl. exs. n. 3228^, pubescens, caulibus herbaceis erectis parè ramosis, foliis lanceolatis utrinque acuminatis integerrimis, caulinis sessilibus, intimis subpetiolatis, capitulis vix bracteatis. 2/ in monte Tauro ad AVitahlggit cl. Aucher. Capilula disooidea pisi majofis magnitudine. Brac-reæ 1-3 lineares vix invol. adiequantia. Paleae recept. lineares. Achnnpnia matura non vidi. (v. *. à cl. inv.)

V. p. 490. lin. 1 a.

1. ECLYPTA EKECTA, adde: Hab. adhuc in Palestina secqs Jprdanom {Anch!}, in Arabia? valle Falma (Schimp!), etc.

v. p. 491- '1^:.

2. £ PROCuMBKNS, fl^: in Louisiana hanc et Eel. reclamlegir cl. Teintnrier!

Trib. IV. SENEACIONIDEM.

V. p. 500. lin. a4-

RsLtiANiEjE, car. adde: Recept. nudam aut paleacenso.

V. p. 504* ad calcem.

i. ICHTHYOTHERE CUNABI, adde: aun. sc. nat. i83i. p. 64*

V.p. 507. lin. 39. loco generis Apali.

CGLXXI. BLENNOSPERMA Less. syn. 267. — Apalus DC. prod. 5. p. 507.

Capitulum pauciflorum heterogamum, fl. radii foemineis i-serialibus ligulatis latè ellipticis tubo destitutis, disci masculis tubulosis 5?-dentalis. Invol. 5-phylloin i-seriale, squamis ellipticis. Recept. parvum nudum. Achaenia fl. radii 5-angulatum oblongumpapilloso-intfanum, disci abortivum. — Herba Chilensis anuua Villanovaæ facie 3-5-pollic. gracilis parium ramosa supernè puhescens. Folia alterna amplexicaulia pollicem longa pinnatipartita, lobis linearibus semi-lineam latis. Capitula flava parva pedicelata.

I. tf. CHILENSE (Less. 1. c.). Cl ia Chili. Unxia antheoiidifolia Bert. inss. Colla rnem. acad. laur. 38. p. 37. n. 77. t. 3ti. Soliva radiata Poepp! pi. exs. n. 210. diar. u. 121. Apalus aetheuiifolicis DC. prod. 5. p. 507. monente cl. W. nott. Rudicis fibrae tcaues fasciculatiin è collo ortae. (v. s.)

V. p. 5ia. lin. 37.

6. SILPHIUM TERBBINTHACEDM, adde * bot mag. t. 3525.

V.p. 5i5. lin. 6.

1. POLYMNLIA UV.EDA.LIA, adde * et in Louisianâ (Teiut.l).

"V.p. 517. lin. 28.

1. BERLAHDIERA TEX ANA, adde: DC. in Deless. icon, select. 4. 1.16.

V.p. 52\$. lin. i3.

1. PINILLOSIA TETRANTHOIDEA, adde: DC in Deless. ic. sel. 4. t. 27 f. 1.

"V.^ 5a8. lin. à fine 5.

2. TETRANTHUS HIRSUTUS, adde: DC. in Deless. ic sel. 4. t. 27. f. 2.

V./7. 529. lin. 19.

1. If A xLVTHivoLik, adde syn. ;Cyclachaena xanthifolia Fres. ind. sem. h. fiancof. 1836. p. 4. — An revera' genus ab Ivâ distingendu in g

V.p. 550. lin. à fine 8.

1. EUPHROSYNE PBDicuLARiFOLXA, qdde : DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 28.

V.p. 532. lin. à fine 10.

6. PÂRTHENIUM HYSTEKOHVORUS, adde: in Louisianâ (Teint.!).

V.p. 533. addAlcetn.

CCXCViir. MOONIA Am. pug. p. 3₀.

Capitulum heterogamum, 1k radii circ. 5 foemineis ligulatis 3-fidis i-senalibus, disci masculis infuudibuliformibuj. Iuvol. biseriale, squa mis ext. 4-5 palenti-recurvis, inter, sub-5 erectis. Recept. palcis oblongis membranaceis i-nerviis onustum. Stylus fl. ibemuei bifidus, ramis Jinearibus revolutis, fl. masculi simplicissimus aequilis apice glaber deorsiim pubescens. Achaenia radii obcomgressa utiinque marginata

oblonga ecoi'ticawlaevia apice brevissimè bicornuta, — Suffrutex? Zeylanicus habitu Biden^{is} et Delucia? , gfnhriusculus. Folia opposita peticrata, indivisa aut 1)ternalim secta, serraluris mucronatis instructa. Pendunculus terminalis nudus gracilis elongat^s i-cephalus.

i. M. HETEROPHYLLA (Arn.! 1. c). J sea If in Ceylonâ. (v. s. comtq. àd. Aru.)

V.p. 538. lin. 3.

CCGUI. WEDELTA, addesyn.: Niebnhrfc et Wetfelia Neck, elem*l* i./>. 3o?

V. p. 548./in. 20.

10. WOLLASTOKCA GLABRA.TJY, addc : DC. cull. mem. ix. t. 7.

Y.p. 550. I'm. 13.

I. RUMFORDIA FLORIBUNDA, addc: DC. 1Q Deless. 1C Sel. 4<¹» ^O.

V. />. 559. Z/n. 12.

a. OBBLISCARIA COLUMNARI*, a ^ e syn. L Ratibida columnaris brit. fl. ganl. ser. 2, t. 36i.

V. p. S5\). lin. ulthn.

1. ANDRIEXIA MExipANA, adde: DC. in Deless. iq.^el. 4. t. 3i.

V. p. 560. lin. 26.

a. ANOMOSTERIUM BUPHTHALMOIDBS, <^ie : DC. ia Deless. ic. seL 4. t. 3a.

V. ^>. 56s. ad calcem.

11. GTMNOPSIS ENSERIALIS (HooM'ic. pi. 3. t. i45), caule erecto scabrosab-dichotomo ramoso, fblis dblongo-ovatis petiolatis angulato-dentatis saprà nudiusculis obsoletè piti^etatis bablùs strigoso-pilosis, iuvol. sqauuis*x* iniserialibus oblongo-spathnatis birsutis, rec. paleis ach*nia glaberrima nitida involventibris, ae^. demum tubercalatis scabris toralosis, pappo coroniformi fimbriatot*- in Texas legit cl. Drammond.

y.p. 567. lin. 38.

1. PUILOGLOSSA PERUVIAHA, adde: DC. in Deless. ic. sel. 4* t. 33.

y.p. 568. lin. 4.

a. CHRYSOSTEMMA TRXPTSRIS, adde: Hook. bot. mag. t. 3583.-

y.p. 568. post lin. 32.

1. CALLIOSPISS TIKTORIA, addc :

@.%tropitrpurea (Hook. bot. mag. t. 35r 1), maculâ ligolaram atroparparca maxima et paginâ ferè totam occupant*. — var. hurtensis.

y.p. 569, lin. i7»

CCCXXXVI. AGARISTA, adde : DO. tiou Don. — Genus Donianuin ab Andro* medâ non videtnr satis distinctnm.

y. p. 671. lin. hfine 2

i3. COREOPSIS DIVKRSIFOLIA. — Ab ei non«differe yidetnr Calliopsis Draminondii brit. fl. gard. ser. 1. t. 3i5.

'V. p. 571. lin.' ajuei'\).

i3*. C. COROWATA (Hook. iyjt. mag. t. 3460. non Linn, nee Walt.), caoleerecto 'debili flexnoso glabro. fo¹Hia²ppositisspathulatisintegris vel te^matim pinnatimve sectis naccios marginat³ linearibus acuminatis, inter. lati pilosis, ligulis apice 5-fidisp⁴ si purpuro-maculatis, achæno 2-3-paleaceo. (1) in Texas semina legit cl.Drtimmond

'V. p. 572. lin. ia-i3.'

- 14*.* G. LOMOPK8 (Hook. bot. mag. t. 3586)* de bills, foil is oppositis, radical, spathalatis, caulinis profundè pinnatifidis glaberris basi ritrinque ciliatis, lobis linearis-lanceolatis integris ve^Htisis, pedimcalis elongatis, corollis nicoloribus, ligalis a pice 5-fidis. — in Texas Amer. bor. legit cl. Drmnmond. Pappi squaniellae dentato-ciliatae.

y.p. 573. lin. 45-46.

- 26*. C. FILEFOIA (Hook. bat. mag. 3505), glaberrima, canle erecto, foliis oppositis pinnatipartitis bipinnatifidisque, lobis linearis-filiforibus subcaruosus suprà canaliculatis, Hgulis 8-9 obovatis. (J) in Texas sciina legit el. Drnmmond. Ligulae omuinò lulcae. Discus purpareo-sanguineus. Pappus bisquamellatus.

V. p. 575. lin 46.

2. AcTyro^ERis HELIAWTHOIDES, adde : In hnc verisim. dñae species aut variebates distinguenda? nempe:

A. Nuttallii, lignis 8, invol. sobuniseriali. — A. helianthoides Nutt. gen. ain. a. p. 181.

£.? Elliottiy ligulis 10-11, invol. biseriali. — A. helianthoides Ell. sketch 2. p. 412. "Verbesina helianthoides Michx. c. non Kunlh. Arced it adiconem A. ovatae (Cav. ic. ^ t. a80), sed ligula? 10-it nee 8. (v. v. in h. genev.)

T. p. 575. lin. 46-47.

a". ACTINOMEHJS oppositXPomia. (Fresen. ind. sem. b. frajicof. ann. 1,836), canle hirto, foliis oppositis et super, alternis ovato-lahceolatis grossè serratis acuminatis suprà scabris subliis villoso-sul^rsatis, capitulis corymbosis, invol. biseriali, squamis ovatis sdbpatulis, ligulis n-«2. % ? in agio Illinoensi locis ndis pratoium. Caulis 4-alatas. Pedunculi subalati abbreviati. l^olia 3 poll. loBgg, 2 poll. lata. Achaenia lato-alata. (v. v. in b. ^enev.)

V. p. 577. lin. 7.

1. OYEDJEA. VERBBSINOIDES, adde : DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 34.

\. p. 588. lin. 9.

16. HELIANTHUS DITCAPETALUS, adde : Hook. bot. mag. t. 35io.

y.p. 58(j. lin. 49.

3a." H. CALIFORNICUS, syn. adde : HeL. longifolius Hook. fl. bor. am. ifc. p. 3i3. bot. Beech. 1. p. 149. non Pursh. Hab. ad flora. Colamfrn'et iti monibus scopalosis «x Hook.

'V. p. 590. lin. 7-8.

33*. H. MAXIM/LIANI (Schrad.!) ^eni. h. goeu.^ iS35.dk, sc, nat..i836. bot. 6. p. 101)i foliis cau'linis alternis, raqtieis oppositis, in Tceolatis subserratis scabris ntrinque attenuatis petiulatis, iArol. squamis lano'eolato-linearibus acuminatis hispidnlis. — in, Aincr. þur. grnyijj^osis ad flum. Missouri detexit Princ. Max. Neovidensis. Capitula paulo' minora qua 'lll H. gigautei. (v. s. conim. à cl. auct.)

V. p. 592. lin. à fine a.

3. FLOURENSIA LAURI FotiA, adde : D(!. in Deless. ic. sel. 4. t. 35.

y.p. 5g4- lin. 3o-3i.

1. BIDENS TRIPAVITITA, adde:

fi.indtvisa, foliis omnibusindivisib, caule sesqu^ltdali, capituiis majuscuis. in Persia boreali Vigit cl. Aucher pi. ex». 11^3^47! Achsettia biaribtaia. (v. s.) .

Y.p.6o5. lin. 28-39.

77? B? NOV/E-CALKDONI>K(Foist. cxSchkcht. in liiuca iS35. i≥^8o), canle ra-

inoso dirhotomo , ram is snbsulcatis glabris, foliis pilosulis pirihiatisectis, lobis lanceolato-linearibus acutis integerrimis, fol. s^eHimis indivisiis, capit. solitariis terminalibns, achaeniis conipipssis margine acuruscilia utrinque 3-linéatis breviter lanceolatis. — in Novā-Caledoni[»], Nov. Hebiwjifl. Coreopsis Tannensis Spreng. syst. 3. p. 614. Rūmens pinnatifida Wall, ca*. vcomp. n- 300 ? ex Sahlect.«An forte Càmpylothecaj aut OVlossogynei spj? *

y.p. 606. lin. 26-27.

x*. COSMOS TKNCIFOLIUS (Lindl. hot. reg. t. 2007)»slaberrimas, foliis bipinnatisectis , lobis liaearibus remotis acutissimis iniegris lobulatisque , invol. extèrioris squamis ovalis acuinioalis, achaeniis asperia rostratis innticis uat i-3 arisutis. (Tj id Mexico. Affinis C. ^ipinnato^sed^bla tenuius inrisa_T invol. ext. sqaanifc minus acuminatæ, fructas >caber longius rostratds, disci exaristatus.

V. p. 610. lin. 33.

3. LIPOCHJETA UMBELLATA, adde i DC. in Deless. ic. sel. 4* t. 36

V. p. 618. lin. 41-42.

42. "VERBSSINA** PROSTRATA (Hook. et Am.! bot. Sleech. p. 195), caule prostrato ramo'sb nine iude' radicante scahrido, foliis oppositis oblong Is b re vissi mè petiolatisbasicuneatis pauci- (sub- 3) dentatis utrinque hirsutnlo-scahris, pedicellis i-cephalis ex apicibus aut ramnloruzn hifnrcationibus ortis folk» longioribus, invol. squamis ovalibus acutis imbricatis, recept. paleis angusti^ibus casterum similibus, ligulis paucis. — in CbinA.circa Cantbnera. Flores Intei/Fructns non satis noti. (v. s. comm. k cl. Aniott.)

V. p. 619. lin. 29.

DITRICHUM Cass. nee Timm. — DItricbium Timm. est DUymodonis sp.

V. p. 627. lin. 5.

1. DUNANTIA ACHTRANTHES, adde: DC. in Deless. ic. scl. 4- » \$7-

V. p. 627. lin. 11.

2. DUW^TIA MicnocEFiiAXA. Hujas spe(^ei specimen in herbario meo deerrans nuperrimè reperi. Habuiex herb. I'hibandiåoå cl. percgr. Née in Pátagonia ad portuin Desidératum lectnm. Dubia ideò mihi videtnr indicatio habitations in Mexico ex herb. Hacnke. In hâd cnitp anreå external collectioxre^schedulaé jplantis uon adheient «t errores ideò i'acilè evadunt. *

V. p. 627. lin. à fine 5:

a. XTMENESIA MICROPTERA. Hue ex specyn.-missio perfmere videtur Xilbe\$e&fait aiistralis Hook, fit A^n. ad Bonariam etiam lecta.

V. p. 629. Hu., 27ft

3. OLiooGX?ffi TAMPICANA, adde': DC in Deless. ic.^el. 4. t. 38.

... V. p. 629. lin. 30-?T.

4. O. BuncHtT.wr (Hook. ic. pi. 3. U'i o i), pednnenlis capitulis plernincioe mältu longiobus, acba3nñs*oblop*(T-ovatis obtuse trigonis , paleis cuneiformibus apice incisis. — in Rio-Janeiro Krasilieu'sium. >*

y.p. 631. lin. 15.

4. CHRYSANTHELLUM IWDI^DM, adde : DC. in Deless ic. sel. 4. t. 39.

* V. p. 633. Hn. 22.

1. DELUCIA OSTRLTHIOIDES , adde : DC. in Deless. ic. bel. 4. t. 40.

V. p. 635. lin. 38.*.

3. FLAVERIA LINEARIS. Recepí ex ins. Cuba lectam à cl. La Sagua. Caulis basi ul rait Lagasca^suffrnticulosus, nc>ut vult Kunth herba annna.

V. p. 5⁷*. lin. ia-i3."

14*. G. LONGIFBM (Hook. bot. mag. t. 3586), debilis, foil is oppositis, radical, spathulatis, caulinis profnndè pinnatifidisj^{*}abris basi ritrinque ciliatis, lobis linear-lanceolatis integris velfincisis, pedtmcalis elongatis, corollis nnicoloribas, ligalis apice 5-fidis. — in Texas Amer. bor. legit cl. Drumuioud. Pappi squamella; dentato-ciliatse.

y.p.573. lin. 45-46.

26*. C. FILIFOLIA (Hook. bJBt. liag. 3505), glaberrima, canle erecto, foliis oppositis pinnatipartitis bipinnatifidisque, lobis linear-filiforibus subcaruosis sapri canaliculalis, ligalis 8-9 obovatis. (f) in Texas semina legit cl. Drainmoad. Ligulae omnino lutene. Discus purpareo-sanguineus. Pappus bisquaniellatas. ^

V. p. 575. lin? 46.

2. AcTtNO^ERis HELIAKTHOIDES, adde : In hnc verlsim. dñae species aut variebates distinguenda? nempe :

a. Nuttallii, lignlis 8, invol. sabuniseriali. — A. heliantboides Nult. gen. am. 9. p. 181.

JS..? EUiottii, lignlis 10-11, iuvol. blseriali. — A. heliaatlioides #11. sketch 2. p. 412. "Verbesina heliautboides Midix.l. c. non Kunth. Accedit adiconem A. ovatae (Cav. ic. iff l. a80), sed lignla? ro-it nee 8. (v. v. in h. genev.)

V. p. 575. lin. 46-47.

a*. ACTINOMERIS oprosiTiFOtiA (FreseD. ind. sem. b. fra/ico. ann. 1.836), canle hirto, foliis opposilis et super, alternis ovato-lahceolatu grossè seirati[<] acuminatis suprà scabris subliis villoso-sub^irsutis, capitulis coryiAbasis, invol. biseziali, sqaamis ovatis suhpatulis, li^ulis 11-ca. % ? in agro Illinoensi locis ndis pratoram. Canlis 4-alatus. Pedunculi subalati abbreviati. Folia 3 poll, long*, 2 poll. lata. Achaenia lato-alata. (v. v. in h. ^enev.)

V. p. 577. lin. 7*

1. OYEDJEA VEFIBESINOIDES, adde : DC. in Deless. ic. sei. 4. t. 34.

V. p. 588. lin. 9.

16. HKLIAMTHUS DBCAPETALUS, adde : Hook. bot. mag. t. 35io.

V.p. 589. lin. 49-

3a'. H. CALIFORNICUS, syn. adde : Hel, longifolius Hook. fl. bbr. am. i.p. 3i3. bot. Beech. 1. p. 149. non Pursb. Hab. ad flum. Col am bin 'et in motitibus sco-polosis QX Hook.

V. p. 590. lin. 7-8.

33*. H. MAXIM;LIANI (Schrad.! ;em, h. goett.v >835. |^i. sc. nat..i836. bot. & p. 101) | foliis catflnis ahernis, raqaeis oppositis, ^ncoelatis sub&erratis sca-bris ntinque attenuatis petiolatis, idKrol. squainis lano'eolato-lineanibus acumi-natis bispidulis. — i^ Amer. bor. grpyiy^oais ad flum. Missouri detexit Princ. Max. Neovidensis. Capitula paulò minora quam H. gigautei. (v. s. coniru. à cl. auct.)

V. p. 59a. lin. a fine 2.

3. ^LOIIREKSIA LAURiFOtiA, adde: D C. in Celess. ic. sel. 4. 1. 35.

"V.^ 5g4. lin. 3o-3r.

j. ttiDENs TRIPA^TITA, adde;

fi.indtvisa, tbiis omnibus indivisis, cadle sesquijy^dali, capitaH* tnajusculi's. in Persia boreali Vegit cl. Aucher pi. exs. 11^3(47! Acliadia biarisiaia. (V. 8.)

V. p. 605. lin. 28-29.

77? B? Nov*-CALEDOWMs(For5t. cxScbkcbt. in limjxa'iSjj. L>^x .oj, canle ra-

inoso diebotomo , raniis sbsulcatis glabris, foliis pilosalis pifhatisectis, lobis lanceolato-Hnearibus acutis integerriuis, fol. s̄m,niis indivisis, capir, solitariis tchininalibos, achaeniis compirs^is niargine aculusculis utrinque 3-linealis. breviter lancealatis. — in Novâ-Caledoniâ, Nov. Hebiiflifi. Coreopsis Tannensis Spreng. syst. 3. p. 614. Eiū^ns pinnatiida Wall, cat. vcomp. n- 300 ? ex Sohlect.^An fortè Cnipylothec^ aut Glossogynes sp?

V. p. 606. lin. 26-27.

x*. Cosmos TENCIFOLIUS (Lindl. bot. reg. t. 2007) *laberrimus, foliis bipinnatisectis , lobis linearibus remotis acutis.iimis integris lo-bulatisque , invoh.exterioris squainis ovalis acuminatis, achaeniis asperis rostratis mnticis ant i-3 aristatis. (Tj iii Mexico. AffinisC. *J3lpinnato^se~~k~~~~l~~ Julia tenuius inrisa , invol. ext. squanjaj minus acuminatoi, tructus^cabr longius rostratifs, disci exaristatus.

'V.p. 610. On. 33.

3. LirochjETA UMDELLITA, adcf*e* i DC. in Deless. ic. sel. 4*. \$6

M.p. r>i8./m. 41-42.

42. "VERBSSINA.* TROSTRATA (Hook, et Am.! bot. tfeech. p. ig5), caule prostrato ramo'sb ftinc iudè radicante scabrido, foliis oppositis oblongis brevissimè petiolatis basieueatis pauci- (sub- 3) dentatis utrinque hirsutnlo-scahris, pedicellis i-cephalis ex apicibus aut ramnloruin bifurcationibus ortis folk) longioribus, invol. squamis ovalibns acutis imhricatis, recept. paleis angustif^ibus cttcrum similibus, ligulis paucis. — in Chinâ.circâ Cantbnera. Flores lutei/Fructus non satis noti. (v. s. comm. à cl. Arnott.)

V.p.Giq. tin. 29.

DITRICHUM Cass.rwc Tirnrr. —Dilrichium Timm. est Didyuodootis sp.

*V. p. 627. lin. 5.

1. DUWANTIA ACHTRA'NTHES , odde : DC. in Deless. ic, sej. 4* 37.

V. p. 627. lin. r.i.

2. DUN^RTIA MicRocErjiAXA. Hiius spec^le specimen in herbario meo deerrans nuperrimè reperi. Habuiex herb*. HiibandiâoA cl. peregr. Née in Pâtagoniâ ad portum Desideratum lectnin. Dubia ideò mihi videtur indicatio habitationis in Mexico ex herb. Haenke. In hâ! cnitp aureâ cseterom collection*^scbedulaš plantis uon adheient < errores ideò lâcUè evadiint.

V. p. 627. lin₂afneS:

n. XnEESTA MICROPTERA. Hue ex specyn. missò pertiuere videtur Ximenesia ftiistralis Hook, ^t A^n. ad Bonariam ciara Iccta.

V.p. 629- //W. 27.

3. OLTGOGX^E TAMPICANA, adde: DC. in D~~le~~s. ic.^el. 4. t. 38.

V. p. C29. lin. 3o-Jf-

4. BURCHELWI (Hook. ic. pi. 3. ^.101), peduncnis capitulis plermnq[ue] multalongioribus, acbaeniis^oblonga-ovatis obtuse trigonis , paleis cuaeiformibus apice incisis. — in Rio-Janeiro Brasilieusium.

V.p. 631. tin. i5.

4. CHUTSAWTHELLUM IWDI^CM, adde : DC. in DeJess. ic. sel. 4. t. 3Q.

V.p. 633. tin. 22.

1. DELUCIA OSTRUTHIOIDES , adde : DC. in Deless. ic. sel. 4. t. 40.

V. p. 635. lin. 38.V

3. FLAVERIA LINEARIS. Recepí ex ins. Cubâ lectam i cl. La Sagsa. Caulis basi ut vuJt Lagascu< suffraticulosus, nccwit vult Kunth berba annna.

V. p. 636. In. 13.

1. BROTEROJV TRINERVATA, *adc^B* : in Guianā anglicā. Schomb.! pi. exs. n. 247.

V. />. 639. In. 1g.

- JLAIRVILLEA. Deleatur et ad genus Cacosinia p. 9*7f educator.

V. p| f>42. ///. 37-3<.

. HYUENATHERUM BELBNIDIUJYI , caule suffruticuloso erectp ramoso, foliis oppositis ad basin subpalinatorpinnatipartitis, Lobiscirc. 51ateralibus minoribus, tenninali elongato, omnibus subulatis rigidis puberulis, pedicellis elongatis i-cephalis nudis, invol. gamopbyllo biseriāli, pappi paleolis 2-3-fidis lanceo-lato-aiistatis. <J circa MendoMiu et in Patagoniā boreali.Belenidium Candoleanura Arn.! in tltt. Pectis acicularis Gill. herb, ex Am. Habitns omnind H. pentachaeti || Berlandieni. (v. s. coram. à cl. Arnott.)

y.p. 643. In. 35-36.

- 4*. TAGETES SIGNATA. (Bartl. in J. sem. h. goett. 1837. p. 7), caule erecto r-5nosd, foliis pinnatiseptis , segii\entis 6-jogis oblongo-linearibns inciso-serratis, serratnris inferioribus armtatis, pediculis i-cephalis snpernē vix Iticrassatis, in-volciis1 oblongo-oyatis 5-auguiat-ibus , ligulis 5 subrotando-ovatis truncato-emarginatis. —in Mexico. Af finis T. pa tula. Pappus paleis 5 trnncatia.

'V. p. 651. In. 10.

22. POROPHT^^UM? SELIOI. —'Conf. descr. eximiazn (snb nom. Kleiniae Selloi) à cl. de Scblectendul in linneā 1837 editani. Ex ea patel atirps Porophyllo non adnumerauda ut jam suspicatus erara, sed locus verns dnbius. An fortè Eupatoriacea ?

V. p. 65a. In. 7.

1. GAILLARDIA DRUMMO^DTI , *adde* : G. biocolor var. Drummondii Hooft. bot. luag.'t. 3551. G.^iicta brit. fl. gärd. ser. 2. t. 5^67.

y.p 653. In. 35-36.

CCXCII\ ACHYRACHJENA *tiskauer del. sem. Iwvratisl. i83fy*/j. 3.*

Capituliyn nulliflorum , floribus radii steriM)us parvis subligulalis sea hiac apice lissis genitalium rudimeuta retinentibus, disci hermaphoroditis 5-fidis-. Invol. duplii semie, squamis lanceolalis, exter. foliacies subcBntfolutis et flores radii intrà cavitatein-foventil5us, inter, mpr-giie scariosis planis. Recept. planuin paleas i-serialcs inter discum et r^UtOm gerens, cxtexùm nudum alveoldto-subfimbrilliferum. Anth. 4fcldfeuidáia3, aŕlfculo antherifero longiuscuio. Styli rami teretiusculi puberul. Achaenaelongata-basi attenuata longitudindUt^r striata seciis ner-VIII03 scabrida, radii calva, disci coronata pappo afriplö biseriali, paleis 10 membranaceis obtusifi', exter. 5 dimidiò et ultrà brevioribus, inter. 5 junioribus circà tubum cor. convolutis. — Herba ex orā occidentali America? bor. of'ta , villosa, habiliu Haecubaeam seu Scorzoneram ferè referens, subcanescens, pilis aliis loAgis aliis brevissimis fortè subgia,n-dulbsie. Caulis sub simplex apice nudus i^Cepliahis. Folia a Item a linea-ria sessilia integerrima. Cor. longè tubulosae, ex sicco purpureae.

1. A. MOTUS (Schauer 1. c.)^— in orā occid. Amei*. bor. verisimiliter ad Calliforniain legit cl. Douglas, (v. s. comm. ab hon. soc. hortic.londin.)

V. p. 65f. In. 30.

10. BAHIA LANATA. Confer Fiscb. et Mey. ind. ieto.'h. petr. i835. p. St. n. 64. synon^miam no.stram confirm.

"V.p. C60. In. 17.

1 E:,PEJOA Mtxrc ANA, aSde : DC*, in Deles* ic. sel. 4. t. 41.

'V.p. 660. lin. 19 et 20.

CDFV. CERCOSTTLOS, *adde*: exSchlect.syn.Gnnlheria Spreng syst. 3. (1828.)
p. 449 non Trev. nee Andiz.

1. C. BRASILIENSIS , *adde phraii specif.* '• folios iutegerrimis *et syn.* :*Giintberia
Megapotamica Spreng. I. c. exSchlect. in liunaeā i83?. p. 4.

y.p. 660. lin. 22-23.

9. C. SCABIOSOIDES (ATII. inlitt.), fohis oblongo-lanceolatis acnti& uhi- aut' h1-
pinnatifidis. — in piov. Cordovae, Sancfi Ludovici et Patagunix borealis. Ce-
phalophora scabiosoides Don mss. etCeph. elongata Don niss., ex paite, jnxtā
cl. Arn. (•. s. coram. à cl. Arnot;.)

'V.p. 661. lin. 3i.

3. HYMENOXYS ODORATA, *adde* : DC. In Dele^s. ic. sel. 4* t- 4^.

'V.p. 661. lm. à fine 7-6.

5. HYM.? LINEARIFOLIA (Hook. ic. pi. 3. t. i40)> herbacea kild'e rarnosi sub
lente pilosu, foliis alternis linearibas integris.injò iutegerriniis, pedicubs ter-b
zninalibus i-floris, capitulo radiato, inyol. sqfaamis oblongis im^utis , pappi
paleis H-6 ovato-acuroinatib nervo excurrentelongè cuspidatib.*— in Texas' ad
San Felipe legit cl. Drummond.

M.p. 662. lin. 34.

Sect. 11. ACTINELLA, *adde syn.*: Ptilepida Rajin. 1820.

y.p. 663. lin. 24.

3. C^sPHALOPtORA^DEcuRRENS, sjrn. *adde* : Heleniam pbescens H6ok. bot. Bc'ech^
P- i49.

y. p. 664. Un. 42.

1. LASTHENIA GLABERRIMA, *adde syn.*: L. Californi^a Lindl. bot. rég. t. 1823.

'V.p. 665. lin. 40.

1. HECUB^A SCORZONBR^EFOLIA , *adde*: DC.ic. sel. 4. t. 43.

V.p. 665.lin.afne6.

CDXHI. HELENIUM, *adde syn.*: Brassavok Adansfam. 2. p. 127 non Brewu.

V. p. 668. lin. 33. <

f. ARGYROXYmuM SMDWICEN5E, *adde*: Hook. ic,*pl. 3. t. 75. DC. coll. mem.
ix. t. 8. Arffcyrophyton Book, com p. bot.^mag. v. 2.

V.p. 668. /m. 40-4i.

CDXVI*. fcCHOMBURGHIA DC. coll. mem. ix. *.₉.

Cqpitulum multitlorum radiatum, fl. racjii 5-7 ligulatfs foeinineis,
disci tubulosis 5-dentatis hennaplu*oditis. Invol. ovatum imhricatum
circ. 3-seriale , squamis inter, longofibitis-oblusis striatis. Recept. con-
v ex urn epaleafœum pun(^alum. LigUlaj a^ice 3-dentatae. Genitalia disci
indusa. AchaBnium prismatico-teretusculum pubescens. Pappi paleae 10
ovali-oblongaeapfce subdentata3obtusa3 1-scriales more cu*ollarum con-
tortarum invicem iucumenles. — Herba Viuianeis dichotome- ra-
mosa erecla teres puberula. Folia opposita breviter petioiata ovatcv-lan-
ceolata utrinquesubacumiDatqgrosse denlata tripljnervia glabra, peiolo
venisque subtiis puberulis. Capitula è dic'hotomiis pedicellata soli Uri.i
maenifudine circ.'fjfi. Cor. flaya. — Genus dicav'i cl. peregruatori
anglo Schomburgh qui Huperime Guianam Augham Botanices causft
pcragrat et hanc ipsam plan lam detexit.

x. S. CALKOIDES. — in Guiana Angliae (Schoenb.I). Folia polite, longa, vix semi-poll. lata. (v. s. à cl. inv.)

V.p. 669. lin. 20.

1. LEMMATIUM ROTUHDKFOLIUM, adde: DC. ia Delc. ic. sel. 4. t. k].

V.p. 674. lin. ai."

CALEA. PINNATIFIDA, adde sjen. : Mikania diatata Spreng. syst. 3 p. 422? DC. prod. 5. p. 203 ? ex Schlect. in linnaea 1837. p". 12.

V.p. 679. lin. 39-40.

CDXXVII*. LATIA Hook. et Arn. hot. Beech.p. itfi. sub Tridace.

Capitulum multiflorum radiatum, fl. radii ligulatis foemineis, disci tubulosis hermaphroditis. Invol. hsemisphaericum, squamis oblongis Qcutishasin florin radii eorumque achenia involventibus. Recpt. pln-nuni [>alcas lineares pluris^riales idler radii et disci ttorcs interjectas gercus. Styli* rami recurvari appendiculati. Achaenia oblonga basiattemraea, iadii glabra calva, disci pilosa pappo persistente rigido basi plumoso donata. —Herba decumbens Californica patentim hispido-j]osa ramusa, ramis i-cephaljs. Folia alterna linearis-lauccolala, iufcr. pinuatifida ,iuper. integra. Con. lutes.

1. L. GALLARDIOIDES. — in California. Tridax? galardioidea Hook, el Arn. 1. c.
" " V.p. 691. lin. 29-30.

T*. MADIA GLOMERATA (Hook.il. bor. am. n. p. a4)» capituHs2-4gIomeratispaciflrfis in corymbum terminalem digestis, radiis obsoletis. — in planitiebs ad Sa&katchawan Amer. bor.

T. p. 692. lin. 5.

T. MAD ARIA ELEGANS, adde syn.: Madia elegans bot. mag. t. 3548. — Madia viscosa f. Hook. fl. bor. am. I. p. ?4-

V.p. 693. lin. 28.

1. OXYURA CHRYSANTHEMOIDES^a&fc* Lindl. bot. reg. t. 1850. Fisch. et Mey. ind. tertius sem. h. petr. 1837. p. 43? Ex cl. Schauer (del sem. h. vrat. 1837), achenia omnia subancipi-compressa obovato-oblonga, radii calva glabra, disci (fl. herin.) pubescentia pappo setoso coronata, setis seu paleolis longitudo inaequalibus serrulato-scabris.

V.p. 695. ad calcem.

DCX.XXIX*. CALLTCHROA Fisch. et Mej. ind. tertius se/n. h. petnop. 1837. p. 3i. D. Don brit.Ji. garcl. ser. 2. t. 373. Schauer del. sern. h. vrat. 1837. p. 3.

Capita I tun multiflorum helferogamum, fl. radii foemineis subbiseriatis ligatis, disci tubulosis lietmapht'. i-dentatis. Invol. duplique ordine polypylum suba&quale. Recpt. depresso linbrillifeT&ni epaleaceum ('C\ Don), seu margine palcis a-3-strialibus munitum (ex Schvaei¹). Agchsenin ^bftisiformia, radii glabra magis compressa apice calva, disco elevato trimcato, squamis invol. exterioribus obvoluta^ disci villosa pApposa. Pappus setaceus denticulato-scabci- T-SCrialis. —Herba Califorica erecta. Folia alterna sessilia. Capitula soiitaria pedunculata, flavo^aurea, radio ampio cujteato. —Genus affinc Madaroglosste et Oxyurai.

i. C. LATYGfOISa (Kisch. et Mey. I. c.), (T) in California.

¹VL p. 4. I'm. 44.

1. ANTHEMIS SCAHIOSA , *adde* : ad ripas Euphrati cl. Chesney D. 140! et ad Aleppuin cl. Aacher n. 328\$!

VI. p. 8. lin. 16.

19. A. MONTANA, *adde*: hūe pertinere videtur Anth. Iberica Auch. pi. exs. n. 3⁵⁸! in Asiā-Minore lecta et à descr. stirpis homonyme Bieb. ul videtur diversa.

VI.p. 8. lin. 35.

20. A. MARITIMA , *adder*: circā Odessam Auch.! pi. exs. n. 3362.

VI.p. 9. I'm. 47. -

27. A. PEREGRINA, *adde*: in insulae Zacinthi arenosi maritimis (Margin, iu Arabiā Pelraea (Schimp.! n. 399).

VI. p. 10. lin. 35.

30. A. ALTISSIMA. Ab hāc nnn differe videtur A. Ka⁵iiica Vis. saltern ex specim. à cl. Wiest in JtJgypto infer, lecta (un. id p. n. 5ia.)

VI. p. 14. lin. ult.

2. LYONNETIA RIGIDA , *adde* : in insulā Chio legit cl. Aucher pi. ex. n. 3a52!

VI. p. 15. Un. 28-29. "

- C. L. m⁵TINATA , caulis è collo plurimis simplicibnsba'si puberulo-hirtellis infemē foliosis snernē nudis i-cephalis, foliis hispidiusculis pinnatisectis lobis subulatis mucronatis aliis integenimis aliib pinnatilobatis, invol. squainis inargine scaiiosii oblongU acutiosculis. % in insula Rhodo legit-cl. Audier pi. exs. n. 3z50 et in Graeciaēmonte Diaforti (Bory) Anacyclus pectinatus Boī'y ei Chaub. fl. mor. p. J51. t. 28. f. 2, quern ad L. lennifolia in dubiub referebam⁵iuc potius pevtinet. Capitula dimidiò quāra L. tenuifoliac minor. Pappus minimus ant nullus ex capitulo juuiore videtur. (v. s. à cl. Auch.)

VI. p. ai. lin. 5.

6. PTARMICA NAWA. — Specim. pedalia in valle Rossig Rhsetiae legit cl. Moritzi#.

VI. p. 21. lin. 8-9.

- 6*. P. MULTIFIDA, tota pubescens-aubhirsata, caule erecto siuiplici foKoso, foliis bipinnatisectis lobis linear-setaceis, corymbo compositeconferti, in\ol. cainpanulati squamis margine fusco-nigricantibus glabris, apice subciliatis, ligulis 8-10 oblrori⁵is. If, in Olympo Bithyno legit cl. Aucher. AchīHca setacea Auch.! pi. exi. n. 3ag6 non W. et Kit. Aflinit. P. nanaZ&cd minūs villoin, el folia bifere tripinnatipartila. (v.s. à cl. inv.)

VI. p. 22. lin. 4.

- 1*2. P. UMDELLATA, *adde*: hūe referto stirpem Auch.! n. 3297 in Olympo Thessaliaelectara , Ptarmicam Clavenna; referentemped nullū minorem et ferè Ptarmicae nanarhabitum gerentena. (v..s.)#

VI. p. 22. lin. 44.

17. P. IRCUTIANA, *adde* sijn. : Achillea Leneniis Turcz.! in litt.

VI. p. 26. lin. 26-27.

10. ACHIU'EA S>YLV'TICA , *adde* :

0. *subvehilina*, caule Yoliisqae pube brevi pubescens-velutius. If fk Grād& legit cl. Aucher pl⁵cxs. n. 3555! (v. s.)

VI. p. 26. lin.'d⁵finc 7.

- 3 A. NOBILIS , *adde* : in Olympo tfhbyno (Auch.!).

'VI p. 27. Un. 3.

14. A. MICROPHYLLA, addc: in Hispaniae Granatensis montibus ad alt. 5000 ad 7000 ped. gregariè crescit obs. d.K. Boissier. — Ach. microphylla Caucasca in herb. Rossic. obvia, diversa excorymbo siuplici, recept. nudo, etc., et videtur Pyrethri species.

VI. p. 27. /in, 45-46.

- 18*. A. PALL^SCENS, canle creto siuplici pubescente, foliis à basi pinnalipartitis snbpnbescenlibns, lobis-pinnatifidis acutis sabremotis integerrimis, corymbo composite) polycephalo fastigato, bracleis set^ceis, invol. ovalis pubescentis squiamisacuniinttis, iugulis obovatis integris. if Pin Asia Minore legit cl. Ancher! Ach. ochrdleuca Auch. I pi. exs. 33oi non Ehr. jiec Kit. Herba ad A. tanacetifoliam ferè accedens. Ligulas pallidas ochroleucae. (v. s. à cl. inv.)

% VI. p. 28. lin.penidt.

24. A. COMVACTA, adde: in Olyrapo Bilhyno legit cl. Ancher pi. exs. n. 3295!

VI. p. 3p. fiii, 23.

- 3a. A. TOMENTOSA, adde : iff Graecia (Anch.l), in montibus circà Tessalonicaiu (Sibtb.)

VI. p. 3o. ad calcem.

- 36*. A. DAMASCENA, caulinus è collo lignoso plarimis simplicibns velutino-tomentosis, foliis tormentosis pinnatisectis lobis tricuspidatis snbtridentatis confertissimis, corymbo oligocephalo subsimplici, capitulis pedicello ferè longioribns obovato-globosis villosa-subtomentosis, ligulis minimis concoloribus. *!f circa Dain*i&cm* legit cl. Ancher-Eloy. Acb. falcata Auch ! n. 3293. an Linn.? h nostra A. falcata differt prasertim ligulis minimis et capitulo breviter pedicellatis, ab A. falcata Wilfd. seu albicali oii^nind diversa. (v. s. à cl. inv.)

VI. p. 3r. Un. 29-30.

- 39*. A. ERICLADA, caule basi fruticoso et ramoso, rarus praesertim junioribns pedicellisque dense lanuginosis, foliis pinnalisectis rachi excepta glabriusculis, segmentis transversis approximatis grossè dentatis, coi*ynibo composito polycephalo, invol. ovato-globose snbl^ndginationis, lignis 5-6 obovatis snbdentatis, paleis lanceolatis hyalinis. If fi in Olympo Birhyno legit cl. Aocher pi. exs. n. 3304! Aftinis A. cretiae et eriophorae. Ligulae albidae ant ochroleucae. (v. s. à cl. iiiv.)

VI./1. 39.1w. 6-7.

- 43*. A. ALEPPICA, caule basi sq^Truticoso ramoso erecto, glabriuscilo, foliis pinnatisectis glabriusculis, segnieatis transversis denticalatis, corymbo composite, ranuulis angulatis, capitulis oblongis paucifloris, ligulis 3-4* % 5 c^1f^ 4leppum legit cl. Aucher! A. imbricata Anch.! pl exs. n. 32q4 non Vent. Similis A. teretifoliae sepi ca pi tula ovali-oblonga nee obovata, flores ^0-12 tantum gerentia; ramnli cor. e^inyol. subvelntina. Cor. lateae. (v. s. à cl. in?) *

VI.p. 32. Un. 19.

48. A. IMBRICATA, adde : ad ripas Knphratex herb. «xped. ChesVieyanae n, 184.

VI.p. 36. Un. 40-41-

- 8*. SAWTOLINA KLVGAKS (Boiss.! hied.)f toU canescenti»-tomentosa, caule saffruticinloso demisso cespitoso, ramit fldridis erectis i-cephalis parcè foliosis, foliis oblongo-linearibus integerrimis, infer, obtusia, summit apice membranaceo-acuminatis, invol. dorsocanescens adpressis acuminatis. If* \$ in declivibus arer^sis ad Trevenke in parte calcarea Sierras Neradae regni Granatensis ad alt. 6500 ped. detexit cl. E. Boissier. (v. s. coinn^, à cl. inv.)

"SI. p. 45. Un. à fine 7.

1. LLUCANTBEMUM iHTEGRiroucM, addc; Ueiba pygm^ea ad fietum Senjavç-nense exspecim. ab hon. acad. bt petr. missio. (v. s.)

VI. p. 45. lin. à fine 6-7.

3*. L. ARMCNUM , caule safruticoso à basi ramoso multicipiti, ramis ad apicem gereutibas. folia petiolata erecta pinnatipnrtita pubescentia, lobis linearibus integrerriinis, pedunculis ex axilla' folio rum oitis nūclis i-cephalis glabris folia quadruplet superantibus , in vol. squarais ovatis acutis margine foscis. scarioso-hyalinissubdenticulatis. If \$ in Armenia legit cl. Ancher-Eloy pi. exs. n. 3476! Plants pars inferior vid. ex sicco more plantaram alpinarnm inter folia nive aat in terra⁴ sepulta fuisse. Folia juniora subvelntina , adulta glabrata. Ca pi tula raagnit. L. integrifoⁱⁱ. Achaenia saltern per anthe.sin omnino calva. (T. s. à cl. inv.)

'VI p. 50. lin. 27-28. adde:

MATRIC\B,I,E sect, ia bisA - DIABASIS. Capitala discoidea. Cor. 5-dentatas. Recept. sphaericum. Pappus nullus.

1*. M. CORYMDIFERA , glabra erecta apice corymboso-ramosa, ramis elongatis monoscephalis, foliis 4 basi pinnatisectis, segmentis multifidis, lobis linearis-setaceis, capitulis globosis, invol. squamis apice scariosis subaequalibus. (J) in Oriente ad Elwind legit cl. Aucber pi. exs. n. 3567! Herba sesquipedalis Pyrethrum corymbo&um inflorescentia referens, Species omnino media inter M. discoideam et nigellofoliam , priori ligulis nullis, posteriori recept. sphaericis affinis. (v. s. à cl. inv.)

'VI p. 55. lin. 38-3Q.

1 a*. PYRETHRUM AUCHERIANUM , canibns è collo suffruticoso pluribns erectis siuiplicibus apice nudis i-cephalis , foliis à basi pimiatistctis segmentis wunatipartitis lojis oblongis parvis obtusis cauleque birsutulis, invol. squamis ovalibus apice hyalinis obtusis, pappo brevis&imo. ^ in Armenia legit cl. Aucber-Eloy. Pyrethrum Aucb.! pi. exs. n. 3455. Accedit ad P. cinerariæfolium sed folia bipinnatipartita, etc. AmbigiteK brevitatem pappi coroniformis* inter Pyrethrum et Leucanthemum. (v. s. à cl. inv.)

VI. p. 56. lin. à fine 'i.

19. P. CAUCASXCUM, adde: in Olympo Bithyniae legit cl. Aucher n. 3285! (v. s.)

VI.p. 60. lin. 31-3a.

39*. P. OLIGOCETH ALUM , collo soffraticoso, multicipiti, caulis erectis parce foliis apice nudis laxè raiuosis 2-3-cepbaliis, foliis radicalibus petiolatis, caulinis sessilibus, omnibus cauleque sparsè et minutè pubeialis pinnatisectis, segmentis pinnatipartitis, lobulis parvis obtusiusculis, invol. hemisphaerici squatais coriaceis adpressis apice summo subhyaluis, pappo brevissimo. JC 3 in Armenia legit cl. Aucher pi. exs. n. 3480! Flores flavi. Ligulae coriaccae obovata* apice obtuse 3-dentatae in sicco subvirentes. Tuboli punctis paucis resiuosis consperM. (v. s. à cl. inv.)

VI.p. 61. lin. 8-9.

43*. P. CAPPADOCICUM , caulis è radice suffruticosa pin rimis subaphyllis simplibus velatinis, foliis radicalibus antè parte caulis inferiore ortis petiolatis pinnatisectis adpressè seviceo-canescensibus, segmentis oblongis integerrimis aut apice trifidis, capitolis circ. 3 subsessilibus id apicem caulfis, invol. basi bursuti squamis ovali-oblongia apice rufo-scariosis. % 3 in montibus Cappadocia legit cl. Ancher-Eloy p. exs. n. 3^82! Caulis 5-6 poll, longus. Folia ferè Artemisia? argenteae. Capitulaⁱⁱ flava. Pappus subcoroniformis in lobos a-3 fissus. (v. s. comm. à cl. inv.)

VI. p. 6a. /i/i.^3a. P. MMENSE. ^ lege 5 •

VI. p. 64. lin. 8.

l. CHRYSANTHEMUM SEGETUM , adde: in inj». Zacintho (Marg.), in Oriente ad Gazam. (Auch.)

VI. p. 64 .lin. à fine \$.

INARDIA Cass. non Neck, nes Arab.

VI p. 64. Un. à fine 3.

4. G. VISCOMUM, *adde* : ad Antiochuni (Auch !)

'VI p. 65 lin. àfina 9 ^J Ze^e 3 .

VI. p. GG. hn. ao. ^ /e#e 3 .

^W.J. 76. AM. 15.

Jacosta, /e^e; locaste. Noineuad coloreru violaceum iingularara allndens Ideb foitv
iimneiito nomen eqindem inediluin inatavi. — m cat. gen. *loco* radio luteo ,
lege: radio violaceo.

VI p. 95 lin. 10

8. ARTEMISIA, GLUTINOSA. , *adde*: in omni legno Giain^Dbi ad montes Alpujar-
rasi alt. 3000-i500 ped. legit cl.Ed Bois&iei '

VI. p. 118 lin. 23-a4^

13J*. A. GRANATENSIS (Boiss f ined), cespiosa mnlMceps tota seiicco-aigetea ?
caulibusMOiphcibus, foliib petiolafis tiip<uttiis, segments palraatisecfis , lobi,
lineaiibub acutinscnlis, capitnlis 3-5 sub-80-llois snbglobosis, mfei louge pe-
dicelldtis, snpei. sabses&ihbas fere coi"yrnbosi», invol. sqaamis cano-argenteib
margue fuscis scaiosis, corollis apice piloso-bnsntis, tecept beuñpheiico
4;labio %£ la Hispaniae Gianateubis ad Sieuae INevadaecacuiuina alt. 8000-11000
pedam Jegit tl. h Boisniei. Va|g. *IUanzanilla real* dicitui et à IUBticis ut itoma-
chica usitata. Affinis A. .spicats bed iafloies>ceutia praesertim diveisa (v. J. à
, cl.#nv.)

VI. p. 119. hn (d à fine.

148. A. ANNUA , *adde* ciicà Constantinopolim (AucL.!)

VI. p. 121. lin. 2.

- i55. A. ARGITTEA, *adde*: iu insalà Rbodo (Auch !)

Vi p. 111. hn 18

- 15^ A. ARBORESCENS, *adde*: IQ insulà Zaclnt^o (Marg.!).

Vt. p. 121. hn. à fine 3.

161. A CAMPHORATA, *adde*: In Hispauiae Granhtensis Siena Nevada ad Caste
jaela (Boiss ').

VI, p:|2Q. Iui.i3.

6. TANACEIUM C\NFSCENS, *adde* Idem, ni fallo, 14 Cilicia legi^cl. Aacbei pi
ess. n. 329f.

. VI.p. iji. hn. 2J-22.

ao*. T. AUCHERI, caule herbaceo subadseidenti-ei<cto foliisqne paberuhs ,
iohis petiolatiJ, plaatifectis, segrnentis wult^idis, lobisliueaiibusiDtegerrimib,
capiti.hs 2-7 iff coiymbum tc^ininalm disposals, invol campanuleto —i
luonte Libaao legit cl. Aacbei-Eloy pi exs n. 33o3 ? Affine T AudlbeiU,
bad folio rum lobi con ben.ili Pappus bievib 4-T-labus». (v b àcl.inv)

VJ.p. 160. lin. 9

- 1 LEPTORHYNCHOS SQUAMATUS, *adde*: Chiysocoma sqaamata Hook. bot. mag
t. 36*25.

'VI p. i8a hn 7-8.

67* HFLICHRYSUM IANATUM (DC non Schiank)/otuni lanupine laxâ hitsutibsi
mum, caulibub heibaceis simplicibns, stenibus demissib, JU'ndo ejecto, folns
obiongo-lignalilib lnie^eirimis acatis, coiyubo contiacto , invol subglobosi
basi lauuginobi bquainib glabiib ovatis ^ aaeis J, disco floi xquabbiib If iu

Olympos Bitbynia? legit ,cl. Aucber! Gnaph. gra.veolens Aach.pl. exs. n. 3 no ! non Bieb. Ab omnibus ferè sect, speciebus differt lanngine nou adpressà, £,& laxà et vcrè birsnlå. (v. s. à cl. inv.1*)

'VI p. 182. an. 11.

68. H. RUPESTRE, *adde* : in ins. Zacintho (Marg.!), ad Gibraltariam (Boiss.!)

VI. p. 182. Jin. 3a.

69. H. DECUwBENS, *adde* : in rupibns xegni "Valentini (Bd!s*!)

'VI p. 18a. *ad calcem*.

71. H. STJECHAS. *adde*:

£. P serotinum, caule parciùs lanuginoso. 3 in regni Granatensis partibus interioribus alt. 2000-4500 ped. legit cl. E. Boissier. H. serotinum Boiss.! ined. Differt ab H. Stachade vero florescentia seniori tinfipc aug. et septembri et foliis inodoris. (v. s.)

|l.p. i83. Jin. 7.

- 7a. H. ANGTJSTIFOLIUM, *adde* : in insiilå Cypro, si, ut autumo, Aucb.! n. 3545 hoc lité referendus.

'VI p. i8'3. Jin. 28.

74. H. ARMENU, *adde*: ct in Cappadocia ail Karabag. (Aucb.! n. 3i 14.)

VI. p. 184. Jin. 8.

77. H. ORIENTALE, *fi Coum*, *adde* : et in insuli Cypro. (Aucb.! n. 3i 18.)

VI. p. 184. Jin. aS.

30. H. ARENARIU^J, *adde* : in Crfppadociâ ad Enpbratem. | Ancb.!)

VI. p. 245. Jin. 19.

- I. OMALOTHECA SLTINA, ^ *snbacaulis?*— *adde* : in Olympos Bilbyni-B (Aucb.!) et in excelsis Sierras Nevada; regni Granatensis. (Boiss.!)

VI. p.- a4C. Jin. i3.

1. LASIOPOGON MUSCOIDES, *adde* : et locis siccis ad radices montis Sinai (Scbimp.i n. 182), el montis Horeb. (Auch.! n. 3J33.)

'VI p. 249. Jm. 5.

6. FILAGO ARVENSIS, j2. *Lagopus*. — *qgde*: in Sierrâ Nevada Ilisp. Granateps» (Boiss.!)

'VI p. 266. Jin. 1a.

6. TRICHOGYNE CAULI^LORA, *add*-*, in Arabiâ pctrseâ ad Haaara legit cl. Scbiruper n. 207! nee 408 qui-ad Filaginem Geriuanicam ft pyramidatain prod. 6. p. 247 referendus.

VI. p. 271). Jin. 8.

3. LKYSSBRA CAPILLIFOLIA, *adde*: in Wadi Hebraji Arabia petres ad rupes (Scbimp. !J, et elia in monte Sinai (Aucb.! 11. 3a43).

'VI p. ao5. Jin. 28. MICRODLIUS /e^e.-PsiLODERIS.

'VI p. 303. Jin, à fine 3.

DCII. BRACHYSTKPHIUM. Less.— Genus, ut jam suspiculus erara , delcatur et speciesad Brachycomem amandantur. Conf. suprà obs."V. p. 3oS. Unjns loco inseratur sequens incauiè omissuai:

DCII. A^TEROSPERIVIA Less. syn. 389.

Capitulum radiatu'm. Stylus disci rain 15 coao.Lrevi pubequ adsceii- dent^obsesso superalis. Achainium exalutumerostre plauo-coinpressmu

bicostatuni. Pappus conform is biserialis , \$erie ext. brevi, int. longā. *-**-Fruticulus Capensis ramosissimivs Asterihyssopifoliosimilis hirsuto-canescens, foliis sparsis linearibus. Capitula solitaria iż ramis supernè aphyllis. Radius coeruleus, discus luteus.*

i. A. CHRYSOCOMOIDES (Less. 1. c.). J ad Cap. Bonae-Spei.

"VI p. 3x6. lin. 46-47. adde :

•*••*• Persicce (cor. 4-fidis /-andris). An Genus?

17. LTGFARIA. AUCHERI, tota confertè glanduloso-pilosala, caule erecto simplici, foliis infer, petiolatis lyrato-pinnatifidilis loīs snbrotnndis grossè sinuato-de'ntatis, sup^r. sessiHbns*iRciso-pinnatifidis lobis apicquac acuminatis, capitnlis 4-5 pedicel I a ris racemoso-corymbosis, bracteis linearibas elongatis seeds pedicels et ad barfin in vol., ligalis paucinerviis, cor. disci 4-fidis 4~andris, achaeniis glabris. If in Persia: australis prov. Laristan in inontibns legit cl. Aucher-Eloy! pi. ezs. n. 343i. Pappus multiserialis rigidalus subochroleucus. (v. s. comm. à cl. inv.)

VI.p. 345. lin. 4i•

33. SEITECIO CHRYSANTHEMIFOLIOS.

y. adde : in Persia; prov. Aderbeidjan (Anchb.l n. 34*J3.)

VI. p. 3'i6. lin. à fine 6.

28. S. MIHUTUS , adde : in umbrosis inontanis regni Granatensis (Boiss.!).

"VI.p. 349. lin. à fine 3.

45. S. ERRATICUS, adde : in Hispaniâ ad ifossas Sevillac (Boiss.!)•

VI. p. 350. lin. 7.

46. S. AQUATICUS, adde : in Hispaniae mdntanis Asturicis (Dnr.!) et Granateubus (Boiss.!).

VI. p. 350. lin. 38.

48. S; DoRiiEi, adde: in pingnibns homidis Sierras Nevada Hisp. Granatensis (Boiss.!).

VI. p. 355. lin. 4.

jo. S. LiNIFOLits, adde: in Hispaniae Granatensis apricis legit cl. E. Boissier à maris littoribus nsque ad 5800 ped. snprà inare. — If lege 5 .

y2. frigidus (Boiss.! ined.), bumilib à basi multicaolis, foliis oblongo-linearibus, corymbo pauciflovo. % ^ in de^livi^iM argilllosis Sierras Nevada Granatennis. Prinii fronte à S. liniolio valdè diversus, sed ol. Boissier qni utrumque vivum observavitasserit esse ineram varietatem. (v. s. à cl. inv.)

VI. p. 355. lin. 4-5.

70*. S. QUINQUE^ADIATUS (Boiss.! ined.), glaber, caule baff suffróticuloso erecto divaricato-ramosibsimo teveti, foliis lato-linearibns basi attenuatis integerrimis aut sinuato-dentati.s, ramis elongads i-cephalis apice nudis, inv. squamis accessoriib minimis snbnallis, ligiliis 5 disco duplò longioribas", pappo corollis disc! breviore. ^ in sninmitatibus calcareis Hispaniae ad Dornajo et declivibns scbiwtosis ad Mula^acenalt. 6500-7500ped. legit cl. E. Boisuer. (v. s. à cl. inv.)

VI. p. 356. lin. à fine 4.

82. S. BOISSIERI, subacaulis cespitosus totns adpressè sericeo-canns, radice lignosâ brevier multiciffti, foliis radicalibus confertis ovali-oblongis petiolatis apice den tali*, scapo i-cephalo parcissircis folioso, cajpitulo discoideo, acbacniis glabiuſcnlis, pappo cor. tubnm paulò supei-anle. % in altis siccis Sierra: 34evade Giuuanen&is alt. 6700-9500 ped.detex.it eūm pluribus aliis cl. K. hojn-

sier! S. Granatensis Bois9.! mss. Habitns ferè Antennariae djoiae aut Hicraaii Pilosellae. Cor. subrabentes. (v. s. à cl. inv.)

'VI. p. 357. lin. à fine 4.

86. S. ABACHNOIDEDS, adde.: in Hispania Granatensi Fa Sierrâ de Mijas et montibus dê Ronda alt. a500-4500 ped. (Boiss.ty. *)

VI. p. 358.//i. 25-26.

68. S. TOURNEFOR^{II}, adde.'

@. *Granatensis* (Boiss.! ined.), foliis Iatiofibus subintcgerrirais crass ioribos, infer, breviūs petiolatis: *I/. in summis Sierrae Nevada; Granatensis alt. 6600-9800 ped. legit cl. £. Boissier. Capras inebriat! (v. s. à cl. inv.)

VI. p. 358. /in. à fine a.

91*. S. BEBFSPERUUS , araneobO-lanatus incane&cens, canle erecto tereti apiceco-ryuboso-ramoso, foliis canlicis anrito-semiarplexicaulibus variè pinnat[^]r incisis dentatisve, invol. calyculato glabro iquamellis adpressis, lignis 10-[^]2, achaeniis parcè villosis. — in Meiopotaiui legit cl. Aucherl pi. cxs. n. 4444. (v. s. à cl. inv.)

/£? eriolcenus, invol. aracloid60-)a*iato , ligulis i5-20. — ad Pontem Enxi- num legilcl. Aucherpl. exs. n. 3430! An t>p. propria? (v. 3. à cl, inv.)

VI. p. 359. lin. 8-9.

92*. S. THArbOIDEs totus tomento cano molli pannoso conferto albidns, canle erecto siraplici angulato, foliis radicahbus petiolatis oblongi& crenalatis, caulinis sessilibus lanceolatis integerrimis, race mo thyrsoideo, invol. ecarycnlati<< lignis nallii, achaeniis glaberrimis. % Ad montem Delphi Eubaex legit cl. 4 u- cber! Calacia verbascifolia Auch.l pi. exs. n. 3405! sed à S. verbascifolio om- ninò diffeit. (v. s. à d, inv.)

'VI. p. 360 lin. à fine 4-5.

103*. S. ELODES (Boiss.! ined.), caule herbaceo erecto laxè lannginoso, foliis ntrinquè acuminatis <<nbintegerrimis, infer, longè petiolatis ovali-oblongis, super, sessilibus linearibus, capitblis panels corymbosis raaxiinis, invol. circ. 3o-phyllo ornninò ecalyxnato araneo[^]o, ligulis nnmerosis angntissiniis, pappo cor. disci breviore, achainiii glaberrimis btiatis. If in humidis Sierr Nevada Hisp. Gianatensis ad decliv. merid. inontiuin alt. 8000 ped. detexU cl. E. Boissier. Species speciosissima, hominU altitud. intedum adaiquans. Perioh 8-9-pollic. (v. s. à cl. inv.)

'VI. p. 362. lin. 40.

111. S. UACHYCHIDS, adde : an ab fitk satis differt CSnerana tenuifolta Gam], fl. helv. 5. p. 307? saltern injspecim. Rbaetico descr. Gaud, sat conveniente, pappum corollâ breviorem nee boic aeqnalem vidi.

VI. p. 363. lin. à fine*.

118. S. KJEMPFKRI. EX speciroinisi Sieboldiani capitulo à rl. Zncari4i coimm. om- nin6 videtnr Ligdhia? 6[^]ecies post*Lig. Jdponicaua p. 3x6 inserenda et erit ti. KJEMPFERI.

VI. p. 365. lin. 45.

S. ZBYLAXVCUS, adde (v. s.)

VI.p. 439. lin. 6h. anteMADARACTis, adde:

DCIX*. CROCIDIUM Hook.fl. bor. am. i.p. 335. L n g R o n T gr[^]

Capitulum multiflorum radiatuin, ligulis foemincis. Invol. i-seriale lnulti-parLitum, squamis lanceolatis gjabris subpatentibus. Receptaculum conicuia nudum alvcolatum. Styli rami api<<e summo pilosi. Achaenia radii nuda[^]bovata compressa tuberculosa-crenato-inar[^]i- nata glaberrima, disci papposa, pappo aquali, setishirsufulis.— Herha

Boreali-Americana, annua humilis. Gaules simpliccs vel ramosi. Folia glandula, radicalia lyrato-pinnatifida Jaciniis paucis; caulina parva, linearia integra vel laciniata, in axillis (more Senecionisanrei) insigniter lanosa. Flores solitarii in ramis. — Genus ex ci. auctoie rfd Senecionides reiatunr, ob achaenia disciscalva, propè Madaractidem videatur colligandum. — Cl. Hooker incaule dicit in textu capitulum homogamum, diim in cone et in explicatione iconis capitula reveiā radiata sint.

x. C. MULTICAULE (Hook. I. c.). (T)-ad Hum. Colombia Ameic. septentr. propè Fort-Vancouver legeiunt cl. Doughis et N. Gany.

Trib. V. CYNAREM.

y. p. 453. tin. 34-

12. CALENDULA SUFFRUTICOSA, *adde*: in regno Granatensi à 2000 ad 1000 ped.
syphiā maie legit cl. Boissier!

*y. p. 539. /in. 29.

6. Ar^OTAXIS LEONTODONOIDES, *adde*: *DC. coll. mem. ix. t. 10.

VI. p. 5u.-fin. 14.

1. STAFHEINA. IJOETICA, *adde*: in umhrosis Sicn* Esteponensis à 2000 ad Jooo ped. alt. legit cl. Foissier!

'VL p. 550. lin. 44.

ATRACTYLIS UUMILIS. *adde* (v. >)

\I. /?. 556. lin. 8.

27. COU&NIA ONoroRDoiDE», *adde*: Eichw. pi. nov. 2. p. ^o. t! 3^. Onopdron • polyac. uilhum Eichw. 1. c. fast*. 1. p. 3. ex ip&o. .

VI. /». 567. litim à fine 6

1. AUCHERA ORIENTAIIS, *adde*: DC. coll. uieui. ix. t. u.

Ml. p. 559. hn. 3.

^ AMDERDOA MURICATA, *adde* : in Htepariae agro Malaccensi ad inargines agrorum (Boiss.!).

'VL p. 579. lin. 14.

68. CENTAURKA MOKTANA, *et. C)anta*. Evidencrex specim. heib. Boiss.! hue adhuc referenda ut meia vjiJelab C. Jingu^dta Lag. jn prod. vol. 6. p. 602. n. an •mtti'^ubias speMs indieata. In montibus Gianatensis à cl. Boi&bier lecta.

VI. p. 5B2. lin. 40-41.

88*. C. BOAAYCINA (Boiss ! ined.), tota iuvolucro excepto tomento denso cana cespitobd humilis, ladice ligoo& luultiripiti, foliu* ladicahbus confertissimis, Aliis obovatiMndivisis obtusis, aliis cjinlnisqoe jJinnalisectis lobij, integeriiniis obovatis, caulibus parce foliosis i-<epn*alis, involv squarro appendice longè et rig id ill e cibata apice subspiuōsa. ^ in Hispaniae Granatensis Sieirā Tejedā in arems calcareis alt. 4000-5500 }>ed. legit cl. L. Boi&sie! Vroxime accedit ad C. leucophyllara et C. aigenleam. (v. J. a cl. inv.)

VI./>. 583. lin. 41-42.

§5*. C TEKUIFOLIA, u. 17|, Hue transferciida, nee inter CilciUapea& ut incante ad missioñ it

VI. p. 584./m. 41.4.2.

95**. C MOMTICOIA (Boiss ! ined.) glabriuscula, caule erecto lamoso, foliis ladi-calibus et mfeiomibus pinnatipaititis, lobis pancts oblongo-lineanbus aculis titegernmis, cdulinis pleii^quc oblongo-hneaiibi⁹ indiviii*, involv. stquamis jpice m spinJ* n subcam u'gidaiu patul.iui basi cili.itani^ioductis, pappo bicvii>

simo. — in calidis Sierrae Nevada: Hispano-Granatensium legit cl. E. Boissio*] Aftinis C. caerulcscenti et tenuifoliae sed foliis caulinis plerisque iudivisisdifficSe videtur. (v. s. à cl. inv.)

VI. p. 586. lin. 38-3₉.

112*. C. BOISSIKRI, tota tomentoso-cana, caulinus ploribus decumbentibus foliosis apioe subramosis, foliis radic. breviter petiolatis, caulinis subsessilibus omnibus pinnatipatiis lobis 2-4-jugis oblongo-lipearibus integrerrimis, caniu- lis ramulos terminaniibus suprà ultima folia vix exsertis, invol. squanVis int sniam rigidam basi ciliatani subfuscum productis, cor. radii disco aequalibus.% in sum mis Sierrae Tejedae propre Malagam alt. 6000 ped. legit indef? E. Boissier! C. decumbens Boiss.! ined. nee Dubois nee DC. Cor. purpureo Pappus ackaejio triplò quadruplo brevior. (v. s. à cl. inv.)

VI. p. 5%?. lin. 3-4.

x14*< C. CLÈMEWIÉR (Boiss.! ined.), tota tomato aenso sybkinato cana, caule erecto ramoso subapbyllo, foliis radicalibus petiolatis pinna tiparfitis, lobis ova-to-triangularibus siibaiistatis vix acutis, caulinis sessilibus paucis, ramis floridis striatis i-cephalis, capitulo globoso, squoin. appendice brevilex* scarioso-decurrente longe ciliaria iu cilium vix spinescens abente. If in Hispauiaj Grauatensis Sierra de-Tolox ad parietes rupis calcarei; dfcta; Tajo db la Caisna uh, Aoo ped. legit cl. E. Boissier! Habitus C. Ragnsin*. Florea-latei? (v. s. à cl. inv sinefloie.)

VI. p. 587. lin. 14-15.

115*. C. PROLONG! (Boiss.! ined.), glabra, canibus è collo plurimis berbaceis simplicibus i-cephalis subaphyllis, foliis radic. petiolatis lyrato-pinnatiparlitis lobis lateralibus/blougo-lipearibus, ter^ninali lanceolato, gmnibus acuminatis integrerrimis, fol. caulinis sessilibi à basi pinnatipartitis lobo terminali vix cacteris latiore, suramis»paucis linearibus integrerrmis, invol. squamis apice longe ciliatis inermi apiculatis. If. in montibus demissis circa Malaccam et Koudain alt. 1200 ad 3000 ped. legit cl. Boissier. Cor. intense aureo. (v. s. à cl. inv.)

VI. p. 558. lin. a&ie 3-A.

i*5\ C. GRAWATKNSIS (Boiss.! ined.), parce avachnoideo-lanata, caulibus solitariis plnnmisve erectis simplicibus --cephalis, foliis radicalibus petiolatis, aliis* oblongo-lancablatis ulriuque acuminatis indivisis, aliis pinnatisectis lobis uiu-cronatis, fol. caulinis paucis pinnatisectis, invol. sqnamis apice ciliatis in spianam patelam squamâ duplo breviorem productis, intimis apice scarioso-membranaceis. ②? in declivibus calidis Sierrae Nevadae Hispano-Granatensium alt. 4500-5000 ped. legit cl. Boissier! Flores aurei. Radix verticalis. (v. s. à cl. inv.)

•'. VT.>. 588. lin. 4^.

114. C. ORWATA, addc: fvequemt in regni Granatensis argilloso ad alt. a500-5000 ped. ex c). £. Boissier!

VI. p. 5g'i. lin. ai. 1

151. C. AFULA, addc : in Hispania anstraii ad Make cam (Boiss.!)

VI. p. 5y'i. lin. 41.

i53. C. SILHUREA, adde : in collibus siccâ Hispauiae ad IVJalasaja, ct Marl^lb.,, legit cl. E. Boissier!

VI. p. Goo. lin. 3i.

198. C. POLYACANTHA, adde ; cl. Boissief in sylvis sabulosis Gibraltaria l*«*it atirpem(ab eo C. Hystrix dictam) quae vera" Willdenowii videtur C. polyacanthi-tbaet cum deacr. op limè quadrat. Invol. squam. appendices spinis 9- n sub-

fasciculatè instructs et ideo transitionern inter sect. Philotizi et Seridioiflis
xhibent. Herba casteruiuf C. spbaerocephala* affinis. (v. 8. à d. Boissier.)

VI. p. Gio.lin. JB.

i. KENTROPHYLLUM L AN ATOM, *adde*: in Hispaniâ mediterraneâ (Boiss.).

VI. p. 611. lin. 34.

6. K. ARBOHESCENTS, *adde*: in tolâ regiour Littorali Hispaciæ australis Mediterra-
nea: ad sepes et in Hidis legit cl. E. Boissier! Frotexcirc. orgyalis. Folia super.
Ovaâ acuiuiala potius quam obovata.

VI. p. 6r5. lin. h fine 3-4.

6. CRDDNCJELLtIs HisPAificus (Roiss.! ined.), gla^cr, canle râioso polycephalo,
foliis validè dentato-li>irJObi< infer, ovato-laoceolatis, ca?teiis lanceolati^, invol.
squarais exler. foliaceis spiuoso-denlatis, intimis apice dilatato-scariosis, acbae-
niis ctiaui radii pappigeri, pappo acha>nio longiore. % in arvis Hispante Gra-
naten sis ad alt. 5600 pt^ in Sierrâ de Gador legit cl. ttoissie'r! Aflinia C. pecli-
nato sed folia caulinâ latitudkii bue triplu uec t>extupl6 longiora, etc. (v. s. *
1. inv.)

|I.p.6iS. lin. 41-41.

4. OworoRDOW EXIGATUM, *aJte*:

fi. abbreviatum, caule abbfreviato a' medio ramoso magis folioso. — ad mar-
gines viaroin circâ Malacam legit cl. Buishier! (v. s. à cl. inv.)

VI. p. 619. lin. 41.

11. O. ACAULE. — Ex spec, in lli&paclfa Granateusi leclis c|. Boissfer' confirms I
silspacioneui me am de identitac C. araulis, C. pyrenaici et C. uniAori.

Ml. p. 6ao. lin. ult.

5.*CYfARA HUMILIS. *adde*: Sibth. Q. graic. t. 83\$.

VI. p. 6a 1./in. 3-4.

5*. CYTARA ALBA (Boiss.! ined.), caule siraplio apice 2-3-cephalo, foliis brevissimè
cuiTrntibus brevissimè cauleque subvelutinis pinualipartitis^obis reticulato-
Irrosis apice spinosis, invol. glabriuni sqnan^is aAninato-spiuoHls integer-
rhist exter. patulo-babrecurveis, inter, erectis subcoloratis. — in argillosis supra
Albania regni Hispano-Cmnatensis et in^Sierrâ Nevada loco dicto Pulpbe alt.
3000-4000 ped. legit d. Ikhuer! Caulii 8-18 poll, longus. Gbr. albae. Invol.
squamae int. albidae. (v. s. à cl. inv.)

"VI p. 6;i3. lin. 11.

10. CARDUUS wiORiscENs, *adde*: in Rhaetiâ (Moritzi!).

VI. p. 624. lin. à fine 4.

aa. CARDUUS CARLINOLDES, *adde*: in Sierrâ Nevada Granatensium alt. 800'o ad
9800 ped. legit cl. ifoissier! Ex eo hûe pertinet C. Hispaticus Bory nee Lag.
nee Lam.

"VI p. 626. lin, à fine 9.

3i. G. TENUIPLORUS, *adde*: ail ab boc satis differunt C. intricatas et C. syn-
cepbalus Ricbenbi fl. exc. 1. p. a3i?

VI. p. 629. lin. 3i.

46. C. HISPAHICUS, delendus! Syn. Boryi ad Carduum carlinoidem, syn. Lagascx
ad Chamajpeucem Hispaticam pertinet.

VI. p. 635. lin. 38-39. *adde* :

Sect* 1*. ODONTOLEPIS Boiss. ined.

Invol. globosim, sqamis imbricath apice spinosissub spin a quasi dilatato-in-

Volutiset utiinquespinulam lateraleni gerentibus — Sect. omnin6 inter Lophio-
l'pidem et hriolepidem niedia, huic pioxima.

4*. CiRsfDM ODOICTOLEPH (Boiss.¹ ined.), fohis semiampiexicaalihns non decnr-
rpntibus supia setoso-scabus subrus laxe lanugmosis pmnatipaj'titH, lobis sim-
plicibns bipartitisve spinâ validâ acutmnatu , involucro inter folia suprcina
semli globoso lanuguioso — in Hispaniae Granaten&is raontibus diclili Siena
Tejeda, Gador, Nevada legit cl. Boissier Habitat C. ferocis Cor. albje, larius
parpareae An ex cl. Boi&s. Chaniaapcuce bonida prod. vi. p. 660 hue revo
canda? (v. s à cl. inv.)

VI. p. 636. tin. 33-34.

7*. C. CRINITUM (Boiss.¹ ined.), foiiis in alam dentato-spinosam decurrentibus
suprà setoso-scabns snbtus aiacbnoideo-lanatis pinnatifidis , lobis sublobnlati
valide ipinosis, c.ipitnlis ad apices ratnoruin paucis sobglobosib, 111 vol. sqnaniis
parce arachnoideis angastis longe aruminatis spmosiji integrerrimiji paicc pa-
tenti-recurvis —in Hispaniâ Granatensi legit cl. Boissler' et ciica Naibonem
cl. Requier! Ex habitu accedit ad C. echinatnm sed folia decimentia nec'tan-
tum amplexicaulia. Capitula daplò fere uiajoia quani C. lanceolati. (v. 8)

VI p 638 adcalcem

0.1 C. ECHIUTUM, adde ad Malagara et in toto regno Granatensi in collibns
calidis usque ad 5000 ped.supia mate legit cl Boi^ier. Del. ullimamdv in vol.
squamis phtasun.

VI. p C4x/m 5-6.

43*. C. FLAVISPINA. (Boiss.* ined) fohis decurrentibns ntrinqne aroneoso-canescen-
tibus late sinuato-pinnatifidis raargine spinas flavae eium in paite decui-
lentc gerentibus, capitulis paniculato-iacemosis subaggiegatis ovato-oblongis,
mvol. sqnnig glabus, exter in spinam lectara sqaaniA longiorem piourris,
inter, niolhtereifusco apiculatis — in aquo&isRegni GianatciMn ad Allala11ini
et Sierram Nevadam usque ad alt 6000 pad legit cl. Boissiei. Pioxiiue accedit
ad C. polyantbemam et Sirulum.(v. 5. à cl. inv.)

VI p 662. hn. 17*18.

io5. C. ACIULI, adde:

\$1 gregariyn , (Boiss ' ined.), folio rum lobis approximatis subcrispis, npnio
suberectis longioribns, invol. squamis fusco-maculatis. 7/1 111 pi.itis Sieirts
Nevada; Gianatensium gregane creacen*, alt. 6500*5000 ped legit cl. E.
Doissier! An forte species piopua? (v. s. à cl. inv)

VI p. 658. ad calcetn.

7 CHAM/LFLIJ(E HISPAMICA, adde hûe Cardan* Hispamicns- Lag. anal, sc nat.
n. i5. p 283 peitinet. Stipem insigni in aridis legni Granatensis ad aooo-
5000 "ped. alt legit cl. Boissier. A Ch Casabonae dialucti&Mnia. Capitula am-
pli corymbosa. Invol. glabia pnipurascientia. Folia snbtus niveâ. (v. s à cl.
Doissie.)

x4. C. PIORRIDA Confer adnot. circa Cirsium Odontolepidcm su pi a I in. H citatam.

VI p 660. hn 38

1 NOTOBASIS SYRIACA , adde . in arvis Hispanias Meditei raneae (Boiss.)

|l.p. 661 hn 3J

x AcnorTILOM Pic RIS, adde . ad Kaiadagh (Aach.!)

VI.p 670. hn 2.

i5 Sk.RRATUL1 riKVATiFIDA , adde: in aiichsiuier dumeta in montosis regmGi-
natensisalt. a500-5000 ped. lsgit cl. E Boi&sici.

VI. p. 670. Un. 40-41.

19*. S. BoETicA (Boiss.! ined.), caule erecto simplici i-cephalo cum foliis glabio hinc indè & abfloccoso, foliis iufer. petiolatis nblongis denticulatis, canlinis paucis sessilibas linear-ioblongis acuminatis, invol. squainis lanceolatis sens! in nee abrupte ' aruuiinatis erectis apice pergauiaceis. — in Hispaniae Granatensis Sierra d'Estepona inter frutices in umbrosis ad ped. 3000-4000 alt. legit nl. E. Roihier! Herba semipédalis. Cor. purpurascentes. Invol. fere Chamaepeucis, sed pappus scafler, etc. (v. s. à cl. inv.)

VI. p. 677. tin. 11.

19. JURICEA HUMILIS, var. 9-, *adde* : in pascnis aridis Hispaniae Granatensis in Sierra Tejeda etS. Nevada alt. 6000-9000 ped. legit cl. E. Boissier)

Trib. VI. MUTISUCEA.

VII. p. 6. Un. 38.

Odontophyllum Less., *adde*: in linnasa⁴ nee in syn.

VII. p. 8. Un. x.

Aplophyllum Less., *adde* : in linnaea⁴ nee in syn.

VII. p. ia. Un. 27.

a. OrDENsiiGXA ARBUSCULA, *adde*: DC. coll. mem. rx. t. 19.

VII. p. a*, //n. 18.

3. MOQOITIA POLTMORPUA, *adde*: DC. coll. mem. ix. t. i3.

VII.p. 36. /in. 30.

STEIROCOMA, *lege*: MICROCOMA.

VII. p. 43. Un. a`fine 9.

OxTonoN,Less., /?#e: OXYDOK.

Trib. VII. NASSAVVIACEM.

VII.p. 48. /m. a5.

3. NASSAVIA SrREN»BLioIDBs , <w/e : DC. coll. mem. ix. 1. 14.

TIL p. 53. /1/1.26.

a. POLYACHITRUS NIVIUS, *adde*: DC coll. mem. ix. tr i5.

VII. /?. 54. Un. 17.

3. PAXARGYRUM SPIITOSUM, *adde*: DC. mem. ix. t. 16.

VII./>. 64. lin.afnek.

Sect. STENOPHYLLDM Less. syn. p. 41a. a ^ e : nee Less, in linnaca 1831. p. 698 nee Rafin.

VII. ^.67. Un. 4.

2. DUMERILIA AikVLMti % *adde*: DC. coll. mem. ix. t. 17.

TILp.6g.lin. 33.

i5. Tmxis DIVARICATA , *adde sjn.*: Castra regia Fl. flam, ic.

Trib. VIII. CICHORACEM.

VILp. 75. /in. ia.

DIPLOSTBMMA , Hoclist. et Steud., *adde*; non Neck, (qose Tachigalea Aubl.)

VII. p. 78. Un. i4-

KOKF.PJNIA, Pall., etc., adde : nou Scop.

TCI. p. So Jin. 16.

3. HYOSERIS LUCIDA, adde: in regno Valentino (I>oiss.!)

VII. p. 93. Un. 9.

t). ACHYROPHORDS SERIOLOIDES deleatnr. Conf. genus Mel abasia infra' ricscr.

VII. p. 95. Un. 36. asy. arf calcem.

I. SxRIOLfc JETHNHIISIS.

a. SERIOLA. CRETEHSIS.

Dcleautai' et ad gen as Metabasis transferantr.

VII. p. 97. Un. ao.

DCCXCVI. METABASIS (i), adde : Seriola sp. auct.

Garact. intactus retinendus sed species sequenti moHo ex specimibus magis completis amandandae.

1. M. CRETENSIS , foliis radicalibus pinnatisectis, canlinis linearibus subinieger-
limis, p. ippo radii sqaamellato. (%) in pascnis raontosis et arenosis insularum
inaris Mediteiraeei. Hue referendx saut stirpes 3 sequentes. An species? an
varietates?

A. nrens, invol. squamis parcè farinosis pilis criniformibnsubnigrellis elon-
gatis hispidolis. —Seriola Cretensis prod. 7. p. Q5 cam synon. (v. v.)

£. Hymctia, invol. sqaauis parce farinosis, pilis setiformibas ri^idls a]-
bidis parcis birtis. — in monte Hyoietto (Aucb.!), in Zacinho (Murg. !).
Metabasis Hymettia prod. 7. p. 97 cum syn. (v. s.)

y. serioloides, invol. squamis farinosis pilos paucissimos ant snballos ge-
reatibus. — in Zacinbo (Marg.!) Acbyropborasserioloides prod. 7. p. y3.
(v. s.)

3. M. ^THWEKSIS, foliis radicalibas obovatis integris ant vix dentatis, canlinis
pancis oblongis, pappo radii roinimo autsubnullo. (4) Seriola ^thuensisprod.
7. p. 95 cum synon. (v. v. et s.)

VII. p. 105. Un. x5 et 18.

L.PCHII.ENSE, lege: CHILLENSE. Provenit enim non ex Chili, sed ex pago Cbillo.

VII.p. i83. Un. 12. afie:

2. ZOLLIKOFKRIA. rHOifDRiixoiDEs, adde: DC- coll. mem. ix. t. 18.

VIIa<p. 198./fa. d fine 4.

Dele Omalocline, Pbaecasiuin , CatoniaetSoyer a adCrepidem jam relate.

VII. p. aa5. tin. 3.

A. lege H.

VII. p. »47- Un. aa.

2. DUUYJCA HispiDA, lege: DC. coll. mem. ix. t. 19.

(1) Nomen Scriolas servavi ad species caracteri generico anctorum convenientes et
notum finxi ad ea» qua a veter. caractere discrepant.

GENERALA INCERT.E SEDIS.

Vll.p. a6a. lin. 4a-43.

DCCCLXXXIX. SCALES IA Am. in Lindl. not. syst. 443.

Capitulum homogamum. Anthers nigricantes exserta: caudalae, aJis cordalo-oblongis. Stylus Tagctis. Achxniun compressum obrordatutn omnino calvum con forme glabrum, disco epigyno inconspicuo. — Frutex. Involucrurn biserialis. Ca pi tula basi intrusa axillaria brevipedunculata. Folia linearis-lanceolata utrinque utlenuata alterna suprà scabriuscula subtus pubescentia iotegerrima. —Ad Heliopsideas refert cl. auctor.

i. S. ATRACTYLOIDES (Am. 1. c). jf in insulis Gallipagos.

OMISSA.

'V. p. 66. lin. hfxne 9.

a. DECAVKURUM RETICCLATDM, adde : DC coll. mem. ix. t. 1.

'V. p. 75. lin. à fine 9.

1. RLAKCHETXA. BITEHOTRICBA, adde: DC. coll. mem. ix. t. a.

V./>. 94. Hn- 30.

1. ROJERIA BPECIOSA, adde : DC. coll. mem. iz. t. 3.

V. p. a58. lin. i3.

1. TuRCZAiuiriowi* PASTIUZATA, adde: DC. coll mem. ix. t. 5.

V.p. 533. lin. 13.

1. MEHDKZIA DICOLOR, adde: DC. in Del ess. ic. nei. 4. t. 29.

V.p. 676lin. ult.

1. 'VAUGASIA CARACASANA, adde: DC. in Deless. ic. sel. 4 t. 47.

y.p. 679. lin. a' fine i3.

CDXXVIH. IILEPHARiPAPPUS, adde : Eriopappus Arn. in Undl. nat. syst.p. 443 non Dumort.

N, h. Indicem generum dichotomam, vol. 5 p. 9 nnntiam, oinisi non tantum bfevititiis CIUS, scA quia lector brevi teiupore h;mc reperlat in aureo r|. Meissneri libro cai titolas : Plantarutn Vascularium Genera tabuhs diagnosticis exposita. Lipsicv fol.

Icones peneruin pluriinonun in Proclromo ilfscriptorum cdidit amiciss. Benjamin Delessert in quarto suo Iconnni ^elcttarara voluniine in ox in lucein profe icndo, et obiervationes circa Compositarnm ingentem ocdinen) generates brevi lempore pubheo examiui submit tain in di&s. xx et x niox edeudij* iu Collection de Mvmoires in-4. Paris, i8?4-i838.

Insecnndà volnminis sectione tractandi vcniant c-cteri Calyciflorarura ordines nempè : Lobeliaceae, Campanuleae, Goodenoviae, Stylidieae, Vaccinicaa, Küfin*^c, etc., et in volnm. octavo sequantur ceieri Gamopetalirum ordines. Deprecor eos oranes qui Prodromo favent ctqui in hoc catalogo geuerali detecta su.i vollcrit insererc, ut speciinina aicca etaduataliones circà Gamopetalaruiu ordines breviori tcmptoremittant.

INDEX GENERALIS

NOMINUM ET SYNONYMORUM COMPOSITARUM

in partibus V⁴, VI^A et VII* scctione primā cmttmeratnrtun

Obs. Nomiiia aduiissa lilleis roiuante, ^ynonyma Ualicifl liaduniji , II<III>* in ulrafjue clause:

Ordinalia m.ijoribns,
Tribualia majti&culis,
Generica vulgaribub,
Sectionalia mlnoribos.

| | | | | | |
|---|---------------|--|--|---------------|-----|
| Abasoloa <i>Less.</i> | VII, | 2.11 | Acmella <i>DC.</i> | V, | 620 |
| Abrotanrla <i>Cuss.</i> | VI, | 1.1 | <i>ArnstuDC.</i> | V, | 90 |
| Abrotaiioidec <i>DC.</i> | VI, | 2.2 | Acourtia <i>Don.</i> | VII, | 65 |
| Abrotauura <i>/Jess.</i> | VI, | 105 | Acrocentron <i>Cass.</i> | VI, | 536 |
| Absinthium <i>DC.</i> | VI, | 120 | Acrocephulmn <i>Cass.</i> | VI, | 263 |
| <i>Absinthium</i> <i>Toiirn.</i> | VI, | <i>ibid.</i> | Acrolophus <i>Cass....."</i> | VI, | 561 |
| 'tcanos <i>Adans.</i> | VI, | 617 | Arroplilon <i>Lass</i> | VI, 66a; VII, | 305 |
| Arantiiolxo <i>DC.</i> | V, | 460 | Actinierii* <i>Raf.</i> | V, | 575 |
| Acantbolepis <i>Less.</i> | VI, | 527 | Actinca <i>JwiS.</i> | V, | 602 |
| Acanthnphyllum H. et A. <i>VII,</i> | 52 | Actinella/^...V, 662} <i>VII,</i> | 293 | | |
| Acantbopbyton <i>Less.</i> <i>DO...</i> <i>VII.</i> | 84 | Actinell^ <i>Less.</i> | V, <i>ibid.</i> | | |
| <i>Icanthospvma</i> <i>Arrab.</i> | Yr | At*1 inoccnia <i>DC.</i> | VI, | 82 | |
| Acanthospermium <i>Schrank..</i> t | 521 | Actinolepis <i>DC.</i> | V, | 655 | |
| Acanthotlicra <i>DC.</i> | VI.. | Acliiioneeris <i>A'ult.W,</i> 655 ; <i>VII,</i> | 2c>0 | | |
| Arantlioxantbium <i>DC.</i> | V, | ACTINOPHYTUM <i>Neck.</i> | V, | 4 | |
| Acarua <i>Cogs.</i> | VI, | Arfiuoptera <i>DC.</i> | V, | 543 | |
| Acnrna <i>VVlld.</i> | VI, | Actiuospermum <i>Ell.</i> | V, | 653 | |
| A<arna <i>Vaill.</i> | VI, | Adcnoraulon <i>Hook.</i> | V, | 207 | |
| Atharithcnumhl. etF <i>VI,</i> | 2/8 | AdenochttiM <i>DC.</i> | VI, | 49' | |
| AcUiUea <i>Neck.DC.</i> VI, 24; VII, | 2.95 | Adcnocyclus <i>Less.</i> | V, | 10 | |
| /Ichilca <i>Linn.....VI,</i> 19 , 21 | | Adenolepis <i>Less.</i> | V, | 607 | |
| Achromolccna <i>Cass...</i> -VI, x5/f, | i55 | Adenophylluni <i>Pers.</i> | V, | 630 | |
| Acliyraclia-'na^'ciaMtT. . . . VII, | 292 | Adinosolen <i>DC.</i> | VI, | i36 | |
| Arhrrastnirn <i>Nock.</i> VII, | 79 | Adnoslemma <i>l*ont_m</i> V, 110 : <i>VII,</i> | | | |
| ACHYJIIDKALi <i>DC.</i> V, | 212 | 266. | | | |
| Acliyrocline <i>Less.</i> <i>DC.</i> VI, | 1.1 | ADKNOSTYLKAE <i>Cast. DC..</i> V, | 126 | | |
| A<ihyr< coma <i>Cass.</i> V 1 | 15 | Adenoslyle* 6V/A.A.V, 20.3 ; <i>VII,</i> | 2,i | | |
| Acliyropappus //, B. K> V, | 65' | Ailcnntnc <i>Jia</i> <i>Lined.</i> VI, | 416 | | |
| Acliyropappus, <i>Did.</i> V*, | 563 | Adnpngou <i>Neck. DC.</i> VII | | | |
| Acbyropliorus <i>Scop.</i> VII, | 92,307 | 89 | | | |
| Achyrophorus <i>Gicrln.</i> VII, | 91 | Algoheris »C | VII, | | |
| Achyrophorus <i>Tausch.... VII,</i> | 90 | /KthcoLvna <i>Cuss.</i> VI, | 340, 422 | | |
| Ad'iy wphnrus <i>Vaill.</i> VII, | 95 | AlUbenp ^p p ^p s <i>Cass.</i> VI, | 574 | | |
| Aciarplia <i>Juts.</i> V, | 3 | AKtheorhiza <i>Cass.</i> VII, | i5i) | | |
| Acilepis <i>DC.</i> V, | 15 | Athionia <i>Don.</i> VII, | 86 | | |
| Avilrpis <i>Don.</i> V, | <i>ibitt.</i> | Apalma J)€. . . . VII; | a50 | | |
| Acipbyllica <i>DC.</i> V, | 641 | Aganippca^ <i>Mex.</i> VI, | 3 | | |
| Acispermwn <i>Neck.</i> V, | 56g | Afiarista <i>DC....\</i> 569; <i>VII,</i> | 280 | | |
| Aclcia <i>DC.</i> \J' | 3° | Agatb.ua <i>Cass.</i> T...V, | | | |
| Acmella <i>Rich.</i> » | 630 | A%onthomeris <i>Pclaun.</i> VI, | 157 | | |
| | | Agathyrsus <i>Don.</i> VII, | 2.7 | | |

- Agenora fion* VU, q5
AGKRATEAE Less. V, 107
A^oratoide DC.* V, 108
Ageratum Linn. V, *ibid.*
Ageratum Auct. V, 107, 10ft
Aglossa DC. V, 543; VI, a58
Agnusceris haf. VII, a51
Amianthus Marl. V, 1*5} VII, a66
s/tfriphylfum Juss. VI, 50^
Agripliyluin Less. VI, *ibid.*
Ainsliwa VII, i3
Aiolotbeca DC. V, 508
Afarçonia DC. V, 53T
Alherlinia &preng. 80; VII, a65
ALBERTINIEAE DC. V, 78
AUina Cav. V, 5ao
Alciua DC. V, *ibid.*
Afcinin Steutl. V, *ibid.*
Alriopu DC. V, Q09
Alcithoe Don. VII, t18
AUlamn Lallav. et Lex. ... V, 561
Alitalia Cass. VI, 6G6
Alilmm Less. V, 97
Alix Co mm. V, 319
AUft^opappus Cass. V, 477
Alia go pappus. DC. V, *ibid.*
Allundca Lall. VII, a53
Allocarpus H. B. K. V, 676
.inini.j»trmwn Willd. V, *ibui.*
Allomia H. B.K. V, io5
ALOMIAE Less. V, Vi3
Alopccuroides DC. VI, atio
Alophium Cass. VI, 601
Alymnia Neck. V, 515
Alymoia DC. V, *ibid.*
Amberhoa DC. VI, 558 ; VII, 3~j
jtwberhoi Isn. VI, *ibid.*
jimblaclueniuni Turcz. ^.. VII, 93
Amblyocarpum F. el M. VII, a8f1
Amhlyopclis DC. V, 667
AmLlyopo^on ^o. et Jtf. Vr, 56i
Amhlysperma Henth. VII, ao
Ambrosia liniu. V, 5a5
AMMKJSIACKAE Less. V, 500
AMMIOSIEAE Cass. Less. V, 498, 5?a
AMKLLEAE DC. V, ai r, ai3
AMELLOIOKAE Less. V, ai3
Amelliis 61fA. V, ai3
Amcltus Adanp. V, aa6
jimeHuA l\ Rr. V, 544
Amclliii Linn. V, q6, a13
Ammobinm H. lir. VI, i53
Amnogeton Srhrarl. VII, 98
jimphephU H. B. K. .. V, x^o
Ampliaciysi. DC. V, Zx*
Amphicalca DC. V, 67a
Ampbidoxa DC. VI, 346
Aniphigloua DC. VI, a58
Ampbilasia DC. VI, 267
Amphirhapis DC. V, 343 ; V^l, J79'
Amphistplium DC. V, 373
Anatis Schrank. V, 567
Anaclidea DC. VI, 50
AaactiflBia DC. VI, 155
Auactia Cass. VI, 55o
Anacyclus Pers. DC. VI, i5
Anacyelus Linn. VI, i4t *\$
Anaglypha DC. V, 3n
Ana-itis DC. V, 6a8
Anaändria Süt\$. VII, 4o
Ananthocyclus Vaill. VI, 77
Anaphalis DC. VI, »7^f
Anargyrum DC. VII, 54
Anaslrraphia Don. VII, 26
Anaxeton Cass. VI, 367
Ancathia DC. VI, 557
Andrieuxia DC. V, 55o; VII, '^\\$9
Andromachia U. B. K. V, 95; VII,
 a65.
Andrmachia Cass. V, 9^f
Andryala Linn. VII, a44
Andryaloide DC.* V, 377
AnecioNeck. VI, 3^o
ANGIANTHEAE DC., 500 ; VI, i4<
Angianthus Wendl. VI, i5(>
Auliebccarpaoa DC. V, aai
Anisochata DC. .V, 109 ; VII, 2G6
Aniooderit Cass. DC. VII, 157
Anisopappus M. et A. VII, 253
Anisoramphus DC. VII, 251
Anisotrichia DC. V, 80
Anoleptns DC. VII, 184
Aiomostephium DC.X, 56o; VJI, 289
Anonymos Walt. ^V, 128
Antennari.i R. Br. VI, a6v>
ANTENNARIEAE / ^. V, 500 ; VI, aG4
Anthalmum Neck. V, 487
ANTHEMIDEAE Cass..Y, 499; VI, 1
Anthemopsis Boj. V, 547
Anthemis DC. VI, 4 1 VII, ag5
Antiicmis Auct. VI, 3, 4* 7» *3, i5,
 i8₇ 19.
Anlhemoüles Less. V, 681
Antffthrixia DC. VI, 377
Antodon Neck. VII, JOI
Anvillea DC. V, 487
Apaloclainys Cass. .. VI, #57
Apalus DC. .. V, 807'; VII, 387
Apargia Less. VII, 107
Apargiu Scop. VII, 101
Apalanthus riv. VII, a54
Apbnnoihynchos LesB. .. VI, 160
Aphanostcphus DC. .. V, 3io
Aphelcxis Boj. VI, a 16
Aphelexis Don. VI, a 14
Aphyllocaulon Lag. VU, 15
Aplodiscus DC. V, 35o
Alopappus Cass. V, 345 \$ VII, 379

NOMINUM ET SYNONYMORUM COMPOSITARUM. 31 I

- Aphyllum* Cass. VII, 6
Aphyllum Less. VII, 8, 306
Aplotaxis DC...|I, 6J85 VII, 30a
Apogon fill..... VII, 78
Aposcris Neck. VII, 8?
Aposeris Cass. VII, 80
Apuleia Gaertn. VI, 514
Arachnites DC. VII, 90
Aratium Neck. VII, 198
ArctioLam. VI, 5fo
Arctium Juss. VI, d;id.
Arctium Linn. VI, 661
Arctogeron DC. V, afio
ARCTOTE[^]DC. VI, 4Jg, 484
Arctotbeca Wendt. VI, 4<5
ARCTOTIDEAE DC. VI, ibid.
Arctotis Gfurln. VI, 4⁸1
Arctotis Auct. V, 681, 688
Arctotis Linn. VI. 484, 49'» 4p4> 4J[^]
A retina Neck. VI, 5i4
ArBophylla DC. V, a66
Argyranthus Neik. VI, a6?
Argyrochata DC. V, 53a
Argyroctuva Cav. V, ibid.
Argyrocome G«crtu.... VI, 177, 211
ArsfYfocnnie Srbrank. VI« an
ArgyroxipbiuinZ)C.V,668; VII, a\$3
Aristotela Adans. VI, 4⁷^
Armania Bert. V, 576
Arnica Linn. %. VI, 3i6
Amoldia Cass. DC. VI, 70, ?3
Arnnpoffon Willd. VII, 116
Arnoserii Gtvrtn. VII, 79
Arrbcnacgne Cass. V, 398
AiTowsmitbia DC. VII, 254
Artemisia Linn... VI, 93; VII, 298
ARTEMZSIEAF. Uss.|% 499; VI,rf)a
ArtfinisioideH DC. V, i05
ARTHROSTYLEH Dum. .. VI, 449
Ascaricida DC. V, 60
Ascaricida, Cass. V, i5, 00
Aspelina Cass. VI, V₄₀
Aspidalis. Grertn. VI, 503
Aspidium ZoH. VII, ^50
As ilia Pet. Th. V, 61
Astelma Less. VII! aii
Astern ma Less. V, 50a
Biter Néetjk... V, aa6; VII, 272
Aster AdansT. V, 253
ASTEREAE' V, 211
ASTERINEAE DC. V. an. 213
Asteriscus Mnnek.Y, 486; VII, 287
ASTEROIDEAE Uss. V, 8, 211
Asteroids Tourn. V, 483 , A85, 486
Asteromea Blum. V, 302
Asteropsis Less. V.. V, a60
Asteropsis Less. VI, 277 ^
Asteropterus Less. VI» ,378
-Isteroptcrus Vaill. VI, ibid.
- Astrosperma* Less. VII, 999
Aslerollirix Cuss. *VII, 1*7
Atalanthus Don. DC. VII, 189
Athamus Neck. VI, 548
Atlunasia Cass. VI, 86
Athanasia Linn..VI, 8j, 85, 86,90
Athanasia Walt. V, 68[<]
ATHAN ASIEAE Less. V, 499 : VI, 84
Athanasioides DC. VI, 91
Athenaa Adans. V, 11
Athrixia Kcr. VI, 176
Atliroisma DC. V, 368
A thro nia Neck. V, 6ao
Atractylis Linn.|l, 5^95 VII, 30a
Atractylis Cass. VI, 550
Atractylis Vail L. VI, 610
AtracJylodes[^]C. VII, 48
Atraxylef>f.. VI, 610
Auchera DC..VI, 557 ; VII. 30a
Augusta Leand. VII, a6
Atlacopliora DC. VI, 330
Aurclia Cass. V, 3x4
- Rabounya* DC. VI, 36
Bacatia R. et P. DC. VII, 3
RACCHAREAE DC. V, 398
BACCHAR1DEAE I*ss...|, 31*, 3<8
Baccharis Linn...V, 398; VII, a8i
Baccharndes Linn. V, 60
BaccharoidcK DC. VII, 37
Baeria T. et M. VII, a5f
Bijihia Lag. V, 656 ; VII, 39a
Bailleria Cass. V, 505
Balbiaia DC. VI, 447
Ballnšia Willd..%. 1% 679
BALBISIEAE DC. .V, 500 ; VI, Hi
Baldinęcrlia Neck. *|» 77
Balduina Nutt. X.... V, 65u
Balsamila Deal'. VI, '6a, i35
Balsamita Lrss. VI, ibid.
BaUnmorlt/a Hpoh. V, 55i
Bültimora Linn. V, 50Q
BALTIMOREAE Cats. V, 500
Barbellina Cass. VI, 544
Barkliausia Moeneh. VII, 152
Bnkhauseia N'il. VII, 144
Barkhusenia H o p..... VII, 152
Barnadesja Linn. f. VII, 2
Jiarlolina Adans. V, 641, 670
Bastcria Hnutt. VI, 5o:j
Basteria Less. VI, ibid.
Jtecliium/JC V, 70
Bcdfordia DC. VI, 44i
BcUardia Colla. VII, 88
BELLIDEAE DC. V, »ia, 3o/
Bel 1 idiaslr urn JMiclieli. V, aa(>
licitidiastrum Vaill. VI, 39<
Uclifliopsis DC. VI, 991
BKLL1EAE DC. V., a 1 a, ii0a

- Bellis Linn.* V, 304 ; VII, 376 *tirnchrstephum* Less. VII, à^6, 299.
Bellium Linn. V, 303 *Bractysty/is* Mey. VI, .
flenediotia DC. VI, 533 *Brauneria Neck.* V, 554
Henrietta Gray. VI, 531 *Breca Uss. DC.* VI, 6
Berardia Vill. VI, 54* *Breteuillia Buck.* VI, 503
Berkhaya Less. DC. VI, 504 *Bnckillin ICl.* V, 18J
fie, key a Ehr. VI, *ibid.* *Bridxesia Hook.* VII, 53
Berkbcyoidei Less. VI, ^97 *Brocchia Viv.DC.* VI, 13i
Berlandiera J96\,V., 517 ; VII, 888 *Brntra Spreng.* V, 635
Berniya DC. VII, 18 *Broteron DC.* — V, 635 ; VII, arj
Bertholotia DC. V, 375 j VII, 80 *Bulmum DC.* V, 4<3
lielhencaurtia Chois. VI, (i) *Bulbostylis DC.* V, 138 ; VII, a68
Rirlincin Don. Less. VII, 99 *BUPHTHALMKAЕ Uss..*, ai3, 483
Wu|en»Ltnn. V, 5g3; VII, 390 *Bubpthalmum Ca*s.*, 4^3 ; VII, 287
*BIOENTIDJE Us** V, 408, 5,3 *Burriclia DC.* V, G6*
Bijcl3wia DC. V, 3ao; VII, a79 *Bust amenta hot* mex.* V, 166-168
Biotia DC. V, a6? *Bustia Adans.* V, 483
Jiintia Cast. V, 691
Blainvillea Cast. V, 49^3
Blancbctia DC. V, y5 ; VII, 308
Illaxium Cass. DC. VI, 70, 71
Blenno.iperma Less. VII, 888
Blepharipappus Hook. V, 6795 VII,
 3<8.
Blcpharispermum Wight. DC.X., 368;
 VII, 180.
Blepliarodon DC. V, 3j6
lilcpharolc)is DC. VI, f g3
Blumea DC. V, 43a; VII, a8i
Bobarhn Petiv. V, 554
flethem Less. V, 63g
Jlahcra Willd. V, *ibid.*
Bcrhcr /?6'. V, G4o
Boberoides DC. V, *ibid.*
Bajer'iaflC. V, Q|
BOJERIKAE DC. V, Mi.
Boltonia L'Her. V, 30i
Boinhcilaapna t>C. Vf, 460
BOOPIDKAE Cass. V, 1
Boopis Juss. V, a
liorkhnusia Bcuhm. . # . . . VII, 15a
JinrUinusia Link. VII, *ibid.*
Borrichia ^tlans. V, J88
Jiotryatfcnia F. et M. V, 300
Bracianthrum DC. VI, 4?
Br.ichycla.los Don. VII, 33
Brachycome Cass. V, 305 j VII, 376
Jirnt hronie Gaud. V, a80
Jlrachy eoinc Cun. V, 305
Brachyderr Cass. DC. VII, 160
BrArhjgloIM DC. V, a65
BrachyglottU Font. V, 319
Sr/iclirxync Caps. VI, 147
Brarliylirna Brown. V, 4ao
Brnchymeris/JC. VI, -6
*Brachyrhynchos Le**.* VI, 4 ^
Brab i-/ V' V 3 V 1 I - 8 -
Brachystnmti l^ass. V; 305
Bracystephium Less. VI, 303
- Caralia PC.* VI, 3ay
Cacalia To urn. V, ?o3
Cat'aim Cass. VI, 336
Cacalia Linn. VI, 336, 337
Caralianthrum Dill. DL'.W. 336
CACALIKAE Less. VI, ap3
Caroamia H. B. K. Vf 97 j VII, a<55
Cadisnis E. Mey. VII, i5.{
Crrsulia Horb. V, 4&*
CAESLLIKAE DC. V,
 Calais DC. VII, *ibid.*
 Calcitrapa Cass. DC. VI, 85
 Ca/citrapa Vnill. VI, 5g£
 Cal<trapmdes Vaill. VI, 59*2
 Caloa R. Br. , 677; VII, 5p
Calea Lind. V, ibd
Calea Gartq. VI, 397
Caleacte DC. V, dn'.|
Oi/eacte R. Br. V, 67 |
Caleactç Less. V, G(k)
Calcbrnchys Cass. V, 660, 6G0
CaM>rac>iys DC. V, C(xj)
CALEINKAE Cass. V, Wig
Calendula Tech. VI, 45i
Calendula Linn. VI, 70, 45i, 456
CALENDULACEAE DC. VI, 449, 45i
CALEWDULEAEUss. DC. — \ I, *ibid.*
Caltceras Cav. V, a
Calimeris Cass. Ne'es. V, a58
Calficefihalus Mey. VI, .
Callirhoa F. et M. . ||l, a94
Callilepsis DC. V, 67c
Calliopsis Heichenb.y., 568; VII, 289
Calluttemma Cass. V, 2'/
CaUHlephus Cass. V, *ibid.*
*Callophora DC** V, 54a
Calocalais DC. VII, 85
CaJocephalus R. Br. VI, i5r
Caiomeria Vent. VI, 157
Cnlonnea Bnclioz V, 65c
Calopappus Meyen. VII, 28

- Calopilium L*ag.* VII, 5a
Calolis B. Br. V, 3oa ; VII, 275
Callha Tourn. VI, 451
Callhnides B Juss. VI, 473
Calycadeia DC. *.... V# 695
Calycefa Kith. V, 9
CAM CKRKAL R. Br. V, 1
Calycium Ell. V, 3,6
Caly cocorsus Schmidt.... VII, 150
Calydernios Lag. V, 669
Calydernios Cass. V, *ibid.*
Calydennos Spi cng. V, 11
Cafyptocarpus Less. V, 619
Campuloclinium DC. V, ,36; VII,
 a68.
Campylotheca Cass. V, 593
Cannilia Bonjt. V, #5at>
Cappai)C. V, 469
Carboni Adans. VI, bo6
Ctirdenna Cas». .. VI, 340, 397, 398
(mlispernium Tranl. \I, *go*
 CAR1)OPATKAE/>C...VI, 45o, 527
Cardupatum Juss. VI, 5 a 7
Cardopatum Pcrs. VI, *ibid.*
 CARUUINK[^]Z[^]C¹. VI, 450, 617
Cauluncellus sitians.W , 6i4»* VII,
 3o4.
*Carduoides fe*s.* VI, 497
Carduus Grrtn.Xl, 6a, ; VII, io4
Carduus Linn. etauct. VI, 6J3, 634,
 65% 660.
*Carelia L*ess.* V, 1a5
Carelia Ponted. V, 108
Carlina Linn. VI, 545
Curlma Cass. >... VI, *ibid.*
 CARLIBiEZJC. VI, 460, 531
Carlowzia Less. VI 5/8
Carlowwa Moench. VI, *ibid.*
Carmelita Oar. VII, 14
Carminatia Moc. DC. VII, ^3^7
Carpesium Linn. VI, a8i
Caiphephorus Cass. V, ,3a j VII, 167
Carpholoma Don. VI, a65
Carphostcplum Cass. V, 678
Cartrsta Cass. V, 71
 CARIHAMEiE DC——VI, 4^, ht9
Carthamoides Vaill... VI, 613, 614
Cailhanms pPBr/i VI, 611
Cailhamus Hill. V, 7*
Carlhamus Linn. VI, 610, 6,4
Carlhamus Sclik. VI, 610 , 611
Cartndiutn Sol. VI, ,5a
Cassinia R. Br. VI, 154
Cassimia Br. li. kew. VI, i5o
CASSINIEAE L_{ZSS.} V, 5^oo[^]y» x5i
Cussiopea Don. ^ ^ ^
*Castalu Less. DC** VI, 70, 73
Catanance Tourn. VII-, o»
Catmanche faiU. Less...Ml, *ibid.*
Catipes DC. VI, a6^s
Catonia Aloench. \II, # ,67
Catnia Cass. VII, ' i65
Celmisia DC. V, 209
Celusia Cass. V, *ibid.*
Cenia Conun. VI, * 8a
Cenlaurca Less.W , 565,; VII, 3oa
Centaurea Linn. VI, 558, 565
 CENTAURIrA: DC. VI, 460, 557
Ceiitaurium Cass DC. VI, 566
CcntaurinmMaW. VI, 66a
Centaurbpus Bojer.W, 93; VII, n6S
Centipedea Less. V, 371
Centipedea Lour. VI, i4°
CentiaZhtcna Scbott. VI, 64
Centmptdus Cass. V, i5, 60
Centratherum Cass. V, 70
Centjiithvr um Less. V, 69
Centrocarpria Don. Vf 555
Centi of linium Don.....VII, i\$
Ceutrolieua DC. V, 5»4
Ccntrosptrnum Kunth. V, 5a 1
Cenli nsprinum S[r. VI, 64
Cephalonoplos Week. VI, .643
Ceplialnpappus IV. ft /J7..VIIIf 73
*Cq>lulophora Ctn>,|, 661 ; VII, 093
Cetatocephalus Vaill. V, 5^3
Ceratochxiia DC. V, 522
Ctrcostylos Less. .V, 660i VII, 293
Cei uana J'orsk. V, 488
Cetmtus Crrtn. V, 6ao
Cestrmoidcb DC. VI, 1>5
Ceitnuus Cass. DC. VI, 664
Chabrea DC. VII , 58
Chaenactis DC. V, 6^19
CHANANTHOPHORÆ Lag.VII . 1
Cha lachlyna Don. VII . 34
Chaetactii DC. V, i>7
Chiitantlicra R. el P. DCU, # 29
Chtvtanlhera H. B. K. VII, 60
Chivianthcrea Less. Don. VII. 3o, 3a
Cluclopappa DC. V, JOT
Cluytophnra Nutt. V, dud.
Chahmtcellii Cass. V, 563
Cliainr<j pnryhsut DC. VI, 35
(liatiuvlt on C. Bauh. VJ , 5aT
Cliamtrlcou (ass. VI, 547
Chiiraarinela DC. V^ 5o
Chamaeniliuu Cass. DC. .. ,||| 4
Chamaopeucc DC. V, 657 ; VII! 3o5
Chamastephunum Willd... V, 654
Cliainonulla DC. || , 5f
Cliaptalia Pent. VII, 4*
Chnpudui Ledeb. VII, *ibid.*
Chardinia Desj. VI, 53o
Cbarieis Cms. V, 300
Cliartolepis, Cass. DC. , ... VI , 568
Cliniclania Week. VII , 8G
Cheirgloph Cass. DC. VI, 676*

- Cheriuia Cass. // el Am.. VI, «i), 30*
CließeuJia Cass. VJI, 44
Chilmdenus Cass. V, 4/6
Cliiliadeus DC. V, ibid
Chiliopliyllum DC. V, 554
Chiliorichum Cass. V, aifi
Cliionolepis DC. VI, 217
Chionoptera DC. VII, 1|
Chionostcmfaa DC. VI, aog
CliUuboIus i)C. V, /J53
Chlainydopbora /i/tr. VI, 138
Clila my sperm a Less....VI, 75
Chlynnholus Cass. V, 44& 453
Chondrilla Linn. VH, i{}*
ChnmlrUh Wall. VII, 15i
Chorisma Don. VII, 177
Cloris DC. VII, LOid.
Choristea Th. DC. VI, 503
*Chresja Arral>...V, 85; VII, *65*
ChromocliaBta DC. V, 351
Chromochajta DC. VI, 3J I
ChrmochUon Cass. ... VI, T54« 155
Chiomolicua DC. V, 1'13
ChromnlfttA Cass. VI, 6'14
Chronolacna DC. V, 397
Chronopappiu DC. V, 84
Chrysattuum H. I. K. V, 97
Chiyanhelltna Cass. V, O.o
Chrysanthellum Hiclu, ibid, VJI, QOI.
CHHYSANTHlMEiUi Less. W, 499; VI, 38.
ChrysanthewfiUles Tourn. .VI, 4^9
CLryhanLlieiimm DC. VI, 63; VII, ^97-
Chrysanthemum Linn. VI, 45f 53,6'J, i35.
Chryseis Cass. VI, A69
*Chrystis Less. VI, 558**
Chrysis Ren. Vt 585
Clirysoconia Cn»s. |g 353 ; VII, 280
Chrrsnroma Linn. V, 35i, 353
CHnYSOCOMEAE DC.. V, ai-J , 31o
Chrysogonuni Linn. V, 5>0
Chrytowclea TautfcU. V, 5^Q
Chrysohania liunth. V, 55s
CHRYSOPSIDKAE DC.. V, Qii,3a6
Chrysopsis Null. V, 3a6; VII, 'J79
ChrjMo»p/uvriuw Willd ... V, 0^3
ChryoBteinma /ew.V,5G7 ; VII, 289
ChrY'soslcnima Mey. VJ, 50 1
Eühnniti Cass. a' s' s' s' V, 9
Chiqung a Juss. VII. 8
Chyldia Jdch. V, 563
Cicerbila Wallr. VII, 2^
CICHORACKAE Vaill. V, 4>9; Vlf, 74.
CICHOREJi Spreng. VII , 1AI.
Cichorium /<i</, VII, 83
Cinara Tourn. VI, 620
Cineraria I^ess. VI, 305
Cineraria Cass. VI, 340
Cineraria Linn. VI,305, 3i3, 355, 359, 36a, 4>9>
Cirseilium DC. VI, 550
Cinellmm Gu?rtn. VI, 54c
Cirbioidea DC. VI,
Cirsium Tourn. DC. VI, 63{ ; VII{; 303.
*Cirsium Cass. VI, 64*1*
Cirsium Less. VI, 658, 6<>
Cissainpelopbis DC. VI , 331
Cladanllius Cass. VI, 18
•Cladochaita DC. VI, 2 b
Cladoserib IASS. VII, H
Cla?rvilTea/>6! V, 636
*Cfainillea (add.) VII, *65 , 292*
Clarionea Lat. DC. VII, 60
Clarionea Cass. VII, 6J
Clarionea Less. VII, 65
Clariouella DC. VII , 5i
Clariouoidcl DC. VII, 65
CfavenaDC. VI, 633
*Clavigera DC... .V, 1*7; VII, 307*
Cleanthes Don. Less. VII , 71
Ctcirui Schrail. VI, 40»
Clihadium Linn. V, 505
Clomenocoma Cass. V, 641
Clnrmum Adans. VI, 621
Closiropermwn Neck....VII, 152
Cnirus Vaill. DC. VI, 606
C/iicusSdireb.etaiict. VI, 934,657, •660,666.
Coclestina Cass. V, 107
Creriorarhis DC. VI , 85
Coinogni- Less. VI , 41
Colensa/tthus Cass. V, i36 , i38
Cnltra Sprung. V, 630
Cnlshinm 'oili. VII , 99
Ci>tne)iclla Janj. VI, 283
Coimiidcndnim DC. V, 344
COMPOSITE Vadl. V, 4
COMPOSITbLORji GairM V, ibid.
Conioihcle DC. V, 35t*
Conoclinium DC., i35;VII, 268
Conoplora DC. M^ .. VI, 329
Cnnlarena Adans.. T^H .. V, 8S
Conyz Leu. V, 377 j VII, a8i
Conyz Ait. Lam. V, CM)
Conyz Linn. V, ^77, 3q6
Conyz Vfi||| V, "7
CONYZEJE Uss. V. «ia, 3f18
Cony/oide!» Tourn. DC. VI . a8i
COUEOMJDE; Less... V, '198', 56r,*
Corcupsff Linn.. V, 56g; VI1, 389
Coreopsis Auct. V, 56J, 568, 569, 575.
Corcopsoidcs Mcench. V, 569

NOMINUM FT SYNONYMORUM COMPOSITARUM. 315

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <i>Corethriogyne DC.</i> | V, a 15 | <i>Cyclolepis Don.</i> | VII, 28 |
| <i>Cotvna-solis Tourn.</i> | V. 585 | <i>CyHopis Guill.</i> | VII, <i>ibid.</i> |
| <i>Coivisarlia Merat.</i> | V, 463 | <i>Cylindrocline Cass.</i> | V, 458 |
| <i>CorvUartia DC.</i> | V _f <i>ibid.</i> | <i>Cylindrosorus Be nth.</i> | VI, i5x |
| <i>CORYMBIFERIE Paill.</i> | V, 4 | <i>Cymbonotus Cass.</i> | VI, 491 |
| <i>Corymbium Linn.</i> | V, 88 | <i>Cynara Thunb.</i> | V, 71 |
| <i>Coryuotrichum DC.</i> | VI, 648 | <i>Cynara Vail.</i> | VI, 6ao ; VII, 304 |
| <i>Cosmea Willd.</i> | V, 606 | <i>CYNARE-ffi Less.</i> | V, 9 ; VI, 449 |
| <i>Cosmos Cau.</i> | V, 606; VII, 391 | <i>CYNAREJE Cm.</i> | VI, 017 |
| <i>Cosmus Pers.</i> | V, 606 | <i>CYNAROCEPHALAEfaiY/ Juss.</i> | V, A ; |
| <i>Co tula Gierln.</i> | VI, 77 | | VI.419- ^ |
| <i>Cotula Lion.</i> | VI, 77, 82, 42 | <i>Cyuarooides Dp.</i> | VI, 666 |
| <i>Cntula Vaill.</i> | VI, 8a | <i>Cynotis Hoiimans.</i> | VI, 45 |
| <i>COTULEA Less.</i> | V, 499 J VI, 76 | <i>Cynthia Don.</i> | VII, 89 |
| <i>Cousinia Cass.</i> | VI, 55a ; VII, 30a | <i>Cypsclodontia DC.</i> | :VII, 286 |
| <i>Cruspedia Furst.</i> | VI, <i>ibid.</i> | <i>Cyrtolepis Less.</i> | VI, 17 |
| <i>CRASPKDIEAE/W.</i> | VI, 149 | | |
| <i>Crassicola DC.</i> | V, 3:3 | <i>Dahlia Cnv.</i> | V, 491 |
| <i>Crassina Scop.</i> | V, 534 | <i>Damatris Cass.</i> | VII, 255 |
| <i>Crassocepludum Mtench.</i> | Less. VI, 29\$, 397, 398, 30i. | <i>Jamiroitia Cass.</i> | VI, an , |
| <i>Cremocepium Cass.</i> | VI, 397 | <i>Dan a a Colla.</i> | VI, 416 |
| <i>Crepis Mocnch.</i> | VII, it>0 | <i>Dasyphyllum // B. K.</i> | ..VII, 3 |
| <i>Crejris Linn.</i> | VII, 160, i5a | <i>Decachaeta DC.</i> | V, i33; VII, 268 |
| <i>Crinis&a Don.</i> | VII, 144 | <i>Decaneurum DC.</i> | V, 66 ; VII, 264, 308. |
| <i>Crinita Moench.</i> | V, 351 | <i>Dec kern Schultz.</i> | VII, i3a |
| <i>Crinilaiia Cass.</i> | Less. V, <i>ibid.</i> | <i>Delilia Sprng.</i> | V, 50i |
| <i>Critonia P. Jij-</i> | V, 140 | <i>Deloderium Cass. DC.</i> | VII, 109 |
| <i>Critnnia G&Ttn.</i> | V, 126 | <i>Delucia DC.</i> | V, 633; VII, 391 |
| <i>Crocidium Hook.</i> | VII, 30i | <i>Demetria Lag.</i> | V, 3:4 |
| <i>Crociseris Reichenb.</i> | VI, 357 | <i>Demidium DC.</i> | VI, 3/J6 |
| <i>Crocotylium Cass.</i> | VI, 5yi | <i>Dendroseris Don.</i> | VII, 343 |
| <i>Crocodylurn DC.</i> | VI, 565 | <i>Denekia Thunb.</i> | V, 462 |
| <i>Crocodylodes A dans.</i> | VI, 506 | <i>Denim Adans.</i> | V, B 20 |
| <i>Crocodylodes Va ill...</i> | VI, 549 | <i>Dens-Lconis Tourn.</i> | VII, 145 |
| <i>Crodisperma Poit.</i> | V, 563 | <i>Detridium Nees.</i> | V, 223 |
| <i>Crossolepis Less.</i> | VI, 158 | <i>Detridiuin DC.</i> | V, <i>ibid.</i> |
| <i>Crossostephium Less.</i> | VI, 127 | <i>Delrioides Less.</i> | V, <i>ihid.</i> |
| <i>Crupina Cass.</i> | VI, 565 | <i>Delris DC.</i> | V, <i>thid.</i> |
| <i>Crypliosperraum Beauv...</i> | V _f >497 | <i>fJelris Adans.</i> | V, <i>ibid.</i> |
| <i>Cryptocarpha R. Br.</i> | V, 3 | <i>Diahais DC.</i> | VII, 296 |
| <i>Cryptogyne Cass.</i> | DC....* , 147 | <i>Diaraotlia Less. DC.</i> | VII, 3 |
| <i>Cryptopetalum Cass.</i> | *Y | <i>Diavnnthn Lag.</i> | VII, 2 |
| <i>Q-ryptopetalmn DC.</i> | V, <i>ibid.</i> | <i>Diacanthoides DC.</i> | VII, <i>ibid.</i> |
| <i>Cryptostemraa H. Br.</i> | VI, 4f ⁵ | <i>Diale^ta H. 11. K.</i> | V, 76 |
| <i>Culcitium H. elB.</i> | VI, 3i4 | <i>Diaphnmlhus Meyen.</i> | VII, 53 |
| <i>Cullumia R. Br.</i> | VI, 497 | <i>Diazcuxis Don.</i> | VII, aa |
| <i>Cusimbua</i> | V, 650 | <i>Dichroccphala DC.</i> | V, 371 |
| <i>Cuspidella ^ K.</i> | V, 370 | <i>Dichrovcphala L'HeV.</i> | VI', 139 |
| <i>Cuhpidia Gaerth.</i> | Less. VI, 503 | <i>Dicoma Less.</i> | VII, 33 |
| <i>Cynastrutn Cass.</i> | VI, 559 | <i>Dicoma Cass.</i> | VII, 36 |
| <i>Cyanopis (Hum.</i> | V, | <i>Didcta L'Ifer.</i> | "."VI' 503 |
| <i>Cyaupfcis Cass.</i> | VI, 4^8 | <i>Diglossus Cass.</i> | "."vj 640 |
| <i>CyanthitUnm Blum.</i> | V, 69 | <i>Dimetroslemma Cass.</i> | VII, a55 |
| <i>Cyauus % DC.</i> | VI, 57 | <i>DuHorphanthesCaas.</i> | V, 377 |
| <i>Cyathidium Royle..</i> | VI, 531 | <i>Himorphanties DC.</i> | V, <i>ibid.</i> |
| <i>Cyathocline Cass.</i> | V, 373; VII, a8<f | <i>Dimorphotheca VaiU.</i> | VI, 70 |
| <i>Cyathophora DC.</i> | V, 538 | <i>Diomedca Cass.</i> | V, 16 |
| <i>Cyclachasna Fres.</i> | VII, 288 | <i>Diothodon DC</i> | VI, |

- Diolis Desf.* VI, 34
Diotostephus Cass. V, 510
Diplofi.in Raf. V, 3a6
IMPLOPAPPEAE DC. V, a n, 271
Diplopappus Cass. />C.V, 375; VII, a73.
Diplosastera Tausch. V, 568
Diplostemma H. et St. VII, 75 , 306
Diplóstepbiu Cass. V, 373 ; VII , 373.
DiplostephiumlLunth. V, 27.3
piplothrix DC. V, 611
Dipterocome t| et M. VII, 356
Discocalea DC. V, 67a
Discocenia DC. VI, 83
Discomela Raf. V, 586
Discopoda DC. V, 604
Disparago Gaerln. VI, 367
Dispajella DC. VI, *ibid.*
Distasis DC. V, 279.
Distephanus Cass. V, 74
Distreptus Cass. V_f, 87
Disynanthus Raf. VI, afk)
Disynuphia DC. VII, 367
Ditrichum Cass. .V, 619 j VII, 391
DiznnLurn Willd. V, 48 i
Dcullingeria DC. V, a63
DaeUinuerin Necs. V, a63 , 37a
Dolickl.isium Lag. VII, *yx
Dolichogync DC. VII, a56
Dolic/insy/is Cass. VII, 4
Dolomiacn/JC. VI, 543
Donia R. Br. V; 314
Donioides DC. V, 477
Doratleptis Death. VI« 163
Doria Less. VI, 4^9
JJnrin Adans. V, 330
Doria Thmnb. VI, 3jo, ^69
Dorobtca Cass. VI, 34o, 4a6
Doronicum Linn. VI, 320
JDraropis Cass. V, 558
Dracunculus Bess. VI, Q3
Hrepania Juss. DC. VII, 86
DrimyphylJum Bursh. V, 5oi
Drozia Cass. Less. VII, 61
Duhautia Gaudich. V, 680
PubyaejDC. VII, 347, 3>7
Duchesnia Cass. V, 4,5
Dufraldea Cass. ! V, 66a
Duhaldeca DC. y, 366
Dumcrilia Less. Vil, 66, 306
Dumerdia Lag. V_f, 55
Dunantia DC. .. V, 636: VII, aqi
Dysodia DC. \, ^
Dysodium Rich. V, 519
Dyssodia Ca v. V, (jlc)
Drssodia Willd. V, *ibid.*
Echenais Cass. VI, 660
Echinacea Moench. V, 554
Echinanlhus Neck. VI, 5a3
Erhinoftena Jacq. V, 3
ECHINOPEJE DC. VI, 5aa
ECHIJSOPODEJE Cass. VI, *ibid.*
Echinops Ljnn. VI, *ibid.*
ECHIISQPSEAi Cass. VI, 5aa
ECHINOPSIDEJE DC. .. VI, 45o, 5aa
Echinppus Tourn. VI, 5aa
Eclopes Gcerln. VJ, 387
Erlypta Linn. .. V, 489 ; VII, 387
KCLYPTEAE Less. V, ai3, 488
Edmondia Cass. Less. VI, 214
Edwarua Week. V, 593
Eglctes Cass. VI, 4a
ElachiaZX? VII, 256
Elachothamnos DC. V, 398
Electra DC. V, 63o
ELEPIIAWTOPEAE Cass. ..\, 10, 85
Elephantopus Cass. V, 85
Efephanlops Linn. V, 85 , 87
Elophantosis Less. V, 87
Eleutheranthera Poit. V, 585
Eleutherochxta DC. VI, 44»
Eleutherogeron DC. V, 293
Eleutierolepis DC. VI, 448
Elnliegea Cass. V, 3i8
Elphegca Less. V, *ibid.*
Elvira Cass. V, 50a
Elytropappus Cass. VI, 356
Emilia Cass. VI, 3oi
Enatcida Cass. V, 5'2
Enanthiotrichum Mey. VI, 443
Encnia Adans. V, 566
Endnleuca Cass. VI, 3^9
Endoptera DC. VII, 177
Enhydra DC. V, 636
En) dm Lour. V, 636
Enula Duly. V, 4^4
Epallage DC. VI, 3
Epaltes Cass. V, ff>|
Epiclinasfrum Bojer. VII, 18
Epitrachy DC.* .." VI, 635
Erato DC. V, 31.7
ERECHTHITE^ DC. VI, 3,3
"EWKCHITKAE DC. V, 500
Erechbtites liaf.... &.. VI, 'i\$\$
Ereclitiitoides DC. .. J^HL. VI, 33q
*Ereiciphyllum Less.. ^f.. V I, 197
Ercmanthis Cass. " .. VI, 361
Eremnl/ms Less. V, 83
Ercmia DC. Vr 77
Eremoccephala DC. VI, »37
ERIGEREAE DC. V, an
Erigeron Linn V, s83: VII, 274
JzriiftH'on Uon. v, *fJ3
**Ennesa Don.* VII. 10, 1 T
Erincarjpha Cass. V, 5G4
*ERIOCEPHALEAE /w.V,499; VI, 145**

NOMINUM ET SYNONYMORUM COMPOS1TARUM. 317

| | | | | |
|---|-------------------|---|---------|----------|
| <i>Eriocephnlus</i> Linn. | VI, <i>ibid.</i> | <i>Euliarpalinm</i> DC. | V, | 538 |
| <i>Eriocphalus</i> Vaill. | VI, 635 | <i>EUHRLKNIEJE</i> DC. | V, | 653 |
| <i>Eriocline</i> Cass. | VI, 456 | <i>Eulielichrysum</i> DC. | VI, | 169 |
| <i>Eriocoma</i> HJ BB KK | W, 499 | <i>Euheliopsis</i> DC. | V, | 550 |
| <i>Eriocoryne</i> Wall. DC | VI, 54* | <i>Eiielioainthia</i> DC. | VII, | i3c |
| <i>Eriolepis</i> Cats | VI, JS35 | <i>Euhymeouoxys</i> DC. | .. V, | 661 |
| <i>Eriopappus</i> Diim | VI, 36a | <i>Euhy pochaerii</i> Dubjr. | VII, | 90 |
| <i>Eriofyl</i> lmp. ag | V, 656 | <i>EU1NULEJE</i> DC. | V, | 463 |
| <i>Eriopila</i> DC. | VI, a | <i>Eujasoiia</i> DC. | V, | 476 |
| <i>Eriospbscra</i> Less. | VI, 166 | <i>Enlasiospenuum</i> DC. | VI, | 38 |
| <i>Eriostemon</i> Less. | VI, 538 | <i>Euleucaria</i> DC. | VII, | 56 |
| <i>Eriotbrix</i> Less. | VI, 393 | <i>Euliatriis</i> DC. | V, | *ia8 |
| <i>Eriothrix</i> Cass. | VI, <i>ibid.</i> | <i>Eulucilia</i> DC. | VII, | 46 |
| <i>Enlheis</i> Gray. | VII, a84 | <i>Kulychnophora</i> DC. | .. V, | 79 |
| <i>Erythrolrcna</i> Sweet. | VI, 657 | <i>Eumelampodium</i> DC. | .. V, | 518 |
| <i>Erytbtropogon()</i> £. | VI, a54 | <i>Eurallina</i> DC. | VII, | 109 |
| <i>Eschembaclia</i> Moench. | V, 377 | <i>Euinonosis</i> DC. | V, | 77 |
| <i>Esnpnn</i> Raf. | VII, * a4° | <i>Eumorphia</i> DC. | VI, | 1 |
| <i>Espe-joa</i> DC. | V, 660 j VII, 29a | <i>KumorpUoides</i> DC. | VI, | 49 |
| <i>Espeletia</i> <i>Mulis</i> . | V, 516 | <i>Eumulgediurn</i> , HC. | VII, | 247 |
| <i>Ethulia</i> Cuss. | V, 1a | <i>EUMUTISIEiE</i> DC. | VII, | 4* |
| <i>Ethulia</i> Gacrtn. | V, 461 | <i>Kunuchoglossum</i> DC. | VI, | 48 |
| <i>Et/udin'^ces</i> . | V, 11, ia | <i>Euocderia</i> DC. | .. VI, | a |
| <i>ETHULIKAE</i> DC. | V, 10 | <i>Euonoser{i</i> DC. | VII, | 34 |
| <i>Euageratum</i> DC. | V, 108 | <i>Euosmites</i> DC. | VI, | 290 |
| <i>EUAMKLLKAE</i> DC. | V, an | <i>Euozothainnus</i> DC. | VI, | i65 |
| <i>Etiaudryala</i> DC. | VII, 244 | <i>Eupanargymm</i> DC. | VII, | 54 |
| <i>EUANTHEMIDEAEZ)£.</i> V, 499j VI, 1 | | <i>KÜPATÖRIACEAE</i> Less.... , 8; io3 | | |
| <i>Euautbemis</i> DC. | VI, 7 | <i>EUPATORIEAE</i> DC. | V, | io3 |
| <i>Euaplopappus</i> DC. | V, 347 | <i>Eupatoriophalacron</i> Vaill.. V, 49 | | |
| <i>Euarctotis</i> DC. | VI, 485 | <i>Eupatorium</i> Linn. V, 141 ; VII, | | |
| <i>EUASTEREEAEZ)C.</i> | V, an | a68. | | |
| <i>Euatlnvia</i> DC. | VI, 376 | <i>Eupatorium</i> Auct. | V, 14'f | 187• |
| <i>Kuberkliye</i> DC. | VI, 506 | <i>EUPECTIDEvEDC.</i> | V, | 98 |
| <i>Eubrachyrrhynchos</i> DC. | VI, 437 | <i>Kupetalacte</i> DC. | VI, | 267 |
| <i>EobrachysZ)C.</i> | V, 3ia | <i>Euphania</i> DC. | V, | n4 |
| <i>Euracalia</i> DC. | VI, 327 | <i>Euphrosyne</i> DC. | V, 53o; | VII, Q88 |
| <i>Eucalais</i> DC. | VII, 85 | <i>Eupicis</i> DC. | VII, | ia8 |
| <i>Euca/ia</i> Ra;uscb. | V, 567 | <i>Eupiqueria</i> DC. | .. V, | io4 |
| <i>Eucalydennos</i> DC. | V, 669 | <i>Eupolychaetia</i> DC. | .. VI, | a85 |
| <i>Eucplialophora</i> DC. | V, a35 | <i>Euporophyllum</i> DC. | .. V, | 648 |
| <i>Eucliiton</i> Cuss. DC. | VI, X97 | <i>Eproustia</i> DC. | VII, | 37 |
| <i>Euchloris</i> Don. | VI, 84 | <i>Epyrrrocoma</i> DC. | .. V, | 350 |
| <i>Eucichoium</i> DC. | VI, 505 | <i>Eurhapont.cum</i> DC. | .. VI, | 664 |
| <i>Eudibadium</i> DC. | V, 375 | <i>E.irops</i> Cass. DC. | .. VI, | 443 |
| <i>EUCONYZKIE</i> DC. | V, 161 | <i>Eurtops</i> Cass. | .. VI, | 33 |
| <i>Eucrcpis</i> “” | VII, 36 | <i>Eurybia</i> Cats.... V, a65; VII, | | |
| <i>EudicomaJBf.</i> | VII, 27a | <i>Eurybia</i> Nées. | V, | 264 |
| <i>EudiplostepBRft</i> DC. | V, 3ao | <i>Eurybia</i> Gray. | VII, | 37a |
| <i>Eudoronicmn</i> DC. | VI, 35a | <i>Eurybiopsis</i> DC. | .. V, | a60 |
| <i>Eudorus</i> Cass. | VI, 34o, 039 | <i>Eurytis</i> Don. | VII, | 90 |
| <i>Eud#jdia</i> DC. | V, 288 | <i>KusaussureaMey.</i> | .. VI, | 533 |
| <i>Eueclopes</i> DC. | VI, 4»o | <i>EuscolyraustfC.</i> | VII, | 7^ |
| <i>Kueclypta</i> DC. | V, | <i>Euscorzonera</i> DC. | VII, | 117 |
| <i>Eticrigeron</i> DC. | V, a83 | <i>EUSKNECIONEJEZJC.V,</i> 500; VI, | | 298 |
| <i>EucsxxDC.</i> | V, 458 | <i>Euseripbium</i> DC. | .. VI, | 26a |
| <i>EUGALINSOGFJEZ>C...V,</i> 499» ^{6 6 8} | | <i>Eusonchus</i> DC. | .. VII, | 184 |
| <i>Eugatuelia</i> fl. mex. | V, 50a | <i>Eusphaerautlius</i> DC. | .. V, | 369 |
| <i>Egnaphaliunt</i> DC. | VI, 22a | <i>Eusteuocliffe</i> DC. | .. VI, | 237 |

- Eastipnoliyllum DC.* VI, 92
Ensiccebe Cass. VI, 289
Eutauacetum DC. VI, ia8
Eutarchonsmthus DC. V, 431
Futhamia Cass. V, 330
Euthamia Nutt. V, *ibid.*
Kuthiamia DC. V, 34i
Eutjirincia DC. VII, 99
Eutragoceras DC. V, 533
Kntrichogyne DC. VI, 165
Kutrixia DC. % VII, 67
Eutrhis Hook. VII, 68
EUTUSSILAGINEJE DC. V, 207
EUVERNOfIEA DC. V, 10
Euxantlioides DC. V, 5*4
Kuxanthium DC. V, 5a3
Kuxrnia Cham. V, 5or
EUXKNI/E0C. V, 498, 500
Kuxerdntberauiu DC. VI, 5a8
Evax Gcerln. V, 458
Evopis Cass. Less. VI, 5<4
Eyselia Reich. VI, ia
- FACRLIDEJE Less.* VII, 45
Face'lis Cass. VII, 47
Failjasia Cass. VI, 393
Faustjila Cass. DC. VI, 164
luui'onim Gaertn. VI, 5o3
Fctva Spreng. V, 61a
Felicia DC. V, *ibid.* VII, a.71
Felicia Cass. V, a18
Ferclinanda hag. V, 55a
Virlilca A'rfiultz. VII, 87
Fidelia Sciliultz. VII, 107
Filago Ttmrn. VI, 347
Fda^n Willd. V, 456
Fimbrillaria Cnssi. V, 387
Fimlirillaria DC. V, *ibid.*
Flav«rif JI«J...V, 635 j VII, 29¹
F/avcria Ju&s. V, 104
FLA VERIER Less. V, 4g8, 605
FLOSCULOSA Tourn. V, 4
Florestina Cass. V, 655
Flotovia Spreng. VII, 10
Flourensia DC. . . . V, 5ga; VII, a90
Foraeum Adans. VII, 244
Fornicium Cass. Mey. VI, 665
Fougeria Morench. V, 50g
Fougeroux't DC.* !..! V*
Francoeuria Cass. " V* 475
Franscria Cau. y* 54
Frtemannia Boj. VI, ai7
Fresenia DC. y, 3a8
Frolovia Ledeb. DC. VI, 538
Fulcadea Pair. VII, 4
Fulcadea Less. V, 77
Gaillardia Foug.. V, 6i5 ; VII, 292
- GALLIARDIRAE DC.* V, 499, 65i
Galactiles Moench. VI, 6if>
Galardia Lam. V, 65i
Galasia Less. VII, ia3
Galatea Cass. V, a54
GAUICLLA Cass. . . . \, ibuf. VII, ana
Galeana La/lav. VII, a&7
Galinsoga R. et P. V, 677
Ga/iso^ca Kunth. • . . . V, 678
Galinsoga:a Zucc. V, 677
GALINSOGEAE DC. V, 499, 6J8
Galophthalmum N. et M. . . VII, 257
Galoddia Raeusch. V, 65 r
Gamocarpha DC. V, a
Gamolepis Less. VI, 40
Garulcum Cass. V, 309
Gastrncarpha Don. VII, 7a
GatiMnhofia Neck. VI, 70
Gatyona Cass. DC. VII, 177
Gaximia Geertn. VI, 508
Geigera Less. V, 48a
Geigeria Griess. V, *ibid.*
Gelasia Cass. DC. VII, 1 a3
Georgia Spreng. V, 494
Georgina W^lid. V, *ibid.*
Geracium Reich. VII, 164
Gerbera Gron. VII, 15
Geropogon Ltnn. VII, III
Gibbaria Cass. VJI, 257
Gifola Cass. DC. VI, 347
*Glebiom** Cass. VI, 63, 64
GLOSSARIPHYTUM Neck. V, 45 VII, 74
Glossocardia Cass. V, 631
Glossogyne Cass. V, 63a
Glimophylla DC. VI, 154
Gluphiphyllaæ DC. V, 671
Glutinaria Comm. V, 318
Glutiuaria DC. V, *ibid.*
Glycideras Cass. VII, 257
Glyphia Cass. VII, *ibid.*
GNAPHALIKAE V, 500 i VI, x40
Gnupiialium. *Don. DC* VI, aat
Gnaphalium Vaill. V, 458
Gnaphalium Cass. VI, aaa
Gnaphalium Lihn, et auct. VI, 166,
 167, 169, a n, 219, 243, 240;
 247, 249 a56, 264, 269, 371,
 275.
Gnaphalium Tourn. VI, 34
Gnaphalodes Tourn. V, 460
Gnaplialopsis DC. VII, * a58
GncphosU Cass. VI, 151
Gochnatia U.B.K. VII, a4
Gomezia Lalltv. VII, a6a
Goniocaulon Cass. DC. . . . VI, 558
Gonospermum Less. VI, 84
Gorteria Gaertn. V4, 500
Gorteria Lam. VI, 50J

NOMINUM ET SYNONYMORUM COMPOS1TARUM. 319

| | |
|---|--|
| <i>Gorleria</i> Linn. VI, 497, 500, 502,
50j, 508. | Hedraiophyllum <i>Less.</i> VII
'vii' 24 |
| <i>GORTERIEAE DC.</i> VI, 44, 497 | <i>Hedypnois Tonrn.</i> 'vii' 81 |
| <i>Grcemia</i> Hook. V, 661 | <i>Hedypnois</i> G*rtn..'. . VII, 79 |
| <i>Grangea Adnw></i> V, 372 | <i>Hedypnois Scop.</i> VII*, 145 |
| <i>GRAIVGEINKAE DC.</i> V, 37r | <i>Helcastrum DC.</i> .. V, 263 j vii, 375 |
| <i>Grindelia IVdid.</i> V, 3i4 ; VII, 258 | <i>Hclenia Linn.</i> y' 666 |
| <i>Guardiola, / B.</i> V, <i>ibid.</i> | <i>Heleulia DC.</i> "y* <i>ibid.</i> |
| <i>Guardiola</i> Steud: V, 5n | <i>HELENIAE Cass.</i> . . . ! , 4 99, 651 |
| <i>Guariruma</i> Cass. <i>Less.</i> VH, 1 | <i>Helenium Linn.</i> V. 665; VII, 293 |
| <i>Guizotia</i> Cass. V, 5 | <i>Helenium Cass.</i> y* 666 |
| <i>Gundelia Town.</i> V, 88 | <i>HELIANTHEAE Less.</i> y, 498, 534 |
| <i>Gundelsheimera</i> Cass. V, <i>ibid.</i> | <i>Herianthus Linn.</i> V, 585, VII, 290 |
| <i>Guttierrezia Lag.</i> V, 653 | <i>Hechichroa Raf.</i> V, 554 |
| <i>Gymnachcvna Reich.</i> VI, 264 | <i>HELICHRYSEAE . . . V, 500 ; VI,</i> 75 |
| <i>Gymuactis DC.</i> V, 317 | <i>Helichrysum DC.</i> VI, 175 ; YU, 298 |
| <i>Gymnanthcnium Cass.</i> V, i5, 67 | <i>HelichrysurnGxrtn.</i> Casg.. VI, 169 |
| <i>Gymrjantiemum DC.</i> V, 6j | <i>JJelichrysum Gaudicli.</i> . . . VI, 215 |
| <i>Gymnarhena Desf.W.</i> 374; VII, 280 | <i>Helicta Less.</i> VI, 3 |
| <i>Gymnocline Cass.</i> VI, 53, 58 | <i>lleiophthalmum Raf.</i> V, 555 |
| <i>Gynnocoronis DC\</i> , 106 j VII, 266 | <i>HELIOPSISDKAE DC.</i> V, 458, 534 |
| <i>Gymnodiscus Less.</i> VI, 49 | <i>Heliopsis Pers.</i> V, 550 |
| <i>Gymnolaeua DC.</i> V, 641 | <i>Helipterum DC.</i> VI, 211 |
| <i>Gymnoloma Ker.</i> V, 503 | <i>Helminthia Juss.</i> VII, 132 |
| <i>Gymnolomia H. B. K.</i> V, 56i | <i>Hdminthothcca Vaill.</i> . . . VII, <i>ibid.</i> |
| <i>Gynopsis DC.</i> «V, <i>ibid.</i> | <i>Hemiachyris DC.</i> V, 313 |
| <i>Gymnosperma Less.</i> V, 3r1 | <i>Hemizonia DC.</i> V, 692 |
| <i>CYMNOSIM:RMEJEZ)a..V.</i> 212, 310 | <i>Henanthus Less.</i> V, 356 |
| <i>Gymnostephium Less.</i> V, 300 | <i>Heootogyua DC.</i> »..V, 432 |
| <i>Gymnostyles Juss.</i> VI, 142 | <i>Henricia Cass.</i> V, 262 |
| <i>Gynema Raf.</i> V, <i>fibo</i> | <i>Heracantha Link.</i> VI, 610 |
| <i>Gyncfieteria Willd.</i> V, 456 | <i>Ileracautha Tab. DC.</i> VI, 545 |
| <i>Gyneleria Spreng.</i> V, <i>ibid.</i> | <i>Hcrderia Cass.</i> V, i3 |
| <i>Gynoxys Cass.</i> yj, 335 | <i>Hertia Less.</i> VI, 483 |
| <i>Gynoxys Less.</i> VI, 325, 411 | <i>Hertia Neck.</i> VI, 443 |
| <i>GynuraCVi«.</i> VI, 298 | <i>Heteracia F. ct M.</i> VII, 440 |
| <i>llacub</i> Vaill. V, 88 | <i>Heteractis DC.</i> VI, 410 |
| <i>Haenselera Boéss.</i> VII, 83 | <i>Heteranthemis Schott...</i> VI, 63, 468 |
| <i>Halocharis Bieb.</i> VI, 665 | <i>Heterochacta DC.</i> V, 082 |
| <i>Hamulium Cass.</i> V, 617 | <i>Heterocoma DC.</i> V, |
| <i>Haraulium DC.</i> V, <i>ibid.</i> | <i>HETEROCOMAE DC.</i> V, <i>ibid.</i> |
| <i>Hapalosthephium Don.</i> VII, i65 | <i>Uetcrolepis Cass.</i> VI, 496 |
| <i>Haplocarpha Less.</i> VI, 494 | <i>Heterolepis Bert.,</i> VI, 4»6 |
| <i>Haplostephium Mart.</i> V, 78 | <i>Heterolophus Cass. DC.</i> VI, 675 |
| <i>Harmodia Don.</i> VII, 2T | <i>Hctermrphra Cass.</i> VI, 496 |
| <i>Harpalium Cflifc.</i> V, 583 | <i>HETKROLAbPEAE DC.</i> V, 213, 496 |
| <i>Harpalizia Zj^Ht</i> V, 584 | <i>Heteropappus Less.</i> V?, 297 |
| <i>Harpalyce^Jt.</i> VII, 240 | <i>Heterospenna Cav.</i> Vf, 632 |
| <i>Harrison in T^rcl... %.</i> VI, 528 | <i>Heterospermum If did.</i> V, <i>ibid.</i> |
| <i>Hartmannia DC.</i> V, 6,3 | <i>HETEROTHALAJYIEAE DC.</i> , 216 |
| <i>Jlxtonia Hortul.</i> V, 271 | <i>Heterotbalumus Less.!</i> <i>ibid!</i> VII, 271. |
| <i>Hayned Spreng.</i> V, 16 | <i>Heterotheca Cass.Y, 316:</i> VII, 279 |
| <i>Haynca Willd.</i> V, 4 | <i>HETEROTHECEAE DC.</i> .. V, 21 a, 316 |
| <i>Hebecarpaea DC.</i> V, 219 | <i>HeterotAchum Bieb.</i> VI, 531 |
| <i>Hebclinium DC.</i> V, i36 | <i>madaJgoa Less.</i> V, 511 |
| <i>Hlbephora DC.</i> V, 453 | <i>Hidalftoa Lallav.</i> V, 52, T |
| <i>Hectorea DC.</i> V, | <i>Hicradium DC.</i> VIF, 247 |
| <i>Hecubaea QC.</i> .. V, 665; VII, 293 | HIERA 198 |
| | <i>Uieracioides DC.</i> VII, .67 |

- Hieracium FAnn. Froel...* VII, 198
Hilairia DC. VII, 33
Hingcha Illoxb. V, 636
Hiorthia DC. VI, 17
hiuorthia IN eck. VI, 15, 17
Hippia TAnn. VI, *44
Ihppia Runth. VI, i!||
 HII>PIEAE. V, 499J VI, |||
Hippioides DC. VI, i34
Hipposeris Cass. VII, 33
*Hippo*eris Less.* VII, 35
Hirnella Cats. VI, 150
Hirpicium Cass. VI, 502
Hirtellina Cass. VI, 544
Hispidella Bazn.... VII, 258
Hisutsua DC. VI, 44
Hochstetieria DC. VII, 287
Hohenwartha West VI, 610
Ifolochedus Cass..! VII, 71
Htlolepis/)<? V, 16
Holophyllaea DC. V, 670
Holophyllum Less. VI, 86
HolopliyUum Less. VII, 8
Honucanthus Spreng.... VII, 63, 6f
Homanthis DC. VII, 64
Uomanthis Kurth. VII, 63
Homochroma DC. V, 324
HoBiogyne Cass. V, 204
Homoianthus DC. VII, f3
Jiookia Neck. VI, 662
Hoorebeckia Corn. V, 5|6
Hoplophyllum DC. V, 73
Hopkirkia DC. V, 660
Hopkirkia Sprung. V, 493
Hoppea Reich. VI, 3.3
Hottia Mrench. VII, 167
Hubertia Bory. VI, 376
Humea Sm. VI, 57
Hunteria fl. met. !V, 649
Hunteria DC. V, *ibid.*
Hyal:ca DC. M. VI, 565
Hyalis Don. T. VII, 28
Hyalolepis DC. VI, 149
Hybridella Cass. V, 554
Hymejiatherum Cass.~V,6\$; VII, 292
Hymenocentrou Cass. DC. VI, 5
Hymcnolepis Cass. VI, 85
Hymcnomea Less. VII, 116
Hymenonema Cass. VII, *ibid.*
Hyrrnenonema Hook. VII, 86
Hymenopappus LHer. V, 658
Hymenoxyx Cass..W,6Si; VII, 303
HYOSERIDEJE Cats. VII, 78
Hyoseris Juss. VII, 79, 397
Hyoseris Gaertn. VII, 81
Hrosleris Linn. VII, 79, 81
H OCH>RI>Efc ass. Lys. VII, o
Hypochaeris DC. VII, *ibid.*
Hypochceris Gaertn. VII, *ibid.*
- Hrpoehafbris H. B. K.* VII, 93
Ilypochccris Tausch. VII, 91
Hysterionica fVilld. VII, 258
Hysteroplurus Vaill. V, 53 x
Ichthyothere Mart.Y. 5<4 ; VII, 288
Ifloga Cass. DC. VI, 265
Imp. I a Dod VI, 247
Ingenhousia Bert. f.VI, 447
Inl>l)ellia Cuss. VII, 180
inlybclha Monn: VII, 164
Htbellioide DC.* VII, xbul.
Inula Gm-tn. V, 4^4; VII, u83
Inula Linn. V, 4^3, 4^6, 467
INULEAE Cass. V, 2i3, 462
Inulopsis DC. V, 349
Iocaste Mey. VII, 298
Ij>)iona Cass. V, 475; VII, 285
Isanthus DC. VII, 63
Isanlus Less. VII, 18
Israelia Cass. DC. VI, 6a, 65
Ismelia Less. VI, 63, 65
I&melioides DC. VI, 65
Isocarpha R. Br. V, 106*
Isdcarpoides DC. V, 107
Isontena_m Wight. V, 23
I&onema Cass. V, 66
Isostigma Less. V> 63{
Isotrichia DC. V, 82
Isotypus H. B. K. VII, 33
Iva Linn. V, 5ag ; VII, 288
IVEAE Cass. V, 4g8, 517
Ixauchenus Cass. V, 388
Iicris Cass. VII, 151
Ixiolacna Benth. VI, 161
Ixodium f. Br. VI, 153
Jacca Cass. DC. VI, 570
Jarobcca Tourn. Cass. VI, 340, 348
Jacosia Mey. VI, 76 j VII, 298
Jacquemntia Bel. VI, 43
Jaegeria U. B. K. V, 543
Jasonia Cass. V, 47>J VII, 285
Jaumea Pers. V, 663
Joannen Spreng. VII, 9
Joannnesia Pers. VII, *ibid.*
Johannia Willd. VII, *ibid.*
Jungia Linn.f. VII, 55
Jurinea Cass. VII, 306
Kahiria Forsk ^ ^ V* . V, 12
Kalbfusia Schutlz ^ ^ n.. VII, 121
Kahmens Cass. V, 550
Kallias Cass. V, *ibid.*
Kallias DC. V, 375
Kanelinia Less. V, 300
Kau/J'ussia Wees. V, 278
Keerlia DC. V, 3oc>; VII, 278
KentrophylumiVecA^I, 610 ; VH,
 34
Kerneria Moench. *... V, 598

NOMINUM HT SYNONYMOKUM COAIPOSFTAHUM. 31i T

| | | | | | |
|--|--------------|------------------|---|----------------------|---------|
| <i>Klasia</i> Cass. DC. | VI, | 668 | <i>Layia H. et A.</i> | VII, | 294 |
| <i>Kleinia</i> Linn. | VI, | 336 | <i>Lcachea</i> Cass. | V., | 442 |
| <i>Kleinia</i> Jacq. | V, | 47 | <i>Lebctina</i> Cass. | ... y | 639 |
| <i>Kleinia</i> Juss. | V, | 663 | <i>Lciadraena</i> DC. | *., VI*, | 157 |
| <i>Roanophyllum</i> An. | VII, | 262 | <i>Leiacbaeium</i> DC. | ... y, | 346 |
| <i>Kœlpinia</i> Pall | VII, 78, | 309 | <i>fifibnitzia</i> Cass. | IVM, | 40 |
| <i>Krigia</i> Schreb. | VIII, | 88 | <i>Leigbia</i> Cass. | ... y, | 580 |
| <i>Kugaia</i> DC. | V, | 650 | <i>Leighia</i> Scop. | ... y, | 12 |
| <i>Kuhnia</i> Linn. | V, 126; | VII, | <i>Leiocarpum</i> DC. | VII, | 38 |
| <i>Kyberia</i> Neck.,, | V, | 394 | <i>liciobryum</i> DC. | ... yj, | 215 |
| <i>LABIATIFLORAE</i> DC. | VII, | * | <i>Leiogom'a</i> DC. | ... y | 226 |
| <i>Lacellia</i> fiv. | VI, | 55, | <i>Lejica</i> Hill. | ... y* | 534 |
| <i>Lacbanodes</i> DC. | VI, | 442 | <i>Lemra^tium</i> DC., | , 669 j | 294 |
| <i>Lachnosperraum</i> Willd. | VI, | 255* | <i>Leontodon</i> Juss. | ... , | 101 |
| <i>Iactica</i> Tourn. | yil, | 133 | <i>Leontodon</i> Adans. | ... VII, | 145 |
| <i>Lactuca</i> Cass. | VII, | ibid. | <i>Leontodontoides</i> Mich. | VII, | 82 |
| <i>LACTUCEJE</i> Adaus. Cass.. | VII, | 74 | <i>Leontonyx</i> Cass. | ... VI, | 167 |
| <i>LACTUCEJE</i> Le*s. | VII, | •33 | <i>Leontopbthalmum</i> Less. | ... ly | 675 |
| <i>Laennecia</i> Cass. | V, | 376 | <i>Leontopbthalmum</i> Willd. | • V, ibid. | |
| <i>hacstadia'Kunlh.</i> | V, | 374 | <i>Leontopodium</i> R. Br. | VI', a*ij | |
| <i>Lagasca</i> DC. | V, | 91 | <i>Leffachys</i> Raf. | ... V, | 5^ |
| <i>L>ngasca</i> Cav. | *V, 'ibid. | | <i>Lepacby^DC.</i> | ... V, | ibid. |
| <i>fagasea</i> H. B. K. | V, | ibid. | <i>Lepicliua</i> DC. | ... , VI, | x97 |
| <i>Lagenifera</i> Cass. | ... , V, | 307 | <i>LepidaploaLskS9.</i> | —TV, | i5, 26 |
| <i>Lagenophora</i> Cass., | 307 ; | VII, | <i>Lepidaploa</i> DC. | ... y | ag |
| <i>Ljagoseris</i> Bieb. | VII, | 179, | <i>Lepidonequa</i> F. et M. | VII', g^ | |
| <i>Tjtigoseris</i> Link. | ... ^h | 152 | <i>Lepidopappus</i> fl. mex. | ... V, | (§5 |
| <i>Lagurostemon</i> Cass. DC. | VI, | 532 | <i>Lepiclo]tlioriiin</i> JVcek. | VI, | JQ |
| <i>JLampsana</i> Tourn. | ... VII, | 76 | <i>Lepidopbyllum</i> C<fcA.V, 3r4; VH, 2*78 | | |
| <i>LAMPSANEUE</i> Cass. Less. | VII, | 76 | <i>mkjjfdopogon</i> Tausch. | • *V, | 458 |
| <i>Lamyra</i> Cass. DC. | VI, | 658 | <i>Lepidoseris</i> Reich. | ... VII, | i53 |
| <i>LAMYREAS</i> Cak». | VI, | 617 ¹ | <i>Lepiscline</i> Cass. | ... ^Yli | 197 |
| <i>Lancisia</i> Adaps. | VI, | | <i>Lepterantjms</i> Neck. DC. | ... Tvh, | 57» |
| <i>Lancisia</i> Gaertn. | VI, | | <i>Leptica</i> Mey. DC. | ... VII, | 16 |
| <i>fancUia</i> Pers. | VI, | 39 | <i>Leptinella</i> Cass. | ... J^I, | 141 |
| <i>Landtia</i> Less. | VI, | 494 | <i>keptocarpba</i> DC. | ... V, | 495 |
| <i>Langsdorfia</i> Willd. | VII, | 22 | <i>Leptocoma</i> Less. | ... Vf | 280 |
| <i>Lanipila</i> Burch. DC. | VI, | 3n, 38 | <i>Lcptoderis</i> DC. | ... V, | 323 |
| <i>Lapeyiriisia</i> Tbunb. | VI, | 76 | <i>Leptoglossa</i> DC. | ... *I _f | 258 |
| <i>Lappa</i> Tourn. Jdss. | VJ | 1561 | <i>Leptogyne</i> Ell. | ... M. | V, |
| <i>Lapsana</i> Linn. | VII, | 76, 77, 78 | <i>Lcptomorpha</i> DC. | ... % | VI, 450 |
| <i>Lasiantha?</i> a DC. | ... *... rV, | 607 | <i>Leptopyfa</i> DC. | ... VI^ | 5c3 |
| <i>Lasianthus</i> ZilCC. | V, | ibid. | <i>Leptophytui</i> Cass. | ... Vj | ^79 |
| <i>Lasiocephalus</i> Schlect. | VII, | | <i>Lcptopoxlff</i> 2Vutt. | ... w. | 278 |
| <i>Lasiopogon</i> Cass. VI, 246 ; VII, | 292 | | <i>Leptorliynclios</i> Less. | VI, .59; V'J, Rg8 | |
| <i>Lasiopus</i> Cass. | VII, | •18 | <i>Le^toliperuides</i> DC. | ... ^, | 17 |
| <i>Ljusiopus</i> D. | VII, | 247 | <i>Leptosine</i> DC. | ... y | 551 |
| <i>Lasiorhiza</i> | VII, | 58 | <i>Leptotbamnus</i> D (J. | ... y' | 367 |
| <i>Lasiorliiza</i> | VII, | ibid. | <i>Leria</i> DC. | ... yj | J0 |
| <i>Lasiopernum</i> ^{jung} | VII, | 37 | <i>LERIEJE</i> Less. | ... YJJ ¹ | |
| <i>Lasiospermum</i> Fisch. | VII, | ia4 | <i>Lessingia</i> Cham. | ... V* | AK |
| <i>Lasiospermuiu</i> Fisch. | VII, | | <i>Lestibedeia</i> Neck. DC. | ... VI, 70 | 71 |
| <i>Lasiospora</i> Cass. Less. | VII, | 1a4 | <i>Leucantha</i> Gray. | ... VJ | Vrg |
| <i>Lasthenia</i> Cass.. .V, | 664 i | VII, * | <i>Leqaauthciuoides</i> DC. | " " VT* | In |
| <i>Latreillea</i> DC. | V, | 504 | <i>Leucanthcmum</i> Tourn. | DC.VL, 45'; | |
| <i>Laurea</i> Cass. DC. | VII, | iffi | T VII, 296. | | |
| <i>Lavenia</i> SwgirU. | *—V, | 110 | <i>Leuceria</i> Lag. | ... VII, | 58 |
| <i>Lavenia</i> Wall. | Y, | a\$0 | <i>Leuceroideh</i> DC. | ... VII, | 5p |
| <i>Luxmannia</i> Fnnt. | V, | fioi | <i>Lciicorbrysiim</i> DC. | ... | 215 |

- Leucomeris* *Don.* VII, a5 *Madaria* *DC.* V, 691; VII, 294
Leucomeris *Blum.* VII, a i *Madarioidej.* *DC.* V, 6^a
Leucophyta *B. Br.* VI, i5a *Madaroglossa* *DC.* V, 694
Leuoophyton *Less.* VII, 36 *Madea* *Sol.* V, 30i
Leucopsisidium *DC.* VI, 4^ *Madia* *MoL.* V, 691; VII, ^
LAcopsis *DC.* V, 348 *Madia* *Auct.* V, 691, fin?
Leucostemma *Don.* VI, «og *MADIEAE* *DC.* V, 4qg, 6qT
Leuzea *DC.* VI, 663 *MagarsaZJC.* VI, 65
Lcyssera *Linn.* VI, 278 ; VII, 299 *Ma home la* *DC.* #.... V, 4^7
LEYSSKRIEJSZV, 500; VI, 276 *Mairia* *DC.* V, " ain
LIABAEAE *Cass.* V, 94 ; VH, a65 *Malria* *Ne'es.* V, *ibid.*
Liabum *Adans.* V, 96; VII, a66 *Malacothrix* *DC.* VII, 19a
Liatris *tSchreb.* V, ia8; VII, 267 *Mantisca* *Cass.* VI, 56a
Liatris *Don.* VU, 13 *Mantisalca* *DC.* VI, *ibid.*
Lidbeckia *Berg.* VI, 39 *Marasmodes* *DC.* VI, i36
Lidheckia *Pers.* .. I. VI, 38 *Marcelia&zsh.* VI, 4
Lieberkuhna *Cass.* VII, 43 *Margaripes* *DC.* VI, 370
Ligularia *Cass.* VI, 313 ? VII, 300 *Margarita* *Gaud.* V, aa6
LIGULATAE *Gcertn.* VII, 74 *Marsha Ilia* *Schreb.* V, 680
LI GULI FLORAE *DC.* VII, 74 *Martrasia* *Lag.* VII, 55
Limbara *Adans.* V, 47 *Maruta* *Cass.* VI, i3
Limbara *DC.* V, *ibid.* *Mastigophorus* *Cass. DC.* VII, 50
Liniphillgrti *Ljess.* VII, 39 *Mastruciym* *Cass. DC.* VI, 667
Llnosyris *Dt.* V, 351 ; VII, a80 *Matamoria* *Lallav.* V, 87
Lloydia *Neck.* VII, x3 *Mataxa* -Spreng. VI, 37
Lipochaeta *DC.* V, 6io; VII, 391 *MaXricaria* *Linn.* l, 5o; VII, 2^7
Lipotriché *B. Br.* V, 544 *Matricarioideb* *Less.* VI, 1J1
Livotriché *Less.* «... V, \$10 *jyicdicusia* *Mcench.* VII, 128
'Looheria *Neck.* ... /' V, 01 a *Meisteria* *Scop.* V, 1&
Logfia *Cass.* VI, a818 *MELAMPODIEAEZ*M..* V, 498, 5i7
Lomatolepis *Cast.* VII, 180 *MELAMPODINEAE* *Less. DC.* V, 497,
Lonas *jaåns.* VI, 84 500.
Longclariipia *Less. DC.* WI, 279 *Melampodium* *Linn.* V, 517
Lopholepis *Cass. DC.* VI, 634 *Melanthera* *Rich.* .*.... V, 544
Lopbolaena *DC.* VI, 335 *Melanchrysum* *Cass. DC.* VI, 508
Lopboloma *Cass. DC.* .. VI, 58© *Melanodendron* *DC.* V, 279
Lorcnte'a *Less.* V, 101, 10a *Melanoloma* *Cass. DC.* VI, 577
Lorentea *Lag.* V, 98 *Melanthera* *Bohr.* V, 644
Lo'renteh *Ort.* V, 628 *Mendezia* *DC.* V, 53a; VII, 308
Loxodon *Cass.* VII, 44 *Meratia* *Cass.* V, 50a
Lucilia *Cass.* VII, 4^ *M\$occjlron* *Cass. be.* VI, 5qa
Lucilioideb *Less.* VI, 280 *Mesogramma* *DC.* VI, 304
Lucilioides *DC.* VII, 46 *Mesoretra* *Raf.* V, 666
Lugoia *DC.* ... +. i^VI, 14 *Meso&teirus* *DC.* VI, 93
Lufiera *Scbulz.* VII, 8g *Metabasis* *DC.* VII, 97, 307
Lychnoflehalus *Mart.* V, *83 *Metalsasia* *B. Br.* VI, 249
Lyfclmophora *Mai U.* V, 78 *Meftlasioides* *DC.* VI, 266
Lychnophoroides *DQ.* V, *ibid.* *Metazanthus* *A/e/re/^/k.* VU, a5cj
Lycoseris *Ca&s.* VII, 21 *Meteorina* *Cats. DC.* j^H, VI, 70
Lygodesmia *Don.* VIIJ, 198 *Meyera* *Schreb.* ... /tt., V, 636
Lyonnetia *Cass.* VI, 14 ; VII, ag5 *Meyeria* *DC.* V, 670
Mathxranthera *JYe'es.*;... V, 261 *ifticractis* *DC.* V, 6ig
Machlis *DC.* VI*, rfo *Micrelium* *Forsk.* V, 489
Macldium *Cass. Less.* VII, Zn *Microcoma* *DC.* VII, 36
Maclovia *DC.* VII) 59 *Microderis* *DC.* .. VI, »95 5 VU, 127
*Macrobotu*Z>£.* VII, 53 *Microglossa* *DC.* V, 320
Macro rhy neb us *Less.* VII, 151 *Microgyne* *Less.* V, ag#; VII, 275
Madaractis *DC.* VI, 439 *Microgyne* *Cass.* VI, 147
Microlonchus *Cass.* VI, 56a

JVOMINUM KT SYNONYRIORUM COMPO^TTARUM. 3,a3

- Microlophus Cass. DC.* VI, 557 *NaMonium Cms.* VI, 37
IMicropsis DC. V, 459 *Nananthea DC.* VI_v * 45
Micropus Linn., V, 4^o j VII, 283 *JVanophyeitn Less.* VI, 200
Microrhachis DC. VI, 85 *Nardopliyllum DC.* VII, To
Microrhynchus Less. VII, 180 *Nardosmia Cass. V, ao5 ; VII,* 37₁
IM icroseris Don VII, 88 *Narvalma Cass.* V, 633
Microspermum Lag. VII, 150 *Isaisaea DC.* VII, 48
Microstephium Less. VI, 4\$ *Nassauvia 6omm.Juss...XII,* 49, 36
Microtrichia DC. V, 306 *Nassauvia Cass.* VII, * *ibid.*
Mieia LalliiV. V, 654 *Nassauvia Don* VII, 48, 60, S
Mikania fTtUd...jk-187 ; VII, 370 *NASSAUVIACKAE Less.Y*9; |H, Ag*
Milleria Cass. ^ V, 503 *NASSAIWIEJU Cass.* VII, *ibid.*
MILLERIEAB DC. V, 4q8, 50a *jNASSAUIEJB Le>s.* VII, *ibid.*
Millina Qass, DC. VII, 109 *IVafssavut Spr.* ^ . . . VII, *ibid.*
Millotia Cass. ^ VI, 161 *JYassovia Pers.* > . . . VII, *ibid.*
Minuria DC. V, 398 *Nauembuf^ia Willd.* V, 635
Minurothamnus DC. VII, 50S *JVauplius 'Cass.* V, 486
Mitiua A dans. VI, 546 *JWeedhamia Cass.* V, 633
Mnesitheon Raf. VII, 387 *Neja Onn.* V, 3a5
Mocinia Lag. V, 67 r *Ncmauchees Cass. DC.* VII, 179
Moc&ia DC. VII, a6 *Neoceii JOass. DC.* VI, 294
Mvhnia Neck. VI, 50S *Nctlra Spreng.* VI, 283
Molina R.ctPav. V, 398 *Kuractis Cass.* V, 631
Molpadia Cass. V, 4»5 *jYeurrchUvna Less.* ^ VI, *ibid.*
Monactis//. 4 K. V, 546 *Neurolaria IK Br.* VI, *ibid.*
Monarrenus Cuss. V, 457 *NidoreiTa Cass.* V, 500
Monenteles La id I. V, f\$ *JVieburhia Scop.* V, 3ai
Monochlana Cass. VI, 559 *JVieburlia Ntfck.* VII, 389
Monodonta DC. V, 3*5 *Nocca Cass.* V, 9a
Mouogyria DC. X . V, 74 *Noccea DC.* V, *ibid.*
Monolopia DC. VI, 77 *JVoc<ara^J-dvq.* V, 81
Monosis DC. V, 564 *Nolletia Cass.* J, V, 366
Montagnaea DC. V, 564 *Nothites Cass.* J, V, 186
Mnnlanoa Lallav. V, *ibid.* *Notica!strum DC.* V, 186
IVfoonia Am. VII, 88 *Notobasis Cass..|l,* 660,• VII, 3h
Moquinia DC. *VII, JM, 306 *Notonia DC.* VI, 441
Mama LindJ. vf| 679
Morysia Cass. VI, 90
Moscharia H. et P. VII, 7a
Moschifera Mol....% VII* *Obeliscaria Cass.Y, 558 j VII,'* 289
Mulgedium Cass. VII, 247 *Obchstolhecn Vaill.* V, 555
Munnozia H. et P. #Vli, 259 *(Jbacjaj'a Cnss...VI, 340, 'i) 1,* 342
M iiny chia Cass. V, aaa *Odontocarpha DC.* V, 71
Mussinia Willd. Yh 508 *Odojiituguallin DC.* VI, 611
Mutisia Linn. f. VII, 4 *CTdontoleJns Boiss.* VII, 304
Mutisia Cass. VII, 5 *Odontoloma U. B. K.* V, 11
MUTISIACEAE Less.Vt 9; VII, 1 *Odoutolophus Cass. DC. ...*.. VJ,* 579
MUTISIA VII, *ibid.* *Odontopliylluin Less.* *, VI, 288
MUTISIA VII, *ibid.* *Odfmiophjrrllun^Lcss.* VII, 6, '8, 306
Mycelis CasTTJbC. VII, 139 *(Jdontospermum Neck. V, 486 '488*
Myosseris Link VII, 184 *OdontotrirhumsZMcc.* VII, 260
Myriactis Less. V, 308 *Ofidera Linn.* VI*, 1
Myriademis Cass. V, 476 *OEderia DC.* ||| *ibid.*
*Myriocephalus/?e/tf/** VI, 150 *Otfcerostylus Cass.* Vjj * 15<>,
Myriogy ne Less. VI, 13₉ *Ogicni Spreng.* V, 50i
*Myripnois Bans** VII, 38 *Ogienna Cass.* V, 54.^
MyscoliwCass. DC. VII, 19 *Oglifa Cass. less.* VI, a4«
Nabalus Cast. VII, 240 *Oiospc.mum Less..|l, 11; VII,* *6{
Olearia Monech.. V, i,i *Oldenburgia Less.* VII, 12, 5o&

- Ohtaclis* Cass'. V, rfi
Oligactis DC. V; *ibid.*
*Oligof t.w ** VII, ia
Oliganthes Ciss. V, i5
Oligoap us Las. VI, 4^5
Oliquchseta DC. VI, 671
Ongodora DC. \<| a8a
Oliga lion Cass. V, 681
Onglobus DC. VI, a6
Ohogogyn DC.. V, 629, VII, 291
O/s^e/m'Cass. V, 370
Oleotporus Cass. Vf, <3, 14⁴
Oligothiix DC. VI, * 304
Olocirpha DC. V, % 692
Omilianthus Less. VI, <3
OmtlotesZC. VI, tbul.
*Om ilolhera Cass., l, *\$5*, VII, 209
Onobioma DC. VI, 6ii
O ihi nma Spi eng VI, 611, 613, 614
Onopix H<if. iiyfi* ^a^o
Ouopordon Li'in.Wi, 61 j^V^I, 304
Onosens DC. VIJ, 3i
Onostns Cass. VII, 34
Ouotrophe. Caff. ££. Vf, 644
Ooclinwm /J<.:V, i33 ; VII, 268
Opmorphaea DC.....%K -ip*.* 136
Oplnyosporus Mejren.. , , II, a60
Opounia />o/i. YH, 108
Oreophila Don. DC....|ll,* 93
Orcoscns DC. VII, 17
(Jreuqoiiia Scilicet. VI, 'W
Oiesiqoma WilU. ^ 1, 3aJ
*Otyb(f*t<* fl m^x* ^I, ^"^"
Oimenis CV.* VI, 18
(>rtt<rt B<rol. V, 4^6
Orsinia Hulol. V, lo'j
Orthoceitroa 6a«. DC. VI, 6^1
O<mit<s Cass. VI, jyo
(Jsnutts Linn. VI, ago, 392
Osnntopsn Cms. VI, 29J
OSltOSVhliMIXLDt. VI, 9^4^9
ObteobpermHp>is />£. ^VI, ?
Osleospici nium Linn. ^J§i /%
Ostensntrmnin Til. VIJ>i}, j5<
Oswalda Cass. V, 605
Oiwalda ZC. V, 1^/.
Otjnlihis Link. VJ, 34
Olei/a Lnunu. VIJ, 263
OUftuiM rtfA.* VI, ^7i
Uthnnnu Linn. VI, 40, 443, 469,
OIHONINIALZJC. VI, 449, 468
Ororlilamys DC. VI, 77
**Oxy<lon Ae«.* VII, 306
Oxylobus Moc. V, u5
Oxylobus D^. V, *ibid.*
Oxyodon A^J. VII, 43, 306
Oxypappus ^. V, 66,i
Oxyphearia Horri VI, 157
Oxyura DC V, 6<)i, \ U, ao4
OyedxaDC V, 576, VJ1, jqt>
Ozothamnus H Br. VI, if4
Ozothamnus Cass. VI, r65
Pachydens Cass. V, 360
Eachydem DC. V, ibul.
Pachylaena Don. VII, 3^*
Pachylepis fess. VII, 98
Pathy rh) nchusDC VI, a65
Pacourioii Aufm^ V, 14
Pacourinopsis Cass. V, i>ir/
Palafoxia Lai. V, |i|
Paleolaiia Cass. fV, ibul.
*Palcyia Cass DC** VII, ito
PaUasiaUH& V, 56>
Pallemis Cass V, 487
Pa/nphalea Laq. VII, 7?
PanaMja fViss. VI, i6i
Panargyrura Lag. VII, 5 k, 30G
Paquerina Cass. V, 307
Paraphysis DC. VI, 560
Pardihium Burm DC MI, 3S
Pnt themastrum "Niss V, 5ii
*Pai tlicnia<*trum DC.* V, *3II
Partieuichaeta DC. V, ibut.
PARTHENIRAE /ess V, 4QS, 530
Parthenium Linn V, 531, VII, aSS
P.nra)ia Or(. V, 540
PT-crrpvfe)/^ V, 10, 9]
PLCriDEAL LMS. V, 98
Pectidium Less. V, *ibid.*
PectidopsisjDC. V, ibul
Pectmastrum Cass. DC.. VI, 600
PectineUum D(!. V, 1 of
PcclisHkess .4. V, 98
PetUs Linn. V, tbul.
*P*tis Cass.* V, ibul.
PrgoJettia C'ss. V, 48'
PentBcalia Cass. VI, 3Vf
Pentachlamyrf DC.. VII, 1 a5
Pentameradllies DC. V, 4^5
PciUanema Casi.V, fc4, VII, afc5
Pentmthus H it Am... VII, 54
Pentanthus I^ss. VII, 53
Ponta^ioru^ Don Hook ... VII, a4
Pentnlans Don VI, 196
Pontbea Don L VII, 5
Prnt7ia 'hunb VI, i36
Pcnmibus //// V, 568
PPRDtCILA. Spreng. VII, I
Percuphma Hoilm. VI, 667
Perezia />£. VII, 6a
Peiezia Cass. VII, Go
/ta ma tallav. VII, C5
Perezia Lac. VII, 61
Pfnralia (jass. VI, 3in
Pencallis Don VI, ^ o, 409
Petrotriche (jgss. Vf, 26]

- Ptsonaria* Lam. . . . VI, 500, 501
Persoonia Michx. . . . V, 680
Perymenium Schrad. . . . V, 608
Pfctalacte Don. . . . VI, 267
Petalolepis Cass. DC. . . . VI, 164
Pclalolepis Less. . . . V, 267
PKTASITEAE DC. . . . V, 204
Petasites Town. . . . V, 206
Petrobium R. Br. . . . V, 501
Peyrousea DC. . . . VI, 76
Phtcasiam Cass. Re'u^. . . . VII, 160
Phccnixopus Cass. . . . VII, 176
Phamocoma Don. . . . VI, a66
Phaeuoglossa DC. . . . VI, 259
Phaenogyne DC. . . . VI, 145
Phaeopappus F. et M. . . . VI, 560
Phrvnnpoda Cass. . . . VI, 4^9
Plnenopus DC. . . . VII, 176
Phugnalon Cass. . . . V, 3f6
Phalacraja DC. . . . V, 105; VII, at16
Phalacrocarpuiu DC. . . . VI, 49
Phalacrodiscus Less. DC. . . . VI, 47
Plialacroglossum DC. . . . VI, 45
Plialacroloma Crr.ss. . . . V, 297
Plialacroniesus Cass. . . . V, 4^7
Phalolepis Cass. . . . VI, 508
Phania DC. . . . V, u4; VII, 266
Plianoderis DC. . . . VII, 9a
Phialis Spreng. . . . V, 656
Philactis Schrad. . . . * . V, 534
Philoglossa DC. . . . V, 667; VII, 289
Philostizus Cass. DC. . . . VI, 598
Phrygia Pers. . . . VI, hpi
PFiyllinema Blum. . . . V, 630
Pljylocalympna Benth. . . . VI, i50
Phyllocephalum Blum. . . . V» 66
Phyllocephalum DC. . . . V, ibid.
Phylloneja V, 3a5
Phynaspermuin Less. . . . VI, 44
Phytcumopsis Juss. . . . V, 680
Picnocnmon Dał. Mey. . . . VI, 634
Picnomon Lob. Ad. . . . VI, ibid.
Picradenia Unoh. . . . V, 665
Picridium Desf. . . . VII, 182
Picris Juss. . . . VII, 128
Pjais Linn. . . . VII, "9, 131
Picrosia Don. . . . *VH, 251
V[e]sDC.J/L* . . . VII, 144
Pilosolcoide ^ P . . . I . . . VI, 16
l>nardia CassT. . . . P . . . I . . . VI, 63, 65
Pinaropappus Less~> . . . VII, 99
I'in^rma Cass. . . . V, 398, 4^jo
Pinillosia (ossa), 5a8; VII, 288
Piptocarpha Brown. . . . VII, 261
Piptocarpha IL < Am. . . . VII, . . .
Piptoceras Cass. DC. . . . VI, 567
Piptoyomtf Cass. . . . V, 74
Piplnpogon Cass. . . . VII, 95
Kptcuiemina Don. . . . ^ .. VII, . . . 5 4
- Piqueria Cat'* V, 10\$
Piqucrioides DC. V, 105
Pirartla Allans. V, 1a
Pithecoseris Mart. V, M
Pithosillum Cats. VI, 374
*a[aci9 Lour** VII, u^gi
Plagi(Aeilus Arn. VI, jji
Plagiotome DC. VI, 296
Plagius VHtv. VI, i35
Plaiiorhachife DC. V, X5
Plateclypta DC. V, 49 r
Platycarpa DC. V, x^q|
Plafycarpha Less. V, 71
Platycheilus Cass. VII, ibid.
Platylepidea DC. VII, a65
Plaiytepis Less. VII, ibid.
IMatylophus Cass. DC. VI, 671
PlatypEris H. B. K. V, Gfn
Plarypteris DC. V, ibid.
IMalyrapliuin Cass. DC. VI, 659
Plazia /Let Pav. P. V, VII, 47
Pleclocephalus Don. DC. VI, 575.
Plicouactis DC. V, g5»
Plocarphus Don. VII, 7a
Pleuroceplialuin Cass. VI, aba
Plocamophyllum Less. V, iyj
Pluchea 6V/« .. V, 44Q ; VII, a83
PLUCHKINEAE Cass. V, 43a
Pluridens Neck. V, 5g3
Potlanthus LJIC. V, 50i
Podia Neck." VI, 698
Podocoma Cass. V, 260
Podoncja DC. V, 3a5
Podnsperrn IAbill. VI, 15Q
Podnsperra Less. VII, 110
PodoBmirmum DC. VII, ibid.
PodothSca Cuss. VI, 109
Pollalesta H.B.K. V, i5
PnhfiDC. * . V, 27D
Polficajitha Gray. VI, 5^8
Palyacantha Vaill. VI, (Jfm
Pn'lyachrus Hook. V11, 53
Polyarhurus Lag. VII, 53, 306
Pol^actidium DC.Y, 281; VII, 374
Polyactis Less. V, abi
Polyanhena Cass. V, aa8
Polycephnlos Forsk. V, 3n₀
Polycephaloi DC. V, ibid.
Polycha^ia Less. VI, 284
Polrchatia Taiisch. VII, " 86
Polyclada DC. VII, i^25
Polylepis Less. V, J18
Polymnia Linn. . . . V, 5i4 ; VII, 88
Pntytninstrum La in.. V, S14, 515
Pnlypappus Less..|| 308; VII, a8i
Pofyphyllon Less. VII, 50
Polyptcris lYutt. V, ^
Pnlypteris Less.. V, 660
Porcellites DC^ VH, 9^

- POROPHYLLEAE DC. V, 499, 647
Porophyllum *yailLV*, 499; VII, 292
Portalesia Meyen. VII, - 52
Prarclis Cass. V, i33
Prenunthes *faill.* VII,
Prenanthes Linn. VII, it 191
Priestfeyn fl. mex. 561
Prinlzia *Qass.* VII, 13
Prionautics Schrank. VII, 6H
Prioijoropliyllum *Less.* VII, 3r
PrisiocitiPUn M^oy. VI, 86
Proaacron Cnst> V, 508
PmseUa Don. VII, 30
Prnlenpsis Mart. V, 16
Prvnslia Spreng. V, 30
Proustia *I,fx.* VII, 26
Psar.alium *Cans.* VI, 334
Ptaiiac^ttiim Heck. *Less.* VI, i3<>
Isatiurnelia *Ua* DC. V, 609
Pscphthlus Cass. DC. VI, 575
Pseudarctotis DC. VI, 489
Pseudatlmixia DC. VI, 277
{'bcudevnx DC. V, 459
Pseudocbamomilla DC. VI, 5r
Psciuln-elr.pliantopus Rohr. V, 87
Psendn-luctia DC. VII, 4<>
Psiatlia *Jacq.* V, 3.8
PSIAIMKAE DC. V, 212, 317
Pailorarpnx DC. V, 596
P.silopliyllum *Less.* VI, 286
PsilosAuin DC. VI, 40
Psilstrophic DC. VII, 261
Psilothamus DC. VI, 51
Pailotlinnim *Mej.* DC*. . . . VI, 49
Ptarrrica Torn. /?CVI, ig; VI, 295
Pterigeron DC. Vs > 293
Ptcrocanlon Ell. V, /if3
Pterocaulopsis DC. V, 454
Pterocoma DC. VII, 37
Pterolopbus Cass. DC. VI, 571
Pteronia FAnn. V, 356
Pteronia Linn. f. V, 7^
Pleropappitis *Less.* V, 1f7
Pteropappus DC. V, *ibid.*
Pternphnra Nerk. V', 361
Pterophorus Cass. V, *¹&²>
Pterophnruft DC. V, *ithit.*
Ptcrophytn Cass. V, 5-15
Ptejopogon DC. VI, 235
Pterotheca Cass. VII, 170
Prorothrix DC. ; VI, 279
Ptilostemon Cass. DC. , 1, 667
Philostephiim H. R K" V' 678
rtilurus *Don.* yjj
^ulicaria DC. — V, 477/VII, 28S
Pulicavia Ga?rtn. y?
Pycnocephalum DC. y, 83
Pynosorus Benth. VI, 83
Pyrarda Cass. V, 379
- Pyrarda* DC. V, 373
Pyrethraria DC. VI, 15
Pyrethrum Me&l. V, Cy>
Pyr&Lhrum (*Icertn.* VI, 53 j VII, 297
Pyroclia>a DC. V, 3*49
Pyrrhopappus DC. VII, 144
Pyrrocoma Honk. V, 350
Quinelia Cass. VI, i58
RADTATJE Tourn. V, 4
Kailh.nla Cuulidi. VI, 44°
Rnniilla DC. V, 55c
Rancagua Poepp. ctKndl.. V, G64
liaubidii Raf. V, 558
Ratibida DC. V, f5g
Rtizumowui Spreng. VI, 157
Rea Bert. D'cnisn. VII, 243
Reichartlia Roth. VII, 188
Rclhania *Less.* VI, 288
ndhanuì L'Her. VI, afti, 287
RKLHANIEiE *Less.* V, 500 | VI, 280 ;
V I I, 88
Rclbanoides DC. VI, 280
Rliadotbeca Cass. DC. VII, 180
Rhacnmti A dans. VI, 662, 665
Rhacoma DC. VI, 665
Rfiaffarlinlnitvs VaiH. VII, 81
Rhagariinitis Tnnrn. VII, 77
Rhaqtllinfus Reich. VII, 78
RlmnlRriiflk Desf. V, 463
RHAPONTKCE^ Cast. VI, Ma
Rhnponicnm DC. VI, *ibid.*
Rhnponicum Less. VI, 665, 666, 667,
668
Rhi^iothamnus *Less.* VII, 37
Rliinactina L, c.ss.., 275; VII, 274
Rhinarlina Willtl. VII, 55
R/iinnct'.rotis *Less.* VI, #256
Rliodanhc FAntf. VI, i5g
RhyicJiocfinpus *Less.* VI, 290
Rhynchpsidiujp DC. VI, *ibid.*
Rlynchospermum Reinw. V, 296
Rhynea DC. VI, t54
Rhytifbmthc Benth. — VI, 161, 6¹9
nirhrn Labill. VI, 15a
Rifian Allans. V, 575
RSencoirtlt Cass. ^ V, 503
Rigiopliylluv *Less.* ^HL . VI, 289
WobvTfaDc. W.VN, 6
Rohinsonia DC. VI, 213
Rnrrarrfia Week. VI, 345
Rochonia DC. V,
Rorii^ia |Sprent* VII, *ibid.*
RODIGEEJS DC. VII, 504
Rn'hri Vahl. / VI, 90
Rolandr Rattbel Lex. . . . VI, 34<>, 341
Roffinkin Zenk. V, 696
Rosalesia ^ V, i83

NOMINUM ET SYNONYMORUM COMPOSITABUM. 327

- Rosenia *Thunb.* VI, * a80^b Senecio *Lion*, et auct. VI, 3a5, 34<), 437.
 Rosilla *Less.* V, 668
 Roilua *Lam.* V, 668
 Rnthisia *Schreb.* VII, i5
 Ruckeria *DC.* VI, 483
 Rudbeckia 'Cass. V, 555
Itudbeckin Auct. V, 55/J, 558
 RUDBECKIE*: *Cas+* ... V, AgS , 554
 Rumfordia *DC.* .. V, 549 > VII, 289
 Rutidocarpaea *DC.* VI, 7a
 Rutidosis7^C. ! .. VI, i58
 Sabazia 'Cass. V, 496
 Salivaria *DC.* V, 6a4
 Salmea *DC.* V, 493
iSanhdana Leand. VII, a6
 Santolina *Linn.*.. VI, 355 VII, 096
 Santolinee Less. VI, 1
 Sanvitalia *Gualt.* V, 6a8
 Sarcanthrmuiu *Cass.* V, 367
 Sarreta *DC.* VI, 667
 Saussurca *DC.* VI, 531
 Saussurea *Cass.* VI, 543
 Scalcsia *Am.*....! VII, 308
 Scalia *Sims. DC.* VI, 16a
 Scariola *DC.* VII, 133
 Scepinia Neck. V, 356
 Scepinia *DC.* V, ibid.
 Schistovarplia Less. V, 608
 Scliostosteplium Less. VI, 70
 Schizogyne *Cass.* V, 47^
 Selikuhrria *Rnth.* V, 664
 Selikuhrria Moench., V, 49^
 Schlrchtemlalia Less. VII, a
 Srfdechtendaha Willd. V, 638
 Selimidta *Mccnch. DC.**... VII, 86
 Schomburghia *DC.* VII, 293
 Scterobasis. VI, 340, 3g2
 Sclerocarpus *Jticq.* V, 5(56
 Sclerolepis *Cass.* V, 114
 Sclernlepis Monn—qp... VII, 98
 Scolospermum Less. V, 60<>
 Scolrrnanthus Willd. VII, 63
 SCOLYMEJE Less. VII, 75
 Scolymus *Tourtu Lain.* . VII, ibid,
 Scn/j mus C&s. VII, ibid.
 Scofzonera *DC.* VII, 117
 Scorznnera ZA. VII, 110,117
 Scnrznnera TMS. VII, 117
 SCORZONEREA! Cass. Less.VII, 99
 Scoi-zonemidcsMcBnch.... VII, 100
 Scmhicaria *Cass.* VI. 34<>, 4?3
 Scytala. Mey. VII, 12
 Sebastiana Bertol. V, 630
 Selloa *H.* tt.K.....V, 612
 SKMIFLOSCULOSAE *Tourn.*.. V, 4
 SE MIFLOSCULOSJZ *Tourn.* VII, 74
 Sfinecillis *Gccrtm.* VI, 3i3
 Senecio *Less.** VI, 34W VII, 300
 Senecio Lion, et auct. VI, 3a5, 34<), 437.
 SENECTONEJE *Less.* V, 500.
 SENECLONEAE *Cass.* VI, 2g2
 SENECLONEJE Less. ..VI, ayu , 298
 SENEClpNIDEiE Less. V, .8,
 Senecimypus Dura. VI, 341
 Scrgilus G?ytn." V, 38.
 Sericocarpus JVcSs. V, a6r
 Sericophorus %DQ. VI, a 15
 Seridia Juss. *Cass. DC.* VI, 5>N
 Scridioides *DC.* VI, floo
 Serinia *Raf.* VII, 2 &
 Seriola *Linn.* VII, <5 , 307
 Senphida Less. VI, too
 Serqihidium *Bess.* VI, ibid.
 SKRIPHIK^E *DC.* V, Boo
 SFRIPHIEAE *DC.* VI, 25g
 Seriplium *Linn.* VI, a6i
 Seris *Less.* VII, in
 Jem Willd. VII, 35
 Serratlna *DC.* .. VI, 667 ; VII, 305
 Scyratula *Linn*, et auct. VI, 66a, 667, 673.
 SERRATULEAE *DC.* VI, ^ 450
 Shawia *Forst.* V, 78
 Sidcranthus *Fras.* V, 347
 Siebara (*ny. VI, 53i
 Siegesbeckia *Linn.* V, 49^
 Stlajrerus Labill. VI. i/9
 Sfl-PHFE^E Less. V? /|p8, 510
 Silplium *Linn.*.. V, 5n ; VII,
 SILYBEJIE Less. VI,, A50, 6X5
 Silybum *faitl.* VI, 616
 Simblocline *DC.* V, 397
 8imsi%i'erA. V, 577
 Siphnqyne *Cass.* VI, 147
 SIPHONIPHYTUM >feek. V, |
 Siplionisma *DC.* VII, a3
 Skirrhopborus *DC.* VI, t\$0
 Skirroglypliis *DC.* V, 533
 Sobrey m R. et P. V, 636
 ilobrya Pers. V, ibid,
 Sogalgina *Cass.* V, 678
 Sof;/dif>na Steud, V, ibid.
 Sotdevdla Lag. %.. VII, a58
 Solenogyne *Cass.* V, 367
 .Solenogy ne Cass. —VI, i47
 SOLENOGYLFE^S. V ' IIQ 365
 SOLIDAGINEAE *DC.*... V, *ia / 3Q8
 Sohdago *Linn.*.... V, 33o; VII, a79
 Sohva fl. et Pav. VI ^
 Sohi'cea Cftss. ! VI', ibid.
 Sommen Hory.V, 3
 Sommerfeltia *Less...!!..."* V*, 30a
 Sonchidium *DC.* VII, *fa
 Sonchus *Cass.*.... !". *. VII, 184
 Sonchus *Less.* VII, 18* , 18^
 Soyeria Moijn. VII, i65

- Spadactig Cass. DC.,.... VI, 550 'Stilpnopappus Mart.Y, 7S; VII, 365
 Spndnnia ^icess.. VII, 33 Stilpnopli)turn Less. VI, , cp
 Spadonisma DC. VII, 33 Stizolophui Cass. DC. VI, 574
 'SpaniopliloD Less. VI, 6 JI Stofcaca T/mnb. VI, 5^{<4}
 Spanotrichium Mey. DC. VI, 291 Stobrva Spreng. V, 71
 Sparganophoriiis Vaill.V, 11;VIL 263 Sloe be Linn. VI, a5g
 S'prta nf>plidms Miclix.... IV, 114 Stokesia L'Hcr. V, 71
 Spernphyll/a Neck. V, 681 Strahonia DC—*, V, 4^{8!}
 Spermoptera DC. VI, 368 Srreckera Schulu DC. VII, 100
 SPUJERkUTIIIVsJEDC. V, iia, 56 Strigia DC. V, ia6
 8)Ua>rant lioides Curin. V, Srobocalyx Blame. V, ai
 S|>I.rrantius Linn. V, 5a Strogiylorepis DC. VI, a83
 Siffluurocephitlus Lag. VII, 50 Sironpyloma DC. Til, 5a
 Spli.iTocigium DC. VI, 50 Strongylospuraa Less. VI, 8a
 Splic-vromorph^u DC. VI, 681 St'trophopappus DC. V, 75
 Splienogyne H. Br. V, 681 Slnu luim P. Br. V, 11.
 SPHENOGYNEJE/>£... V, 4^{cig} 581 Strlimnits Raf. V, 4^{&0}
 Sptlacrou Cass DC. VI, 5ao Stylinnus DC. V, ibul.
 Spilunlhes Jncq. V, 6a4 Stylolepis Lehm. DC. VI, x63
 Spi/anhe* Cass. V, 6ao StyloDCerns Sprung. VI, 149
 Spilnnthus Linn. V, 624 Stijmitfo Grerln. V, 128, 129
 Spilnnthus Purs. V, 624 Suprago DC. V, 129
 Spiracantlia If. B. K. V, 6go Swammenjamia DC. VI, 164
 Spira/epis Don. VI, 167 Swertia Ludw.... VII, 86
 Spilrfelia Sclmltz DC. VIJ, 30 Sympliyocli-neta DC. VI, 448
 Spifia Sell rank. V, 265 SYNANTHKilliE /;cA. V, 4
 Spongolrichum NGCS. V, 266 Sy/mltirum Cass. VI, 340, 3[<]
 Spongotrichum DC. V» 8\$ Syucarplia DC. VI, a13
 Stacliyanlus DC. V, 30a Synccepholum DC. VI, a8a
 Suvhelua Linn. VI, 5/j3, 30a Synccephalantha Jiartl. VII, a6a
 Stachelina DC. VI, 543 ; VII, 101 Synchocndron Bojer. V, 9a
 Slammarium Willd..... V, 50a Synrdrella Oartn. V, 629
 Staiuinarium DC. V, ibid. SYJNGENliSIAPOLYGAMIALwm.V, 4
 Starkea Willd. V, 96 TAGETFJE DCi. V, 499, 638
 Slarhia Juss. V, ibul. Taftales I Ann... .V, 64a ; VII, 392
 Stechmannia DC. VI, 343 TAGKTINEyE Cass. V, 499, 638
 Steiractis DC. V, 247 Tan ace turn Linn.l, 127; VII, 398
 Steirocoiu DC. VI, 306 Taraxacoides Vail). VII, 101
 Steirocoma DC. VII, 36, 74 Tftraxaconatrum Vail... VII, 79
 Stciroriiscus Less. VI, 38 Taraxacum IMI. *... VII, i,f>
 Stciroglossa Df. VI, 348 TARCHONANTHERLessM, a<3, 4_{2<}
 Steirottphilna DC. VI, 258 Tarchonanthus Linn. V, /J31
 Stemmacantlia Cass^ DC.... VI, 66a Taxostichc DC. VI, 196
 Stemmodontia Cass. V, 538 Tecmarsis DC. V, 63-
 Sten^ctis/e^5. V, 398 Clekia Baumg. .V, 485j VII, 287
 Stenactis Cass. V, a8i Tenorea Bert. VII, (18
 Stenocline DC. VI, ai7 Cephrodes DC. A ... V, 'l(1
 Stenoggne Cass. VI, 147 Tephroseris Rrich..^.... VI, 350
 StennlopliuM Cass. DC. VI, 672 Tessaria lielP. V, 456
 Stenoplyftum Less. . T. VII. (Ji, 317 Tetracnqnim MaMich. V, 65 |
 Stciiotheca Monn. Frcll. VII, 3f8 Tetradymia DC. VI, 4^{<0}
 StephnnantliUi Lebm. V, 4<7 Tetragnnnf licca Difl. V, 55a
 Stephanocoma Less____f. VI, 28* Telriimolopium Nrés. . A .. V, a6a
 Stephanopappu* Less. DC.. .. VI, 285 'J'etraAorph.Ta DC. VI, 609
 Stevia Cav. V, ii5 Tarantha Poit. V, 5o5
 Stictophylla DC. VI, 285 Telrantluifl -Wvrtrti.V, jp8; VII, 288
 Stiflia Mih. VJ1, 285 Tetraotis Blum. V, 6H7
 Stilpnogync DC. VI, a^{c>3} Teiibdus Cass. p.. . V, 666
 Stilpnoides DC. VI, g2

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Tetradu* DC. | V, <i>ibid</i> | <i>Tims Sw»^z</i> | V., 505 |
| Thainuataulia DC. | VI, 61 I | <i>TnxisP BilFwn</i> | . fc... V, 67, 3e6 |
| Thflcarpea DC. | VII, 37 | <i>TiopidoLpis</i> | J'ausch... .".V, a 16 |
| Thchspenna Less. | V, 633 | <i>Troximon Gantn.Nutt</i> | .VII, a5i |
| Tut 1) thamnos Less. | V, 683 | <i>Tubifera DC.</i> | .V, 386 |
| n>c>thamuo» DC. | V, 681 | <i>lulnhum Cass.</i> |V, <i>Hfio</i> |
| Iheodoiea Cars DC | VI, 336 | <i>Tubihum DC.</i> |V, <i>ibid</i> |
| IheroeiMon DC. | V, 483 | <i>Tulodibcus DC.</i> |VI, aq6 |
| rhcspis DC | .V, 375, VJI, 48i | <i>Turczaninovia DC</i> | V, 25;, VII, 303 |
| llic euotia DC. | VI, 551 | <i>luipima Lallav.</i> |V, 7, |
| Thnuaisn Vent. | V, 318 | <i>Twipima H B R.</i> |VII, 4 |
| Hi! incia Roth. | VII, 99 | <i>luisenii Ca9S.</i> |V, 398 |
| 'Thymophylla Lag. | V, 627 | <i>TUSSILAOINFAE Less.</i> | , .V, 103, 204 |
| 111 si 1 Mey | V, 54Q | <i>'IWilago 7num. CUSA</i> | .. V, 208 |
| filhonia Desj. | V, 5>4 | <i>Twufafro Linn.</i> |V, a04, 208 |
| Tolpib Biv. | VII, 85 | 7//w//ii'jo. |VJI, 40, 41, 4a |
| Zal, is Adans. | VII, 80 | <i>TyllnmaDon....*</i> |W, 3a |
| Tomilhe DC. | VJ, 564 | <i>Tyiminus Cass.</i> |y. VI, 617 |
| Townsi ndia llooh.. | ...VII, a7a | <i>Tcuoa Cass.</i> |V, 4j ^a |
| 'Irachodeh Don .. | VII, 191 | <i>Utacmi Ad ins.</i> |V, 629 |
| Iracliyarpifi DC | VI, 438 | <i>Upxia Linn J.</i> |V, sot |
| /ia<ant us Wall | V, 1-6 | <i>Unim Kunlh.</i> |VI, 75 |
| 'Tragoceras Lest | ...V, 533 | <i>Uralipjk DC.</i> |VI, >63 |
| 'Tia^ocens H B K |V, <i>ibid</i> . | <i>Urolepis DC.</i> |V, i36 |
| Trahopogon font i... | ...VII, 8a | <i>Uiopsprniiim tblop.</i> |VII, 116 |
| 1 ma<ap qnn Linu. | VII, 8a, | <i>Ursiuia (tceitn.</i> |V, 688 |
| Tra. angoraunders Va.ll. | VJI, 116 | <i>Uiinia Auct.</i> |Vf 681, 689 |
| Ti dtteint km Ten. | V, 680 | <i>YamilloBma Less.</i> |V, 18 |
| 'Inachne Cnss. | VII, 50 | <i>Vargasia DC.</i> | .., V, 676, VII, 308 |
| Tnanthoea DC. | V, a3 | <i>Vaihemia DC.</i> | *.V, 4, 3 |
| Tnn pit ilum DC | VI, 217 | <i>Vceneçasia DC.</i> |VI, 43 |
| Trie hoc line Cats. | VII, ao | <i>Venidium Less.</i> |VI, /J9 ¹ |
| Tm Jicoma DC. | VI, 507 | <i>Vrrbesina Less.</i> | V, 612, VII, 291 |
| JtliiOfILJllS Vfc | VII, 17y | <i>Verbesmaita DC.</i> |V, 612 |
| In chodes DC. | VI, 507 | <i>VmittSINEAE less</i> | .. V, 4q8, 607 |
| TnchogoniaZ?6 | V, 4*6 | <i>Vermifuga B et Pny..</i> | V, |
| 'J ric ho<yne /fss VI, a6^, VII, | aq< | <i>Veinonia <Schreb</i> | , V, i5, VII, a63 |
| 1 nrholip» DC. | .. «.. \I, | <i>Veinrtma Less.</i> |V, 14, 74 |
| 71 uhophyHum ^utt | V, 656 | <i>VfRNO!IAChJL£*M</i> |V, 8, 9 |
| 'Jnthospa mum Heauv. | V, 5Jr | <i>V>RN(>NII A. Cass.</i> |V, g |
| Tn< hospira H B K.^.. | V, 90 | <i>VfcRNONII'A DC.</i> |V, 10 |
| JTuhostemrnaCtM. | V, 538 | <i>Vernonioides DC.</i> |VII, 24 |
| 'fnclinttphium Cass. | V, 540 | <i>Virutina Cass DC.</i> |VI, • 5ga |
| Tndax Linn | v *^J, 079 | <i>Vicoa Cass.</i> |V, 47<1 |
| rngonosptinuim Less. | V, 501 | <i>Vipiuera hi. B J(.</i> |V, 578 |
| lihsa Cass » | .. V, 128, 131 | <i>Fi, uutia Less.</i> |V, Uffd |
| Trilisa DC. | ... V, 131 | <i>Vittanova Oi I.</i> |V, 531 |
| 'Jrunci a nthes £,&&. | V, | <i>Villanova L<^.</i> |VI, -5 |
| Tniuerjiithes Bt | V, <i>ibid</i> | <i>Vdlaiui Guelt.</i> |VI, Ra |
| Trimelia Voc. | VII, i6a | <i>Funyn Gaudich.</i> |VI, 1^9, 160 |
| Tnmorplaja DC. | V, 190 | <i>Firea Adans bcop.</i> |Vlf, 10c |
| Tnnim pliau Cass. | V, <i>ibid</i> | <i>virea Vahl DC.</i> |VII, i3a |
| TriplocarpTPt DC. | VI, 73 | <i>J. lihsa-autea Tourn.</i> |V, 330 |
| Triplouiitron Cass. DC |VI, 5(>i | <i>Virginea DC.</i> |V, <i>ibid</i> . |
| Tii polii.miVt«^V,a53, VII, | 27a | <i>Fit,dm L'IWr..:</i> |V, 65i |
| J upteiis Less. | VJ, 456 | <i>Vitladima Rich.</i> |V, 2S0 |
| TupiiUon R.clPav.. | VII, 50 | <i>Fii'ama W4lld.</i> |V, <'> |
| TIU ID?AE Cass. | VII, 54 | <i>Vongia Roth nr.</i> |VII, 245 |
| Irmdium DC | -V, | | |

330 INDEX GENERALIS NOMUVUM ET SYNOW YMORUM, etc.

- | | | | |
|---|------------|---|--------------|
| <i>J/oiglia</i> Spreng.....VII, | 4 | XERANTHEMÆ DC. ..VI | 450, 528 |
| <i>falulaitUa</i> Cas^.... .^1, | 558, | <i>XeranLhemium</i> <i>To' urn.</i> ..VI, | 518 |
| <i>Volutaria</i> <i>Cats.</i> DC.....VI, | 55cj | <i>Xeranthemum</i> Neck ..VI, | 214 |
| <i>f^osacan</i> Adans.....V, | 5H5 | <i>Xeranlhcmum</i> <i>Lino</i> ...VI, | 214, 528 |
| <i>Jfahlenhergia</i> Schum....V, | 497 | <i>Xerobius</i> Cass.VI, | |
| <i>Webbia</i> DC.....V, | 73 ; VII, | <i>Xernlepis</i> Less.V, | 607 |
| <i>WecU-lia</i> <i>Jncq.</i> ... V, | 538 ; VII, | <i>Xerolepis</i> DC.....V, | <i>ibid.</i> |
| <i>trcdelia</i> Auct.....V, | 545, | <i>Xeroloma</i> <i>Cass.</i> DC..VI, | 529 |
| <i>Werneria</i> Kunth.....VI, | 3a3 | <i>Xempappus</i> Wall ..VII, | 3fi |
| <i>IVibctia</i> RCEIII.....*. | VII, | <i>Xerothamnus</i> DC., **.....V, | 3n |
| <i>Wibor#ia</i> Roth.....V, | 677 | <i>Xerotiurn</i> HI. c£ I]. ..VI, | u 8 |
| <i>fFiekitncmia</i> Spreng.....V, | 140 | <i>Ximenesia</i> Cav... V, | 376\$ VII, |
| <i>tfttiirulia</i> Neck.....VI, | 267 | <i>Xumnesia</i> Less.V, | <i>ibid.</i> |
| <i>IKdtlenovsa</i> Cav.....V, | 638 | Youngia <i>Cass.</i>VII, | ig? |
| <i>Willemelia</i> Neck.....VII, | 150 | Zacinlha <i>Tourn.</i>VII, | 177 |
| <i>Wollastonia</i> DC;.....V, | 546 | Zaluzania <i>Pers.</i>V, | 553 |
| <i>Woorviflea</i> DC.....V, | 318 | Zarabellia DC.....V, | <i>ibid.</i> |
| <i>WulUa</i> mck.....V, | 563 | Zurabelha <i>Cass.</i>V, | 51g |
| <i>Xanthioideg</i> DC.....V, | 5ii | Znrbnbellia Neck ..VI, | 50 |
| <i>Xanthiama</i> DC.....V, | 94 | Zexmenia <i>Lallav.</i>V, | 610 |
| <i>Xanthium</i> Linn.....V, | 522 | Zeyhera <i>Spreng.</i>^V, | 183 |
| <i>Xanthocephaluin</i> <i>Wdltl.</i> ..VI | 43 | Zinnia <i>Linn.</i>TV, | 534 |
| <i>Xanthocoma</i> //, H. K.V, | 310 | Zccgea <i>Linn.</i>VI, | 562 |
| <i>Xantho/epis</i> Willd.....V, | 97 | Zollikoferia >C.VII, | <&J, 4P7 |
| <i>Xautliopam</i> DC.....VI, | 55i | ZoUiknfcrta N^es.VII, | 150 |
| <i>Xenismia</i> DC.....V, | 509 | Zyprhehs <i>NtSes.</i>V, | 317, |
| <i>Xenocarpus</i> Cass.....VI, | 305 | Zyplielit DC.....V, | J18 |

FINIB INDICIS СОХРОЫТАИИМ.

**PRODROMUS
SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS.**

PARS VII:

SECTIO POSTERIOR.

VjJLirouvc aux mimes adresses.

- DE CAWDOLLE. — *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis; in-8. Tomi I, II, III, IV, V, VI, et VII pars prima*, 1824 à 1838. 105 fr.
- Collection de Mémoires pour servir à l'Histoire du règne végétal, et plus spécialement pour servir de complément à quelques parties du *Prodromus*.
- Premier Mémoire : sur la faraille des *Milastomacées*; in-4- avec 10 Planches. 1828. * 10 fr.
- Second Mémoire : sur la famille des *Crassulacées*; in-4. avec 13 PI. 1828. 10 fr.
- Troisième et quatrième Mémoires : sur la famille des *Onagraires* et des *Paronichies*; in-4. avec 9 Planches. 1829. 8 fr.
- Cinquième Mémoire : sur la famille des *Ombellifères*; [nrl]. avec 19 PI. 1829. 15 fr.
- Sixième Mémoire : sur la famille des *Loranthacees*; in-4. avec 1 a PI. 1830. 10 fr.
- Septième Mémoire : sur la famille des *Valirianées*; in-4. avec 4 PL 1831. 5 fr.
- Huitième Mémoire : sur la faraille des *Cacties*; in-4. avec 10 PL 1831. 10 fr.
- Neuvième Mémoire : sur la famille des *Composées*; in-4- avec 19 PI. 1837. 15 fr.
- Dixième Mémoire : — L'écine[nic] famille ; in-4* avec 4 tableaux. 1838... 5 fr.
- Le auuiir n'ayant pu , ni dandff *Prodromus*, ni dans SOD *Cours de Botanique*. donner sur certains points de la science iqsvéveloppement qui lui paraissent nécessaires pour fixer J'attendent des Lanistes, .1 cru devoir publier séparément une se're de Me'moires servant d'eclaircissement aux deux ouvrage[s], et dont dix forment un volume, accompagné's de planches. CM Memoires peu vent done (Hrc considered comme le *Comment aim du Prodromus*.
Chaque MAmoire se vend se'paftimunt. *
- *Itēgni vegetabilis Systema naturale, sive Ordines, Genera et Species Plantarum secundum methodi naturalis normas digestarum et descriptarum.* Volumen 1 : *Sis tens Prolegomena et Ordines quinque, nempe Ranunculaceas, Dilleniaceas, Magnoliaceas, Anonaceas et Menispenneas;* in-8. de 568 p. 1818. 12 fr.
- Volumen II : *Sistens Ordines sex, nempe JiOrberidas, Podophyllas, Npnphaceas, Papaveraceas, Fumariaceas et Crudferas;* in-8. de ^50 pages. 182 x. 15 fr.
- *Astragalologia, nempe Astragali, Biserrula et Oxytropidis Historia;* cum So tab. eneis; 1 vol. petit in-folio. 1802. 54 fr.
- Le ratme ouvrage, grand in-folio, papier vélin super/in doable. 56 fr.
- JAUME SAINT-HITTE. — *Exposition des Familles naturelles et de la Germination des Plantes;* 4 vol. gr. in-8. avec 117 planches en noir. t805. 36 fr.
- Le même ouvrage, 2 vol. in-*4. Planches en couleur, papier ordinaire.. 96 fr.
- HUMBOLDT (A.) et BOILPLAND. — *Plantes' equinoxiales recueillies an Mexique, aux Andes de la Nouvelle-Grenade et au Pérou;* par MM. de Humboldt et Bon-planri, avec leur description; 17 livraisons formant 2 vol. in-folio, avec 144 PI. (Ouvrage com pie t). 500 fr.
- HOOKER F.J.) et GREVILLE (R. K.). — *Icōnes filicum : ad easpotissimum Species illustrandas delineator, qua: hactenus vel in herbariis delituerunt prorsus incognita, Del saltern riondium per icōnes botanicis innotuerunt; cum tabulis aneis.* Le terte en latiu, avec 240 planches; 2 vol. in-fol. Londres, 173 r. (Ouvrage complet.) Les planches en noir. 360 fr.
- Le même ouvrage, les planches en coulcar. * <...> 600 fi.
- WALLICH (N.), surintendant da Jardin hotanique de Calcutta. — *Plantæ Asiaticæ rarores, on Descriptions et figures d'un choix de Plantes inédites de l'Inde orientate;* 3 vol. in-fol. avec 300 planches très-soigneusement coloriées; le texte en laugue latine. Londres, 1830 à x832. (Ouvrage cnpnplet). 900 fr.
- BLOM et HIRSCHFELD. *Compendium floræ Germaniae : Sectio I. Plantæ Phanerogamicæ*, ed. 2^e aucta; 2 parties in-12. Norimbergæ, 1836 à 1838.... 20 fr.
- *Idem, Sectio II. Plantæ Cryptogamicæ*; 2 parties in-12. 1831 à 1833.. 20 fr.

PRODROMUS
SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS,
SIVE
ENUMERATIO CONTRACTA
ORDINUM, GENERUM, SPECIERUMQUE PLANTARUM
et USQUE COGNITORUM, JUXTA B.F.THOM NATUBAM5 NORMAL

DIGF^TA ;

AUCTORE AUG. PYRAMO DE CANDOIXE.

PARS SEPTIMA:

SECTIO POSTERIOR

Sistema iilimos Calyciflorarum ordinos.

PARJSIIS,

Sumptibus Socioruni TREUTTEL ET WÜRTE,
•i£ dicta de Lille, n° 17.

VEH1TQUE IW EORUMDEM BIBHOPOLIO",

ARGENTORATI.

M; DCCC. xxxix.

PRODROMUS

SYSTEMATIS UNIYERSALIS

REGNI VEGETABILIS.

PARS SEPTIMA, SECTIO POSTERIOR.

Ordo CILI. STYLIDIE^L Juss. ann. mus. 18. /?. 7, dict. sc. not. 5i./7. 177. — Stylineae ft. Brown prod. 565. gen. rem. p. 29. iUstr. t. 5. BartL ord. nat, 148. D. Don gen. sjrst. 3./?. 719. Endl gen. p. 519. — Stylidiaceae Lindl. nat. syst. ed. i.p. a4o.

Calycis tubus ovario adnatus, limbus 2-5-partitus, lobis ssepiis in labia 2 dispositis per aestivationem imbricatis. Corolla gamopetala, 5-6-loba, tardè decidua, saepissimè irregularis, lobis per aestiv. imbricatis, tubo brevissimo. Stam. 2, (Ham. in columnam cum stylo concretam coahitis, antberis didymis simplicibusve stigmati incumbentibus polline globoso rariis angulato f'cetis. Ovarium biloculare aut septo abbreviato subuniloculare, po 1 y sperm urn, glandule anticâ 1 aut 2 oppositissaepiuscoronatum. Stylus 1 intrà columnam staminum concretus. Stigma indivisum seu bifid urn. Capsula bivalvis bilocularis, ab apice ad basin dehiscens, septo parallelo nunc abbreviato vel demum marginibus valvularum inflexis soluto subunilocularis. Placeniae subtumidaa utrinquè niedio septo longitudinaliter adnatoc. Semina parva ovata interdiim siipitellata. Albumen carnosum suboleosum seminiconforme. Embryo inclusus minutus. — Herbae (vel suffrutes) Australasicæ seu rariis Asiaticæ, caulescentes seu scaposæ. Folia ideo caulina sparsa aut radicalia conferta, linearia indivisa. Pili, ubi adsunt, saepiis apice glandulosi. Flores in racemum (rariis spicam seu corymbum) disposili. Pedicelli ssepiis 3-bracteati. Columna genitalium notabiliter sed vario gradu irritabilis! — Ordo à cl. Brown egregiè constitutus ad Goodenovieas Campanulaceasve accedit. Confer de organorum floralium dignitate el structurâ, praeter auctores suprà citatos,

Rich, in Juss. ann. nms. 18. p. 7. Labill. ann. mus. 6*. p. 4*4-Salisb. parad. 1. n. 77, interse variè dissentientes.

I. STTLIDIUM *Swartzmag. nat. ges. Berl. 1807./**. 47. e. 1 et 2. *Willd. I. c. p. 53. et sp. pi. 4. p. 146. Labi/I. specun a p. 63. / ax 3-217. &t Brown II. cc. non Lour. (1) — "Ventenalia Smith exot hot. a. (1805)/>. 13. t 66 ^ 67. no/i Beauv. nee Cav. nee Keel — Caudollea Lab ill. ann. mus 6 (x805) p. x54. t. 63 et 64. v. 7. />. 400. /101 £a6t// J/ttc. nee Mirb. nee Bast. nec Raddi.— Stiledium Andr.*

Calycis limbus bilabiatus. Cor. irregularis 5-fida, lacim'4 quint4 (labeflo) dissimili minore saepiis dcflexà, reliquis patentibus mterdùm geminatim cohaerentibus. Columna genitalium rechnala dupli flexura¹. Anthers bilobae lobis divancatissimis. Stigma obtusum indivisum. Capsula bilocularis septo supernè interdiim incompleto. — Herbae aut sufTruticuli. Folia aut radicalia rosulata aut secus caulem spars a, interdiim basi attenuata. Pili suepiis apice glandulosi.

Sect 1. TOLYPANGIUM *EndL gen. p. 620.—Styliidii sect. Ventenatia U. Don gen. syst. 3. p. 179. — Stylium §. 1. Brown I. c.*

Capsalae ventricosae subovatae sphyriceae ant oblongae nee lineares.

* *Herbar scaposee Squama scariosa ad colhim. Folia radicaha basi attenuata. Flores racemosi. Calycis labium exterius a-, inlerius Z-partitutn.*

1. S. CARZioscfc (Benth. en am pi Hngel) p. 71), scapo elato giabro vel apice glanduloso-pubescente, folns peiolatis suhorbiciilatis carnosis glabra squaraU scariOAis interstiDctia, racemo bubsuplici, calycis Rlanduloso pubeicentis labiis parHlis. 7f in No\á Hollandia ad Regis Grorgii sinam. Petoli sesqtnpollic. Limbos fol. circ. pollicaris. Scapus a-j-pedalis. Cor. lilacinae. (v. s. ex col). (Drammond.)

a. S. riLosuM (Labill. Nov. Holl. a. p. 63. t. ai3), scapo glanduloso-pubescente sobramoso, folus planis eloagatis lanceolato-ensiformibus. If, in Nová Hollandia ad proin. Van Leuwin (Labill), ad Swan-Kivei (Hugel) S. longifoliam Rich, in Pers. encb 2. p. 310 Heiba sesquipedalis. Floies paniculato-racemosi pallide itibescentes (Don). Sea pi Labill. ct mibi pilo&issimi vix gland aloj»i, ex Br. pubescentes. (v. s. in h Deless et ex coll Dmtnm.)

3. S. REDUPLICATUM (Brown 1 c. p 5G8), scapo vilhs arutis (eglandulosis) birto, racexno subramoso, folns angasto-ensiformibus reduplicatis extus squainis lationbus. If in Novae Hollaudiae orå mend. Scapi semipedales pedalesve. Flores rubii aut carnei (Don.)

4. S. HIRSUTUM (Biown 1. c. p. 558), ncapo villis acntis (eglandulosis) sparsis hirsnto, race mo &ubsimplin fob is liuearibos marline parum rccuivu,, sqna- mis folia disUngorntibus interioribns acuminatis. % m NOJC Hollandiac orå merid. (Br), ad Poit Jackson (h Mus Par.';, Grah. new Edinb phil. journ. i83i. deceiub. Hook. hot. mag. t. J194. Scapus 9-pollic. Folia 6-pollic. Ra- cemas conferlas polhceui longas. Cor. roseo-purpuieae. Labellam minntum. (v. a in h. mas. reg. Par.)

•• *Herba? scaposee, folns radicahbus confertis, squainis nullis interstinctis |foliis caulinis nullis Calycis labium ext. 2-, int i-dentatum.*

5. S. DMBELLATUM (Labill. sp. N. Holl. 2. p. 66. t. 217), scapo suprà pilosius.

(1) Stncto jure genus Loureinanum i5 annos Swarziano antiquius et optimum oomen suum servasbe debuisset, sed nolui, contra usuro generalem et ad nomenmeum findicandura , litem inovere.

- cnlo pilis apice glaadulosis, raceruis subspicatis in nmbellam bast mvolucratam disposals, foil is lineaibus % in msilà "Van-Diem en CaDollea umbellata Labill. ana mas 6. p 456 Styl polystachiuin Rich, in Peis enh. a. p aio.
6. S ARMERRIA (Labill.' Nov. Holl. 1 p 66 t. 216), scapo basi glabro apicc inter floras glanduloso-piloso, lacemo sobspicato simplici, foliis linear-ensifounibas margine suhrecurvis iutegenimis glabns. % in insula 'Van Diemen Candollea armeria Labill ! ann mus 6. p. 455. Cal. dentes obtnsi. Labellum ex Labill inappendiculatum. Squamae seu folia aboitiva niter folia subpatentia. Scapu* fructifer foliis mullo longioi (v. s.)
7. S MKLSTACHYS (Biown I c. p 568), scapo pilosiascolo, spicà simplici glanduloso-piloMssunJ, iloribus imbncatis subset 11 bus, foliis lineaibus margine subiecurvis laevibus. If in msula Van-Dieuen A prascedente foi&an ex cl auct ipso non di versa? Labellum appendiculatum 'J'
8. S. GRAMifiFonuM (Swai tz 1. c p. 49 t '. F i), scapo a pice prauertim inter floies glanduloso-piloso, lacemo simplici subspirato, foliis*lineaibus ligidulis plus minus maigine dcuticulalis glabris % in insulà Van-Diciuen et in Nova Uollandij oriental! et meidionali (h mus Pai ') Willd sp 4 p 146. Labill. Nov. Holl 2. p 65 t. 2i5. Biown.piod 568. Sims bot mag. t 1918. Caudollea serrulata Labill.! ann. mns 6 p 4>4 t 64 f. a Ventenatia major Smith exot. bot a. p 1i. t 66 S. hucare Sieb' il. Nov. Holl. CXMIC n° ^5i. Styledium giainiuifoham Andr. bot lep. t 658 S. serrulatura Pers enh. a. p aio I olia variant a a ad 8 poll, longit., maigine num feie lovia nnnc V,plus minus sen ulato-scabra. C01. violaceo-purpuie.e, labello basi appendicula to. (v.s.)
9. S unEARk (Swartz 1 c p 50 t. 1 f 2), scapo glabro filiforrai, mcemo simpliri, pedicelliik ovaiia subacquantibus, foliis compiesso-filifotmibus margine denticulatis scapo multù bre\ionbus If, in Nova liollandia ad Port Jackson. Willd sp 4. p. 146. mag. nat. cur 1807. p. 5J Biown prod 568. Veutenatia minor Smith exot bot. 2 p. i5. t. O7. Folia pollic sesquipolhcemve longa fere obtusa. Cor. violaceo-parpureae, labello basi appendiculato. (v. s. IU b. Deless et raus leg. Pai.)
10. S SETACFUM (Labill Nov Holl. a. p. 65), scapo glabeirimo, racemo sjinplici sabspicato, foliis tetaceis mucronulatis, capsuhs clavato-oblongis. If iu Novx* Hollandiae prom. Van-Leuwin. Labellum inappendiciatum.
- * " * *Herbai sea poser, foliis scapi nulhs *vel mmonbus spar sis (nee 'verticdlatis) radicibus confer Us esquamatis, calycis lab mm ext. bi-, inter S-pat Mum,*
- zi. S SPINULOSCM (Kiownprod 5|Q), foliis linearibus mucionatis basi attenuatis margine spiuulosis , srapo plantulos-pnbescnte, lacemo simplici iaio iobcoiyboso, fauce coronatà, labello iuappcudiculato If in Nova: Hollandia? ora meridionali
- ia. S. C^SPITOSUM (Brown prod. 669), foliis lineaibus glabris setaceo-mucronatis mnrgine Integernmis, racemo saepe diviso, rarhi sc.ipoque glahris % fauce nuda, labello inappendiculato. If in Nov-c Hollandiae 01 à meudionali
13. S. PIIPFRUM (Krovvn 1 c), foliis linean-lanceolatis glabiis pilifeiis margine inlegernrais, laremo simplici, lathi pnbescntc, scapo glabio, fauoe nuda, labello inappendiculato. if m Novae Holl. orA meiid. (Bi), ad Swan-Rivei (Dromni'j (v s)
14. S ASSIMILL (Biown 1 c), foliis angusto-<<>>palhulatis glabiis crassinsculis mar- gine integeriinis, racemo parum diviso, lachi scapoqne pubescentibns, fauce nndà, labello appendiculato. % in Nova; Hollandiae orà mend. (Br), Jd Swan-Kiver (Hug.).
- i5. S. SPATHULATUM (Brown 1 c.)» foliU spathnlatis atrinque glanduloso-pubes- centibus margine mtegerrimis, raceino raultifloro scapoqne glabris, fauce co- ronatà, labello appendiculato If in Nova; Holl orà meridionali (Br), ad Regis Georgii sinnin (Hag)
- p.* *Urvillei, foliis oblongo-spathnlalis acntu , srapo palmari basi piloso. —*

In Nova" Zeelandiâ loco die to *Bate de Tasman* S &pathulatum Rich et Less voy. Astrol p. 229

16. S. GLAUCUM (Labill. Nov Holl 1 p. G4 t 114), foil Is radicalibns lanreolato-spathulatis integernmis subacunuinatis subtus pallidis, scapis plurimis glabru folia paaca oblongo-lineaia gerentibas, race mi paociflori pedicellis elongatis, fauce nudâ, labello exappendiculato. *If* in Novae Holl. promont. Van-Lenwiu (Labill.). Candollea glauca Labill. aon. mus. 6 p. 454 Scapi ex ic. Bill. 4-4-polI , in specim herb mus Par. 8-10 poll. (v. s. in h. mas. Par)
- /2 ? *Browni*, foliis utnnqae glaudulos-pubescentibus, racemo subcorymboso pancifloro. — In No*ae Holland, orâ meiid. S glancam Bruwn prod. 569.
- y. *subverticillatum*, foliis canlinis in verhcillum tiiphyllnm dispo&itis, caeteris paucis aparsis. — In Novae Hollandiac orâ oorientali. Ad divis. sequent. vergit¹ (v. s. exitin. Band.)
17. S. ERIORHIZUM (Brown prod 56Q), foliis spatbulatis setaceo-mnchronatis utnnquè in paginis glabus, marginibus tonentosis, <ollo lanato incrassjto, racemo sabpanicnlato acapoque giandulos-pnbc&cenle, fuuee nudâ labellu appendiculato. *If* in Novâ Hullandia tropicâ.
18. S. FLOAIDUMDUM (Brown 1 c), folus oblongis nndiqae glabns ad margines integernmis, scapis numerosis paniculatii lanatis villij* arcitis (eglandulosis), fance nndâ, labello appendiculalo. *If* in Novâ Hollandiâ tropicâ
19. S. JUINCEUM (Biown I c), folus radlcahbin liueanbus, scapi glabri minutia distantibus bractLisque uideo adnatis, calycis lobis &ubulatJ_s fauce giandolis stipitalis coronal., labello inappendiculalo *If* in Novâ Hollandiâ mend. (Br.), ad Swan-River (Hag). (v s. ex coll Drumm)
50. S VIOOLACEUM (Brown prod. 56q), folut* radicalibns angasto-lanceolatis, scapi glaberrimi par vis adpiessis bracteisque sessilibus, racemo stmplici, calycis tubo parco glandulos-pilosu lobis basi gibbis, fauce coronatâ, labello inappendicnlato. % in Novae Holland. 01 à mend. Bauei Illusti. t. 5. opt. C01. violacea. Scapus pedabs. Folia 3-pollic
- * • *Foliis scapi i>el caults verticillaeis, calycis labio exter. bi-, inter* 3-partito.*
- ai. S. LUTEUM (Brown prod. 570), scapo inarticulato glabro, foliis radicalibns linearibus, cauhnisi aferiorib& in veiticillum 1-3 dispobitis, c^etcris sparsis remotifl calycis lobis basi gibbosiusctilis, fauce coronatâ, labello inappendiculato. "If in Novae Hollandiae 01 à mend. Cor. ilavx.
- II. S. AMOENUM (Biown 1 c), scapo inarticulato glabro, foliis radicalibns spathulatis acumiuatis, caulinis supia medium in verticillam nnicum dispositis, snperioribus nllis, fauce coronatâ, labello inappendiculato. *If* in Novae Holla udiae orâ mend. (Br.) ad Swan-River (Druuim.I). Cor. palhdè rubrae. Scapi fere sesquipedales (v. s.)
- a3. S. ARTICULATCM (Brownl. c), scapo articulis duobus verticillato-foliatis, foliis radicahbus lanceolatis coriaceis, labello appendiculato. *If* in Novas Hollandiae orâ merid. Planta semipedalis? ex Don.
34. S. BRUNOWIANUM (Benth. in Hug ennm. p. 7a), scapo arliculis 2-4 verticillato-fobatis, foliis radicalibus hneari-lanceolatis basi attenuatæ, racemo laxo, calyce aqualiter 5-partito lobis obtusis, corollas fauce coronatâ, labello appendiculato. *If* in Novâ Hollandiâ ad Swan-River Scapi semi ad sesquipedales. (v. s. ex coll. Drumm.)
- a5. S. DivKRSiFonuM (Brown prod. 570), scapo stneto inarticulato, verticillis 3-4 foliosis filiformibos, foliis radicalibus lanceolatis, fauce coronatâ, labello appendiculato. *If* in Novae Hollandiae orâ mendionali. (v. s. ex coll. Drumm)
- a6. S. SCAHDBHS (Brown 1. o), cani e scan dente glabro, folus fasciculato-verticillati» lineanbns apice spiraliter cirrhosis, racemi pedicellis elongatis, fauce coronatâ, labello appendiculato, cor. lobis serratis, columnâ snperne pubescente. *If* in Novae Hollandi ora mer. Giabam in new Edinb. pbil jonrn i83x dec. et in bot mag t. 3i36. Cor. violaceae.

***** *Caule suffiutlcoso ,ohis spams crebns*

- 37 S. FRUTICOSUM (Brown prod 570), caule &nfrrnticoso glabro, folus angasto-hnearibus snbdecarrentibos mncrone acatis glabris confertis, racemo piloso glandnlo*o sabpanicalato, fauce seraicoronatâ, labello appendiculato *k* in Novae Hollandiae orâ mend Reicheub mag. t. ig Styl. glandulosnm Sulisb pirad. Lond t 77 Lois herb amat t. a5o Suffi utex pedali&. Cor roseo-pur purascentes. Glandulaa duae flavdc c toro ortx ad basin coluinnae ex Salisb (v v. c)
- 28 S TARIRIPOLiuM (Rich in Pers encb a. p 210), caule auffrnticoso pabenlo, fohis angaslo-hnearibas bensilibas confeitis acutiusculis glabunscolis, racheiuo paberulo-glandaloso subpanicalato , fauce nudâ , lAbello appendicnlato. j in Nova Uollaadiu ad Port Jackson. S tenuifolium Brown prod. 570 Sims hot mag t. 2249 ^{1>oir} diet, snpll 5 p. 4ri. Sieb¹ fl No\ Holl exs. n. 17a Link et Otto abbild. p 5g. t. 2b S. 1 a nti folium Jass ann mas. 18. p 19 t. 3 Hook txot. fl. t. 33. Lindl. bot. reg t 55o Corol pallide roseo-purpuras centes. (v. s sp)

• • «•» yw£o corolla! brevissuno, labello porrccto.

- 39 S. CAirARvruM (Brown prod 570), pusillnm , canle paacifloro , foliis ovalibus, f.mce nud&, lobis cor. sobdentatis, labello mappendiculato *If.* in NOVJB Hollandise orâ.mend (Br), ad poitum Regis Georgii (Less '), ad Swan-Rivei (Hugel) (v s in b. Dcless)
30. S. STriTATUM (Benth in Hngel ennra 7a), canle pnsillo erecto apice giandn-losso pubescent e, foliis petiolatis ovalibus paucis, pedicelli^ ad a pice m canlis approxiniatis, rapsulâ globosâ, cal. limbo 5-partito, cor. lobis stipitatis, a oblon-pis basi angustatis, a ovatis basi hastato-cordatis. — In Novâ Hollandil ad Swan-River.

Sect. ii. NITRANGIUM *Eidl, gen. p. 5ao.* — Slyhdium §. 2.
Brown 1. c. — Anderson ia / . G. Kaenig mss. net alior, — Styli-
dii sect. Andersonia *D. Don I. c.*

Capsulae graciles lineares vel linear-lanceolatae.

* *Herbas scapifonncs, Joins radicahbus rosulatis % caul mis nulhs aut paucis alterms, fionbus spicatis vel corymbosis rarb subsolitarns.*

31. S^ciyixARE (Brown prod 670), stapo capillau 1-1 floro, foliis ladicalihas ovalibna, calyce glabro acntissimo, limbo 3-partito, lacinia me^dia bifida, fa nee coronatâ, labello jna]>pendiculato % in NovA Mollandia *tropical 1 Herba i-a-pollic.
- 32 S. TENERUM (Spreug syst 3 p 74^)» scipo capillari, spicâ pauciflorâ, foliis radicalibns snbrotundis, calycis 1 ibus paititis glaudalosis, lunbi [acinus dnabns niajonbus semibifldis, iaucc nudâ, labello inippndiculato. *If* in Now Hollandia tropicab. Herba 3-poll ex Don S. tenellum Brown prod. 571 non **wartz.**
33. S ROTtmniFOTiuM (Brown 1 c)_t scapo capillari i-/-,floro, foliis radicalibos snbrohindis, clycicis labiis indivisis, laciniU 4 limbi snbxqualibns, fauce nuda % in Nuv£ Holfandiatopicali Herba 3-G-pollic ex Don 1 c .
- 34 S. TRASSIFOIUM (Brown 1 c), scipo teieti, spicâ raccmosa elongatA , foliis radicalibus elongato-ldfccfolalii. % in Novaj Hollandiae orâ meridionali. Herba i-2-pedalis
35. S CORYMBOSDM (Brown 1 c), scapo teieti corymbifero, foliis ladiralibns linearibas, mncrone setareo, calycis labns partitis '% in INovae Hollands 01A meridional! (Bi.), ad Swim-River (Hugel) Heiba ex Br a-3-pollic Fanx tor. nnda et labellum exappendiculatum ex Benth. in Hugel en urn. p. 7a. Scapus folia paice oblonga obtusa gereni.
- 36 S. KUNTHII (Wall 'cat n. ^769), scapis plnnnn\ snbnndis c>moso-corym-
bosisy floiib.!> se&silibus pansi& spicatis in dichotomiib scssihbus, foliis pau!6

suprà inediam rosulatis subrotundis petiolintis, calycis labio alio sub-3-dentato, a hero bifido. *If? n* Silhet India? oriental!* legit cl. Wallich! Herba 3-pollicaris, ant omnino glabra aut bine indè pilos glandulosos paucissiraos gerens. Cor. ex specim. videtur minima. Capsula 4 lin. longa. Kiores distantes ex foliorum minimorum oppositorum axillis orti. (v. s. comni. ad hon. cur. Angl. Ind. or.)

37. S. TENELTUM (Swartz mag. nat. Berl. 1807. p. 51. t. 1. f. 3. non Brown), scapo simplici coimpresiusculo, foliis radicalibus ovato-lanceolatis obtusis basi attenuatis sessilibus, canlinis paucis vix acuminatis, floribus paucis spicalis renotis sessilibus, calycis labio alio 3-fido, altero bipartito. (*Jj?* in Indiâ orientali circâ Malaccam. Folia 4 lix longa, reticulato-venosa. Scapus 2-pollic. Bractex sub floribus solitarix. Labellum ininutissimum. Capsilla poll ice m longa.
38. S. ULICRIFOSUM (Svrartz mag. nat. Berl. 1807, p. 52. t. a. f. 4), scapo filiformi supernè subpaniculato, foliis radicalibus nubrotnndis sessilibus, canlinis remotis oblongis obtusis, floribus remotis sessilibus bibracteatis, calycis labio alio 3 fido, altero bipartito. (*f*) in Zeylonâ. Capsula serauncialis.
39. S. DTRICNR. AIIORDFs (Benth. in Hugel enum. p. 73), canle erecto filiformi basi suhancipiti apice laxè subcorymboso, foliis alternis paucis, infer, ovatis, super, oblongis, calycis laciniis subconnatis, cor. limbi laciniis a obovatis, 2 minoribus oblongis, fauce coronatâ, labello appendiculato. — In Novâ Hollandiâ ad Swan-River. Herba 2-4-pollic. glabra. Bractae parvae 11liformes.
40. S. LONGITUBUM (Benth. 1. c), cdulc erecto filiformi apice laxè paniculato, foliis ab basin canlis confertis linearibus plants acuminatis, super, minoribus sparsis, cal. laciniis in labia a subconnexis, cor. laciniis integris, 2 obovatis, 2 oblongis snba?quilongis, fauce coronatâ, labello inappendiculato. — In Novâ Hollandiâ ad Swan-River. Precedenti af/iue. An nlrumque ad bane divis. ritè relata P.

* * *Herba; caulescentes floribus alternis vel solitariis, capsulâ teretiusculâ lineari apice conformi.*

- 4t. S. IHUWDATUM (Brown prod. 571), caule ramoso infrâ divisuram foliato, foliis linearibus, corolla; limbi laciniis majoribus obovatis, rrinoribus linearibus, fauce nudâ, labello inappendiculato basi tubo adnato. *If* in Nova; Hollandia; inundatisad oram merid. Caulis sesquiuncialis.
- 4u. S. DESPECTUM (Brown 1. c), caule partito, ramis paucifloris, foliis linearibus, limbi cor. laciniis lineari-oblongis parum inaequalibus, fauce nndâ, labello inappendiculato basi tubo adnato. *If* in insula* Van-Diem en. S. iuundato proximum. Caulis sesquinnce.
43. S. DXFFUSUM (Brown 1. c), canle ramoso diffaso filiform!, foliis linearibns, caulinis distaniibus, cor. limbi laciniis 2 majoribus bifidis, fa nee coronatâ, labello inappendiculato basi tnbo adnato. *If* in Novâ Hollandiâ tropicali.
44. S. PYGMEUM (Brown 1. c), canle simpliei erecto a-3-floro, foliis linearibas, calycis labii partitis, cor. limbi laciniis integris, fauce nudâ, labello inappendiculato. % in Novae Hollaudiae orâ merid. Scapus uncialis.
45. S. BULBIFERUM (Bentb. in Hugel. enum. p. ?3), canibus erectis basi bulbilleris, foliis ad apicera caulis fasciculatis linearibns, pednnculo apice i-3-floro umbellato, invol. foliis linearibus. Cor. fauce nudâ, labello inappendiculato. — In Novâ Hollandiâ ad Swan-River. Caules 3-4-pollic. An certe ad bane divisionem referendum ?
- * *Pedunculis i-Jloris ex alis folio rum in summitate scapi vel rami copfrorum, capsulâ teretiusculâ apice conformi.*
46. S. REPEWS (Brown prod. 571), caule repente, rauis adscenidentibn foliis subulatis adnatis, terminalibus confertissimis, fance coronata, labello inappendiculato. % in Nova; Hollandiaj orâ meridionali.
47. S. Gur'ATUM (Brown I. c), scapo simpliei, foliis radicalibus linearibu?.

flonbus fasciculatis snbsessilibns, biactea foliaceis, faace coronatâ, labello gp-pendicnlato. 2f in Novae Hollandiae orâ mend.

48 S PEDUNCUTJATUM (Brown 1. c), scapo simplici, foliis radicahbus lanceolalis, floribns nmbeilatis, pedicelhs capillaribus, invol foliohs linearibus, limbi cor. laciniis in.Tqualibus, faace nndâ, labello inappendiculato % in Novâ Hollandiâ tropicali.

* * * * *Racemis caulem foUosum terminantibus, caps 11 la compressâ lanceolatâ, vel hnean collo coarctato.*

49. S. BnEVisctruM (Brown prod ^72), caule simplici, foliis compresso-filiforniibns, snmmis confertissirois, racemo peduncolato subpanicnlato, racbi villosâ, capful à lanceolatâ a?quivalvipuhescenle.3fin Novae Hollandiae 01 à mend. (Br.)_v ad Swan-River (Ugel).

50. S PAsirci.ATUM (Brown 1. c), canlibns plarimis adscendentibus glaberrirois, foliis lineanbn* aculis, floribus in spicam subracemosam biacteatam ad racbin glabiain digeslis, cipsulâ lanceolatâ utroque locnlo serainifero, super, postito demum aperto % in Novae Hollandiae oia met id. Undl bol. reg 1.1459. Don gen syst 3. p. 721. f ia3 Folu aupenora, bracteae et calyces pube parcâ glandulo&â donantur. Cor. alba; punctis rubellis punrtatae. (v. v. c)

51. S. FALCATUM (Brown 1. c), caule snbsimplici racbique pubescentibus, foliis lineaibus, spicâ peduncul.itâ oubracemosâ, cdpsulib divaritalis lanceolatis, locnlo utroqne semimfero, supenor dimidio an^nstiore clauso. ^ in Novae Hollandiae orâ meridionab (Br), ad Swan River (Hug) S. solcatuni Steud

5*. S. LESSORr, canle fruticuloso subsimplici erecto dense et breviter racbique hirtello, foliis lineaibas acutis in petiolum fete attenuatis glabns, raceroo terminah simplici, cal. tubo elongato ad apicem coiollisque parce piloso-glandosis, labello elongato inappendiculato. J in Nova Hollandia ad portnm Regis Georgii legit cl. Wesson. Caulis pedalis gracilis. Folia 9 lin. longa patentia ant deilexa, sum ma fjsicnlato-subverticillata. Cor. alba exsicco, tubo calycis lobis breviore (v 5. coram à cl. Meiat.)

53. S. iMmirATUM (Benth. in Hngel enom. 73), caule Anticoso tenoiter lanaç, foliow unbucatis adpiessis ovatis austatis, racemis subsimplicibns, QprollT tubo longe exerto, fance coronatâ, labello appendiculato. — In Novâ Hollandiâ ad Swan-River (Hugcl). Cor tnbus limbo calycino duplo longior extus piloso-glandulosus, quâ notâ propriam sect, formale videtui

54. S_# ADKATUM (Brown 1. c), canlibns à collo pinnmis simplicibns glabris, foliis linearibus, spicâ subsessili divisâ, partiahbus pauciflois, capsnlis baM adnatis linearibus, collo calyce bieviore, loculo superiore vacuo angusiissimo (f) ex Don in Nova Hollandia' mendionali (Br), ad portnm Regi« Georgii (Baxt '), ad Swan-River (Dranim) Lindl bot. reg. t. 9U Sinin bot. mag. t a5q8 Lodd. bot. cab. t. n i a . (>anles 4-6 onciales. Cor. roaeae ad centrum saluiatiiores. (•••.)

55. S pROPIQUUM (Brown 1. c), canle mnllicipiti, partialibns umbellatim di- visis, folus linearibus, spicâ sessili subsimplici, capsnlis basi adnatis linearibus, collo calycem aequante, locnlo supeiiioie vacno angusti^imo. (f)** ex Don in Novas Hollands orâ merid. Flores carnei

* * * * * *Corolla /undo bipartite, lohis bifidis, capsula hnean.*

56. S ALSiifoIDES (Brown prod. 67a), canle erecto, foliis ovatis, floiabbm oppositis, floribns axillaribns sessihbas'solitanis ebracteatis. % ? in Nova Hollandiâ tropicali

J Species vix notcc.

S. WXGHTIAHUM (Wall, cat n. 3760).= Epilobium Wight. herb descr. desidei.

S. BUXiFOtiM (bort. Belved.)- = mdeser

^V. R. Confer ad calcem volnminis specie* i5 per impressionein rcocptak.

II. LEEUWENHOEKIA *Brown prod. 57a* (sub Levenhookia). *Spreng. sjst. 3. n. 304G. Endl. gen. n. 3094.* — *Gynocampus Lesch. herb.*

Calycis limbus 5-partitus bilabiatus. Cor. limbo 5-partito irregulari, labello dissimili fornicate columnā longiore cum tubo articulato mobili! Columna erecta infrā tubi lateri (ubi labellum) adnata. Anth. lobis uno super alternum divaricatae Stigm. 2 capillaria. Capsula i-locularis. — *Herbae Novo-Hollandicae pusillae facie Radiolae. Folia alterna peliolata, ramorum summa cooferta. Flores fasciculati interstincti.*

I. L. PUSILLA (Brown 1. c.), glaberrima, corymbo nioltifloro, corollae tobō abbreviato. (?) iu Novae HollAndiae orā merid. Herba i-a-pollic. ex Don. (v. s. ex Regis Georgii sina?)

a, L. PAUCIFLORA (Beatb. in Hngel enam. 74), so pernō pills glandulosis pnbescens, folia petiolatis ovato-orbiculatis, corymbo paucifloro, corollis calyce subqnadruplo longioribus. (J)? in Novā Hollandiā ad portum Regis Georgii.

III. FORSTERA Linn. f. nov. act. Ups. 3. t. 9. Swartz in Schrad. journ. 1799.

a. p. 3i. t. 1. a.y. a.tff in Koenig. journ. hot. x.p. 391. t. 6. EndL gen, n. 30g5. nee Gcertn. nee Scop. — Phyllachne Forst. car. p. 58. t. 58. Swartz in Schrad. journ. bot. a. p. 17'\$. et in Koenig. journ. hot. \p. 286. t. 5. Lam. ill. t. 741. journ. hist. nat. p. 190. t. 10. J. a. — Forstera et Phyllachne Schreb. gen, n. 1379 et 1480.

Calycis limbus 2-3-partitus crectus. Cor. tubuloso-campanulata, tubo brevi, limbo 5-6-partito, lobis scqualibus oblongis patulis. Anth. 2 a pice columnis staminac sitx, globosa;, bivalves, valvis transversim dehiscentibus. Stylus intrā columnam occlusus. Stigmata a subrotunda. Capsula ovalis i-locularis. — *Herbula? ex hemisphaerii australis regionibus frigidis ortae, minimae, glabrm, musciformes. Caules breves crecti. Folia imbricata parva sessilia integerrima. Flores ad apicem solitarii. Invol. 2-3-phyl̄um sub ovario.*

1. F. flEnroLiA. (Lion, suppl. 407)» Uore pedancolo solitario longissimo inai-dente, invol. calycis limbo b rev lore. %, \$ in summis montium altissimoram cacuminibus Novae Zealandix. Forst. act. ups. 3. p. 184* t. 9. Swartz in Schrad. joarn. 1799 p. 3i. t. a. et in Keen, jo am. x. t. 6.
3. F. MUSCIFOLIA. (Willd. sp. pi. 4' P- *48«)» flore inter folia suprema sessil, invol. calycis limbum superantc. ^ ^ in terra del Faego ad fre torn Magell, Phyllachne nligiuosa Forst. comm. Gcett. 9. p. 24. Swartz in Schrad. journ. 1799. v. I. p. 17^- t. 1. et in Keen, joarn. 1.1. 5. Lam. U. cc. Slibas Comiu.! 10S». (V. S.)

Ordo CIV. LOBELIACEJE (1) *Juss. ann. mus. Par. 18. p. 1.*
excl. Stylidieceis et Goodenovieceis. DC. et Dub. bot. gall. 1.
p. 310. Don gen. syst. gard. 3. p. 697, excl. Cjrpbia. LindL
syn. brit.fi. p. ity. excl. Jasione et Strumpfia. BartU ord.
p. 150. Presl prod. mon. lob. 8° Prag. 1835, et in Mey.
comm. pi. afr. austr. Dreg. i. p. 283. Endl. gen. 1.p.
509. — Campanulacearum gen. Juss. gen. p. 165. — Cam-
panulaceae trib. 2. Br. prod. nov. holl p. 56a. Alph. DC.
mon. camp. p. 36.

Calyx 5-lobus, ovario plūs minūsve adnatus, lobis oQualibus aut subinaequalibus, plerumque persistentibus. (iOrolla persistens, plūs minūsve gamopetala, lobis petalisve 5 cum laciniis calycinis alternantibus, sa;piūs irregularis, bilabiata aut i-labiata, aut tandem petalis 3 connatis 2 liberis, nunc subregularis; tubo integro vel longitudinaliter fisso, fissurā inter lobos labii minoris ante florationem inf'erā, per anthesin (flore resupinato) plerumque superā nempē axi inflorescentiae oppositā. iEstivatio subvalvaris. Stamina 5, lobis corolla? seu petalis alterna, à corollā saepiūs libera, nunc ejus tubo connata; filamentis interse liberis vel plūs minūs connatis, soepiūs basi liberis et apice cohaerentibusjanlheris connatis, bilocularibus, introrsis, longitudinaliter dehiscentibus, a inferioribus saepiūs minoribus apice in mucrones satas vel fasciculos pilorum productis, superioribus nudis vel barbatis. Follinis grana (sicca) ovoidea, lajvia, plerumque sulcata. Ovarium inferum aut semi-superum, biloculare vel rariūs i-loculare, placentis tune parietalibus. Ovula 00. Stylus 1. Stigma annulo pilorum cinctum, antberis diū tectum, plerumque bilobum, rariūs indivisum. Fructus sicpiūs apice valvis 2 medio septiferis, rariūs supernè operculo, vel latcrai-Itervalvis3 debiscens, aut tandem indehiscens, plerumque siccus. Semina 00, albumine carnosō, einbryonc recto. — Herbo3 vel suffrutes, rariis arbusculae, in regionibus subtropicis frequentiores, lactescentes, foliis alternis exstipulatis penninerviissajpiiis dentalis, inflorescentiā indefinitā floribus plerumque axillaribussolitariisracemosis ?pedicellis (excepto Parastranho) sub anibesin torsis, corollis saepius caeruleis. — Cyphia est typus diversi Ordinis. Calysphyrum Bung est Weigela Thunb. in Caprifoliaceis, de quo conf. Alph. DC. biblioth. univ. Genev. jun. 183g.

(1) Ordo elaborate a film caii^simo Alpiiouim DC.

Trib. I. *DELISSACEJE Presl prod. mon. lob. p. /,G. EndL gen. i.p. 512.*

Fructus indehiscens, bacratus* vel siccus. — In generibus I, II et III corollas tubus dorso basin usquè fissus; in caeterisbasi integer. — Cauhs pier unique lignosus. Pedunculi frequenter axillares multiflori, inflorcscentia nempe thyisidea, in Ordine anomala.

I PR AT I A. Gaudich. voy. Frejrc p 45f> G. Don gard. diet 3. p. 6aq excl. spec. — Presl prodr lob. p. 4* excl. P. begontfoha. Endl. gen. 1. p. 5ia. sect, b Enpratia

Calyx tubo obovoidco vel obconico, lobis aequahbus. Corolla longituchririliter fissa uml.ibiata scnrn-apcita, lobis subaequalibus ovato-acutis lanceolatisvc. Anthers 1 mfenoes apice scnis paucis lerrmnatae Stigma bilobum. Fructus indehiscens biloculars meinbranaceus aut carnosus. — Ierba* repentes, ex Amend mend., c.iuhbus folusque glabris, loins obtusis, extieims rmnoribus in axillā non florifens, pedicelhs paucis, floribus albidis vel cjcrulcscntibus.

I. P. HEDERACFA (rharD in linn. 8. p. 212), glabra, canhbas ramosis repentibas, folus ovjitis lotundtisque dentato-crenalis, petiolis limbo multō brevioribus, pedicellis paacis .ixillanbus folio longionbus nudis, lobis calycims lanceolalis arutis tubo pyiiforini MibaLfjualibus corollā i-4-ve brevioribus, corolla filamentisque iutui bisi villosii. If, in Drasilia australi et locis vicinis ex gr. id fietmn (Chain) et insulam (Gandich.¹) S^antac Catbannae, prope Buenos-Ayies (Iwerdie) et ad ripas Uruguay (Cham) P scipylUcea Piesl prod lob. p 46 P bcdeiacca ibid Corolla ejeruleitrens,lobii anguste lanceolatis acutitsiims Aiiba?qualibns, suprnonbus' none loDgioribus. Fructus indehiscens non carnosuj subglobo&o-pyrifounis. (v. s.)

@. *elhptica*, folus clliplios subsessilibus Lobelia hederacca Hook et Am. in jouin. hot. 1 p a;6* Lobelia odorala Grab, in Edinb. n. phil. journ. t8ir ex auct. cit.

a P. REPCirs (Gaudiob. voy IVeye. p. 456. t 79), glabra, caulinai ramosis repentibus ladicantibus, foins oibiculatis subcordatis sjnoato-ciena»is, petiolo liinbiim aquante, pedirellis paueis axillanbus lonqitudinc peliolorum a 3-branteolatis, bractcolis altcinis spaibis minimis acatis, lobis calyoinis ovato-acutis tubo ohovojeo bivionhus coiolla' 5» brevioribus. If, in insnlis Maclovianis <>ie I alklaud. Herba piostata subcainosa

0. *Urvilleana*, lobis calytirn tubo obovoideo xqnalibus corollā liiplo brevionbus — In liisahs MadoManis Piata repens d'Uiv¹ (I ll mal. p. 39. An divcr&itas exenoie tantura pictons? (v s. comiu. a d. d'Uiv)

3. P.? BOIIIFNSIS, ranlibus ramosis repentibus angnlosis glabris,foliis obovatis obtusis dentirulatis glabris in petiolin lunbo bievioiem nngut>tatis, peditelbs pauns axillanbus nndis folio sublongioibu*, lobis calycinis lanceolalis aenminatis tubo obconico longionbus cum pejicello glabus, coiolla laciniis calycinis tnplo longioie exlus glabrA intus filamentisque villosis Tf in Boliviā (Pentland¹) Habitus* et coiolla Pi•ili<c, sid fiuctus nondum cognitns Tubus calycis post anlbcsin bemispbaencun Caules nunc ilagellifoimes foliis extremis minonbus non ilonfens, ut in Piatus. I olia 4-5 bn. longa, 2-3 hn. lata. Lobi (orollac lanceolali subaequales. Antheiae praesentis generis, (v s—comoa. à cl. Peutland)

J "Praticc cirluscr.

- P. Btoonii-oiia Lindl := Piddingtonia niimmulau.t
- P. CORYMOSA G Don = Isolobu» coiyuibosus
- P ERECTA Gaudich — Isolobus concoloi
- P RADICALS G Don "= Isolobns Koxburgii
- P. TauifDfiRGii O. Don. ~. Isolobus* tadicann

II. PIDDINGTONIA. *Lobeliae spec. auct.* — *Rapuntiispec. Ptesi.* — *Piatioe spec. Lindl* — *Pratia sect. Bernonia Endl.gen. l.p. 5ii.*

Calyx tubo ovoidco supernè angustato, lobis lincaii-acuminatis aequabbus, 5 superioribus approximates minusque patentibus. Corolla longitudinabter dorso fissa, bilnhi.ila, lobis i supenoribus linearibus erectis, labio inferioie 3-fido palcule lobis ovato-acutis, Libiis longitidine sñilibus. Antbera3 duo; infciiocis setis solilams ternnnatae. Stigma bilobum Bacca crassa ovoideo-globosa biloculans.—Herba lepens, caule iobisquc pubescenlihus, loins liiscqualilci rcniformibus cordalis dentatis pctiolatis, pedicollis axillanbus folio subsequalibus, flore purpasrenlc —INomen scctiouis Hermonia tnnquain genencum uon adnusiquia genus Pratia jam tyroni classiario Prat-Bernon dicatum. Planla nepalcensis in incemonam vocavit H. Piddington qui de planlis indicis scnpsit * *An English Index to the plants of India*, 8°. *Calcuta* 183^.

x. P. NUMMULARIA. — *Lobelia nummularia* I am.! diet. 3. p. 58g. Blam ! bijdi. fl. ned.ind p. 737. R.ipnntiaiin nuiianlauuin Presl prodr. nion. lob p. Jo. Lobelia begonifoli.i Wall ' as. res. xi. p. -J77, in Koxb II. inJ. a p. n 5, list n i3of> Lobelia obliquid Ham mss ! in 1^L.tmb Putia begonifolia 1 indl. bot. ieg. t. 1373. C. Don gard. diet. 3. p. 6^ Piesl piodi. lob. p. 46. If in hu-inidis Nepjliae etin Jjvj (Lescben.) Comincis 'Blum.' inb. nius. Par. et Juss.), Ciulcs ladicanies pilosi I olia subtus pi.usritim pilo*td_f dentibus mucronulatis. Pedicelh in axilhs fohoiuin medioiuin glabernmi nuch. Lobi calycini tabo longiores utunque I'dentati Coiolla lobis c.ilycntis vix dimidio longior glabra Lobi CHHCIS et coiolla puipuuscentrs. liacca 4-5-lin. longa — 'Vaunt lobis calycnm' plus minus dentdtis Folia m quibiiitddm speci mini bus Javanicis iigdiora sapcine glabia et m<tgis dentata, in alus ejaad. insulas plants nepalensi binulia (v s)

III. MACROCHILUS *Preslprodi. mon. lob.p. 47. hndl. gen. i.p. 5i3.* — *Lobe-lije spec Cham.*

[^] Calyx tubo obconico, lobis foliaqeis oblongis margine imbricatis. Corolla tubuloa umlabiata, tubo clongalo liamalo-incurvo in femè integro superciic doiuo longimdnalilcr fuso, Jaciniis linearibus a3quabbus connivciibus pendulis. FiLmeiUa m tiilnim à corollâ bberum connata. Antberaj 'i uifcncoes apice iongè barbata;. Stigma bilobum. — Fruclus.... — Arbor Siindwicensis, palin,eioiniis, ti unco striclo simplici bioigyab, coniani foliom et jiccluticiiloioni extollcnlc; fobis glabris oblongo-ovovatib acuuiinulais in peliolum bievem angustatis denticulalis, liiflorebeiiis corollisque toinctosis, pedunculis folio Jongionbus nutantibus cicbiò biactcalib capitulo compacto globoso terminatis, Inacteisoblongo-ellipticis.

1 M siJPFnus (Piesl 1. c). — *Lobelia tumpiba* Cham. linn. 8 p. a?3-5. in sylis opdcionbus montiuia ocud. msulai O-W.ibu (Ch.im.l c). t'olia cum peliolo aub-i pollicau a J pedaba j>cmipcdcm Lila Cijnlul 1 drmphtis CO roll is inagnitudine pugm , flonbus a-^pol. lougis.

IV. CLERMONIIA *Gaudich i)qy. Fieyc. p. 459- G. Don gen. sytt gard 3.p. 698. Preslprod. mon. lob.p. 48. hndl. gen. 1. p. 5i\$.*

Calyx coloralus, inferne tui binatus cum ovario adnatus, tubo arcualo iupra ovanum jproducto, lobis nempè plus miniisve connatis, incrio->ibus mugis coba3rcntibus, omnibus caducis, undc tubus ca'lycis circumscisse dehiscens. Coiolla tubulosa arcuata semi-5-fida subregularis, ^alycc aequabsvel paulò longior, tubo integro, lobis suba3quabbus, ? supercionbus (ex Endl.) eicctis, inferioribus palenibus. Filamenla m

lubum à corollâ hbeium coalita. Anthers 2 inferiores apice barbatx. Stigma bilobum inclusum. Fructus indehiscens subcarnosus bilocularis. — Frutices vel arbores Sandwicences lactescentes, folns petiolatis crenatis vel serratis, pedunculis axillaribus, ftoribus pedicellatis albidis vel rosco-violaceis.

- i. C. GEANDIFLORA (Gaudich. I. c. t. 73.), glabra, foliis obovatis breviter et obtusiusculè acammatis credato-serratis, petiolis limbo 5° brevioribus, pedunculis petiolo duplo majoribus, bracteis ovato-acuminatis pedicellis multoties brevionibus, calyce maximo tubuloso subarcuato basi turbinato a pice inaqua. Jiter 5-1 obo, lobis apice reflexis, corolla tubulosa semi-5-fida. I obis calycinis subioDgiore lacmus aubincnrvs. jy in insults Sandwicemibus. hoha cum petiolo 2 i-3 poll, longa, polluem lata, acumine abrupto obtuso 3 lin longo Flores niaxinii 3-pollicares. Lobi calycis ultra ovatum fere omnino connati tubum nicixiunum luflatnm præebentes, dorso tamen medium usqne disticti. (v fiagm à cl. Gaudich. 10mm.)
- 1 C. PERSICM FOIIA (Gaudich * I. c. t. 7a), glabra, foliis oblongo-lanceolatis crenato-serratis a cat is in petiolum limbo dimidio breviorem angustatis, pedunculis petiolo subbrevioribus, bracteis ovato-acuminatis pedicellis gracilibus multoties brevionibus, tubo calycis tarbinato, lobis tubo 4°-5° ħ longioribus apice recte inflexis infenoribz plus minusve connatis, corollâ lobis calycinis sublongiore semi-5-fida tubulosâ loUllanceolatis subaequahbas patentibas 5 'n insolis Sandwicen&bas. (v fiagm. à cl. Gaudich. comm.)
3. C. onLONGifOLIA (Gaudich. I. c. t. 71), foliis oblongis obtusis basi in petiolum limbo subaequalein angustatis crenatis glabris, pedunculis petiolo diradio brevionibus, bracteis ovato-acuminatis pedicello dimidio brevionibus, tubo calycis pyriformi apice conitncto lobis lanceolatis braciore, corollâ lobos calycis .quante, lacinias lanceolatis erectis apice inflexis. f) in ins. Sandwicensibus. Media inter C. grandioram et Delisseas. Corolla subregularis Clermontite, sed tubus calycis vix ultia ovatum productus lobisque subregalanbus terminatus.
4. C. KAKEANA Meyen in Pre&d piodi raon. lob. p. 48 cit. mini solum nomine cognita

'V. DELISSEA. Gaudich. voy. Frey. p. 457. G. Don gen. syst. gard. 3.p 699. Prest prodr. lob. p. 47. Fndl. gen. p. 512. — Lobelia; sp. Cham, in linn. S.p. 219 Hook. bot. Beech, p. 88.

Calyx tubo sacpiis hemisphaericus, nunc ovoides vel turbinato, lobis brevibus saepiis dentiformibus. Corolla tubulosa bilabiata, tubo integrum, labiis longitudine equalibus, superiore lobis 2 distinctis rectis vel ad faucem inflexis, infra eriore patente 5-fido. Tubus stammeus à corollâ liber. Antheiac 2 inferiores apice barbatae. Stigma bilobum. Bacca subglobosa bilocula. — Frutices vel arbusculae Sandwicenses lactescentes, foliis integris vel pinnatifidis, racemis axillaribus erectis folio bievionibus multifloris, floribus pedicellatis albido-roseis. Inflorescentia racemis axillaribus.

1. D. SUDCORDATA (Gaudich. I. c p. 457 t. 77), ramosa, foliis ovato-acutis subcordatis serratis dentibus acatis petiolis hambam acquantibus, pedunculis longitndiae petioli, pedicellis bracteâ dentiformi triplo longioribus tubo calycis hemisphaerico-ovoidis pilosinsculo apice 5-dentato. ^ ^ ei simihter in m& Sandwicensibus ex silentio cl. auct. I. c.
- 3 D. TJWDULATA (Gaudich 1. c p. 457. t. 78), caule siinpjieissiino, foliis ovato-lanceolatis acutis serratis dentibus acatis in petiolum limbo dimidio brevioiem angustatis, pedonrnlis longitndine petioli, pedicellis bracteâ dentiformi 4°-5° vc longioribus, mbo calycis ovoides utrinque obtuso apice 5-dentato. ft In msuJii Santwiceubibū ex silentio cl. anct. I. c. Corolla tubus, ex icona, infra sinus denues seu gibbos ramimas praebet.
3. D. ACUMXNATA (Gaudich. I. c. p. 457 t. 76), ramosa, foliis ovato-acuminatis

denticolatis denticulis callosis alternalim majoribns pilosinscnlis basi in petio • lum limbo breviorem augustatis, peduncolis axillaribus petiolo brevioribns , pedicellis bracteâ acuminâ aeqnalibus, calyce ovoideo-hemisphaerico puberulo apice5-dentato. ^ ia insnlis Sandwicensibus. — Cham. linn. 8. p. 219. Folia teuuia subtûs pallidiora , utrinquè pilis brevibus paucis adspersa cam petiolo 4-6 poll, longa, 1-2 poll. lata. Corolla 9-12 lin. longa lobis sup. ex ic. none erectis none ad inferiores inflexis. (v. fragoi. à cl. Gaudich. et soc. hort. Lond. coram.)

4. D. ANGUSTI FOLIA (Presl prodr. lob. p. 47. praeente Cham.), foliis angustè lanceolatis acnlis serratis serraturis obtusis crebris rotundato-inflexis subaequalibus, petiolis limbo dimidio brevioribns, pedunculis axillaribus petiolo brevioribus floribus corymbosis, pedicellis elongatis tiliformibus tubo calycis semi-ovoideo, dentibns ciliolatis cadacis. 3 1^o editioribus ins. Sandwicensis O-Wahu. Lobelia (Delissea) angustifolia Cham. linn. 8. p. 219. Folia pedalia latitudine semi-pollicari, basi integra in petiolum angustata, subtûs pallidiora, pilis rarib ad basin limbi. Pedunculi sub-3-pollicares, ia-16-flori, bracteolis caducis, pedicellis pollicaribus. Corolla cnrvnla 16 lin. longa.
5. D. CALYCIWA (Presl prodr. lob. p. 47), foliis oblongo-lanceolatis utrinqñè acutis in petiolum brevem longè angustatis inaequaliter eroso-crenulatis, pilis snprù conicis brevibns rarib, nervis subtûs fuscescenii-hirtis calyce glabro tubo obconico, lobis oblongis obtusinsculis, limbo corollae birtello. — In insnlis Sandwicensibus. Lobelia calycina Cham. linn. 8. p. ?aa et p. 220. Kollandia calycina G. Don gen. syst. gard. 3. p. 6gg. Caulissimplicissimus? Folia sesquipedalia , 3 poll, lata, petiolo pollicari. Lobi calycini 3 lin. longi i-nervii. Tubas 5 lin. longus demin olivseformis. Pedicelli semi-pollicares in pedunculo carno so. Corolla à staminibus libera.
- d. D. FIHNATIFIDA. (Presl prodr. lob. p. 47), ramosa, foliis oblongo-lanceolatis, utrinquè acutis in petiolum brevera decurrentibus remotè pinnatifidis suprà giabris subtûs fuscescenti-hirtis leviter duplicato-dentalis dentibus sublubisq. obtusis calloso-mucronulatis, pedicellis apice pedunculi carnosus subcoufertis bracteolis squamaeformibus , calyce corollaque hirtis tubo calycis obconico lobis auri culatis ovatis obtusis.— In montibus occid. insulae O-Wahu Sandwicensis. Lobelia pinnatifida Cham. linn. 8. p. 2ao. Rollandia? pinnatifida G. Don gen. syst. gard. 3. p. 698. Folia cum petiolo sesquipollicari pedalia pinnis ntrinqne 3. — Lobi calycini 3 lin. longi. Corolla 2 poll, longa a staminibus libera. An Cyanca? .
7. D. AMBIGUA (Presl prodr. lob. p. 47), foliis oblongo-lanceolatis utrinque acutis in petiolum brevem longè angustatis sinuatis daplicato trilobato den tatis dentibus calloso-mucronulatis suprà glahris subtûs fuscescenti-hirtis, tubo calycis glabrescente, lobis ovatis submarginato-obiusis mucronatis subhirtellis,nervis corollae hirtis.—In insulâ O-Wahu Sandwicensium. Lobelia ambigua Cham. linn. 8. p. 222. Rollandia? ambigua G. Don gen. syst. gard. 3. p. 698. Caulis simplicissimus? Folia cum petiolo af pollic. sesquipollicaria. D. pinnatifida forsitan non diversa ex cl. Cham., lobis calycios tauien basi minus auri culatis.

-j- *Species exclusa.*

D. ARBOACA Presl. = Sclerotheca arborea.

D. MACROSTAGHYS Presl. = Lobelia macrostachys.

'VI CTANEA Gaudich. n>oy, Freyc. p. 45>j. t. ^5. Pres/prodr. lob. p. 47. Endl. gen. i.p. 5ia.

Calyx profundus 5-fidus tubo turbinato, lobis aequalibus foliaceis. Corolla tubulosa subarcuata semi-5-fida, dorso medium usquâ iissa, lobis subbilabiatis longitudine aequalibus linear-lanceolatis semipatentibus, tribus inferioribus magis approximatis. Filamenta staminum à corollâ libera inter se connata. Antherae connatas apice recurvae et omnes barbatae. Stigma bilobum inclusum. Fructus baccatus sulcato-dcagonus indehiscens bilocularis ovoideus calyce coronatus. — Arbor

Sandwicensis lactescens, ramis ramulisque tuberculato-feculeatis, foliis pinna tipartitis, floribus cyaneis racemosis.

- i. C. GRIMESIANA (Gaudich. 1. c. t. 75). 5 ^{1Q} iksulis Sandwicensibus, abi vulgò *Touè-noui*. Folia pinnatipartita prope petiolum pinnatisecta lobis lanceolatis grossè et in.uqualiter serratis. Peduaculi pedicelli petiolique tubercnlati. Hracteie ovato-lanceolatae pedicellis accrescentibus breviores. Lobi caiy-cini latè ovato-lanceolati undulati corollā dimidio breviores.

VII. ROLLANDIA. Gaudich. *voy. Freyc. p. 458. f. 74. G. Don gen. syst. gard. 3. p. 698 exclusis spec. Chain, descr. Presl prodr. mon. lob.p. 47. Endl. gen. x.p. 513.

Calyx tubo ovoideo, lobis abbreviatis obtusis aequalibus. Corolla arcuala lateribus compressa, tubo integro supernè intlato caiyce mulio longiore, lobis lanceolatis in flex is tubo paulo brevioribus inter se longitudine aequalibus limbum subregularcm constituentibus. Columna staminea cum tubo corollae supernè connata, extra tubum libera. Antherae apice barbatae. Stigma inclusum biloburn. Fructus indehiscens subcarnosus bilocularis.—Frutices lactescentes, Sandwicense, foliis amplis, pedunculis axillaribus pauciQoris, floribus albidis. IuQorescentia Delis-sea rum.

- x. R. LANCEOLATA (Gaudich. 1. c. t. 74), ramosa, foliis oblongo-lanceolatis duplicito-dentatis subtùs birtellis utrinque acutis petiolis limbo dimidio ferè brevioribus, pedunculis petiolo brevioribus 2-4-floris, bracteis lanceolatis acutis pedicello diiplo triplove brevioribus, calycis glabri lobis obovatis obtusis tubo ovoideo triplo brevioribus. £ iu insulis Sandwicensibus. Folia semipedalia. Corolla incurva caiyce toto 8° major basi angustata lobis lanceolatis. In iconē R. montana vocatur.

fi. *grandifolia*, foliis majoribus. Lobelia lanceolata Hook. voy. Beech, p. 88. Ex speciinine nostro cl. Macrae, ex ins. Woalioo : folia ferè sesquipedalia 3 | poll, lata oblongo-lanceolata petiolo solùm sesquipollicari (forsan truncato) limbo inaequaliter calloso-denticulato nervis subtùs hirtellis. Flores ut in iconē citata, sed columua starainca tubo corolla? non connata, stamina solùm basi libera epipelala, unde character generis dnbimm. (v. s. comm. à soc. bortic. Lond.)

- Q. R. CRISPA (Gandich.! 1. c. p. 259), ramosa, foliis oblongis obtusis margine undulato-crifspis basi in petiolum augustatis glabris argutè dentatis dentibns rotundato-inllisis, bracteis ovatis obtusis velutinis, calycibns pubescent ibus, lobis ovatis obtasis. £ Ist insulis Sandwicensibus. Folia pedem longa 3 poll, lata. Stamina corollae adnata. (v. fragment a à cl. Gandich. comm.)

-j- *Species exclusce.*

R. ? AMRIOUA G. Don. = Delissea ambigna.

R. P piNwATIFIDA G. Don. = Delissea pinnatifida.

^VIII. CENTROPOGON Presl prodr. lob. p. 48. — Lobelire et Siphocampyli sp. alior.

Calyx tubo subgloboso. Corollae lubus integer tubuloso-incurvus, laciniis superioribus majoribus falcatis galeatis, inferioribus patenibus. Aniherae duae inferiores aculeo ovato triangulari cartilagineo solitario saepiis terminatae. Annulus (an semper?) carnosus angustus inter calycis limbum et ovarii superiorem partcm. Bacca globosa bilocularis, pericarpio tenui, placentis maximis. — Suffrutices vel frutices, Americae meridionalis, habitu et corolla Siphocampylorum.—Acumen antherarum ex pilis connatis constans. Pedicelli axillares.

1. C. t.^vIGATUS, glaber, caule tereti, foliis ellipticis breviter petiolatis acutis remote snbserratis, serraturis dentiforraibus brevissirais, pedicellis folio dimidio brevioribus basi bibractcolatis, bracteis suboppositis subulatis, calycis

tubo bemisphaericolaciniisiueari' acDmi^atis integns breviore, corollâ glabrà incurva soperne ampliore laciniis calycinis 4° longiore, antbeis basi ine-dioque glabiis apice pilosiusculis 2 inf. cuspidato-baibatis, baccâ globosâ. — In Suuoatno. Lobelia lsevigata Linn, f ' suppl p 3yi Petoli 3-5-hn. longi. Limbi 3-4-pollic. subintegn. Corolla mbra ? (v. 111b. Linn)

- a. C SURINAMENSLS (Piesl prodi.lob p. 48, excl. syn. Lob. laevigata), caule simplici tereliusculo glabio, foliis elliptuis acutis vel acuminatis basi obtusis brevjter petiolatis dentatis, dentibus minios acutis callosis uncinatis, pedicellis folio snbbrevionbus, basi bibiacteolatis, calycis tubo beinispbaerico, lobis lanceolalo-acuraiuatis tubo longionbus subdeuticulalis, corolla incnrvâ snperne subventncosâ, lobis supenoribus majonbus recuivis faucem obtengentibas, antberis longe exsertis omnimò hirsutis, baccâ globosâ. *fi* in dumetis provincial Rio de Janeno (Sellovv, Gaudichb.) circa Bahiain (Lhotsky ! Salzin '), in Guyana¹ insuhs Tabago ' Sti. 1Inceutii¹ et Tiinitatis (Sik**b**' n° 213), Novâ Andalusia (H. B et K.), Andibus Novo-Granatibus (H 15. et K.), et Peru-ianis (h. Juss. et Bonpl.). Lobelia Suiinamensis Liiin sp. 1J20. Sims. bot. mag. t. 225. Andr. bol. rep t. 5oa Lodd.bot. cab t. 740, Boupl. jaid. Navai. p 97. t. 3g. H. B et Kunth' nov gen. am 3. p ^07. L. sphdeioacaipa Juss ! hcib. Lob. spectabihs H B. et K ! nov. gen. am. 3 p. 306. Siphocampylus spectabilis G. Don cen. syst 3. p. 702. Sipbocampylus maciantbus Pobl' bias. a. p. io5.t 168 Siphocamp Suiinamensis G Don gen. syst gaid 3 p. 702. Lobelia (Sipbocampylus) Surinameus Cham linn. 1833. p. 201. Lobelia cornuta Linn, sp 13IQ ? ex Cham. "Vaiat fohis subintegris deniicnlis solum peripheriara excedentibus vel suLcrenatis, denticulis in smibus crenarum, pedicellis glabris vel subpubescentibus. Corolla puipurea. (v s.)
- 3 C ? BEKTERIANUS, glaberrimns, ram is lsevibus rectis heibaceis, foil is ovalo-acnniinatis mucioualis basi obtusissimis membianaceis remote et aigute denticulatis peliolatis, pedicelhs petiolo sublongionbus, tubo calycis ovoideo,lobis dentiformibus sobulalls tubo bievionbus, corolla glabra anquste cylindiac& elongata apice bilabiata, antheris omnibus apice baibatis, bacca ovoidea basi obtusa apice acula. *J* in Guadalupa. Lobelia srandens Beit ' non PI. B et K. Lobelia Beitenana Spreng syst# 1 p 71a. Piesl pioilr lob p 36. Siphocampylus Berterianas G Dongen syst gard. 3 p. 70J "Vidclurstandensex nomine cl Bertero, sed lauui recti in nostro spetim. I olia 4 poll, longa cum petiolo polhcari, tenuia et denticulata modo C Suiinamensis Flos pollicaris. Coiolla rectm&cula purpurea persistens, vix aperta in spccimine. Bacca omnino infera. Antheiae non cuspidatae ? (v s)
4. C? ANDROPOGOW , caule ramoso glabro sulcato, foliis o\ato-acutis breviter peliolatis glabris denticulis piliformibus remotepenpbeiiam integiam excedentibus, pedicelhs folio bie\ioribns basi subvillosis biacieolis 2 lincanbns basi sitis, tubo calycis glabri hemisphaeiico stuato, lobis Imcau-acurainatis tubo snblongioriblis, coiollâ tubnlono-subfalcata superne laiioie glabi.i, lobis tilanguid n bus lationbus, tnbus Infenoibus roult rainonbus acutis in labellum 3 dentatum coalilis, anthers valde hispidis *J* in sylvis Quitensibns Lobelia andropogon Cav. ic. 6 p. 10. t 5i5. Presl piodi lob. p. Ip. Siphocampylus andiopogon G Don. gen. syst. gaid 3. p. 703. Habitus, folia et calyx piacentis qua cum jonxit, cum dubio, cl Chamisso lmn. i833. p. 201, sed ex icone diffeit pedicelhs bibracteolatis lobisque corolloj breuonbus. Mnchrones antheiarum verisimiliter piaetei iit pictor.
5. C. GRANDIS (Prcls prodi. lob. p. 48), laraulis folisque glabris, folij, oblongis acutis basi in petiolnm angustatis crenato-seirnlatis, mteiioubus mte^eeirimis floribns umbellatis umbelhi teuninalibus sub-decem-flons, biacteis ovatis obtusis hirtellis pedicelhs medio bracteolatis inultò brevioribus , calyce semi^globoso hirtello, lobis ovatis acutis tubo corollae decies hrevioribus, corolla extern^C hirtell^d tubo supreme amphato, lobis ovato-lauceolatis 2 super, majoribus, antberis hirtelhs 1 inf. apice mnchronatis. 3 piope Santa-Fe de Bogota. Lobelia grandis Linn.! suppl. p. 307. ex pi. Mutis. H B. et Kunth' uov. gen. a ID 3 p. 307 ex pi. Mutis. Siphocampylus grandis G Don gen syst. gard. 3.p 70a. Folia maxima 5-poll. et ultid, 2 poll. lata, petiolis semipolheaubus. Pedicelh

- 6-9 lin. long! Corolla rubra ante flo ration em cnrva. Capsola conico-globosa magnitudinc ftuctus Pruni spinosac. Ex specim. floriferu herb. Linn, antherae exseitae, 2 mferiores in mucronem triangularem reflexum productae. (v. in b Linn, et iuus. Par)
- C. C GRANULOSUS (Presl prodr. lob. p. 49), glaber, ramis pedicellisque granulato-&cabris, fohia petiolatis ellipticis ntrinque acntis dentatis, racemo corymboso nntante, bracteis oblongia brevissimis, pedicellis compressis corollam aeqnantibus, lobis calycims ovato-triangularibus acntis tubo dnplo brevionbus, coiollae scabnasculae lobis ovato-aconiinatis supenoribus longioribus, flla mentis antherisque apicem versus hirsutis. /) in Peru viâ.
7. C. REFLEXDS (Presl 1. c») ramis foliisque glaberrimib, foliis ovato-lanceolatis acuminatis obtnsis remote serrulatis, racemo corymboso pancifloro, bractei* oblongis brevissimis, pedicellis compiessis calyce duplo longioribus hiisutis, calycib birsnti lobis hneanbns ncutis serrulatis reflcxis tubo triplo longioribus, corolla? g] a brae lobis acminatis apice hispidulis, supenoribus lanceolatis, mfenoribus ovatis duplo brevionbus. 3 "a Peruviâ.
8. C. SZASFRA.TUS (Presl 1. c), pubescenti-scabiisculus , ramis flexnosi, foliis petiolatis elongate lanceolatis angnsto-acuminatis acute duplicito-dentatis , pedicellis compiessis folio brevionbus, calyris lacinns lanceolatib acutis obsolete denticulatis ba&i trinervhs tubo duplo longioribus, corolla; lobis lanceolatis, superioribus mferioies dimidio excedentibus, baccâ 10-costatâ. £) in Peruviâ.
9. C. BBSURZOXDKS, ramulis viscidalo-biitis, folns petiolatis late ellipticis apice rotundatis basi subacutis utunque hirtellis denticulatis, pedicellis folio bievoiri- bus villoso pilosis inter basin et median partem bibt acteolatis, calycis pilosi tubo hemisphacrico, lobis lanceolatis acutis corollâ 4° brevionbus , corollâ externe hirtella tubo subinflato rectiusculo, lobis lanceolatis acutis inferionbus duplo brevionbos, antheris 1 inf apice baibalis pilis in mucionem connatib. A in Andibus Popayanensium? Lobelia be&leroides H ft. et Kuntb ' nov. gen. ain 3. p. 306. Presl prodr. lob p 39 Fiulex facie JJesleriae, folns 3 | poll, longis a o-n lin latU; coiolla albâ; baccâ? depiesso-globo&â magnitudine fructus Pruni Spinoza (v. in b mus. Par)
10. C. CUSPIDAIus, ramis velutinis carnosalis, foliis petiolatis late oblongis apice lotundatis ruspidoitisque basi subacutis utnnque glabriusculis denticulatis, pedicellis velutinu. in infer parte mediove biacteolatis, calycis velutim tubo depiesso globoso, lobis lanceolatis acntis corollâ 8° brevionbus, corollâ externe hirtella tubo aicuato, antheris inf apice barbatis, pilis connatis. ^ ? in Peiuvia (Dombey!). Folia 5-6 poll, longa, a-3 poll. lata. Pedicelh 1-2-pollicares approximati suburnbellati, bracteis linearibus mimmis Bacca magnitudine Cerasi. Praeced. et C. grandi valde affinis (v. in h mus. Par.)
11. C. HIRTUS (Presl 1. c.), tomentoso-huta, caule striato, folns lanceolatis utrinque acuminatis bievitei petiolatis denticulatis, pilis albis ngidis, pedicellis folio aequalibus, calyce huto, tubo globoso, lobis linearibus acutis erectis tubo sublongionbus, corollâ subinceivâ, lobis 2 super longioribus inflexis./> in umbrosis montis Sti. Antonu Quitensimm. Lobelia huta Cav. anal, scienc. nat. 2 p. 108.1c. 6. p 13. t. 52O. Siphocampylus hirtus G. Don gen syst. gard ^ . p 702. Caulis fere orgyalis rainosus. Folia semipedalia, iloralia diradio bieviora
- ia C BONPLANDIAVUS (Presl 1 c), caule arboreo, foliis lanceolatis aignte seirato-dentatis planis pubescentib bioviter petiolatis, pedicellis axilla rib us folio bieviobus. 5 in Ameocl merid (II. et Bonpl in h Willd.). Lobelia dentata Willd. in Koena et Sch. syst. 5. p. 57* non Cav. Lobelia Bonplandiana Roem. ct Sch. 1 c. An Ccntiopogon?
13. C EnuLis(Presl 1. c). — Lobelia edulis Linn An error typographic^ ? Lobelia sub eo noriae nulla in Linn, sp aut in snpplemento, nee in catalogis Stendel, Spiengel, etc An C Sunnamensis ? cuius bacca cibus communs apud mcolas Surioatnenses.

**Trib. II. CLINTONIEM Preslprod. mon. lob. p. 43. EndL
gen. 1. p. 510 excL Ljsipomia et Hypscla.**

Capsula i-loculans, prismatic, elongata, valvis tribus (quarum 1 medio placentiferae) lateraliter dehiscens.

IX CLINTONIA Dougl. mss. Lindl. bot. leg. t. 1a4i- G- Don gen. syst. gard. 3. p. 717 excl. C Rergxana. Preslprod. mon lob p. 45. End/ gen. 1. p. 510. Lobelias sp. Pccpp

Calyx tubo clongato linearis-triquetro contorto, lobis inaequalibus lanceolatis. Corolla tubo brevissimo integro, limbo bilabiato, labio supenore bipartite lobis angustibus, inferiore cuncato-trilobo. Slainma connata, antbens 2 infenoribus apice setigens. Ovarium omnino inierum i-loculare. Stigma bilobum. Ovula placentis panetalibus dualibus, utroque latere, secus longitudinem totum ovarii adfixa. Placentae lineare* cum sliginatis lobis aternantes, nonnihil quoad florem laterales, ovulis in placenta bisenatis. Capsula longe prismatic contorta 3-questra, valvis 1 medio placentiferae. Semina elliptica angusta. — Herbs Americana? annuae, foliis sessilibus mucronatis, floribus axillaris sessilibus bracteate longioribus, habitu et ovario generis Speculanas (Campanula speculum L.)

- z. C. ELEGANS (Lindl. bot. reg. t. 1241), caule rainoso erecto fohis inferioribus ovatis superioribus ovato-lanceolatis acutis floribus laxe dispositis, tubo calycis longe prismatico i-questris contorto biacteis $4^{\circ} 5^{\circ}$ ve longiore, corolla lobis calycis lanceolatis acutis subaequali, labio ssp. profunde bifido infra. 3-lobo lobis aequalibus, columnam stamineam lobis calycinis breviore. (1) in America boreal occid. prope flumen Colombia (Dougl.) — Presl prod. mon lob. p. 45. Florea intense aium, labio niajore maculata centrali pallule lutea. (v.v.)
3. C. POLCHIELA (Lindl. bot. reg t 1909), canteraraoso flexuoso, fob is ovatis lanceolatibus obtusis, floribus laxe dispositis, tubo calycis biacteis $4^{\circ} 5^{\circ}$ ve longiore, corolla lobis calycinis lanceolate obtusis in clinis longiore, labii superioria profundo bilidi lobis ovato-acutis divergentibus, labii inferiores lobo centrali majore, columnam stamineam lobis calycinis breviore. (1) in California (Dougl.). Planta minus quam C. elegans, flore duplo majore maculata centro aurea marginie albâ Ha lulus C. elegans.
- 3 C. CORYMBOSA, cnule erecto ramoso teieti, foliis erectis ovatis lanceolatis quoque qbtutus, Uoubus apice rainorum. approximate, tubo calycis bracteate ovato-acuta tripli longiorie angulis habendo, corolla lacrimis calycinis lanceolatis obtusiusculis duplo longiore, labii superiores profunde biiidi lobij. lanceolatis acutis, inferiores lobo centrali nonmajorie, columnam stamineam lobis calycinis longiore. (t) in Aineucâ bor occid (Dougl.). Cauda* 5-6 pollic. pro gene recessus. Folia 3-5 in. longa if-a in. lata, mtegia. Antheus dorso pilosus culuc (v. a. comiu a soc. hortic. Lond.)
4. C. PUSILLA (G. Don gen. syst. gard. 3. p. 7^j8), caule simplici humilem erecto, foliis lineari lanceolatis obtusiusculis inerioribus inioribus, floribus §.[^]y tubo calycis. bracteate linearis-obclusa duplo longiorie cylindriaceo, corolla lacrimis calycinis lanceolatis electis obtusis breviore, staminibus inclinatis. Qua in Chili (Pospp !) — Presl prod. lob p. 1/5 Lobelia pusilla Poepp. diar. n. 7 in Planta i-pollicans. Tolia 1j-a in. longa. Habitus et illoies Speculana; hybndaj Lobi super coiollae lanceolatae acuti electi; mfeiores breviores? inter se aequale*. Capsula cylindracea 6 hn. longa, i-loculata, 3-valvis, placentis J. (v.v.)

Species exclusa.

C. BERGUNA Don ^= Oiararoatolbcca Bergiana Presl

Seclio II. HYPSELA.—*Hypsela Presl I. c.*

Capsula seraibilocularis, dissepimento incompleto basi et apice inserto, margine libero undique placentâ tenui obtecto. An genus diversuui? An species quaedam supra enumerate cum praesenti jungenda;?

0*. L. RENIFORME. (H. B. et Kuntb nov. gen. am. 3. p. 3ao. t. aG6*. f. 2.), glabra, caulis repens, foliis orbiculato-reniformibus einarginatis rectus, petiolis limbo aquatibus, pedicellis petiolo brevioribus, tubo calycis toxibnato-cainpanulato lobis ovatis aequalibus longiore, corolla carapanulata tubo inaequali Jobis calycinis a°-4° longiore, limbo obliquo bilabiato lobis ovato-acuminatis patentibus. % in regione Quito ad moutein ignivinum Antisana? alt. 500 hex. *Viola algida* Willd. herb, in Roem. et Sch. syst. 5. p. 391. ex Kunth syn. 2. p. 351. *Hypsela reuniformis* Presl prodr. lob. p. 45. Fructum non vedit cl. Kunth.

J. Species exclusa.

L. SERPENS Kunze. = *Seligeria radicans*.

Trib. IV. LOBELIEM Presl prodr. mon. lob. p. 9. Endl. gen.
1. p. 510.

Capsula bilocularis, apice valvis 2 medio septiferis aut rariū poris 2 dehiscens. — Herbae suffrutices vel rariū arbusculae, floribus saepius pedicellatis axillaribus, corollā nunc dorso longitudinaliter fissā (in generibus XII-XXII), nunc lobo integro (in sequentibus), bilabiatā, unilabiatā aut subregulari.

XII. HETEROTOMA Zuccar. in florā i83a, beibldt. p. 100. Endl. gen. 1. p. 5vi. —*Myopsis Presl prodr. mon. lob. p. 8.*

Calyx tubo liemisplumperico, limbo bilabiato, labii superioris apice 3-fidi laciniis erectis, inferioris horizontaliter producti apice 2-tidi laciniis inflexis. Corolla longitudinaliter fissa tubulosa, tubo basi valid & inaequaliter dilatato et in calycis labio inferiore ad lacinas usquè in calcaris speciem extenso, sursuum cylindrico 5-fido. Stamina 5 filamentis antherisque connata. Antherae 2 inferiores apice barbatae. Ovarium inferum biloculare. Ovula per rimam. Stigma emarginato-bilobum. Fructus.... — Herba Mexicana cire. 3-pedalis, foliis alternis petiolatis e basi rotundatā ovatis oblique acuminatis inaequaliter crebre dentatis utrinque pubescens, floribus in racemos terminales simplices multifloros dispositis magnis purpureis.

i. H. 10BEL101DBS Zuccar. 1. c.—In frigidissimis la Cumbre de San Antonio Mexicanorum, 8000 ped. supra Oceanum. *Myopsis Mexicana* Presl 1. c. ejusdem generis sine dabo, sed forsitan species diversa. Cl. auctor description era iiondum edidit.

XIII. MEZLERIA Presl prodr. mon. lob. p. 7- Endl. gen. i.p.Sio, ubi *Metzleria* scribitur. *Lobeliae* sp. Linn.?

Calycis tubus hemisphaericus. Corolla dorso usquè ad basin fissa 5-partita, lobis saltem inferioribus basi connatis, subregularis, lobis lanceolatis patentibus, 2 superioribus paulò minoribus. Antherae 2 inferiores apice setuloso-aristatae, omnes leviter incurvatae. Capsula globosa, apice (ex Endl.) loculicido-bivalvis. — Herba; Capenses humiles, caule decumbente, floribus axillaribus parvis albidis?

1. M. DEPRESS*. (Presl! prodr. lob. p. 7. excl. syn.), glabra, canibus prostratis ramosis radicantibus, ramis angulosis foliosis, foliis latè ovatis subdecorrenti-

bus ohtosis integi is, pedicel Us axillai ibus folio apqualibus ad baun biglandulosis, calycis lacinus corollā triplo brevioribus % ad Cap Konae-Spc, in graminosis inontosis Wnbergen alt. 6-7000 ped — Prosl to mm pi afr. austr. Dreg p. a83 Specimen nostrum carnosulam humile, *Coins* 2 lin. longis nunc breviter pelio-], <tis, floribus nuraerosis spares inimrois, tubo calycis heniibpbauico, corollā tlbida lobis infer, latioribus basi connatis. CapsuU nondum apeita. Habitus Pialia. Lobelia depressa L. et Thuob. inter se foisan diversae, a prcesenti veri-Mtniliter differunt, ex colore floiis et longitudine folioium in plantā LiuneauA, ex pedicellis folio duplo longioibus in plantā Ibunbergianā Conf ad species gen. Lobelia?, (v. s. comm. à cl. Drege.)

- a. M. FIICAULIS (Piesl prod. lob. p. 7) glaberrima, caule angulato filiforme deenrabente, folns acute callosoque dentatis in peliolum angustatis, inferior!-bns obovato-spathulatis, Miperioi ibub lineal i-lanceolatis, pedicellis axillaubos folio diradio brevioibus, calycis lacinūs corollā triplo brevioibus. — Ad Caput Bonae-Spei
- 3 M. HUMIFUSX , glabernma , caule ramisque tenerrimis angulosis diftasis, fohis ovatis brevisbiine peliolatis s̄erratis, senatuns ntiinque 3-4 loboqne teruiinali niDcronulato-cfcUpsis, pedicellis folro dimidio longioribus nudis , tubo calycis brevissimo tuiBUnato lacinus ovato-acntis mult6 breviore, corollā lobis calycinis triplo longiore , antheus pilosinsculis 7, inf <tpi(e baibatis. — Caput Bonae-spei, inter saxa montis Tabularis. Lobelia? Bnrch. cat. pi. afr. n. 635. Wahlenbergia Dreg ' pi cap. exs n 6 J04. Planta peipusilla , foliis carnosalis x | hn. lorgis linearā lalis, flonbus mini mis albis vix 1 ^-tin. Ovarinn &ubli-beiam. A Lobeliā alsinoide Lam forsan non diversa , sed ex desenptione mancā cl. auct. non affiimandum. (v. s.)

XIV. MONOPSIS *Sahsb. trans, hort soc lond a p.Zy.G. Don gen syst gard.*
3. p. 698. *PresI prodr. lob. p. 10 excl. sp. Endl. gen 1 p. 511 excl. sect b*
Lobelia; sp. Linn.

Tubus calycis obcomcus \el iicinispiae iicus. Coiolla doiso lougilii-flinaliter fissa regulaiis campanulnla vcl infundibiiliformis 5~loba, lobis «equahbus rotundalis. Stamina vix connata omnia apice barbata. htigmala 2. — Herba3 »nu?e Capenses, babitu florque Campanulacearum piacerlim Speculanae (Campanula; Speculum L.). Corolla ex violaceo cscrulea.

1. M DEBIT is (PresI^r prodr. lob p 11) caule ramoso, lamis diffusis angnlosis, foliis linediibus angu&tis remote cartilagineo-dentatis, pedicellis .ixillaiibas folio tiiplo quadiuplove longionbu&^iectis, lubo calycis obconico elongato lacinus hnearibus ectis snbjLquah, coiollā lufundibaliformi lacinus calycims paulo longiore, antbeus omnibus apice baibdtis.(lj *d Cap. lionae-Spei in parte inf. occid et in magnā Kano—Picsl'comm pi afr austi. Dieg. p. 284. Lobelia debilis Linn, snpl. p. 3q5. Ihunb. prodi. p. 40. Fl. cap. p. 182. Lobelia tenella Zeyh' pi TMp- n- ⁵⁶ n⁰n Linn. Tola planta, imocorollac, pilosiuscula piimo a&pectu glabia, pilis raris albis. Coiolla nunoi quam in sequentibns viol ace a. Capsula elongata 10-ncivia saep* cur\at*i* Due species in beib Linn sub nomine Lob. debilis, quarnm nna Enchysia repens, altera veio certioi ptsesens videtui. (v. s. inter pi. Dicg. et in h Linn)

- a. M. SpEcufUM, caule prostiato 1 amoso, foliis lmeaiibus acutis lemote serratis pilosiuscnlis, pedicellis axillanbns sparsis folio tiiplo qaadmplove longionbun adscendentibns, tubo calyris obconico, lobis hnaii acummatis patentibus demum leflexis, corolLe tubo infundibuhfoi mi, limbo iota to, lobis rotundalis niucrouulatis, anberis omnibus apice pilosis. (f) ad Cap. Uonx-Spc. Lobelia bpeculom Andr. bot. rep. t 644 bol. mag t 14^9. Campanula Ahicana annua etc. Comm. hoit. 2. p. 76. t. i8. fig. ad dexli. ** M. conspicua Sal. nans, soc horr. lond. 2. p. 4° - ^x 2. Ples^ P^{101*1}, lob. p. 10 Coiolla er violaceo cwrrulea habitu Speculaua Speculum (Campanula Speculum L) Pedicelli calyxque nuuc pilosi (v, j)

3. M. ORACILI^s, caule ramoso glabro, foliis lincari-lanceolatis, lanceolatisve remotè serratis margine cartilagincis, pedicellis axillaribus erectis piiosinsralis folio a°-3° ve longioribus, calycis; pilosi tabo hemisphaerio laciniis linearibus acuminatis deinum reflex is breviore, tobo corollae infuDDibuliformi , limbo rotato lobis rotundatis roncronulatis, antberis omnibus apice barbatis. (f) ad Cap. Bonap-Spei in montibus Diaakensteeu. M. conspicua grarilis Presl! com in. pi. afr. auslr. Dreg. p. 284. Folia infeiiora ovalo-lanceolata sub-integra obtusa. Pedicelli sxiùs supernè approxiuati. Corolla ex violaceo caerulea. Capsula hemisphaerica bilocularis. (v. s. comm. à cl. Dreg.;

"f *Species dubia.*

LOBELIA, CAMPITULATA Lam. diet. 3. p. 588. Coof. ad Lobeliaruni calcem.

'J *J *Species exclusce.*

M. CORYMBOSA. Presl. = Isolobos corymbosas.

M. DIOICA. Presl. = Holostigma dioicum.

M. IWCOMSPICUA Sal. = Knobysla erinoides.

XV. HOLOSTIGMA G. Don gen. syst. gard. S. p. 698. nSSfSpach (1). Lobelia? sect. 3 Br. prodr. ft. nov, holl. p. 565. Monopsis Presl prodr, mon. Iqb. p. 11. Monopsis sect. Holostigma paitim Endl. gen. i.p.Su.

Flores dioici. Calyx tubo obconico. Corolla longitudinaliter fissa , profundè 5-fida, unilabiata, lobis subaequalibus. Stamina 2 inferiora apice sclis unicis terminata. Stigma ititegrum (Br.). Capsula bilocularis bivalvis. — Herbac Novae-Hollandiac inter-tropicalis. — Diflert à Mon op si et Isolobo siigmate indiviso, (lorcquc dioico.

1. H. DTOICUM (G. Don 1. c.) — Lobelia dioica Br.! 1. c. Monopsis dioica Presl 1. c. Ex sperimine nostro masculo : planta tola glabra, canlis simplex tenuis adscendens angulosns, folia sessilia lanceolata accta remotè et acutè serrata, flores racemoso-spicati apice eongesti, pedicellis capillaceis bractea linearis dimidio longioribus, lobis calycinis setaceis, corollà albidà triplo brevioribus, lobis corolla; patenibus lanceolatis, antberis iaclusis stigma abqrtivum globosum includentibus. (v. s. comm. à cl. Br.)

XVI. ISOLODUS. — Lobelia? sp. auct. — Prati; sp. G. Don gen. syst. gard. 3. p. 699. — Monopsis sp. Presl prodr. mon. lob. p. 11. Endl. gen. 1. p. 5 n. — Rapuntii spec. Presl comm. pi. afr. austr. Dreg. p. 287.

Calycis tubus lurbinatus vel obconicus elongatus. Corolla dorso longitudinaliter fissa unilabiata 5-fida , lobis aequalibus patentibus. Stamina 1 inferiora apice setis unicis terminata. Stigma bilobum. — Herbs, intlorescentia varià, floribus albidis vel ex purpureo maculatis. — Women ab irof aequalis et oGoë lobus, propter lobos corolla? aequales.

§. 1. *Pedicelli apice ramorum eongesti.*

1 • I. coRYMBoses, glaber, canle debili angulato adscendenle ramoso, foliis iuciso-serratis decurrentibas , inferioribas ovato-roinndatis in petiolum limbo aequalem anguisatis, superioribus lanceolato-spatbulatis, floribus apice ramorum congeslis, braeteis linearibus dentatis pedicello longioribus, tubo calycis turbinato t lohis acutis, column' a stauinèa lobis corollae dimidio bieviore. Antheris corollam non superanlibus. % ? ad Cap. Bonae-Spei. Lobelia corymbosa Grah.! in James. Edinb. new philos. journ. octob. 1816. p. 385. Sims bot. mag. t. a6y3. non Berg. Monopsis corymbosa Presl prodr. lob. p. 11. cum seq. raixla. Pratia corymbosa G. Don gen. syst. gard. 3. p. 699. Canlis (ex Grah.) frnticulosus. Calyx glaber. Corolla profunde 5-fida albida basi pr-

purascens lobis aquoahbus ex paiporeo a basi ad media m partein niacalatis
(v. s.)

2. I. JASIONOIDES, caule erecto teieti lamoso qlabro, foliis remotè inciso- serratis glabatis, infeiionbns o bo vat is in petiolum limbo bieviorem angustatis, medus sessilibus lanceolato-oblongis, supcnobiis hne<inbus_t floibus a pice ramoium conges Us, biacleis linearibus subdentatis peduello apice piloso longionbus, calycis pilosi tubo turbinato lob is acutis, coluuuiA staminrā torollain aequantc , anthens exseitis (?;? ad Cap' Bonae Spei in paite nifei. occid et in Caffua. Rapnntimm coiybosura Pit si com in. pi aft¹ austr. Dieg p. 287, an orunia speciimna P Plant* nostiae à tl Drege comra stamimhus coiolla semper longionbus.fohisque a pr-edec differunt. Calyx in quibusdam glaber Coiolla ex albido parpenascens. Capsala bivalvis. (v. a.)

§. 2. *Pedicelh sparsi.*

3. I. SPARSIFLORUS, glaber, cauhbus difluis procumbentibns gracibbas, foliia spatbnlatiocioso-seuatis, infenonbus in petiolum limbo brevioiem ^ngusiatis, supenonbas sessilibns linear-spatherulatis, pedicellis axillanbus folio dimidio brevionbus capillaribns basi bibracteolatis, tnbo calycis ovoideo basi acoto lacimib acammatis longiore , coiolla lobis calycini* tnplo longiore i-labiata profunde 5-lidâ, colamnâ stammeâ corollam subapqaante (ad Cap Ronae- Spei, in cacumine monlis Tabnlaris (Ecklon' in b. Dunant). Fades En< hysiae ennoidis, sed corolla sperne fissa. Radix perpendicnlaris alba. Caules e collo plunmi 3-6 poll longi. F_{eha} infer. 4-6 lin longa 1 hn. lata, dentibns utrin- que a-3 Flores 2 lin. longi albido-rosei Antberiae 2 infer mucionulaite (v. s.)
4. I* KERII, caubbos decumbentibus simplicibns giabris stnatis, foliis subsessili- bus lanceoldtis basi obtusis ciliatis integris medio dentatis apiceque plabris acuminatis, pedicellis axillanbus folio longionbus basi bracteolatis calyceqne glabris, tnbo calycis longe obconico, lobis aenminatis, corolla patente lobis lanceolatis subxqualibus, antbens .. — In Cbma Lobelia rampanuloides Ker bot. reg. t. 7^3 non Thunb Caules 4-5 poll longi Folia alteina sparsa 8-io lin. louga Pedicelli folio vix duplo longiores pio pliinta cras&iuscuh cum calyce supernc continui. Corolla albida fauce virescens et bimaculata, tubo lobis calycinis vix longiore, fisburâ patente, lobis sup. ide6 divergen- tibus.
- 5 I riMPANULoiDEs,^caule deenrobente subsimplici elongato filiform! strinto glabro, foliis subsessihbu^ lanceolatis acentis obsolete serratis glabris patenlibus pedicellis elongatis. -- In Japoma I oheha ermoides Thunb. fl jap. p 3a6 non Linn. Lobelia campannloides Ibnnb trans, soc linn lond 2 p. 3Ji non Ker. Ra pun Hum campanuloides Piesl piodi p 14 L Japonica Dietr Oaett- ner lexic 5 p. 552 ex Ru.ro et Scb Cauhs pedahs et ultra Folia subpollica- lia. Antbeiae igu. Flores termmales in ramis elongatis
- 6 I RADICAL, caule decumbente radicante filiform! raraoso angnlato plabro, ramis erectis, folus sessilibus lanceolatis decnrentibus nndulatis subdentatis patulis glabris ungniculanbus , pedicellis axillanbus, solitanis folio duplo feie longionbus (IJ in Japoniâ. Lobelia Eiinns Tbunb fl Jip. p 3<5, non Linn. Liobelia radicans Thunb trans, soc. linn lond. 2 p 3 to non Roxb Rapunl tium radicans Piesl prodi p. U Pratia Tbunbeigu G Don gen. syst gard 3. p. 700. Floies secandi ex nomine vernaculo a Thunb cit
7. I. ROXBURGH 1 ANUS, glaber, caulibus adscendentibus rauiosis slriatis, folii* bifams subsessilibus lanceolatis ntriuque acutis 1 emote subdentatis, pedicellis axiHaribus nudis folio dimidio longioubns, tubo calycis longe obconico 10- uervio, lobis acurainatis, tubo corolla pubescente calyce dimidio longiore, lobis patenlibus umlateralibus aequalibus lanceolatis, antheis . . . % ex Chinâ introd. in h hot. Calcutt Lobelia radicans Roxb fl ind. 2 p. 112 Wall' listn. i308, nonThunb Pratia radicans G Don gen. syst gard 3 p. 700. Cauhs ramique diffasi 4-6 P°N l°P< Poll» nunc basi subpilosa Corolla pnr- purascens (ex Roxb) fjutp bi_BTlanduloSd Yaldc afhnis I Keiii, sfid div<i>a

- folia angastioiib⁸ basi acntiset saepiūs glabris, florura colore et pubescentia, (v. a. comm, ab. ampl. ccet. mere. Ind. Or.)
8. I. COBTOLOR, giaber, caule tereti adscendente, foliis oblongis obtusè dentatis snbssilibus pedicello parùm longioribus corollā unilabiata laciniis aequatibus. % ad Portum Jackson. Lobelia concolor Br. prodr. fl. nov. hoi I. p. 56a. Pratia? erecta Gaudich. voy. Freyc. p. 456.
 9. I? CUNNINGHAMMir, glaber, ramosus, ramis adscendentibus angnlosis, foliis sessilibus ovatis obtusis irregulariter dentatis dentibas obtusis folio 4°-5° ve brevioribus basi obscurè glanduloso-bracteolatis, tubo calycis pyriformi lobis acaminatis basi latis longiore, corollā lobis calycinis triplo longiore, laciniis linearibus seqnalibus, staminibus epipetalls, filaintentis basi liberis pilosis, antheris glabris 1 inf. apice setosis, capsula globosa. If. inNova Wallia australi. Lobelia inandata Conningh. Planta verisimiliter aquatica, ramis 6-8 poll., foliis 6-1 a lin. longis, 4*6 lin. latis caruosalis, corollā albidā? dorso fissā profundē 5-fida parùm aperta. Stigma bipartitum. Fractus quasi carnosus forsitan indehiscens et tune generis diversi. (v. s.)

XVII. PARASTRANTHUS G. Don gen. syst. gard.* 3. p. 697 et 716. Lobelia? sp. Linn. — Rapnntii sect. Xanthonieria Presl prodr. lob.p. ii.comm.pl. afr. austr. Dreg. p. a85.

Calyx 5-iidus, tubo cylindrico vel obconico. Corolla flava infernè lougitudinaliter fissa, lobis 5 ovato- acutis bilabiatis, 3 superioribus majoribus. Antherae apice omnes barbatae. Stigma bifidum, rariis (an monstrositate?) triHdum. Semina subrotunda minima.—Planiae herbaceac vel habitu suffruticuloso; foliis sessilibus, saepè coriaceis; floribus sessilibus vel brevissimè pedicellatis, axillaribus et basi bibracteolatis, luleis, quasi inversis aut potiis (quia sessiles) sub anthesi non utin afilnibus torsis.

1. P. LUTEUS, glaber, caulis simplicibns ramosisve adscendentibns, foliis lanceolatis sessilibas serratis acutis, floribas laze spicatis, lobis calycinis lanceolatis aenminatis corollā extùs pilosiuscula dimidio brevioribus. If. ad Cap. Bonae-Spei. Rapuntium foliis oblongis etc. Burm. afr. p. 101. t. 39. Lobelia lutea Linn. 1 p. i3a2. Sims bot. mag. 1.1319. P. simplex G. Don gen. syst. gard. 3. p. 716. Rapuntium luteum Presl! prodr. lob. p. 11. Lobelia Sieb! fl. cap. exs. n. 249. Caules plurimi flagelliformes nncsnperne ramosi. Flores aurei. (v. s.)
- a. P. CAPITATUS, caulis adscendentibus glaberrimis letragonis, foliis sessilibus linearibus acutis argutè reinotèque dentatis, floribas capitatis, bracteis ovatis acntis digitato-dentatis, bracteolis lanceolatis acutis calyce dimidio brevioribus, calycis tubo oblongo nervis birsuto laciniis lanceolatas acutissimas aequante, corolla; laciniis nervo dorsali hiisutis.—Ad Gap. Bonae-Spei. Rapuntium capitatum Presl prodr. lob. p. II.
3. P. VARIIFOLIUS (G. Don gen. syst. gard. 3. p. 716), caules suffrnticuloso erecto supernè ramoso, foliis crebris linearibus glabris inferioiibus subiutegris superioribns dentatis, bracteis flores subterminales aequantibus, tubo calycis hispido, lobis lanceolato-acuminatis glabris, corollā pilosiuscula lobis calycinis dimidio ferè longiore. % in collibus prope Cap. Bonae-Spei. Lobelia variifolia Sims bot. mag. t. 1692. Rapuntium variifolium Presl! prodr. lob. p. i» et comm. plant. afr.-austr. Dreg. p. a85. Stigma 3-partitum ex Sims, aH monstrositate? Stigmata desunt in specim. nostro. (v. s.)
4. P. ERICOIDKS, caulis filiformibus diffusis puberulis, foliis sparsis op posit is ternatisve verticillatis sessilibus linearibus acutis rigidulis denticulatis semi-teretibus, floribus in spicam linearem digestis, calycis tubo linearis lanceolatas acutas superante, corolla laciniis extùs nervo liirsutis.—Cap. Bouae-Spei. Rapontium ericoides Presl prodr. lob. p. 1a.
5. P. THKRMAMS, caules plures simplices vel ramosi adscendentis hirsatissimi» pills albis stiigosis, foliis sesilibub ahenris utrinquc angnstatis ovatis senRtit*

crecto-patentibus unguirnlaribus suprà glabiis subtus piloso-bispidis, floiibus axillaubus luteis, pedicellis folio bievionbus calyceque hiisuto-stiigosis. Ad therm as prope nvin Elepbantis Cap. Bonae-Spei ipso sspè livulo aqu? calidx. Lobelia theimalis Thunb. prodi.i. p. 4°. fl. 2. p. 42. Rapuntium tbermale Presl prodi. lob. p. 12. Lobelia pubescens Dietr. ex Steud.

6. P. EUPHRASIOIDES. — Lobelia Eckl. pi. cap. union, itm. n. 38. Rapntium Eupbrasoides Presl piodr lob. p. 12. Solum nomen mihi notnm In sectione floiibus luteis sessihbus collocavit cl. Piesl, ideo veusiimlitter Parastiantbus.

•j- *Species exculsa.*

- P. UNIDENTATA G. Don. = Dobrowskia i-dentata.

X'VIII. DOBROWSKIA Presl prodr. lob. p. 8. comm. pi afr. austr. Dreg, p. 283. Endl. gen. i%p. 5io —Lobelias sp. Thunb. et altor. — Parastrantb sp. G. Don gen. syst. 3. p. 716.

Calyx tubo saepiis lurbinato, rariis hemisphaenco. Corolla doiso longitudinaliter fissa, 3-partita, petalis 2 superionbus distinctly unguicualis crectis 3 infeTioribus in labiuin 5-fidum cohaerentibus. Stamina filamenlis antliciisq. connata, antheris omnibus apice barbatis Lasique extiis puberulis. Stigmata 2, linea, cxtià tubuin stamineum spiraliter revoluta. — Herbae Capeiiscs, foliis allernis oppositis aut teinate quinatove verticillatis, pechcellis axillaiibus primo aspectu saepè terminalibus, floribus crerulcis. — Affines Lobeliis quarum antherse omnes apice barbatae.

1. D. UNIDENTATA, cautious pluimis diffusis ramosis angulosis scabns, folns subsessilibus alternis oppositis teinatisve acutis maigine caitilagieo neivoque subtùs scabris, inferionbus ovato-lanceolatis medio utunque i-dentalis, snpeuoribus lincaribus mtegiis, pedicellis elongatis ilexosis subteriumalibus folio inultoties longioribns, Jacimis caiycmis Uncaiibus acutis reflexis tubo scabio diinidio lougioribus, corolla extus adpiesse pubescente. If. ad Cap. Bonae-Spc in parte orient, infer. Lobelia unideulata b. Kew. ed. 2 v. 1. p. 656. bot. mag. t. 1484. Lobelia bidentata Donn Lobelia scapigeia WJICL. suppl. b btr i8i3 ea^ Piesl non Br. Parastrantbus unidentata G. Don gen. syst gaid. 3. p. 716. D. Massomana Presl prodr. lob p. 9, coiuni. pi. afr. austi. Dreg, p. a&3. Coiolla intense violacea. (v. s ex Krebsn. i3c), Dreg, et b. angl)
- a. D. DREGEANA (Piesl' piodr. lob. p. 9), caule erecto lamosissimo, lamis angulatis scabns, foliis sparsis oppositis ternatisqnc caloso-acutis maiginatis margine neivoque medio subtùs scabris, infimis subsessibns lineaii-lauccolalis medio utunque umdentatis, supenoiibus sessilibus lineaiibus integns, pedicellis axillaubus folio 4<-5° le longiobus minute pube&ccnibus, calyce pilosiusculo lacimis linearibus acutis ieflexi. tnbo dimidio longioiibus, <ollat adpressèpubescente neiusque doiso pillows.^adCap. Bona;-Spei in pane orientali iufei.—Piesl! coram. pi. afi. austi. Dieg. p. 28i Capsula nutaus in spec, siccis. An tatis a D. unidentatâ differt? (v. s. inter pi Dreg, et Kiebs.)
- 3- D. POLYPHYHA (Presl prodr. lob. p. 9)» ianiis augulalis scabns flexuosis, foliis ternato-quinatovr erticillatis sefisibns anguste lineaiibus acutis jiarginatis margine neivoque medio subtùs scabiis, pedicellis axillaiibns folio duplo longiobus floribusque pnberulis, calycis tubo hemispbaeuco lacimis linearibus acutis patentis&imis duplo broiore , corollje neuig extus bimutis. ^C? ad Cap. Bona?-Spei Capsula pendula.
4. D. SCADRA, caule erecto scabro supeinè ramoso, lamis anglosis pilosiusculis foliosis suboppositis sessibns linearibus pilosiusculis maigine revolntis patentibus, pedicellis axillaubus folio tripliè plute longioribus apice priors, tubo calycis bispido, laciniis linearibus acutis reflexis tubo longioribus lobisque corollæ pilosiusculis 2f ad Cap. Bonæ-Spei in parte infer. orientali. Lobelia scabia Thunb. fl. cap. ed Schult. p. 178. D. Thunbergiana Presl' piodr. lob.

p.g. comm pi. afr. austi. D,eg p. a83. Planta cl. Thanbeig, ex description* tfillert solum pedicelbs folio duplo longionbus. (v. s in pi. Dreg)

5 D. ASPERA , retrorsum srabra , caule erecto dngulato, foliis alternis vel oppositis nnrgine cartiUgineonervo que snbtus scabns.infeiionbus ovato-lanccoldtis lanceoldrisve acatis bievner peliodltis srdbrido-aculeolatis utiinque i-a-den-Jdtis.supeiionbus lmeaiibis integus sessil.bns, pedicellis folio duplo tiiplov longior.bus bdsi bibid< teoldt.s, biaoteolis lineaibus folio Inplo bievionbus, flonbiis piibeuliis, ldcinns ralycinis lineaiibns drntis patentibns cili tto s(jbns tubo subacqnl.bus (T),u| CA, Bonae-Spei in biiimdis montis Didboli (Kkl ' pi. tap. n 16.) etin regione austral! et onentali infci. (l)rege'). Lobelia &cobia j»pieng. n. entd 1 p a.3, non Thnnb. Lobelia aspera Upreng. ib p 111 Lobelia Ch.maepithys Spirng syst. 1 p 914 et Zeyh' pi. c.p n 2S0, non Laral D EtklonidndPiesl'piodi. mon lob. p 9, comm pi. afr. dustr Dreg p 284. Cyphia simplex Spreng in Zeyh' pi cap n iS fid herb Moric. et Uunant. D Zeyhmdna Presl prodi lob p. 10 Coiolla lobis calycinis vix longior. SpecimenDregednum mdjus, peddle, foliis infer, mdgis serrato-sca-bus Capsuh eiectd? mdtura ovoidco-tnrbinata lobis Cdlyciuis longior. Sub nomine D Zeyhenanaj D laeviraulem raisit cl. Drege, enore venuuilei, aat 13. Zeyberiana cl Preshi ad D. lavicaulem referenda, (v. s)

6 V D s J^{TTI/VRTODEH} (P'esl piodi. lob p 10) canibus angulatis retrorsum aca-bns, folus oppositis petioldfs oblongo-lanceolatis aculis lemote denlatis raar-gine et subius scabm, pedicelbs axillaribus scabiis folio duplo longioiibus, calycis tnbo hiito Idciniis linearibus acutis ciliatis duplo breviore. % ? ad ^ap. Bona-Spei. An k pr.rced diversa ?

7 P .r/FVICADI IS (Pies1, P<-odi. lob. p 10), (aulibus angulatis lavibns adscen-dentibas, folus sparsis oppositisq. sessilibus linearibus rancroiiiildtis, c.lidto-icabiis, integiis, pdicellis axilldiibns folio mnltoties longionbns apicp pubes-centibus basi bibiacteoldlis, brdrteolis lineaibus folio tiimidio brevioiibus floribus ddpiesse pobeeihs, laciniis calycinislineaiibus nincronulatisserrnlat* cilidtis erectis mho ovoideo-tiirliadto ainqalibus corollâ tnplo brevioribus. % in Africâ anstrali prope Port-Naral. —Presl' coimm pi. afi austi Dieg p. 284. Capsula eiecti obovoide.i. Conf ad finem num 5 (v s in pi Die")

8. ry, SERRATIFOi:ra » ca... i, erecto ramisque angulatis glabris lavibus, foliis gMbiis, infenoribus oblongo-linearibus obtusis in petiolnm bievera angnstatis utnnque 1-2-dentdtis, niedus snj>erioiibusq lineaibus sessilibus a£utis seriatis, dentibas atrinqne 3^1 subulalis, pedicellis dxillanbas folio sublongioubas Izvibas, tubo calytis glabio longe obconico laciniis ere(tis linearibus inarpme scabnslpngioie (l ad Cap Bona2-Spei(Burcb ! catdl. pi dfi austr extiatrop. n. 706). Specimen nostium 4 poll, dltum. Radix tennis iibrosa. foln eiecta, media lonfjiora 4-8 lin lonka vix | lin. Idta Pedicelli erecti nudi frnrtiferi folio vix dimidio longiores. Corolla ... Capsula erecta longè obconica glabra a lin longa. (v. s comm. à cl. Burchbell)

Species exclusa.

D - ANCEPS Presl. = Lobelia anceps.

XI X. SCLEROTHECV. — Lobeliae spec *Sparmann* in (r) *Font 'prodi.* n. 308.
— Delisseae ? spec. *Presl prodr. lob. p. 47*

. Calyx tubo ovoideo, lobis 5 pateritibus reflexisve tubo sublongion-hus. Corolla dorso longitudinahter fissa, bilabiata, petdlis nempe 1 su-perioribus basi cum infenoribus subconnatis? inter se liberis, 3 tnfe-rioribus in Jabmm 3 fidum? coherentibus. Stamina 5. Stigma bilobum. Capsulâ indurata, lnfera, v-locularis, globosa, apice acuta, poris rotundis 2 dissepimento alternis vertice dehiscens. Semina parva glo-

(1) Conf. ad prafat opens ubi cl Forster descnptionum anctorem Sparmann dicit

bosa. — Arboi biorgyalis. Rami teretes hgnosi. Folia ovato-acuminata, basi acuta, laevia, dentata, conacea, 5-6 poll longa, 1 j-2 poll, lata, dentibus callosis, pctiolis 6-8 lm longis. Pedicelli axillares i-flon folio dimidio bieviotes, paulo infiā mediam partem bibiacteiti, bracteis suboppositis, lineanbus, 6-8 lin longis, mtcgns Lobi calycm 6-8-lin demum caduci Pettla Imeaii-lanceolala, apice leflexa, lobis calycinis fere duplo longiora Gapsula 4-5 hn longa —Genus dislinc-tum piopter capsulam lignosam pons nee valvis dehiscentem. Cooilā accedeie videtur Dobiowskiac, sed habilis diveisus, et puctuea ex iconē Imperfectā Forsteii, specimmibuaque raio tloufcns herbauorum adhaeientia pelaloium obscuia manet Spaimann pclala ungmculata dixit, 5 coh ae re n lib us, i libens. — JNomen a cx*~~foc~~ duius et 8~~x~~& cap-sula.

I S ARBOREA. fy In msnbs Socielatis Lobelia arborea Spaim et Torst'l t IC med in mus bnt ' Ouillem zephyi. tait m ann sc nat. par 18^7 v 7 p MO Delissea? aiborea Presl 1. c (v inh Banks, Lamb et mus par)

XX. LOBELIA Linn, lapp p 127 gen n 1006 exel sjn Plum et Laurentia. Jt/ss gen p 165 non Plum nee Presl —Lobelia? sp Linn, sp p. i3i7 Lam dice 3 p 5Si —Rapuntium Fount 1 p i(>3) 'Mill diet 1 Gccrtm 1 p 15I Presl prod lob p i exel sect 1 —Doitmannia Rudb lap 97 f 2 G Don gen sjst gnrd 3 p 697. — Inmeiis Presl prodr mon lob.p 47 —Lobe lia Plum et Gccrtm est Scjevola, Lobelia Presl est Sipbocampylus Pohl

Calyx 5-Iobus, tubo obconico, ovoideo vel liemi^haBiico. Corolla superne longitudmahei fissa, bilabiata, tubo cylindraceo vcl mlundi-buliformi rtcto, labio supenoie surplus minore et eiecto, mfenoie saepius patente latioie 5-fido vel raiius T denlalo Antheiae 2 infenoies vcl 1 anus omnes .ipicc baibatae Ovanum infeiiim vel semi-supuum, imo (in speciebus sum Hm is) sublibicum. — Hei ba> vel ranus sufluentes, folns altcini<>, flonbus saepius mcmoso spicalis, pedicellis axil-anbus, cooilā caeruicā, albā, violaccā, mbiā vel ex rubro aurtā.

Sectio 1. TRIMERIS.

Corolla profande bilabiata, fere tupartita, labhs longitndine aequalibus divergentibus, mfeuoie 3 fido —Tumeus Presl 1 c p 47 Fuld gen 1 p. 5i3 I L sCEVOLFFOLIA (Roxb ' in jppend Beaton St Helen), glabra, caule fruticoso 1 a in o so, folns obovatis obtnsis denfafo sernti*, dentibus callo&ulis ob-tubiuscubs, pedicellis axillmbus folio subbievionbus nudis subc mpre<>sis tnbo calvcis longe obconico, lobis liueaiibus obtu&is tubo xqualibus corolli diimdio hievionbus, antbeus 9 inf a pice bieviter baibatis J in mnlnosis Stae Helena; piop(Sandy Bay 1 urnens oblongifolia Presl 1 c Milkwood m-colis Lactescens, larais teretibus, folns a 3 uncias longis, basi integus, denti-bns eat rein it raajoubus Coioila alba (ex Soldnder in^s) doiso fissa, petalis a snp cum infeiioibus basi solum connatis, 3 inf luednim uj>que connatis Capsula longe obo\oidea, \alvis a apicedebiscens Semina o\ata, acutiuscala, laevia. Cooilā et babitū ad Sclerothecam accedu (v in b. Roxb et Royl)

Sectio 11. RAPUNTIUM.

Corolla bilabiate, labus divergentibas, circiter usque ad raediam partem con-nahs, mtei se inaequalibus, snpenore erecto, lobis 7. angustionbus, mfenoie pa-tente, lobis 3 lationbus —Lobehae pleiaeque auctorum Rapuntu spec Tourn. Rapuntium Presl 1 c exel sect 1. et div spec

§. i. *Aniheroe omncs apice barbatcc vel setis tennmalte.*
Coiolla tceriilea vel alba.

* *Tubas calycis per anthesm basi acutus, plus mmusve elongatus nempe*
Imean-obconicus aut turbmatus.

- a L. LEPTOCARPA. (Grissel. linn 5 p. 419), caale decumbente ramoso, ranns ilarcidis, tessilibus ovato-acutis argute serratis margine cartilagineis glabris flo-n'bus axillaribus spasis pediceUis raimmis, tobo calycis longe claviforim hispidio lacinus lanceolatis a cut is duplo tnlove longiore, corolla intus pilosins culA fauce antrorsutn nmpliatâ lobis superioribns brevioribns rectis inferioribus obtosis, antberis oinnibns apice barbatis, capsulâ cylindraceo-obconica^t If ad Cap. Bonae-Spei L glabrifolia E Mey. berb Rapuntinm glabrifolium Picsl^T prodr lob p. 12. Lobelia Buich.! cat. plant, afr. aust n 1864 L. Mundtiana Cham, linn 8. p. i|5 Habitus Paiastranhi, sed corolla caerulea supernefissa "Van at canle glabro vel piloso, foliis ovatis vel lanceolatis. (v. s coim. à cl Drege et Dorchell)
- 3 L. PRESIII, pnbcscens, caule adscendente angulato basi ramoso, foliis longe petiolatis cordato-subrotuudis obtusissublobatisque petiohs pianis apice alatis, pedumulo triminali elongato glabro paucifloro, flonbus racemosis secundii*, pedicellis bradeam setaceam acquantibus, calycis lacimis linearibns acntis erctis tubo tubinato 10 nervio sublongioribns, corolla? limbo extus hirtello % in lapestribusmontis Witbergen ad onent Cap. Bome-Spei. Kapnntium cordatum Pieblcomm.pl afr Dreg p a85 non L cordata Willd PIII canlis et petiolo-luma-a^poll long houzontaliter patentes Mores pollice breviores Corolla; hiibus, ut videtui c sicco , intense aznreus. (v s.)
- 4* L. GFNiSTorDES, glabia, canle ere* to rainoMssimo ramisq. anglatit, foliis nessilibus angu&te Imcaribus z-nerviis cihato-&errnlatis apice obtnsiuscule tal lo&is fugacibus, peditellis lacemosis secundis pubescentibus bractealmeari setaceâ asquilonis, calycis lac inns Imcaribus cihatis eiccto-patentibus tubo torbinato hi 1 suto duplo longioribus capsula zo-nervia glabrâ j ad Cap. Bonac-Spei in paite luerid. raontosâ. Rapuntium gemstoides Presl comin. pi. afi. austr. Dreg p ^85 Affinis L. spartiodi Mores 5 lmeares.
- 5 L. SPAHTIOIDES, caule ramo9is&imo lamisq. divaricatis teretibos ghbris, folii* se&silibus lincaibus aculi scubs basi cilialis, floribus racemosis villosulis, pedicellis lanatis bracteâ folus conformi aeqnlongis basi bibracteolatis, calycis laciniis lanceolatis acnmmatis erectis tubo tubinato decem costato in pedicel-lom angustato longioiibus, corolla; laciniis lobisq ovato-oblongis j in mon-tosis Capensibns ZwaiteLergen (Eckl. et Dreg) Rapuntium spaitioides Presl pi. Eckl etcomm. pi afr austi. Dieg. p. 28(>)
- 6 L ANGVSTIFOLEA (Benth.' enum plant, nov boll, austi occid Hugel p. 74 ») glabra, caule adscendente subteieti, foliis longe lanceolato-lineanbus integrerimis vel minute glanduloso-dentatis, floialibus flore longioiibus, laciniis , Lalycmis lineanbus minute scabro-serratis ovano lineaii vix. longioribus — Ad flumen Cygnorum Novae Holland!® (Hugel). tolia 3 4 poll, longa, VJX I ±-i lin Uta. Stamina apice omnia barbata. Habitns L. ancipitis. (v. m b. Bentb &pecim. impcif)
- 7- L. CIDBOSA (Labill.¹ nov. holl 1. p. 50 t 71), glabra, caule tereti simpliti stneto, racemo secundo , foliis integus, imis obo|atis, medns hntaubus supremisq. rans, bracteis miuimis lineaiibus, pedicellis bi acted dnple longioiibus ad basin braoteolatiji, tubo calyns oblique pyrifoimi, lobis acnminatis filamentis staminnm diimdio bi cvioi l'bus, corolla laciniis sup. glabris bievibus mfenonbus lauctolatis, antberis omnibus apite pilosis (l) ad Van-Dieraen , orasq mend et or INovaeHollandise I5r.' prodi. nov. holl. p. 564 Rapuntium gibbosumPieslpiodi p ii ~ Sieb ' pi exs. uov holl. n 619 Coiolla ticru-lea. Folia ciassiuscula pauca mteidum subdtntata. (v s.)
- 8 L SIMPLICICAULIS (Bi. piodi. nov holl p. 564), glabia , caule simplicissimo tercli, racemo bccundo paucioloro , fohu, lmeanbiis deulalik leinolissimi Ian

- ccolatis, corolla* labio supenore baibalo, utriusque lauiniU acutis, capsula ciecta hinc gibbosiuscula.— Ill ins. "Van-Diemen, et ad fluraeu Cygnorum Novae Hollands (Hugel) — Bentb < enum. pi. nov. boll, aosl. occid. Hugel p. 74. Rapantium &imphicaule Piesl prodr. lob. p. 30. Planta Hugel senu-pedalis lecta annoa glabra vel minute pubescens, pedunculis dichotomis, lobis calycinis lougè acuminatis integris tabo longionbus, labiis corolla? valde inaequalibns (v. in b. Bemb.)
- 9 L. BBOWNIANA. (Rcem. el Sch. syst. 5. p. 71), glabra, canle tereti partum ranioso, racemo secundo, foliis hnearibus inferiobus dentatis, corolla; labio Aupenore ciliato, ntriusq. laciniis acutis, capsula hinc gibbosa.— In Nova Hollandia orient, intrà tropicum. L. stricta Br. prodr. p. 564 non Swartz. Rapuutinm Browniaumn Pre&l 1. c. p. 30.
10. L. HETEROPHYLLA (Labill' nov. holl. i. p. Si. t. 74* non Humb), glabriuscula, canle angulato simplici, lacerao secundo, foliis hnearibus crassiu&culis, imis obovatis integris, infcnoiibus dentato pinnatifidis,supenoribus&paucis integris, bracteolis lanceolatis acutis adpressis pedicello mli. medium biacteolato inol-toties brevioiibus, tubo calycis ovoideo lobis lanceolato-acutis , column A sta- uiineat lobis calycinis breviore, corollas glabiae labio sup. bievi, inferiore la-cinia media obcordata laterabbus obovatii. (l) ad oram merid. et occid. Novaa Hollandiae et in Tan-Diemen. — Brown prodr. nov. boll, p 564. Lindl. bot. reg. t. 2014. Bentb. en pi. nov. holl. austr. occid. Hugel p. 74. Rapantium belerophyllum Pre&l piodr. p 12. I⁴ lores majores quara in affimbis (v s)
- it. L. TENUIOR (Br. prodr. nov. boll. p. 564, non Bentb.) pilosiuscula, caule filifoiisi diviso, lamis pedancalifoiiibus uniflons, foliis infer, pinnatifidis ovatis, super Hnearibus tifidis integ^nimisve, coiollae labii inferioiis lacinia mediæ obcordata laterahbus dimidiatis, capsula subcylindriacea. —Ad liilora or. et occid. Novae Hollandia? intia tropicum. Rapuntiuu teuuius Pre&l prodr. lob. p. 30.
12. L. RAMOSA. (Benth ' in the botanist t. 9^), cnle ramoso subtereti adscen-dente foliis pedicellis calycibusque pilosis, foliis infei. iiregulariler pinnati-sectif lanceolatis acutis, super subintegns hneari-Ianccolaiis, iscemolaxo, pedunculis giacilibus, tubo calycis cylindraceo lacinias hneares subacquante, corollæ labiis valde insequalibus, lobo centrah mferioris maximo mucronulato lotundato laterahbus dimidiaii. % in Nova Hollandia propre fluyen Cygno-rom. L. tenuior Benth ! enum pi. nov holl. au-tr. occ. Hugcl p. 75, non Br. Planta diffusa 2-3-pedalis, none in hort. angl. culta. Lobi sup. corollas pilosi , infer, non baibati. Antlerae omnes pilosae. Cap&ula elongala subobliqua, cy-lindraceo-tnrbinata. (v. v.)
13. L. PARVIFOLIA (Br. piodr. nov. holl. p 564), glabra , caule subpaniculato tereti, raru &ubuiiflois pednucubfoimibus, corolla? labio &uperiore imberbi, iufcioiis laciniis oblongis acutinscnlis — Ad oram merid. Novae Hollandia?. Rapuntmm parvifoliuin Piesl piodr. p, 3i.
14. L. DOMIHGENSIS, glaberrima, caule erecto gracili simplici anguloso, foliis infeiioribus breviter petiolatis ova'Js remote denticulatis, supeirioiibus lan-ceolatis seb&ilibus senatis, pedicellis axillanbn& folio sublongioiibus imâ basi bibracteolaiis, biacteolis stipula^formibos lineaiibus, tubo calycis ovoideo basi subacento laciniis hnearibus acuminatis soblongiorc, corollâ laciniis calycinis vix longioie , antheris omnibus apice pilosiusculiscaeieum glabus. Qp in His-paniola (Beiteio¹). L. Heyniana paitira Spreng. syst. 1. p. 717 ? non Rcem.et Scbult. Planta debilis 8 poll, longa , similis L. tngonae sed foliis angustioii-bus. Flores parvi, racemo laxo elongato. Capsula obovoidca ^.3 |_m, iodga. (v...)
15. L. TRIGOWA (Roxb. fl. ind. 2. p. in), glabra, ramis diffusis erectis vel ad-scendentibns canleqe trigonis, foliis subsessilibus ovatis subcoidatis repandè dentatis dentibus mucronulatis, pedicellis gracilibus folio longioribus basi bi-bracteolatis, tnbo calycis obconico, lobis linearci-acuminatis tubo subaequali-ns corollâ minimâ glabrâ lobis calycinis suhlongioie, antbens inclosis om-

latis, infeiionbus bracteā subulatā longioribus, sopeioiibas brevioribus, calycis hispidi laciniis linearī - sabalatis patalis, corolla calyee tnplo longiore lobis soperionbas brevibas par vis, labio tufenore profunde tripaitito lobis ohlongis. % 5 habitat L. commutata Roe in. et Scb. syst 5. p. 36 non p. 73 Habitus plantae Capensis. Canlis (vel ramns) ligQosns. Folia vix 6 lin. longa basi 2 lin. lata, nervo inter emarginatur. im paruin piominente. Illores 5 racemosi subse- condì, coroll4 violaceā tubo albicante sublenle hispidulo, ant hens apice pilis a Ibis. Affinis L. hirsutae.

09. L. PINIFOLIA (Linn. sp. 1318), snffraticosa, fohis secandū ramos approxima- tis erectis linearibos integris inargme subrevolutis glabris vel pnbescenibus, peduncalis paucissubterminahbus folio vix longionbus bracteatis, calycis tabo hemisphaericō ut peduncali pilis adpressis sen ceo, lobis lanceolatis acuminalis corolla externe pnbescenente 4° breviobus. ^ ad Cap. Bonae-Spei piope urbeni, in montosis — Tbunb piodi. 2 p. 36. Andr. rep. t. iy3. Sieb.' beib n. 83. Rapunculus asthiopicus \ lolaceo galeato {lore, etc Breyn cent p. 173. t. 87. Rapunculus fruticosas fol. nervosis acutis, etc. Buim. afr. 3. p. 41. f 2. Ra- pnttium piuifuliuin Piesl ' prodr moa. lobel. p. 19. coinra. pi afr. Dreg. 1. p. 288. Moies violaceo-c.Biulei. (v. s)

3*). L. CHAMJEPITYS (Lam diet. 3. p. 5go), canle suffruticuloso folioso ramoso, fohis sessilibus lineaibus superne canaliculatis apice utuuque denfatis pilis Lievibuh birsutis, peduncuhs nudis i-floris giacilibus longissimis apice bracteatis, btacteis sqaani 1 form i bus angustis acutis, lobis calycmis di&tautibus acu- ininatis tubo obhquo longioribus, corolla basi lateralitei ventneosā. 5 Capnt Bonae-Spei Rapuntmm Chainaepityb Presl piodr. lob p 20 non Spreng. Cau- lis tenuis cylmdirurus Folia numeiO!»a 6-7 lin longa. Peduncuh caule longioies 6 pollicaias, cujus squamae minimac apicis veiisim. bracteae. Flores 6-lin. ex viol ace o caciulci. /, in herb. Renth)

Jr. L. PAUCIDENTATA, caule fiuticoso erecto ramoso tereti pubescente, foliis ap- pioximatissessihbns lmeaiibus obtusis remote paudentatis glabris, pedunculis terminahbus eMngatis pauciflois, pedicellis biacted lineaīi ciliatā triplo lon- gionbus biacteolatis, calycis tabo latimis lanceolatis acutis ciliatis duplo bre- vioie, corolla; limbo extus pubescente, ant hens omnibus apice pilosis j ad Cap. Bonx-Spei in paite infer, oiientali. Kapuntium paudentatum Presl piodr lob. p. ao, comm. pi. afi. austr. Dieg p. 289.

3a. L. cEBATOPHYILA , fruiicoso hirsnta , canle adscendente ramisqne terelibns, foliis sabsessilibos hnari-lanceolatis obtusis remote pmnafido-dentatis, den- tibus lineanbus callosis, pedunculis i-3-flous coiollaque glabris, bracteis pedi- cel lo bracteolato brevioibus bracteolisque linearibus cihatis, calycis laciniis linearī-lanceolatis obtusis cihatis tubo senceo-pubescente duplo longiotibus, antheris... ., capsnlae subglobosae valvis limbo calycis sequilongis. 5 Caput Bonae-Spei (Eckl). Rapuntiam ceratopbyllum Piesl comm. pi*, afr. austr. Dreg. p. 289. Af/inis L. tomenlosx, caeiuleae, Chamseptys et pautidentatae, ab omnibus diversa , ex Presl.

;f. *glabrata* (Presl 1. a), foliis glabris aut pilis rarisi, dentibas parvis.

33. L. CAPXT^IFOLIA, caulibns diffasis ramosis sabangulatis glabris, foliis sessili- bus setaceis integerrimis glabris apice callosis, raceino laxo basi ramoso, pedi- cellis bracteā lineaīi capilUcea sabbrerioribus pilosiascuHs basi bibracteolatis, calyee nervis hirsato, tubo ovoideo 10-striato laciniis liueari-aconiinatis bre- vioie, corolU velutina laciniis calycinis 4° longiore, lobis lanceolatis, antbens ommbns apice hir&utis dorso pilosis, capsula ovoideā. 7f? in regione occid. et austr. Capua Bonae-Spei. Rapuntiam capillifolium Presl ! prodr. lob p 19, comm. pi. aft a^{o9}tr. Dreg p 2gg L₀b_e sieb.! pi. exs. n. x3g. Corolla videtnr ex violaceo cajrulea (v. s)

;f. *velutma*, ramis divaricatis angulosis rigidis foliis calyceqnc puberulis pilis bievibus. — Caput Bonae-Spei (Verreaux in h Monc ')

3ij. L. IASIANIHA , caule erecto ramisqne tcretibos glabris, foliis sessilibus angus- tissiinc linearibus ciliatis apice callosis, racemislaxis paucifloris secundis, pedi-

tellis lii&pulii biacleau lineaiem apice callosani obtusam aquaulibus medio i bracteolatis, calyce liispidisswo , pilis patentibus, tubo benuspbaeuco idstriato lacinus setaceis brcviore, coiolla exius liusuta lacinus calycinis tuplo longioie, antbens omnibus apice baibatis % ad Cap Bonae Spei in montibus Giftbeig inter i500 2000 ped alt, (Dieg') Rapuntium lasianthuin Piesl' comm. pi afi austi Dieg p. 208 L capillifohae va4de aihnisi, sed flores majores et biacteola dneisa (v s)

35 L SIMSII (Sweet b but. p 247), caule adscendente, folu, lanceolatis pinnatifidis piunis soepuis bilu's acutis, in petioluin niayginaira augustati*, peduncr^ lis terminabus et axillanbus nudis a 3-flons, biacteis liueaubus mimiuis, pedicelhs biactei mulio longioubus medio a-3-bracteolnis, mbo calycis hcnuspha?nco lacinus lanceolato-acummalis subbreviore, coiolla lacinus calycinis o° longioie labns luaequalibus, lobis sup lanceolatis, infer oblongis, 2£adCap Bona. Spei L pedunculata Sims bot mag t aa5x non Br Rapuntium SimsiiPieslpiodi lob p 20 Lx ic phnta glabra, I coronopifuhae *alde aflinis,co olla basi purpuiasceus , lobis intense caemleis, Inleuouibus faure luteis

36 L. COROROPIFOHA (Linn, sp i322), cnlc basi decnmbente dense folio so piloso medi 1 paite eiecio in pedunculum nudum glabruni teretem a ilodium alennte, folns sessil bus lanctolalis deutato-pinnaliidis , dentiDUs oppositis pilosis, biaciealinearf-Kuininita ad apiceni peduncuh, pedicellis biactea mullo lougionbusniedio biaiateolatis uno teiminali longioie, tubo calycis ovoideo turbinato lusrido laiinns 1 mceol His dunidio brevioie, coiolla lobis ralyciuis j^ta longioie lobis sup lanceolatis mfei obovatis mucionulatis, autbeiisomm bus apice birbttis, o\wuo sublibero *^ad Cap Bonae Spei propenibem —Sims bot mag t 044 excl 13mm syn Tbanb il. cap p 184 Sieb' pi. ex* cap n 137 Buicb^ cat n 85 Lam diet 3 p 589 exel vai /f Rapuntium ^Ftbiopicum, etc Bieyn cent, t 8S Rapuntium coronopifoliuni Piesl^ prodi lob p. 20, in Mey, conim pi afi Dieg p 289 L Thunbergn Sweet b bnt p 247 Rapunlium Ibuubeigu Presl piodi p 20 Pih caulis foliorum <aly cisij alb) 1 ioies inagm, coiolla caerulea f luce alba (v s)

f' nni/^ora,glabia, peduncuhs 1 flons namerosis flore maximo ty dd Lip Bonae Spei Rapuntium folio longo profunde dentato floruni petiolis lonr gissimis Buim afi p q8 t 38 f 1 JL coionopifoha & Lam 1 c Au diveisa? an icon eirouea?

37 L CVLRULEA (Hook bot mag t 2701), caule hasi decumbente dense folioso, media pane eiecto in pedanculum nudum glai)rn m teretem 4 floium abeunte, foliii sessihbns lanceoLtisidentato pinnatiidis pubescentibus, iloubus laxe racciuosis nutantibus, bracteis hneaubus, pedicellis biat tea(j°-7° longio ribns, tubo calycis glabuusculi subnullo lacinns calycinis 8° longiore labns •aide inacqualibus, lobus sup lanceolitis, labio inf 3 paitito basi aogustaio lobis obovatis ictuso mucronatis, antbens omnibus apice barbatis, ovaou nubbheio ^adCap Bonae Spei in parte mfei anstiali — Rapuntium cacieuleum Presl prodr lob p 20, in Mey. comm pi afi austr, Dreg p 289 Floies maxim 1 ca?rnlei fwte lutei Pedicelli in ic cit nudi sed veie medio bibracteolati ut patet ex. *|erbo cl Pi esl 1 c

0 glabrescens, folns feie depilatis vel glabns Rapuntium cxruleum & Presl comm 1 c
y lahdens, folns paulo lationbus dentibus lationbns acntiusculis, bracteobs calycis approximatis Ripuntium caeruleum y Piesl ibid

18 L TOMKNTOSA (Linn suppl p. 3q4)» cinlibua adscendentibus basi fohosis cum folns velutino-tomentosis a medio in pedunrulum nudum teitem cladium i-a florom abeuntjbus, foliishneau lanccolatis margins revolutis apiçem versus ntunque 2-4 dentato lobatis, bracteis lineanbus ciliatis, pedicelli* bracteå tnpllo loDgionbns medio bibracteolais, calytis tubo pilis adpiessi^ hrito lacinus lanceolate acutis 1 nplo breviore t corolla ndpresse pilosinscula Incinns calycinis 6° longiore, labns \alde inaeqaahbus xnfr profunde trifida lobis oblongis antherisomnibnsapue pilosis, ovario sublibero Q^adCap Bonæ

Spei in pane austi ft oiiient (Dreg.' Kiebs') prope Algoa-bay (Forbes!). Ihunb. piodr. i. p. 40, (l. cap. p. 182. ftcem. et Sch. syst. 5. p 4G. Rapuntin tuiuentosam Presl' piodr. lob. p. 19, in Mey. comm. pi. air. austr. Dreg, p. 288. (v s)

fl milliflora, elalior 4-flora Rapnntim tomentosum Piesl 1 c sub litt. c. in pi Dreg.! 'Vidi in b. augl. Whitley et Milne bub nomine L. ex rule a Hook?(v. v.)

3g. L MACUI ARIS, caul 1 bus adbceudentibus basi foliosis pabescentibus, roedio fa pedunculos nados glabros 4-floros abeuntibus, folns sessilibus oblongo-lanceolatis dbtusls apicern veisusglabrii* utrinque i-3-dentato-lobatis basi snbeihatis mlegns, biateib lineaibus cilia tis pedicellis medio 1-2-bractcolatis bractea qnadiuplo longionbus, calycis tubo piloso lacimis lanceolatis acutis duplo bievioie, coiolla lacinus calycinis 6° longiore, labus valde ina;qualibus pilosiusculis, lobis smp acutis, infer oblongis, antberis omnibus apice pilosis, ovatio sublibero %, ad Cap. Bouae Spei, in parte inf orientali (Dreg ') Rapnntium maculate F*ej*i*T prodi. lob p 20, in JVley. comm. pi afr. austr Dreg, p. 288. Vi* à L. caerulea Hook, diversa, bed folia minus lobata glabiiscula et flores unnoies. (v. s.)

& *procera*, caile pcdnncnlisq longioribus llab cam pnore. Rapnntium macula re proceium Presl! I. c. (? s. in pi Dreg)

40. L GixxriLis (Andi. rep. t 340 uon Nutt), glabra erecta snbramosa, racemo laridoio secundo, folns infeuonbussubovalis incibo-pianatifidis, superionbus lineaManceolatis babiotegris, bracteis Imeaibus pedicello multo bievoribas, tubo calycis brevi, lobis subulatis tubo corollx illaraeatisq. aequalibos, labio corollae sop barbato brevi, inieriorls lobo inedio late aubquadrato, antberis omnibus apice pilosis. (L) ad Port-Jackson^Rr) et C.iput Bonae-Spc (Andi. et Sims ex b. angl. sed forsane eirore hortul). bims bot. mag. t. 741. Rapan- tium giacile Presl prodr. p 11. Lobelia dentata Sieb.' li. nov. holl. n. i79non Cav. L. pnbescens ejusdein in b. Duuant non Ait Corolla intense caerulea fance Intea, lobis inf. obcordatis araplis. Species obscura cujus specim. certa non vidi In plantis nostris à cl. Gaudicbaud et Sieber comraun. tabus calycis ovoidens potius quam hemisphaencus. Species, tit sequens et ahae, inter a sectiones cl. Piesl ambigua. Habitus L. gibbosae,beterophyllae, etc., ejusdem regionis. (v. s)

41. L. DENTATA. (Cav. ic. 6 p 14. t. 5*i), erecta glabria snbramosa, racemo sec undo, fohis mferionbus ovato-lanceolatis inciso-dentatis, supenoribus lanccolatis dentalis, Liacteis linearibus pedicello multoties brevioribui, tnbo calycis hemispbnEiico inaequali, lobis linearibus tubo coiollae diimdio bievoribus, corollae lacinus supei brcvibus glabriusfulis, inferiobus oblongis acutis# anthem omnibus apice pilosis (f) pi ope Port-Jackson. Br. prodr. Nov. Holl. p. 564 Rapnntium dentatutn Pie&l piodi. lob. p. ai. Corolla caerulea fauce albida. (l. s)

42. L. PTEROPODJL, caule erecto simplici tiiquetro glabro, foliia subcordatis in petiolum maiguatum ciliatum longe angustatis ovato-acutis giosse dentato-lotaiis dcntibas seu lobis callos>o-inucionuJdtis , laccmo puucifloro tciminali, pedicellis cum calycr pube adpressa hiisutis bractea linearis a°-4° longionbus tubo calycis bemisphaenco lacimis lineaibus acentis &ubbreviore, corollâ lobis cdlycuiis sextuplo longiore, anthensi omnibus apice barbatis, ovario infero ^ ad Caput Bon,e-Spei jn legione infer orientali (Dreg.') Rapuntium pteiopodium Presl' prodi lob. p. 21, in Mey comm. pi. afi. Dreg P» at). Corolla albida glabria. Folia radicalia non viili. L chainaedryfolia? valde afluxinis. (v. s)

43. L cnAMEDRYFOLIA, canle *adscendente* tnqurtio 1 amoso piloso, fohls obo- yatis oblnbis grosse dentatis dentibns mucionulatis ciliatis nervo subtus pilosis in petiolum marginatam angubtatis, snpenoribus oblongo-lanceolatis, race- mis termmahbns^ muhifloris laxifloris, pedicellis pilis adpressis pabescentibus bractea linearis 5° brevioribus, calycis tubo pubehcente hemispbarico laciniis laneeolalis acutis ciliatis duplo brevioic, coioltt tubnlosa laciniis calycinis

tiplio lonqiore, anlheiis apice omnibus baibatis, capsnlâ semi-snperâ If ad Cap. Bonae Spei in parte infei. orientali (Dieg.¹) Rapuntium chamxdiyfohnni PresP prodi. lob p. »i, m Mey. comni pi. afi austr. Dreg, p 290 Loiolla inmima albida glabia. Habitus, coiolla et ovanum seini-hbeium L Chffoitanx. (v s)

44. L. NUMMULARIOIDES (Cham.¹ in linn. i833. p. 109), herbacea glabia, cauibua angulosis piostiati\ apiribus floiffens .idscentibus, fohis carnosuhs ovatis coidaiis subieufonmbusq obtosis inlegeniniis vel obsolete bubsmauto-crenatis brcviter petiolatib subsessilibusque , pedicellis loDgis axillaribus tubo calycis semi clipsoideo, lobis lineaai-lauceolati> tubo coiollae paulo brevioribns, anthens doiso glabris apice omnibus baibatis, capsnlâ globosâ. — in BiasihA frequej. extia et intia tiopitam (Sellow' Lhotzky) Rapuntium nnumulaiioideb Piesl piodi lob. p. ai. Caules vix semi-pedales iiUfoiuies. Folia 3-5 lin longa Peditelli pollicaires. Coiolla tencia ceiulea vel violacea. Senuna tnquetio ellipric* Calyx pei antheun hM acutiusculus, sed cap- sold sabgloboia feie geneiis Piatias. An dehiscens? (v s> in h. Lindl.)
45. L. AQUATiLA(Cbim in linn i8i3. p. an), heibacea glabra,cauleerecto vel fluielantr craswuscno umphci vel tainoso, folns spaisis MMilibu. enct., abguste lanceolatis atutis obsoJete senatis, pedicellis axiltinbus folio duplolonglOllbUH, tubo hemi-ellips»ideo, lobis angustis atutib tubo coiollae paulo brcvioribus, anthens dorso glabns apice omnibus barbatis, capsulâ ellipsoideâ — in Brâsilia) palustnbis (Sellow). Rapuntmm dquaticum Presl piodr. lob p 21 Plant*, aquatica pedalis et longioi, foliit ieuu-pollic.tnbus. Lobi calycis liaeam longi tubo oequales Corolla cxrulea ^ el puipurea glabra Capsnla supeine libera , aim longa Seinina tiquetio-subsphaeroidea

§. 2. *Antherte 2 solium mferiores apice barbatce vel setis terminates
(ccsteris dorso nunc glabris nuncpilosis).*

* *Tabus calcis per antheun basi acutus, nempb Unean-obconicus, obcomcus vel turbmatus (i) Corolla ccrrulea vel alba.*

- 46[?] L RtxiFORMis (Cham in linn i833. p 210), herbacea, canlo aubcapilli idinoso lepente ladicante, foliis brewtei petiolatis suboibiculato-ienifoii-Dibul> obsolete angulaiis superne pilosi, pedieellib terminalibus axillaiibusque elongate hirtellis , calyce hutello, tubo obconico, lobis ovatis acutis patnlU COIONIC tubo dimidio bievionbus, anthens dor& glabris. —in liiasilia (Sellow). Rapuntium remfornie Presl prodi. mon lob. p. i5 Inter Muscos et Mariantias cespitoso-reptans, cespite sesquipollicait pedicellis pauci& pollicaiuba. Folia 2 lin lata piofuude coid.ita. lubns calycis 2 |m longus lobis duplo major. An 2solum antbeiaepeuicillatae"

47. L MEMDRAS^CEA (Br.' prodk" nov holl. p. 563), glabnuscula herbacea pro-combens, foliii subiotnndis repando-dentatis ineubianaceis* sobttmervibus pedicello brevioiibns, tubo calycib obovoideo, lobis subdentalis lanceolatl acutis longitudine tubi, coiolla whntiacæa lobis calynnis 5olongioie, laciuu, smnhbua lineaibu> — jd lutoia Novae Hollands intia trop.cum. Rapuntium[?] raembrauateum Piesl prodi. p So. Habitus L. putpuiastentiset geneii* nostiiPiddingtonje. Folia bievishime petiolata i-ij poll lata. Pedicelli axilla- res 2-polhcaies nudi. Cor. caerulea. (v s in h Bauks)

48. L. QUADRAW(utARts (Bi. piod. nov holl. p 56a), glabra herbacea, caule 4-gono adscendente, foliis ovatis dentatis subsessilibns pedicello i-4< bicviouibus, labiisupeiions laciniis angubtioiibus lmtanbus. % ad hitora Nova Hollandiae intia Uopimin Rapuntium quadiangulare Piesl prodr. lob p. 16.

49. L PURPCAASCENS (Br' piodr. B. nov. holl. p. 563), glabia heibacea 1a-mosa, ramib adbcendenlibus graciUhns tettagonis, foliis ovatu> subtus pallidio-

(1) Character saepe incertus, ad sectiones naturales coa&tituenduni minuncproprios, sed deficiente alteio et proptc copiara specierui hie adhibitub.

J 1ibus bieviter petiolatis inciso-serratis, pedicellis paucis axillaribns folio dinudio longioibus, calycis lobis hneaiibns tubo sub» dentatis, corolu lobis calycinis 4° longiore lacinus superionbus linearibus, anthens glabris 2 inf. apicc subpilosis — piope Poitum-Jackson Kapunliuin purpurascens Presl 1 c. p 17 Planta huuulis. Folia 3 lia. longa, 2 lin. lata. Woies nulli in axillis mpeiioribus Coroll 1 rosea intetne alba Capsula nunquiin dehiscens in speci/n mini nods, ei»q kabitu Piatia>,.&d raatimtate per feel d obsen.iuda. Calycis tubus inilio flora lioms obcomcus pedicello continuus, per flotatlonem ipsara incrassatus hemisphaeucas, iiaque species media inter sectiones cl. Presl. (v. spec h Gaudith à cl. Dr nuncup.)

fi. ilicifolia, caule basi radicante, dentibns folio rum rigidis, pedicellis folio tnpl qnadiuplove longioibus arcuatis, lobis calycinis lacimato-dentatis apice leflexis. % ad Cap Kome-Spei (forsari enoie hoitul.). L. ilicifolia Siros (uec Kei) bot. mag. t. 1896. Rapuntium purpuid&cens Presl 1. c Corolla ex ic. cit.soidide c.tiae, ex caineo viie^ceos, ic&cupinata (ex Sims), ut in geneie Paiastiantbo, sed cb.uactr non ceitus. Capsula nondum matnra globosa biloilaiis cainosa (ex Suns), (v. s ex b Par)

y. Calyce liirsnto —Culta in b. Goink L. ilitifolita Roc in. et Sell sy&t. 5. p. 6J. In tf et ft folia Mib lente non temper glabria &d bupeine pilosiuseula, pilis breviboit.

5o L auGULOsA (Oiab.¹ iuEdinb new pbil.jonin. dec. 1829), glabiabeibacea, caule piocumbentis diffuso lainoso, lamis giacilibus sulcalis, folus brevilei petiolditis ruinudatis bail cuneatis icpaude dentatis, ptdicellis axillanbus pancis solnaiiii folio multoties longionbus, tubo talycU ovoideo lob/s subnlatib lutebris sublongiore, coinllâ palenle lobi^ obovafis latciahbis bievio- bus angu&lioribus, authens omnibus apice seiaceis— e Novâ-Zealandia cult, inhort. butann Rapuutimn 1 ugu 101 uruPresl prodi p 3o Planta humiln,, caule ra.iculato, foliis rrgulosis membrauaceis 4 lin longis Axillae supenoie* non fJonfeix l'loies albi ex llavo et puipuieo stiiati. (v. s.)

5i. L CESPITOSA (Blum ! bijdi. tot floi. Ned. Ind. p 729), liebacea glabia, caule tetragouo diffuso piocumbente giacili, foliis sessilibus elljpticjs lanceolatisqoe obtusis, supenoubus sinualo-denlatis, pedicellis rarisi axillaribus folio 3-5« longioibus nudis, tubo calycis longe obconico lobis basi subdentatis longiore, coiollâ lobis calycinis 5o longioie, lacimis sup lincanbus, antheris glabri 2 inf penicillatis —in giammosis ad pedem montis Cede ins Jaice Rapuntium cespito&cum Piesl 1 c. p. x3. L purpurascenti valde affinis sed fohti luinora rainusque denlata Capsula veru>inuliter longe obovoidea. (v. in h. in us. Pai spec, à cl. Blum miss)

5a. L. LITTORAI is (R. Cuningh ined), glabra herbacea, caiWe piostrato ramoso, rainis giacilibus angulosi*, folus lolundato-ovatis anguloso seiratis bieviier petiolatis, pedicellis peucis solitarns axillanbus folio dimidio longioubus, tubo calycis obovoideo, lobis acuminatis tubo aequalibus submtegris, corollâ lobis calycinis tuplo longioie, laciniis sap. linearibus, iufei. obovatis, aniheiis glabns 1 inf. apice setaceo-pilosis. — in No\â Zeelandia prope flumen Keii Kei' Planta hunulis hnbitu Praiae vel lysiporaatis. l^olia saepius rotunda 5.-^.-angulata 3 hn. lata, nunc ovata Floieb albidi? Affinis L. puipurascenti. (v. s. comm. à cl. A. Cunningham)

53 L. AWGUTATA (Foist, piodi. n. 300, caule prostiato simplicissimo, folnssnb-rotundis repando-denlalis, pedicelbsi axillanbus solitaib unifloris. — in Novâ Zeelamliid. Rapuntium? angulatum Presl prodr. lob. p. 3o. L. repanda Mill. diet ed. Martyn, n. 33.

54. L- FLUVIATILIS (Br. prodr. fl. nov. holl. p. 563), repens glabrinscnla , ram is adscendentibus, folus ov.ibbus senatis subciliatis, pedicellis ebraciealis cum calycibus ovaiiUque pubescentibus, staraiuibis epipetalis. — pi ope Portum-Jackson. Rapuntium? fluviatile Presl piodr p. Jo. Ex speciminibus Gaudich. pedicel 11 nunc folio breviores nunc longiores, folia nnn senata nunc integra 1 aim angulosi, tubus calycis elongates o\oideus, lobi lineares, corolla nil-

- nima albida? lobis ealycinis quadruplicata longior. Antherae glabrfc, 1' inf. apic. setis terminate, (v. 9. rx cl. Gaudich.)
55. L. IICUNDATA (Br. prodr. fl. nov. boll. p. 563), repens glabra cespitosa, folii* subrotundis dentato-rcpandis pedicello ebracteato glabro longioribus, calycis laciniis tubo corollae parum brevioribus, slaminibusepipetalis.—propè Pormm-Jackson. Rapuntium? iuundatum Presl prodr. p. 30. L. fluviatili adeò similit ut forsitan varietas ex eel. Brow.
56. L. PEDUNCULVTA (Br. prodr. fl. nov. holl. p. 563), i-epens parnm pubescena, ramis adscendentibus filiformibus, foliis remotis ovatis angulato-dentatis suh-ciliatis, pedicellis longissimis minutè bibracteatis. — propè Port-Jackson. Rapuulium? pedoncalatum Presl prodr. p. 30. Stamina at vulgò epigyna.
57. L. IRRIGUA (Br. prodr. fl. nov. holl. p. 563), repens mnscosa glabra, folii* crassiusculis subrolundis dentato-crenatis petiolatis, pedicello ebractealo longioribus, lobis corolla; subaqualibus. — in orà uierid. Novae Hollnndix et in Van-Diemen. Rapuntium ? irrigum Presl prodr. p. 30. Slamiua at vnlgo epigyna. An certè Lobelia?
58. L. SUBMERSA (Cunningh! ined.), hamillima glabra radicans, foliis obovatis petiolatis subiut[«]gris obtusis, pedicellis axillaribus folio longioribus, tubo calycis pyriformi, corollâ . . . — in aquis fluminis Keri-Keri Novae Zealandiae. Planta tota bipollcaris. Radices filiformes ramis longiores. Folia 2-3 lin. longa. Mores in spec. truncati. (v. s. coimm. à cl. A. Cunningb.)
59. L. REINWARnIANA, caule di'cumbente debili 3-alato, foliis ovatis acutias-culis dentalis cariilagineo-marginulatis ntrinquoè paberulis in petiolum dilatum foliaceum angustatis, dentibus calloso-mucronatis, pedicellis axillaribus folio ferè duplo brevioribus, calycis tubo turbinato iaciniis lanceolatis acutissimis ciliatis patentibus breviore, aulberis a iufer. barbalis. — in Java? L. tri-queta Reiuw. mss. Rapuntium Reinwardtianum Presl prod*, lob. p. i4* An à L. trigona Roxb. diversa? Specimen Javanicnm adest sine nomine in herb, nans. Par, (a cl. Leschenault)cum prwsenti congruens, soltum lobis ealycinis tubo non longioribus.
60. L. SUBINCISA (Wall.! list. p. 35. u. 1310 non p. i58), glabra, canlesnberecio ramoso cum ramis trigono, foliis ovato-acutis in petiolam brevem marginatam apastatis dentibus raucronulatis, pedicellis gracilibus folio lanceolato longioribus basi biglandulosis, lubo calycis obconico laciniis acuminatis subxquali, corolla minimâ glabri lobis ealycinis vix longiore, antheris inclusis 2 inferioribus apice penicillalis, capsula obovoidea valvis lobis ealycinis dimidio brevioribus. (I) in regno Avu; (Wall.). L. trigona Wall. list. p. i58. 11. i3og. litt. M. non p. 35. Maxim I* af/jnis L. trialata; Mam (supra, n. 16), facilèque primo aspecta confusa, sed antheris 2 soltum pilosis. Corolla albida? Racemus partum foliosus , bracteis saepè cum pedicello basi conuatis. (v. s.)
61. L. ARENABIOI^{ES}, glaberrimu , caule erecto ramisque angulatis , foliis ovatis obtusis remotè inucronulato-serrulatis in petiolum brevisimum angustatis, pedicellis axillaribus folio lanceolato obtuso serrulato duplo brevioribus, calycis tubo turbinato laeinias triangulares acutas erectas scqnante, corolla labii lobis obovatis, antheris 2 inf. barbatis. (t) in Nepaliâ. Rapuntiam arenarioides Presl prodr. lob. p. 17.
62. L. BERLANDIERI, hnmilis gracilis, caulinis pluribus adscendentibus ramosis vfl simplicibus^lxvibus basi pilosiusculis, foliis remotè sabdenticulatis pilosiusculis, radicalibus rosulatis ovatis vel oblongis petiolis limbo brevioribus, caulinis raris sessilibus lanceolatis, pedicellis axillaribus filiformibus, bracteis linearibus pedicello multoties brevioribus, tubo calycis glabri obconico, lobis linearibus erectis integris corollâ triplo brevioribus. L. circâ Tampico de Tamaulipas (Berl! n. 106). Plania 3-polhc. Folia radic. 6 lin. longa. Corolla albida? parva lobis parum inter se diversis angnslis. Geuitalia iuclusa, antheris omnibus vix pilosis infer, subpenicillatis. Capsnla obovoidea elongata. Habilus L.Nuttallii sed minor el calyce diversa. (v. s.)
63. L. h. tpioloiD^s, densè pubescens, caule pro^liato lamo-so angulato, folii*

ovato-lanceolatis obtusis remote denticulate in petiolom angustatis, infimis obovatis, pedicellis ancipitibus folio xqualibus, calycois tubo tuibinato lacinias lanceolatas acutiusculas erectas aequante, capsula? \alvis brevissimis. % in ins. Mauritii. Rapuntium telepbioides Piesl prodr lob. p. 18.

64. L. MADAGASCARIENSIS (Rcem. et Scb syst. 5 p 67), glabra, canle raraoso adscendente alato, folns decanentibus, infeiionbus ovalis seiratis subacutis, auperioribus lanceolatis denticnlalis pedicellis sublonpioubus, lobis calycinis setace is tubo comco acquahbus, corollâ calyce longiore lobis superionbus linea-jil>us inferioribns ovatis raucronalis, anthens 2 inf apice baibatis. *If* in ins. Madagascar et Jobanneae. Spreng. syst. 1. p. ^g Boj.' b. maur. p 1 g3 L. decunens b. Wild non Cav Rapantium platycaalon Presl prodr. lob. p. 14. L. alcta Lepcrvencbe! et Boa ton ined. non Labill. Habitas L alat^e sed callycis tubas bicvior. (v. s.)
65. L. FiLiroRMis (Lam. diet. 3. p. 588), canle ramisqne gracibus soberertis, folns denticulate, imis oblongis lanceolatisve, mediis supercionbusque lineaubns pedicello longioribus, tubo calycis obconico, lobis linearibns acntis tubo longioribus, lobis sup corolla; linearibus infer. obo\at>s, antbeus pilosiuscnlis e infer, apice barbatis. *If* in Mauritio et Boiboniâ secus vias ant in arenosin linmidis (Bouton! Bory) et in Madagascar, piope Tannanarivon (Bouton! I3oj!). L. polymorpba Bory voy.il. Afr. austi 2. p. i38 var. a et ^ L. berpens Bouton ined Boj. h. maur. p 193 non Lam. Rapuntium filiforme Presl 1. c. p. 18. "Variat caule foliisqnc glabns vel pubeiulis et longitndine pedicelloium (v. s)
- 0>. *Luzoniensis* (Roem. et Sch syst 5. p 61), tabocoiollae longiore In insula Luzon L. ilifoimis Cav. ic. b. p. 7. t. 511. An vere eadem species quam in insulis Aiiica austiabs^p
66. L. sEirENs (Lam diet. 3. p. 588), glabra, caule prostiato subramoso, foliis ovatis creuatis, pedicellis folio subbrevionbns, tubo calycis obconico laciniis linearibus. — in ins Mauritii et Dorboniae Sicb ' pi. exs. inaur. 11. n. 367. Rapuntium seipens Piesl prodr. lob. p. i5. Planta cl. Sieber annua? bumilis, caule raniisque angulosis, iobis infer, lotundatis cienatij>, sup. lanceolatis denticulatis, lobis calycinis tubo aequalibus, corollâ caeoleâ simili L. tiliformi, aatberis % infer apice baibalis (v. s)
- &. *cheiranthifoha*, foliis linear-lanceolatis acutiusculis, flonbus secundis, pedicellis tolio duplo bievoribus, calycij> tubo laciniis duplo brevioie, corollae tubo fauceque ciebre maculatu>. */£ in ins. Mauritii. Rapuntium cbeirantifolium Presl 1. c. p. i&
- y, *pedicellata*, caule ramisque angulosis diffnsib patentibus, foliis lanceolatis ovatisve ciennlatis maigine saepe levolutis obtusis pedicellis folio longioribus *If*. in editionbus Borboma3 (Bouton! Bory) et rupestribus Mauiitii (Bouton! Bojer) L polymorpba Boiy, voy. il Afr. austr 2. p. 1^8 var y et f. L bicolor Boj. h. maur. p 19J. non Sims L. polymoipba Willd. herb, ex Boiy Roem. et Sch. syst. 5. p. 6S³ Rapuntium Boiyannm Presl prodr. lob. p. a4 ? Lobi calycini latioies et breviores quam in L liliionui. (v s)
67. L. ECKLONIANA, glabernma, caule debih decumbenteiamisque angulatis filiformibus, foliis in petiolnm angu&tatis acute dentatis, infer, spatulatis obtusis, medus oblongo-lanceolntis acutis, floialibus linear-lanceolatis apice 3-deutatis, pedicellis axillanbus capillanbj. folio bievoribus, calycis laiimis lanceolatis acuminatia tubo tnrbidato aeqmlongis, corolla? lacinus lobisque lanceolatis acutis subinaequalibus, antbeus 2 iuf setuloso-b.trbatis. (f) ad Cap. Bonac-Spei in montibus Diakensteenbergen, non procul ab urbe. Rapuntium tcklonianum Pieil in Ltkl. pi. cap. et in Mey. comm. pi afi. Dieg. p. 286. Folia 4-6 liu longa, a-x l,u l_{dia} [lores par\i.
68. L. BEILIDIKOLIA (Ihunb ' piindr p. 40 non h. Kew.), cau'e herbaceo filiform! crecto simplici pilis albis hiito, foliis dentatis hirsutis, infer, petiolatis obovatis obtusis sup. sessilibus linearibus acutis, pedicellis jxillaiibus et tcuninalibus capillaribus ilexuosis coiopiessis folio longionbus, calyce glabio, tubo obco-

nico lacinhs linean-acuminatis snbintegris breviore, corollā lacinhs calycinis iriplo longiore glabiā labns valde inaequalibiis, antbens apicc pilosinscolis a inf. barbatulis <J> ad Cap. Bonae-Spei (Thunb), in graminosis oient. colonis (Dreg) Thunb ' fl. cap p 183 Roeiu et Stbult syst. 5 p. 44 excl.syn h.Kew.L.belbdiflora Lin. f' suppl. p 396 Rapnntium belhdifolium Piesl prodr. lob p. 15 in Mey. comm. pi. afr. austr. Dieg p 287. Planta 4-5-pollic. Corolla azureae labinin mf. basi uiaculatum (v. s in h Linn.)

A.glabrata (Piesl' in Mey. coinra. pi. afr.Dreg. p. 287), glabnnscnla, lobis calycinis vix dentatis (v. s)

fī. hirsuta (Presl' 1 c), cauhs angulosns subpedalis superne raraosns, cum folns pilosus, pilis albis patenhus. Folia sessilia snbdeennentia dentata f inf ovato-acuta, sup lanceolato-acnminata I lores snbpamrulati. Pedicelli glabrat compressi Calyx glabriubculus, tubo obcomco, lobis acuminatis dentatis tnbo duplo longionbus. Corolla lobis calycinis daplo longioi azarea, bilabiata , lobis exteine pilosis, labiis inaqualibus, antbens dorso pilosis, 2 inf. apice barbatis. (v s)

69 L scxnRiPEs, cauhbus angulosis basi scabriuscnlis superne denndatis, foliis infer obovatis breviter petiolaiis dentatis margine revolutis, inediis sessilibns lanceolato-hneanbusseriatis glabns, racemo laxo terminali paucifloro, pedicellisbiacicā hneari denticlnatā duplo tnplove longionbas ancipitibus letror-sūm snb&cabris, tobō calycis glabn bcabriuscnh obconico, lacmiis hneanbus acntis basi utrinqne i-dentatis tubo wquahbus, coiollā lacinus calycinis tnplo longiore plabrà, anthers dorvopiloMs 'x mf apice baibatis. (f) ad Cap. Bun^-Spei, in inontibus Kalbeig regionih sup orient. Rapunliuin stabnipes Presl' piodr lob p. 17, in Mey comm. pi afr. austi. Dieg p 287 Tatiat caule simplici erecto vel ramo&o decumbente, folhs inf. pilouš vel glabiis. (v » corona, à d. Dreg, et Krebs.)

70 L MICRODOW, caulinbus erectis tetraquetrib ramosis basi pubescentibus, foliis inferionbns oblongis obtnis in petiolum bievein angustatis repande seirati* pnbescentibus petiolo prxteied pilosiustulo, snpeiioubus rans bessihbus liue. - nbns glabns remote calloso-serrulalis, pedicellis ancipitibus biacteā //longior)bns, «alycisinbo tarbinato lacinhs lineanbus acnininatis subdentatib longiore,' corollas lobis & ap hneanbns tenuissiims, inf. ovato-acutis majonbus, antbens pilosis 1 infer apice barbalis. (JjadCap Bonje-Spei minontoshumidis Paarlb erg «t graminosis orient propeKacbu (Dreg •) Rapuntium micodon Presl! pr lob p 16 in Mey corani pi afi. ansti Dreg p 287 Lob BurchJ cat pi afr austi. n 102. Planta 6-i5 poll, gracilis Coiolla casrnlea lobis calycinis tnplo longior (v a comra a cl Dieg. et Buich,)

71 L. NATALEHSIS , glabra, caule sobsimplicj ttraquetro flexuoso, foliis sessili- bns lmearibus obtusis lemoti acute callosoque &errulatis Inhinis lamcolato- oWongis senatis l>asi angustatis, racemo laxo, pdiceWis fjlifoimbus biacle.1 lincau denticulatā tnplo lougionbus, calycis tubo tmrbmato lacunis lineaughus urulis breviore, antberis 1 inf apice baibaus. (jj* prope Poit-Natal Kapuum- tium flexuosnni Presl prodr. lob. p 16, in Mey. comm pi afr. aastr Dreg p. 287.

72. L. AiGOExrsrs, cauleflexuosodeblhtctraquctro mfenie simplicipilososupeinc ramoso glabro, fohis sessilibus, infer obovatis obtusis pilosis dentatis, supe lanceolatis acutis glabrinculis calloso-scnatis , bracteis linoau lanceolatis snbintegriH glabns, pedicellis ancipitibus br<ictiā nnilito longionbnsbasi bibrac- tcolatis, biactehs glandulifoimibus, calyns glabii tubo tuibinato l.icimis lanceolatis acuminatis dimidio brcvioie, corollā glabra lobis calycinis duplo longiore, anthers pilosis 2 infer baibatis (J) ad Algoa-bay Africa aunti (Foibes) Canlis semipedalis Pili albi p.itcnles 1 olia itna veiisim petiolata. Lobi calytini inlegri basi .mguslaii uicdlo latioics (juuai III afJUnibus. (v t> comm ab bon sor. bort. Lond)

73. L ACOTAMGULA, glabra, caule ramoso flexuoso aculc tiinuetio, foliis ses- silibus hneaii-lanccolatis utnuque acutis remote aculo divaricatoq dentalis uliat¹⁸ angastissiinc decarrenlibi^, supienus lineaibus, laceino sctuudo,

pedicellis bracteâ triplo longioribus, cnlycis tubo tnrbinato laciniis linearisetaceis patentibus basi utrinquè unidentatis aequilongo, corollae labii lobis obovatis, untheris a infer, apice barbatis. (J) ad Cap. Bonue-Spei. Rapuntiura acutangulam Presl prodr. lob. p. 16.

74*. L. TRIQDETRA. (Linn.! maur. p. 1a0), glabra, canle erecto ramisqoe laevibns obscurè trigouis, foliis sessilibus linear-lanceolatis grossè et inaequaliter dentatissuperne raris, racemo coarctalo terminals, pedicellis hractea¹ lanceolatS sub-integrâ duplo longioribus, tobo oalycis obconico lobis linearibus aequali, corollâ lobis calycinis triplo longiore glabrâ, amheiis hiisutis 1 inf. barbatis, capsulâ ovoideo-elongatâ. (I, ad Cap. Bonae-Spei iu regione infer, occid. et ausir. Thunb. fl. cap. 2. p. 4&- Lam. diet. 3. p. 58Q, non Sieb. L. capiuala Burin, prodr. 25. Rapuntiura triquetrnni Presl prodr. lob. p. 16, in Mey. comm. pi. afr. anslr. Dreg. p. 287. Lob. Rurch.! oat. pi. afr. austr. n. 84. L. heteromalla Sclirad.ined.? et hort! Uapuntium bctermalluin Presl prodr. p. i5. L. debiiis Eck! in h. Dnnant. Canlis nunc simplex. Flores caerulei parvi, racemo corymbi/ormi post anthesin elongato. (v. v.)

(6. *comosa*, foliis linearibus, spicâ terminali foliosâ bracteis longitndine flornm. (T) in Africâ. Olim culta in h. Amstel. L. comosa L. sp. i3'i3, h. cliff, p. 5oo non Cav. L. corymbosa Berg. cap. p. 344 non Grab. (v. s.)

75. L. OTTONIANA, caulis adscendentibus angnlosis snbalatis foliisq. glabris, foliis obovatisrepando-denticulatis in petiolum angustatis, superioribus sessili-bua linear-lanceolatis remotè acutèque denticulatis, floribus racemosis, pedicellis bracteâ longioribns calyceque pnberulis, calycis tubo obconico laciniis ovato-triangulares acatas superante, antberis 2 iuf. apice barbatis, capsula cylindracea. (fj Hab... . Rapuntiui Ottouianum Presl prodr. lob. p. 14.

*/G. L. PDBESCENS (Ait. h. kew. ed. 1. v. 3. p. 49S), tota birta, caule ramo-hiss i mo ramisq. angulosis, foliis inferioribns obovatis breviter peliolatis grossè crenatis, supe\ lanceolatis serratis aculis sessilibus, pedicellis folio duplo Tri-plove longioribus angulosis, tubo calycis ovoideo-obconico laciniis lineari-acuminatis aeqlali, corollâ laciniis calycinis triplo longiore, anlberis pilo-siuscnlis 2 infer, apice barbalis. If, ad Cap. Bonjp-Spei prope' orb em. Jacq. h. Schocnbr. 2. t. 178. Thunb. fl cap. p. 18 f. non Willd. L. alyssifolia Salisb. ic. slrp. rar. 19. t. 10. Rapnntiui pubescens Presl prodr. lob. p. 17 (excl. syn. R. hirsntnm Mill.), in Mey. comm. pi. afr. austr. Dreg. p. 287. Kam^t diffusi. Corolla alba tubo et antheris caerulescentibns. (v. s. c. et spont. à cl. Dreg, comm.)

7j. L. cuWEFOLRA. (Link et Ott. abild. h. ber. t. 39), caule decumbente ramoso angulato birsuto, ramis apice glabris, foliis inaequaliter serratis, infer, peti'o-latis ovato-acutis subcordatis, super, sessilibus ovato-lanceolaiis, racemo terminali, pedicellis bracteâ linear-i integrâ duplo Iriplove longioribus glabris, tubo calycis glabri ovoideo-oboönico laciniis divergcnlibus linear-i-a'cuininatis dimidio breviore, corolla laciniis calycinis plasquan duplo longiore. If. ad Cap. Bonae-Spei. Rapuntiunm ovafrn Presl prodr. lob. p. 16- Canlis semi-pedalis. Folia plerumque glabra. Corolla glabra pallidè caerulea lobis labii inf. basi interne macalatis. L. repenti Thunb. valde affiu.s, nee forsan diversa.

78. L. HEDEACEA (h. kew.! ann. T830), glabra, canle adscendente 3-4-gono-anperne ramoso, foliis late ovalis obtnsis in peiiolnm marginatura augus-tatis crenatis, irais rotundatis snbintegris sdperjoribns lanceolatis dentatis, crenis dentibusque macronnatis, pedicellis ancipitibus bracteâ linear-i-dentata dnpllo longioribus bad biglandulosis, t'l^o calycis obconico lobis linearibus breviore, corolla lobis calycinis vix dimidio longiore, anheris 2 inf. apice bar-batis. . . . — Hab... . L. arguta bortul. Belg. el Genev.! Habitus L. pubesceutis sed gisberrima, floribns majoribns et charact. diversa. Planta herbacea 6-10 poll., pedicellis 1 $\frac{1}{2}$ poll. racemo laxo. Corolla pallidè cærulea, lobis sup. mino-ribns linear-i-lanceolatis subciliatis, inf. obovatis majoribns mucronulatis. (v. v.)

79. L. ERIKUS (Linn. sp. p. i3ai non Sims.), glabra, canlibas ramosis diffasis adsceockntibas snbteretibus, foliis subdentatis, radicalibus obovatis in petiolom

brevem angustaiis, caulinis lanceolatis sessilibus, pedicellis terminations et axillaribus bractea linearis wibinlegrā duplo triplove longioribus anticipiibns basi biglandulosis, tubo calycis ovoideo-obconicolaenius linearibussuhbreviore, corolla laciniis calycinis dimidio longiore, lobis anp. Innceol:nis, infer, ovalo-acutis, antheris pilosiuscnlis 2 iuf. apice baibalis. (?) ad Cap. Bonae-Spei. Tbunb. prodr. p. 40, fl. cap. p. 179 (partini) non fl. jap. Rapuntiam fcnnns Mcench. meih. p. 655. Presl prodr. lob. p. 17, in Mey. comm. pi. afr. anslr. Dreg. p. 287. Florescterulei minores qnam in L. bicoloři. Ab eā differre videtur praecipue radice annnā, glabritie et corollā breviore. Descripti specimen olim in liorlo Lugd.Bat. cultui sub uomine L. Krinus. (v. s.)

jg. I'oliis omnibus lanceolalis, pedicellis folio vix longioribns.—Campanula minor africana Erini facie flora viobceo caulinis erectis. Herm. h. Lngd. Bat. p. 110 t. i n. Annua videtur ex ic. Quid sit L. Krinus Lam. diet. 3. p. 557, annua non omnino grabra, quero? Linnaeus forsan diversas species miscuit sub nomine L. Krini ut mouet cl. Sims t. 901. Thuubergins quoque plantain diversam villosam sub L. Erino confundit.

80. L. BICOLOR (Sims bot. mag. t. 5i/#), lenuissimè pubescens, caulis ramosis

~~patens angulosus, foliis linearibus sessilibus, terminalibus et axillaribus basi biglandulosis tubo calycis ovoideo-obconico laciniis linearibus subbreviore, corolla glabrii lobis calycinis triplo longiore, lobis sup. lanceolatis, infer, ovato-aculis, anberis pilosulus i inf. apice barbatis.~~ 1L ex Willd. et Sims ad ic. 901. Ad Caput Donee-Spei propè urbem. L. Kiinus Thunb. fl. cap. p. 179 (pariūm) Sieb! pi. cap. n. i38. non Linn. Rapuntinm bicolor Presl prodr. lob. p. 17, in Mey. comm. pi. afr. austr. Dreg, p. 287. Corolla caerulea ad faneem albido-lulea. (v. v.)

16. p rostral a glabriuscula, foliis infer, plabris petiolis lanatum ciliatis. % L. bicolor Willd. enum. h. ber. 1. p. 218. (v. v.)

y? lobis inferioribus corollae amplioribns. ty L. Erinns Sims bot. mag. * 901- Ex glabritie et radice pcrenni ad prxsentem speciem potius quam ad Eri-nnm pertinere videtur.

Si. L. SIMPLEX (Tbunb. prodr. 1. p. 39), canle herbaceo filifurmi siraplici-erecto pařum piloso, foliis sessilibus linearibus villosis margine rrflexo iucras-satis, pirdicellis axillaribus et terminalibus capillaribus folio longioribus, calyce villoso lobis lineari-lanceolatis. (ij ex Thunb. (2) ex Ait. b." kew. ed. 2. v. 1. p. 367. Ad Caput Bona?-Spei. Thunb. fl. cap. p. 178. Jlapunliura sim-plex Presl prodr. lob. p. 17. Caulis palmaris. Folia unguicularia, corolla coerulea.

82. L. BRACTEOLATA, caulis decumbentibus flexuosis ramosis cum ramis angulosis pilosulus, foliis sessilibus oblongis acutis basi longè angustatis re-motè acutè dentatis subpilososis, supremis linear-lanceolatis acuminatis integris, pedicellis foliis oblongis acutis basi longè angustatis subpilososis, supremis linear-lanceolatis, bracteolis capillaribus, tubo calycis glabri obconico elongato lobis linear-acuminatis subbreviore, corolla lobis calycinis dimidio longiore, anberis pilosis 2 inf. apice barbatis. % Pairia.... L. Erino et bicolori valdeaffini, verisimiliterq. in hortis sarpecum illis nixta. Folia sparsa pauca. Corolla glabra similis ic. 901. bot. mag. sed minus caerulea minu.sne in fauce alba et ad basin loboruñ infer, macula caerulea notara. (v. v. in b. Genev.)

83. L. DREGEAWA, glabra, caule à basi ramoso, rainis debilibns adscendentilms angnlatis, foliis obovalis oblongis remotè dentaris, imis petiolatis, superioribus sessilibus, raceinis t;longalis inullifloris, prdicellis bracted ovato-acuia sub-dentata duplo longioribus, tubo calycis ovoideo-obconico laciniis ovatis acatis snhbrevioie, corolla laciniis calycinis triplo longiore lobis lanceolatis anhe-bris glabris 2 infer, apice penicillatis. (1) ad Caput Dooae-Spei, in vallib's bomidis regionis superioris (Drege!). Rapunliuni Dregeanum Presl! prodr. lob. p. aa, in Mey. comm. pi. afr. austr. Drege p. 290. (v. s.)

84- 1>. LIMARIOIDBS , glabria, caule ercto raniosissimo rnmisfjuc angnlosis, foliis

imis obovatis obtusis in petiolum angustalis obtuse dentatis, mediis sessilibus linear-lanceolatis acutis remote dentatis, biacteis lineaibus* subdentatis, racemo laxo multifloro, pedicelhs bracteā triplo longionbus gracilibus, tabo calycis ovoideo obcomeo laciniis lineaibus acutis denticulatis diradio bieviore, corollā laciniis calycinis duplo longiore, antheus pilosiusculis 2 in f* apice barbatis, capsula obovoidea (I) ad Caput Bon-E-Speii paite infer, orient.(Drege¹) Rjpuutmm hnarioides Piesl' prodr lob. p 22, com in, pi afr. austr. Drege p 290 Herba 4-5-poll. basi denudata superne ramosissima, flonbus parvis albidis? tubo calyci* ut prjecedentis (qua cum tameu non affinis), inter sect. I et 3 cl Piesl ambigao (v. s.)

85 L. SENECALENSIS, glibia ramosa, caule erecto 1 amis adscendentibns, foliis sparsis linear-lanceolatis obtusis serratis dentibus subcallosis, pedicelhs axillaribus bracteā hnean subaequahbus, tabo calycis ovoideo, laciniis linearibus corolla laciniis calycims 4° longiore, lobis superioibns hneanbns puberuhs, inferioibns ovatis, antheris pilosinscohs? mfei apice barbatis, capsula obovoidea. (I)in Sencgalia L tnquetia Sieb' pi. seneg. n i5 non Linn Planta pedahs heibacea Folia 1-2 poll longa, i-3 lin lata. Illores pauci ccerulei? in axilhs supenoribus Pedicelli accrescentes post anthesin braoteā longiores.

(.. .)
S6. L. URKN9 (Linn ' sp. i52i), caule erecto simplicissimo, foliis basi approxiratatis, infenoribus oblongis obtusis crenatis in petiolum augnstatatis mediis lanceolatis dentatis acutis sessilibus, bracteis lineaibus acuminatis subintegns flore subsessili dimidio hreviobus, tubo calycis longe obcomco, lobis hneari-acorainatis tobō corollae dimidio brevionbus, corolla antheiisq; pilosiusculis, antheus 2 infer, apice pemcillalis (T) in paludosis et hamidis Angliae merid , Galhx occid , peninsula? Hispamcae (Pirard¹ circa Gados), mMaderae montibus fiequens (Low ' Leman') Sm. engl bot. t. 9^3 Bull h franc t 9. Lam. et DC. fl. fr n. 2S70. Brot. fl lus. 1 p 404 Holl. bot zeit floi iH3o. Rapuntium uiens soloniense Bocc sic p. 20 ic. Rapuntium nrens Mill diet. n. 4. Presl prodr. lob. p. i3 L. serrulata Scholt in Roem. et Sch syst. 5. p. 54? L. Farsetia *Vand. in Roem pi Imp p 66 Specimina Maderensis saepe Europaeis siraillimj, nunc foliis lationbus \el bracteis flore majoribas (v s.)

87. L CLIFFORTIAITA (Willd. sp 3. p. g/f6), glibia, caale erecto ramoso, ramis denudatis gracilibus racemo laxo trrminatis, foliis infenoribus petiolatis ovatis snbeordatis inaequaliter crenato-dentatis, supenoribus sessilibus lanceolatis, bracteis flliformibus pedicellis multoties bievoribas, tabo calycis obconico, lobis capillaceis ereclis corolla parva dimidio brevioribus, antberis glabnuscuis infer, apice fimbriatis, capsula semi supera (jp m ins Cuba (Hurab La Sagr.'), Saucto Domingo (Bert'), Porto-Rico (Wydl'), veiisirailiter mm in ten a firma Ameicce, m Mauntn cullis (Sieb ' Bout.¹), in India orient, et Java, sed forsanibi exinsul.Caiibaeisadvena. H. B et Kuntb nov gen am 3 p. 3i5 excl. syn Michx Lam diet 3p 586,nonMichx nee Parsh. L caule erecto, etc. Linn.' h Chffoit. 42b. t 26 opt. Rapuntium Tiacbehi folio floie pnrpnrasc Plum amer. ic 235 f. 2 Rapuntium cordifolium Moench suppl. p. 277 Presl prodr mon. lob p a5 Lobelia fiiformis Sieb ' heib. maui. 2. « ao8 Bonton herb ' non Lam Cav I. chenopodifolia et tuangulata Wall ' hst. n. T^i2 Rapuntium chenopodifolium Presl prodr p 3i L tetragona Blum' bijdi. tot fl. ned. ind. p 729. Caulis pedahs. Folia semper glabra plus minusve dentata tenuia. Pedicelli sub lenle scabriusculi Corolla minima ex caeruleo purpurascens. Capsula semi-snpeia ovoidea, valvis obtusis longitndine loborum calycis (v v c. et s spont)

88 L MtcHAuxn (Nutt gen am 2 p 76), glabella snperne ramosa, fohis petiolatis ovahbs crenato-dentalis, inflnis suborbiculatis, lacemis aphyll'* laxiflois, flonbus parvnhs pedicellatis. — in "Virginia" L. Chffoiriamn Midi, fl bor. am 2 p i*5a, non Willd ex Nutt Rapuutium Michanxii Presl prod mon. lob p. 25, sol urn noraen An a piaeccenti vel sequenti diveisa?

8q. L XALAWNSIS (H. B pt Knnt' nov «on am 3 p. 3i5), canlo eieclo siiji-raiioso pilosiusculo, lamis <leiJtiddUs_giacihbtis racemo laxo terminaUs , fol»^s

petiolatis ovalis subcordatis mucronulato-dentatis supernè petiolis nervisque subtilis hirsotulis, superioribus sessilibus lanceolatis, bracteis linearibus pubescentibus pedicello pubescente multò brevioribus, calyce subinero glabro, tubo brevissimo, lobis linearibus acutis tubum corollae aequantibus, antheris hispidulis a inf. apice barbatis, capsula oblonga ferè snperà valvis obtusis, lobos calycis planè superante. (T) in Mexico (Hunib. et Bonpl. et h. Benth.!), in Dominica (Grah.), Trinitate (Sieb.! n. 344) et circa Bahiam (Salzm.! Blanch.!). Rapuntiuin affine Presl prodr. lob. p. 35, non ejusd. p. 13. L. Clifforliana Schlecht. et Cham. pi. mex. in linn. 1830. p. 127. 1831. p. 3p6? Sieb! trinit. non Willd. nee Mich. L. mollis Grah.! pi. gard. Edinb. in Edinb. philos. journ. dec. 1829. Adeo similis L. Cliffortiana; ut semper à collectoribus citatis snb eo nomine niissa, sed pubescentia et ovario ferè toto snpero certè di versa, (v. v. c. ets. spont.)

90. L. MONTICOLA (H. B. et Kunth! nov. gen. am. 3. p. 316), canle erecto subsimplici glabro autbirtello, foliis petiolatis ovatis obtusis subcordatis doplicito-serratis membranaceis utrinqè tenuissimè hirtellis, racemo spiciformi terminali nudiusculo, bracteis linearibus subhirtellis pedicellis hirtellis multò brevioribus, calyce subinero glabro, lobis linearibus tbnm corollas *quantibus, antheris apice puberolis non barbatis, capsula ellipticà basi tantù adnatà lobos calycis a-quante. (Tj in roontibns Novo-Granatensibus. L. palinaris Willd. in Roem. et Sch. syst. 4. p. 56. ex Kunth. syn. a. p. 349. Rapantium monticolnm Presl prodr. lob. p. 25. Herba 6-8-pollic. Corolla cacrueleu. An à L. Xalapensi di versa? (v. sperini. trnnc. in h. mus. Par.)
91. L. MICRANTHA (H. B. et Kunth! nov. gen. am. 3. p. 316 non Hook.), caule erecto rainoso angulato ramisqne hirtis, foliis petiolatis ovatis acnniinatis dentato-serratis pilosiusculis membranaceis, racemis spiciformibus, bracteis pedicello brevioribus infer, lanceolatis serratis sup. linearibus integerrimis, calyce subinero, lobis linearibus glabris tubum corollse subxquantibus, antheris glabris 1 inf. apice barbatis, capsula oblonga basi tantiim connata lobos calycis dimidiu fere superante. (f) in regione Qnitensi prope Poembo alt. 1300 hex. et in Peruvia loco diclo Chiuchin (herb. Domb.!). L. ruderale Willd. in Roem. et Sch. syst. 5. p. 56. Rapantium micranthum Presl prodr. mon. lob. p. 25. L. subtilis H. B. et Kunth! nov. gen. am. 3. p. 317. L. Draba Willd. in Roera. et Sch. syst. 5. p. 67. Rapantium subtile Presl prodr. lob. p. 25. (v. s. in h. inus. Par.)
92. L. SUCCULENTA (Blum.! bljdr. tot flor. ned. ind. p. 728), caule herbaceo subramoso giabriuscuso angulo, foliis ovatis crenatis, basi iu petiolnm brevem angustatis, pedicellis axillaribus folio subbrevioribus calyceque pilosis, tubo calycis pyiflorini lobos ciliatis subsequante, corolla lobis calycinis non longiore. — in graroinosis insulae Javoe circa Buiten/org. Rapantium succulentom Presl prodr. p. 13. Caulisex Blum, repens. Folia membranacea, subtiis pallida clabriuscula, crenis mucronatis, infer, rotundata, sup. acuta, limbo S-12 lin. longo nunc subcordato, petiolo marginato limbo multò breviore. Anherae soperiores glabrae. Ovarium omnino inferum. Lobi calycis subinxquales. (v. iu h. mus. Par. à cl. Blnui. miss.)
93. L. FASTIGIATA (H. B. et Kunth! nov. gen. am. 3. p. 313), canle erecto rainoso glabro angulato, 1 amis fastigiatis, foliis subsessilibns lanceolatis acutis remotè denticulatis glabris, racemo spiciformi terminali elongato glabro, bracteis linearibus parvis, bracteolis 2 minimis ad basi u pedicellorum, calyce glabro, tnb oblongo-cylindraceo basi turbinato, lobis lanceolato-linearibus acutis integerirais tubo duplo longioribus, corolla lobis calycinis parum longiore lobis infer, oblongis, antheris glabris 2 inf. barbatis, capsula oblongo-cylindracea (f) pprope Popayam et Chillo Quilensis alt. 900-1300 hex^ L. tenuifolia (firill.) in Roem. et Sch. syst. 5. p. 347 ex Kunth syn. 2. p. 347. Rapantium fastigiatnm Presl prodr. lob. p. 15. Folia 12-15 lin. louga. Flores vix 3 lin. 1°ng' * pedicello aeonaes. Pedicelli bractea nunc longiores, nnnc breviores. (v. s. in h. mus. Par.)
94. IJ. cnuiNA(Cav. ic. 6. p. 8. t. 5u f. 2), caalcerectosiinplcibasi pilosiuscnlo,

folus interne approximatē saperae ram, radicalibus obovatis mtegris glabns , raulim* linear-i-lanceol.itis dentatis hirsutiusculis, floribus spicato-raeemosis, biacteis hnearihu*s* integiis subhirsutis pedicel 1 is daplo longioiibus, calycis subbiiMili tubo turbinato-henusphaericō lobis linearibus tobō corollae dunidio hievionbus > lacinus corollae sup lineaibus, infer, oblongis, anlberis omnibus pilosin, infer a pice barbatis. *If*, m Mexico pi ope Real del Monte. — Ic. mex. ined. Rapuntium gruinuin Presl prodr lob. p. 25. Pedalis, flore caeruleo, an-thens tubuin coi. vix superantibus. Capsula ovoidea semi-supera. (v. s à c). Alanian.)

55 L SPICATA (Lam diet. 3. p. 587 ann 1780,^ canle erecto simplicissirao, basi puberulo , foliis obtusisintegris vel denliculatis subpnbesentibus, radicalibns sesiilibus oblongis, cauhni* oblongo-lanceolatis, ratemo spicifoimi elongato, hracteit lineanbus angustissimis longitudine pedicellorum , ralycis glabn tubo heinisphaeiico-tuibiuato , loins capillaceis coiolla tnpio brevionbus. 2£ in Americā boi. à Canada etfluviū Kubim (Red uven prope lacuui Winnipeg (Dougl in h Renth!) ad Carohuam. R.ipuntium fol. oblongis villosis, etc. Clayt. fl. virg. p. i35. L. Claytoniana Micbx. fl. bor. am. 1. p. 153 (ann T803). Pmsh 11. am. boi 2 p ^7. Ton.' fl. un. st. J. p. 240 £11. sketch gcorg. 1. p. 2<>5. L. pallida Muhl cat p 22. L goodenionles Willd. hoit bei. 1. p io t 30. Rapuntmni Claytonianum Presl piodi. mon lob. p. a3. Cauhs sesquipcdahs. Moies paivi eaciulei (v. b)

96. L KAFMIT (Linn op i3i8), eaule erecto gaiili lsevi sacpius ramoso, folus glabus remotedenticulatis , ladicallibus oblongo-sparhulldis, caulinis liuearibū obtu&iusf'ulis patentibus, racerao laxo, pedicelhs niedio bracteolatib biarteā sen folio basilan btevioubus floi longioribns , tobō calyciji glabii ovoideo basi acuto lobis acuminate basi latioiibus corollā 4° brevioubns, coiollae lobis sup ligulatis ininjnais, inf ovato-atuiis acquabbus. (2)? in rnpestubns bumidii Noveboiacensibus, veisus Niagaiam¹ rlc. — loirl 11 un. st. 1. p 2Jg Nutt. geu. am. 2. p. 76 Rapunium Kalmii Presl prodi. inon. lob p 22. Dm cum L. Nutfalu mixla forsauque a Michaux, Puisb et aliis confusa. Ven-6imihei in ditionibns TNoveboiacō au^tralioiibus non crestit. Ditfert à L. Nutlalu caule uuoie la?vi iarao&o, braoleis inulto'majonbus pedicel I is taraeu bievionbiis, biacteolis niedio pedicellorum nee basi, capsulā ovoideā lobis calycis Iongioie nee spbaeioideā bievioie (v. s.)

97. L NUTTATII (Rocm. et Sch syst 5 p 39), caule ereclo gracili nudiasculo saepius Minphci minate scabio, foliis ladicallibus 3-5 ovato-spatbulatis pilosis subintegns, caulinis ectis sessilibus linea*i* lauceolatis lemote denliculatis, larcnio virgato, pedicellis fjlifoimibns bracteā miuimā longionbus flore bieuouhus, biacteolis 2 minonbus basi pedicelloruni, tnbo calycis glabri hemipliamico basi subacuto , lobib acuminatis basi latioribus corolla tnplo brevioribus, lacinns corollae sup. ligulatis uiuiimis, inf. ovato-acutis sequalibus. (2) •ul margines siccios paludum à Nova Cesaea ad Carolinam et Iloudam (h. Micbx¹) Torr ' fl. un si 1. p. 240 L gracilh. Nutt. gen Jm. 2 p. 77, non Andr. L. Kalmii Bait fl. am. sept, t 3» f. 1 et Lll sketch 1. p. 264 *xToir. Bipedalis ifiacillima mleidum glaucescrns floie minimo csernleo ex •lbo et viridi maculato , antberi3 omnibus viv pilosis (v. s.)

0^ L BOYKIKII (Torr el Gray' ined), glabra, caule rainisqne erectis virgatis, foliis anguste lmeaiibus erectis glandulosi-denticulatis, racemis elongatih laxis , peditellijs nudis gracibbō ancipitibus biacteā hneari tenuiflore longioubub, mbo calyru. turbnnto , lobis angnstis hnēan-lanccolalis lonpe acuruinatis tu|jo mulio longioiibus corolla dimidio brevionbus, coiollae lobis sup. lignlaiis minirnis, 111F oblongis aequahbns Tjⁿ in paludibus Georgiae (Boykm ') , et FlomU (Chapman'), aquatica. Radices niuneiosau ajbidae. Habitus piacedcutis. i^oha 3 4 1m. lonca. Coiolla cwiulea (v. s. tonnn. à cl A. Giay)

yg L. CAMPORUM (Pohl bras 2. p. 100 t 165), canle electo siraplicissinio stucto piloso , foliis subdccmreutibus 1 emote dentatis cihatis erectis linea*i*us acuminahs, imis oblongis, merino spicifornn basi drnudato elongato f

bracteis ovato-acuminatis snbintegris pedicello clnplo longioribus, floribus subsessilibus axillaribus, calyce piloso, tubo longe obconico striato, lobis lanceolatis acminnatis corollā dimillio brevioribus, lobis corollae pilosis, anthris bispidis a inf. apice barbatis. (f in campis siccis ad Minas-Geraes et alibi in Brasilia austr. et .equinox. (Sellow) 0. Don gen. syst. g>rd. 3. p. 704. Cham, linn. 1833. p. 208. Rapuuiuin caruporuni Presl prodr. lob. p. i5.

;g *Lundiana*, foliis glabriusculis, bracteis longioribns, antberis minus bispidis. In pratisbumidis prov. St.l>auli(Lund.! cxs.n. 760 et 7<i). Caulis pedalis et ultrà. Folia infer, oblongo-lanceolata. Corolla cfernlea. (v. s.)

100. L. TKSERA (H. B. et Kunth! nov. gen. am. 3. p. 314), glabra, caule erecto simijici, foliis sessilibus lanceolato-linearibns, inferioribus lanceolatis remote denticulatis obtusis, racemo terminali pancifloro, bracteis linearibus pedicello mulio brevioribus, calycis tubo turbinato lobis lineri-lanceolatis acutis iniegerrimis tubo corolla paulo brevioribus, antheris a inf. barbatis, capsulū oblonga semilibera. If in collibus prope Puembo Quitensium alt. 1300 hex. Rapunium tencrura Presl prodr. lob. p. i5. L. pauciflorae simillima. (v. in h. mus. Par.)

101. L. PAUCIFLORA (H. B. et Kunth! nov. gen. am. 3. p. 314), caule erecto simplici striato glabro, foliis sessilibus, radicalibus lanceolatis, caulinis remotè denticulatis glabris aut hirtellis, racemo spiciformi paucifloro glabro, bracteis linearibus birtellis pedicellum duplo superanlibus, calyce birtello lobis linearibus acutis tubo corollae dimidio brevioribus, corollae limbo birtello, antheris 2 inf. barbatis. % in temperatis Mexici propè Valladolid de Mecboacan (Humb. et Bonpl.), et ad radices montis Orisabse (Schied et Depp.) Schlerht et Cham, in linn. 1830. p. 127. L. simplex b. Willd. 11. 3971. L. commutata Roem. et Sch. syst. 5. p. 73. Rapuntium pauciolorura Presl prodr. mon. lob. p. i5. Herba 6-8-poll. babitu L.Kalmii, corolla caeruleo-violacea. (v. in h. mus. Par.)

10a. L. nurESTRIS (H. B. et Kuutb! nov. geu. 3. p. 313), caule erecto subramoso ramique pubescentibus, foliis sessilibus bust angustalidenlatis utiuque birtopubescentibus, infer, oblongis obtusis, sup. lanceolato-oblongis lanceolatisve acutis, racemo spiciformi terminati, bracteis linear-lanceolatis integris vel subdentatis birtis pedicello duplo longioribus, calyce pubescenti-hirto, tubo turbinato, lobis linear-lanceolatis tubum cor. aequalibus, antheris glabris a inf. barbatis. % in monte ignivomo Purace prov. Popayensis. L. polygal. T-folia Willd. in Roem. et Sib. syst. 5. p. 56, ex Kunth syu. I. p. 347. Hapnumtum rmpesre Preal prodr. lob. p. i5. Heiba 6-ia-poll. folia 8-ia lin. longa, 2-3 lin. lala. Corollae violaceae. (v. in h. mus. Par.)

103. L. ANCERS (Thnnb. prodr. cap. p. 40), glabra, caule erecto vel adscendente ramoso alato-trigono, foliis decurrentibus iinrari-oblongis obovatissive repande et acutè deniculatis, pedicellis axillaribus folio uploquaduplovè brevioribus, tubo calycis elongato lobis triangulaibus uiultotieslongiore, corollā tulto calycii non longioie, lobis super, linearibus à labio inferiore 3-fido dñeigentibus, anthers dorso pilosiusculis 1 iuf. apice setaceo-pilosus, capsulū cylindracea! If. in hemisphxrio toto australi extra tropicum, nenipé : in hnnidis Africie ausiralis (Tbuub. Dreg!), in Van-Diemen! Nova-Hollandia! Nova-Zeelandia! in ins. Juan Fernandez (IWrt!) et in Chili circa Conception (d Urv! Hook.) et "Valdiviaiu (Hook.) Thunh. 11. cap. p. 180. Rapuntium anceps Presl! lob. p. 14, coium. pi. afr. austr. Dreg. p. 286. Dubrow. kia anceps Presl! prodr! lob. p. 10, comm. pi. afr. Dn;g. p. a<<4- L. decambens Sims bot. mag. t. 227^ nou Reem. et Sch. L. rhizopbyta Spreug. nov. prov. b. bal. 1818. Sims bot! mag. l. a5ig. L. bellidifolia b. Kev. ed. a. p. 35^ et hort. angl. n^on Thunb. L. alata La bill 1 nov.-holl. 1. p. 5r. t. 7a. Br. prodr. nov.-holl. p. 5(>2. Benth, enum. pl. Hagel. 74 Hook, journ. bol. 1. p. 377. A. Rich. voy. atirol. p. 277. Rapuntium alatum Presl prodr. lob. p. 14. L. rnpincola Bert! herb. chil. Colla pi. chil. in act. acad. taur. 38. p. u₉. Sieb.! pi. exs. nov.-holl. n. 55\$. Admodum variat caule pliis minus erecto, nunc radicante, foliis obtusis oblongis vel lanceolatis linearibnsq. supremis magis dernrentibus. I'olia siibcar-

nos.'i. Calyx mine subpdbscens. Corolla parva ex albido coerulea lobis inf. medio intenſius coloratls. (v. s.)

ft. cuneiformis (Br. 1. c), foil ls lanceolato-cnneiformibns latioribas non decurrentibus.— In Novā-Hollaudia. L. canef'rruis Labill.! 1. c. t. 73. L. alata var. Hook. 1. c. Rapuntium cuneiforme Presl 1. c. (v. s.)

104. L. DORTMANNA (Linn. sp. p. 1318), caule erecto simplici glabro nudiuschlo, foliis radicalibus rosulatis linearibns teretibus glabrin bilocularibus, cauliis xnimis raris, bracteis ova'tis pedicello duplo triplove breviribus, calyce glabro j tabo obconico lobis linearibus snblongiore, corolla: lobis infer, ovato-lanceolalis pilosiusculis superioribus linearibus, filamentis basi liberis, antberis iuclusis omnibus pilosis a infer, apice penicillutis. Tf in aquis lmpifloribus Europe occid. septentr. et America; sept, à lacu Servi (Uook.) et freto JIudsoniano (Rceru et Sch.) ad Georgian! (Nult. Torr.) Sm. eugl. bot. 140. Fl. dan. t. 3Q Koch syn. fl. germ. 1. p. 461. Lain, et DC. fl. fr. n. 2869. Torr. fl. un. st. 1. p. 35g. Hook fl. bor. am. 2. p. 21). tortmanna lacastria floribus sparsis penduiis Rudb. lap. 97. / 2. Lob. foliis bilocularibus .stibulaü Linn, fl. lap. 11. 279, suec. n. ^83. Uortmanna palusris G. Don gen. sy^t. gard. 3. p. 715. Rapuntium Durtmanna Presl prodr. lob. p. 18. Radix tota fibres a alba iibris fasciculatis. Folia inirarsa, 1 | poll, longa, nunc paulò complanata. Caulis vel scapus cavas pauciflorus. Ovaiiam apice liberum bi- (nee 3) loculare. Capsnla longe ovoidea basi plus minus acuta parte liber;! sup. nunc lobis caly- . cinis breviore nunc longiore in specini. ejusdem loci. (v. s. utriusq. drbis.)

105. L. PATUDOSA (Nutt. gen. n. auier. 2. p. 76), canle recto anguloſo simplici laevi, foliis glabris carnosulis planis remotè subcrenatis, radicalibus conferlis longè linearī-oblongis obmsis_T caulinis raris erectis linearibus, floribus lougè spicato-raceraosis, bracteis lincnri-acutis calloso-dentatis pedicello nudo dimidio brevioribus , tubo calycis turbinato lobis.linearī-acuminatis dentatis breviore, corollā lobis calycinis 6° longiore labio inferiore medio hispido, antheris pilosis 2 infer, apice barbatis. If in paludosis sphaguosis AmerioB bor. à Delaware ad Louisianain. Hook! Drumm. coll. in comp. to the bot. mag. 1. p. 100. Dortsuanna paludosa G. Don gen. syst, gard. 3. p. 713. Rapuntium paludosum Presl prodr. lob. p. 18. Folia radic. 3-6 poll, longa, 5 lin. lata, in, pcliolum crassum angnsta. Caulis nudiusculus. Flores pallidecaeralei. Tubus calycis sub finem florationis hemisphnerieus; lobi ad originem subatiricnlati. Media inter L. crassiuscnlam et L. Dortmannam. (v. in h. Dnnant. et Bentb.)

** *Tubus calycis per anthesin basi oBtusus, nernp̄ ovoideus vel hemisphcericus.*
— *Corolla cccrulea vel alba, in ultimis tamen spedebus lilacina roseave, imb et rlibra.*

A. *Sinus calycis lobis basi decurrentibus obtecti.*

106. L. APPMUICDLATA , caile erecto ramoso angulatis, angulis scabris, foliis glabris calloso-denticulatis, radicalibus obovatis oblongisye in petiolum brevein angustalis creuulatis, canlinis sessilibus ovatia subintegris , lacemis spiciformibus clongatis basi denndatis, bracteis linearibus glandulosodenticulatis pedicello scabro , basi biglanduloso sublongioibus , lobis calycinis eliliais, liueari-acuminatis tubo 4° longioribus basi utrinquè in laciniis linearcs tubo breviores productis. in Texas (Dramin.! in h. Benth.). Habitus L. spicatac. Glandulae callosa; inter crenas foliorurn. Appendices calycis decera, nou conn a tie. Labium infer, corollae medio pilosum. (v. in h. Benth.)

107. L. LEPTosTACiiYs, caule erecto basi puberulo, foliis oblongo-lanceolatis sessilibus brevissimē puberulis undulato-crenatis calloso-denticnlatis, racemo spiciformi elongato, bracteis linearī-lanceolatis calloso-dentatis pedicello basi bibiacteolato longioribus, tubo calycis laciniis decem pendentibns linearibus teclo, lobis angustis linearibus glabriuscnlis tubo 4° longioribus corollā sub-brevioribus. % ? in Carolina me rid. Caulis snbpedalis, angulis minimi's ex decurrentiā foliorum scab rid is. Folia sparsa, media a-pollic. Corollae labium jnferius medio piloscsm. Antberx a inf. apice pilos.-e. Appendices tubuni Ion-

gitudine aequantes. Variat bracteis pedicello sabaeqaalibus vel multò longioribus. (T. S. in b. A. Gray ex Fraser.)

108. L. BREVIFOLIA (Nutt. ined.), caule erecto simplici glabro, foliis sparsis argutè dentatis oblongo-linearibus glabris, iafterioribns iu petiolum brevissimum angustatis, floribas spicato-racemosis, pedicellis brae lea linear! dentata multò brevioiibus, tubo calycis piloso brevissirao , lobis lanceolatis grossè dentatis acutis, appendicibus rotundatis, corollà extiis nervis birtellà lobis calycinis triplo longiore Qf in Alabamâ America? bor. L. dentata Torr. olim ined. non Cav. Caulis pedalis et ultrà. Folia 6 lin. longa., a-3 Jin. lata, caruosa? Corolla caerulea labio inf. medio snbpilosso. Anlberae omnes apice hispidulx, sed 2 inferiores breviores ex.tremitate ipsâ barbatac, superiores dorso potiùs pubescentes. (v. s. comm. à cl. A. Gray.)
109. L. ruBERULA (Mich. 11. bor. am. 2. p. i5s), pubescens, caule erecto simplicissimo, foliis ovato-oblongis obtusis glandclosa-denlicnatis, floribus spicatis secuudis, bracteis ovato-acntis acutè serratis ilorcum acquantibus, tubo calycis brevi piloso, lobis Lanceolatis acuminatis pilosiusculis corollà paulò brevioiibus. % in humidis inoutium Americas bor. à Pensylvaniâ ad Georgian). Pursb. fl. bor. am. 2. p. 447- Torr. fl. un. st. 1. p. 240. Nutt. gen. aro. 2. p. 76. Beck bot. of north, and middl. stat. p. 2i5. Rapuntiuin puberulum Presl prodr. mon. lob. p. 23. Folia et habitus L. spicatae (Claytoniana Mich.) sed bipedalis, floribus triplo majoribus intensè eseruleis lobisque calycinis diversis. Lobi calycis basi decurrentes auriculis 5 tubum hispidum xquantibus* Species tnbo calycis potiùs turbuato sed propter appendices hie enumerata. (v. 8.)

jS. *Gabella* (Hook. bot. mag. t. 3292), foliis obsoletè pubescentibus, oaly-
cibus glaberrimis.

110. L. SYPHILITIC A (Linn.! sp. p. 0,45), pilosiuscula, caule erccto simplici, foliis ovatis utrinquè acutis irregulaviler denliculatis, floribus raceinoso-spicatis, pe-
dicellis axillaribus foliis ditnidio brevioribus, calyce hrito, tubo hemisphaericō,
lobis Lanceolatis acuminatis basi auriculatis corollà dinidio brevioribus, auricu-
lis obtusis 1-eflexis tubo brevioribus. % à Carolina ad Canadam in humidis et
propè Novam Aureliam (Diuminond! n. 186). Jacq. ic. rar. 3. t. 597.
Ker. bot. reg. t. 537. Pursh fl. am. 2. p. 447. Rapuntium syphiliticum Mill,
diet. n. ». Gacrtn.fruct. 1. i52. t. 3o. Presl prodr. mon. lob. p. 19. Corolhetu-
bus violaceus, limbus caeruleus, vel rariùs corolla tota alba. (v. s.)

jg. *maculata*, caule mag is attenuato, foliis argutè denticulatis ferrugineo-
Lain- diet. 3. p. 5\$6.

y, *Ludoviciana*, caule glabro, foliis lanceolatis subintegris glabris, calyce
glabriuscolo, — in Louisianâ. (Tainturier!)

\$: *Uybrida* (Hook. bot. mag. t. 3b'04), corolla intensè purpureo-violacea. Hy-
brida veiisimiliter praesentis et L. purpurca; l'algentis vel cardinalis.
Low's purple Lobelia Lindl. bot. reg. t. i445. L. speciosa Sweet brit.
flow. gard. ser. 2. t. 174. Rapuntium speciosum Presl prodr. lob. p. ig".
(v. s.)

B. Sinus calycis non obtecli.

i n . L. HORTEHSIS, glabra, caule erecto simplici, foliis lanceolatis acuminatis erosè dentatis, superioribuscrispis, racemo spicato folioso, pedicellis brevis-
simis nudis, bracteis linear-lanceolatis denialis pedicello triplo longioribus,
calycis glabri tubo hemisphaericō, lobis Imeari-subulatis uiargine recurvis
erectis iotegris corollae tubuui aequantibus. % Hybrida verisimiliter, apud hor-
tul. Dennis in Americâ orta. L. colorata Sw. brit. flow. gard. ser. 2. t. 180,
non Wall. Rapuntium coloratum Presl prodr. lob. p. 3o. Antherae flavidae intrâ
tubum corollae. Flores pulchre casrulei. An L. ccelestis Nutt. in Lond. h. brit.
p. 75?

H a . L. AM^NA (Michx. fl. bor. nm. 2. p. iñ), caule erecto pubescente scabro ,
foliis laucéblatis acuminatis serratis scabris, floribus raceinoso-spicatis second is,
pedicellis brevibus basi bibracteolatis linearibus foliaceis, racemo folioso , bci-

nisi calycinis erectis integerrimis margine revolutis tabo hemisphaerico longioribus, lobis corolla? infer, ovato-acutis. % in moiitosis à Virginiam ad Carols Tiam et Texas (Druramond n. 4a!) Ell. sk. georg. i. p. 267. Pimh fl. bor. urn. 2. p. /j17. Natt. gen. am. 2. p. 76. Jnss, ann. mas. 18. p. 16. t. 1. f. 1. solum flos. Ilapuntiuu araaenum Presl prodr. raon. lob. p. 23. L. syphilitica? Walt. car. p. 218. Caulis 2-3-pedalis pubescens. Folia 6-8 poll, longa, poUicem lata, rarù laevia. Corolla caerulea. Specimen vidimus (ubi folia infer, desunt) caule supernè glabro, laciinis calycinis margine extus revolutis corollam xqnantibns, antheris oinibns dorso pilosis, 2 tamen infer, apice barbatis. — "Variat caule foliisq. glabris (Michx.) iut saepius pbescenti- scabris, lobis caly* cios plus minusve basi revolutis in auriculam saepè productis. (v. s.)

113. L. GLANDULOSA (Walt. fl. carol, p. 218), cnule erecto snbpiloso sabramoso, foliis lauceolatis glanduloso-serrulalissubcarnosis pubernlis glabrisve, floribus spicato-racemosis, bracteis ovato-acutis grossè glanduloso-serratis pedicello longioribus, bracteolis linearibus glanduliferis duabus basi pedicellorum sublopposilis, tubo calycis hispido, lobis linear-acuminatis margine revolutis integriis vel denlatis corolla ad faucem pilosa paulo brevioribus. If. in palud» a Virginia ad Floritlam. Ell. sk. Geoig. 1. p. 2^5. Pursh bor. am. fl. 2. p. 4/17. Poir. diet, suppl. 3. p. /187. L. crassiuscula Mich. fl. bor. am. 2. p. 162. Nutt. gen. am. 2. p. 76. Hook. Drumm.! plant, in corap. to the bot. mag. 1. p. 100. Kapuntium glandulosum Presl prodr. p. 21. Variat foliis ovalibus, lanceolalis a til linearibus, plus minus dentatis. Corolla caerulea. Antherae 2 inl. apice pilosae.(v. s.)

/6. *Giabra*, panciflora, bracteis lanceolnto-linearibus, calycc glabro, lobis integris, corollâ glabrâ. In Carolinâ merid. Caulis semipedalis. Folia ovato-acufa. (v. s. ex herb. L'Hér.)

^. *nbtu si folia*, foliis obloogis obtusis pubescentibas, lobis calycinis corolla dinidio brevioribus.— In Alabamâ. (v. s. comm. à cl. A. Gray.)

114. L. VEHONIC/EFOLIA (Willd. in Roem. et Sch. sysL 5. p. 56), caule erecto, foliis pubescentibus, radicalibus obtusis obovatis, cauliis lanceolatis dentatis acutis, floribus terminalibus racemosis.^in Americâ merid. ex iiiin. Humb. et Bon pi. Rapnnium veronica; folium Presl prodr. lob. p 23. AnL. fenestraliaffinis?

115. L. PYGMEA (Thunb. prodr. 1. p. 40), cnnlibus decombentibus tenerrirais ramisq. diffusis leniiissimè villosis, foliis alternis petiolatis orbiculalis serraturis argntis uirinqnè lennissimè villosis, petiolis hirtis limbo sublongioribus, pedicellis axiil»ribns cupilhuibvis hirlis folio dciplo longioribus. — ad Capnt Konse-Spe in rimis monlis Riheck Kastel. Thunb. ilor. cap. p. 181. Ilapun-^ liom pygmaeum Presl prudr. lob. p. 22. Folia lineam longa. Corolla alba. An Laurentia ?

116. L. MUSCOIDES (Cham. linn. i833, p. 2i5), pusilla humistrara glaberrima, caulinibus filiformibns rudicanlibns, foliis snbrotuudis piofundè digitato-5-7-fidi.*i* lobis elliplicls acutis nmcronalatis petiolis latis limbo brevioribus, pedicellis axillaribus ebracteatis folio plnrieslongoi-ihus, tabo calycis brevissimè obconico, lobis ovatis acominalis, anheris anticis barbatis.— ad Cap. Bonaj-Spei, in Hummis mont. Zwellendam. (Mnndt.) Rapuntiuu muscoides Presl prodr. lob. P< 22. excl. syn. L. minuta. Folia cum peiolo 1 Jad 61in, longa. Corolla purpnrasceus.

117. L.? ALSINOIDES (Lam. dict. 3. p. 588), repens glabra, caulinibus ramosis gracilibus basi radicantibus, foliis ovatis dentatis breviter petiolatis, inferioribus rotundatis, pedicellis axillaribus solitariis folio duplo triplove longioribus. — ad Caput Bonæ-Spe (Sonnerat). Rapuntiuu alsinoides Presl prodr. lob. p. 22. Species valde ohscnra, habitu L. Laurentiae (ex Lara.) sed pedicellis aiillaribus, foliis brevioribus magis rotundatis. Forsan generis Laurentiae, sed corollam non descriptsil cl. anctor. Caulis 5-polliearis. Folia majora 4 liu: longa.

118. L. DEPHESSA (Linn, suppl. p. 3g5), caule berbaceo palm an d~~p~~ressiss:mo varicoso nndicnjè prostrato carnoxo, foliU lanceolatis minime rirrnrentibus,

pedicellis alterms solitaihs foliornm longitndine, flonbos atiopuipmcis. — ad Caput Bona-Spei

/0 *Thunbergu*, caule fihfoimi, pedirelhs folio duplo longioribus, corolla albida (fjadCap Bomc-spei prope urbem L depissa lhunb prodr.p.39 fl. cap p 178. Caulis glaber albus leirae adpiessus; rami sparsi frequente* capillares diffusi glabri flexuosi, folia alterna breviter petiolata ovato-oblonga obtusa hneam longa; flores axillares minutti pedicellis capillaribus An species diveisa? Cl Presl Lob. depressam L et JThunb. ad Metzleiam suam retuht.

lit). L. FLEXUOSA, puberuld, caule cieco subramoso, folis petiolatis linearianreolatis utiinque angustdtis remote dentitulatis, pedicellis filiformibns bractea lineali acuta longioribus, tubo calycia hemispbaenco, lobis linearibus tubo brevionbus, antbens 2 mf barbatis (J) in Mexico. Rapuntium flexuosum Presl piodr. lob. p. 23, non ejusd p 16.

ao. L WANA (H. B. et Kunih¹. nov gen am 3. p. Z17. t. 272), stolonifera glabra, caule abbre\iato* erecto simplici, stolombns filiformibus foliatia, foliis vpatbaldtis integeiriims crassiusculis petiolis hinbo bievionbos, pedunculis umfloios radicdbus et axillaribus nudis, tubo calycis bemispbaeuco-turbinate, lobis lmean-laoceolatis integris eiectis tubo corolla? paulo brevionbus, lobit> corolla «,up. linearibns icuminatts, infer oblongis, antheris 2 inf. pilosis % in sylvis inexicanis juxta Real del monte et Moran —Rapuntinm na-num Presl prodr. mon. lob p 29. Ic mex med.¹ planta subacaulis babitu et flore Viola? vel potius Laurentia Coiolla palhde violacea (v in h. inus Par.)

i2i. L. rusiLLA, scabnuscula caule erecto subramoso, foliis petiolatis decurrentibus* remote aiguteque dentatis, inflmis ovatis utrinque acutis, supenoribus lanceolatis utiinque angustatis, pedicellis axillaibus raceraosis folio duplo longionbns, tubo calycis hemispierico, lacinns linearibus acrainatib tubo duplo bievioubus, antheiis a infer hir&utis. (Y) in Mexico occid. Rdpnntium pusillum Presl piodi mon lob p 22.

122 L. cinccoIDEs, caule eiecto anguldto simplicissimo, foliis petiolatis cordatis acuminatis duplicato-acute dentatis snbtus nervis pabescentibus petiolisque cihatis, raceroa lxiusculo, pedioelhs biactea setacea duplo tuplove longioribus, calycis tubo bemispbaenco lacinns linearibus acurainatis tiiplo bieviore (I) in Mexico —Lob sp n ia3a Cham, plant Scbied. et Depp linn b p 5qb Rapuntium circaeoides Presl prodr mon. lob p a5

123. L RArtmcuioIDEs (H B Kunth' no\ gen am 3. p 5ia), caulibus ramosis procumbentibus inferne hirrcllis supeine ramisque glabiis, foliis sessiliibus linear! lanceolatis acutis basi valde angustatis irregnlantei acute que dentatis glabris, racemo spiciformi laxifloro, bracteis hncliibus pedicellos sobae-qudntib*s, calycis glabrl tubo bemispbaenco lobis linearibus acutU integris pilosis tub 1lm coiolla? subaequantibus, antheris glabris 2 infer, apice barbatis % prope Mexico. Rapuntinm rapunculoides Pieslmon. lob. p 23 L dracunculoides Willd. herb, in Roem. et Sch.syst 5. p. 66? Caules 25-30-polhcares. Folia 1¹ poll, longa, 2]-3 lin lata. Raceuius4-5-pollic. Pedicelb 6 9 h_n loogt Interdu**mbi**acteabieviiores. Corolla caemlea (v mh mus Pat)

124. L. COLLINA (H. B etKuntb' nov gen am. 3. p 312), cauhbus procumbentibus ramosis la?vibub glabiis, lamis adscendentibus, foliis sessihbus lanceolato-lmeanbus acotis remote denlitulatis glabris, racemo spiciformi terminal! glabio, bracteis liueanbus pedicellos aequantibus, floubus secundis, uilyce glabro, tubo beraisphanco, lobis hneaiibusacniis Integerrimis tabo corollaedaplo tnplove brevioribus, anthens exsertis glabris 2 inf apice barbatis. % in collibus siccis Penmae rara alt. 1100 hex. — L hnifoha Willd. in Roem et Scb. syst 5. p. 5^ ex Kuntb syn. 2 p. 34?* R^apun.tiam collinum Presl prodr mon lob p s3 (v fiagin in h. mus. Par)

125 L URANOCOMA (Cham in linn i833. p 32i), caule erctto *anguUto* sinipli in feme glabro, superne scabudo butello, foliis sessihbus erectis hnean-**kis** .ittennatia .iculis rrnuissunr m-vqualitti deaticulatis , rarenio terminali

tylindICO densiloro fohoso, bracteis fohaceis ovato-acumin<ttis pilosis pedicello longioribus, tubo calyris spbaeroideo, lobis» lineanbas acatis diimdiā parteni tubicoiollae superaniibus, corollā glanduloso-puberulā, anthers lacinias sub-sqnantibus 2 iuf a pice barbatis. *If* in Biasilia' (Sellow.). Rapuniura urano-coruura Presl piotr p 24 Heiba 5-6-ped.ilis. I_nolia pedalia i5 bn lata. Race-inus sesquipedalis, biacteis infer. I_n poll, longis, 10 lin latis, pedicel I is infer, senupollicaibus Corolla caeulea sub 2-pollicans. Cipsula subsphaeroideasemisopeia. Seuima leutifoimia ala membrianacea alba maxima cincta.

126 L THAPSOIDEA. (Schott in Pobl bras. 2 p. 102. t. 167), canle stricto simplicissimo pilo&iusculo, folii* sessilibus superne confertis lanceolate basi attenaatis subdenticulatis ininuleque oiliatis pilosiusculis, racemo teirainali py»amillah densifloro, biacteis appioxiialis lanceolato-acmuinatis pilo&is Inlegns pedicello longioribub, calyce piloso, tobo bemisphaeiico, lobis acuminatis basi latis tubo corollne dimidio bieviotibus, lobis corollae pilosae omnibus angostis labio inf. 3-fido, antbeii 2 infei. barbatis. *If*- cuca Rio de Janeiro (Schott.), in montibus Organ (Gardner' 462), visa in capitaniā Goyaz (Pobl.). — Rapuntiuiti thapsoideum Piesl prodi. lob p 24. Oenistoina buisihense Spren3 syst r. p 588^eKcbain liunsea itS33 p 209 Princeps Lobehariira, canle 6-pedWi¹ medulld farcto, racemo 10-pollicari, folns raditalibus sesquipedalibus caulinis subpet.ihbns, coiolla cyanea Capsula ign. Senima investiganda nam ex analogia cum L. iiranocoma forsau alata. (v. m h. Benth. spec. Gardn.)

127 L. EXAITATA. (Pohl pi. bras. 2 p. 101. t. 1b6), caule &tiecto simpliribsimi gl.libro, fohis caulinis se&silibus erecis lanceolato-icununafis bail Mibattenuatis denticuldtis subnlaiis, r.icemo pyiamidih leininali densilloio , biacteis approxnnatis ovato-lantcolatiji pilosiusculis integris pedicello longioribus, calyce piloi>o, tnbo hemisphaerico, lob is acuminatis basi latis tubo coiolLe longioribus, corollā extus pilosā labio infeuorc 3-fido, anthers 2 inf penicillatis *If*. in tiligiuosis et paludo&is piov. Rio de Jancio et Mm as Geaes. Rapuntium exaltatnm Piesl piotr. lob. p 2/f. Cauhs bcibaceus 5 pedalis flstulosus striatus Folia pedem longa, scsquunciam lata, in ic. ciliata Integra , ex descipt. glabra denticulata. Corolla cyanea, lobis 2 snper. linea-acuminatis paalo longionbns. Accedit ad sect, sequentem.

128 L. INFLATA (Linn/ jet ops. 1741, p. a3. t. r), caule erecto in femē sintplici hirto, snperne ramoso glabio, foliis irrpulariter seirato-dentatis pilosiusculis , infeiioribus oblongis obtusis bieviter petiolatis , medus o\ato-araiis sessilibus, flonbns paivis racemosis, pedicelis biacteā acuminatā brevionbus , calycis glabri tubo ovoideo, lobis linear-aciunminatis corollam aequantibns , capsulā ovoideā inflatā. (f) in Ameucā boi à Canada ad Carolmam et Mississipi. — Willd. ip. 1. p. 9J6. Pursh fl. araer. 2. p. 4'|8. Big amer ined. hot. 1 part. 2. t. 19 Sweet biit flow gard ser. 1. t. 9_nj Rapunlium inflatum Mill, diet n 5 Piesl piotr. mon. lob. p. 24. Racemus spicifoimis ramulis basi auctus. Corolla pallide exrulea (v. s.)

i>9 L. COLORATA (Wall. 1 planr as rar. 2. p. 42 non Sweet) , canle erecto simplici tereti glabro , folii* lmeaui-lanceolatis subdendatis glibrīs, racemo spiciform elongato paucifloro, bracteis, glanduloso-dentatis pedicello longioribus, pedicellis pilosis, tubo calycis ovoideo, lobis lincanbus dentatis pilosis tubo longioiibus corollā tnplō bievionbus, lobis corollae lineanbus angustis, antheris pilosis 2 mf apice baibatis In inoutibus Sillet. L. puipuras<ens Wall.! list n. i3_o? (n_on Brown) nomen ab auctoie relict ibid. p. 157 Rapuntium coloratum Pre¹l prodr. lob. p. 24 (v s.)

130. L. SESSHIOPOMA (Lamb tians. linn, soc 10. p. 260 t. 6), glabra, canle erecto simplici, fblns sessilibus approximatis lanceolatis seirulatis infenoubas obtusis supenobns acentis, pedicellis folio dimidio bievioubus, tabo calycis pynformi lobii acuminatis integiis subbreviore,coiolla lobu. calycmis quadrnplo longiore,lobispilosinscolis infeiioribus lanceolaUs, super, lineanbiis, antheris glabiis a inf apice penicillatis *if ;_n Kamtschatka (Poll) et Daxivia' (Turcz')— Roem. et Sch syst 5. p. 56 noil Humb L. Camtsliatika Pall. rass. Rapuntiam

Kamtschaticum Presl piodr. lob. p. 24. Planta pedalis et ultrà herbacea. Flores violacei. (v. s. comm. à cl. Turczan.)

i3r. L. PYRAMIDALIS (Wall.! as. ies. x3. p. 376), canle erecto ramoso tereti glabro, ram is angulosis, foliis sessibns lineaee-lanceolatis acutis serratis glabiis, racemis nullifloris, bracteis acuminatis foliaceis pedicello longioribus, tnbq[^]calycis ovoideo, lobis subulatis serratis tubo longioribus corollam olequaeraubus, corollâ puberulâ lobis omnibus icilexis lateraiibus angstrioribns, rapsulâ 10-costata: nut ante If.? in JNepalia fiequens et in mont. Sillet. — Wall.! list. n. i302. p. 35 et 157. D. Don bot. mag. t. 2387. Rapantiura pyramidale Piesl piodt. p. 2J. Caulis 3-5-ped. Vloies violacei. "Vanat iamisbrac-teisque glabris vel pilosis, lobis calycinis plus mmusve longis. (v. s.)

/g. Bracteis lobisq. calycinis integris Rapantium Wallichiauum Presl prodr. lob. p. 24 Species mixta cum L. pyramidali ex cl. Presl, sed inter spe- ciruina valde numerosa duas species, vixque duas \arietates distinguere non v.ilui. (v. s.)

i3a. L. EXCELSA (Leschen! in Roxb. et Wall ! fl. ind. 2. p. 114, non Bonpl.), caule ina&imo berbaceo erecto, foliis lanceolatis brevitet petiolatis basi angustatis acuminalis denticulatis supeine pubeulis subtus tomentosis, racemo fo-haceo pubescente inuhlfloro, bracteis louge acuramatjs glanduloso-dentatis cre-bns pedicel Us dtiplo longioibus, lobis calycinis erectis hueau-Ianceolatis den-ticulatis tubo hemispbaeiico tnplo longioubns tnbo coiollae pubescents sequalibus. — in montibus Nilgiri. — Wall ! list, n i305. Rapantium Lesche-niaultianura Piesl prodr. lob. p. 24. Annua ex Lescheu. sed verisimiHter caulis tantum annuus, 10-12 pedalis! Folia 6-10 pollic. longa. Corolla non apeita in spec, nostro. Habitus geneiis Tupae. *Vulgo Oumary. (v. s.)

i33. L. NICOTIAN[^]FOTIA. (Heyne! in Roe in, et Sch.syst. 5. p. 47), caule erecto, lamis teretibus glabriusculis, foliis subsessilibus oblongo-lanceolatis dentjeu-latis basi angustatis apice acuminatis racemis nullifloris, biacteis foliaceis, pedicellis pubeolis bidctea sublongionbus medio bibiactehitis, lobis caly-ciuis lanceolatis seiratis tubo liemisphaeiico puberulo longionbus patentibus, corollâ pubescente lobis calycinis quadriuplo longiore, lobis lateialibas longis linearibus, centralibas lanceolatis, anlheiis 2 infer, apice penicillatis %? in montibus peninsulas indicae et in Ceylona (Macrae b. Lindl!) — Wdll.¹ list. n. i304> p* J5 et 1J7. Rapantium nicotianxfohum Presl piodr. p. 24. Canli* 6-7-pedalis. Capsnla crecta sphaeroidea. (v. s. 4 cl. Lescben. el Wall, comm.)

x34. ^- RSEA. (Wall! in fl. ind. 2. p. n5), nndiqnè ^elntina, canle eieclo ramoso tereti, ranus teretibus, foliis sessilibus, lanreolatis utrinque acuminatis serrulatis, flonbs lacemoso-spicatis secundis, pedirelhs brjctea lanceolata integrâ bievioribus, tabo calycis ovoideo, lobis linearibus integris tnbo duplo lon^aionbus, corollâ velntinâ lobis calycinis dimidio longiore laciniis laterah bus ancustioribus deflexis centralibus ovato-aculis. (T) ex Wall, in Nepaliae' calidionibus et in raont. Pundua et Sillet. — Wall ! list. n. i303. p. 35 et 15". pi. as. rar. a p- 4a- t. i52. Rapantiura rose am Piesl prodr p. 24. Planta 4-6-pedahs sericeo-glaucesceus. Floies numerosi lobis cor. apice roseis. (v. s.)

135. L. coRDroERA (Cav. ic t. 523), birsuta, canle erecto sulcato, foliis sub-amplexicaulibus ovato-acutis remote denticulatis, pedicellis axillanbns folio dimidio brevioribus, tubo calycis villosi hemisphaenco lobis lanceolato-linea-nbus acuminatis erectis tubo coiollae subaequalibus, corollâ coccinea glabra lobis super, linearibus leclis longis, labio infer. 3-partito araplo tnbo aequali, lobis oblongis patentibns interse simibbus subacutis. % in Cibili fundis Longavi etCucba-Cucha. Rapantium cordigeum Piesl prodr. p. 26. Caulis 3-pedalis. Pili ex icone molles crebii Flores pauci magni bipollares.

136. L. SPLEWDENS (Willd. hort. ber. t. 86), glabra, caule eieclo simplici, foliis ftessihbas lanceolatis acuminatis denticulatis, lacemo terminal], bracteis lanceo-latis acuminatis denlatis pedic»llosublongionbus, tubo calycis hemispbaeiico, lobis lineaiibus acuminatis tubo corollae glabra; subaequalibus, anthers dorso glabris infer 2 apice barbatis. If. in Mexici temperati* H. B. et Kunth. HOT.

gen. am i p. 3n Rapuntium splendens Presl prodr. mon lob. p 26 Habitus et color L cardinahs L. fulgenti valde affins sed veioslmiliter distincta. Differt glabiitic (pediellis tail I urn nunc pilosis), foliis angastionbus potius Jineanbus, bracteis bievionbus, pedicelhs contrà longioribns. Diversam dicit cl. Bonpland pi. Malm, et Nav p. 21. qui ad Willd. semina. nii&erat. (v. s. a plar. coll comm)

137. L. FULGEWS (Willd hort. ber. t 85), pabescens, caale erecto simplici, foliis bessilibus lanceolatis armuinatis remote subdenticulatis, racemo terminali, bractem fohaceis lanceolatis longe acumiualis dentalatatis pedicello tripli quadinplove longionbns, tnbo calycis ovoideo subhemisphaerico, lobift fincaibus acuminatis tubo corollae pubescent is subaequahbus, autheris omnibus pilosiuscuhs 2 inf. barbatis. If. in Mexici teroperatis, nee in valle Mississipi (Nntt. gen am 2 p. 77).— Humb B et Kanth nov gen am. 3 p. 3 n. Bonjpl ' jard Nav. et Malm. 19 t 7. Andr. bot. lcp. t. 65g. L. forraosa Roth hi Roem et Sch. syst. 5 p. 50 Rapuntimm fulgeus Presl piodr. mon lob. p. 26. Habitus et color L. cardinaly sed magis pabescens fol. anguslionbas antbens omnibus pilosis. (v. s.)

138. L. CARDINALIS (Linn, sp p 1320), pubernla, canle erecto simplici, foliis oblongo-lanceoldtis ulrinque acutis iiregalanter dentatis, raceroo elongato t>ub-secundo, bracteis lanceolatis glanduloso-serratis, inferioribus pedicello longionbns • superionbus brevionbus, calycis glabuusculi tubo beraispbaeiico bievi, lob is lmeaui-lanceolatis acuumnatis longis tubo corollae sub-pqualibus, antheris exsertis infer barbati3 If. in humidis a Nova Auglia ad Caiolinam — Lam diet. 3 p. 585- Ell sketch georg. 1. p. 268. lorr fl. uu st. 1. p. 242 Big ' fl bost p 85. bot mag. t. J20. Flos cardinahs Barbenni Hern niex t. 880. Rapuntium americanum fl coccineo Rob ic ibS Lob. caidinalis, eic., Knorr fles a t L. 2. opt, Rapuntium cardinalc Presl prodr. lob. p. 26. Floresrubri. (v.s)

fi. Mi Hen, major, calycibns pnbescenbtibns t corollis violaceo-puipnreis, antheris crassis. L. cardinahs Milieu biit. flow gaid t. 372. Hybuda inter. L. cardinalem et siphilylicam apod Miller hortul. nata

i3q. L. TEXENSIS (Rafln. heib. part. 1. aun 18SJ. p 20), puberala, canle flexuoso siniphei, foliis sessilibns lanceolatis denticulalis acutis remotis, flo-
nbns racemois secundis remotis, bialeis lanceolatis, pedicelhs bractea bre-
vionbus, lobis calycinis linearibus, lobis coiolla angustis a cut is —in Texas.
Affiuis L. cardmali et L. fulgenti ex auctore. Corolla magna coccinea. An a
praecedenti diversa ?

140 L GRAMINEA (Lam. diet. 3. p. 583), glabra, caule erecto simpiicissimo, foliis linear-lanceolatis integris vel remote subdenticulatis, racemo longo sim-
plici, bracteis lincaii-acutis, pedicellis basi bibracteolatis bractea subaequalibns, calycis tubo hemisphaerico, lacmiis linearibus acuminatis tnbo duplo longio-
ibus, corollâ glabrâ, antheris 2 mf. apice baibatis —in Peruvia (Jos. Juss.')
Rapuntium gramoicum Presl prodr. lob. p. 26 Bipedalis, folws 5 poll, longis
a-3 hn. latis. Floies foimâ fere et colore L cardinalis, lobis corollae angustioii-
bus. (v in h. Juss.)

4i- L HANKEANA , glaberrima, foliis petiolatis lanceolate acuminatis dentatis subtus ingoso-venosis, floribns axillanbus racemosis, pedicellis bracteolatis folio brevioribus , calycis tubo hemispbaerico lacinns lanceolatis tubo aeqlon-
gis, corollae labii lobis usque sub apicem connatis, antheris a inf baibatis.
f, in ins Luzon Rapuntiura Haenkeanum Picl prodi. lob. p 26 Corolla non
caerulea ex sectione ubi locavit cl. auctor

142 L. LOHGIFOLIA, glabra, caule erecto simplicissimo tereti, foliis sessilibus linednbns elongatis acumiatis 1 emote seunlatis, pedicelhs bractea conformi hrevioribus, calycis tubo hemispbaenco lacmiis hneanbus bieviore, antheris pilosioscuhs 2 inf apire baibatis. If. m mhulâ Luzon. Rapuntiuin longifoliura Presl prodr lob p. 26 Corolla no 11 ccerulea sed rubia aut vnescens, ex sec-
tione 11b] locaMt cl auctoi

143. L. LUCJEAITA, glaberrima, caule adscendente angaloso ramoso, foliis oblongo-lanceolatis acuminalis duplicitatim acnlè callosoque serrnlati basi cordatâ nmplicanibus breviter decurrentibus, floralibus ciliato-dentatis, pedicellii ancipilibus folio brevioribus, calycis laciniis lanceolatis acuminatis medio utrinquè 1-2-denticulatis tubo sublongioribus, corollâ deflexâ, laciniis lobisque linearis-lanceolatis acuminatis. *If* in Chili. Rapuntium Lucseanum Presl prodr. mon. lob. p. 27. Corolla rubra; antherx 2 inf. barbatae. An Tupa vel jcqaentis seclionis?

Sectio in. HOMOCHILUS.

Corolla bilabiata, tobo elongato cylindraceo, labiis longitidine sphaerulibns, inferiore apice 3-dentato, lobis labii superioris dentibus inferioris latioribus, labio superioris vix sursum reflexo, sspius (ut in Siphocampylis) deflexo, labiam inferins obtegente. — Species Americans, floribus axillaribus, rubris aut ex rubro-flavesceulibus aut violaceis, tubo calycis hemisphaericus.

144. L. LAXIFLORA (H. B. et Kuuth! nov. gen. am. 3. p. 311), caule erecto rainoso, foliis subsessilibus ovato-acuminatis serrato-dentalis, pedicellis axillaribus nudis vel medio bibracteolatis follo subxqualibus, tubo calycis hemisphaericus, lobis lanceolatis acutis tubum longitudine aequantibus corollâ intus pubescent e 6°-8°ve brevioribus, antheris apice hirsutis, capsula semisuperata. *If* in Mexici temperatis frequens. L. fissa Willd. herb, in Recn. et scb. syst. 5. >. 57 (ex Kunth syn. 2. p. 346). Rapuntium laxiflorum Presl prodr. mon. lob. p. 26. L. rigidula H. B. et Kunth! 1. c. Rapuntium rigidulum Presl 1. c. L. persicifolia Cav. ic. 3. t. 518, non Lam. L. Cavanillesiana R. et Sch. syst. 5. p. 43. Rapuntium CaTanillesianum Presl 1. c. p. 27. Siphocampylus bicolor D. Don in brit. flow. gard. ser. 2. t. 389. Variat caule foliisque glabris vel hirtellis, pedicellis folio brevioribus, sequilibus aut longioribus, in eadem plantâ nudis vel bracteolatis, none in axillis foliorum superiorum nunc in axillis mediorum, corollâ exstis glabra aut hirtella. Pars media corolla: rubra, basis et lobi flavi. (v. s.)

>2. *dngustifolia*, foliis linearis-lanceolatis linearibusque. — in Mexico. L. Cavanillesii Mart, choix pi. jard. Mun. p. 12. t. 9. Hook. bot. mag. t. 3600. Anonyma vx Hernand. t. 351. L. persicifolia H. B. et Kunth! 1. c. p. 310, non Lam. Rapuntium Kuntbianura Presl prodr. lob. p. 27. Andrieux! pi. inex. n. 267. Siphocampylus bicolor bort. soc. hortic. lond.! Variat birsutie et longitudine pedicellarum etc., ut et. (v. v. c. et s. spont.)

145. L. RIGIDULA. (H. B. et Kunth I nov. gen. am. 3. p. 5ix), caule erecto simplici folioso glabro supernè hirtello, foliis subsessilibus oblongo-lanceolatis subacuminatis argute serrnlati rigidulis suprà glabris sublîs rugosis et hirrellis, floribus axillaribus longè pedicellatis, tubo calycis lieinisph;crico, lobis lanceolatis acutis corollâ hirtella quadruplo brevioribus, antheris apice barbatis, capsula semisuperata subrotundo-ovata. *If* in Mexico? Rapuntium rigidulum Presl prodr. mon. lob. p. 26. L. floribunda b. Bonpl.! in b. mas, Par. Kolia bipollicaria et panlò longiora, 6-7 lin. lata, petiolis hirtellis. Pedicelli uni aut uesquipollicares hirtelli nudi. (v. in h. mus. Par.)

146. L. KRAUSSII (Grab, in Edinb. new Phil, joorn. mart. 1830), caule erecto rainoso glabro, foliis lanceolatis subsessilibus argutè serratis glabris, pedicelli folio subbrevioribus glabris medio bibracteolatis, tubo calycis glabri hemisphaericus, lobis linearibus acuminatis patentias sphaerulatissimis corollâ triplo quadruplo brevioribus, corollâ glabra subincurvâ, lobis superioribus param divergentibus, inferioribus angustioribus brevioribus, antheris apice barbatis. *If* in Dominicâ—Grab, in bot. mag. t. 3012. Caulis sesquipedalis. Folia 4-poll. longa, pedicellis subtripollicaris. Corolla rubra pollicaris, labio infer, profundè tri-fido, lobis linearis-acutis uedio minore. Capsula hemisphericus apice conica et libera, ex descr. el. Graham non valvis debiscens sed lapsu apicis. Flores desunt in axillis foliorum superiorum.

147. L. ROTUNDIFOLIA (herb. Juss.!), caule (ramove?) iereti lignoso flexuoso siraplici glabro, foliis peltatis ellipticis denticulatis coriaceis glabriis apice

cuspidato-icflexis, raceino Lerrainali \elulino, floubus appioximatis, pedicellis medio bibracteolatitt coropressis biacteā lineau dentatā duplo longionbus, calycis glabii tubo hemisphaerico lacinias lineares aequante, coiollā glabiā laciniis calycium 6° Iongiore lobis lineanbus, antbens 2 inf apice barbatis. j in Hispaniolā (Nectoux¹). Kolw 12-15 lm longa , 8-9 lin. lala. Coiolla labra? ex herbai 10 fere umlnbiata, lobis tamen distinctis scqualibus Habitus Siphocainpyh sed corolla fis&a. (v. in b uius. Par et Juss)

148* L. DECURRENS (Cav ic 6 p i3 t. 621), caale stncto simplici glabio, foliis decurrentibus oblongo-lanceolatis inaequalitei serratis glabiis, lacemo terminal! pyramidato densifloro, biacteis fohaceis lanceolahs biserratis pedirello mnlto longioibus, tubo calycis bemispbaeric villoso, lobis lanceolatis acute dentatis tabo corollae dimidio brevioribus, lobis corollas angustis acuminatis husutis, superioribus deflexis longioribus, labio inf. trifido breviore, anthens 3 inf. barbatis, ovano serai-supero. If. in Chili ad upas flum. Claro (Nee herb) Rapnntium decurrens Presl prodi lob. p. z| Caulis i-5-pedalis. Dentes foborum 2 minores inter majoes. Coiolla pnnpureo-violacea, petalis 2 sap. medio tantum cum labio inf. connatis.

yS. calyce et coiolla ubiqne hir&utis. If- in Peruviā (Bonpl¹). L. foliosa H. B ' et Kunth nov. gen. am 3. p. 310 Rapantinm foliosura Presl piopr. mon. lob. p. 24* L. decunens Sweet brit. flow gard. ser. 2 t. 86 bot. reg. t 1842. heib Dombey' Matthews ' n. 658. Specimen bub nomine L. folios* anno 1808 à cl. Bonpland commuuicatam omninò cum ic. Cavan. convenit, nisi quod lobi caiycis et coiollae tubus externe pubescentes. Folia et lobi calycis coiollaque simillum. Inter dentes foliorum majoes a minores. E regno Quitensi dicit <1 Kunth sed Bonpland e Peruviā. Semina oblongd fusca nitida ex cl. Kunth (v. s.)

149. L GAUDICHAUDII, glabra, canle fruticoso crasso ricatricibns foliorum latis crebrisqae, foliis oblongo-lanceolatis lanceolatisque lutebris sessilibus, racemo terminali raultifloro , pedicellis basi bibracteolatis compressis biacteam aequantibus, tubo calycis hemispbxnco-tubinato, lobis lanceolatis tubo duplo longioribus, corollā arcuatā lobis calycinis tiiplo Iongiore, anheris omnibus apice barbatis. \$ ad cacumen montis O-Wahu Sandwicensium (Gaudich! 1837). Planta 3-pedabs medullā faicta. Folia 3-4-poll. longa, 6-12 lin. lata erectiuscula, maigine leviter crispa Corolla basi losea, snperne rubro-violacca, glaberrima, dorso fissa, lobis super, linearibus medium usque cum infenoibus connatis superne hberis deflexis, labio infei. apice tridenlato. Capsula ovoidea apice comca, certe dehiscens Semina plana, ovato remformia. (v. in h. mas. Par.)

J Species minus notce aut generis dubii.

* Americana:.

150. L. NIVFA (Rafin. ann. of nature n. 1. ann. 1820 p. i5 non TVilld.), caule simplici glabro supernè stria to, foliis adpressis cuneatis obtuj»is cmaigmatis ciliolatis subscabris subtùs pallidioibas dentatis dentibus callosis, racemo spiciformu elongato gracili, bracteis subulatis parvis, flonbus cernuis, pedicellis calyce biewonbus lacmiis calycinis snbulatis. 2f ia Kentucky Americas bor FJores parvi nivei longe racemO6i caulis 1-2-pedalis

151. L PHYTEUMOIDES (WilW. herb, m Roem. et Sch. syst. 5. p. 68), folns lanceolatis dentatis sessilibus glabns, racemo terminali, caule adscendente snbramoso. In Americā merid. exitin. Hnmb. et Bonpl.

i5a. L.? nETicuLATA (Willd. in Rcem. et Sch. syst. 5 p 58), canle aiboreo, foliis ovato-lanceolatis acmialis cienatis rugoso-venosis, subtùs pubescentibas, corymbo terminali ratemoso. J ad Onnocnm (Hnmb. et Bonpl). Vensi militer Siphocampylus . .

i53. L ? LOXEHSIS (Willd. in Roem. et Sch. syst. 5 p 7a), tomentoso-scabia, foliis oblODgts petiolatis supià lugo&is lucidis, flonbus teiminahbus pamtulatis. J Ciica Loxa (Hliaib et Bonpl.). Verisimiliter Siphocampylus.

154. L.? RETRORSA (Willd. in Roem. et Sch. syst. 5 p. 57), caule arboreo, rarae scabns, foliis petioiatis ellipticis mucronatis letrorsnm seiratis rugosovenosis, flonbas terminalibas raceinosis 3 *^Q America merid. (Humb. et Bonpl.). ForsanTupae species?
155. L.? ELTIPTICA (Willd. in Roem. et Sch. syst. 5. p 57), caule arboreo, foliis ellipticis obtusis nigosis venosis denticnatis, ramahs petiohs pedunculisiq folns longioribus hirsuto tomentosis, calycibas reflexis, coiolhs pubescentibns 5 in America mend. (Humb. et Bonpl 1. An Centiopogon?)
156. L DIVERSIFOLTA. (Roem et Sch. syst. 5. p. 68), foliis inferioribns snbrotndis, snpenonbus lanceolatis, summis lineaubns, maigine cartilagineis serratis, caale debili subdiviso, peduncnlis elongatis.— in Americā mend. (Humb. et Bonpl.)* L- heterophylla Hnmb et Bonpl. mss in h Willd — CI Kunth ad auam Campaniilam and a in (W ahlenbergia linaioides nob.) adduxerat, sed eel. Chamisso in linnaea i833 p 209 dicit : L heterophylla h Willd. n 3967 est revera Lobelias species
157. L.? SONCHIFOLIA (Sw. fl Ind.-occ 3.p 1947), glabra, caule simplici ereclo, striato, foliis petiolatis ellipticis subtus glaucescentibus, inferioribns incisis subsinuatis, superionbos subpinnatifidis, lacinus oppositis ovato lanceolatis obtasis margine dentatis dentibus mucronolatis, petiohs marginatis, racemotermali, pedicellis bracteā bievionbus basi biacteolatis, laciniis calycims lineaubus acutis, corollā tubo cylindraceo snbincoivo usque ad basin fisso, lobis ovato-acutis erectis subscqualibus, anthers apice setaceo-hispidis — in graminosisdepiessis juxta fluent a Hispaniolae Rapuntium sonchifohnm Presl prodr lob. p 27. Herbacea, biped.dis, foliis 3-4-poll, corollā purpnreā, capsula ovata. An lupa?
158. L. DECUMBENS (Rcein et Sch 5. p. 67 non Sims uer h. Jass), canlo flexoso glabro decumbente, folns ovatis serratis arutis, floubus axillaribns solitams, pedicello biacteis binis setaceis eodem longioribus in Antilhs (h Willd ex h Rich). Rapuntinm Richaidiannm Presl piod. mon lob p 26.
159. L AMYGDALINA (Willd in Rcem. et Sch. syst. 5. p Sj), caule erecto, folns oyatis. acummatis serratis, pedicellis axillanbus, corollis fissis. — IM America mend et uin. Humb et Bonpl Rapuntium amygdalinum Presl prodr. p 27 Yeribimihter nna e sp. a cl. Kunth desenptis sed ex phiasi nimis bievi auctoium omnino obscura

** Capenses.

- 160 L KREBSIANA —Rapnntinm Krebsiannm Krebs pi. cxs. cap u 137 Presl prodr. lob. p i5 solum noraen. Tubus calycis turbinatus vel linearis-obconicus, antheraeque inferiores baibataj, ex chiaict sectionis
- 161 L. BIFIDA. (Thunb. prodr. p 40), caule heibaceo fihformi capillan pnbes cente erecto snpeine seincl vel bis dichotomo, folns ladicibus subpetiolatis obovatis denticulatis snpubescntibus, caulinis 1-2-ciectis minutis, flonbus terminahbas solitams, bracteā lanceolata in dichotomia canlis. QQ ad Cap Bonae-Spei in monte Bockland. Rapuntium bifidum Presl piodr. lob. p 30 Radix tenmssima Caulispollicans nsquē digitalis. Folia lineam longa. Floie* cserulei.
162. L. FERVENTS (Thnnb fl. cap. ed Schult. p. i83), canle herbaceo erectinsculo subramoso glabro, folns sessilibus glabris, mferioribus ovato-oblongis tennissime serratis, snperioribns lanceolatis serratis, flonbs ex axillis foliornm saperiornm solitarns, pedicellis folio daplo brevionbas. Q) ad Capnt Bonae Spei. Rapuntium fervens Presl piodi. lob p. 30. Canlis spithamaens. Folia unguiculaiia usque pollicaria Floies ca3rulei
163. L CINEREA (Ihunb. prodr p 4°)» cauhbus plmibus crctto-patentibus subsiroplicibus teretibus laevibus glabus, foliis sessilibus acatis dentato-spmosi^ margine incrassatis, infenoribus glabris, superioribus cinereo tomentosis flonbussubracemoso-terminalibns, calyce rineieo-tomentoso.()ad Caput Bonae spei, ad Boggeweld Rapuntinm cmeienm Presl prodr p 30 Radix sabfusi-

forrois simplex laevis lon.gè descendens. Caules inxquales vix palmares albi. Folia patentia apice reflexa. Flores albi.

164. L. CAMPAITULATA (Lam. diet. 3. p. A88 uon Cav.), exigua, canle simplici gracili glabro, foliis linear-lanceolatis glabris sessilibus remotè denticulatis, pedicellis axillaribus filifonibus apice pilosis i-floris, flore campanula to , calyce piloso, lobis angustis patentibus vel reflexis, corollâ patente subregulari. (jin Africâ ausrali extra tropicum legit ^Vaillant. Planta 4-5-pollic. Folia vix pollicem longa et I | lin. lata. Flores babitu Convolvuli, corollâ vix diversâ. L. exigua Pers. An geueris Enchysiae? an polius Monopsis?

1^5. L. LINEARIS (Thunb. prodr. p. 3g), caulis simplicibns erectis spithameis terelibus rugoso-striatis glabris, foliis allerois sessilibus patentibus linea-ribas glabris plan^ integris pollicaribus, floribus axillaribus solifariis pedicel-lalis caeuleis, pedicellis folio duplo brevioribus. 5 ^t^l Caput Bonae-Spei in fonte Bocklandsberg.— Thunb. fl. cap. ed Schult. p. 178. Willd. sp. z. p. 9^7. Ait. h. kew. ed. 2. v. 1. p. 356.

1f)6.. L.? PANICULATA (Linn. sp. p. i3xc>), glabra, caule erecto basi simplici fotioso, supernè raraoso paucifolio , foliis oppositis lanceolatis acentis, ramis diebotomis, pedicellis ex axillis bractearum op^ositarum folio similium illis triplo longioribus, floribus m in in) is, lubo calycis ovoideo. (I;ad Caput Bonac-Spei. Rapunlium foliis linearibus acutis llioibus gemellis polyunthos Burm. afr. p. 100. t. 38. f. 3. Ex cl. Presl (prodr. lob. p. fli) eadein quam Wahlen-bergia exilis nob. sed ex icone non videtur. Habitus diversos et corollse lobi iusequaales. Nee tamea Lobelia videtur propter capsulam 3-locul. exdescript. ^urrian.

167. L. FATDLA (Linn.f. snpl. p. 3g5), caulis plnribus filiformibns diffusis prostratis elongatis sirnplicibus vel remotè dichotoiuis rugosis glabris, foliis sinuato-dentatis villosis, inferioribus petiolatis ovalis oblongisve aculis paten-tibns, superioribns lanceolatis, floribus alternis remolis cernuis , pedicellisso-litariis capillaribas bracteâ longioriboa. — ad Caput Bonae-Spei in Lange Kloof etalioruui montium vallibus.— Thunb. prodr. p. 40, fl. cap. p. i8x. Rapun-tura patnlium Presl prodr. lob. p. 30. Caules patentissimi pedales et ultrâ. Folia pauca alterna vel ex axillis 2-3, nnguicularia usqâe pollicaria, petiolo semipollucari.

* * * *Asiatics et Australasicce.*

168. L. MJLCROSTACHYS (Hook. hot. yoy. Beech, p. 88), glaberrima , foliis linear-lanceolatis ntrinque angustatis subcrenatis, raceroo simplici terminal! longisimo, pedicellis axillaribus l-floris seenndis horizontalibus apice sursùm ver-gentibus pauld infra medium bibracteolatis bracteâ lineati Integrâ longioribns, calycis tubo heroisphaerico lobis obtasis ovatis sqnali, antheris a inf. apice harbatis ceteris glabris. 5 ^n ^ns< Sandwicensibns. D.elisse ? naacrostachy* Presl prod.lob. p. 88. Caulis elatus strictus. Corolla dorso fissa 2-3 uncias longa arcaata, ex cl. Hook.: tabo cylindraceo 5-fido hinc fisso,; ex specira. herb. Lambert: petalis diù cohaerentibas , derañm 2 sup. liheris lineanbus, 3 infer, comiatis, omnibus longitudine similibus. Fructus ign. ergo genus ignotum. An Lob. Gaadichauidii affinis? an Macrochilo? (v. in h. Lamb, ab itin. Beechey.)

169. L. SEB^E, glabra caule flexnoso berbacco decumbente raraoso, foliis sessili-ibus utrinque vel uno latere i-deniatatis acutis mediis oblongis superioribns linearibns , pedicellis axillaribus et terminalibus folio sublongioribus, tubo calycis ovoideo laciniis linear-acuuinalis pateniibus subbreviore, corollâ in-fundibuliformi irregulari snperne flssâ laciniis vix longiore. — in Ceylonâ. C^mannla ceilanica senecionis folio flore pnrpureo Seb. tbes. 1. t. a2. f. 12. p. 37 (non lob. Zeylanica L. qua? forsani L. affinis Wall.). Folia inf. desunt in icone, media subpollicaria 3 lin. lata dente medio vel propè api.cem. Co-rolla in i c imperfecta an bilabiata?

170. L. MOMTANA (Blum. ! bijdr. tot flor. ned. ind. p. 728) f caule herbaceo pro-cumbente ranioso teretiusculo, foliis oblongis lanceolatis acrinalis argute cerratis glabris, pedicellis axillaribus solitaria unifloris folio dimidio brevio-

rib us. — in sylvis montanis huimdis Jav^o. Ex specimoe beib. Lugd. bat. in b. mas. Par. caulis laevis a liu. crassus , rami flexuosi, lolia o\ato-acuminata basi in petiolum brevem angustata 2-3-poll longa i-f lata, pedicelli pauci axilla res, tnbns calycis hemisphaucus lobis linear-lanceolais multò brevior. (v. spec, coiollâ map. in. b. mus. Par.)

**** Patrice incerUe.

171. L PROCUMBENS, bortul Rapnntium pro cum bens Presl prodr. lob. p. 17 obi solam nomen. Sub hoc nomine L. Erin 11 in in horto angl. Heytesbuui vidi.

17a. L. ? RACEMOSA (Wcstm Roem. et Sch. syst. 5. p. 58), fobis ovatis peliolali* glabris denticul. Uis, caule erecto, pedanculis axillai^u* teiminalibasque race-inoso-coiyrubosij», pedicel II3 capillaubu* brarteatis. —Habit.it .. Caulis pedales glabei infeine flexuosos. Folia pollicaiin petiole tenuibns. Pednnculi communes folio breviores apice foliom, pedicellis axillaribus uniflons. Corolla vix 2-lin., calycom paruin excedens pentapbyllum.

173. L.? UM BELL AT A ('Vest in Roem. et Sch. syst. 5. p. 58 non H. B. et Knntb.), glabra , cauhbus angulatis errciis, foliis sessilibus lineaibus apice dilrif^qito-tii-fidis dentdtis clentibus elong.itis , flonbus ttTiuinalibus umbellatis, biaoJei um-bellula: brevibus, pedicelJii longitudine calyci^ tnbo corolla; duplo bievoris lacimis glabns , lobis labij coroiae supenois reflexis lineaibus, infenois ob-longis subapqidibus, stamibus tubo coroiae paulo bievioibus, antberis apice baibatis. — Habitat. . . Canles pedales. Folia dentato-lacimata ut ad basin folioium Chrysauthemi Lencantheini. Corolla caerulea polcaris. Capsula bilocula DOD inflata.

L. INTEGRIFOLIA Nois. hort.

L. GRATILOIDES Roxb.

L. PURPUREA Breiter ined.

| Cl. Piesl nomine tant^m notae; in pio'r. mon.

| lob. ad calc. citatae.

•j' *]- *Lobelia exclusce.*

L. A CUM IN ATA Sw. = Tnpa aenminata.

L. ADENOFORA. Roem. et Scb. = Lysipoma arcliodes.

L. AMERICANA W h. = Scaevola Plumieu.

L. AMBIGUA Cham. = Dehssea ambisua.

L. ANDROPOGOTT Cav. = Centiopogon andiopogon,

L. ANDROSACEA Willd. b = Lysipoma acaulu..

L. ANGUSTIFOLIA Cham. r= Dehbsea angustifolia.

L. AREOLATA Rich = Tupa stricta.

L. ARENARIA Salziu. herb = Cephalostigma Bahiense

L. ARGUTA Lindl. = Tupa sahcifolia.

L. ASCLKPIADEA Willd. =Siphocampylns ferrugineus.

L. ASPERA Spreng. = Dobrowskia aspera.

L. ASPLENIFOLIA bortnl = Iiotoma senecioide&.

L. ASSURGEWS L. = Tupa assnrgpns.

L. ATTENUATA Presl. = Siphocampylns atlennatus

L. AYAVANENSIS Willd. h. = Siphocampylas umbellatus

L. BARBATA Cav. = Siphocampylus baibatns

L. BEGONIFOLIA Wall. = Piddingtonia begonifoha

L. BERGIANA Cham. = Grammatotheca Bergiana.

L. BERTERIAWA Spreng = Centiopogon Berterianns

L. BESLERIOIDES H. B. et K =Centropogon bfsleiioidc&.

L. BETUL^EFOLIA Cham. = Siphocampylus betuleefohus.

T BIDEWTATA Donn = Dobrowskia unidentaia

- L. BISERRATA Cav. = *Siphocampylus biserratas*.
 L. BIVONJE Tin. = *Laarentia tenella*.
 L. BONPLANDIANA R. et Sch. = *Centropogon Bonplandianus*.
 L. B&ANDTII Nois. h. = *Tupa salicifolia*.
 L. BBIDGESII Hook. = *Tapa Bridgesii*.
 L. BROUSSONNETII Bory. = ? *Wahlenbergia lobelioides*.
 L. BRTOIDES Willd. h. = *Arenaria dicranoides*.
 L. BULBOSA L. = *Cyphia bulbosa*.
 L. CALYCINA Cham. = *Delissea calyciua*.
 L. CAMPANULOIDES Thunb. = *Isolobas campanaloides*.
 L. CANARIENSIS li. par. = *Wahlenbergia lobelioides*.
 L. CANA Presl. = *Sipbocampylas canus*.
 L. CANESCENS Presl. = *Siphocampylus canescens*.
 L. CARDAMINES Thnnb. = *Cyphia Cardamines*.
 L. CARDIOPHYLLA Presl. = *Siphocampylus cardiophyllus*.
 L. CAUTSCHUK. WJlld. herb. = *Sipbocanipylas Caoutschoac*.
 L. CHAMIGRITYs SpreDg. = *Dobrowbkia aspera*.
 L. CHAMISSO^IANA Presl. = *Siphocampylas Chamissonianus*.
 L. CHEIRANTEUS L. = *Manalea Chei ran thus*.
 L. cruATA SpreDg. f. = *Prisraatocarpus*.
 L. CIRSIIFOLTA Lam. = *Tnpa cirsifolia*.
 TJ. CoLUMNEE L. f. = *Siphocampylas Golumneae*.
 L. COMOSA Cav. = *Siphocampylus comosus*.
 JJ. CONCOLOR R. Br. = *Isolobus concolor*.
 JJ. CONGLODATA Lam. = *Tupa conglobata*.
 XI. CONGLOBATA Sieb. = *Tupa Havescens*.
 L. CONVOF.VULACEA Cham. = *Siphocampylas convolvalacous*.
 L. CORDATA Willd. h. = *Siphocampylas volabilis*.
 L. CORNDETA L. = *Centropogon Srinamensis*.
 L. CORYMBIFERA Presl. = *Siphocampylus corymbosui*.
 L. CORYMBOSA Grab. = *Isolobas corymbosus*.
 L. CRENATA Thanb. = *Cyphia crenata*.
 L. CRENATA Presl. = *Siphocampylas crenatifolins*.
 L. CRETICA herb. Juss. = *Laurentia tenella*.
 L. GYPHIA Thanb. = *Cyphia digitata*.
 L- CYPHIA Gmel. = *Cyphia bulbosa*.
 L- DEBILIS L. f. = *Monopsis debilis*.
 li. DECUMBENS herb. Jnss. = *Siphocampylas decambcns*,
 L. DENTATA Willd. = *Centropogon Bonplandianus*.
 L. DEPENDED ^ . et p_{av} ^ = *Siphocampylus dependens*.
 L. DIGITATA Thanb. = *Cyphia digitata*.
 L. DIOICA R. Br. = *Holostigma dioicum*.
 L. DOMBEYANA Presl. = *Siphocampylus Dombeyanus*.
 L. IDULIS Presl. = *Centropogon edulis*.
 L. ERINOIDES L. = *Enchysia erinoldes*.
 L. ERINOIDES Thunb. = : *Isolobus campanloide^*.
 I*. ERIHUS **Thanb fl.** jap. = *Isolobas radicans*.

- L. EXCELS A BoDpl. = *Tupa salicifolia*.
 L. PERRUGINEA L. f. = *Siphocampylus ferrugineu*[^].
 L. FQETIDA H. B. ct K. = *Siphorampylns foetidus*.
 L. FRUTESCENS Mill. = *Scaevola Plumieri*.
 L. FDSCA Fresl. = *Siphocampylus fuscus*.
 L. GASPARRINI Tin. = *Laurentia Michelii*.
 L. GIGANTEA Gav. " = *Siphocampylus giganteus*.
 L. GIGANTEA Sims. = *Tupa salicifolia*.
 L. GLABRATA H. B. et K. = *Siphocampylus glabralus*.
 L. GRANDIDENTATA Schlecht. = *Siphocampylus grandidentalii*s.
 L. GRANDIS L. f. = *Centropogon grandis*.
 L. HIRTA Cav. = *Centropogon hirtos*.
 L. HUMBOLDTIANA R. et Sch. = *Specnlaria perfoliata*.
 L. BYPOCRATERIFORMIS R. Br. = *Isotoma Brownii*.
 L. HYSSOPIFOLIA Salzm. herb. = *Sohwenkiae* sp.
 L. IMDRICATA Cham. = *Siphocampylus imbricatas*.
 L. JAPONICA Dielr. = *Isolobas campanuloides*.
 L. IWCANA R. et Pay. = *Tupa obovata*.
 L. iNcisATHunb. = *Cypbia incisa*.
 L. INUNDATA CuniDgh. = *Isolobns Cuningbamii*.
 L. KUNTHIANA Presl. = *Siphocampylus uwbellatus*.
 L. LACINIATA Presl. = *Siphocampylus laciniatas*.
 L. liEviGATA L. f. = *Centropogon laevigatas*.
 L. LARICIWA Spreng. = *Prismatocarpus diffosus*.
 L. LAURENTIA L. = *Laarentia Michelii*.
 L. LAURENTIA WANA Hoffm. et Link. = *Larentia teuella*.
 L. HMOSELOIDES Willd. h. = *Lysipoma montioides*.
 L. LONGIFLORA L. = *Isotoma loDgiflora*.
 L. LUTEA L. = *Parastranthus luteus*.
 L. LYCIOIDES Cham. = *Siphocampylus lycioidecs*.
 L. MACROPHYLLA Presl. = *Siphocampylus macrophyllus*.
 L. MACROPODA Sw. = *Siphocampylus macropodus*.
 L. MACROSTIEMOW Presl. = *Sipbocampylas macrosteinon*.
 L. MEGAPOTAMICA Spr. = *Wahlenbergia linarioidcs*.
 L. MINIMA Sims. = *Lanrentia minuta*.
 L. MINUTA L. = *Lanrentia minuta*.
 L. MINUTA DC. = *Lanrentia tenella*.
 L. MUCRONATA Cav. = *Tupa mncronata*.
 L. MUTISIANA H. B. et K. = *Siphocampylns Mutisanus*.
 L. NERIIFOLIA Moris. = *Tnpa salicifolia*.
 L. wiTiDA Presl. = *Siphocampylns nitidns*.
 L. WIVEA Willd. = *Byrsanthes nivea*.
 L. NUDICAULIS Lam. = *Cypbia Phyteuma*.
 L. NUMMULARIA Lam. = *Piddingtonia mimmuluiia*.
 L. OBTUSIFOLIA Willd. h. = *Siphocampylus srandcns*
 ^ ODOCATA Grab. = *Pralia bedcracca*.

- L. OPPOSITIFOLIA Spr. in Zeih. pi. cap. n. 354- = ? Wahlenbergias »p. ex d.
Presl. Specimen sine flore vidi.
- L. PALUDOSA Natt. = Lobelia Dortmanna.
- L. PARVIFOLIA Berg. = Lightfootia oxycoccoides.
- L. PEDICELLARIS Presl. = Siphocampylas longepedaacuUtas.
- L. PENDDLIFOLIA Pre&l. z= Siphocampylns pendulifolias.
- L. PER&IEFOLiA Lam. = Tupa persica?folia.
- L. FINNATIFIDA Cham. = Delissea pinnatifida.
- L. PHYTEUMA Linn. = Cyphia Phyteuraa.
- L. PINNATA Lam.=Non Lobeliacea.
- L. PLUM 1 ER 1 Lin.=Scaevola Plumieri.
- L. PLUMIERI Burm. = Sexvola Taccada.
- L. POLYPHYLLA Hook, et Arn. = Tupa polypylla.
- L. PRUNIFOLIA Presl. = Siphocampylus prnnifoliis.
- L. PSILOPHYLLA Presl. = Siphocampylus psilophyllus.
- L. PUBESCBNS Willd. = Enchysia re pens.
- L. FULYERULENTA Pers. = SiphocaiDpylus campanolatus.
- L. ruLVERur. ENTA Hook. = Siphocampylas Jamesonian.
- L. PURFUREA R. et Pav. = Siphocampylas rosmarinifolius.
- L. PURFUREA Lindl. = Tupa parpurea.
- L. PUSILT< A Poepp. = Clintonia pusilla.
- L. RACEMOSA Sims. = Tapa racemosa.
- L. RADICANS Roxb. = Isolobas Roxburgii.
- L. RADICANS Thunb. z= Isolobus radicans.
- L. REPEf s Tbanb. = Enchysia repens.
- It.* KOBUSTA Grah. = Tupa robusta.
- L. ROSMARINIFOLZA Presl. = Siphocarapylus rosmarinifolius.
- L. RUGOSA Presl. z=z Siphocampylas rágosus.
- L. SALiciFOLTA Sweet. = Tupa salicifolia.
- L. SALICINA Lam. = Tupa acuniinata.
- L. SCAB R A Thnnb. = Dobrowskia sea bra.
- L. SCABRA Spreng. = Dobrowikia aspera.
- L. SCABRA Presl. == Siphocampylus scaber.
- L. SCAN DENS H. B. et K. = Siphocampylas &canden.s.
- L. SCAWDENS Berter. zz: Gentropogon Berterianos.
- L. SCAPXGERA Br. = : Enchysia scapigera.
- L. SCAPXGERA Willd. = Dobrowskia onidentata.
- L. SECUNDA Linn. f. == Enchysia repens.
- L. SECUNDA R. et Pav. = Tupa secunda.
- L. SELLOWIAWA Presl. = Siphocampylus Sellovianas.
- L. SEKBCIOIDKS Sims. = Isoloma senecioides.
- L. SESSir.iFot.iA H. B. et K. = Specularia perfoliata.
- L. SETACEA Sibth. et Sm. = La uremia tenella.
- L. SETACEA Zeyh. = Prismacocarpi spec.
- L. SPECTABILIS. H. B. Willd. h. = Centropogon Surinaiuensis.
- L. SPATHULATA Bridg. = Selliera radicans.
- L. SPECULUM Andr. = Monopsis Specaloin.

- L. SPK.CROCARPA Jnss. herb. r= *Centropogon Sorinamensis*.
 L. STRICTA Lam. z= *Tapa stricta*.
 L. SUPERBA Cham. = *Macrocibilus superbis*.
 L. SURINAMENSIS L. = *Centropogon Surinamensis*.
 L. TACCADA Gcertn. = : *Scxvola Taccada*.
 L. TENELLA Biv. = *Laurentia teuella*.
 L. TENELLA Lin. = *Lightfootia oxyccoides*.
 L. THERMALIS Thunb. =z *Parastrantbus tbermalis*.
 L. TRIRHTILLA Presl. :=: *Siphocampylus doploserratus*.
 L. TUPA L. = *Tapa Feillei*.
 L. TUPA Donn. = *Sipbocampylus giganteas*.
 L. TUPA Ait. = *Tupa salicifolia*.
 L. UMBELLATA H. B. et K. = *Siphocampylus ombellatui*.
 L. UNDENTATA Ait. = *Dobrowbkia unidentata*.
 L. VARIIFOLIA Sims. = *Parastranthus variifolias*.
 L. VBRBACIFOLIA Presl. = *Sipbocampylos verbascifoliui*.
 L. VERTICILLATA Cham. = *Siphocarapylus verticillatus*.
 L. VEKTICILLATA Kunze. =r *Stenodix sp*.
 L. VILLOSULA Presl. := *Siphocampylus villosulas*.
 L. VIROATA Poepp. = *Siphocampylus virgatus*.
 L. VOLUBILIS H. B. et K. == *Sipbocampylus volubilis*.
 L. VOLUBILIS L. = *Cypbia volubilis*.
 L. WESTINIANA Thunb.z= *Sipbocampylas Westinianus*.
 L. WILLDEWOWIANA R. et Sch. = *Lysipoma aretioides*.
 L. WrLDENOWIA Presl. = *Siphocampylus ambellatus*.

XXI. TUPA. *G.Don gen. syst. gard. 3. p. 700.* — *Lobeliae sp. Linn, tt ornn. fere auct.* — *Rapuntii spec. Presl prodr. mon. lob.* — *Tylomium Presl ibid, p. ii.*

Calyx 5-lobus, tubo hemisphærico vel globoso. Corolla persistens, i-labiata, dorso longitudinaliter fissa, deflexa, plana vel concava, c petalis 5, insequalitercounatis, apice diiii cohaerentibus constans j lobis 3 centralibus seu inferioribus magis connatis, lateralibus plus niiniis- ve divergentibus immquam erctis, omnibus quandoquidem sub fin em florationis segregatis. Stamina 5, connata; antheris omnibus vel 1 in- ferioribus apice barbatis caeterum glabris aut pilosis. Capsula infera, rariis supernè libera, bivalvis. — Herbae elaias? vel suffrutices, caule simplici, foliis alternissâbpiis lanceolatis medio approximatis, racemo folioso elongatomullifloro. Floi'cs saepiis purpurei, raro coccinei, flavi aut virescentes. Succus lacteus acris in totâ plantâ.

Sect' 10 1. EUTUPA.

Anthers a inferiores apice barbatae, omnes cajterum glabrae ant piles*. — Species Peruvians vel Cbilenses.

1. T. FEUILLEI (6. Don gen. syst. gard. 3. p. 700), tomentosa, canle erecto sim- plici angulato, foliis sessiliis decurrentibus ovatis acutis minute denticulatis, pilis stellatis, bracteis sibintegris ovato-lanceolatis acutis pedicello siblon- gioribns, calyce globoso lobis triangularibus erectis integris corolla 8° brevio- ribns, corollâ pubescente, antheris 2 infer, apice barbatis. *f in Chili, ins. Juan Fernandez et Peraviâ. Rapuntinm spicatum foliis acutis vulgo Tupa

Feuill. journ. obs. 2. p. 739 t. 29. *Lobelia Tupa* Linn sp. 1318. Sims bot. mag t. 2550. Svv. brit flow. gard. sei. r t. 284. Lindl. bot. leg. t. 161a. opt. Poepp' diai. n. 405 non Ait *Rapuntium Tupa* Piesl prodi. lob. p. 28 Plant a Verbasci habitu, lacemo mulufloro, corolhs ex lubro aurantiacis. Antherae in iconে omnino pilosoe, non semper in sperim. nostiis (v s)

- a. T. BERTERIT, caule erecto simplici tereti basi glabnusculo superne cmm foliis pedicellis floribusque pubeiulo, foliis sessilibus lanceoziatis acutis minute denticulatis, bracteis linear-i-acuminalis pediello xquabbus dentatis, calyce globoso lobis hneari-acuminatis erectis integns corolla 5° vel 6° brevioiibus, an them pilosiuscuhs 2 infer, apice baibatis If in Chili prope Rancagua Lobelia quae a Tupa videtui diveisa vulgo *Tupa*, Bert¹ herb, aim 1828 sub n. 389. Cauliscuiler 3 peduhs. Folia pruno aspectu glahra, vitio phescentia, pilis subtus frequentioribus laro stellatis, 4-5 poll, longa, 1-1 J lata. Pedicelli bracteae quepolhcaies hispidi Corolla purpuea pubescens Filainenta basi hirsuta. A praecedente diffeue videtur praecipne lacinns calycims anguslioribus. (v. s)

3. T. MUCRONATA, villosa, caule erecto simplici sulcato, foliis sessilibns ovato-acutis mucronulatis serrulatis, pedicellis axillanbus nudis folio dimidio brevioiibus, calyce subgloboso, lobis lanceoziatis acuminatis electis integris tubo aequalibus, corolla roicina subvillosa tñfula lobo medio apice tñlido ovato lateralibus linearibus, antheris 2 infer apice baibatis 3ⁿⁿ Chili iundo Cucha-Cucha Lobelia mucionata Cav. ic. t. 5i6. *Tupa Cavanillesiana* G Don gen. syst. gard. 3. p. 700. *Rapuntium iuucronatum* Presl prodr. mon. lob. p. 29. Caulis fere orgyalis. I^olia pallida superiora a poll, longa sennpoll. lata

@. *Hooherij* biacteis niinoibus pedicellis dimidio brevioiibus, floribus nutantibus, lobis calycinis brevioiibus tiangularibus — in Chili *Lobelia mucronata* Hook bot. mag. t 3207 C[^]ulis 3 ^-3-pedahs pubescens I'olia omnino ut in ic. Cavan basi obtusa lat.i. Capsula late pyrifoimis nutans. An species diversa propter pedicellos biacteis longiorcs^p

4. T. onovATA (G. Don gen. syst. gard. 3 p. 700), foliis obovatis obtusis snbtis lubiginosis tomentosis subdenticulatis, pedicellis axillaribus folio longiobus, calyce sphaerico, corollà brevinscnà, antheris omnibus baibatis If in Peruvia. *Lobelia incaua* Rill et Pav. in h Lamb. *Rapuntium obovatum* Presl prodr. lab. p 25. Folia in herb, rgnlosa. I<loies puipurei vel rnbu Planta a-3-pedalis ?.
5. T. HYSSOPIFOLIA, pubescens, canle simplici angnato, folus sessilibus lineaiibns lanceolatis acutissimis integermis, floribus axillaribus racemosis folium aeqnanhbns, pedicellis corapressis, calycis lacinns lanceoziatis acuminatis tubo longionbus, corollà pubescnte, labii lobis ad medium connatis. — in Peiuv/a ant in Chili. *Rapnntium hyssopifohum* Presl prodr. mon. lob p. 29

* * *Foliis glabris.*

6. T. OVATA (G. Don gen. syst. gard. 3. p. 700), glabra, folns ovatis remote denticulatis, racemo terminali elongato denso, flonbut. secundis, starainibis valde exseitis, antheris infer ne barbatis. If in Peru via (h. Lamb.) lolia in bebario rugulosa.
7. T. SECNDNA (G. Don gen. syst. gard. 3. p 700), glabra, foliis elliptico-lanceolatis denticulatis margine subrevolutis, racemo teiminah bievi, llonbns[^] secundis, bracteis paivis lmeaiibus, pedicellis axillaiibus, columnà staminea valdeexserta, antheris 2 baibatis. \$ m Peruvia. *Lobelia secunda* Ruiz et Pav. in h Lamb *Rapuntium secundam* Presl prodr. lob p. 29. lolia approximate. Lobi calyciui membianacei.
- « T. SALICIFOLIA (G. Don gen. syst. gard. p. 700), glabra, caule erecto simplici tereti, foliis sessilibus lanceoziatis utunque acutis serrulatis mtidis pedicellis folio dimidio brevioribus infia medium bibiacteolatis, calyce globoso, lobis lanceoziatis acuminatis erectis corolla 5° brevioribus coiolla glabnusculi lobis lmeanibus apice connatis, antheris 1 infei barbatis. % in Chili pi opé "Valpa-

- raiso (Place¹ Abadia¹) Lob salicifolia Sweet hort. snbarb. lond. p 37. Hook, journ p. 278, non L. saKuna Lam Lobelia Tupa Ait h. Kew. ed. 2. p 35>j. noa Linn. L. gigantea Sims bot mag. t i3s5. non Cav. L. ezcelsa Bonpl jard. Nav etMalm.p 112 t 46 L IUandtii hoit. Pans. (h. Cels!) Lob. arguta Lmdl.bot. reg t. 973 non hortul. Tupa arguta G. Don gen. syst. 3 p 700. Lob. neiiifolia Moris act mem acad. tur. 38. p 44. lolia zJG poll, longa erecta Pedirelh raio in axilli* foliorum su pei 101 uni. Coiolla aurea nuncrubro tincta. (y. s)
9. T PURPUREA(G Don gen. syst. gaid. 3 p. 700), canle erectosimpli giabro, folus lanceolatis utiinque acammatis glabris seriulatis)>raeteis ovato-lanceolatis pedicelhs nudis duplo longioribns, calycis plobosi tubo 10-costato, lobis tnangularibus arutis ectis integiiscum pedicelhs pubescentibus coiollā roseā octuplo bievionbus, antheus pilosis. & ⁱⁿ Chili prope Valparaiso. Lobelia puipuiea I indl. bot leg t i^25. Kapunlum purpuieum Presl piodr. inon. lob p. 29.
10. T BLINDA. (D. Don bnt flow. gard. ser. 2. t. 308), glabernma, canle electo simpli tiiquetio, folus se&sihbis inaequaliter decurreutibus basi latis Lmceolatis acuminatis glanduloso-duphcato-serratis , pedicellis nudis folio dimidio brevioibus, calycis Mibglobosi lobis lanceolatis erectis acotis mmute seiratis corolla 8° brevioibus , corollā roseā sub-5-lidā glabuusculā lobis demum libens planis lanceolatis sequahbus, antheris glabiis 2 infer a pice barbatis. If iu Chili. Rapnntium blandum Piesl piodr lob. p 27. Canlis 3-peddlj».
- ZT. T. BESSERIANA, caule erecto simplici tejetiusculo foliisque glabio , foliis sessilibus lanceolatis acutis mucionutib (In plica to lemote callosoque &erratis basi acutis, floubus axillaiibus secundis folio acuminato longionbus, pedicellis angnlati, calycis pubescentis lacimis lanceolatis acuminatis tubo duplo longioribus, corollā pubescente, labii lobis libeiis, capsulā decera-costata. ^{^ ia} Chili. Rapantiam Besseiianam Presl prodr. lob. p. 38. Piscedenti valde aitinis videto1.
12. T. POLYPHYLLA (G.Don gen.syst. gard.3.p. 700), caule ereclo simplici glabro teieti, foliis ovato-lanceolatii sessilibus mucionatis argute et 1 emote serrdtia coriaceis glabiis, inferioibus basi attenuatis noagis dentatis, pedicellis axilla-ribus folio brevioribus pubescentibus, calyce pubescente, lubo hemispbxrico, lobis triangulanbus ercli[^] tubo fequalibus, corollā velutinā atropnrpureā lobis diu in labellum concavum ovatum connatis, antbens glabris 2 iufei. barbatis ^ *ⁿ Chili pi ope Valparaiso frequens Lobrlia polyphylla Hook et Arn bot. of Beech voy p. 33. Hook. bot. inag. t. 355o. D Don bnt. flow. gaid. ser. 2. t. 242* Rapuntium polypylluro Presl prodi. p. v8 Caulis 4-5-ped. Folia crehra 2-5 poll longa, superionbus (biacteis) o\atis lalis approximatis. Coiolla non longa subpollicans. ^v s.)
- >G Arfustifoha (Hook ' et Am. jonin bot. p 277), foliis angustioribus snb- "integns. __ Prope Coquimbo Hook ex Cuining? n. 888. etQuillota. (Bert^r) (v in h Benth.)
- y. Latifoha, folus lalionbns ovato-acutis. — In Chili ad Concern. (Pcepp. 1828 n 2qo diar et coll i. pi. chil n. 7\$) prope Valpaiaiso (Cniuing! n. 5qo) Lobelia Po?ppigiana Knzze¹ Rnpuntium Pajppigiauum Presl piodi. lob. p 29 ubi tantum nomen. L. polyphylla Hook, et Aiou journ. bot. p 277. (v. s comm. à cl Poeppig. et in h. Benlh.)
13. T. SUDDENTAIA, glabeinma, caule simplici angulalo, foliis sessilibns lanceolatis utiinqne acutis basin veisus remote denticulatis, lacemo apice nutante, bracteis lanceolatis acutis pedicellum supeiantibus, calycis lacimis ovato-tnangularibus acuminatis tubum aequantibus, corolla pa be ml'a , labii lobis usque ad medium connatis. % in Chili. Rapontiuin subdentatum Piesl prodr. mon. lob p. a8. T polyphyllae valde afiinis videtur.
- '4. T. BRACTEOSA, glabra, canle eiscto simplici angnlato, foliis sessilibus linear-i-lanceolatis ulrinque acutis dnplicato acute callosoq. denticulati9, bracteis ovatis brevissime acummatis obsolete denticolatis flores lacemosos duplo

superantibus basi rotundatis pedicellis angulatis flexaosis corollâ pobescenta brevioribus, calycis puberuli lacinii lanceolatis acaminatis tubam aquanti-bns, labii lobis infrâ medium liberis. *fr* in Chili. Rapnntium bracteosum Presl prodr. lob. p. 29.

15. T. BRIDGESII, glabra, caule erecto simplici, foliis lanceolatis longè acaminatis acutè serrulatis basi decurrentibus, racemo elongato, bracteis infer, pedicello longioribus, saperioribus brevioribus ovato-acuminatis, lacinii calycinfo lanceolato-acuminatis ciliato-serratis tubo dimidio longioribus, corollae glaberrimae petalis medio et apice conualis linear-lanceolalis, antheris pilosiusculis 2 infer, apice barbatis. 5 i^Q Cibili propè Valdivia. (Bridges! n. 663.) Lobelia Bridgesii Hook, journ. 1. p. 278, bot. mag. 1. 3671. Rapuntium Bridgesii Presl prodr. lob. p. 28. Caulis 4-6-pedalit, basi suffrutescens. Folia 5-6 poll, longa. Corolla rosea reflexa sesquipollucaris staminibus dimidio ferè longior. (v. in h. Benth.)

Sect. 11. TYLOMLUM.

Anthere omnes apice barbate. Annulns carnosus brevis inter ovarii verticem et tubum calycis. — Pedicelli sapè cum bracteâ basi connati. Folia glabra. Omnes ex iusulis Caribaeis. — Tylomium Presl 1. c.

16. T. AACEMOSA, caule erecto simplici glabro striato, foliis sessilibus medio approxitnatis lanceolatis acaminatis grossè et acutè serratis, racemis terminali nudiusculo elongato glabriusclo, bracteis lanceolatis spinuloso-serratis, inferioribus pedicello aequalibus basique counatis, superiорibns brevioribus, bracteolis 2 medio pedicellorum, calycis tubo latè heiiiispbeerico, lobis linearibus acuiis dentatis patentibus, antheris omnibus apice barbalis. 5 i^Q >nsula Sancti Christophi Antillarum. Lobelia racemosa Sims bot. mag. t. 21^7. Grah. Edinb. phil. journ. i8;8. p. 3g3. Rapantium racemosum Presl prodr. lob. p. 25. Caulis 3-5-ped. Folia 4-6 poll. Lobi calycini in iconi integri, in planta Grabami valde serratis. Corolla virescens glabriuscula. (v. s. com in. à cl. Grah.)
17. T. ROBUSTA, caule erecto simplici angulalo foliisque glabro, foliis supernecrebris obovato-lauceolatis acuminatis basi attenuatis et sabdecurreutibus grosse et acutè dentatis, floribus secundis numerosis, bracteis linearibus acantis cam pedicellis pubescentibus, pedicellis medio bibracleolatis bracteis longioribus, calyce velutino tubo globoso sulcato, lobis linear-acuminatis serratis apice reflexis tubo aequalibus corolla dimidio brevioribus, corolla trifida, lobo centrali tripartito. j in insula Hispaniola. Lobelia robusta Grab. Edinb. pbil. journ. sept. 1831, bot. mag. t. 3i38. G. Don gen. syst. gard. 2. p. 708. Tylo-niiin robustum Presl. prodr. lob. p. 3a. Caulis firmus ex decurrentibus foliis alatus. Folia coriacea, 6-10 poll, longa, dentibus crebris aequalibus subulatis xnagnis. Pedicelli pollicares. Corolla vioosa fa lea t a pnbescens ? aniberis 2 sa-perioribus ciliatis ex Grab.
18. T. ASSDRGEWS, canle erecto simplici angulato foliisque glabris, foliis subdecurrentibus ovato-lauceolatis serratis basin versus acute et grosse dentatis acumi-natis, floribus secundis nnmerosis, bracteis linearibus serratis, pedicellis medio bibracteolatis bractea basilari subbrevioribns, calycis tubo globoso, lobis linear-aenminatis serratis patentibus vel reflexis tubo sublongioribus corolla iriplo brevioribus, corolla pubescente semi-5-iida lobis linearibus. *2 ^ *n e^, lioribus ins. Jamaiae. Lobelia assnrgens Linn.! aman. acad. 5.p.408. Sw. obs. P- 317. Andr. bot. rep. t.553. G. Don. gen. syst. gard. 3. p. 708. Lobelia major brachiata assnrgens, etc. Brown jam. p. 322. Tylomium assargens Presl prodr. lob. p. 32. Caulis 3-4-pedalis ex decurrentibus foliis quasi alatns. Folia pedalia. Corolla sanguinea sen vinosa. Raceiuns inenrvus nt in praecedente, cui valde afnnis. Differt foliis basi angustioribus et aliis charact. (v. in h. linn.spec, floribnsimperf.)

£• *Porto-Ricens'is*, foliis crebre et acute dentatis. % j\$ in Porto-Rico (Wydler ! berb. n. 4*3.) Forma folio ram dentesque infcriores ut in iconi Andr. rep. t. 553, »ed dentes xnedii superioresque foliorum perpendicu-

lares, idto folia dentata nee pailim serrata. Lobi calycini iemote sen iti , in iconē (enore forsan) integri. Coiolla pubescent, (v.s.)

i< T. CONG LOB AT A , caule erecto simplici abbreviato crasso, foliis cuneifoliis oblongis subacutis dentatis nitidis glabris lacuum conglobatum pilosinsculum superantibus, biacteis linearis-lanceolatis denticulatis pedicello mediobibracteatis Mibbreviouibus, lobis calycis latis linearis-acatis dentato-niubnatis tubo heliusphsprico lato Uiplo lougioribus. If in montibus Maitinica? Lobelia ronglobata Lam. diet. 3. p 585 G Don gen. syst. gaid 3. p 707 Rapuntium foliis Ciisn Iucidis, etc Plum, sp 5. mss. 4 t 117. Tylomiui conglobatum Presl prodr lob p. 3a. Caulis pedalis vet paulo major, basi denudatus. Folia pedata , '{poll lata dentibus pi ope petiolum rans perpendicularibus majonbus, extie- imitate minonbus obliquis Corolla rubesrens calyce vix longior. (v. in b. mas. Pai)

&. *GElatwr*, caule raajore. — in insulā Haiti Rapuntium ahud foliis Cirsii, etc Plum. ibid. Lobelia conglobata Lam ibxl 1 assurgent valde affinis videtur

?o T. FLAVESCENS , glabria, foliis oblongis acutis¹ aerralis conaceis basi in petio- lum brevem angustatis, lacemo foliis longioie, biacteis ovato-lanceolatis utunque aculis senatis, pedicellis biactea b' re MO 1lb us medio bibracteolatis , tnbo calycis liemispserico, lobis linearis lanceolatis erectis subdentalis duuidio breviore, corollā falcata glabiā lobū calyunis diinidio longioie. — ia Martini- cā Lobelia conglobata Sieb.¹ beib ma it n 289, noa Lara Tylomium fla- vescens Prehl prodi. lob p 3a ubi solum uomen. Caulis in bspecimine sea pi- formis, foliis inferioribus appioximatis & poll longis 6-7 hn lati&. (v. in h Dunant ubi flores iuipeifecli.)

21. T. PSRSICJGFOLIA , glabria, caule erecto tcteti supeine lamoso, foliis lanceo- latis utunque aruminalis , peliolatis membranace s msequalitei senatis denti- bus acuminaDs, pedicellis infra medium bibracteolatis folio dimidio bievioribus, tubo calycis turbmato, lobib linearis-acuminatis tubo lougioribus subdentalis roillA dimidio bievionbus, coiolla levoluta lobis acuminate, antheris omm bus apice barbatis, capaula ovoida seraisupeia utrinque acutā. ^ *ⁿ monti- bus Gnadaluac frequens. (Kraus^! Perrotl. ' Badie ') Lobelia persicfolia Lam diet. 3 p. 585 (fid berb. mus Pans) non Cav. Caulis basi denudatiu, J<olia 4 poll longa 9 Im. lata dentibus alteinatim minoubui>, in petiolum i-i J poll longum angustatis Pedicelh folns obtecti basi ab llhs omnino liberi. Calyx 10-nervius. Corolla in heib. vinoba falcata Tubas calycis in capsula su- peine niarginatus. 'Valva obiusoe. Semina ovata subcoinpressa (v. s)

aa. T. STRICT A, caule erecto siuiplici angulato glabio foliis subconaceis glabris, radicalibubconfertissubsilibus ovato-cuneifoimibns acutis serrulatis, caulinis ovato-lanceolatis acuteet letiorsum denticulatis, flonbus electis, bracteislinea- nbus, pedicellisbrtvibus, lobiscalycinis liueau-lanceolatis acutiseiecto-pateuti- bus senatis. 5 in Guadalupae montibus. Lobelia stneta Sw. prodi p. 117 ilor. Ind. occ. p. IQ53 Lam diet 3. p 584 G Don gen. syst gard 3. p 708. Rapuntium ^tiictum Pieslpiodi lob p. 27 Lobelia aieolata Rich in Juss. ann raus 18 p 3' Caulis suffruticosus a 3-pedalis tolia subcouacca luagine denticulato-spinulosa, spinnlw letroisum flexis Corolla puipurascens, tubo longitudme calycis, limbo 5-parlito laciniis ifflexi^ Affinisl assmgenti, sed folia ldtioia denticuhs reflexis non molibus, caulis minime alatus

a3 T. nasiiFoiA, caule ereoto simplici basi denudato, foliis Hnea*i-lanceolatis glabiis dentatis,dentibusspinuhformibus distantibds,floribus nutantibus,biac- teis linearibus acutis obscure dentatis J in msula Sancti-Vincenti. Lobelia ciisii- foia Lam diet 3 p 584 Roem et Sch. syst. 5 p 47. Sinhocampylus^p cir- siifolinsG. Don gen. syst. gaid 3. p. 7^o Rapuntiuin alAunum folns Cirsii florē virescente Plum. sp. 5 mss 4 t 116. R.tpntiuuTFusnfoLpm Piesl prodr. lob. p ^7* ^adix Ghx laiossa. Eagliis pedals ciassa* Folia 7-8 poll longa, 9.1a lin lata. FloiesTirescenteb \el iiavidi. Plantl tola suteo laceo itn

odoio scatens Gum 1 stucta (lob stucta Sw) juuxit Willdenow sp r p 944, sed Lamarck qui plantas vid t sepaiautun enmeiavit

u4 T ACUMINATA, caule glabro erecto simplici teretiusculo, foliis lanccolatis ulnnque dcutis lemilatis subdecuentibus glabus, racemo fob is brevioie \e-lutino, bracteis liaeubiis pedicello medio bibracteolato aequalibus, tubo ca-1VCIS bemi9phaeric, lobis linearibus erectis deuticulatis coiolla dimidio bievio-ubus, coiolla revolnta exiernc velutina antbeus omnibus apice baibatis, capsula ovoideo acuimnata seiuisfpeia ty in neinorosis monlium Jam IICB (Sw Laja) et Haiti (Lam) Lobelia acuimuta Sw prodr p 117, fl Ind occ p »q50 Lobelia sabcina L in diet, i p i>83, non L sabnfolia Sweet Lobe lia folds oblongis etc BiownJun 5IA Rapunculus folio ohlongo, elc Sloan jam 1 p lib t q5 f a Rapuutium acuminaluiu Piesl piodi lob p 24 Cauli* 3 4 pedabb | olid 8 1a poll longa 1 2 poll lata 1 lores palhde rubes - centes aut viudes Riacieae cum basi pedicelloruiu connJta? (> s)

2i 1 EHbiFOLiA, caule erecto simplici glabio, folns longe lanceolati? ulnnque iciuinrilis glalms gl mduloso seuulttis, 1 ace mo pubciulo folns lougiore f bracteis linearibus dentatis pilosis pedicello medio bibi icelcolatis a?quahbus, rnbo c llycis velutini heimspbaoco lobis hneubiis mtegiis corolla velutini bieTic ubuSf lanthens 2 inf apicc baibatis, capsulâ tuibmato bemisphnencu infeiS ^ % in insuld Haiti (Poifcm') Pars infeuoi gl ibra , lacemus flores que velutini Folia supeuoia 6-8 poll longa Racemus subpedabs Lobi Cdly-cim in tlabastro triangulates bieves deinde lineaiei artiescentes Coulla virei r«ns film longa (v m b in us Pat)

Specie* dubia

Job soucUifolia Sw <st foisiu Tnpa Confei ad tab generis Lobelias

XXJI RHYNCHOPI^ALUM fresen bot zeu. Floi n 38 oct i838 p 603

Calyx tubo obconico-tamjanulato, limbo 5-pailito, lacinus folia ceis bncari-lanceolatis subuhtis Coiolla tubo superne hssso apitc accummato incuivo mtegio, limbo scilicet 5-fido nullo, ideoque petilum* unicum canaliculatum lostnfoime mentions St~~a~~mina 5, cum corollâ inserta, filatnenta mf(1 le libera et anthera? quarum 1 infei »l ice longe barbitas , in tubum libeium connatas Polhnis granule spha-iica (veu:»im ia aquâ immtisa^) ovauum inicnim, placentis dis-stpimento utnnque admlis Piuctus —Plauta paimaris, truncо stricto ultrâ orgyab, comam folioium racemosque longè biacteos extollen es.

R MOICTANUM —In piovinua Simen Abys&im< alt gi-iaoooped (Rupp)

X111 SIPHOCAMPYPLUS Pohl bras 2 p 104 C Don f,en sjrst gard 3 p 700 - Lobeha> sp Lin f suppl p 3qi. —Lobelia % I H Ji et Kunth now gen am i p 3oa — Lobi lia sect Sipbocaupylm Cham et bchlecht w Imn 1833 — Lobelia Pie si prodr mon lob p 33 non alior.

Calyx 5-lolus, tubo tuibunlo aut htmisspbaenco Coiolla tubo supLFne saepius vtnlricoso, plenique recurvo, mtegio vel (lanssime) 1 asi fib'jo ef supeine solum inttgio, lobis 5 tubo brevionbus bilabtatio falcalis, duobus supenoribus saepe niajonbus SU^I-I faucem leflcxis, infeiioribus'subbievioibus Stamna connata, anthcus 1 infVrKuibus A|nce barbatis ajk(rarius) omnibus hirsulis —Fiutices, sufiiutices, Q| lierbae, ex Tmencâ prasertim meridionali, non iunqudin scan-lent, caulibus ramisq sgepiu^ eiectis, fo^palterqis aut veiticillatis, pedicellis axjlnribus, flonbus rubus vel sorciide albidis, Lorollib pie-

riimque pubescentibus, latere superiore (in Lobeliis abbreviato) paulò niajore. Convexilas corollas sursim spectans.

Sect. i. HEMISIPHOCAMPYLDIS.

Corolla basi et apice 5-petala, medio gamopetala, petalis plus minusve in tnbum connatis. Filamenta staniuum basi ctm corolla (an in omn. spec?) adbixrentia. — Folia alterna.

* *Folia non laciniata.*

- x. S. BISERRATUS, caule simplici scabriusculo, foliis ovatissubacmis ha si rotunda tis breviter petiolatis irregulariter et duplicalii serrato-dentatis membrauaceis so-
>gernè glubris sulitùs cinereo-subtomeutosis, pedicellis folio triplo hrevioribus calyceque tomentosis, tnb calycis hemisphaerico, lobis ovato-acutis lubo triplo brevioribus, corolla glabra calyce niulto longiore ventricosâ basi fissâ superne lubulosa, lobis linearibas, antheris dorso glabris a infer, apicn barbatis If, J in Peruvia. Lobelia bisen-a ta Cav! ic. 6. p. 10. t. 5r4- haud bona. Hook! but. misc. a. p. 221. Presl prodr. lob. p. 38. S. Cavanillesianus G. Don geu. syst. gard. 3. p. 702. Caulis 3-pedalis et ultra, huffraticosus ex Cav., rectns vel ramo recto herbar.eoex specim. noslro. Folia 1-3 poll, longa tenuia sobsessilia. Racemus foliosus elongatus Kx corolla niedius inter Lobelias et Siphocampylos, 11 am rec'iuscula basi supernè iissa medio tubulosa. Filamenta staminum basi cum tubo corolla; connata. (v. s.)

p. iatifolia, foliis majoribus sessilibus. In Pérvia (Matthews! n. 5^o,)

2. S. DOMINGENSIS, caule herbaceo erecto simplici glabriusclo, follis Qvato-acuminatis basi in petiolum brevem angustatis dentieulaiis adpressè subpubes cenJibus, racemo terminali 6-10-floro, pedicellis infra med. bibract. puberulis, calyce puberulo, tnb calycis hemisphaerico lobis lanceolato-acuminatis dentatis breviore, lubo corollae tenuissime puberulo lobis calyciuis 5°-6° ve longiore, antheris omnibus apice birsntis. % in Sancto-Domingo (Poiteau in b. raus. Par!) Planta 1-2 ped. babilu Lob. cardinalis, radice h'brod, pedicellis nunc bractei longioribus nunc brevioribus. Corolla rnbra angusta cylindrace.i vix inenrva, ia-i5 lin. louga. Antberse inf. piaesertim apice barbatae. Caps, seratsopera. (v. in b. mus. Par. Deless. Juss.)
3. S. DECUMBENS (b. Juss. et mns. Par.), caule herbaceo decumbente simplici glabro, foliis ovato-aenminatis petiolatis iuaequaliter biserratis glabris, racemo laxo terminali, pedicel tis inf'a medianam partem bibracteolatis petiolo longioribus, tubo calycis hemisphaerico lobis lanceolato-acuminatis dentatis breviore, tnb cor. tenuissime puberulo lobis calycinis 0° longiore, an theris omnibus? apice pilosis — in Sancto-Domingo. Valdè prased. aflinissed petioli longiores, limbus basi obtnsus gro&sè serratus. Corolla ut in praeced. basi tam<n magis festrata. (v.in h. mus. Par.)

* * *Folia laciniata.*

4. S. TACINIATUS (G. Don gen. syst. gard. 3. p. 704), ramis velotinis foliis profonde dentatis aenminatis lobisque aenminatis, tubo calycis hemisphaerico, lobis corollæ falcatis, colnuina' sramiuea' vclutina', antheris giabiis ?* infer, apice barbatis. 5 in Pérvia. Lobelia biserrata Ruiz, et Pav. in h. Lamb. Lobelia laciniata Presl prodr. lob. p. 4- non Lara. Corolla rubra vel cocinea.
5. S. LAMARCKII, caule simplici foliisqne glabro, foliis pinnatifidis partitisve lobis ntriuqè 5-7 snboppositis linearibus mucronulatis integris, pedicellis paucis
- roulo omniau mctiuau bntiuau mctiuau mctiuau, calycis
glabro, tubo turbinato, lobis linear-acuminatis tubo sublongioribus, corollæ longè tubulosa rectinsecula externè subvelutinâ rectâ lobis calycinis 4° longiore. — in editoribus Sancti-Donyng, in districtu dicto du Borgne frequens. Lobelia laciniata Lam. diet. 3. p. 584, non Presl. Rapontion laciniatum Presl prodr. lob. p. 29. Caulis (vel ramus?) herbaceus. Folia 3 poll. longa, lobis 6-12 lin.

Jongls distantibus m petiolum seu nervum centralem decumentibus Times polliciae subcorymbosi, ia axillis folioimu supciiorum , lubn, ericti lubus corolla; basi cvidtntr /UHUS, incdio integei, a pice i-lbus Stamina (ex spec. Banks) apicc pilosa, a infer. pi.Tserlim extreuiilale baibata. la specim. lit'ib Tuss. folia pinuahiida (v s.)

Sect. ii. EUSIPHOCAMPVLCS.

Tubes roiollae oiuninū integer.

§ i. *Tubus corolla lobit calycinis multu` longiot*

* *Calyx tubo turbmato vel longe obconico.*

a. *Non scandentes, Joins alternis.*

- 6 S. vinoATus, canle recto simplici glabuuscolo, foliis ovato-lanreol itis breviter peliolatis lepande denticnlatis ulunqne acutis supeine glabris subtus neivlsqe pnbemlis, pedicellis (olio aequalibus glabuusculis apice appoxiualis,i aljcc \il-Josulo, tubo bievissimo tubinato, lobij> lineaibus acuminahs tubo tuplo lougioiibua corolla; tubo 4° bicMoiibus, coiolla glabiā cyhndiacea leitā, antlieia glabiis 2 inf apice baibatis If in Peiuvia Lobelia virgita Pocpp ' 11 1069 Piesl prodr lob p J4. Iolia iriegulauter sparsa i|-? poll longa cum petiolo a-hneaii, to lla. lata, subtus pallidioia louientum caducurn apiu> ca'lib et ad oiiginem pedicelloium Corolla polncans inedio puipuiea superne lutea. (v. s)
- 7 S. ATTSNUATUS, glaber, caole teieti lamoso, foliis petiolatis lanceolatis an-pustato-acuminatis leiuotc denticulatis basi acutis, pediodlis folio hrevionbus iufi 1 medium bibiacteolatis , calycis pubescens lobis lanceolatis arutius-culis tubo tuibiuato a?qualibus , coiollaj pubescens tubo lecto, cap&ulā 10-costatā. f> in Pciuvia. Lobelia allenuata Piesl piodi. lob p 34.
8. S pFNDuni-oLrus, glaber, laniisaugulatis,foliis petiohtis pendulis ovatisobtubis mucionatib re mote callosoque denticulalis ieticulato pellucidoque veno&is, lacemo multifloio , ilonbus secuudis pendulis pubescenibus , biacteis petiolatis linean-Iauceolatis pedicelhim bracteolatum a?quantibu&, lobis CM 1 vein is Jincaribus .1 cut is tubum turbinatum aeqiiantibus, corollx tnbo bievi, lobis elongatis lineaibus acummatis electis subx-qualibus, capsala 5-gona ^ ill Peruia. Lobelia J'eruluhfoha Pie&lpiodi lob. p 35.
- 9 S. HoMBOLDTtANUj, pilis patentibus dense pubescens, lamis angulatis, foliJt petiolalis ovatis lanceolatisque utunque acutis argute callosoque denticnlalis supia pljbrescentbtjs herbaceis, pedicellis axillaibus coiupressis folium jcquantibus, lobis calycinis ovato-tuangulaibus acutis tubo turbinato 10-costato bievoribus, coiollae tubo recto, 1 acinus ovato-lanceolatis acumin.itis aequaiibus, snpei. longionbus. /) in Peruvia. Lobelia Hnmboldtiana Piesl prodi lob. p 35, non Roem et Schnlt.
- 10 S. CoruMNEL (G Don gen syst. 3 p. 701), laiun. tomentosis, folns ellipticis utiinqueubtibus supia glabuusculis nitidn iugosi& sublus tomentoso-fen ugi-neis maigive levolutis ^ubcienatis, pedicellis folio dimidio bievionbu& pulve- iulento-toinento&i\$, talyce tomentoso tuibm.uo, lobis lineaibus tubo subbie- ioubns, coiolla exlus pubescente subincui \a basi angustatā lobis calycnn. mnlo lougioie, laciuns liueaiibus, mfeiioiibus bievioubus leflexis, aii\hens glabiis 2 inf apice barbatis. /> in No\ a Cianalā cnca Sauta-1'e. Lobelia Co- luinnjj Linn f sn>pl. p. jg3. Siu ic linn, ined 1 t. ?2 H. B' et Kuntli nov. gen et sp amk 3. p 3o2 Piesl piodi lob p 5\$. Rami lignosi foliosi Tonieulnm pagina j^f< fochoiuin lamoinm et Uoium e pilis stellatis bievibus ferniginu* conslans >olia a poll, longa , S-q liy, lata, petiolo 3 liu longo. T-loiesfautisesquipolhcaies rubu (v a)
- 11 S. RON-MARINII-OMUI (G Don gen. syst qaid 3 p 104), eieitus, fJn±

linear-lanceolatis integiis margine levolutis supeine glabus , sublus toiuento-ftisincanis, pedicellis folio acquahbus, tubo calycis turbinato, lobis loigie h-neaiibus, coiollâ lubiâ, antbeiiis infeiioribus apice baibalis /} » Peruvia. Lobelia purpuiea Ruiz et Pav in h Lamb. Lobelia losmauifolia Piesl piodr lob. p 66 Lobelia herb Domb ' n 4JS. Folia rlenza Salices quasdam lefereu-tia (G Don 1 c.) Rami lignosi, mtidi, ad ougincs foliorum cicatiisati. Vo lia linea u ngida 2-4 poll, longa 2-4 lin laia, supra lxvia , subtus iuiana adpiesse tomentosa. Pedicelli nudi folns subbiegioies. Corolla glabia recta, lobis calycinis multo longior, laciiniis rettis angustis G. Don calycom sphacticum dicit, sed in nostiâ plant'a et m Dombeyana ' cl Piesl ineraoiata tuihinatus superne ampliatus. (v. s)

12. S. RUGOSUS, lamis pendulis glabris, folns ovato-iotundatis basi laoceolatis brewter acuminatis calloso-denticulalis conaccis rugosis Mipra glabeiumis Mjbtis pedicellis flouibusque tornentosis, floiibus lacemoso-toiuentosis , pedi-cellis folio tiiplo longionbus, lobis calycinis linearibus acuminatis tubo biev-tci tuibinalo longioubui, roiolsc tectitutcniae lobislanceolatis acutis subaeqna-libus, capsula 10-angulan. 5 inPera\ia. Lobelia rugosa Pre& piodr. lob. p. 34.
- 13 S DERtrfDi-Ns (G Don gen syst g.ird. 3. p 704), laims terelibns apice tomentosis , folus conaccis ovato-lanceolatis subrotundatis acuminatis petiolalis argute spmoso-denticulalis suprà glabiis nitidis sublus tomentosis, pèdrellis folio longioubus llore ramulisque fcirugineo-tomentosis, tubo calycis tnrbi-nnto lobis lincati-subulatis dentatis brtvoie, coiolid extus pubescente tnbn-losA incut vâ lobis calycinis 5° longiore, anheus pilosiusculis infenonbus apice baibalu. Jy in Pernvâ. Lobrlia dependens Ruiz et Pav. heib. Piesl piodr. lob. p 39 Tolia 4-0-poll longa , 9-18 hn lat 1, cum peiilo glabiinsculo 9 lin. longo Mores saperne appioximatl, corollâ &esqnipollican. (v in herb Mono, et Dunant.)
14. S. TANTANIFOIIUS, lamis in feme glabus apice pedicellisque velutims , fohis ovatis ntutisbasi oblusis breviter petiolatis margine denticulatis lecums su-pcine glahiis lugosis suhtus fusco tomentoais ncvis eminentibus, pedicellis apite coi-iyubosis foliis dimidio bieMOiibus biactets lanceolalis luspidis lon-gionbus, calyce velntino, lobis linea ii-acuiuinatis tubo tuibinalo lougioiibtis, (Oiollâ angustâ incut vâ subvelutina lobis acuminatis, anheis glabiis a infei. apice baihatis, capsulâ lo-angulan. ^ cnca Caiacas. Rami ie<li simplices Miblignosi teretes Folia coriatea 1 ^ poll longa 10-12 hu. lata, nunc sub-cordata , grosse subtus reticulata Mores pururascentes 8-10 simul approximate (v.s. conim. a cl. "Vargas)
15. S DETUL^I-OTIUS (G Don gen. syst. gaid. 3 p. 704) , caule ramoso teieti glabio, folus petiolatis ovato-acuminatis sibcoidato-tnangulanbas subdopli-cato-acute serralis supeine glabus subtus neivo et petiolis temssime pubescentibus, pedicellis folio longioubus ^labus, tubo calycis glabu obvetsc pyramidato , lobis angustis acutis serrnlati tubo bublonqioubus corollâ plus hfxiesprevionbus, coiilli snbaicuata glabiâ superne dilatata lobis angaste lanceolatis acutis, anthciis glabus a inf apice baibatis, capsulA obvetsepy-lamidata elongata infera. \$ in ISi.isilia bellow.') Jn inontibiis Oigan (Gaidn.! n 4G3) Lobelia (Siphocampylus) betulcfoha Cham ' in linnajâ i8i3. p. 204. Lobelia betulcfoha Presl piodi. p Vj Canlis nloans lectus. Folia petiolo vubpolhcari , limbo 2-polhc Pedicelli a-3 poll Corolla mbia Capsula 6 hn. longa, 3 lin. lata. (v. spec. Gardn. in h Benth. Sellow. in h. Lindl.)

JG¹ S. srABER,caule lepente radicmte tamoso, lamis eroclis angulatis apice puberulis, foliis petiolatis ovatis acuminatis duplitato-mncronato denticulatis suprà scabns subtus ad ncivos >elntinis , infeunriK^ basi totundatis, t>npe-liouibus cordatis, floufnis suboppositis, pedicellft /olmm subTqunnibus , lobis calycinis lanceolatis jcuininatis calloso denti< nlahs tubo tuibinalo dnpo J>reionbns , lobis corollre erectis supci 101 ibus longionbus , c.ip^nlâ 5-cost.>IA ^ in BiauhA Lobelia bcabia PICJ1 piodt lob p. 33

Jt. iSon scandentes, folus oppoutis te/ms qnatermsvc.

17. S. viRTicILLATV5 (G. Don gen. ayst. gard. 3. p. ^o3), caale saperne subhntello simplici, folus 6-8 verticillatis subsessibus elliptico-linearibus icntis argute senatis irMá subhirtelhs, pedicellis folio bicuoiibus cnm calyre et coiolla hiitello-pubescentibos, tnbo calycis tmbinato, lobis .mgusti» acutis tubo xqualibus, coiolla vix ventricosâ lectiusculâ lobis anguste lanceolatis a<utis superioribns paulo fornicatis mfeiionbus leclts, antbens 2 infei barbaiis, capsula semi supeia \$ in Brasilia prjesertim mendionah Lobelia (Siphocarapylns) vertioillata Cbaui! linn. i8J3 p 20a Lobelia verticillata Presl prodi lob p. 36. Caulis 3-6 pedalis Folia 5 9 poll, longa, T-I 7 poll lam. Pedicelh subpollicarrs, fructifen •esquipollcates. Corolla rnbia 1-a poll, longa. In specimine Sellowiano heib Lindl. lobi calycis tubo triplo longiores, corolla 5° breviores (v. in B Lindl.)
18. S IMBRICATUS (G. Don gen. syst. gard. 3. p. 7<>3), «anle seu ramo lignoso nervoso-angulato cicatusato pilo&o, fohis imbiicatis sobsessilibus ovatis subacutis cordatis senulatis hirrellis, prdicellis folio brfvionbns ralycibnsqut* hirtelhs, tobz calycis tnrbinato lobis lineaibus acuds corolla 4° bievionbus, corolla tubulosâ cnrvulâ subventricosa birtello-pubescente, anlbeiis glabris a inf. apice barbatis J-y e Brasiliâ (Sellow.) Lobelia (bipbocampylus) lmbncata Cham. linn. i833 p 20b. Lobelia lmbncata Presl prodr lob. p. 36. Caulis vel r.tnrii pilis binneib vestiti ciebre ticatrisali, cicatricibns scntelli-foimibus Folia pseudo-verticillata &nbteinata, i-iy'poll. louga petiole lineaii. Pcdielli vix pollicares Lobi calycini 1| lin Iongi
19. S. LYCIOIDES(O. Don gen. syar. gard 3. p. 70^ ex Cham.), glaber angal-lui», folus 4cssilibns ectis anguste lanceolatis elongato angnstatis acutis remote obfuse callojio-berrulatis infrioibus pseudo-verticillati ternis, floralibus hemis veiticillatis, pedicellis teiuia folio brevioribus, tubo calycis elongato obconico, lobis tnbo brevioribus ovatis longe acuminatis corolla paulo <n-ruata subventricosa, autbeiis doiso glabris 3 in Biasiliâ (Sellow.). Lobelia (Sjbncimpylus) lyeoides Cbara. linn. i833, p. 207 Lobelia lycoides Prsl prodi. lob p. 33 Canlii vel ramus ulnaiis Folia infei. 3-polhc. 3 4 lin. la la , niargme leflexo *VertinlH flouferi in specimine tres, intenodiis snbtripollicatibus Coiolla rn^ra. Capsula oblongo-conica, 9 lin. longa, 5-neivia, apice lostrata

y. *Scandentes, foliis alterms.*

- 20 S SCATDENS (G. Don gen syst. 3 p. 7o3), glabra, caule fintico<>o-&can-deute, full is petiolatis le flex, is obi 011 g is obtusis basi acutiusculis snbcajiosi* margine Integerrimis et revolutis, pedicellis folio mult6 brevionbas basi biacted inatrucfis, tubo calycis turbinato, lobis lineaibus acatis basi snbdenticulatis coiolla} tnbo 5° Ael ^°brevionbns, corollae glabrxlacmis lanceolatis acutis falcatis subaequalibus, anthens 2 inf apice barbatis f-)J in frigidis Peru-viae inter Paramo de Saiaguru et uibem Loxa; Lobelia scandens H B et Kunth <<». gen. am. 3 p. 309 Piesl prodr lob p. 35 Lobelia obtusifolia Willd in Roam tt Sch syst 5 p 57 Folia 72-21 lin. lon^a, 5-8 lin lata, petiolis 3-4 bn Floiesspaesi reflexi. Pedicelli 2-4 lin. Iongi. Corolla coccinea subpollicans. Cipsula turbinata

ar S voruHins (G. Don gen syst. gard 3 p. 7o3ic), canle fruticoso \oln-bib, ramis glabris, fohis petiolatis ovato-acutinatis subcordatis argute clenti-enlatis supia glabus sublns tenmssime piuberulis, pedicellis folio dimidio bre-Monbus pubemlis> clyce hutello,tubo turbinato, laciniis Imean-acutis tubo duplo longionbus, corolla apice impliata lobis lineaibus undulatis supei majonbus snbrectis,-itoheiis omnibus apice pilosis. ^W ad flumen Onno-enjn. Lobelia volubil^s H B et Kunth' nov gen am. 3 p 3<>8 t 271 Prsl prodr lob p 33nonLinn I obelia cordata Willd in Rcem <t Sch syst. 5 p 3o8 Folia subbipnllcaua, pulliaeni lata. Coiolla coccinea elongata (v ill h nun. P*i*)

22. S. CONVOLVULACLUS(G. Dou gen. syst. gard. 3. p. 703 ex Cbm.), volubilis, glaber, raiuis teretibus gracilibus, foliis petiolatis ovato-lancicolatis angustatis acuminatis maigine reflexo obsoletè deuliculatis, pedicel I is folio nullò longioribus, lubo calycis obconico, lobis denifbrmibus parvis tubo brevioribus obscurè denlicnlalis, corollà subarcuatà super Té dilutatà subpigerulæ, antheris glabris 2 infer, apice barbatis, capsulà oblongo-obconinà angustit apice rosfratâ. & J in Brasilia (Seilow.) prope Kio de Janeiro ('Vantb.! n. 407). Lobelia (Siphocampylns) convolvulacea Cham. linn. 18J. p. 105. Lobelia convolvulacea Presl prodr. lob. p. 33. Habitus S. scandemis et volubilis sed diversa. Internodia 2-6 poll, longa. Folia sparaa maxima 3-pollicaria 14 lin. lata, petiolis 5 lin. iougis, dentibus callosis. Pedicelli 4-6 poll. longi. Corolla rubra subbipollcaii. Scmina subsphxroideu. (v. s.)

a3. S. LONGEP-1 DUNCULATU^ (Pohl bras a. p. 109. t. 17a), glabriuscum, catile lereti, foliis alternis ovato-acurninatis raembranaceis cortatis peiiolatis argutè dentatis, pedicellis folio longioribus axillaribus, tubo calycis obconico, laciniis linearibus acutis corollà angustà stibarcuatà nullò brevioribns, lobis corollse acnmiatis, antheris glabris 2 infer, apice bai-batis, capsulà elngatà obovoidea. — in fruticetis provinc. Rio de Janeiro (Pohl) et montibus Organ (Gardn.! n. 1(5). Lobelia pedicularis Presl prodr. lob. p. 34. CauJis 3-pedalis. Folia 3-4 poll, long^, 1-J poll lala, denticulis setiforruibus calUfijt;. Corolla ferè bipollcaris purpurascens. Caulis (ex specim. Gardn.) subscaudens. Differ 1 planta Gardueriaua »oluin pedicellis inajoribus folio fere duplo longioibus, capsulà forsitan longioie. (v. iu h. Dnnant el fielh.)

24. S. PERUVIAITUS, glaber, ramis lignosis alhicantibus, foliis petiolatis ovato-acurainatis remotè serratis, pedicellis folio duplo triploVe brcvioribus nndis, tubo calycis turbinato, lobis lir.eari-aciininaiis integris tubo b^evioribus, corollae glabne rectae lobis lanceolatis inaequalibus, antheris glabris a infer. apice setosis. ♂ in Peruviae provinc. Chachapoyas (Matthews!) Rami 3-4-poll, longi à canle nudo albido lignoso flexuoso divergentes. Folia sesquipollcaria petiolo 4 lin. inclusa, 5-6 lin. lata, utida, longè acuminata, serraturis acutis minimis. Corolla rubra sesquipollcaris tubulosa ante florationem

Mibincurva. Antherae parutn exsertac. (v. s. in h. Boissier et. Beiilh.)

Tubus calycis hemisphcericus. — Non scandentes.

et. *Folia alterna.*

a5. S. PRUFEOlius, raiuis teretibus petiolisque laruentosis, foliis coriaceis latè reblatis obtusis mucronulatis æqualiter callosò-dentatatis supra glabriuscultis subtùs hirtellis basi acutis, pedicellis folio brevioribus floribusque hirtellis, tubo calycis hemisphærico, lobis linearibus acutis tubo longioribus corollà multò brevioribns, lobis corolaelinearibus acunutis eifciissnperionbn.s Miblongioribus, cupsnla 5-costatà. ♂ in Americâ? Lobelia prnnifolia Presl prodr. lob. p. '5y. ex Huinb. Species originis ignota? à cl. Humboldt Preslio 06mm.

a6. S. CAMPANULATUS, minis toraentosis, foliis ovatis obtusisintegerrirni.s breviter ptMiolatis rugosis supernè glabris subtiis incano-tomentosis uiargue subrevciuus, pedicelis folio longioribus floribusque hirtellis, tubo calycis hemisphærico-turbinato, lobis ovatis subacutis integris tubo brevioribus, corollà basi cylindracea supernè campanulatà rectâ? externè tomentoso-pulverulentâ lobis ovatis erectis æqualibus, antheris 2 inf. apice barbatis. ♂ propè montem Chimborazo. Lobelia campanulata Cav. ic. 6. p. 13 v. 1 55. Presl prodr. lob. p. 36. non Lam. Lobelia pulverolenta Pers. syn. a. p. 212, non Hook.Canoianthuscamparinl.'ifusG.Iongen.sy.st.pard.3.p. 71p. FrutexJ'-pedalis tomento albo tectus. Corolla iinus robens, extis tomeito albicans, apice 5-loba, lobis calycinis 4° longior, ex Cay. recta regularis (nndè cl. Don genus ronstituit) sed veñsraililer subirregnlaris ex slylo obllquo et auulogia cum S. pulverulento. Anthericiufere omnibus figuris Cavan. glab'rai, qnando' 9. solui infeiores raodo solito apice harbata; ca-terum floten'similem elicit pra»cedenli (Lob. raucrouala Cav.) ubi .anfhera inferiores b:ubatw.

27. S. JAMESONIANUS, ramin pedicellis foliisque subtus albo-toimentosis pulvern-leatis , fuliis latè ellipticis hreviter petiolatis obtusis crenato-aerratis suprà ragosis glabris, pedicellis folio sublongi6ribus apice arcuatis, calyce tomentoso, tabo hemisphsrco, lobis lanceoiatis acutis snbfoliaceis grossè serratis tubo lojia6ribns, corolla tubuloso-cainpanulatu lobis calycinis duplo longiore pul-YefuJento-rDniento.sä semi-5-fidu rccliuscnl, lobis ovato-acutis sabaequalibus, antheris glabris? /; in valie Karros regionis Quilensis alt. 6000 ped. (Jameson) Lobelia pnverulenta Hook, jonrn. hot. p. 2 32. t. i3r (excl. »yn.) non Pers. Lobelia Jarnesoniana Presl prodr. lob. p. 56. Caulis fruticosus. Folia biuccialia periolo 3 lin. longo. Alabastrnm obtusmn comrauni wodo generis snpernè gibbosnm subarcuatum , lobis superioribus paulò longioribus.
28. S. CAITESCENS, canle erecto angulato pedicellis floribusqne tomentoso-canescente, foliis »ubsessi!ibns lanceoiatis acatis argutè dpanicato-callosoque dentatis utrinquè pubescenibus, pedicellis folio squalibus, tubo calycis hemi.splia?ricoj lobis lanceolato-triangularibnsacntisdenticulatis tubo longioribns corollas tubo recto calyce raultò longiore, lobis lineari-lanceolatis, ilamentis villosis. £ in Mexico. Lobelia canescens Fiesl prodr. lob. p. 38.
29. S. MUTISXAVUS (G. Don gen. syst. gard. p. 703), rauulis hispidulis, foliis oblongis btevissine acuminatis basi angustato-acutis remotè et obtuse denticalatis petiolis nervisque snbtus birtis, pedicellis folio dimidio brevioribus, calyce. glabro , tubo subgloboso tereti, lobis ovato-lanceolatis obtusinsculis irreguluriter crenatis tubo coiollae 5° vel 6° brevioribus, corolla glabra , tnbo suptfi-nc paulo ninpliato et curvafo, lobis falcatis 2 super, longioribus, antheris 'x inf. apicc barbaüs. Jy in montibns snbfrigidis Novo-Granatensibns. Lobelia Mutisiaua H. l. et Kuutb! nov. gen. am. 3. p. 308. Presl prodr. lob. p. 39. Folia 6-J poll, longa a4~^a7 ^n- ^att» petiolis semipollicaribus. Lobi calycini tnbo subajquales. Corolla viescens? S. glabrato nffinis. (v. in b. mus. Par.)
30. S. BARHATUS (G. Don gen. syst. gard. 3. p. 701), ramis petiolis nervisqne foliormn ferrugineo-toiueutosi.s, foliis lanceoiatis utinqnè acuminatis breviter petiolatis denticulatis, pedicellis folio subaequibus, calyce tomenloso, tnbo hemispbfliico, lobis dvntifornibns tbr> tiiplo brevioribus , corolla externe pubesrente subinciirvà basiangnstiore lobis a superioribus lanceoiatis majoribus ad faucem reflexis, ilamentis pilosis, anheris u infer, apice barbatis. ^ in Peru vía (Cav.) et Nova-Granatu (Huimb. Donpl.). Lobelia barbata Cav. ic. 6. p. 12. t. 5r9- H. B. et Kuntli! nov. gen, 3. p. 303. Presl prodr. lob. p. 38. Gaulis 3-4-pedalis. Corolla coccinea. Ex speciu. Humb. in b. mus. Par, folia ntriuqnè acuta polliceni longa, pedicelli longitudine variabiles, tnbus calycis basi latus apice constrictius, pili stellati. (v. s.)
31. S. VERBASCIF6T.JT3S, ramis petiolis neivis snbtus floribusque ferrugineo-tomentosis , pilis ai'bu.sculiforinibns , foliis ovato-eJlipticis acutis calloso-denticulatis Mipra SU'Uato-pubesccutibus subiùs tomentellis, pedicellis folio duplo brevioribus, tubo calycis bemispbaeric decem-costato , lobis linearibns acatis tnbo longioribus, coiollae tabo incurvo , lobis lineari-lanceolatis acuminatis falcatis Hubcqnalibus , filamentis pubescentibus, capsula 10-angulari. 5 *n *eruviâ. Lobelia verbascifolia Presl prodr. lob.¹ p. 38.
32. S. CAOUTSCHOUC (G. Don gen. syst. gnd. 3. p. 701), ramis glabris, ramnis foliis pedicellis floreque rubigino.so-iomentosis pilis raraosia, foliis ellipticis acutis basi obtusiusculis glauduloso-denticulati.s suprà glabriusculis petiolis ifervisque subiis bispidissimis rnbiginosis, pedicellis folio diuidio brevioribus, lobis calycinis. lanceoiatis.denticulatis tubo corollac triplo brevioribus, antberis sparse pilosis 2 inf. apice barbatis. fy in moutanis provincial Popayanensis «t jaxta Mamendoi, alt. 1000 ad. 1600 Lex. Lobelia Caoutchouc II. B. et Knnt! nov. gen. am. 3. p. 304- Pres¹ . piindr. lob. p. 38. Folia 3-3-J poll, longa ia-i5 lin. Jala, petiolo semipunctato ex specim. num. 10 n. mus. rar. pollicaris, magnitudine fructus Pruni spinosa. E lacte gummi elasticum paratur. (v. s.)

33. S FERRUGINBUS (G. Don gen. syst. gard. 3. p. 701), ramnhs peliolis pedicelhs calyceqtie feirugmeo-tomentosis, pilis lamosis, foliis oblongo lancolalis acutiuscuhs petiolatis obsolete denticulalis cupiā glabriusculis subtus ferrngineo-tomentosis basi acntu, pedicelhs longitudine foliorium basi bibnuteolatis, tubo calycis globoso superne aDgustioie lobis lioeanbus loDgioie. co 1 oll a laciniifl calycinis decies loDgiore snpeiDe pnulo dinphata*c! curv.it A extus pilis stelldts ferrngineo-tomentosā, lobis lanceolatis falcalis super ma 10-ribns, antbeiis glabnusculis 2 infer, apice baibatis jj pi ope Santa-Fede Bogota (exHuinb et Bonpl.). Lobelia fenuginea Linn f. suppl. p. 3y4 ex Mutis H. B. et K. nov gen am. 3 p 3o3.Willd.sp 1 p 9^5? Presl prodi. lob. p. 38. Lobelia a*clepiadea "Willd. in Roein. et Scb syst. 5. p. 57 Folia 1-1 7 poll longa 4 liu. lata, petiolo 3-liueaii, pills pagmse super stellatis, infeuoris at et ramorum pot) us raraosis Coiolla rnbra Antberae longe exseitac; filamenta pilosa An planta Hamboltiana eadera ? (v in h. Linn.)
- 34 S MACROSIEMON, pnbescens, caale errcto angulato lamoso, folhs sessihbns elongato-lanceolatis acninatatis argute remote callosoque denticulatis, pedicellis axillaibus teieiisculis foliiiduplo bievionbus mfa medium bibiarteolalis, tubo calycis bemispbaenco, lobis lanceolatis acutis denticulatis tubo longioibus, coiollac glabiae tubo iecto, lobis linednbns ectis Mibxqualibns. If in Peruvia. Lobelia macrostemon Presl prodi. lob. p. J7 Corolla lobis cilyemii innlo longior.
- 35[?] S. FDSCUS (G. Don gen syjt gard i. p. 704), rubiginose tomentosns, folns elliptico-lanceolalis denticulatis calycis tubo hemisphaeric, lobis leflexis denticulatib, coiollā tomentosā robiginosā, antheris a infei. baibatis. fy in Peiuvia (h. Lamb.^'.Veijsiniehler frutex acaudens Lobelia fu&ca Presl prodr. lob. p. 58, ubi solum nonien. An S beandcenti affinib? sed tubus calycis bemisphaelicus.
- 36 S. cAwus(Pobl bras 2. p. 106. t. 169), canle subramoso hirto, foliis ovato-acnti^c breviter petiolatis creiati superne butellis snbtu8 pubescentibus, pedicellis folio sub[^]equalibas pubeiulin, calyce birlo, tubo bemisphaei ico , lobis lineaii-acniniidts erectis integris tiibo coiolla? 4° brevioiibus, co/ollae glabuc tnbo superne ventricoso dechnato, lobis liueari-acutuinatis dneigentibus snperionbus rectis infeuonbus leilexis, antbeiis glabns 2 jnfei apicc barbatia. 3 infiutictis piov Minas Geraes. Lobelia caua Piesl piodi lob p. 37 Canbs 2-3-pedalis. Folia 3 nncias longa 1 I lata, cienis alternatun minonbus denticulo calloso terminatis. Coiolla caeiuiesccnti-iubra. (v. in h. lientb)
37. S. CRENATIFOLIUS (Pohl bras 2 p. 107 t. i7o), caule subramoso piibescente , foliis o\alis acutis in petiolum biexein angnstntis inegnlaiiter cienalis basi mtegeiimis snpeine hii tellis subtus pubescennbus , pedicellis folio dirnidio feie brevioiibus , cum c.ilyce hii tell 1 & , tubo calycis heruisphaciico , lobis linear-i-acuminalis erectis apice reflexi* tubo coiollae 4° bievionbus, corolla glabra tubo supeine \enticoso declinato lobjs lanccolato-aciiminatis apice reflexis'inferioie majore eaeciisculo f antheris glabns mfet. 2 apicc baibatis. 3 in dunietis proviuciae Mfnas Geiacs. Lobelia cieuata Piesl prodi. lob. p. 37. Cauhs bipedalis Folia "t nncias longa , unciam lata , ad lentem supii hiitella Corolla caeiuiesccnti-mbia. (v. m b Kenlb.)
38. S. VILLOSULUS(Pohl brås. 2 p. 108 t. 174), pnbeiula , caule simplici. folliis ovato-acntis breviter petiolatis basi lotundatis bjsenatis suprā glabriusculis subtus villosufis, pedicelfis folio brevioiibus tubo calycis hemisphxrico , lobis linear-i-acummatib erectis apice divngeutibus tubo coiolla? 40 brevioiibus, corollā externe pilositisculā, tubo biibdeclinato angusto supeine vix latioic 'obis interne pilosis lanceolaio-acuiuinatis supeiioribus lectis lateralibus snl>acqudlibus teflexis, anlheus a infei. apice baibatis, capsulā ov^to-acuta seini-Auperā J in ^'oNcelis piovincji* Mmas Geiacs Lobelia villosula Piesl prodi. 1°b. p. 38.Caulis bipedalis. Folia 2 poll longa 1 poll, lata supeine ad lentem pilosa bicienata ex. Icon^ potius rjuain Liberia I a. Pedjcelli sesquipollicaics. t Qid... a evemlesccnti-ilbra.

3g S CA-RDIOPHYI LUS (Pohl bi is 2 p no t 17!), glabei, cault siuipliu fohis ovato aculii inbcoidalis breviterp*»tiolalis subundulatis ininnle et 1 emote denticulatis, laceiu folioso multifloro pedicellis folio brevionbus, tubo calyns hemispbaeuco , lobis lanccolato acuminatis tnbo aequalibus erectis, coroll a superne 1 itioie sabincuiva lobis lanceolato-acuminatis pice ciliais , an thens 2 infei apice barbatis capsnla ovoidea acuta semisupeia J in Sena de Chumbo prov Mmas Geiacs Lobelia caidiophylla Piesl prodi lob p. ^7 Caulis J-pedalis I olac 2-3 poll longa, 12 poll Uta Corolla caeulewenti robnt in praetededenibus

40 S NITIDUS (Pohl bras 2 p no t 174), gl)bcr, cmle simphu teieti glabro, folns ovato teuhs cordatis {Jabris bieviter petiohtis seirihs, dentibus 1-2 minonbus mtei niajores, ptdicellis folio dimuho bievioubus cum culyte piibescenibus lobis calycinis lmeari u uminatis tnbo hemisp'erico longion bus roiolla/|^ Invioubus, coiolla pilo^inscula tnbo snperne subventncobO subdedinato lobis lanceol it is acntis erectis , anlbens 2 infei apice barbatio , capsnlä ovat) acuta semi supeia ^ in fiuticetis piovinoa. Mmas Gtines Lu bell a mtida Piesl prodi lob p 3" (nibs 2 ped ths Ioha 2-3 poll longa 1 I lata, subrus neivis ad lentein pnberulis Corolla caruksceuti rubra

41 S CORYMBCFLRUS (Pohl bras 2 p tia t i«5) glaber, canle simplici te reti,f)bit ovato acutis bieviter petiolatis cordatis senato-dentatis dentibus 1 2nnni>iibus mtei m tjoies, flonbns sopeine approximate toryrobosis axilla iil>us, pedicellis folio scu biactea foil ace a dimidio longionbus, calycis tnbo hemisp'denco, lobit linea acuniinati tubo sequidbn^, corolla bubdeclinata supeine sub%entiiiosd ldcinns < alycims multotjcs longiore loRis ovato-acuminatis ciliatis, untbi 1st 2 infei apice baibatis % in fiuticetis raontanis pro-vFnriae Minis Gerus distuctu Muus Novas Lobelia coiymbifeia Pie 1 piodr lob p 37 Plinti hdbatfa sesrjii]>edalis Folia 1 2 -poll longa, polbcem lata, subtus ad neivos pilosiuscnl 1 Biactese triplo minoieb sed foima simile* Coiolla capralescenti iubra foima piaecedentium.

42 S MACROPHYLIUS (G Don gen syst gaid 3 > 704),folus late obovati* ainn mitispl bus subdeulicnl 1& b isi angnlatia, flonbus apice subcoiyubo sis, pedicellis folio inulto bievionbns, tubo cilvcis heinisphaeuco , lobis ovato lanceol itis, (oiolla lubia, uithens lufenoubus apice baibatis £) m Per 11 via h Lamb) Lobeli 1 maciophylla Piesl prodi lob p 39 Folia pedia Pedicflli appioxiinati Plinta 2 3 pedalis °

@ *Folia ve, ticillata scppius ternata*

43 S COMOSUS { (r Don gen syst gaid 3 p 702), caule simplici, folns lanceolafis acumiatus dentatis sublus puheralentis lutescentibns, infeioribus altcims floralibiis *• veiMollatis, peliolis \llosis bievissnnia flonbns subco lymbosis pedicellis f>liis ilo^raltbus sublonpoubus, lubo calycis hemispbae nco lobis linea acaminatis an^ustis tubo \ lougioubus corolla tuplo brevionbus, coiolla subincun a lobis bievibus obtusiusculis, anlhens omnibus apice barbatis % pi ope Quejeta Mexicanoruni Lobelia comosa (IV ic 6 P 9. t 5rs f 2 Piesl prodr lob p 36 Caulis 2 pedalis bolcatus ex icone fibber Folu 1 poll long 1 2-H lin lata supeine paulorugosa, petiohs aesqui lmeanbus C01 ulla lutscens polluans

k| S PSILOPHYIUS (Pobl bras a p 1 3 t 1^6), glabei, caule subramoso , folns terms lauus qu iteinis ov ito acuminatis bieviter peNolalis basi rotunda-tisdeniencUti, dentibns 1-2 run oribus miei majotes, pedicellis folio tuplo bicvioubiis, tubo calyciN heiinspbanoico, lobis ciectis lmean lanccohtis basi angnstatis apice sub<utA tubo coiollae dimidiO bievionbus, corolla snpeint subvenIncosa glal ia lobis 1 incollato-acenminatfs infeuonbusdivegentibus re flexis antbens 2 mf ipicc baibatis, cipsul t ovoideo arnta tenn supera lacinns calycinis reflexis terminta ^m fiutitets piov Rio dc Jarieno Lobelia psilophylla Piesl piodr lob p 37 Gatalis 2 pedalis Folia 4 6 poll longa j 1 J poll lata (oiolli <ernlescenti rubia, foram piaecedentium

45. S. DUPLOSERRATUS (Pohl bras I. p. T J4. t. 177), c.mle subiaraonb pilodcts-rnlo, foliis ternatis ovato-acntis basi rotundatis petiolatis birtelli* acute serrali* dentibns a-S roinoiibus intci niajores, pedicllis folio sublongionbus cum calye et corollā puberulis, tubo calycis oboideo lobis lineaui-acruinatis erectis tubo .equahbus, coiolla dclinatā elongatā vix superne ventrico& lobis lanceolate acuminatis inferioiiLns divegentibus , antbens 2 infer «spice barbatis If, io fruticetis piovuuiae Rio de Janeno.— G. Don gen syst. S p 70^ non Cbara. Lobelia tnpbylla Piesl symb fsc 4 p 63 t 40 prodr. mon. lob. p. 37. —Gaidu.! pi bias exs n 464? Canhs bipedalis tolia 3 poll, longa 1 I poll. Iata, petiolo <> hn longo. Coiolla capiule*centi rubra. Diffeit plauta Gardneuana solum foliis minus duplo-ieuatis, potius maequaliter scrratis

46. S. WESTINIANUS (Pobl bias. 2. p. 113 >, caule simplici glabro teitti fohi^ teinatis ovalo-acntis breitei petiolatis inaequ.ilitei deniatis sapeinr ginbiis sublus pabescentibus, pedicelhs folio subbre^ioribus, tubo ralvcis pubeiuli hemispbjTico, lobis lanceol.ito-acuminatis .ipice lef^xis tubo &ubxqualibus, coiolla supeine subventucosā pubernlā caWie multo longiore, lobis linear-acuminatis patentibus, aniheris I mf. baybatis J " bumidis prope \illam Kicam et in prov Sancti-Pauli (Mait. j Ha*lliae* I ohelia Westiniana lleicb. «xot 1. p. 5y t So Caulis biprdahs et nhra. Pedicelli pollicitntt, III icoue, nunc folio bieviores, mine aequales Corolla subdechu ita sesqnipollcjs.

f*. brevipedicel!ata, foliis tecmatis angustionbus acnimnatis, pedicelhs folio qaadmplo brevioubus.—Ciica' Yillam PiU.un Lobelia Weslimana Thnnb. plant bias dec. 1. p. J t 1 Roem. et Sch syst. 5 p 53 Piesl piopr. lob. p 37. S Westinianns £ Pobl 1. c

y foliis quateinis lationluis acentis Pobl 1 r

iT foliis qua term's .ingustioibus acammatis — Pohl 1. c.

- foliis plerumque spensis laius oppositis teinisve ovato acumirati*, pedicellis folio dimidio bievionbus. — in pro\ Minns Geaes (Vauthiei! n. #4 \

47 S ORBIOITIANUS, ifiraies ectis terctibns beibaceis , foliis tertiatis o\ato-a<n-iiiinatis brevitei petiolatis inaequaliiei n<uteque dentatis superne plabi nisculu» snbtus pubeinlis, pedicllis folio dimulio bie\iouibus calyce orollaqne velutinis, tubo calycis heinisp PIICO , lobis line.u i-snbulatis lubo iiiplo longionbos, coiolla calyce multo longiore lobis lineaibus, antheiis 2 inf baibitis.— in Boliviā (d'Oibigny') Habitus piaecodentis Rami gl.bn vel piwsritiu apue puberuli Folia J-4 poll longa, 1 ^-a poll lain, petiolo 3 lin Dents i-i-i minores inter roa^oies. I loies in axillis bupenoubus numerosi, lutei ubiiqtu . (v. inb. mas. Par.)

§. 2. *Corollas tubus lobis tahcuus longitudine subecquahs vel brevior.*

**Anthcrce omnes glnbrec*

48. S GTABRAIU* (G. Don gen sy^t gird 3 p. 70^), glabei, foliis late elliptkis basi obtusis subintegns apioe acutib umote dentatis margine glandulosopunctahs, pedicellis folio frqualibns, tubo calycis semi^loboso inttato, lobis lauceolatisobtu&iusculis obsolete crenalii et glandulosis lubum coruilae .eqnau tibns, corollā glabia lubo snpeme consUK'io » l°bis lance<>latis talcati 2 sup. lougioibus, aniheiis glabiis nnheribus. /j prope Sinta-fV de Rogoia Lobe lia glabrata H. R. et Kuntb nov j;en am 3 p. 307 t 370 Piesl piopr. lob p Iq. l'olia 3-/ poll longa, 18 •>? III lata , potiolis 6-q III longis. Corolla virescens (v. in h inns Par ubi stamina impeif.)

49. S. MATTHIAI , ranns angulosib mfeine glabns apice incanis, foliis lanceolatis ntrinque acentis breviter petiolatis tiebre et acute dentatis snpeine glabiinsru- &ul)ts pubeiulib nciTisque incanis, pedicellis axillaribus longitudine folio ¹ oni glabi is nudis, < alvcis lubobrnuspbari ico glabiusrnlo larinnslineni ibus den-

fatis pubescentibus tiiplo breviore, corollâ net vis pubeiulâ niedio ainpbata cursâ lacinus calveius tnplo longioie tubo vix lacinms&uperante. Tf in Peruvia (Matthews' n. 167a). Color folioium ex pubescentia cinerascens. Folia alleina 3-5 poll longa, 1 |-i poll, lata Coiolla vnestens pollicaris, doiso usque ad uiediifm fissa, lobis deflexis acutis Columua staminea glabra. Anllherae apice omnes glabra? saltern in uno flore. (v. in b. Lindl.)

** *Anthercp omnes hirsutissimce*

- 50 S. DOMBEYANUS, ranns petiolis folus snbtus floibusque albo-tomentosis, foliis ovato-oblongis acum^natis dnpheato-callosaqne cien.itis basi lotndatis suprà glabris, pedicellis nndis folio duplo bievioubus, tnbo calyns bemispbaelico, lobis linear-lanceolatis acuminatis caloso-seuatatis tubo dnpllo longiubns tubum corolla; czcedentibus, corollae lobis lanceolatis falcalia obtusinsculis super longioribas, filamentis toinentosis, anlbeiis hirsutissimis. If in Pciuviâ Lobelia Dombeyana Piesl prodr p. 3g
- 51 S. FOEIIDUS(G Don gen. syst. gaid. 3 p 70*), raiuulis piloso-biitis fuscescentibus, folus lanceolato-oblongis acuiuinatis basi in petioium angustatis denticnialis utrinque biitis, pedicelbs folio hie|ioiibus villos-o-hnUs basi biabiacteolatis, caljce villos-o-birto, tubo globoso depresso, lacimis lineaai lanceolalis acutis demiculatis tubum coiollae aequantibus vel paulo supeiantibu*, corolla biitella supeine ampliata lobis lanceolatis acnminatis deflexis supei itiajonljus, anthers apice hispidissiims. f) in alta plamtie Bogotensi et in Andibus subfugidis Novo-Granatensis Lobelia foetida H. B et Kuntb! nov RCII am. 3. p JoJ. Willd. in Rocm. et Scb syst 5 p. 67 Fiutex fertidus. Tolia non mgosa g-polbc. etmajora, a^- poll lata, petiolis pollicaribus et nltia. Pedicelli 4-6 pollic. Lobi calyois tubo tuplo lungiores Coiolla albida. (k)lumna staminea pubescens. Capsula «ubc;lobos.i m.igmtudine feie Cerasi, debi&pentia ignotd S. gigantco afijni». (v in b. mus Pai.)
- 5a. S. GiGANIEUS (G. Don gen syst. gaid 3 p 'jos), c.mle ramoso, lami, pubescentibus, folus lanceolatis cuspidato-acumiuitatis basi longe angustatis subpetiolatis rugosis crenato-dentatis suprà glabris subtus pllosis, pedicellis glabnusculis basi bhracteolatis folio saepius longioribus, talyce tubo pubescente globoso, lobis glabiiusculis hneaii-acuminatii tubo longioribus, corolla ialiata velutinâ, tnbo lobis calycinis .ncquali, lobis lanceolato-ovatis acutis supei. sublongioribus, antbeii basi excepta bispidissinus. Jj in legione Qnilenhi piope Guarandani et in aliâ planilie Bogotensi L gigantea Cav. ic 6 j) 9. t. 5i3 H B ' et Kuntb nov gen. am. 3 p. 305. Piesl prodi. lob p. 3q. Lobelia Tupa Donn ex Steud. nom. non L Caulis 14 ped. altns et allior. Folia O-g-poll. longa, i-?-i poll lata peliolis 3 lm.)on\$is. Corollaluteo-rubcns. Coluinna Manunea glabia In planta Cavan pdicelli saepius folio longioies, lobi calycini integri; in Bonplandiana pdicelli folio breviores, lobi calycini dentati; caet. slmill (v s.)
53. S ? UMPFTTATUS (G Don gen syst gard 3. p. 702), ramulia Tilloso-pilosis, folus oblongo-lanceol itis acunnuatis basi in petiolura angustatis denticnatis supra glabnustulis subtus pubescenti-hiitis, pedieelli* superne approxunatis bnielhs nudis foliis floialibus |ix bievroffbus, floubus subumbellatis, tubo *«lycis globoso depiesso anguloso, lobis bneaiibus acuminatis mtegus tubum coiollae aeinqnibus, corolla cum calyce firtellâ f tubo supeiDe amplialo, labus tnbo acqualibus, snperioie »paH>lo lacimia falcatis lanceolatis, infeiiore inicgio o\uo-.iciio bitviore, .milieus Mipeiuc hispidissimis ft in Andibus Peiuviams jnxta Ayaxacam Lobelia umbillala 11. B. et Kuntb¹ nov. gen. »l' 3. p. J04 Fmtex foetidus Folia 5-pollic et majoa petioli* semipoll. Calyx vistidulo-birtus, lobis tubo sublongioribus Pedicellis 3 4-polhc. Coiolla MA bipollicaiis ampla, lobis infei. (an semper ') connatis. Ovaiio et antberis t,d genus Centiopogon accedit, sed fmctus foisan debiscens et antbeic apice pilosaj nee tuspulata? (>. in h mus Pai.)

f. *jfilldenowianus*, folus> ped.-ibus cicnulatis, pdicellis folio iongiorihi^

— *Lobelia Ayavanensis* Willd. in Roem et Sch. syst 5. p. 57. ex ilin. H. et ft. quam similetn L. umbellatae dicit el. Kuntli syn. I. p. 34i. *Lobelia Willdenowiana* Pie&L piopr. lob. p. 3g. ubi tantum nouien, nou Roem et bch.

y *Chamissomanus*, Coins pedalibus, pedicellis folio sublongioilbus, lobis infeiioibus corollae diu eounatis demum bbens.. *Lobelia nmbeliala* Cbam. * in linnaea i833. p 3ii. *Lobelia Kunthiana* Presl piopr lob. p. 39 Celeb ChamiMO de identitate non dubitat.

-j- *Species non satis notce.*

54. *>'*MACROPOIUJS* (G. Don gen sysr.gaid. 3 p. 702), ramis angulatis pnbescen-tibns, foliis elliptico-oblongi* obtisiuseulu* petiolatis senulalis temii&Mnie pubescentibas, pedieillis folio sublongioribus villosis, c.ilyce gibbo 5-gouo 5-paiUto lobis lineaiibus dcuts» electis, coiolla cybndricâ »sub\entricosâ cnr-vafâ lobis lineaiibus, antheri* a hiiper. a pice cilia tis. ^ in Brasiliâ piopc Villa m Ricam. *Lobelia macropoda* Tbunb. pi. bras dec 1. p. 6. bwartz in Roem. et Seb byst 5 p. 5a. Pre^l. prodi lob. p. ^7. Tolia 2-3-polhr peuolis ungu-tularibns. Corolla coccinea. Cap&ula leflexa pentapona. Afluiis dicilnr Lob Suiuamensi Linn , sed tune Ceuiiopogon; tanien antberae 2 soluin baibatae et fructus capsula vocatui nee bacca.

55. S. CHAMISSONIAHUS (*Lobelia Chamissoniana* Presl prodr. mon. lob. p. 36 , ubi soluin nomen).

56. S. SKLTOYVIANUS (*Lobelia Sellowiana* Piesl ibid.). E Siphocampylo duplo serrato Cbaiuisbdnis dnas species constituit cl. Piesl nomine tantum uotat. Cel. Cbam&bo Linn 1SJ3. p. 201 dicit a Specimina nostia à Poblianis (S. duploserratus Pobl) recedunt foliis subcordalis brevins petiolatis petiolo \ix 3 hn. longo et pedicellis folio bievioubus. » Inter ilia specimina 2 specits distinguit cl. Pie&L.

57. S.' CRANDIDNTATLs , caule subsiiuplici tereli, foliis longe petiolatis ovalibun fliplkutve basi acalis a pice acuiuinatib giosse subsinuato-dentatis, dentibns uiucronulatis , utinquo pube brevissimâ adspcrsis, pedicellis jd&cendenlibus folio bieviobspubeiulis, tubo calycis subgloboso, lobis angustis acurainatis , corolla calyce multoties longioie suisum dilatata pnbescente, lobis acummalis angntis Mipei. longioibus , antbeiis apice barbalis. % in Mexico ad Cuest.i grande de Chicouquiaco. *Lobelia* (Siphocampylus,)graTjdidentatus Schlechi pi. mex. bchied him. i8i; p. a6a. *Lobelia* piandidentata Presl prodr. lob. p. 37. *Hebaglabiescens* Folia 3-4 poll longa.i} -* poll, lata, petiolo scs-quipollicari, teneie luembr.inacea. Pedicelli 2-2 $\frac{1}{2}$ poll, longi. Coiolla cocci-nea. Iructus subgloboMii immatiuus. An Lob. suunamenbi L. afiinis et idrù Centropogon ?

*j' -j- *Siphocamp/li exclusi.*

S. ANDROPOGON G. Don. = *Centropogon Andropogon*.

S BEHTEKIANUS G. Don. = *Centropogon Berterianus*.

S. BESLERIOLIDLS G. Don. = *Centropogon Beslenoides*.

S. CIRSIIFOLIUS G. Don. 1= *Tupa cirsifolia*.

S. Ci&ANnb G. Don. r= *Centropogon giandis*.

S. HIRTUS G. Don. = *Ceutiopogon hirtns*

S. MACRANTHUS Pobl. == *Ceutiopogon Soxinamensis*.

S. bPECTABILs G. Don. = *Centiopogon Sniinauiensis*.

s- SURINAMLNMS G. Don. = *Centiopogon Surmameasis*.

XXIV. BYRSANTHES Presl prodr, mon. lob. p. j. — *Lobelia*; sp. auct

Calycis tubus imâ basi tanttim ovario adnalus. Corolla infunclibul-

- cilibus, bracteoliH 1-2 remnitis linenibus, lobin calycmis lanceolatis coiollâ <limidio bieviорibus. (f) ill stagnis et ad nvnlos Africa? seft. (Desf.¹), Sat din 1 ae (Thomas'), Coisica? (Bocc. Thomas'), Ilia* ins. (Micb.), Italia; (Meitol), Stxbadum (Lois) et citca 'Vid provincial gall. Vaucluse (Ches-sael') Ranunculus aquaticus, etc. Bocc nous, p. 35 t. 27. fig major. Lau-entia anuua minima flore cciuleo Micb. gen. p 18. t. 14 Lobelia Lauientia Linn sp. p iSit. Savi, bot etiusc 1. p 12c. Ten. fl. nap. 3. p. 224. Bertol fl it 2. p. 553. Desf¹ fl. all 2. p. 3ia. Lobelia Gasparri Tin. rat. h panorm. 18*7. p 279 (ex.BeitoI.) Lobelia Salzmaniana Presl synib bot. 1. p. 31 t. 20. Solenopsis Laurenlia et S. Salzmanniana Presl prodi.lob p. 3a. Forsan una et eadem species cum L. tenellâ ul censernnt cl Boicone, Will-ricnow, Link et Hoffinansegg , etc. Lauientia tamen veia (Michelii) annua videtnr, raajoi, ramosa, foliis dentatis; allera pcrennis, minor, srpius acaulis pediceUis scapiformibus, foliis integus vel sinuatis longius petiolatis. Sped-inina media quaodam difficile nuucupatui. (v.s.)
2. L. TBNELLA., acaulfs vel subacaulis, foliis longe petiolatis obovato-spatbulatis integris lepandise, pedicellis radicalibus filifoimibus foliis tuplo longioubus, biacteohs 1-2 lemoris linearibus , lobis calycmis lanceolatis coiollâ dimidio btevioubas, lobis cooioloe subaequalibus. % in uligiosis Lusitanix (Link et Hoffm.) Sardinia (Moris.'), Corsica?' Siciliae', Cietae (Sieb.'), Cypn(Aucherl) Kapuulum Cieticum minimum Bell id is folio flore macula to Toiun. cor p. 9. Knpunculus aquaticus minimus, etc. Bocc. inns t. 37 fig. minoi. Lobelia Lau-entia & Willd sp. 1 p 94^s. Link et Hoffin fl port, 2. p ax. Lobelia tenella BIN cm cent 1. p 53. t. 2 truss fl sic. prodr. 1. p a5i. Bert fl. ital. 2. p 554. Lob Bi\on^{ss} Tin. cat. h. pau. 1827 p. 279. Lob minula DC ' fl. fr. n. 2871 uou Linn. Lobelia setacea Sm et Sibth. fl graec t. 221. prodr. p. i/f5 Lobelia cietica beib Jnss ' Solenopsis Bivonaeanas Presl piodr. lob. p. 32 (v. s)
3. L. CANARIENSIS , caulis pluribus erectis lamosis, foliis sparsis oppositisque ovato-lanceolatis obtusis temote denticulatis in petiolum angustatis, pedicellis axillaiubusteiminalibusq filifoimibus folio duplo quadriuplo longionbus infra medium biacteolâ petiolatâ lanceolatafohaceainstuctis, calycis lacuiis lineaibus obtusis tubo longionbus. (J) in Teneiiffâ. Solenopsis Canariensis Piesl 1. c.
- 4 L. MUNTA , acaulis glabra, foliis basi confertis petiolatis ovalis obtusis undolato-cienatis petiolis limbo a?quilibus , pedicellis plurimis scapifoimibus electis folio duplo tnploye longionbus uniflons suprà basin i-brakteatis, biactea mi' mmâ lineaii acutâ flouibus teiminahbus electis brevioie, tubo corollas cyhn-dtaceo laciniis calycinis sublongiore limbo 5-paitito palente inaequali lobis o\atis 2 minoribus. (I, in subaquosis Cap Bonae Spei. —Lobelia niinuta Lin. mant p 192. nou Thutib nee DC. Sims bot mag. t. 2590. Solenopsis innata Piesl piodi. lob. p 3i Corolla pallide caeulea. Antbeue inclusae. Pedicellos apbyllos dixit Linnaeus enore forsan, nee tamen Lobeham miuutain Ibunb. (quae Lauientin micrantha Nob) intellexisse videtur, qiaia plantse Thunbeigianae post Linnasi Mantissam detectae. Specimen in Mantissa desciiptuui, si adest in beib. Lmnaei, me fugil in autopsia nimis brevi.
52. *minima*, bracteis supia basin pedicelloiuin ternatis. Lobelia minima Sims bot. mag. t 2077. Solenopsis minata var. Presl 1. c. Coiolla pallidior.
- ** *Tubus calycès ovoideus basi angustatus vel angustè turbinatus.*
5. L. ARABIDEA., glabra, caule sohtano ciecto teieti gracili, foliis radicalibus con fen is oblongis acutis sinuato-denticulatis integrisque sessilibus basi angus-tatis, caubnisfloidibusque rans linearibus deuticulatis, pedicellis axillanbus bracteâ dimidio longioubus, tubo calycis ovuleo basi auguslato teieti laci-niisminiraia linear-acumiatis erectis duplo longiore, corollâ angoste cylind-thacea lobis calycmis tiiplo loagioie^acmiis lineaibus 2 snpei. augustionbus, anlbens glabiisculis' a mfei. apice seta teiminatis. Qf) ad tap Bonae Spei in patteiuf occid Rapuntium arabidvum Piesl' p 18 coram. pi. afi. austi Dieg

- p. Q88. Lobelia Leklou' u 488 m Monc et Dunant Flldres albidi minimi. Capsula ovoideo-tubinath (v. s. comm. à cl. Dreg.)
- 6 L DREUCANA , glabria, canle erecto simplici terti gracillimo, foliis radicibus 9-3 obovatis obtusi!) mlegiis petiolalis, medus paucis oblongo-lanceolatis sessibus aigute dentatis, bracteis lineibus integus, pedicellis subteinalibus biactea triplo longionibus, tubo calycis angusto terti lacimis linearis-acuminatis erectis bieviore, corolla angustis cylindriaceis lobis tal¹cinis 40 longiorie, labia hubaeqnahbus lobis 1 sup angustionibus, antbens glabriusculis 2 mm apicet seta teirainatis (T) ad Cap Bonac Spei in humidis nionrosis Giftberg, regiois occid infer. Solenopsis Diegeaua Hresl¹ comm pi afr. aastr Dreg p. 390. Planta minima ficie Arabuhs verna (v. s. in pi Dreg.)
7. L MICRANIHA, rara diffusis tenuibus pilosis, peliolis pilosis limbo subaequahbns, lirabis lotundatis pilosins(ulis 5-7-dentatis, pedicellis erectis gracillirnis glabris nudis axill inbus folio 4°-5°-ve longionibus, calyre giabro, tubo obovoido basi acuto terti lacimas lanceolatas at uniuinas jequoante, coiolla laciniis calycims 7°-8°-ve longiore, tubo angusto, lobis 1 supenonbus mmonbus, antheris glabris, 1 Infeioubns seta tcaminatis (f^p) ad Cap. Bonae Spei in regione montana occid. Lobelia minuta Thunb.' inb Linn, prodi p./O fl cap p 182, non Lmn maut Walilenbergia micianiha Dieg.' catal. plant, aaf. anslr p 9. Lobelia Ruicb' catal pi afr. austr n 634 Eckl' in b Dun Flanta debilis, habitu Wahlenbergiae hederaceae. Limbus fohorum 1-4 lin. latns membranaceus, angulis dentibusve acutis nnn brevibus. Coiolla alba. Scmina ovoidea (v. s.)
8. L. GAUDICHAUDII , canle repente ramoso alato-triporto, fobis sessilibos oblongo-lanceolatis obtnsis repando-denticulatis basi angastatis, pedicelhs axilla laubub folio longionibus, calycis laciniis triangulan-lanceolatis acutis tubo angste turbmatoenvio bieviobus, coiollae laciniis lanceolatis 1 suj>erioribns(?) longionibus — in No^a Hollandia Encbysia Gaudichandh Presl prorir. p 41. An lapsu pennae lobos supenores majores dixit rl. auctor, in praesenti sp. et sequenti.
- g. L BADERI , caulis repente ramosis alato-triportis flexuosis, foliis sessilibus obovatis ovato-lanceolatisque obtusis obtuse dentatis basi acutis, pedicellis axilla 1 ibuh folio brevionibus, calycis laoinus linearis-subulatis tnb tnrbinato basi angustato doplo brevionibus, corollas laciniis lanceolatis a superiouribus (?) majobus — in Nov^a Hollandia Encbysia Buneri Presl prodr. lob p 40-
- 0. major.* (Pre& 1. c), canle longiore laxo flacrido, fohis ova to-lanceolatis oblongo-lanceolatisque, pedicellis folio brevionibus ant aeqniflongis —Hab cam pioie.
- xo. L. PUSILLA, glabra, caule ererto tereti vel subancipiti, foliis oblongis acatis integrerimis subdentatisve, pedicellis filiformibus bracteis quadruplo longioribus, lobis calycmis lanceolato-lineanbus acntiusculis tubo corolla; triplo brevionibus, laciniis infenoibus corolla? obovatis, saperionibus duplo minoribus —in Nov^a Hollandia prope flumen Cygnornm (Hugel et Drnmm !). Iso-toma pusilla Benlh.' en plant, nov. holl austr occid. Hngel p 75 Herba 3-4-polcaris, caule temm, folns 2-4 lm. longis. Anlheiae dorso ciliatae, inflores 1-aristat¹ aristat setacea reflexa. Faux corollse lotea, lobi caerulei. Capsula subcylicduca a lin. longa. (v. in b. Bentb.)

XVII ISOTOMA Lindl bot. reg t 0^4 <* Don gen syst. gard 3 p 716 Presl piopr lob. p. 41. — Isotoma, settio Lobeliae Br. prodr nov holl p 565 — 1 ob^lia sea. Solenanthis Kunth in H et B. nov gen am 3 p 30g — Hippobroina G Don gen syst. gard 3 p. 717 — Lanrentiae spec Endl gen. I. p 512

Calyx 5-lob us, tubo tuibmato vel elongato. Corolla hypocraleri-inoipha, tubo nilegro, lobis calyunis multo longioie, lecto vel sulnn-curvo, lobis patentibus aequahbus vel piulò inaequalibus. Filamenta stammum tubo coiollae plus mmusve adnata Anlheijs extrà tubum corolla: inter se connatx, J lufeonluis apice setaceo-anstatis — Herbae s as pi us annuae, pedicelhs axillaubus, flonbus albis, loseis vel caeruleis.

Sect. i. EuisoroMA

Tnbns c IIoHT longus Anlhei e npeworm glabue vil parutn pilosae Semina triqnetia (an semper?)— e ftovâ Hollandiâ.

- i I BRLviroLiA. (Pieslprodi lob p 43), glabeiriua, caule erecto simplici,, folcij sessibus lineaiibus acutis adpressis latitudine tuplo longionbus, racemo nmlifloio, pdicellis biacted folus conponni dnplo longionbus, calyns lacinus o\iio-lanceolatis acuminati* tnbo tmbinato obliquo doplo bievioibus, (oroll-p IarimN obovato-spathulalis abiupte acuminatis tnbur aequantibus, snpeiiouhus paululum mmonbus (I ? in Novâ Hollandiâ).
- 0 I BROWNII (fi Don 1. c. p, 716), glabta, caule eiedo smphci teieti, folus liuearibns integris pedicelhs folio multo longionbim, tubo cylcis obconico , lobis linean acuminatis tubo recto corolla? triplo biezionbus, lacinus obovato cuncatis paulo luxqaahbus mucronatis tubo dimidio bieviobus I) in Novâ Holla ml 11 piope (return regis Geoigu et flu me u Cygnorum — Benth.' en pi nov holl austr occ Hngel p. j5. Lobelia h^pociatenformis Br. piopr nov holl p. 565 Hook bot. mag t. 3075 Planta pedahs, lacemo terimnahmnlli-floio Corolla roseo violacea Capsula pynfoimi-iucui va Semina tnquetra. (v s . comm a cl Cunningh et Drumm)
- J. I. sFitrioiDES, canle erecto, angulosu, folus lin^an-lanceolalis iobdecnren-nbuH nregulanterpmnrftiidis, lobis alternatim brevioubu^, peditelhs erectis folio duplo tnplove lonf,Monbus, tnbo calycij. obconito, lobis linean-atum-natis tubo coroll? qnadruplo brevionbus, lacinus cotollae I luceolatis aoutis tubo duplo triploxe biezionbus, ilamentis pilosis (T) in Nova Walliâ ans-trail — I axillans Lindl. bot reg. t 964 bot cab t. i5a8 Gaudich voy Freyc p 455. t 70 Lobelia senecioidej. Sims bot mag t 3702. ^ Lobelia aaplenufolia bortul Lohi coiollac patenfs subaequales amoene caemlei Yariat caule foliisque glabeirimis aut subpujiescentibns (v s }
- 4 I. BAUKRI (Presl piodi p 4a), glabernma, caubbns teietibus, folus iessi-bsns linean lunceolatis acutis remote acnltque senaiis, supremis teinato-veitcillatis, pdicellis folio longlonhus, calycis laciuns lanceolatis acutis eiectU lubo turbinato detem neivio dnplo longionbus, corolla? lacimis ovalibus aequahbus tnbo dnplo longioribus % m Nova Hollaudiâ

Sect 11 SOLENANTHIS — Hippobroma G. Don gen. tyst. gatd 3.
P 717. — Lobelia sect. Solenanthis Kunth I. t.

Tubus coiollae longissimus Anlheiae omnej, apice hirsutae, a infer piaeterea, setis terminatae. Semina globosa —ex America — Nomen Hippobroma (eqnom cibns) aliquid falsum in memonam revocat, nam planta eqiñm raaxime vrue/ica, ex Jacq anwr p aao

5. I. LONG IF LOR A. (Presl prodr. lob. p. 4a), pabescens, caole herbaceo angaloso ramoso, foliis lanceolatis acntis basi angnstatis dentatis, snperioribns approximatis, pedicellis folio multoties brevioribos basi bibracteolatis, floribus longissimis folia floralia subaequantibus, tubo calycis obconico, lobis linearibus aculis dentatis tabo corollac longissimo decies brevioribus, laciniis corolla lanceolatis aequalibus. *If* in paladosis Caribaeoram. *Lobelia longiflora* Willd. sp. r. p. 94*2. Jacq. amer. p. 219. hort. vind. x. t. 37. Desconrt. fl. med. des Antill. pi. i56. Sieb. I plant, martin, n. ^ Iindl. bot. reg. t. iapo. *Rapnn-tium longiflornm* Mill. diet. 7. *Rapancalus aquatica*s, etc. Sloan, jam. x58. t. iox. f. 2. *Hippobroma longiflora* G. Don 1. c. (v. s.)

J- *Isotomce exclusm.*

I. PU9ILLA Benth. = *Laurentia pnsilla*.

I. 9CAPXGXRA G. Don. Z=L *Enchysia scapigera*.

Orrlo CV. CAMPANULACE.E (i) *DC. et Dub. bot. gall. i. p. 3n. Lindl. syn. brit. p. 135, nat. syst. ed. i. p. 185. G. Don gen. syst. gard. 3. /?. 731. ZsWl. ^/z. 1.^7. 5i3.— Campanularum pars Adans. fain. nat. 2. p. i3a. — Campanulacearum pars Juss. gen. p. 163. Giseck. ord. naU linn. n. 29. — Campinulaceae sect. 1. Br. prodr. nov. holl. /?. 559. — Campanuleae trib. Campanulacearum Alph. DC. monogr. des Campanulees, 1 vol. l^o 1830.*

Calyx saepius 5-lobus, nunc 3-6-8-10-lobus, rarissimè limbo destitulus, ovario adnatus, lobis aequalibus. Corolla gamopetala, regularis aut rarissimè subirregularis, laciniis cum lobis calycinis alternantibus, acstivatione valvari. Stamina 3-5-6"-8io, numero lobos corolla? saepius a?quantia nun qua m superantia, iisdem alterna , à tubo corolla? libera; filamentis liberis , basi saepius expansis membranaceis; antheris plerumque liberis, loculis 9. ante florationem longitudinaliter dehiscentibus. Pollinis grana (sicca) spbaerica, papillis minimis echinata. Ovarium inferum 2-3-5-6-8-io-loculare, in Merciera dissepiment o incompleto uniloculares. Ovula 00 , in Merciera 4. Stylus plus minusve pilis collectoribus caducis tectus. Stigma nudum (nee indusio cmctum) raro capita turn, saepius ramosum, ramis numero loculorum, in alabastro erectis dorso pilosis interne papillosis, in flore deinùm divergentibus vel recurvalis. Loculi, quando lobis calycinis numero aequales, nunc iis oppositi, nunc alterni. Capsula vertice aut lateraliter dehiscens, plerumque valvis medio septiferis, rarius vero fissuris aut poris absque valvis. Semina 00 (in Merciera numero definito) parva, embryone recto, albumine carnos. — Herbae lactescentes vel rari suffrutices, in regionibus temperatis frequentiores; foliis exstipulatis, alternis vel rarius oppositis, saepius deutatis*, inflorescenti& aut definita, floratione centrifugd, aut obscure indefinite, alabastris tune ramos laterales terminantibus primo apertis; floribus solitariis vel glomeratis, saepius pedicellatis, raro involucratis; corolla plerumque caerulea, nunc flava vel purpurascente.

Tribus T. VTAHLENBERGIEJE Entll. L c. -^ Campanuleae subtribus I. Alph. DC. I. c. p. 98.

Ovula 00. Capsula vertice intrà lobos calycis dehiscens. — Pedicell! post anthesin erecti. Genera in hemisphaerio australi frequentiora.

(i) Aurtmre Alph. DC. dilectissimo Clio.

- I. JASIONE Linn, k. cliff, p. 426. gen. n. 1005. Juss. gen. p. 166. Lam. ill. t. 7* f i. Gessn. phyt. p. 104. t. i3/* 896/10/1 Theophr. nee Plin. — Scabiosac sp. Lob. adv. nov. p. Q32. — Aphyllanthes Dalech. hist. p. 864. — Raptiisp. Column, ecphr. p. 226. ic. — Ovilla Adans. fam. nat, 2. p. i3/».

Calyx 5-fidus. Corolla profundè 5-partita, laciinis linearis-lanceolatis. Stamina 5, filamentis tenuibus, antheris basi in tubum connatiis, polline caeruleo vel purpurascens. Stylus à mediâ parte usque ad apicem pilosus pilis 10 ordinibus dispositus. Stigmata *2, brevia. Capsula 2-locularis, spheroidea vel ovoidea, apice foramine late, valvis brevissimis dehiscens. Semina minima, ovoidea, nitida. — Herbae saepiis perennes humiles, foliis alternis angustis, floribus capitatis sessilibus vel breviter pedicellatis, floratione in capitulo centripetâ, in plantâ centrifugâ.

1. J. MONTANA (Linn. sp. J3i7), caule erecto siraplici vel raraoso tereli infernè piloso, supernè glabro, foliis linearis-lanceolatis nndnialis pilosis, pedunculis elongatis nudis bracteisque glabris. (Jj interdum % praedpue in arenosis maritimis. la Enropf medie et circa mare Medilciranew. — OEd. 11. daud. t. 319. Engl. bot. t. 882. Sturm DeutschL. fl. ic. opt. Desf. fl. all. a. p. 311. Lam. et DO. fl. fv. n. 2872. J. undulata Lam. fl. fr. 2. p. 3. excl. var. /3. Dietr. fl. regn. boiss. t. a n. Alpb. DC. mon. camp. p. 102. Bractex ovato-acuta? subcrenatae. (v. v.)

\$-maridma, hirsuta, caalibus prostratis elongatis incanis subsimplicibus, Toliocrassiusculis, calycibns incanis 9€? in sabulosis Galliac propè Testede Buch. J. maritima Dufour in b. DC! J. moutana y maritima Duo.! in bot. gall. p. 3 n. (v. s.)

y, *liuoralis* { Fries nov. suec. pars 2. p. 39, ed. 2. p. 268), huinilis cespitans, caulis simplicibus adscendentibus, capilulis luinimis, bracieis obtusis rotundis. If. in arenosis Suecise.

f. *stolonifera*, radice stolonifera, stolonibus rosaliis, foliis ovalis pilosis inarguatis integris, pedunculo elongato glabro nudo, bracteis ovatis creuatis pilosis. % in Calabriâ (Tbomas!) Medias snnt iuter priesenteui et var. y: J. niontana b Gass. prod. fl. sic. 1. p. a5o. Cup. panph. bon. t. 83. Bertol. fl. it. 2. p. 527. J. perennis Bert, lucubr. p. 22. n. x8 non Lois. J. bumiliis Jan elencb. p. 3. n. 2. non Lois. J. pereimis Fries nov. ed. 2. p. 270 excl. syn. Mert. et Koch.

t. *major* { Mert. et Koch Deutschl. fl. 2. p. 147. excl. syn. DC fl. fr.), radice crassâ multicauli, caulis a-pedalibus, cajjitalis duplo uiajoiibus. In Paliitinatu.

n. *prolifera* { Bell. act. tar. 5. p. 247), capitulis proliferis. Lain, et DC. 11. fr. n. 2872.

f. *dentata*, bracteis spinoso-dentatis acatis. — ia Olympo Bitbino (Aucb.! ann. 1837. n. 1880).

- a. J. CORYMOSA (Poir. suppl. 3. p. 131. excl. syn. Dalech.), caule erècto ramoso anguloso angulis pilo&o, foliis sparsis decurrentibus oblongo-linearibus sub-pilosus uudiilatis, pedunculis brevibus pilosis, bracteis ovato-acmis ciaeato-dentatis pilosis. — in arenosis regni Maroccensis (Brouss.). — Alph. DC. mon. camp. p. i03. J. arenaria Salzm.! in h. DC. Caulis 6-7-polli ubiqne foliosos. Folia et capitula minora quam in præcedente. Folia breviora quam in J. perenni, et præterea lobi calycis subciliati. (v. 3.)

3. J. PEREWNS (Lam. diet. 3. p. 216), caule erecto subsimpli, foliis sapernè paris subpilosis, radicalibus obvatis in plantis non floriferis confertis rosulatis, caninis oblongo-linearibus planis integris, pedunculis elongatis nudis, bracteis ovato-ciculis serralo-dentatis interne pilosis. If, in Gallia et in Germania Galliac proximâ. — Lam. ill. t. 724. f. 2. Lam. et DC! fl. fr. »» ^873. Bot. reg. t. 505. bot. mag. 1. 2198. Mert. et Kovh! Deuischl. fl. 3. p. U8 excl.

vai. *fc* Habitus J. moutanx scidiadix sempei pecnnis , folia et ca pi tula ina-
jora Variat caule foliisqoe pilosis aut glabiis, foliis ladicahbus integris aot
crenatis (v. v.)

- 4 J HUMILIS (Loisel. not snr les pi de Franc p. 42), pubescens, caahbus adscendentibussimplicibas, folus linear-i-ovatis obtusmsLulis plauis integris, radicalibus approximate rosulatis, caulinis sparsis, pedunculis teruinalibu* brevibus, bracteis ovato-acatis integiis vel dentatis calyce viloso lobis linean-
capijlaceis. Of in pascuis editioribus Pyrenaeorum —DC fl. fr. suppl. n 2873.
Lois. fl. gall 2. ed 2. p 147. Alph. DC mon. camp p 105. Phyteuma crispa Ponrr. act. tolos 3 p 3*4. J- undulata ji Lam. diet. 3 p 216. J. montana humilis Pers. enh. a. p. %i5 excl. byn Ca\ J perenms % Lapeyr hist abi.
Pyr. p 103, Pubescens, incana, praeupue iufia capitulum Planta 3-4-poll
basi repens et cespitans, pedunculis terminalibus fohosis parvis. (v. s.)
- /& *tomentosa* (Alph. DC. 1 c,), folus minimis ovato-acutis, bracteis sub-
integns angustis ova to-a cut is, calycibus valde tomentosis, lobis hneari-
capillaceis In Novâ-Castellâ (Lag 1)
5. J. riNiciLLATA (Boiss.! herb), pubescens, caulibus adscendeatibas, fohjs sparsis linear-i-ovatis acutis plan is deatatis, pedancuhs terminahbus brevi-
bus, bracteis ovato-acatis iategris dentatisve, tabo calycis glabro, laciniis li-
ne ari-cap ilia ccis penicillatis. — in arenosis Sierra Tejedae Hispaniae meiid
Habitus J. humilis, praecipne var. *ft* Folia magis dentata, basi ranora, lobi
calycis longiores exceptâ extremitate glabri. (v s . comm. à cl. Boissier)
6. J. SUPINA (Sieb in Spieng syst. x p. 810), lalice simplici, caulibus plan-
mis repetitiôis diffusis hum ill bus glabnusculu., folus integns radicalibus spa-
tbulatisbasi ciliatis, caulinis sparsis oblongo-lanceolatis glabrinsculis, pedun-
culis teiminahbusbrevibus glabiis, bracteis ovato-acuminatis acute dentatis
glabris, calyce glabro If in editioribus Olympi Bithyni (Auche ! 1837
n 1881) Caules 2-4-poll., radice non longiores Capitula minima. Habitus J.
hunihihs sed diveisa (v s . comm. à cl. Auch.)
7. J LUSITANTCA (Alph DC mon. camp, p 105), hurailis, cauhbns ramosis
diffusis, foliis obovato-lanceolatis pilosmscalis sabsmuatis peduncahs nudis
terminahbus bievibus aut scapiformibus, bracteis ovato-acatis glabiiscuhs
sobsmuatis subacutis. — prope Olosippum. Caulis 2-3-poll tennis. Folia apice
ramorum sterihum conferta, in florifeiis mfeiiora breviora. Capitulis pai vis,
pedunculis raro teiminahbus bracteisque integns, a J. perenni differt. (v in
h. Banks.)
8. J. AMETHYSTIWA (Lag.et Rodi anal, decienc nat. t 5.n. i5 p 271),humilis,
glabra, cauhbas simplicibus diffusis, foliis obovatis subsinuatis radicalibus con-
fertis minoribus, caulinis spai&is subspatalatis, capitulis terminahbus violaceis,
bracteis ovatis integris , noribns congestis % in editionbns Sienx-Ne\adae.
Radix fibrosa. Caules i-3-poll longe rigidiasculi. Folia radicalia numerosis-
biiaa, 3 hn. longa. (v s . comm. à cl. Boissier.)
- ^ *tristis*, folus ciliato-tomentosis. J. tristis Bory ann. gen. 3 ann. 1820
p. 3. In Sierrâ-Nevadâ loco dicto 'Valleta
- 9 J POLIOSA. (Cav IC rar 2 p. 38. t. 148. f 1),glabria, cauhbns artscendentii-
bus simplicibus humilibs, foliis iadicahbus rosnlatis obovato-spatholatis inte-
gris vel remote denticulatis, caulinis sparsis linean-lanceolatis integns subacu-
tis, capitals terminalibns paucifloris, bracteis oblongis obtusis vel subacutis
mtegris glabns % in editioribus montium Hispama? mend Phyteuma ? Hgi-
difolia Dufour' ined. Radix crassa Caules t-3-poll. Folia inferiora minora
(v. s.)

Species exclusa.

J. CAPENSXS Berg. =3 Aitranitia ciharis.

II. LIGHTFOOTIA *Lher. sere. angl. p. 3. Ait. h. kew. i. p. 217. Willd. sp. i. p. 45. Alph. DC mon. Camp. p. 107. Endl. gen. i.p. 54. Non Sw. — Campanula; sp. Thunb. prodr. p. 38. Linn, suppl. p. 141.*

Calyx 5-fidus, tubo hemispherico. Corolla 5-partita vel rariis profundè 5-fida. Stamina 5; antheris liberis caducis. Ovarium 3-5-loculare. Stylus apice incrassatus. Stigmata 3-5, brevia filiformia. Capsula saepiis semisupera, valvis 5-5 vertice dehiscens, Joculis (quando 5) lobis calycinis opposilis. Semina ovoideo-trigona.— Suffrutices vel rariis herbae perennes, Capenses vel Madagascarienses; foliis alternis oppositivis, sessilibus, parvis; pedicellis axillaribus et terminalibus post anthesin ereclis rigidis.

§. 1. *Capsula 5-locularis.*

1. L. SUBULATA (Lber! sert. angl. t. 5), caule adscendente vel erecto sublignoso simplici vel ramoso, foliis alternis erectiusculis linearis-subulatis angustis subdeniculatis, racemo elongate pedicellis folio brevioribus basi bibractcolatis, petalis linearibus lobis calycinis erectis margine exiliis levolutis sublongioribus, valvis capsule tubo longioribus.^{ad} Cap. Bonae-Spei, prxcipue in parte infer, occid. — Alph. DC. mon. camp. p. 107. Dreg.! pi. cup. exs. n. 6312 et alia specim. sine num. excl. plauta è Cederbergcn. Campanula subulata Spreng. syst. 1. p. 728. Zcyb.! pi. cap. n. 35g non Tbunb. Lightfootia Hurch. cat. pi. afr. anstr. n. i'6]. Campanula fruticosa Linn. sp. 1. p. 238? Variat glabra vel pilosiuscula. (v. s.)

§. 2. *Capsula Z-locularis%*

2. L. LONGIFOLIA (Alph. DC. 1. c.), caulis erectis basi lignosis simplicissimis velutinis, foliis alternis erectis linearibus subulatis angustis rigidis margine s 11 perne paulo revolutis remote subdenticulatis glabris, floribus spicatis sessilibus aut breviter pedicellatis ternatis, laciniis corolla? 5-partitae lobis calycinis ilnpllo longioribus, capsula fere tota infera valvis brevissimis. % ad Caput l^{onae}-Spei. L. linearis Eckl.! in h. Dunant. Campanula sessiliflora Linn, suppl. p. i39? Thnnb. prodr. p. 38? fl. cap. ed. Sebult. p. 171? mem. acad. Petersb. 4» P- 367. 1. 5. f. 1? ubi corolla 5-loba, nee 5-partita, sed verisim. errore pictoris. Folia 6-8 lin. longa, & lin. lata. (v. in h. Dimaut.)
3. L.? DNIDEVNTATA (Alpb. DC. 1. c. p. 109), glabra, caule erecto liguoso simplici, foliis alternis erectis linearis-lanceolatis acuminatis basi dentatis dentibus utriuque 1-2 setaceis, floribus laxè racemosis, lobis calycinis erectis acuminatis integris margine extis subrevolutis tubo hemispherico longioribus, corolla 5-fida lobis calycinis triplo longiore, valvis obtusis capsulae ipsius tubo brevioribus. 5^{ac:} ^^aP^ut lionae-Spei. Campanula unidentata Tbunb.! prodr. p. 3g. mem. acad. petrop. 4. p. 371. t. 5. f. 2. fl. cap. ed. Sciuult. p. 172. Willd. sp. 1. p« 897. Pedicelli folio longiores rigidi. Fasciculi fuliornm in axil-Hs plerumque. An Wahlenbergia propler corollam certe 5-fidam? sed habitus et forsitan seiina Lightfootiae. (v. in b. Banks, et in h. Linn, a Thuuii.)
4. L.? ADPRESSA (Alph. DC. 1. c p. no), canle ereclo lignoso simplici, foliis alternis Kessilibus reflexis linearis-lanceolatis setaceo-dentatis basi ciliatis, margine revolutis, floribus paniculatis, calycis glabri tubo ovoideo, lobis acutis erectis, corolla lobis calycinis duplo longiore campanulata seuii-5-fida? ^ ad Caput Bonae-Spei. Campanula adpressa Thunb. prodr. p. 38 mem. acad. petrop. 4. p. 368. t. 7. f. 2. flor. cap. ed. Schnlt. p. 171. Ex icona pessima corolla potius Wahlenbergia sed habitus Lightfootiae.
5. L. ALBENS (Spreng. in Zeyh.! pi. cap. exs. n. 266), caule erecto lignoso ramoso, foliis allernis sacpiis fasciculatis patulis linearibus angustissimis integris luargine sobtiis revolutis crassiusculis pallidis, racemo laxo, pedicellis longitadiue foliorora scabrinscniis, calycis glabri tubo obconico laciniis linearibus erectis externè revolutis basi subdenticulatis, lobis corollae 5-partite laciniis calycinis triplo longioribus, valvis acutis capsulae ipsius tubo subxqnalibus. 5

ad Caput Bonae-Spei.—Alph. DC. 1 c. p. no. Campanulaceae sp. Biuch.! cat. pi. afr. aastr. n. 1720. Lightfootia Dreg.' pi. cap. exs. n. 3619 e collibus piope Klem Fischrievie. (v. s.)

6. L. AiroMALA, glabra, raims basilignosis^fohis alternis patent-rcflexis linearibus acutis marginatis lemote subdenticulatis, peduncuhs divegentibus ligidis, paniculâ elongatâ laxâ, pedicellu teiminalibiib brae teâ lancpolalo-acuminata tnpl longionbuw, Iobi* calycinis lincari-acurainatis maiginatis Integrit* tubo longionbus, cofrilld profunde 5-flđa lobis calycinis 4° longiore. J ad Capot Bonae-Spei, in regione montanâ occid. Lightfootia Dreg' pi. exs n 166 b. Corolla non vere 5-partila, sed iuter 5-partitam et 5-iidam Ex eo potius Wahlenbergia, habitus tamen, lacmiae angustae corollae, capsula brevis et seraina 3-goa Lightfootia. Folia 6 lin. longa, lineain lata. Peduncuh et calyces nunc scabriuscui. (v. s. comm. à cl. Dreg.)
7. L. ANGSTIFOLIA, lamis lignosis teretibns velutinis, fohis alternis sessilibas lmeari-lanceolalis acaminatis ngidis erectis glabris margioe subtus revolutis dentibus utrinque 1-2 subulatis, floubus aggiegatis, fa&cienlis teroiinalibus axillanbasque, bracteis lanceolato-acuminatib dentatis flores sequantibu*, lobis calycinis hneari-acuminatis electis integiis margine mciassatis tubo Ion-gioiibus, lacinns corolla? pilosis lobis calycinis dimidio majonbus. j\$ ad Caput Bonae-Spei, in colibus asperis aastralibus (Dreg.' n 6320) L fascicalataevalde affiuis, differt fohis angustioribus longionbus, fasciculU racemosis nee corymbois Calyx glaber. (7. s. comm. à cl Dieg.)
8. L. PASCOEATA (Alph. DC. 1. c. p. 112), caule erecto lignoso ramoso vel simplici remisque teretibus velutinis, foliis alteruis sessilibus reflexii ovuto-acutii crassisnclis glabns remote denticulatis inaiginc subtus revolutis, flonbus fasciculate, fabciculis terminalibus vel subterminahbus, biacteis lanceolato-acuminatis dentatis flores aequantibus, lobis calycinis lineaum-acuminatis erectis integris margine incrassatis tubo longionbus, laciniis coiollae pilosis lobis calycinis paulo longionbus. ^ id Capnt Bonae-Spei Campanula fasciculata Linn suppl p. 139. Thunb. piopr. p. 39 act. acad. petiop 4. p. 3^3. t. 6 f. 1 B. cap. ed. Schult. 5. p. 173. Roella reflexa h. Banks' L oxycooides litt. f Dreg.' pi. cap. Folia minora maxillis conge&ta. "Valvae capsulares lobis calycinis maltō breviores. (v. s.)
9. L. SICATA, lignosa, ramis diffusis simplicibus fohosis snbvelutinis angnlosis, foliis gteinis patenti-reflexis ovato-aculis couaccis glabiis concavis margine SQisum reflexis dentatis, flonbus &essihbus axillaribus sohtariis, calyce glabro, tubo heimsphaenco, lobis ovato-acutis tabo lougioiibus sulintegiis, laciniis corolla; extus pilosis lobis cdlytmis duplo triplovo longionbus. 3 ^** ^«P^{ut} Bonc-Spei, in monibus Giitbcig et Ccdetbergen L. oxyco<<oides litt. e. Dreg.' pi. exs. cap. L. subnata litt. c. Dieg.' pi. exs. cap Habitus et folia L. tenelhe, &d flores longe spicati. Folia saepè in axillis mmora fasciculata. Capsula kemisphaeiica, valvis 3 lobib calycinis>brevioubuj». (v. s. comm a cl. Dreg.)
10. L. TENELLA (Alph. DC. 1. c p nr t. 3. f B), caule erecto lignoso ramoso, toYw, alternis saspis fasciculalisielle Uovatis obtusisciabsisbubinlegitis, margine subtus revolotis, floiibus racemosis, calycis tubo obconico lacniis hneari-lanceolatis aculis breviore, lobis coiollas sub-5-partitae laciniis calyarinis dnpl longionbus, valvis acutis capsulas ipsius basi seqoalibas J ad Caput Bonae-Spei m diversis locis coloniae. Campanula tenella Linn.' sappl p 141. Ihunb. prodr p. 3q. act. acad. petrop 4. t. 7. f. 3, ic pessim. fl cap. ed Schult. p. 173. (exel syn. L. oxycooides) Roem et Schnlt. syst 5 p. 117- (^{excl-} cod. syn) non? Lam. diet. 1. p 5QO. Lightfootia Dreg.' pi. cap. 63ib. Roella 1 ecuna h. Banks' Roella filiformis Poir. diet. 6. p. rii fide h. Juss' non Lam. Roella glabra Pon. diet. 6. p. a3a. fide h. mus Par ! L fasciculata Eckl! in h. Danant. "Variat folds integris veldenticulaUs, ramis abbreviatis lignosis vel giacihns. "Valv* capsulares lobis calycinis subbrevioicis (v. s)

k, longivalvis, lobis calycinis patentibus biew'oubus, valvii cap^ulae eloiigatis

- lobos calycis excedentibus.—*Campaiulacea* Buich.! pi. afr. austr. n. 26^5.
Lightfootia Dreg.! pl.exs. n 6J08. *L. oxyccoides* a Dreg.! pi. exs. cap. (v.s.)
- y. *brevivalvis*, lobis calycinis*ieclis dnpl longioribus valvas capsula les breves tnplo exccedentibus. *L. oxyccoides* b,d,Dreg* pi exs cap. *Lightfootia* n. 6311. 6318 ejusd ! An species cum *L. tenella* confusa? (v. & comm. a cl. Dreg.)
- ix. *L. OXYCCOIDES* (Lher.' sert. angl. t. 4⁴ excl. syn. *Campanula tenella* L.), glibia, caule soberecto vel adscendente rainosissuno basi lignoso,raniisdiffibis, foliis alternis leflexis ovato-lanceolatis acutis teuuibus ad basin denticulatis, pedicellis filifoimibus longitudine foliorum , tabo Calycis heimsphanico laciniis subulatis integus margine extus revolutis longioie, coiollae 5-partitae lobis oblongo-laaceolatis lacimis calycinis dimidio longionbus, capsulae v.lvb acutii pane infera aequalibus. J ad Caput Bonac-Spei ex gr. in montosis Drakens-teen (Dieg ' n. 6j06). Sm. exot. bot 2 t 69 Trattin. aich. gen. 137 ead. ic. Alph. DC. 1. c. p n3 nonDreg. *Lobelia tenella* Linn maut p. 120. Thunb. Strodr. p. 40, non Biv. *Lobelia parvifolia* Beig. cap. p. 345 non Br. *Campanula Utonica* Rcen.! et Schult. syst. 5. p. n5. —Dieg ' n. 6315. (v. s)
12. *L. LAHCEOLATA* (Link ennm. h. ber. 1. p. 217), caule decumbente, foliis lanceolatis glabris dente uno alteiove, pedunculis pubebcentibiib, calyce glabio coiolla duplo bieviore. 7^ ad Caput lionae-Spei. cult, in h. beiol. *L. oxyccoides* var Spicng syst. 1. p. 809 A films *L. oxyccoidi* at folia lanceolata nee ovata, coiollae majoies 4⁴Qcares albip et cserulc¢es.
13. *L. MUSCOSA* (Linkeniu. h. ber. i. p. 217), caule decumbente glabio, foliis lanceolalis glabiib integeinmis, ramis oppositls, pedunculis glabiis, calyre corollâ brevioie. — ad Caput Bonoe-Spei. cult, in h Berol. *L. oxyccoides* Spreng. syst. r. p. 809. Folia 3-4 lin longa j lin. lata. Corolla ?-3-lin. albo-oaeiulescens.
- i4- *L. LOODIGESII* (Alpb. DC. 1. c. p. 114), glibia, caule ramoso lignoso, foliis alteinis patentibui* leflexisve ovato-lanceolatis acutis iutegiis, flonbus laxè lacemosis, tubo calycis hemispbaeiaco lacimis acutis breviore, corollas 5-par-
titae lobis lanceolatis lacimis calycinis 4" longioribus. J Q ad Caput Bonae-
Spei. cult, in h. Loddig. *L. tenella* Loddig bot. cab. t. io38, non Alph. DC. Raini tenues purpurascentes. Folia a lin. longa £ lin. lata. Pedicelli 2-4 lin. longi. Corolla rotata cserulescens.
- x5. *L. 1 YCOPODIOIDES* (Alpb. DC. I c. p. 114), ramis lignosis simplicibus valde foliosis, foliis affinitia iao subverticillMtis electis lam o ntpleasis lincwii ibus iingustissiitiis glabris raaigie extus revolnlis, iloiibns paacis srssihbus, tubo calycis pilo&iusculo laciniis glabris erectis lineanlms br̄eviore, coiollae piofunde 5-partitoe lobis hneanbns laciniis calycinis triplo longioibus. \$ ad Caput Bonac-Spei Rami apice subvelutim. Folia 4 lin. longa. (v. in h. Kuiith) «
16. *L. orrosiTIFOLIA* (Alpb. DC. 1. c. p. 115), laiuib erectis tenmbus rigidis simplicibus, foliis opposilis patentibus leflexisve linea-lanceolatis acuimnatis glabils subdentatis marginē ciassiusculis, flonbus paucis saepiū tcimiuallibus, calyce glabro tubo hemisphaenco laciniis erectis lanceolato-acuiuinatis denticulatis dimidio breviore, corollâ sub-5-partitâ lacmjis calycinis duplo longiore. 3 ad Caput Bonas-Spei, ex gr. propè Dutoitsklool (Dreg ! n. 63i4 LightfooUa Burcb.! catal. pi. afr. austr. n. 606 Eckl.! in h. Dun. (v. s.)
- i7. *L. RUBOIDKS*(Alpb. DC. 1. c p. 116), ramis procumbentibns diffusis, foliis oppositis patulis subreflexisve lanceolatis acntis remotè denticulatis floiibus pauci terwinalibus et axillaribus, tubo calycis piloso sphærico laciniis patentibus linear-lanceolatis remote denticulatis subpilosis dimidio longiore, corollæ 5-partitæ lobis linearibus calyce longioribus. — ad Caput Bonæ-Spei. (v. in b. Banks.)
- 18 *L. FUBE&GENS*, iatuit tejetibus foliobis velutinis, foliis, alteinis vel snboppo&itis lineaubui aculis patentibus pubescenlihb maigme btibtus levoulis integiis

deutatisve, floubas terminalibus aohtariis , pedicellis folio brevionbus calyce-que pubescentibus, lobis calycims lineaai-subulalis integna tubo triplo longio ribns, corolla; glabra? lacinus lobis calycinis paul6 majoiibns % Ad Caput Bonae-Spei. Ligbifootia Dicg ' pi. cap exs n. 7406 Radix gracilis ramosa. Raiui rigidi, non bgnosi, h-7-pollicares. Folia 2-3 hn longa , axilbs foluferis. Corolla vixpaitita, diu 5-fida. Capsula hemisphaerica, valvis 3 breubus. Se-mina tnqueta, pauca, valde angulosa (v. s comm a cl. Drege.)

19. L MADAGASCARIENSIS (Alpb. DC. 1 c p. 116), glabra, mule erecto basi sublignoso suupbci, foliis alternis eiectis hneari-acuminatis remote dentu ulalis, illobus snbpamculatis nnraeiosis, tubo calycis hemispbaeric0 teieti, lacinus crectis acumitiatis integris tubo sequalibus, corolla 5-partita lacinus calycinis tnpl0 ciicitei longiore, capsula ommno infeia valvis bievibus. % in insula Madagascnr. (Coibmeis in b. Jus<j.')

JO L? aonusTA, glabra, ramis diffusis lignosis, veteiibus in arma mutatis , foliis elhptiris brevissime petiolatis integerrimis innctionnatis planis marginatis al tcinis vel fascit 11 latis , flonbus e fascienlis folioruiu temin solitariisve pedicellis folio dimidio brevioiibus, tubo calycis hemisp crico 5-gono , lobis linear! acuuiinatis mugine intus reflexis tnbo longioiibns, coroll4 5-partit4? lobis calycinis duplo longiore j ad Caput Bonae-Spei m legione interna' sic(A coloniae Lightfootia Dreg ' pi. exs cap n 7691. Specimen nostrum imperfrcluni, habitu ab omnibus Campanulaceis differt Folia 4 bn longa, 1 1 * lin lata Kami junioies scabiuscuh purpmasceutes Coiollaorsan deinuin 5-paitita Antheiae generis. Capsula tilocularans semi-supera. Semina ovoidea punctata. (v. s.)

•j" *Specie f exclusa.*

- L. riLiATA Spieng. = I'rismatocarpus subulatos.
- L. SESSILIXORA Spreng = Frismatocaipas Atrictus.
- L. BESS n it 1 OR A Zeyb = Cyphia.
- L. n C |oj Dreg. = Wahlenbergia caffra.
- L. n. 6310 Dreg = Wahlenbeigia decipiens.
- L. n. 63E3 Dreg =z Wahlenbergia oxyphylla.

III CEPHALOSTIGMA Alph. DC. mon camp.p. 117 Endl gen. | p 5i5 — Wahlenbeigij; sp Le Pr et Perrott herb, seneg. — Campanula} sp. IVall. herb. — Lobelia¹ sp Salzm herb.

Calyx 5-fidus. Corolla 5-pmtit4 , laciiniis lobis calycinis longioribus. Stamina 5, hbeia , filamentis basi latioribus Stylus saepiiis exsertus , plus nunubve pilosus. Stigma simplex, capita turn , pilosurn. Capsula 2-3-loculans , apice valvis ^i-^ , medio septifens, brevibus , debisrcns. Semina 00, minima, ovoideo-tnquectra. —Herbae habitu. Wahlenber-giafum , coroll4 Lightfootiarum , floribus laxè racemosis paniculalisve, peduncubsdichotonus , pedicellis terminalibus bracte4 oppositis.

Sectio 1. EUCEPHALOSTIGMA. Endl. I, ^>

Stylus laciinas corollae paulo superans. Capsula 2-loculaus.

*• C PLRROTTKIII (Alpb DC 1 c.), canbbns erectis simplicibna herbaceis basi pdosis, fohis sessilibus integris maigine albidis mfeiionbus lanceolatis confer-tis imperioiibus hneaiibus acuminatis , lacemo elongato laxo pedunculis saepè dichotouis, pedicellis giacilibus glabris, tubo calycis obcouico glabio lobia acuhssuMongiore, laciuns cotollau lobis calycinis triplo longioribus, capsula obovoide4 (j ln arenosis hamidis ad Kbam peninsula; Promoutoiii vindis in Senegambia. (v s. comm. a cl Le Prieui et Peirotte)

a. C. PRIEURKI (Alpb DC 1 c.), canle humili lamosissimo basi denndato sub-hgnoso ramis pilosiuscnlis , fohis hnearibus minunis, floribus numerosissiinii peduncuhftdichotoiuis f pcddielhs iihfonuibus, tubo calycis obconno glabro lobis linearibus acutift sublongiore, lacinus coiolla? lobis calycinis duplo Ion-

gioubus, capsula obconica (J)? in Senegalià ciica Jonal. (v. s. comra. à cl. Le Prieui el Perrottet)

3 C BAHENSE, caule herbaceo sitnplaci eerto basi husuto, foliis subsessilibus membrinaceis repande cienuatis glabris obtosis mferoribns obo\atis, rnediis lanceolatis, biacteis Imeari-lanceolatis acutis, racemo elongato inuhiflоро, pedonculis illiformibu* duhotomis cum floie glabiis, pedicellis biacteola oppo\atis terminalibus, calycis tubo ovouleo lobis lanceolalis acuimnatis .equah, lacimis corollae 5-paitilae lobis calycinis sublongionbus, capsula obovoideâ. (J) in areuosis ciica Babiam Blanchet' n 366. Lobelia arenana Salzm¹ Plaiita 3-4-poll ladice giacili, foil is 6-10 lin longis, lacemo nudiosculo bracleispavis. Pedunculi derail bis vel tei riirbotomi axillaies, jxdicellij> biacleâ mullo longioiibus Stylus crassus pilo&uH corollâ sublongior Sligiu capitatuui. Capsola 2-lokulans vahii breM&simia Senina j-qactia (v.s.)

/2 major, canle pedali, folns dnplo majoribus, bractis piacsilun triplo quadruplove inajonbu^ Q^ circa Babiam in cultis Dlancbet' u ibd III h. Moric (v. 8.)

Seclio 11 TUITAMIDIDM Endl L c.

Stylus lanuias corolla: vix seqaans Capsula triloculaiis.

4 C. PMiiccLATUM (Alpb. DC 1 c), caule beibaceo lamosi&simo folioso pilo^o, foliis sessibus ovatis utnnquè acutis meinbianat eis subsinuatis glabris IKMVIS biiblu&pubeiulis, pamculA lasa, pedunculis giacilibu& dichotoims glabns, tubo Crflycis obronico lobu, pilu&is aiuuunalis> brevioie, ladinis coiillac lobis calycinib tnplo longioiibus, capsula obcomca (f) mca Proiue ad lipas luawaddy Biyroanoim Campanula pamculata Wall.¹ list n. 1295. Planta pedalig. (v. s. coimu. ab ampl. ccel meic Ind 01)

IV. MICROCODON Alph. DC. mon. camp, p 117. t 19 Endl gen v. p 515
— Campanula* sp. EchU m h. Dunant —Wahlenbergiae sp Schrad' in lit

Calyx 5-fidus, tubo ovoideo. Corolla apice 5-loba, minima, cylindraca. Stamina 5, hbeia, filamentis tenmssimis basi non expansis. Stylus fill form is Stigmata 5. Capsula 5-loculaus scini-snpcia, loculis cum lobis calycmis alternantibus, valvis 5 dehiscentibus. Semina ovoidea minima.—Herbac Capenses, annuac, humiles; foliis alteinis vel suboppositis sessilibus parvis nnquistzs, supci ioi ibus paulò longioribus, flonbus teciminalibus subsessibus; calycis tubo hispido.

Sectio 1. EUMICROCODON.

Ovanum supernr conicum liberura Capsula valvis tenninalibus 5, paid III infeiorem longitudiue 9ubcLquautibu8, dclibceut> Semina mtida

1. M GLOMERATDM (Alph DC. 1. c. t i q), caule lamoso, ram is simplicibus, folnslineanbas acuminatis, iloubus apite ramorum appioximatis (J) ad Caput Bonaj-Spei. Campanulacea Burch. cat. pi afr. austi n. 189 Campanula hispida Eckl. in h. Dunanl, non Linn (v. s.)
- 2 M 8PAR3IFLORUM (Alph DC 1 cp ia8), caule raraoso, iamis dicbotomis, foliis linear-lanceolatis, floubus &olitaiis leuninalibus (i^ ad Caput Bon*-Spri Wahlenbergia hispidula Schrad'lit (v.«.)

Sectio ii. COELOTHECA.

Ovarium superne planum, totum infernum, tubo calycis brevius Capsula sero valvis superne deluiscens, vel potius parte superiori (sine valvis proprie ditis) tuboque calycis ab apice ad basin inter lobos fisco demum aperta. Semina ovoidea, obscure trigona, sub lente punctata — Habitu et dehiscentia medium inter species seci et genus nostrum Europaeum Edraianthus à quo differt numero locularum. Forsan typus generis nov? Nomen a nrologiis cavus et thixa capsula

3. M. DEPRESSUM, canle abbreviate ramosissimo rainisquu diffusis hispidis teretibxxs rigidis foliosis , foliislinearibus acatis marginalia subdenteiulatis subciliatis, floribus sessilibus terrainalibus etaxillaribus, calycis tubo obconico pubesconte . tereti , lobis Hneari-acnminatis den-ticulalis giab'iusoulia inbo auhlongioribus, corollā longitudine lobcmim calycis apice 5-lohā. (l) ad Capnt honas-Spe in nrenosis inter Elephanirivier et Rergrivier. Wahlenbergia ·Dreg.! pi. exs. u. > 6ayi. Planta habitū Anstadtiae Hieiochuniinac , z-poll. aha, 2-4-poll, lata ram is inter, eloigatis. Capsula cum lobis calycinis seinipollicularis, diù exsiccata * inaperta, externē hispidissima. Debiscentiam ipsam non vidi; ia capsulis valde exsiccatis valva; desunt, sed sinus calycis paulò fiasi. (v. s. com in. à cl. Drege.)

'V. PLATYCODON *Alph.* DC. *mnn.* *camp.p.* *ia5 excl. spec.* 2. *Endl. gen.* 1.
p. 5r5. — *Campanula:* sp. *Jacq.* *hort.* *wind.* 3. *p.* 4-*t.* *i.Lam.* *ill.* *n.* a5i3.
JVilld. sp. 1 *p.* 89r. — *Wahlenbergiac* sp. *Schrad!* *cat.* *h.* *gott.* 1814. *Fisch I*
lilt. — *Campanula:* sect. *Codonix* spec. *Spreng.* *sysL* 1. *p.* *)'65.

Calyx 5-fidus. **Corolla** 5-lobn, maxima, infundibuliformis. **Stamina** 5, libera, iilamentis basi latioribus. **Stylus** basi incrassatus apice pilosus, pilis 5-serialis. **Stigmata** 5, crassa, demum patentia. **Capsula** erecta, ovoidea, 5-locularis, loculis cum lobis calycinis alternantibus, apice valvis ncutis dehiscens. **Semina** ovoidea, nitida. — **Herba** perennis, **Asialica**, subglaucscens, -glaberrima, foliis ovato-lanceolatis sessilibus alternis aut suhoppotitis grossè serratis, floribus solitariis paucis terminalibus intensè circuleis.

x. P. GRANDIFLORIUM (Alph. DC. 1. c.). — in SibirA Dahařicā et (non spontanea?) circa La Cava in repno neapolitano (h. JOSH!). — (Campanula foliis lanceolatis glabris ina;qualiter denfatis, etc. Gniel. sibir. 3. p. i53. t. 28 ic. bon. Campanula graudiflora Jacq. 1. c. Herb. de Tumat. 19 fasc. t. n? non Lam. (1. fr. Campanula genlianoidts Lam. diet. 1. p. 781* Wahlenbergia grandiflora Schrad.) 1. c. (v. v.)

-**Species exclusa.**

P. HOMALLANTHINUM Alph. DC = *Wahlenbergia homallanthioa*.

"VI. CANARINA. Juss, gen.p. 164. Lam. ill. t. 259. Gasrtn. fruct. sttppl. p. i63".
 t. 211 Alph. DC. mon. camp.p. ia3. t. t^f. li.—Campanula sp. Pluck.phyt. t.
 276./*. 1. Linn. sp. 1. p* 168. — Canaria Linn, mant.p. 148 et ii5.— Pernetya
 Scop, introd. ad hist. nat. p. 150.

Calyx 6-fidus. **Corolla** apice 6-loba, carnpanulata, maxima. **Stamina** 6, libera, iilamcntis busi crassioribus glabris. **Stylus** inclusus superne hispidiis, pilis duodecim-seriatiss. **Stigmata** 6. **Capsula** subcarnosa, 6-locularis, apice (tesle Gaertn. f.) dehiscens, loculis lobis calycinis oppositis. **Scmina** numerosa, parva, angulata[^] — **Herba** 3-4-pedalis, gta be r riu a, glauca, quotannis e radice fusiformi lactescente surgens, foliis oppositis, floribus solitariis terminalibus.

1. C. CAMPANULA (Lam. diet. 1. p. 598), foliis oppositis petiolatis hastatis subcordatis inacqualiter dentatis, calycis tubo obconico, lobis lanceolatis acuminitatis deniatis. % in Canariis. — Curt. hot. inag. t. 444. Herb. de Tamat. 25 fasc. 1. 142 Campanula Canariensis Linn. sp. p. 238. (v.s.)
 2. C? ZAHGUKDAR (Lour. fl. cocbinch. r. p. 240), caule scandente fralicoso te-
staceo, foliis alternis cordato-ovatis integrifinis glabris petiolatis,
flore solitario lateralí pallido, corollá 6-fidâ, staminibus 6, capsulâ inserâ
subovata basi acutâ 6-nerviâ, 6-loculari polyspermâ basi debiscens, seminibus
cordatis comp. vooia UIH luiijinaté cinctis odons. — in ora Africæ / ^ngueDar.
Verisimiliter generis diversi propter folia alterna ctcapsulam basi drbiscentem.

VII CAMP VNUMOFA *Ilium bijdr tot. flor need ind p. 726 Alph DC mon camp p 1x8 Lndl oen 1. p 5i5 cxcl syn Codonopsis*

Involucrum i-florum 5-partitum. Calyx hemispbaencus, ovano adnatus, limbo Iruncato. Corolla 5-paitita Stamina 5, hbeia, loins mvolucen opposita, filamenlis basi sublationbus Slylis inclusus Stigmata 3 ovata ciassa Ovirium mfeiiim Capsula globosi, umbibco lato piano 5-angulan cicatncibus corolla? et staminum cuieto terminata, multivaivis ex Blum (veiisimbter 3-valvis) Semma cicberuma, ellipsoideo-cyhndnca subpunctata Placenta; ciassae iitunque mflcxde ad angulum inLei num cujusque loculi.—Hciba? glabeirimai, lactescentes, radicibus (ex Blum) luberosis, caulis ramisque tcittibus, folns oppositis, peliolatis, subtus glaucseentibus, pcdunculis axilhnbus et terminabbus uniflons

1. C JAVANICA. (Dlam M e), caale scandente, fohis ovatis cordatis crenulatis, petiolis limbo pauiin bievionbus, floubus paucis, pedicellis petiolum aeqaantibus, lobu. involuen lanceolatis ncurain itii longitudine flons ^*» m sylvis hmuidis montium Jivx Cap&ula glohosci crussa involucro accre¢e patente rinca — Alpb DC 1 c p 119 (v s)
- 2 C CELEBICA. (Blum '1 c p 727), caulceiecto, folns bieviter petiolatis subIDtegnis mfeuoribus ovato-acutis, bupeuoribus 1 mceolatis, floubus termiualibas subcorymbosn, rarais 3-flons, pedicellis longitudinc petiolorum ____ in insula Celebes —Alph DC 1. c p. 120 (v in h Blum)

VIII CODONOPSIS Wall herb n i300 et 1301, non species in Roxb fi ind a. p. io3 Alph DC mon camp p 120 sect 2 nonSenth et Royl.illustr himal bot part. 7. p 254 necEndl gen — Campanuincsc sp. Endl. gen. 1 p, 5i5.

Involucrum i-florum 5-partitum, lobis dent Uis CalyxhernisphaeiICUS ovoideusve, ovano adnalus, limbo Liuncalo («iu scrnpi *) Corolla 5-fida vel apice 5-loba Stamim 5, bbera, involucii fouobs oppositi, filamentis basi lationbus Stylus inclusus Stigmata 5, line iria, demum revoluta Ovanum 5-loculare, oinnino infuunj Capsula globosa, corollâ peiaistente tcuninat\, demum nudA, apice aicolata\, ibique valvis 5 brevibus dehiscens Loculi cum involucii fobobs alteinantibus, ideoquc lobis corolla? oppositi Semina 00, paiva, leuticulana.

Sectio 1. SYNCHLÆNA

Involucrum com calyce basi connatnm — Nomen a 01v cum et KXenvet vest is, involucrum

1. C TRWCATA. (Wall' list n i30i), caule erecto, folns ovato-acnmiatu, argnte serratis breviter petiolatis, flonbus ad apictm riraoium 3 b, pedicellis petiolo longioubus, involcri calyce basi idnati lacuna 5 lineaubus atumimtis patentibus, tubo calyns spbieoideo, limbo obsoleto?, coiilli profunde 5 fid 1 — in regione Bumanorum ad Pingee secus npas Inawaddy —Alph DC mon. camp p 122 Cainpanuuicea ex Endl 1 c Specimen nostrnm fructiferura lobis calycinis orbatum. Capsula infera apice valvis 5 dehiscens. (v s tomin. ab ampl caetu meic Ind or et in h soc lmn LondiD) *

Sedlo II. APOCHLYFNA

Involucrum liberum. — Nomen ab «two procul et xxaiva involucruui

- * § PARVIFLORA (W ill ! list n i300), caule erecto, foln», ovato-acummatis breviter petiolatis subinlegns vel senulatis, denticuhs setiformibus, lamu. .ipice "5 5 flons, pedicellis folio dimidio brevioribus, mvolucen folmlis lmeanbns acnminaris denratis, calyce ovouleo limbo nullo, coiolla infundibnlifoim senu-

Chinâ boi (h Banks') Campanula Rcdowskiana Cham et Schl ined. ex Linn 4 p. 41. Campanula houiallauthina Ledeb act petiop. 5. p. 5^4 Cham, et Sch. 1. c. W Kruhsidia Fisch' in h DC. Platycodon homallanthinum Alph DC. mon. camp p 126 Peduncall i-ilon semipollicares Capsula vrrticc dehiscensex cl Fisch Habitus et coiolla generis Platycodon, sed capsula 3-loculans¹ Conf. ad char generis Wahlenbergiae obs de numero loculornm.
(v.s)

/S *angustifolia*, fdlis linear-lanceolatis integernmis Ledeb. 1. c.

Sectio 11. AIKINIA. — **Aikinia el Nesophila.** *Alph. DC. mon. tamp,*
p. 145. — **Campanulas sp.** *Linn. Thunb.* — **Campanopsis sect.**
Camp Br. prodr. nov. holl. p. 56i. — **Wahlenbergiae sp.** *Schrad.*
— **Aikinia Salisb.** *ined.*

Calyx et coiolla 5-lobi Corolla infundibuliformis vel tubulosa, saepius apice 5-loba, nunc 5 iida. Ovaium quo ad majorem partem inferum, 5-3-a loculae. Seraiua ovoidea — Heiba. vel lai suffiutices, saepius annuac, folns pleiunique aessilibns basique appoxiniatis, 5apim alternis, peduncuhs sjcpus elongatis dichotomic; lloibus pa 1 vis.

§. 1. Capsula 5-locularis. Seminamitida. Caules ei etti vel adscendentes, folds scssilibus alternis vel bani oppositis, pedunculis sapiks elongatis nudis. — Omnes Capenses, annual? herbagecc.

* *Corolla 5-fida, patens, discolor.*

7 W CAPENSIS (Alph. DC 1. c. p. 136. t. 18), caule rrecto simplioi vel rainoso basi piloso, foliis ovato-lanceolutis pilosis irregulariter dentatis, peduncalis elongatis i-flons glabns, calycis tubo ovoideo lusrido, lobis linear-lanceolatis (ilialis corolla 5-iidâ pateute dimidio bievoribus, capsulâ obo/oidea pilosa. (JjadCip BondB-bpei, in aieuosis, ad upas flum. liergiivier (Dreg !) — Campanula afneana annua hirsuta Co mm hort. a. p. 71. t 35. Campanula Capensis Linn. &p. p. 240. Thunb prodr. p. 3c), mem acad Petersb 4. p. 374. t. 6. f 3 Hot mag t 782. Roella decurrens Andi bot lep. t. a38 non L'Her Campanula elongata Willd en h. bei. suppi. p. xo Wahlenbergia elongata Schiad ' cat. h gou 1814 Folia mine opposita. PIII calycis albi Mibietrorsi Corolla centio alio-cacruea, ad oiiginem loboium virescens, macniliis nigri& inter lobos, lobis violaceis. Stigmata crassa ovata demum patentia. (v. v)

#* *Corolla apice S-loba concolor, scepius infundibuliformis, pose anthesin contracta cylindracea.*

8. W. DIFFUSA. (Alph DC 1. c. p. 137), caule debili ramosissiroo glabro vel pilosiusculotereti, foliis auerois linedii-acaininatis subdeniculatis margme cartilagineis, calyce glabro vel pilosmscolo, tubo sphapnco, lobis linear-acnminatis coiollam tubulosam apice lobatam subxquantibus, capsulâ sphjeioidea glabra — ad Cap. Bonse-Spei. Campanula lubioides h. Banks' Campanula afneana hirsuta parvo angustoque folio, 11 ore pallide violaceo Co mm hoit. a. t. 37 ? Folia infer, desant. Peduncuh 6-10 bn longi (v. s in h Banks ex h. Kew.)

g W TINEARIS (Alph. DC. 1. c. p. 137), caule erecto r.iraoso tereti folnsque labnusculis, foliis alteinis oppositisqne linearibus angntis subdenticulatis inargme supeinc revolatii, pedicellis folio hrevionbus, tubo calycis sphaeroideo hispido, lobis elongatis linearibus angntis subpilosis lubo qnadruplo longionbns corollam tnbulosam apice 5-lobam sqnantihs, capsulâ sphxrica subpilosâ (I ad Cap Bonae Sp**i*, m aienosis prope Beigrivier Dreg ' pl.«exs Campanula linearis Linn suppl p. J40 Thnnh prodi. p 38, mem. acad. Pefersb. 4 t. 5. f 3. fl cap. < Scbult p. 171. Rarai infri. sacpe oppositi.

Folia sjcpius basi ciliata, pilis paacis albis. Capsula 5-locularis. (v, s. cotnm a cl. Dreg)

10. W. COST ATA, canle à basi ramoso, ram is erectis snbpilosis, pilis albis brevis-jumis vesiculaeformibus, foliis hnearibas aciitis glabris margine crassis denticn-latisque , iafenonbus oppositis saperioribas a 1 terms , racemis elongatis mnlti-lion's, pedunculis abbreviatis folio bievionbas, calyce sebro, tnbo hemisp*-uco lobis linear-i-acnminatis subciliati breviore, corollà cyhndiacet lobis calycinis dimidio longiore, capsulà late turbinatà 5-costatà. (f) ad Cap. Bonse-bpei, in parte infer, occid (Dreg.! n 6296). Planta 3-4-polli. radice gracih, folus spensis 5-8 lin longis super ssepe lougioibus > pedunculis sxillanbus h basi rauioium 3-5-floris, peditellis calyce bievionbas, corollà augastà apice 5-lobà, valvis capsulae lobis calycinis eiectis paulò brevioribos. (v. a. comui. acl. Dreg.)
11. W. DivEnGENS, canle à basi ramoso, ramis divergentibns scabro-pilosiusculis, pilis vesiculxfoimibus, fohis linearibus acutis glabus margine ciassis denticu-latisque infenoribus oppositis superioribus alternis, pedunculis divaricatis dicbotomis, pedicellis folio longioiibus, calyce scabro, tnbo hemispbaericob lobis lineaii-acnminatissubdentalisbrevioie, corollà cylindiacet lobis calycinis diradio longiore, capsula latissime turbinatà 5-iostatd. (j) ad Cap EonT-Spei, in arenosjs prope Jbenezan, regioms occid. Wahlenbeigia Dieg.¹ pi. cap exs 6299. Radix elongata, gracilis. Caulis 3-pollicans W. costatae \aldi alfinis, sed lami magis diveigente, pedunculi minus abbreviati, capsuke valva; lobis calycinis tune patentibus multò bre\iores. (\. s. comm. à cl. Dreg)
12. W. DLrrriEivs, caule lamosissimo erecto ramisque teietibns scabiusculs, fob is oppositis linearibus acnminatis dentitulatis, pedunculis dicbotomis diva-ricatis, bracleis alteinis pedicello opposito vix brcvionbas, calyce glabro, tubo abbieviato 5-gouo, lobis patentibus dentiformibus cuspidatis longitudine tubi, corolla tobulosa a pice 5-loba calyce multo ties longioie, capsula brevi 5-angnlari senu-supeia. 7L? ad Cap. Bonae Spei in parte inf occid. Lightfootia Dreg.¹ pi. exs. cap. n 6310. Habitus Lightfootije, sed corolla apice soltum 5-loba Plauta 3-polhc. basi rigida . rnniisqne ngidis. l'oha .ingusta, a-3 lin. longa Cipsula viac lineamlonga, 5-loculaiis, locuhs lobis calycinis oppositis ranus 3-locularis (v s. coinm. a cl. Dreg)
13. W. TURNATA , ramosa glabra, ram is eiectis teretibns, foliis alternia spar-sis linealibus margine incrassatis lemotcque subdenticnlatis, pedunculis dichotomis inultiflons , pedicellis brae tèa longioiibus , calycis tubo turbinato, laci-niis linean acuminatis margine intùs revolulis erectis tubo longioiibus, corolla apice 5-loba laciniis calycnus triplo longiore, capsula turbiuata 5-gonat. Qp? ad Cap. Bonac-Spei in parle occid. prope Dutoitskloof. Wahlenbergia Dreg.! pi. exb. n. 6295 partim. Specimen tiuncntum .i-polljtaie , folus plciisqec delapsis. Flores 4 lm longi. Corolla cyhndracea ? Capsulae 5-loculaiis valvae laciniis calycinis eiectis multo breviores. (v. s. comm. à cl Dicg)
- 14 W. OXYPHYLLA , caule erecto basi simplici pilosinsculo snperne pamculato scabro foliis basi appioximatis alternis oppositisque lanceolato-Hcumiuati^ inargin'atis subdenticulatis glabnusculis, pedunculis dicbotomis, calyce glabro, tnbo hemispba?rico lobis lincari-acnminatii duplo tnplo>c bicvioie, coiolla apice 5-loba lobis calycinis triplo longiore , capsula hemispaciicà 5-angulan. (jy ad Cap. Bonaj-Spei in paite montosa^ occid Lightfootia Dieg.¹ n. (>3i3. Herba 4-6-pollicans. Folw ^-4 ^{lin}-_{lon} 8^a » ^{VIX line} «*ni lata. Peduncoh divari-cati cum calyce scabuuscnli, folio sublongiores. Valvae capsulares lobis calyci-nis patentibus dimidio bieviores. (v. s comm. a cl Dreg)

fi, pedicellis elongatis folio multò longioribus giacilibns. Dreg ' n. 6313 on, specimen fructiferum.

- 15 W. SAXIFRAGA, caulibus eierts gracilibus basi sirapliubus pilots, snperne dichotoims glabiis, loliis .ilternis ct oppositis lincau-lanceolatis acuminatis remote snbdenticulatis pilosiuscuhs bracteis pedicello opposito multo breviori-bus, ealyce glabro, tubo hemispacrico teieli 5-nervio , lobis lincaii-acnmi-

natis margine supernè revolutis tubo iriplo longioribus, corollâ lobis calycinis triplo longiore aj)ice 5-Ioba cylindriacea, capsula hciuisphaerica %. ad Cap. Bonaj-Spei, in apriH montis I'quelberg. regionis occid. (Dreg.! n. 630a). Radix crassa, caules plurimos seinipedales einittens. Folia per infer, partem frequentiora 3 liu. longa. Flores 4 1° longi. (v. s. comru. à cl. Dreg.)

16. W. rsifTAMERA, caule erecto subsimplici basi piloso, foliis linearibus acatis glabriusculis margine subdenticulatis, paniculâ laxâ pauciflorâ, pedicellis bracteâ longioribns, tubo calycis heinispahjrico bispido lobis linearibus angustis glabris duplo triplovc breviore, corollâ infandibulilbrmi apice 5-lobâ lobis calycinis dimidio longiore, capsula globosâ 5-angulari. (i) ad Caput Bonae-Spei in parte infer, occid. Walilenbergia Dreg.! n. 9137. Planta pednlis. Folia infernâ tpproximata alierna vel tmbopposita 5-6 lin. longa vix lineam lata. 'Valvae capsulares 5, lobis calycinis ereclis dimidio breviores. (v. s. comm. à cl. Dreg.)
17. W. DREGEANA, caule ndscendenfegrscili basi simpliei subpubescente supernè paniculato scabrido, foliis linearibns acutis pilosis margine subdunticnlatis, iloribus laxè paniculatis pedicellis gracilibus folio longioribus, tubo calycis hemisphaericо lobis linearibus angustis dimidio breviore, corollâ elongalâ 5-cos-tatâ. (j)? ad Caput Bonse-Spei. Walilenbergia Dreg.! n. 6297. Planta pedalis et ultrâ, flexuosa, foliis per inferioretн partem approximatis alteruis (>-io lin. longis vix lineam latis. Lobi calycini in capsula patentes 3 lin. longi valvis Iriplo longiorus. (v. s. comm. à cl. Dreg.)

§ 2. *Capsula 3-locularis.*

* *Herbacecc ; foliis rotundatis, longh petiolatis, alternis ; scminibns pnnctatis|*

18. W. HEDERACEA (Richenb. pi. crit. 5. t. 480), glabra, caule adscendente aut repente filiformi ramoso, foliis rotundatis obtuse 5-y-angulosis, pedicellis terminalibus et axillaribus gracilibos folio longioribos, tubo calycis bemispbx-rico lobis linear-subulatis longitudine a?quali, corollâ lobis calycinis 4* longiore, capsula heraisphaericâ. (j)iu humidis et umbrosis Europae occidentalis ab Hispaniâ et Galloprovinciâ ad Daniam er in Americâ bor.? (herb. Juss.! au •rrore?) — Alpb. DC. 1. c. p. i£o. Campanula Cymbalaria folio C. Baub. prodr. 34. Campanula bederacea Linn. sp. p. 240. Sm. engl. bot. t. "J'i. Roem. fl. eur. fasc. 1. p. 17. c ic. Campanula bedersefolia Salisb. prodr. p. 127. Campanula arvatica Lug. in variet. de cienc. lit. n. 39. oct. 1805. p. 4°« Aikinia hederacea Salisb.! in h. DC. Schultesia Roth en. plant, germ, pars 1. ann. 1827. testc Court, fl. belg. Roncela hederacea Dnmort. fl. belg. prodr. p. 58. (v. s.)

** *Herbacece ; foliis sessilibus vel inpetiolatum brevem angustatis, plerisque oppositis; seminibus Icivibus.*

19. W. FLACCIDA (Alpb. DC. I.e. p. 138), pilosiuscula, canle erecto simpliei pa rum folioso, foliis oppositis alternisque ovato-acutis integris, pedunculo terminali i-a-floro folioso, calycis pilosi tubo ovoideo lobis lanceoiato-acuminatis erectis aequali, corollâ lobis calycinis dimidio longiore, capsula ovoideo-sphaericâ angulosa. — ad Caput Bonae-Spei. Campanula flaccida Masson in h. Banks.! (v. s. in h. Banks.)

- ao. W. XNIFGBIFOUA, glahra, canle erecto ramoso ramisqne tetraponis, foliis oppositis linear-lanceolatis acntis rigidis raargine incrassatis subtùs revolutis integerrimis, pedicellis terminatiōns solitariis folio brevioribus, tubo calycis obconico lobis lanceolato-acuminatis margine extùs revolutis erectis dimidio breviore, corolla infundibuliforini ore lato sub-5-fida lobis calycinis vix dnplo iongiore, capsula obconica valvis brevissimis. — ad Capnt Bonae-Spei in parte infer, orient. Wahlenbergia Dreg.! n. 4012. Seiuina ovoidea laevia. Folia 6-8 lin. longa, in axillis interdum fasciculata. Sequentе dnplo major, w|x tamen diversa. (v. s. comm. à cl. Dreg.)

- ai. W. STELLAaioinas (Cbnm. in linn. 8. p. 196), caulis »dscntibns sub - cespitosis filiformibus tetragonis glabris, foliis oppositis basi approximatis ovato-acutis lanceolato-acntis lincaribusve margine revolntis, pedicellis terminatiōns vel axillaribns folio longioribus, tubo calycis ellipsoideo brevi, lobis

- lanceolato-aculis glabus margine subiellexis, corollâ infandibuliforrai 5-iida lobis calycinis diniidio longiore. *If.* in Caffianâ (Kiebs n xi6) Wahlenbeigia Dreg ! n 6101 ex Albany Tolia subtus neivo pilosa, infenora sublineau'a brevias lanceolata, Miperioia sub-5-hneana , latitudine vix seunlineam excedente. Coiolla circitei 5 linear metiens. (v. s.)
22. W. SPZNULOSA (Alph. DC. I e. p. i55), huinihs ramosissinia, raznis diffusis rigidis leretibus glabns vel scabuuscuh*, foliis linearibas anguslis glabiis vel pilosiuscuhs deuticalatis ugidis aculeo tenninatis, infeiioribas opposing, pedicelhs folio sublongiobus, tubo calycis glabii spbaenco, lobis inargiue revolutis cilia Us acuminatis tabu &uba:qu*<*ilibub, coiolla angusta' apice 5-lob à, capsula' spbaeroideâ. — ad Caput ttona>-Spei. Campanula spmulosa heib. Banks' Planta i-2-poll., foliis 2-3 lin. longis, pedicelhs post matniationeiucapsulae spinas simulantibus (v in b. Banks.)
- a3. W. MADAGASCJUENSIS (Alph. DC. 1 c p. ilqj, caule electo rainoso glabio paium folioso supeine pilosiusculo , foliis btucte oppo&itis iuteruodio bievioibus ovalo-acutis cienatis glabns, calyce pilosiu^culo, tubo sphaeiico, lobi* acuminatis apicc lecurvis coiollain pi of untie 5-iidim scquanlibus, capsula glo bosa \alvis bievibus — in Madagascar Rctnn tkLhotonu I loies in dichotouiij, bolitani, pedicelhs j>emipollcaibus (v in b Hook, aim 1828.)
24. W. HILSENBERGII, caule electo ramoso glabio supeine pilouiusenlo, foliis stricte oppositis inleinodio bievioubus ovato-aculis utnnque pubeiul> subcienalis, calycis bir&uti tubo turbinato-henmpaenco, lobis lanceolatis acuminatis tubo Miblongioiibuseiectis, corollâ lobis calycinis longioie — in Madagascar ijc piov. Emna Campanula Uilsenbergi Bojer msb. Fiamentuin nostmm 4-polhcaie, iam!> suhtetagoniit, inteivallo (olioruin polhcan, iohis 3-6 hn. longis 2-i lin. latis, iloubus solitarns inte* lamos dichotomos, pedicelhs &ennpollicaiibus et ultra Corolla tiuncata. — An à W. Madagascanensi diversa ? (F. S. comm. a cl. Bouton)
- [^]5. W. DIVKRSL>OLIA (Alph. DC. 1 c. p 139), canibus procumbentibus laniosis paium folioMs supeine glabris mferne piloMi, foliis alternis oppositis glabiis cuhs, infenoibus ovatis bubrotundjs cienato-dentatis, ahii ovato-lanceolatis acutis uudulato-dentatis mucionulatis, pdicellia teiininahbus et axillaibus fihformibus folio duplo lungionbus, calyce glabio, tubo ovoid"o-j>ub&pha.iCo lobis acutis basi latioibus sublongiore, capsulâ ovoideo-obcomcâ —ad Caput Bona; Spei (Kcklon'). Caules 6 9-pollic pihs albis longis mollibus. Semina ovoidea nitida An a sequente dueiba⁹ (v. inh. Dunaut.)
96. W. opposiT FouA, glibia vel pilosiu&cula, caule ndscendente flexuoso 1-amoso rami&que tetragoms, foliis stricte oppositis ovato^lanceolatis iuteinodio bievioribus obtusis mucronulatis dentibus utiinque i-3, pedicelhs termiuahbus in dichotomâ lainoiuui folio subbievionbus, tubo calycis hemisphaeiico lobis lanceolatis acutis electis subbievioie, coiollâ lobis calycinis paulô longiore, capsnlâ hemisphxricâ lobis calciuius patentibus teiininatâ valvis brevissiniis. — ad Caput Bonre-Spei in giaminosis et rupestribus legionis infer. oorientalis. Wahlenbeigia Dreg.' pi. cap n. 4008 et 4009 Planta pedalis, dif-fasa Folia omnia simiha, /|-5 hn louga, 1-1 | hn. lata. Pili albi interdum basifoliorum calycisque. Semina ovoidea feie laeid. (v. s.)
- [^]. *enspa*, foliis margine crispatis albidisque, pedicelhs folio sublongionbas *Jf.* ad Caput Bonae-Spei 111 ead. paile piopecafiaactam magndin Dieg ! n. 4007. Specimen iraperfectum , basi hgnosum, foliis niugis dentatis (v. s. comm. a. cl Diege.)
27. W. PROCUMBESTS (Alph. DC 1. c p i4° t 15), glibia vel pilosiuscula, cau-Hbus repenteibus ramosis, foliis oppositis verticillatisvc ovati> ant obovatis sub-in tegi is, pedicellis terminalibns axillaiibusque folio duplo longioribns, tubo calycis ovoideo longitudine ¹oboi um, corollâ apice 5-loba' lobis calycinis erectis acantis triplo longiore, capsulâ teiti ovoideo-sphsericâ. % m fossis aquosis ad Capnt Bonae-Spei prope nibem.—Dieg ' pi cap exs. Campanula procumbens Thunb ! fl cap. cd Sch p 174 mem acad. Petersb. 4 p i75. Linn. f. suppl. P- 141. Flores pauci Semina ovoidea sub lenle punctata. (v. \)
- £. *foltosa* (Alph. DC. 1 c p. 140 t. i5 f. 6), cauhbus s«pe abbreviatis,

foliis appioximatis minoribus. *Campanula* Burch ' pi. aff. nusti. extiatiop n 361 et 108. *Walhenbergia* Dieg ' pi. cap. exs. n. 3t>73. G3o3. W. prorumbens ejusd.' specimen ex aspens Leuwenberg (v. s.)

a3 W. MONTANA, cespitosa humilis l. imosa, ramis abbreviatis villosis diffasis, foliis ciebus opposiliti alteimsque obovatis vel oblongo-lanreolatis i emote dentatis maiginatis basi ciliatis, (loribus sohtaiis teiminalibus subsessilibus, tubo calycis hispido obconico, lobis glabns lan< eolato-acuminalis maiginatis letuote subdeutatis longitudine tubi, coioll.i iiifundibulifoimi lobis calycinis duplo triplo longiore. If in sumrao month* capensis Kalbeig. alt. 5-6000 pet) (Dieg ! n Hj5.). Plauta hibitu' alpino , tena; adpressa , foliis lamos tgentibus 3-6 lin longis 1-2 lin latis glabus excepta basi Pili semper molles. Coiolla seaupollicaus a pice 5-loba. Genilaha coiolla dimidio breviora Ovanum 3-lo culare. Capsula.... (v. s. coinm. à cl. Dreg.)

29 ? W KREBSII (Cbam. in linn. 8. p ig5), caulis flliformibus subberbacels procnmbentibus ad oiiinem lamornm feitilium foliosis tetaigoms, angnis lelror^um luspidulis, folus confeitis patulis ugidiuh liugulatis vel oblongo obovatis obtusis vel aculis siiuato-dentatis lellexo-maiginatu, raiuis sursuin denudatis elongatis in pamculam laxam divisus, tubo calycis globoso , lobit nblongo-triangulaiibus obtusiusenlis maigine scabiidi!>f coiolla infundibuli fouui calyce tnplo longiore , capsala sphieioideâ.—in Caffariâ (ICiebs n 134) Folia opposiia? suhbipolheaua, 2 lin. lata , glabia \el pilosa, dentibus mucio nulatis rigidii. Pamcula 4-8-flora. Flos senupollicaiis Semina ovoidea nitida

*' * Herbacee ; joins sessilibus vel raniis in petiolum brevem angustatis, plerisque alcernis, tints interdum oppositis ; semimhxis Ictibus.

tt Flores sessdes *vel sitsessiles. Folia sparsa , nee basi condensata. — Habitue Microcodon et quasi hitjus generis rcducto nuinero loculorum.

Jo. W. INCONsrrcuv, pusilla glibra , caule recto teiti lamnlis basi aucto, folus spasis cicctis allermis, iufeionbus oppositis, linearibus denticulatis, flonbu* terminalibus latealibusque sessilibus, tubo calycib obconico, lobis liueaiibus denticulatis acutis tubo longiobus, coiolla tubulosâ lobis calycmis duplo triplo longioie, capsula tuibmila'. 1 ad Caput lioiue-Spei. (BuimJ). Radix bipollicaiis simplex. Canlis 2-pollicaris, pio planta ciassus, rigidus. [«oha 4*> lin. longa angustissima. tloies pauti, 3 lin longi. Valvae capsulaies 3, lobis caly- •iniif paulo breviores. (v. s)

31 W. ACAUT19 (E. Mey. in Dreg.' pi. cap. exs), ladice elongatâ simplici, fo- hib ramisque mini mis abbreviatis condensatis , folus imis petiolatis obovatis ob- tasis subdentaHspilosiascahs, aliis ses;>ilicas hneati-lanceolatis dentatis, (loribus sessilibus teiminalibus et latealibus, tubo calyris obovoideo piloso tereti, lobis lanceolatis acentis glabriusculis, coiolla infundibulifoimi lobis calycinis 4° longiore apice 5-lobâ. () ad Caput Bonae-Spei, in rupestribns aritbsque prope Zilverf jntlein, alt. 2000 ped. Radix 2-3-poIHcraiis, sed pars planta; aeu exposita 6-g hn tan turn longa. Folia exteriora 6 lin longa. Floies 3 lm. longi. Ovuum 3-loculare. (v. s comm. à cl. Dreg.)

/&. Peduncuh etpedicelli breves Folia sparsa, nee basi condensata.

3a. W. IIISPIDULA, (Alph DC. 1. c. p. i55), caule ramoso, raniis crassisbispidis divergentibus teretibus, pilis ligidis albis, folus lineari-lanccolatis acuminatis pilosiust nils rigulis subdenliculatis floibus snbssessilibns, (alycis tubo hispido ovoideo , lobis longissimis lobo dnplo triplo longioiibus folus simihbus acento deniknlDtJs marginatis pilosiusculis, coiolla tubuloso-infundibuliformu lobis calycinis subbrovioie apice 5-lobâ, capsula spaencâ. (f) ad Caput Bonae-Spei in collibus sabulosjs ocud. *Campanula hispidula* Thunb.' prodr p 38 , voy. 4 p. 35 J. t. 4. L_{am} i jj_a j_p sgs; Rocm.! et Scb syst. 5. p. i56. exel s^n Comm. t. 17. Caules i-3-polhc. (v b)

•53. W TMNKSIANA (Alph. DC 1 c. p. 15/), caule glabro basi simplici superuc paniculato, foliis lineaibus angnbtis remote denticulatis acuminatis, pedunculis ciectiusculis, tubo ralycis glabciimo sphamico, lobis linraribus angustus denticnlalis tubnm sub.equantibus basi ciassioubus, coiolla mfundibulifoini apice 5-lobA lobis calycinis duplo longioie. — ad Caput Bonae-Spci. *Camp-*

- mild paniculala Smith in h. Banks' noli ThunL Folia sparsa* angusta, eiicoidea. (v. in b. Banks.)
34. W. pANicurATA (Alpli DC. 1. c. p. i53), caule lamosissimo piloso , foliis linearibus pilosiascalis integiis vel subdenticulatis, pedunculis dichotomis di-xaiicalis, calycis pilosi tubo ovoideo angusto, lobis acuminatis integiis tubo subaequantibus, corollā infundibulifoimi apice 5-loba laciniis ralycinis duplo longiore, capsula ovoideā. (f) ° ad Caput Bonae-Spei. Campanula paniculata Linn.f. snpl p 1^9 Ihunb. piopr. p. 38, mem acad. petrop. zj t. 7. f. 4 11 or. cap ed Schult p 172. (v.s in h. Banks et Scbult turie.)
- i35. W MASSONII (Alph DC. 1 c. p. i53), pusilla, caale à basi ramoso piloso heibaceo ngido erecto, foliis lincanbus anguslis integiis ciectis inargine subrevoluti3, pedicellis folio sublongionbus, tubo calycis pilosi bemispbaenco paivo lobis capillaiibus brevioie , coiolla mfundibulifoimi angustā apice 5-loba lobis talycims duplo tnplve longiore, capsula spbaenca •— ad Caput Bonae-Spei (Masson'). (v. in li Banks.)
36. W RUDIS (t. Mey. in Dreg * pi. cap. exs.), pdosa, caule à basi lamoso, lamis erectis teretibus, folns sparsis lanceolato-acuminatis margine ciassis snbdenticulatisque, paniculā multiflorā dicboloiuā, pedicellibraced subaequilibus, calycis tubo tuibmato lobis linearibus rigidis mnlti bievioie, corollā infundibuliformi bajī angustā lobis calycinis tiiplo longioie glabi.^ apice 5-loba, capsula turbinatā. (f) " ad Caput Bonae-Spei, in arenosis occidentalibus Pl.mta 5 0-pollic. Folia 2-3 lin longa, semilineara lata. Vlores 3-4 lin longi. "Valvx capsularcs 3, acutse, iobis calycinis paolō brcvfoicb (v. s. conini , à cl. Dreg)
- J7 W. DUNAWIH (Alpb. DC. 1. c. p. i52), caule ramoso ligido basi sublignoso teiti pilosiusculo, folns spaisislinifafi-lanoeolatis augustisacuminatis integiis pilosis, paniculā laxā, pedunculis" ichotomis divaiicatis u'gidis, pedicellis folium aeqnabitibns, calycis pilosi tubo bemispluenco paivo, lobis longe subulatis tubo multoties longiobus , coiolla tubulosa apice 5-loba lobis calycinis sublongiore. (I) ^ ad Caput Bonae-Spei (Ecklon'). Wablenbeigia Dieg.pl. exs. tap. n 6295 b, non litt a quae W luabinata nob Caulis senipedalis. Habitus Liplnfootiac Cipsula ex spec Dregeano obovoideo-tuibinata, 3-locularis, valvis lobis calycinis triplo brevioubuu. (v s)
- j8. W. nr.osA, caule à basi wtmoso, lamis divegentibus siipeinè angulosis cum foliis pedicellis calycibusque pubescentibus, foliis spasis ovato-aculis lanceolatisve maigine ciassis subrevolutis remote subdenticulatis, pedicellis braitea oppositē brevioiibus, tnbo calycis bispido tuibinato laciniis lineaai-acunnna-115 breviore, corollā infundibulifoimi laciniis 4» longiore apke 5 loba, capsula hemispbaericā (I) ad Capnt Bonje-Spei in arenosis prope libeuc/ai legionis occid. inf Wablenbeigia Die^ ! pi exs. n 6298 Radix simplex elongata. Caules Tel ranii 2-5-polhc. Folia alterna, aequalite^ sparsa, 3-5 lin. longa , lineamllata 1^loies numeiosiseimpollcarps. Capsule teieliuscula, alvis 3 lobis calycinis tiiplo brcvionbns. (v s couim à cl Dreg.)
- *9. W. PHOSIRATA, radice elongala simplici, ramis à basi divergentibus simplJct bus prostratis cylindncis glabriusculis, foliis sparsi alteinis oppositisque h-ireaubns denticulatis pubeiubs, pauiculā paucifloia coaictatā, pedicellisbiac-teā sublongionbus, tubo calycis tuibinato bispido lobis ovato-atutis ciliatis tubo longiobus, coiolla infundibulifoimi campanulata lobis calycinis 6° Ion t>iore apice 5-loba , capsula bemispb^ericā (j) ? ad Caput Bonae-Spei in feccis Namaqua; paivse W ^ prostiata E Mey in Dieg.! pi. exs. cap Ranii 3-poll. ladice breviiores Folia Dequaliter sparsa, 2-3 lin longa, vixlmeam lala. Calyx « x. pilis albis brevibas quasi fimbriatus. Flores 5 lin longi. Valvae i capsulx lobis calycinis longioies. (v. s. coznm. à cl. Dreg)
- /O W. DEMTICULATA (Alpb. DC 1 c. p. i5a. t. X^1), caule ramosissimo glabro vel supernè scabriuscalo, foliis spalnis lineanbus augustis acumiatis glabns 1 emote dcentlnatis, pamenla mulliloia pedicellis folio vix longioiibus, calycis glabri vel scabriuscui lubo bemispfacnto, lobis dcenticulatis lmeanbns tubo longioiibus , corollā]>iofunde ^-iidā lobis calydnis sublongioie, capsula spb mal eāQjV ad Caput Bon^c Spci in igcione ocident (Buitb cat]>lafi

austr. n. 2000 el a3oa. Dieg.'). *Campanula denticulata* Burch.' travels vol 1 p 538 W. *corymbosa* E Mey. in Dreg.' catal pi. exs cap Wahlenbergia Dreg ' pi. exs n 6300 a non b. (v s.)

LJL. W RAMUROSA (E. Mey in Dieg I pi. exs cap.), canle recto ramoassimo, ramis teretibns basi puberulis supcine glabris extremis dichotomis , fob is sessilibus hnearibus paberaleis acatis, imis oppositis, medus saperioribusque alternis, pedicellis giacillimis bracteā oppositis, calycis glabii tubo turbinato snperne lato ad basin loboram 5-angulan, lobis linear-aciuininatis tubo longionbus, coiolla cyndraceā lobis calycmis 6° longiore, capsula sphaeroideā 5-gonā. (T) ad Caput Bonae-Spei, in arenosis mfei. octid Humilis, 3-4-pollicaris, tenuis, ramosiAsima , multiflora. I'olia mfeiiora caduca, patva, non approximate. Pedicelli S-j 1m longi Floics 3 lin. longi, calyce mimmo. Capsula valvis 3, lobis calycinis vlxbievioribns, dchiscens. (v. s. comm. à cl Dieg.)

4a. *W EXILIS* (Alpli. DC I c p. 151. t. X'VI), caule ramosissimo basi pilosuscuso, lamis glabris filifoimibus, folhs sparsis linea-acuniinatis integris subpilosis, pedicellis filiformibus folio oppositis, tobo calycis glabri vel seabriusruli obconico, lobis lifeari-acatis eieclis set A brevi teimiuitas tubo bievoribus, corollā tubulosā apice 5 lobā lobis calycims vix dimidio longioie, capsula obovoideā angustj. (T) ad Caput Bonae-Spei, in parte infer occid. (Butch.! cat pi. afr. austr. n. io5 Ecklou ' Dreg.¹). *W. claviculata* E. Mey. in Dreg ' pi. cap. exs Planta gracilis, erecta, a-^-pol^c Pedicelli numerosi 4 lin. longi. (v. s.)

43. *W. INGRATA* , radice elongate, caule ramoso ramisque adscendentibns glabtis laevibus, fob is sessilibus linearibns inaigmc snbtus revolutis denticlnnti&subtus pilosiuscuhs, pedicellis terminalibus et axillanbus bracteā subxquahbus glabiis, calycis tubo piloso lobis lanceolatis acutis glabriusculis brevioie , corollā tubulosā lobis calycinis 5° longitfre, captful't hemisphaericA subtercti — ad Caput Bonac-Spei, in arenosis secusflumen Garip. *W. divancata* b. F. Mey. in Dreg 1 pi. exs non litt. a Radix semipedahs, fere simplex, cauls ramosve 3-4 poll longos emittens. Folia (in specim nostro truncato) alterna sea opposit a , basi decidua 3-6 lin longa. Valvae capsulares lobos calycis aeinqantes. (v. s. comm. à cl Dreg)

44. *W. CAFFIA*, caulinbus erectis basi siraplicibns pilosiascnlis, snpernè subramosis glabris, foliis spasis alternis oppositis ternisve crcbiis linean-aruminatis sorrlulatis glabris , pamcolā pauciflorācoarctatā pedicellis bracteam subaequantibus, tubo calycis glabri obovoideo tereti, lobis linean-arummatis apice palulis maigino reflex is tubo longionbus, corolla 5-fidā tubulosā lobis talycinis dimidio longiore, capsula hemisphaeuca 10-neiviā. (f) ad Caput Bonae-Spei, in teirā Caffroium Lightfootia Dreg.' pi. exs. cap. n. 6307 Radix elongata simplex. Caules 3-4 , foliosi, semipedales. Folia i-4-lin lqnga,h-neam lata. Flores paivi Capsula 3-loculans, valvis acutis launns calycinis panlō brevionbus. (v stcomm. à cl. Dreg.)

45 *W DIVARICATA* (E Mey. in Dreg.¹ pi. cap. exs. litt. a. nonM , canle humili ramosissimo lamisque divergentibns puberulis, foliis sessilibus Jinean-aoinninatis puberulis subintegns , imis oppositis, raediis supeuoibasque alteinis, pedicellis giacillimis bracteā oppositis , calyce pilosuscuso, tubo ovoideolaciniissubulatisraulto bieviore,corollā cylindiacē Iacinuscalycinis6° longtoie, ctpsulā hemisphderica teiti. (l)ad Caput Bonae-Spei, maienosis prope Ebeneza* Habitus W. exibs, sed capsula latior, corolla multo longior Radix longa. Valvae capsulares 1 acini is calycmis dimidio breviores. (v. s. comm. a cl. Dreg.)

46. *W EMIRKKWSIS* , caulinbus diffusis bumilibus pilosis, foliis alternis oblongis obtnsis sinuatis pilosusculis, floibus folio oppositis brevissime pedicellatis, calyce glabro, tubo obconico , lobis lanceolatis eieclis tubo longionbus, corollā mfundibnliformi lobis calyctnis ix longiore, capsula ovoidea. (J) iu piovincia Emirna ins. Madagascar, secus upas muloium *Campanula lipaiia* Boj.! mss. uon Le Pr. et Perr. Cauls plures , a 4 poll longi. Folia sparsa , a-3 lin longa (v. s. comm. * cl. Bojei)

y. *Peduncuh et pedicelh elongati. Folia basi approximate.*

- 47* W. GRACILIS (Alph DC 1 c. p. i4?. non E Mey), caule simplici Tel ramo&o glabro vel piloso erecto gracili, foliis alternis mine snboppositis linea-lanceolatis sinuato-dentatis glabiis, pedicellis terminalibus et axillaribus elongatis nadis glabns, calyce glabriu&culo tubo ovoideo lobos erectos aenminatos xquante, corollâ infundibuliformi patente 5-fida lobis calycinis dimidio longiore, capsulâ obovoideâ. (*T^ If*, in NovA-Hollandiâ ubique, Yan Diemen, Novâ-Caledoniâ (h. Banks !) et Novâ-Zeelandiâ (Lesson ' Dm v. '). Campanula gracilis Forst, piopr. n 84. Sims bot mag. t. 691.Br piodi. i. p 56i. non Bert. (ampanula vincaeflora 'Vent. jard. Malm. t. 12 Campanula capillaris Lodd. bot. cab. t. 1406 Plauta polymoipha, corollâ majore cyaneâ fundo dblido vel lutescente, capsulâ Mibtereti (v. v. c.)
- S. *stricta*, oaule lamoso stricto, foliisplunbus oppnsitis lin^pfi^ciceoiatis_f calycis launiis lineaibus tabum corolla: extus dihcolons pa^hm^sapeian-tibus.— Campanula giacihs Sm exot fl. bot. t. 45. Camp, giacilis § stricta Bi. I.c (v. s)
- y *Utrorahs*, canle simplici clongato, foliâ paucis aitnnis lincaiiibns angnis-tis, lobis calycims acuimnatis longitadine tiibi coiolla; Campanula litlo-ralis LabillJ nov. boll. 1 p. 49 t 70 Camp gracilis vai. Bi.l. c W. giacihs Alph DC. 1 c Benth. en. pi. auslr. occjd. nov. boll. Hugel. p. 75. (v. a.)
- / *capillaris*, caule capillari paniculato, foliis linearibus remotis, calycis Iacinub capsulâ subglobosâ dimidio brewoiibus. Campanula gracilib vai. Br.l. c.
- f *polymorpha* (Alph. DC. 1 c), foliis loferioribus obovatb obtusis, mediit lanceolalis, sup. Hnean-lanceolatis, calycis lacinns lalinsculis corollâ di-midio bievionbus.— in Novâ-Zeelandiâ. Campanula polymorpha diffusa Soland ' in b. Banks, (v. s)
43. W. MARGINATA (Alph DC. 1. c. p. 143), c.nile ramoso glabio, foliis alternis vel suboppositib lanceolalis et hnean-lanceolatis nndulato subset ratis margine pilosis albisque, pedicelhs elongatis, tubo calycis glabu obovoideo lobis a<nUs longiludiiie aequali, corolla infndibulifouii lobis calycinis vix dimidio longiore, capsulâ obovoide.u *If* m Japomâ. Campanula niaiginata 'lhunb. fl jap. p. 89, plant, jap. dec. 3. c. ic. Campanula giacilis vai. Spreng pog n. 28.
- 49 W. IAVANDUL^EFOLIA (Alph. DC. 1. c p. i4fl)» ^{Cdnle} filifoimi angulato striato, ramis i-3-ilons, foliis sessilibus linearibus obtusis obsolete lemotc serratis floribus-5-lidis, coiollâ ovaiium pauiin sperante.— in roontibua orient Javae. Campanula lajandulaefolia Blum, bijdi. tot ilor. need.ind. p. 726. Forsan à Wahlenb. giacih nou distincta ex Bluai. 1 c
50. W. QUADRIFIHA (Alpb DC 1. c p i44), raule illiformi nnguiato striato^ foliisque linearibus pilosiusculs, -floribus 4-fidis, corollâ ovanum vix supe-lante, stigmatibns 3. — circâ Poit Jackson. Campanula qnadvHda Br piod. nov. holl. p. 56i. Addit cl auctor : Campanulas (Wahlenb) gracili nimis aHiniset foi&an \aiietas veioalis.
- fi W. sAxiroTA(Alph DC 1 c p 144), glabra, caule abbieviato, foliis con-ferlslauceolatis subdentalis, peduncnlis i-flois scapiformibus, floubu;»4-fidis, capsulis subglobosiM — in insulâ 'Van Dicmen Campanula saxicola Br prodr fl nov. holl. p. 56i Pia?cedenti propinqnn at distincta videtur (Bi. 1. c.)
52. W. MUtiCABiRs (Benth. enum. pi. nov. holl. austr. occid Hugel p. 75), glabra f catilibus basi ramosissimis decumbentibus, ramis gracilibus adscenden-libus, foliis alternis ang&te lineaibus integratimis, pednnculis i-flois sub-terminalibus elongatis, calycis laciniis linea lanceolatis coiolla piofunde 5-fida tuplo brevionbus, capsulâ longe obconica — prope Swan-nvci Nova; Hollandiae Raini tenues pedales ligidinsculi nnmeiosissimi. Folia pleraque pollicem longa angustissima, sup. minoia remota Pedunculi 2-4-pollicaires. Cbrolla campannlata (vel snbrotata?) cipauid 4 lin. longa.
- ^A3. W. SIEBERI (Alph DC 1. c. p. i44), caule mnioso eiclo basi dens&hispido, foliis alternis subdenticulatis actifis, infeiioiibub lautcolato-obovatib pilosis.

- snpeiioribus linea*ii*-lanceolatis glabnascalis pedunculis dichotomis bracteis hrevissimis, calyce glabio, tubo ovoideo lobis linearibus angustis eiectis breviore, corolla tubulosa^a lob 13 calycinis fere tiiplo majore, capsula obovoideâ. (T)in Novâ Hollands (Sieb.! n. 677). *I'olia margin'e alba cartilaginea*. (v. s.)
- £4. W. DEHISCENS (Alph. DC. 1. c. p. 145), canle erecto ramoso vel simplici basi pilosiusculo, fob is alteims snbpilosis, infeiioribuslanceolato-obovatisobtnsiusculis undulato-dentatis, pedunculis dichotomis, biacteis brevissimis, calyce glabro, tubo obovoideo lobis erectis linearibus angustissinns longioie, corolla infundibulifoimi lobis calycinis longiore, capsula obovoidea: (j) in Bengali à et NepaliA. *Campanula dehiscens* Koxb.! hort. beng. 85. fl. md. 2. p. 96. Wall.! asiat. lea 12 p. 571 c. ic list. n. 1294. *Corolla alba*. (v. s.)
55. W AGR:[»]SIIS (Alpb. DC. 1 c. p. 14\$), caule ereeto à basi ramoso inferne piloso, foliis basi appioxiuati linearibus augnslis subintegns maigine undulatis, pednnncnlis saepiùs dichotomis bracteis brevissimi?, tubo calycis glabi i obovofrieo lobis erectis linearibus angust&simis longiore, corolla mfundibuh-formi lobis calycinis dimidio longiore, capsula obovoidéa. (l)in Nepaliâ. *Campanula agrestis* Wall! in Koxb. fl. md. 9 p 97, beib. n. 1292. Folia piloiiuscula, margme alba, subrevoluta. Yix à W. dehiscente diffeit. Caalis tamen à basi magis ramosus folia angustiora minus denticlnata etflos caeileus. (v. s. couim. ab ainpl. coet. mere. ind. or)
56. W. INDICA. (Alph DC. 1. c. p. 146), canle ramoso informe foliisque pilosiusculis, foil is linearibus integris acuminatis, peduncnlis 1-lions glabus, calycis gldbii tubo ovoideo lobis acutis angustis, corolla tubulosâ lobis calycinis dimidio longioie, capsull obconicâ. — in montibns India? dictis Nilghni (Lesclien!). (v. in mus. Pai)
57. W. PEiiOTiFOLii. (Wight et Am. prodi. fl. penins. ind. 1. p. 405), caale ereeto ilexuoso pilouo anguloso supiâ raiuoso, fohis alleruis sessilibus lanceolatis acuniuatis bail attcnualis glabenimis margue undulato-crispis denticulis 1-2, pediicuhs teirainahbus pubescntibus nudis, tubo calycis piloso lobis linearibus acuminatis glaberrirais breviore, capsula globosâ. (t)in India 01 Dcntella ercta Roth nov. plant, sp p. 140 Cham, et Schlochf. in linn. 4. p. 150 *Dentella peiotifolia* Willd h n. ^111. Canlis semipedalis etlongior, 1 amis dicholomis, folus ad leutem tenuissime cihatis unciahbus et semiunciahbus. Capsula 3-loculaiis.
58. W. CAPILLACKA (Alph. DC. 1. c. p. 156), caulis simplicibas erectis bisi pnberulis superuè glabus, foltis fihfoimi-lineaiibus integris maigine revolutis pedunculis dichotomis, pedicellis bracteâ duplo longioribns, calycis glabii tubo obovoideo vel heoiisphactico, lobis linea*ii*-acuminatis margine subrevo-lutis tubo longiobus, coiollâ infundibuhformi laciniis ralyemis triplo longioie apice ^-lobâ, capsula hemisphxncâ. — ad Caput Bonse-Spei, in paitc occid. (Tbonb) in giaminosis anstialibus et oriental. (Dreg.) *Campanula capillacea* Thuiib. prodr. p. 56, mem. acad. petrop. 4. p. 366. t. 5. f. 4. fl. cap. ed Sch. p. 170 excl. syn. Lightf. subulata. *W. capillacea* E. Mey. m Dreg.! pi. cap. ezs. Rami vel caules e 1 ail ice suigentes pedales graciles, foliis infeinè frequentioribus (in specim. h. Dreg, crebermnis). Capsula 3-localaris. (v. s. corn in. à cl. Drcge.)
- ^9 W RRASILIENSIS (Cham, inlinn. i833. p. 3i8), glabia, lamis subradicalibus St^{tt}phcibus angulntis, foliis erectis parvis strictis linea*ii*-acuminatis concavis [»]pice callosis, paniculâ pauciflorâ subcoarclatâ, pedunculis dichotomis, tubo calycis obconico laciniis foliis bimilibus bievioie, coiollâ 5-fidâ infundibuli-formi-tubulosa laciniis calycinis vix dimidio longioie, capsula obcouica. If. in Brasiliâ tropicA (Sellow), in campis elevatis prov. Santi-Pauli (Lund ! n. 763 sub nom. Lobehae). Habitns et patria W. linauoidis, sed semina ovoideo-iub-compressa (nee lenticularia), pallide biunnea, capsula bievier saepius 3-locu-lans, quando tamen a-loculans. Flores i lin. longi. (l. s. comm. à cl. Lund.)
- Co. W. HUMiris, basi pilosa sapernè glabia, canle eiecto simplici vel larooso foliis ad basin appioximatis hneari-lanceolatis 1 emote siibdentalatilis undulatis maigine albidis, suprioribus subulatis, pedunculis dichotomis, calycis glabu tubo ovoideo angasto lobis hucaibus cicclis &ublougioie, corolla

lobis calycinis dimidio longiore, capsula obovoideâ. (j) in oryzetis Casawancx in Sengambiâ. An à W. riparia diversa? Caulis solum 3-pollic. (v. s. comm. à cl. Lepr. et Perrott.)

61. W. RIPARIA (Alph. DC. I. c. p. 146), caule erecto simplici vel ramoso infernè folioso piloso, supernè nudo glabro, foliis subpilosis margine albis undulato-dentatis, inferioribus obovato-lanceolatis aculis, inediis angustioribus acuminateis glabris pedunculis dichotomis, calycis glabri tubo ovoideo angusto lobos lineares erectos interne revolutos aequante, corollâ lobis calycinis dimidio longiore, capsula obovoideâ. (jj) in Senegambiae regionibus dictis Podor et Wallo. Campanula riparia Leprieur et Perrott! bcrb. Caulis pedalis et ultra. (v. s. comID. à cl. Lepr. et Percott.)

tta. W. BOJERI, canle erecto simplici, infernè folioso piloso, supernè nudo glabro, foliis glabriusculis, inferioribus obovatis subintegris, inediis oblongis vel linearibus acutè reuiotèque dentatis, pedunculis dichotomis paucilloris, calycis **glabri tubo angusto obovoideo lobos lineares erectos interne revolutos aequante, corollâ infundibuliformi ferè 5-sidâ lobis calycinis 4° longiore, capsula longè obconicâ.** (I) in montibus, locis herbosis, provinciae Emirna Madagascar. Valde affinis praecedenti, sed corolla major lilacina. Folia vix margine revoluta. (v. s. comm. à cl. Ilojer.)

63. W. NUTAUUNDA (Alpb. DC. I. c. p. 15c), basi pilosa, supernè glabra, caule erecto simplici vel ramis ssepium dicotomis, foliis basi approximatis, imis lanceolato-obovatis subintegris margine nervisqne pilosis, inediis lanceolatis acnis irregulariter dentatis glabriusculis, bracteis linearibus, pedunculis dichotomis paucifloris, tubo calycis ovoideo lobos linearl-acuminatos xquante, corollâ cylindracea apice 5-loba lobis calycinis vix dimidio longiore, capsula obovoideâ. Clia Calabriâ et Sardinia.—Bertol. II. it. 2. p. 5^4. Campanula nntabunda Guss! in Ten. append. 5 ad fl. nap. prodr. p. 3. plant, rar. p. 94 t. 18. Moris! st. sard, elcuch. p. 30. Campanula lobelioides ex. Calabriâ et Sardinia Spreng. syst. 4. p. 2. p. 340 non Linn. (v. s.)

64P W. DENUDATA (Alph. DC. I. c p. 1^7), glaberrima, ramis adscendentibus gracilibus paueilioris, foliis linear-lanceolatis margine albidis undulatis subintegris, pedunculis elongatis nndiusculis, calycis tubo obconico elongato, lobis lincari-acurainatis iutegratis glabris longitudine tubi, capsula longe pyriformi. (I)? ad Cap. Bonce-Spc (Uurch! catal. pi. afr. auslr. n. 2^60). Ilaraos pedalis infernè foliosus. Flos nnir.us terminalis, cum alabastro axillari. Lobi calycini 2 lin. longi. Corolla.... An folia ima opposita? (v. s. comm. à cl. Bnch.)

65. W. CEINU* (Alph. DC. I. c. p. 148 non E. Mey.), à basi ramosa, infernè pilosa, supernè glabra, ramis erectis gracilibus, foliis argutè deniatis glabriusculis pilosive, inferioribus oppositis obovatis ovatisve obtusis, inediis alternis ovato-lanceolatis lanceolatisque acutis, biactcis minimis linearibus, pedunculis dichotomis, calycis glabri tubo ovoideo lobos roargine revolutos serrulato-ciliatos aequante. Corollâ infuudibuliformii sub-5-sidâ lobis calycinis triplo longiore, capsula obovoideâ. (jjad Cap. Bonae-Spc in parte infer, occid. et in monte Wynberg. Campanula annua glabra, etc. Comm. bort. 2 t. 36? Campanula cernua Thunb. prodr. p. 39, mem acad. petrop. 4. p. 374. t. 7. f. 1. Sieb. pi. cap. n. 243- W. gracilis E. Mey. in plant Dreg! non Alph. DC. Wahlenb. n. 6^83. Dreg! pi. cap. (v. s.)

66. W. UNDULATA (Alph. DC. I. c. p. 14⁸); caule adscendente basi simplici piloso, supernè nudo ramoso glabro, foliis subamplexicaulibus alternis oppositisque ovatis vel ovato-lanceolatis serrulatis, variè glabro, tubo obconico lobis acuminatis basi latis serrato-ciliatis longitudine aequali, corollâ infundibuliformi lobis calycinis triplo longiore 5-sidâ, capsula obconicâ. (I) ad Cap. Bonae-Spc in Swartland. Campanula undulata Linn. f. suppl. p. 142. Thunb! prodr. p. 39, fl. cap. ed. Schult. p. 173. Campanula glabrata herb. Banks! Folia 1-1¹₂ poll. longa. Differ à W. cernua solum tubo calycis striato, lobis basi latioribus planis, in aestivatione imbricatis. Dreg. n. 6280 b. non a. Conf. ad W. Chàmissoniaiam. (v. s.)

67. W. NUDICAUIS (Alpb DC 1 c p. 149), canibus ereclis ramosis infeinc pilosis, supeme glabus nudiusculis, folns hisi approximatis obovatis vel lanceolatis undnlalo-cienatis pilosinsculis margue albidis, pedunculis dichotoinis, calycis glabri tubo siibspha»iico, lobis subulalis snbiuaeinqabbus integns longiudine tubi, cotolla late infundibubformi 5-fidâ spbaeroidêa.—ad Cap Bon.e-Spei (Masson! ia h. Banks) nbi Campanula diffusa vocatur. (v. s.)
O /lore tnajore (Alpb DC. ibid.), Campannla elongata herb. Banks' (v. s.)
68. W. ARKNARIA, à basi raraosa, lamis eiectis denudatis glabris superne dichotoris, foliis basi approximatis lanceolatis undulato dentatis glabris pilosisve, biacteis mimmis acuimnatis integris, calyce glabro, tubo obovoideo lobos ovafo-acutos subaequante, corolla mfandibuliformi 5 fid à lobis calycinis tnplo longiore, capsula obovoidea (I; in Capite Bonac-Spei ad lipas aicnosas fluvii orieiilisBascbeet intei Kuga et Zondagrivie (Dreg ' pi cap. n 4002) Planta pedabs et ulnâ, radice perpendiculari, pedunculis multiflons, flonbus parvis. (v b coinni a cl Dieg.)
69. W. "VERREALIXII, inferne pilosiuaculn, supernè gl ibra , caule eiecto, basi folioso subsimplin, raedio nudo simplici, paniculâ dicbotomâ , foliis basi condensatis obovatis vel oblongo-lanceolntis in petiolum niargmatum angustatis iriegul.il itcr u emnlatis, bracteis linear-acuminatis minimis tubo calycis ovoideo lobos Imearrs erector xquante, corolla infundibuliformi 5-iidâ lobis calycinis sublougiore f oapsul. ellpsoidat (J) ad Cap Bonac-Spei ('Vcneaiix in h Motic'). Radix simplex. Caulis pedalis Folia omnia feie ladiralia, 1-2 poll, longa, subintegra, crenata vel denticulata Yalde aefinis W arenanae, A qnâ foiftan nondiveisa : lobi calycin longiores tanaen, angustioies, corolla minor. v. s. coin in a cl Moricand)
70. W. VARIAuis (E Mey. in pi. exs Dreg 1 excl. var. pumila), canle erecto à basi r.imoso, inferne piloso, snperue peduncnlis floribnsqe glabris, foliis lanceolatis o\ilo-lanceolatisve marginals dentatis pilosiusculis, pedunculis dicbotomis simplicibusve bracteis lanceolatis uudulato-dentalis acutis, tubo calycis hemisphe-rico lobis lanceolatis subintegiis eiectis dimidio bievioic, corollâ Infundibuliforini lobis calycinis duplo longioie, capsula globosâ. (f) ad Caput Bonas-Spei orient, et octid. in nionte Katberg Planta subpedalis, multifloia. — (Dreg.¹ pi exs. cap. n. 6287.)
& *Krebsiana*, foliis oblongo-lanccolatis giosse acnteque dentatis supernè glabus subtus pilosiusculis. Ad Caput Bonae-Spei (Kiebs¹), in paite inlei orient (Dreg '). (v. s.)
- ^i. W. CIIOLATA, caule erecto à basi ramoso infernè pilosinsculo folioso, superne glabro denudato, foliis linceolatis dentatis su bin a rgin.it *s pilosis, biacteis linear acuuunatis basi subcihatis, pedunculis simplicibus dubotomisve gracibus, tnbo c ilycis obovoideo, lobis lanceolato-acuminatis basi seirulato-cihatis eiectis longitudme tubi, corolla infundibubformi lobis calycinis duplo longioie, capsula pyriformi (Jj ad (>aput Bome-Spei Dicg ' n 6382 et 6286. W. vanabilis var. pumila E. Mey in Dreg ' pi cap. exs. specimen ex Paarlb erg Differt à W vanibili tubo calycis uon hemisphaenco, lobis calycinis non margine incrassaiis brevioribus angustiorittus sub lente ciliolatis ^v. s. comm. à cl Dreg)
- "p* W PA TULA, ramosissima diffusa supernè glabra , raniis dnancatissobdivisis infcriouibus pilosis, foliis petiolalis ovato-acutis membianaceis glabris a 1 gate dentatis, snprioribus lanceolatis , biacteis nnlhs vel lineanbus angustissimis , tubo calyce baennspbaerico lobis aruminatis lineanbus cieclis dunidio bieviore, corolla infundibaljfoimi sub-5-fida lobis calycinis duplo majore , capsula ovoideâ (J) ^A Capnt Bonac-Spei in lupestibus pi opé fluvium Garip Wahlenbergia Dieg. ¹ pi cap. exs n. J077 Planta pedalis Campannlam patulani quodam modo refeiens. Folia ima opposita, pleraque alterna 1 1 I poll, longa cum petiolo 3 lin. longo , dentibus subulatis paucis. Coiolla caciulca. Seinina ovoidea subtompresca nitida. (v. s.)
- 7i. W. srH>norARPA, à basi laniosa, ramis eiectis s>implicibus vel dicbotoiuis

basi pilosis super 11 e glabris, foliis basi appioximatis oblongis lanceolatisqnc nndulatis pilosiuscults, bracteis bievissinns lmeanbus ciliatis, calyte glabio, tabo heroisphaeiico lobis erectis ovato-acuminalis longitudine a?quah , coiollâ lobis calycims diroidio longioie, capsulâ lotumlatâ (j) ad Caput Ronae-Spei in legione alta occid inter Brackriviei et Uitvuglit. (Dieg.' n 9136 a) Planta humilis, 2-4 poll alta Radix simplex, caules vel tamos giacilcs ciuittens Pih abbreviati albi \esiculifoimes. Folia <3-i5 lin longa. Moies minimi ut capsula lineain longi. (v s.)

[^]4. W. SEMIGIABRA, à basi ramosa, ramis erectis simplicibns vel dicbotomis basi pilosis superne glabris, foliis basi appioximatis oblongo vel linea lanceolatis undalatis pilosis, bracteis brevissimis liueaiibus glabiisculis, calyce glabro, tubo obconico lobis erectis ovato-acuminatis longitudine a'quali, coiollâ lobis calycims dimidio longioie capsulâ obovoided (I) ad Caput Bonne Spei, in re-gione alia occid mtei Bracknviei et Uitvugbt. (Dreg.¹ n. 913b, b). Specimen mancum, W. capensis nuncnpalum (enore forsani?) in plant Dug. ex planicie prope Klipbtig, bic referto Planta W spbaeroaca pac valde affinis, sed uiajoi, pedalia, pilis mollibus longionbns et forma capsula* chvrt>a (v &)

7\$ W riCHOTOMA, a' basi i<unosa, ram Is erectis dicbotonus glabiis nndinsco-Iis, foliis basi con fe it is oblongo linearve lanceolatis pilosis deuliculatib, bracteis minimis dentiforraibus glabiis, pedunculis dicbotomis, tubo calycis obco-niro lacimas erectas lineares a*quante, coiollâ tubulosâ laciuns calycims 4° loDgiore, capsulâ obcomcl (I) ad Caput Bonai-Spei in collibus asperis propè Ebenezai, regionis infer occid (DiegJ n 6285.). Radix simplex, giatili*, Caa-les seu rami 3-4 pollic Tolla 5-6 1m. loDga. Moies numeiu paivi, vix 3 lin. long! (v. s com in A cl Dreg)

7*a*. W ANDROSALEA (Alph. DC 1. c. p. i5o. t. 19. f 1), caule simplici nudo pancifloro glabro, foliis basi confetti* losulatis ovato-lanceolalis bieutei petiolatii* aculis denticulatis pilosis, pedunculis dicbotonus, biactcolis glabus, calycli glabu tubo bemisphaericu, lobis tnangulaiibns Integrib tubo s>ubbievio-nbns, corolla late mfnndibulifoimi profuude 5-fida lobis caUtims dnpllo tii-plove lougiore, capsula spbaeiouh a (I) ad Caput Bonac-Spei (Burcb ' cat pi. afr. n ^273.) Radix simplex Cauhs 5-pollic. electns. Stigmata ^, basi glau-duhs cincta (v. s comui. a cl. Rurch.)

77. W PAHVILORA , basi pilosa, superne glabra, caule erecto teieti basi simplici, foliis basi condeusatis lanceolato-lmeaiibus erectis subintegiuh pubescentibus , bracteis lmeanbus glabiis, pedunculisdicbotomis pautiflous, tubo calycis obo voidco lobis linealibus sublongioie, coiollâ pro(unde 5-fidâ lobis calycims tn-pllo longiore, capsnlâ obconicâ lo-nerviâ Qj ad Caput Bouaj-Spei in aienosis pi ope Rergnviei, legionis mf occid (Dieg ' n 6290) Radix tinuis. (aulis pe-dahs feie denudatus «tiictns giacilisque. Pili pateutes bicves mollei. Horea parvi vix 5 lin longi Stigmata 3, basi annulo cincta Capsula 5 loculaiis, valvis obtusis lobis calycims subbrevoi ibus (v s comm à cl. Dug)

78 W. ANNUIARIS, canlibns erectis basi pubescentibus, supcine glabns, folns basi confertis hmean-lanceolatis denticulatis pube¢ibus, hi.ictcis linearibus glabris, pedunrulis dicbotomis , lubo talyus liHbiuato IOLIS ovato acutis subbieMote, corollâ late infundibulifoimi piofunde S-hdâ lobis sextnpllo lon-gioie, capsnlâ globosâ (l ? <<d Caput Bonac-Spei, piope Bcigalei, m parte infer occid (Dreg' n 6a88) Radix simpler, caules ptdalts teiftes feie nu-doseimttens Pih niolles non longi Hons patentes 8-10 lin lali albP Stigmata 3, demum patentia, doiso pilosa basi annulo tumido u'ncta Valva cap-salares obtusae lobis calycims subsequales. (v. s comm. à cl Dieg)

79. W. PAUCIFIORA, caule leclo glabro teioti nudo simplici pedunculis apice paucis dicbotomis, folns basi confertis linear-Kmceolatis runulatis pilosis bracteis linearibus gLibnnsculis, pedunculis pauciflois, tubo calytis glabri obvoideo angusto, lobis lmeanbus erectis margine subre\olutis acuminatis tubojongioiibus, corolla infundibulifoimi 5-fida lobis calyciuis dimidio lon-g^'ic, capsula elongata obvoideâ.Q ad Caput Bonx-Spei pi ope Krakee, ^raul,alt 3Soo p. in regione ottid (Dieg' pi exs. 11 6:189) Radix Hums ,

perpcudiculans. Caulis pedalis Folia || poll, longa, 2 lin lata, pilis albis bieibus patentibus T lores 6-9 lin. longi Sligmatj j, annulo basi tumido cincta. (% s. coram. à cl Dieg)

**** *Stiffrutescentes, folds sessibus alternis <vel suboppositis non basi approximate. Nesophilcc sect. parthn Alph. DC. mon. camp.*

50. W 1<FRNANDEZIANA. (Alpb. DC. I. c p 160), glabra, caule sublignoso cresto nnguloso basi simplici superne paniuilito, pcduncuhs dichotomis, folis crebris alternis vel suboppositis lanceolatis snbatntisserratis conaceis, biacteis ovato-acutis lanceolatisque pedicello naultoties bievioibas, tubo calycis obconico, lobis subserralis triangulari-acuminatis tubum aequantibus, corollà late infundibaliformi seini-5-fida lobis calycinis triplo longioie , capsulâ obtonicâ. If. fi in insulâ Juan Fernandez. — Hook' journ bot 1. p. 279 Campanula Lanaiuii Beiteio'mss W Larrainii Colla pi. chil.m act taur. 38 p 118. t 35. Capsula 3-locularis nee bi-loculaus ut crrore dixi in monogr. Camp, (v. s.)

51. W. BFRTEROI (Hook et Am. journ. bot t. 279. t 137), caule sublignoso erecto ibique folioso hirsuto anguloso, foliis ciebis irrculariter alternis h-ncan-oblongis coi iaccis supi à glabris¹ iiuppresso punctatis, subtus biisutis margme revoluto remote denticulato, pedunculis apice appioximatis subcoryrobosis i-flou's, bracteis ovatis subacutis, tubo calycis bemispbaenco lobis inlegeiri-llls ovatis obtusis subbrevioic, corollà late Infundibuliformi serai 5-fldâ, capsulâ semi-snperâ basi hemisphaenca. If fi in montibus isnlse Juan Fernandez (Bcrtero!) Campanula gracis Bert, lieib camp gracilis var Colla pi. chil in act. taur 38. p nq. mmime Forst. Habitus W Feinandc7ianae sed evidentei diversa. Pednnculi folio vix longiores. Capsula 3-locularis valvis acutis. (v. s.)

§ . 3 . *Capsula i-lotulans.*

* *Suffrutescentes — Wahlcnberglc sect. Nesophilcc parthn Alph DC mon. camp.*

82 W. LINIFOHA (Alpb. DC. 1. c. p. 16a), caule lignoso erecto valde folioso folns lincaiiibus acutis sen at is glabiis vel fleno ccntrali pilosis, pcduncnlis ler-niinahbns nndiusculis gljbn's subdicbotomis, pedicllis folio dimidio bieviou- bus bracteis ovato-lanceolatis multo longionbus, tubo calycis glabii obconico, lobis ovato-acurainatis tubo longionbus subseriatis, corollâ cylindiacæ seini-5-fida lobis calycinis dimidio longiore, capsnlâ tuibmatâ ^ i° Saiictâ-HelcnA (h. Banks' Lindl ' Kunth ') et in ins. Ascensioms (herb. Meiat') Roella hm-folia Roxb f in Beats tracts lelat. to Sanct.-Hel. p 3ai. W foliosa Alph DC p 160. t. 14. Campanula clivosa h Roxb.¹ non h. Banks. Folia pollicemlonga, 2-2 I lin lata. Caules glabii vel pilosiuscuh. Lobi calycis basi iiubiicati. (v. s. spec Ro\|b. ann 1839)

83 W ROXBURGH rr (Alph DC 1. r. p 162), frulescens, ramulis paucis eiectis pilosis, foljis sparsis sessibus oblongo-lanceoljtis basi angustatisserrulatis sub-pi I osis, pamcnla terminali pilosa eiecta, bracteis linceolatis acutis, calyce glabio, tubo longe obconico, lobis ovato-lanccolatis atuliuscnlis tubo biezionbus integns, corollâ sub-5-fida ba'i angustata lobis calyciois 4° lougiore, capsulâ Hongato-obconicâ. A in insulâ Sanctac-Helenae, in sylvis densis ad meridiem ^"ntium Diana?, HaTley, etc Roella paniculata Roxb.' list of plant. Sauct.-HIen in Beatson tracts relat. to Sanct-Helen, p 320. Floies albi l*olia basi sulxategra longt obcomca. (v. in h Roxb. et Buich. ann. 1839.)

84^ W BuRrHEiLii, frutescens, ramulis paucis eieclis pilosis, foliis spaisis sessibus oblongo-hneanbus acute senatis subpilosis, pamculâ terminali eiectâ elong.itâ , bracteis bnceolatis acutis, calyce glabio , tubo obconico, lobis triangulari-aumnatisseuatis tubum aequantibus, corollâ 5-fida basi angaslatâ lobis calynnisi J° longiore, capsulâ tuibmatâ f in ins. Sanctae-Helenaj, in nionte Halley Habitus oiuninô praceous, pannla tamen longior, folia angus-tiora immorâ usque ad basin senata ibique vix angustata. (v in h. Burch.)

85. W. ANGUSTIVOHA (Alph DC 1 c p 1G2), glabra, cauhbus snbhcidaceis prottimbenlibns ad onginem pcduncnloruui ioliosis, foliis Imeaii-lanceoldtis

buhseuatis, pedunruliH p.uit If Ion's nudiusrulis elongatis, biacteis linejrihus minimis, calycis tubo obconico elongato, lobis acuminatis maigme revolutis tubum sequantibus, corolla campanulata lobis calycinis triplo longiore apice 5-loba, capsula obconica 2/4 in insula Sancta-Helenae. Campanula clivosa herb. Banks' non h. Roxb. W clivosa Alph. DC 1. c. p. 161 Roella angustifolia Roxb' list of plants Sanct.-Helen. in Beats, p. 320 Caules e rupibus pendentes, nudi per spatium b-8-polheare. Loba pollicem longa, 2-3 lin. lata. Pedunculi 4-polliciales. Ex iconc opt ined. cl Burchell floresalbi, staminum filament a basi angusta supeine latioia pilosa (v. s.)

** *Iherbaccce.*

86. W. CHAMISSONIANA (G.Dongen. sjst. gaid 3 p 74>) >caulibus ad&cendenibus inferne lamosis foliosis, supeine denudatis in pedunculos elongatos desinenter tibus, fohis sessibbas ovato-lanceolatis neivoso-marginatis paudentalis glabris vel pilosis undulatis, bracteis ovato-acutis ciliolatis, tubo calycis obconico io-nervio lobis calyrrinis ovatis acutis ciholatis, corolla arapla infandihu-hfoiim profunde 5-lida — ad Caput Bonae-Spei. Wahlenbeigia Cham in Linn. 8 p. 194 Dieg 'pi exs. cap. n. 400P Cipsula 2-loculai!>, semiuibns ovoideib laivibus brunnaeis. In specimine Dregeano. folia erecta 8-12 lm lon^a ciispata dentata, floies majoes quani in plensque Wahlenbergii, tubus talycis obconicus lobis ovato-at uminatis cihalis subbievor, corolla lobis calycinis non dimidio longior, sligina 2-fldui, capsula eloigata magna obcomca 10-neivi.i semi polliraiis biloculans valvis obtusis bieibus — in graminosis tapensibus ouent. pi ope Gekau et ad upas fluvh Keg. (v. a. connn a cl.Dieg.)

a. *micrantha* (Cham 1 c), elalior, giacihor, tanibus cicctis 2-3-pedalibus, fohis 1/5 hn. longib, corollae diametrio 6 lin. vix. excedente Wahlenb. n 6280 litt. a Dreg, pi exs. cap. que a n. 6280 htt. b diffit capsula biloculai, stigmahbus a latis planis Conf adW undulataiu (v. s.)

£. *macrantha* (Cham 1 c), canibus folisque hrevionbus, fohis obli&iорibus, corolla; diametro polhcari

87 W. BiioruLAiiis, caule à basi ramoso, ranns adbcendenlibns iuferne foliosis pilosis, supeine nndiusculis glabus, fohis oblongis LmceolatUve maigme albidis undulatis, biacteis hneau-lanceolatis mtegiis, tubo calytis longe obovoi-*i|eo* 10-neivio, lobis hneari-lanceolalis acuminatis ciliatis tubo sublongioribus, coiolla late infundibnhformi 5-lida lobis cahciniis dimidio longioie, capsula elongata obconica (i^ ad Caput Bon^ -Spc (Dieg.' pi. exs n. 6281, O284, Kiebs.'sin. num.) Planta pedahs et nltia' L oha basi appioximata, 1-2 poll, longa, integra vel obscure dentata, glabia vel pilosa. Biacteic nuuc cilia? Flos inagmtudine feieCampanulas patulae Stigma a-lobm. Capsula 2- locula-11s. Seimma ovoidea utiinqnc subacuta. (v. s.)

88 W. STRIAT\, glabra , caule rainoso, rarnis nngulosis striatis supeine nudiusculis, fohis lanceolito-acuminatis inagine t nspatis subdentalis , bracteis hneari-acuniinatis, pedunoulis elongatis nunc dichotomis , tubo calycis obconico 10-neivio, lobis ovato-lanceolalis mtrgns tubo subopqualibus, coiolla late infundibnbformi profunde* 5-hd.\ lohis calycinis 4°-j^ clougioie, capsula longe obconica Qj ? ad Caput Ronai-Spei (Krtbs ' n i33). Planta pedalis rrecta. Folia infer, desunt ia specini. Flos scmpolhcais Stigmata a, laius 3. Capsula 2-locularis 4 lin. longa, valvis obtusis bieibus. (v.s.)

89. W. MEYERI, infeine pilosa, medio et snperne glabra, caule a basi lamoso ramisqne dichotomis nudmsculis eicctis, iols basi condensatis obovatis vel oblongo-lanceolatis maigme albidis # undulatis, bracteis linear-acninalis minutiis inegrit, pedunculis pectevulnre, tubo calycis obvoideo, lobis ovato-acutis tubum sequantibus, corolla infundibuliformi apice 5-loba laciniis calycinis triplo longiore, capsula ovoidea. (I) ad Caput Bonae-Spei, in montosis humidiusculis occidentali u. W. ceinna E Mey in Dreg ' pl cap exs non Alph. DC Radix simplex. Caulis ramosissimus 6-12 pollic altus, ramis gracilibus. Folia pollicem circiter longa. Pili albi pauci. Flores vix a lio longi Habitus W. audrosact-ae, aed majoi, lamosa , captuU 2-loculaii (v. s.)

90. W. TENUJS, canle erecto lamnso laraisque gracilibas glabiusrulis, foliis oppositis alrernisve spasis oblongis lanceolatisqne superioubus acuminatis, pedicellis bracteâ bublongiobus, tubo clycicis hispido obconico lacinh linearj acuminatis pilo&imculib brevioie, coiolla louge infundulifoimi lacinns caly- cmij» quadriplio longiore apice 5 lobâ (J) ad Cap. Ronae-Spei in Nam^{qua} parvâ Wahlenbeigia Dreg' pi. exs n. 62(3). Radix caulisque semipedales tenues. lolia pubeiula ant glabra. Stigmata 2, ex autopsia flu 1 is unici. (v. s comm. à cl. Dieg.)

**Sectio in. CERVICINA Alph. DC. mon, camp, p, 156. Endl. gen, 1.
p. 516. — Cervicina Delil.fi. d'Egypt, p. 7. t. 5./. 2.**

Calyx et coiolla 3-4-lobi Stamina 3. Capsula 2-loclnaris. Semina triquelra, extiemitate acula, alteiâ truncatâ —Heiba humilu* annua, foliis alternis sessilibus angastis, pedicelhs brevibus folio oppositis, floibus minuuis, habitû W. denliculatae et afiinium.

91. W CERWCINA (Alph. DC. 1 c p i56), pusilla, caule Lamosissitno, lamis diveigentibus pilosiuscuhs, foliis linear-lanceolatis subdeutienlatib, tubo calycis pilosiuscuhs ovoideo, lacinus linean-lanceolatis subdenticulatis, corollâ tuhulosâ Iobis calycims sublongioie, capsnlâ sphseii(â. (l) In aren&is et andis JEgypti et Senegalai (Le Pneui et Penottet!). Ceiviciua campanuloides Dehl.' (v. s.)

**Sectio. iv. LOBLLIOIDES Alph. DC. mon. camp. p. i5^ . Endl. gen. 1.
p. 516. — Campanula? sp. Linn. — Lobelia? sp. hortul — Wahlenbergiac sp. Schtad.**

Calyx et coiolla 3-5-lobi. Stamina 3. Capsala 2-locularis. Semina ovoidea nitida.— Herba gracilis annaa, habitû Lobehatuni «ed magis adhuc Walilenx 1-giae nutabundac, foliis alteruib sesilibus, flonbj» paivis loseis longe pedicel-lalis.

92. W. LODELIOIDES (Alph. DC. 1. c p 15^ t 17), glabra basi simplex crecta, foliis denticulatis infenoribus lanceolatis obovatis, luedus lmeau-lanceolatis, superioiibus raris angastionbus, pedunculis subdit hotomis elongatis, calycis tobo obconico angnato lacimis hneari-acuminatis erectu., corollâ cylindiac. l lacinus calycims vix longioie, capsula elongatâ ovoideo-cylindiacea. Q) in Maderâ (Masson ' Lowe') et Tenet iff A (Thibaud ' Buch). Campanula lobellioides Linn' suppl. p. 140. Ait h kew. ed 1. vol 1. p. 219. Campanula parviflora Salisb prodr. p. 126. Lobelia Bioussonclia Boiy il. Fortun. p. 33o ? Campanula mconspicua h Bank' Roella cemua Brouss. cat. h mousp 1804 p. 4y. Camp juncea et jnncifolia hortul. W. pendula bchiad' cat. h. gott. 1814. p. 5. disseit de gen. Blamenb , etc. p. 38. (v. v.)

**Sectio v. LINARIOIDES Alph. DC. mon. camp. p. i58. Endl. gen,
1. sp. 5i6. — Campanula? sp. Lam.**

Calyx et corolla 5-lobi. Stamina 5 Capsnla a-loclnans Scrnina lenticnlaria nitida. —Herba amencana, pereams, foliis alternis sessilibns angustis, floribns longe pedunenlatis et pedicellatis.

93. W. UNARIOIDES (Alph DC. 1. c p. i58 exel syn. Lobelia heteiophylla et Lob. diver&ifolia) glabra cauie erecto simplici vel à basi lamoso foliis linearibus marginatissubdenlitulatis, pedicelh> terminahbus elongatis nudis, calycis tubo obconico, Iobis integris tnangalan-acnminatis tabo snbaequalibus, corollâ infandibuliformi 5-iidi lobis talycini* dimidio longiore, capsula longe obconicA If, in Amer. mend à Monte "Video (Commei^.) et Biasilia mend, ad Chili. Campanula linarioides Lam! diet 1 p. 58o. Camp. Chilensis Prchl I in h Haenk. Hook jouin i.,p a?g Lobelia megopotamica Spreng cur. post. 4 pars a. P- 7» ex P»esl prodr. lob. p 5a. B re we rid limfolia Spreng sys». 1. p. 614 ex Piesl ibid. (v. s.)

- fi. filiformis* (Alph. DC. 1. c.), foil is bievioibns obtusis. —*Campanula filiformis* Ruiz et Pav. fl. peiuv. 2. p. 55. t. 200. f c. *Campanula linoides* Presl in berb. Haenk' In aiulis Conceptions (v. s.)
- y. arida* (Alph. DC. 1. c), lubis calyciusdeuliculatis, coiollâ minimâ —in andis Quiten&ibus. *Campanula arida* H. B et Kunth' nov. gen. 3. p. 30i. Kuntb¹ syn 2 p. jy excl *Lobelns heteiophyllâ* et diver&ifoliâ teste Cham linn i833 p. 209 (v. s.)
- l. lat'ijoha*, foliib lahoubus ohtusis, lobis calycinis dentatis , floie raajoie. — in arcnobis inantimis Chili. *Campanula Chilensis* Molin sagg. 2. ed. p 281. Beit.' heib. n. 883 ct 884. (v. tJ

Sectio vi. PHYTEUMOIDES.

Coiolla ferè 5-partita Stamina caduca, an 5? Sngmata 1 bie\ia lineana. Capsula 2-iocula 1 is, eloDgata, obconica. Seinina elliptica , utunque sabacuta, nitida , coiupressa. — Flores&essiles spicati. Ex coiollâ ad genus* Lighfoolia atuedit, scd calycis tubo elongato, 2>eminib!, habituque toto , polius Wahlenbergia. Nomen ex analogia*cum Phyteuinatibuti iloribus spa 1 sis.

94. W. sncATA (E. Mey in Dreg.' pi. cap. exs.) , caule lamoso lamisque ctectis virgaiis 2itriads basi pilosis fiupeinc glabus, fobis basi frequentiobus lanceolate ucutis erectis maigine ciassis subtus revolutis remote &ubdcnticulatis floibus spicatis sohtaiib teinative, bracteis 3 ovato-acutis ciliatis, calycis glabii tnbo obconico, lobis ttiangulanbus tubo subbrevioibub, coiollâ sub-5-partitâ infuudibulifoimi lobis calycinis 6° longioie, capsulâ longe obconicâ. — ad Cap. BoujE-Spe in gramo&is aspens oifentalibus. Pedalis et ultia non lignosa [«oba altema, 4 lin. louga, lincam lata. Bractese lineam longae. Lobi coiollae lanceolati basi tantùm connati. Stamina basi expansa, an ^P Capsula 3-4-lin. teres biloculaus, valvis 2 obtusis lobos calycis ojquautibus. (v. s. com in.'a cl. Dieg)

J. IVahlenbergice exclusce.

- W. DALMATICA Alpb DC. = Edraianthns Dalmaticas.
 W. FLACCIDA Pre& = Campanula Gaiganica.
 W. GaAMiwiFOLIA Alph. DC. = Edraiantbus giamlnfolius.
 W. GRAHDiFLonA Schrad. = Platycodon grandifloinm,
 W. HISPIDULA Scbrad. =Microcodon sparsifloium.
 W. KiTAiDEiir Alph DC. = Edraianthus Kitaibelii.
 W. MIGRANTUA Dreg. =: Laurentia miciantha.
 W. rujttiLio Alph DC. = Edraianthas }>umilio.
 W. TENUIFOLIA Alph. DC. = Edraianthns tenuifolius.
 W. w. 6291 Dreg. = Miciocodon depiessum
 W. IT. 63o4Dreg = Mezlcria humifusa.

X. HETEROCHJENIA-. — *Campanulasp. Lam. diet. l.p 58a Bojerhort. maur.* p. 194. — Wabienbergia ? ensifolia Alph. DC. monogr camp. n. lo^{*a}>

Calyx profundè 5-lidus, tubo glabio obconico, lobis ovato-acuminatis cilialis aestivalione subimbncatis. Corolla sub-5-fida, campanula ta. Stamina 5 , libera , filamentis basi latioribus. Ovarium inferum , 3-loculare. Stylus cylindncus à ba:i pilosus , corollâ sublongior. Stigmata 3, ovata, crasMuscula. Capsula cylindracea , lobis calycinis longior, subincurva, 3-loculans apice primium valvis 3 locubcide aperta, tleindè imâ basi inter nervos 10 calycis dehiscens , demum (lobis ca-

lycinis caducis) nervis decem tubi ab apice versus basin à tubo segregatis. Semina oo, ovoideo-trigona, sub lente punctata. — Planta basi sublignosa; caule 1-2-pedali, glabro, medio densè folioso, basi simplici, superne ramis floriferis: foliis alternis sessilibus longè lanceolatis acuminatis subciliatis argutèque serratis penninerviis, nervis lateribus parallelis, dentibus regularibus setis 1-2 terminatis; floribus terminalibus et axillaribus, pedicellis bracteâ multò longioribus; corollâ pollicem longâ, sordidè luteâ, maculis purpureis 5; capsulâ erecta subpollicari, glabra, dehiscentia initio tribus i, dein simui tribus i ct tribus 2, nervisque calycis divergentibus. — Habitù media inter Muschiam (*Campanula aurea* L.) et Wahlenbergias iusulares suffrutescentes ut *W. Feinandeziana*, *W. linifolia*, etc.

i. H. ENSIFOLIA. —*Campanula ensifolia* Lam. 1. c. *Wahlenbergia?* *ensifolia* Alph. DC. 1. c. In rupestribus editioribus Borboniac! et veiisimiliter Mauritii, nbi cl. Bojer è propinquo ad parietes rupis praetaliae agnovit. (v. s. florif. in b. Delcss. et fnetif. à cl. Bouton nuper comin.)

XI. PRISMATOCARPUS Alph. DC. mon. camp. p. 164. t. 20. End/, gen. 1. /?. 516. — *Campanulas* sp. *Thunb. prodr.p. 38. Rccm. et Sch. syst. S.p. i5t>.* — Prismatocarpi spec. *Vher. sen. angl. p. r. excl. sp. europceis.* —*Campanula:* sect. *Legouzke* sp. *Pers. enh. i.p. 191 excl. sp. europ.* — *Roellae* sp. et *Roeloides herb.* Banks,

Calyx 5-lobus, tubo cylindraceo angusto clongato 5-nervio, nervis cum lobis alternantibus. Corolla infundibulifbrmis, rariis subcampnulala vel tubo cylindraceo, apice 5-loba vel sub-5-fida. Stamina 5, antheris liberis. Ovarium omnino inferum 2-loculare. Stylus basi persistens. Stigmata 2. Capsula cylindracea vel prismatica, clongata, 2-locularis, vertice primiū pcrforata, dcinde lobis calycinis dclapsisin 5 laciniis ab apice ad basin rupta. Semina ovoideo-subcompræssa, obtusa, punctata. — Suffrulices vel lierbæ rigidæ sublignosæ, omnes Capenses; foliis alternis, sscpiis angustis linearibus; floribus terminalibus solitariis vcl geminis lernisve, apice peduriculoruin sessilibus vel breviter pedicellatis. — *Campanula Prismatocarpus* Linn, typus est generis, omnino à Speculariâ nostrâ *Campanula Speculum* Linn, divers^

§. 1. *Stylus exscrtus.* — *Folia per inferior em partem ramorum frequentiora.*

1. P. FASTIGXATUS (Presl in Dreg.! pi. cap. exs.), caule basi sublignoso ramoso plabro rainisq; fimplicibns striatis, foliis erectis linear-aciuininalis remotè dentalis niargine superne revolutis, floribns apice ramorum congestis sessilibus, bracteis ovato-acutissubciliatis tubum calycis subaequantibus, lobis calycinis ovato-aenatis subciliatis basi connatis, tnb; corolla; lobis calycinis dimidio longiore. % A ad Caput Bonx-Spei, in saxosis Occident. (v. s. comm. à cl. Dreg.)

a. P. DIFFUSDS (Alph. DC. mon. camp. p. 164), caule basi sublignoso erecto tereti glabro, rarae basi foliosis, foliis linearibus angustissimis integrisglabris vel pilosiusculis, pedunculis divergentibus rigidis 3-floris, floribus sessilibus vel breviter pedicellatis, bracteis subulatis glabris, lobis calycinis ovato-acutainatis glabris, corollâ tubo elongato angusto lobis calycinis multò longiore. ^ ad Caput Bonoe-Spei, in montosis occidentalibns. Trachclium diffusum

Linn, f suppl.p. i43 Tbanb. prodr p. 38. Ait. h Kew. ed. a v i. p. 355
 Dnra. Corns bot cult. 3. p. 53o. Pnsraatocaipus t)reg' pi cap. n. 63a4 ,
 6325, 63a6. Lobelia lancma Spreng. f rent, suppl. p. 9. Zeyh.' n. dSj P.*
 laricinus Presl prodr. mon. lob. p. 5a (v. s.)

§. 2. *Stylus inclusus.*

* *Folia Basi ramorum frequentia apice ferè nutta*

3. P. BREVILOBUS , raniis basi lignosis cylindricis glabris superne paniclatN , foliis erectis llineanbus angustissimis mtegiis apice miuronulaiis s>ubciliatis, pedunculis denudatis giacilibus eiectis dicbotomis , biacleis minimi's lineaibus acntis subcdialis, calyce glabio, tubo apice consricto, lobis lanceolatis aculis tubo in ul to ties brevionbus, coiolla lobis calycinis qnadiuplo longiore. J «d Capnt Bonx-Spei, in collibus aspens prope Bergvrier (Dieg ' pi. cap. 11. 1949 b.). Folia 6-9 lin longa, rigida, subconcava. Pednnnculi puipurascentes. Floics sessiles vel terminates pcdioellati. Lobi calycim hnenin soluin longi. Capsula 3-5 lin longa (V. s comm . i cl Diege)
- i. P. LYCOPODIOIDES , caule sublignoso gracih terci velutino, romis diffusis simplicihiis, basi foliosis subvelatinis, dpice nadis glabus pauciflou^, folns approxinxnatia patenti-ieflexis llineaii-laneolatis subulatis integns ciliatis, bracteis rarisi folio simihbab, ilonbus sessilibus vel pedicellati &olitarib, calyce glabio, • lobis lineaaii-acmninatis integns tubo duplo triplove longioriLus, corollà infundibulifonni lobis ralyrinis dimidio longiore. ^ ad Caput Bonze Spei in montosis orcid. propc Dntotskloof. (Dieg ! n OJ28.) boha 2- 6 hn longa, vlx] lin. lata, usque ad median partem ramoiam nuiuerosa supraqnc nulla. Peduncuh purpurei. Capsula pollicaus (v. s. comm. a cl. Dreg)
5. P. PANICULATUS (Lher ! sert angi p. 1. exel. syn. Polemoninm roelloides L), ramis basi lignosi* cylindncis glabi is superne dicbotomij* denudatia, foliis hneai 1-subolatii integns erectiiiiiculis setaceo-ciliatis margme Iriktassalis, pamcula laxa, bracteis subulatis subciliatis tubo caly<is multo bicvioibus , floribus sessili'bus, lobis calyclms acuminatis margine inciassatib, rojolKi glabia mfundiboliforini sub-5-ild,\ lobis calycinis. triplo longiore. 5 ^ Caput Bonje-Spei in parte occid. austral —Alpli. DC. mon. camp, p ibS Campanula fruticosa Hill syst veg 8. t. 8? IC. pess. non L. Campanula ericooides Lam ' ill. n a574- Camp, roelloides h. Jabs.¹ Camp. (Legousia) eiicoides Peis syn. 1. p. igi. Koclla eiicoides Spreng. syst. j. p. 723. Prisraatocaipus Dreg ' pi. exs n. 632Q (V. s)
- £. FOLLIS valde ciliatis, pamcnla paucifloia —Alph. DC. I.e. P.inuriuptus Eckl ! in h. Dnnant non Lber (v s)
6. P. GRANDIFLORUS (E Mey in Dieg.¹ pi. exs cap), ramis simplicibus basi lignosis cylindriciSjinferne foliosis velutinis, apice denudatis gldbiis,foliis lineaaii-acmninatis integns setaceo-ciHatis margine incrassatis, lacemo 9picifonni paucifloro bracteis longe aenminalis basi ovatis ciliatis tubo calycis brevioribus , floribus sessilibus vel bieviter pedicellatis, lobis calycinis bnean acuminalis subciliatis ^corollà glabrà infundibulifoimi 5-fid«\ lobis calycinis tiiplo longiore J ad Caput Bonae-Spei, in collibus austi alibus, Habitus et folia omnino P. pamcnlati, sed calyx, corolla et capsula duplo roajoies. Foisan minus a P.m-terropto diversa, pars lamen denudata longior, floiesque majores (v. s. comm. k cl. Dieg.)
7. P. INTERRUPTUS (Lher. sert. angl. p x). caule lignoso ramoso, glabro vel subvelulino tereti, folhs linean-acuminatis inlegns ciliatis, floribus apice peduncolorara appioximatis sessilibus, biacteis folio simihbus , lobis calycinis linea-ri-acuminatis ciliatis integris. ^ ad Caput Bonx-Spei —Alph DC raon. camp* p 166. Roella interrupta heib. JBaiiks. Campanula interupta Peis. enh. x. p 19a Folia sparsa , intei vallo nudo polhcem longo prope flores, onde noineu* Vix à P. paniculate differt. (v. s. sine coroll in h. Banks)
8. P. PEHuircuiATUS, frulicosus, lamis teretibus pubescentibus divisis, foliis lineaibus angustis acntiusculis glabris basi spinoso-ciliatis, peduncnlis lamn

ceo-cibatis, supeiiioibus non majoribus lacinuto-dentatis, floibus solilanis leiuinalibu', lobis calycims lanceolatis longe acuminatis laciniato-dentatis glabns, eorollA infundibubformi lobis calycinis uon longioie vaiiegatâ. ^ a' Capat Bonx-Spei. (v. 1a Banks.)

- i R. DREOEANA, caule lamisque eieclis pubescentibus, foliis linear i-acuminatis ereclis apice incuvatis laciniato-dentatis basique ciliatis, iloahbus longioribua imbnctatis lacintis raajuiibus, Aoubus soli tarns tenninahbns, lobis calycinis lanceolatis longe acuminatis laciniato-dentatis, coiollâ iniundibniformi lobis talycims non longioie. ^ ad Caput Bonae-Spei, prope Paarlbeig. R. ubata Dreg.¹ specim e loco dicto. Folia iloresque R. ciliatae minores Fasciculi foJiorum in axillis Folia lobiqne calycis dorso subpubescentes. Folia floraba involucrm imbiicatum laciniatum fulvui simulantia. Corolla concoloi ** (v. s. comm à cl. Dreg.)
- 3 R CHIATA. (Linn. sp. i p. 241), caule ramoso piloso, foliis erect is linear-acuminatis ngidis ciliatis, pihs rigidis ilobus subtariis terimnalibns amphs, foliusfloralibus majoribus, lobis calycinis laciniato-dentatis cilidtisque folio longionibus, corollâ lobis calycinis longiore am p' a vaiiegatâ. fr ad Caput Bonac-Spei, in parte Occident et ouent (Dieg.) et in Algeriâ? (Desf. fl atl. sed velisiui en ore). Gaeitn. fruct i. p. 154. t. 3i. f. 3 Dot. mag. t. 278 Tbunb. il. cap p ty'i excl R leticulata Heib amat t. 332 Alph DC. 1. c. p ff3» — Aculeosa mauntanica encae foliobs birsutis, etc. Pluk. aim 8 t a5a f 4. Campanula afncana huuialis pilosa Seb. thes 1. p. 15 t. 16. f. 5. Campanula afuc, etc. Comm. bort. 2 p 77 t. 3g. Roella Linn. h. Cliff, p. 49s* t. 65. (v. v.)
4. R* RFTICULATA (Linn ' spec x p. a40* caule erecto subsimplici piloso, foliis eicctis subulatift ciliatis, ilorabbus non longiobus, ilonbos terminahlms solitaiiis, lobis calycinis subulatis mtegris brevibus subcibatis, coiollâ infundibuboimi profnnde 5-iida lobis calycinis dinidio feie longioie ^ ad Caput Bon^e-Spei — Gieseik. piitlect. p 3q8 excl. syn. b Cliff Lam ill. 2577. Alpb. l(. 1. c p 174 R folns imbricatis Roy. lugd a',8 Cnmpauula Capitib P.onae-Sppi foliis reticulatis spinosis Petiv inns. 21. f. 17° Floies albidi¹ nnnoies quam R. ciliatae. Corolla pubebcens. (v. s spec a Linn in b. DC)
5. R. DUNA-NTII (Alpb DC 1. c. p 175), caule adscendente lamosobasi denudato, ramis diffnsis pilosinscuhs, foliis subeteclis liueari acuminatis cilialis floialibus vix longioibus, iloiibn* teiminabbus subtariis vcl tcnatis, lobis calycinis lanccolato-acuminatis 1 emote denticulatis extus glabus interne pubescentibus, coroll A lobis ralycinis sublongioie & Caput Bonje-Spei ad cacumen montis Tabulans (licklon' in h. Dunant). Habitus R. reticulate sed folia floraha et lobi ralycini latiores. (v in h. Dunant.)
6. R.P THUNBERGII (Alph DC 1. c. p. 174), caole subsimplici filiforroi erecto glabro apice ramoso debili pedali, folns glomeiatis lanceolatis acutis ciliatis margine revolntis glabus hneain longis,floibnsinramisterminabbus solitaiiis. — ad Caput Bonse-Spei Campanulaciliata Ihunb. 11. cap ed. Scbult p 172. non Stev. Campanula Thunbeign Rcem. et Scbult. &y st. 5 p* 135.
7. R. CINEREX (Alph DC. 1 c. p. 175), canle à basi ramoso, iainis siimplicibus erectis teietibus ad onginem folioruin incano-pubescentibus, folns eiectis Lineari-subulatis remote denticulatis basi subtomentosis creterum glaberrimis, floralibus bimilibus, floubus solitaiiis vel 4-6 apice ramornm snbglomeratis, lobis calycinis integiis linean-subulalis glabus, corollâ lobis calycinis dimidio longiore J ad Caput Bonae-Spei, in giammosis circa Swellendam. Campanula ciaeica Linn snpl p ii9- Ihunb. piodi. p. 38. mem. acad peti 4. p. 368 t (5 f. 4, £1. cap ed. Schult. p. 172. R. glabrella h. Banks! Flores albidi. (v. s.)
8. R. ? nRACTfc|TA(Alph. DC 1. c. p. 179), caule fiutescente teieli cineio pu-bescente (lexuoso erecto ramoso, Minis simpbcibus, foliis leflexis lineaiittngonis acntis glabiis integus, flonbus terminalibas sabsolitanis, bractei* ovato-acuminatis cibatis ^ ad Caput Bonac-Spei. Campanula biactata lbunb phyt Bl. p 90 (cit. ox Rcem. ct Schult.) floi rap. ed Schnlt. p. 171.

- g. R. LATILOHA, ramis erectis pnbescientibns, foliis patenibus linearibus ncutis sefaceo-ciliatis, iloahbus vix longionbns, floribus bolitariis terrinalibus, lobis calycinis ovato-acutis latis subintegris rigidis exlus aspcris in!us pilosis, coiolla mfundibnliforrai lobis calycinis dimidio loDgiore. J ad Caput Bonae-Spei, in arenosis occ'id. (Dreg.' n 63as). Iolia ? bn. longa, cum alus minonibus axillanbus. Lobi calycis fere innmicali 3 liu. longi, i] lin. lati, nunc lemote dentati. (v & comm. à cl Dieg)
- 10 R GLOMERATA , glabra, lamis adscendentibus anguloſts infernè denudatis, foliis linearibus aculis integiis \cl remote dentatis patrnti-erectis, ferabbufc lationbus giosse dentatis basi subciliatis, biacteis late ovatis 5-lobatis lobis acurainatis, iloiibus glomeiatis bracteis lon^gioribus, lubis cnlycinis lanceolatis setdceo-acuDiinatis integris glabrii. corollā lobis calycinis longiote. ^ ad Capnt Bome-Spei, in giaminosis orientalibns ad ostia flum Omsamcabe Roella Dreg' pi. cap. exs. n 4011. Folia 5 hn. longa, 1 lin. lata (>. s)
11. R CAMPESTRIS, rainis adscendentibus basi denudatis anguloſti & pubeiulis, foliis lineaii-acuimnatis patentibus cibatis integns, floiahbus ovato-aculis snb-dentatib, llonbus terrinalibus solilaiis ternatisve , lobis calycima lanceolatis acuinatinis integris glabiis laevibus, corollā lobis calycinis sublongiore 5 ad Capnt Bonae-Spei in campestnbis interioribus prope 1^elbelsoip (Dreg.' n 63a 1). Folia 3 lin longa, cam alns axillaribus minonbus Flores parvi. (v s. com in à c] Dreg.)
- 1 i R. HEruRVAiA, ramis crebris diffusis abbreviates foliosis, foliis patcn(i-ie< urvis lineaubiiis acutis 1 emote ciliato-dentatis, floralibos paulo majoubus lobjsque calycinis recuivatis basi setaceo-ciliatis apice lacmiato-dentatis, iloubus solitams terruinalibus. j ad Caput Ronje-Spei (Dieg ' n. 65*5). Planta lignosa bemipedalis ex special, umco Folia 2 lin. longa. Istlores paivi, biacleis imbiicatis lecuivatis, lobisque calycinis lecuivatis lacuiato-dentatis, valde dislincta (v. s. comia. à tl. Dieg)
- 13 R. PROSTRAE (E. Mey in Dreg¹ pi. cap exs.), linnilis subbgusa lamis teietibus pilosis, foliis hneaiibus acutis cibatis inlcgris patenti-eiectis, floral 1 bus sinilibub, flonbus terminahbus &olitaiis sessilibus, lobis calycinis Imeari acuminatiu apice lecuivatis ciliaiu. leuioeqne sr»bdtnl*lis, corolla lobis cal[^] cinis subbievioie. % ad Caput Donae-Spei m plamtic aicnosā mlei lygeibeit; et Siiongsberg. Radix elongata lamosa. Caulis 4 6 pollic lamis adscendentibus prostratisve ligidis. Folia pio Roella¹ pauca, 3-4 iin. longa. (v. s comni a cl. Dreg)
- 14 R SQUARROSA (Beig cap p 4a), humilis lamosa basi sublignosa, 1 amis dillnsis heibaceis angnhs pilosis, foliis ovato-aentis decuuentibus apice cuspi datis recuivatis 1 emote ciliatis et scetaceo-dcnlalii, iloahbus similibus , ilonbus sobtanis glomeiatisve luminalibus, lobis calycinis o\ato-acuminatis (ibatis, coiolla lobis calycinis dimidio longioie. If.- j ad Caput Bonaj-Spei in bunidis ex. gr. inonlis labulaj — Ihnnb. piindr. p" 68. 11 cap ed Stbult p i,⁷. Lino, suppl. p. i4i- Alph DC mon tamp p 176. Lain.! ill. n. 2⁷9 Dum. Cours. bot.cult. 3. p- 53o R. filifoimis Lam. ill. u. 258o. t. 123 f a.ic. pes- wñ. non Poii. R. ngidula b. Banks¹ (v. s.)
- 1'> R. MUSCOSA (Tbanb. 111 Linn, f suppl. p. i43), bumiHima berbacca liuu-fusa lamosa, rain is (ihformibus foliosis glabiis[^] loins ovnto acutis patentileilexis glabrfis cou'aceis remote senatis, dentibus ligidis, Jlioibus teinūmalibus solitariis, tnbo calycis nndo foliis obtecto, lobis ovato acurminalis mtcgiis glabris vel Mibciliatis, coiolla infundibnliforrai lobis calycinis triplo quadriuplo-ve longioie. If, ad Caput Bonrc-Spei, in hnmidis montis iabuls. Thnnb 11 cap. ed. Schult. p 175. Alph. DC I.e. p. i⁷ Herb Ranks' Dipg' pi t.|p n. 63o5 R cespitosah Ranks'Buich.'cat. pi a|fi ausli n. 636 Campanula Itklon¹ inh. Dunant Co ollacaeuilea. Biactae foliis similes iloii i>aium aji pioximatac. (v. s.)
16. R ? DECURREKS , caule cieclo lainoso beibaceo piloso , pilis rans rigidis albis, foliis painlis decnrientihns ovalo-oblongis basi ciliatis subintegus, flonbus

solitariis sessilibus tenninalibus , tubo calycis ovoideo glabro, lobis acuminatis ciliatis longitudine tubi, corollā campanulatā scini-5-fidā lobis calycis Iriplo longiore. (I' ad Caput Bonae-Spei.—Lher.! sert. angl. p. a. t. 6. Ait. h. Kew. x eel. i. p. 226. Poir. diet. 6. p. 23a. sppl. 4 p. 693 excl. syn. bot. rep. Rcem. et Scb. syst. 5. p. 74, excl. cod. syu. R.? decurrens Alph. DC. inon. camp. p. 178. Radix simplex, 4-pollic. Folia floralia ab aliis non diversa. Stigmata a. Capsula iguota. (v. s.)

Roellce exclusce.

- II. ANAFORIFOLIA Roxb. = Wahlenbergia angustifoli.i.
- II. CERNUA Brouss. = Wahlenbergia lobelioides.
- R. CILIATA Dreg. = Merciera brevifolia.
- R. COMPACTA h. Banks. = Merciera tennifolia.
- R. DECURRENS Andr. = Wahlenbergia Cap crisis.
- R. ERECT A h. Banks. = Prismatocarpns altiflorus.
- R. ERICOIDES Spreng. = Prismatocarpns paniculatus.
- R. FILZFORMIS Poir.= Lightfootia tenella.
- R. FRUTICOSA Lher. = Prismatocarpus fralicosns.
- R. GLABRA Poir. r=: Lightfootia tenella.
- R. XZTIERRUPTA h. Banks. = Prismatocarpus interrupts.
- R. LATERIFLORA h. Banks. = Merciera brevifolia.
- R. LINIFOLIA Illox. = Wahlenbergia linifolia.
- R. KITIDA h. Banks. = Prismatocarpas nitidus.
- R. PANXGUATA Roxb. = Wahlenbergia Roxburgh!!!.
- R. PEDUNCULATA Berg. = Prismatocarpus peduncnlatus.
- R. riNiFOHA. h. Banks. = Merciera tenuifolia.
- R. RECURVAb. Banks. = Lightfootia tenella.

XIFI. EDRAIANTHUS.—*Campanula* sp. *auct.* Wahlenbergias sect.Edraiantha.
Alph. DC. mon. camp. p. 139. Endl. gen. 1. p. 5i6.

Calyx 5-fidus. Corolla semi-5-fida, saepius cylindracea , rariū subcampanulata infundibuliformis. Stamina 5, libera , filamentis basi expansis. Stylus à basi cylindricus iuclusus. Stigma 2-rarius-3-partitum, lobis linearibus demum patentibus. Capsula 2-3-locularis, 01 -nino inf'ra , hemisphaerica vel ovoidca , s 11 pern & intr' calyceni plana ibique fragments seu valvis irregularibus caducis debiscens, diii postea persistens crateriformis vacua. Semina 00, ova la , compressa , ^ro Ordine majuscula.—Herbae cespitosae , bumiles, pcrennes, exparte •auslro-orientali Europae. Folia alterna , l>asi conf'erta , saipiūs linearia angusti , plerumque cum bracteis calycibusq. ciliata , pilis all)is Wgidis simplicibus. Flores sessilcs, saipiis capitati, magritudine Canipanularum, corollā caerulcā. Capsula supernc rupta anno sequente persistens. — Characires pauci à Wahlenbergiis discrepantes, sed habitus diversissimus ; dehiscentia capsulae et inflorescentia potius Jasiones, sed flores maiores et antherae liberae. — Nomen ab e^ctioc sessilis ct avdps flos.

§. 1. *Flores glomerati.*

1. E. ORAMINXFOLIUS, caulis foliisque molliter pubescentibus, foliis integnis , radicalibus linearibus vel liueari-spathulatis, canlinis lincaribus subamplexi-caulibui, bracleis ovato-acutis integris sohpube.scenlibns capitulo brevioribKs, ralycis tubo glabriuscolo, lobis puberulia, sinubus fdentalis. % in Sirilia, J~~Q~~ H^r nici'1. nsqn'r M^r Rnmam r| Z.icintbo. Trachclium Tiagopogi folio mon-

- tanum Column, pise, plant, q. nov. hist, ad phytob. p. 35. I. uG. Trachelin in capit. ntmn, etc. Bocc. i. rar. p. 78 f.2. Trachelium minus, etc. Barr. ic. 33a. Campanula graminifolia. Linn. sp. 1. p. a34. Sibth.! fl. grace, t. 206. Ten. fl. nap. 1. p. 6b". non Waldst. et Kit. nee Willem. Wahlenbergia graminifolia Alpli. DC. 1. c. p. i30. Stigma 2-lobum. Capsula 2-locularis, in speciin. diversis noper à cl. Gussone missis, (v. s.)
2. E. KITAIBELII, caulis molliter pilosis foliis subciliatis, radicalibus linearis subulatis remotè denlicnatis, bracteis ovato-acuminatis dentalo-serratis exterioribus capitulo brevion'bus, calycis lubo villosa, lobis subdenticulatis, utrinqne pubescentibns, sinubus dentirulatis. % in montibus praesertim calcareis Banatiis, Croatiae et Transylvania. Campanula graminifolia Waldst. et Kir. pi. rar. hung. a. p. 166. t. i54. excl. syn. Baunag. en. stirp. trans. 1. p. i55. Wahlenbergia Kitaibelii Alph. DC. mon. camp, p. x3i. Stigma a-3-paititatu. Flores majores quā in in sequente.
3. E. TENUIFOLIUS, canibus hirsutis, foliis linearibus integris bracteis lobisque calycinis setoso-ciliatis, bracteis linearibus basi ovatis integris exterioribus capitulo longioribus, calycis tubo pilosuscule, sinubus edentatis. % in Croatia (Waldt. et Kit.), prope Finnic (Muller ! pi. exs.) et in Dalmatia (Biasoletto!) praesertim locis demissis. Campanula tenuifolia Waldst. et Kit. pi. rar. Lung. 2. p. J68. t. 155. Campanula graminifolia Host. 11. auslr. 1. p. 26b excl. syn. Column, et W. et Kit. Campanula graminifolia ft Schouw plan ein pflz. geogr. ital.p. 1 i. Wahlenbergia tenuifolia Alpli. DC. 1. c. p. 'S'S. Stigma a-lobu. (v. s.)
- i. E. DALMATICUS, canibus glabris foliis linear-lanceolatis ad basin hirtociliatis extremilate glabris, bracteis linearibus basi ovalis iutegris eilialis exterioribus capitulo longioribus, calycis tubo pilosuscule, lobis ti-iangularibus integris ciliatis dorso pilosusculis, sinubus edentatis. % ad Orientein Salouae (Biasoletto!) Stigma a-lobu. Folia integra vel remotè subdentalata Wahlenbergia DaKmatica. Alph. DC. 1. c. p. i54. (v. s.)

§. 2. *Flores solitarii,*

5. E. SERPVtT.iFoius, canibus cespitosis diffusis procumbentibns glabris i-floris, foliis oblongo-lanceolatis oblusis retusive ciliatis, radicalibus coufertis subcrenatis in petiolum angustatis, eaulinis paucis alterius sessilibas iutegris, flore terminali bracteis-2-3-4 ovato-lanceolatis ciliatis obtecto, calycis tnb'o ovoideo glabriuscule, lobis ovato-lanceolatis obtusis ciliatis, corollā campanula ūta. % in summis Biocovi Dalmatiie (Vis. Ulaletto!). Campanula scr-pyllifolia. Visian. in flor. ann. 18^9, ergiing. blatt. p. 7. Caules Moresque purpurascentes (ex 'Vis.), l'olia G-b lin. Tonga lineam lata. Caules (loriferi biplicares. Capsula? persistentes in speciin. nostro jam roptae exsiccateae. (v. s. comm. à cl. Biasoletto.) .
- 6* E. FUMii.io, cespitosa, caulis diffusis brevissimis valde foliosis, foliis linearibus integris subtus glabris superne margine revolutis medioqne j)ilosus, pilosus adpressis extreuitate folii subpenicillatis, iloribus terninalibus solitariis, lubo calycis obconico glabro, lobis iutegvis foliis similibns. If in editioribus montis Biocovo Dalmatiae. Campanula punnilio portentosa: mea, nōm. et Sch. syst. 5. p. 136. Visian. ! stirp. dalm. sp. p. 29. Flora ann. 1829, ergäng. blatt. p. 5. Weld. et Trattin. Arch. für gesell. statist. etc. mai 1824, p. 309. Weld. ic. Portenschl. Wahlenbergia punnilio Alph. DC. I.e. p. i34. Campanula silenifolia Host fl. austr. 1. p. 268 non Msch. Stigma 2-3-lobum. (v. s.)

Tribus II. CAMPANULEJE G. Don gard. diet. 3.^ 732. Endl. gen. p. 516. — Canipaimleaj subtrib. 2 Alph. DC. mon. camp, p. 180.

Ovula 00. Gapsula lateraliter dehiscens. — Genera omnia ex hemisphxrio boreali.

XIV. PHYTEUMA Cces. I. ix. cap. 3o. Gessn.tab. phyt. Linn. gen. n. 29a. Gcertn. fruct. \p- i49- t. 3o. Jitss. gen. p. 165. Lam. ill. n. 2589. t. i^f, 1. &AA: handb. n. 118. £. 3g. -^//A. £>£. /now. cam/>. p. 180. !?/«/!. £*««. i./>. 516. (non Diosc. Column. Dalech. Match. Lour.) — Rapunculiu Trag. p. 576. — Raptuntiam Lob. hist. p. 178 IV\ 329. — Rapunculns Dalech. hist.p. 641. C. Bauh. pin. p. 92. Tourn. Hém. 1. p. 93. t. 38. Adans. fain. nat. 2.p. i34.

Calyx 5-fidus. Còrola 5-partita, laciniis linearibus apice diii et in unà specie semper cohaerèntibus. Stamina 5, filamentis basi latioribus, nntheris liberis, polline violaceo vel rubescente. Stylus pilosus, apice 'j-3-fidus. Capsula a-3-locularis. Semina ovoidea, internum subcompreßa. — Herbae perenues Europaeanae vel Asiaticæ ; foliis radicalibus pctiolatis à caulinis diversis ; floribus sessilibus vel brevissinè pedicel-Jatis , capitatis vel umbellatis.

Sect. 1. SYNOTOMA G. Don. gen. syst. of gard. 3. p. 'J^S.

Flores umbellati. Lob! corollæ apice naoquàm discreti. Capsula 2-Iocularis. — FJores breviter pedicellati, in nrabellara siraplicem dispositi. Phyteuma Sectio 1. Alpb. DC. mon. camp. p. i8r. Physoplexis sectio End 1.1. c. p. 5iy.

1. P. COMOSUM (Linn. sp. 1. p. 242), glabrum, caulis decnmbentibns siraplicibns, foliis grossè etacotè dentatis, radicalibus longè petiolatis cordatis ova to-rotundatis, canliois breviùs petiolatis ovato-lanceolatis acutis, capitulis urnbelliformibus terminalibus, bracteis roaximis obovatis grosse dentatis. % in rupesrribus Daldi nee non Alpium vicinarutn. — Jacq. fl. austr. append. t. '50. Trachelium petrscum minus Ponae descr. mont. Bald, in Clus. hist. 336. c. ic. Ban*, pi. obs. t. 889. Bapunculo conioSo, etc. J. Bauh. hist. 2. p. 811. ic. Sta-minum flainenta basi vix latiora. Pori capsulae nonduin noti. (v. s.)

Sect. 11. HEDRANTHDM G. Don. gen. syst. of gard. 3. p. 746.

Flores sessiles, capitati vel densè spicati. Lobi corollæ versùs apicera diù con-nati, demìum liberi. Capsnla 2-3-locularis, poris 2-3 lateraliter versùs medium partem sitis debiscens.—Plytenma sect. 2. Alph. DC. mon. camp. p. 182. Phytenma sect. Rapunculus partim Endl. 1. c.

§. 1. *Capitulum per* anthesin hemisphcericum <vel globosum , deinde globosum vel subovoideum. Capsula Z-locularis.*

a. *Bracteis numerosis latis saiphs inter sc aqualibus.*

2. P. PAUCIFLORTJM (Linn. sp. 1. p. 241),caulis bamillimis glabris vel pilo-sinsculis , foliis integris glabris, radicalibus confertis brevibns angustislineari vel obovato-lanceolatis, caulinis paucis sessilibus lineari-lanceolatis, capitulo paucifloro globoso, bracteis ovato-acutis ciliatis integris vel ad basin snbdentatis. T\$J in Alpibus pracsertlm occidentalism et in Pyreuaeis. — Lam. et DC.! fl. fr. n. aS58. Gaud. fl. belv. 2. p. 171. Reich, ic. cent. 4. f. 545. Alph. DC. mon. camp. p. i83. Koch syn. fl. germ. p. 463 excl. var. ^Bertol. fl. it. 2. p. 53o. excl. var. 0. non Ha»nk. et Host. Ph. globnlariaefolim Hegetschw. r'eise p. 746. t. i3 et 15. Gaud. fl. helv. 2. p. 170. non JSternb. etHopp. Bractex apice nunr|nám dentatae. (v. s.)

&- *bracteis obtusissimis* — Hegetsw. reis.p. 146'. t. 14. (v. 6)

3. P. GT.OIJULARI^FOLIUM (Siernb. et Hopp! Denkschr. der hot. Gesellsch. in Regensb. a. p. 100), caulis humilibus glabris, foliis radicalibus confertis obovatis latis apice subdentatis glabris vel ciliatis, caulinis paucis sessilibus obovato-ianceolatM subciliatis, capitulo paucifloro globoso, bracteis latissimis ~~obtusissimis~~ apice subdentatis. 24 in Alpibus austriacis. — Alph. DC. mon. camp. p. 182. non Hegetschw. nec Gaud. Ph. pauciflorum Hänk. in Jocq. coll. 2. p. ti3. non Linn. Ph. pauri-iloruin var. p. Koch syn. fl. germ. ». 4G4. Jiertol. fl. it. 2. p. 53o. An à Ph.

*paucifloio diversnm** Caules in piajsente raaiores, folia radic. obovata 2-4 hn. loDgioia triplo latioia, apice obtusa et subdentata, bractae basi seinpei integrte (v. s.)

4. P. SIBIRICDM (Rcem. et Schuit. syst. 5. p. 77. ex de Vest), caule lirino 2-pollicari erecto folioso folns omnibus umeato-lineaiibus den tat is 3-4 lm. longis suberectis adpressis capitulo globoso, bracteis oblongis rigidis acutis. — in Sibiria (de"Vest). P pauciflomm h. Johann. ex Roem. et Sch. Diftert à P. paacifloro Linn, raule fohtoso, bracteis exteiioribus non latis, flonbus non paucis ex Roera et Scb. 1. c.
5. P. HLMISPHJERICUM (Lian. sp. 1. p 241) , caule glabro , foliis erectis, radicalibus subintegiis caule vix bievoribus lmearibus vel multo lirevionbus oblongis longe petiolatis, cauiinis hneari-lanceolatis mmoribus subdentatis glabus vel pilosiusculis, capitulo globoso , bracteis ovato-acnminatis subintegns cihalis. If in Alpibus, Gebennis et Pyrenaeis. — Jacq. ic lar. t. 333 Lam. ill t. 124. f. a. Reich, ic. 4. t. 363 Alph. DC. naon camp, p 184 P. Micheln Lapeyr. hist abr. pyr. p 109 ex Benth. uon AH. P. intermedium Hogetsrbw reis. p. 147 t. 17. P. graminifolium Sieb. berb. fl. austr. n. 71. ex Men. etKocb. "Vanat flore caeruleo , albo aut flavid (v. s)
 - fi. foliis radicalibos caule duplo longioribus. In Helvetiā centrah (MontzP)
- >. P. HUMILE (Schleicb.¹ exsicc), caule glabro laevi, foliis glabns, ladicibus confertis linear-lanceolatis basi angustatis subintegiis, caulinis paucis lineaibus mtegris, capitulo globoso, biacteis ovato-lanceolatis loiigc aruminatis nnnte ciliatis dentatis et insequaliter seiratis. If m Alpibus Rhaeticis (Montzi!), 'Vallesiacis et Pedemontanis. — Muriith.' guid. en *Val. p. 84. Hegetschw. leis p. 146. t. 16. Gaud fl heh. 2. p. 173. Alph DC. mon camp, p 186. Bert fl it. 2. p. 534. P< Carestiae Bir. act acad. tauuo. 1818, 23. p. 315. t. 5 ex Beitol qm plantam vidit, non Lois nee Alph DC. mon. p. 18> Variat longitudine foboium bractearumque. Calyx interdum pilosiuscuius (v s)
 - 0. *humilhmmum*, radice crassā, caulinuhs brevissimis — Gaud. 1 c. Reich JC. 4. f. 54b.
7. P. SERRATUM (VJv. app ad. fl cors 'prodr p i) , caule giabio laew, folns glabris, ladicibus confertis lanceolntis longp petiolatis bubintegris caule subnequalibus vel multo breioribns , caulinis linear-lanceolatis subserratis , capitulo globoso, bracteis patentibu& vel reflexis latis ovato-acuminatis acute serjatis glabns If. m CorsicaD montibus. DC et Duby ' hot. gall p §12. Beit. fl. it. 2 p. 533. Ph. Carestiae Lois fl gall. 1. p. 145 (excl. syn. P. Siebeii). Alph. DC. mon camp p 185. non Birol Caulis majoi quam in P. humih, folia sublatiora, calyx glabei. (v s)
8. P. SiEDLRi (Spreng pugill. 1. n 29), caule glabio vel piloso, foliis subciliatiis, radicalibus petiolatis ovato-rotundis subrordatis crenatis, caulinis iufenoribus petiolatis lanceolatis grosse dentatis, supeioribus aplexicauhbns acute dentatis , capitulo globoso bracteis ovato-acnminatis pilosis giosse et acute dentatis. if in Alpibus praecipue austnacis et in Apenninis. — Reich, K. f 360 et 361.Mert et Koch Dentschl fl. I p 184 excl syn. Moiis oxon Alph.DC. roon. camp. p. 186 P Charmelii Sieb. in h Spieng. P. intermedium Jan iii h. Ser ' non Hegetcbw. P. oibiculare var. Scbrad ! in litt. Bertol fl. it 3. p 536 Caulis 2-5 poll alms. Folia in surenhs nondūra flonferis minima longe petiolata rotundata crenata subcordata. Capitulum 8-10 lin. latum. Bractca? lalissirose flonbus subbrevoires (v. s.)
9. P. ORDICULARF (Linn. sp. 242 excl var. &, et y) , caule glabro, fohtis crenatis, radicalibus petiolatis lanceolatis subcordatis, caulinis sessilibos linear-lanceolatis, capitnlo florente globoso, fructifero ovali, biacteis ovato acntis latis If in Europā. — Engl. hot t. 142. ^ū- comosa Gou. fl. monsp. p. 26. non L Ph. cordata Till. Dauph. 2. p. 517. t. 11. f. 1. Sims hot. mag. t. 1/1>6 Ph Soheuchzeri Lapeyr. lust. abr. Pyi p. 109 excl. syn P. Michelii Hegetsthw id's. p. 148. r 33. nonahor P fislulosum Reich fl Dicsd. lloabot. /eit 5 1» 554 Plauta polyiuopha , taur 2 20 poll, alto, foliis laditalibus lameolatis

vel cordatis, glabris vel pilosis, bracteis integris,, crenatis vel dentalis, glabris vel saepius ciliatis. Sequentes var. cinnmoro ex monogr. p. 188:

yg. *lanceolatum*, caule majore, foliis longè lanceolatis miniraè cordatis. — Lam. et DC! fl. fr. u. 2861. "Vill. Dauph. 2. p. 517. t. 12. f. 1. (v. s.)

y. *giganteurn*, caule maximo, foliis tit in praced. P. elliptica Vill. Danph. 2. p. 517. t. 11. f. 2. Hegetschw. rein, p. 148. (v. s.)

<T *coinosurn*, bracteis amplioribus. P. comosa "Vill. Dauph. a. p. 517. Lam. el DC! II. fr. 11. 1860. (v. s.)

1. *Columnce*, foliis radicalibns par vis cordato-ovatis, canliuis infer, lanceolatis serratis. Rapuotium corniculatam montanum. Column, ecphr. pars 1. p. 223. ic. ^24.

vt. *decipiens*, humile, foliis radic. brevibus elliptioo-linearibns lineavibusve, obsoletè crenatis, caulinis scssilibus li oca rib us obtusiusculis. P. brevi folia Scbleich. cat. 1821. p. 25. P. pilosmn Hegetschw. reis. p. 149. f. 34- P- orbiculare var. Gaud. fl. helv. 2. p. (76. Accedit ad P. hemisphxricuin.

{&. *Bracteis paucis incuqualibus angustis.*

10. P. GHARMELII ('Vill. Dauph. 2. p. 516. t. 11. f. 3), caule suberecto glabro, foliis glabris polymorphis, radicalibus longè petiolatis cordatis ovato-acutis grossè serrato-deatalis, caulinis petiolatis lanceolatis irregulariter serrato-dentatis, capitiolo sphserico, bracteis 3-6' liti. longis liueari-lanceolatis subintegris pilosiusculis ereclis vel patentibus. % in Alpibus I'edemontii et Delphinatus et in Pyrenaeis. —All.! auct. ad fl. pedem. p. 8. Lam. et DC! fl. fr. u. 2864. Alph. DC. mon, camp. p. 189. P. orbicnlaris <T Willd. sp. 922. P. orbicularis A. Lam. ill. n. a856. P. Scheuchzeri Bentb.! cat. Pyr. p. in ex ipso mono nte. P. Scheuchzeri Koch ayn. fl. germ. p. 465. Bert. fl. ic. a. p. 54*. P. orbiculare Jacq. 11. austr. ,t. 437. f. dextra ex Bertol. Lobi calycis pilosiosculi. Caules seniipedales in sequente pedalett. (v. s.)

xx. P. SCHEUCUZERI (All. ped. u. 428. t. 3g. f. a.)_f canle erecto glabro, foliis glabris, radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis brevibus crenato-serratis, cauliis inferioribus longis linear-lanceolatis acutè et remotè serrnlati, superioribns linearibns snbintegris, capitulo sphero, bracteis reflex is vel patentibus glabris linear-acurninatis integris 1 ^-i-pollicavibus. If in Alpibus. — Lam. et DC! fl. fr. n. 2862. Simsbot. mag. t. 1797. Reich, ic t. 360. f. 54i. Alph. DC. mon. camp. p. 190. Koch syn. fl. germ. p. 465. Bert. fl. it. a. p. 542. excl. syn. P. Charmelii. P. ovata Lam. ill. n. a585. excl. syn. All. non Willd. P. corniculatum Gand. hebr. a. p. 177. P. Charmelioides Birol. mem. acad. taur. 1820. v. 24. p. 577. t. 10. Caulis pedalis. Calyx glaber. (v. s.)

§. 2. *Capitulum per anthesin cylindricum, conicum vel ovatum, deinde magis elongatum. Capsula %-^>-locularis|*

ia. P. SCORZONERIFOLIUM; (Vill. Dauph. 2. p. 519. t. 12. f. 2), glabruin, foliis polymorphis, radicalibus petiolatis cordato-ovatis vel ovalis, caulinis linear-lanceolatis, spica ovoideæ, bracteis rcflexis linearibns integris brevibus, calyce glabro, stiginatibus 2. % in Alpibus et Sudetis (Schin. fl. boh.).—Reich, cent. 3. t. 249. f. 4c 1. Mert. et Koch Deutschl. fl. 2. p. 189. excl. var. f. et >• Alph. DC. mon. camp. p. 192. non Lam. et DC. fl. fr. Ph. Scheuchzeri yS Pers. enh. 1. p. 193, var. y Schslt. fl- austr. 2. ed. n. 881. P. betonicae-folium Sims bot. mag. t. 2066, non "Vill. Ph. Michelit BerioU fl. it. 2. p. 638. excl. plciisque syn. non All. (v. s.)

0. floribus intense casrnleis. Sims bot. mag. t. 2271.

i3. P. MICHIKT.H(A.11. ped. 1. p. n5. n. 4*7- * 7- *- 3.), caule glabro, foliis glabris vel piloaiusculis, radicalibus linear-lanceolatis brevirer petiolatis integris vel remotè denticnlatis »picA ovoideæ subglobosa, bracteis reflexis linearibus pubescentibns, calycibus medio pilosis, stigmatus 2. % in inoute Ceusio. — Reich, ic. bot. t. 348. f. 5_{a9}, (;am|. fl. helv. 2. p. 80. Alph. DC. mon. camp. p. 193. uon Lam. et DC. fl. fr. nee Lapeyr. Hegetschw. et alior. Y betonicacfoliam y Mert. et Koch Deutschl. fl. 2. p. 190. Cum pracecedeute

- et sequente janxil tl Berto). fl it. 2 p. 538 Planta lucta pedahs, fohis nuu-
qaam cordatis. (l. a)
14. P. BETONICJEFOLIUM fVill Baupb 2 p 5i8 t 12 f. 3)taule ghibio, folu»
mfeiioubus coidatis oblongo acuminatis siinplicitte stimlatis, supeitoiibus
hneari-lanceolatis erectis subintegns, spicâ ovoideâ fere cbiactrntâ, biatteis
raris lineanbas glabris, calyceglabio, stigmatibus 3 If mmontams Gei mania;,
Helvetia;, Sabaudia? , Gallue et in Apenninis (Jan h Sei').—L.uu. et DC ' fl.
fr n a865 Reich ic. bot. t. i5o. f. 41 J Alph DC mon tamp p 194.
Mert. et Koch Deulscbl. fl 2 p. 189 excl vai /?. et y non bot. mag. P
Micliebi Beit fl it. 2. p 538 partim. I^olia ladie louge petiolata. Capitula
pana, snbpollicaria (\ v)
- /0 pubescens, fohis et piaeipue petiolis pubtcentius —Gaud fl helv 2.
p 181 (T. h)
y scssifolium, foliis radic. confertis &essihbas lineaii-lanceolalis non cor-
datis. In editionbus Alp mm Sabaudao P. Micbelii Lam. et DC.I fl. ft. n.
fj863. non ahor (v s)
15. P. VERONICJLFOLIUM (Scbiad in litt Alph. DC mon. camp, p 196.), caule
glabro vel basi pubescente stnalo , fohis pilobiuseuhs, infeiioubns louge petio-
latis coidatis longe lanceolatis simplicitei dentato-seuatis, supeioiibus sessi-
hbis lieeari-lanccolatis &eriulatis, spicâ cylinducâ acummatâ, biacteis
setaceis glabm, <alycibus glabiib, stigmatibui. 2 3 If in piov S.ihsbuigensi
(Hoik, et Scliad. in lilt). Petoli pilo^i Spied 2-pollicaiib imtio floialioms
acummala pyiamidalis, alaba&tus j»upeuonbus MX mcui|atis. (v. s 10mm a
cl. Schiad)
16. P. PERSICJEFOLIVM (Hopp cent exsic.), glaberriuum, foljis lufeionbus
petiolatis o Lion go-la nceolatis simpliciter cienuialis, cauhui!. liuan-lanceolatis
snbintegns, spica oblonga, biactcis bneaii lanceolatis subintegnt, stigmatibus
a-3 V"» Canntbia (Hopp') et Gallic piov Lozeie (Piost').—Alpb. DC.
mon. camp. p. iy6 P. scorzonenfolia Lam. et DC ' fl fi. ed. 3 11 2866.
Reich ic bot. 3 p 48 non ic Floia bot 7eit. i83O p. 397 non "VJIL P
betonicaefohum var fi Mert et Koch Deuti>chl. fl. 2. p 189. Gaulis r-2-peda-
lis. Folia non cordata. Spica 1 |-i poll longa, alabastns ciectib obtusis \ix
incurvatis Stigmata saepius 2. (v. s)
17. P. sncAiUM (Linn sp. p. 242), glabrum, foliis mferioribus longè petiola-
tis coidatis ovato-acutis bisenatis,, biiperioubus ovato lanceolalis &iuipbcitei
dentatis, spicâ cylinducâ elongatâ , bracteis hneaubus subulatis, sligmatibus 2
*)£ in sylvaticis Euiopae temperata — OEd. fl dan t S62 Scbk. i-nch n. 43o.
t 39. bot. mag. t. 2347 R^odix fu&formis. I olia radic saepius tx mgro-macu-
lata Spica 2-3 poll, longa, alabasti is incui vatis (v. v.)
\$. biacteatum (Alph DC mon p 198), pllosu 111, fohis cauhnis araplis
longe petiolatis, bracttis longis 6-10 lin — in Pyienais. P Halleu DC
et Dub. bot. gall p 3i2 IIOU Lam. et DC fl. fi |y s.)
18. P. HALIERI (All ped i.p 116), glabium , fohis mfeiionbub longe petiola-
tis cordatis ovato-acentii dupbotti »<ji>atis, Biipeiionbiis lanceoiati, senatis,
spicâ ovoidco-oblongâ , biacteis lanteolatu. acuminatIs seuulatis vel subinte-
gns subpolhcanbiib , sligmatibus 2. % passim m Alpibus, Apenninis ct
montibuji Hohemijc et Tiaisylvamae (Baning) — Laui et DC 11 h n .2g68_t
Gaod fl. hd\, 2 p. i83. Alph. DC mou. tamp p. 199 lieitol 11 a 2 5^5
non DC et Dub bot. gall P ovatura Schm. n. abhandl. der bobem. gess p. x.
p 20. Willd sp x. p. 923. Hopp' exweo. II ill htlv. n 683 Canhs-a-3-
pedalib Capilulum r-i I poll longum, bratteis 2 pateutibus \el reflexis,
alabastiis mcui vatis. Corolla atioviolarea. (v s)
19. P. NIGRUM (Schm fl. boh 1. p 87), glabrum, foliis luferioribos petiolatia
cordatis ovato acutis simplicity crenulatis , supeioiibus seswhbus lieuan-lau-
ceolatis senulatis, spicâ ovoideâ sub^iobosa subpolljcau, huectci^b leilcxis h-
uean lauceolatis bimipolhcanibns subintegus, sligmatibus 2 If in Bohemia
(Schm Pobl ') in Hrir^ni 1 (Wall ') tt nitid ISouubergam (Pan/ in h Su ').

— Mert et Koch Dentschl. fl 2 p IQT. excl syn. P. ovale Hopp. Alph. DC. in on. carap p 199. P. spicatnm y Pohl! tent, fl germ. p. 210 Folia et capitula minora qoara in IVHalleri. I lores atrovjolacei in praefloratione incutvan. (v s.)

20. P. BALBISII (Alph. DC. mon camp. p. 200), canle hamili foliisquc glahns, fohis radicalibus petiolatis cordatis late ovato-acutis cauhnus paucis subsessibus ovato-acuminatis, spicā cyndraceo-oblongā, bracteis paucis flote brevioribus hneanbus pilosiuscuhs, lobis calycinis subpilosis, stigmaUbus 3 *ip in valle Pedemontanā dictā Pesio (Balb') —P. cordata Balb' nmc. alt. p. 10 in act taurin non Till, nee hot mng. Caul is erectus 4-6 poll altus. Foliasubmtegra vel remote et irregulanter dentata dentibus valdeacutis. Spica alba sub fin em anthesis 9-12 lin. longa, bracteis 2-3-lin. (v s)

JS. petreeum (Alpb. DC. 1. c.), foliis integiis, super, longē lanceolatis aenminatis. Prope Bassanum. Rapnnculus petraeus Alp ezot. p 343 et 344 c IC Mor. ox. 8. 5. t x f. 2. P. Michel 11 Bertol. part. 2 p. 038. non alioi.

Sectio in. PODANTHUM G. Don gen. syst. of gard. 3. p. 748.

Flores breviter pedicellati, lazè spicato-racemosi, a-3 in axillā cujusque biac tea?. Lobi corollas apice dili connati demum liberi. Capsala 3-locularis, poris 3 Jaterahter versus apicem sitis dehiscens. — Graeciae, Asia) mmons et Caucasi incolae. — Phyteuraa sect. 3 Alph. DC. mon. camp, p 201. Phyteuma sect Kapunculus paitlm Eudl I.e.

- 2r. P. TENUIFOLIDM (Alph DC loos. camp. p. 201), caule simplici inferne glabro superne scabrinsculo, folns caulinis linearibus obtusis mtegris angustissimis giabris, spicā simplici a pice condensate, calyce scabriuscno Jf, circa Byzantium. Stigmata 5 , crassiuscula brevia. (v s. comm. à cl. Olivier.)
- 23 P. IIIMONII-OLIUM (Sibth. et Sm prodr fl. grsec. 1. p 144. fl. grace 3. p. 14. r 218), caule raraoso, fohis radicalibus longe petiolatis repando-dentatis, cau linis paucis in bracteas transeunfibus, spicā longā mterruptā, bracteis integiis sabulatis minirais, capsulā ovoideA 2f in Olympo Bithyno (Sibth Aucher') in Dalmatia (Bert') et regno Neapohtano. — Alph DC mon. camp p. 202 Campanula limonufolia Linn, sp 1. p. 23g. P stricta Sims hot mag t. ar45. Campanula viigata Lodd. bor cab. t. 667 Ten fl. neap 1 p 66, nou Labill. P Mylosum Schrank pi. rar. h mon. fasc 5 t 49. P. collinniu Cuss pi rar p.97.t 19 Bertol. fl it. 2 p 548 Taria tcaule, foliis, calycibusque glabiis aut scabris. In hortis majus et glabernnum (v. v. c.)

23. P. RiGinuM (Willd sp 1 p. 9^5 excl syn. Tourn), caule simplicis&imo glabro, foliis ladirahbus linear-lanreolatis dentatis glabiisculis, dentibus rainutissimis obtusis, floribus sparsis pedunenhs 3-floru.. If, in Onente. Species ex plantA herb Gundelsheimer verisimihter constitnta et nimis P limoniifoho pioxima. Phrasislouinefortii à Willd. citata ad P amplexicaulem lefeieuda ex h. Touin speciinine. Alus verbis species diversae sub eadem phiasi in heib. Gundelbh. et lourn adsunt. An P limomfolium°

24. P. LOBELIOIDES (Willd. phyfogr 1 n 20 t 4. f 2) t cau|v ^ubsimplici sea bnusculo, fohis scabris, ladicahbus petiolatis hnean-lancpolalis acute denti <ulatis, caulinis linearibus acuminatis sessihbus, (lonbas spasis btevi-pedi tellatis, calycibus scabris % in Aimenia —Willd. sp 1. p 0,24 Alph DC. mon camp, p ao3. Kapunculus aimeniusHeSperidis folio Tourn cor p /j ei h. Lam Caulu. semipedahs Folia 1-2 poll longa Mores soli tarn \ el (ex Wi lid) germm R_di_m brachiati et folia hispida in planta herb. Gundelsh. ut Mtletui ex descr. Willd 1 c (v in h Lam)

25. P. IANCEOIATUM (Willd sp. 1. p 924), glabrum, caulis ramosis, fohis ladicahbui confertis bieviter petiolatis lanceolatis gios>c seiratis, canlinis hie vissimis lineaumcuminatis, floribus sparsis, sohtanis, capsulā ovoidea Of in Armenia — Desf. pi. d_u COI m a n n m U 5 „, p 55 t > vel choix des pi dacoip 34 t. 24. Alph DC mou p 204. Kapunculus Armcnius, foliis an-

- guslis dentalis Tourn. ! herb. Rapunculus Orientals fol. angustis dentatis cor. p. 4. Auct. veius ou mus.: Radix crassiuscula j-pedicatis. Caulis 3-4, semi-pedales vel pedales. Folia 1-3, poll. longa, 4-5 lin. lata. Corolla albida nervis roseis. Planta herb. Gundelsheim. scabra videtur ex Willd. l. c. (v. s.)
26. P. ruLCHERxuM (Fisch. et Mey. ind. sem. h. petr. Jan. 1835. p. 35), pubescenti-subincanum, ramis virgatis, foliis radic. oblongis acutiusculis denticulatis, caulinis diminutis, floralibus aabreniformibus amplexicaulibus calyces involucranibus, floribus 2-4 sessilibus glomeratis, capsula ovoideâ basi rotunda t a. *If* in aridis nioutium Talusch. P. liioniiifolia ? C. A. Mey. "Verzeichn. Pflanz. in Cauc. n. 698. Hohenh. enum. pi. Talusch p. 63.
27. P. REPANDUM (Sm. prodr. fl. groec. 1. p. i43), canle glabro, foliis radicalibus confertis petiolatis elliptico-oblongis repandisglabris, petiolis basi fimbriatis, spicâ laxâ interruptâ, bracteis linear-i Lanceolatis iiiubriatis. *If* in Olympo liytyno. (Sibth.). — Sm. in Rees cycl. v. 28. Radix crassa lignosa. Caulis a-4 poll, altus.
28. P. VSINAI, pilosum, caulis bnmilibns adscendentibussimlicibus, foliis inferioribus confertis lanceolatis obtusiusculis crenatis, snperioribus raris brcvissimis linearibus integris, floribus paucis apice approximatis, calyce corollâque sub-; velutinis. % ad rupes Sinai (AuchJ x836 n. i3r4» 1837. n. 1884). Radix crassa multiceps. Canles 4-6 poll, alti graciles. Folia ia-i5 lin. longa, 3-4 lin. lata. (v. s. comra. à cl. Aucher.)
29. P. CANESCENS (Waldst. et Kit.! pi. rar. hnng. 1. p. 12. t. i^), scabrum, caule simplici, foliis sessilibus ovato-lanceolatis cremilatis, spicâ elongatâ laxâ ramis interduin auctâ, bracteis linear-i Lanceolatis subinlegris, capsula ovoideâ. *If* ab Hungaria ad Cancasnm. (Fisch.) — Tratt. tab. t. 745. Baumg. ennm. st. trans, p. i58. Bieb. fl. cauc. suppl. p. 149. Subcanescens; variat caule, foliis calycibusque scabris, incanis vel glabriusculis, foliis angustis vel 5-6 lin. latis. (v. s.)
30. P. SATTCI FOLIUM (Bess.! prim. fl. galic. 1. p. 368 ex Kit!)), caule aimplissimino foliis iuferioribus petiolatis ovalo-lanceolatis serrato-dentatis, superioribns sessilibus lanceolatis acutè serratis, spicâ brevi, bracteis linearibus subintegratis. — in Banatû (Kit. ex b. Scbrad.) et Podoliâ (Bess.). — Alph. DC. mon. camp. p. 205. P. salignum vel salicifolium à cl. auct. cit. vocatur. Species P. canescenti valdè afflnis, forsanche nonservanda. Specimen div. Kitaibel. à cl. Schrad. coinm. glabrum erat, foliis margine tantum pilosiusculis j aliud nuper communicavit cl. Besser ubiqûc incanum. (v. a.)
31. P. CAMPANULOIDES (Bieb. fl. cauc. 1. p. i56. suppl. p. 148), caule simplici glabro, foliis glabris vel pilosiusculis, inferioribus petiolatis ovatis obtusiusculis crenatis, mediis latis sessilibus ovato-acutis crenatis superioribus lanceolatis serratis, spicâ brevi densâ, bracteis subinlegris acuminatis, calyce glabro. *If* in Caucaso et Armeniâ. (Tourn.) — Sims bot. mag. t. 1015. Alph. DC. mon. camp. p. 206. Rapanculus armenius foliis longioribas et rigidis Tourn. herb. (v. s.)
- ft. Sibthorpiatum* (Alph. DC. I.e.), caulis foliisque pilosis. In Olympo Bithyno (Sibth. et Aucher! n. i885. ann. 1837) et Tauro (Kotschy! n. 343). P. ellipticum Sibth. et vSm. prodr. fl graec. 1. p. 143. fl. gr'. {_m} 217. Sm. in Rees cycl. 28. uon Till. P. Sibthorpiatum Rcem. et Sch." syat. 5. p. 84. P. virgatum Kotschy non Willd. (v. s.)
- 3a. P. AMPLEXICAULE (Willis, sp. 1. p. 9^{a5})» *glaDum*, canle simplicissimo, foliis snbaroplexicaulibus ovato-acutis latis acute serratis vel biserratis, spicâ brevi densâ, calycibiis glabris. % in Armenia (Tourn.), in Asiâ min. ad Euphratem. (Auch! i836. n. 2252.1837 n. 38a4), in monte Tauro (Kotschy! n. 338) et ad cacuinen Olympi Bythiui (Sibth.). — Sibth. et Sm. prodr. fl. gr. x. p< *44- fl. gra;c. t. 219. Alph. DC. mon. camp. p. 207. Rapancnls armenius altissimus folio glahro et rigido Tourn.! herb. Pallide virescens, foliis subtus margineque pallidioribus. Folia inferiora bievi-petiolata in specim. Aucb., in aliismihi ign. (v. s.)

J3 P. AUCHFRI, caule simplin glabro vel infcinè pilosiuscnlo striato, foliis me-
ihiis sessilibus giabiis ovatis acutis iusequalitei senatis, fasciculi; florum nume-
IOSIS axillaribus spasis, biacteis lanceolatis acuminate submtegns, calyce
glabio, capsula ovoideâ. % in Persia; monibus (Auch 'i336 n 3i?4 18 J7.
11 1886) (aubs sesquipedib rectns firmus, in specimine n 1886, pilosiuscu-
lins Folia infeioia ign., media erecta x $\frac{1}{2}$ poll, longa 6 hn lata, denibus
acutis. Spica intetupta subpedalis. (v s.)

'T Species minus notm.

||. P INVEQUATUM (FCit. apud Schult. fl aasti ed. a. n. 883), capitnlis subglobosK, fob & radicalibub lanceolate basi lnxqnahter cordatis serratis, caulinis liueaiibus, snpeuoibus sessibus lategcimuis. If, in Alpibus et sabalpinis co-
nutatus Arvensis.— Roem. et Sib syst 5 p 80 I'loxiineaccederc ad. P. Char-
uelii yidetnr ex Rcem et Scb. 1 c.

35. P ? MINUTUM, canbcalis adscendentibus et decumbentibas simplicibas, fo-
liis glabbi* lucidly, radicalibns spathalato ovatis sinuatis confertii, caulinis
spatulatis obtusis, peduu alisflbfoiinibus longitudme foliorum, floribus axil-
laibus lenninalibusque, calyce glabro lf'u suuimis Sierras lexadae (Agardh)
Campanola minuta Agardh incd Ph. nuoutnm Roem et Sch. sy&t. 5 p. 87
ex plantâ Ag. Polia ladie. 4-7 Hn. longa, 1-1 ^bn lata, cauhua 1-1 I lin.
longa Anlheiae oblongae alba?, btylns cjrollâ qujdinple et ultra longioi In
sectione Phyteumatis floribos sparsib cuunierant Roera et Sch HabitQ9 proba-
biliter et patna Jasioncs fohos?.

Species exclusce.

PH. AMERICAHUM Hill. = Campanula Auiencana

PH BEGONZFOLZUM Roxb = Pentaphragma begomfolinm

PH DEPINNATA. Lour. } =• Sam'bnci ap
PH. CocniNCHiNENiis Lour)

PH. JACQUINI Sieb = Campanula Jacquinii

PH. PINNATUM L = Petiomarula pinnata

PH. RIGXDIFOLIUM Dnf. = Jasion foiosa

PH. TRioloLoi Molina. = ?

PH. VI at ATOM Willd = Campanula vugata.

XV. PETROMARULA *Bellus epist' ad Clus in Clus. hist pars 2. p 299. Alph.*
DC man camp p. 209. — Rapunculi sp. Impet hist Bank pin. 93 — Phy-
*teuinatlb sp. Linn — Phyteumatis sect. Pelromaiula Pers each 1 p. 194**

Calyx 5-fidus, corolla 5-partita. Stam. 5, filamentis basi la Us an-
theus longioubus , polline violaceo. Stylus glaber. Stigma capitatum
crassum pilosiusculuni. Ovanum 3-loculare. Capsula erecta, lateialiter
poms 3 ad medinm partem sitis dehisccns. — Herba Cietica , folns
i^dicahbus pi imo petiolatis ovato-arulis deindc pinnatis, petiolis mar-
ginaiis ct lobalis , floubus laxe racemosis pediceilatis.

¹ P PINWATA (Alph. DC 1 c) % ei. plensq. (j) ex 'Vent h. Cels In Cietae mon-
tanis et scopuhs maritiinis copiose, culta ab anno i6/o Petromarula seu Lac-
tuca petrxa Belli, Pona descr mont Bald. p. 38 c ic Rapunculus creticus
incolis Petromaiula Iraper. hist, p 882 c ic J Bauh. hij,t a. p. 811. ic
Toorn 'herb cor 4 Pbyteuma pinnatum Linn, sp p. 24.1. Tent jaid. eels.
t. 5a Siblh.'fl graec. 3 p. i5 t 226 Radix cras&a edulis Caubs a-4-pedalis,
glabemnus.' nmuij 1 oha glabia, ladicaha semipcdaha piunata, lobij, 3-5
irregularibus, ovato-acutis sabcoidalis creuatis vel gios&e dentatis, lobo termi-
nali ovato vel lotundato tordato grosse rrenato vel serrato, cauhna serrato-
laciniata et subpinnata. Racemas multilloius (v. s.)

??. pubescens (Alph DC 1 c), panicuU et calyciba* puberuhs. Phytteami
pinnatum Rtithenb hort. hot t i37.Calta ex setnin. Sieb

XVI. MICHAUXIA *Lher. dissert. Lam. ill. a. t. ^5. Pers. enh. i.p. 488.* —
Miiidium Rbazes. Adamfam. desplant, a.p. iSb.Jüss. gen.p. 164.

Calyx 8-1 o-fidus, sinubus appendicibus obtectis. Corolla 8-1 o-partita, rotata. Stamina 8-10 libera, filamentis latissimis, antheris apice breviter cuspidatis. Stylus pilosus. Stigmata 8-10 filiformia. Ovarium 8-10-loculnre, loculamcntis lobis calycinis opposilis. Capsula nutans, 8-10 valvis basi dchiscsns. llcrbae hicnncs, Ořicntalcs, sinubus calycinis obtectis ad Campanulas sect. 1. acccdentes.

1. M. NUDA, *caule glabriuscolo , foliis scabro-pilosis irrculariter dentato-lobatis lanceolatis, radicalibus profnndc lobatis petiolis hinc indc srgraentis marginalibus auctis, caulinis sessilibus, floribas octandris appendicibus calycinis brevissimis.— in collibus adNinivain. (Aucher! i836 et 1837. n. ifiaO.). Folia M. campannloidis t caulis M. lacvigatae, flores setacco-pilosi nt in chiabns, sed appendices calycis vix lineares longac lobis multo breviores. Corollam bene apertam non vidi. (v. s. comm. à cl. Aucher.)*
- a. M. CAMPANUtoIDES (*Lher.! diss. monog. c. ic.*), hispid a., pilis rigidis, foliis lanceolatis irregulariter dentato-lobatis, radicalisms longè petiolatis, petiolis marginntis lobntisqec, canlinis sessilibus subnmplexicaulibus acuiis, fioibas octandris appendicibus oalycinis rc/lexis lobis hrcvioribus. (Z) in Libano circà Aleppum, in Cappadociā (Aucher! 11. 2047* aun- i836.) ct in Tauro (Kotschy ! n. 338). — Cart. hot. mag. 219. Alpb. DC. mon. camp. p. 211. t. 4. f. c. Medium Dioscoridis vel Mindinm Rhazis Raaw. Hodoep. part. 2. c. 12, p. a84. et part. 4-1. 35. ex Gronov. it. 35. ex Juss. Dal. hist. app. p. 33. c. ic. Campanula lyraefolia Sali&b. prodr. p. 127 exd. syu. Lain. M. strigosa. Pers. syn. 1. p. 4i^» Flores pnrpurascentes. (v. v.)
3. M. LLEVIGATA (*Yent.! h. Cels. p. et t. 81*), *caule glabro, foliis piloso-scabris irregulariter dentatis, tadicalibus ovatis longè petiolatis, petiolis non lobatis* caulinij, sessilibus suharaplexicaulibus oblongis, floribas 8-10-andris, appendicibns calycinis lohis longioribus. (2j in Persiā. —Gaertn. fruct. suppl. p. 162. t. a n. f. G.Bor.reg. t. 1451. Rot. māg. t. 3ia8.Hoheuh. en. pi. Talysh p. 64. M. decandra Fii,rh. ined. Flores albi. In spontaneis partes floris numero 8 semper vidi, in cnltis frequenter nmmcro 10 ex auer. cit. (v. s. comm. à cl. Anch. et Belaiig.)*

XVII. CAMPANULA *Fucks, hist.p. 43. Raymeth. pi. p. 82. Tourn. Him. hot. 1. p. 90. t. 37 et 38. Linn. gen. n. 290. Juss. gen. p. 164. Gaertn.fruct. 1. p. i53. t. 3i. Lam. ill. H. 345. t. is3. excl. plur. »p. Alph. DC. mon. camp. p. ai3. Endl. gen. 1. p* 617. — M*if*ov et Efivoc Diosc. /A. c. 18 et 29. — Erineon Plin. I. a3. c. 17. — Uvulariae sp. Trag. hist. 926. — Cervarioic sp. Cord. Dod. pempt. 164. — Rap* sP- R'teM- P> 458. — Traohelium sp. Lob. hist. p. 176. non Linn. — Rapnnculuj., Campanula glabra et Tracheliura C. Bauh.pin. 92 et 94. — Medium Tourn. e'lem. hot. \p. 90. t. 38.—Roncela Dumort. comm. bot. p. 14. non ejnsd. fl. belg. prodr. p. 58. — Erinia Noulet ann. sc. nat. ser. 2. v- 9/?. 120.*

Calyx 5-fidus. Corolla apice 5-loba vel 5-fida, saepiis campanulata. Stamina 5 libera, filamentis basi lalis et membranaceis. Stylus in nrse-floratione pilis collectoribus (except^ imā basi) tectus. Stfgmata Ø vel 5 filiformia. Capsula 3-5-locularis, valvis 5-5 lateraliter dehiscens. Semina ovata complanala vel ovoidea.—Herbae saepiis perennes nunc humiles et bumifusae mine 9.-3 pcdalcs crectae multiflorac foliis' radi-calibus saepiis formā diversis, floribus terminalibus vel' axillaribus. Omnes in hemisphaerio borcali.

Sectio i. MEDIUM *Tourn. elem. bot. i. p. go. t. 38. Alph. DC. L t. End I. genv-i.p. 5i[^].* — *Mtjfoov Diosc. I. 4- c. 18. Viola manna vel Mariaoa , Medium veter. auct. — Campanula? sp. sect. Medium Linn. gen. n. 290. Marianthemum Schrank hort, monac.*

Sinns calycis appendicibus reflexis obtecti. Capsula 3-5-Ioculaiis, valvis basi sempe sitis dehiscens.

§. 1. *Capsula &-loculans ; stigmata 5. — Onines mulfiflorce ,foliis radicalib*ius* longè petiolatis. — In Grcecid et vicinis regiombus.*

* *Folia radicalia irregularanter lyrata *vel laciniata, petiohs nempe marginal is lobatisque.*

1. C. CRISP A (Lara. diet. 1. p. 58i), glabra, canle subsimplici, foliis lsevibus giosse crenato-dentatis raargine enspis, radicalibus bidentatis laciniatis, caulis sessilibus ovato-acutis, floribus pyrmidatim raceinosis, calyce scabro, appendicibus minim's dentifounibns, corollâ latâ campanulatâ extus scabriascult. If in Armenia inter uibes Kara et Erzerom (Tourn ! \oy. 2. p. 3⁸ ic). — Alph. DC. mon camp. p. 216. (v s in h. Jnss.)
2. C C£Lsii(Alph DC.raon.camp p. 217), velutina, caaleadscendenteramoso tereti, foliib mfei ioubus irregulaiiter lobatis lobo ternnnali crenato ovato-acuto, auperioiibas sesMibus obovaiis crenatis, floribas erectis longe race in oils, appendicibus calycinis minimis dentiforuiibus, corollâ tubulosa velutinâ lobis calycims quadruplo longiore. (^ in Giaeacia* C. tomentosa "Vent * bort. Cels. p. et t. 18 Dum. de Cours bot. cnlt. 3. p. 5i-) non Lam Gaulis subpedahs Folia cinerascentia. (v. in h. Deless)
3. C. RUPESTEIS (Sibth. prodr. £1. graec. 1. p. 142.fl.grxc t. 2i3), caule adscendente apice prscsertim viloso-hispido, foliis veluhnisi cmerascentibus raditMlibus irregulanter pinnatis, lobo terrinali rotundato, caallnis sessihbus ovatis snbdentatis, floribus laxe raremosis, lobis calycinis appendicibusque triangulanibns a*quahbus bispidis, corollâ tubulosa velutina lobis oalycmis duplo triplove longioie @? ad inpes Bieotoc et Pelopponesi (Sibth) et in ins Rhodo (Aucher-Eloy 1K37 n 38ai et 38². et i836 n 1301). Alph. DC. mon camp 2x8. Pedicelli atque appendices calycis valde pilosi in spec. Aut.h 1301. et 3822. (v. s.)
4. C. TOMENTOSA (Lam ! diet. 1. p 584), undique incana tomentosa, cault adscendente, foliis radicalibus irregulariter pinnato-^lyiatis lobis cienato-dentatis ovatis, caulims sessiUbus obovatis crenatis floribus ldxe racemosis eiertis, lobis calycinis lanceolatis longe dcummatis appendicibus ovatis lobis dimidio brevionibus, corollâ campanulatâ seuceA lobis calycinis duplo longiore. — in Oiiente (Tourn.), Ephesiae admuros (Tonrn ! Ancber-Eloy' n 706. anno 1836. etn i38i). — Alph. DC. mon. camp. p. 218 Tomento valde dis- tmcta. Caules pedales c radice crassâ. Lobi calycini 7-8 Hn longi. (v. s.)
5. C. LYRATA (Lam. diet 1. p. 588. seivato syn. Tourn), hispij_a canle ereclo ramobo, foliis inferioribus petiolatis o^ato acutis irregulariter cienatis petiolo marginato hinc inde lobis parvis aactc , supeioribas sessilibus ovato-lanceolaiis serrato-dentatis, racemo elongato inultifloro, appendicibus calycinis ovatis obtusis lobis acutis subaequahbus, corollâ tubulosa neivis %elutind lobis calycims duplo longioie. — in Onentr (Tourn.), circa Bi7antiuin (Olivier') etin Garamanid (Aucher-Eloy! n. 1840.). Alph. DC. mon. camp p. 219 (v. s.)
6. C. ANDREWSU (Alph. DC. mon. p. 220), villosa, caule erecto ramoso, foliis radicalibus lyrato-pmnatifidis pinnulis innws, (aulinis inferioiibns petiolatis subcordatis rotundatis grosse dentatis, supeionibus sessibbus obcuneiformibns dentatis, floribus laxo racemosis, appendicibus calycinis ovalis lobis duplo brevioribus, corolW campanulaio-tubalosa glabra (2) in iupibus uiubiosis

- Grajcae (Sibth.). C. laciniata Andr. hot. rep. t. 385. (excl. syn.). Sm. prodr. fl. graec. 1. p. 141. (excl. syn. Tourn.) non Linn.
7. C. LACINIATA (Linn. sp. 1. p. 237. excl. syn. Raw. et Baub.), caule ereclo ramoso suhvelutino, foliis pilosiusculis, radiealibus ovato-lanceolatis grossè laciniatis, petiolis marginatis lobatisque, floribus erectis laxè racemosis, appendicibus calycinis ovato-acutis lobis dñplo brevioribus, corolla' campanula! à amplâ lobis calycinis ovnto-acnmiaatis triplo longiore (2) in Arcbipclago , ad rapes ins. Cardiolissae (Tourn.! voy. 1. p. et tab. 260). Lain. diet. 1. p. 588. Alph. DC. mou. camp. p. 220. non Andr. Pili vix perspicui. (v. s.)
8. C. AICHUSFLORA (Sibth. prodr. 1. p. 141, fl. graec. t. 212), caule ramoso subvelutino crecto, foliis pilosis ovato-lanceolatis, radiealibus petiolalis laciniatis subincanU loho termiuali corda to obtuso innequaliter cordato , caolinis sessilibus obovatis crenatis, floribus laxè paniculatis, calycibus glabriusculis appendicibus ovato-acutis lobis acntis duplo brevioribus, corollâ cylindracea amplâ tubo pubescente. ® in ins. Polycandro et in scopolis maritimis ins. Hydro?. (Sibth.)
9. C. TCBULOSA. (Lam. diet. 1. p. 588), pilosa , canle tereti, foliis cäulinis inferioribus longè petiolalis pilosis limbo ovato-acuto crenato dentato, supelioribus sessilibus ovato-lanceolatis serrato-denlatis, floribus pancis axillaribus et tenniualibus, lobis calycinis acuminatis, appendicibus ovalis obtusis lobis duplo brevioribus, corollâ velutinâ tñhulosâ lobis calycinis duplo longiore. — in ins. Cretâ (Tourn.!).— Dcsf. pi. cor. Tourn. inann. mus. Par. 11. p. 142. t. 17. Alph. DC. mon. camp. p. 222. "Variat foliis inferioribus petiolo lateraliter lobato aut IIQ lobato. Folia radic. ign. (v. in h. "Vaill. et Juss.)

** *Folia radicalia ovata vel lanceolata, petiolis non marginatis.*

10. C. CARIF.NSIS, pilosa , canle erecto siraplici, foliis ovatis crenatis, inferioribns petiolatis, petiolis marginatis, pedunculis 3-5-floris, floribus subfasciculatis, lobig calyciuis acutis corolla tubulosa pubescente paulò brevioribus, appendicibus ovatis obtusis lobis latioribus sublongioribusque. (2)? in provincia olim Carli Asiaj min. (Aucher ! aim. i836. n. 933). Radix fusiformis. Caulis sesquipedalis, pills rigidis, ut tota planta , obsitus. Folia infer. 3-pollic. inaequaliter crenata petiolis none margine sublobatis. Capsula 5-4-l°cularis. (v. ..)
11. C. BETONCEFOLIA (Sibth. et Sin. prodr. 1. p. 141. fl. graec. t. aio non Bieb.), pilosa, caule erecto subrainoso, foliis elliptico-oblongis vel ovato-acutis crenato-dentatis, radiealibus brevioribus brevi-petiolatis, floribus terminalibns et axillaribus, appendicibus calycinis lobisque ovato-acutis in terse aeqnalibS) corollâ tubnlo»ù pubescente calyce duplo triplove longiore. (2) in monte Olympo liithyno (Sibth.). Corolla baud uncialis, basi flavescentis.
12. C. CORYMBOSA (Desf. plant, du cor. de Tonrn. ann. du inns. Par. 11. p. 139. t. 15. vel choix des pi. du cor. p. 40. t. 30), caule erecto piloso, foliis ovato-acutis crenato-dentatis pilosiusculis, radiealibus petiolatis ovato-acutis, caulinis sessilibus lanceolatis, floribus laxè cotymbosis ereclis , calyvis ciliati lobis longè acuminatis, appendicibus ovato-acutis lobis dimidio brevioribus, corollâ campanulato-tubulosa subpnbescente.— in ins. Crelâ (Tourn.!). Alph. DC. mon. camp. p.aa3. Radix fusiformis. Caulis bipedalis. Corolla sesquipoHi*. caris. (v. in h. Tonrn. et Juss.)
13. C PELVIFORMIS (Lam. diet. t. p. 586), birsnta, caniibus adscendentibns snbsimlicibus 1-4-floris, foliis radicalibus petiolatis ovatis crenaio-d.»ntatis caulinis sessilibus ovato-acutis pancis, lobis calycinis ovaio-acuminatis ap' pendicibus ovato-rotndatis lobis sulpa' qualibiis, corolla campanulata àmpia glabriusculâ . -- in Greta' (Tourn.!). — Desf. choix de pi. du cor. de Tdurn. t. 3i., vel ann. du mns. 11. p. 14» t. 16. (v. in h. Tourn.)

jg. *micrantha*, corolla minore anguslioreet pubescente. C. poliflorinis Si**b** . pi. exsicc. cretic. Forsau sp. distincta Folia radic. non •idi. (v. s.)

14 C. MEDIUM (Linn sp 2i6), pilosa, caule eieclo, foliis sessilibus ovato-lanceolatis vcl lanceolatis crenato-dentatis, raccrao laxo mnltifloio, lobis calycinis ovato-acummatis, appendicibns amplis ovatis obtusis lobis dimidio bicuoribus, coiollâ campanulatâ inflntâ nervis bntâ (2) in inonlosis Fulpiae ineidionahs, à Gallopiovincâ (DC ') et Italia⁴ sept, ad Fauriam (Boeber ex Reicheub. mag p. 157), ucc nun in Europâ mediâ ex hortis interduni elapsa. Medium seu Viola maiiana Matlb comm ed Valgr p (>3i. ic. Besl. bort Eyst. ocst. 1. t. 3. f. 2 et 3, t. 4. f. 1 et t. 5. f. 1. C. giandifloia Lain, fl ft ed r vol. 3. p. 334. non L. (v. v. c. ets. sp.)

§. 2. *Capsula 3-locularis. Stigmata 3.*

* *Uniflorce yawee, folus radicalibus confertis.*

15. C ADAMI (Bieb. fl cauc. 1. p 153, suppl p 148), folus snbciliatis, radicalibus longe petiolatis cuneato-spathulatis ad apicein giosse seuato-dentatis, caulinis sessilibus obovalis hnearibusque serrato-dentatis, lobis calycinis acuminatis pilosiusculis coiollâ tnplo bievionbus, appendicibns ovato-cuneatis subpubescentibus lobis tiipio bicvioribus. If in Caucaso oientah Stev ' mem. soc nat. mosc 5 p. 256 Bieb cent, plant ross. 1 1.16. Alph. DC. mon camp, p 226 t. 11 f. 1.—Cespitosa, caulis simplicibus, 3 4 poll Coiolla mfun-dibnliformis glabia. Lobi calycis in capsulâ patentes. (v s)

16 C BIETIEUSTEINIANA (Roem et Schult syst 5 p 147), canle glabro, foliis lanuqmoso-ciliatis, ladicahbus spathulatis apice dentatis, caulinis sessilibus hncanbus, lobis calyciuis oblongo-lanceolatis coiollâ duplo bievionbus cihaftis, nppendicibus ovato-acuuunatis villosis lobis triplo bievioibus —in Can-CJSI lupestiibus .tlinis (Stev ') —Alph DC. mou camp p. 227. t. xo. f. r C. tiidentata Schieb. dec. 3 t. 2 Linn raant p. 44 C. rupestris Birb fl tanr. cauc 1. p. 15{ et suppl. p. 146 Habitu proceed. Coiolla glabia. (v. s)
/? matrantha (Alpb. DC. 1 c), floie majoic

17. f BITHYNICA, canle glabro, folus lanugine ciliatis, radicalibus hnari-spalhnialis apice integns aut emarginatis, caulinis sessilibns linearibus , lobis calycinis lanceolatis subaiutis cilialis corollâ vix dimidio brevionbus, appendicibus ovato acutis ciliatis lobis tiipio brevionbus. If in editioribus Olympi Bithyni (Anch ' n i858, ann 1837). Radix lignosa simplex superne inciassata foliisque obiecta. Caulis x-2-pollicaiis erectns. folia polbcem longa saepius integia Capsnla nutans. Differtâ C. Biebeisteiuianâ solum folus angustionbus magis ciliatis iarò dentatis et tune potius apice emarginatis, floie niinore, appendicibns non nbique hirsutis. (v s a cl Ancher comm.)

18. C nrrosv (Pall mss. Roem. et Sch. syst. 5. p 148 non Ledeb), canle pilosiusculo foliis basi raolliter ciliatis, ladicahbas longe lanceolatis petiolatis cieuulatis, caulinis linearci-acummatis sessilibus integns, lobis calycinis ciliatis ovato-acuinatinis coiollâ ore barbatu tiipio brevionbus, appendiibus ovato-arutis ciliatis lobis dimidio bievionbns. If in Sibiiia. — Alph DC. mon. ramp. p. 226. Caulis eiectus 3-poll. Corolla infundibuliformis. (v. s. a cl. Fisch comm)

19 C. SAXIFRACA (Bieb fl cauc. 1 p. i55. et snpl. p. *47) » caulibns glabriuscubs, foliis subciliatis, pilis mollibus, radicalibus longe petiolatis lanceo-lato-spathnlatis crenulatis, caulinis sessilibus integns ligulatis, lobis calycinis acurnindtis basi latis glabris coiollâ duplo brevionbns, appendicibus acumina-UsciUdtis lobis duplo brevionbus If in edilioribus Cancasi ex gr. in Bescbttau (Bieb. risch i)._ Alph. DC. mon. camp p 228 t. 20. f ?. E cespite caules unifloii pluiej, 2-4-poll Corolla infundibuliformis glabra. Capsnlse nntantis lobi patenies. (v. s.)

ao C AUCHERI, pubescens, canlibns ascendenibus uniflons, foliis radicalibus petiolatis, lanceolato spathnlatis apice prae seitim dentatis, canlinis sessilibns lanceolatis, lobis calycinis acutis basi latis corollâ late infundibuliformi tiipio brevioribus, appendicibns acuminatis lobis tnplo breviobus. % in montibus

- Armenia (Ancher.). Habitus pisecedentium. Folia radic. 2-poHic. Caules du-
plo longioies. 1 lores erach Lobi calycini brevioies quâni in C. Biebeistei-
nianâ, folia laliora quam in C saxifragâ, planta nndique magis pubscens (v. s.)
- si. C err IATA (Stev. mem soc des natur. de Mosc. 3. p. a56), caule pilosuscule,
folis radicalibns subsessibus obovato-lanceolatis creuulatis ciliatis, caulinis
ligulatis basi tanlum ciliatis, flore erecto, lobis calyciuis hneari-acuminatis
ciliatis coiollâ infundibnliformi glabiâ dimidio bieyionbus, appendicibus
ovato-acutis cilialis lobis quadriuplo brevionbus. *If* in editioubus Caucasi,
piope Narlzana (I<isch'). — Bieb. fl. cauc supply p 147 • (exel syn. Tourn.).
Alpb DC. mou camp, p 229. Pih ligidi, praecipuc in calyce. Caulis simplici-
cisorous nnicus. (v. s.)
22. C. AITAICY (Alph. DC mon camp p 229, t 10. f. 3), caule glabro nm-
floro, folns radicalibus petiolitis lanceolatis crenulntis glabns, caulinis ligu-
lalis subdentatis glabriusculis, tubocalycis pnbescente, lobis ovato-acuminatis
glabiuscnlis corollâ late Infundibnlifoimi ciliatâ duplo bicvioribus, appen-
dicibus subulatis villosis lobis triplo brevioibus % in editionbus aluicis
Sayanentibus (Fisch'), in Persia (b Kunth'), et DahunA (Turc/ ') — C. Sa-
nensis Fi*ch^T cat h. gor 1808. non Pall. C. fiigida Pall in h. Lamb ! C. pi-
losa Ledeb ic. pi. fl. ross t. aog, fl. alt. r. p a4J. non Pall, (v. s.)
- a3. C DSYANTHA (Bieb fl cauc suppl p i/»7), canle unifloro, folns radicahbns
ovatis acutis vel obtusis petiolatN cienatis glabriusculis, caulinis hes&ilibus
paacis lanceolatis intciis pubescentibus, calyce pubescente, lobis ovato-
lanceolatis coiollâ latè Infundibuliformi interne et ore barbatâ tuplo breviori-
bus, appendicibus minimis subulatis. % in ins Unalaschka (Gbamiss.¹ Fi&cb !),
Bebring (Stell) nee non prope fret urn Behring fCbonsinh Kunth¹)—Grael.
sib. 3. p. 160 n. a8 Reichb. ic. i. p. 70 t 85 f 178 Alpb. DC mon t. 10.
f. 4* Folia bieviora, radio, magis crenata, quam in piiore. (v. s.)
- i|. C. ArLiowii (Till, fl. Delph. 18, fl Dauph. 1. p. 3oa et 333 > 2 p. 5|i t. 10),
caule simplici saepius unifloro subpiloso, foliis ciliatis, radicalibus linear-
lanceolatis subintegris, unis obtusiusculis, caulinis lmeaiibus, lobis calycinis
lineari-acaminatis coiollâ campanulatâ subbnrb.itA dimidio brevioibus pilo-
sis, appendicibus ovato-acutis cihiatis lobis triplo bievioribus *If*. in Alpibus A
Cenisio (DC'), ad Galloprovinciain (h. DC'). — Lam. et DC fl fi. n a85t
C. alpestns All. ped p. n3. t. 6. f 3 (exel syn. Touin) non Lapeyi. C
nana Lam. diet i.p 585 (v. s.)
-)6. *spathulaea*(Lam. et DC. 1. c), foliis radic. spathulatis, caulinis subdentatis.
(v. s.)
5. C. PALLASIANA (Roem. et Scb 5 p. i38 ex de "Vest in lilt"), caule unifloro
foliisque lanceolatis sen alls petiolatis glabris, flore nu tan te, foliis acutis.—
in Sibnia (de Vest) Folia acute senulata nhia polhcaia; canlina 2-3 lin.
longa. Corolla pollicau's calyce dimidio major.
26. C LiGUIARis (Lara, diet 1. p. 585), canle 3-pollicari folioso tenui et fere
glabro, foliis oblongis angustis obtnsis integris leviter ciliatis, floie electo
terminah, calyce h»spido, lacmiis fere lineanbus sinubus obtectis, coiollâ
caropanulato-mbulosâ subbaibatâ. (ex desc. Lam). — Colebatui in borto
Paris ubi alpina dicta erat. G. Alhonii, vel C. b.ubata uniflora videtur.
- ## *Pauciflo+ce vel multiflorce, flonbus non capitatis.*
- aj. C SAXATIUS (Linn, sp p 237. exel syn Tourn), glabra, canlibus erectis,
folns luteogns, radicalibus rosulatis snbspathulatis, caulinis ovato-acutis, ra-
cemo paucifloro, lobis calycinis accummatis corollâ tubulo&â dimidio breviou-
bus, stylo exseito *If*. in CretA (Bocc) ad rupes maritimas (Sibth. prodr.)
Trachehum saxat^e, etc Bocc. muš. p. 76 t. 64
28. C HETEROPHYLLA (Linn. sp. T. p. 240), gjaberrima, canlibns erectis sim-
plicibus, foliis mlegns, radicalibus snbspatbulalis, caulinis ovato-rotundatis,
floribus solitauis axillaribus, pedicellis folio brevioibus, lobis calycinis amitis,
snubus subdentatis, coiollâ campanuhto-tubulosa extiis velutina. *If*, in ins

Chero Archipelagi (Tourn.).— SJbth! ctSm. prodr. i. p. 139. fl, grace, t. ao8. Alph. DC. mon. camp. p. 233. C- .saxatilis foliis infer. Rellidis cscteris Nam-molarise. Tourn. it. i. > 243. c. ic. (v. s.)

29. C OLIVIERI (Alph. DC. mou. camp. p. 233. t. 9.), pubescens cinerea, cau-libas erectis simplicibus, foliis subintegris, radicalibus spathulatis, canlinis ovatis vel ovato-rolundatis brevi-pedicellatis, floribns approximaf is, lobis caly-cinis acuminatis corollā infundibuliforini velutina (hiplo brevioribus, .sinubus sabdeutatis. Qf in ins. Delos (Olivier!). Caules pi u res 8-9 pollicares e'r ad ice crassā. Mores 3-G ad apicera cujusqac caulis snbsessiles. Pubes oculo nudo vix perspicua. (v. s.)
- o. C. CANDIDA (Alpb. DC mon. camp. p. 234), paociflora, pailidc incana, • canibus erectis simpliribus, foliis radicalibns spathulasis subintrgris, caulinis ovatis sinuato-dentati* brevi-petiolatl lobis calyciu acuminatis corollā infun-dibuliforai glubiūculā daplo brevioribus, siubus subdeutatis. 2f In Oriente , ad rupes fiissouloun (Olixier!). Caules pin res 3-5-pollicares e'r a dice crassā. (v. s.)
- 3i. C. CALAMENTHIFOMA (Lam. diet. 1. p. 585), pubescens cinerea, caulibus de-cumbentibus rumosis, foliis dentatis , radicalibus rosulatis subspathulatis, cau-lini.s obovatis, floribus axillaribus et tcnninalibus, lobis calycinis lanceolatis corollā tubuiosā veluiuuā dimidio brevioribus, nppendicibus brevissimis. % in ins. Naxo (Tourn.). C- saxatilis foliis infer, liellidis caeteris Nutnularise sab-hirsutis creuatis ac vélati rugosis Tourn. cor. 3. Vélin du mus.! Desf. choix de pi. du cor. t. 27.
- 3a: C. APPENDICDLATA , pabescens, caulibus adscendentibus, foliiscrenato-den-tatis obovatis, iloribus axillaribns et terininalibus , lobis calycinis latis acumi-natis, appendicibus ovato·acutis pilosis maguis, corollā tubulosā pubesceiite lobis calycinis vix dimidio longiore. ^ in ins. Chio. (Aucber! n. i832. sub no-mine C. calamentifulifoliae.). Caules 3-5 c radice crassā, suhpedales. Folia vix pollicaria, petiolo brevi marginato. Pedicelli folio breviores. Sliguata 3. Dif-fert. à C. caiaraenthifoliā appendicibas calycinis bene conspicuis a Jineas longis valdē liirsntis. (v. s.)
33. C. DICHOTOMY (Linn, arnceu. 4- P- 306), pilosa , pilis rigidis, canle erecto ra-rroso, ram is dichotomis foliis sessilibus oblongis vel ovato-aculis subiutegris , floribus soliliariis inter ramos vel folio opposilis, lobis calyciu acuminatis basi latis erectia corollā tubulosā glabru brevioribus, appendicibus ovato-acumina-tis lobis dimidio brevioribus non adpressis. (X) circa mare JYJeditermneum ex-ceptis Galliā mer. et Italiā sept. —Bocc. pi. rar. sic. p. 83. t. 45. f. 1. Jacq. coll. 5- p. 36. t. 12. Siblh. fl. gra'c. t. 211. Sw. brit. flow. gard. t. 280. C. mollis /f. Willd. ap.'i. p. 910. C. Afra Cav. ann. de cienc. 3. p. ai. C. decipiens Boem. et Scb. syst. 5. p. 14-1. Flom-s ccruni, pedicellis 1-4 lin. longis. Corolla dirai dio vel tertia parte lobis calyc. longior. (v. s.)
- j8. brachiata (Alpb. DC. mon. camp; p. 237), appendicibus, calycis obtasis adpre.ssisi.— in Hispaniā merid. (Boiss!), Mauritanīa (Thib. Salzra!) et Mesopotamiā. (Audi.! sin. u°.). C. brachiata Salzm! ined. Appendices ca-lycis in eodem speciutine nunc obtusi nunc acuti. Accedit ad C. stiigosam. (v. a.)
34. C. PROPINQUA (Fisnh. et Mey. ind. sem. b. petrop. ann. i835. p. 32), his-pida erecta, ramis dlcfaotorais, foliis sessilibns oblongis acutiusculis denticula-ris, floribus pedicellatis in dichotoiniis vel terminalibns, laciniis calycinis li-nearilanceolatis corollā infundibuliformi 5-iida duplo brevioribus. (T) in sterilibusA.derbeisch.au Persia? sept. Afiinis C. divhomiiae sed capsula qua-druplo minora , semina contrā sextnpllo inajora. In scctione Medium ex cl. auct.
5. C. STRIGOSA. (Russel! descr.^>f Alep.), piloso-slrigosa , caule erecto, ramis dichoton»»» foliis sessilibns lanceolati.s integris erectis, floribus solit^tiis inter raraos vel folio op posit is, lobis calycinis longe subulatis basi latis erectis corollā tuboloso-campannlata subbrevioribus, appendicibns ovatis obtnsis ad-

pressis lobis dimidio brevioribus. (*If* in Syria^a (Labill.) Auch! n. 170a. ann. 1836), propè Aleppum (Rnss.! Auch! 11. i85i et. i855 ann. i336) et iuTauro (Kotichy! 349). — Alph. DC. mon. camp. p. a36\ ^Vahl symb. 8. p. 34? C. Russeliana Roem. et Sch. syst. 5. p. 142. Caulis superm; dichotomus. Folia liueari vel ovato-lanceolata. Flores cernui petlicellali. Pili uudiquè crebri rigidi et patentes. (v. s.)

36. C. MOLLIS (Linn.! sp. 1. p. 237), velutina cinefascens, caulis adscendentibus, foliis sessilibus subintegris sericeis, radicalibus confertis obovatis vel spathulatis, caulinis ovalis rotundalis patentibus, iloribus paucis laxè paniculatis, pedunculis unilobis terminalibus et axillaribus, lobis calycinis lauceolatis erectis corollâ campanulaâ glabra dimidio brevioribus, appendicibus aculis brevissimis tubo calycis brevioribus. 9^a in Hispaniâ merid. in regno neapolitano (Ten.! in h. Hook.), Crelâ (Tourn.) et Mauritaniâ. C. cretica saxatilis Rellidis folio magno flore Tourn.! herb. "Velutina in inns. inst. p. i n. (excl. syn.). C. mollis Curt. hot. mag. t. 404. (excl. syn. Bocc. et fiarr.). Alph. DC. mon. camp. p. 238. C. velutina Desf.! fl. alt. 1. p. 180. t. 5i. Radix crassiuscula. Caules basi simplices. Flores erecti. (v. s. et v.)

0. *microphylla* (Alph. DC. 1. c), foliis caulinis mihiinis ovato-acutis subdennatis. In Hispaniâ merid. C. xnicrophylla Cav. ann. de cienc. 3. p. 19. (v.s.)

37. C. EHULIS (Forsk.! fl. a²gypt. arah. p. 106 et 44) hispida, caule erecto, foliis ovato-lanceolatis suberenuatus, lobis calycinis linearis-lanceolatis corollâ hispidâ tubulosâ wqualibus, appendicibus amplis obtusis longitudine lobi. *If*. in Arabiâ felice (Iorsk.). Radix crassa edulis. Caulis seunipedalis ramosus (Forsk.) vel simplex (in h. Banks) unitloius, Lobi calyci parium acuti.—Alph. DC. mon. camp. p. 2J5. (v. in Banks ann. 1828.)

38. C. DULCIS (Decaisn! flor. sinai. in ann. sc. nat. scr. 1. vol. 2. p. i5&) cespitosa ramosa puhescens, foliis ovatis ohtusis sinuato-dentatis, inferioribus sessilibus, superioribus subarplexicaulibus, iloribus pancis solitaviis terminibus et axillaribus, lobis calycinis lanceolatis corolla puberula tubulosa penlô brevioribus, appendicibus ovalis subaciatis lobis duplo brevioribus. *If* ad rupes mont. Sinai (Decaisn! Schimp.! u. 338) et Horeb (Aucher n. 1848 et (r* arm. i636). Radix craita. Caules 4-6 polices longi adscendentes. Plauta undique incano-velutina. (v. s.)

39. C. LIBANOTICA., hirta, caulis virgatis simplicibus i-3-floris, foliis linearibus repando-subscrratis, inferioribus longe pectiolatis, superioribus rarissimis, floribus subsessilibus, lobis calycinis lincari-acuiis corolla intindihuliformi glabra triplo brevioribus, appuudicibus ovatis ohtusis longitudine lobi. 2C in editionibus Lihau (Aucher ! 11. 1877), in monte Dgelwl Cher prop*, Damascum. (Labill.). C. stiinta Labill. j>l. rur. syr. dec. 5. I. 4. uon Linn. Caulis 6-8-poll- adscendeus. Liubi /oliorum radic. bipinnatae angustati petiolis ^equates. Flores erecli, nnuc ilos nuicis terminalis. (v. s.)

40. C. STRICTA (Linn. sp. a38, uon Labill.), caulis pilosus ramosus Virpalis foliis ovato-Janccolatis acutiserratis pilosis, caulinis sessilibus, floribus panels terminations et axillaribus subsessilibus erectis, calyx glabro, lobis lanceolatis corolla tubulosa triplo brevioribus, appendicibus ovalis aniplis longitudine inborum. *Or*. in ArmAniu (herb. Tourn.! elGraeciâ (Sibth. d'Urv.!). — 1. 9.; *an-* talis folio longo rigido aspero flore sursum spectante Tourn.! cor. p. 3. Aubriet in vélins du mus.! Desf. choix de pl. du cor. p. 38. t. 28. Alph. DC. mon. camp. p. 259. Folia radicalia desuat in specimine paucifloro Tournesortii (v. in h. Tourn.)

41. C. JASCONIFOLIA, caulis virgatis simplicibus unifloris pilosis supernè nudiusculis, foliis linearibus acutis birtis, inferioribus vix petiolatis, supremis minimis, flore erecto bracteolato, calyx glabriusculo, lobis calycinis linearibus, corolla infundibuliformi glabra duplo brevioribus, appendicibus ovatis adpresso lobis subbrevioribus. 2C in Cappadociâ (Aucher! n. 1878, et ann.

- 183G u. 2G00) Radix crassa, ande c.mlf s 3-6, erek, 4-f>-polbcarei. Folia rodica ha polliccm longa, superue icgulariter deciescentia et rarescentia ut in Jasione. (v. s)
42. C. SAHMATICA (Ker bot. leg. t. 287), caule simplici stria to pnbescente, foliis Sqbtomentosis mfenoribus petiolatis coidatis lanceoato-bastatis creuato-dentatis, supeuoibns sessilibus ovato-lanceolatis seirato-dentatis , floribus sparse racemosis nutnntibus,<calycis tubo densè piloso, lobis velutinis corollâ campannlata extus velutinâ duplo brevioribus, appendicibus minimis ligulatis veln-tims.^in hubdlpinis Caucasi (Bieb.). C. betoniesefolia Biehl. pi nov. h Spreng. p. 14. Bieb fl cauc. 1. p. i5i. et suppl. p. 144. (non Sin. etSibth.) C. gummi-fera Willd. lei. in Roera. et Scb. syst. 5. p. 144. C. commntata Roem. et Sell, ibid. p. i43. (v. v. c.)
- fi. glabia* (Alpb. DC. mon. camp, p 240), caule, foliis et etiam calyce gla-bus. C. sarnidtca Sims bot. mag. t. 2019. Lodd. bot. cab. t. 5S1.
43. C. LAMiiFOriA (Bieb. fl. cauc. 1. p. i54. suppl. i/4), caule simpljci tereti pu-bescenle, foliis crenulatis subtùs incanis, infeiionbus petiolatis snbreniforim-hns, supeiioribus sessilibus ovato-acntis, flonbus racemoso-spicatis secundis, caiyce incano-velutino, lobis acuminatis matgine revolutis corollâ campanulalâ externe subvelnlinâ fauce barbatâ tiipio quadiuplove brevioribus % inPonto (Auchei' n. i850 ann. 18J7. et 1601. ann. 1836) Caucaso praeseitim Iberico (Bieb) ct Mediâ (Buxb.). C. Albaiac folio, floie oblongo pmpurascente beib. Gandelsh. specimen steiile ex Gbam. linn. 1833 p 3ao Etiam in h Tourn. spec, stcrile sab pbrasi satis simili anno i830 \idi. C foliis Iainii, etc. Buxb. cent. 5 p. 10. t. 18. C. lamiifoha Cbam 1. c. C. alli.uifolia Salisb parad. t. 26. Alph. DC. raon. camp. p. 241. non Willd ? (v. s. cnlt. et sp.)
- fi. macrophyUa*, foliis ladic. La&tatis. C macrophylla Sims bot. mag t 912.
44. C. ALLiARiiEtOLiA (W»lld. s^ i. p. 910), caule suprà in paniculam amplam decomposito, foliis ntrinque vuidibn** subtus in nervis et lete venoso hutis, pilis ligidis albis in p.iginâ supei. rarescentibus spasis, iloiibus semipollini-caubus, caeteris nt in pia?ccdenle. —in Cdppadociâ. C. Cdppadocica , iect*ci*, folio Allianae, florealbo pyramidalo herb. Gundelbh n. 107 ex Cham in linn. 1833. p. 319. C. alliaiaefoba Cbam. 1. c. (non Alpb. DC mon. camp. p. 241 quea C. lamnfolia Bieb. nee Reich, ic. 3. p. 2. t. 202. f. 345 quse Symphy-an-dia pendula). An veiè à i| lamiifolia Bieb. di|eisa?
45. C GROSSEKII (Heuffel plant bung. nov. dec in. flora i833. n.23), caule simplici angulato piloso, foliis bispidis, inferionbus cordatis petiolatis inaequa-litei et duplicato cienato-dentatis, sum mis ovato-acutis in petiolum aJtenaa-tis, pedunculis axillanbus racemosis 3-fidis, calyce setoso-ciliato, lobis lan-ceolatis patentibos apice levoltis, appendicibus lanceolatis lobis triplo bre-vioribus coiolla lobis calycinis duplo tuplovè longioie angulis bispidâ. % in HnnganA. Radix crassa lignescens. Cauhs 2-3-pedalis, interdùm ramosus Cololla saepe margine barbata caerulea. Stigma 3-fidum Habitus et inflorescentia C. Tiachelii, sed calyx appendiculatus. (v. \. in h. genev)
46. C. INCURVA. (Aucher! n. 1864), caule simplici adscendente tereti pnbescente , folns crenato-dentntis puberulis petiolatis cordatis o\ato-rotundatis, floialibus sessilibus ovatis, floribus paucis axillanbus et terminahbus, pedicellis brevibns, calyce pilosiasculo, lobis amplis ovato-aculis coiolla infundibulifouni externè subveluiñ aie villosulâ duplo brevioiibus, appendicibus ovatis obtusis lobis snbbrevionbus. If. ad radices Olympi Thessal. Caulis pedalis et ultrà apice piae-aeitim tomentosns Limbus foliorum i-3 poll longus latusque, petiolis supe-lioium margmatis Lobi calycis 3 lin lati' 6 hn. longi. (v. s.)
47. C VIOL^FOLIA (Lam diet. i.p. 587), bumihs pauciflora pilosa, caole erecto, foliis radicahbus petiolatis ovato-rotundatis coidatis crenatis, caubnis ovato-oblongi*, dentatis, lobis calycis ciliati lanceolatis longe acuminialis rorollA cam-panalatâ parum Inevioiibus, appendicibus ovato-aculis lobis dimidio bievio-nbs. —m b. Pans, cuha, ann i, G5, tanquam e Sibina. — Alpb. DC. mon.

camp. p. 242. Gaulis 3-4-pollic pilis rigidis. Moies 2-3 nutantes. Seqnenti .ifiinis. (v in b. Juss.)

48 C PUHCTATA (Lam diet. i. p 586), pilosj, canle simplicieerto paucifloro tereti, folns ovato-acutis crenatis, caulinns subsessilibns dentalis, flonbus nutantibus, peduncolis i-3 floris, lobis calycmls cilialis longe lanceolatis coiollā carnpanuiā punctatā interne lanuginosā triplo bievioribus , appendicibus ovato acutis lobis duplo brevioiibus. % ID Sibiu.ř orientali, Dahuriā (Fisch.) et Japonia. (b. Lamb!). Gmel &ib. 3. p i55 1 3o n ?3. Sims bot. mag t. iyij Schrank b monac. fasc 9 t. 87 Alpb DC mon. camp p 24a. Pi a lit a pedalis Corolla soidide alba maculis purpurascentibus (v s)

49. C DIVERGENT (Willd cnura. h ber. 1. p. 212), pilosa, caule erecto simplici supeine pamculato multifloro, foliis radic subspathulatis crennlati bisi angnMatis, caulinis sessilibus lanceolato acuminahs, peduncuhs dneigentibus, calyce setacro-pilo&o, lobis longe acuminatis coiollā oblongo-crmipanulatā interne lanuginosa 4° brevionbus, (2) in Sibinā (h. Patun'), in Tiansylvanii (Baumg), Hungaia et Bannatu (Kit).— Alph. D(mon camp p. -243 C spathnlata WaldM. et Kit plant, rar. huug S. p. 286 t 268 (non Sibtb) C nu-lansWabl et Horn h Hafn. p 201. (non Lam). Pili iic;idi ha?pe retroisi. T loien nondum aperti ererti, deinde nutantes. Tix à G Sibirirā differt. (v. v.)

50 C SIBIHICA (Linn sp p 136), setaceo-pilosa canle erecto simplici supernē paniculate mullilloro, foliis crennlati, radialibns petiolatis obovatis obtusis , caulinis sessilibns lanceolatis acuminatis, calce biilo, lobis longe acumiuatis corollā infundibniformi inlūs villoHO barbatā tuplo bievioribus , appendicibus formā loboimn &ed dimidio brevioribns (2) in Asiā septi'utriionah et Altaica , in Caucaso, EuiopA ouemali et usque ad Pedemontiuni (All. 1»1].') secus radices merit! Alpium —Grael. sib. 3 p. i54 n. 11. t. aq Jacq. fl. austr. 2. p 60. t. ?oo Sjms bot. mag. t. 639. Bieb (1. cauc. 1. p i55 Alpb. DC mon camp p 244 (v v)

& pamculata (Alpb. Df. 1 c), latifolia, ramis mulliflois divaucatis. — in hoiis Afinis C divergent], (v. v)

y. abortiva (Alph DC 1 c), minima , 3-flora, foliis linoail-subulatis, flo-ribiis minimis —in sircis prope Vindobouai. (Velwich')

hi. C rABvnroiiA (Lara diet 1. p 588), canle pilo<>o lamoso, ramis dūholo-nns, folns cienato-dentatis, tadiqalibus longe petiolatih ovato-oblongis obtusis iii&cjaliter basi intisis, caulinis subsessibbus ovato-lauceohis , panicula multilioiā, calyce pubescente, lobis ovato-acuminatis coiollā tplo bievioribns, appendiuuhj. lobis subspquabbus ov.>to-acutis. y in Ibena. C. orientabs iohis incisis flore mimmo rnnlipliti Tourn • "Velins du mus. non heib. Desf. choix dc pi du coi. deTouin. p. 3(j. t 29 Ann da mus. 11. t. 14. Caulis i-a-pedalis. blores subccinui, parvi, coi TU caeruleā. (v. s)

52 C. CADCASICA (Bieb casp. p 140. app n. 14) , bn rail Is, caulinis snberecits ramosis teietibus scabiis pilosis , foliis crennlati, inferioribns obovatis obtusis petiolatis, sopenoiibus lanceolatis sessibbus, peduncnliji pduciflons divergen-tibus , lobis calytmis acuminatis biito ciliatis coiollā infundibniformi 4° bre-vioiibus, appendicibus ovato-acuminatis lobis dimidio bievioribns. Tf, \n Cau-caso snbalpino —Bieb fl. cauc 1. p i55 Alph DC mon camp. p. %fa "ya liat calyce glabio, segmentis reflexis plus minusve longis. (v. s.)

53 C AFFIKIS (Roem et Sennit, svst 5 p. 140), canlibns hispidissimis simplici-jjus pilis deflexis, foliis caulinis hnrau-lanceolatis setaceo-ciliatis lon"issimis , peduncnlific axillanbus et teiminalibus 3-4 floris, calyce obtecto, lobis coiollī dimidio bievioribus. % in monte S. H. Lujo penius. Hispan. (Broussonet ex Rcem. etScb)

54. C. BARBATA (Linn sp 236), canle recto snbsimplici tereti piloso, foliis villosn snbintegns, ladjcabbus cofertis lanceolatis canlmis paucis ligniatis, iacemo laxo paucifloro, pedunculis uniflous, floribus nutantibus, calycM pilosi lobis mentis, appendicibus o^aUs obtusu lobis dimidio brevioiibus, corollā cainpanu-

latâ oie baibata. % in Alpibus —Jacq obs pars a p. 14 t. 37 Lam diet 1 p 586. Lam et DC ' fl. ft n. 2tf52 Bot mag. t 120b. Lodd. bot cab t 78S 11011 Spreng fl. hal. nee Lapeyr (v \.).

£ um/lora (Alpb DC. inon cauip. p. 247J, pusilla i-2-pollicaus C. biisnla Belhdis folio Pluk. pbyt. t. x53. f. 5. C. Firmiana 'Vaudelli fasc. 9. (v. v.)

55. C. ALPINA (Jacq. enuin \md. 210), humilis, caule subsimplicierecto sulcato, foliis hneaii-lanceolatis crenato-iepandis lanuginosis, ladicahbus confeitis basi angnstatis, floribns pyiamidafim racemosis nntantibiib, pedunculib uniflous, lobis calycinis longe aturainatis coiollâ catnpauulatâ vix. bievionbns lanuginosis, appendicibus ovato-aculis lanugmosib loins multoties bievioubus. ty in Alpibus ouentdlibus et Caipalis —Jacq £1 aust 2 t 318. Rot mag t. 957. Alph. DC mon. camp, p 248. Radix fu&ifoimis. Caulii 3-5-pollicaris. (v. a.)

56. C SPECIOSA (Pourr act. to! 5. p 3og), caule siinplici erceto, foliis scssilibus crenato-repandis, radicalibn^ linean-lanceolatis, caolinis lineaubus, racemo pyrainidaio, pedueulelis uniflous, florilms nutantibus, lobis calycinis lineariacununati ciliatis corollâ campannlatâ dimidio bievioubus, appendicibus ovato-triangularibus ciliatis lobis dimidio bievioubus If in Pyrenaeis et collibus inter Pyrenaeos et Cebennas. — DC 11. fr. 3^e ed n 2854 etsnpl Centb. cat. Pyr. p. 66. C longifolia Lapeyi. fig £1 Pyi. t. 6. (v. &)

&. bicauliSy bumilis, panciflora, stigmatibus 2. C bicanlis Lapeyi. fig. £1 Pyr. p. i3. t. 7. C lougifolia /2 id. hist. abi. Pyr p. 107.

* * * *Fioribus glomeratis*

67. C. CZHORACEA (Sibtb. fl. giae t. 209), pilosa, caule angulato ramoso, fohis undulato-crenatis, radicalibns obovatis megulariter lacimatis petiolatis, caulinib sessilibus lineari-oblongis obtusis, bra< teis ovatis coidatis, lobis calyeis pilosi ovato acntis corollâ tubulo& pilosâ tiiplo brevionbus, appendicibus obtnsis longitudine loboium. (2^ in Thessaliâ C capitata bot mag. t. 811? Reichenb. pi. cut. 6 f» 782? Radix fusiformis. Caulis 3-pedahs erectus. Ioha radic. petiolis iuarginatis inegalanter lobatis , utin sp. 1-9

58. C LINGULATA (Wdldst et Kit. pi. rar. hung. I. p 65. t, 64. nonReichenb. pi. crit), hispida, caule snbsimplici angustato, foliis ses&lilbus undulato-crenatis, inferionbus lingulato-spathulatis, superionbns linean-lanceolatis, bracteis ovato-acutis, lobis et appendicibus calycinis oblongis obtnsissetaceo ciatis corollâ tubnlosâ interne hiisutâ dimidio brevioibus (2) in Hungaria (W. et K.), Croatiâ et Dalmatiâ (Host). Caules pedales, pluies ex eadem ladice. (v. v.)

Sect. 11. EUCODON Alph. DC. mon. camp. p. 25i. Endl. gen. 1.

p. 517. — Campanula a ct b Roem. et Schull. sist. 5. p> 88.—

Campanula verae Spreng syst. \p. 275.

Sinus calycjs non obiecti. Capsula 3-loculaiis

§• 1. *Capsula sessilis_y erecta, valvis ad basin sitis dehiscent. — Europa, nunquam annum, flonbus capitatis wel spicatis.*

Stylus exsertus. Flores fasciculati subpedicellati, capitidis terminahbus.

59. C JACQDINI (Alph DC. mon. camp, p 2S1), caule simplici erecto glabio , foliis re_{mo}te serrat; glabiis, imij. obovatis bievisMme peliolatis caeteris ovatis majoribua obtusiuscnlis, capitulo laxo ebrakteato, calyce veluhno, lobis acutis, corollâ angaste tabalosut glabuusculâ semi-5-bd*ii* lobis calycini* 5° nw-jore lacinus linearibas. % ad parietom Touinrfoiti.mamms.Cieta. Phyteuraa Jacquin Sieb ' h ciet Caules 3-pollicares e basi sublignosa. Coioll* centrales sajpeincuvatae. Capsula 3-loculans. (v. s ;

60. C PETR^A (Linn. sp. a36), canle sublignoso simplici incano, foliis crenalatis snbtùs incanis, radicalibus petiolalis ovato-lanceolatib, brartek capituh densi obtasis flores snbaeqaantibns externe incanis, calyce incano, lobw lineanbus

obtasis corollâ carapanndtâ velutinâ duplo biclonibus % in nionte Baldò et in piov Galtiae dicta Yai loco Les Lscalles d'Lglon (h. Rich'). — Tiachelium majus petraeum Ponae mont. Bald, in Clus. hist p. 333. vel cescr. mont Bald, p. 62 camp, alpina sphaerocephalos Bair. pl pei Gall p. 1^o t. 890 Pluk. phyt. t. 15a. t. 5. C. petraea Poll. elem. 2. p. 150 t. 5 f. 1. Reich pi. cnt. b. f 777 (v. a.)

* * *Stylus inciusus* — *Flores glomerati, glomerulis seepius tenninahbus.*
Caules erecti sunphces

61. C. PTARMICEFOLI v (Lam. diet. 1. p. 570), canibus ercchs simplicibus giabns, fohis letrorsüm ciliatis mtegris, radicalibus confertis lineaü lanceolaiis obtusis, caulinis sessihbus acuminatis, bracteis ovato-acutis, floribus sessihbus axillabus vel ternunalibus sohtaiis vel fasciculatis, tubo calycis gldbn sphaenco lam, lobis ovato-acaminatis eiecu's corollâ tjlindracea triplo brevionbns * in Armeniâ (Tonrn. Anchei' ann. 1837 n 1859) et in Cappadoni (Auch. ann. 1836 n. 2274). Willd. sp. 1. p. 902 Deaf, choix des pi du cor. p 35. t. a5 ann. mus zi. p. 56. t 6 Rcem. et Sch. syst. 5, p 106 C. onentalis foliis Ptarmicse flore oblongo. Tourn. cor. 4. Aubriet velins du mus.¹ — Caqles è radice lignosa ciasst vesligiis fohorum obtectâ snrgentes. Folia non seirata (ut in icona Aubnet), sed Matis letrorsis albis vere ciata. Flores i-3 axillâ quaque, birfcteis 3 basi encumdati. Stylus apice tnlobus. Gapsola tiiloculaiis. (v. s. comin. à cl. Aucher)

62. C. INVOLUCRATA (Aucher' pi exs. ann. 1836 n. 2069. 2602, ann. 1837 n. 1842 et 1857), subpubescens, caule tereti, foliis crenulalis, radicalibus brevJ-petiolatis obovatis obtusis, caulinis sessilibus ovatis subacutis, biacteis amplis o\ato-acutis floies superantibus, lobis calycis pilosi lineanbus corollâ unfundibuliforrai puberulâ lobis vix dimidio longiore. If. in Cappadociâ et Airaenâ. C. pptiae? Kotschy' plant, exs n. 348. Caules 4-10 pollicaires e radice pereuni. Habitus C. glomeiatae, sed bracteae pro planta maioresnon acuminalse. "Vanat foliis ere nu Lit is velsrrulatis. (v. s.)

63. C. FonosA(Ten fl. nap 1 p 71 t. 18\ snbpilosa, caule tereti foliis irregnlanter bi-dentatis, inferionbus petioiatis, petiolo marginalo, hmho subcordato ovato-acuto, biacteis ovato-acuminatis floies subnequantibns, lobis calycinis longe acurainatis cilintis denticul.itis coiolla tubulosa dimidio bievionbus, lobis corollas intus pilosis. If. in legno neapolitano. — Alph. DC mon. camp, p. 2^3. Goas f. pi. lai. p 94 Reich, pi nit 6 f. <65. Vauat foliis bidentatis aut bi-seratis (v s)

64. C. GWKJIBATA (Linn, sp p ?35\ pubescens, caule tereti, foliis serrulatis inferionbns petiolatis, limbo coidaio ovato-oblongo, supenoribus sessihbus ovato acutis, glomerulis termmahbus vel axillaibus, bracteis OVJto-acuminatis floribus bievioribus, lobis oalyccims acuminatis corollâ lufnndibulifurmi dimidio bicvioribns. % mEuropâ, Armenia (Anch.'), Peisiâ (h Lamb.') et Sibnia tota (Fisch ' Turc '). — Smith engl. bot t. 90 Ol d fl. dan. t. 1328 Reich, pi. out. 6 t. 754. Alph DC mon. camp p. a63 ad 258, ubi var. seq.

\$. *speciosa*, floiibns maximis. C speciosa Horn h Ilafn. 2 p. 957. Sims bot. mag. t. 2649 Reich, pi. rut 6. f. 762 non Pouri. In Sibiiâ (Fisch') et Caucaso' (v. v)

y *Nicceensis*, foiiis approximalis ovato-acutis sessihbs, floribus dense spicatis. C. glomei.ua var. All ped. 1. p. 119 f. 1.

rf. *elhptica*, foiiis, longe petiolatis ellipticis miniraé cordatis, bracteis maximis. C elhptica Kit. in Schult. fl austi. ed. 2. p 918. Rcem. etSchult.' syst. 5. p 125. Reich, pi. crit 6. f. 7^3. C. lingulata Reich ibid. f 780 et7<i (v s.)

e. *sparsi/lora*, giomernlis axillanbus. C. glomerata @ Lam. diet 1. p. 583. C. aggregata Willd ennm. h her suppl. 1 p 10 Reich, pi. cnt. 6 f 7(10 et 761 C. glomerata Reich. 1 c. f 755 Note, et Ball), fl ticin. 1 p. 101 t 5 Rcem' et Srh syst. 5. 1. c Lodel bot cab t. 505 (v. t>.)

- £. *cervicariooides*, caule ilexoso hiisoto mrtri altirudine, flonbus termina-libns et axillaribus. C. cervicalioides Rcm. et Schult. syst. 5. p. 128.? Re append .id fl ped p. i3.
 n. *fannosa*, foehls snbtus inoanis. C. petrea All. ped. T. p. n.a. Lam. et DC fl. ft. n. 2845* ad calc. \ol. 3. C. aggregata Reich, pi. crit. 757, 758 non Linn (v. *)
B. pusilla, minima 1-2 poll ices alta, foil is rotndato-cordatis. — in pralis valde siccis.—Reicbb pi ciit 0 t. 7D1. (v. s.)
t. Jlore pleno. — C. glomerata ^ Roem. et Scbult. syst. 5. p. 12/\$.
 65 C CERVICAIWA. (Linn. sp. x. p. 235), pilosa , pilis rigidis, caule sulcato, foliis snbintegiib, radicalibus lanceolatis bievi-petiolaris obini»Iti!»ruli9, caulinis sessilibus acuminatis, glorciulis tennin.ihbus, brarteisovatn-acutis floribussnbrevioiibus, lobis calycims oblongis obtusis cotolla Infundibnliformi dnnidio brevioribns (2)in I'uop.'i teiuperata et septentiiionali atque Sibiria.—Ginel. sib. 3. p. 137. t. \i. OFdei fl. dan. t. 7S7. Lodd. hot. cab. t. 452. Corolla nervis exteine pilosa Stylus flubexsertus.(v. v.)

* " * *Stylus exsertus >vel inclusns — Flores spicenti. Caules erecti simplices.*
Folia sessilia,

66. C. MULTIFLORA (Waldst. et Kit. pi. lar. hung. 3. p. 992. t. a63), pilosa t caule stiato, folns undulato-crenatie, infeiioribus ovato-lanccolatis, raulmis acuminatis, spicae iutennptae flonbus fasciculalis, biactis ovato-acnniinniis , loins oalycims obtusis ciliatis corolla infundibnlifoinu tnplo bievioiibus (2) in Banatu C. cervicalia v<ir. Reirb pi. ciit 6 t. 77<). Corolla glabia. Calix lubo ovaio-obconico glabii&culo. Capsula obtasc tnangulaii (v. s.)
 67. C. SPICATA (Linn. sp. 1 p. aJ'i), hirsuta , caule striato , fohis snbintegrjs, radicalibus conferlis lineaai-lanccolatis, canlinis lineaai-acummatis, 5picå longå basi intenuptâ, floubus. solitauU \el toinalis, lobis calycims ov.ito-acnminatis corollå lufnndibulifoiui tuplo bievoribus.^2)in Kuro[à meudionali, prxseitim ad ladics Alpjuni. All. ped. 1. p 112 t. 46. f. 2. (exel syn Banli rt Tonrn) Alpb. DC. mon. camp. p. 261, ubi seq. var. Capsula sphaeroidea. Calyx hirsutissimus.
ft. ramosa, caule ramoso. — in foveis nivalibus Sndetocam. (Sebum, fl. boheni n. 182.)
y. interrupta spica* intenuptâ, foliis elliptico-lanceolatis.— in Pedemontio. C. spicata var. All. ped. n. 414. ad fin. t. 47. f. 1. Lam. et DC fl. fr. n. 2855.
T Ilornschuchii, parva, foliis lanceolato-ovovatis, corolla majore ovoideâ. — in Alpibus Cannthia?. (Hornschaeb')
 68. C. IHYSOIDES (Linn. sp. x. p. 235. excl. syn. C. Bauh. et Thal. desor.), caule sulcato, lohis integiis pilosis , inferioribus lanreolatis obtusis, canhnlis Jincan-lanceolatis acutib, floribus densè pyraimdatim spicatis , calycis tubo glabio , lobis acnimnatis ciliatis, coiollâ ochroleucâ oblong.i lobis calycims duplo longiore, stylo exerto. If. in Alpibus et Jurasso Jacq. obs. 1. p< 33. t. 21. fl. austr. t. 4TI. Bot. mag. t. 1290. non Lapeyi (v. v.)
 69. C. CONFERTA , caule adscendente sirnplici folio&o anguloso piloso, foliis caulinis scssilibus vel prdunculatis 3-5-flons, iloibus subsessilibns bracteis ovatas deniatas mtegras snpeiantibns, calyce hispido, tubo longe obconico, lobis ovatis latis corolla infundibuliformi rxtus pilosâ aequalibus , stylo exerto. If in Capadociâ ad Euphratem (Aucher¹ n. 3S23. ann. 1837). Canles subpedales incur vi fohisflo rib usque onustj. Folia 5-8 hn. longa 3-6 bn. lata obtusa vel acata. Lobi calycini amplissimi 3 lin. longi 2 l>n. lati PiU ubiquè frequentes breves* patentes. (v. s. comm. à cl. Aucher et Belanger.)
P> g^bra>* caule glabro, foliis lobisque calycinis solùm cillatis, corolla gla^ bra, foliis subintegrjs. (v. s. comm. à cl. Aucher sub eod. num. 3823.)

§. 2. *Capsula nutans, pedicellata, valvis ad basin sitis dehisccns. Lobi calycis semper mtegn.*

* *Flores pedicellati. Folia radicalia scspiūs cordata pectiolata. Ferè omnes perennes.*

tt. Muhiflorce, corollā semper glabrd.

70. C. LATIFOLIA (linn. sp. 233), caule simplici laevi, foliis amplis duplicafo-ser-latis, iarcicalibus petiolatis coidatis ovato oblongis, ciliulis sessibus ovato-acuminatis, floibus racemoso-spicalis, pedunculis i-flois erctis, calyce glabro lobis longe atuminatis corollā maximā campannato-infundibuliforū tñplo bieuoibm. % in liopā, Persia bor. prope Lenkoian (Holicn. en.), in Altaï (Patun') et Nepahā. (Wall. n. ia85 | — Hoi. dan. t. 85. f. 782. Engl. Lot. t. 302 Alph DC. mon. camp, p. 26^a. ubi seq >ar. (v. \.)

£. *maorantha*, canle et foliis pilosiuscuhs, calyce glabro, corollā maximā. — in Caucaso (FJsob. 1, Iberia (Touin.¹) et Olympo (Auchei')). C. latifohd macrantha bot. mag. t. 2^53. 1'is.cb.'ined C. macrantba bot. mag.t. 3347. 1 lores lielerdum mtdiocres tnm loliis pilosis. (v. s.)

y. *enocalpa*, oaule foliisq. pilosis pallidioibus, c.tlycis tnbo liispidissimo. — in Caucaso (Ueb. Tisch'). C. ciocaipa liicb. 11, cauc. 1 p. i4<) C. latifolia var. Fisch ! ined. Folia minus acuminata, dentibus obtusiusculia. (v. v.)

71 C. TR/CHEIILM (Liun. sp. 235), caule auguloso pilaso, foliis scabiis acuminatia giosc̄ orcu.ito-deiiit.itis, iadicalibus ovatis pectiolatis contatis, floribus ltxcia-cempsis, pednnenlis i-3-flois, ralycc snbpilos, lobis eicitis tnanj^ulari-acuminatis coiolla campannlit.i' tuplo bievoribns. If, ia Eaiopā, in Caucaso (Rieb.), SII >J 1 IA¹ et Japōtna (Ihunbj)—Sm. engl. bot. t. II H. dan. t. 1026. Lam et DC. fl. ft. D. 2844. Alpb DC. 1. c. p. 266 C uiticifolia Scbm. (1. bob. p. 73, Willd. sp. 1. p. 90). C. plicatula Dumort. fl belg prodr. p' \$? (v. v.)

>2. floie unico temnnali. Bieb. fl. cane 1. p. 140.

y iloiepleno. C. Fueb&ii flore dupli violacco Theali. flor t. 69. (v. v.)

72. C. RAPUNCULOMFs (Linn, sp. p. 2^4), caule scabuusculo, foliis >cabi» ovato-acuminatis, iadicalibus pt*liolatis coidatis cienulalis, caulinis seirululis, floribus longe lacemoso-spnais bolit.niis, calyce scabriuscuso, lobis lineali-lan-ceilatis deinūm lelexis corollā uifundibubformi 4° brcvioibus. % in Kuropa tenipciatā, Caucaso (Bieb.), moniibns Suwant (Hohen) et Sibiiia occidental. (Patiin') — Sm. engl. bot. t. i360., Fl. dan t. 1327. Reich pi. crit. 6. t. 700. Alph DC. mon. camp p. 268. C. Tracbelium Bull. heib. de la France, t. 319. non Linn, lloies saepius secundi. (v. v.)

6. *calice glaberrimo*, tota plantā plus minusve glabia et inbescente. — in Ucraniā ((. Lleranica et C. noglecta Bess) et inboilis (C. crenata Link eauin. h. ber.alt. 1. p. 214. Reich, pi. cut. 6. t. 702. C. iufundibuhfor-mis bot. wag. t. 2631). (v. v.)

y. *macrophylla*, caule ramoso, raceino multifloro, foliis maximis. — in boitis. (v. s.)

J. *QEmpontana*, floubus pane is laxc̄ laceraosis, prdunculis longioribns erctis, lobis olycinis lationbus.— circā (Enipontum. (Moietli!))

6 ? /*sachehoideis*, raule foliis et prxseitum calycibus pilosis, pjli, ljaJdis allus.—in Caucaso (Bieb. Fisch') et Aimeniā (Aucher! 18J6 n. 2477, 1837 11 1846) — C. tiachelioides Bieb. fl. cauc. !. p. i50. et suppl! Reich, pi. cut. 6. f 701. C. lunariaefolia Reich, pi. crit. 6. ic. ^m n5o (An Willd »). (v. v.)

£. *nana*, caule abortivo i-3-floio. — in valle Anzasca et alibi, (v. s.)

7. C. BONONIENSIS (Linn. sp. i.p a34) scabra, caule simplici, folii* sei 111- Idtis ovato - aenminialis snbtus pailidis, iadicalibus coidatis petiolatis superio »ibus amplexicanibus, floibus numciosis parvi&longe lacmosis, lobis caly- ^nis aunminatis coiolla infundibuliformi 4⁰ brievoribns. If. in Europā onen-

- tali, Sibiiā occid et Caticaso. Reich, icon. tent. a. t lit t aai. Alph DC. mon. camp. p. 270 C Thai i an a Wallr ! &ch. ciir p. 88 (v. v.)
0. *obliqmfoha*, foliis radicalibus longioribus C obhcjuifolia Ten.! fl. nap. prodi. p. 16. fl. n^otp. 1. p. 99 t. 17. (v. &) y. *lychnitis*, ramosissima malfiflora. C. lychnitis Hornem. h. Hafn 1. p. 10,9 (v. s.)
- <T *Ruthenica*[^] foliis lationbussubtus tomentosis. In Caucaso et Tauriā. C Kuttbenica Bieb. fl. oauc. 1. p. 151. et suppl. Sims bor. mag. t. a65i. (v. s.) it *simplex*, caule siinplis Mino. C. simplex. Lam. et DC ' fl. fi. 3. p. 730 (v.s.)
- f. paucijlorce i>el umjlorce , corolla'scepihs glabrei*
74. C. COLT IN A (Bieb fl cauc 1. p i5?, suppl. p. 14 J), caule Minphci, foliis inferionbns lonqc prtinlatis ovato-oblongis cienulatis, mediis lanceolatis, sn-peiioiibns Hnedii-acniuinatis, floribus paurois sedindis longe peduncolalis, tubo calycis bispido, lobis eie<ij> lanceolatis* corollā infundibuhfoinn dimidio bre<ij>oribus % ill Cancaso (D'reb Stev.¹) et in Anatoliā orient Aucber! 18J6. n. a'335, 1837 n. i854. — Bieb. pi. iar. ross. 1. t. 42. (v. s.)
- /? tubo calycis giabio.—G. collina but. mag. t. 927. (v. v.)
75. C. PAUCIFLORA (De>f choix de pi da cor. p. 36. t. 26, ana. mns. 11. p. 57. t. 37) oanle lamoso, folus dentnto-&enatis, radicahbus ovato-rotundatis petiolatis, caahnis ovatis brevi-petiolatis, floibus paucis solitariis terminalibus, Iaciniis calycinis isubulatis ectis coiollā infundibnlifoimi dimidio bievioibus — in ft ut ice I is moutium Cietae (Touru.). Glabia sesquipedahi, floribus erectis.
- 76.. C. WEMOROSA (Alpb DC. mon. camp p 274)* glabia, caule simplici ecto virgato, foliis ladicibus longē petiolatis coidati<> ovato oblongi* iemot[^] crec-natis, caulinis sessibus lanceolntis repande serratis, lacenio luxo, Iaciniis calycinis subulatis corollā infundibuliroiini dimidio bievioibus If, in Austria; et Moravia; nemoiosis (Scbiad ' mss). C. elongata I'oitenchl (non Willd.) Accedit ad C. rbomboidalis var. fi. (v. a.)
77. C. RBOMBOIDATIS (Linn. sp. 233), caule simplici eiceto, foliū seMilibus ovato-acutis seiatis, iloiibus paucis laxe l'iceinosis, Iaciniis Cdlyciuis &ubulatis erectis corollā campanulatā dimidio bievioibus % in montibus Kuiopae temp. Barr ic. rar. 78. t. 567 C azurea bot. mag. t. 55i. C. mbia jonrn. et flor. des jard. i33a. p ct t. 120. (v. v.)
- >S. *lanceolate* (Alph DC. mon. camp. p. 276), foliis confertis lanccolatib snb-integris C. lauceolnta Lapeyr. hist, abi Pyi p. io5 czcl. &yu. All. (v. s.) y. *lejlexa* (Alph. DC. 1. c), latifoha , lobis talcyiuis iellexib (v. &)
78. C. TRICHOCALYCINA (Ten. fl. neap, piodr. p. 16 11. nap. p. 67. t. 16), caule simplici ereoto, foliis bicvi-peholatis ovato-acutis giosse seirnlis, Jloribus paucis racemosis, 1 acini's calycinis reflexis Ion go capillaibus coiollā iufuudi-bnlfonni piofundc 5-iida subxquabbus. % in ifgai Neapolilani, Siciliee (Guss!) et Cretae (Sieb !) monlibas. — Alph DC. 1. c. p. 276. (v *)
79. C CARNICA (Schiede! in Mert. et Koch Deulschl iloi. 2 P-^{r58}), caule adscendente dcibili paucifloio, foliis glabiis, ladicibus longe pcliolalis rotundatis coid.itis dentatis, infeiiotibus obovititis linc eol.itis\|P, supenoibus lmeanbus gracibus, Iaciniis talycinis longi&sunis bncaibus leilexis corollā Aqnahbus. %in Cainlola (Scbiede! Graaf.) et Cariniae (Welwilch¹) alpibns—Alpb. DC mon. camp. p. 277. Koch syn. fl. g**nn. p. 468. C. huifolia Scop eain. 1. p. 144. Yauatqioaclamptndiaemcoiollae. Petoli folioium ladic a-3-pollicares j limbus 4 lin. latus. Lobi calycini aute piaeflorationem j»»n reflexi. (v. 8)
80. C. HOSTII (Baumg. en 3 p 34?), caule erecro paucifloio, folii* maigiuc scabio-cihiati_{si} radicahbns paucis rotundatis coidatis angulato-dentatih, canlinis lanccolatis et lmeanbus, alabastris nulantibus, Iaciniis calycinis linean-ubulati!. patentibus reflexive coiollā infundibuliformi bievioibus If> in monti busaastiaccis.—Host'fl.aubti.i p. abi. Alpb. DC mon. camp p 277. (v v)
- 81 C. rrrioi.AiA (Alph DC mon. camp p. 278), glabn lima, Rimplex, pau-

ciflora, foliis radicahbus longe petiolatis coidatis lotuudatis dentatis, petiolis maiginalis, canlinis iufeonbus lanceolatis remote dentatis petiolatis, sape- rionbas linearibus mtegris, lobis calycinis erectis snbulatis coiollâ campann- latâ dimidio brevionbns If. in Amciicâ boi. propc lacuni Seivi (Richards!). Caulispedalis. L'ctioli fol. inf sicpius niaigmati Alabast** erecta? ex spec. sice. (v. s.)

- 8a. C LINPOLIA (Lam diet. i. p 579), caule erceto, fjiis radicabbus pancis petiolatis ovatis smuatis, caulinis linearibus integiis, L<<cinii6 calycinis longis erectis, coiollâ campanulalâ atuplâ lobis calycinis duplo tnplove longiore. T& in Europde medi^a moiibis et m Anieucâ boieali ocud —Larn <t DC ' fl. fi. n 28J4 Alpb DC. mon camp, p 279. Meir et Koch Deut&chl ilor. a p. i>7 Hook (1. bor. am 2 p. 27 C angustifolia Lam. ill 2499? Species lumis polymoipba. Alabastia uutantia (v. v.)

yg. Vaidcensis, pubrscens, C Taldensis All. ped 1. p. 109 t fi f I# c liniloha HcLiike 111 Jatq coll 2. p 8i C unifloid Till.¹ Dauph 2 p 500. t. 10 DOU L C. Robdn Lois fl. gall ed a. v 1. p 140 t. 24 (v v.)
y Scheuchzeu, umiloia pusilla glabra, Iatmiii talycinis lougis —C. Scheueb7cri Vill. dauph. 2. p 5oi. t. ro. exel syn louin 11011 Lodd. hot cab C. montana, etc Ban pi ob> ic 487 C. linifolia Willd sp 1 p 893.
el. Langsdorffiana, glibia, c mleiecto stiibumilot, folns ladicibus ovato- Toinndaiis integiis, caubnib nifeuoib obojato-lanceolatU In Ameicæ, Asiaeqne iegiombus arrticis C. lolundifolia var. lloinein ' C. Lan^sdorf- liana Tisch^T mss G helerodoxa? Bong.¹ >eg. dc Siltba p 3i. loisan species (v. s.)

83. C. ROTUNDIOLIA (Linn. sp. p 1Z7.), foliis radicalibus petiolatis cordatis ro- tundatis cienato-dentatis, caulinis lineaibnj. lanceolatisve, lacinus calycinis snbulatis ectis corolla caropanulata tuplo bievioribus % in Emopa, Sibina et Americi bor occid — OFdei fl dan. iobO cngi bot t. 866 l'lee hcib. aitif. de Paiis livi 2. ic. C mniflorn Huds. fl. ed 1. p. 81 non Linn C minor Lam. fl fr. 3 p. 339 C. vanifolia Salish prodi p 120 C nunuta Savi 2 rent, de la floi ctrusc. p 54 C. Scheubzzeii bot cab t 485 non aboi C. heterophylla Gray but plants 2 p 408. C. Uaumgattenu Beck fl fiaucof et Koch syn fl geim. p 469 Alabastia erecta. Varietates in auctoribns mime- roi*, inter quas bequentes (v v)

0. nteluana, pusilla, colore gnseo, puberula, pauciflora —DC.'fl fr. suppl. n. 28J2 (v s)
y. major, folns caulinis longis lanceolatis, flonbns majotibus. C lotnndi- fohd \$ Lam ' diet. 1 p. 578 (v. s)
\$. tenuifoha, foliis radic. oblongis, caulinis linearibus, caule elongato gra- cili.— M. dan. t 855 Hoifr fl gcim. ann. 1800. p 100

- 84 C OSPITOSA (Scop ' cam 1. p 143. t. 4), bumihs pauciflora, folns radica- hbus confeitis brevi-peliolatis ovatis glandulosso-dentatis nitulis, lacimis caly- cinis linearibus ectis corolla campanulala tiiplo bievioibus If, in montibus Europae mcdie.— Alpb DC 1. c p. ?83 C pusilla Hocnk.' in Jacq coll 7. P 79 exel syn. Scheuchz Zollikoffer tent fl. belv fasc. 1. ic lientb car. Pyr. p 66. C Jlellaidi All.¹ ped 1 p. 108. t 85. f 5 ic pessim. C. punula bot. mdg. t. 512. Flores jam ante evoluiouem nntantes. Pollen violaceum. (v. vt)

fi. pubescens, caule elongato unifloro pobescente, foliis paucis subpilohis, coiollâ latâ. C pubescens Schm ' fl. bobem n 167 cent. 2. p. 67 Reich*, ic bot cent. 1. t 78 Zollik. tent, fl helv. c. ic. (v v)
y. imbricata, foliis basiconfertisimbricalis lanceolato-linearibus numerosis, coiollis angustis.— in Alpibas austriacis. — C. alpina caule fohtoso Bocc inqs. t 10i C Rocom Till. Daupb. 2. 50a. C imbricata Hayne! med

85. C. DIVATICA (Wall.! in R^Axb. fl. ind. 2 p. 97. heib. n. iao3), scabia, pibs ngidij, bievibus tecta, caulibus linearibus angustis subintegiis/laciniis calycmij, erectia subnlatis corollâ campanulâ puberulâ duplo bievioribus % m "n- biosisNepaliae.C. stncta Wall. as. ieseaich.i3 p 374 non Linn. C integrernma Donprodr. p. i55 (v. s.)

86. G DUBtx(Alph. DC mon. camp, p a86), glabra , caale nniflоро, fohis canhnis electi»angustis,infeiioiibusliueari-lanceolatis petiolatis, superioribus longe acuminatis, lobis calycinissubulatis corollā infundibuliformi tubulosā dimidio brevionbus *If in insula Terra-Novac* (Morkon in b. Hook').—Hook fl. bor am a. p. 27. An satis a C. limfolia vel C rotundifolia diversa? (v. in h. Hook.)
87. C PRATENS (Alph DC mon camp. p. 287), glabria , caule humili simplici umiloro superne inagis folioso , foliis petiolatis ovato-acatis subcrenatis ladica-libus cordati* rotund itis Iaciniis calycinis longe acuminatis corollā late oainpanulatā inplō quadriuplove bievionbus. *If in pratis maritirais Terrae-Noyae occid* (La Pylaie¹). f auhs semipedahs. Flos erectus. Corolla amplior qnam ia C rotundifoliā (v. s.)
88. C. PULLA (Linn. sp. a3i), caale buriali unifloro, folhs giabris crennlatodentatis, inferioribas brevi-petiolatis ovafo-iotundatis, auperioibus scsilibus ovato-acutis, Iaciniis calycinis longe acuminatis erectis coiollā carapaiulata ditnidio brevioibus. *If in montibus Imperil Austiaci.* Jacq. obs. bot. i. p. 30. t. 18. 11. austr. 3. t. 285. Sims bot. mag. t. ^gi.
- /2. *ramosa* —C palla var. Scop. earn. 1. p. 143. C. pulla f Linn. sp. a3i?
89. C. Excise (Schleicb! pi. exs), glabria humilis, caulis tenuibas uuiflons, foliis infeiioribus linea-acuminatis, lobis calycinis setaceis patentibus deraum reflexis coiollā campanulatā tiiplo brevionbub, sinubus corulla? exiii>is, capsulā obconicā. *If in edilionbus alpinis rara; circā montes Roseum et Sempronium. — Murmh guid du voy. en YalaU p. 33 et 35. DC. cat. monsp. ann. 181 |. p 86. Lodd. bot. cab. t. 56i. Reich.ic. cent. 1. t. 78. Gaud. belv. a. p. 147 t. a (v. s)*
- go. C WALDSTKINIANA (Rcem. et Sch. syst. 5. p. 99), glibra, canle erecto flexuoso rigido simplici paacifloio, folus sessihbns lanceolatii* serratis mferioribus obtusis, snpeonbus longe acuminate, lobi calycinis subulatis subdenticulati^ patentibus coiollā campauulntā 4° bievioibus 7f in montibus Cioatiae Reich ic cent 1. t. 85.C llexuosa Waldst. el Kir plant. iai. 2. p. 145. t i36 non Mich. C. rupestus Host fl. austr. 1. p. 263. (v. s)
91. C. APARINOXDES (Pursh fl. am. bor. 1. p. 15g), glabria, caule debili adscedente simplu i pancifloro angulis retro-scabro, foliis infenobus linea-obo-vatis, a his linea i-acuminati:*, remote denticulitis retrorsum scabris, lobis calycinis tuaugulaiibas corollā campanulatā dimidio brevioibus. (j) in AmeriCii bor pratis hum id is a Canada ad Geoigiarn. C erinoides Mnhl. cat. p 17. Bigel fl bost p. 54-Nutt! gen i. p i36 non Linn Planta pedalis , habitn Gain. Floies 2-4 , peduncilis divaiicatis unifloris. Corolla alba. Capsnla spbae-loidea "Vanat panicula multiflora (v. s.)
92. C. FLEXUOSA (Micbx ! 11. bor. am. 1. p 109), glabria, canle laevi superne paniculato, rainis erettluscuhs, foliis supeine approximatis subse&sihbni lan-ceolati! utinque acuminatis grosse berratib, lobis calycinis capiUaceis corollā tnbulobO'Campanulata dimidio bievionbus, stylo subex&erto. % in montibus Carolina;.—Alph DC. 1. c. p. 291. uon W. et K (v. s. in b mus. Pai. et Rich.)
93. C. DIVARIovTA (Miobx.¹ fl bor am i. p. 109), fjlabra, caule erecto supeine paniculato, ramis divergentibus tenuibus nudiusculis, foliis sparsis subscsiibus ovato-lanceolatis utrinque acuminatis giosse seiati maiginc scabnuscnlis, lobis calycinis capillacpis coiollā tubuloso-rampanulatā dimidio brezionbus, «ylo subexiscito *If in Caiolinā, Georgiā et Kentucky* —Ell.' Sketch. Georg 1. P 26a Nutt ' gen. p 136 C.iulis sesquipedalis, nee sesquipolhcans ut in Monograpbiā nostrā dicitui eiroie typ. Tlores parvi nutantes azurei. (T. S)
- y. *Pauci/lorce pdosee , corollā extiis pubescente, capsulā fan semper?) nutante — Inflois escentid ad C Erinnm accedenies, nempe pedicellis sccpiuifolio opposws xel terminahlus*
94. C. CANA (Wall.' m Roxb fl ind 2. p TOT. herb, n ia\$4). tomentosa, caulis adscendeutibns, laroosis, folus ses&ilibub approximali-* lanceolatis deutatis snbtus nicanis, floubus teiminalibus, pedicellis bievibus, Iaciniis calycinis lanceolatis dentatib coiollā infundibuliformi pilosā c^aplo breyioribas, capsnla

- turbinatānutante? % in Nepaliae niontibns ~ Alph. DC. mon. camp, p 292.
(v s co mm. ab am pi. coetu mere. Ind or)
95. C. CANFSCENS (Wall' list n. xa8q), hispida, canle erecto, foliis radicalibus confeitis lanceolatis crenulatis, caulims rcmoti* augustioribus repande denticulatis, flonbus lacemosis saepè approxiraalis brevipedicellalis parvis, calycis tubo sphænco, lobij> linearibus integris corollā tubulosā pilosā, capsulā sphælica Q, in Nepalia et Hindustani^ circa Rauipoie.—Alpb. DC. 1 c p. 292. C. Benthamii Wall.' list n. 1290. (v. s com in. ab ampl ccetu mere. Ind. or)
96. C. oLORATA (Wall' in Roxb. fl. ind. 2 p. 101, list n. 1287), caule ramoso pubescente, folns spasis lameolatis acutis repando-denliculatis, pedancuhs elongalis termialibus et axillaribus, calycis tubo pilosissimo obconico, lobis triangularibus integris corollā tubulosā velutinā snbxqnahbus, capsulā turbinatā subnutante. if in Nepalia—Alpb. DC moo. camp. p. 293. (v. s. coram. ab ampl. ccetu mere Ind. or)
f. *Moojtrofnana* (Alph. DC. ibid), foliis minus dentatis. Circā Ladack trans monies Himalayos C Moocroftiana Wall • list n. 1288. (v a)
97. C. PALLIDA (Wall as. res. i3. p 375), canescenti-pilosissima , canle erecto ramoso, foliis elhplicis sinnato crenatis petiolalk , suprerais i>essilibus, floubns terminalibus solitariis pedanculatis, calycis tubo turbinato, lacinns linean-lanceolatis coiollam campanulatam subxquantibus. — IU Nepaliā. — Wall, in Roxb fl ind. 2 p. 100. Don piod. nep p. i5(>. Flores albidi
98. C. RAMUIOSA (Wall.' in Roxb. fl md. 2 p 100, list n. 1286), canle erecto piloso ramoso , foliis lanceolatis sessilibus crenato-dentatis, nervis sublub eminentibna, pedicellis axillaiibus et terminalibus, calyce piloso, lobis latis acntis subdentatis coiollā cylmciac vclutmd duplo tnplōe brevionbns, capsulā tnrbinata subnntante. *)f in Nepalā —Alpb DC mon. camp. p. 294. (v.s. coram ab ampl coetu mere. angl. Ind. or.)
99. C. ALPHONSI (Wall.' list n 1296), hnmilis uniflora, canle pubescente, foliis cauhnis sessihbus lanceolatis acntib mini mis denticulatis superne pilosiasculis subtus incanis, calyce pabescente, laciniis acutis corollā campanulatā pubernlā dimidio bievioribus — ia montibus Nilgbiri Alpb. DC mon camp, p. 294 Capsula ign Planta tota bipolhaiis. (v. s. coram. ab ampl. cajtu mere. Ind. or)
100. C EVOIVULACEA (Royl.' ill. himal. p. 253. nbi solum nomen) , canlibns diffusis adscendentibns teretibus pubescentibus, folns incanis subintegris, inferiobns rainoribns obovatis lotundatis breviter petiolatis, snpeiiionbus ovatis, pednnculis dithotomis, tubo calycis incani late turbinato, lobis ovato-acnmitatisintegns coiollāextus velntinā triplo bievioribus. % in Kanaoi India bor. Caules e ratlice simplici, 4-8-poll. Inflorescentia teiminata ut in afliu. Corolla 6 lin. (v s. comm. à cl. Royl.)
101. C. CASHMIUANA (Royl.' ill. himal. et casbm. 1 p 254. t. 6?. f 1), caule ascidente vclutino pubescente, foliis canlims sessilibus oblongo-obovatis sūbcrenatis iutegiisve incanis, pednnculis nniflōm axillaribus et tcnunalibus, enlycibus velntino^pilosis, lobis 1 emote dentatis coiollā campannatā pubeiuU triplo bievioribus tuangulanbus aculij). If, in Cashran vel Cabcroyr —Floies erecti ci<rulei. Planta hnmilis 4-5-poll. Folia 3-5 lin. longa, 2-4 hn. lata. Flores 9 hn longi (v. s. comm. a cl Royl.)
102. C A^GYROTHRICA (Wall' list ii 7i3S), humilis , undigne pilis albis ob-sita, caule simplici debih, fohis ovatis subdentatis, peduntulis mnflōis terminalibns et axillaiibus nudis, lobis calycinis tiiangularibub integus (oiolla cainpanulatā tuplo bresioubus. — in India' bor. ad Kimaon Planta 3 4 poll. Pe-duncuh nunc dichotomi. Capsula turbmata ba&i dehiscens. (h Royl) Affinis C. CashminancC Royl. (v. s.)
- ''' Mores brevissime pediccUativeI sessiles, terminates vel folio cpositi. Capsula turbmata Rami plus minusve dichotomi. Folia sessiha parva oblonga. — An-mice. — Rouccla Duraort. comm bot. p. 14 Ennui ~~Net.~~
103. C. ERIBUS (Linn. sp. p. a^o) , hispida , foliis obovatis vel ovatis grossè tleu-

tato-lobatis, ilonbus sessilibus, lobis calycinis tuan^oularibus acuininatis electi et deignum patentibus coiollam parvam tubniosain basi pilosam subacquantibus (Y) circa maie Mediteuaneum, in icneriffA (Ledi') et Madeia. (Low ') — Siblh fl giae. t 214. Lam et DC fl. fi. n. 2849. Alph DC inon camp. p. -295 Roncela Eiinus Duiuoit comin. bot p. 14 Erinia campanula Noulet "ann. sc nat ser. a. v. 9. p. 120. Folia superioia saepe 3-loba. Inflorebientia manifesto terminata. (v v)

104 C DRABIFOLIA (*>ibth fl. graec 3.p 11. t 215. excl. syn Tonrn), hispida, fobis ellipiico-oblongis dentatis, floiibus pedicellatis, calycis lacinus semper electis subalatis coiolla ovoideo-campanulalâ bievioibas (l,in Graeria (Sibth.) et Asiâ minoie (Aurher! n. xb38.^ Corolla? tubo albo glabio, limbo cseiuleo piloso. (v. s)

105 C. RHODENSIS (Alpb. DC. mon. camp. p. 297), pilosa, folus inferioribus obovatis snperioiibus integris o vat is, ilonbus terminalibus , lobis calycinis tuangulanbns ciectis denum pateutibus coiolla campanulatâ triplo brevion- bus. (l) ? in ins. Rbodo. (Olivici! in mus. Par)

*• Capsula mi tans^J valvis 3 basi sitis dehiscens — Species inter se affines, radice seu potilis basi cauhum crassutsculd, pedunculis petiohsque gracilibus , floribus parvis Ex habitu in §. 3 locandcpropk, C. Portenschlagianam> sed capsula non erecta wdetur.

x06. C BILLARDIERII (Alph DC. mon. camp, p 303. t. i3. f B), giabra, can- libus adbcendentibuj* folus radicibns longe petiolatis cordatis parvi& J-5-fidis lobis dentalis acutis, supenoribus miuoribus raris vel nulljs floribns pancis> laxe lacemosis, pedunculii* i-5-floii*. ill 1 formibus, calycis tubo sph.-eroideo T laciuuus erectis subino-qualibus filifoimibus coiolla tubulosâ daplo \el tiiplo brevioubus. If in Onente. (Labill '). Pedicelli admodum gracieles. (v. s.)

fi. major, planta pedalis, cauhbus sunplicibus, folus canlinis raris brevius petiolalis ovato-acutis giosse et acute dentatis. — in Olympo Bithyno (Auchei! D. 1847), in Libano(Anchei! 3819). C. Cymbalaiia bibth. et Sm. prodr fl. giae;c. 1. p. i39 ,

107. C HUMILTIMA., sobacauhs glabra , petiolis peduncuhsque flliformibns, hmbis rotuodatis ^-angulato-dentatis coidatis , pedunculis i-i-flois nudius- cnlifA, bracteb lmearibus minimi's, lubo calycis ovoideo, lacinus hneaiibus erectis tubo brevionbus, corollâ infundibuhformi lobis calycjni*. dimulio lon- giore , stylo coiolla sub oquali. If. in montibus Persiae occidentabs (Aucber! n. i86t ann. xS5y et n 3076 ann. i836) Pars peiennis minima. Pedanculi petiolis majores 2 pollicares. Flores minimi terminates et rarius axilla res, soli- tarii. Capsala nutans? sine dubio basi valvis 3 debiscens (v. s. comm. à cl Aucher)

108. C PERrusILLA, glabra subacanlis, petiolis peduncnlisqae radicalibnsfibformi- bus elongatis aequalibas, hmbis lotundatis rordatis snbintegns, pedunculis nniflois, tubo calycis ovoideo elongato , lobis illiformibus patentibus tubam aequantibus, corolla cylindiacaea pice 5-lobâ lacinus calycinis dimidio lon- giore, stylo coiolla dimidio breviore. % ill montibus Persiaj occidentals (Aa- cher! n. i860 aun. 18^7) et in monte Bizotoun (Auchei' n. 2888 anu. i836.). E caule sennpolbcarri vetus>tioribns petiolis obtecto pedicelli petiobqne numero- sissuui intricati 1-2-pollicaeies Limbi 2-4 hn. lati, integr, crtnulati, vel sub- dentati. Capsula nntans? valvis 3 basi dehiscens. Corolla angusta alba per- sistens. Gem talia Campanula, sed habitus sin gala ris. Piaecedenti similhma

109 C CAEKOSA (Wall' in Roxb fl, ind. 2. p 102 list n. ia3a),canle ramoso gla- bro foliique carnosnlis, fohis ovatis petiolatis crenatis, crems mucronulatU, pedicelhs axillaribus paucis longitudine fohorum gracilibus, lubo calycis pyri- formi lacinus acutis longioie, corolla piofunde5-fidat lacnjis ralycinis 4° lon- giore, lobis lanceolatis subinsequalibus, capsula pynformi glabrat.—inNepahâ. Planta hamilis 3-4 pollic adscendens lepensvr Folia glabia vel pilosiuscula, .icutu vel obtusa Flores minimi Capsnla 3-locnlaris erecta ima basi 3 valvii minimi's dehiscens. Stigma 3-partitum (v s)

§ 3. *Capsula erecta, valvis ad basin situ dehiscent — Flores pedicellati. Folia radiulia petiolata sapiis cordata, banpetiolorum scvpe expan m'et persi slente. Omne <> perennes*

*. *Corolla pubescens aut velutina, tubulosa, lobis brevibus Folia radicaha con ferta. — Pauciflorce, Orientates*

n o . C. DAMASCENA (Labill » p]. mi syi. dec 5. p 7 t. 5), pubescens , foliis ladicahbus o\«ito-obovutis subinlegus inranis, caulmis ovatis acutiubculis, calyce velufino, lobis subulntis corollā cylindri aceā velutinā diniidiobievionhas, capsula obovoidea If in Libanu (LabilU Aucher. 11 34q n^on. 18J6, n 18⁹ ann. 1837.). — Alph. DC moo camp. p. 298. Caules fiagiles plures 3-4-pollicarea paucifloii. (v. 3.)

111. C ARGENTEV (Lam.¹ diet. 1 p 58'),), hunnln, foliis ladicibus linea- ubovatts aigenteo-tomentosis subintegns, auperioribus rauoribuj» oblongis , calyce velutino, lobis tiian[;];nlaiibus coiollā tnbnlosā velutinā trlplo biexiuri- bua, capsulā tuibinalā. If in Armenia (Tourn'). — C. oneatalis, s, ixalihs ar- gcutea Loncoji folio Toom ' coi I Alpb. DC. mon. caiup. p 798 Capsula C Eiini bed lobis calyciuis iucurvatii Tloics Mibpauiculali (inh Louin et Ju&s)

1 ta? C. SvnAr\ (Rcem el Scbult. syst. 5. p 133 ex Willd. reliq. ined.), foliis raditahbtis spalhulato-oblongis, caillinis ovalibns sest-ilibui snbsinuatis , canle simpl*i* ad apicem paucittoro.[^] in Syia An biclocanda ?

[^] *Corolla rotata, profundb 5-Jida, externe scepius pubescens. Stylus exsertus Omnes Itahccc.*

n 3. C ETATINOIDES (Morett.' pi. ital dec. 3. p*5), toineutosa, caule subiecto simplici, foliis acnte dentatis petiolatis, Infeioubus oblongis, bupeioibū** ovato-.icutis, lacemo denso, tubo calycis ovoulco, lobis hneaii-subulaiia pa- tentibus coiollaiu piofunde 5-iidam lotatam deqiianiibus , lacimis corollae ex terne pubescenlibub %, in saxosis inontinin Diixiensiniu — Pyaimdalia Clns. our post p 67. t 68 Rapunculus Btixianus Gieg. de Reggio. Zwingr. theati bot p 3921c C elatines Poll. fl. vei 1 p a⁸. non Linn. Sylasroioll.i dnplo longioi (v s)

n 4- C. E&ATINKS (Linn. ap. 1 p. 240 \ plus minūsve pubescens, caule adscende- dente, fohis coidatis grosse et acute dentalii, Infenoubu[^] iotuudatis, aliis. o\ato-acuti», raceino laxo, mho calycis bphaeuco, lobu[>] patentibus linean- lanceolatis subinaequahbns coiollā dimidio bievioiibus * }f m Alpibiii Pedemontii, Dolphiatus, et lacus Laiii piox'tnis (Moretti'). —All ped n 4*?. t 7 (nonbona). Alph DC mon camp p. 300. (v. s)
jS, glaberrima. Alph. DC. ibid. (v. &)

ii5 C GARGINXCA (len.'in (loi. map. add. et emend enim cat. serain h neap. 1827), glabrnscula, caulibus diffusis, foliis infeuonbus leniformi- coidatis cienato-dentatis, supeuoibus ovato-acutis deutatis, taceiou laxo, pedunculis i-a-flori8», tubo calycis sph<eiouleo, lobib pateutibus, lanceolate subinx'qahbus corollā glabiā liiplo quadriuplov bievioiibus. % m mont< Gargano Apuliap (1 en ') et in Dalmatia³ (ex specim cam C. Poitenschla- giana in b. DC. mixlis;. — Ten.' act. acad neap 1827. ic Biit flow gaid sei.a. t. 25a Lindl bot. reg 1.1768(optima). \| ahlrnbergia ilaccidaPiesl sy,nb p 29. t. 18 ic. medioci. non Alph. DC Vaiiat caulibns fohisque glabns vel pubescentibui, foliis plus miniis\dentatis, crenis saepe macionulatis (v s)

y. *Corolla non rotata, glob^a, 5-fida vel sub-5-fida — Radix plus minus crassa.*

116. C. MACRORHITA (Gay heib '), mdice ciassā, caulibus adscendentibus foliis ladicibus petiolalis paivis totundatis coidalis dentatis , caahnis inferioibns ovato-acutis dentatis supeuoribns sessilibuslinean-acuminatis , lion bus termi- nahbns et axillaiibus , alaba6tris eiectis, lobis calycinis. acuminalis patentibus vel leflexi[^] coiolu cunpanulatā diradio bievioubtii, 7f in mpestiihus monti.

Cousson Galloprovinriac (b. DC), Niceae (Ribso'), Monceci (h. Gay ' ct prope San Maico Piceni (h. Moiic') — Alpb DC mon ramp p 3oa C. Pilicicensis er C iapej.fisi Riso' ined. C rotundifolia Bert. 2. p 464 p. irtitn. Habitus omnino C lotundifoha?, bed capsula erecta, lobi calycis leflcxi, radix ciabsa, etc (v j,)

fi. pubescens, canibus foliuque pnbescenibus, lobia calycinis erectis C pUillayS DC ' 11 fi Mjppl n a833.—in collo Tendp (v s)

117 C MORETTIANA (Reichenb |c tai. cent. 4 p 18. t 3ao f 491) et 500 , pilosa liimilis uoiflora , flnus cienato-dentatis paivi*, ladicabbus petiolati* coidato rotandat &, caulinis lninoubns ovato-acutis , lobis calycinis lauieolatis coiolla iuifiindtbulifocui qnadiuplo brevioubas. % 111 Dalmatiā et lyiolu (b DC.)—Alpb. DC 1 c p 304 Beit fl it 2. p 461 C pulla Paiol boir sice, ined Poll fl \ei. 1 p a68 nou Lmu C filifonnis Morett ' pi. ital. dec 8, non Rniz et Pav (v s.)

i tS. C. PoRTPNsmiAGiANA. (Rceni et Scbolt syst. 5 p 9*5) , glabiiscnla , caubns suberectis, foliis intei se «cqualibus peliolatis cordatis lotnndalis acute anguloso-dentatis, flonbus racemosis tuho calycis spbaeroideo, lobis eiectis acnminatis coiolla infundibnlifonni tuplo brrvionbus. %. in Dalmatiā — *Vis stnp. dalm p 2961 54 (exil syn C isopyllae Moi). Alpb. DC. mon camp, p. 3oJ t. 13 fig A. Liidl.bot. leg. t. 1995. Affinis C Garganicae, sed corolla uon profunde 5-iida. (v a)

Q. pubescens, vel solnm velutina (v s.)

119 C. KAIICERIC (Perpenti in Ribl. ital. 1817. v. 5. p i34 c ic.), caubu* suberectis ramosis, ramis i-3-flois , fobis Hubsessilibus ovatis leinole serratis , inferionbus minoibus obovatis , lubo calycis obconico, lobis calycinis longe acnminatis erectis corollā late mfundibuliformi dim id 10 brevionbus. If in montibus urea lacum Lanui et in Brixiensibus —Alph DC mon camp p 3o5. Capsnla obovata. Flores magni suisū spectantes \anat lobis calycinis integrā vel dentatis (v. s)

120. C isoPYLLA (Morett ' append ad Schouw prosp fl ita) p. 22 initio ann 1824), caubus suberectis, foil is omnibus inter se aequahbus petiolatis rolundatis cordatis crenato-denutis, flonbun coymbosis, lobis calycmis acuminatjs coiolla late campanulata dunidio bievioribus, stylo ex&ertn, capsula ovoidea. If. in Liguriā. — Reich ic pi cent. 3. t. 202. f. 344 Alpb DC mon. tamp, p 3of) C flonbunda 'Viv fl lyb. append, de fl. ital p 67 ann. 1824. Lobi calycini interdura dentati (v. s.)

X3i. C. FRAGILIS (Cyrill. plant fasc. 1 p 3Q. t 11. f 2), canibus difflusis adscentibus, folus ladicibus longe petiolatis co id a I is lotundatis obtuse dentatis vel errnato lobatis, caulinis minoibus ovatis lanceolatisque, flonbus laxc co-ryobosis, lobis Cdlycims bneaii lanceolatis acnminatis eiectis corollam p.tten-tcm snbaeqnantibun, stylo exseilo, capsnlā ovoideā lobis calycinis patentibus terminatā. If in regno Neapolitano, foraaque in Siciliā (Cupan. Raiin.).— Ten flor nap. t. 119 C. rotundifolia Cdjetana longius radicata Cop panph. 1. t. 192 (ex Guss J Bocc ic rar p 54. t 27. C. difmsa Vahl sjmb p. 18. C. cochlea 1 ifoha ibid, non Lam. C crassifoha Nees syll. ratisb 1 p 6. aracen. bot. fasc. 2. p 9 t 4 C. Cavolmi a. Ten. syll. p. 94 (v s)

0. *hirsuta*, undique iñcana C saxatilis rotndifolia t etc Ban pi obs p. 10. t 4^>3. C. Barreld Presl symb. p. So t. 19 C fragilis hirsuta Alph. DC. mon. p. 307. Liidl bot. reg 1. 17³⁸- C Cavolmi ^.Ten.' Syll. P 94 (^s-)

122 C. VERB 1 COLOR (Sibth. et Sm prulr.piодr.fi giae 1 p i38) glabia, canle adsceudenlo, fobib seiratib, ladicibus longe petiolatis ovato-acutis subcordatis, chnluns bievi-petiolatis ovalo-lanceolatis acuminatis, floubus longe spicato - lacemosis, lacjns calycinis acuininati* patntibu& deium reflexis coiolla ftubrotatā vanegata dimidio brevionbus , stylo exerto, capsolā sphac 10ldea If in Giaecia —Sibth. fl graec t. 207 link en h. hn 1. p 214.

Alpb DC. mon camp p. 308. C. plamfloia Willd. h. her. i p 210, uon Lam. C Willdenoviana Roem et Sch. sysl 5 p 107. (v. s)

/?.*muhiflora*, foliis megnlantei senatis unduldtis, floubus Inagm* nume-
rosissimis. C. versicolor Andi. bot rep t. 39b. non Gnss.

ia3. C. TIMORir (Morett¹ prosp. di un geogi bot. ir. di Schouw p iy), glabra, caole adscendente vel prostrato, foliisi rouaceis, tadicibus lunge petiolatis ovatis iubcoidatii* irregulanter serratis, caulinis brevibns petiolatis ovalo-acutis grosseseiratis, floubus racemosu, lobis calycims lmeau-lanceolatis patentibus corollâ late campanula!* dimidio bievionbus, capsulâ sphjrnc % in ie-
gno ncapolitano —Ten. syll. p. 97. C coryumbo&a Ten piindr. fl neap p. i5 non Desf C Rosani Ten ' fl nap. 3 p ?o5. t. 120 C vei&coloi Cuss pi. TAT. p. 92. non Siblb —Corolla in ic fl. neap fnndo violacea, medio pallida, lobisque cseruleis. An satis a C \versirolore diveisa? (v s)

u4> C. PYRAMIDAHS (Linn sp p 233), glabra, foliis glanduloso-dent.uis, mfe-
rioribus petiolati& ovato-oblongis subcoidatis, cauhnij* he&siblk ovato-lanteo-
latis, floribns nomeiosis pyramidaiim lacemosis, lobis calycmi*, acuminatis patentibus coiollâ late (ampanalatâ 5-fidâ dimidio brewonbm, tapaula sphx ncâ profunde solcatâ % m ditione aosttiacâ pi ope mare Adiaticum Lob
hiit p 177 ic. et t. 327 Sweit floil t. 16 f. 2 Hoit Eystet se&l 1. | 7. f. x Jaurae St.-Hil pi de Pi a nee. 1. 416. Alpb DC mon tamp p. 310 (v. v cult.)

JQ5. C. TACTIFLORA (Bieb fl cauc 1. p. r53), cauleerecto iamoso, foliis sessili-
bus ovato-lanceolatis acute serratis, floribus laxe panicnlatis, lobis calycinis latifirmis acntis serrulatis corolla' alb id 'a 5-fidâ late campanalatâ dimidio bievion-
bus, capsulâ ovoideâ % in Cauca&o et Iberia' (b. DC). —Bieb rent. pi. ro&s. 1
t 10 Bot. reg. t 241. Bot. mag t. 1973. Alph. DC. mon, camp p. jti t 7
(v v)

§. 4. *Cap vula erecta, valvis paulo supra medianam partem aut scipiits prope apicem laterahter sitis dehiscens, — Folia ladicaha scepnu obovata brevi-petiolata, nunquam cordata. Flores sapiiii pedicellate Lobi calycini frequenter denticulati. Stigmata sea rami strh scepe elongati patente.*

* *Vulvas capsulares paulb supra medianam partem laterahter sitce. Rami non dichotomt.*

rau. C. SCOULBRI (Hook¹ in Alph DC mon tamp p 3i?), canle simplici veJ
ramoso panuiloio, foliis acute senatis hiisutubs, inferioiibus OAato-ucutis pet-
tioiatis , mediis ovalo-lanceolatis &upeiionbus lineaum-fonreolatis iessilibus,
floribus lacemosis, lobis calycinis siibulatis electis toiolla 5 lidâ Infundibnh-
foimi tuplu bievionbus, stylo exscrto, capsnlâ ovoideâ. ^ prope fluiuen
Columbia Ameiicai bor. (Scouler¹ et Douglas in h Hook) — Hook¹ fl. bor
am p j% t. ia5 (v. b)

& *glabra*, lobis calycinis patentissimis, foliis majoribus tenaionbns. Hook
il boi am. 1. c.

* *Valvce capsulares laterahter prope apicem sita: Flores terminates vel axillares Rami non dichotomy*

t27 C. FULGEWS (Wall 'in Roxb. fl iod. a. p. ijg. lMt n ia83), simplex erecta
pedalis pilosa, foHU lanceolatis utnnque actiminatis brevi-petiolatis serratis
floribns subsessibbs axillanbus iohtanis lerniive iuperne appioximatis lac-
nns calycinis sabulatis electis integris corolla' iu fundi bull form 1 glabri lo'neio-
rabus, capsuli ovoideâ zo-neiviâ. — in edition bus Nepaha? —Alph DC mon
camp p. 3i5. Calycis tubns obtonicus Pon rapsnlac panlo infra snmmam
patem Accedit C Scoulen foliis et capsnlâ. (y s. comm. ab ampl. coet. mere
angl Ind or)

* «8 C PIAHIFTORA (Una. diet 1. p. 53o) glaberrima, canle sirophci, foliib ses*

silibns cotiaceis nitidis, ladicibus coufeitis ovatis \cl ohovato-obtu<>is crenulatis, caulinis lineaii-lanceolahs acutissubintegiis, floribus spicato-taceinosis, lobis calycinis ovato-acuhs latis electis corollā cainpanulato-iotatā tnplō brevionbus. 1^ in Amentā boieali veiisimililei piope sinum Hndson.— Alph. DC mon p 313. Tiacbelimu Amencanum minus ilore exualeo patnlo Dodart ineui. ed. Malaqne Amstel. 1758 p. 6ar t 3*, ed fol Pai 1676. p 119.1.5. C. pyiarmdali< innoi Kiggelaei in Muutiug phyt cuiios. t. i>S C Americana Mill diet n i3 non Linn C nitida Ait. h. Kew cd 1 vol. 1. p 346 (ex h Banks') (v. v. cult. etc.)

129. C AMERICANA (Linn.' sp. p a3> excl. syn), caule erecto simplici, foliis bet rat is pilosiusculis, ladicibus o\ato-acnhs subcordatis petiolalis coidatis, caulinis ovato-lanceol itis utnnque acuminatis, flonbns longe spicatis solila-llls teinisve, tnbo calycis elongato obconico, lacinns lineaii-acuminatis sub-integiis patentibus coiollā 5-iidā cainpanulato-iotatā bievioubus, capsulā ey-lindracea snlcata. If m America' boi. inter Niagara et Georgiam. — Toir.¹ fl. ofun. st. 1 p. 237 Alph DC. mon camp 31 f. C. asteinidcs Lain. ill. a5i5. C- obliqua Jacq. h Scbcenbr 3. t. 136. C acuimnata. Michx.' fl boi. am. 1.]> 108 (excl syu Dod.111). C declinata Mcench nielh. suppl. p 187. excl. syn. Cauhs 2-3-pedatis. Lobi corollas exlu's et a pice pilosi. (v v)

£. *subulata*, humilis paucifloia. C subulata Benuv ' b. Deless. (v. s)

130. C ILLINOENSIS (Fiesen ind. s*>n h Francof. i83t>), caule ramoso angulalo, lamis patentibus, folus ovato-lanceolatis longe acuminatis aignte serratis icflexis, bupenotibub pilosis III petiolui brevissimum decumentibus ,*floibus sessilibus tcrnis vel singulis in axillis superioubus, laciuns calycinis subulatis basi seiratib patenlibns, coiollā rotatā, capsulā prihuiatico-clavalā — in agro Illinoensi.— Caulis 4-1-pedjlis. Corolla piofunde *i-partua* ex cl auctoie sed veiisim. profunde 5-iida Laciuae extus apice pilosae Capsula poris 5 subapice dehiscens.

13f. C. LATILOBA, glubra, caule erecto simplici teieli, folus caulinis lanceolati* utrinque attenuatis cienato-seiratis, flonbus setsihbus bracteas o\ato-aeutas dentatas teqaantibus solitams vel bubfasciculatis, lobis calycinis ovatn-acutis latis mtegus erectis coiollā late campanulatā diuudio brevioribus, capsula spbaeroidea piofunde sulcata. — in Olympo (Aucher! ann. i836). — Caulis pedaliset ultra. Folia 3 5 poll, longa, 4-6 lin lata, deutibus ad extremttatem veisis s>d obtusinsculis. Corolla fere C persicifoha*. Stigmata 3 patentia longa ut in sequentibus Dehiscentia capsule non ceita. Folia ladic desunt (v s comm. à cl. Aucher sine n°)

x3». C. PKREGRINA (Linn.! syst. p. 3oi) t bispida, caule simplici anguloso erecto, folūs inegularitei crenatis, petiulo alato , iriferionbns obovatis, supenoribus ovato-acutis, floibus spicatis axillaiibus singulis terms>e, tnbo calycis obcono- nito hispidissuno , lobis acuminatis basi latis subintegus corollā patente fnndo atro-caeruleā subbrevionbus, capsulā ovoideā snlcata. (2) in Libano (Labill ' Aucher! n. 558 aan. i836, el 1834 <nn. 1837), ciica Aleppuni (h Kunth') et in Mauritania (C. alata Bové! h. Maur. non Desf) —Jacq bort. Schcenbr. 3. t. 337. Sims bot. mag. t. 1257. Alph. DC. mon. camp. p. 3i(> (excl syn fl. poit. enoie cit.). C. lanuginosa Lam. diet. 1. p. 58V (excl. syn. Thai. 32.). Caalis i-J-pedahs. (v. v c et s)

133 C. PRMULIEFOLIA (Brot. fl Ins. i p. 288. phyt. i.t 20), caule hispido simplici ereclo, folus pilosis ma:qualiter duplicato-crenatis, radicalibus oblon^o-lanceolatis obtusiusculis petiolo margiuato, caulinis ovato-oblongis aculis , flolibus spicato-iaceniOMS axillaiibas terms vel singalis, tubo calycis obconico pilo&o, lobis acuininatis basi latis denticulflis coiolla campanulata lolata duplo bievioubus —C peigrina Hoffiu et Link 11 port 2. p i5. t 83, non Linn. Species UMOIS piaeiedenti afiiuis, sed diversa (ex Krot desc. et IC) radice pienm, lobis calycinis dentads, coiolla fimo albida, capsula magis elongatA et obconica

134, C. AJ-AIA (Desf fl atl 1 p |,8 t JO), caule simplici ercto anguloso gla-

bro, foliis inequaliher deutatis glabris, radicalibus ovato-acutis. canlims sessilibus decurrentibus lanceolatis, floiibus pancis spicato-racemosis apice approximate, calycis tubo hispido brevissimo, lobis Imeaii-lanceolatis acutis subciliatis corollâ latè campanulatâ dimidio brevioribus.— in Atlaute — Pioribns valde affinis sed glabria et capsula basi dehiscente ex eel. Desfont. A a error ia descript. et ic. subiit? Capsula spbseiica in icone. C. alata Bove h. Maur. ad C. peregrinatn lefero nain hispidissima.

135. C. PERSICIFOLIA (Linn sp ed. x. p. 164)» caule suhsimpli erecto, foliis glabris rigidis crenulatis, radicahbus lanceolato-ovobatis, caulinis linear-lanceolatis, (loibus terimnalibns et axillaiibus solitnrns pedicellatia, lobis calycinis acuminatis basi latis intrgiis COIONJ late campanulatâ diradio brevionbus, capsulâ ovoideâ 3-sulcatâ poiis lalis. \wedge f in liuiopâ temperate et meiid. iu Onente? (Oliviei!) et Altai (Fisch!). — Bull. b. de Kiauc. t. 367 OEd. fl. dan. t. 1087. Sibth fl. giae. t. 105. Alpli. DC. niun. camp. p. 3aa. C. decmieu Liun. sp. ed. a p. AJ2, non ed. 1. I'loa saepè plenum m honis. (v. v.)

3. *angustifolia*, foliis lineaibus angustis. — Taborn. t. 411 et 41a (v. ss.)

y. *runcrantka*, floribus ampliviraib lilacini. — Curt. bor. roag t. 397.

f. calyc pihso, ciliacii tubo piloso-hiigoso lobii glabrii, fohi» lineaibus aiigusdf. — DC ! tt fr. n. ai⁸ var. y. (v. &)

t. *dasyarpa*, unidoia, fvlns ladic. ovatis obovatisquo, caulinis oblongo-lauceolati⁸, c.ihce trrabio pilo&o — C. da⁸y⁸pa Kit. in Scult 11. aust. ed. 2 n. 900. Roeni. et Sell. syst. > p-tp.

(*J. hispida*, tota pilosa.—C. liispiJa Lejeun! il. Spa. suppl. 1. p. 998.

L.pumila, glabra caule iniuimo uniiroio, foliis appioximaljs fiiuiis, co-10IIA ba&i augu&tata. — C. puimla Scbm. il. bob. n. 171 (ex Pobl fl bob.)

0. *calycina*, monstiosa uniiora, lobib calyoinU ovato-lanceolatis iuaxiniis, corollâ basi an gust at.'i. C. peibtcifolia calycina Reich, ic. cent. 1. t. 77. (v. 9.)

136. C. CARPATICA (Jacq. li vind. z. p. aa. t. 57), glabria, cuulibus ramosis, foliis iofeiioibus longe petiolat⁸ ovito-ioinndtii cordatis denlati&, superiore*i*ibiib bievius petiolatis ovalo-acutis., pedunculis teuiinalibns et a\illaribiis longib UQiflons, tubo ctlycis obconico, lobib acuminatis basi latis subdentati;> eicitis coiollj latè campanulata iiplo duplove bieionbus, cap&ulâ ovoideo-cylind race A. % in Transylvania (Bauinc;) el uionibus prope Caipatos (Wahlenb.) — Bot. mag. t. 117. Roeiii. et Sch l/. eui. faj.c. J. ic (v. v.)

137. C SILKNIKOHA. (Fibcb.! in Alph. DC. moo. camp. p. 3ao), caule simplici paacifloio, iuperne deuud.ito, foliis molliter ciliatis, tadicalibub liuteoJali*, longe petiolatis lutcgiU, canliuis anguslioubus acuminatis, lobis calycinis erectis acuminatis ciliatis micgiis coioilâ mfundibulifornii tiiplo brevioribus, capsulâ elongatâ obovoideâ 'if? in Sibniâ orientali et Dabuiâ.— Omel. 11. sib. 3. t. 32 (ex«l. »y» Touiu.). C. ciliata beib. Paliiu ! C. Batcaien&is >all. inh. Lamb.! C. Infuidibuliini Reich, pi. CM it. 1 t. 75. f. i58 (11011 Test?). — Floies i-3, uno sempei tcrnnnali. Vanat foliis ralybusque cilialw vel pilogis aut glabiis ,foliis iutcgns aut 1 emote subdentalis. (v. s.)

138. C. STKVENI (Bieb fl. cauc. suppL p. 138), canle siinplicissimu i-i-iloiio Mipeiuè deuudato, foliis tadicalibus obovatis petiolatis cieulalitis basi subciliatis, caulinis sessilibus subintegiis infci 101 ibiib ovato-lanteolatis super, atnminatis, calycin glabri lubo elongato lobis lanreoiyahs acuhs erectis corolla jufundibulifoim dunidio bicvionbus, capsulâ elongalâ. % inCaucaso, Iberia (h. DC), Amieuid (Toiiin.'\ »t Ukrauiâ (Goldbach in b. DC !).—C. au⁸ustifolia dipilulu Papaveiis Rlui-idis Tomn.¹ cor 4. C. simplex. Stev.' meiu. soc nat. Mosk. J. p. a55 (uou DC). C. Vjtnugbofijaua Roeiu. el Sch. syst. 5. p. 102. C seuniiida ibid. p. 91. —Flores Ill i 1101 c's qliam in precedenif. (v. ».)

f. Sibirica (Alph. DC won. camp p. J21), coioilâ usque ad mediunj *->ida lobis .nnplioibiis, ~ in Altai (I⁸isch ') et alibi in Silnna (Msch. III) C in-fundibulum Vest⁷ Lcdeb U. alt. 1 p. 2⁸9 (exrl s\|n Hcicb >

tig C RANUNCULUS (I inn sp. p a3a), radice fusiformi, canle sabsunpli-
ejecto sulcato, foliis infeiionbus obovatis brevi-petiolatis snhcienatis, caulinis
sessilibns linoii 1 aneroid tis integus, floribus spicato-racemosis, tubo calycis
obconico, lobis electis longe snbnlatis angnstis glabu; coiollâ infundibuli-
fbrmi subbivionbus, capsula obconica tnsulcata ^J in 1 uropa. medrà, in
Caacaso (Bieb Fisch ') et ciica maic Meditenaueum — Lngl bot a83 M dan.
t. i3a6 Tabern. ic 409 C elatioi Link et Hoffm fl port a. p 11 t. 80. C
fastigna Gmel leu* duich Rossi. 1. p. i5j t. 33 (uon Dufour) — Variat
caule gUbio, piloso, vel angulis tanlirm scabio, flonbus sessilibns vel pedi-
cellatis , tubo calycis glabio vel stiigoso, dentibus calycis integris vel senato
dentatis corolla dimidio bievioribus aut suba?qualibus Vane tales dueæ m.igis
notandx inter oiunes :

/? *calyce strigoso*, C verruculosa Link et Hoffm fl poit a p. ix t. 8i.

(v. v.)

y *calicina*, laciniis calycinis longitudine lorollae a' bist usque ad medium
paitem acute serratis (. calicina Bceb. III Roem et Scb. syst. 5. p 104.
C Rapunculus Bieb fl. cauc. suppl p. 1J8 — in Russia et Caacaso fie-
quens. (v. s)

140. C. LVMBERTIANA (Alph. DC mon camp p. 327), caule siuiplici multifloro
piloso, folns caulinis sessibus oblongo-acummatis iriegiianter dentunlatis
pilosiusculis , flonbus spicato-racemosis , calycis glabri lobis acuminati* paten-
tibus grosae et acute dentatis corolla iufuudibuliformi subbivionbus —tin
Glnlan pi ope mare Caspium. — C. Rapunculus vai. <T C. A. Meyer veizeichn
pflanz cauc p 66 Inflorescentia C Rapunculi a qua pa rum differt (v. in h.
Lamb)

141. C PTAEHAICA (\lph DC mon camp p. 3a4), canle simplici crecto nni-
floio snbpiloso, pilis mollibus, folns pilosiusculis, radicahbus lotundatis subcre-
natis bievi-petiolatis, caulinis sessilibns lanceolatw subintegns utiinque acutis ,
calycis glabu lobis subulatis patentibus interns corolla subbievioubus —in
Pyienoeis (b Merat') et ins Baleancis (h. Rich.') Canlis pedal is substriatus.
Flos terminalis snrsura specrans Calycis tubus obconicus. Capsula ign (Spec
tiuncata iid in h cit)

142 C PATUTA (Linn* sp p a3a) , canle ramoso, ram is divergentibns uni vel
paucifloii;*, foliis radicalibus confer tis obovatis crenatis, canlinis hneau-lanceo-
latis scsilibus snbintegris, pedicellis eloupati, lobis calycinis longe neuramatis
pateutibus basi scuatis coiollâ Infundibulifoimi dimidio brevionbus , capsula
ovoideo cyhridiaceâ. •% in Europâ centiab et ineiid. et in ditione Tnnetanâ
(Sihouw).— OEd. fl dan. t 3^3 Sm engl bot. t. 4a. Hoi t. Elth t 58 f 68.
C Bellulifolia Lapeyi ' suppl à Thist. Pyr. p. 36 Jaume¹ flor et pom. fianc.
fasc 1 C decuriens Linn, sp ed. 1. p 164, non ed a. Thor.' chl. land,
p 164 I loubus terminalibns paucis miniine spicatis à C Rapunculo differr.
(v. v)

yS. *calyce strigoso-pdoso*, \lph DC. mon camp p 3aq. (v v)

y. *latifolia* (Alph DC 1 c), canle angulis scabro, foliis cauliis lanceola-
tis latis senulatis laciniis calycinis longissimis corolla sublongioribus.—
in Gdliâ raeiid. (v s)

<T *grandiflora*, majoi, ilonbns maximis, lobis calycinis integris coiollâ sab-
brevioribns. — in ins. Zaatho (Margot¹) (v. s)

t. *pauciflora* (Alph DC. 1 c), caule humili paium ramoso subnado, flo-
ibus teiminahbas et axillaibus pauns magnis, corolla campannatâ lobis
oalycinis dimidio longiore. — Column ecphi. pais alt p a4. ic

K *neglecta*, lobis calye mis reflexis basi serrato-dentatis corolla duplo \el
triplo bie\ionbus — C. neglecta Rcem. etSch.' syst. 5. p. 104.

143. C. ERINOIDES (Linn niant p. 44² excl. syu. Henu. non Ell), caule huraili
pancifloio ejecto angulis scabnuscno , foliis parvis lineaii-lanceolatis glabrin
ciennlatis, lufeonbus obtusis, supeuoubus acuminatis, pednnculis i-floria
¹ lobi N L, 1}cims longe snbulatis integus corolla Infundibulifoimi snbbievioribus,
1}ul a longe obconica teicUusciila. — in Hispama ct icgno lingitano (Ca\

- ex Brong.)** — Laiu 'heib Cav ami de cienc 3. p. ao(uon Lll). Alph DC inou. camp, p 33r Canlis 4-6 polhcans, pedunculis plus immusve divergentibus, anguhs letio-scahris. Corolla interdum Mihecamfanulata (v s.)
- 44 C. MxTRiTtNs (Alpb DC mon. cirap p 33-), taule humili paucifloio, ram is unilons, folij sessibus lmean-lanceolntis subintcgnis , lofenoribus oblnsis , superioiibus acntis, lobis cal}CJuU louge subulalis eiechs mlegii* contolla Infiindibulifoimi subhievioubus, capsulu obconic't elongalat not) ciulcata, 10-ueivia. (T cuca Matnrum (Lagars'). — Infloiescentia et habitus C palulae sed minor, 7j-5-pollicaiis, .tnuua, lobii. calyunis mtegnsi "Vanat caale simplici \el l.tiiioso (v >)
- £. *Nevadensis*, caule foliisqne pilosib. — III editionbns Siciiae-Nevada (Boi&s.¹ }
145. C. SPATULATA (Siblb et Sm prodr fl giae 1. p 137. ll giTc 3 p. 3. t ao3), canle adscendente umiloiu piloso, folus* infenoibui petiolatis obovatis crenati*, superioiibu& lanctolnlis j>ubintegrib, calycis. tubo^ obronico, lobis H-nenri-acuminatib dentatis corollâ campanolatâ vix bievioiibus If in Olympo Bitbyno et Parnasso — Caulis spithamoeus, Flos ert-etus founâ C patulai sed minor. Laciuse calycis pilosde |e| margine &cabiidjciculx. Pollen Lctrulscens Geimen turbinatum , capsula &phaeoidea
146. C HERMINII (Hoffm et Link ' (1 porr. I. p. 9. t. 79), glabia, caule ascendentcMiuplici paucifloio, folus subinte^{ns}, iadicalib:> ovalibus vel lanceolatis, caulinis hncan l.mceolatis, petiolis ba>i uliatis, lobis talycims longc capillaccis reflexis coiolIA infundibulifoinn subhievioubns (I, "in editionbos Sierr.e d'Estrella Lu&itanix. — Koern. el Sch ' syst 5. p IOI. Alpb DC. mon. camp. p. 318. Caulis semi pedals Infloiescentia C. ihomboidalis, pedicellis 5-6-1 in (v. in b Scbult Tune)
- (47- C. RAMOSISSIMA (Sibtb. il. graec. t. 304. piodr. 1. p. ify uon Host), caule erecto ramoso anguloso niultifloro pilotO folns ovato lanceolate rienatib glabriDMCubs , Inferioubus obtnsis , supei. ncutis, ranus divaucatis uniflons f lubo calytis obconico piloso aut velutino, lobis angustis acuminatu. mlegus estus pilosis roillâ patula subhievioubus , capsula obconicâ neivis paian emiuentibus pilosi> (I^ in Giaeia. — Alph. DC mon. camp p 333 — Lobi calyciui per anthesin patentes, ante et postea eiecti. (&)
148. C LOREYI (Poll clem, bot a p 148 ic. ult f. 1) f ciule eiecto ramoso anguloso , folii glabm sessibbs, infeuoibns obovatis creuatis, mtdiis ovjtulanceolatis, t>npenoiibus oxalo amunnatis Mibintegns pedunculis elongatis nudis uniflons, lubo calycis bie*i* den^e piloso pilis retioiMb, lobis palcntib* glabris longe actnninatis basi denticulatis corollam subrotatam .nequanlibiib, tapsula iphauoideâ piofutle sulcatâ stng&o-piloba (Jy in provinc Vtroiensi, Dalmatia (Vis) et Coicyro (albot in r>erl.\ — Poll fl >cion 1 p 171 t 2 f-4 Sims bol. mag t a58i Alph. DC mon p. 333. Brit flow, gard ser 2 t. 3^2. Bert, ft it 2 p ^19 C balden&is Balb.¹ tat h taur. 1813 p ao. C. laniosissima Hostfl aiisti 1. p 964 (non Sibth) Caulis subpedalii, glabei ACI hispidus, lanus stu pedunculis glabus (v v. c)
149. C KOTSCHYANA. , caule eie< to tenui sea bio snpeine lamoso , ramis dicboto- mis, folns, erects {ewilibu* ovatis ^labiU crenato dentatis, pedicellis biactea op posit a muh6 longionbus giacdibns, calye sc&bnbsp;nusculo, tobo hemisp&bnbsp;xiico, lobis hneaii-acmninatis tubo longionbus coiolla profunde ~~salida~~ diradio ble- vioiluis, capsula hemisphapriza 3 sulcapa.fl in morite Tauio(Kotschy' u. 345 et 34b). Planta giacilib, 4 O-noll. Tolia 3 liu. longa, 1 {-2 lin. lata, inferioia obtnsa. Coiolla La;rnlea, fiiie Phyteumalis , sub-5-parlita , lobii I amen raodo Campanularum persistentibus nec III in geneie Phyteuma dueigenlibiib (v s)
- 150 C DFCUMDENS (Alph. DC mon camp p. -J34 t 11 f A), caule deuimbente snsimpli pancifloro, peduntulis axillaibus uuiflons folio longionbus , folns ladralibns romndito spathnl.itis prliolatis sinuatis caulinib obovatis cie- nato dcnnatis, stipe nonbus p.mtis se^ilibus lam col* tit, ralycis tubo ovoideo

pilosø, lobis lincari-lanccolatjs electis integiis acuminatis coiollå campanulas* l>revioubu% capsnlå sph eroidéa.(jin Hispaniâ piope Aianjuez Variat caule, foliis et lobis calycinis plus minusve glabns. (v. vs com in. à cl. Deless.)

i51 C. LOEFLINGII (Hrot phyt. lusit. fasc. i. n. 10), glabra, canle ramoflsisimo mnltifloro electo angulosu, foliis crenulatis, inferioibus ovatis reniformibus yel lotndato-coidatis, supenonbus aplexicauhbus ovahs, peduntulis unifloris teiminalibns et axillaribas elongatis gracihbs, tubo calycis obconico, lobis loupe acuminatis patenlibas corollå infundibulifoinn subbrcvionbus, capsula obconirå sulcatå neivis emineatibus. (f ia Ln&itania, prope Matri-lum (Roem et Sell) et in Mogador (BroussJ).—Biot pbyt las>it. select p. 4i. t 18. Roem et Schult. syst. 5. p. IOJ Hoffm et Link fl. poit a p. 14. t. 81. Alph. DC. nion camp. p. 335. C. tiroubsouiinetiana Roem. et Sell. syst. 5. p. 104. (v. s)

152. C. RETRONSV (Labill ' pi rar. syr. dec 5. t 3), caule erecto paucifloro an-pnloso , angnis letiorsùm scabus, foliis infeuoibus obovato-rotundati& pelo-latis sabsinuatls glabns, hupeuoibus o\ato-lauceolatis integiis raargine bca-bris, pedunculis sea lamis 1-flois terminahbus et axilljnbas elongatis , lobis calycJDis louge acumioatis patentibus seirulato-scabris corollå iufnndibulifoiiiu longioribus, capsulå obconica elongata. CT in Libano (Labill ' Auch.' n 1874 anil. 1837), et in Asiâ mmore (Auch ' n 186J. ann. 18J6) — Alph. DC. inon. camp p. 336. Caul it, pedalis. Calycis tubas elongatus à pedunculo vix distinc-tus; lobi basi lati (v. s)

153. C. LVSIOCARPA (Cham in linn. 4* P ↗ exel ayn. C. Sajanensis),'hoinilis, caule uniiloio nudiuscnlo, foliis iadicalibus confertis lanccolato-obovatis seta-ceo-denticulatis, peliolis cilialis, tubo calycis villosø, lobis acuminatis denticu-latiscoiollå infundibuliformi campannlata diuidio bievioribus, capsulå sab-cyhndracea.7!/in Karntbchatká (Tisch '), ins. Alcutiis, fieto Kotzebne et editio-libus inontmm Rocky-Mountains diet —Hook.' Reecli \oy. p 127. fl. boi. niu a p 28 C. algida Fiscu ' inss. Alph. DC. mon. camp p 33S. t. 11. f. 4 Cap&alae dehisceatia extus sub apicem ex cl Cham (v s)

154 ? C. ZOYSIX (Waif in Jacq. coll. 2 p 122),cespitans, glabra, cauhbas humili-ibus eietti!) pauciflois, foliis integiis radicalibus confeitis petiolatis ovato-bovatii obtusia, caulinis obovato-lanccolatis hneanbusqoe, prdunculis umflo-nis tenmualibus et laro .xilldiibu6, lobis calycims lmeairibus subulatis paten-tibus, corollå longecylindraceo-ventticoba lacinns ralycimsqoadiaplo longioie npice cou&tielD et 5-lohå lobis interne villosis, capsulå ovoideo-sphseucå an-gulatå subiectå. % in Alpibus Styriae , Carniolse et Carinthiae —Jacq ic. lai •1. t. 334 Stuim deutbcbl floi ic. Jacq. mnt. Alph DC. mon camp p 336 Flores pio plantå magm subnutantes, antheris nimiinis Species abuormis "Valvae capsulaies certe versùs apicem. (v. s.)

i55. C. CENISIA (Liun. sp. soppl. p. 1669), cespitans, caulibus humilibus adscen-dentibus nniflois , foliis sessilibus integiis, radicahbus confertis obovatU obtu->is, rauhnis o\ato oblongis, caly<e hirsuto, lobis hnean-lanceolatis cotollå profunde 5-fida patenle diuidio hrevioubus, capsulå ovoidea valvis media sitis dehiscente. % iu Alpibus Sabaudiae laia —All rar. stirp sp. 35. t 5 f 1. ped. n ^95 t. 6 f. 1 Reich, ic hot. cent. 1. t. 85. (v s)

jf. *angustifoha* Schi. piiiu. halisb p. 70 Au eiroie citata' Nondum in Gennanid ceite leperta. Conf Rohl deutschl. fl. a. p 180.

i56 C uiriPLORA(Lmu. sp p 231), glabra, caule unifloro erecto huuiili, folus subintegris, infenoribus obovatis petiolatis, medns obovato-lauceolatis, supe-rioribns rarioibns linean-Ianceolatis, calyce villosiusculo , tubo elongato, lobis linearci-acnminatis corollå infundibuliformi subxqualibus, capsulå artecta louge cyhndidcea cos tat a. 7f in. regionibus arctius Emopse et Ameiicœ —Linn fl. lap. n. 85. t. 9 t. 5, & fl. suec n. 177 Sv bot t 5^6 fl. dan. r i5i2 Alph DC. mon. camp. p. 3J9 Hook.! 11. boi am 2 p 29 (v. s.)

n *Giesechna*, coiolla calyce quadruple longioie —C unifl)ia Citietk b

Groenl Johannei, ex Roem. et Sch G Gieseckiana Vest in RCLIU. et Sch. syst. 5. p. 89.

157. C. ARISTATA (Wall.' in Roxb. fl. ind. 2. p. 98. h. n° 11191), glaberrima , canlibns erectis nuifloris, folns radicahbus longe petiolatis lanceolate ovalis ve acutis vel obtasis uudulatis, caulinis sessihbus hneaubus angustis glandulosodenticulatis, lacimis calycinis longe snbulatis corollā dlapo majoiibus, capsulā longissimē obconicA If. Circā Laddack trans Himalayos monies —Alph DC. mon camp, p 85 Coiolla quasi aborlna infundibulifoiinis caerulea Cjpsula rautura ia-i5 hn longa if liu. lata, valvi9 3 piope apicem lateiahter sitis. (v. in h. Royl. ann. 18^9)

** * *Valve capsularesprnpè apicem sitce. Floresfolio oppositi aut terminates inter ramos dichotomos. — Ad Specularias accedens.*

158. C. FA&TIGIAIA (Dnfou' in Alph. DC mon. camp p. 34o. t. ia fB), humilis scabra lumosa, ram is baepius dicbotoinis, folu's infeuoribns obovatis >submtegus, medns obo\ ato-lanteolatis. grosse 3 5 dentatib, superioubus tineaii-lameolatis, ilonbus. &nbs>essihbus sobtauis, lobis calycinis hnean lanceolatib coiolla>infifiudibuliformi dnplo longionbns, capsulā obconica' 5-angulau (f) in Auagoma (Dufou') et ciica' Aianjuez (h. Deless ') nee non in Geogiae agus in cultis piope Kl^abelbpol (Hohenh ' eu pi. Tal. p t>3) —Media iutci Campanulas et Speculaiias. (v. s.)

^. 5. *Species sectionis Eucodon scd capsulā non satis notd.*

159. C. VIRGATA (Labill. ic. pi. rar. syr. dec. 2. p. n. t. 6), caule sirapllci tecto btriat glabiisoulo , folds radicahbus oblongo-lanceolalis cieuulatis petiolatis, caulinis sessilibus lineaaii-lanceolatis subintegus, flonbu-, spicalis soepc gerainatis ternatisve, calycis tubo scabio, lobis eie<lis subulalis corolla Iniundibuliforui duplo tiiplove bievionbns, capsule obcomcS (2) in Libano.— Alph DC. mon camp p. 327. An C. Rapunculi vauetas? Spēcnnina i>vilaca beib. Ancher ad C Rapunculum pertinent. Icon cit. cum plantā nostrā J abill. non convenit et sine dubio pesMina : Hos emm wdetui Phyteumatis et ideo Phyt. M'igatum vocavit cl Willdenow, s<< planta uostia heib Labill. Camj)annlii est, et inter Phyteamata nullum coguosco iconi siuile. (v. s.)

160. C PERSIC A, canle erecto ramoso pilosiustulo, ramis eiectis glabris denudatis, folns integris, pilosis scabns, ladicallbnj oblongo-lanceolali*) in pelio-luru hmbo aequalem attenuatis obtusis, caulinis sc-silbas lanceolatis paucis, llonbh iiibsessihbus axillanbus saepms teinatis, calycis glabiisucuh tubo o\oideo lobis ovato-acntis bievissimis, corolla snbparlila, lobis extus velutmis laiiceolatis, capsula obovoideā.— in PLMSW (Aucher' i836. n. 3i73). Caulis pedalis vel ultia. I^oha tadic. 4-5 poll, longa, pilis brevibus rigidis. Brac-teae 3 basi florum approximate. Lobi calycim vix lineani longi. Co 1 oil a piofunde 5-fida vel feie 5-pamta unde flos fere Phyteumalis, sed lobi apice non cobaeientes. Capsula praeteiea' nt in Campanulis valvis 3 basi HI lib dehis-crns i>tainina coiolla subacqua lutea Stilus siibexsertus apico 3-lobus. Tapsula nutuns lidetur sed foisan exsiccaionid causā. Species nulh afluxis. 1 loies ut in icone C. viigatae Labill pi. syi. dec. 2. t. 6. sed folia Integra, (v.s)

161. C ? PEDUHULARH (Wall.' list 11 7<<39), glabeiriina, cauhlms lamisque gracibus adscendentibus, folns infeiionbus oppositis vel altcinis, supenoiiibus alternis, omnibus bieipetiolatis ovatis obtusis subintegris, pedicellis folio oppositis longis nodis, calycis tubo elongato obconico, lobis erectis lanceolatis integris obtusis corollā 5 hdā glabrā duplo brevioribus 2/3 prope Kamon Radix simplex, caules pluies 5-6-poll em it tens Folia radicalia nulla, caulinis 5-6 lin. longa, petiolo \ix linear!, glaucescentia. An Wahleubergia? Capsula i<<n. (v. s romui. ab am pi. coetu mere. Iud. 01.)

- 162 a C niGiSCLirs (Pall, in Raan et Sch syst 5. p io a\ folns i.imeolaMs, iadicalibusm petiolum attenuatis cit 11.1tis, laulmis *>easililius, <uale slucto sun plni pubestcente, ilonbus iarieuo^i< leiniin. libus <<il)iibus ciliatis. 7T ad

lacam Baical Cauhs spithnmaus pancifloms, corollce i j pollic. caljee daplo long Jo res «emi-5-fidae, laciniis pauiin ciliatis. Stylos calyce pa mm longior (Roem. et Sch. ex reliq Willd.) Inter Campanulas sinnbos calyeis non obte- lis enamerdt c] auct.

163. C. CAVTSCHATICA (Roein. et Sch syst. > p. 152), foliis radicalibus cordatis dentatis, raulmis oblongo-lanceolatis integeniiit), caule capillari subnnifloro, calyce lefiexo, lacinh linearibus corollam aequanhbus. % in Kamtschatka (Pall) Radices capiliares. Folia radic longe petiolata, petiobs capillaibus, rotunda J a sub<ingulato-dentata nienbianacea glabra le\ia, caubna in petio- lnm attenuata obtnsa Canhs setaceu? debilis apicc subun/floru». Caljis la- ciniac inaequaales subulatse ieflexe (Willd mss. lor. cit). Calyx no a. ubtectus videtui ex descr.

164. C ERGANa (Roem. et Sohiilt. sysr 5. p. 105), foliis !irieari-lanceo!ati> io- tegeimnis ses&lilbns, infeiionbtis latioribus subpefiolatU ad petiolum atte- nuoti!* ITebibA, caule pubescente, flonbus axiilanbos demurn spjcaiiv, calyos lacinus longiludine toiollae setaceis divdiicatis snbpangentibof. ^ in Sibmâ (Pall.) C ^pecjosa Ieliq Willd Cau)i>ped<jlij>etultia simplex tetendebilis. kolia infer, lanceolata sul)deot-ila Flores vix pedunculati in axillis» foliocnm supei spicam iuterruptam formantes Intel Campanula* sinulm* calycls non ohtectis enutneiant cl auctoies.

165. C. KITAIBELIANA (Roem et Sch. bysl. 5. p. 90), fobis infeiionbns obovalo- cuDeifoirainbus cienatis, supeionbus lineaiibus iiitegerumii, caule &implici&- simo unifloro. If, in Alpibus mtei comil Lysiaviensem et Thnrocziensem C. microphylla Kit apud SchuIt. fl auslr a. ed n. 400 (non Cav.). — An C. ro- nnndifolia vel hnifolia?

166. C ADS(EN)DENS (Vest in Roem et Sth syst. 5. p 90), caule spithamaeo ads- cendente glabio, foliis subsparsMs, iafciouibus snbpetiolatis ovatis dentatis, buperionbus oblongis integei riinis glabu»f floie sobtano nnlante, lobis caly- ciujs j»bulati» corollâ pjinn bieionbiii». — in Sibmâ (Pallas, \esO C. 10- tnudifolia beib. Pall, in Johanneo. AHinis videtur C rotundiobae \el ccspositae.

167. C. LosTRfITt (Ten. syll. p gti), caule debili subpaniculato, foliis ladica- bus longissime petiolatis orbicolatis vel elliphcis ^ubcordatis rotandatU sub- crenatis petiolisqu hispidiuseuhs, sens bievibus deor>uin apectantibns, r.m- Imis hueanbus, flori bus erect is, lacinus calycims liaean-setaceis patentibus 00 roll am infnndlbulifonnem 5-fidaiu glabrain aequanilbns vel superantibus. % in oollibus Campania» detexit <1. Lostntio. Radix nassa Tubus calycis ob- conicus. De capsnlâ tacet cl auctoi Habitus macifste C. lOlundifolIT, sed forsan capsula electa ettunc C macioibizae pioxima C loinudifolia e\ Bertol fl. it. 1, p. 46r\$, sed sub eo nomine species meo scn&u diveisa* junxit

168. C WANNERI (Rochel phnt. banat. rar. p 41 t 5. f. 11), t-jule eictto scrai- peddli tereti stnato pubescente, pednnculis umflois axiUanbus et teumna- libns, folhs lameolatis ina?iju.iliter denlatis pnbescenti-villosis, m^iionbus petiolatib, ralyti-, tubo obconico bnlo, lobis o\alo-l.inceolaii* dcuinin.it& dentatii bispidis eiecti» corollâ tubuloso-campanulatâ dimidio bieMonbus, lobis corolle brevissimis —in Alpibus Banalus C betciopbylla Baum^ ft. trans snpl. 3. p 142 (ex Rocbel) 11011 Linn Corolla cjeulea. Spcues mibi jgnuta, in fiectiou locanda, j\ed nbi ?

169. C V»^UL4 (All. ped i. p ro8 n 397. t. 7. f. i), ninilora, folns i>ubglabii» ovalibii denlatib, caule Mibnudo, calyce glabio, coiollâ campanulati palenie. % ad iadi<es montis Vesnli in Pedemontio. Kolia ladicalia couferta non coi- data. An aftinis C limfoli.-c ?

170. C rojYAirrm (Roem. et Sth. sys ^ p 1 Jo \ bispida, foliis oblongo-lan- reolatis serratis, ilonbns paniculato glorueiatis, <alcybus aignte scuatis. — in Sibiiâ (Pall.) C muhiiloia Willd mss. non Kit

Species non satis notct.

171. C. LUNARIAffOLix (h. Willd. in Roem. et Sch. 5. p. 91), foliis ovatis profundè cordatis petiolatis duplicato-serratis, floribus secundis. *If.* in Caucaso (Willd. ex Adams). An C. alliarifolia ? C. illaria-folia Reich, pi. crir. (i. f. 75o est C. rupunculoides).
172. C. xsrERRIMA (Zuccagni in Koem. coll. p. 128), foliis hastatis tomeutosis dentato-spinosis, floribus axillaribus, corollis extrinsecu* lomentoso-hispidis. — in Oriente. C. ajugoefolia Sestini in Spreng. syst. 1. p. 73'i. Caulis semipedalis solitarius erectus tomentosus. Folia caulina iibrirata cordato-hastata dentato-spinosasubtiis praesertira reticulatact touientosa. Flores axillares sessiles solitarii. Calyx spinosus corollâ brevior. Corolla campanulato-tubulosa violacea.
173. C. DECURRENS (Zuccagni in Roem. misc. p. 128 non Linn.), caule alato, foliis decurrentibus dentatis hispidis, corolla extrinsecu tomentoso-hispida. — in Oriente (herb. Sestini). Caulis a-pedalis flcxuosus ex decursu foliarum alatus. Folia sessilia spatulata decurrentia denlalo-spinosa subtus reticulata et non nibil tomentosa. Flores axillares congesli pedoncnlo coiumnni insidentes. llactesc cordatae. Calyx et corolla tomentoso-hispidi. An C. alata Deaf, proxima?
174. C. ASPERA (Mcench. sup pi. p. 188), cauie tereti stricto Rimplicisslrao, foliis oblongis sessilibns creuatis, peduuculis 3-floria. (2) culta? Planta tota aspera pilosa, Canlis 3-pedalis. Folia obtosa rigida. radicalia petiolata, caulina sessili reniora. Kacemilaxi terminales. Flores axillares, intermedio peduncularo, laterales a peduuculo communi iindnati, foliis lanccolatis brevibus suffulti. Pednnncnli alterni foliis breviores erecti trifidi. Calyx 5-gonus, laciniis lanceolatis acntis dentatis corollâ brevioribus. Corolla speciosa caerulea 5-fida. Stigma 3-4 iidum. Capsula 3-locularis.
- f*S. C. MONTANA (Delarbr. fl. d'Auvergn. p. 40), solnm nomen.
176. C. ANAOALLOIDES (Royl. ilHimul. fasc. 8. p. a53), solam nomen.

Species verisimiliter excludendce, sed generis incerti.

177. C. SCANDENS (Roem. et Sch. 5. p. 120), canle pedali et ultrâ flexnoso scabro, r.ünia volubilibus hispidis, foliis longè petiolatis ovatis acuminatis hispidis du-])licto.-serrato-crenatis, floribns pedunculatis axillaribus solitariis, laciniis calycinis corollâ brevioribus patentibus dentatis ciliatis. *If* in Sibiria. (Hall.)
178. C. STETTATA. (Thnnb. phyiogr. Bl. p. 20. mém. acad. petrop. 4. p. 373), foliis ternis linearibus integris, floribus axillaribus pedunculatis, caule frutes-ccnt? tereti fnsc toto glabro ranioso ereciusculo palmari, ramis alternis simplicibus curvato-erectis, foliis sessilibus acutis iubiicatin unguicularibus» floribns in summitate ramorum solitariis, pedicel I is capillaribus flexuosis pollicaribus. j «d Caput Bonx-Spei. Certe non Campanula, expatria, sed charact. prorsus ignoti.
- »71. C. UVNCIFOLIA (Roxb. fl. ind. I. p. 9G), ramosa glabra, foliis alteruis vel suboppositis brevinetiolatis lanccolatis serratis acuminatis, floribus termiualibus, laciniis calycinis lanccolatis et laciniatis, capsula obov.itâ 5-loculari. (j) in, hmidis Chittagong. — Cl. Wall. 1. c. planiam Roxb. non cognosuere dicit, alteram paulo biinilem paucis verbis descriptis.
- i30. C. RHYTEOMOIDES (Ziicfign. cent. 1. obs. bol. in Roem. coll. p. 1a8), pymwa, foliis radicalibus pluribns lanceolatis oblusis in petiolum decurrentibus undulatis, caulinis paucis remotis sessilius amplexicanibus mncronatis, floribus sessilius in spicam brevem ver in capitulum ite congestis, calycis tubo tetragono, lobis erectis lanceolatis laxibus, corollâ campanulatâ violacea calyce majore, stylo exerto, capsula 4-gonâ. — in monte Olympo Bithyniae (Sestini)'. — Roem. et Sch. syst. 1. p. 84.
- i8r. C. GLAUCA (Thnnb. fl. jap- p. 88), caule siiffnilicoso angublo glabro sn-nvrne paniculato-ramoso, ramis flexuosis valdè tingiltntis erectis subfastigiati&

giabiis, folns sessilibus ovatis acutis serrati* subtus glaucis scabiis, pednnncuhs erectis teriuinabbns pollicanbns, braiteis 1-2 in pedunculo alferms lanceolatis, calyce subangulalo gauco, lobis lanceolatis leflexis, corollā inagnā caemleA — in Japoniā spout, et cult. Pldnta ofluonalis vulgo Kekko et Kikjo vel Kirakoo —Kekko Kocinpf .imaen v p. 822 ex Thunb Corolla caerulea Campanula? Forsan Pldtycodon vel Adenopbord.

182 C DECLOETIANA (Ortmann betr. zur flor Bob in ex linn i83q n 1. litt p. 17), caule decumbente folioso puberulo umfloio 5 6-poll, foliis radicalibus renifoinibus, cauhnis ovato-lanceolatis, omnibus denticulatis, calycis lacinii* coiollam violaceam subaequantibus lanceolatis —In montosis Bohemia?

Campanula excluscp.

- L ADPRBSSA Ihunb = Lightfootia adpressa.
- C AGAESTIS Wall = "Wahlenbeigia agresis
- C ATIXA&IAFOLIA Reich = bympbyamlr.i pendula
- C. ALPINIL. = Adenopboa lihifolia
- C. ALTIFLORA Pojr. = Pmmatocdipus dlti/lorus
- C. AMPLEXicAULib Mitb. = Speculdia peifoliad
- C AMGDLVTA Rdfin = Specularia perfoliata
- C AitiKtNsis Kunze. = Specul.iiiA perfoliata
- C ARDORFscENb P Bi = Hainelia chi-ysautbd
- C ARIDA Kunth = Wahlenbeigia liudrioides
- (. ARMENA Slcv =Sympbyandia Annena.
- (AETATIGA Lag = Wahlenbeigia bed e race a
- C. AUREA L = Musschia diirea
- C BIFLORA Ruizet Pav =- Specnlana peifoliala
- C BRACTEAIA Ibunb = Roelld bracteata
- C CATENSIS L = Wableubeigia Capensis.
- C CANARIENSIS L r= Ciuarina Campanula
- (CAPELIARIS Lodd. = Wahlenbeigia gracilis
- V. CAPILLACEA Thunb = Wahlenbergia capillate.i
- C CERMIA Thunb = Wahlenbergia ceinua
- C CHIEKSSIS Presl =. Wibleubeigia bnauides
- C CIWEREA Thunb = Roella cineica
- C CLIVOSA h Banks = Wahlenbergia ringnstifolia
- C. CLI7OS4 h. Roxb =Wahlenbeigid linifolu.
- C corriNEA Sieb = P(1 sonata ^
- C CORD MA ^Vis =; Spetulana Speculum
- C CORONVTA. Ker =- Adenopboa coiouala
- C CO^ONOPIFOLIA Roem. el Sch, = Adenophoia ct touopifolia
- t CRISPA h Banks = Pns'mt itaipus ciispui.
- C DEHISCLNS Roxb zz Wahlenbtigia dehiscent
- C nENiicuiATA Buich. = Wahlenbcigja deulicul t.i
- L DKMiuuLAiA Spieng. = Adenopboa liitnspidata
- (ETONGATA Willd = Wdhlenbeigid Cdpeus»is»
- C E>SH-OTIA Lam z= Hcteiotlnxua cnsifolia
- (Liucoidts Lain _ I'lismatocaipub pamculatus
- (. ERYSiMtnuti Roeai ct Sch =; Admophon coiouopifoli 1

- C. EXOTICA Aid. = *Convolvulus* 3-color.
- C. FAICATA Roe in. et Sch. = *Specula lia falcata*.
- C. PAsicuLATA L. nr *LighifoolJa* fasciculala.
- C. PiLiFORMis R. et Pav. r=: *Wahlenbeigia Hnaiioides*.
- C. FianiERi Roem. et Sch. = *Adenophora lilifolia*.
- C. FISCHERIANA Spreug. = *Adenophoria coionopifolia*.
- C. FLACCIDA h. Banks. = *Wahleubeigia flaccida*.
- C. FLAGELLARIS H. B. K. = *Specularia peifoliata*.
- C. PRUTICOSA h. Banks. = *Piismatocaipus fmicosus*.
- C. FRI/TICOSA Hill = *PrismaJocarpus fiutico.*<us*.
- C. FRUTICOSA L. = *LIgblfootia sudulata*.
- C. GKNTIANOIDLS Laiu. zr *Platycodon graudiflorom*.
- C. GMELwr Roera et Sch. = *Adenopbura coionata*.
- C. GMFLIJTI Spieng = *Adenophora Gmelini*.
- C. OHILAHENSIS Rccm. et Sch. = *Spernlaiia Ghilaneasis*.
- C. GRACILIS Forst. = *Wahlenbergia giallis*.
- C. GRACIMS vai. Spreng = *Wahleabeigia marginata*
- C. GRACILIS Bert. = *Wahlenbergia Beileioi*.
- C. GRAMmiaFOLIA L. = *Edianthus gramuifolius*.
- C. GRAMINIFOLIA Waldst. et Kit. = *EdidianbnsKitaibelii*.
- C. GRAMINIFOLIA Host = *Kdraianthus tenuifolius*.
- C. GRANDIFLORA Jacq. = *Pldtycudon grandiflorum*.
- C. HEDERACEA L. = *Wahlenbergia hederacea*.
- C. HEDERAfOLIA Salisb. = *Wahlenbergia bederacea*.
- C. HIBTA Roem. et Sch. = *Specularia Speculum*.
- C. HISPIDA Eckl zr *Microcodon glomeiatnm*.
- C. HISPIDLA Ibunb. = *Wahlenbergia hi&pidula*.
- C. HOMALLANTHINA Ledcb. = *Wahlenbeigia homallanthina*.
- C. HYBRIDA L. = *Specularia hybrida*.
- C. iwroNSPicoA h. Banks. = *Wahlenbergia lobelioidea*.
- C. IWTERMEDIA Roein. et Sch. = *Adenophora liliifoLa*.
- C. iSTERRUPIA Peis. = *Prismatocarpus interiuptub*.
- C. JUNCEA et JDWCIFOLIA hoit. = *Wahlenbeigia lobehoides*.
- C. LARRAHTI Bert. = *Wdhlenbeigia Fcinaadeziana*.
- C. LILIFOLIAL. = *Adenophora liliifolia*.
- C. LILIIFOLIA Lam. = *Adenophora Lamarkii*.
- C. LJMWIFOLIA L. = *Phyteumahmonifolium*.
- C. LiHARioIDES Lam. = *Wahlenbergia Huarioides*.
- C. [iiNEAais'L. = *Wablenbergia linearis*.
- C. LiwPHYLLA Pall. = *Adenophora coronata*.
- C. LWOIDES Presl = *Wahlenbeigia linarioides*.
- C. LITTORALIS Labill. = *Wablenbergia gracilis*.
- C. LOBtLioIDES L. = *Wahlenbergia lobelioides*.
- C. LOBELtoiDES.Spreng. = *Wahlenbergia nutabunda*.
- C. LONGIROSTRIS h. Banks = *p.Umatocaipus cnspus*.
- C. LYRJEFO利亚 Sahsb. = *Michauxia campannloideb*.
- C. MARGXNATA Thunb = *Wablenbqrgia marginata*.

- C. MARSUFLORA Roem. et Sch. = Adenophora coronatn.
- C. MIKUTA Ag. = Phytcuraa minutum.
- C. MowiEviDEEwsis Spreng. = Specularia perfoliala.
- C. MONADET.PHA Pall. = Adenophora coronal*.
- C. KUTABUKDA Guss. = Wahlenbergia nutabunria.
- C. KUTAWS Sieb. = Syrnpybyandra Crelica.
- C. OsiETiCA Bieb. = Symphyandr^A Osselica.
- C. OTTONIANA Roem. et Sch. •= Lightfootia oxycoccoides.
- C. FAWICULATAU. Hanks. = Wahlfnbergia Banksiana.
- €. PAWICULATA L. f. = Wahlenbergia paniculata.
- C. PANICULATA Wall. = Cephalostigma pan icula turn*
- C. PARYIFTJOBA Sal. = Wahlenbergia lobelioides.
- C. TEIDULA Bieb. = Syniphyaudra pendula.
- C. PENTAGONIA L. = Specnlaria pentagonia.
- C. PERESRIA Fiscb. = Adenophora latifolia.
- C. PSRESKIEFOIJA R. et Sch. = Id.
- C. PERFOLIATA L. = Specularia perfoliata.
- C. psRiPLOciFOLiA Lam. = Adenophora periplocifolia.
- C. PLIGATA Pers. = Prisinatocarpus crispus.
- C. POLVMORPHA Soland. = Wahlenbergia gracilis.
- C. roMPONHFOLiA Fiscb. =r. Adenophora Gmelini
- G. POROSA Thunb. = Samoli sp.
- C. PRisMAToRARus Ait. = Prismatocarpns nitido9.
- C. PROCUMBENS Tbunb. zz= Wahlenbergia procumbens.
- C. VURTUREA Spreng. = Wahlenbergia purpurea.
- C. rUMiLio Portenschl. = Edraianihu purailio.
- C. PYGVJEA Lam. herb. z= Borago laxiflora.
- C. QUADRFIDA Br. = Wahlenbergia 4-flida.
- C. RABELAISIANA R. et Sch. = Adenophora Gmelini.
- C. REDOWSKIANA Chain, et Schl. = Wahlenbergia homallanthina.
- C. REPENS Lour. i=?
- C. RBOMBOIDEA # Willd. = Adenophora liliifolia.
- C. RIPARXA Boj. = Wahlenbergia Emirnensis.
- C. RIPARIA Le Pr. et Perrott. r= Wahlenbergia riparia.
- C. ROELLOIDES h. Juss. = Prismatocarpus panicniatus.
- C. RUBioDEsh. Banks. = Wahlenbergia diffusa.
- €. SAJAWENSIS Pall. = Adenophora coronata.
- C. SAXICOLA Br. = Wahlenbergia saxicola.
- C. SERPYLLIFOLIA C. Bauh. r= Linnaca borealis.
- C' SERPYLLIFOLIA "Vis.= Edraianthus serpyllifolius.
- C. SESSXLIFLORA L. = Lightfootia longifolia.
- £.. siLEMiFOLiA Host = Edraianthus pumilio*
- C. SrEcumM L. ass Specularia speculum.
- C. SPBCULTIM var. Ui v. = Specularia Coa.
- C. SPIKULOSA h. Banks = Wahlenbergia spinnlosa.
- C. SPRETA R. et Sch. = Adenophora liliifolia.
- C. SPURIA Pall.—Specularia hyhrda.

- C. STENANTHINA Ledeb. = Adenophora coronata.
- C. STYLOSA Bess. = Adenophora liliifolia.
- C. STYLOSA Lam. = Adenopliora stylosa.
- C. SUAVEOLENS Willd. = Adenophora liliifolia.
- C. SUBULATA Thunb. = PnMuatocarpus subnlatiis.
- C. suBurATA Spreng. = Light footia subulata.
- C. SYKGENKSFLORA Pall. = Adenophora coronata.
- C. TEWELLA L. = Lightfootia tenella.
- C. TKNUIFOLIA W. fit Kit. = Edraianthns tenuifolius.
- C. TETRAPHYLLA Thimb. = Adetiophora verticillala.
- C. TKALICTRIFOLIA Spreng. = YYahlenbergia ibalictrifolia.
- C. THUNDERGII Roem. et Sch.m Roella? Thunbergii.
- C. TRiHYLLA Tbuob. = Adenopbora triphylla.
- C. UMBROSA Dietr. = Adenophora liliifolia.
- C. UNIDKHTATA Tbunb. = Lightfootia i-dentata.
- C. VERTICILLATA Pall. = Adenophora verlicillata.
- C. vmc.EFlloRA Vent. = Wahlenbergia gracilis.
- C. VIRIDIS Spreng. = Wahlenbergia viridis.

X'VIII. SPECULARIA Heist, sjst. pi gen. p. 8. Alph. DC. mon . camp. p. .4. — Onobrychis sp. Lob. hist. p. 22S. C. Bank. pin. p. 210. — Campanula sp. Dod. pempt. 168. Tourn. inst. 1. p. 112. Linn. gen. n. 290. — Avicularia Gessn. tab. phyt. 9 / . 76. /. Bauk. hist. 2. 800. — E la line Ccesalp. I. 9. cap. 3a.— Penlagonion Tab. ic. 316. —Speculum Tcneris Ger. herb. 35f. —Legonzia Durand. Jl. Jourg. i.p. afi. — Pri&raalocarpi spec, non Capenses Lher. sere angl. p. 2. Lam. et DC. fl. fr. 3. ed. 3. p. 708. — Apenula Neck. elcm. bot. l.p. a34 — Triodallns Rafin.

Calyx 5-Iobus vel abortu 4-3-lobus, tubo elongato prismatico vel longè obcouico. Corolla rotala, 5-loba. Stamina 5, Jibera, filamenlis merabranaccis pilosis anlhcris brevioribus. Stigmata 3. Capsula longè pristica , 3-locularis, valvis 3 lateraliter in superiori parte sitis de* hiscens. — Herbae annuae bumiles, floribus sessilibus, hemisphsrii Loreal is incolse.

* *Cdljcis tubus longissimus angulosus. Capsula propre lobos calycis lateraliter dehisces. Semina ovoidea. — Folia inferiora obovata Integra, alia ovato-oblonga vel lanceolata subintegra non amplexicaulia. — Gerontogece.*

1. S. PBITAGONIA (Alph. DC. mon. camp. p. 344), caule rarooso roajore, fl0-ribns tenninalibnssoiitanis, calyce piloso, pilis rigidis, lobis patentibns longis linear-i-lanceolatis longilndine corolla; vel brevioribns. () in Oriente ab Aleppo (Russ. in h. Banks!) et Creta (Tourn.!) ad Tbraciam (Tonrn.!).— Campanula penlagonia Linn. sp. 1. p. 23g. Desf. choix de pi. da cor. p. 44. t. 33. vel in ann. du mus. ri p. 10. t. 18. Ker bot. reg. t. 56. opt. Alph. DC mon. camp. p. H4« Speculum Teneris ilore amplissimo Thracicum Rai hist. 1. p. 742. Campanna pentagonia tlore arapllissimo Thracica Tonrn.! inst. il'j. Prismatocarpns pentagouius Lher.! sert. angl. p. a. "Variat caule subpilosu, scabriusclo vel glabro, corollâ 6-12 lin. longâ. (v. v.)

jg pubescent, tota incana, lobis calycinis bracteisqae ciliatis. In Asiat zui- ñore (Aacher! i836 n. i306, 18^7 n. 1867).

2. S. FALCATA (Alph. DC. mon. camp. p. 345), canle snbsiniplici glabro vel scabriusclo, floribns longè spicatis vel apice approximalis, calyce glabro vel naarginibus scabro, lobis longissirais lanceolato-acaninatis apice reflezis

- corollā duplo longioribus. (J) in Corsicā (Soleir.!) Italiā, DaluiMia (Vis.) *tl* Graciā. Campanula arvensis e reel a, etc. Cup. panph. a. I. 10 el ejusd. Specuhim veueris dilutē cinereo Ho re stellato in a jus t. 224. ex Guss. Campanula arvensi* More iuiuimo cap&ulā grandi lluxb. cent. 4. p. ^4. t. 38. Prismatocarpus falcatus Ten. prodr. p. 16. fl. nap. 1. p. 77. 1. _ao. Campanula talcata Rcm. et Sch. sy.st. 5. p. 154. Guss.! plaut. sic. prodr. 1. p. 347. Lubi calycis 6-8 liu. longi falcali lalioies quām in Speculo. (v. s.)
- /? *scabra*, canle calycibns uervisque foliorum scaherriniis hirtellis, lobi* calycinis corollā vix duplo longioribns. J in Msderā. Prisraatocarpus scaber Lowe! (v. s. comra. à cl. doct. Leman.)
3. S. SPECULUM (Alpb. DC. inou. cauip. p. 346; caule ramoso, ram.i 3-floris, calyce glabro vel pubescente, tubo a pice constricto, lobis linear-lanceolatis patentibus deinuin reflex is longiludine corolla?, (f) in Euro pā media et circ/i mare Mediterranean], in segetibnj. Onobrychis altera IMgarum et Dodonri Lob. ic. 41S. Campanula arvensis minima Uod. pempt. 16b. t. 1. Campanula Speculum Linn. sp. s3b. Curt. bol. mag. 109. Sibtb. fl. graec. 3. p. n. t. aiG. Legouzia arvensis Dnrand. fl. Bourg. 1. p. 37. Prismatocarpus Speculum Lher ! sert. angl. p. a. Campanula cordata Vis.! stirp. dalm. spec. p. 5. t. a. (v. v.)
- f. calcina* (Alpb. DC. 1. c), foliis et lobis calyciuis latioribus. In Iberiā. Legouzia Speculum? Tiscb. iued. ex h. VVilbtrms. (v. s.)
- y. *pubescens* (Alph. DC. 1. c), iucana, cuule erecto. Campanula arvensis erecta Cup. hort. catb. p. 15. ex Guss. Speculum Veneris Ocyraifolin araplo Uore purp. Cup. panph. 1. t. 9 ex fiuss. Prismatocarpus Speculum k. Lam. et DC. ! tl- ft*. 3 ed. n. ^856. IVismatocarpus birtus Ten.! prodr. p. 16. fl. nap. 1. p. 76. t. 19. Campanula birta Roem. et Sch. syst. 5. p. 153. Guss. fl. sic. prodr. 1. p. 346. (v. s.)
- «*T. Libanica* (Alpb. DC. 1. c), caule burailiore simplici, foliis erectis, foliis apice approxiraatis. In Libano. (Meryon!)
4. S. HYBRIDA (Alpb. DC. mon. camp. p. 349), caule subsimplici, floribus apice approximatis, calyce scabro, tubo apice consticto, lobis erectis ovato-lan. ceolatis brevibus et corollā duplo longioiibus. (J' in Europā media, in regioue Caucasicā et circa mare Mediteraneuin, in ségetibus. Campanula arvensis minima erecta Mor. oxon. I. p. 457. sect. 5. t. 2. f. 11. non Dod. Campanula hybrid a Linn. p. iZy. non herb.! Sm. engl hot. t. 375. Urot. fl. lusit. 1. p. Q&7. Bieb. fl. cauc. 1. p. 156. excl. syn. Ruxh. Prismatocarps bybridus Lber! sert. angl. p. a. Prismatoc. confertns Meeuch. meth. p. 496. Campanula spuria Pall. iued. Roem. et Sch. syst. 5. p. 154. Planta 3-6 poll, alta pilosiuscuh. Flores 3-6. Lobi calyciu semper erecti latiusculi 3 lin. Iougi margine scabro-ciliati. (v. v.)
5. S. COA (Alph. DC. mon. camp. p. 350), incana, canle huinili subaimplici, floribu? paacis saperuè approximatis, lobis calycinis erectis lanceolatis acuminatis corollā brevioribus. (T) in arenosū maritimis insulx Cos. Campanula Speculum var. d'Trv.! en. pi. Aichip. p. 24. et mém. soc. linn. Par. 1. p. a80. Prismatocarpus birtns? an nov. sp. ejusd. in h. DC. Plania 3-pollicaris adsceadens pubi^cens cinerascens basi tamen glabrinacula. Flores 3-6. Calyeis tubas apice non const rictus. Ex forma loborum calycis et habitu'ad S. hybrida III accedit. (v. s.)
6. S. GHILANENSIS (Alph. DC. mon. camp. p. 350), caule simplici subramoso. foliis lanceolatis acuminatis serratis, floribus subramosis calycis laciniis corollā longioribus acuminatis serratis. (I in Persia prov. Ghilan (Pall. ex Roem. et Sch.). Campanula Ghilanensis Roem. et Sch. syst. 5. p. 154. Similis S. Speculo. ex cl. auct. sed diversa: canle simplici triplo altiore. foliis calycisque laciniis in longum macronem set ace um tortilnu abenntibns serratis.
- ** *Calycis tubus longe obconicus UVIS*; lobi 5-4-3. Capsula versus mediant partem lateraliiter dehiscent. Semin a sublenticularia. — Folia ovatoroiundaia am-pUxicauliā. — Americana.
7. S. PE*FOLIATA (Alpb. DC. mon. camp. p. 551), canle erecto bimplici. fnli^

amplexicaalibns ovatis vel rntuntialis crenato-den tan's, floribns axilla ribn< aolitariis vel ternis, calyce glabro , lobis 5-4-3 crcclis lanceolatis acntis corolla brevioribus. (I) in Americâ utrâque à Novâ Angliâ et regione fluin. Colombia usque ad Anmco ia Cbili merid. et Montevideo (herb. \Villd.). — Hook.! fl. bor. am. a. p. ao Cham. linn. i833. p. aoo. Carapannla pentagonia perfoliata Mor. oxon. a. p. 457- sect. 5. t. ia. f. a3. Specaluoi Veneris perfoliatam Rai. hist. i. p. 743. Campanula perfoliata Linn. spp p. a3<. H. B. et Kuntb! nov. geu. 3. p. 300. Pursh fl. am. Sept. 1. p. 160. Campanula amplexicauis Michx.! fl. am. bor. 1. p. 108. Campanula biflora Ruiz, et Pav. fl. peruv. a. p. 55. t. aoo f. 6. Campanula flagellaris H. B. et Kunth.! nov. gen. anie 3, p. 301. t. a65. Campanula angulata Ralin. il. Indov. p. 55? Triodallns rupestris Raf.! Campanula Montevidensis Spr. sy.^{et}. r. p. 738 ex Cham. 1. c. Campanula Anlicensis Kunze in Poepp. coll. pi. chil. 3. diar. 854! Lobelia sessilifolia Willd. herb. n. 3968 ex Cham. 1. c. Lobelia Humboldiana Roem. et Sch. syst. 5. p. 68. In eadem planta lobi calyces numero variant. Species maxime sporadica in novo orbo. "Vid sp. e Jamaica (h. Banks), Vera-Cruce (ibid.), Quito (h. Humb.), Peravia (h. Dombey 435?) et e Brasilia attalit Sellow ex Chain. I. c. (v. v.)

XIX. TRACHELIUM Pona Hold. ital. 44. ch. ex Tourn. inst. 130. t. 50. Linn. gen. n. 293. Adans. fain. nat. a. p. i34. Gcrttn. fruct. i.p. i55. / . 3i. Juss. gen. p. i65. Lam. ill. n. i5gi). t. iaG. Schk. hot. handb. it. 40. — Cervicaria? sp. C. Bauh. pin. 95. n. ao. — Rapnncali sp. Mor. Oxon. sect. 5. t. 5./*. ia. — Valerianae Spec. Cup. hort. cath.p. a aft. ex Cuss.

Calyx 5-fidus. Corolla apice 5-loba , tubo angustissimc. Stamina 5 , libera, filameotis tenuissimis nnlheris multoties longioribus. Stylus exsertus apice soliit propè stigmata pilosus. Sligmata 2-3 minima obtusa. Capsula 2-3-locularis, sphseroidea, erecta, lateraliter poris basi silis dehiscens.—Hcrbae caule erecto glabro, Horibus corymbosis numerosissimis parvis.

- I. T. Cfa.cx.Kcic (Linn. hort. nps. 41), foliis ova to-acntis grossè aerratis breviter petiolatis corollâ violaceâ hypocraterimorphâ, tnbo longo angustissiuio, cap- snlâ 3-loculari. ^ in rupestibus Africae sept. Hispaniae et Italia; raerid. Desf. fl. all. 1. p. 18a. Boissieu fl. d'Eur. t. i3;. Ten. fl. neap. 1. p. 79. Alph. DC mon. camp. p. 353. Valeriana carolea Urticace folio Barr. ic. 683. (T. V.)
 a. T. AirGUSTIFOX-iuiii (Schoosb. beob. nb. das Gew. ia Ma roc. p. 7a), foliis linearibas angastis integerrimis obtnsis sessilibns, corollâ albid^ infundibuliformi tubo elongato, capsolâ a-lorolari. — Raro in montosis repni Maroccensis. Caulisrectnssimplicissimns teres glaber striatns sabpedalis. Folia glabra lineam lata. Corymbns terminalis compositus, at in T. earuleo, sed minor. Tabus corolla*, longitudine pedaculi et ultra. Stylos fiiformis cor. duplo longioi. Stigma clavatam bifidum. (Schousb. 1. c.)

Species exclusc.

- T. DIFFUIUM Thanb. =i Prismatocarpas diffasus.
 T. TKirciFOLIUM Thunb. = Mercicra tennifolia.

XX. ADENOPHORA Fisch. ined. ann. 1816. diss. degen. 7. Adenophora et Guldenst. Ledeb. cat. h. Dorp. i8aa. Reich, h. hot. t. *3, 45, etc. Alph. DC. mon. camp. p. 354. non Lamour. — Floerkea Spreng. ann. 1818, non nil. nee Spreng. — Campanula} sp. Linn. — Campanula sect. Floerkea Spreng. syit. 1. P-735.

Calyx 5-fidus. Corolla campanulas vel infundibuliformis, apice 5-loba. Stamina libra 5, filamentislongismembranaceis cilialiisez pilis

conniventibus quasi conaatis. INectarium cylindriicum slyli basin cingens. Stylus saepè exsertus, in praefloiatione supernè pilosus. Stigmata 3. Gapsula 3-loculaus, lalerahter ad basin 3 valvis dehiscens. Semina ovata plus miniis complanata.—HerbaB, radicibus saepè crassis, caulis erectis, foliis alternis vel rariis subverticillatis, radicalibus petiolatis rotundatis, flonbus nutantibus racemosis vel paniculatis.
—Asiae scptentiionalis et Europae orientalis incolae.

* *Folia latiora ovato-lanceolata grossè serrata.*

- i. A. SIVEHSXS (Uph. DC roon camp. p. S54. t. 6), foliis alternis ovato-lanceolatis acuminatis acute senalis glabiit, flonbas spicato-iacemosis, lobis calycinis linear-lanceolatis mtegiis glabiis, coiolla infundibuliformi, stylo subexerto $\frac{2}{3}$ i?inChiaa(StauQtun'). I'ohaiadic non vidi; cauhna subtus palhdiora. Nectaum I hn longn. (v. s.)
/?. calyci* tabo birsuto. Alpb. DC I c (v. s.)
- a. A. TKirusriDATA (tisch.¹ in Roem etScbulr. 5 p i58), foliis alternis serratis glabiiasculis, radicalibus petiolatis rotundatis, caulinis sessilibas ovato-lanceolatis, flonbus latemosis, lobis calycinis tiiangularibns dentatis patentibus, corolla campanulata, stylo longitudine corollac. % in Dahnriæ. — Alph. DC. mon camp. p. 355 A. deuticnlata Ledeb. suppl. cat. h. Doip ann. |Si'i ex Finch, IU litt Reich hoit. bot t. a. optim. Campanula denticnlata Sp^{eng}. syst. i. p ^35 Folia snbtus pallidiora, remote ciliata, pihs albis mollibns bre vibns. Calyx glaberrimns Nectauam * lin. longam. Variat dentibus lobornm calycis plus minùsve distiactis. (v. s.)
3. A. VERTICILLATA[^] (Fisch. adumbr. gen. Aden p. 5), foliis subverticillatis serrato-dentatis, radicalibus petiolatis suhrotuudis, caulinis ovalo-oblongis, floribus saepius verticillatis parvis, lobis calycinis erectis linearibus subulatis integris, coiolla tubulos-campanulata, stylo longe exerto $\frac{2}{3}$ Dahuriæ (Pall Fisch.¹) et Japoniæ (Thounb¹) —Alph. DC. mon. camp. p. 356. Sweet brit. flow gard. sei. a. t. 160. Campanula verticillata Pall. voy. 3. p. 719. t. G. f. i, ed. gall, append. 8. p. a63. t. >J5. f. 1. Linn. f. vippl. 141. Lam. diet. 1. p. 58a. Camp, tetraphylla Thunb ! fl. jap. p. 87. Calyx glabernmns 2 lin long us. Corolla 4 lin longs inflata. Nectariura prismaticnm | lm. longnm (v. s.)
4. A. LATIFOLIA (Fisch¹ adambr. gen. Aden p. 6), foliis subverticillatis, caulinis ovalo-oblongis acuminatis grosse senatis scabro-ciliatis, flonbus sparsis vel subverticillatis, lobis calycinis patentibus lanceolatis margme denticuiato-scabns, corolla campanulato-infundibulifoimi, stylo subexerto. % in Dahan. — Alph DC. mon. camp p. 357* Campanula Pereskia Fisch. mss. camp, pereskiaefolia Roem. et Sch syst. 5. p. 1 it) Spreng. syst. 1. p. 735. Folia radic non vidi. Piliseu denticuli foliorum sen loborum calycis oculo nudo vix perspicui. COL oil a 6-9 lin. longa. Nectariuin cylindricnm | hn. longnm. (v. s.)
5. A. LAMARCKH (Fisch.' adumbr. gen. Aden p 6), foliis alternis ovato-lanceolatis acutè serratis ciliatis, flonbus racemoais lobis calycinis erectis lanceolatis integris glabiis, corolla infundibuliformi, stylo longitndiue corollae If in Sibinæ altaicæ. — Ledeb. fl. alt 1. p a45. Alph. DC. mon camp. p. 357. Campanula foliis radic. cordato-ovatis, caulinis lanceolatis, floribns nntanti-busGmel sib. i. p. 148. n. 28. t. 26? Campanula liliifolia Lam. diet. 1. p 58i? Calyx glaber lobis 1 | lin. longis. Coiolla semipollcaris Nectarium cylindricnm lincam longnm. Stylus intciduin coiolla brevior vel longior. (v. s.)
&. *angustifoha* (Alph» DC 1. c), foliis caulinis lanceolatis angnts longe acuminatis petiolatis, stylo exseito. An species? (v. s. comm. à cl. liscb. ex h. Prescott)
6. A. LILIFOLIA (Ledeb. cat. h. Dorp. 1822), foliis alternis, radicalibus petiolatis ovato-rotnndatis cordatis crenalo-dentatis, caulinis sessilibas ovato-lanceolatis gossè serratis, flonbuua numerosis pyramidatim paniculatis, lobis calycinis suberectis trianguluubus snbdentatis, coiolla campanulal4, stylo exerto

Tf. in Sibiria et Europa oriental. — Alph. DC. mon. oatnp. p. 35p. *Campanula pyramidalis* minor Alp. exot. t. 34o. p. 34*. G Alpini Linn.! sp app. p. 166uj. Morett.! bot.it. n. IT. p. it. Bertol. fl. it. 2. p. 476. *Campanula foliis radic. ex cordato-ovatis caulinis lanceolalis* Gmel. sibir. 3. p. 148 excl. t. 26. etsyn. Banb. pin. *Campanula liliifolia* Linn.'sp. p. 233. Jacq. b. Schoenbr. 3 p. 46. t. 335 Sin. prodr. fl giaeac. 1. p. i38. Bess. fl. gahe. 1. p. 16¹. Ker bot reg. t. a36. C. rbomboidea (*i* Willd. sp. x. p. 899. Camp. orabrosa Dietr. lexic. r. p. 675. Camp. intermedia Roem. et Sch. syst. 5. p. n_o. A. intermedia Sw. brit. flow. gar. ser. 2. t. 108. Camp. Fiscbeu Roem. et Sch. ibid, p. 116. A. coinmnus Fisch.! adumbr. gen. Aden. p. 6. Ledeb. fl. alt. 1. p. 346. *Campanula stylosa* Bess. cat. h. cren. 1816. non Lam. A. stylosa Reich, h. bor. t. 45. Radix crassa. Folia glabm vel pilosiuscula. I¹ lores saepè suaveo-Jentcs, calyx glabenimo, lobis interdūm nondentatis 1 j- lin. longis. Nectarim brevè, nonlineam longnm (v. s.)

f. *infundibuliformis* (Alph. DC. 1. c.), corolla infundibnliformi. *Campanula liliifolia* Waldst. et Kit. pi. rar. hung. 3. p. 274. t. 247. Camp. sua-veolens Willd. ennm. h. bei. suppl. p. 10. Horn. h. Hafn. Mippl. p. 23. Reich, hort. bot. t. 32.

y. *spreta* (Alph. DC. 1. c), caule apicem versus pubescente, foliis utrinqnè subhirsutis, germibus hispidis. Camp. *preta Roem. et Sch. syst. 5. p. ia3, ex h. Schult. Turic ! (v. s.)

7. A. STYLOSA (Fisch. adumbr. gen. Aden. p. 6, non Reich.), foliis alternis petiolatis, inferioribus obovatis sinnatls, superioribns ovato-aenrainatis snbeordatis serratis, floribus paucis racemosis, lobis calycis triangularibus eiectis integris, corollā infundibalifonni, stylo sxipis exerto. % in Sibiria et Tatarid (Lam.). Cull a in hort. Paris, anno circ. 1782. — Alph. DC. mon. camp, p. 360. Ledeb. fl. alt. 1. p. 24¹. *Campanula foliis ex coidato-lanceolatis*, etc. Gmel. sibir. 3. p. 15i. t 27. *Campanula stylosa* Lam. diet. 1 p. 580. Willd. sp. 1. p. j¹ot, non Bess cat. h. creni. Caulis subascendens. Folia ladic. non vidi. Calyx glaber, lobis 1 | lin. Corolla 4-9 lin. longa. Nectarium cybndricum latnm liueam longnm. (v. in heib. Lam. et Juss.)

8. A. rERipociFOTIA (Alph. DC mon. camp. p. 36i), foliis alternis petiolatis ovato-acutis subcordatis crenato-serratis, floubus paucis, lobis calycinis triangularibus acentis subdentatis, corollā campauulatd apice trancaU, stylo exerto — in Sibiria, colt, in h. Paiis. tempoie Lamarck. *Campanula peiiplocifolia* Lam ! diet. 1. p. 580. Roem. et Sch syst. 5. p. i n . Caulis adscendens. Folia ad mediara partem planta? appioximata glabernma, petiolis semipollcaribus , limbis 5 lin. longis 4 lin. latis. Lohi calycini linediu longi laterdūm denies 1-2 prsebente. Cor. 5 lin. longa. Nectanum latum | lin. longum. (v. in h. Lam.)

9. A. coRONOrFOMA (Fisch.! adnrabr. gen. Aden. p. 5), foliis alternis, radcalilibus petiolatis ovato-ioinnd.itis coidatia cienato-dentatis, caulinis ses&ilibus linear-lanccolatis glabeinmis Irrvibus , floribus paucis racemosis, lobis calycim patentibus lanceolalis integns, coiollā rampanulalā, stylo longitudine collae. If, in Daburiā et Sibiria altaicā. — Reich, hort. bot. t. a3 Alph. DC. mou. camp. p. 362. *Campanula coronopifolia* Roera. et Sch. syst. 5 p. !5¹. *Campanula Fischeriana* Spreng. cur. post. p. 97. A. Lamarkii angustifolia Fisch. 1. c. Affinis A. Lamarkii sed folia glabu, nectanum dimidio lon_<ius. & Margines foliorum subtūs levoluti. (v. s. comm. à cl. Fisch.)

yS. *latifolia* (Fisch.' 1. c.) foliis lationbus argute dentatis. (v. a.)

y. *angustifoha* (Fisch.! 1. c.), foliis angust'ssimis sobintegris. *Campanula erysimoides* Roem. et Sch. syst. 5. p. 102? ex Fisch. (v. s.)

** *Folia angustio^a Unearia integia vel subintegra.*

¹(\ A. GMELIWI (Fisch.! adumbi. gen. Aden. p. 5), foliis caulinis alternis erectis linearibus angntissiuus integiisglabrs lavibus, floribus paucis secundis, lobis calycinis erectis lanceolatis integris, corollā campannlato-infundibuhformi, "yto inclusio. ^? in Dahuria, — Alph. DC. mon. camp. p. 3C3. *Campanula*

foliis linearibns rigidis integerrimis, etc. Gmel. sibir. 3. p. 16a. t. 33. Campanula pomponiifolia Fisch. mss. ex se ipso. Campanula Rabelaisiana Roem. et Scb nit. ay st. 5. p. x53. Folia radic. non vidi, caulinata margine sub I us revoluta. Lobicalyc. 2 lin. longi. Nectarum | lin. (v. s.)

/2. *stylosa* (*k|A*). DC. 1. c), stylo exerto. Campanula Gmelini Spreng. manr. 1. p. 56, non Lam. nee Hess.

if. A. CORONATA (Alph. DC. mon. camp. p. 363), foliis radicalibus petiolatis ovato-rotundatis cordatis crenato-dentatis, eaulinis alternis erectis linearis-lanceolatis remutè sub.serratis scabriusculis, floribus paniculatis lobis calycinis linearibns integris, corollâ cainpanulata⁴, stylo exerto, nectario maximo. Tz in Dahuriâ (Fisch.! Tarcz.!) et in Sibiriâ altaica (Pall.! Ledeb.). Campanula inndelpba Pall, et syngenesiilora ex Fisch. lilt. Campanula liupbylla Pall, in b. Banks.! Camp, coronata Ker bot. reg. t. 149. excl. Gmel. r. 33. Campanula Sajanensis Pall, in h. Kuuth! Willd.! mss. Roe in. et Sch. syst. 5. p. 102, non Fisch. Camp. marsupiiHora Roem. et Scb. syst. 5. p. 116. Camp, stenanthina Ledeb. mem. acad. petr. 5. p. 525. Camp. Gmelini Roem. et Scb. syst. 5. p. 103, non Spreng. A. ruarsupiiflora Fisch.! adumbr. gen. Aden. p. 5. Reich, h. bot. t. 15. Ledeb. fl. alt. 1. p. 244. Nectariou 3 lin. longui cylindricum apica dentatum et pilosum. Filarienta stau. lanceolato-ligulata pilis longis ciliata. (V. V.)

•j- Minus nota.

1?. A.? TRIPHYLLIA (Alpb. DC. mou. camp. p. 365), foliis ternis linearibus, integris glabris, floribus verticillato-teinatis. — in Japonia. Campanula triphyllii Tbunb. fl. japon. p. 87. Radix fusiformis. Caulis erectus glaber. Folia sessilia pollicaria margine reflexo-patentia. Pedunculi axillares i-flori, rarius divisi, foliis triplo longiores.

XXL STMPHYANDRA Alph. DC. mon. camp. p. 365. EndL gen> p. 518. — Campanula sp. auct.

Calyx 5-fidus. Corolla apice 5-loba, saepius velutina et ochroleuca. Stamina 5, iumentis liberis membranaceis ciliatis, antheris in tubum ion gum a pice 5-dentatum connatis. Stylus pilosus. Stigmata 5, iiliformia. Capsula 3-1 ocularis, valvis 3 lateraler ad basin dehisces. — Planta? perennans herbaceae aut sublignosae, foliis petiolatis cordatis inflorescenti⁴ Campanularum.

Sectio 1. ANOTOCALIX Alph. DC. 1. c. et mss. — Melanocalyx
EndL I. cl.

Sinus calycis nudi.

1. S. CRETICA (Alpb. DC. mon. camp. p. 366. t. 8), glaberrima, caule erecto berbuceo, foliis ovato-acutis irregulatiter serratis, inferioribus amplissimis, floribus racemosis nutantibus, lobis calycinis longè acapiuntis, corollâ infundibuliflori-caiupanulata⁴ glabra. %? in regione Spbakiotarui ins. Cretae. Campanula nutans Sieb.! berb. cret. non Lam. (v. »)

a. S. STYLOSA. (Royl. ill. bimal. p. a53), incana, raniis sublignosis divergentibus sa?pius dichotomis, foliis ovatis utrinquè acutis dentatis, pedicellis folio oppositis, lobis calycinis triangularibus dentatis, corollâ subvelutinâ, stylo corollâ paulò longiore. If. in montibus India bor. Folia inferiora..., superiora sessilia, 4-5 lin. longa, 1 4-a lin. lata, aubutus incana, supernè sericeo-pubescentia. Corolla flava. Pedunculi folio longiores. Calyx sericeo-incanus. Anthers glabrae connatx. (v. s. conini. à el. Royl.)

Sectio 11. OTOCALYX Alph. DC. I. c. et mss. — Sevicodon EndL I. c.

Sinus calycis appendicibus obtecli.

3. S. PENDUTJA (Alph. DC. I. c.), caulinis ramosis pendulis sublignosis pilosis,

foliis ovato-aculis crenato-dentatis velutiins, floribus* paniculatis, loris calycinis lanceolatis, appendicibus ovato-acutis, corollâ infundibuliforii velutinâ.— In Caocasi rnestribiis. Sweet brit. flow. gard. ser. 2. t. 66. C. A. Mey. verz. der pflanz. in Caucas. p. 85. Campanula sieuclola Ilieb. ft. cauc. 1. p. 1⁴ et suppl. 384. Fischb. cat. b. Gorenk., ann. 1812. p. 3i. Campanula alliariaefolia Keicb. cent. 3. f. 345. ex Cham, linn. 1833. p. 320, non alior. (v. s.)

4. S. AKMENA. (Alph. DC. 1. c.), caule erecto virgato rainoso vigido piloso, foliis ovato-acutis grossè serratis velutino-incanis, floribus teuuinalibus solitnriis erectis, calyce incano, laciniis triangulariilius integris, appendicibus reile&is minimis acirtis, corollâ tubulosâ vclintinâ. If in Caucaso <irg. Gandscham (Slev.'j et in rdhioribA niomiiuu Talyshb (C. Meyer veix. der Pflauz. cauc. p. 85 et Hohenh.). Campanula Annena Stev.! meni. soo. inosq. 3. p. a5b'. Bieb. fl. cauc. suppl. p. 145. (v. s.)
5. S.? OSSETICA (Alph. DC. 1. c.)_f canic siraplicihumili, foliis petiolatis cordatis duplicato-serratis, calycibus glabris, lobis denicalatis appendicibus icflexis nmltò longioribus, corollâ suL5-fidâ, lobis inliis pilosis. % in Ossedaelbericac moute Kaischaur. Campanula Osselica Kieb. fl. cauc. suppl. p. 145. Kxejus de.scr. valdè affuius S. pendula?.

XXII. MUSSCHIA Vumort. comm. bot. 18ai. p. 28. omissis pr&cip. charact. Alph. DC. won. camp. p. 368. Endl. gen. p. 518. Campanula sp. Linn. f. suppl. p. 141.

Calyx 5-fidus. Corolla profundi 5-fida a urea. Stamina 5 libra , ilamenlis basi glabris leviltir expansis; anheris cuspidntis. Stigmata 5. Calysula 5-locularis, lo-nervia[^] lateraliter fissuris numcrossis transversis inter nervos dehiscens ; loculis 5 cum lobis calycinis ct ideo cum staminibus alternantibis. Semina ovoidea. —SoftVutex habitu h toto. Ordinc discedciis, glaberrimus, caule crasso, foliis altcrnis maximis ser* ratis , fibribus numcrossis aureis terminalibus et axilluribus. Genus. **dis-**linctissimum.

1. M. AUREA (Dumori. 1. c.)_t foliis apice ramoruin conferlis ovato-laiiceolatis integris semi-pollicaribus. k in insulis Maderâ (Masson in h. B:lnlu! Leman!) et Teneiiffâ (Bory).— Alpb. DC. 1. c. Campanula aurea Linn. 1. c. Bory il. fortun. p. 330. Veut. malm. t. 116. Duliaiu. tr. des arbr. 3. p. J6Q C. ic. bon. Ker bot. veg. t. 57. (v. v.)
- f. angustifolia*, foliis angustioribus. In rupeslribu* Mader*. Campanula aurea Jacij. bort. Schoenbr. 4. t. 472 var. #. Ker 1. c. Masson herb. Bunks.! (v. s.)

XXIIJ? PENTAPHRAGMA fTalU list n. i3i3. Endl. gen. i.p. 50₉. non Alph. DC. mon. camp.p. 05. — Phytemna begonifolium Roxb. h. beng. p. 85., fl. ind. 2. p. 108. Jack. mat. misc. in Hook. bot. misc. i.p. 277. t. 5?.

Calyx tubo ovoideo, lobis 5 ohtusis rotundalis tubo brevioribus. Corolla 5-partita , lobis patcnibus obtusis oblongis integris marcescentibus lobis calycinis sublongioribus post anthesin accrescentibus. Stamina 5, lobis corollaealterna, iisdemidio JDreviora, libra, filamentis basi latioribus lanceolatis. Ovariun inferomo-loculare (interdum 4-loculare ex Jack). Stylus brevissinus crassus, lobis calycinis vix longitudine **aequalis**. Stigma trilobum, lobis patentibus oblusis brevibus. Pili collectorcs.... Indusium nullum (1). Capsula 5-locularis, debiscentia

(1) De iudicio locutus sum iu Monogr. enmpn. p. 93 , anno 1830, sed co tenpore Scaevoiae species in herbario nostro, pro Peutaphragmate, inter plautas Walli-clii sub umcro I 3 I 3 irrenecrat, nec uisi recenter verum Peutapragma inueiraus.

ignotū, cuius indicia forsan latcraliler propè summam partem tubi calycis. Serina globosa. Placentas crassae. —Herba insulae Pulo Penang dicta?, habitū à Campanulaceis omnibus diversisimo. Gaulis flexuosus repens, cum petiolis racemisque pubescens, pilis ferrugineis fasciculatis coutortis. Folia alterna petiolata inaequaliter cordata obliqua reniformia obtusa vcl acuminata glabra acutè serrata, limbo 6-8-poll. longo 4-5-poll. lato, petiolo bipoliicari. Racemi axilla res pauci petiolo subsequales, floribus approximatis secundis revolutis scorpioideis breviter pedicellatis, bracteis ovatis obtusis lanuginosis. Corolla alba.

1. P. BEGONIFOXIUM (Wall.! 1. c.), in sylvis iuauiae Penang. Phyteamabgonifoliam Roxb. 1. c. (v. s. oomm. ab ampl. coet. mere. angl. ind. or.)

Trib. III. MERCIEREJE.

Ovarium dissepimento incompleto uniloculare. Ovula 4 in inferiori parte ovarii, 2 utroque latere dissccimenti membranacei minimi.

XXIV. MERCIERA Alph. DC. mon. camp. p. 369. Endl. gen. i.p. 518. — Trachelii sp. Thunb. prodr. p. 38. Linn, suppl. i43. — Roellae sp. herb. Banks.

Calyx 4-5-fidus, tubo ovoideo. Corolla tubulosa 4-5-loba, tubo angustissimo. Stamina 4-5, libera, filamentis basi etiam tenuissimis antheris multoties brevioribus. Ovarium inferum, dissepimento incompleto basi vix perspicuo uniloculare. Ovula 4j nempe 2 utraque facie dissccimenti in inferiori parte ovarii. Stylus filiformis, sscpiis corollā longior. Stigma bilobum brcvissimum. Capsula ignota, indebiscens? vel modo Roellae vertice demum aperta? — Sufruticcs Gapenses, babitu. Roellae, caule erecto ramoso, ramis valde foliosis, foliis alternis confertis linearibus erectis subulatis ciliatis rigidis, fasciculis foliorum minorum plerumque in axillis, floribus spicatis sessilibus axillaribus, inflorescentia indefinite, calycis tubo nispido, lobis lanceolatis aculis, corolla Trachelii.

- x. M. TKNUIFOLIA (Alph. DC. 1. c. p. 870. t. 5), foliis valde ciliatis, corollis foliis longiore apice solam 5-1 obi caerule; lobis lanceolatis patentibus dorso pilosis, stylo snbexerto. ^ ^{aa} Caput Bonae-Spei. Tracheliom tenuifolinm Thunb. prodr. cap. p. 38. Linn, soppl. p. 143. Roella compacta, R. pinifolia et Tracheliom tennifolinm Thanb. in herb. Banks! *Variat calyce 4-5-fido. (v. in h. Banks et Danant.)
- a. M. BREVIFOMA. (Alph. DC. I. c.)» foliis sabciliatis, corollA longitudine foliorum apice 4"5-lobJl albd, lobis lanceolatis patentibus glabris, stylo corolla doplo longiore. 3 ad Caput Bonae-Spei, in montosis propè Dutoitskloof (Dreg!). Roella laterlilora h. Banks! R. ciliata Dreg.! uon alior. In specimine Dreg, calyx ex corolla 4-1 obi. Ovnla certe 4 paulo snpra basin ovarii. (v. s.)
3. M. LEPTOLODA (Alph. DC. 1. c.), foliis ciliatis, corollA foliis subbrevioro albA glabrd 5-iida¹, lobia linearibos erectiuscalis glabria, stylo longitndine corolla: 5 ad Caput Bonac-Spei. (v. in h. Hook.)

Ordo CVI. CYPHIACEiE (i). — *Lobelia?* sp. *Linn.* — *Campanulacearun* gen. *Juss. gen. p. 165.* — *Lobeliae carum* gen. *Poir. diet. sc. nat. verbo Cfphia. Guille. diet, class, verbo Cfphia. G. Don gen. sj'st. gard. 3. p. 6g8.* — *Goodenoviae carum* gen. *R. Brown gen. rem.p. 28. Bartl. ord.p. i^{efj}. Lindl. nat. syst. ed. 1836.^{^?} 241. Presl in Mey. comm. pi. afr. austr. Dreg.p. 292. Endl. gen. i./>. 607.*

Calyx 5-fidus, lobis subinacqualibus. Petala 5, laciniis calycinis alterna, saepiis libera, nunc basi vel mediâ parte paulò connata facilè separanda et plerumquesub finem florationis omnino libera, oblonga vel lanceolata, subinoequalia, nunc in labia a cohaerentia, labio *superiore* tripetal, inferiore bipetal. [^]Estivatio subvalvaris. Stamina 5, petalis alterna; filamentis basi latioribus nunc connatis, medio et apice semper liberis; antheris disiinctis, verticalibus, introrsis, dorso pilosis, margine membranaceis glabris, loculis vix distinctis. Pollen è granis globosis disiinctis constans. Ovarium tubo calycis adnatum, bi-loculare, 00-ovulatum. Stylus glaber. Stigma laterale propè apicem vel apice ipso styli, labiuin superius corolloe spectans, obtusum, simplex, pilosiusculum, humore viscosissimo tectum, nudum vel forsan (rarius) indusio brevissimo? circumdate. Capsula polysperma, bilocularis, dehiscentiil serotinâ in plerisque ignot[^], in *C. bulbosa* tardè loculicidâ, rostro capsulam terminante (seu parte inferiore styli) parenchymate pleno demiim fisso, loculis intrâ calycis tubum sitis. Semina triquetra. Conf. ad *C. bulbosa* var. *β*. — Herbac Capenses, radice in pluribus tuberosit, caule erecto aut volubili, foliis alternis dentatis lobatis vel pinnati-palmative-partitis, floribus racemoso-spicalis axillaribus, inflorescenti[^] indefinitâ, corollâ albâ vel roseâ. — Ordo à Campanulaceis tiversus corollâ polypetalâ irregulari, sestivatione non valvari, stigmate indiviso laterali; à Lobeliaceis antheris liberis, polline sphærico, flore non resupinato, lobo nempe corolla) axi inflorescentiae per anthesin opposito; à Goodenovieis tandem, indusio stigmatis plerumque nullo (vel rariū subnullo), sita floris diverso, petalo enim nee fissurâ corolla? axi opposito. Medius inter Goodenovieas capsulii polyspermâ, Campanulaceas corollâ 5-partita (Lightfootia, Phyteuma, etc.) et genus Parastranthus propter flores non resupinatos in Lobeliaceis anomalam.

(1) Ordinem condidit et Jesciipbit (Ulectissimus filius Alphonsus DC.

CYPHIA. *Beig. cap p 173. Juss gen p if>5. Willd sp I p. §§5i. Ker hot. reg. t. fo>Gilli&n. dlet, class 5 p 290! Piesll. Edl Endl I L b1 Lobelias sp. Linn. Thunb. — Cyphium Gmel syst. 5. p. 370.*

Chiaactercs ordmis. — Divisia ex htbitft potiiis quātn ex adhx-
icntiA petalorum adeò variabili sumpta. Sectiones nnturnlcs ex dehis-
ce ntia capsulae vel stigma Us formā adhuc investigandae.

§o 1. *Cauhs erectus.*

* *Folia dentata.*

x. C PHYTEDMA. (WilKl. sp. T. p. q56), tuberosa, caule siraplici electo nudo, foliis oblongis leinotc denticulatis ad basin confertis patentibus in pelioluin bie\em maigmatnm angustatis, flonbus subspicatis, bracteis 3 ovato-acumi-
natis cihati tubo calycis diradio brevioribus, lubis calycinis lanceolato-acn-
minatis seiratis deraum leflexis tubo sublongioribus. (1 ? Capat Bona»-Spei in
legione occid. infer. — Ker bot. reg. t. 625. Presl! in oomm. pi. afr austr.
Dieg. p. 292. Lobelia Phyteuma Linu. sp. p. 23ig. Ibnnb 11. cap. ed. Scbult.
p 184. Lobelia nadicaulis Lam. diet. 3 p. 5go Cypbia *errata Spi syst. 1.
p. 809. Tuber oblongum. 'Vanat ciule folusque glabns vel pilosis, foliif> srpe
ciliatis. Coiolla ex albo purpmea babi supetae gibba, petalis sup. diu conni-
ventibob. Filamenta apice snbeonnata deiouiu libeia. (v s . comm. à cl. Diege
Lamb , etc)

a. C. LIWAROIDKS (Presl' in comm pi afr. austr. Dreg. 1. p. 294) 1 glbra ,
caule electo tereti lamoso, rarals divegentibus, foliis sessilibus lincaiiibus an-
^Ufr> lemote denlicnlatis liitegerrinii&qqe, ramis ilexuosi^ pedicellia bracted
ovato-armminatu integrd diuudio feie longionbus basi et apice bibracteolatis,
lobis Cilycjnis ovato-acutis integiis tubo tnibinato btevissimo longioibns. —
ad Capul honx-Spci, in paitc infer, australi. Foi&an diveib* species sub eodem
DOiniue latent ex cl. Picsi. (v. s. in pi. Dieg)

fi. micrantha (Presl 1 c), foliis caulinis mediis usque ad basm tupaititis,
lacinus foliitque reliquis angnste hnearibus integer!luiis, racemo volabili,
iloribus mirioibiis. —in gianunosis pi ope Ganep flu in. alt. 4200 ped.
Cyphia n. 6272. Dreg. heib.

3. C. TKirurFOLIA, caule erecto flexuoso simplici tereti infernè glabro snperoc
subvelutino, foliis sessilibus lineaibus glabns denticulatis, racemo spiciformi_y
pedicellis prope apicem bibracteolatis biacteA capillace^ sublongioribas, lobia
calyemib ovaio-acutis tubo taibinato aequahbus petalis 6° brevioribus. — ad
Caput Bonae-Spei. Lightfootia sessilifolia ZeyhJ pi. exs. n. 327, non n. ao3.
G volubilis ft Grie&selich linn. i83o. p. /ao? Cauhs seroipedalis. Folia panca
6-10 liu longa vix | lineam lata. Bracieae i-3 lin. longae. Plores non se&siles sae-
pius solitaiii ad babin race mi pedunculati, pedanunhs 3-5-flous. Petala li-
beia oblongo-lanceolata. (v. s. in h. Monc.)

4. C. PERSKIFOLIA (Presl¹ 1. c. p. 29>)» glabra, caule erecto simplici angulato,
folns sesilibus electis linear-ldnceolatib snbacatis* ngidis maigine ievolutis re-
mote serrulati*, spied basi nudiusculd inultifloid, floiibus subsesibiliu*, pedi-
celbsbracte lanceolato-acuniinata' utrinque i-dentatâ duplo tiiplove brevioii-
k's apice bracteolatis, Jobii calycinis lanceoldto-acnminialis senatis erectis
tubo turbinato longionbus petalis 4° bievionbus, aatheris glabiis —ad Caput
Bonae-Spei ;n regione infei onentah — Diege beib n. 4017. Habitus Phyleu-
jTiatia limonifoln canlis sesquipedalifc. Folia 2-3 poll, louga, 2-lin lata. Petdla
diu in uttoque l_dbio connata tubum inflexum piccbentia. Ovariom semi-supe-
IIIILL Stigma obtusum. ^v. s.)

* * *Folia pinnatdobata,*

5. C. CARDAMIAES (Willd sp i p. q5J), caule scdpioru electo siniplici stiiato
MISO, foliis pelioldti pindlhihdis villosis, pinnis ovatis utiiicjue atUuuatis

dente i-a notalis mediâ 3-loba*, flonbus lacemosis, pedicellis brerissimis, ilia-meDtis conn at is, antheris libens hiisutis. — ad Capnt Bonae-Spei.— Lobelia CaidamiusThunb. prodr. p. 3Q. » cap. ed. Schult. p. 185. Caubs palmaris et ultrâ. Folia digitalia radicalia. — Specimen vidi in heib. Dunant à cl. Ecklon lectum, phiasi Willd. simillimum sed ii I amentia basi connivenibus nee con-natis. (v. s.)

6. C. incisa (Willd. sp. i. p. 953), caule scapiformi simplici erecto snlcato vil-losa, folns petiolatis villosis, longilodinc petioh inciso-subpinna-tiffidis, flori-bus racemosis, pedicelbs bievissnms, coiolla* bilabiate, petahs lanceolatis , filament is villosis connatis, antbeii libens villosis. (j) ad Caput Bonae-Spei, prope uibem, in collibus Lobelia incisa Tbunb. piodr. i. p. 39 fl. cap. ed. Sebult. p. i&5 Radix descendens. Caubs spitbaraaes et nltra. Folia cnui pe-tiolo 2-poll. Corolla albo-incarnata, pet a Us 3 snper. cohaeremibus facile sepa-randis, 2 iof. connatis pendulo- refLexa. Stylos longitudme filanientorum. Stigina lateiale capitatnm obtnsum patenforme.
7. C. BUIBOSA. (Berg, rap p. 172), ladice tuberosd*, caule eiecto simplici pube-mlo, foliis infenoribus palmatipatit in petiolam inarginatnm limbo doplo bievioiem angu&latis, lobis utunque 3 terminah roajore obtusis hneaii-oblone-gis integns vel uregulaiiler a-fid is dentatisque, folns snpenoiibus sessilibus piofuude 3-7-lidis, flonbus spicato-racemosis, pedicelhs pilosis folio multo bie-vionbas apice biactcolatis, lobis calycinis lanceolatis subaculis tubo turbinato tuplo longionbus petalis 5° brevioribus. If ad Caput Bonae-Spei in montosi* piopè urbem. — \illd. sp. 1. p q53. Sieb! pi. exs. n. i36. Piesl! pi. afr. austi. Dieg. 1. p. 297. Lobelia buibosa Lifen. sp. p. 1019 Tbnnb- fl. cap. ed. Sebult. p. 184. Lobelia Cyplia Gmel. non Ibunb. Rapuntium tubeiosum fo-liis nmltifidis flonbus spicatis Burin. afL p 98. t. 38. f. a. Cyprium Capense Gmel sysL 5. p. 370. Taiiat iohis glabiis vel puberulis plts minusve lobatis. (v. s.)
8. *angustiloba*, lobis linearibus angnstioribns, flore minore. C. bnlbosa Kckl.' in h. Dan. C. buibosa Butm.¹ in b DC non ic cit Capsula (ex spec, b. Dun) semi-stipeia; pars mfeiaoi bilocularis, infid calycis tubuin bemi-sphaeiicum 10-neiviuni, pais supeior hbira, prxcedenti sublongui, ovoi-dea, acuta, stylo persistente terminals, bisnlcafa medullâ fareta, sei6 valvi» a loculicide a basi subdebiscens. Semina pluriina tnqueta punctata. (vs)

§. 2. *Caulis volttibilis.*

* *Folia pwnatilobata.*

8. G. DLNTARIEFOLA (Tresl 1. c. p. 2Q5), caule volubii teretiuscolo, foliis petio-latiSt infenoribus tusectis, segmentis petiolatis lancerlatis acuiuinatis seuatia lateialibus bipartitis, foliis florahbus 3-lobis lobo medio majore, pedicelbs axil-laribus folio brevioribus media bibiacteolatis, calycis lacimis lauceolatis acutis tubo dnpo longioiibus corolla 4° bievionbus.— ad Cap. Bonae-Spei htas austiale.
9. C. TOMEKiosA. (P>esl! 1. c p. 29^), puberula, caule volabili ramoso tereti, foliis breviiei petiolalis 3-parlitis, segmentis subaequalibns oblongo-lanceolath, mucro-nulatis integiis aut obsolete nnlobis, flonbus axillanbus solitaiis fohb brevio-ribus, pedicelbs peliolo duplo longionbus calycisque tubo tomentosis , calycis lacinns lanceolatis acaminatis tnbo tuibinato sublongioribus petalis triplo brevioribus. — ad Caput Bonae-Spei in parte infer, occid. prov. Parvae Nama-quae. C. digitata Dreg, catal. pi. exs. "Vanat pedicellis nudis \el basi et apicc bracteolatis, bracteolis verisimiliter caducis. Folia 6 lin. longa. (v. s. xn pi. Dreg)
- (i. *minor* (Presl 1. c), foliis minoribus, segmentis folioram digitafo-2-5-lobis. — in legione infer, anslrali Cipitis Bonje-Spei. Cyphia n. 6277. Dreg. catal pi. ess. ex Presl.
- >. *glabtaj* foliis j-pailitis glabiis, pedictlbs glabriusculis basi et apace

bracteolatis , calyce glabro Comm. à cl. Dieg. sub nomine C tonientosa var minor, (v s)

to. C. roYnACTYLA (PresPl. c. p 296), glabia , caule teretiusculo ramoso volubili, foliis breviter petiolatis limbo 3-pirtito, segmentis linea oblongis medio longiore margine integris tenuiter revolutis indivisis vel inseqn.iliter piofundè bifid is apice callosso-mucronulatis, foliis superioribus sessilibus profunde 3-5— lobis, lobis lateralibns mmoribus, biacteis 3-seclis, lobis ovato-acntis medio xpajore, pediceliis bractea' snblougiore apice bracteoldtis, lobis calycims late lanceolatis aiuminatis tubo turbinato duplo longioribus petabs tnpl bievio-nbui. — ad Caput Bonae-Spei in regione infer occid Cypbia n. 6278. Dreg ' plant, exs. (v s comm a cl Diege)

ix. C. DIGITATA (Willd sp. I p. Q53), glabra, radice bulboso" caule volnbili Mimplici stnato, foliis sessilibus digitato-pinnatis lobis hueanbus margine leflexis, pedicellis longitudine bracteae, bracteis folio similibus ovatis, lobis calycims ovatis acutis comexis ei ecu's, petal is in ntroque labio semi-cohaerentibus. — ad Caput Bonae-Spei prope urbem et in legione internd Zwaitebergen. — Piesl in comm pi afr anstr. 1 p. 296 Lobelia Cypbia Tbunb. prodr. p 3Q Lobelia digitata Ihunb. act. gorenck. 5. p 62. fl.cap ed. Schult. p. x85. Pedicelk pnr-purascentes. Corolla cseraleo-albida, labio infer 3-partito , lacinns nngmcalaribus Lobi calycis semihneam longi. Capsula subrotanda angulata biloculaiis bivalvis.

»a C. ANGUSTIFOLTA (Preil m Eckl. herb et m comm pi. afr. austr Dieg 1. P 29^)» caule volubili teiti, foliisbievitei petiolatis 3 ranus 5-partitis, lacmiis inaequaibus linearibus angntis atfatis Integeniinis plams, lacemis laxis, brae teis. 3-pariitis pedicello medio bibiactcolato duplo quadruplov brevioribus , calycis lacimis hneanbus raucionatis patcntibus tubo longioribus — Caput Bonae-Spei in legione oriental 1 infer. Habitus C digitata).

*^y *Folia dentata vel subpinnatifida*

13. C VOLUBIIS (Willd. sp z p. gfc), glabra, canle volnlili ramoso tercti , folijs sessibbns remotis Hneanbus margine apiceque callosso-deatatis margine inciassato leflexis, floribus sobtariis axillaiibus, pedicellis medio bibiacteolatis bracteA acnininatâ sublongionbus, lobis calycims ovato-acuminatis tubo turbinato longioribus petabs diu medio connatis 6°-8° brevioiibus (T) ex Ibnnb.—ad Capnt Bonae-Spei in montosis occid. et mend Piesl in comm. pi. afi austr. Dreg ' 1. p. 29S. Cham in linn. 8. p 224. Lobelia volubiiis Thunb prodi p 39, fl cap. ed. Scbult p. 1^9 "Vanat foliis inttgermis vel sen at is, mlo inciso-serratis, biacteis integris vel 3-lobis, corolli fance glabra vel baibata 6-10 lin. longa, antheris glabnusculis vel pilosis. (v. s.)

14. C. CREWATA(Presl piodi lob p. 5r), glabri, caule volubili filiformi de-enmbente pa rum ramoso, foliis lanceolatis biewtei petiolatis cienato-scuatis, lufcuoiibns acutis supenoribns obtusis, flonbus ex axillis foliorum supeno-lum , pedicellis capillaribus vix longitudine foliorum. — ad Capat Bonas Spei, in parte infer, orientab (Dreg) —Presl in comm pi afr austr. Dreg 1. p 297. Lobelia crenata Thunb prodr. p 3q, fl.cap ed Scbnlt. p 180 Ait.b. Kew. ed. 2. vol 1 p. 36a ? Folia (ex Ihunb.) axilhs interdum fobolis dnibus onustis (an potius basi biloba ?

5. C HFTEROHYILA (Presl' in Eckl. herb, et comm. pi. aft austr Dieg. 1. P'^ 97), glabra, caule volubili tereti, foliis petiolatis, infenoribis ovatis acutis inaequaliter serratis seirolatisve 3-nerviis infra medium utrinque angula-tismedus floralibusquc tiilobis, lobis lauceolatis acutis seiratis integnsquc , centiali duplo triplove longiore , racemii axillaribus, biacteis lanceolatis acutis pedicello medio bibiactolato subseqiulongis, lacinits calycini. lanceolalis acutis tubamsupeiantibus petal is 5° bievioibus —caput Bonae-Spei ad litus austiale. Folia in speciin. nostio 3 loba subpinnatifida lobo centiali tnpl majoe acnniinato, petiobs limbo dunidio brevioribns (• s comm à cl Drcgr)

x6. C. DREGEANA (Presl! in com in. pi. afr. aastr. p. 394)_t giabra, caule angulo-volnibili, foliis breviter petiolatis lanceolatis vel ovato-lanceolatis basi dentato-lobatis apicem versus remotè denticulatis, racerais bracteis linearis multo longioribus basi i-bracteolatis, lobia calycinis linearis-lanceolatis erectis acantis tabo lato brevissimo 5° longioribus petalisque patentibus vix dimidio brevioribus stylum a pice incrassatam aequantibus. — ad Caput Bonae-Spei propè urbem, loco dicto Saldanbabay. Habitus Convolvuli. Folia 2 poll, longa, 6-7 IJn. lata, petiolo a-3 lin. longo. Flores mine solitarii vel umbella subsessili (ex Presl). Ovarium vix basi adnatnm. Capsula subglobosa. (v. s. ad. Dreg, comm.)

J- *Species minus notes.*

17. C. SYLVATICA (Presl in comm. pi. afr. anstr. Dreg. 1. p. 297 sin descr.) — in sylvis Ado regionis infer, orieutalis Capitis Bonae-Spei. An (ex cl. auct.) sufficienter diversa à C. crenata, an ejas varietas, an G. angustifolia ?
18. C. BOTRYS (Willd. reliq. in Roem. et Sch. syst. 5. p. 477)» foliis bipinnatiC-do-laciniatis, canle salcato.
19. C. SALICIFOLIA (Presl in h. Eckl.), nomine solnm roemorata in comm. pi. afr. aastr. Dreg. 1. p. 393 inter species canle volubili, corollâ bilabiata basi gibba polypetalâ.
- ao. C. uNDUTATA (Eckl.), nomine solam à cl. Presl memorata in comm. pi. afr. anstr. Dreg. 1. p. ag3, inter species canle volubili, corollâ bilabiata basi aeqnali polypetalâ.
- ai. C. LIXIPETAXA (Presl in Eckl. herb.), cam praeced. in comm. pi. afr. aastr. Dreg, enamerata.
- aa. C. XLIXPHTAIA (Preslibid.)
- a3. C. ECKLOITTANA (Presl in Eckl. herb, et in comm. pi. afr. anstr. Dreg. 1. p. ag3), canle volubili, corollâ hypocraterimorphâ, tubo garoopetalo cylindrico inenrvo demùm hinc indè irregulariter fisso, iimbo patente aequali. — Gum G. Zeyherianâ sect. Cyphiellam cl. Presl constituit.
- a4. C. ZKYHERXAITA (Presl ibid.)

"f 1" *Cyphia exclusa.*

C. SIMPLEX Spreng. = Dobrowskia aspera.

Ordo CVII. GOODENOVIEJE JR. *Brown prod. Stf. gen. rent,*
p. 24— Goodeniales LindL nat. syst. ed. a. p. »4i. —
Goodeniaceae Benth. in Hug. enum.p. 68 End/, gen.p. 505.
Presi in Dreg. comm. f. %.p. 292.

Calycis tubus plus minus ovario adnatus, limbus 3-5-lobus aut integerrimus obsoletus persistens. Cor. gamopetala plus minus irregularis, tubo anticè fisso, rarius 5-pariibili, limbo 5-partito bi-autrariis i-labiato, lobis disco lanceolato piano, lateribus (alis) subslantiā magis corollinā , aestivatione induplicatis, raro obsoletis. Stain, cum corollā nee ciun stylo concreta, lobis corollae alterna, filam. distinctis, antheris concretis aut saepius liberis, basi affixis verticaliter sitis, bilocularibus, loculis longitudinaliter debiscentibus. Pollen simplex compositumve. Ovarium biloculare(rariusi-aut4-loc.) Stylus simplex aut rarissime duplex. Stigma carnosum cinctum indusio submembranaceo cyathiformi, integrum bilobumve ore ciliato rarius nudo. Pericarp, nunc polyspermum capsulare septo (ubi adest) valvis parallelo rarius conlario, nunc drupaceum nucamentaceumve, seminibus definitis. Semina albumine carnoso saepius donata. Embryo erectus cotyl. saepius foliaceis, plumula inconspicua. — Frutices aut herbae. Succus non lactescens. Piii varii. Folia sparsa exstipulata simplicia Integra aut dentata aut subincisa. Flores clistincti. — Ordo affinis Lobeliaceis ex corollae tubo supernè jam in praefloratione fisso et antheris isostemonibus interdūni concretis, Brunoniaceis ex stigmatis indusio.

Trib. I. SCJEFOLEM R. *Brown prod. 58a. G. Don gen. syst. 3.*
*p. 727. — Scxvoleae LindL nat. syst. ed. 1. n. 178. Mart, consp**
n. 167. — Scaevolaceae Lindl. ed. 2. p. ifp..

Semina in loculis numero definita saepius 1-2. Drupa aut nux calyci adhxrens , saepius calycis limbo (interdum parvo) coronata.

I. DAMHERA R. *Brown prod. 587. Ram. et Schult. 5. n. S<4- G. Don gen. syst.*
3/>. 730. JHSS. et Rich. ami. mus.i&p. 1-18. t. a. Endl. gen. n. 3040.

Calycis Jimbus abbreviatus aut obsoletus. Cor. bilabiata , tubo hinc fisso , labii superioris lobis margine intiore auriculatis. Antherae imberbes arclè cohairenles! Ovarium i-spennum. Stigmatis indusium ore nudo. Nux Crustacea. — Sufirutices aut herbac perennes, omnes in JVov& Hollandiā crescenles. Guiles saepius villosi nut incani, adulti hinc inde glabri. Folia allerna integerrima aut dentalia. Pedunculi axillares uni am panciflori. Pnbes partium floralium diversa in diversis, speciebus. Cor. crcurse rarius purpurcae, 5-parlibiles, deciduse.

- Wnrooaae, *nempe wllis corolla: etpartiumvicinarum plumosis.*
- ▷ D. HEDERACEA (Brown I c), heibacea procumbens tomentosa, foliis plenosne petiolatis subcoidatis angulato-incisis, sommis integernmis, adultisapia glahns, corollis extus cineieo baibatis, vilhs patuhs pluinosis. If. in Novae Hollandiae orā mendiouali.
- a D UNDULATA (BrowQ prod 587), suffruticosa erecta tomentosa, foliis petiolatis sabrotundis dentatis undulatis suprā stabns pedunculo axillaii 2-4-floro longionbus, corollis extus nigro-barbatis, villis plumosis. X in NOVA Holland!A ad Port Jackson. M caerulei.
- 3 D ROTUNDIFOI IA (Brown' 1 c), snffi nticosa erecta tomentosa, fohis petiolatis subrotundis integns planis, suprā scabus, basi oblusissiinis, pedunrnlis axillanbus subumfloris bievissiuis teiminahbus subcorynibosis, corollis extus mgro-batbatis, villis pluinosis J in Nov Hollandiā ad Poit Jackson. M. caerulei (v. s. in h mus leg. Par.)
- 4. D. OVALIFOLTA (Brown prod 588), snffrnticosa erecta farfuraceo-tomentosa, foliis petiolatis ovalibus subintegns pi an is supra scabus, peduncuhs 2-4-flous axillanbus folium subaequantibus, ternunalibusque corymbosis, corollis extus mgro-baibatis, villis plumosis ^ in Novi Hollandiā ad Port Jackson. Rich, ann. mus 18. p. 18 1.I f 1 G Don gen. sysi 730. f 126. Sieb.¹ fl nov. holl. exs n. 227. A. Rich diet, class, h. nat. t. 14. (v s)
- 5. D. punplREA (Brown 1 c), suffuiticosa erecta tomentosa, foliis peliolatis ovatis aculuscule dentatis snprā scdbris, peduncnlis axillaribns i-S-flons, corollis extūs nigro-barbatis, villis plumosis 5 •^{ia} Nov. Holl. ad Port Jackson. Fl. parpurei.
- 6. D FERRUGINEA (Brownll. c.), sufTruticosa erecta tomentosa, foliis petiolatis ovatis acntiusculis repando-dentatis bast snbeuneatis trinervibus, adultis suprā kevibus, floribns sabterruinahbus breviter pedicellatis, corollis extus lanatis, villis bieviter plumosis. ^ *^Q Novl Hollandiā orientali mtiā tropicum. Pobes florom fen ngmea (v. s. comm. à cl iuv)
- 7 D. XANCEOLATA (A. Cunn^r in htt. 18J6), suffiuticosa erecta ramosissima , foliis lanceolatis mtegerrimis ant hinc inde subsmuato-dentatis supra glabns snbtus ramulisque pube stellatd velutinis, peduncuhs in racemnm compositum teiminalem dispositilis corolhsque praeter tomeiitum villos plimosos nigros gerentibus. 5^m Nov.1 Hollandia inteiore ad vail em Wellingtonianam et in siccis circd Bathnrst legit cl. A. Cunningham. Canlis 1-2-pedalis inferne glaber. (v. s à cl inv.)
- 8. D RVPENS, radicis tfnnco lignoso hotizontali radicnlas agente, caule basi fruticoso erecto ramoHissimo, lamis stiiis villosis longitudinaliter notatis, foliis sessilibus hneari-lanceolalis integernmis seu ntunque obtuse 1-dentatis suprā demūm glabris snbtus tomento stell ito denso canis, pedirellis biacteolas a li-neares snbeoncavas gerentibus, corollis extus tomento cineieo-nigricante plomo hiisutia. \$ in Novd Hollandid ad Swan-rivei legit cl Drummond' Snffrntlcnlus semipedalis. Rami stncte-erecti Folia G-8 lin. louga, sesquilln lata, sopra juniora pnbcsentia. Stylus glaber incurvut* corollā multò bievioi. (v. s. à cl mv.)

* Incanae, *nempe pube corolla partiumqueflorahum stell a to-tomentostā.*

KJ D iffCA»A (Biown 1. c), snffrnticulosa erecta lamosissima, tola pnbe stel-lata molli cano-tomentosa, foliis oblongo-obovatis integernmis, pedicellis axillaribus brevibns i-flons. j in Nova; Hollandia; msohs sterilibas legernnt (post Daropierum) botan. exp. Bandiniaia; D. tomentosa Bi.' in h mns Par Habitus fere Crotonis ant Cneon pnleiuenti. Cor. caerule-e Folia b-ia lin. longa (v. s comm. à mus leg. Par.)

*** Podostachyae nempe villis corollas simplicibus elongatis, cauhbus herbaceis striatis , spicis pedunculatis, bracteis oppositis ^Jlonbus alternis

- 10. D. ADPRESSA (A. Cunn.¹ in hit. i836), cauhbus e radice lignosA plarimis

4. S. MONTAWA. (LabiII.! sert. caled. p. 4t> '• 4»), fmitcoaa, axillis baibatis, foliis. breviter petiolatis obovato-oblongis obtusis basi attenuatis integernmis subco-
rjaceis ramisqne glabns, pedunculis dichotorais pubescentibns folio brevio-
ribus, bracteis foliaceis, calycis limbo 5-partito, corollis tomentosis. 5 in Novae-
Caledomae montanis Flores in pedunculi dichotomis sessiles.
 5. S. SERICEA (Forst. prod n. 504) * fmitcosa, axillis...., foliis obovatis integris repandisve utrinque ramisque tomento niolli vestitis, peduncalis dichotorais, flonbusin dichotomiispdicellatis, cynis corollisque tomentosis, calycis limbo 5-partito ovarii longitadinem aequante. 5 in littoribus inaiilimis msularumSo-
cietatis (Forst.), et Novae-Hollandiae tropicalis (Br. prod 583), ins. Lucon
nbi dicitur *Duduceducln* (Presl), in Cochmchinx mantimis (Gaudichaud ') nee in Islandia ut scupsit Poiret (diet. 7 p. 147). Yahl syinb 2. p 87. Affims
S. Koenigh, sed tomento facile diversa. Folia deium calva, biactex subulatas et pedunculi folio longiores ex Presl. (v s . in h. mus. teg. Pat. coll. à cl. Gau-
dichaud.)
 6. S. vEruTiNA (Presl rel. Hxnk. 2. p. 58), fraticosa? axillis barbatis, foliis ob-
ovatis integerrimis avenns utunque sericeo-pubescentibus, inferioribus oppo-
sit, pedunculis petiolo subaequahbus cymosis pauciflons floribusque extus
pabesceutibus, biacteis lineaii-subulatis¹ calycis limbo 5-parlito, tubo cor.
oeqoali, cor. lobis late marginatis ciliatis <\$ in insulâ Guaham Mariannainm.
Hue cl autor trahit Buglossam htoream Ruraph amb 4. t. 54. etiamsi planta
dicatur glabra. Drupa snbglobosa 4-costala. Cor. intus densè villosa, poJlicem
longa, alba ?
 7. S. LESCHEKAULTIX, frnticosa , axillis sericeo-barbatis , rainulis pedicellfs caly-
cibus corollis foliisque subtus adpiesse puberis, foliis obovatis basi cuneatis bieviter petiolatis obtusissiims subintegei IHUIS supeine glabris , pediculis di-
chotomis petiolo paulo longioribus, bracteis calyusque lobis feic linearibus
corollâ quadraplo brevioribus. Jy in ins. Javâ legit cl Lcschenault (v. s. in h.
mas. Pai.)
- *• *Calycis limbo 5-dentato aul subinlegerrimo.*
8. S. MOLLIS (Hook et Arn. bot. Beech. 89), fiaticosa, axillis barbatis, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis glanduloso-denticulatis, suprà glabns subtùs ramnlisque sericeo-tomentosis, pedunculis axillanbus petiolo bievioribus flexuoso-ramosis divaricatis paucifloris, bracteis recurvis subulatis, cal. obtuse et brevissime 5-dentato, ooiollis seuceo-tomeutosis. 5 in insulis Sandwich. Affinis S. sericeae. Planta fiagillima (U. et A.) Flores griseo-violacei. Fructus puberuli, adulti caeruleo-nigri. (v. s. in h. mus. reg. Par.)
 9. S. TOMENTOSA. (Gaudich.¹ in Freyc voy. bot 460. t. 81.), fiaticosa, axillis bar-
batis, foliis subrhombéo-ovatis obtusis sinnato-dentatis, pube sellatâ molli ra-
misque fuscescenti-tomentOMs, pedicellis axillaiibus solitanis l-floris, calycis limbo brevi obtuse 5-dentato, bracteohs umlateralibus semi-cone retis. j in
Novae-Hollandiae 01 à occidental!, ad sinnm Canum mannoruin. (v. s)
 10. S. CHAMISSONXANA (Gaudich.! in Freyc. voy. bot. 461* f* 3a), fraticosa,
axillis barbatis, foliis oblongis utrinqae acminatis argute dentatis ramisque
glabns , pedunculis axillaribus dichotomis folium subaequantibus, calycis limbo
5 dentato, coiollis pubescentibus \$ in insulis Sandwich Ex cl. Hook, et Arn
in Beech, bot. 80. et ex ipsis Gaudich. speciminibus, folia vix pubescentia ^t
cor paulo'quain in icone Gaud, minores. Van at peduncalis plus minùs elong-
atis aut abbreviatis (v. s.)
 - xi. S. CILIATA (G.Don gen. syst 3. p. 728), fruticosa, foliis lato-lanceolatisutrin-
gae acaminatis merabrnnaeis basi dentalatis lamisque glabris, axillis barba-
tis, pedunonhs 5-8-flons folio feie longioribus dichotomis, bracteohs liaeaii-
bus, calycis limbo breviter dentato cihato, coi glabia J in Sandwicensium
insnlA O-Wabu S. Gaadichaadiana Cham in hnnaea i83J p. aa(> non Hook,
et Arn. Drupa ohvaefoimis. Stylus villosas. Folia 3-j-poll. l^nga, pollicem
lata. (v. s)
 - xa. S. PLUMIERI CVahl symb. a p. 36), fruticosa, axillis snbbarbatis, foliifi

obovatis integemmis ramisque glabris subcarnosis, pedunculis axillaribus dichotomis, corolla limbo cupulato truncato subinlegenimo, corolla intiis to menlosa. 5 in littonbus maritimis ins. Baharaensium (Cat ^ r-irJl^n.,TM Porto-ricco(Ledru!), S. Domingo (Bert.), Mexici (Moc.) et c' etiam SIn? Manritii (Sieb.! Bout!) et Borboni* (Comm.). Lobelia pf_{om} ic t £S fT Catesb. car. 1. t. 79. Lobelia frutescens Mill. diet. Lobelia Plamieri Linn Y ' 131. Jacq. am. 219. t. 179. f. 88. Scasv! Lobelia Willd. sp. i D o; c s " V T Plumieri Lam. ill. t. ia₄. f. , ex Poir. diet. 7. p. ,46^P Lobeiif imlri J'! Willd. herb, ex Don. Modavia Comm! herb. Fructus nigri b mZn fApZli spinosae. (v. s.)

13. S. THUWBERGII (Eckl. et Zeyh. ex Dreg. comm. p. 292). f:mi cosa, axillis barbatuhs, folis obovatis obinsis integerrimis ramisque carnosis elabris duncenlis axillaribus augulatis dicbotomis fpliuin subaequantibus, bracteis fintis nbns, calyce obtuse denticlnato, corollae tubo intiis villosissimo lobis mai^n|~tis, stylo inferne villoso, drupā globosa Levi. & ad Cap. Bonae-Spei inter A'W. bay et Port-Natal, in littoribus arenosis (Eckl. Burch.! Forb!). Sc Lobelia Thunb. fl. cap. 1. p. 186. Proxime ad Sc. Senegalensem et ad Sc. Plumieri accedit, nee forte satis distincta. (v. s.)

14. S. SEWEGALENSIS (Presl Ieliq. Haenk. a. p. 57), fruticosa, axillis foliorum subbarbatis, bractearum barbatis, foliis latè obovatis basi attenuatis inleceirimis ramisque glabris subcarnosis, pedunculis axillaribns dichotomis folio brevioribus, calyce brevissimè 5-dentato, corollae inliis tomentosae lobis immareinqiis ovano enervi, drupā subglobosa 4-costatā. ^ in SenegaliA (Ronss ! Sieb V Cerbera ovata Sieb.! pi. exs. Seneg. n. 23. Proxime accedit ad S. Plamieri sed lobis corollae lmraarginatis praecipue differt. (v. s.)

15. S. MENZIESIANA (Cham. in linneā ,833. p. 227), fruticosa, axillis barbatuhs, folis obovatis lanceolatis vel antice paucidentatis basi in petio-luin longe attenuatis camosulis sublūs pubescensibus, pedunculis axillaribns cymosispancflorisinterdum ,floris folio brevioribus, bracteis linearibus cal dentibqs brevibus ciliolatis, cor. intūs villosis. ^ in inslVrO-Wahu Sandw,cengium. Drupa oliv^formis. Cor. extūs pubescens. 0. glabra, foliis subtiis corollis exfisi glabris.—Cum var. *..

16. S. GLABRA (Hook. et Am. bot. Beech. 80), fruticosi AYTIIW l<>ni₄ c i. cuneato-oblongis oblique acuminulatis 4 S l i₅ ^ glanduloso-denticulatis, pedicnlis axilla ribus^ -florit^ olo dZYxr| bus nudis, corollā glabrā, calycis dentibus tublrCautibur^{|||||} Sandwich. Pet. olus ,i L poll, longu,. Affinis Sc. Cbnmissioniana? WoTM specim. Gaudich. flavi Axilla, parce barbal*. Pctioli 6-12 lin. Io*_{ND} . i. ?v_{es} Tn h. mus. reg. Par. coll. à cl. Gaudichaud.)

17. S. GAUDICHAUDijHook. et Am. bot. Beech, p. 8, non Cham.) fruticosa axillis barbatis, foliis lanceolatis acutis integerrimis ramisque glabris nedi' cellis axillaribus i-florisfolio multoties brevioribus, calycis limbo obtuse den- tato, corollis glabris, bracteolis linearibus. J in insulis Sandwich ad 45° 5n hex. ap. alt. Sc. montana Gaudich.! in voy. Freyc. bot. p. 460 non'l anill Foha a poll, longa, 3-4 lin. lata, recta seu hinc inde snbfalcata. (v. s.)

18. S. MICRACKTHA (Presl Tel. Hank. 2. p. 58), fruticosa? foliis lanceolato-oblon* obtnsisintegerrimis coiaceis in petiolam attenuatis secūs nervum niediu pubescensibus, infer, oppositis, cymis folium subsquautibus, floribnsn. sericeo-pubescentibus, calycis limbo brevi snbdentato , cor. laciniis ginatis basi fimbriatis. ^5 in insnlā Luzon Philipensium. Cor. alba? e sissima. Stylus glaber. Drupa elliptica pubescens 10-costata. Affinis diditur s. Plumieri.

>9. S. OPPOSITIFOLIA (Roxb. fl. ind. a. p. 148) fruticosa >v!li.. ^ c 1- . . ^ : <.is breWter pe.ioli,i, ...iptici, in<eg?is 1 ^ TM " ^ ^ , ^ ^ . ^ :

ciflous 5 in msul Moluccis. Ad St. Sarcocaipaeas a cl. Don lelata , sed locus in sect dubnu f.

Sectio ii. GYMNSTEGIA Benth. in Hug el enum. 68.

Dropa exsocca i-4-locularis Sliginatis indnsium oie nndam vel ocalo armato brevissime ciliatura ~ Suffrutices. Floies saepius spicati.

20 S CRASSIFOLIA (Labill.¹ nov.holl. 1 p 56. t. 78), suffiuticosa adscendens glabra, foliis subcamosis obo\aiis dental is in petiolam angnstatis, lmfimis oppositis, ilonbus spicatis bracteatis, bracteis oblongis integus 5^m Novae-Hoi iandiae Olā mendionah (Brown prod 584), in terra Van Lenwin (Labill ') et ad Olam orientalem (b uius Pai'). Folia vaiiaut subiotunda, obovata ant passim lanceolata. Drupa obovata 2-locul (v. s.)

21. S GLODULIFERA (I abill ' nov. holl 1. p. 55. t. 79), suffiuticosa erecta glabra_f foliis hnean-lanccolatis paucidcntatis semiamplexitauhbus subcarnosis sub-enervii&, flonbus axillaribus sohtarus gemim&ve, biacteis subulatis integns, calytis lobis brevissums obtusis. j IU Novā-Hollandiā mend (Br 1 c), ad terrain ^Van-Leuwm (Labill '). Drupa ovata 4-)ocul mgoba nee co&tata. Got. tu-bas ad faucein seti> apice glandulo^is 12-18 onusta (v. s. a cl. m\)

22 S. DRUMMONDI, suffrnticulosa' lamosa glabra , 1 amis striato-subangulatis_v folus elliplicis ntunqne acuuiinatis seiratib, spicis elongatis, biacteis lanceo lads acuinmatii) , bracteohs calycisque lobis linearibus acatis, flonbus ad a\illas sessihbus sohtariis, corollā i-labiata glabra tubo intas hirsuto, stigmatis mdusio glabro rainutissiuie ciliolato, fructu ovato snlcato bjloculan 5 If in Novā-Hollaodia ad Swan-river legit cl Drummond' Cor. cacrneae (v. s à cl inv)

23. S. CUNNINGHAMI, suffrnticosa erecta "labra, folils linearis-snbalanceolatis acu-nnatis integerrimis , pedicnlis tiiildis, flonbus in dichotomus solitariis sessili- bus, diupā 5-snlcata bilocaliai calycis lniibo vix 5-dentato sapeiatā. j m Nova?Hollandiae occidentalis Archipelago Dampieiano legit c\ Al. Cunningham Affinis videtur S globuhferae et thesioidi Stigmatis indusinm nuduin Drupa glabra 5->ulcata. Bracteae subulatae Mores ex sicco caeralei (v. s à d . inv)

24. S. THESIOIDES (Bentb 111 Hug. cnum 68), suffrnticosa^p adscendens glabra, foliis ioferionbuji sublanceolalis paacentitatit*, superioubus biacteisque linearibus IDtegeniiDis, spicis clongatis , ovano biloculari. \$ in No\ à-Hollandiā ad Swan-river. Affirm S globuliferae etiam setis glanduhfens corollae.

a5. S roLYSTACEYA , suffrnticosa erecta ramosissima glabra, ramis angalalis, folns linearis-lanceolatis acumiuatis, infer, remote denticulatis, super, mtegei-limis, spicis ramoj> ramulosqe tenninantibas oblongis, biacteis bracleolisque apice snbnlatis , calycis limbo bicvi truncato , corollā glabra , capsula globosa subdidiyinā glabra. j in Novā-Hollandiā ad Swan-river legit cl Drummond' A films videtur S. thesioidi. Cauhs sesquipedalis lolia infer 2 poll, longa , 1 lin. lata. Spicas 1-1 poll, longae. C01. canmieae. (v. s. à cl. inv.)

26 S. FASCICULATA (Benth in Hugel enum 68), suffrnticosa adscendens glabra vel apice axilbsque pilots, foliis brevibus fasciculatis linearis-snbulatis mteger-timis teretibus, flonbus bievitcr spicatis, bracteolis 4-6 sub qooqne floie, otario i-locul. a-speirao J " Nova Hollandia ad Swan-river (Hog). Drupa le\ iter pnbescens sub-5-costata. Calycis niargo ob&oletns

**Sectio. in. XEROCARPJEA G.Don gen. syst. 3. p. «^ao.—Scaevoiae sect. 11.
R. Brown I. c.**

Dinpa exsucce i-4-locolaris. Stigmatis indusinm evidenter cihatum Spicatei-nunalis rauus axillaiis Bractesc sabtendentes foliaceae, lalciales peraistentes

* *Folus omnibus aut pie risque dentatis sen incisis*

27 S. AITEMUIA (Biown prod 583), fruticosa erecta pilosa, folus lanceolatis

- dentatis biacteis subtendentibns integerrimis, corollis extus hirsntis, maiginis
has suprà nudis, stylis villosissimis. ^ ad oram meiidionalem Novas-Hollandiae.
a8. S. WITIDA (Brown prod. 584), fruticosa erecta glaberrima , foliis ellipticis
argute dentati&, bracteissubtendentibas passim dentatis, corollis extus glabris,
raargmibos suprà stylisque villosiuscalis. 5^{1Q} Nova-Hollandia meiidoMuh.
(v. s. in h. mus Pai)
29. S. ovALiForiA. (Brown' prod. 584), suffruticosa adscendens, folis ovalibus
ellipticisque hinc inde acute dentatis, bracteis subtendentibus rbombeo-elhp-
ticis acutissirois submtegris, calycis limbo obsoleto , stylo apice bine baibato.
5 in NOVJ Hollanchà intrà tropicnm
et. *cinerascens*, tomeato cinereo donata, corollâ extus pubescente. Bi. 1, c.
(v.s)
g. *glabra*, glabia, corolla èxtus imbeibi. Br 1. c (v. s. inh. mas. Pni)
y *media*, glabra, corolla extus pubente. (v. s. in h. mos. Par.)
30. S. SEMIAMPLLXICAULIS , fmiticlosa erecta, ram ls terelibus hispidis, foliis
semiaraplexicauhbas ovalibus, aliis acute dentatis. aliis integerrimis, oili.itis
supra spaise, subtus sreus neivura pilosahs, bracteis bracteolisque ainphs
foliaceis , calyce 5-partito lobis parvis obtusis, corollâ mtus tomentosâ extus
velntinâ, stylo compresso ad apicem villosissimo, ovuno snlcato adpresse pa-
bescente. ^ in Nova-Hollandia ad Swan-river legit cl. Drummond I Flo res in
axillis» solitarii, brevissime pedicellati. Cor. caciuleac, lobis alatis dorso medio
velutims. Alabastrum corollinuin spathaeforme sericeo-velutinum. Styh et
stjgmatis barba alba confertissiraa. (v. s. à cl. inv.)
31. S. MACROPODA, sufrnticulos.i, ram is erecto-diffnsis tcretibos pills patulis
subfasctulatis bispichs, folns obovato-enneatis basi intrgernmis apice calloso-
dentatis superne spaise setosis snblus glabriQsculis, pedicel Us ex axilhs ortis
folio longioibus hispidis, bracteohs foliaceis a angnste cuneatis apice pauci-
dentatis sub flore sitis, calycis lubo subrotundo bispidissimo, lobis hneari-su-
bulatis tnbo triplo longionbus , cor. extus bispidissima , indnsio magno bis-
pidis&nio ^ in Nova-Hollandia ad Swan-iiver legit cl Drnmmoud' Species
distinctissiuia , forte ex ralycis lobis Leschenaoltiae sirailibus genericè distin-
guenda , sed habitns Scaevoiae Flores albi aut pallidè caeralei. Ovaiinm i-locul
i-spermum. (v. s. à cl. inv.)
32. S. AMULI (Brown 1. c) , herbacea erecta, foliis ca neat is obovatisre gla-
bnusculis, spica simplicissimâ, bracteis subtendentibus lanceolatis subinte-
gris,calycis limbo lobato, stylo infrâ glabro, apice bine barbâ stiictâ colorati
indusium aeqnante, ovario biloculaii. If, in Nova-Hollandia merid. Iconem S.
cuneiformis refert, sed flores in bractearum axillia omnes etiam inferiores soli*
tarii nee a-3.
33. S. CUNEIFORMIS (Labill.! nov. holl. 1. p. 56. t. 80), herbacea erecta? pilo-
smscalâ, foliis cuneatis argute dentatis, spica elongatae axilhs inferioribus
a-3-floris, bracteis subtendentibns lanceolatis integiis, calycis limbo lobato,
stylo infrâ glabro, apice bine barbâ indnsinm aequante. If, in insuld "Van
Diem en. Brown prod. 584- Drnpa i-Iocnl ex Labill (v. s. comm. à cl. Labill)
34. S. SIKUATA (Brown 1. c. 584), berbacca diffusa pubescens, pihs adpressis,
foliis obovatis enneatisve dentatis et smuatis, spicâ compoitiâ, spicnhs panci-
floris, bracteis subtendentibns ellipticis integns, calycis Inn bo lobato, stylo
infrâ glabro, apice hinc barbâ strictâ coloratâ iudusmm supeiente. If inNovl-
HollandKI raerid Mediante S cuneiformi accedit .id S. aemulam sed habitus
diveisus.
35. S. HUMILM (Brown prod. 585), herbacea adscendens vel diffusa pubescens,
foliis argute dentatis, imis obovato-enneatis, r.iracis lanceolatis, spicâ simplici,
biacteih subtendentibns linedn-lanceolatis subdentatis, calycis limbo lobato,
stylo apice hinc barbâ strictâ coloratâ indusium aeoante, ovario biloculaii.
% in Nova-Hollandia mend.
- 15 S MICROCARPA. (Cav.¹ ic 6 t. 509), herbacea pabescens diffnsa rariüs eierla,

foliis cunealis vel ovalis saboibculatisve denratis basi attenuate, spicā simplici, biacleis subteudeutims dentatis, calycis limbo lobato, corolla tubo intusbarbalo, pills f.lucis iculis capiialisque , stylo longitudmalifr villoso, o\ano i-locul ^-spenno Tfin Novā-Hollaidia ruca Port Jackson Brown'piodi. 585 ('odenia laevigala Cart. bot. mag t. 387 Goodenia aPuda Smith' trans aoc lin 2 p V|7 G laevigata et albida Willd. s.p. 1 p. 854. Poir. diet. 8 p 850 Hemitbins Salisb ' berb. Herba habitu \ariabilis. Cor. dilute violaceje stiatae (v. v «\ rl *» sp)

- 37 S. PALT IDA (Drown¹ ptodr 585) berbacea diffusa pubesceus , foliis caneatis lanceolattiwebasiattenuatis dentatis, spicā simplici, biacteis hubtendeuhbus saepius defitntis, calyx limbo lobalo, corolla? tubo inlus midinsculo, stylo glabro, ovano t-loculan 2-spermo % in No\ā-Hollandia mendionali. Priori cui mmis affinis omnibus partibus minor (Bi.) (v. s. à cl, inv)

*• *Fohis omnibus aut plerisque integerrunii.*

- 38 S suAVEOIEtrs (Brown* prodi. 585), berbacea diffusa pubescens, foliis oblongo-spathnlatis cainosis bine inde subdentatis Inlegernmisve, axilhs barbatis, spit à elong.itâ fohaceâ , bractris subtendentibus lineaii-lanceolatis, ovario bilocular, diupj baccatâ. If in Novā-Holiandiâ orientali ad Port-Jackson , meiill et tiopica Goodenia calendulacci Andi. bot. lep t 11 Flores caerulei odorati. An certe ex fiucto baccato ad Xerocarpaeum refeienda? (v. s. sine fr. in b. inns Pai)

39. S. CJESPITOSA (Brown 1 c), suffralicosa erecliascola glabra, foliis linear-lanccolatis maigine subiccuvis passim subdentatis , axillis imberibus , calycis limbo abbreviato 5-lobo, ovauo a localaii. 5 IU Novā-Holiandiâ mendionali. I'lumuis notis accedit ad S. globulifeiam sed ovarium certe 2-locul (Bi.)

- 40 S. REVOLUTA (Browa¹ prodi 5K6) suffruticosa erecta birsuto-pubescent sobcinerea , foliis oblongo-lanceolatin sessilibus margine revolutis, 3 pica'com pa etâ, bracteis snbtendentibus lanceolatis interiores vix saperantibus, calycis limbo obsoletè rrenato, ovario biloculari. ^ in Novā-Holiandiâ intiâ tiopicum. (v. s. in b. raus. Pai)

41. S. ANCHUSIGForii (Benth in Hugcl enam. 68), saffraticosa prostrata hispidissima, foliis oblongo-spalhulatis lanceolatisve margine recuivis, snperionbus bracteisqne subtendentibus lineaiibus, spicA elongatâ , calycis limbo obsoleto, diupâ rugosissimâ 4 lorulan. 3 in Novā-Hollandia ad Swan-rivet. Diupae lonli a serainifen , 1 steiles.

42. S. iAzr(Eoi ATA. (Benib. in Hugel enum 69), suffrnticosa procumbens pilosobispida, foliis lanceolatis integerrimis, brat teis subtendentibus brevibus latolanceolatis, spicâ elongatâ densâ , talycis l'mbo obsoleto .drnpâ rugosâ costatâ biloculari. ^ in Novā Ilollandia ad Swan-rivei Aflnis Sc aucbusaefoliae, sed minù pilosa, spica densior, folia plana multo latiora basi dilatata

43. S. GLANDULIFERA , suffruticulosa ramosa erecta piloso-setosa y pilis larorum et foliorom longis basi saepius tuberculosis apice eglandulosis, racheos et biactearutn bievibus apice glandulosis, foliis lineari-lanceolatis aculis basi attenuatis, spicis elongate bracteis lineari-lanceolatis corolla; tubo vix brevioribus, bracleolis lineanbus brevibus , cal. limbo obsoleto , corolla intus extusqne sparse bispidulâ, stylo et indusio barbato, fluctu apice subtuberculato biloculari. j in Novā-Holiandiâ ad Swan-river legit cl. Drammond! Suffruticulus i-i | pedalis. Rami teretes. Folia a poll, longa. Cor. caeruleae 7-9 lin longae (v. s à cl. inv)

- 44 S CANESCEHS (Beutb in Hug enum. 69) % suffinticosa erecta? tomentosovillosa, foliis oblongo-lmearibus mtegeirimis margine revolutis, flonbus ad axillas fasciculate sessilibus , bracteis ovatis bracteolas vix superanlibas, calycis limbo obsoleto, ovaiio uniloculai biovnlat. £ in Novā-Holiandiâ ad King Geoige's sound. Coiolla extus, uli stylus, pilosa.

45. S. LiNEAnM (Brown prodr. 586), suftruticosa erecla tamossissima pilosa scabia, foliis liueanbus biacteisqne maigine recur vis, spicâ terminali, ovario

iDonospernio. J ⁱⁿ Novae Hollandis ora' nieiid. (Ri) et forte' oriental) si specimen folus ut videtnr paulò la loiibus, à botanicis llioens Baudimani collectura , hue ceite peilmet? (v. s)

46 S PAIUDOSA (fliownl c.) , subheibarea erecta parce raiuosa pilosa scabra, foliis lineaii-lanccolitis planiuscnlis spicas axillaies ftubapqnantihut, ovano l-sperrno J in Novae-Hollandiae orà meridionali.

47 S ANGUITATA (Brown¹ 1 c), suffrnticosa eiecta ramis angnlati, foliis sessibus oblongo-lanceolatis, &picà rarà simplici, brarteis subtendentibus foliis raneis confoimibus , calycis lirabo 5-fido ovaiium biloculare subaequante. J in NovA-Holljndia inter tropicatu ad Carpentauani 'Vaiiat foliis pa&sim p.iucidentatis, adult a siepras glaberrima, nunc pilis patolis con&pvisa, ex Br. (v. s. coom. à cl. mv.)

Seel. iv. POGONAMHA —Pogonanlhera *G Don gen. sjst. 3./?. *j?o non Blumc.— Scxvolx sect. ni^a It. Brown.*

Drapa exsneca Anlbera? apice barbatoc — Herba; pedanculis axillaribus i-flo-
m ilongatis, biacteis a apicib foliaceis perbiitentjbns

48. S. MACRODONTA, heibacea adscendens pilosa , foliis obovalo-cnneatis versùs jipicein giosse dentalis, infei. hasi semi ninplcxit.mlibas, pedicellis axilKuibib folio longioiibus i-flois sub flore biarlcab 2 linearis lanteolatas inlegias flou xquales gerentibus, ralycis limbo 5-paitito, lobis liueanbns, coiollx lacin. alis aveniis. j in NovA-Hollandia' nd King Geoige\ sound legit cl. Al. Cunnigham. Indnsium ample olutum Antherx apire bre\itei baibata;. (v. s à cl inv.)

A9. S. HispIDA (Cav. icon 6 t 51 o), heibacca erecla ant diffuse unique*hispidia, fohis lineaii-lanceolatis \cl oblongo-spathnlatib, lpfimii subdenUts seu piu-natifido dentatis, pedicellis axillaribus i-flos versùs apicem biacleolas duas lincares gereulibus, calycis limbo a^iguste 5-partito, corolla; laciniham alis avenus. ^C in No\à Hollandia orientali prope Porl-Jfttkion. Brown' prodr. 586. Sieb 1 fl Nov lloll. vxa n 2i5 Reuib. in Hog enum. 69 Goodenia 1-
xnosissima Sinnh¹ tians. lin, soc a p. i/,9. Nov-Uoll i5 t 5 Coiolla lilaciuamp I a Hciba vαιiat folns etiun supeilioibus integriiuis et inciso-dentatis.

So. S. PIOSA (Benth. in Hogel enum 69), herbacca erecta patentim pilosa, foliis oblongo-spHthilatis apice subdentatis, supeiionbus oblongis, bracteis ovatis corolla subdimidio brevionbus, calycis limbo brevissime dentato , alls lacimam corolJap a\enns % m NovA-Hollandia ad Swan-nvcr. A(lws S. hispid», sed folia lata bievia , bracte-e ovatae, cat. dentes brcvissimi

51 S WEMBRANACEA (Bentb. 1. c.) , berbacea piocumbens patentim pilosa, fohn tennibub obovato-spathulatis apice denlati, biacteis obovatis apice ~~dentatis~~ corollai subaeqnantibus, calycis ^{lin}bb obsoletto, alls laciniamm corolla; ave-
niis. IL iu No\à Hollandia ad Swau-riyei. Coiollae demidio minoret quam S. hispidae.

5a. S. CALLXPTERA (Benth 1 c), berbacea erecta pilis pateutibm hispida, folui obovatis basi cuneatis apice giosse dentatis, biactcis cuncatis apice dentate, laciniis calycimslineaubus ovano 3°-^°-ve longioribus, corollx]aciniaiam alii paraKelo-venosis. If. in NovA-Hollandi* ad Swan-iiver

53. S STRIATA (Rjown prodr. 586), hei bacea eiecta snbadpressè scabio-pnbes-
cens, foliis infeuoibus spathtilati* pmnatiido-dentalis, superionbuas oblongs,
bracteis linearis lanceolatis srtbintegcnimis , lanniis calytinis ovano duplo lon-
gioribus » abs laciniamm COIOILT parallelo-venosis % ad orom meridionalem
Novae-Hollnndiap (Br),nd portum icgb Geoigii (Lesch.¹). Denlh. in Hug.
enuio. 70 Sc. stncU Koem.ct bchult 5 p 165. ttaudinia liumilis Lcschi heib.
'Vauat ptls nious scabra aut glabriuscula (v &. in h 11ms. Par)

Sect.? v. CROSSOTOMA G.Don gen. syst. 3. p. ^3o.—Scaevolae sect. iv^a.
*Jt. Brownprodr. 586.—Pogonetes Lindl. nat. syst. ed. 2. p. 2^3
 1*443-*

Drapa exsacca bilocularis. Indusium cilia turn Antherae apice imbeibes Calycis lirnbus ob*oleatus. Cor. ale fiinbuatar aut subintegiae.—Fiutices spine¢es. Pedicelh 1 - floii apice bibracteati. Folia mtegeuiina avenia, pleiaque fasci-culate.

54 S, SPINESCENS (Prown¹ piopr. 586), fraticosa, ramulis spmosis, fohis ovahbus obovatisve, biacteohs pedicelli deciduis, alls corollae longitudinahter fimbria-tis 3 i^Q Novae-Hollandne 01a meridionah (Br), ad sinum Canum maunoruin (Gaudich '), in ins Sti- Francisci (exp Baud ') (v. s.)

55 S OLEOIDES, fintesceni, ramulis puberulo-velutims bine inde spinosis, fohis nblongo-lineanbus, biacteohi pedicelh persistentibus, alis corollae non (ant vix) limbnnatis. 5 in parte Novae-Cambiae mtei 101 e legit cl. Al Cunningham¹ Ha-bitus S. spmescentib, sed facile dneisa. Folia fasciculata feie Rhumui oleoidis, 8-10 hn. longa, se&qnihu lata Pedicelh semi-polhcares. (v. s.)

56 S. LYcroIDES, frutesceub, ramuñis glabns(an hmc mde spinosis^), foliis oblongo huearibus, biacteohs pedicelh peisilentibus, alis coiollae non (aut >ix) iiimbnatis. ^ in Dampieu aichipela»q ad 01 am boi. occid. Novae Hollan-diae legit cl Al. Cunningham ' folia fasciuitatd 15-18 hn. longa, sesquilin. lata cnervia integrernma Pedicelli 3 hn. longi (v. s. à cl. mv.)

Sect.? VI. SCIVOLARIA.

Ovanum i-ovulatum ? Indnsinra ciliatum. Antherae imberbes. Alac laciniarum corollae parallelo-venosae.

07. S. GRANDIFLOKA (Benth. in Hug enum. 70), procumbens glabia, foliis IU nean-subulatib integernmis, pedunculiit i-floib calyce longionbus basi brac-teatis, cotelhs styluque glabns. — in Novâ-Hollaudiâ ad Swan-uvei. Pedun-cali reflexi. Cor pollicem longx.

f Species vix nolce.

S. TODRKOA Willd enum. suppl p. 10 , sine descr.

N. B Forte ad Scaevolam refeienda sunt^VigienaeduB (hispida et laevis) ex Floras Fluminen^is (vol. 2. t. 73 et 74) icone rudi tantum cognitaj et hie con&ulto y pra?sertim expatiia diversissimâ, oimssae.

Trib. II. GOODENIEJE G. Don gen. syst. 3. p. 7a3. EndL gen.
 p. 5oj. — Goodeniaceae Lindl. nat. syst. ed. p. 24^{2*}

Semina in capsulae loculis numero indefinita. R. Brown I. c.

IV. GOODENIA —Smith trans hn. soc 2 (1794), p. 'i^I^bilL Nov. Holl 1 p. 52 t 75 R Brown piopr 5;5 Roern. et Schuh 5 p 867. G Don gen syst. * p. 723.— Selliera Cav. ic 5. (1799)^- 49 t. 474 /• x —^G<H>deni*i* et Selhera Endl. gen. n- 3043 et 3042. — Coliema Anders mss. non Hoffm.

Calycis tubus ovario adnatus, hmbus aequahter 5-paititus. Cor. ir-regulanter bilabiata aut lantis unilabiata, tubo posticè fisso, necta-rium saepè fissurae oppositum gerente, lobis aestivatione mduphcalis. Stam. 5 , cum coiolla nee cum stylo concreta , filam. distmctis , anth. junctionbus subcohaerentibus demium libens. Stylus simplex. Capsul bilocularis (raro 4-locuIans), septo parallelo nunc abbrevialo. Semina plurirna imbncata compressa — Herbae (raniis suffrutices) pleracque è Nova-Hollandiâ oitaj* Folia alteina, pleraque indivisa , mtegia aut

dentata. Flores pedicellati axillares aut teimiualus, saepè Ijilnacleati, flavi aut purpūTdscentes.

Sect. i. OCHROSANTHUS G\ Don /. 1 . p. 724. — Goodeniae sect. 1.
R. Brown I. c.

Capsula bilocularis \el srpto abbreviato subnniloculaiis. Coi bilabiata fla\la , iobis alatis Stigmatis labia coiollae paialleta.

• *Pedunculis terminalibus ^pi cads vel pamculatis, partiahbus bibracteatu*

- i. G. BLLIDIFOLIA (Smjib' in tians. linn soc. 2. p 349), caule scaposo nullo apice pubescente spicam lemotiflorani simplicera gerentc, foliis iddicalibus planis lanceolato-spatbuldtis in peliolum attenuatis acute dentatis subincisisvt , oalycibus vjllosii, corolbs pube simplici pubescentibus If in Nova-Hollaudia orientali ad Poit Jackson Biown'1 c n. 1 Sieb. fl nov holl. exsic. n. a3o. Folia subcainosula, a-pollic. longa, glabra, petiolispubescentibus. Canhscirc. pedalis (v s)
1. G. STELLIGERA (Brown prodr 575), raule nudiusculo, spicâ subsimpli pubescente, foil is radicalibus cainosis semiteietibus lineanbusve giabns apite sub dentatis, coiolla extus pilissimphcius pubeque stellan \estitâ, capsulae vahulis partitis If in Nova-Holl ad Poit-Jackson (v s. in h Deles*..)
3. G. FANICULATA (Smith trans linn soc 2. p 348), caule paucifolio apice paniculate hirtello-pubescente, foliis ladicabns elongato-lanceolalis subdeutatis incisisve , super hneaiibus, calycibns pnbescenti hiitellis ^ in No\0-Uo11an diâ circâ Poit-Jackson. Gav icon 6 p. 5 t 507 Biown piodr. 575 Boutouia pomifeia hort. Erf. ex Steud. Heiba pedalu> hirtella. tx cl Brown pili calyciui, alii simplices, alii glandulosi, inihi omnes aut feie oinnes simphces. (v. s comm. a cl Lambeit)
4. G. HUMILIS (Biown¹ prodr 5y5) , cnole paucifolio, paniculâ simplici pubesceni-hispida paucifloia, foliis ladicabns elongato-lanceolatis subdentatis acutis basi longe attenuatis, calycibus coiob&que simpliciter hiitellis % ad 01111 Novae-Hollandia; me rid ad Poit-Philip. Ueiba S-pollic. Folia rad cijuleiii feie ^quautia. (v s comm. à cl. Biown)
5. G. GRACILIS (Brown! piodr 575), glabia, canle paucifoho, paniculâ sinphci, foliib ladicahbus linean-lanceolaiis elongatis ciassiusculii, coiollis ct c*-Jycii. Iobis glanduloso-pubescentibus. If ad hitora Novse-Hollndire mtia tropicum. Lodd. hot. cab. t. ioi2. Heiba cue pedahs. Ioha ladir 2-2 | pgl longa. (v. s. comm. a cl Biown)
6. G. DBCURRENS (Brown¹ piodr 575), gldberiima vix ad apicem racemi sub-pnbescens, caule folia pluuua oblonga dentata decuuuntia geicnle, mcerao bpicato simplici aut basi subramoso, coiolla pises juniore extus pubeiula If in Novâ-Hollandia' ciica Poit-Jackson. Sieb'fl uov. holl ex&icc. n 231 Herba pedalis aut sesquipedalis. (v. s.)
7. G. ARMERIE*OLIA. (Sieb.'fl. nov holl exs. n 249), glabra, caule eietto j,ubaphyllo simpbc, fohis ladicabns lineanbus mtegeininis subcoiaceis, i.ueini padtiflon pedunculis ereclis apice 3-floris, flonbus bracteatis villosisunui, ad apicem pedunculi subsessilibus. If in Novâ-Hollandia'. Heiba pedalis ri^lda lolia 5 pollices longa, sesqoilin. lata Cor. flavae, uiedio doiso \illoia2, Roai gine glabiae. Bracteae linearisubulata?. (v. s)
- ** *Pedunculis axillaribus tnfidis simplicibusve bibracteatis.*
8. G. ACUMIWATA (Brown piodi 575), wffriUicosa erecta glabia fucata, foliis ovatis accummatU dentalo-senatis, axillib imberbibis, peduucolis tiiidis tii-chotomisve, calycislobis plauis capsuU piismatic'i dunidio biewoiibus, senainibus bisenatis fr in No\â-Hollandia ad Poit Jackson Piovima G. ovata?, vix tamen vaietas (Bi) loha 2-poll longa b - lin. lata (\ s.mh Ddess. miss à cl. Anderson)

9. G. OVATA (Smith trans, linn. soc. a. p. 347), suffruticosa crecta glabra nanc
fuoata, foliis ovatis neutis acurainalisve deutato-serratis, axillls barbalis, pe-
tluiculis trilidis Iricholomisve, calycis lobis subulato-filiformibus, semiuibus
nniserialibus. J in Novâ-Hollandiâ orientali el meridionali et in ins. Van-
Piemen. Andr." bot. rep. t. 68. Vent.! li. Cels. t. 3. et mém. inst. 2. p. 3a 1.
t. 10. Civ. icon. 6- p. 4. t. 5c6. Jnss. ann. mas. 18, p. 1. t. 1. n. a. Brown
prodr. 675, Sieb.! fl. nov. boll. exs. n. a32. (v. v. c. et s. sp.)
- so. G. VARIA (Brown prodr. 576), suffrntcosa glabra, foliis obovatis obtusis
ovatisve acutiusculis dentatis coriaccis, axillis nndis, pedunculis trifidis sira-
plicibusve, calycis lobis staminibus brevioribus, corollis stylisqne glabris,
capsula ovata. ij in Novae-Hollandine orâ merid. Suffrutex i-a-pedal.
- a. foliis obovatis passimque ovalibus subdentatis basi attenoatis, canle dif-
faso , ram is flexuosis. Br. 1. c.
 - #. foliis snbrotundis subsessilibus dentatis, canle depres.so, pedunculis snb-
unifloris. Br. 1. c.
 - y. foliis ovalibus acutinscolis dentatis, caule erecto, pedunculis 3-floris.
Br. 1. c.
11. G. GRANDIFLOHA (Sims bot. mag. t. 890), herbacea erecta glanduloso-pu-
bescens, rauisstriato-angnlatis, foliis inferioribus lyratis, raineis inferiorum-
quie lobo tei-minall ovatis acutis dentatis, pedunculis trifidis tricholocnis sim-
plicibusve , calycis lobis linearibns acuminatis , slylo lon^itudinaliter lanato.
ff Bonpl. sen (2) Sims seu potiûs % Wild, in Novâ-Hollandiâ ad Port-Jack-
son. Bonpl. jardf nav. 16. t. 6. Willd. cnam. z. p. aig. Brown! prodr. 576.
Good, nppendiculata Jacq. Capsulap 5-gona; basi gibbae. (v. v. c. et s. sji.)
- z*j. G. HETEROPHYLL\ (Smith! trans, linn. soc. a. p. 34q), herbacea erectiuscnla
pubescenti-hiriella, pilis eglandulosis, foliis ovatis oblongisve incisis lobalisve,
pedunculis anifloris rariûs bifloris, bracteis à flore remotis iobisque calycinis
.subulatis, stylo glabro. If. in Novâ-Hollandiâ ad Port-Jackson , Paramatta, etc.
Cav.! icon, 6. p. 6. t. 508. anal. hist. nat. z. p. 96. Brown! prodr. 576. Sieb.I
pi. exs. nov. holl. n. aa8. (v. s.)
13. G. ROTUNDIFOLIA (Brown! 1. c.), herbacea erctinscula glaberrima, foliis
subrotndis inciso-serratis raembranaceis, peduncnlis i-flois flore duplo tri-
plove longioribus, bracteis subulatis flori proximis, stylo glabro, capsulâ
ovatâ. 1C in Novâ-Hollandiâ circa Port-Jackson (Br.) el intrâ tropicnm (Rcem.
et Schult.). (v. s. comm. à cl. Brown.)
- i^- G. ruDKscENs (Sieb.! fl. nov. holl. exs. n. 178), herbacea diffusa minutissime
pubescens, foliis enneatis dentato-serratis obtusis, pedicellis i-floris brevissi-
mis, bracteis linearibns flori proximis, stylo pubero. ^? in Novâ-Hollandiâ.
An fortè G. rotundifolia var. /£, Brown 1. c ?, scd nostraà priore certè diversa
videtnr. (v. s.)
15. G. SARBATA (Brown 1. c), herbacea? erecta glanduloso-pubescens scabra,
foliis lanccolato-linearibus integris, pedunculis i-floris, corollae fance barbatâ,
stylo longitudinaliter birsulo, capsulâ 1-local. 2-3-sperroâ. % in Novâ-Hol-
landiâ ad Port-Jackson et in insulâ Van^Dienien.
16. G. GENICULATA (Brown! prodr. 577), herbacea ereeta pubescens egbndu-
losa, foliis longo-lanceolatis dentatis, peduncnlis i-floris elongatis scapiformi-
bus medio bracteas lineares gerentibns, fructiferis geniculato-reflexis , calyci-
bus corollisque pubescenti-villosis. *£ in Novae-Hollandiae orâ meridionali ad
Pon-Phillip. Caulis nunc abbreviatu ex Br. (v. s. comm. à cl. Br.)
17. G. LANATA (Brown ! 1. c.) berbacea hirsuto-pubescens eglandnlosa sobacau-
lis, ramis proslratis, foliis obovatis ovalibusve obtusis subdentatis birsatis no-
vellis calycibusque basi lanatis, pednnculis scapiformibus i-floris folia, triplo
superantibus, corolla lobis ciliatis. % in itfaula Van-Diemen. (v. s. comm. à
cl. Brown.)
18. G. BEDRACEA (Smith trans, linn. soc. 3. p. 34g), herbacea subpubescens
eglandulosa, ramis filifoimbis proslratis, foliis ovalibus obovatiave dentatis,

ladicibus none lobatis, pedunculis i-3-floris folia m nit 6 superantibus, culollae lobis eciliatis 2f in Novā-Hollandid ad Port-Jackson et in ins Van-Diemens. Brown! prodi S77. Sieb.¹ pi. exs. nov. boll., n 575 Cot. extū pubentes nee lanaginosi. (v. s.)

19. G. GLABRA (Brown 1 c), herbacea glabra subacaulis, ramis prostratis, foliis ladicibus subovalibus spatulatisque paucidentatis, rameis subsessilibus, pedicellis i-flons, corollas exlus glabus. *Tf* in Novā - Hollandiā intrā ti opicum

*•• *Pedunculis ebracteads, axillaribus vel terminalibus, i-flons.*

20. G. MOLLIS (Biowu 1. c.), folns ovatis subcordatis acotis senatis villosis molibos, pedunculis axillaubns, coioliae tubo saccato % in Nov&-Hollandiā intrā tropicum.

- ai. G. ELONGATA (Labill.' nov holl. 1 p. 5a. t. 75), sparse pilosa, caule erecto flhfoinii simplici, foiiis radicalibus oblongo-spathulatis subdenUts, canliuis lanceolatis subintegris basi attenuates, pedicellis axillanbus solilarus subteinalibusqne elongalis, fiuctifeis leflexis. *If.* ? in msnlā "Van-Diemen. Biown ! prod. 577. (v. s.)

- ua. G. BISPIUA (Biowu I. c.), stngosa hirsula crecta, foliis canlinis sessilibus elongato-lanceolatis subdeittatis, pedunenb soli tarns axillaiibns elongatis, fiuctifeis erectis, calycibu* bibpidis *Jf in Novā-Hollandiā intrā tropicnm

- s3. G. CORONOPIFOLIA (Brown ' 1. c.), glabra, foliis lincanbus, radicalibns pin-natiido-dentdtis, canliuis integeuimis, seminalibus obovatis murionulatis persistent lbn, pedicellis subsoil tanis alternis, fmctifens erectis. (1^? in NOXĀ Hollandiā intiā tropicum ad Carpentanam (v. s. à cl inv.)

- a4< G. FULCHELLA (Benth in Hu;; enum 71), glabra, caule laraoso giacili pauculato paucifolio, foliis ladicahbus oblongo-spatbulatis dentatis, canlinia infenoribus oblongo-line.ribus subdentatis, super, lineanbus subintegrrnuiis f pedicellis folio snblongionbns, superionbus fascinlatis, corollae tubo sacrato. — IU Nov-Holl. ad Swan-nvfi. Cor Intea feie G. fascitilatae

- a5 G. TENELTA (Brown prodr. 577 #ion Andi. nee Sims), subpubescens, pilis adpiessis rar, caule bimplin vol nnllo, foliis ladicahbus plants lanocolatis spalbulatisve, fructifens erectis — in Nova-Hollandiae 01f meiidion. G. te-nella G. Don gen. syst. 3. p 7*5. excK syn et icon.

- a6. G. PILIPORMIS (Brown prodr. 578), glabriuscna, caule sirophcl, foliis rad i-calibus lilioimibus, canlinis minoiibus, pedunculis terminalibus umbellatis. *If* in Novae-Hollandiae orā mend.

Sect. 11. TETRAPHYLAX G. Don gen. syst. 3. p. 725.

Corolla bilabiata flava lobis aid lib Capsula 4 loculais. R Brown pi odr. 578.

27. G. QUADRILOCULARIS (Brown 1 c), giab'in ciecta, foliis subovalibus dentatis, floibus spicatis axillanbusve. % in]No\se-Hollandias orā nierid.

Sect. HI. PORPHYRANTHDS G. Don I. C.

Corolla bilabiata csernlea vel pnrpaiea, lobis alatis. Capsula bilocularis \el semibilocularis S'igma labii corollaj paiallelura R. Brown prod. 678.

- j8. G. PURPURASCENS (Piown ' 1 c.) glabiu, caule nudo, foliis radicalibus elongdto-lanceolatis, parcnlā effusa. *If* m Nova Hollandiā intra tropicom. (v. s. in b. Dcless. et mns Par)

- ac\ G. PTERIGOSPERM*. (Brown 1 c.), glabia, canle subsimpbc paucifloro, ' foliis udicalibus lineanbus subdentatis, caulinis minoribus remotis floibus alteinis, calyce oblusmsculo ovanisque glabus. 0^ in Novae-Hollandiai orā mend.

- do. G. CARULEA (Biown' 1 c.) glabia, cauhbusparialibus subsimplicibus pauci-floils, foliib laditalibus Ime<mbu:>, caulinis lemotis, calycibus acutis ovarii-que glandu|ob|b. *If* in No^se-HolldDdia: ora nieid (v s in b nns. icg. Pai)

3i. G. IRCAHi (Brown 1. c.) incano-toinentosa, caulis pahtialibus subsira phcibus pancifloris, folus caulinis re mo Us oblongo-hncaribus, corollis exlus ovariu>que lanatib. *If*, in Nov.x-Hollandiae oia mend.

3a. G. BIGIDA (Bentb. in Hugel. cnuin 71), suifiuticosa pubescenti-lanata v \bowtie denium glabnubcula , ram is erectis rigid U flexuosis dichotome ramosis, foliis Irneaiibus, ladiicalibus &ubbidentalis, caulinis sp.tisis, calycibns glandulosis lobia acutis, cor. lobis alatis capsula biloculari ^ in Nova-Hollandia ad Swan-river. Pedicell axillares bracteali puuci-floti vi*. polhcares Mores G caaiulea, Anexserainibus alamernbianaceautindistylicinctis genericed distinguenda^v s)

33. G. cisifOLiA. (A Cunn ' in litt 1836), suffiutic*o*a ramosissima, ramis angnlati, supeine minute glanduloso-puberulis, foliis hneanbns maigine revolutis mtegerrimis aut apice den tat is, pedicellis axillanbus versus apicem bi-bracteatis i-flons, calyce corollaque extus glanduloso-pubens. *If*, in Novae-Hollandiae collibus ad UunterVrivcr legit cl. A Conningham (v. s. à cl. inv)

Sect. iv. MONOCHILA G. Don gen. syst. 3. p. 725.

Corolla unilabiala lobis alatis. Stigma bilobuui, indusio COIOMOB labio contario, cilia to. R. Br I. c.

34. G. SCAPIGERA (Brown 1. c), glabra eiecta foliis dentalis, spicà terminali pedunculatà, calycii lobi& subulate , ova no hiuc tubulifuo longionbus. % in Novae-Hollandiae orå mend.

A. pedunculo com muni elongatoscapiformi, foliis Imeari-lauceolatis elongatis.
/t pedunculo communi mediocri, foliis ovali-lanceolati.

35. G^ VISCIDA. (Brown' 1 c), glabra fucata ei ecta, fohtia lanceolatis dentatis, pedicellis axillanbus 1-Doris bievissimis, stigmate bifido. % in Novae Hollan due orå mend. (. 5. in h. inus teg VAT,)

Sect. v. AMPHICHILA.

Cor..... stigmatib mdusium ut in prionbus ciliatum. Capsula raembianacea. Pedicelh axillaies i-flori ebracteati. R. Brown I. c.

36. G. ruMiLio (Brown 1. c.) , repens p Aescens , foliis ovatis membranaceis > teiminalibus confertis, pedicellis e sum mis ahs umflons. — in Nova-Hollandiu intiå tropicum. An bujus generis ?

Sect.? vi. SELLIERA G. Don gen. syst 7?5.—Selliera Cav. ic. 5 p. 49*

Corolla anilabiata purpaliascena, lobis apteris, acbtivatioue valvatå. Stigmatia indu&nm ore nudo. Cap&ula carnosa — Pedunculi bibracteati. Ueiboc lepcnles Folia mtegerrima. — An, suadenle cl tadlicbei, genus propnum ut^statiut cl. Cavailles?

37. G. REPKNS (Labill.' nov holl. 1 p 53. t. 76), glabia repens, foliis lauoeolatis carnosis acutis, pedunculis bibiacteatis vix iloiib lougitudiui a?qualibui> Of. in Nova-Hollandia ou'entali mciid (Biown), nee nou in inbula 'Van Diemeu (Ldbill.') et ex cl Ach Rich in Nova Zedandiä loco Gallis dicto Havre dc VAstrolabe, sed coiollae lobii linearibus diffcire videtui Biown¹ prodi. 579. P011. diet «. p. 849. Heiba puwlla. Folia 3-5 hn. longa. (v a. coinm. à cl Labill.)

38. G. KADICAN\$ (Pers. encli. .1pp. 955 P011 dut. 8p p. \$), ghabra ladicanj., foliis lanceolatis subcamosis subacutis, pediculis medio bibiacteatisllore mullo longioribus. *If*, in humidis maiitinis Chilensis ad Sanctum Caiolum deChloe et Coquimbo(Cav), urbein Conceptiouis.(d'Uiv.¹) et Concon(Paipp '), nee in Mexico ut incaute dixit Poiiet. Good ippens Cham. inliuna?â i833. p. 224. Selliera radicans Cav. icon 5 p. 49 *. 47». f 2. Lysipomia icrpens Puepp.' pi. cxs. n. io3. Folia vanaut i-5 poll longa (v. s)

•|- Species exclusa

G. ALBIDA Sin, =: Scavola microcarpa

G. c A LEW DU LACK A Audi¹. = *Scxvola suaveolens*.

G. DUBIA, Spreng. = *Calogyne pilosa*.

G. LJEVIGATA Curt. z=z *Scaevola microcarpa*.

G. TEN ELL A. Andr. = *Eulhales trinervis*.

V. DISTTLIS Gaudich. <voj. Freyc. bot.p. 460. t. 80. G. Don gen. syst. 3.p. 720.
Endl. gen. n. 3045.

Calycis tubus ovario adnatus, limb us 5-partitus lobis subulatis.
Cor. decidua tubo posticè fisso, limbo 5-partito subbilabiato, lobis inargine subpapyraceis. Slam. 5 dislincla. Stylus bipartitus, stigmatibus Jobis cupulatis indusiatis ciliatis superatis. Capsula membranacea calycinios lobos infrà apicem retinens apice emarginnto-bifida bilocularisj septo abbreviato valvulis parallelo. Semina imbricata piano-compressa orbiculata membranâ marginata. — Herba Novo-Hollandica annua multicaulis pilosa. Caules subsimplices. Folia radicalia grossè dentata, caulina alterna linearia integra. Pedicelii axillares solitarii clongati i-flori laxè racemosi ebracteali. Cor.ilava;.

J. D. BERAIIDIAITA. (Gaudich.! 1. c.). (T) in Novac-Hollandiae orà occidentali ad siuum Canum marinoram. (v. s. à cl. inv.)

VL EUTHALES R. Brown prod. 579. Endl. gen. n. 3046. non Dietr.(i) — Velleia Labill. nee Sm.

Calycis tubus imâ basi ovario subadnatus 5-tidus inaequalis. Cor. tubus hinc iüssus, limbus bilabialis. Antb. distinctx. Stylus indivisus. Stigmatis indusium bilabiatum. Capsula 4-valvis basi bilocularis. Semina imbricata compressa. — Herba Novo-Hollandica acaulis glabra hubitu omnino Velleya à quâ differt tantiim calyce tubuioso ad medium nee ad basin lisso.

1. E. TRINERVIS (Brown 1. c), Of in Novae Hollandiae orJi raerid. (Br.) ad terram Van-Leuwin (Labill.). Velleia trinervis Labill.! nov. holl. 1. p. 54. t. 77. Goodeniatenella Andr. bot. rep. t. 4G\$. Sims but. mag. t. 1137. Folia oblonga inpetiolum longè attenuata, intcgerrima aat hinc inde subdentata , vix trinervia dicenda, nam nervuli laterales vix (saltern in sicco) perspicui. An forte soadenie cl. Lindley Mirps ab Andrews depicta specificè distinguenda ? (v. s. comm. à cl. Labill.)

"VII. CALOGYNE Brown prod. 579. G. Don gen. syst. 3. p. 726. Endl. gen. n. 3044.

Calycis tubus ovario adnatus, limbus 5-partitus, lobis aequalibus. Cor. bilabiata. Anth. distinctae. Stylus trifidus lobo singulo stigmate indusiato terminato. Glandula epigyna inter filamenta 2 inferiora. Capsula septo abbreviato subunilocularis. Semina imbricata compressa, — Herba Novo-Hollandica pilosa annua, babitu peniliis Goodeniae, sicca odore Anhoxanibi. Folia alterna linearia elongata dentata vel incisa, floralia basi auriculata. Pedicelii axillares i-flori ebracteati, frutiferi reflexi (Br.) an certe ovarium junius 3-nec a-loculare?

1. C. PILOSA (Brown! 1. c.) (I) in Novà-Hollandid intrà tropicum. Goodenia dubia Spreng. syst. 1. p. 72. (v. s. à cl. inv.)

VIII. YELLEYA Ram. et Schult. syst. 5. p. v— "Velleia Smith trans, linn. soc. 4. p. 217. R' Brown prod. 530. Endl. gen.p. 3047.— Velleja Lindl.

Calyx 5-partitus imae ovarii basi subadnatus, segmentis inaequalibus.

(1) Euthales Dictr. est es Steud. Beauharuuisia fructipeudula.

Cor. tubus imâ basi ovario subadnalus supern6 hinc fissus, limbus bilahiatus lobis margine alatis. Anth. disinctae. Stylus iuulivisus. Stigmatis indusium maximum cilialum. Glandula epigyna inter Mam. i anteriores. Cnpsula basi bilocularis, valvulis hipartitis. Semina imbricata compressa. — Herbae Australasicae acnulcs. Folia radicalia oblonga aut subspathulala, saepiis dentala aut sublyrata. Caules scapiformes dicbolomi, folia flora lia opposita interdiim connala integra sub ramis gerentes. Pedicelli i-tlori nudi, nunc terminales nunc è dicbotomiis orti. Cor. flavae. — Calicem involucri nomine salutat cl. Richard.

§. I. *Calyce 5-partito lobis parum incequalibus, corollâ basi calcareo-ratd, calcare persistent e,* — Menoceras *R. Brown I. c.*

1. 'V. PARADOX' (Brown! 1. c), pubescens, foliis obtuse dentatis. % ib Novae-Hollandise cam pis ad radices monitiuin circa Port-Jackson, ad orara met id. et in insula Yan-Diemen. Pedicelli subnmbellati parce rmosi. Scapus suberectas foliis inulto longior. (v. s. coenra. à cl. Brown.)
j&? humilis, foliis inciso-sabryratis, scapis adscendentibus folia panlo sope-rantibns.— T. paradoxa Lindl. bot. rgg. t. 971. Gart. mag. 1828. t. 7.
2. 'V. A R GUT A (Brown 1. c), glabra, foliis argute serratis. 0^ in Novae Hollandise ora mrid.

§. 2. *Calyce Z-parlito segmento uno maximo suborbiculato, oorollâ basi gibbosiuscuUi.* — Velleia? vera? *R. Brown I. c.*

3. *V. LYRATA (Brown ! 1. c.), glabra, folia basi inciso-dentatis ant sublyratis, bracteis dirhotoiniarnm distinctis, enlycfs segmentis 2 ovatis, uno roajore orbiculato. % in NoviJ-Hollandi.1 orientali circa Port-Jackson. Lindl. hot. reg. t. 551. Sieb.! nov. boll. fl. exs. n. 2'1'i. Guillfin. ic. lili. t. 4. Hook. exnr. fl. t. Q4. 'V. spatbnlata Juss. et Rich. ann. mus. Par. 18. p. 17. t. 1. f. 4. non Br. V. dicbotoma quorunid. Axillnc foliorum glabrx, sed axillae br.ictearnm variant glabrae aut]>ilosso-barbatai. (v. s.)
4. V. sPATHnrATA. (Drown! 1. c), glabra, foliis oblongo-spathulatis snbedentatis basi integerrimis, axillis barbaris, bractis dichoioniarum dislinctis.^ in Novft-Hollandiâ intra tropicuui et ad Port-Jackson, (v. s. in h. Deless. et mas. Par.)
5. V. ruBEscENs (Brown ! prod. 58i) pubescons, foliis dentatis, bracteis dicliotomiarum dibtinctis, calycis segmentis oblongo-acutis. If. in Novâ-Hollandiâ intra tropicuno. Caules foliorum radicalium longitndini aeqaales. (v. a. in b. mus. reg. Par.)
6. 'V. FERFOLIATA (Brown 1. c), glabra, bracteis dicbotomiarum maxiis con-natis subrotuodis dentatis. If ad Port-Jackson.

IX. LESCHENAULTIA. — Lechenanlia *R. Brownprod. 581. G. Don gen. sjst. 3.*
*p. 7*7. Endl. gen. n. 3048.*

Calycis tubus ovario adnatus lobis 5 lincari-subulatis. Cor. lubo longitudinaliter fisso, limbo subbilabiato, lobis subserratis. Anth. sub-anhesi cohaerentes. Pollinis granula spha3rulis4 coalitis composite. Cap-snla prismatica bilocularis 4-valvis, valvis oppositis medio scpliferis. Semina nucarnenlacea. — Frutices (rariis herbae) omnes è Novâ-Hollandift orti glabri. Folia alterna angusta inlegerima. Floresaxillares vel' terminales vel oppositifolii subsolitarii pedicellati. Cor. ignae.

§. 1. *Fruticuli ericoidei, Jlorihus axillaribus vel terminalibus, capsula' valvata, scmimbus cubicis.* R. Brown I. c—Lechenaultia Endl. gen. n. 3048. b.

* *Flonbus subsolitariis igneis Delccemleis.*

1. L. FORMOSA (Brown 1 c), floubas axillaribus solitarhs ebractentis nutantibus, corollis bilabiatis filameiitissae glabus ^ "n Novâ-Hollandia ora mend. L formosa Sweet fl aastr. t 26 non LmDI. nee Hook. Folia hnearia teretisbulata patula non ruueronata. (v v c)
2. L. MULTIFLORA (I. odd. bot cab. (1826) t. i5yg), flonbns axillanbus solikanis ebiacteath subnutantilms, corollis bilabiatis extus ilamentisque hirsnto-pubescentibnn 3 in Novâ-Hollandia L. oblata Sweet fl austr (1827) n 26. in notâ G Don gen syst 3. p. 717. f. 12?. L formosa Sims bot. mag t 2600. Lindl bot. reg. t q»6 non Br. L. Baxter! G. Don in Load. h. biit.(1832) p. 79.
- 3 L. TUBIFLORA (Brown ' 1. c), floribus subteiminahbus solitams subsessilibas, corollis tabulo&is caivatis, limbo cunni\enti, foliis snbuldtis mucronulo pellacido 3 in Novae-Holldndiae 01 à mendionah. Cor glabrse 6-7 lin. longs, lobis aristato-muctonatis (v. s. coroni. a cl. Brown)
4. L. CRAMDIFFORA , floribus ad apices raraorum solitariis geminisye basi bibracteatis, coiollae limbo bilabiato, lobis mncionatis ciliatis late alatis serratis. 3 in Novâ-Hollandia ad Swan-river legit cl. Drummond' Fruticalas gldber pedalis eucoindens Folia tenaia fere subulata mucronata. Cor. caerulea ampla ovario exclnsa fere polhcem longa, lobis late dorso tnneivhs apice mucronatis, alis aniplis serralis Indnsium spaise puberum. Calycis tubas gracilis 6-7 lin. longus, lobi subnlati. (v. s. à cl. inv)

* • *Floribut corymbosis flavis velpallidis.*

5. L. EZPANSA (Brown 1. c), floribusaxillaribns in coiymbura pauciflorum confertis, pedicellis bibracleatis, roiolac limbo nmlabiato, lobis ciliatis. j in Novae-Hollandiae 01a meridionali (Br), onentali (h. nius. Pai.) et ad Swan-river (Hng Druram.') Tolia erecta mocronata. Calycis tubus elongatus. Cor. extus glabra stnata, lobis maigina et apice ciliatis. (v. s. couim. à mus. reg. Par.)
6. L FLORIBUNDA (Benth in Hug ennm. 70), floiibus terminalibus coryrabosis, corolla? limbo nmlabiato laciniis ciliati&, foliis linear-subulatis mucrone brevis&imo pellucido. J in Novâ-Hollandia ad Swan-river. Cor magmt. L formosae, sed at in L. expansa tubus ad basin fissus Cor. ex sicco albae. (•. a. coll. à cl Drummond)
- «. L ? LINARIOIDES, floribus in corymbum terminalem confeitum di^positis, pedicelbs bibiacteatis, corolla; limbo bilabiato, tabo intus velutmo-hirsuto, extus lobisqae glaberrimis. j % in Novâ-Hollandia ad Swan-river legit cl. Drummond' Caulis erectos 1-1 ½ pedalis parcè raraosns. Folia alterna anguste lineana integerrima, ut tola planta glabra Cor. flavac. Antherae liberasnec ut in ceteris concrete, unde et ex fructn ignoto genus dubium. (v. s. à cl inv.)

§. 2. *Herba, /lore oppo'nifolio, capsuld tardiiis valvata, valvis collo coarctato coharentibus > semimbus cylindraceis,* R. Brown I. c.—Latouria Endl. gen. n. 30^S. a.

8. L FITIFORMIS (Biown¹ 1. c.)t flore oppositifolio, corollâ extus glabra intus snbharbata, foliis alteinis compresso-filiformibus If in Novâ-Hollandia intra tiopicum —in Carpentaria. Folia caeteris longiora, nerapè ia-i5 lin. longa patentia. (v. s. conim. à cl. Brown.)

• *Species exclusa,*

L HUMILIS Spreng. = Antbotinm humile.

X. ANTHOTIUM R. Brown prod. 58a. EndL gen. «. 3050.

Calycis tubus ovario adnatns, limbus 5-partitus. Cor. tubus hinc longitudinaliter fissus, limbus bilabiatus, labii superioris lobis margine interiore auriculatis. Anlh. cohaerentes. Pollinis granula simplicia. Ovarium biloculare. Stigmatis indusium corollae labiis contrarium. Fruct. ign. —Herba Novo-Hollandica humilis glabra acaulis. Folia radicalia teretiuscula basi pariim dilatata. Scapi plures patuli indivisf. Flores fasciculatim congesti, bracteis foliaceis. Cor. subviolacea 5-partibilis, unguium marginibus inflexis solutis. Stigm. indusium imberbe.

I. A. HUMILK (Brown l. c). If. in Novae-Hollandia orā merid. Leschenaultia humilis Spreng. Tariut minor et ferè daplo major floris relativā proportionē aliquantnm diversa.

Ordo CVIII. ROUSSJEACEJE.

Calyx profundè 5-fidus persistens, tubo brevi basi ovarii adnato , lobis cartilagineis , per aestivation em valvatis, deindè patulis, imò reflexis. Cor. perigyna 5-partita, petalis nempè imâ basi tantùrn concretis cartilagineis lanceolatis extiis villosis, post anthesin persistentibus. Stam. 5 petalis alternacum iis inserta vix iis breviora, filam. firmis erectis basi non dilatatis, antheris erectis basi insertis bilocularibus longitudinaliter dehiscentibus. Pollinis grana crassa. Ovarium imâ basi calycis adnatum, supernè crassum ovato-pyramidalum quinquangulare sensim in stylum conico-cylindicum productum. Stigma glabrum per anthesin clavatum globuloso-5-gonum demùm margine revolutum et ferè indusio cinctum. Bacca cum calyce basi adnata ovato-pyramidata acutè angulata in stylum pentagonum persistentem producta , carnosa , intùs 5-locularis, angulis cal. lobis alternis deorsùm in carunculas triangulares dilatatis, septis carnosò-membranaceis in axim confluentibus, pulpâ molli in loculis semina obvolvente. Placentae crassae axi intus adnatae fungosae. Semina nunierosa parva cordato-ovata. Albumen carnosum. Embryo.

— *Frutex scandens pseudo-parasiticus Mauritianus glaber.* Rami teretes. Folia opposita, petiolata , obovata aut oblonga, mucrone acuminata, à medio ad apicem remotè el calloso-dentata , coriacea, nervo medio valido utrinquè penninervio, venis reticulatis. Stipulae membranaceae (forte Bractese quarum flores abortiunt) intra-axillares vaginantes, in foliis superioribus sita3. Flores in axillis solitarii pedicellati, ad basin, pedicelli bracteâ membranaceâ subvaginante cincti. Corollae extùs villo albida3, intus ex sicco albido-purpurascentes. Numerus partium variat: i° flores ex Smith videntur interdùm 4-meri nee semper 5-meri, 2° fructus loculi interdùm 6-y.

— Genus *Roussaea* ad Solanaceas à cl. Ga3rtnero filio et Lindleyo , ad Campanulaceas à cl. Jaume , ad Scrophularineas à cl. Bojer relatum , mihi videtur no'vi ordinis incunabulum. Differt à Solanaceis et Scrophularineis calyce adnato , staminibus corollâque perigynis, stigmate subindusiato, fructu stellatim et regulariter multiloculari, etc. Distinguitur à Campanulaceis stigmate glabro subindusiato et foliis oppositis verticillatisve, fructucarnoso, etc., ad Escallonieas (mediante Forgesiâ) accedit, sed folia opposita, fructus carnosus, stylus unicus, etc. , à Loganeis distinguitur calyce basi ovarii ad-

X. ANTHOTIUM R. Brown prod. 58a. Endl. gen. n. 3050.

Calycis tubus ovario adnatns, limbus 5-partitus. Cor. tubus hinc longitudinaliter fissus, limbus hilabiatus, labii superioris lobis marginine interiore auriculatis. Anth. cobaerentes. Pollinis granula simplicia. Ovarium biloculare. Stigmatis indusium corolla? labiis contrarium. Fruct. ign.—Herba Novo-Hollandica bimilis glabra acaulis. Folia radicalia teretiuscula basi parvum dilatata. Scapi piures patuli indivisi. Flores fasciculatim congest!, bracteis foliaceis. Cor. subviolacea 5-partibilis, unguium marginibus inflexis solutis. Stigm. indusium imberbe.

I. A. HUMILK (Brown l. c). If in Novae-Hollandia orâ merid. Leschenaaltia humilia Spreng. "Variat minor et ferè duplo major floris relativâ proportione aliquantom diversa.

Ordo CVIII. ROUSSJEACEJE.

Calyx profundè 5-fidus persistens, tubo brevi basi ovarii adnato , lobis cartilagineis, per aestivationem valvatis, deindè patulis, imò reflexis. Cor. perigyna 5-partita, petalis nempè imâ basi tantùm concretis cartilagineis lanceolatis extùs villosis, post anthesin persistentibus. Stani. 5 petalis alternacum iis inserta vix iis breviora, filam. firmis erectis basi non dilatatis, antheris erectis basi insertis bilocularibus longitudinaliter dehiscentibus. Pollinis grana crassa. Ovarium im4 basi calycis adnatum, supernè crassum ovato-pyramidalum quinquangulare sensim in stylum conico-cylindicum productum. Stigma glabrum per anthesin clavatum globuloso-5-ffonum demùm marline revolutum et ferè indusiocinctum. Bacca cum calyce basi adnata ovato-pyramidata acutè angulata in stylum pentagonum persistentem producta , carnosa , intùs 5-locularis, angulis cat. lobis alternis deorsùm in carunculas triangulares dilatatis, septis carnosò-membranaceis in axim confluentibus, pulpâ molli in loculis semina obvolente. Placentae crassse axi intùs adnata3 fun go sac. Semina nunierosa parva cordato-ovata. Albumen carnosum. Embryo.

— Frutex scandens pseudo-parasiticus Mauritianus glaber. Rami teretes. Folia opposita, petiolata , obovata aut oblonga, mucrone acuminata, à medio ad a picem remote et callosodentata , coriacea, nervo medio valido utrinquè penninervio, venis reticulatis. Stipulae membranaceae (forte Bracteae quarum flores abortiunt) intra-axillares vaginantes, in foliis superioribus sitae. Flores in axillis solitarii pedicellati, ad basin pedicelli bracteâ membranaceâ subvaginnante cincti. Corollas extùs villo albidae, intùs ex sicco albidopurpurascentes. Numerus partium variat: i° flores ex Smith videntur interdùm 4-meri nee semper 5-meri, 2° fructus loculi interdùm 6-7.

— Genus Roussaea ad Solanaceas a cl. Gaertnero filio et Lindleyo , ad Campanulaceas à cl. Jaume , ad Scrophularineas à ci. Bojer relatum , mihi videtur novi ordinis incunabulum. Differt à Solanaceis et Scrophularineis calyce adnato , staminibus corollâque perigynis, stigmate subindusiato, fructu stellatim et regulariter multiloculari, etc. Distinguitur à Campanulaceis stigmate glabro subindusiato et foliis oppositis verticillatisve, fructucarnoso, etc., ad Escallonieas (mediante Forgesia) accedit, sed folia opposita, fructus carnosus, stylus unicus, etc. , à Loganeis distinguitur calyce basi ovarii ad-

nato, à Goodenovieis lobis corollae regularibus, coriaceis nee
marginē corollino-membranaceis, stam. filamentis corollae
non adnatis, fructu baccato. Habitus hinc Forgesiae et Scae-
volae, illinc Labordiae. Conf. de Roussaeae affmitatibus Alpb.
DC. in mon. camp. p. 94.

ROUSSJSA.. —Roassen Smith ic. incd. i. p. 6. f. 6. Gaertn. f. carp. 3. p. 166.
t. 313. —Roussoa Roetn. et Schult. sjrst. 3. p. 3. is. 418. —Ronsseaavia Dofer
hort. maur. p. a/6.

Car. gen. idem oc ordinis. — Nomen primitivum (parcè ortho-
graphicè mutatum) est servandum, pracsertim ut à Rousseauxi[^] faciliis
distinguatur et uomini cl. J. J. Rousseau ritè respondeat.

z. R. SIMPLEX (Smith 1. c.) /) ^ in insulae Maaritii sylvis nmbrosis, speciatim
ex Bojer ad Pollicem et districtam militarem. Fl. apr. maio. Lara. ill. t. 75.
f. a. Tratt. arch. 3. p. 64. t. 100. Poir. die. 6. p. 318. Sieb.! fl. maor. n. 12a.
(jr. s. ex herb. Comm. et Sieb. et corom. à cl. Boa ton.)

**Ordo CIX. GESNERIAGE*E* Nees arm. sc. nat. (i8a5) 6.
p. 20,5. *Kunth handb. p. 1/og.* —• Gesnereae Rich, in Juss.
ann. mus. 5. (1804)/?. 4²7- *Kunth in H. et B. gen. i.p.*
3g2. *Mart. nov. gen. 3. p. 58.* — Gesneraceae Lindl. *nat.*
syst. ed. 2. p. 286. — Personatae sect. Gesneriaceae Link
handb. 1. p. 504. — Gesnerieae Bnrtl. *ord. nat. p. IJ£.*
G. *Don gen. syst. £.p. 6/4* (trib. Gesneriacearum).**

Calyx nunc basi plūs minūs ovario adnatus, nunc liber,
5-partitus aut 5-fidus, lobis suba? qualibus per aestivationem
valvatis; Cor. gamopetala, tubulosa , plūs minūs irregularis ,
perigyna nempē calyci ad basin aut ad apicem partis ovario
adnata? inserta, 5-loba, saepiūs ringens, per aestivationem
imbricata, tubo basi posticē gibbo. Stam. 5 imae corollae in-
serta, saepiūs 4 ierilia didynama, quinto postico rudimen-
tario sterili, rarissimē 1 tantiū fertijia. Antherae biloculares
saepē per paria subcohaerenles, connectivo tumido donata?.
Glandulae i-5 cum staminibus alternae, nunc distinctae, nunc
in annulumconcretae , circa ovarii basin siiae. Ovariū i-lo-
culare. Stylus simplex. Stigma nunc indivisum capitato-
coucavum nunc bilobum. Fructus i-locul. capsularis seu
baccatus bivalvis, loculicide dehiscens aut indehiscens, val-
visaxi inflorescentioe parallelis, placentis 2 medio valvularum
adnatis bilamellatis. Semina numerosa minuta oblonga. Em-
bryo erectus in axi albuminis carnosí. Testa lenuis oblique
venulosa. — Herbae aut sulfrutices. Folia opposita, rariū
alterna seu vērlicillata, indivisa, exstipulata, penninervia.
Flores racemosi umbellati aut axillares. — Ordo docente cl.
Jussiaso, etc., ex ovario saepē adnatoet corollarum insertion e
peri^yna ad Campanulaceas Vacciniaesve accedens, ex irregu-
laritate corollarum à Goodeniaceis partum abhorrens, sed ex
forma corollas, staminum didynamia et valvis fructus axi in-
florescentise parallelis potiūs fortē, suaclentibus cl. Link,
Bariling, Lindley, etc., ad Personatas praeoipue Oroban-
cheas (etiamsi perigynus) accedens.

Trib. I. *GESNERIEM.* — Grsnrcaruni §. 1 et *I. Mart, L c. 1*
Gesnriaceae div. 2. *Nees 1. c.* — Gesnerieae genuineac. *Bartl.*
ord. nat. p. 17^. — Gloxinieae et Gonrudicae G. *Don I. c.*

Galyris tubus plūs minūs, sed evidenter, ovario adnatus. Corolla
ideō ad apicem calycis lobi inserta.

1. RYTIDOPHTLLUM *Mart. no**, *gen. 3. /> 38. Lindl nat. syst. 289.* — *Codonopbora Lindl. bot. reg. n. 1110. excl. sp. 24.* — *Gesneiiae sp. Plum. Linn.*

Calycis tubus ovario adnatus, limbus 5-partitus. Cor. campanulata, medio subconstricta, limbo 5-lobo. Stain. 4 didynama cum quiuti rudimento. Anherae liberae aut juniores vix subcohaerentes> adults vix subexserta?. Discus epigynus crassus annularis sinuosus. Capsula cum calyce 5-costato concreta, vertice piano bivalvis, placentis 1 parietalibus polyspermis, seminibus fusiformibus.—Frutices, rariis arbusculae sen suffrutices, omnes Caribaei. Rami supernè hirti. Folia sparsa, subtus hirta seu hirsuta, supernè soepè bullata. Pedunculi axillares elongati cymam corymbosam gerentes.

- x. R. GRANDE (*Mart. nov. gen. 3. p. 39*), foliis luto-lanceolatis longissimis petiolatis serrato-denticulatis supra pilis spasis scabris, subtus pallid is, raraulis petiolis pedunculis nervisque fol. sublùs puberulo-scabris, pedunculis longitidine folii apice corymbosis, cal. lobis lanceolato-triangularibus, corolla; alabastro glabriuscuso. /j f) in Jamaicâ austral! ad praecipitia niontum altissimorum. Gesnera grandis Swartz! fl.. ind. occid. p. 1018. G. grandis è Jamaicâ Spreng. syst. 2. p. 838. Folia pedem et ultrà longa, 2-3 poll, lata, petiolo pollicari. Cor. ex Sw. lutco-virides. (v. s. à cl. Swartz.)
2. R. PLUMERIAITUM , foliis lato-lanceolatis longissimis breviter petiolatis latè crenatis ex apice crenarum ruucronnalis, supra pilis subclavellatis in raedio areoiarum subcongestis scabris, subtus petiolis pedunculisque hirsutis¹, pedunculis folio paulò brevioribns apice ramoso-corymbosis, cal. lobis lanceolatis, cor. alabastro extus liirsuto. \$ in Santo-Domingo legit cl. Bertero ! Gesneria Plum. amer. t. i34» bpna sed excl. syn. Dunn, citata. G. grandis var. ex Hispaniola Spreng. syst. 2. p. 838. Magnitud. fol. ad G. grandem accedit sed car. notatis facile disliucta. (v. s. à cl. Bertero.)
3. R. BERTEROANUM (*Mart. 1. c.*), foliis lanceolatis utrinque acuminatis den t Leu-latis petiolatis supernè papilloso-asperis, subtus hirsuto-scabris petiolis ramisque dense hirtis, pedunculis folio dimidiò ferè brevioribus hirtellis apice corymbiferis, cal. ljbis subulatis, cor. alabastro birsuto. \$ in Santo-Domingo ad rupes legit cl. Bertero. Gesnera scabra ex Hispaniola Spreng. syst. 2. p. 838. Folia 7 poll, longa, i5-i6 lin. lata. Cor. 6-7 lin. longae tubulosae sabincurvae extus hirsntae. (v. s. à cl. Bertero.)
4. K. FETIOLARE , foliis oblongo-lanceolatis ntrinqnè aenminatis petiolatis serratis ntrinqnè viloso-subbirsntis, ramiset pednnculis folii longitudini aequalibus birsntis, bracteis foliaceislanceolatis, cal. lobis oblongo-lanceolatis acuminatis. fy in Santo-Domingo ad rupes et loca praeupta. Gesnera tomentosa Bert, berb. Praeter notas indicatas differt à R. tomentoso corollis rubentibns paulò majoribus, foliis non reticnlato-nervosis magi membranaceis petiolatis 7-8 lin. longis. (v. s. à cl. Bertero.)
5. R. CKENULATUM , foliis ovali-lanceolatis acuminatis basi cuneaio-attenuatis sabsessilibus crenatis suprà scabris subtus birsutis, raaais hirsufis, pedancnlis folio duplò longioribus subbispidis apice corymbosis, bracteis subulatis, cal. lobis ovali-lanceolatis aenminatis. J in ins. Cubâ propè Havanam (Hnmb. la Sagr.). Gesnera tomentosa Jacq. amer. 179.1.17%* f<< 6. H. B. et Knntb nov. gen. am. 2. p. 396. non Linn, nee STV. G. crennlata Alpb. DC.! in b. DC Folia 5 poll, longa , 1 £ poll, iffca. Pedunc. 6-8-poll. (• s. comm. à cl. R. dc la Sagra.)
6. R. TOMENIOSUM (*Mart. 1. c*), foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi attempoatis vix subpetiolatu serratis tomentoso-hirsutis subtus subincanis, ram is hirsutis, pednnculis folii longit. aequalibus subhirsotis, bracteis nullis aut minimis, cal. lobis latè ovato-triangularibus. j in ins. Jamaica? locis proclivibus jaxta rivos. Gesnera tomenrosa Linn. sp. ed. 1. p. 612. Swartz! obs. 228. Sims bot. mag. t. i0a3. Codouphora lanceolata Lindl. bot. reg. n. mo in adn. — Sloan. Jam. 1. p. 164. t. 104. f. 1. Brown Jam. p. 261. Cor. subearo-

panulat.-c virescentes extus hirsntse. Folia pedanculi et ramali glatinosi. Fol. 6. poll, longa , ia-i5 lin. lata. (v. s.J

7. R. AORICDLATUM (Hook. bot. mag. t. 356a), foliis lato-lanceolatis oblique snb-falcatis crenatis basi ntrinque antriculatis sessilibas, pedunculis hispidis longitudine folii, calycis lobis aourainalis patalis. § in Brasiliâ circâ Rio de Janeiro. Corolla flavida extiis set-ice?, intus flava rubro maculata.

II. CONRADIA. Mart, gen. nov. 3. p. 38. Lindl. nal. syst. 287 non Nutt.—
Gesneriae sp. Plum. linn. — Pentaraphia Lindl. bot. reg. n. 1110.

Calycis tubus ovario toli adnatus, limbus 5-fidus seu potiis 5-partitus. Cor. tubulosa aut campanulala limbo subaequaliter 5-fido. Stam. /£ didynama cum quinti postici rudimento. An there plerumque in orbiculum cohaErentes. Discus glandulosus nullus. Capsula sicca calyce vestita in verlice piano bivalvis. Placentae 1 parietales polyspermae. Semina scobiformia. — Frutices, suiFrutices, rariis herbae. Spec, omnes Americanae, prajserlim Caribaeae. Radices fibrosa?. Folia sparsa , praesertim in nervis scabrida rariis glabfa, plerumque dentata. PeHunculi. axillares uni aut saepiis pluriflori cymosi. Cor. rubrae aut virides autpallida? saepè punctatae.

• *Fruticosce, genhalibus exsertis, antheris per paria connexis.* — Dittanthera G. Don gen, syst. 4. p> b'5o.

1. C. VENTRICOSA (Mart. 1. c), fmitcosa, foliis ellipticis acurainatis crenatis petiolatis glabris, pedancolis folio brevioribus flore,s 3-4 ombellatos pedicellatos gerentibus, cal. lobis snbalatis elongatis, cor. cylindraceâ incurvâ snbventricosa , caps, obovatâ nervis lonotatâ. 3 i^o fissuris rnpiuu Jamaicae, Montis-Serrjii, Martiniae, Dominica?, Goadalupae. Gesnera ventricosa SwarJz fl. ind. occ. p. 1018. Cor. coccineae, sesqaipollicem longa?, 5 lin. diam. lobis labii saper. crenato-dentatis. (v. s.)

yS^o angustior, corollis cylindraceis vix ventricosis, capsnlâ obconicâ nervnis in alas subexsertis. 3 in Guadalapd legit cl. Perrottet! Cor. pollicem longa, diam. 3-4 liu. (v. s.)

a. C. EXSERTA (Mart. 1. a), subarborea, folia oblongo seu elliptico-lanceolatin crenubto-serratis petiolatis glabris, peduncalis folio brevioribus flores 3-4 nimbellatos pdicellaros gerentibus, cal. lobis linearibas a pice sobreflexis, capsulis obovatis 10-nerviis. ^ in raootibus sum mis Jamaica* australis. Gennera exserta Swarlx! fl. ind. occid. p. 10^4. Gesn. corymbosa Balb. et Bert. herb. Corolla; pollicares flavae. Pelioli pollicares. (v. s.)

3. C. CALYcwA (Mart. 1. c), fraticosa, foliis lanceolato-ovatis acuminatis serrato-crenatis breviter petiolatis glabris, peduncalis vix folio brevioribns trifloris, calycis tabo inflato campannlato dentibns 5 ovatis, capsulâ cylindraceâ basi attenaata 10-strialâ. 3 ^{ia}_{s y lv} monium Jaroaiae auslralis. Gesnera oalyicina Swartz fl. iad. occid. p. io?6. Cor. magna? pallida; sen alb*.

4. C. PEDUNCULOSA , fmitcosa, foliis ellipticis ntrinque acuminatis integerrimis breviter petiolatis glabris, pednnclis folio duplo triplove longioribus flores duos longe pedicellatos gerentibus, cal. lobis subulatis elongatis, cypsnU obconica 10-nervia. t) »ⁿ Mexico. Gesneria exogonia fl. mex. ined. ic. Cor. flavescent. Glandula annularis suprà ovarium et idea§fcedia inter Conradiam et Rytidopbyllum. (Descr. ex ic. pict. v. s. sine flor. in h. Moric.)

* * *Fruticosar aut suffruticosce, genitalibus inclusis, antheris per paria connexis.*— Syuanthera G. Don I. c,

5. C. CRANIOLARIA (Mart. 1. c.1, fruticosa , foliis enneatis obovatis acutis petiolatis siiperu glabris snbruncinaiis seu obtusrsinaato-lobatis, petiolis pednnclis raraulis nervisque fol. aubtus hirsuto-hispidis, pedanculis ex axillis snpreuiis ortis folii circiter longitndine hispidulis 5-floris, cal. lobis linear-lancicolatis

- reflexis, cor. lobis fimbriatis. 3 *ⁿ pi**r uplis montium Hispaniolac. Craniolaria fruticosa Linn. sp. 861. Gesnera Craniolaria Swartz! fl. ind. occ. p. 1015. G. (imbriata Lam. diet. 2. p. 703. Marlynia fruticosa GLox. obs. p. i3.—Gesnera arborescens, etc. Plum. gen. '37. ic. ed. Burm. t. 137. Cor. subc. impanulata? , intus Mrautae, flavo-virides nigro-punctatai. Folia 4-6 poll, longa. Petioli ex Sw. semunciales, in spec, meo 2-3 lin. tantum longi. (v. s.)
6. C. SCABHA (Mart. 1. c), fruticosa, foliis oblongis seu ovato-lanceolatis acutis basi obtusis serrulatis breviter petiolatis utrinque pedunculis calycibusque pubebrevi scabris, pedunculis axillaribus folio brevioribus apice coryiubiferis, ramis 3-fidis 3-floris, cal. lobis ovatis acutis. ^ in Jamaica; occidentalis nipibns calcareis montium. Gesnera scabra Swartz! fl. ind. occid. p. 1020. Polia 3 | poll, longa, pollicem lata, petiolo %-3-lin. Flores (cal. et cor.) sanguinei. (v. s.)
- j. C. HUIUris (Mart. 1. c), fruticosa, foliis sessilibns lanceohitis basi cuveatis superue serratis caulisque glabris, pedunculis folio longioribus apice 3-5-floris, cal. lobis linear-lanceolatis, corollis in cm vis. £ in insulis Caribaeis, Santi Domingi (Plum.), Cuba (la Safera!). Gesneria humilis Linn. sp. 850. excl. Sloan, syn. G. humilis flore flavescente Plum. ic. ed. Burm. t. i33. f. 1, Caulis infernè nudus supernè foliosns. Folia sesquipoll. longa, 4-5 lin. lata. Pedunculi rariis simplices snbuniflori. Calyx purpurascens. (v. s. ex ins. Cnba comm. à cl. la Sagra.)
8. C. CUNEIFOLIA, fruticosa, foliis sessilibns obovatis basi obtusis subeni-datis apice grossè denlatis, pedunculis axillaribus folio brevioribns i-floris, cal. lobinlanceolatis apice acuminate, corollis luhnlosis extiis pubescens. \$ in Mexico. Gessneria cuneifolia fl. mex. ined. ic. Affinis videtur C. hiunili sed pedunculi breviores i-flori, folia 2-2 | poll, longa, 15-18 lin. lata. Cor. extiu brevissiræ pubescentes, extiis coccinea;, intus Havescentes. (v. s. ic. pict.)
9. C. SLOAWKI, soffrnticosa, foliis lanceolatis utrinque acuminatis serratis reticulato-nervosis in nervis petiolis caulisque velutino-scabris, pedunculis 3 ant unico triparlito folio breviori, calycis lobis linear-subulatis tubo longioribus, cor. tubulosa. ^ in Jamaica; cretaceis aridissimis. Gesneria acaulis Linn, ap. 850? (ex syn. Sloan, sed descr. amoen. acad. vix ac ne vix quadrat.) Swartz! obs. 227.—Sloan, jam.hist. 1. p. 159. t. 102. f. 1. Nullo nido acaulis, sed, ex ic. Sloan, et specim. Swartzianis, caulescens erecta semipedalis simplex per totam ferè longitud. foliosus et florifer. Species cal. lobis clongatis (-n) lin. longis spectabilis. Cor. coccinea. (v. s.)
- * * Herbacee, antheris subexscritis, liberis. — Chorisanthera G. Don I. c.
10. C PUMILA (Mart. 1. c.), subacaule herb ace a, foliis obovato-enneatis crenatis Bessilibas supernè soabridis, sublùs sublaevibus, pedunculis subradicibus folio brevioribus i-u-floris, cal. lobis ohlongo-lancolatis acutis. If ad latera umbrosa rnpium Jamaica? occid. Gesnera pumila Swartz! fl. ind. occid. p. xo3o. Folia 2 poll, longa, 9-10 lin. lata. Caulis brevissimis. Cor. subcampnllatae albidae, extiis hirsutie sanguineæ bursutae. Anth. subrotundae liberal. (v. s.)

III. GESNERIA Mart. nov. gen. 3./>. 27. Lindl. nat. sjerst. 287. non Plum. —
Gesnerie sp. Linn.

Calyx ovarii basi adsatus, limbo subinaequaliter 5-partito liiiero. Corolla tubulosa imâ^Lsi 5-j;ibberosa aut rqualiter subtumida, limbo 5-lobo, lobis nunc in labia duo dispositis, nunc subaequalibus. Stam. 4 imae corolJae adnata, didynaina cum quinti ru dim en to. Anhherae juniores cohaientes. Stylus filifonnis, stigmate capita to aut bilobo. Glandula; perigyna? 2-5 circa ovarii basin. Cnpsula coriacea i-locularis bivalvis, valvis convexis, placentis 2 parietalibus polyspermis. Scmina scobiformia. — Herbae perennes radice tuberosa, rarius frulices. Caulis simplex aut oppositè ramosus. Folia opposita aut vrlicillata dentata.

Pedunculi simplices imiflori aut ramosi multiflora, axilaria aut in thyrum lacumumve terminalcm dispositi. —Species omnes in America tropicā spontaneae.

Sect. I. ETGESNERIA.

Cal. lobi ovato-lanceolati aut lanceolato-lmeares non valvati. Cor. coloia Haaepius coccinea fa nee modice biante. Capsula obtusa aut sensim attenuata.

* *Folus oppositis.*

et. Herbaceae.

1. G. cHELOirroxDES (H. B. et Kunth nov gen. am. a. p. 692), caule herbaceo subsimplici angulato piloso-his to., foliis oppositis brevissime petiolatis oblongis acutiusculis basi obtasis glossefucnatis utnnque piloso-birris subtus canescens-tibus, flonbus oppositis soli tain's geniimsve spicatls, cor. tubulosso-ventricosis extus hirtellis % in hnmidis nmbiosis Novae-Granatae. (or. inc. iinata, faace corapressa, calyx vix iino ovano adhxiens)
2. G. ALLAGOPHYILA (Mart nov. gen 3. p 36 choix p 2a 1. i4) caule erecto piloso, foliis oppositis teinis ant subspaisis subsesulibus viilosis hneaii-oblongis bpatbnlatiis obtusis crenatis, flonbas sessilibus veitcillatis in spicatu longani terrainalem dispositis, cal. lobis lanceolatis, cor. tuho piloso cylindrito, limbo zequah patente glabro. If. in Biasihae cam pis aurifens prov. MiDarura (Mnit.), in piov Sancti-Pauli (Lund') ad Maldonado (Ailand¹) et Poitalegre (Hook). Liudl. bot, reg t. 1767 Oiobanche hirta fl. fluin. h t. 79 et foile Or. spicata t 78. Cor. coccineas aut flavescenti-iubrae. Folia 2 3 poll, longa , 9-12 hn lata. luber placentaeforine. (v s)
3. G. VA.RGASII, hirsnto-tomentosa, canle herbaceo erecto tereti, foliis oppositis bieMssime petiolatis ovali-oblongis nttnque attenuatis crenatis, pedicellu ad axillas foliorum summoiara fasciculato-verticillatis i-floris iuaequarebus in lacemum terminalein di&positis, calyce imā basi idnato 5-fido, lobis lanceolatis, cor. cylindriaceā apice subventricosā puberulā If click Caracas legit cl. Vargas. Cor. coccmeae pollicui longa. Stam breviter exserta. Folia luterdūm subalteina. Media inter G. allagopbyllam et strict am, prion foliis, posteriori floiibnsaffinis. (v s à cl inr.)
4. G. TERTmrLATA (Cav ic 6. p. 61. f. 585. f 1), canle erecto herbaceo-villoso, foliis oppositis inbessilibns ovatis cienuatis superne hispidit> snbttis cmereo-tonentosib, pedicelhs ad axillas supreraas verticillatis i-flois viilosis, cor. tubulosa'limbo breviter et obtuse 5-lobo % m Amer. me rid. inter Gnarandam»et Chimboraco Radix ex ic fibiosa. Herba 8-10 pollic. Cor. coccinea; villosa?.
- 5 G TUBXFLORA (Cav ic 6. p 61. t ^84), tomentoso-hirsuta, CAule herbaceo erecto telragono, foliis oppositis ovatis acutis crennatis bientei periolatis, pedicellis axillanbus a-3 nmfloris petiolo loogionbus, cal. lobis angustis, cor. tubulosso-snbvenliicosā tomentosā rectā 5-uenata ad fancem coarctata. % in Panamensi ditione (or. pollicem feii longap, pedicello duplo fere longioies, coccueje Glandulae perigynaj 5.
6. G. LATIFOIIA (Mait. nov. gen 3. p 35. etinOttoverh ges. Beil gart. 5. t. 218 t i et in linn. 1829 litt p 17), herbacea simplex toraentoso-villosala " foliis oppositis lato et oibiculan-ovatis petiolatis grossè dentato-crenatis, cy-mis axillanbus suisūm in thyrum congestis, cor. cylindraceA tnbo aqaaLi, cal lobis lanceolatis acuminatis. 'C in nmbrosis ropestribn Biasiliaa tropica' jn prov. Rio-Giande, S Cathaiae, Santi-Pauli et Minium G. macrohtachya Liudl bot leg r 1202 ex ipso et ex Hook, jouin. 1. p. J80. Radix tubprosa. Folia 6 poll, longa et totidem feielata, supia spaise pnbeia et subtus babto-mentosa. C01. pollicem longae mbiaj Glandulas 2. pengynse posticae. (v. s. tomui. à mus. i^g. Beiol.)
7. *Gauditkaiidi*, tota densius liisuto-torrentosa, tohis brevius petiolatis dentibiib luinonhus multo magis appoximatis, cal lobw elongatis If. n|

Brasilia circa Rio-de-Janeiro legit cl. Gaudichaud Non male refert ico-neni 1202 bot. leg. sed totnentum demius et ferrugineum. (v. s.)

7. G. POLYANTHA , caule herbaceo erecto velatiao 4->ulcata obtusè 4-gono, fohis opposiis petiolahs coidatis late ovatis subacuminatis dentdtis supià sparse puberis snbtus hirtello-velutinis canescenibus , sum in is sessilibus ovatis, cy -mismultiflois in paniculani apbyllam dispositis, pedicellis elongatis, <cal lobis lanceolaJis capsahsque acumiD.itii» pubescentibus. '2 in Santà-Cathaunà Bia-Aliae legit cl. Gaudn hand Petioh 2-poll Folia 6-7 poll longa, 4-5 lata Corol-las non vidi Gland, oblongae 2 peisistentes ad basin ovaiu Caps longe s»ty-liferae, vahis concavis Intòs ad uiargiaem msigniter pilis patentibus ornatis. (v s à cl. inv.)
8. G. SELLOWII (Mart nov. gen. 3 p 36), caule piloso-biito ramoso, fohis op-positis breviter petiolatis cordato-ovatis acutis serratis suprà hirtulis subtùs tomentoso-cams, cyrais multjfloris lalealibus in tbyrsum longum dispositis, cal. lobislineau-lahceolatis, cor. cltvato-cyhndncis tubo subsequah Tf, in Bia-sihae prov Rio-Giande do Sul ad inont Butncaray legit cl Sellow' Tuber magnum placentaeforme sublobatum. Cor purpuiea fere policein longa, exlus pilosa, basi bigibbosa , gland, perigynae 4. (v. s comm. à mns reg. Betol.)
- 9 G CORYMBOSA (Swartz fl. ind. occ p. 1022), canle frutescente erecto tereti subramoso, lamis incano-biisutis, fohis oppositis brevitei petiolatis. ovatis acuminati* scanosis senatis soperne pnnctato-aspens subtub subtouentosis, pedunculi& tucbotomij* in coiybnum teiuinalem dispositis, cal lobis paten-tibus, COL. tubulosa mcurv'a. % in saxosis calcaieA Jamaiae australi^ jnxtà ripasfluviorum. Coi. coccineae, fauce aperta.
10. G. RUPICOLA (Mart nov. gen. 3. p. 30 t. 213), tota pubescenti-villosa, caule erecto superne aphylo, foliis oppositis breviter petiolatis lato-ovdtis obovatise snbtus puipuiascentibus, cymà teiminali, pedicellis longitudine corollas, cal. lobis angastis acummatis, cor limbo eiectiusculo subseqaali. % in rupibus piov. Mmaium Brasilia locis altis apricis Cauhs spitbamceus. Flores 5-20 Biactae lancolatae acammatae. Coi. pollicans coccineo-punicea. Glandulae 5.
- [i. pulcherruna* (St. Hil voy. 2. v. 1. p. 378), caule bispitbameo, pedicellis longionbus numerouonbus, jugo folioium infra' umbellaiu sito. If, in Biasiliâ.
11. G. ELONGATA. (H B. et Kuntb nov. gen. am. 2 p 396. t. 192), caule eiecto-fraticoso, ram is tetragonis lanato-hirsutissimis, fohis oppositis petiolatis ovali-oblongis accunnatis crenatis suprà strigoso-scabris subtus fu6<esceutJ-la-natis, pedancuhs axillaribus folio longioribns pedicellos 4 uniUoios cor Ion-gitud geretitibus , cal lobis angustis, cor tubulosa? subventriLOs extus b n-sutnlae lobis subaeqaalibus. \$? in Amer mend, legno Quitensi? G. velutina Willd beib ex Ch. et Scbl. Calyx lanato-tomentosus Cor. coccinea i2-i5 lin. longa. Petioh 8 lin. longi.
- 12 G DKPPEANA (Cham, et Schlect. in linnaea i830. p. xio), molhiei et pa-tent tim touientoso-villosa , caule erecto tereti, folus oppositis ovah-oblongis acaminatis dentatis subtus subalbido-tomentosis, pedunculis folio brevioiibns pedicellos 4 subumbellatos corolla longiores gerentibas, cal. lobis, angustis, cor. clavatae extus hir&nto-subtomento&x lobis sabaequalibus. £ in sylvis Jalapen&ibus Mexici G. tomentosa Moc. fl mex. mss non Linn G qnaterni-floia fl mex. ic. ined. Gessn. elongata vai Grah.descr.pl rar 1839. jan p. 3. el in bot mag. t. fyIS* Caules rubentes Coi. coccineae vix polhcem longae. Folia 4 poll, longa, 18-20 hn lata, petiolo pollicari. AffinisG. elongatae. (v. v. c)
- 13 G. LASIANTHA. (Ziicc. pi. nov. fasc. i. p 300. n. 6), caule buffrotescente ramoso pihs adpiessis rigidis canetcente, foliis oppo&itis petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis serrulatis molhiei sericeo-hirtis , pedunculis axillaibus folio brevioribns pedicellos 4 unifloros umbellatos gerentibus, corollae tubo extus holosericeo basi aequah 5-gibbo&o, stamibus barbdts. 3 ^{ID} Mexico.

- Cor coccinea pills coloratis, xo lin longa Discos peilgynus glaodulis 5 minun's auctas Affinis dicitar G. Deppeanae
14. G TUBEROSA (Mart nov gen. etsp 3 p 29 t 212), cade è tubere globoso ranlticipiti rbi7omotoideo boiizontali sigillato, foliis oppositis bieviter pelio latis lato-ovatis dentatis moHissime pobescentibos subtus uervo venisque hir-tulis, peditulis basilaiibus i-floris plunmis, cal lobis lanceolalis, cor. tubnlosae hmbo erectiusculo snbsequali % in fissuns rupium quartzoso-schistosarium prope "Villnicca prov. Minaruin Biasiliaj Hook, bot mag t. 3664. (x rupestns Grah. in Edinb phil. jouin 1837. dec Coi pulchre coccinea basi 5-globosa, extus tenuissime pilosa. Glandulae 2 posticæ
- x5. G AGGREGATA (Kerbot. reg t 329 Hook. bot. mag. t. 2725), pubescenti-villosa, caule erecto rainoso tereti, folus oppositis petiolatis oblongo-ovatis crenatis utnnque acutiusciilis, pedicellis axillaribus 2-8 veriicillatis i-flois corollâ panlo bievionbus, cal. lobis ovatis acuminatis, cor clavato-cyhndiaeae basi bigibbosae lobis sphaeqnahbus. *If in ambrosis &ylvaticis Brasilia) ciicâ Sebastianopolim et alibi Mart, uov gen 3 p. 35 G. pendulina bot. reg t. 103a Corolla* coccinea, polycera longae, extus pubescentes Gland peiigynct 4-5, posticæ 2 sa^epe concretae. Vaiiat ex Mait folus terno-verticillatis.
- 16 G RUTILA (Lindl. bot reg t 1158) villosa , taule erecto leieti. foliis opposite breviter petiolatis oblongis ntrinque acutiuscuhs grosse crenatis, pedicel Us axillaribus folio, imo coiollâ, brevioribas erectis sohtariis, calycis subinflati 5-lidi lobis subtuangul.ribns, cor. tubnlosae rectae ex tub pubescentis Idbio snpt-riore prod**ctiore. If in ambrosis sylvaticis Brasilia? prope Sebastianopolim et in tiactu dos Orgaos Mart nov. gen 3 p. 34 Lodd. bot. cab. t 1801 Heiba 2-3-pedalib. Cor coccinea feie 2 poll longa Glandulae pengynae a ad basin sopei. ovani
- ly. G. LINDLEYI ^Hook. bot. mag. t. 3^02), pubescenti-biisuta subscabia, caule elat teieti, folus oppoititis petiolatis ovato-oblongis rugosis crenatis, racemo elongato apbyllo, pedicellis cue. 4 veiticillatis corollâ tiiplo quadiu-plove brevionbus, cor. cylindracea extus pnbera, labio sapei pauld piodec-tiore If. in Biasiha circa Rio de Janeiro G rutila vai atiosangumea Lindl. bot reg t 1279 G atroaanguinea aun flor 18^6 p 2^5 cum ic Herba 4-5-pedalis Tubei globoso-depressum. Petioli 2-3 pollic. Coi coccineo-san-gaiuae, 1 f poll longae, basi valde tumidae Glandulae peiigynae 5.
18. G BULBOSA (Kerbot. leg t 343), pubescenti villosa, caule erecto tereti, foliis oppositis brevitei petiolatis ovato-elbpticis basi coi datis seirato-crenatis, cymis multiflois ex axillis fol. supiem in tbyrsum terminalera amplura dispositis corollâ vix bre*voribus* ral lobis latis brevibus, coi. cylmdiacae baw 5-gibbosae labio sup. longe piuctioie ^ in saxosis unibrosis Biasili-e ad •Vilia-nccam et serram dos Oigaos. Mait. nov gen. 3 p 35 Scbwseg in schrift. nat ges. Leipz v 1. 1822. p. 206. t 6 Lodd. bot. cab t 1724 Tubei lotandum. Heiba bipedalis Cor coccinea pubescens sesquipollic.
- 19 G MACRORHIZA (Dumoit bull. ac. Brux i836 p 36i), caule herbaceo erecto adpresso piloso, folus oppositis petiolati* ovato-cortlatis denticulatis subtus candicantibas, suminis coidato-orbiculatis, pedicellis in paniculam fœciindam dispositis corollâ dimidio brevionbus adpiesse pilosis, cal lobis lineaibus, cor. tubulosis subventricosis extus velutinis If in Biasiha; prov Rio-Janeiro Inber maximum Coi. scarlatina; polycera longae. Glandule 1 pengynae post anthe&in elongatae Affinis dicitur G bulbosae
- 20 G. SUTTOiri (Booth in lit!. Liidl bot reg. t. 1637), canle heibaceo erecto ramoso tereti. folus oppositis petiolatis cordatis crenatis tomentosis , sum mis ovatis bubsessihbus, pedicellis axiUaubns solitanis l-flons folio suoloii"ioribus flore subbrevionbus, cal. lobis angnslis, cor. cyhndiacese pubescenfis labio super, oblongo undulato elongate, mfei p.irvo revoluto % in Biasiliac sinn Boniviaga prope Rio de J. neno legit cl Snlton.Coi pukbie coccineae sesqm-polyc. Affinis G bulbosae ct iiitlsc. Glandulae a alb-E
- ai. G. LAIERITIA (Lmdl bot. reg t. igSo), heibacea biisuta, foliis oppositis

breviter petiolalis subrotundo-ovatis cord at is rugosis crenalis, pedicel I is iufetrioibus axillaribus i-floris flore longioribus , super. biOdis bifloris subumbellatis, calycis lobis brevibns aculis, cor. cylindraceo-clavatse exlùs tomentosae labio super, oblongo concavo bilobo, infer, trancato. % in Biasilia. G. Selloi hortul. angl. nee Mart. Bracteae sessiles amplexicaules planse. Cor. sesqui pollicem longu? pnlichrè coccine in icon, fortè pallidiores ex nomine. Folia infer. 5 poll, longa, 4 poll. lata.

32. G. FJWCIALIS (Lindl. bot. reg. t. 1785) , caule herbaceo tereti, foliis oppositis subsessilibus cordatis ovatis acutis crenalis tomentosis rugosis, racemo terminali, bracteis ovatis acutis reilexis, pedicellis solitariis bracteâ longioribus corollâ brevioribus, cat. lobis angustis, cor. tubulosis apice latè ventricosis, labio sup. oblongo bilobo basi angustato, infer, ininimo revoluto. If, in Brasilia. G. fascialis Hook. bot. mag. t. 3659. Cor. coccineae, 2-2 | poll, longae, extùs puberuke, fauce 6-7 lin. diani. truncalâ.
- a3. G. COOPERI (bort. Woburn. 1839), caule herbaceo tereti velutino-hirsuto , foliis oppositis petiolatis ovatis crenatis acutiusculis basi latè cordatis supra sparse hirsulis sabtùs et in petiolo toinentoso-hirsutis subcanis, bracteis sessilibus reilexis ovato-cordatis acutis denticulatis, pedicellis axillaribus flore paulò brevioribus bracteâ quintuplè longioribus, cor. tubulosis apice ventricosis, labio sup. obovato, inf. miuimo revoluto. *2^. Patr. mibi igu. Cor. oocaccineaj, a poll, louga? extùs tenuiter velutiao-puberap. Stylus birsutns stmnuaque glabra rxserta. Anth. in discum cobnerentes. Affinis G. fanciali, sed folia petiolata. (v. s. lect. à filio in bort. Wobuin. Bedfordiano.)
- 24' G. HOUTTEI (Duuiort. bull. ac. Brux. 1836. p. 36a), caule cresto p.'tentim piloso, foliis oppositis petiolatis cordatis velutinis rugosis den tat is, sum missessilibus stiboriculatis, pedicellis in paniculam dispositis corolla: sequilibus piloso-glandulosis, oal. lobis lanceolatis , cor. tubulosis fatce coarctatis. — iu, Brasilise prov. Minarnm propè Sabaca. Affinis dicitur G- fauciali.
- a5. G. HOWDENSIS (H. B. et Kunib nov. gen. arh. a. p. 3p.5. t. igo), canle herbaceo erecto teretinsculo sericeo- lanato, foliis oppositis brevirer petiolatis ovali-obtongis acuminatis basi acutis crenulatis snprâ scaberrirois suhlùs albedo-lanatis, pedicellis axillaribus 2-3^{is} utiifloris flore duplo longioribus, cal. lobis lanceolatis, cor. tubuloso-veuticosis hirsntis faace coarotutis lobis teqnalibus. If. in scopulosis Nova*-Granatse propè Honda. Cor. flavo-viresceus, lobis purpureo-rnacalatis, 9-10 lin. louga. -
- /2. Fruticosce.
26. G. "VAUTHIERI, caule fruticuloso erecto tereti in femè glabro snpernè hirsutissimo, foliis oppositis subsessilibus ovatis subcordatis crenatis supernè hirsutis subtùs • rouientosis, pedicellis ad apicem ranii congesto-subumbellatis ad axillas bractearum gerainatis flore brevioribns, cal, lobis angustis, corolla; cylindracex extùs hirsuto-velntinae labio ssp. oblongo bifido, iuf. subtranscpto. J in Brasilia; monte Corcovado prov. Rio de Janeiro legit cl."Vauthier (pi. exs. n. 176). Cor. coccinea?, pollicein lougae, basi 5-9-gibbosaB. Antberoa exsertae, labio sup. breviores. An forte var. G. lateritiae. (v. s. à cl. inv.)
27. G. UIRSUTA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 2. p. 394. t. i89)>fruticosa ramosa, rain is hirsutissuiis, foliis oppositis peliolatis oblongo-ovatis acuminatis crenato-serralis suprâ toineutoso-pilosis subtùs lanato-tonaentosis , pedicellis axillaribus gerainis i-floris petiolo tripli longioribus, cal. lobis linearisublan- ceolatis, cor. cylindrica extùs hirsutae lobis subrotundis patulis requalibus. ^ in temperatis prov. Cuiuanensis propè Caripe. Cor. purpurea sesquipolUc subinenrva. Pedic. 2-pollic.
28. G. ULMIFOLIA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 2. p. 394), erecta ramoaa, ramis subtetragonis pilosis, foliis oppositis peliolatis ovatis acutis leviler oblique rordatis crenatis suprâ builatis et scabris subtùs reticnlatis et hirto-pubescentibus, pedicellis axitlaribus>a-4i& nnilloris, cal. lobis lanceolntis, cor. tubulosoventricosa faucecoarctata. 5 ? iu agroQuitensi inter Chillo et Sangolqui, Cor. coccinea cxtiis pilosa.

30. G. LONGIFLORA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 2. p. 3g6), lanrn pediculis peliohsque lanato-b'usutis, foliis oppositis oblique ovan's acutis cienatis supia tenuitei piloso-hirtis subtus pbescientibns, pedancnlis axillaiibus bip.irtnis, cal lobis lineaiii lanceolalis, coi lubuloso-entiacosis lannlo-pilosis lobis 10-tundatis patentibns subxqualibus f) ? in No\à-Grauatà Affinis G. molli. Cor. pnrpuiasioentes lobis puipureo-maculatis et pedicelli subbipolhcares

30 G MOIIIS (H B. et Knntn nav. gen. am. 2. p 3ij5. t. 191), ram ls pilosis , foliis oppobitis petiolatis oblique ovato-oblongrs acuminatis basi hmc rotundatis subcorddtis serrato-crenatis suprà dense piloso-pubescentibus subtus aigentei* et piloso seiratis, pedunculis axillaribus bievissimis in pedicellos 3 tiniiloros elongates partitis, cal. lobis lineaiii-subulatis, cor. cylindraceà aequalitei et rotunde 5-lobå. ^>?ini Novà-Granatà. Cor. coccinea sesqnipollc. Petioli pedicelhque pilosi

*• *Folds verticillatis.*

31. G. SPICA-TA. (H B. et Kunth nov. gen. am. a. p 3g3. t. 188), caule snffituculoso eiecto piloso-hnsuto , foliis terno-veilicillalis* bieviter petiolatis lanceolato-oblongis acnnunatis <renatis suprà densissime stngoso-pilosis subtus lanato- touentosu> , pedicellis bre\issimis coufertis subdenis verticillatis ia spicaui interruptam dispo&itis , cal et coi. extus birsutis. ^ in Novà-Gianata. prope Ybagne in nliginobis Cor. tubulosa coccinea *>ubincuiva. Glandala? 5.

/6. *Schiedeana*, foliis ssepiùs quaterno-veiticillalis suprà scaberiumis pills caulinis biibadpressis fulvescentibus, coi. hirsutissiuuis. — in Mexici uubrosis prope Hacienda de la Laguna. All spec piopr.?

3a. G. ScEPTRUM(Mait nov. gep. 'i. p. 02 t 214), elata molliter villosa, folus subsessihbus teinato-veitiollatis e basi subcoidata oblongis obtuse senatis, pedicellis ebracteatis teiuo-veilicillatis longitudine floiam in tbyisum elongatum dispoiitis, lobib cal. hneaiii-lanceolatis adpiessls, cor. longe tubulosae labio sup. prodacUore, % in campis Brasiliae prov. Sancti-Pauh et Minaium. GlanduJa? 4 5

a. *rubra* (Mart. 1 c. t. 214), folus sublineaiii-oblongis acutis 3-5-polhc, pedicellis laxi&, cor. rubus.

fi. *Jlavaida* (Mart. 1 c), foliis lato ovato-oblongis 4-6-pollic, pedicellis laxis, coi palhde flavis.

y. *ignea* (Mart. 1. c), foliis minonbas 1 ^-2 pollic. obtasis subtùs densius canescenti pbescientibus, pedicellis brevionibus, coi. palhde igneis ad limbi margines rubentibus. Hook bot. mag t. 55>j6

33. G STRICTA (Hook, et Ain. jouru bot r p 280), caule elato hispido, foliis terno-verticillalis scssilibus basi subcordatis oblongis crenatis suprà hispidis MI bns tornentosis, pedicellis i-ilons teino-veiticillatisin raceraum valde elongatnra remotè dispositis, cal. lobis lanceolatis, corollà tubuloså basi valde gibba extùs villow, labio super productioie, gentaltbus exsertis.C^in Brasiliae paludosis ad Mugidas Cruzes prov. Sancti-Pauli Nov ilor. Affinis G. Sceptro sed .ib hacetab omnibus affimbis diffeit genitalibus exseitii>. Ovanum dtn&e villosmn ima basi subadnatum. (v. s comm à cl Lund.;

34. G OXYPHYLLIA, caule erecto viloso subhirsuto, foliis terno-verticilUts bpe-vissime petiolatis lauceolatis acumiuatis integemnm intenodio brevioibus suprà dense piloso-scabus, bntus parcè scabriuscui^, nevis* lateralibus biju% pedirellis ex axillis supmnis oitis 3 verticillatis i-flois folio bievioibus, cal. lobis lanceolato hneunbus, coiollà ventiicosil biisutå calyce paium lougioie, labio sup. subabbreviato.*2f in Amer. mend, (foite in Brasilia) legit cl. Pöcppig srd scbed. omisstå oiigo propna mihi latet. Affinis vid. G. sylvatia? sed folia duplo longiora. (v. s)

^5. G ELATIOR (H. B. et Kunth nov. gen. am. a. p. 393), caule erecto heib<<teo hispido-pilo*o, foliis terno-veiicillatis subsesibilis lanceolatis utrinque oblusis cienatis snpià piloso-scabris subtùs densè piloso-hirtij), spica verliciUbiemolib 3-floris constante, cal hispidi lobis o\pto lanceolalis, cor tubulosis suptinc

- inflate villoso-pilosis. % in urabiosis tempeiatis Novae-Andalusiae dd mont Tamiliquin Cor. rnbrae, pilis articulatis. Ovar. pilosum glandulis 5 cinctum.
36. G. SYLVAIICA. (H B et Kunth nov gen am 2 p. içji), caule herbaceo stngoso piloso, foli is temo seu quateino-veiticillatis subsessilibus lanceolato-oblongis acuminalis lutefernmis utnnque (supia ptzesertim) stugoso-pilosis, pedicellis ad axillas a 4 \eitillalis, cal. lobis lanceolatis, cot venticosae extus pilosae lobis ovalis le flex is. If, in calidis prov. Biacainorensis inter uibem Juen et fluv. Amazonum.
37. G. DOUGLASN (Lindl rep. 1827. p. 19 bot reg. t. 1110), caule glabrinsculo ereclo , foliis quaterno-vertirillatis peliolatis ovatis seiratis molhiei pubescen-tibus, sum mis sessibus, pedicelhs pluriraes l-floris exaxillissupei. veiticillatis, flonbus nutantibus, calyx lobis lauceolatis, coiollis longe tubulosis subaequallitei 5 filiis lobis extus tubeiculalis. If. in Brasilia; sylvis circà Rio de Janeno et in tractu Sena do Mar. G. veiticillaia Hook bot xnag t. 2776 non Cav. G. Bouglashi Lodd bot. <ub t. 1939. Mait. nov gen. 3. p. 34 G. niacnlata Mart, nov gen. t. ai5, hue à cl. auct telata etiamsi folia opposita.—Pedicelli rnbenteb cor. longiores. Cor. 1 ½-2 poll, longae, lubro et flavde mixtae. Gland 2 latae ad basin ovaui (v. s.)
- /S. verticillata (Hook. bot. mag t. 36ia), peduncolis nuiueiosissimis in vei-ticulos pluumob dispositilis If,
38. G. CANESCENS (Mart. nov. gen. 3. p 36), villoso-incana, caule erecto, (oliis oppositis seu qaateino verlicillatis lato-ovatis utrinqne brevitei acutiusculis Mibdentatis, cymâ teiminali paucifloA, cal. lobis angusto-trangularibus, corollae clavato-cylindncae limbo biew subaequali. Of. in urabrosis rupesiibus Brasilia; in piov. Sancli-Pauh et in Sena do Mai Caulis *ubpedalis puipuias-cens. C01. puniceo-coccineae, bievibime pubescentes, polhcaies. Glaudula: 2 posticas hneari-oblongae.

Sect. 11. PRASANTHEA. — Paliavana Kand. fl Lus. et Br. spec. p. 122.
t. 7./. 17?

Cal lobi ovati longe acuminati per aestivationem stricte valvati. C01. viescens fance late hiante. Capsula abrupteet longe lostrata.

39. G. PRASINAIA (Kei bot. leg t. 428), tola pubescenti-viljosa, caule fruticoso carnoso erecto teiti, folus opposilis ovali-lanteolati** ovatisve seiratis breviter petiolatis sub 1 us velutinis, pedicellis axillaribus 2-4 coi. brevionibus, cal. lobis basi o\atis longe acuininatis, cor tubo brevi basi inflato, limbo ample campa-nulalo lobis subacquahbas. J in cam pis Brasilia? ad "Villain Riccara et alibi prov. Minaium. Mait nov. gen. i. p 37. An Oiobancbe raceraosa 11.flu ID. 6 t 72? Petioli annnlo subarticulatim inserti. Cor. vuescentes extus mgio punc?atx Ovanum rostrato-pyranudatnni. Glandulae 5. Vaiiat foliis terno-veiticillatis. (v. s. comra a cl. Lund)

•J Species non satis notce.

40. G.? MACRANTHA (Spreng syst. 3 p. 889), fruticosa glabia, foliis oblongis utnnque attenuatis obsolete denticulatis ciliatis, pedunculis axillanbus i-floris, corollâ amplissiniâ ejinpanulatâ. Jy in Biasiliâ legit Sello Ca?t, ign. f
41. G.? MACULATA (Moc et Sesse fl mex. ic et mss. non Mart), caule herbaceo villoso tereti, foliis opposilis petiolatis ovali-oblongis acuminatis villoso marginedentato iesoluto, pedicellis axillaribus solitaiis folio, imò floie, brevioribus, cal lobis ovali-oblongis patulis, cor. tubo extus villoso basi egibhoso, liinbo oobxqualiter 5-lobo %? m Mexici montibus lixtiae. Coi. vix pollicem longae rubicuudas intus albo-maculatae. AffinisGloxinia; antirbin<B. (v ic pict)
42. G.? UNIFIORI. (Moc. et Sesse fl mex. mss ined), caule beibaceo ererto simplici, folns quatemo-verticillatis bre\itei petioUts ovalibus acutis sen.itis villosis, pedicello solitano unifluo fulus paulo longioie, cal. lobis patenibus lanceolato-liueanbus, coi mbo basi 5 gibbo limbo patente lobis 5 subiotundis subaq b u s . If.¹ in Mexiti raonnbus Chilparsingi Antiibmuni uufloinm

Moc., et Sess. ic. ined. fl. mex. Herba sernipedalis. Canlis robicundns. Cor. pnr-pureo-violacea 9-10 lin. longa. Stigma bilobam. (v. ic. pict. et s. in b. Moric.)

J-J- *Species dubicc.*

N. B. Ad Gesnetiam accedere videntar:

Orobanche pelraea Arrab. fl. flam. 6. t. 60.

O. pednnculata ibid. t. 7 '5.

Sed descriptionibus deficieulibas eas consultò omi&i.

-J-J- *Species exclusc.*

G. ACAULIS fl. mex. = Achimenes tenella.

G. ACAULIS Linn. = Conradia Sloanei.

G. BARBATA Nees et Mart. = Tapeinotes barbata.

G. CALYCINA Sw. = Conradia calyciaa.

G. CORYMBOSA Bert. z=z Conradia exserta.

G. CRANIOBLARIA Sw. = Conradia craniolaria.

G. CRENUALATA Alph. DC. = Rytidophyllum crenulatum.

G. CUNEIFOLTA fl. mex. = Conradia cuneifolia.

G. EXOGONIA fl. mex. = Conradia pedunclosa.

G. EXSERTA Sw. r= Conradia exserta.

G. FIMBRIATA Lam. = Couradria craniolaria.

G. BUMILIS Linn. z= Conradia hamilis.

G. LONGIFLORA fl. mex. = Achiraenes longiflora.

G. PULCUILLA Sw. = Achimenes coccinea.

G. PUMILA Sw. = Conradia pumila.

G. SCABRA Sw. = Conradia scabra.

G. SCABRA 'var. Spreng. = Rytidophyllum Berteroanum.

G. TENELLA fl. mex. = Achimenes tenella.

G. TOMENTOSA Bert. = Rytidophyllum petiolare.

G. TOMENTOSUM Jacq. = Rytidophyllum crenalatum.

G. TOMENTOSUM Linn. = Rytidophyllum tomentosum.

G. VENTRICOSA Sw. = Conradia ventricosa.

IV. GLOXINIA *Lher. stirp. nov. i.p. 149. Mart. nov. gen. 3./>.62. excl. Vand.*
syn. —Gloxinia et Sinningia Nees. Lindl.

Galycis tubus imo ovario adnatus, limb us 5-fidus aut 5-partitus. Cor. infundibuliformi-aut campanulato-subringens, hinc posticè ad basin gibba, aut subcalcarala, tubo ventricoso, limbo patulo subbibrati, lobis 5 rotundatis. Stam. 4 diclynama cum quinti rudimento. Anelli cohaerentes. Glandulae 5 perigynae. Stylus in stigma orbiculatum concavum subinfundibuliforme abeuns. Capsula i-locul. bivalvis, placentis 1 parietalibus bilobis, seminibus numerosis oblongis. —Herbae aut suffrutices. Species Australi-americanae, pleraque Brasilienses. Folia opposita, inlerdiim radicalia, petiolata, crenata. Flores ampli, axillares aut radicales, pedicellati, saepiis nutantes.

Sect. 1. EDGLOXINIA. —Gloxinia Lindl. nat. syst. cd. 2. ». 287. —
Gloxinia? legitimae Marl. I. c.

Calyx 5-partitU5. Cor. violacec aut csralescentes. Herbx caulescenle* aul feubacanles.

1. **G. MACULATA** (Lber.! stnp. nov. p 149)» caule erecto simplici, foliis oppositis petiolatis cordatis inaequalitei dentatis supia spaise pilosiusculis sub t us glabu's discolor! bus, pedicelhs axillanbas horizon tali bus i-flons folio bievinbas, col. limbo 5-partito lobis ovali-oblongis patentibus, coi. tubo hmc basi gibbo/ % in Carthagena Amer. merid Hook bot. mag. n. 1937 in adn. Reichenb mag. t. 3 Martynia peiennis Linn. sp. 862. Glox. obs. p. i3. Gloxinia tricholoma Mcench snpl 194 — Eh ret pict. t. 9. f. 2. Linn, hort Cliff. 3ai. t 18. Cor. caeruleae Radix Dentanae momhforuiis. (v s)
2. **G. GRACILIS** (Mart. nov. gen 3 p. 64. t 226), canle elongato erecto piloso, foliis oblongis utrinque attenuatis acutis senatis pilosuhs, pedicellis axillanbas soiitanis gemimsve brevissiruis i-flons, calycis teretis lob is longe acuminatis, corolla pubescente obtuse basi gibbosâ If in Brasilia prov. Sebastianopobtanâ in liumo pingni super saxa. Cor caerulea aut pallide violacea.
3. **G. ANTJRHINA**, caule heibareo erecto tereti viloso siinplici. foliis opposite petiolatis ovatis acutis senatis villoso , pedicellis axillaibus i-flois folio bievoribus, cal lobis oblongo-liueanbus, corolla? tubo cylindraceo viloso hinc basi in calcar obtusum piuento, hmbi lobis pa tubs rotndatis % ? in Mexici umbiosis raontanis Aiabuaitam in Guatimalae ditione. Aatirbinum macalatum Moc et Sesse fl mex. IC. ined. Radix fibrosa, forte repens. Cor. pollicem longae, coccinese intus maculatae. Stigma infundibnhforme mdivisuni. (v. ic. pict. et v. s. in h, Moiic.)
4. **G. CAULESCENS** (Lindl bot reg. t. 1127), caule erecto carnoso elongato, foliis opposins petiolatis ovalibus oblongisve bullatis crenatis utrinque velntino-hiisutis, pedicellis axillaibus folio paul6 longionbas 1-florin, cal. 5-partiti lobis ovatis acutis, cor lobis subaequahbas, inteiniedio rordato ovato ^)in Americâ Peinambucanâ. Lodd bot. cab. t. i566 Caulis pedalis. Petoli 4-7 lin. long!. Calyx et fere corolla G. speciosae. (v. s.)
5. **G. SPECIOSA** (Lodd.' bot. cab t 28), caule abb le via to aut subnnllo, foliis subradicalibns longe petiolatis puberis birsutisve ovalibns oblongisve crenatis, pedicellis petiolo longionbus i-loiis, calycis 5-partiti lobis acuminatis, cor. lenticosâ. If in Brasiliâ. Lindl. bot reg. t. 2i3 Hook bot. mag. 1937. Keicbenb. mag t. 4 Maityma speciosa herb, amat t 2?5. Folia saepius subtus pnrpnrascentia. Coi \10lacca?, sesquipoll. longae, pollicem fere latae, horizontales, hinc obtosissime basi gibbae. (v. v. c.)
 0. *albiflora*, corollis albis. Hook, bot mag. t. 3io6.

Sect. 11. HEMILOBA.

Calyx tubulosas, teres nee angulatas, 5-fldus. Cor. pallide caeiulessensseu alba Heiae subacaules. Folia et pedicelli radicales. — Sect, media intei Eugloxiniam et Sinningiam.

6. **G. MACROPHYLLA** (Nees et Mart act soc. nat. cur. xi. p. 66), subacaulis, foliis ovatis sessilibus pnbresrenti-mollibus crenatis, pedicellis flore brevionbus conferlis subiadicahbus , calye ample 5-fldo extus villoso , lobis acuminatis, cor. oblique 5-loba. If, in BiasiLiâ ad viam Felisberti Flores G. speciosae.
7. **G. HIRSDTA** (Lindl. bot. leg. t 1004^ * snbacanlis pilis sparsis elongatis hispida, fob is peuolatis subradicalibus ovalibus oblongisve crenatis bullatis, pedicellis i-floris ad collum aggregatis folio tnplo brevionbus, calye 5- fido lobis acuminatis, corolla: lobis distantibus letus tubo hinc ad basin mudice gibbo. If m Brasiliâ. Hook bot. mag. t 2690. Coi pallide caernlea, &esqnipoll. longa , extus vix pilosula. (v. s.)

Sect. in. SINNINGU Mart. 1. c. — Sinningia Nees ann. sc. nat. 6 p. 292. Lindl. nat. syst. 2. p. 257.

Calyx tubui lotua aut LUHI angulatun aut imo alntiis, ^>li<lii — Coi. alba nut (ivicutitrn IIfil)iDcauloMiiinn «imlm. 1<olia of>|>otilii peilioliilu « reunta.

8. O. HEIXERI (Mart. 1. c.), caule suffruticoso erecto, foliis glabris ciliatis crenatis, pedicellis calyce brevioribus, calycibus tuibinatis ovaio duplo longioribus. 5 in Brasiliâ. SinniDgia Helleri Nees ann. sc. nat. 6. p. 292. U ia. Lindl. rep. 1827. p. 30. bot. reg. t. 997. *Gloxinia Scbottii* Mikan del. bras. p. 4. ex G. Don gen. syst. 4. p. 649. Cor. a J poll, longae flavidæ. Calyces et folia subttis snbpurplei. (v. v. c.)
9. G. GUTTATA. (Mart. 1. c.) , caule suffruticoso erecto, foliis oblongo-lanceolatis basi attenuatis acuminatis subtus velutiis supra Incidis, pedicellis calyce brevioribus, calycibus cylindrico-campanulatis ovario triplo longioribus. 3 in Brasiliâ. *Sinningia guttata* Lindl. bot. reg. 1.1112. Cor. pa Hid a, intus purpureis maculis guttata, sesquipollitic. (v. s.)
10. G. VILLOSA (Mart. 1. c.), caule simplici carnoso villosa, foliis longè petiolatis oblongo-lanceolatis villoso-snbstrigosis, pedicellis[^] axillaribus i-floris aggregatis brevissimis, calycibus profundè 5-fidis ovarii longitndine, corollâ extus villosâ. — in Brasilia. *Sinningia villosa* Lindl. bot. reg. t. n34. Cor. pallidè flavescens, inimaculata, circ. a poll, longa.
11. G. VELUTINA (Mart. 1. c.), caule erecto, foliis petiolatis ovatis subcordatis velutinis, pedicellis i-floris calyce brevioribus, calycibus cylindricis angulato-alatis ovario triplo longioribus. % in Brasiliâ. *Sinningia velutiua* Lindl. bot. reg. n. mainnot. Cor. vix pubescens pallida immaculata. (v. s. ex bort. soc. bortic. Lond.)

•j- *Species non satis notce.*

- ia. G.? ARBOREA (Collabot. ripul. p. 61), caule frnticoso adscendente ramoso tereti, foiiis oppositis brevissimè petiolatis ellipticis basi attenuatis serratis tomentosis. <\$. Patr. et fruct. ign. An *Gloxinia*? an *Gesneriaceae*?
- z3.? G. DUBIA (G. Don gen. syst. 4. p. 649). —in Mexico. Nees in linnaea 1. p. 305.

N.'B. Ad *Gloxiniam* pertinere videntur:

- Orobancbe verticillata Arrab. fl. flum. 6. t. 64.
 Orobanche umbellata, ibid. t. 6S.
 Orobancbe tuberosa, ibid. t. 70.
 Orobancbe cernua, ibid. t. '71.
 Orobancbe tabulosa, ibid. t. 76.

Sed descriptionibus deiicientibus eas consnlto omisi.

- V. ACHIMENESP. Brown, jäm. p. 271. excl. sp. ia[^]. Pers. enh. n. 1484. Nees ann. sc. nat. 6.p. ag5. non Vaht. — Cyrilla Lher. st. nov. 1. p. 147. t. 71 n%ón jjinr. — Trevirana JVilld. enum. 638. — Trevirania Mart. nov. gen. 3. p. 56. — Treverania G. Don I. c. — Buchnerae ct Columneae sp. auct.

Calycis tubus ovario adnatus, limbus 5-partitus lobis lanceolalis. Cor. tubuloso-infundibuliformis basi hinc sa3pè gibba, limbo piano 5-fido, lobis subaequalibus subrotundis. Stain. 4 didynama, antheris non cohajrentibus. Rndimentum stain, quinti corolla? basi inferne impositum. INectarium glandulosum annulare tenue. Stylus in stigma vix incrassatum obliquum aut subbilobum abeuns. Capsula semibilocul. bivalvis, placentis parietalibus subsessilibus. — Herbae Americana? erectae villosa?. Folia opposita aut ternio-verticillata petiolata dentata. Pedicelli i-flori axillares. Cor. coccineae aut purpurea? multo quam *Gloxinia*? minores. Radices, saltern specierum ritè cognitarum, bulbillis squamosis onustae.

• A. cnccivHA (Pern. 9. p. 164), fnliifl oppoNitin nul t<rno-^f*rrioillaiñi nvnlii Mtuiuinatis, petlicellitt ciilycc luri^iorihus, caljein lohla JiiioculHru-lJnc<ijbii.«

- ereclis corollâ dnplo brevioribus. % in montosis Jnmaiae australis juxti ripas flnyloroin suprà rupes solo madido. Ach. minor P. Brown, jam. p. 27c. Cyrrilla pulchella Lber.! 1. c. Swartzfl. ind. occ. 3. p. 1082. Gesneria pulchella Sw. prodr. 90. Colutnnea erecta Lam. diet. I. p. 66. herb, a mat. t. 216. Buchnera coccinea Scop, insubr. 2."p. 10. t. 5. Trevirana coccinea Willd. 1. c. Treviranía pulchella Mart. nov. gen. 3. p. 60. t. 226. i.ti. (v. v. et s. c.)
2. A. <RANDIFLORA, pilis pateutibus hispida, foliis oppositis seqnulibus ovatis acutis basi •bliquis sparsè serratis. If in Mexici umbrosis propè Hacienda da la Laguna. Treviranía grandiflora Scbied. in linnaeA. 8. p. 247. Folia suprà viridia subtùs rubeutia formâ ferè ulmi, majora 1 |-i poll, longa. Cor. am pise violaceo-purpurea?. Geuitalia inclnsa.
 3. A. HETEROPHYLLA, parcè pilosula, foliis oppositis ovalis dentatis acutis brevissimè petiolafis, pedicellis calyci aequalibus, calycis hirsulissimi lubia linearibun ereclis coroll) qaadraplo ferè brevioribus, corolla? tubo cylindraceJ glabro bine basi (nt in Gloxiniâ) in calcar obtusum prodncto. If in Brasilia sylvaticis circâ Cujaba detexit cl. Sylva de Manzo. Kl. deceinb. Radix nt in Acb. coccinea cui babitu afiinis. Ovarium imâ basi adnatum hirsatum. An potiùs (loxinia sp.? (v. s. couun. à cl. inv.)
 4. A. ANDRIEUXII, canle adscendenli-erecto simplici apice birsuto, foliib oppositis •2-IJ-jagis petiolaiis ovalis latè creuatis sublùs suhhirsutis, pedicellis ex axillis supremis a-/» nnifloris folio paalò brevioribus ebracteatis calycibusque glabris, capsulâ obconicâ 10-costalâ cal. lobis triangularibus ereclis coronatâ If in Mexici prov. Oaxaca inter Tehuantepec et Hum. Guazacoalcos. Septemb. flor. legit rl. Andrienx pi. cxs. n. atf5.! Herba 2-3 poll, longa. Pedicelii sesquipollic. Cor. ex sicco purpureo-violaceae, tnbo hinc basi gib bo. Stigma subbifid um lobis rotundatis. (v. s. à cl. inv.)
 5. A. ERÜorDES, foliis oppositis 2-3-jugis ovatis longè petiolatis dentatis pobrulo-birtellis, racemo terminal! aphylo, bracteis linearibus alternis, pedicellis i-floris bracteâ paulò longioribus, cal. lobis tubo corollae parum breviore. If in Arner. austr. circâ Caracas legit cl. "Vargas. Cor. ex sicco purpnrea, multò minor quam priornra.* Radix bulbillosa ut A. cocinex. Calyx ovario semi-adnatus. Cor. basi non gibba. Stigma parvum subacutum, nee ut in Gloxinid infundibnliforme. (v. s. cornra. à cl. inv.)
 6. A. COM IF ERA., caule basi radicante adscendent-evtecto conferte et breviter viloso ferè ad apicem usquè nudo, foliis bijugis ad apicem approximatis petiolafis ovatis dentatis pubero-villosis, pedunculis axillaribns subterminalibus conferiè corymboso-plurifloris, cal. lobis oblongo-linearibus bractfisque parcè puberulis corollâ dimidio brevioribus. % in Americâ anstrali fortè in Brasiliâ legit cl. Poeppig. Radices ut in Achimene coccinea bulbilloso-squamose. Cur. ex. sicco purpureae, basi vix gibbae. Stigma ferè ut in Gloxiniâ sabiufundibuliforme orbiculatum? (v. s.)
 7. A. COM IF ERA., caule basi radicante adscendent-evtecto conferte et breviter viloso ferè ad apicem usquè nudo, foliis bijugis ad apicem approximatis petiolafis ovatis dentatis pubero-villosis, pedunculis axillaribns subterminalibus conferiè corymboso-plurifloris, cal. lobis oblongo-linearibus bractfisque parcè puberulis corollâ dimidio brevioribus. % in Americâ anstrali fortè in Brasiliâ legit cl. Poeppig. Radices ut in Achimene coccinea bulbilloso-squamose. Cur. ex. sicco purpureae, basi vix gibbae. Stigma ferè ut in Gloxiniâ sabiufundibuliforme orbiculatum? (v. s.)

"j- Species non satis notct.

8. A. LONGIFLORA, foliis oblongis ntrinqnè acuminatis serratis, pedicellis calyce brevioribus. cal. lobis erectis corolla' triplo qnadruplove brevioribus. % ? in Mexici humidis temperatis. Fl. sept. Gesneria longiflora fl. mex. ic. ined. Cor. purpureo-violacea circ. if)lin. longa. Folia terno-verticillata. (v. icon, pict.)
9. A. TENEELLA, foliis ovatis vix acutis dentatis, pédicellis calyce longioribus, cal. lobis patentibus corollâ duplo circ. brevioribus. 2/3? in Mexici calidioris rupibus fl. sent. Gesneria acutis fl. mex. mex. G. teneella fl. mex. ic. ined. Flores coccinei magnitnd. A. coccinea, scd ab ea differt cal. lobis patentibns nee ereclis et foliis vix ocutis. Folia opposita. (v. ic. pier.)

VI. PICRIA Lour. coch. ed. fV. 2. p. 477- Lindl. nat. syst. p. 287. et 29a.

Cal. 4-scpalus deciduus, scpalis 2-ovatis corollâ longioribus, 2 linearibus brevioribus. Cor. lubulosa riiigens, labio sup. spathulato emarginato, infer, rotundè 3-fido. Stam. 4 didynama,' 2 longiora erecta anlhens unilociliaribus, 2 breviora inflexa antheris 2-locul. Stylus corolla? sequalis , stigmata 2 lanceolata erecla. Bacca ovala infcrâ 2-locul. polysperma. Sem. subrotunda.—Herba erecta multiplex amarissima. Caulis ramosus 4-gonus. Folia opposila ovata serrata ninnr, glabra. t lores pcdunculati congesti axillares et terminales albo-rubri. —Car. ex Lour. Genus vix notum, nunc ad Gesneriaceas , dunc ad Solanaccas, à cl. Lindley rclatum +.

1. P. FEL-TERR*: (Lour. 1. c.), % iQ hoitis CochinchinaB et China culta.

VII. MITRARIA Cav. icon. 6. p. 67. t. 5jg. anal, cienc.nat. 3. p. a3i. Guill diet, class. 10. p. 63^t). Nart.nov.gen. 3. p. 67. non Gmel.

Calyx parti ovarii inferiori adnatus, 5-partitus, lobis pallidis lanceolatis fere pergamaceis. Cor. tubulosa subventricosa, limbo bilabiato lobo super, bifido, infer. 3-fido. Stam. 4. didynama exserta, antheris liberis; quinti postici ruclinientumelougato-filiforme. Stylus subulatus. Stigma crassiisculinn. Glandulae nullae? Bacca i-locul. Semina oblonga. —*Frutex americanus* scaudens, ramis subvillosis teretibus seu ex Cav. obscure letragonis. Folia opposita aliquando terna, ovata acuta, serrata, subtus glauca, superne pilosiuscula. Pedicelli solitarii rarius 2-3 axillares i-flori. Bractea? a inter se basi in mitra? formarn concretaj basin calycis semicingentes. Cor. coccineae pollicem longre. Genus ad Colimnearn et ad Sarmientam ex staminibus liberis exscrtis et ex calyce basi bi bractea to accedens, sed calyce ovario adnato diversum.

1. *M. coccinea* (Lav. H. ex.), in San Carlos de Chjloe fl. mense febr. (v. s. in h. Deless. coll. à cl. Bridges.)

Trib. II. *BESLERIEJE Bartl.* ord. nat. „5. - Gesnerearum
^ 6. *Mart. nov. gen. p. 67.*

Calyx liber nee ovario adnatus. Corolla ide6 ad basin calycis Inserta.

VIII. BESLERIA Mart. gen. nov. 3. p. 43. - *Eriphia P.* Brown, jam. 2-0 — *Kesleriae* sp. *Plum. Linn. Sw.* — Besleria et Tussaoa *Reichenb.* Lindl''

Calyx liber 5-fidus aut 5-partitus, lobis inlegerrimis aut (in specieh paucis. forte excludendis) dentatis. Cor. campanulato-subringens" labio superiore bilobo, infer, trilobo. Stam. 4 didyuama supra bas?n tubi elata, postici quinti rudimentum paleaeforme. Stigma bilobum Annulus hypogynus absque glandulâ. Bacca globosa i-locul. placenta 2 parielalibus bilobis. Semina 00 minutissima*. — Fruticuli in Amrica3 sponte nascentes , erecti aut scandentes, caule subte fohis oppositis petiolatis crassiusculis dentatis intcgerrimis Denniner viis. Pedunculi axillares uni aut pauciflori. Pubes simplex Calvces saepius rubro-colorati. Cor. rubrae aut flava. " "

Calcis lobis integerrimis.

1. D. LUTEA (Linn, ap. 863 uon Spieng.), caule suffrutescente Icèvi, foliis petiolatis ovalibus remotè et calloso-seriatis glabris, pedirellis ad axillas aggiegatis i-flois petiolo brevioribus, oalyce basi ventricoso 5-fido lobis subiitègriiinus electis, coi.tubo supia' basin gibbp. & in fruticetis sylvisque hmnitlis nontosis Jamaica: (Sw.), Martimcae (Jacq.) Guadalupee (Perroltet!), in sylvis Paraensibqs (Mart, an certè eadem ?), Guianae (Aubl.). Jacq. aoier. 187. bwartz.! obs. i3i. Eipbla P. Browne jam. 270. —Plum. ed. Barm. t. 49. f. 1 et 2. Calyx in ipsissimo Swaitz speciin. 5-fidus nee 5-partitus. Cor. lutea. Folia ferè Sohdaginis Viigae aureae (v. s.)
2. B. GUAD\LUPENSIS , caule sc.mdente subradicante snpernè cum petiolis et pediculis brevissimè velutino-puliente , foliis petiolatis ovalibus cienatis dentalis ve subtus secus neivos subvelutinis supemè sparse pilosulis, pedicellis plurimis ex axillâ ad apicem pediculi brevissimi ortis, cal. 5-fidi lobis integrinmis aenminatih, cor tubulosâ calyce duplo el ultia Jongiore. ^ in Guadalupe montanisjun. flor. legerunt el. Feirottet et Lheituimer. Cor. prnpuras-cens 9-10 lin. longa. Capsula globosa calycinis lobis brevior. B. lutes affinis sed facilè distincta. (v. 9. à cl. iuv.)
3. R. FLA-VO-VIRKNS (Nees el Mart. DOV. act. nat. scrut. Bonn. xi. p. 48), canle li^{gg}noso , foliis oblongo-cuneiformibus basi iulegerrimis apire minutè denticulatis acuminatib glabiis, peduuueulo axillari petiolo dequali apice pedicellos pluiimos i-floios umbellatob gerenle, cal sepalis ovatis. ^ in Biasilise nligi-nosis circa viam Fehsbeitiam. B. luteo-virens Mait nov. gen. 3. p. '45. Folia pedalia. Cor. viresrenli-lote<£, infuntlibuhformes feie regulares, lobis oblongL* acutis. Capsula ovata. Affinis B. luteae et bicolori.
4. B.UMDROSA. (Mait. nov. gen. 3 p. 44-1 218), caule suffwticuloso electo subtetragono apice adpresso pubescente, foliis petiolalis oblongis utiinquè acuminatis integreriuuis, junionbns ciliatis neivo Venisque subtus pubescent-stri-gillosis, pedunculis axillaribus subtuflous petiolas superantibus, cal. 5-partiti lobis ovatis acuminatisintegerriinis. ^ iu sylvis umbrosis Brasiliae in tracta Sena dos Orgaos. Cor alba, tubo ba&i hinc gibbo.
9>. *latifolia*, foliis latè ovahbus utrinque breviùs acuminatis. ^ in Serra dos Orgaos legit cl.Tautbier pi. exs. n. 555! Folia, excl. petiolo, 4 poll, longa, 24 l**ta. Calyx refert icon. Maith plantje integra; nee fig seorsim expos. (v. s.)
5. B. ELKGANS (H. B. et Kuntb nov. gen. am. 2. p. 397), caule frutescente, larbis junioribus plloso-birtis , foliis longe petiolatis suboblique elliptico-oblongis acuminatis integreriuuis glabris , neivis subtus pilosiusculis, pedunculis axillaribus subgeminis subtriflois petiolo brevioribus, cal. 5-paitiri lobis subapqualibus integreriuuis subrotundis coiollisque glabiis 3 *n Andibns Quinduensibns Nov. Granatse Cor. coccinea. Affinis diciturB. luteae.
6. B. SOLANOIDES (H. B. et Kunlb nov. gen. am. 2. p. 3g8\ glabra snblignosa electa, foliis petiolatis lanceolato-oblongis acuminatis basi angustatis 1 emote et obsoletè denlicnlaiis, ppdicellis axillaribus subternis i-flois» petiolum sub-cquantibus, cal. 5-partiti lobis ovatis acutis integrerimis glabris. J inter nrbes Popayan et Almaguer in umbrosis ad fluv. Pensitara. Cor. aurantiaca calyce quintuplè longioi. B. eleganti affinis.
7. B.3 BERTERIANA, glabra, caule frnticoso erecto qbtusè tetragono, foliis oppositis aut subaltermis petiolatis ovalibus utrinquè acuminatis remote seirulatis, pedicellis bupia-axillanbus sohtaiis i-floris petiolo longioibus , cal. lobis 5 latè ova~ti» acuminatis baccâ globosâ longioi ibus. Jy in Jamaicâ legit cl. Bertero. Besleua lutea Spieng. syst. 2. p. 841. ei ipso in h. Balb.! Flor. ign.'et ideo genus dubium; species à B. lutea diversissima , ad B. umbrosam pntiùs aCedit, sed pedicell solitani i-flori. (v. s. à cl. inv.)
8. B.? PATRISII, bispida, caule suffrutescere subtetragono erecto, foliis oppositis petiolatis ovalibns utunque acarinatis serrulato-dentatis suprà sparse, subtus

- secus nenos liispidis, pedunculis ax.llaiibns petiolo bievionbns pedicellos, 4 nmfluos elonga.os geientibns, cahece 5-fido lobi, acumintis \rightarrow 1L m Guiana sen Ciennā leg.t cl Pat.*. Cot glabi*, ex sicco purpu.ascentes, 8-9 l,n. longx-. Bacca subsicca ovata stylis bas, ap.ce concavo truncata apiculata . Seruina oo foiteaxi centiali affixa el ided genus dubiuni. (v &.)
- 9 B ? INCARNATA (Aobl gman. i p 635. t. z56), tonientosa eieota c.ulibus tetragomisiaruosis, foliis o\atis cienatis, pedicellis axillanbussolirarlis i-flons petiolo panlò longionbus, calyce 5-fido, coiolla tubo longo subinllato limbo 5-lobo subdcntitulato, stam. exselis. if in Guiana ad ou^inem aiunil Calibicensis. Coiolla subpnrpuiabcens. Barca subglobosa mbia edulis.
10. B.? GRAWDiotoA. (Scbott neu bras, pflanz i. p. 5. n. 5 et m floia i8ai. p. I97)» caule erecto Liisuto, foliis ineinbianaceis late ovatis integernmis supra glabn* infra birsutis, ilonbus axiJltinbu* racemoso-paniculatis snbscundis, cal. lobis ovato lanceolatis mtegeriiraib, cor. tnbulosae lobis infeiionibus levolniis. —in sylvis montium altiomin Senjc-Giaudis lia&ilix. Calyx et cor. flavi glandulos-pilo&i. Stgma lejiler bifidum. Tiuct. ign
11. B.? GRANDinoRA (H. B et Kunlh nov gen am. a. p /|Oi), fiuticosa foliis ovato-oblongis acuminntis cienatis supra densissime pilosis siibtus iamulisque hiusuto-villosis, pedunculis axillanbus elongatis pluifloris , cal lobis integernrjis dense pilosis , coi. campanulatis villosis fanre apeila f} || humidis Novo Gi.matensibus Diyraorua » grandifloia G. Don gen syst 4 p 653 Calyx dense pilosus purpuiascens. Coi. basi subgibbosa extus bnsuto'-vilosa " mteine alba glabia , limbo rubio macnlato. Truct. ign.
- 1^. B >_BVIOLACE4 (Aubl gman a. p.6So. t. a54), fniticosa scandensglabra, foliis ovalis nitidis inlegemmis, r.icemo terminal! latemuli!, J-flois constante calye 5-dentato, \$r in Guiana ^ prope Hum. Smeniaiensem et Galibieñsem super aiboeis scariBens. I lores et fmctus violatei Bacca edulis forte bilocnla-lls ex Aubl. Folia subtus neiis purpureis.
- i3. B >_{Affinis}^c RD iFA (Aubl. guian. j. p 63i), fiutirosa scandens, foliis ovatis floibah spicatis. fy r> m Guiana Gall.ca piopo Oyao. Affinis B violate* dic.tui, sed iloies ca.iulei An mtia xaietas? CLt igu
- ** *Cal cis lobis dentatis aut serratis.*
- ,4. B » CRAsairoHA (Scbott neu b,as pfl 1. p. ? „ ? -m flor 18 af P¹⁹ oaule f.u.iculoso subscandente .adicante, foli.s petiolatis oblongo-laheolat. s ,n.egeriimi_{SC,ass,ssup.a} glabiis infra pilosulis, flor.bus axillanbus solnar; longe pedunculatis nutannbus, cal. 5-pu.uu lob,, lanceolatis seira, cor Tetricos* limbo revoluto. ^ Brasilia, piov. Mina,-Geiaeia in ,ylvu piopc Agoalimpa. Fpigea et epidendia. Cal^x mbens Coiolla coloi ct ffiict ,gn. ^
15. B. PDICHELLA (Donn Leant Mo ex Suns bot. m a g t 114O), caule saffmticoso-sncculento, folns oblongo-ovati-, ciénatis in peioliom'attenuati& ciliflatis, junioribus subhiitelhs, pednnculis axillanbns pedicellos 3-4 umbellato" . geionlibus, calye pentagonis 5-iidis coloi atis lobis scuulatis. ^ in ins Ti s nitaiis (buns) et ni fallo in ins (nb) piopc Ha^analn (La Oss F^t) Lodd* b "" cab t 1028. B. umbellata heib Banks. Be«dena scu Tussaca pnkli(la R^t, hoit. bot t. 4., ForteiniitocilyceelbabituFpisfijcs.p.ex Mait nov cen > p 4> Episcia ? pukbella G Don gen syst 4. p. 6*J6 Calyx coccineus Ctr. tlava, junior extus parce pilosa , lobis intus lubio-stnatis. (v s.)
16. B^BICOLOR (H. B et Kunlh nov. gen. am. a p 3g), crecta subliposa, ramis tetragonis, foliis ovato-oblongis acuniinahs deunVnlati, snppi- pilosis, iobtus piloaopubescentibus, pedicellis axilla,,bus ciebui l*fl*isto- lobis cal. ovatis acumintis denticulati; pilosi* t i_u n_{ml},,n_kL A r - 7oris , doea_{im} et No,o-G.an.en, Co, fla^ J^Z^XJZZ calyce quadriplio Jongioi, superne ventneosa tomпиessa Capsula ovata bivalvis unde gequb Jubiuin.

K B » CAICAIHAIA (II B. et Knntn nov. gen am. 2. p ^ reoffIBICOSA , r.

mulis villoso-hispida is, foliis oblongis subacuminatis apice crenalo-serratis pilosis, pedunculis axillaribus petiolo triplo longioribus 2-4-floris, lobis cal. denticulatis ovato-oblongis acuminatis hirtellis, cor. glabris ad basin superne calcaratis. <\$ in temperatis Andium Qainduensiam. Cor. aarantiaca, tubuloso-calcciformis, fauce constricta, lobis rotundatis. Fruct. ign.

*j- *Species <uix no tee.*

- B. MOLLISSIMA Spreng. ex Steud. ncm. phan. i. p. 107. in syst. Spreng. omissa.
 B.? BIVALVIS (Linn. f. soppl. 280), herbacea repens pilosa, foliis oppositis pectiolatis, 4)edicellis ex axilla binis i-floris folio brevioribus, calyce bivalvi lacero, baccà ovali, nucleo biloculari.— JQ Surinamo. Senkebeigia Neck, clem. n. 560. nou flor. West. Ex inflorescentia accedere videtur ad Episciani hispidam, sed ex calyce bivalvi et baccâ nucleo feta diversissima videtur! A genere, fortè ab ordine excludenda. f.

N. U. Ad Besleria forte' accedunt :*

Orobanche carnosa Arrab. fl. flum. 6. t. 6r.

Orobanche fluminensis, ibid. t. 62.

Orobanche Brasiliensis, ibid. t. 63.

Orobanche ventricosa, ibid. t. 7.^

Sed descriptionibus deflcientibus consultò eas omissi. Besleriae ejusdeni operis sunt fortè Bignoniae species non satis nota?.

-j-J- *Species exclusae.*

- B. DicoLOR Schult. = Alloplectas dichroa.
 B. BIFLORA Forst. = Cyrtandra biflora.
 1). cocciifEA Anbl. = Alloplectus coccineus.
 B. CRISTATA Linn. = Alloplectus cristatus.
 T. CRISTATA fl. raex. = Alloplectos glaber.
 B. CTMOSA Forst. = Cyrtandra cymosa.
 B. HIRTELLA Schott = Alloplectus circinnatus.
 B. HISPIDA H. et B. = Alloplectas hispidus.
 B. SAHGUINEA Pers. = Alloplectus sanguinens.
 B. SERRULATA Jacq. = Dryinonia serrulata.
 B. SPECTADILIS H. et B. = Dryinonia spectabilis.

IX. HYPOCTRATA Mart. nov. gen. 3. p. 48.

Calyx liber profundè 5-partitus, lobis lanceolatis integerrimis. Colla tubulosa basi posticè gibba, tubo anticè ventricoso, limbo 5-lobo aut 5-deutato subaequali. Stam. 4 didynama cuin. quinti postici rudimento ex imâ basi tubi. Antherib per paria cohaerentes. Annulus by-pogynus et glandula postica. Stigma bilobum aut (ex icon.) infundibuliforme indivisum. Bacca globosa succosa 1-locul. placentis 1 parieta-libus bilobis. Semina 00 oblonga aut ovata.— Fruticuli Brasilienses extensi et radicantes, rariis erecti. Folia opposita crassiuscula. Flores ^xillares solitarii aut ascrecati. Cor. coccineai roseac alba3 aut ochro-leuae.

Sect. 1. CODONANTHE Mart. I. c.

Coroll-c Mibns subcanipanulatus inque latre anteiore parium ventricosior, limbo latiusculo.

1. H. GRACILXS (Mart. 1. c. p. 50. t 220), glahia, ram is inordinatis adscendentibus passim radicantibus laxis uitidis, foliis breviter petiolatis ovalis acuhs maigme passim subundolato-denticulatis, pedicellis axillaibus 1-^2, coiollis subcainpanulato-tubolosis , lobis lotundatis patentibus. j inter saxa et in paludosis per magnaui plagam Brasilia;. Cor. semi-uncial is, exths alba, rntus flavicans.
- a. H. AGGREGATA (Mart. 1. c. p. 5t. t. 221), caule erecto subsimplici birsuro, foliis oblongis utrinque acuiniiatis Integeinmis, junioubus pilosis, petiolis ner\isque subtus Lirsutis, pedicellis axillaiibū[^] aggregatis, coiollis uiceolalis, lobis rohunclatis patentibus. J in sylvis aboriginibus Biasihse prov Kio-Negio Calyces miniati birsuti. Cor. coccinea subtilissiraè pabescens
3. H. CILIOSA (Mart I.e. p 53), birtnla, caule decumbente radicante, folns lato-lanccolatis utiunque acuminaus subseuat, floribus axdlaiibus aggipgatis, cal. lobis subalatis, cor. subcampanulato-tubulo&is, lobis lotundatis pafenti- bus infiruo cilns intioflexis If, in sylvis ad Manacura ditioms Japuren&is Bra- silia. Cor. pollicans et ultrà ochioleuca.

SECT. II. ONCOGASTRA Mart. I. c

- C01. tubus deorsum valde gibboso-ventricosus, limbo breviter dentalo erecto.
4. H. HIRSUIA. (Mart 1. c p. 5a. t 222), caule electiusculo vel adscendentii superne villoso-hnsu-to[^]folus bieviter petiolatis obovatis obtusiusculis birsntii , flonbus axillaibus solitams, coiollis antice gro&se ventiicosis, limbo electo contiacto 5-dentato J in umbiobis petrosis ad margines sylvaum piov. Minarum Biasilix. G. Don gen. syst 4. p. 6J2. f. 68. C01. polhcarib srailatina, ad limbum mteiduin flava, extus pnbescens.
5. H. STRIGHLOSA (Mart. 1. c. p. 52), caule erectinscolo superne villoso, folns bteviter petiolatis oblougis acuminatis mucionulatisstiigillossis, flonbus axilla-ribus sohtauis, coi. antice giosse* ventucosis, limbo contiacto 5-dentato fy in cahdis tupestiibus monlanis Brasilia? piov. Minaium et Bahiensis. P11011 valde afluxis dicitui.

N D. Ad Hypocrytam pertinere videnlur .

Orobancbe monamheos Ariab fl. fluui. 6 t. 66

Oiobancbe serpens, ibid t 67.

Orobanche peianthomega, ibid, t 63.

Oiobancheiissa, ibid. t. 69

Oiobancbe feiox, ibid. t. 73.

Orobanche melancbolica, ibid t. 77.

Sed descu'ptionibus deficientibus eas consultò omfw

X. COLUMNKA Plum. gen. am. p. 28. t. 33. Linn gen. 792 Lam ill t 724
Mart. gen. 3. p. 5b. e. 2aO./. 2 non Roxb. (1)

Cdlyxhbci 5-partitus.Cor. tubulosa, rectiuscula, basi posticē gibba ungcns, lobis supeuoie eiclo formcalo, niicnoie tulido patente' Stam. 4 didynama, anthers connexis, qumti postici rndimentum". Glandulae i-5 cnca basin ovarn. Bacca i-loculans, placantis a panetalibus bilobis. Semma oblonga.—Frulices Americani flexiles "electi aut scandentes. Folia opposita brevi-peliolata crassiuscula subscrata,

(O Coluinnealloxb.fl md 3. p. 97 convenit saltern quoad species satis notas cum Limnophila Br. at forto quoad cameras ad Stemodiām Omucs ideo ad Scro- pbulanneas lejiciendjc. Conf Bentb. Scr. md p. ^5.

hirsuta vel pubescentia. Pedunculi axillares solitarii aut conferti. Corolla: coccinea.

- i. C. SCAICDENS (Linn. sp. 891. excl. Sloan, et Brown. syn.), caule fruticoso scandente apice spicato, foliis oppositis breviter petiolatis ovatis iubacuminatis serratis supernè hirtis, pedicellis axillaribus petiolo paulò longioribus*, cal. lobis integris, corollis pubescenti-hirsutis. ♂ in sylvaticis humidis submontanis umbrosis insul. Caribearum, Martinicæ (Jacq.), Porto-Ricci (Bent.), Trinitatis (Buch.), Cuba? (La Ossa) et in Guianâ (Sw.). Swartz obs. 249. Jacq. b. vitid. 5. t. 48. Lam. ill. t. 524 f. 1. C. Mart. nov. gen. 3. t. 226. f. 2. Q. lotuudifolm bdli\b. par. t. 29. An C. villosa Willd. euuui. suppl.?—Plum. ed. Buiin. t. 8y. f. 1. Cor. pbaMiicea pollicem longa. Bacca alba globosa. Nectar in fundofloibcopiosa unde Liane à syrop elicitor. (v. s.)
2. C. HIRSUTA (Swartz fl. ind. occ. 2. p. 1080), caule suffrutico&o hcanciente apice bir^uto, foliis oppositis breviter petiolatis ovatis iubacuminatis serratis supernè hirtis, pedicellis axillaribus petiolo paulò longioribus*, cal. lobis serratis hirsutis. ♀ } in sylvis montosis Jamaicje ad arbores et iupe<>. Hook. bot. mag. t. 308i. — Sloan, jam. hist. 1. p. 15-j. t. 100. f. i.mala. P. Brown, jam. 270. t. 3o. f. 3. Cor. hirsuti&simea phaeniceae vel albido-rubriae. Bacca alba subrotunda.
3. C. RnTILANs (Swartz! fl. ind. occ. a. p. 1083), canle frutescente subscandente laevi, foliis oppositis longiusculè petiolatis oblongo-lstoceolatis denticulatis sca-briusculis subtùs birsutis coloratis, pedicellis i-j axillaribus petiolo brevioribus, cal. lobis inciso-laciuiatis obtusis corollisque villosis. Jj ~) in sylvis umbrosis Jamaica ad troncos arborum. Hirsutie rutilante à plerisque facile di-versa. Petoli pollicares. Cor. flavo-rubrac. (v. s.)
4. C. HISPIDA (Swartz! fl. ind. occ. 2. p. 1085), canle frutescente erecto snbte-tragono piloso-scabro, foliis oppositis petiolatis ovatis obtnsis basi inaequalibus denticulatis hirsutis, pedicellis ex axillis supremis. . . . , cal. lobis lanceolatis integris birsntissimis. ♀ in montibus altis Jamaica; occid. ad rupes nmbrosas. Calyns pili sangumei. Bacca alba deraùm dehiscens. Cor. indescr. (v. & bine fl.)
5. C. OVATA (Cav. icon. 4. p. 62. t. 3gi), canle fraticoso snbscandente radicante, foliis oppositis petiolatis ovatis grossè paudentatis suprà bispidulis subtùs tomentoso-ferrugineis, pedicellis sex axillis bupremis solitariis, cal. lobis lanceolatis utrinquè x-denfatis, cor. Vbngè tubulo&a extus pilosà. ^ in ins. San Carlos de Chiloe. Cor. coccinea, labio super, vix fornicato apice bidentato, infer, patente 3-pavtito. Fructus dicitur capsularis? (v. s. sine fl. in h. Deless.)
- C. C. SCHIEDEAKA (Schlecht. in linn sea 8. p. 249), ranibus simplicibns, foliis oblongo-lanceolatis integerrinois soriceo-villosis, cal. lobis ovato-lanceolatis integris corollaeque macnlatis'et villosis. % in Mexico ad veteres arbores propè Misantla et Hacienda de la Laguna. G. Don gen. syst. 4. p. 633. Caules nodosi, apice villispurpleisvestiti. Folia breviter petiolata, 5 poll, longa, 1 |lata. Cor. bipollic. flavo et fusco variegata. Bacca globosa alba.

'J Species dubiæ.

7. CP AHXSOPHTLLA, caule snffrntescente erecto? spicula saltern hispidisMmo, foliis oppositis snbsessilibus villosis, altero oblongo lanceolato acuminato snb-serrato basiinaequali, altero multò minorebasi ovato apice acuminato, pedicellis axillaribus folio niajori dimidio brevioribns hispidis, cal. lobis integri* lanceo-lato-linearibus acuniinato-subulatis. I) in America anstrali legit cl. Poeppig tied loc. propr. ignoro. Cor. purpureo-coccinea, 1 poll, longa, basianguastata, valdè gibba. (v. s. sine frnctu.)
- g, C.? TRIFOLIATA (Link enum. h. Ber. a. p. 14^), canle erecto pubescente, foliis terno-verticillatis sub&essilibi;s oblongis dentatis pubescentibus, pedicellu* axill. folio brevioribus, cor. tnbo basi gibbo, labio iop. raflexo, inf. tnfido. A. Patr. ign. Cor. caerulea. Fruct. ign.

9. C.? STEIAATA. (Lour. coch. ed. W. a. p. 47) pilosa, ovaule herbae repente, ramis soberectis, foliis ternate-verticillatis petiolatis ovatis serratis, pedicellis axillaribus solitariis, cal. lobis capsulisque subulatis.[^] in aquaticis Cochinchins. Cor. rugosus labio super. 3-infer. 2-fido (au ideo resupinata?). Capsula bilocularis. "Verism. è genere, imo ex ordine removenda.

-j--{- Species exclusae.

- C. BALSAMICA Roxb. = Limnophila gratioloides.
 C. COCBINCHIENSIS Lam. = Diceros Cocbiacbinensis.
 C. ERECTA Lam. = Achimenes cocci nea.
 G. HETEROPHYLLA Roxb. zzz Limnophila heterophylla.
 Q. LOWGIFOLIA Lam. = Diceros longifolia.
 C. MINUTA Roxb. = ? Steraodae sp.
 C. TOMEHTOSA Roxb. = ? Stemodias sp.

XI. DRYMONIA Mart, nov.gen. 3. p. 5j. — Besleria sp. auci.

Calyx liber obliquus 5-phylloides, sepalis imbricatis, i interioribus. Cor. obliqua campanulato-subringens basi posticè gibba, fauce palulâ, labio superiore bilobo, infer, trilobo. Slam. 4 didynama, anterius inter se liberis. Rudiimentum quinti nullum. Stigma bilobum. Annulus hypoginus et glandula postica. Capsula baccans ovata coriacea i-locul. bivalvis, placenlis 2 parietibus bilamellatis. Semina oo fusiformia.— Frutices Australi-Americanici scandentes, bine indè radicanti's, aut humifusi. Caules teretiusculi epidermide nitida. Folia opposita* petiolata serrata pubescentia crassiuscula. Pedicelli axillares solitarii i-floribreviusculi petiolo subacquales ebracteati. Corollae amplae, flavidæ aut alba?, siccè pictæ.

- i. D. CALCARATA (Mart. I. c. t. 224), foliis ovatis basi rotundatu^{*} cordatis a pice acutis et calycis sepalis oblique cordatis dentalis pubescentibus, corollæ limbo dentali-ito, anterius basi calcaratus. £)) in arboribus sylvarum aboriginem prov. Rio-Negro Brasilia; Cor. 2 poll, longa, pollicem lata, flava, lincis atro-purpureis punctatis. Pedicelli petiolo paulo longiores.
- a. D. SERRULATA (Mart. I. c.), foliis utrinque subhirsutis ovali-oblongis nitrinque acominatis dentalis, cal. 5-partitis serratis, cor. lobis serrulatis. J-> ") in India Occident. Besleria serralata Jacq. b. Schenck. 3. p. ax. t. 291. Drym. bicolor Lindl. bot. reg. 1838. t. 4. Drymonia Jacquinii G. Don gen. syst. 4. p. 653. Cor. pallidè liava, hinc ad basin gibba. Pedicelli petiolo suba-quales aut vix longiores. Folia subtus rubentia. Fruct. ignot.
3. D.? SPECTABILIS (Mart. I. c.), fraticosa ramosissima, foliis elliptico-oblongis acutis obsoletè dentatis adpresso-pilosus, cal. sepalis obsoletè denticulatis ovato-oblongis basi sobcordatis, cor. campanulata pubescens-]>ilosâ. Jj in umbrosis ad ripas flum. Sinilhac inter Popayan etla Sequia Novo-Granalenium. Lipsleria Spectabilis H. B. et Kuntze nov. gen. am. 2. p. 400. An ex Knuth Gloxinie sp.? Cor. alba limbo rubescens.

XII. KLUGIA Schlecht. in Linnaea 1833./>. a4K.

Calyx liber pentaplero-pentagonus. Cor. tubulosa limbo bilabialis, labio sup. niamaximo rotundato integrum, inf. parvo trilobo. Slam. 4 sub-equalia absque rudimentis quinque. Stylus brevis stigma te sub capita truncata Capsula membranacea bivalvis, valvis in medio placentas 2 lamelliformes gercentibus. Semina 00 cylindrica. — Herba Mexicana erecta alternifolia, pube nivulâ primitum subgrumosa, foliis inaequilateris, floribus azurcis in racemum terminali dispositis.

- * K. AZUREA (Schlecht. 1. c.) If. in Mexico ad Cnesta grande dc Chironquiart*.
 ^ cypreum. flor. legit cl. Schicde.

XIII. TAPEINOTES.—*Tapina Mare. nov. gen. 3. p. 60. t. a*5. G. Don gen,*
syst. 4. p. 554./. fig.

Calyx liber 5-partitus insecqualis. Cor. infundibuliformi-subringens, basi posticè gibba, tubo anticè interdiini grossè ventricoso, fauce contract[^]; limbi erecti labio superiore bi-, ini'riore 3-lobo. Stam. 4 didynamica et quinti postici rudimentum. Anth. coliaerentes. Annulus hypogynus in glandulam posticam tumcns. Capsula ovata coriacea i-locul. a-valvis, placentis 2 parietibus bilamellatis. Semina 00 oblonga.—Illerbae Brasilienses pusillx è tubere hypogaeo ortae, molles subcarnosse. Folia opposita, interdiuum oppositione perturbala subremota, petiolata subdentata. Pedicelli axillares solitarii aut gemini 1-2-flori. — Nomen paululum aheravi ne tain facile cum Tapeinià Juss. et Tapinià Fries confundatur.

1. T. BARBATA (Mart. nov. gen. 3. p. 60. t. 225. f 1), herbacea ramosa infcrnè radicans, foliis oblongis acuminatis Lasi cuneatis subcrenatls snbtiis scabris, pedunculis axillavibns 1-2-iloris, cal. lobis latè deltoitleis raargine veflexis, cor. cylindricis grossè carvatis extùs villosis.[^] in Brasilia? paludosis ad viam Folisbertiam. Gesneria barbata Nees et Mart. nov. act. nar. cnr. XI. p. /jS. Cor. intùs rubicandaB, unciam longne. Affinis dicitur Conradiæ soabrae, sed folia opposita.
- a. T. TrsnxA. (Mart. nov. gen. 3. p. 61. t. aa5. f. 2), brevicanlis simplex, foliis sabradicalibus ovatis subintegerrimis membranaceis sparsè pubescentibns, pedicellis 1-2 subradicalibus folio.longigribus capillaribns, calycis tubo brevi, lobia 5 lancolatis, corolla^{*} tubo elongato bine basi calcarato, stigraate bifido tenoi. Ql in Brasilià circà Rio de Janeiro legit cl. Gaudicbaud. Herba minima-vis: pollicaris. Pedicelli 6-9 lin. longi. Cor. 4 lin. longa. Capsola oblonga bivalvis, valvis concavis. (v. s. comm. à cl. inv.)

XIV. NEMATANTHUS Schrad. in Gcctt.anz. i8ai. <v. i.p. 719. Neuw. reis. 2. p. 108 et 343. Mart. nov. gen. 3. p. 46.

Calyx liber obliquus ultrà medium 5-fidus seu 5-partitus, lobis lanceolato-linearibus suba;qualibus, sum mo paululum. minore. Cor. infundibuliformi-campanulata obliqua basi posticè gibba, faucc patula, limbo aequaliter 5-Iobo. Stam. 4 didynamica cum quinto rudimentario aut nullo. Anth. cohacrentes. Annulus hypogynus et glandula postica. Capsula pyramidalis coriacea i-locul. 2-valvis, placentis 1 parietalibus bilamellatis. Semina 00 oblonga.—Frutices Brasilienses simplices aut parcè rainosi suprà arbores scandentes saepè radicantes, epidermide nitida cinereo-testacea. Folia opposita (altero sa3pè minore) petiolata crassiuscula oblonga ant ovali-lanceolata utrinquè acuminala subintegerrima f juniora ciliata. Gemmatio nuda foliis complicatis. Pedicelli axillares i-flori solitarii cbracleati filiformes penduli. Corolla^{*} puniceae ampliae.

1. N. CHI. ORONEM (Mart. 1. c. p. 47. t. ^19), pedicellis folio bveioribns, calycibns ferè 5-partitis. J in sylvis aboriginibus umbrosis Brasilia in prov. Sebastianopolitanâ, ad Seriam dos Orgaos, etc. Variat pedicello et calyce nunc pilis adpressis glabriusculis, nunc pilis patentibus hispidis, 1-4 poll. longis, semper viridibus aut parcè purporascentibus. Folia 4 poll. circiter longa, 15-16 lin. lain. (v. s.)
2. N. LONGIPES, pedicellis folio longioribns, calycibus ultrà medium 5-ldis. g in Rrasilia. propè Rio de JaTieiro legit cl. Oaudirbaud. Folia vix 3 poll, longa, polljccin lata. Pedicelli florentes 4 poll, longi, apice praesertim et calyces hirsnl. AnN. coriicola Scbrad. 1. c. (qui N. ioncma Mart. 1. c. bnc refendus pntat) » se1 pili calycis et pedicelli violacei dienntur, quod saltcin ex sicco in moo non apparct. (v. *.)

XV AILOPLECrUS *Mait nov gen 3 p 53 G Don gat syst 4 p 65** —
Loplua /tew I/I Ham prod, ind occid p 47 —Ciantzia & Spy? ml rod p 173
*« 710 /io« ahoi —Dd beigaua Fuss fl ant 1 p 141** —Orob mebue sp*
*Velioz in Vand fasc t 7 / 18 *« Rccm script p iai f. 7/ 18 —On*
bandies sp Arrab, fl Jlum —Beslcnae sp Linn

Calyx libei coloiatus 5-sepalus, sepuiis lmhucaUs vane basi con uexit, 2 interioiibus. Coiolh lubulosa \cl clavifomis rectiuscula, limbo bie\i 5-lobo ant 5-cJenialo. Stain 4 didynama cum quinti postici ludiincent e basi tubi Stigma cipitalo-infundibulifounc. Annulus Jiypogynus in glandul im poslic.un lumens Capsula baccans couacti i-locul bivalvis Scmma 00 oblonga —Fiulices Ausli Ib-Amencani scandentes radicantes Gaults leletes aut subtetragon (lexiles, epideimide nitida Rmni opposili Folia opposita lunc inde maequalia pelio jata pipgmuscula, sa?pe pubenlia , mleidum subtus jubcnlia. Gcmmalio nuda. I^ lores axillarLS, adgregati, lanus bolilam, bracleis lubio-colo-1 alis mstiucti nut muli C01 ha\ae

* *Calycs sepahs integerrums*

I A. SPARSIFIOR!. (*Mait nov gen 3 p 55 t aa3. f. 1*), frnticosusstandens foil is oblongis MI oblongo linctol itisba&i ^ttcnuitis jcummatis subtiliterstii gillosis mtt^tiumis, flonbas axillanbas snbessilibus aggitgatis vel 'parsis hnctpis qnam vepj'a oibicalan tnangulana inleqemma minoubns calycibus que alio sanguineis et siibintegciinns, cor villosse limbo 5-dentato ^CS in pmgnibns umbiosis Brasihae super arbores jxander* in Serra dos Orgaos L01 citund Ramuli et folia ooclla albo hnta

o A CIRCIINAIUS (*Mart nov gen 3 p 5b t aa3 f a*), fiuticosns < indens ndjeans, folns oblongis vel lato oblongih basi attenmtis acnmmatis subhlitei stu^illossis, racenns axillaiibus , pednncuhs nodnlosis, braiteis quirn *ep il t oblonga integermnna majoubus ialycrib!>qae ttro sangumeis et submtegcni iim, cor vilo&aD limbo bievitei 5 lobo levolato f)^m sylvis abonginibns Brasilia; prov. Babiensi ad Rio-LNegio Cf r cilnna Rosleua Imcella Stbotl in OEstr med Jabib vi 11 p 8^ in floia zSai p ig8^neubias. pf] 1 p b? Epigaea ex Schott, Lpulendra ex Mart

3. A PATRISII, finlicosns subcarnosns scandens, folns petiolatis ovah obiou'^ntnnqueacuminatissnbintegeuiinis, peduncuhs jxillanbus plunflous bracf^s amplas obovato-iotundas subcibatas colorjtas gerentibus, cal lobis* oblongib integns bratteisque coloratis. ^r^ m Oman » G ilhc^ seu Cnyenn i lcgiul P1 tns 'Aflims A coccmeo, sed i descr Aubletn , piaster not is indjcitas , diffcn folns dnplo longionbus, coiolls extus tomentosis (v s)

* * *Calycs sepahs serratis, tatenbus non mutuo adphcatis.*

4 A cocciUEiiS (*Mart nov gen 3 p 57*), fiuticosns subcarnosus scandens, folns pehol itis carnosis ovatis acnminatis obsolete sciratis, peduncubs axdl i-nbas plunflous bracleas amplas cordato-iotundas dentatas ^eientibns, cal lobis ovalibus dentatis brachteisque <oloialis frrs in sylus pilndosij, Sinema riensibusGnian-e Galbcae Besleua coccinea Aubl. gman a p 63a t ^55. Coi flava Capsula cainosa fhua subiotunda

5 A CRISTATUS (*Mait no\ gen 3 p 57*), caule iufhuticoso scandente ladicante, folns petiolatis o\alibus ntnnquc acutis dtntatis ulunquc lmelli^, pedicillis petiolo longioubus i-flons 1 mnsquc iiinioubus busulis caKcibus coloratis lobis serrntis ov itis iLUinin.ihs, coi tubo extuslnisuo V m'syl\is humidis GuiHiae (^nbl), Maitinieje (J itq), Ouadalupa, (I beinnt' ') Nevis (Ham) Beslena enstata Linn sp 863 Jatq amei iS8 t no Lophia nh*e* nicea Desv. in Ham piodr md oct p 47 (iinlziasScop 1 c —Plain fmci jd Buim t 50 Calvx coccmus im olutnformis Coi fluestens Capsuh ex x*sum nign (v s)

- >. A. HISPIDUS (Mart.], c), fruticosus erectus, junior subvolubilis hispidns' foliis oblundo-ellipticis acutis serrato-crenatis bispidis, pedunculis axillaribus solitariis i-Uoris, cal. sepalis argutè serratis hispidis. /> in tempcratis hnmidis Andium Pop:iyancnsii:m Nov. Granat. Resleria hispida If. B. et Kunlh nov. £<n. am. 2. p. 39. A. cristato proximus. Cor. flava, supernè ventricosa, calyce tn'plo longior.
7. A.? SANGUIMEUS (Mart. 1. c.), friftieosns sea ml ens, foliis obovato-oblongis acuminatis denlati.s sparsim adpresso-piio.sis sublùs purpureo-iaculatis , pedunculis axillaibus sessilibus , cal. sepalis seirato-incisis dense lanatis., cor. villosa gibbosà subbilabiati. /) in Santo Domingo (Turp.) et in monte Qnindiu Novo-Gwnat. (H. B. et K.). Hesleria sanguinea Pers. encb. 2. p. 165. H. B. et Kunlb nov. gen. am. 2. p. 4^o. Dalbergaria Jhoenicea Tussac fl. ant. 1. p. 141. t. 19. Tussada Reicbenb. ex Lindl. Yireya sanguinolenta Rafin- speccb. sc. 1. p. 194. Calyx potiù? laciniatus quam serrattis. (Pers.)
- S. A.? GLADER, Miffruticosus scandens glaber, foliis ov.ilibas basi cuneatis apice acurainatis inargine serratis, pediculis nxillaribus l-lloris solitariis peiolo vix loogioiibis , calycis lobis serratis acurninatis corollce longitudineni subaequantibus. /)/^>in Mexici iuontibus Mazailani. Rcslen'a cristata fl. mex. ic. ined. Cor. purpuro-violaceo. Stigma ex ieone bilobnm. Fructus ovatus acaminatus indebi.scens. (v. ic. pict.)
- * *** *Calycis sepalis dentatis crenatisve, lateribus mutno applicatis. — An genus?*
9. A. DICHROUS, cauic fruliculoso crecto* foliis petiolatis ovato-lanceolatis integrerriois birtellis pinguibus, floribus axillaribus confertis subsessiibps, cal. quinquepaititi lobis rotundatis denticulatis, corollo claviflorinis limbo creoliusculo. ^ in Drasiliic sylvis propè Agoa-litnpa in prov. Minns Geraes. Bcsleria bicolor Scbott nen. bras. pfl. 1. p. G. n. G. in flora 1821. p. 197 non H. B. et K. liesl. dicbrus Sj>reng. syst. 3. p. 34o. Alloplectus Scbottii G. Don gen. syst. 4. p. 555. Calyx ruber lateribus proxim. 2 loborum mutuò applicatis. Cor. tuho rubro , limbo flavo. Fruct. ign.

- \o. A. ANGUSTIFOLIUS , caule snffruticoso erecto infernè tcreti glabro, apice sub-tetragono puberulo, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis atrinqnè acnniinatis iutegerriuiis suprà glabris subtùs pallidis ad nervos puberis , cyrnis axillaribus brevissime peduncnlatis 3-5?-floris villosulis, calycis lobis subrotundis crenatis bracteisque coloratis. 5 ^m sylvis primaevi Brasilia? ad Sierram dos Orgaos. Orgyalis. Folia cum petiolo pollicari 6-7 poll, longa, 12-14 in. lata. Cor. non Tidi. Ovarium hirsutissimum. (v. s.)

XVI. EPISCIA Mart. nov. gen. 3. p. 3g. — Besleria; sp. Plum. Linn.

Calyx liber 5-phyllo seu 5-partitus. Cor. infundibuliformis, tubo rectiusculo basi posticè gibbo, limbo 5-lobo. Stam. 4. didynama cum quinti poslici rudimento è basi tubi. Annul us hypogynus in glandulam posticam tumens. Stigma bilamellatum. Capsula subgloLosa membranacea bivalvis, placentis 1 parietalibus bilamellatis. Semina 00 oblonga. — Plerbae Americanai molles decumbentes rindicantes. Folia opposita petiolata venis anaslosantibus percursa. Flores axillares solitarii velcymosuli et bractcati.

1. E. DECUMBKNs (Mart. 1. c. t. 216), glabriuscna decumbens reptans, foliis oblongis basi snbeordatis acutis creuatis, cymulis axillaribus terrinalibusque, calyce corolla duplo breviore, sepalis lanceolalis aenmininatis subserratis, cor. lobis integerrimis. *f in nemoribus densis udis Brasiliae ad fluv. Japura prov. Rio Negro. Cor. alba circ. sesquipollig.
2. E. REPTANS (Mart. 1. c. t. 217), piloso-birta sarmentosa radicans, foliis ovatis obtusis cr<>naiis, pedicellis axillaribus solitariis i-floris, sepalis lincari-spathulatisobtosis, corolla? calycem duplo saperantis lobis dentatis. If, in umbrrosis Brasilia? ad fluv. Japura propò paguni Manacnru. (>. Don gen. syst/ 4.

- p. C55. t. 70. Cor. pulchr's scarlatina , pilis snnrlatinis hirsuta, circ. sesqui-pollic.
3. E. HISPIDA, piloso-hispida adscendens, foliis ovatis acatiasculis grosse dentatis, pedicellis axill. geminis i-floris, cal. sepalis oltlongis mucrone acutis, cor.... % in, Amer. australi (sed locus propr. ign.) legit cl. Poeppig. Caules pedicelli et petioli hispidissimi. Fol. laminae supra sparsè, subtùs secùs nervos hirtae. Pediceli rigidi petiolo aquales. Cor. videntnr juniores extùs hispidae sed ex specim. fractifero non satis notae. (v. s)
4. E. METLITXFOLIA (Mart. 1. c. p. 42), erecta apice vclulina, foliis ovatis utrin-qè subacuminatis grosse crenatis, cyrois axillaribns subtriangularis, cal. sepalis cor. tubum subaequantibus longè lanceolatis acuminatis subseruantis , cor. lobis intcgerrimis. % in ins. Caribaeis, Martinica (Pers.), Guadalupà (Bert.!) et in Gniant (Aubl.). Besleria mellitaefolia Linn. sp. 8G2. Scbrank hort. mouac. t. 44.— B. melissae Tragi folio Plum. gen. 29. t. 5. ic. fl. Cor. intense purpurea (Schrank). Fructus non baccatus sed capsularis subglobosus. (v. s.)

XVII. SARMIENTA R. et Pav.prodr.fl.per. p. 4- Mart. nov. gen. 3. p. 66. t. a 19. f. 3. G. Don gen. syst. p. 65i.—Urceolaria Feuill. obs. 3. p. 69. Molin.fl. tfuit. 177 non alior. — Sarmienta et Urceolaria Ream, et Schult. syst. 1.p. 5a et 77.

Calyx liber 5-partitus, lobo unico vix latiore. Cor. tubus obovatus basi angustatus npice ventricosus, Limbo 5-fido, lobis obovatis aequalibus. Stam. 1 fertilia exserta , 1 subulata sterilia, 1 minimum ctiam sterile. Stigma simplex. Gapsula ovaña i-locul. ex R. et P. circum-scissa ? Seinina 00 obovata. — Herba Chilensis super arborcs scandens glabra. Gaulcs radicantis. Folia opposita carnosa breviter petiolala ovata avenia punctata. Pedunculi terminates longi 1-2-flori. Bracteolae 2 immediatè sub flore. Gor. punicea extùs pubescens.

- x. S. REPENS (R. et Pav. fl. per. 1. p. 8. t. 7. f. £.). 01 ^) in nemoribus Chilensiutn ad Conceptionis Urbem et in prov. Re re, Iratae, et Pucbacay. S. scandens Pers. encb. 1. p. 13. Urceolaria Chilensis Roem. et Scb. syst. 1. p. 77.— Feuill. obs. 3. t. 43.

Ordo CX. SPHENOCLEACE[^]: *Mart, consp. (1835) n. 162.*
LindL not. sjrst. ed. 2. p. ^38. (Campanulacearum sub-
ordo ?). — Pongatieae EndLp. 519 (ad calc. Campan.)

Calycis tubus ovario adnatus, limbus 5-partitus, lobis rotundatis concavis margine subinflexis per anthesin patulis, demum snprà oVariurn conniventibus persistentibus. Cor. gamopeta!a 5-partita, lobis indexis basi subauriculatis. Stain. 5 in sinubus cor. sessilia; anth. rotundaD a-locul. longitudinaliter debiscentes. Ovarium biloculare multi-ovulatum. Stylus brevissimus. Stigma capitato-bilobum imberbe. Capsuia membranacea a-locul. basi cuneiformis oo-sperma circurnscissa. Placentae fungosae utrinque septo adnata? (lil^erae deorsùm pendulae ex Gaertn.). Semina minutissima ntinierissima teretiuscula, exalbuminosa ex LindL, albumine carnosò donata ex Gaertn. Embryo rectus teretiuscnlus axilis, radicula longa, cotyledonibus brevissimis. — Herba annua erecta glabra ramosa. Folia a Item a extipulata lanceolata integra laevia. Spicae terminates seu oppositifoliae pedunculatae cylincli'icap. Bracteae lernae seu tri parti toe sub flore. Flores parvi albi. — An ordo Portulaceis aut Samolo ex. habitu adgregandus? A Campanulaceis differt stigmate imberbi, antheris cor. insertis et oeconomia fructus. Interea nee habitu nee caracteribus ad Ficoideas, ut voluerunt cl. Marti us et Sprengel, ai'finis mihi videtur.

I. SPIENOCLEA Gaertn. *fruct. i* (1788),/? 113. t. 24. — Pongatlom Juss. gen. (1789) p. 4^3. fijatn. ill. 1. n. 1991. — Gaertnera Reta. obs. (1791} 6. p. 24 non Lain, nee Schreb. nee Neck, nee trail. — Kapinia Lour. cock. ed. TV. t. p. i5(?)

Car. idem ad ordinis.

z. S. PONGATIUM. (T) in kumidis et coltiis Indiae orientali is, Malabariae (Rbeeil.), Cochinochinac (Lour.), Crylonae, ins. Timor, JEgypti, ins. Caribearum, Mexici, etc. Sph. Zeylanica Gaertn. 1. c. Willd. sp. I. p. 927. Roach. fl. ind. ed. Wall. 9. p. 116. Pongalium indicum Lam. 1. c. Scbrebra Pongati Retz 1. c. llapinla herbacea Lour. 1. c. Pongati Rbeed. Mai. 2. p. 47. ** 24* (v. b.)

Ordo CXI. COLUMELLIACEJE *LindL* nat. syst. cd. i.
p. 222, ed. 2.p. 239. — *Columellieoe D. Don in Edinb**
new. phi/, journ. 1828. decemb. p. 46. eoccl. gen. G. Don
gen. syst. A.p. 57.

Calycis tubus ovario adnatus, limbus 5-partitus, lobis xqualibus subdistaniibus. Cor. subrotata, tabo brevissimo, lobis 5-8 per aestivationem imbricatis stibrotundis. Stam. 2, basi tubi inserta, quasi opposita. Anthera? renifbrnn-rolundatae 3-lobae, loculis undulato-plieatis. Ovarium biloculare multi-ovulatum. Stylus simplex laevis. Stigma capitatum bilobuin. Discus epigynus carnosus. Fructus capsularis bilocularis polyspermus seplicido-dehiscens. Placentae septo adnatae. Semina adscendentia laevia. Embryo ercctus acuminatus in axi albuminis carnosi. — Arbores aut Frutices australi-americani. Rami oppositi, juniores subtetragoni. Folia opposita exstipulatn, integra aut serrata, oblonga aut obovala, subtus sericeo-pubescentia. Floressolilarii aut terni, ramulos tennantes. Cor. flavae. P^olia amara febrifuga. Lignum durum. — Ordo ad Jasmineas sen Personntns nonnullas ex stam. 1 accedere videtur sed calyx ovario adnatus! ad Gesneriaceas ex calyce adnato, capsula biloculari et corolla subirregulari potius approximandus. — An slam, potius in duas phalanges concreta diadelpha, adelphia utraque antheras '5 concretas gerente? In specim. meis florum earie subdestructorum structuram veram non cernere quivi.

I. **COLUMELLIA** *Ruiz et Pav. prod. p. 3. t. i. /.* 3. fl. per, l.p. a8. H. B. et Kunth nw.gen. am. 2.p. 388 non *Lour*, nee *Jacq.* nee *Arrab.* (i). — *Colnmella Vahlenum.* A.p. 300. — *Uluxia Juss. diet. sc. Nat. lo.p. 102. 56.p. a3* ◇.

Car. idem ac ordinis.

1. C. OBLONGA (R- et Pav. fl. per. 1. p. a8. t. 8. f. i), foliis oblongis extrorsum serratis petiolatis subtus albicanti-pubescentibus, floribus ternis pedicellatis subcorvrbosis. 5 ^{iri} ^{erov} ^{aē} *yWi ad Pillao. C. arborescens Pers. enh. 1, p. 13. "
 - a. C. ODOVATA (R. et Pa^ fl. p<*r. 1. p. 29. t. ia. f. a), foliis obovatis concavis serratis integerrimisque sessilibus, subtus incanis, floribus subsessilibus nni-floris. ^ ia collibus aridis Peruviae. Col. frute&ceus Pers. enh. 1. p. 13. Foliola 2 parva liuearia sub calyce. (v. s.)
 3. C. SEHICEA (H. B. et Kunth nov. gen. am. 3. p. 388), foliis oblongis utrinque accarinatis integerrimis subtiis adpres. so sericeis, prdnncalis]-3 floris. /> in Regno Quitensi lo'cis sylvaticis et tleclivitate month ignivomi Tunguaraga. Folia pollicem longa, 3 Jin. lata. (v. s. comm. à cl. Ronpland.)

(1) *Colutnella Lour. c&t Cayratia Jiibb.* — *Colimellia Jacq. c^t Nestleria.* — *Coinmellia Arrab.* est gfnus vix uotum.

Ordo CXII. NAPOLEONEiE *Beauv. fl. owar. 2 (1807), p. 29.* — Belviseae *R. Brown trans. soc. lin. i3 (1821),/?.* 222. — Belvisiaceae *LindL nat. syst**(1836),/?.
239.— Asterantheae *Reichenb. consp. 1 (1828),/?.* 137.

Calyx ovnrio adnatus, limbo diviso persistente. Corolla imo calyci inserta, gamopetala, decidua, rotata, plicata, multiloba seu indivisa, simplex vel duplex (interiore tune fortè ^minibus aborlivis constante). Stam. nunc definita polyadelphe, nunc indefinita libera, basi corolloe inserta. Ovarium inferum. Stylus 1 cylindraceus. Stigma angulatum seu lobatum, peltatum. Fructus baccatus polyspermus calycis denlibus coronalus uni-bi-locularis. Sem. . . . — Fru-
tices aequinoxiales glabri. Folia alterna, petiolata, integer-
rima, exstipuliata, penninervia. Flores axillares vel laterales,
solitarii. — Ordo vix notus, à cl. Jussieu, Beauvois et Des-
vaux inter Cucurbitaceas et Passifloreas collocatus, imò à cl. Desvaux utmera Cucurbitacearum sectio cum dubio habitus;
à cl. Desfontaines, Brown, etc., propè Symplocineas relatus ;
imò ex priore vix à Symplocineis separandus; à cl. Lindley
propè Spbenocleaceas et Colunielliaceas insertus. Ab omnibus
ut videtur, ex caract. equidem incompleto, diversus. Ex or-
dinatione meâ fortè subartificiali, in Lindleyi senientiam ce-
cidi.

Nomen ipsum generis proecipui et ideò ordinis litigiosum!
Napoleonae nomen est revera ex jure prioritatis servandum,
sed jam Bonapartea à pluribus annis dicata erat cum cl. P. de
Beauvois Napoleonam finxit, et nomen inventoris ipsius non
sine ratione quādam cl. Desvaux spectabili stirpi consecravit,
sed tamen juri prioritatis addictus Napoleonae nomen servavi.

I. NAPOLEONA, *Beauv. fl. owar. i (1807),/?.* 29. t. 78.—Belviaia *Desv. journ. hot, appl. 4. p» x30.*

Calycis limbus 5-partitus. Corolla duplex, exterior indivisa, interior (ex staminibus sterilibus coadunalis formata) multifida. Stam. filam. 5 dilatata biantherifera. — Frutex Owariensi-Africanus. Flores sessiles basi bracteolis pluribus ovato-rotuodis cincti.

1. N. IMFERIALTS (Beav. 1. c.). ^ in Africâ aeqninoelia H circâ nr bem Oware in sy¹' vis legit cl. Palisot de Beauvois. Belvisia caerulea Desv. 1. c. Flores*caerulei dia-
inetro ferè besqaipollie. (v. s. in b. Deless.)

@.?purpurea, floribus purpureis. fi 3^{interr} «pes ferrugineas Senega» W* ad
Foota-Dialon legit cl. Heudelot. Arbor 24-30-pedalis. Kami vertidillati
horisnntales. Fructus.pulpæ eduli tlonatns, aquâ iufiisus contra hernias in-
j^uinales ab inoolis usitatas ex Hfudrlot. An species k caernlea diversa i¹
(v. s. in b. Delcscert.)

II. ASTERANTHOS *Desf. m'ém. mus. 6./>. g. r. 3.*

Calycis lirnbus campanulalus, cupulaeformis, raultidentatus. Corolla simplex, margine ciliata, 20-22-loba, nervis totidem à centro ad peripheriam productis radiantibus, lobis singulis apice bifidis. Stain, indeiinita corollâ breviora, exteriora gradatim interioribus longiora, filam, filiformibus distinctis, antheris oblongis bilocularibus. Stylus apice in stigmata 6 obtusa subpeltatim disposita expansus. — Frutex Brasiliensis. Flores pedicellati.

x. A. BRASILIETIS (Desf. 1. c). J iu Srasiliâ. Folia ovali-lanceolata acurainata.

sulcata; antherae glandulosohirlae, medio inserts, in tubulos duos coalitos vix furcatos products, fipice tan turn dehiscenf.es. Stylus unicus, nunc rectus, mine apice curvatus. Bacca limbo calycino discoque coronata, 5-locularis, loculis oligospermis. Semina plunma placantis centralibus affixa, angulosa, parva, albuminosa. Embryo rectus viridis. Albumen molle album (lloxb. fl. ind.).—Frutices Indiae orientalis crescere Li, foliis alternis conaceis semper virentibus denticulatis, Racemis pauciflori axillares. Pedicelli bibracteati, apice incrassati, sub iloribus coarctati articulati. Corolla; punicea, apice saepè viridiluteae.

§. i. *Corollis tubulosis.*

- i. A. VAREFATA (D. Don herb. Linnae Soc., ex G. Don gen. syst. 3. p. 862.), ramis teietibus tuberculatis apice subangulatis, foliis brevissime petiolatis oblongisobtusis subspathulatis glabiis minute sen parce sciratis, petiolis callosis, racemis bolitarhs axillaibus, pedicellis longis apice incrassatis 5-angulatis, corollis tubulosis apice curvatis 5-dentatis. £ in montibus Pundua Indiac orientahs (R. Smilh. Buchanan in herb. Lamb) —Ceratostema variegatum Roxb. fl. md. a. p. 413. hort. heng. p. 33. Thibaudia variegata Royl. ill. t. 70, f. 1. Wall. cat. n. 751. Thib. ihodoroides herb. Lamb. *Talamoot* incolarm. Folia 5-6 pollices longa, 1 |-i poll. lata. Mos ante anthesin apice recuvatus; corolla glabra pollicaiis. (v. s. in h. DC. ab am pi. cctu mere. Ind. or.) 1
- a. A. SETIGERA. (D. Don herb. Linn. Soc. ex G. Don gen. syst. 3. p. 86a), ramis teietibus hinc inde hittis, pilis bievibus mgresentibus glandulosotuberculatis, glaudnhs albidib, foliis brevitci peliolatibus coiaceis elliptico-lanceolatis basi attenuatis obtasis apice acuminatis subtus nervosis, lacemis paniculatis iixillanbus foliis duplo brevioribus, pedicellis calycibusque hiitis. ^ IQ niontibus Pundua Indiae orientahs. Dun. vacc, mcd. t. n. Thibaudia setigera Wall ! cat. n 752.—Folia obsoleta denticulata, 4-5 poll longa, 1 J-poll lata. Lymbus calycinus paivus 5-iidus, lacinus subtnangulanbus acutis. Corolla seraipollicans tubuloso-ventricosa & paupnrea, calyce 7-8-plo longior, 5-lobata, lobis ovato-oblongis, apice curvata. (v. s. in h. DC.)
3. A. IORAWTHIFIORA (D. Don herb. Linn. Soc. ex G. Don gen. syst. 3. p. 86a), lamis teietibus glandulis raiib conspersis, foliis sessibus bubintegns oblongis ntiinqueattenaatis acutiu&culis dibcoloiibus, subtus candicantibus tomentosiusculis, tomento canescente tenuissimo, peduuculis axillaibus geraims uniiions, corollis tubulo&o-ventriobis apice semi-5-fidis, lobis reflexis £ in India orientali Dun. vacc. med. t 1^*. Thibaudia loranthifolia Wall. cat. 754. Pedunculi calycesque bnsuti, pilis apice glanduhferib. G01 olla coccinea, apice luteo-vindis, tubuloso-ventricosa, pollida et ultia. Folia 5 poll longa, vix pollicem lata. (v. s in h. PC. comin. ab hon. caet. meic. angl. Ind. or.)
4. A. VERTICILLATA (D. Don herb. Linn. Soc. ex G. Don gen. syst. 3. p. 862), capite fiuticoso, foliis Aerticillatij. lanceolatis acuminatis inmatè dentirulatis ff>as acutis, floribus lacemoso-corymbosis, pedunculis calycibusque hispidis, corollis glabns. j in montibus Pundua Indise orientals. Thibaudia verlicillata Wall. cat. n. 753 Corolla subpoilicans 5-lobaia, lobis brevibus. Filamenta sabcoahta. Antherae bilidse. Stigma subsimplex. **
5. A. VACCINACEA, foliis snbverticillatis angustè lancenlatis serratis, racemis axillanbus, foliis nqualibus J in montibus Garrow Indix onentalis. — Ceratostema vaccinacea Roxb. fl. ind 2. p. 4*2*. — *Kcsa-proom* incolaiujn. Ramuli asperi. An ab Ag. verticillatd diversa ?

§. 2f. *Corollis ovatis.*

- 6 A. ACUMINATA (D. Douherb. Linn. Soc. ex G. Don gen. syst. 3. p. 862), foliis petiolatis lanceolatis longe acuminatis den tatis, floribus corvmbosis lateralibus nn-mrosis. ^ Silhet Indiae onentalis —I hi baud 1a acuminata Wall. (at. n 6297)

- Folia Spilbaniaca. Lobi calycini ovati cuucionati. Calyces peduncuicjue te-nuissimè tomentosi.
7. A. SPRENGELII (G. Don gen. syst. 3. p. 86a), foliis petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis denticulatis basi attenuatis lanuginosis, floribus racemosis glabris, flegmentis calycinis ovatis denticulatis, filamentis lanuginosis, antberis bifidis. 3 in India orieitali. — Thibaudfa Spreugelii Wall. cat. n. 6298. Folia tripolicaria. Flores marcescentes 5-7 in racemo. Corolla ovato-oblonga, circitera lin. longa.
 8. A. SYMLOCIFOLIA (D. Don berb. Linn. soc. ex G. Don gen. syst. 3. p. S62), rainulis lannginosis, foliis ovatis inucionatis serrulatis, floribus Ianuginosis, segmentis calycius rotundatis mucroni; jatis, filaraentis barbatis. 5 in India oriental!. — Andromeda .symplocifolia Wall. rat. u. i522. Corolla iincañ longa.
 9. A.? ARKOREA, ramis glabris riuosis giiseis a pice hirsutis, foliis breviter petiolatis ovato-ellipticis serratis utrinquè acutis, suprà viridibus glabris, subtùs albidis nervo medio hirsutis, race mis axillaribus terminalibusqne foliis vix bievioribus. /> in montibus India* orientalis. — "Vaccinhiu arboreura Lescben. in b. DC. Kournerdon incolarnra ex Lescli. 1. c. Pedunculi pedicelli calyccsne hirsnti, pilis fernigineis vel cinereis. Folia seuipervireutia. Arbor lucdiocris. (v. s. in h. DC. comm. à cl. Lescbenanlt.)
 10. A. ELLIPTICA (G. Don gen. syst. 3. p. 862), caule|(psendo?) parasitico, foliis oblongo -ellipticis utrinqnè acutis basi biglandulosis coriaceis veuosis glabris, race in is secundis tenuissime tomentosis. ^ in montibus Salak Javaj suprà Arbores. Floret toto anno. Tbbaudia elliptica. Blum, bijdr. p. 869.
 11. A. FLORIBUNDA (G. Don gen. syst. 3. p. 8fia), foliis elliptico-oblongis utrinqne acominatis coriaceis glabris venosis, calycibus ciliolatis. ^ in Javae caenmine montinm ignivomorura. Tbbaudia floribunda Blum, bijdr. p. 85g. Prut incolaram. Floret per totum annum.
 - xa. A. XACRIFOLIA (G. Don gen. syst. 3. p. 862), raule(pseudo?) parasitico, foliis cnneato oblongis obtasiusculi.s coriaceis glabris subvenosis, race mis glabris. £ in JaviR cacumine montis Buzang-rang suprà arbores. Tbbaudia laurifolia Blum, bijdr. p. 859. Floret omni lempore.
 - z3. A. VARINGJEFOMA (G. Don gen. syst. 3. p. 862), foliis oblongo-lanceolatis acutiu.scuли coriaceis glabris subvenosis, racemis foliosis calycibusqne glabris. 5 in Java altis montis Gede. Tbbaudia varingittfolia Blum, bijdr. p. 860. Jantijie betid iucolarum. Flores omni tempore.
 14. A. LUCID A (G. Don gen. syst. 8 .p. 863), canle interdom (psendo?) parasitico, foliis obovatissnbretnsis margine recurviscoriaceis glabris subvenosis, raccruis calycibus corollisque pubescentibus. J in sylvis aliорibus Java?. Floret tolo anno.
 15. A.CORIACEA (G.Dongen.syst. 3.p. 863|caule(pseudo?) parasitico,foliiselliptico- vel oblongo-lanceolatis acuminatissimis coiaceis subtriucrviis glabris, racemis calycibus corollisqne glabris. 5 in Javae sylvis montanis. — Tbbaudia coriacea Blum, bijdr. p. 860. Kilagidajr incolaram. Arbutus coriaceus Blum, cat. h. Buitenzog. p. 67. Floret omni ferè tempore.
 16. A. COKEIFOLIA (G.Don gen. syst. 3. p. 8631, foliis cuneiformibasobtusissimis interdùm retusis margine recurvis coriaceis subvenosis glabris. J in sylvis altioribus Java;. Thibaudia cuneifolia Blum, bijdr. p. 861. Florettoto aano.
 17. A. MYRTOIDEA (G. Don gen. syst. 3. p. 863), ramulis pbescenfibns, foliis ovatis ellipticis obtusiusculis margine reenrvis coriaceis subvenosis ad costam ntrinque puberulis, racemis plabiis. 3 "cacumine inonrium ignivomorum insnlarum Moluccarum. — Tbbaudia myrtoidea Blum, bijdr. p. 861. Floret omni tempore.

J- *Species non satis no tec.*

- *8. A. MADAGSCAEIENSIS; caale fruticoso erecto ramoso, foliis ovatis alternis, floribus racemosis axillaribus , pedanculis bibracteatis, corollis viridibns. j in

m&ulà Madaga<cai Cavinlum Pet Tb. gen. nov niadag p. n. n. J7, Cav-Madagasieuense P011. diet sc.n.it 7. p 3io

19. A. ? A COST A, caule fmiicoso, folns ovato-lanceolahs seiratis crassis giabns oj|DO!>ilis, raceims spcatis teiminalibui ^ in sylvis plan is f ochinchin<e. \dccimum Acobla Ra^usch noro)> io<). 'V. oncentale Sw ex Steud no no phan p i>7 V j>picatum POJI diet suppl i.p 280 Acnsta^spicaLoor.fi. coch, 1. p. J38. Arbubcula J-pedahs , corolla alba uiceolata 5-gooa.

-J-j" *Species exclusa.*

A. SERR AT A 0 Don = *Gaylossacia serrata*.

HI GA.YLUSSAGIA H. B etKunthnov gen. am. 3 p 27S *Cham et Schlecht m linn r p. 5a8 O* Don gen syst 3 p 858 —*Lubbacia Spreng. sist 2 p 29a.* — Tbibaudix sp. //«wi rel.hist Ooa.

Calyx ovario adnatus, limbo libero quinquefido. Corolla tubulosa, Lasi ventricosa , ovata nut suhglobosa , limbo 5-hdo. Sdimina decent, limbo calycis mserla. Anberae mulicae, apice in tubulos duos productae. Stylus erectus. Stigma depresto -capitatum Driipa subglobosa sulcat-decagona calyce veslita dcemlocularis, loculis inonospunis. Semina lenliculaia laevishima. Spermodermiurn tenuissimum albumini aictè (idbneicns. Albumen semini conforme , carnosum. Embryo centralis dxilis leres, albumine bre\ior.— Fiutices lamosi. Folia spa^sa apice mucionato-glandulosa. Ricemi axillares approximate Flores bracteati, coccinei.

* *C01 ols 111 ceolatis |el cy hndcis.*

- 1 G BUXIFOLIA (II B. et Kunlb nov gen am. p 276 I ify syn. 2 p. 235 nee Cham, et Scblechl), caule fmlicoso rumosissimo, ramuhs hnsutis, foliis bievitei peliolatis coiuceis elhpticis utnque totundatis apice glaudulâ fusca teimiLMli* integeiriinis reti<ulato-venoj>is utrinque piloso-pubescentibns, ramei& iulipolhcuibns sunpliLihus 111 «ipue ramoroni appioxirnatis, corollis tn-LulosO'Ventncosis, o\anis hispidis. ^ prope dticas in raonte Avilde alt. 800 hex , item juxta Santa-Fe de Bogota, alt 1400 hex —Thibaadia glandulosa llumb lei his! p. 602 Raiui fnsc gl<ibii Corolla coccinea externc pnbes-tens (1) (v s. 111 b DC com in. a cl. Vargas)
- 2 G. IMBRICATA (Pohl pl.bris. 2 p 40 t 126), caule fraticoso, ramis glabiis lunioiibus pilobis, foliis irabticatis ovali-elhpiicis ad apicem immnti>irne erenatis miacione bievi caloso ternunalis, calycibus coiollsque glabns, biacteis bifoinaibus lineaii-lanceolatis et oblongo-icutis j in montosis Bi.isihae ad Tijoca Piovinc<e Rio de Jincuo (Pohl¹) G. Don gen syst. 3 p. 85cj exclus syn. G buxifolia Chna et Schlerht in Iinnaea r p. 528 Cham in him. 8 p. 492 (v. s. in h DC. ex Ildefonso Gomez)
- \$ G DISCOLOR , laraii glabiis \rgatls cinereo-aigenteis fusco-lineatis e\ corticis laceiatione, ramuhs rnbiginosis pnbspescentibus, foliis ellipiicis bicxilei petiolatis babi rolundatis apice acutis mucionatis macron e caloso pall id e ferruglneo, margue levolutis, veius apicem obsolete sermlnti9 subtus albo 1 ufescientibns snbargenteis , snpi 1 għbernmu viridibus, racemis simplicibus bracteatis sob-terminalibus. pobescentibns 5 ciicā Babiam in Brasiliā aequinoctiah —Folia subiub punch's minutmsnnis fuscis conspe!»a Peduncnh pedicelli calycesque rabro coloati, Coiolla? glabiaj coccinea; (v. s. in b DC com in a cl. Blamhet)
4. G PuiniRx(pohi]_1t1s 2. p 41 t 127. Cbim. inlinn. 8 p 4g3), caule fui-licosu, folns oblongo-elhpticis iniegeirnni* inarginé levolntis juuerone abbic-

(i) hx icoue ramuh uon hispidi et folia apice denticulata, ex descr ramuh bispidi et folia integernma' An forte diversa; An stirns ^a_b Bocotensis a Caracasana diversa^ Conf n 25. (DC)

- viato calloso teiminatis, supia glaluis, snbtus adnei vos venas calycesque pilosis, cooilis glabris, biacteis bifoimibus lineanbns et oblongo-arutis. A in' mon-
tosis Brasilia! capitaniae Minas Ceraes (Pohl), capitaniae Sanct<E>Catharina>
(Gaudichaud'). Corolla ventricoso-cyhndiica 5 dentita Bacc.c xo-sulcata?
luagnitudine pisi, glabrae (v. s in b. DC coiuni a cl Gaudib **
5. G. DKPENDEWS (G.Don gen syst 3. p. 85₉), larais angulosis tomentosis, foliis ovatis mucronatis cinereis, flonbus axillaiibus aggie^atis, segmentis, calycims ovalis acutis. 3 in Peru Yacuuium dependeus Rni7 u L>av. in hei'b. Lamb.
I olia pollicaria
6. G.? SUBCORDJLTA, r. irais subteretibns costato-sulcatis glabns, foliis subbonnosi-
!JS subglabns bieviler petiolatis coidatis snbcoidatisqne ovato-ellipticis^ margin-
e snbrevolutis discolonbus mucronatis, mncione anenlau m'aiccsrente
ideemis siinphcibna erectis foliis doplo tuplo'e longionbus A m Pemviae
provinciâ Ghacbaoyas Habitus Buxi baieanc. Rainali subpubescentes Folia
q IO lin louga_f 4-j-lin lata , subtus pnnctis nigrescentibus coaspersa* iu-
mora subtus albo-cineiea, supia vjiidia, adulta sabtis viresentia , supia' lu-
tescentia m specimimbas siccis. Pedicelli cum calycibus articulati. Fiuctus non
vidi. An Tbibandiae spec? (v. s. in h Boiss et Moiic)
7. G. CRENATA (D [Don mss mheib Lamb ex G.Don gen syst 3. p 850\ iamis
teietibus tomentosis, foliis oblongis acutiscrenatis.llonbusaggregatis, segmentis
calycinis ovatis acutis. 5 in Peiu. Tolia 1 | poll, longa. Moies coccinei.
- 8 G RUGOSA (Cham, et Schlechl. in linn. i. p 534. 8. p 4qi), caule fioticoso
lamisbispidis, foliis oblongis xetusis rugosis maigine levolatis supid scabris!
snbtus hiusutis, racemis secundis cernuis glanduloso-hirsutis,coiollis cylindra-
ceis ^ in Brasiliâ tiopicâ (Sellow).— Folia sesquipollaciaii, latit o-hneaii.
Calycis dentes angste aeuminati, o\ano longioies. Coiolla uiceolato-tbulosa ,
ad angulos et in laciniaium apicibus hirsata
9. G RHODODENDRON (Cham et Schl. in linn. t. p. 533. Cham in linn 8. p
49^h)^ Juilicosa ramosa, ramis luspidia, foliis subglabns ellipticis basi angustatis,
petiolis pramosis , laceuais secandis ceinais, coiolbs cylindiaciii X in Biasi-
lia tropica (Sellow) Drnpa exsncta magnitudine ftuctns Pipeus nigri.
10. G PSEUDO-VACCINIUM (Cham et Schlecht. in linn. 1 p 5^o Cham in lin.
«. p 40,i), fiaticosa glabeinma pubescensve, folus. ellipticis laiueolatis lace-
mis ereciis secundis bracteatis, corollis cylmdrateis, ovaiio glabio vel fabres
cente 5 in Biasilia tropita; locis jpeitis alienosis (Sellow, Aug. St-Hilaire'i
r.K St,9l VO7' 11 * o m 2P 406 Andromeda Nenw icis. bras. 1 . p
84 Andromeda coccmea Schrad in Ocett. anz 1821. a. 09
- a. *glabra*. — in serra do Fiiro piov. Miuai Gener (Vanthe.! heib. n. 1.)
'VacciDinni Luisiliense Spieng nov prov p 42. syst 1. p. 21a. *
0. *pubescens*, calycibus coiollisquc 5 denlatis (> s in h DC)
11. G MYRIFOTIA (Cham, in liu 8 p. 494), fohis petiolulatis obovatis lan-
ceolatis acutis apiculatis, apicnlo ohtuso calloso, toto ambitu in maigine ie-
flexo seiruldtis, consistentia lauiinis, planis pollicaiibus, lacemis keřmesini
subsoltariis snbciniinalibus eiectis 'oliuin superantibus, lannus calvin"
hrevibus, coiollâ ventucoso-tbulosâ. J in Brasilia intia' tiopica (Sellö 5*
Ramuli novelh pilosi, cito calvescentes f_olia novella toto arubitri ciliat
snbtus cinnaraomeo-lutescentia, costâ piominulâ cum peliolo pilosa. **
- 12 G. SALICIPOLTA CCbam. et Schlecht in linn 1. p 532. Cham in] 1 n o
4p5), fiaticosa glaberuma pruinosa, foliis oblongo-lanceolatis flonhns'c P
lindraceis subternis. 3 in Biasilia tiopica' (Sellow) — Racemus 'coloratus ses"
silis pollicans spsquipollicausque
13. G LAwCFOLATA(Blu_m bijdi.p 861)• CAUU (pscudo?)parasitico, foliis oblongo-
lanceolatis acummatisimiscouaceis glabns snpià reticnlato nervosN inlratnpli-
neiviis, racemis axillanbus simplicibnscalycibusque tomentosis, p^dedicellis basi
tribractealJS. 5 in Java; sylvis umbiosis supia arboies. Floret pei tofum annum.
- 14 G. DENSA (Cham, in linn 8 p. 496), foliis anticè snbinconspicae obtuse

- crenulalis, mucione subiecto, inflorescentiis coloziatis kerme*ini&, laciniis caiycims ttiangnlanbus, filamentis quaitae longitudiois antherae glabtis. £) in. Bidsiliā aequomoctidli^SellowJ.—Rainuli petioli, peduuculi pedicelli canescenti-pilosu-pube&cenies. Biactae calyce&que cihati. Corolla; glabta*, in ncivis ranter pi loss
- a. foliis aculiusculi* nunc planis mine convexis, uucrone ciasso rubescenle lariū mamfehle incuivo.
 - yf. foliis planis, coiollu. bievibub.
 - y. rdinis stiicioiibus subvngatis
- i5 G MYRTILLiDEb (Cham, in linn. 8 p. 4g3), foliis antrorsiim aigute serratis mucione biihiceto, iniloioscentiis keimesnm, laciniis calycinii lanceolatis quaitā COIOIP longitudine, ill.^owentis LILHIS longitudue anthcice. ^ in Bu-^osid iatei tiopjoa (Sellow < — Kamuli, petioli, pedicel 1L ovaiidqut* biili, pilia loogit pitt*ntissimis dblis_t infloifbcentiac glaaduHfeii&. Bracteas calycesqae pec-tmato-ciliali Habitus Vacc. Mytilli.
- x6 G. rLLIDA. (Chiin. in linn. S p. 49Q)_r ramis cicatiisritis_f foYils sabsessillibus inte{yeumis} sjepius acinis pube plnnlulosā veslitis ciliatis, mucrone icflcxo albido, floribiib pallirlis, biacteis foliareis \indibus longitudine floinn, biac-teolis subfoliaceis linceol.itis sub calyce sitis, laciniis calycinis lanceolatib tertiaB cirriter coiollac longiludinib, Jilarueuhs villosis quaia? antbeue longitudims. 3 in fiasilid ocqminoctiali (Sell >w), et lejucō pio\). Min. Genei CVaulh! heib. n. 4J — Folia supid intense vindia subnitida, subtus obscure feiruginea. (v. a. iii h DC. com in. à cl. Vauthipi) *
17. G AHGUSTIFOLIA (Cham, in lni. 8. p. 4QC)_t lamnlig petiolisqe coloratis , iniloiestenti's cum calycibus pubescentibus, foliis coiiaeis liieaii-lanceolalis , in peliolum brevi^iUum angnstalii, apice acute callosis, niargine ieflexo snb-inoonipicue sennlato oienulatis> discoloubus, supiā soidec vindibus, racemis axillaiibns hubteirnidlibuscue eiectis folia superantibus, bracteis infeuoibus biacieoli^que oilidtis, coiollis cylndiaceis in nenis pnbeiulis , filamenlis vil-loris anthers bievioiibus. 5 " Biasiliā a?quinociali (Sellow), ad Corcovado prov. Rio-Janeiio (Vaatb ! exs. n. 5). (v. s. in h. DC. à cl. Yauthier.)
18. G. piniForiA ^vCham et Scblecht. in linn. 1. p 536. 8. p. 500) , fruticulosa spitbamaea glabeuima piuinosa, foliis linearibus utnnqne acniis crenatis, ra-cernis abbievidtis x 3-floris, corollis urceolatis. ^ in Biasiliā tiopicā, inter Musoos etLichenes crescens (Sellow). — Rractae paivae, ovatae acutsc glando-loso-serratoe. Floies ceinui. Corolla angalo&a uiceolata denlala , dentibns erec-tis. Racemi, peduncuh, pedicelli, bracteae, calyces ovauaque, intensē kerme-sino colore tmcti. Fiutex J-i-pedalis.
19. G. SERRATA (Lindl. in RoyI Illinstr. p. 357. t. 79. f. a) , caule fiuticoso, foliis anguste lanceolatis senatis <cutis rigidis coriaceis nitidis bievitei petiola-tis appro&unatis, biactfis coloratis. subulatis, racemis axillaribus pancifloris , floubus maicesrentibus longē pedicellatis albo-vhidibns. fy in inontibus India? oientalis. Thibaudia senata Wall, cat.n. 6299. Agapetes senata G. Don gen. syst 3. p. 86's ex Royle.
- *# *Cotollis campanulatis.*
20. G. PSEUDO-GAULTHERIA (Cham et Scblecht. in linn. 1. p. 555), fruticosa, ramis hispidih strictis, foliis angu&tis elhpticis subcordatis utnnquē scftbris, ra-cemis nulliflois secundis erectis biacteatis hispidis, ^ in Brasiliā tropicā.— Folia suprā atio-vindia, snblus cinnamomeo - feirogmea. Bracteae foliacese lliomboidco lanceolata: longitudine floium. Diupa exsucca depiesso-globosa , io-costdia, bispuid. (s. in h. DC. coinm. à cl. Sellow et Lund.)
21. G. DECIPIENS (Cham, in lin. 8. p. Soo), ramis hirsuto-pubescentibus, foliis coiiaeis eShpu'rii obtuttis basi attenuatis dpice obsoleto cienati-i, lacerais se-rudi> eicclis.,lobis calycinis triangulaiibus acuminatis, coiolbs campanulatis, angulis pilosib, lobis euctis triangulaubus. J m Brasiliā tropicā (Sellow). G. boxifolia Cham, et Schlecht. in linn. x. p/528. nee U. B. et K. Diversa k

- G. imbiūcata Pobl. Folia subtūs glabra, nervis pubescentibus. Corollae albae campanulalae, nec tubulosae lubiae nt in G. buxifoliae H. B. et K.
22. G. AMSWA (Chain in linn. 8. p 501), ramulis petinlis inflorescentiisque tenmssime pubtmlis, ralyeibas plabiis* biacleohsque subgl.induloso-rihatis, fobis iiibcoilaceis biewssimc petiolatis, breviter calloso nmcionatis, niatgiur leflexo antice ieuulatis, subtūs nmoso-puiictatis, noi \o \eniqne utiinque conspicais, lacemis snbtei minalibis eectis elong.itis folioso-bracleato, laci-niis cafycinis ovahs acuminatis, corolla canipannlatā glaluA, ilamentis cilia-tis dimidise anthcra longitudine. & in Brasiliā iulei liopicos (SellowJ.— Fro lex 6-pedalis. Coiolla alba
- A. foliis cuneato-obo\atis lotnnd itis
jS. foliis angustioribus basi obtusioiib* apice aculioiibut> oblongis et lan-ceolate.
23. G. INCAWA (Cham, in linn. 1. p. 536), fiutulosa incano-toinentosa pbeseus se!>quipedalis, folns oblongis margine revolutis, lacemis paucifloris biac-teatis ieumdis bispidis 5 inftiasiliā tiopicā (Sellow\ Biatlex Kinccolatae.calycc longiores, floie bievioies.. Coiolla dense pubes>cens, lacimis reflexis.
24. G oLFArOFTA, 1 amis glabiis tiwicis, ramulis inbigmosis, folns oblongis basi attenuatis breMtei petiolatis aculis seiiaiis inucion.ilis, seriatiuis mucro-neqne rallosis, margine subievolutis subdiiliigincis glabeirimis, supra' \11id1-biib leticol ito-\rnobi», subtus lscibus vix. nei\osis albo-inft'sctnnbui, lacemis fiinplicibus axillaiibus fobo longioiibus. ^ 111 monte Sena do Trio capitanioc Mmas GeraesBiasiliac (Vduthieij. Peduncuh biatteati. Floica setundi. Coiolla; bractcatac. (v. s. in b. DC. com in a cl. "Vautbier.)
- } *Species corollis fructibinve ignotis subdubiw, à DC. monogra-phic Dunahanc adjecta.*
25. G CARACASANA (DC. herb), fuitcosa, ramulis molliter hiiMitis, lamis tardē glabrat, foliis confertis elliptico-oblongis margine subipvolnlls utiinque obtusis glandulā fuscā teinin.uis siibintegeiiinis, subtus glandulo&o-punctatis neivo petioloqr hirsutis , supta vis in nervo medio subpilosis, lacemis bn-sntis folio feic brevionbus, biacleis coloziatis glabiis, calyce bispido ^ cncā Caiacaslegit cl. Yai^as. G. bnxifolia var. Dunal ' in h. DC. G. bnmfolia var. Kuntb? Bincteac rubiae. Coi ex immaluro statu fortècanapanulat-c Folia 10 bn. longa, 4 lin l<*ta, coriacen siibtūs pallida —Differt à desc. G. buxifob.T Kunth ramnlis petiolisque hiusutis nee hispidis , toliis non stirrtd seusu integerrimis , husulis nee pilobO-pubeacentibus, paulo majonbus, calyiii pilis 11011 glandu losis. Etabicone Runtb tamulis petiolisqe evulentlui hiusutis, foliis luajoiibus inulto magis senatis. (v. s. coraui. a cl. Yd 1 gas)
26. G. HISPIDA (DC. herb.), ftntcosa rauiosissima, ramnlis petiolis foliis bine inde et pracsertim snblūs in ner\o raedio pedioplbs oalyoibusque sparse longe et iigi-dnlē hispidis, foliis elliptic!* basi attenuatis apice seriulahs et ^lnndulā fnscā termmatis siibtus pallidis vix punctato-qlandnlosis, biacteis oblongis ghtiis. 3 m Brasilia; Sierra da Piedade Irgu cl 111ml novcinli fuict. Coi. mihi ij>n. veio&innliter ex reliqmis rampaTinlatae. Folia h-7 lin. longa, 3 | lata. Attims videtur G. decipienti, sed hispida ner husuto-pubescentis, folia supeine vix vc-tnta glabia sed potius bispidula evidenlius seuata. (v. s. coinm. à cl Lund.)
27. G. ADENOCHIETA (DC heib), fiutcosa, ramii glabris, lacbibut, minntē pu-bescenti-velntinii, folm elliptico-oblongis niiinquf obtusis maigine subievo-lutis et int^geriimis supiā glabiis siibtus in ncivis minutē pubesrenti* velutims glandulā sessili termiu.ttis, bracteis lanreolatis pedicello dnplo biiigionhns in Juiiciouem setosum glandulā tcimin.itmn pioductis. \$ in Ria&iba; bumidis i\d Aiaiaocoia mai. floi. legit cl. Lund' Fiutex 4 6-pedalis FIOIPS coccmei in *pecim meo desiderali. l'oha 20-22 lin. longa, 7 lin lit.i (v. s à cl. Lund.)
28. G. OBSCURA (DC. herb), fiutcnlosa, raraib lamulis peliohsque deuse fnsco-velotmis, foliis bieu'sume peliolalib couleiris elliptico-oblongis margiac revo-

Intis et integerninis glandulā subrecurvā terminatis, suprā ad mainges \cln-
tiuis , subtis in nervo velatinis et caeteum glabris punctato-glandulosib, lace-
inīs folio longioribns, biacleis o\atis mucrone apicalatis doiso pubescentibns
ct gl.indilosij. , Cdlycibns pubescenti-velutinis, coioli* ovato-cylindīus. £ in
Biasiliae Sidia da 1'edade novemb. floi. legit cl. Lund ! Accedit ad G. mca-
nam. Folia 9-10 Iin. longa, 4 Iin lata. (v. s. comra à cl. Lund)

39. G itPTOBOTRYs, qia bema, lamnlis obtuse et racibus. acutē angnatis,
foliis bievitei petjolatis ovatii basi coiddtii. apice mucronatis integerriinis co-
naceis reticulato-venulosU, racenr̄ axillaibus folio tuplo longioubus circitei
2O-floiii» sub&ecundis, bracteis bracteolit<que ad basin pcdicelli subalati&, cor.
oylindiaceae lobis reflexis brevibas. J in Biasilise Siena da Piedade noxemh
floi legit cl Lund! Calyx 5-iidus acutus persislcn̄. Fiuctus (ex statn juniore)
^ublotundus apice umbilicatus subcosiatus iuii basi ovano subadhaerens? lo-
cnhs 5 monospermii Anlberfe apice pioudtac muticae biporosaj Glabritie
except 'a iefrrt iconem Andioniedd* subiotundse Pohl pi bras. t. 121 et foite
cam eā ad Leucotboem refeienda? Afimr̄ etiam videtui Gaylusbacia? iinbri-
catse. (v. s à cl. Lund)

IV. ANDREUSIA *Dun. nee Vent nec Spieng.* (1) — Peyiusa Rich in herb. De-
lessert nee DC. — "Vaccmh bp. fVikstr. guad Jl. p 63 in Kønigl. act. vec.
acad. Holm.

Cnlyx coriaceus antē antbesin ovoideus subclausus corollam mapcr-
tam tegens , in anhesi cupularis, 6-dentatus, laro 7-dcntaltis , den-
tibus acuhssimis mucionatis mmginatis, ovano basi adhacrens Corolla
antē anthesin vnlvata, ovoidea, per an the-, m cylmdrica hubcanipanu-
Jata ralyce duplo longior 6-7-tidd , laciims oblon^is acutiusculis, basi
membranā pbcatā tenui junctis. Slamina lobiscor. dupla , cotolln duplo
breviora. Fi I amenta subplana ciliata antheiis paul6 longiora. Antheiae
hiloculaies, loculi b.isi ventneosi pollmiferi, apice in tubulos breves
angusti stenlesque producti, apice dehiscentes, saepē adbacentes. Dis-
cus epigynus cupulaus. Ovarium adhaerens, cupuliformc, disco epi-
gyno calyceque coionatum, 6-loculare, locubs oligospennis. Stylus
i-cylindiicus , subclavatus rectus , corolla vix longior persistens. Fruc-
tus non vidi. Ex Wikstr.Bacca lato-ovata limbo calycis coronata extiis
scabi iuscula polysperma.

1. A. GUADAIUPENSIS, raule frntiroso, lamis glabiis snlcatis fusco-rubisinośn,
foliis bievitei petiolatis ovalo-ellipticis ntnnquē attenuatis integeinmis acuroi-
natis supia glabns vnidibus, subtus leticulatis 5-7 pennineiviis rnfesi<entibns
lomento leproso vix conspicuo, lacemis glabns simplicibus» termindlibns. J
in montibiib Gnadalupae (Foistiom ex Wiksti. 1 c. Perrottet').—Peyrusa Roye-
noides Rich m berb. Delesjert. "Vaccinmm? Guadalupense Swarl7 berb ex
Wiksti. guad fl. p 6J. inkong art vet. a< ad. Holm —Raceim >5-polltca-
les, pedicelli incia&sati fiuctifen s.epius enrvtati. Bacca lato-ovata, limbo caly-
cis coronata, extus scabnascala, polyspeima. Folia x i"^\ |>o||. longa, gln.
1 | poll. lata. (v &. in h. DC. coimn. à cl. Perrottet.)

V. THTBAUDIA R et Pav. Jl. per et chii. t 4. mss (ex herb Thibaud) Jtuune
Saint, ndatre Jam. t. p. 36a. H. B. et K nov. gen. am. 3 p 268 (exclus.
syn Cavmum) G. Don gen. syse 3. p 860 — Cbupalones Nieremb. — Cbu-
palon- Adam, fain pi a. p. 164

Calyx scini-adhaerens tubuloso-uiceolatus hrevis subconaceus, limbo
5-partito, parltiombus dentifornnbis eieclis pcrsislentibus. Coiolla

tubuloso-urceolata 5-dentata carnosa. Stamina decem ; filamenta brevia compressa linearia glabra, mine libera, mine monadelpha. Antherae elongatae, bilocularis, basi liberae, inedio adnnta?, supernè libeiae furcatae, id est loculi supernè segregati in tubulos vacuos elongati, rimâ longitudinali debiscentes. Discus epigynus subintegger, obsoletè 5-dentatus, vel 5-gonus. Bacca subglobosa, subangulosa truncata, calycis Hmbo carnoso-coriaceo 5-parlito coronata, 5-Iocularis, loculis polyspermis. — Frutices; caules erecti diffusique ramosissimi. Gemmae floriferae axillares terminalesque bracteis squamosis coriac.eis subiotundis Imbricatis tectae. Folia alterna coriacea sempervirentia, breviter petiolata petiolis ssep6 contortis, saepiis integerrima, interdiim denticulata vel serrata. Flores racemosi vel subumbellati pedicellis unifloris bi brae teat is, saepc cernuis interdum secundis. Gemma3, squamae, bracteae, racemi, calyces, corollae et baccae saepè rubicundi coloris. Baccae sopore gratae acido donatae.—Genus Cera tostemati affine; sed difleri: calyce minori tubuloso urceolato, limbo brevi 5-dentalo; corolla minori tubuloso-urceolata, anillicarum loculis rimâ longitudinali debiscentibus; bacca calycis laciniis carnosis coronata.

- i. T. PEMARGITATA (R. et Pnv. fl. per. iss. ex G. Don gen. syst. 3. p. 861. n. 7), caule fruticoso ramoso, foliis obovalis subovatisqne obtusis emarginatis coriaceis seimpervirentibns margine revolutis, subtus a Ibid is punctato-pilosus, suprii oitidis, pedunrulis solitariis nxillaribus unifloris dependentibus purpureis, corollâ conicâ ventrioosâ, ore miniino 5-iido albo. J in Peruviac Andinin neiouribus, ad Pillao et Cb;icabuassi tractns, in locis saxosis soli ex posit is. — Frutex biulnaris. Corolla 3 lin. longa. Folia sesquipollucaria, trinerviu, basi acuia.
- a. T. MELLIFLORA. (R. et Pav. fl. per. mss. ex herb. Thib.), caule fruticoso ramosissimo, foliis oblongo-ellipticis obtusis intcgerrimi.s coriaceis utrinquè pnbesceribus suprà nitidis snblis palidioribus subscabriusculis margine rflexis, racemis axillaribus solitarii simplicibus pilosis, laciniis calycir.is lalissiinis brevissimis subnullls, coroliis ovatis puniceis. ^ in Peruvi'e Audiui nioulibus frigidis, saxosis et glareosis locis, copiosè ad Pillao et Cbumpallana tractus.—Dun. vacc. ined. t. 7. Th. mellifera G. Don gen. syst. 3. p. 860. *Puechato sumacmisqui* incolarum, id est florum fasciculos incarnatus optirai mellis. — Frutex biulnaris, ramis diffusis dependentibus. Stamina monadelpha. Sexina minima albiantia. Uujus plantae flores succum nielliferurn copiosum continent, quera Indi avide sugunt, undenomen plants, (v. s. in h. DC. ex h. Thibaud et in h. Lamb.)
3. T. FLORIBIDA (H. B. et Kuntb nov. gen. am. 3. p. 269. t. a54), ramis lere-tiusculis laevibus cinerascentibus glabris, foliis oblongo-lanceolatis aenminialis reticulato-venosis, racemis axillaribns solitariis subbipollucaribna basi bracteis iubricatis cinctis, calycibus corollisque glabris. ^ in inontanis Novo-Granatenibus juxtlâ Santa-Fé de Bogota, alt. 1500 hex. Corolla coccinea. Pedicelli longissiuui. Bractese ad basin pedicellorui nullae ?
4. T. LOIJIFOLIA. (H. B. et Knth nov. gen. am. 3. p. 269), ramis pentagonis lievibua glabris cinerascentibus, foliis elongato-lanceolatis aenminatis basi obtusis reticulato-tripli aut quintuplinerviis, racemis foliis duplo brevioribus, calycibus corollisque glabris. j in Andibns Quindensiunj propè la Seja, alt. 1580 hexap. — Folia 7-pollicaria et longiora.
5. T. BreoroR (R. et Pav. mss. fl. per. t. 4. ex herb. Thib.), canle scandente ramosissimo, ramis longissimis, foliis breviter petiolatis oblongo-iauceolalis apice breviter acuminatis acutis integerriniis subcoriaccis supra nitidis venoso-reticulatis subliis rcliculatis pHIdioribus, margine subrevolutis, tri-quinque nerviis, racemis solitanis bipollucaribus, pedicellis longis puniceis bracteaiis. t) iu Peruviae Andium montibus iVigidis ad Pillao, Acomayo, Chinchoa cc Miiha. — Duu. Tact¹, iued. t. 8. — Thibaudia cuarclala R. et Pav- fl. per. et

56a

DICOTYL. SEU EXOGENJE.

Tribaudia.

- chil. 4. t. 3rt5 ined. ex Don gen. syst. 3. p. 860. *Puechato del monlc* incoia-
rmn, id est florum fasciculus mcurvatns moutanus.—Frutex 4-6-ulnaris,
glabci *Coiolla pollicans* subcyhnduca, ad medium faucemque coarctata pu-
ruea, supci nu alba, ciassi. Bacca rubicunda, Avellanae mtgmtudie, subglo-
bosa calycis limbo coronata. (v s. in DC. ex h. Ihib)

6 T. FALCATA (H. B. et Kunth nov gen. am. 3 p 269), lamulisiscvibus glabris
fuscescentibus, foliis lanceolatis petiolatis acuminatis apice falcatis basi acutin
inlegemmis reliculato-subqntintuplinerviis, 1 ace mis solitariis folio dnplo bie-
vionbus , floibus longe pedicellatis. fy in fiiguhs jnxta urbem *Ahnaguer*
Novo-Granatemium, alt i500 hex. Calyces corollaeque glabri. Folia 9 pollice^
longa.

7. T. PiWDULpLORA, 1 amis fuscis glabris stnatis, foliis breviter petiolatis ellip-
tico-lanceolatis acnmmatis reticulato-quintuplinerviis glabus snbtus punc-
tis inimis mgnscnspesis, raceme axillaribiis solitariis brevibus glaberumis
foliis tnplo mmouibus, pedicelli* elongatis pendulis ^ ad Caicas legit el.
Vargas¹ — Folia 3-4 poll, longa, 1-2 poll lata, acumen lectum vel fal-
catum Liuibus calycinus 4-lobatus subbilabiatus glabenius submembia-
ruceus Pedicelli bibiacleolati, apice Incrassati, semi-poll, et ultia longi.
Coiolla tubulosa 5-0 Iin longa Discus epigynus annularis integer, ^v. s. in h.
DC comm a cl. inv.)

8. T MACROPHYLLA (H. B. et Knntb nov. gen am. 3. p. 270), caule fnticoso ,
ramis Iambus glabns fnscis, foliis ovato-lanceoldtis acuminatis basi rotundatis
retiMilaio-quintuplineiviis, lacrmis solitariis subsessilibus foliis triplp
plove brevionbns \$ prope Pmdanum et Palace, alt 1000 hex. in AnchbusPo-
payanensis. *Uva camaronia* incolarm — Iolia 8-9 poll, longa. Floies longe
pedicellati, subfastigiati, magm Calyces rubii coiollaeque glabri. *Coiolla*
tubulosa alba, interne ventucosa et rubra. In provincia Pastocnsi, ex ea
vjium expriuiit.

9. T. RortsTRis (H. B et Kunth nov. gen. et sp. 3. p. 270), canle fnticoso ,
ramis fnscis pubescentibus, foliis petiolatis lanceolalis obtusiusculis bnsi acutis
lelicnlato-venosis, snpiä glabris, snbtus pix&ertun in nervo puberiilis, lace-
inis solitams tu-quadri-poJlcaibns. /jm Paiamo de Saiaguia piope Loxa et
Alto de Pulla Novo-Granaten*iuin,alt 1560 hex. Bacca &ubglobosa 5-g-locu-
Jans; semina minuta mtiJa.

10. T. NITIDA (U B. et Kunth nov gen. am. 3. p. 271)1 raranlis trigoms f
sulcatis? glabris fuscescenlibus, foiiis oblongis obtusis basi lotnnndatis snb-
quintuphneiviis integuimis coiaceis nitidis, racemis solitauis subsessilibns
folio brcvioiibus basi in\olucratis, bracteis magnis subiotundo-ovatis obtusis
concavis integerrimis coloratis glabris deciduis. J in dechvitate onentali
Andiuin Quinduensium alt. i500 hex. — folia subtus punctis roinatissimis
conspersa, 4-polhcaria, sestjiuipollcem lata.

ii- T ALATA, caule fnticoso rainosissimo , ramis divaricentis Iongissimis teneri-
bns quadialalatis glaberiiimis, foliis cordato-oblongis obsolete dentibus rans
'nmotissimis denticulatis coriaceis venosis glabris supra nitidissimis, lacemis
tohtariis geminis\ e folio brevionbus basi luvolciatis ? sqnamis unbiicatis ova*
*** concavis villoiis peisalentibus. ^ in Peruviae Andiuin montium faocibut
¶ U altls fn bldls — *Andiomedea alata* , Vacciniunx alatum (Herb. Do in bey).
— fnd Udia cauialala R et PdV fl- per. t. 4 ined. t 386 ex G. Don gen. syst. 3.
P* ?-1.) — I'rullex 10-01 gyalls Folia 4 poll, longa. Calyx rnbicundns mtidua
gjbeinmas. Corolla cyhndnca, ptinicea, glabia, carnosia , nitidissima. Bacca
dilute tosea Cerasi magniludie. Stamina monadelpha. (v. s. in h. mns.
Par.)

ia. T. DIPHTILLA, rarais glabris nitidis sulcatis, foiiis snbsessilibus ovato-oblon-
gis acutis gemniis (altero paulo minoie) coriaceis obsolete senatis, dentibns
lans minimis, geminij, florahbus squamosis parvis axillaribus, lacemis brevibns
4-6-flons, pediceliis alatis bracteolas a grentibus uniflois, coiollis uiceolatis.

- 5 circa Huaso Huasi et Paleo in regno Peruviauo (DombeyJ). — PeduDenli Mibpolhcares, crassi. Calyx interdūin 7-dentatua. (v. s. in h. inns. Par.)
13. T. EIXIPTICA (R. et Pav. fl. per. et chil. ined. torn. 4. t 384. fig- *. <?x G. Don geu. syst. 3. p 861), ramis angnlatiſ, foliis oblongo-ellipheis maigine revolaliſ, flonbus aggregatis, segments calycmis aculis bievi>simis. £ in Peru.— Folia 3 poll longa basi attenuata, broiler petiolata, penuineivia. Pedicelli 1.1 poll, longu.
14. T. MORICANDI, ramis fnscii, ramulis subangulatis snlcnlis pobescentibus, foliis bievitei petiolatis idnceolaLs subintegiis maigine subirvolutis subcartilagineis subundulalis acutis saepe apice eioso-tiuncatis, racemis scssihus axilaribns folio brevioribus, pedicelhs snlumbellatis basi biacteatis, capsulis orollisque extùs husutis. J in Peru (Mathews). Limbus calycmus 5-fidu>laciniis latis brevibus acutis. Coiollae coctineae 5-dentatae (v.s. in h. Moricand.) .
15. T. SERRATA, ramis foliosis terelibusfla\escentibus pubeiulis apice subtoraen-tosis pilis cineieis, folus peiiolatis ovatis elliplicis vel ovato-oblongis gios. se 6enatib reticulato costati* lugosis, snblus> cincico pubes>centibus, racemis simplicibub axillaribus iubigmoti& huicteolati pilosiuiculis, calycibua pilosis, corollis extus subglaibiis. 5 " pro.iucia' Pciuviaua' Cbaçapoyas. — Lobi calyciui acuti rnbifiinosi extus pilosi. Coiollae tubuloso-ventucosai 5-dentalse coccineac. (v. » in li. Bojsser et Mori cand.)
16. T. CORUIFOLIA (H. B. et Kunth nov gen. am. 3.p. 271. t. \$55), ramis teietibus, junioribus sulcatis lesmoso-nitentibus, foliis leviter coidatis ovatis obtnsis integerriinib qnintuplo-vel septuplo-nerviis glaberrimis suprā nitidis, lacemis solitaiiis sessilibus folio \ix longionbns bisi in\oluciati», bracteis arete iuibiacatis suborbjculalis maigino integei riinis iubacaiioMs. 5 " AndibusNovo Gianatem, alt. 1200-1400 bex.— Gemmaeflorales strobilifiroes. Co 1 oil a tubuloso-ventricosa exteine pubescens, limbo 4-5 6-lido lacimis ovatis obrusiu&cnlis. Stamiud corollas lobis nuinerj dupla, filamenta bievia basi leviter cohserentia.
17. T. MLLASTOMOIDES (H. li. et Kuntb nov. gen. am. 3. p. 273), caule fruticoso, ramis teietibus laevibus fuscis nitidis, foliis oblongis bieviter acuminatis basi lotundatis subcoidalis reticulato-quintuplineiviis, laremis solitariis tn-pollicaribus folio brevioiibns, ante anthe&iu btacteis imbucatis tectis. £ .Hab» cum T. cordifoliā. Corolla tubulosa glabia infeine \entricosa lubra', limbo 5-iido viidi, laciniis obtusis.
18. T. STROBILIFERA (H. B. et Kunlh nov. gen. et sp. 3. p. ^7^), caule fiuticoso, lamis obtuse angulatis laevibus, ramulis pubernlis, foliis oblongis acucinalis basi lotundatis leticulato-tuph aut quintuplmerviis, raceuuſ ses&ihbus folio bievioiibus, gemmis floialibus stiobihfoinibus sessilibus ovato-ellipticis subpolKcaubus. ^ m fiigidis Novo-Gianateusicon 1600 bex.— Bracteo lacemuin ante apertionein in\olucrtiute-, suborbiculatae, apice rotundatie, aictc imbricatae, coloatae, glabias, exterioies bievioie<*, deciduaa. Calyx cotollaqne glabri. Corolla tubulosa infernè venliicosa lulna. I'oha subtùs punctis minutissimis conspersa.
- 19 T. BRACTEATA (R. et Pav. fl. pei. et chil. 4. t. 388 ined. ex G. Don gen. syst. 3^ p. 360\ caule fiuucoso lamosissimo, ramis subscendantibus diffusis, teneribus bubpnbescentibus angulalis lime inde pmpureis, folus ovalis vel oblonco-ellipticis abiupte acnmiDatis acuniine obtuso, ieticulato-tii-quintuplmerviis saepe retroflexis, supia nitidis vindibus, subtus glabnusculis mfescentibns. punctis minimis nigns conspersis, lacemis subsessihbus bievibus, ante aper-tniam braclds conateis imbiicalis teclis. £) in Peruvian Andiu'm montibus altis fiigidis. — Dun. vacc. ined. t. 5. Andiomeda tiinervis, YaLcinium tri-neive (herb. Dombe\). Fnitcx biulnaiis. Folia sesqnipollicarin, 6 hn. lata* Petioh lineares subcontoiti, purpurei. Gcmmas iloralcs biarlcis squamosis subiotundis concavis submerabranaceis imbucatis tctre. Pedicelli breves% biacteis totidem oblongis membranaceis concavis obtnsissimis rubris, coiolla paulu brevioiiba* 6Upati. Corolla subtubulosa lentneosa lucarnala,

ore parvo 5-fido albo, calyce 4-plo longior. Bacca rubia. (v. s. ID herb. DC. ex h. Thib. in h. Lamb, et b. mus. Par.)

no. T. SCABR!USCI)TA (H. B. et Knllh nov. gen. «ro. 3. p. 272), caule fruticoso, ramis terefibus scabriuscis, ramulis pubescentibus, foliis oblongis acuminatis basi rotunda tis subcordalis quintiplinerviis supra punctato-scapul'psenlis sebiis in nervis pinnatis, racemis sessilibus ante anthesin in gem in is strobililibrinis inclusis, calycibus corollisque pubescens. /) in Andibns Quindueum. alt. 1500-1600 hex. — Dacca depresso-globosa, magoitiuline Pisi, cano-pubescentis. Folia bipinnata, 9-10 lin. Iata. T. strobiliferaj proxima.

31. *T. PUBESCENS* (H. B. et Kunth nov. gen. *t sp. 3. p. *73), caule fruticoso scandente, ramis teretibus rubiis, ramulis trigonis leviter striatis birto-pubescentibus, foliis oblongis aut oblongo-ellipticis acuminatis basi rotundatis reticulato-quadrangularibus aut spatuolatibus supra glabris, subtus calycibus corollisque j)ubescens, racemis sessilibus in gem in is strobilifloribus ante anthesin inclusis. 5 j)at Caracas, alt. 700 hex., item in regno Novo-Granateni, 1700-1800 hex. — In planta Caracasana, folia oblongo-elliptica reticulato-septentrionalis, quinque-pinnata et duos pollies Iata. In planta Novo-Granateni, folia oblonga, quintuplicata aut septuplata, sub-7-pinnata, a 1 poll. Iata. Corolla albo-rubescens.

32. *T. TDNCTATIFOLIA* (R. et Pav. II. pur. et chil. 4. t. 387 f. a ined. ex G. Don gen. syst. 3. p. 860), caule fruticoso, ramis diffuses procumbentes longi, isimis obtusatis nitidis subpurpurascens, foliis deflexis obtusis Vugo-ellipticis abrupie et breviter :cuinutis margine subievolutis utique pinnatis, punctis minimis numerosis pellucidis reticulato-5-7-nerviis, gemmis axillaris globosis, racemis post anthebein folio longioribus. ^ in Peru vine Andimii uernaculibus. Tb. punctata Dun. vucc. incd. t. 6. Andromeda punctata, Vaccinium macropli limn herb. Domb. — F. mi ex. 4*orgynnis, glaberrimus seniperirens. Folia 4-5 poll, longa, a poll. Iata. Corolla ovata Ineo-virebrens. (v. s. in h. DC. ex h. mus. Pav.)

23. *T. QUEREME* (If. B. el Kunth nov. gen. urn. 3. p. '274. t. a5(i), caule fruticoso, foliis ovato-ellipticis acuminatis basi acutis reticulato-quinquiplinerviis, racemis calycibus corollisque glabris. f. Hab. ut incolae perhibent, in loco unico juxta Culi oppidui in Columbiae prov. Chocoensi, alt. 600 Lex. — K'oli glabeniraa 3-3 | poll, longa, 16-17 lin. Iata. Racemi bracteati. *Quereme tie Cali i u col a in ru.*

24. *T. ARUisxEForrA* {H. B. et Kunth nov. gen. et sp. 3. } 274)1 caule arboreo, foliis oppositis sessilibus obtusis oblongis subcoriaceis reticulato-costatis, racemis sessilibus pendulis, ramis, calycibus, corollisque glabris. f. in loca sylvaticis Novo-Granatensis, alt. 940 hex. — Arbor 16-QO-pedalis. Raceini subtriplicares, basi bracteis parvis imbricatis cincti. Corolla cylindrico-tubulosa, coccinea, limbo 5-fido. Stamina monadelpha.

Q5. *T. PYLLIREFOITA*, raiuis subangulosus subcylindricus costatus rubiginosus, ramulis angulosos-pubescentibus cinerascentibus, foliis oppositis breviter petiolatis ovato-oblongis oblongo-linearibus obtusiusculis margine subievolutis angulosos cartilagineis, versus apicem parcer dentato-crenatis, utrinque glabris, subtus nervo prominulo, punctis nigris bine inde conspersis, racemis sessilibus pendulis pediculis calycibus corollisque extus hirsutis. 3 " Pern vise prov. Chachapoyas. — Corolla coccinea oblonga basi venusta. Limbus calycinus 5-fidus, laciuiis acutis. Stylos per anthesin exsertus. Pedicelli subumbellati basi bracteolati. Tolia pollice in longa, 3-4 lin lata. (v. s. in h. Uoiss.)

•j- Species non satis notte.

a6. *T. ? ALNIFOLIA*, ramis glabris fusco-rubiginosus striatis, foliis breviter petiolatis ovato-subrotundis subtus reticulato-costatis penninerviis supra laevibus glabris denticulatis mucronatis vel obtusis vel emarginatis, gemmis iloralibus strobiliformibus rufescens, bracteis scaevolae cilialis. ^ ad Cuiicus legit el-Vargas! (v. s. in h. DC, sine flore. ucc IVnet.)

27. T.? ACUMIKATA, caule froticoso, foliis breviter ct calloso-petiolatis oblongo-lanceolatis, utrinquè attenuatis longèacuminatis utrinquè glabiis, 3-5-nerviis palminerviis margine subintegris subrevolulis, spicis axillaribus pollicaribos, oalyibus subglobosis acutè 5-dentatis. 5 • Hab. $\frac{3}{4}$ Q $\frac{1}{2}$ em (Joseph de Jussieu !, *Cachouyouyou* mcolaiui ex herb. Juss. Folia palminervia , nervo inedio pen-niucrvio, nervis minutissimis. Pedicelli semi-pollicares , suprà basin bracteolati, bracteolis opposilis minutissimis. (v. s. in h. Jussieu.)
- »8. T.? CERANDER, ramis lignosis teretibus ciucreis, foliis breviter petiolatis lanceolato-ellipticis breviter acuminatis glaberrimis utrinquè nitidis subtùs pallidis reticulato-5-nerviis nervo medio pennioeivio , racemis brevibus basi divisis, calyce nrceolato *infra* limb am coarctato, corollis (nbulosis 5-dentatis. Hab. ... Cemnder Rich, in herb. Jassieu.—•Pedicelli longi bracteis slipati, biacleolas 2 oppositassubulatas *infra* medium gerentes, (v. s. in herb. Jussieu.)
29. T. JUSSIJEI , ramis angulosis rugosis atibpubescentibcs, foliis brevissimò petiolatis*, racemis brevibus, calyce sub-5-deutato subintegio, corollis tubulosis basi vcntricosis 3-5-deuiatis. 5 . Hab. in Peru (Josepb de Jussieu !). (v. s. in herb. Jussieu, fruslulum valtlè incompletuui.)

†† *Species exclusae.*

- T. ACUMIWATA Wall.= Agapetes acuminata.
 T. CORIACEA Blum.r= Agapetes coriacea.
 T. EIXIPTICA Blum. = Agapetes elliptica.
 T. CUNEIFOLIA Blum. = Agapetes canefolia.
 T. PLORIBUNDA Blum. = Agapetes floribunda.
 T. GLANDULOSA Hnmb. r= Gaylussacia buxifolia.
 T. GRAHDIFLORA R. et Pav. = Ceratostema grandifloruui.
 T. HIRSUTA R. et Pav. r= Ceratostema cordifolium.
 T. LAURIFOLIA Blum. = Agapetes laurifolia.
 T. LORAITTHIFOLIA Wall. = Agapetes loranthifolia.
 T. MYRTOIDEA Blum. = Agapetes myrtoidea.
 T. HinRorHTLLA R. et Pav. = Vacciuuiu acuinatum.
 T. RHODOROIDES Lamb. herb. = Agapetes variegata.
 T. SERRATA Wall. = Gaylussacia serrata.
 T. SSTIGERA Wall. = Agapetes setigera.
 T. VARIEGATA Royl. r= Agapetes variegata.
 T. VERTICILLATA Wall. = Agapetes verticillata.

VI. CAVENDISHIA *Lindl. but. reg. t. 1791 in notā.*

Calyx adhccrens campanulatus truncatus obsoletè 4-denlntus. Corolla lubuloso-cylindracea 4-dentata. Stamina 8 inclusa, basi imae corollae inserta; filamenta carnosa, monadelpha, connectivis alternis liastatis auriculis rotuodalis, alternis rhomtaoidaHbus; aiitherae mutica3, loculis sulcoaho exaratis apice liberis è rimâ dehiscentibus. Ovarium quadrangulare, 4-loculare polyspermum. Stigma simplex,
 i. C. NOBILIS (Lindl. 1. c.). — in Pernviā. Frutex sempervirens, geuuuis magnis imbricatis, foliis laarinis, floribus speciosis purpureis capitatis iuvoluciatis.

VII, VACCINIUM *Linn. gen. 191.—Vitis-idaen Tourn. inst.p. C07 t. 377.*

Calyx ovnrioadnatiis, limbo libero 4-5-parlitopartitionibus dentiformibus, rariis integerrimo. Corolla campanulata, urceolata vel cylindrica, limbo $4^{\prime\prime}\wedge\wedge^\circ$ s \ll pius icflexo. Stamina corolla? lobis nutiicro

(lupin, limbo calycis inserta, saepè inclusa, inlcrdum ex win. Anthcra? sseptis apice hifirlae, rlorsò bianstatac ant muticae. Stylus erectus stnni-nihus iongior. SLigma obUisuin. Bacca calyce yestiti, globosn, 4-aul 5-lo-cuLins loculis polyspennis, ranssimè io-loculans loculis mono^peimis. — Fnitices auL suilVuticcs, rariis ar I maculae Folia sp.ir>a. Floivs axill.tres solitdrii, gernini, terni vcl racemosi bractcali. Corolla? albulae aut coccineaj.

§. i. *Floribus racemosis.*

a. *Corolla campanulatis velprunium ovatis dein subcampanulatis.*

a. *Fohis cad ft cis, bracteis Joliiformibus.*

»» *Antheris muticis.*

1. V. DECIMEROCARPOT, caule finheoso, ramis cinereo-fuscis nmosis snbangalatis, foliis jxtioldtis obovatis iiijcuneifoiiibus vel luiceolatis obtusis, subtus ncivosis gljncis subpuliebceiitibus, pilis minutissimis, a to mis resinosls conspeisib, suprà Miidihus vcnosib inlcgiis maigie subievolutis, laronus ffiniplicibus biacteol.itij», iloibusc.unpdiiulalis 5-(ilis, b.iccis 8- lo-locnl.nibusl IOCULJS monospicinu»* ^ in Aniciicà boreali. Andiomedea baccata Wangben. p. HI t. J<). f. 60) Raccae io-sulcatx io-luculaies! loculis inonospeimis¹ An ftcuus distinclus? AaGay-Lussacise&p. folns. caducia? An Vai. deqcmloculaus 'V. fiondosi ?

ct. foliis obovatis sabconeiformibus obtusis. — circa lioston. 'V. fromlosuin Gicen iu h DC. 18J4. (v. s. in h. DC)

{6 folns laaceolaiis obliisiisculis. —in civitate Obio (Fiank).—V. cuiyu-bosum Fiauk in h. DC. ex Uoiunc Jtueiaua ibJ^. (v. 5. in b. DC.)

2. V. FHONDOSUM (^Willil. &p. 2. p. 35a), ramis onereo-fuscis, foliis obo\atoblon^ii* \el oblongu-lanccolatis inregeriiniis iupia' glabiis subtus g| UICJS sob-hiisulis vel pilis atomis le&inosis irroratis, Idceruib laxis folioso-bracle.itw axillanbus, pedicellia filjornubus medio bracleolatis 5 ^n ^evv Jerséy et Caiolina. V glaucum Mitbi. fl bor. am. i. p. a3i. *Blue tangles* iuculaium. Coiollas alb<e. Bacca: caeiuleas.

et. folii* obovato-oblonj;is obtusis Andr. bot. rep. t. 140. ^v. s. in h. DC.)

yS. foliis lanceolate, utrinque acutis subiùn birsutis.—^V. venustatn Ait. kew. a. p. J 1. ed. 1. Heib. Banks (v. b. in b. DC)

3* ^ HESINOSUM (Ait. kew 9 p. 1a. ed. 1.), ramis cinereo-fuscis, jnnioribas villosis, folun pclioLtis oblongo-ovatis- aoutmsculis integeiriims, 1 ace in is lute-ralibus secundis, pedicellis bicvibus subbiucteoUttis, corolla ovato-coticis j-gonis deiu subcampanulatis. \$ in sylvis montanis Canad* et Caiolina¹. — Frutex 7-8-pedalis. Barcas mgiae, insipidae. Kami, folia , pedicelh , atomis ics-nosis inoiaiti.

CL. corolib luteo-virescentibnsParshfl. am sept. 1. p< 3^6. (v. s. in b. DC.)

ft. coiolij. lubcacentibus. Sims bot mag. t. 1288.

y. foliis lanceolatis, corollu mbio-lutescentibus. V. p.u villorum. Amir. bot. iep. t. 125.

4. V. nuMOSuni (Andr. bot. rep. t IT?}, ramulis, foliis lacemisque hispidiusculis atomis resmosis inoiaitis, foliis obovato-oblongis nentis mucronatis integer-riniis concoioribus, race mis folioso-b mcle.nl is , pedicellis bre^ibus axillanbns subsolitariis medio hibracteatis. 5 in sylvis à New-Jeiseyad Moiidain. Curt. bot. ^ag. t. n(). Pnrsh 11. anier. sept. 1. p. 285. exclus. syn Ait "V fiondosnm Micbx. fl bor. am. 1. p. a3o —Frutex parvus. Flores magni albi vel albo-paipurusrentes. Autherx lubiae. Baccae globulosae nigrse. (v. s. i a b. DC.)

/2. *humilc*, Wats, dend. brit. 1. f. 3a. (v. ». iu b. DC.)

5 V. HIRTELLUM (Ait kew. ed. 2 v. 2 p. ^7), ramis viigatissnbcreis, foliis angastis obovdJo-oblongis luucronulatis lategernnns sablus bispidiusculis ,

- a to mis resnosis i no vat is, racemis foliosis. 5 in Carolina meridionali (Frftser!). — Pedicelli hispidi bracteati. Stamina subexserta. (v. s. in h. DC.)
6. 'V. AROOREUM (Michx. fl. bor. am. r. p. a30), canle arboreo, foliis breviter petiolatis obovalibus utrinquè acntis niucronalis glanduloso-serrulatis, suprà uitidis reticulato-venosis, subtùs pubescentibus pallidis, racemis folios is, pedicellis axiliaibus uuiflois. ff in sylvis subaiidis Carolina; septentrional is et Floridas. Pnrsh 11. anier. bor. 1. p. aS5. — Arbor i5-ao-pcdalis ; folia interdùm suborbiculata. Sylns t-xsertus. ttacra globnsa, nigra. Pedicelli flo- icsque autē anthcsin cernui, per et post anthesiu erc<:li.
7. 'V. PATIDIUM (Ait. Kew. ed. 1. v. a. p. 10), foliis ovatis acutis scrrniatis glâbris, ruci'uiis bracteatis terminalibus lateralibusvc tiutaibis, corollii campa- nulatis. Q in Americâ scptentrionali. Pursh fl. am. sept. 1. p. 286. Wikström köngl. vet. acad. liandl. p. 9. Frutex ram is glabris tcielibus. Corolla glabra , 2-a f lin. Ion pa. (v. s. in b. DC.)
8. V. DIFFUSIUM (Ait. kew. ed. 1. vol. 2. p. 11), ramis diffusis glabris fuscis , foliis ovato-lanceolatis ncuniïtiu obsoletè serratis pallidis, racemis foliosis, p*dice)lis uniloris nudis. 5 3 *n Carolina anstraiii. — Sims bot. map. t. 1607. Wikström köug. vet. acad. handl. p. 6. exclns. syn. Michaux.. — Frulex ma- gnus interdiim ao-pedalia (Wikstr.). Folia reticulato-venosa , utrinquè acuta , subnilida , breviter petiolata. Corolla roseo alboque variegata. Bacca globoaa , oigra. (v. s. in h. DC.)
9. 'V. OLADHUM (Wats, dend.brit. t. 125. D.), vamis glabris, foliis ellipticu iate- gris glabris, racemis latci'alibns f floribus breviter pedicellatis. ^ in Ame- ricâ boreali. — Corolla rubra cyladrico-campaunlata.
10. V. ARCTOSTAPHYLOS (Linn. sp. p. 500), caule arborescente, foliis ovato-lan- ceolatis serrulato-scabris, ramis infrà-foliaceis foliosis paucifloris, pcdicellis unifloris axillaribus. 3 in Cappadocia. — Dicb. fl. taur. 1. p. 298. Pent. enh. 1. p. 4^o excl. syn. Andrews. — Tonru. voy. a. p. aa3. (^aulis orgyalis. Corolla alba vel purpurea, sa?issime alba pnniceo variegata. (v. s. in h. DC. comm. à cl. d'Urvill*.)
11. 'V. MANTREPJSSE (Link en. b. brr. i. p. 374. 11. 3778), caule arborescente, foliis oblongis niriuqné attenuatis stublùs pubescentibus serrulatis, racemis fo- liosis, pedicellis axillaribus cernuis, corollis coocoloribus. J}in niontibus syl- visque Madera* (Low!), et in iusulis Azoricis (Gnlhnick! in b. Reuter.). V. arc- tostapbylos Willd. sp. a. p. 353. Andr. bot. rep. t. 3o. Curt. bot. mag. 1.1)74. exclus. syn. Guimp. abb. bollz. ^9. t. 3*. nee Linn.'V. padifolium Sm. in Rees cyrl. n. '22. Corolla campanulata subcylindrica albo-viridescens uuicolor. (v. s. in h. DC.)

- » Antheris artis tads.

- ia. 'V. STAMINKUM (Linn. »p. 49^); ramis snbteretibos fuscis, foliis ovatis acntis integerrimis glabris subtùs glaucis, racemis foliosis, pedicel I is solitariis axilla^ ribusiiliformibiis, antberis exsertis dorso aristatis, corollis campanulatis, bac- cis pyrifonnibus. J i" sylvis moiitons Novar-Angliae et Florida?. Pursh i]. am. •ept.x.p. 284.—P'luk. nltti- *• 339. f. 3.—FrutexbipedaLis. Corollse albx>. Dacca? primùm virides, tandem albx. Affine V. elevato. Uiffert vetò : foliis minoribus utrinquè glabris, lloribns majoribus, baccis pyriformibus. (v. s. in b. DC.)
13. V. ELEVATUM (Banks et Solander ex Wikstr. köngl. vet. acad. handl. 1822. p. 8), ramis subteretibos glabris, junioribus pubescentibus, foliis ovalibus obovatis lanceolatis elliptico-oblongisve acutis integerrimis subtùs glaucis pu- bescentibus, pedicellis solitariis axillaribus siliformibns, corollis campaunlatis, antberis exscrcls dorso aristalin, bacris glnbosis. 5 • Corolla,¹ albai; baccsc ma- turai alba;. A 'V. stamineo differ!: foliis majoribus subtùs incauo-gluucis pubes- centibus, floribus minoribus, baccis subglobosis.

< t. foliis obovatis ovalibusqje subtùs pobescentibus acutis. — in sylvis are- nosisa New-Jersey ad Carolinaui America borealis (Pursb). 'V. album Pursh fl. am. sept. 1. 28. nqc Linn, et Willd. W. stamineum Audr. bot. rep, t. au3. (v. 5. in b. DC.)

ft. folns elliptico-oblongis utriique obuisis hibitūs nervo medio niargineque ciliatis.— in tylvi Mexican Is intei l'achuca et Real del inonte. V. stamineum H. fi. el Kunih nov. gen am. 5. p. 367 non L.

f>. *Folns sempervirentibus.*

n *Antheris muticis.*

- 14 "V "Vnis-iD^JA (Linn sp. 500), humile, caulibus lepentlichus, raiuulis erect is, folns obov.iiis emarginatis levolutis intcgemmis vel subsetmatis supra Incirii* subtas palbdis puuctatis, punch's nigris, lacemis terminalibus niitantihti*, corollis cylindriuo campanulatis ^ in syliset encetis solo aieuano, Kuropae et Ameucae boiealisin Alpes ascendens M. dan. t. 40 iingl bol. t 598. But cab. t. loaj. V punctatum Lam. djcl. 1. p 74. FJoes albi \el mbelli Bacc-e rnbrse. (v. >. et **)
- x5. 'V. CRASSKOLIUM (Andi.iep. t 10^i), caulis piocaiubentibas, follis petiolatis ovatis pjlabcinmis conareis serrulatis crassiusculis, lacemis secundis oinbellifoinibus, bracteis coloziatis pedicello brevioiibus, corollis comco-caiupanulatis. ^ in Caiobnā austral! — Bof. mag. t. 115a. 'V. cainosum Peia encb. 1. p 4^9 Andromeda luridifoha Gawl. tec. pi. 24* ex bot mag. Floies deiandn. (v. & in h DC.)
16. 'V. coiffERTUM (H. B. et Kuntb nov gen. im j. p. 265. t a50\ canie fiuli-co<so idntOMiisimo , folus ovato-ellipticis subobtnsis cienuatis toiiaceis glabn» , racemis axillanbus solitanis abbieviatis sessibus ccinuis folium aeqaantibuH. floubusdecandn\$. £ in locis altis iiiontium Mexicanouua, all. 1400. hex Ca-lyces ebiacteati Coiolla campanulala , alba, glabia.
17. V. MYR.TIFOLIUM (Micbx fl. boi. amer i p. 239), glaberimuiu , foliis bievilei petiolatis ovabbus lundis margine subrevoluhi, rariter dentirulatis, race- mu axillaribus subsessibus pauciflois glabtis, flonbus glomeratis, coiollis subgloboio-campanulatis bievi&sune 5-dentatis. ^ in Carolina. Pedicelh bra<- teolati, bracteolii scanoaib. Toba supra \ridia, subtiu pallida. Bacca paiva, nigra (v &. in h. DC)
- et. caulis repenibus.
- ft.* caule erecto.
18. V. MONTANUM (Pobl pi bias 2 p. 3S, t 12O), canle fruticoso nudo ramo-sissimo, rarais diffusis teietibus, folns coriaceis bre*issira*e petiolatis oblongo-elliplicis apice mucronatis basi vix angn&tatis glabiis, neivis subtus ad lenteni pilosiuscubs, Iloribns lacemosis, pedoncolis pedicellisque pilosis. jj in alti^ montosis capitams Minas Geraes Brasiliae. Coiolla campanula!a alba.
19. V. SCABRUM (Pobl pi. bras. 2. p 37. 1. 124), caule fruticoso, larois foliosi* cano-branneis, jtinioribus rubescens, foliis coriaceis ciassis breviter petiolatis oblongis integris apice mucronatis niaigine revolutis ciliatis scabiis, nervis subtus bispidis, flonbus racemosis breviter pedunculatis, pedunculis piloso-glandulosis. 5ⁱⁿ uliginosis tnfosis Brasilia. Coiolla campanulata, alba. Bacca glabra, rufescens.
- » » *Antheris dorso aristau*s
- ao. "V LEnRANIBUM (^ham. in linn. 7. p 524), caule aiboieo, ramis anglosi interdum pubeuilis, folns conaceis bievitei petiolatis ovali-lanceolatis aculisi serratis, setraturis glaudulosis , petiolo et nervo medio suprā pnbescentibu* caeteium glabris, racemis secundis in iuferionbus lamulis annotinis aphylbs, floribns nrceolato-cirapanulatis, antheus biaristatis. £ in Mexico prope *> Salvador. Arbor, corollis a Ibis, baccis nigns edulibus.
- ai V. CARACASANUM (H B et Kunlh nov gen. et sp. 3 p. 266), caule fruticoso ercto , folus ellipticis acutis cientilatis coriaceis glabn's supra nitidis , lacemis axillaribus f_oln\ duplo longioiibns, floribus secundis 8-io-andns, antheris biaristatis J_m monte Silla de Caracas, alt. 800 hex Bracteae lanceolata*. pedicellum suba?qnantes Coiolla campanulata, albo-riibe&cens.
- aa. 'V. MICRANTHUM , ranais teietibus fusco-cinereis rimosis, foliis ovato-elliptic** acentis basi rotundatis venoso-ieticolatis serratis, supra glabns viiidib% snbtii^

pallidè rufescensibus net*vis pilosis, racernis siinplicibus elongatis in ramulis annotinis approxiniatis, co roll is campanulalis subglobosis, antieris an ^{'atia.}
3 in Mexico inter Taiupico et Real del monie legit cl. Berlandier (pi exs.
11. 12). Calyx 5-denla1115. Corolla 5 Uda decandra. Anthers aristala?. (v 5 in
h. DC.)

b. *CorolUs urceolatis, ovatis, oblongis cylindricisve.*

A. *Folis semper inrentibus.*

» *Antheris aristatis, corollis ovatis.*

a3. *V. MERIDIONALS (Swartz fl. ind. oicid. I. p. 276. prod. p. 62. ic. t. 12), canle arboreo, foliis ovalis crenato-serralis glabris coriaceis, lueeniis aphyllis multiflori.t folio longioribus. fy in montibus altissimis Jamaice iinstralis (inontibns caeruleis) (Swartz). Corolla ovata limbo fl-5-fldo. Anihera; aristis l)ifidis. Bacca subglobosa, colore et sapore baccarum V. vitis-ideae. (v. s. ir. h. DC.)

i. 'V. CORYMBODENDRON (Dnn. vacc. incd. t. «8), ramis crectis rigidis fusc.i rrgosis, foliis brevilocr peliolalis ovalis vel ovaio-oblongis penninerviis glabris j-emoiè denlieulalis dentibns brevissimis, supra viridibus glabris, snbius obsoletè lripiosis sordidè ferrugineis acuiuscolis, i^ceinis paoeifloris ;ixill:iribus terrinalibusquc. fy in locis allia frigidis oppidi Pillao. — Thibaudiii corynibodendron R. et Pav. fl. per. t. 4. 'med. ex herb. Thibaad. Congama incolarum. Kloresdecandri. Calyx bibractealus. Corolla conica? Calyce dnplolongior. Stamina inclusa; filament a hh'suta, anthers biaristatae. (v. s. in h. DC. ex h. Thibaad.)

» » *Anthem muticis.*

25. V. FLORIBUNDUM (H. B. et Knnih nov. gen. et sp. 3. p. 266. t. a5x), ramis teretibns glabris, ramulis .ingulatis puberulis, foiiis oblongis acutis crenulatis coriaceis glabris, racemis axillaribus teruiuibusqne nutantibns foliis duplo longioribus, floribus tf-ioandris. ^ io monfanis l'enviae, alt. 1700. hex. Corolla albu , urcsolato-subc.'inipamilata. Calyces ebracteati. .

26. 'V. viLLosuai (Smith in "Rees cycl. n. 29), ramis junioribus villosis, foliis ellipticis integris coriaceis revolutis apicc emarginalis utrinquè villosis, pedicelli bracleis lanceotalis calycibus curollisqae villosis. 3 ⁱⁿ Mexico ex Mntis in herb. Linn. — Corolla pnnpurea pentagona angulis villosis.

i», V. SCHLECHTEWDALII (G. Don gen. syst. 3. p. 856), caule fmiticoso crecto raniossiuio, foliis subcoriaceis ovato-lanceolatis lanceolatisve acutis adpresæ serrnlati apice serratarisqne calloso-mnchronulati.« breviler petiolatis, ramis fructiferis snbaphyllis, racemis elongatis erect is, baccis globosis umbonatis. 5 in sylvis Mexicanispropè Jalacingo. Calyx basi bracteolatus.

a8. V. BUXIFOLIUM (Salisb. par. lond. t. 4), caulibus pnmlis, foliis obovatis crenato-dentatis glabris, racemis congestis snbsessilibus axillaribus lerminaliibusque, corollis brevi-ovatis, filament is glandulosis, stigraate capitato. 3 in "Virginia circa Winchester. Bot. mag. 928. Hot. cab. t. o',8. T. brachycerum Michx. fl. bor. ainer. i. p- *M> Corolla; albide rubro-lineatai. Calyx bmc-teatus.

2g. V. NITTDUM (Andr. bot. rep. t. 480), canle raraosissimo, foliis obovato-ellipticis acutis basi angustalis obsoletè serrulalis , racemis corymbosis terminalibus lateralibusqne bracteatis. 3 ⁱⁿ Carolinà. ~ Corolla ovato-oblonga , ante anthesin alba rubro-lineata, peranlhesin tota alba.

a. caule erecto, ramis, pedicellis calycibusque viridibus, corollis subcylindricis. Bot. rep. t. 480. (v. s. c. in b. DC.)

f. ramis diffusis decumbeniibus, ramis pedicellis bractcis calycibusque rubro purpureis, corollis ovatis. Bot. mag. t. 1550.

3o. V. SUMATRA^{UM} (W. Jack, malay. iniscell. VII. p. 18. Hook, jrn. 1. p. H70), ramis lajvibus rnbro-fnscis, foliis elliptico-ovatis integerrimis glabris

ooriaceis, racemis axillaibus folhs brevionibus. ^ in montibus altis Quuong Bungo el Sugai-Ioaf ia legione luteina' Bencolea ins. bumaliaDjj. Cuioll.t obloogo-ovata, 4-lentata, dentibus brevibus lecurvis. Stamina 8. Ovanum 4-luculare.

31. V. OVATUM (Pmsb fl. amei sept. 1. p. 290), erechnm \alde raniosum, larnis pubescenli busutis, foliis ovato-oblungis coiaceis nil id s brevi-j etiolatis mai-gine levolutis seiratis, petiolis birsulis, lacemis axillanbus terninalibusque brevibus, iloiibus cylindraceo campamilatis biakteatis, calycibus o\atis * in rregionibus boieali-Occidentibus Atneucae (Menzies), in Columbia (Lewis). Goiolla? alba; nibio linealce. (l. s. in b. DC.)
32. V. IANCEOLATUM (DCbeib), lainulis subangulatis apice petiolisqoe sparse pilo&is, foliis coriaceis lanceolatis acuminatis bievitei petiolatis margine callosis et seuatis, latem axillanbus 3-5-flous folio multo bievioibus, pedicellis racbi lommuu! duplo lougioubus, fiuctibus giobosis calycis limbo iuovo-luto acute 5 lido corouatis. 5 in Novâ-Califoiniâ legit cl Douglas! Folia 15 lin. longa, 4 rⁿ- lata. Coi. ign. "Valde accedit ad \. ovatum et ioite bujus varietas anguslifolia ? (v. s. comin. ab bon. soc boitic. Lend)
33. V. EMIRNENSK (Hook, IC pi. 2 t. i3i. Bojer! in litt. 18J9), lamis rugosis nigro-cuieieib runosis coitice laceiato, lamulislacvibus fusco-iubiginosis, loliis bieviterpelolati&ovatis obovatislauceolatisve niaiginesubcartilagineissenatis acutis obtusisve utiinqne glabus leticulato-venosis, supra viudibub, subttis pallide mfe¢ibus, laceinis simplicibus, biakteis folia vix aequantibus gla-Lris. /) in rupibus hum id is montis *Antoungoun* piovincix Emiinae Madagas-car, ciicâ pagum Foulpoiute legit cl. hojei¹ "V. suaveolens Boj.! in litt i833 Bont ' mint 1838. Calyces coiollrcque glabri. (l. s in b DC. comiu. à cl inv)
- 34* ^« CHENDLITDM, ramis glabriusculis fuscis, lamuhs salcatis pubescentibus, foliis petiolatis coiaceis ovato-ellipticis in petiolum attenualis apice obtusis vel acutiusculis margine subcartilagineo cienulato-seuato, lacemis biakteatis axillaibus pedueueht pidictlligque busutis, caljcibua coiollisque glabris. J in provincia Peruviana Chachapoyas (Mathews) (v. s. in h. Boissie²)
35. V. MARGINATUM, iamis glabiis&culis sordide luteo-fuscis, ramulis pubescentibus, foil is petiolatis &nbcoidatis ovalo-acuminutis obtusiusculis* maigine cartilagmeo serrato soide albo, utrinque glabiis vindibus subtus pallidiou-bns, petiolis pubescentibus, lacemis subletminahbus bioCteatis multiflois, floubus congestis. ^ in piovincia PeiuMana Chachapoyas Petiolus liueam longus. Loin limbis 4-5 hn long., n-i- liu. latus. Coiolla subuiceolata 5-den-lata. ti lament a filifoimia pilosa. Calyces coiollaque glabu.(v. s. in b.Buissie².)
36. T. SEGNDitLonuM (Hook ic pi. 2. t. 134 Bojei' in litt. i3cj), ramis dicholomis parte Jnferoir nudâ nigio-cueteis, iainulis fusco-iubiginosis glabus apice subpubeuilis fohosis, foliis brcvitei petiolatis basi obtusis vel acutiusculis o\atis obovatis elliptici&e acutis serratis raaigine caitilagincis ieticul,ito-venosis glabiis, suprà \iidibus, subtus ferrugineo-rubiginoMs, racemis glabus solariis siimpliciDU9 axillau'bus ad apices iamoruin folio longioribns. ^ in sjlvis Madagascarauensibus piov Bel-t.mi-mena piope Jani-toutsuBojer'J "V dithotomiim BOJ.¹ in litt. i833. CaWtis limbus 5-paititus, pai taioiibu, ucutis; corolla nubeanipanulata 5-fida, laciniis lanceolatis. Antheiae long»c. lilamenta plana hirsuta. (v. s. in b. DC.)
37. V. MYRSINITES (Michx. fl. boi.ain 1. p. 233), eiectnm ramosissimnm mi-ciopbyllum, foliis (myiti) se&silibus ovahbus mucionatis subsetrulatis suprà laevigalis lucidis subtus &ubhiisutis scabro-punctatis, laccnr'n fasticnlaris genimaceib subsessiliflouslubelhs. Jin babulosis aiidis Flondseet Catolina*.— Fruticulus pulbet. Calyx coccineus Coiolla amaene puipuica. (v. s. in b.DC.)
 - &• *lanceolatum*, foliis lanceolatis uttique acntis Puisb fl. amei sept. 1. p. 210 (v. s. in b. DC.)
 - y. *obtusum*, foliis snbiotundo-o\ati&. Puisbl c.
38. V. PASCICULATUM (Boj.! iu litt. i838. Bout ' in litt. i838.), ramis fusco-cine-i.nscci]tibis foliosis, apice lamulosis, coitice laceiato, ramulis umbellatis fasci-

cninlis foliosis, folils parvis bievissrae petiolatis oblongo-lincaibus utiinque acutis glabns margine serrato-cienatis cartilagineis niti'dis snbtus pailjdis, iace-
mis axillanbus minutis glabemmis foliis vix brevioribas subcernuis. ^ in syl-
vis Madagascariensibus prope Tani-Soutsi prov Bt-tani-mena, legit cl. Bojer'
"V fasciculatam Boj ! in litt. 1833. Fiutex 5-pedalis Calyx limbo 4-partito,
lacinus acutis. Corolla ante anthesin plicata conica. Folia 3-5 lin. longa, 1 \ lin.
lata (v s in h. DC.)

39 "V. UETIGATUM (Bojer! in litt. ad DC. 183g), frulicosum glaberrimnm, ra-
mulis subangularis, foliis palmis ellipticis utrinque acuraindts plams laevigatis
integerrimiis, racemis &implicibus axillaribus folio tiiplo breviouibus erectis,
biacteis ovatis acutis concavis, calycis dentibns acntib,... ^ in monte An-
toungoun prov. Emirnae msulae Madagascar legit cl Bojei' Folia feie Andreu&ia?,
a poll, louga , polhcem feie lata. Flores in specim. jumores. rruct. ign. an
hujub divisions ? (v. s. à cl. inv.)

40. *V ATTENUAIDM (Dun vacc. ined. t. 17), ram is lignosis nndis fusco-cinerois
decumbentibus , ramulis virgatis attenuate foliosis, foliis approxinntis sessi-
ibus oblongis nlimque attenuate acutis lemote et obtuse senatis reticu-
lato-penninervns &ubtus sabfeirugineis, race mis axill.mbus terminalibusqne
folio-longionbns. 5 ^{1U} montibas Peruviams ad aicem Huasa-huasi Tbib.india
vngata R et Pav (1 per. ined v 4. *Huama pinta* incolaium. Folia 4-5 Im.
longa, 1 \ 2 lin lata. Pedicelli bieves, a lin. longi, unilon, basibiatea ovato-
oblonga ncuta sessih snffnlti, sub flore bibracteolati. Calyx, limbo 5-fido,
lobis denlifoimibus acutis membianaceis. Corolla tubulos^ventiicoba 5-den-
tata. (v s, ex bcib. Ihiband in h. DC.)

41. V. ERIOCLADUM , rarais annotinis nudis glabris, janioribus fohosis birsutissi-
mis pihs fenugineis, foliis bievitet petiolatis subcordato-ovatis senatis raar-
gine subrevolutis subcartilagineis, suprā vindibus mgoso-ieticulatis sub-
pubescentibus, subtus .nemis albo - liifescntibus punctis nigns aspeiMSy-
lacemis axillanbus paicifloris folio diimdio brevionbns glabns. ^ inter Tain-
pico et Real del monte (Beilandier' pi. exs. n. 254)* Racemi ebracteati? Flores
ignoti. Baccae coronatae par\ulae. (v. 1. in b. DC)

43. V RAMOBissiMDM, caule fruticoso ramosissimo , ram is cicatrUalis fusco-
viresrenlibus coiticis laceratione lineatis, lamulis brunneis subaugnlati pu-
bescenitibus, foliis ovatis basi attenuatis apice acutiusculis breviter petiolatis,
margin caitilaginco obsolete seiralo, avenns supiā viiidibus snbtus sordide
ferrugmeis, race mis axillaiibus apice ramorum sitis, floiibns octandris.
5 in Pera (Pavon). (v. s. in h Moncand)

fi. Folus caducis

»> *Antheris muticis**

43. V. CYLIHDRACEUM (Smith in Rees cycl. n. a3. ex G. Don gen. syst. 3. p 855).
Caule arborescente? foliis elliptico-lauceolatis acutis serrulatis glabn̄s, racemis
lateralibus calycibus 5-fidis. ^)in moritibus Azoricis. *Uva de Serra* mcolarum.
Corolla; polhcem longae, lubia; vel purpureae

44. • CORYMBOSUM (Linn, spec 40,9), ramis florifeiis subaphyllis, fohis
oblour/o-ovabbus utrinque acutis subintegns glabns nervis sublus pubc centi-
bus, racemis brevibos bracteatis, bracteis squamosis, coiollis (}lindraceo>
ovalis f in humidis Canada, New-Jers»ey et "Virginia; Vauat alhtudjne,
forma et colore coiolla;. A "V. fuscato differt statoiā majoie, foliis sacpius ova-
libassenulatis nee lanceolatisintegerrimis, floiibus longioribus, calye snbie-
flexo nee erecto. Wickstiom kbngl. vet. acad. bandl. 1823. (v. s.m. h.DC)

A calycibus erectis, stylo subexerto. "V disomoiphum Micbx. fl. amer.
bor. 1. p ^31 Y album Lam. diet. x. p. y3. nee Linn. "V. corymbobum
Wats, dendri. brit. t ia3.

^ calycibus leflexis, stjlo inclnso. "V amaenum Ait. kew ed 1 p. 1a
Andr. bot. rep t i3S. ^r. s in h. DC)

45 "V VIRGATDM (Ait. kew ed 1 \ol 2 p. ia\ iamis floriferis elonjralis sn1-
vii.

aphyllis, foliis lanceolato-oblongis utunque acatis senulatis glabns vel pnbis*-centibus, racemis sessihbns biacteatis, corollis cylindri aceis faucc coaictata, launiis brevissiuis, calycibusieflexis, stylo inclaso. £ in Ions hnraidis Carolina; et "Virginia; 'V. corynibosnm var G Don gen syst. 3. p. 854. Corolla? alba?, rubro tinctac. Ikrutex lamissubangnlatis Wikstr 1. c

et latifohum, Bot rep t 181 Wals dendr bnt t 33 (v s. in h DC)

£. *angustifohum*, Wats, dendr. bnt. t 34. Bot. mag t 3523 "V. fuscatum angustifolium Parsh fl. amer sept. 1. p. 287 (v s in h. DC)

46. V FUSCATUM (Ait kew. ed. 1 vol.2 p. n.), rarais flonfens nndmscuhs, foliis oblongis acatis senulatis glabris , lacemis aggregatis terininalibus biacteatis, pedicellis nutantibus, corollis cylindraceis, Jacinus eiectis bievibus, calycibus acatis erectis, stylo snbxerto \$ in hniniidis Carolina? et Georgia V. formosam Andr. bot. rep t 07 Paishfl bar araei. excl var./3. "V torym bosum Uook bot mag. t. 3433. Corolla? cylindraceae alba; vel rubise albo striatae Calyx brnnneus. lkrntex minor. Wikstrom 1. c (v. s. in h DC.)
47. V ALBIFLORUM (Hook, bot mag t 3428), ram is flonfens snbaphyllis, fohis ovah-Iauceolatis obscnre seirulatis membranaceis, sabtus costâ nemsque praecipue palenti-pilosis 5^m America boieali, in horto Glasgow cultum. Affine"V virgato, coimboso, angnstifoho, etc.
48. V. PtNSYrvANicuM (Laru diet. 1. p. 72), ramis angulatis virldibjs, foliis •essibus ovato-lanceolatis mncronatis seiralatis utunqne lucidis, lacemis confei tifloris subternainalibus sessilibas, corollis ovatis ^ia sylvis umbiosis Pensylvamae et Virginia; Michx, fl. bor am. 1 p. 1Z7. Bot. mag t 3434* Guimp abbild. holtz p. 4o t 34. "V tenellum Pursh fl am sept. z. p ?8> Wats, dendr. bnt t. 35 V. virgatum Ait. kew ed r vol 2 p 12P ex Torrey. "V ramulosum Willd. en. &uppl p 20 ex Guimp 1 c p. 41 "V humile Willd. en snpl p 20 ex Guimp 1. c —Futex pedahs, senipeabesve; lain! teretes viides. Folia parva, 8 lin longa, raro pollicana Coroll-c pallide mbra vel alba;. Dacca; magnae, caeroleo-nJgiae, edules. (v. s in b DC)
49. 'V. C^WADENSE (Rich in rraukl. joarn ed. 2. app p a ex Hook fl. boi amer. 1 p 32), ramis floiferis foliosis, foliis oblongo-lanceolatis integenimis subtus hirsutis, supia ad neivos pubescensibus, floribus racemosis congestis, coiolls campanulatis. 5 iu pinetis Canada; Hook. bot. mag t 344G. Corolla ovata pallide viiides, inferneobsoletepentagona Fratexiamosissimu^.
- 50 'V. MARIANUM (Wats dendr bnt t. 124), ramis vindibus albo-maculatis , foliis ellipticis coriaceis glabris minute denticnatis, racemis laterahbus bracteatis. 5ⁿa ^ in Amerca boieali Fnztex 5-pedalis Coiollae urreolatx albae.
51. 'V. GRAHDIFLORUM (Wats, dendr. brit 125. f. A. non Wickstr. nee heib. Par), ramis viridibus cylindricis glabris glaucescentibus, foliis lanceolate utunqne attenuatis glabris sen ulatis, racemis terrainabbus fohosii* paucifloii^. ^ in Americâ boreah Cor-ollae albae, magnae, cyhndrico-nrceolata;.
54. V ELOMGATUM (Wats, dendr. bnt t. ia5 B.), ramis erectis subpubescentibus, foliis ellptico-lanceolatis sennlalis apice glandulosis, racemis ebiacteatis paunfloris j in Americâ boreali. Nervi fborum snbtus pilosiuscuh. Corolla albae cylindric.T.
- 53 y. MULTIFLORUM (Wats, dendr. but t. 125. C), caule fraticoso parvo raiuosibsimo, fohis subconaceis aeaminatis subserratis apice glandulo&is, iacemis termmahbus paucifloris ^ in Amerca boieali. Corolla; paivae alba?> nrceola to-cy hnd 1 ica;.
54. 'V. LEDIFOLIUM (Pohl pi bias. 2. p 36. t. ia3), raule fmitico<> lereti snbumoso, foliis se&sihbis Itneaiibus basi attenuatis ad lentem ciliatis, supia glabrus, subtus lutescenti bronneis, nfivis pedunculisque pabej>centibus, lacemis axillanbus termmalibusque folni, longionbui J in locis siccis altis montosis provmciae Minas Geraes dihrtictu Minas no\as Brasilia;. Coiolla tubulosa subcamp>nulata alba 5-dentata , denhbus acutis reflexis
55. V TIGISTRINUM (Michx fl boi am. 1. p. 281), ramis angulatis, fohb sub-

sessibus erectis lanceolatis mncionatis serrulatis venosis pubescentibus, racemis srssilibus gemmaceis, pedicelhs glomeratis vix ulhs, corollis oblongo-ovatis 3^m sylvis montanis Pensylvaniae et Yirginiae Pnrsh fl. amei sept 1. p. 2*58. excl syn Willd. Coiolae purpnreο-rubra. Bacia nigrae. Iolia raultui vanant, membrauacea, saepe venis purpureis notata

56. 'V. GALEZANS (Michx fl bor amer. T p. a3a), folhs sessibus cuneato-lanceolatis snbseirulatis venosis pubescentibus racemis sessibus, pedicelhs brevissimis subglomeratis, calycibus acuminatis, coiolhs ovatis fauce valde coarctatis, stylo exerto. 3 m sylvis et campis humidis Virg_{lae} et Carolina Flores parvi «ilbo-lutescentes Baccn parvae, globosae, nigiae

57. V. TFSELLUM (Ait. kew. ed 1 v. a p. 12) > 1 »^{"'} vindibus, fohis oblongo-elliplicis subenneiformibus serrulatis snbmtidis, racemis bracteatis sesilibus pauciflois /in New-Jersey et Pensylvamā Torrey' flor. 1. p. 4,7 nec Pnrsh, etc. (v. s. in h DC)

58. V. BRACTEATUM (Thunb fl jap p. i56), lamis thvaritatis glabris, foliu ovatis acutis seiratis maigine revolutis utriue glabiis, laccmis fohosis folio longioribus. 3 in insulā Nipon. Ki fust japonice Flores secundi Pedicelh in medio bibracteati. Corolla cylindrica alba

Sg V CITIATUM (Thunb. fl. jap p i56), ramis erectis vi'losis, fohis ovatis acutis integm hispidis, racemis fohosis, folus lanceolatis glabris, floribus secndis 3 in Japomā Sasjebu japonice Calyx brevissimus Corolla robra urceolata*

60 'V. LOWGIFLORUM (Wikstr. kongl vet. acad. handl. 1823 s. 11.), ramis angulatis rubentibus, fohis snbsessilibus la tō lanceolatis serrulatis acutis glabiis, racerais nutantibus mnltifloris, calyce obsolete dentato, corollis cyhndricis, stylo exerto. 3 in insnhs Azoricis (Masson). Frntex Corolla rubra. Sta mina inclnsa , filamentis hirsutis

§. 7. *Floribus tohtarū gemimsve.*

*et Anthens biaristatis
» Fohis caducis.*

61. 'V. GEMINIFLORUM (H B. et Knntn nov. gen. et sp 3 p 267. t. 252), ramjs glabris, ramuhs angulatis puberuhs, fohis oblongis subobtusis crenulatis ieticolato-venosis submembranaceis glabris, floribus axillanbus geminis nutantibds decandiis 3 " regno Mexicano, alt. 1400 hex. Frnticulus habitu et structurā V. Myrtilli Corolla alba

6a. 'V MY&TILLUS (Linn. sp. 498), ram is anguiatis viridibus, fohis ovatis serratis ^glabernrais, peduncuhs uniflons soli tains. 3 Corolla roseo-rubra

a. baccis caernleo-nigns. —in locis montosu Europae ubique. Engl. bot. t 498 Schk. handb. t 107 et^{net} (v. s.)

/6. baccis albis globosis, folus profundecrenatis. — in sylvis montosis Aidueenae circa Malmedy. DC. fl fr. 5. p. 43x. Lejenne fl sp. r. p ^ i. (v s inh.DC.)

y baccis albis pyrifoiimibus.—in sylvis raontosis circa Oibey in Alsatil. Paahan in litt. heib DC. (v. s in h DC.)

63 'V CHAMISSONIS (Bongardm mem. arad Petersb 2 p 151 ex C Don gen. syst 3. p 85a), rainiseiectisaDgulatis, folusobo\ato-ellipticissubintegu₅i>t_nse niucronatis glabris subtus pallidis, peduncubs sohtariis uniflons post antbezin deflexis. 3 m msnlis Sitcha et UnaLischka 'V. Myrtillus'¹ Cham, et Schlecht. in linnaea 1 p 5a5 Corolla alba, urceolala, dentata, dentibus brevibus obtusis (v. s. in h DC)

64 V ovATiFOLinM (Smith in Reescycl n. 2. ex G Don gen syst. 3 p 85>), ramuhs angnlati, fohis ellipticis membranaceis mtgeerrinus glabris snblus praeclpue venoms, floribus antefoha ortis bracteatis solitarns, corollis oblongo-ovatl. 3 in legionibus boreali-occidentahbus America; (Menzies). Hook. fl. bor Amer. a p 33 t 137 Frntex 10-12 pedahs (v. s. in h DC)

- <5. V. PARVIFOLIUM (Smith in Rees cycl. n. 3rd ex G. Don gen. syst. 3. p. 85a), caule ramisque acutè angulatis, foliis elliptic[^] uiucrouatis Jutegerrimis inem-branaceis glabris snbtus glaucis venosis, floribus solitnriis, corollis globosis. *fi* in regiouibus boreali-occidentalibns Americas bor.(Menzies). Hook. fl. bor. am. a.p.33.t. 127.—Totaglabra.Baccerubrae. Koh"aseniipollucaria.(v.s.inh. DC.)
6. Y. CALYCINUM (Smith inlleescycl. n. 7. ex;G. Don gen. syst. 3. p. 852), rarais angulatis, foliis obovatis serratis glabris, nervis pubescentibus, pedicellis solitariis unifloris, laclniis calycinis maⁿnis>acutis. [^]in sylvis montium altior-nra insularuin Sandwich. Folia 1 $\frac{1}{2}$ poll, longa, ferè pollicem lata. Corolla ob-longa, pentagona. Frutex bi-tripedalis.
7. Y. SALICINUM (Cham, et Schlecht. in liah.-ea r. p. 5th5), caole frmitoso humifuso , foliis cuneato-lanceolatis cnspidatis integerrimis glaberrimis sub-coriacieis reticolato-venosis, floribns solituriia breviter peduncalatis axillaribtis. *Jin* inferioribus insulse Unalaschka collibus muscosis. Frutex glaberrimus habitu Salicara alpigeuarum. Corolla cylindraceo-orceolata. Pedicelli florentes cernni. (v. s. in h. DC.)
8. V. MYRTII-LoBEs (Michx. fl. bor. am. 1. p. 234), ramulis angulatis, foliis ovalibus ovatisque utrinquè ncatis serratis membraaaoeis glabris, pedunculls solitariis uuifloris, corollis lato-ainpollaceis depressis. [^] in sylvis umbrosis Amen'cae borealis. Hook. fl. bor. Aaier. a. p. 3a. bot. mag. t. 3447. Habitus y. Myrtilli.
- a. *angustifolium*. V. *angustifblium* hort. kevv. ed. 1. vol. 2. p. 11. nee Wats.
A?, *macrophyllum*. V. Myrtillus var. Smith in llecs cycl. Y. *raembranaceum* Dougl. inss. ex Hook. 1. c.
y? rigidurn, foliis subcoriacieis Hook. I. c.
- (>g. V. C'SITOSUM (Michx. fl. bor. am. 1, p. Q3/), pusillum, caespitosum , foliis obovatis basi attenuat^es membranaceis serratis reticnlatis glabris nilidius-cnlis, peducculissubsolitaiis nnifloris, calyce brevissimo. [^] in sylvis montosis Americne borealis. Hook. fl. bor. am. 2. p. 33. r. 126. 15ot. mag. t. 3429. Co roll re rubro-violaceae snbnreolatas 5-dentafoe. Eaccae globosa? caBrulco-csesiae edules. (v. s. in h. DC.)
fc. foliis iuajoribus Hook. 1. c.
- *jo. y. PRJESTANS (Lamb, trans, linn. soc. 10. p. 264. t. ix)> caule hnnili adscedente, foliis raagnis obovalibus senuiatis ciliatis venosis , fractu globoso amplissimo. [^] in remotissirao descrito Kamlsbatkne rarissimum,
- 7!. y. MUCRONATUM (Linn. sp. 499), caule fruticoso, ramis teretibns glaucis, foliis ovatis ellipticis utrinquè glabris integerrimis mucronatis, petiolis canalicnlatis, peduncnlis unifloris folio paulò brevioribus. \$ in Americā sep-tentrionali. (Kahn.)
- 7th8. y. HIRTUM (Thunb. fl. jap. i55), ramis divaricafis fnrrugineis glabris apice villosis, foliis subsessilibns ovatis acentis serratis villosis snbtus pallidioribus, pednnncnlis unifloris solitariis cernuis. *J* in regionibus montis Fakoniae inter Miaco et Jedo. *Ko-utsugi* incolarnm. Corolla campanulata 5-fida, laciniis revolulis. Antherae inclusae.
- 7th5. y. TIMGINOSUM (Linn. sp. 499)» canlc ramosissimo fusco-rnbiginoso, foliis parvis obovatis integerrimis suprà glabris subtùs venosis pubescentibus glau-cisqoe, floribns snbaolitariis, corollis brevi-urceolatis. [^] in turfosis montium et repionum pol.trium Europae usque ad Hispaniam meridionalem , in altissi-mis Siern-e Nevndae regni Giaoatensis (Boissier!) et A in ericas borealis. Fl. Dan. a3x.Engl. bot.t. 58i. Y. gualteroides Bigel. new. Engl. med. journ. Y. p. 33>. ex Torrey fl. i. p. 4i₇. V. pubescens Wormsk. ex Horneui. V. Seilenense Pcrs. ench. 1. p. 473. ir_{rot}tez parvulus proenmbens. Baccse oblongae. (v. s.)

» »> *Foliis semper virentibus.*

74. V. TIERMEDIUM (Ruthe fl. brandb. p. 377. t. 1), ramis junioribus angu-Intis, foliis breviter petiolatis ovatis ovalibus obovatisve serratis, floribos &ub-

racemosis, pedicellis unifloris solitarii gemimsve J in torfosu* pi ope Beiolum.— Intermedium ex Rathe intei 'V. Mytillus, et V. Vins-idaea Antherse biaristatse. Pedicelli in axillis biacteaiura lanceolataium Co roll ae campanulata? 1 librae.

75. V PENDUIIFLORUM (Gandich ' in Freyc voy. T. p. 454. t 68), erectnm, glabrum , iainis angulatis follosis, foil is oblongis argute senatis subcoiiaceis , pedunculis axillanbus. bolitauis uniflons elongatis, fiuctifeus pendulis, laci-niis cdlycmis lanceolatis con ilia campanulata quinque-angulata dituidio bre-vionbuš J in insulin Scandwicensibus alt. /₅₀₋₅₀₀ hex Floret detembu. An 'V. cerei var <T? an 'V. ceieum Cham, hue revocauduni ? (v. s 111 h. DC com to. à cl. Gaudichaud.)
96. 'V. CERECM (Forst. fl. ins. austr. piod p 28), ramis teietibus basi denndatis supeine dense fohosis angulatis glabris, folns conaceis ntunque leticulato-\enosis supra nitidis breviter acuminalas acumine integio, maigine glandn-losos serratis subsessilibus, infciionbns ramonbus, pednnnculis soht<uij> axilla-ibus umflons \$ m impe^tnbus monlium Iriilaium Sandwich (Cham.) Tahiti (Forst. mss '). Cham, et Schleoh. in linn 1. p. 527 Hook ic. pi. 1. t 87. Goill ' zepb. tait. n a'8 Andromeda ceieaLinu. f. snpl. a38.— Qbu-Obu in-colarum lahitensim. Coiolla urceolata cyhndracea 5-dentata Antheisc basi dorso aristata nee fuscata. Baccae rubrae exsncoa?. (v. s. m h. DC)

A. foliis lato-elliplcib glabiis.

J6 foliis lato-ellpticis pubescenlibus Dougl. plant, of Sandwich isl n. 17
y. foliis obovalis. V. reticulatom Smith in Rees cycl. n 30. G Don gen sysi
3. p. 85.

<T folns oblongo-obovatib remotioribus, ramis strictoribns V. denlatum
Smith in Rees cycl. n. 3i.

/S. Anthens muticis.

77 'V. OOTUSUM (Pursh fl. amer sept. 1. p 290), foliis parvis ovahbus utunquc lotuudato-obtusin mucronatis integerrimis glabris coriaceis, peduncnlis axila-rib u» solitaius unifloris ^ in regione boieah-occidentali Americx septentuo-nalis. Menzies in herb. Banks

78 'V. TERWIFLORUM, ram is teietibus oicatiisatis , ramulis fuscis pubescentibus, folns brevilei petiolatis snbibomboideis vel ovato-oblongis utnnque attenualih obtusinsculis aculisve avemis, supia glabns \lr1d1bus, subius pallide cinua-momeis, pilis fasciculatis punctatis, peduncnlis umfloris, geinmis, teinisque, nadis basi bracteatis. ^ in Pein (Pa\on) Pedicelli calycesque glabii cinnamomei. Limbs calycinns 4-paititus, lacmiis ttiangulanbus acutis Folia 6-7 lin longa, 4 ^n* *^ata ' P^{et}ro^{^o} senu-hnean (v. s. in h. Moncand.)

79* 'V. DIDYMANTHUM, rarais puberulis, foliis numerosis approximatis petiolatis ovato-ellipticis vel oblongo-ellipticis conaceis utnnque glabns leraote cienato-serratis supia lucidis subtus palldis a^utinsculis, in sumitate ramoinm IU-bescentibus, pedicellis gemims axillanbns unifloris apice mcrassatis. j in pio-vinciā Pernvianā Chacbpoyas Calyx limbo 5-partito, paititionibus tuanguU-ribns acntis glabiis. Coiolla tubuloso-ventncosa, 2 lin longa, senu 5-iida, lobis lanceolato-oblongis 1'ilanienta longa fllifoimia glabra. Habitus V. con-feru. (v s in h. Boissier.)

80. V. ALATERNODES (H B. et Kunth nov. gen. 3. p a65), aiborescens³ folns subrotundo - ellipticis acutiuscubs inlegeirimis obsolete tiinervns coriaceis glabns, floribus axillanbus solitaiis gem in is aut term;, sessibus oclandus, calycibns bibractealis, antheiis semi-exsertis fi m Andibus Peiuvianoium alt 1700 hex. Coiolla tubulo&o campanulata alba? Bracteae opposilae ovario bie-viores.

81. V. PEICJEOIDES (H B. et Kunth nov. gen. am 3 p. 264), repens, folns ap-proximatis sobimbricatis oblongis acutis obsoletè el lemote crenuLuis rigidis , glabrissubciliati!>. floribus axillaribus solitaries bicviter pcndnncolatis octandns.

- calycinus bibracteatis. fy in niente Tunguragua Regni Quitensis. Proximum V. einpetrifolio. Corolla tubulosa campanulata coccinea glabra quadrifida.*
- 8a. *V. ACUMINATUM* (H. B. et Kunth nov. gen. et sp. 3. p. a63. t. *49), caule arboreo, foliis approximatè sabimbricntis ovatis acuminatis coriaceis glabrius-calis suprà viridibns, subtisi rufescentibus, floribus axillaribus solitariis geminiis ternisve octandris sabsessilibas, oalycibus bibracteatis. t) in montibns Novo-Granatensium et Peruvianorun alt. 1600—1700 hex. Thibaudia microphylla R. et Pav. fl. per. v. 4. ined. ex h. Tbib. Gaylussacia micropbylla G. Don gen. syst. 3. p. 85f? Corolla subgloboso-campanulata alba 4-fida. Calyx bi-bracteatus. Ramali ferrugineo-hirsati. (v. s. in herb. DC. ex herb. Thibaad.)
83. '*V. EMPETRIFOLIUM* (H. B. et Kunth nov. gen. et sp. 3. p. 263. t. 048), repens, foliis approximato-subinibracatis oblongis obtosis integerrimis coriaceis glabris, floribus soli la ri is pedunculatis octandris, calycibus bibracteatis. 3 in monte Antisana Peruviae alt. i650 hex. Corolla tnbuloso-campanulata, 4-fida, coccinea.
84. *V. HUMIFCSUM* (Grah. in Kdimb. phil. journ. 1831. p. 8), canle frnticoso prostrato repeute, foliis ovatis subacutis integerrimis utrinquè glabris ciliatis, pednnclis axillaribas solitariis nnifloris bracteatis. \$ *^u niontibns scopulosis (Rocky mountains) Americas borealis. (Drummond.) Corolla campanulata, 5-lobata lobis reflexis, alba, saepè rubro tincta. Stamina 10, inclusa.
85. *V. MICROPHYLLUM* (Reinwardt herb, ex Blum, hijdr. p. 851), caule fruticoso, ramulis pubernlis, foliis ovalibos obtusis integerrimis raargine recurvis venosis coriaceis glabris, pedunculis subsolitariis axillaribas unifloris, corollis urceolatis. J in montosis insulae Celebes. Floret omni tempore. Calyces ebracteati.

-j- *Species excludendct.*

- V. ACOSTA* Raensch. =z Agapetes Acosta.
- V. ALBUM* (Linn. sp. 1. p. 499). =Xylosteum ciliatum & Parsh fl. amer. sept. t. p. 261. Secundum G. Don gen. syst. 3. p. 853.
- y. *ALATUM* Do nab. = Thibaudia alata.
- '*V. ARBOREUM* Lesch. = Agapetes arborea.
- ~*V. BRASILIENSE* Spreng. = Gaylussacia Pseudo-Yaccinim.
- '*V. CANTABRICUM* Hods, = Dabcecia poll'folia.
- '*V. ERYTRHOCARPOW* Michx. = Oxycoccus erectus.
- '*V. GRANDIFLORUM* Hortul. = Ceratostema grandiflorum.
- V. GUADALUPENSE* Wickslr. = Andreusia Guadalupensis.
- '*V. HISPIDCLUM* Linn. = Phalerocarpus serpyllifolius.
- V. HispitoULDM* Wang. z=z Oxycoccus macrocavpus.
- V. LIGISTRINUM* Linn. =Lyonia ligustrina.
- Y- *MICROCAHPUM* Ait. = Oxycoccus macrocarpns.
- '*V. MACROPHYLLUM* Domb. = Thibaudia punctatifolia.
- '*V. OBLONGIFOTIO*M Hortul. = Oxycoccus inacrocarpua.
- V. ORIKWTALE* Sw. r=z Agapetes Acosta.
- '*V. OXYCOCCOS* Linn. = Oxycoccus palustris.
- '*V. SPICATUM* Pers. = Agapetes Acosta.

VIII. *OXYCOCCUS* Pers. syn. r. p. 419. *Purshfl. amer. sept. i.p-* 256. *Nutt. gen. am. 1. p. 260. — Vaccinii sp. Lin. et Auct. — Schollera Roth tent.Jl. germ. x. p. 170 non Willd. nee J.Rohr.*

Calyx ovario adnalus, limbo 4-fido. Corolla 4-partita, segmentis sublincaribus revolutis. Filamenta conniventia. Anthrae tubulosae fur-

catae poris obliquis dehiscentes. Bacca 4-locularis , loculis polyspermis.
— Suffrutes repentes vel frutices erecti.

I. O. PALUSTRIS (Pers. syu. i. p. 419), repens , ramis filiformibus , foliis ovalibus integerrimis ruagine revolutis subacutis glabris sublùs albicantibus, pedicellis elongatis terinalibus, corolla; laciis ovalibus. *fr* in tñrfosis humidis Euro pa? et Ainericae borealis. O. vulgaris Pursh fl. amer. sept. 1. p. 263. O. euro pie us Nutr. gen. amer. 1. p. a5r. "Vaccinium Oxycoccos Lin. sp. 500. Sow. engl. bot. t. 319. OEd. fl. dan. t. 80. Vaccin. Oxycoccus *a.* ovalifolius Michx. fl. bor amer. p. 1. 228. Snffriilex herbaceus repens sempervirens. Corolla: rubrce, baccae parvule. Folia i3 lin. longa , 1 \ lin. lata. (v. v. et s. in h. DC.)

@. *pusillus*. In Lithuania et Courlandia.

- a. O. MACROCARPUS (Pers. syn. 1. p. 419), repens, raiuisfiliformibus ad. scendentibus, foliis oblongis integerrimis planiusculis obtusis glabris sublùs albicantibus , pendunculis lateralibus elongatis basi bracteatis aphyllis. ^ in paludibus sabulosis America* borealis. Pursh fl. amer. sept. 1. p. 2(3). Wats, dendr. brit. t. 122. "Vacciniuru macrocarpon Ait. kew. ed. 1. v. 2. J. i3. t. 7. Bot. mag. t. 25. V. Oxycoccos /S oblongifolium Michx. amer. 1. p. 228. "V. hispidulum Wang, amer. p. 108. t. 3o. f. 67. *Cramberries* anglice. Bacca; rub lie edules. Folia 3-4 lin. longa, 1-2 lin. lata. (v. s. in h. DC.)
3. O. ERECTUS (Pursh fl. amer. sept. 1. p. 26/f), caule erecto, foliis ovalibus aenminatis semilatis ciliatisque, pedicellis axillaribus, corollâ longâ dcmùoi revolutâ. § in altis montibus Carolina; et "Virginiae. Wats, dendr. brit. t. 3i. Vaccinium erythrocarpum Michx. fl. amer. bor. x. p. 227. Baccae coccinex , nilidae. Corolla; coccinea?. Folia argutè serrata ferè pollicem longa, 6-9 lin. lala. Rami dichotomi ? (v. s. in h. DC.)

-|- *Species exclusa.*

0. HISPIOULUS Pers. = Phalerocarpus serpyllifolius.

§. 2. *Fructu vix baccato coriacco indehiscente aut capsulari.*

IX. PHALEROCARPUS G. Don gen. syst. 3. p. 841. — Vaccinii sp. Linn. sp. 500. — Arbuti sp. Lam. diet. i.p. 2*28. — Oxycocci sp. Pers. enh. 1. p. 419. — Gualteriae sp. Pursh Jl. am, sept. 1. p. 283. — Glyciphylla; sp. Rafinesque in h. DC.

Calyx bibracteatus adhaerens, limbo 4-partito membranaceo tenui. Corolla brevi-campanulata , 4 - fida. Slamina 8. Filamenta hispida ? Antherae mutica?? Discus epigynus 8-dentatus? Ovariuri semi-adhaerens limbo calycino coronatum. Capsula ? subgloboso-ovata nivea , infra verticem convexum limbo calycino coronata.

1. P. sERYLLFOi**^A (G. Don gen. syst. 3. p. 841)» caalibns repentibus hispidis , foliis snbrotundo-ovalibus acuruinatis supra viridibus plabris, snblùs pailide ferrugineis, pilis fr.sciculatis ferrugineis longis conspersis. J in America; borealis cupressetis huraidis. 'Vaccinium hispidulum Lin. sp. 500 exclus. syn. plur. Michx. fl. am. bor. 1. p. 228. t. 23. Arbutus flliformis Lam. diet. 1. p. 228. Oxycoccos hispidulas Pers. enchir. i.p. 419. Gaultheria serpyllifolia Pursh fl. am. sept. 1. p. a88. Glyciphylla hispidula Raf. 1829 in h. DC. Ganltheria hispidula Muhl.ex. Torr. fl. am. 1. p. 4i3.—Caules ferrngineo-hirsuti. Corolla parvula alba. Bacca nivea edulis. Folia 1 J-a lin. longa , 1-1 1 li_a lata /v , s. in h. DC.)

X. MACLEANIA Hook, icon.pl. a. t. 109.

Calyx truncatus obsoletissimè 5-dentatus, 5-alatus, inferne ovario adhaerens. Cor. cylindracea limbo 5-fido. Stam. 10 basi corollae iu-serta % fUameotis per totam longitudinem in urceolum connatis. An-

therae basi affixa, dorso muticae, apice in tubum simplicem attenuatae et rimulft singulâ introrsum dehiscentes. Ovarium 5-ioculare multi-ovulatum. Fruct. ign. — Frutex Peruvianus habitu Thibaudiae aut Cerasostematis glaber, cortice deciduo. Folia subsecunda ovato-acuta coriacea. FJores in axillis fasciculati, secundi, pollicem et ultrà longi.

x. M. FLORIBUNDA (Hook. 1. c.). J in Andibus Peraviae ad Jambras bamba legit cl. Mathews.

XL ANTHOPTERUS Hook, ic.pl. 3. e. *tf.

Calyx ovario adhaerens, basi ebracteatus, altè 5-alatus, 5-dentatus, dentibus ovatis acutis erectis. Cor. conico-urceolata 5-alata, 5-dentata, dentibus acuminatis erectis vel ereclo-patentibus. Stam. 10, iilam. brevibus in membranam connatis, calyci ad basin corolla? insertis, anth. loculis longissimè rostralis rhinâ elongatâ ad apicern intiis debiscentibus. Ovarium 5-locularc pluri-ovulatum. Fructus subbaccatus coriaceus indchiscens 5-pterus 5-locul. dentibus calycis coronalus. — Frutex Peruvianus super arbores (pseudo-?) parasiticus, glaber, habitu Thibaudise et Macleaniae. Rami stricti. Folia lanceolata coriacea trinervia sessilia integer rim a. Flores racemosi majusculi. Pedicelli elongati, basi unibractcati, versùs medium bibracteolati.

z. A. RICEOMOSUS (Hook. 1. c.). ♀ in Peraviae provinciâ Moyabamba super arbores.

XII. ARGOPHYLLUM Forst. caract.gen.p. 29. t. 15. tin. f. stipp. 156. Lam. Must. Cm (a Forsteri ramentata). Gaertn.f. carp. 3. p. 210. Lab ill. sert, austr. caled. t. 40 et 41. p. 37.

Calyx turbinato-subhaemisphacricus sulcatus, limbo 5-6-partito introflexo. Corolla subrotata gamopetala, 5-6-partita, summo calyci inserta, tubo interiori 5-6-gono, 5-6-fido, laciniis fimbriatis, partitionibus corollse oppositis. Stamina 5-6, simplicia, infrà tubum calyci affixa. Ovarium turbinatum, stylo simplici, stigmate capita to. Capsula semi-adhaerens, turbinato-ovovata depressiuscula limbo calycis coronata 5-4-locularis, 3-4-^{arri}_{arn} dehiscens, trivalvis valvis medio septi' eris. Semina numerosa placentis centralibus affixa. — Frutices foliis integris vel laxè serratis discoloribus, floribus terminalibus paniculatis.

1. A. wittDUM (Forst. prod. 115), ramis teretiasculis sericeo-tomentosis, foliis ovatis utrinquè acutis integris senatisve, subtus albido-argenteis sericeis, panicolis calycibusque sericeo-argenteis splendentibus. ^ in Novâ-Caledoniâ. Dan. vacc. iued. t. 4. Labill.! sert. austr. caled. p. 38. t. 40. — Frutex sesquaiorgyalis. (v. s. in b. DC. coin in. à cl. Labillardière.)
2. A. BILIPTICUM (Labill.! sert. austr. caled. p. 39. t. 41) » y^{amis}s cinereis apice leproso-hirsutis intense rufescens, foliis ellipticis basi attenuatè obtiws integrerrinis margine revolutis coriaceis, soprâ glabriusculis viridi-fuscis, subtus nervosis tomentoso-rufis, racemis corymbosis terminalibus calycibusqne tonentoso-rufis. ^ in Novâ-Caledonia. Frutex pedalis. (v. 9. in n. DC. conani. à cl. Labillardière.)

XIII. AMECHANIA DC. herb.

Calyx imo ovario adnatus basi turbinatus 5-fidus, lobis ovatis aculis persistentibus. Cor. oblonga 5-fida. Stam. TO filamentis pubenilis, antheris bilocularibus muticis apice hiporosis. Ovarium subglobosum

superne velutinum Stylus filifoimis Capsula globosa tx nnā paite calyci adnata, ab eo cmcta, 5-locul 5-valvis, valvis medio septifens locuhcido-dehiscens Axis fructus pentagon! fere pentaptera Semina in quoque loculo 1-2, sed in specim decidua —Suffrutices Brasilienses eiecti, \ndromedae aut Gaultheneae facie Folia aliei in conacea erecta, marginibusrevoluta, medio uninei via, venis laleiahbus pmnatis subtus piaecipue piominulis, mucrone iigido nigricante e neivo medio orto teuninata Racem subterimnales aut ex axilhs supienus 01 ti Biactcolse subulatae ad basm pedicellorum —Flores ex primā specie, fructus ex secundā descripti. An stuples sint vanetas aut species dubito^T Genus non satis notuni et ideo ex voce giaccā uf/»^ttvtt,y peiplexitas, dictum

- 2 A SDBCANESCENS (DC herb), ramis pedicnlis calycibnsque pnbe minima al-
bidā canesceulibus, foliorum nervo medio subtus non ^etigeio, maigmibui
Integruimis ^ in Brasilise paludosis Balataes dictis legit cl Lund¹ junio-flo
Corolla pnrpnrescens 1 ruct igu (v s sine frnct a cl inv ;
2 A HisPiDurA (DC heib), raraulis pedicellis nervoque medio folii subtus setis
rigidis patulis hispidis, folus ad ningines subdenticul Uis ^ cum prioic legit
cl. Lund An ideo pi ions act as provecta, aut vanetas ' An species propna **
(v s. sine flor a cl inv)
-

Ordo CXIV. ERTCACEiE *Lindl* nat. syst. ed. i. p. a20. —
 Ericse et Rhododendra Juss. gen. p. 15g. —Ericaceae et
 Rhodoraceae DC. /I. fr. ed. 3. p. 671 et 6j5. — Ericeae
 /J. Brown prod. 557. LindL sjn. p. 172. — Ericineae Desv.
 | journ. hot. 1813.p. 28. G. Don in Edimb. phil. journ. 1834.
 p. 150. Klotsch in linncea 1835. v. 9. litt. p. 67.

Calyx 4-5-partitus, ferè aequalis, ab ovario omnino liber, persistens. Corolla perigyna aut subhypogyna, gamopetala, 4-5-partita aut peialis omnino discretis 4-5-petala, regularis aut rariis irregularis, petalis per aestivationem imbricatis. Stam. definita, numero petalorum aequalia aut dupla, corollæ aut omnino aut ferè omnino libera. Antherae biloculares, loculis duris siccis apice aut basi discretis, saepè variè appendiculatis, poro terminali dehiscentibus. Ovarium liberum, basi disco interdùm nectarifero cinctum. Stylus unicus rigidus. Stigma indivisum dentatum aut 3-lobum. Fructus capsularis polyspermus pluri-locularis debiscentia varius. Semina placentis centralibus inserta, parva, indefinita, testa nucleo nrcte adhaerente. Embryo teres in axi albuminis carnosus, radiculæ hylo opposite. — Frutices aut suffrutices rarissimè arbusculæ. Folia alterna, rarius subopposita aut verticillata, exstipulata, saepius rigida integra sempervirentia super caulem articulatim inserta. Inflorescentia varia. Pedicelli saepius bracteati. — Ordo elegans, olim in duos separatus, nunc debiscentiae modo ad gradum minorem reducto, tantum in tribus plures divisus. Differt à Vaccinieis ovario libero, ab Epacrideis antberis bilocularibus, à Pyrolaceis structura seminum. — Ericaceae et pauci ordines his affines medium tenuent inter Ciliyciflorarum et Corolliflorarum classes, prioribus staminibus vix corollæ adnatis, posterioribus corollis fere hypogynis affines. Inter priores praeeunte cl. Jussiaeo hos ordines servavi, cuius staminum inserlio a Corollifloris nimis abhorret. An fortè classis inter priorem et sequentem admittenda? An ex hodiernis, praecipue Anglis botanicis, partium floralium insertio floccifacienda?

Tribus I. ARBUTEJE. — *Andromedearum* gen. *Don* *Lindl*

Fructus inlehisccns baccatus. Corolla decidua. — Frutices sempervirentes. — Tribus ex fructu baccato accedens ad Vaccinieas et Epacrideas.

- I. ARBUTUS *Tourn. inst. 5g8 t. 368. Gartn.fr. i. p 284. t 59 //.* B. et Kunk nov gen. am 3 p. 279. G. Don gen. srst 3 p. 8J4.— Unedo Hoffmans. et Lxnkfl. port. 1 p. 4i5. — Aibuti»p. Lin

Calyx 5-paititus. Cor. globoso-aut ovato-urceolata 5-dentata, dentibus obtusis reflexis. Stam. ioinclusa, filam. imo corolla? tubo inseitis, antheiis compressis a pice biporosis dorso infra apicem affixis ibique bianstatis, anstis reflexis. Ovanum disco hypogyno impositum aut semi-immersum, 5-locul. loculis polyspermis, placentis centialibus penduhs. Stylus 1. Stigma obtusum. Bacca globosa, plus minus gianu-Iato-tuberculosa, raniis Isevis, 5-locul. loculis polyspermis' — Arbusculae aut frutices. Folia alterna coriacea perennaolia petiolata ovata aut oblonga mtegernma aut dentata. Racemi terminales saepiis paniculati bracteati. Floiespedicellati. Cor. albae autcarneae. — In plurmis speciebus corolla? casu montrosae ferè pentapetalae aut 5-lobje evadunt.

Gerontogece.

1. A. UNEDO (Linn. sp. 366), arborea, coilice mgoso, folns oblongo-lanceolatis obtuse serratis glabns mtdis, racemis nutantibus glabri* subpaniculatis, fructibus mmicato-veriuicosjis globosis. 5ⁱⁿ aspens et lupestibii, legionis ineditenaneas à Bizantio et Pdlaestinâ ad fietum Gibrdltiū nm et secas OceanoB in Lusitamâ, Galliâ occid. et Hibemiat Lam ill. t 366. f 1. Mill. ic. t. 48 f. 1 2. Dnhani arb ed DOV. 1 p 73 t. 21 Eue;l. bot. t. 2377 Unedo edulis> Hoffw et Link fl port 1 p. 4i5 Aib senatifolia Salisb prod 288 Vanat foliis &eriatis ant integerrirais fintegnfolia Sims bot. mag. t 2319), ob-ovato-lanceolatis ant oblongo-lauceoldti& (A. sahcifolia Hoffmans. verz. 1824. p. ao5), plams* aut coinplicato-cn&jis (A. crispa Hoffni. verz. 1824. p 204), ramis glibusaut bispidis,Aonbus albisaot rabescentibus (A unedo rubia Lodd. bot. cab a. t. i33), bimpticibus ant plenib (Ait. kew 3. p. 56), lobis coi integiibtiut laceus (A. Unedo scbizopetala Don). Fiuctus mbii edules sapore falui 'Var. Hyberonica dicitui in hortis fugoris minus impatient, (v v.)
- a. A. HYBRIDA (Kerbot. reg. t. 619), arborea, cortice deciduo, folns oblongis ntnnque «icutib senatis glabns, ramnis pilo&o-glandnlosis lachibusque rubric, panicuhs nutantibus, ovauo subepili /> in hortis verisim. 01 ta ex A. Unedone et Andiacbne. Flores ex albo vjrescentes Cortex ut in Andrachue.
3. A. SERRATIFOLIA (Lodd. bot. cab. t 580 non Salisb), aiboiea, cortice laevi, raniis tachibnsqne glabiis. lobicnndis, fohis oblongo-lanceolatis utrinqueacutis serratis glabiID, pauiculis nutantibus ty in hoi tis nbi verisliu ex A Uuedune et forte Andiathne sen andidchnoje órta Folia magis oblonga inagis senata et brevius petiolata quam A. Andiachnes Corollae albido-subflavidae.
- 4» A AITDRACHNOIDES (Link euuiD 1. p. 395), arboiea, cortice (ut in Andrachue) decidoo foliis oblongis ntnnque acntis seiolatis glibiis, panicohs nutautibus pubescentibus, calyce glabro./^m Oiientc (OlivJ heib.). Ab dffinibus differt racemorum racibibus pube albida velutinis nee aut glabenimis aut pllosoglandolosis. — An hoc aul ad A. unedonis var. qnamdam referenda A. turbinata Pers. et Reich fl. exc. 1. p. 416, fructu torbinato subacnto etflorescentià spuoi à cl. anct. distincta⁰
5. A. CANARIEWSIS ('Veill in Duham. arb ed nov 1. p 80), arborea, cortice rrgoso?, foliis oblongo-lanceolatis utunque acuminatis senatis glabns, paniculis erectis bispido-glandulosis, fiuctibus romicato-veirucosis. fy m insni. Cananensium legione sylvaticA ubi dicitui Madrono. (Buch' can. 146 et 180) Sims bot. mag t. 1677 ^- callicarpos Biouss ' herb Buch 1. c. A procea Soland in h Banks, Habitus Unedonis Cor. albo virescentes aut io»e»3. (v. v c. et s. sp)
6. A. LONGIFOLIA. (1 oii in heib. amat t. 240), arboiea, coitice lasvâ, foliis oblongis acutis serratis glabris basi cilutis, adultis dependentibns, petiolo

hispido, pauicnhs ceinuis larauhsque glntinoso-pilosis, calycibus ciliatis /) in hoitis ubi foite provenit ex A Andiathne et Cananensi. Coi majoies quaiu Andrachues albido-virescentes. (v. v. c in h Genev)

7. A. AKDRACHNE (Linn. sp. 566), a 1 Lore a , cortice laevi, foliis longe petiolatis ovahbus obtutis glabris lotgeei rimis aut lanus 1 emote seriatis, pamcalâ electâ piloso-glanduJosâ apbylla*, baccis laevibus t> *^b «J>peii» Giacae ruca A then as, in ins. Cypio et inter bmyrnam et Bui sain (Sibth '), inter Aleppam et Antio- cbum (Bel.), ciica Magnesiam copiose (Don), ad rnontem Caimel (Labill.') in Tannâ (Stev.' Bieb). Asiâ mino*e, etc Kei bot. ieg. t n3 Sims bot mag. t. 2024. Dabani. aib ed. nov 1 t 22. Aib. integrifolia Salisb. piod 288 Andracobne frntescens Ehr. phil. tians. 57 p. 114 t 6. Cor. ex albo sulni- rescentes Cortex laevis epidermide rubente deciduâ. Bacca globosa rubra edulis. (v. v. c et s. sp)
8. A. INTEGRIFOIA (Lam. diet. 1 p 227 non Salisb), arborea, cortice laevi, foliis longe petiolatis ovatis Integeiriraſacnmne brevi mucionatis, panfculâ erectâ divancatâ parce piloso-glandnlosâ folus paucis intermixta. %5 ^m iQ*>ub' Creta ad radices mont. Ida; (lourn.), piope Damaska (Sieb ' b. Cret) #kndrachne TbeopbiastiClns hist. 1 p. 4S Arb. folio non seirato Tonrn. Finctus dienntur ovales verrncosi rabro-aurantiaci apiculati. Touin. voy. 2. p. 488. (v. s. ex coll Sieb)

** Americanos.

9. A. PROCERA (Doogl ex Lindl. bot. reg. t. 1753), arborea glabra, foliis pelio- latis oblongib duphcato-sciratis, tacemis teiuinalibus pamculatis secundis toxentosib. jy in orâ occid Amencae boiealis Ramuli Interdum bispuli Petioli cal\i ex diagnosi, interdum hispidi ex descibiactae ovatae concave Coi alba;; Fractas subiotundi tubercalati.
10. A. MENZIESII (Parsh fl boi. am. 1. p. 282), arboiea glaberriraa, foliis longe petiolatis couaceis snbtus glancis mtegerrimis senalahsve ovatis ovalibnsve, racemis axillaiibas terminalibasve panicalatis densis pubescntibos , baccis rugosis ^ ad oram Ameiiae borealis occid. (Men?), ad Puget-sonnd, Columbia flam, et Novam Califotniam (Donglas), forte in Mexico occid (ex special. Mendezii non floiidis). Hook bot Beech p 142. Proxime accedit ad A Andrachnem et iconieu t. i)3 bot. leg. non male refert. Baccae polyspermaB. (v. s. sine fl)
- ? *obiongifoha*, foliis oblongis utiinqnâ acummatis seiratis. ^ cam piiorc specim sine fl. raisit cl. Mendez.l Arbatus lanrifolia Linn f. suppl. a38 ? Species Linnaeana obscora etin herb suo non servata ex Don. (v. a. sine fl)
- >? *elliptica*, foliis elliptlcis serrulatis paice acntis. *) in Mexico legei. cl Alaman et Manet. An forte A. obtusifolins Raf. fl lud p. 55° Folia no •ella longe petiolata e gemma' squamosa' 01 ta. Racemi ad apicem rami pluri conferti multiflon, rachi pubescente Biactese et cal lobi obtusi. Cor ovato-globosae. (v. s.)
- ir. A. PETIOLARIS (H. B et Kuntli nov. gen. am. 3 p. 281), arboiea, rainulis piloso-pubescentibus, foliis longe petiolatis oblongis acutiuscubs mucronatu* margine denticnlatis membranaceis snprâ glabris soubtus tomentoso-pubescentibus, Taceuiib abbreviatis congestis, pedicellis longis villoso-pabescentibos.^ in dechvitate occid. montium Mexicanorum inter Cnernavaca et Cuclnlaque Cor alba
12. A. DEirsFroRA (H. B. et Kunth 1 c. t 260), lamulis pubescenti-pjloMs, folus longe petiolatis oblongis acutis argute dentatis couaceis supiâ glabus subnitidis sabtus fascescenti-pubescentibns, nei)o medio feirugineo-villo&o. racemis paniculatis. fy in declivitate orientali montiom Mexicunoim mtei La Pileta et Xalapa. Petioli 12-16 lin. lougi. Folia 4-5 poll, longa, 1 |-2lata Flores couferti albP Pedicelli pubescentes
- J3. A. MOLLX& (H. B. et Kunth 1 c), lamuln pubescentibns, foliis petiolati&

*oMongi** acutis aigute dentalis coriaceis supra mollitei' pubescentibus, subtus canescenti-tomentosis, raceruis paniculatis sessilibus, iloiibus appioximatit. 5 ill Mexico prope Guanaxnato. Folia 2-2 •} pollic. longa, 10-12 hn. lata , petiolo 6-8 hn longo. Rachis et pedicelli pubescenti-tomentosi.

14. A. XALAPEWSIS (H. B et Kunlh 1. c.) lamlis glabns, folns peUolatls oblongis acutis integerrimis snpiā glabris sublūs fu*ccsceuti-loinentosis, race mis paniculato-congestis. /> in s^lvis montiuru Mexicaouium piope Xalapa. Flo res ceruui' albP Fолн 2 poll longa, pollioeni lata.

J Species minus notes.

- x5. A.? FERRUGINEA (Lmn. f. suppl. 238), aiborescens, ramis glabris, folns petiolatis oblongis obtnsis glabris integetnniis, lecemi* axillaubus et terminalibns solitaiiis, pedicelhs inert 10 bibiacteatis, flonl>us nutantibus. J in America mend. Fiuctus dicitar baccatus aed bujus stiuct. igo.

16. A.? FUHENS Hook. bot. Beech, p. 33), caule simplici pabescente, fblis ovah- bus breve petiolialis deuticalatis couaceis margine ievolulis supra uitentibas ntrinque^landulosis, glandnhs pilo terminals, raceinis brevibus axillanbus , rabi pedicellisque pubescentibuj* squamulosi->, calyco glabio, corollā extūs glabra intus pilosā. j in Chih prope Conceptionis uibem (Beech.) in locis siccis a rid is Qued-qued Keuill. obi. 3 p. 56. t. 4^. Baccæ lubro-fusca?, inagnit. Uvs, caine albā. Ingesta? delirium procieant.

17. A.? PUNCTATA (Hook bot. Beech, p. 33), lamosstssima, ramnlis pubescentibus, folib subsessilbus ovato-lanceolatia denticnlatis couaceis maigine revo- lutis glandulis pi lifer is sparsis, racemis axillaribus pubescenlibus squamulosis, calyce glabro, corolla extūs glabra nit us pilosā. 5 ia Chili ad Conceptjonis urbera. Foile eadem ac Pernettya pbillyreaefolia ex cL auct et ideb foite cum priore ad Pernettyam tiansferendat*

18. A.? LANCEOIATA (Lam. diet. 1. p. 227. "Veill. in Duham ed. nov. 1. p. 77 bis), caule erecto glabro, folus petiolatis couareis lanceolato-oblonf[i]:> acutis mte- gerumis, Idcenm terminalibus ramosis nutantibus glabns, flonbus 4-fidis , bacc.1 5-lorul. polyspeima />P^atⁿa *8ⁿ Diversa videtui ab Arbuto Acadieubi Linn, qui foite ad Taccima refeiendns, &d omnino obscura leinanet. 'l'

'J Species evclusce.

- A ACADIENSIS Linn. z= Vaccinii sp ?
- A ALFXNA Linn.=r Arctostaphylos aipina.
- A BUXIFOLIA Stok. = Arctostaphylos Uva-nrsi
- A EMPETRIFOLIA Link. = Pernettya empetuifolia
- A FILIFORMIS Lam. = Phalerocarpus bi&pidulus.
- A tAURIFOLIA Hasn. = Gaulthena fiagranissima
- A LKUCOCAKPA Poepp. = Pei nettya leucocarpa.
- A MICROPKYLLA Foist. = Pernettya rnicrophylla.
- A MUCRONATA. Forst. = Pernettya raucionata.
- A MYRTILLOIDLS Pcepp. = Gaultberia Pceppigii.
- A PHYLUREyEPOLI Pers. = Pernettya phyllireaefolia.
- A PUMIL^ Linn. f = Pernettya empernfolia.
- A ruwGENs Hook.= Aictoj>taphylos Hookeii.
- A SERFYLLIFOLIA Lam. = Pei nettya microphylla.
- A THYMIFOLIA Ait. = Phaleroocarpus hispidulus.
- A TOMENTOSA Pursh. = Arctostaphylos tomentosa.
- A Verna-LIS Pcepp. = Gaulthera vernalis.
- A UVA-USRI Linn. = Arctostaphylos Uva-ursi.
- A xALAppETsis Andr. = Arctostaphylos Oaxacana.

II ARCTOSTAPHYLOS *Gal. ex Adam fan.* (i,63) a. p. i65 *H. B. et Kunth nov gen am 3/7.277 Spreng.syst 2 p 287. G Bon gen. syst. 3 p. 837.— Mairania Neck elem. 1. (1790) <. 363. Desv.journ. bot. 3. >. 38 —Uva-ui&i et Vitis-idaea Tourn inst p. 099 et 607. t. 3jo. Mcench meth. p 470 —Arbati sp. Linn.*

Calyx 5-partitus persistens. Cor. ovato-uiceolata, 01 e 5-dentato revoluto brevi. Stam. 10 inclusa, filam. basi subdilatatis saepius piloso-ciliatis, antheris compressis apice biporosis laterahter bianstatis , aristis reflexis. Ovanum globoso-depressum squamis 3 carnulosus cinctum. Stylus brevis Stigma obtusum Bacca (seu drupa baccata) globosa 5-rariis 6-7-immo io-loculans, locuhs i-spermis!—Suffiutices frutescensve. Folia alterna, saepius persistentia, Integra aut denticulata. Racemi terminates bracteati. Cor. albae aut rubrae. Fiuctus rubri aut nigrum.

§. 1. *Procumbentes (Europece aut Americana) > fructibus lew 1 bus baccatis.* — Mairania Neck. I. c.

1 A. ALPINA (Spreng. 1 c), piocnmbens , foliis membranaceis decidiis obovatis acantis berratis, janioribus ulialis, lacemahs terminahbus, bucteolis o^atis amplis pedicello ciic. xquahbos ciliatis. 5 *n apricis alpinis Europ* et Asiae boreahs fiequens Aibntub .iipina Linn sp 566. OEd. fl. dan. t. 7J. Lightf 11 scot 215. t 11. f. a. b. Palmstr sv bot. t. 478. Gmmp. baamz. t. 58. Coi albae Baccae nigrae, jamores acerbae (v. v)

X A. UVA-URSI (Spieng syst 2. p 287), procambens, foliis couaceis persi&tentibus obovatis integerrimis lacidis, flonbas in lacemolos termmales dispoj.itis , biacteolis sab pedicellis obtasis minimis. £ m montanis et rupestibus Europa* borealis et mediae, Asiae et Americas borealis fiequens. Arbutus Uva-ursi Linn, sp 566 fl lap n. 162. t 6.F. 3 Woodv. med.bot 194. t 70. OEd. fl. dan. t. ii. Scbkubr. handb t. 118 Arbutus buxifolia Stok bot. 5og. Uva-uisi buxifolia Sal in Gray air. 2. p 400 Uva-ursi procumbens Mcench 1 'c. Aibntns procambeus Sahsb. piod 269 Mairania Uva-ursi Desv I. c Cor. albae ore rubente Baccae ma torse rnbirse sapore austeo. Folia astringentia, in calculosis inorbis celebrata. (v. v)

3. A. HOOKERI (G Don gen syst. 3. p 836), procambens sappabescens, fohisco-riaceis perennantibus petiolatis ovalibus obovatisve mlidis minute reticulatis pungenti-raacronatis tenui-marginatis subintegerrimis, racemis teiminalibus brevibus, floribus bracteatis ^ in Californiâ. Aibutas pangens Hook et Aim. in Beech, bot. p 144 Habitus Uva-ursi sed folia latiora longms petiolata basi obtusa, juniora sub\lllosa, plus minus serrata , mucronata

§. 2. *Erecta (omnes Americana), fructibus scepc {an semper?} drupaceis extus verruculosis.*— Comarostaphylis Zucc. abh. Munch, akad. 183^. p. 331 fascic. pL rar. 2. n. 11.

4 A. PCNGENS (H. B et Knth nov gen. am 3. p. 836), erecta , ramulis racemij, fohj&qne junctionbus tenuissime velutinis., foliis ovalibus oblongisve mucionato-pnngentibus utrinque acrainatis conaceis integerriniis , racemis bievibus terminalibus, bracfeis acommatis 5 in Mexico locij* aid* circa Moian «t "Villalpando (H et B) et in ditione Oaxaca(Andr • pi exs. n. 261) Corolla; albae Vanat aut velutina aut glahnicula, foliis ovalibus ant elliptico-oblongis, bracteolis pedicello bievionbus ant ferelongionbus, erectis aut apice nncmato-recurvis in stiipe Oaxacanâ forte specifice distinguenda ? (v. s)

5 A GLAUCFSCENS (H. B et Kunth nov gen am. 3 p 278), erecta? , ramulis puberuhs, folus lanceolalo oblongis obtasis subinucionatis integerrimis sub-coriaccis supra glabris et nitidis subtus» pabescentibas et glaucescentibos,

racemis termmahbus electis secundiiloris glanduloso-pubescentifcs, bracteis pedicello roullo brevioribus. 3 \$^m Mex'co intei Guanaxualo et Valenciana. Stam. filam glabra. Coi. coccinea?

6. A. POLIFOLIA (H. B. et Kunth nov. gen. am 3. p. 277), erecta, lamnlis racemisque mmntissime pubernlis, foliis hneari-lanceolatis acutis integerrimis maigine subrevolutis coriaceis leticnlati glaucescentibus supra glabiis subtus minutissime velutinis, racemis terminahbus erectis subsecundi» laxiusrulis, biacteis acuminatis pedicello duplo brevionbus. \$ⁿ temperatis Mexici piope Villalpando (H et B. Mendez') Andromeda ledifolia H. B. et K. proleg. p. XLI. Cor. coccinea ovata. Stam. filam. villosa-ciliata (v. s. comm à cl Mendez.) *
7. A. ARGUTA (Zucc niss ex linnaea 1838. litt. p. 86), erecta glabra, foliis breviter petiolatis oblongo lanceolatis utiinque atteuuatis acute argute et lujequalter cartilagineo-dentalis, dentibus mucronatis, racemis termiuahbus, junioribus secundis nutantibus demum erectis 3 *ⁿ Mexico. Comarostaphylis arguta Zucc]. c Corolla; tubo globoso, limbo 5-lobo, viirstenti-albae. Stam. filam. barbata. Drnpa rubra globosa extus venucosa, i-5-sperma.
- 8 A OAXACAWA , erecta , lamulis petiolis racemique rachibus feirugmeo-hispidis, foliis oblongo-sublanceolatis coriaceis maigine revoliitis et integerrimis supra glabns subtus feriugmeo-hisutis nervo promineute, lacemis termtnahbus solitaiiis, bracteis pedicello longionbus, flonbus nutantibus, stigaate crasso capitato. ;\$ in Mexici diUone Oaxacanâ junto floi. legit cl. Andneux ' Arbutus Xalapedsis Andi ' pi exs n. 26j. Hook. ic. pi. 1. t 27. non H. B. K. Differt à spec Humb. ramulis hispidis nee glabns, foliis 5-liu. nee pollicem latis niargine levolutis, lacemis solitains nee fasciculatis, peliohs 2 lin. nee senii-pollic longis, ovarii loculis i-nec oo-speimis Bacca diupacea extùs venucu-losa magn. granis Pipen, nucleo 5-locul. 5-spermo (v. s. ex coll. Andr)
9. A. MUCRONIFERA , erecta, ramulis tenmssime velutmo-pubescentibus mov glabns, foliis linean-oblongis utnnque attenuate, planis apice aiistato-mucronatis integerrimis suprà glabns subtus in nervis et nervulis tenuiter velutino-feirugineis, iamis in paniculam la'e lamosam puberulam productis ^ in Mexici Cordillera de Gnachilaqua legit el. Beilandier (pi. exs. n. 11S8 ') Af/inis A Oaxacanje, sed folia plana mucronato-aiistata. etc. Flores non vidi, sed frnctus priori similhmus. Folia 2 £ poll, longa, 5 lin lata, petiolo 2 lin. lon^{*o}_D glabro (v. s)
10. A. DISCOLOR, electa glabra, foliis petiolatis laneeolatis acuminatis suprà nilidis sublus glaucis margme revolutis et caloso-dentatis, racemis plu rim is glanduloso-puberuhs ad apicem ramorum fasnculatis subpaniculatis, biacteis acuminatis pedicello paulo longioribus 3 in Mexici ditione Toluccanâ legit cl. Andneux' (pi. exs. n. 262) Arbutus discolor Hook. ic. pi. 1 t. 29 Flor. Apnh. "Vulg Garambullo dicitui Folia i pollic longa, 9 hn lata , petiolo semipollc. Frnctus non vidi et ideo genns dubiura, ex habitu hie tantum ad- raissuni. (v. s. ex coll. Andi.!)
11. A TOMEICTOSA (Dougl wss. Lindl ' bot reg t. 1791), fruticosa erecta, ramulis fohisqne jnnioribus ferrngineo-tomentosis demum suprà, tandem utrinque gldbns, foliis petiolatis ovatis acutis lnlegeriimis aut serratis coriaceis, racemis compositis bievibns terrainalibus congestis folio brevioribus. £ m Americae bor ocul ad flum Columbia (Menz) in rupestnbus California; (Douel). in Mexico ençà "Villalpando obi dicilnr Madrono (Mendez') ad "Vera-Cru* (Lindl.) Aibutus tomentosa Pursh fl. boi am 1 p. 282. Hook, fl bor am' 2 p 30. f. i3o. bot. Beech r p i44 bot mag t 2J20 Aib Madrono Humb. 11. hisp. 1 p. 454 ex H. B. K. no\gen 3. p 282 in nota Trutex vanat ramis setis glandulosis patuhs hispidis et nudis, junioxibus veluiuis demum glabiis, foliis ovatis snbcoidatis aul ovalibns, integrriims ant serralis glubns, aut feilugineo-tomentosis I<rnc. ign An ideo certe Arctostaphylu, spec.⁰ (v. s) /S? arguta, ramulis petiolisque longe et patentim hispido-setosis, foliis ovatis acummatis argute sen at is subtus in neivo setosls, exteruin subve-

luting sapid gltbris £) in Me|ico circa Villdpando Mixtam habui cum prioie à cl. Mendez sed sine flor et fruct An spec propwa? √ s sine fl etfr.)

- 12 A. CORDIFOLIA (Lindl bot reg n 1791 in not), ramis tomentosis, foliis oblongis obtusis subcordatis ~~guttm~~ tomentosis snpra mtidis, racenns bievibus compositis, bracteis inferioribns foliaceii oblongis couaceit. lacenu longitudine £m ora'occid. Americae borealis legit cl. Menzies Fiuct ign
- 13 A. GRAUCA (Lindl. bot leg. 11. 1791 mnnotaj, glabri glauca, foliis ovato-oblongis acutis couaceis basi obtusis&imis, racemis bievibus compositis, bracteis mfeiionbns squamaeformibus, fuietu ovato./) in California legit cl Douglas.

III PERNETTYA Gaudich voy Freyc bot p 454. r 67 G Don nat syst. 3 p. 836.—Pernettia Gaud, ann sc, nat. 5 p 102 non Scop. — Aibuti sp. JVilld — Andromedae sp Lam.

Calyx 5-partitus persistens. Corolla globosa aut ovata, ore 5-dentato icvoluta. Slam. 10 à corollâ hbera, inclusa, filam. suprà basin sub-incrassatis , a nth ens bilobis , locuhs apice apertis bianstalis. Ovanuni depresso-globosum glandulis 10 subtrilobis hypogyms basi cinctum. Siylus bievis. Stigma convexum subquinquelobum. Bacca calyce suffulta 5-locul. loculis polyspermis. Semina miouta oblongo-ovata. — Fruticuh Amencam ramosissimi, glabu aut in ramulis setObi, erecti aut procumbentes Folia parva appioximata peisistentia alterna ovata integra aut dentata. Floies axillares plerumque solitarn pedicellati nutantes albi. Pedunculi bracteolati —Habitus feie Gaultheuae, sed fructus in Pernettyâ est vera bacca et in Gaulthenâ capsula calyce cainoso cmcla.

- i. P. EMPEIRFOLIA (Gaudich ' ann sc nat. 5 p. 102. voy Freyc bot p 454. t 67) (1), rainosissima cespitoso-diffusa glabia, foliis subdistichis oblongis 111-tegeirimis vix acutis , floubus a villa rib as solitauis cernuis, pedicel lo folmlongiore plnnbracteolato erecto ^ in msu's Maclovianis seu Kalklandiam<>. Flores albi Fiuct globoso depresMii. Arbutus empetnfolia Linn f. snppF 239 Pers. encb 1 p 483 Andiomeda empetnfolia Willd sp, 5, p. 619 Lam diet 1. p 155 Rroyere a feuilles pomtues Pern, voy 2 p. 64 (v. b. couim. a cl. diTrville.)
- a P. POMILA (Hook. IC. pi 1. t 9), hamilis, cauhbas piocumbentibus, foliis ovalis obtusis supra convexis subtus carm itis maigimbus subtilissimo cartilagineo-crennlatis, ptdicellis azillanbas fujia mallo sapeiantibus basi bracteolatis erectis apice incarvis 1 flons. ^ in AmencTe mend, ten à del Fuego, et in Patagonia Arbutus pumila Linn t stippl. 2J9 Foist, comm. Ooelt. 9 p. 32 Willd. sp pi 2 p 619. (v. s. in h Deless)
3. P. LEDOCARPA , cespitosa snbiadicans ramosa glabra, folus ovali-oblongu coriaceis i-nerviis integeruniis, pedicellis axillanbns soli tars i-flons vix folii longitudine basi biacteolatis, cal lobis bracteisque obtnsis. ^ IQ Chili aust. iupe&tnbus fugidissimis miei muscos in lateie auslrah niontis ignivomi Antucen&ist ad 8500 ped ah. februano flor legit Poeppig Aibutus lencocarpa Poepp. ctKuuze coll 3 n. 121. Motes non \idisedad Pernettyamieduco ob calycem 5-partitum linmndtuiu baccam globosam basi stipantem. Pioxime ad P* empet rifoham accedit (v.s)
- ^{4.} p. Gayana, majoi non udicans, foliis aliis oblongis aliis obovatis subtus paulo magis venosis. 3 in altis Chilensibus Coidillens legit, cl. Claud

(1) Imconc Oaudich flores debneati sunt pedicellati et fructus sessilei ' An error pictoris ' Au flores sessiles fructifen, et pedicellati 5tenles?

- Gay. Bacca etiam exucco \id. alba? Flores ign. An foitc species propria?
(v. s com in. à cl. mv.)
- 4 P. SERPYLLIFOLIA , ramulis setoso-bispidis, folu's ovatis acantis parcè serratis, pedicellis axillaibus brevibus lecuvis i-flons. £ ^{3^} fretum Magellameura. 'Commers '). Aibutus inicrophylla Forst.! comm. Goett. 9. p. 3_a. Willd. sp. a. p 619. Arbalus sei pyllifolia Lam diet. 1. p 228. (v. s)
- 5 P. MICROPHYLLA (Gaudich et Don 11. cc.), iam oj>issima humifusa glabra, foliis ovatis acutisohtuse senatis subtus ferrugmeis et \emjlosis, pedicellis axillari- bus i-floris folio brevionbns basi bisquamatis. £ ^m America australiori legit cl. Nee. Andiomeda prostiata Cav. ic 6. p. 43. t. 56a f a. Pernettya Cava- mlesiana G. Don gen syst. 3 p. 837. Andromeda myrbinites Lam. diet. 1. p. n5 ill t. 365* f 2? etideo Peinettya myrsinites Don 1. c ? sed canlis videtur electus et foisan divers a species' (v. s. in b. Delesseit.)
- G. P. MUCRONATA (Gandich ann. sc nat 5. p. 102), erecta ramosa glabra, foliis ovatis senatis niucronato-acuminatis, pedicellis bracteolatis i-flons erecto-in- CQIVJS, flonbus nutantibus. 5 ad fretum Magellanicum, teiram del Fnego et cap Horn (Commers'). G Dou gen. t>yst. 3 p 836. Aibutus mncronata Linn. f. suppl. aSg. Forst comm. Goett 9. p 3i Grah. bot. mag. t 300,3. Lam. ill. 1.366 f 7. Lindl bot. reg t. 1675. Lodd. bot. cab. t. 1848. Suffrutex a-3-pe- dalis. Folia 6-ia lm. longa. Pedicelli mine fohō breviores, nnnc longiores. (v. s. ex. coll Pccpp. n. 777 et in b Deless)
7. P. ni.osA (G Don 11 cc), cauhbus proenmbentibus pilosis , foliis ovato-elhp- tics ciiiato-seiratib coriaceis apice muticih callosis, pedicellis axillaibus i-flo- IJS pilosibsculis folio bievionbas apice incurvis, floialibus ovato-arceolatis nutantibus. ^m Mexmo. Aibntas pilosa Giab. in new Edmb, pbil. joarn. 183a. jun bot. mag t. 6177. Floies alhi. Antherae 4-aiistatae. Glandulae 10 sub o\aiio. Folia 91m. longa, 4i lata. Pili cauhni ferruginei.
8. P. PHILLYREEFOLIA, erecta ramosa, ramulis sparse betosis, foliis lanreolatis mncionato-acuminatis remote senate glabiis i-nerviU, pedicellis axillaribas &olitaiis x-flon& folio dimidio brevionbus glabuj> biacteolas 5-6 paivas in parte infenoii geentibns. £ in Amcuca meiil veiisiin in Peiuvid legit cl. Doin- bey. Arbutus phillyreaefolia Pers. enh. 1 p IT n. 1 r Toha 9-12 hn longa, i lin. lata Coi. ovato-urceolata. Calycis lobi acutiu&culi. Anth. 4-anstatae. (v. s comm a BUS. leg. Pai)
- g. P. PDRPUR>A(D. Don iff heib. Lamb exG. Don syst. 3 p 8^7), ftmnlis setosis, foliis lanceolatis aculis den-ticulalis glabiis sublus veuosis, pediceUis sctbris glandnlobis. ^m in Peruvia. Cor ovatae forte puipureaa. Caet. ign.
- 10 P. diiXARii (D. Don in beib. J'añb exG. Don gen. syst. i p 837), raitmlis setosis , folns ovato-lanceolatis acutu, margine defticulatis et squamuloso-cilia- tia, pedmculis glandulosib 5 in Mexico. Gaet. ign
- 11 P. PENTLA5DII> laraosissima erecta glabra , ramulis angulatis , foliis oblon- go-lanceolatis acutis (nee mncronatis) remote seuato-dentatis uninerviis subtùs venosis, pedicellis axillanbus i-tloris fohō diiidid brevionbus glabris*basi 4-5-bracteolatis subiecuvis. J in Boliviā, vei&im ad montes excelsiores, legit cl. Pentland. Affmis P. phillyreacfohae sed certe distincta. Ramuli omnes setis destituti, roagis con^est. Folia 6-7 lin. longa, 1 hn. lata. Cor. ovato-urceolalre. Cal. lobi acuti. Anth. 4-austatae. (v. s. comm. à cl. invent)
- ia. P. ELLIPTICA, ramosissiuua, ramuhs glabrinseuhs snbangalatis, foliis ellip- tics utrinque obtusi&culis coriaceis dentalatis suprà lxvibus sabtiis penñl- nerviis relicnlatis lucidis, pedicellis axillaribus r-flons folio dimidio breviori- bns minutè pabescenbns basi plunbracteolatis. j in Amer. mend, verisim. in Peruvia legit cl. Dombe. Folia 6 lin. longa, 3 lin. lata. Cor. ign. et ideo genus snbdobiam. Bacca globosa calyce 5-paitito basi cinctf. (v. s. comm. a mus. ieg. Par.)
- «3. P. RIGIDA, erecta lamosissima glabra, ramulis subaugulatis, fohis ovatis* caloso-submucionato-dentatis coriaceis suprà subnitidis subtùs \enoso-reticu-

latis confertis subimbricatis, pedicellis in axillis superioribus solitariis nuflotis folio snbseqaalibns incurvis basi bracteolatis. 5 ^Q insulsi Juan Fernandez (Bert. Gay!). *Arbutus rigida* Colla! act. acad. Tur. 38. p. 120. n. 83. t. 36. Fru-
tex rigidus, ramis apice subcoryinbosis. Peioli breves glaucescentes. Folia
9 lin. longa, 5 lin. lata. Gal. lobi acumiaati dimidiā corolla? longitudinem
ferè superautia. Antb. breviter 4-arisUtae. (v. s. à cl. Gay.)

- 14- P. HACEMULOSA, erecta ratnosa glabra, foliis ovatis calloM>-mncronatis den-
tal is supra laevibus snbtus venoso-reticulatis, pcdanculis lateralibas ex pane
ramoruin iuferiorc ortis ramosis multibracteolalis. \$ in insula Juan Fernandez legil cl. Larrain qui ad Berterium misit. Similjua P. rigidā* sed folia re-
uotiora, pedanculi ramosi. Calyces ut in P. rigidā acumiinati corollae dimidiā
longit. ferè saperantes, antb. breviter 4-aristatse. (v. s. cf mm. ab amic. Ber-
tero.)

Trib. IT. *ANDROMEDEJE*. — *Andromedearum gen. G. Don,*
Lindl.

Fructus capsularis loculicido - dehiscens vaivis nemp& septiferis.
Cor. decidua. — Frutices sempervirentes aut dfcciduifolii. Gemmae
ferè semper squamosa?.

IV. CLÉTHRA *Gaertn. fruct.* 1. p. 3oi. t. 63. *G. Don gen. syst.* 3. p. 841. *Lam.*
ill. t. 309. — Clethraet Tinns *Linn. gen. n.* 553 et5o|. — Volkamerj^{1/}*. Browne
non Linn. — Cuellaria *R. et Paw. syst.* xo3. — Junia *Adans. fam.* 1. p. 165.

Calyx 5-partitus. Cor. profund& 5-parlita ter[^] 5-pelala, lohis oh-
ovato-oblongis. Stam. 10 filamcntis subulatis. Anth. posticae demum
inflexo-pendula? et obversae basi cordata? apice mucronalje mutica?,
loculis poro basi dehiscentibus demum inversis, poro pscudo-termi-
nali. Stylus rectus. S.tigma trifidum. Capsula calycc c'ncla 3-locul.
3-valvis loculicido-dehiscens. Semina > ovata.—Frutices aut arbores,
omnes(excl. Cl. arboreâ) Americani. Folia alterna breviter petiolata
ovalia autoblonga, integra aut dentata. Racemi terminates simpliccs
aut paniculati, solitarii aut fasciculati bracteatlt Flores albi.

Sect. I. EUCLÉTHRÁ.

Genitalia ezserta. Folia decidua. — Species boreali-Arnericanæ.

1. C. ALNIFOLIA (Liun. sp./,565), foliis enneato-tfbovatis acutis serratis ntrinqiic
glabris et concoloribus, Acemo simplici spicifonni, bracreis emn raohi et ra-
lyce linear-sabulatis pubescenli-velntinis. 5 ⁱⁿ paludosis et sylvis bumidis
Amer. borealis à Canadâ ad Georgiau. Lam. ill. t. 369. Dubam. arb. ed. i.
v.^i. t. 71. ed. 2. v. 5. p. 139. Guimp. abb. holz. t. 76. Loud, arbor. 1128.
f. 927. C. alnifolia et denlata Ait. kew. 2. p. 73. — Cat. car. 1. t. 6(5. Stain,
stylo breviora, petalis aequalia. Ncivi medii fol. subtus pubescentes. (v. v. r.
et s. sp.)
- a. C. TOMKNTOSA (Lam. diet. 2. p. 46), foliis enneato-ovovatis acatis serratis
subtus pnbe stellatâ albo-toraentosis, racemis spicatis simplicibus, bracteis
linear-subulatis racbi calycibusque villoso-toraentOii. ^ in paludosis et buini-
dis Virginian et Carolinx. Wats, dendr. brit. t. 3Q. Gu'imp. abb. bolz. t. 77.
Load. arb. 1128. f. 928. C. alnifolia var. toraeutosa JMicbx.! il- 1. P- 260. Cl.
alnifolia Walt. car. i36. Cl. incana Pers. enh. r. p. 483. C. alnifolia £ pubes-
cens Ait. kew. .2. p. 73. C. pbescens Willd. enura. ^55. C. glauca hortul.
Stam. coroll-i longiora, vix stylo breviora. (v. v. c. et s. sp.)
3. C. SCAIRRA (Pers. encb. 1. p. 482 non Lois.), foliis cimeato-ovovatis acatis utrin-
quèsabris grossèserraiis, serraturis uncinatis, racemis spicatis subpaniculatis

- lennitrr tomentosos bi.icleali:, *fi* in Ceogia` opulent FU sketcU 1 p 5o3. Puish fl. 1. p 3o2.
4. C PANICULATE (Ait kew 2. p. 73), foliis cunctato-1/incoleolatis dcutis serratis ntiinqueglabiis, pamoiH teiminali ractinifloia albo-tomentosa *fylo*. Carolina. Willd sp 1. p U20 til. bketch 1 p. 5o3. Pursh fl. 1. p. 20a. Folia angusta ~~MM~~ *ratus acuminatis*.
5. C ACUMINATA (Michx.' fl bor. am 1. p. 260), foliis ovalibns acmininatis crebie senatis utiinque glabns snbtus suhgaucis, racemis spicatis j>ubsolitanis albo-tomento*»is, biacteis floies supciantibus, stain, filamentis pilosis. *fy* in. inontibus altis Carolina:. Pnish fl 1. p 3os. Ell sketch r. p 3o3. Bart fl/bor. am. ill. 3 t. 71 *P. moniana* Baitr cat Tras ' in Lhei. heib. Lois » Duham. ed. nov. 5. p. 160 excl. habit Aibuiculj. Bracteae iu plantis cukis uiox decidae (v. s. sp.)

Sect. 11. GUELLARIA.— Cuillariu R. et Pav. s/ft. p. 10^ prod. t. to.

Gemtalia inclasa.— Folia perennantia —Species. America oalidioois et nnica Maderae indigonac.

6. C. VIBORKA (Ait kew. 2. p 73), folus oblongo-lanceolatis ntrinqne aCtiui-natis apice saltern sen alls glabns , racemis h̄usutis in paniculara tcrmrñalem dispositib , calycis coiollxqii lobis obtusissinns integiis, genital, per anthesin inclusis, stylo dcmum subciso. ^ 5 ^Q sylvis Maderae (Ait. Lowe') Sims Lot. mag t 1057 Vent, hort malm t. fO. Schneev. icou. t 92. rx Salisb Lois, in Duh a in. ed nov 5. p i3i t. 48. Lond arb. 1129 f 930. Tariit ramis glabiis aat cum lacemorum rachichbus husutis, foliis Mibtūs pptiolisque {glabiis ant secus nervos petiolisqae husntU M01. odoi. (v. v c ets sp)
7. C. TINIOLIA (Swart/ prod 74.fl ind occ. 845), folus oblongo-lanceolatis seu ovahbus mtegermis snbtus velntino-m«anis , i<minlis petiolis nervisque subtus fenugineis» racemis conjesto-subpaniculatis tomentosis, coi. lobn apice ciliatis intgris, genitahbs inclas. *fy* ,5 in montibns aliioulas Jamaica; austiahb (Sw ' Kert ') et in Rramlia cuca Rio-Janeiro (MartJ) Tinu» occidentalis Linn, sp 53o. Yolkamena P Btownejam. QI4- t. 21. f 1 —Sloan, jam. 3. p. 86. t 198. f 2 e&c1 descr. (v. s)
8. C FAGIFOLIA (H. B. et Kunth n%v. gen. am 3 p. 289), foliis obovatis ar-gate et remote ilentatis couaceis glabus, petiolis ramnlisque fcirngineo-to-mentosis, racemis fasciculatis (8-1 a) tenuissiinc fuscescenti-tomentosis, bractcis pedicello tiiplo bievoribus, genilalibus mcliisis ^in sylvis prope Bonavista mtei Caracas et la Vjctoua Atfmii, ^. tinifoHae.
9. C. DICOLOR (H. B. et Knnfh nov. gen am. 3. p. 280), foliis oblongis giosse nndulato-cicinalis coriaceis supiā glabiis sublus albido-tomentosis, pdiohs lamuhsqne fasescenti-tomentos.is , lacerais 5-6 fasciculatin ferrugineo-touientosis, bracteis parvis, staminibus mdn&is. 5? jnxta Santa-Tc de Bogota.
10. C. ANGUSTIFOLIA, foliis oblongo-lanceolatis basi attenuatis apfce acuminatis smiiato-subserratis glabns, ramulis petiolis neivoque pagmae jnfer folii medio pilosiuscnhs, lacemis elongatis lachi petlicellis calycibas?ue dense albo-hirsutis, cor. lobis intcgus, genitalibns inclnsis. f\$ in Chili Folia i poll longa , policein lata, petiolo.5-linean. Calycis lobi acutiasculi. (v. s. ex hoit. Kew. anno i83o 4 fili, coll.)
11. C. FERRUGIMEA (R. et Pav fl pei. 4 t 38o f 6. ex G.Don gen. syst. 3. p. 8Ja), foliis oblongis mtegeiumis acuminatij, basi leviter excavdtlj, ramis lace-misqne feirngmeo-villosis, 1 ace in is bimpticibns fascicdlatib, coi. lob<s integiis, gttntialibus inclusis./>in montibus fiigidib et nemoiOis Peuviae ad Panao, Pill.10 et Chinchoa Cuellaria fenninea R. et Pav.'syst p. io3. Cl. macro-stachya Lois, in Dahani. arb. ed. nov. 5. p. i55? (v. &. ILL h. Delej»seit et mns. Par.)
12. C OBOVAIA(R et Pav.fl pei*4-p 38i ex G Don gen syst. 3 p. 84*), folus obovati* lugob&ib denticulatis ramahsque tomentosis, racemis longis fascicnlatis,

- COI lobis integria, genitahbus inclitis 5 in Peru vise nemoribus click Cacbeio victim Cuellaru obovata R. et P 2^{ysl} io3. Arbor excelsa. Lignum duris&imum ad tiabes et utensils a inseivit.
13. C. REVOLITA (R et Pav. fl. per 4 t 380 f a ex G. Don gen syst 3 p. 842), folns oblongis denticalulis basi revolutjs excavatis ra mulis raiemisque tomentosis, lacemis simplicibus fasciculatis, coi lobis integris, gemitibus inclusis /> in Peuvise nemoribns versus Pilao vicum. Cueliana levoluta R. et Pav. s}st. p. io3.
- 14 C NERVOSA (Lois in Duham. aib. ed. uov. 5. p. i33), foliis ovato-oblongis subsessibus dentalatis subtus neivosissimis tonentobisque, laruulis feuu-gmeo-birsutis, raceniis pubestentibus abbreviate spiciformibus in pamculam terminalem dispositis. i>m Amer. merid venslm. Peruvia legit Doinbey. (v s. m h. mas. teg Par.)
- 15 C DIVARICATA (Lois, in Dnbam. arb ed nov 5. p i34), foliis ovatis in-tegei 1 lmis subtus tomentosis, racemis spiciformibus villosis biebribut. divaricatis termmalibus pamculatiin dispo&itis. ^> in Amer. meiid. veri&im Petuvia legit Dombey' (v. s in b mus leg Pai)
16. f. MEXICANS, folius elliptico-oblongis mtegerrimis suprà glabns subtus ineano-velutinis, ramulis petiolis nervis paginx infer, racibusque fenugineo-velutinis, racemis plurimis (4-5) fasciculatis spicifoimibus, flonbus nntanibus, calycibus coiollam subsequantibus, coi. lobis apice subdeuticulatis, geomt inclusis & in Mexico. Cl. integufoha et Cl. ovalifolia Moc fl¹ mex JC. ined. Variat folns obtusts aut subacutis, basi subattenuatis aut obtusiuscuhs. Cor. alba in sicco extus caesia (v s. comm. a' cl. Alan^an et Mai ret)
- 17 C. BRASILIENSIS (Cham, et Scblecht. in linn a? a 8 p. 5io), foliis obovatis d>> tu&is subietuMb submtegeinmis ben acilionbus jnjice benato-dentatis, a pice dentibusq; mucronatis, basi <btus acutiusve cuneatis, supra calvescentibus subtus tomentosib, lacemis pamculatis tomentosis, corollae lobis fimbriatis, gemtahbus inclusis. ^) in Biasikae aequumociialis variis locis. Folia polymorpha Kacemi 5-i5 fysiculati subden^ifloii ebracteati¹ An hue reducenda Cl scabia Lois, in Dubain. arb. ed. nov. 5. p i3a non Peis (v. s a cl Lund lect. ad Ipanema.) *
18. L FIMBRIATA (H. B et Runth nov. gen^ am. 3 p 290. t. 264), fcliiselliptico-oblongis mtegerrimis coiaceis supia laicuhsque giabris subtus petiolisque cano tomentosis, lacemis 5-7 fasciculato-congestis feirugineo-tomentoii* siibsecundiflorib, coiollis hmbiatis, gemtahbus snbinclusib. 5' circa Santa-1 o de Bogota

•j- *Species exclusa.*

(J MOILIS Bert herb zrMacraea paivifolia.

V ELLIOTTIA Muhlenb. m Ell sketch 1 p. 448. Nutt gen. am. in add

Calyx parVbs 4-lobus, lobis latis vix subacutis. Cor. profund^ 4-partita, lobis oblongo-hnearibus vix basi coha3rentibus. Stam. 8 corollâ duplo biebiora, filam. à corolla discretis complanatis (ex Ell.) glandulosis, anth. sagittatis bilocularibus apice callosis longiludmaliter? dehisceutibus. Stylus fiiformis corollâ paulò longior. Stigma ovato-capitatum indivisum<Fiuct. junioi obtuse 4-lobus , mat. ign.— Frutcx ramis Yugatis glabiis. Folia allerna petiolala elliptico-lanceolaU utnnquè acuminata integeriina supia glabra subtis glaucescentia et seciis neivospubescentia. Udcemi rainos termmantes ferè paniculati, iMimili? Demp^ trihdis 3-floris. Biactea nulla3. Flores albi. — Ex fliictu iguoto locus in 01 dine subdubius% Ex autoptis videtur Clethiae •till u is

1. E. RACUBIOSA (Mnhl. I.e.)/} Jin Georgia circa Wayneabouagli el Ooonee.
(v. s. comm. à cl. Elliott.)

"VL DIPLYCOSIA Blume bij<*. 857.—Diplycosia G. Dan gen. syst. 3.p. 838.

Calyx 5-fidus calyculo è bracteolis 2 concretis composito cinctus. Cor. campanulata limbo 5-fido reflexo. Stam. 10, disco calycino iuscrLa, inclusa. Antherae apice bifidae lobis indivisis. Stylus erectus apice iruncatus. Capsula subglobosa deppressa calyce baccalo inclusa 5-locul. irregulariter dchiscens. Sem. 00 cuneata compressa. — Frutices Javani (pseudo?) parasitici. Folia sparsa coriacea intcgerrima. Flores solitnrii fasciculative axillares. Cor. ^pallide vircscentes. — -Genus diff'ert à Gnultheriâ et Zenobiâ antheraruni loculis non biaristatis, à caeteris Andromedcis calyce baccato, ab omuibus dekiscentiuc caps, irregulari.

1. D. FILOSA (Blora. I. c.) foliis ovalo-lanceolalis aenminatis suprà strigosis infra ramulisqne julosis, pedanculis solitaViis gemiui.sve. ^ in sylvis niontis Salak ins. Java).
 - a. D. LATIFOLIA (Blum. 1. c.), foliis ovalibus ntvinqnè acutiusculis raargine reenrvis glabris, pedancolis fascicalatis. 3 in sylvis montaaia Javra suprà arbores.
 3. D. BETEROPHILLA (Blaru. 1. c.), foliis oblooiigs lanceolatisve nlrinque acuminate itubaveniis glabris iufrà punctatis, pedonculis fasciculatis.^iu sylvis altioribus Java; occidental.
0. foliis cuneato-oblongis acatiusculis vel obtasis.

VILEPIGJEASivartzJl. ind. occ. 841. Lam. ill e, 367. G. Don gen. syst. 3.p. 841.

Calyx profundè 5-partitus coloratus, lobis acuminatis exliis tribracteatus. Cor. 5-fida hypocrateiformis. Stam. 10 filam. hispidulis subuatis tubo vix brevioribus, anheris ovatis apice bifidis (Sw.), loculis longitudinaliter dehiscentibus. Capsula subglobosa deppressa 5-locul. calyce persistente cincta. Sem.... — SufTrutices Americani sempervirentes, pilis nigricantibus hinc hidè iustucti. Folia petiolata cordata. Flores in raceruura brevera terrinalem dispositi, bracteali, albi aut sanguinei.

Sect. I. EUPIGJE. — Epiga3a Linn. gen. n. 240. — Memccylum Mitch, gen. 13 non Linn*, •

Corolla hypocrateiformis, tubo intùs birsato, lobis patenibus subrotundis.

1. E. REPENs(Linn. sp. 565), caale decambente repente, foliis obtusis integerim is. A in Amer. bor. a Canada ad Carolinara in rupibus urabrosis ad latera collium et radices Pinornm. Lam. ill. t. 367. f. 1. Andr. bot. rep. t. roa. Lodd. bot. cab. t. 160. Torr. 11. p. 428. Lois. berb. amat. t. a39— Pluk. aim. 1.107. f. 1. Cor. albae roseo tiactae. Petioli 6' lin. longi. (v. s.)

0. mbicunda (D.Don in brit. fl. gard. ser. 2. t. 384), floribosrubris paulo majoribus.

Sect. 11. DRossEA. — Brossaea Plum, gen. p. 5. t. 17. ic. ed. Burnt.
64• f^m *• Linn. gen. n. 1228. Lam. ill. t. 111. f% 3, •

Cor. ovato-oblonga, limbo erecto 5-fido acuto. (1)

(1) Ex Plum, et vñsim. ex Rich. Calyx deiuvum carnosns capsulam ut in Caultheria fovet, sed Swartz dixit tantum calycom perwstcentem et in specim. meo jsm defWato, sed nondum maturo, calyx immutatns remanet. An tamon ex VonnA coroUai Mrossauae genas retiuendum ?

3. f. coRDIFonA (Swartz fl. ind. occ. 2. p. 8/Ja) caule erecto basi radicante, foliis serratis arotis. /Jin suiumitate montium Guadalupae (Sw. Beit!.), Trinilatis(Sieb.! n. 3/46), Cayenne sea Guianae Gallicae (Lebloud!), Sancti-Domingi (Hani.). Gaullberia spbagnicola Rich! act. soc. n. D. Par. 179a. p. 109. Bross&a coccinea Linn. sp. 1661. Gaultberia cordifolia Raeuscb. nora. non H. B. K. Corolla; sanguines (Sw.). Calycis partitiones lanceolatae apice subulatae non videntur ulloinodo carnoos. Petiole vix ultrà liieam longi. (v. s.)

"VIII. GAULTHERIA Kalm in Linn.gen. n. 55i. Gcertn. fruct. i.p. 63. Lam. ill. t. 367. G. Dongen. sjst. 3.^839.—Gaultberia Scop. intr. n. 843. R. Brown prod. 559. llwnb. Honpl. et Kunth nov. gen. am. 3. p. 2H2.

Calyx 5-lobus demum anipHitus plus minus baccatus et capsulam umbiens aut ibveus. Cor. ovata ore saepè conjuncta 5-dentala. Stam. 10 inclusa, filain. sexpè villosis, antheris 4-ai'istatis ncmpè apicc bifidis, ioculis biaristatis rarissime muticis. Stylus fili&rmis. Sligma obtusum. Squamae hypogyna 3 10 distinete aut concretac. Capsula depresso-giobosa 5-loc. 5-sulc. 5-valvis, valvis septiferis loculicido-dehiscentibus. Placenta? axi adnatae. Semina 00 parva testa subAiculalji. — Frutices aut rariis Arbusculae, ex Americâ rariis ex Indiâ orti. Folia alterna sempervirentia denlata aut integerrima. PedicelH mine axillares i-flori nunc in racemum terminalcm dispositi, bibracteolati. Cor. albo rosea> aut coccineae.

1

Pedicellis axillaribus i-floris solitariis bibracteolatis, bracteolis immediate sublore sitis.

1. G. PROCUMBEZIS (Linn. sp. 565), glabra, caule subprocumbente subradicante, rauis adsceudentibns basi nudis, foliis obovatis utrinqac acutis, serratnris setaceis, pedicellis ex axillis supremis ortis incurvis 1-2-floris vix petiolo longioribus sub calyce bibracteatis, iloribus natautibns, calyce baccato capsulain demum indudente|^ in Aucriex sylvis montanis et arenosis à Canadâ ad 'Virginiam, in Terrf-NovA(Lapl.!). Andr,b"ot. rep. t. 116. Dubam.arb. r. t. xi3. Lodd. bot. cab. t. 82. Lara. ill. t. S67. Big.! med. bot. 2. p. 27. f. 12. Sims bor. mag. t. 1966. Gaultberia humilis Salisb. prod. 23g. Tota aromatica. Stam. filam. pilosa. Antb. 4-aristata3. Fofia Tbeac snecedanea undé Mountain-Tea. Fractus ex calyce baccato rubro ednles sub nom. *Partridge-berry*, *Boxberry*, etc, (v. v. c. et s. sp.)
1. G. MYRSINITES (Hook.! fl. bor. om. 2. p. 35. t. 129), bumilis glabra, ramis caespitosis ramificantibus, foliis latè ovatis ciliato-serratis, floribus axillaribus solitariis pluribractealis, corollâ vix calyce longiore, antberis muticis, filamentis glabris, disco hypogyno nullo. 5 in America! bor; iuontibus scopulosis (Rocky-mountains). Habitus omnino G. procumbentis. Calyx fruct. carnosas ruber at in Gaultheria sed antherae muticae! An ideò à genere <3xcludenda? (v. s. in h. Delessert sine flor. à cl. Hooker miss.)
3. G. NUMMULARY, caulibus filiformibus procumbentibus valde setosis, foliis subsessilibns subovatis integerrimis basi cordatis apice mucronulatis, supra nudis subtus marginibusque bispidè pilosis, pedicellis axillai'bns brevissimis solitariis bracteolatis. 3 in montibus Nepaliae ad Gossain-tban et Knawur (Wall.), prppè Bababat in Jumma (Royle% G. nmmuliioidesD. Don prod, fl. nap. kSo. Royle ill. p. 2G0. t. 63. ff. a. Flores albi. Capsula globoso-depressa calyce carnosae caeruleo omnino cincta. All. 4aristatax.
4. G. TRICHOJPHYLLA (Royle. ill. p. a6o t. 63. f. 3), cajspitosa, rainis tenuibus procumbentibus apice prxsertim selosis, foliis parvis coriaceis ovatis acutis brevirerpetiolatis raarginibus minute serrulatis ciliatisque, floribus axillaribus solitariis nutantibus sub calyce bibracteatis. 3 in frigidis et excelsis montibus In(jia3 occid.-bor. ad Jummotri, Choor el Caajpuecre.

- 5 G. REPENS (Blum bijdr. 8⁷), caule repente foliisqne (minmis) infrà pilo-siuscuhs ovatis a cut is serrulatis cona&is, pedicelhs axilla libus i-floris, *Ly* m cacumiae montis Gede ins. Javae. Caet. ign.
6. G. FRAGRANTISSIMA (Wall.¹ asiat. res. i3. p. 207 icon list. n. 765), glabia eiecU, lamalis subtnquetiis, folii elliptico-oblongis atrinque acutis dentatis cornceis, racemis axillaribus sohtariis lectis pubemhs foho diradio bievionbus, bracteis concavis acntis, 1 sub calyce, 1 sub pedicello. 5 in JNnpaulIII ad Nariain-hetty (Wall.¹) Spreng. nea. eutd 2. p s58 G fragi.ins D. Don fl nep i5i. Aibutus lauufolia Ham mss. Folia 2 £-3 poll, longa, ia-i5 ha. latd, subtns feiruginea Cor ovatac roseae fragrantissimae glabrac (v. 5. comm à cl 'WaUih i8ar et abhon coet. mere angf. Ind or)
7. G. LESCHENAU/TII, glabra, ramahs snbtrigonis, foliis petiolatis ovahbas aut obovatis glandule termmatiis crenulatis snbtus punctatis, racerais axillaribas aut lateialibns pubescentibA folio paulò brevionbus electis, bracteis concavis acutis glabris, 1 sub pedicéuo, 2'a iloie paium rcmotis 5^m roomibns Nelli-geny seu Neelgbeiry Ind or. legit cl. Leschbenault Affinis C fragrantissitnae et *ub hoc nomiue^b inv admissa, unde vefisim florcs flagrant, sed diffeit foliis latioribui obtusis apice glandul&is subtus pnuetatis, lacemis duplo longionbus i5-20-flons,^etc\ (v. s. ab araic. inv)
8. G. ruNCTAiA (Blum bijdr. 856), ramis foliisque glabris lanceolatis glandul.l teimmatis senatis infia punctatis, raceinis pamculatis terminalibus, calycibus ciliatis. f) in cucamine montis Gede volgatissima.
9. G. LEUCOCARPA (Blum bijdr. 856), ramis foliisque glabris ovaio-oblongis longitei acurainatis obtuse senatis, racemis axillanbus terminahbusque nautibus, calycibus ciliolatis.^in sylvis altionbus ins. Javse. Gxt. ign.
- * * *Pedicelhs axillaribus |-floris solilaris bibracteolatis, bracteolis hflore remotis*
10. G. ANASTOMOSANS (H. B et Kunth nov. gen. am. 3 p 285), lamuhs foliis que subtus et imrgiue setoso,pilosis o|atis acutis basi lotundalis obsolete denticulatjs supid uitidis, pedicellis axillaribus recurvis villosis 1-flons infrà medium biacteatis quasi 111 race mum foliaceum dispositis ^ in Novâ Gianatâ prope Santa-Fe de Bogota Andromeda anasmosans Linn. f. suppl 83o "Vent, choix. n et t. 53. An Andromeda glomerata Cav. ic⁶. p. 42? Calyx persistens non \eie baccatus ex Kumh, cainosus et capsulair fovens ex "Vent. Cor. ovatae ex albo loseoe.
11. G. PURPURASCENS(H B et Knntb nov. gen. am. 3. p. 282), ramnlis terribussetoso-biisuiis, foliis breviter petiolatis elhptjco-oblongis ntnnqnc acutis seirulatis setoso-hirsutis subtus pmpurascenibus, pedicellis axillaribus bievissimis i-floris bibracteatis. .^111 IN òva Gianata Canlis fere procambens. Affi is, G anastomosanti.
12. G. wwiMNOIDES (H. B. et K. 1 c), glabra, ramulia subangulatis, foliis breviter petiolatis oblongis acntis basi obtusis apice crenatis supià nitidis, pedicellis axillaiibus folio tiiplo bievionbus sohtanis i-flons, corollis ovato-globosij, glabus. ^>m Novâ Granatâ juxta urbein Almagnei
13. G POEPPIGII, fruticosa glabeinma, foliis obovato-oblongis snbserrnlatiis coriaceis, pedicellis axillanbus ad apices raniorum confertis folio paulò longioribus basi bracteolatis. ^ in ^n i australis alpinis ad Pico de Pilque in Andibns Antncensibns. Arbutus myrtilloidesPoepp.' coll. pi. chil. 3. n 679 Ganlthenamytilloides Kunze¹ in Pcepp. coll n. 120 non Cham ctSchl Folia 6-7 lin. longa, 2-J lin lata,obtusa, minntissime mdcronata Calyx per anthesin snh-membianaceus 5-pariitius. Anth loculi apice biaristati (v s.)
14. G. MYRTILLOIDES (Cham, et Schlecht. in linnoea 1. p. 5³), ramis teietibus setoso hiisnid, foliis bieviter petiolatis latè Unceolatis ciliato-subserrulatis mucronatis subtùs seloso-biisu.is , floribus axillaribus iolitaiis brevissiu# pedicellatis , bracteis ad basin pedicelli ovatis concavis ciliatis, biacteohs hneatrib us, comlU extus glabrà j III BrasiliA tropica

- 15 G. CILIATA (Cham et Schb. in lmnsea 5 p. 126 et 8 p. 5a4), glabra, foliis coriacos subsessilibus lanceolatis acatis aigute seirnlatis, dentibus (jurnoii saltern st.itu) scitigeris, floribus axillanbus solitarhs, pedicellis pubescentibus basi bracteolatib. fr in Mexici monte Orizaba cum Solano tuberoso et ad Chi-conquiaca et Mai pays dc Joy a lolia semi-poll, longa , 2 lin lala. Flores albi. Baccae nigrae .
- 16 G. PIUVIATILIS (A. Cann.! in litt. 1836), erecta ramosissima, rarae teretibus setosis, foliis iineaii-oblongis ulrinqae aruminalis calloso-dentatis glabris paice venoso-reticulatis, pedicellis ex axillis supeioribus ortis subracemosij* multibiacteatis. £ in Nov& Zeelandid ad fluraen Keri-Keu legit cl. Cnnnngham. Folia 6-7 lin. longa, 1 |-i lm. lata. Species a ffin is G. antipodze sedex specim. imperfecto caracteres genericos non rite vidi. (v s à cl inv)
17. G. ANTIPOVA (Forst.' prod, p 196), erecta raino&issuna, laraulis hirsntis et hispidis demum glabratis, foliis vix petiolatis oyahbus coriuceis glabus senato-dentatis atrinque leticnlato-veno&is, floralibus%blongis calloso mucionatis, floribas in axilhs supremi* solitaiis subse&ilibns feie spicatis, biacteis 5 ad basin pedicelli. 5 in ^ova^e Icelandiae sinu Insularuin^Rich. et Less, fl n Zeel. p. 210 t. 28. Ramuli flondi tx axillis et apice ramoiam orti veios lace-mos foliaceos constitnnt. Bractse apicc ciliato-subianatae. Cor. uiceolata. Anth. 4-arbtatae. (v. s. comm à cl A. Cunningham.)
18. G. nULFESTRIS (R Biown prod. 55\$ in adn G. Don gen. syst 3. p. 841), erecta , ramubs venncois teteib,&, foliis bievissime petiolatis elhptico-lanceo-latis senntlatis ntrinqne glabiis, racemis axillanbus teiminalibiiive folio lon-gioribus , racbi pedicellisqne pilobis, biacteis acntis 3 ad bas^n'pedicelli, calyce 5-partito non? cainoso niargme subglanduloso. ^ in Novae Zeelaiidiae australhons lopibus nliginosis saxosi&que Andromeda rupeisliis Torst. prod, n. 195 Rich et Less. fl. n. Zeel p 208. t. 27. Cor uiceolata alba, dentibus 5 revolutis. Anth. 4-arbtatae.
- *** *Floribus racemosis, bractels amphs sicco -membranaceis, bracteolis
in medio aut basipedicelli.*
19. G. VERNALIS (Kunze m Pcepp ' coll. 3. p 119), canlibns teretibns pnbescen-ti-velutinis et betoso-pilosis, foliis bieviter petiolatis ovalibns nttnque sub-aentis conaceii bine indc snbscuulatis glabris subtus subrubiginosii lthculato-venosis bine mde pilos nigros rigidos gerentibus, lacenus axillanbus conferhs folio brevioribus, rachi pubescente, biacteis ovatis ad basin pedirelli, coiolhs glabnnsculis. 5 in rupestribus Chili austr adTalcahuano (Pcepp.'), Etlam sine loci indie video in plantis Dombeyams Arbutus veinalis Pcepp.¹ pi exs. n. 62 r. Folia 2 poll, longa , poll ice m fere lata. Anth. brevisi»iinc bianstatae. fy. &)
10. G. HISPIDA (R. Brown prod. 1. p. 558), erecta, ramis bispidis, foliis bre-vissime petiolatis elongato-lanceolatis seirulatis acuminatii subtus p^tiolisque pilosiusculis, lacemis axillanbus terminallbnsquc folio brevionbns, racni pe-dicelhsque pubescentibus, biacteis acnminatis tribus ad basin pedicejli, caly-cibu9 ultrâ medium 5-fidis demum subbaccatis ovaiisque glabris. , in iusulA 'Van Diemen (Br. Cunn), ad montem Tabularem (Caley' inh. Deless), circa Hobart-town (D'Uiv f) Rich et Less. voy. asti. p. 82. t. 30. lolia ao-ai lin. longa, 3-4 lata, snperneIncida reticulato-areolata. (v s)
- ai. G. SHATLON (Pnrsh fl. boi. am 1. p 284. t 12), ssuberecta, ramis teretibus hispidulis, foliisbrevissime petiolatis snbcoidato-ovatis acntis serratis, serratnns in cilia 'pi odnctis, racemis axill et terminal, secundiflois, bracteis oblongis, pe-dicelhh recurvo-pendulis basi bibracteatis jm Amei bor occidentali (Menz), freque_ns d (^ap# Mondocina ad Puget sound (Dongl in Hook. bor. am. 2 p 36). Hook. bot. mag, t 2843. Lindl bot. regist. t. i4n. Folia snbeonacea persibtemia Cor. alb<e sabioseae exfus viscosa-glandnlosa;. Fnctus (ex calyce bajcato) cainosus rubei edulis. (v s. lect à filio in hort soc Iwrtic Lond.)
22. G. coKimoLiA (H B etK.mov gen. am 3. p. 285. t. ab'i), lamulis glutino-so-hispidis teietibus, foliis petiolatis o\atVactnis cordalit. denticulatis rugo-

sis sn p̄a "lab ns et nitidis subtus piloso-bntis, race mis m apice ramnloraiu axill. et termia , bracleis oblougis glandulosi-ciliatis , corollia glutinoso-pilos. ^ in subfrigidis Andium Novo-Granatensim prope Alma goer et Pensitara. Cor. coccmea. ^

23. G. FERRUGINEA (Cham et Schl ' in linnsea. i. p. 524), ramuhs racbibus rt foliorom pagims inf tomento rufo lanalo-birsulis, foliis hieviter petiolatis coriaceis ovalis acntis supra' adultis glabiis maigine scabris, race mis e sum mis axillis ereclis , bracteis ovato-lanceolatis subscanosis denmm glabus. In Brasiliâ tropicâ legiL cl. Sellow Andromeda birsuta Anab. fl. Hum. 4. t. 99. Folia inteidum basi sncordata, 3 poll, longa, 1 7 poll lata (v. a. conira. à mns. teg Berol)
4. G. ODORATA (Humb voy. 1. p 397 5Q9 H. B et K. nov gen. 3. p. 28*), ram is teicibus glabns, iamulis lachibus pedicellisque glarrauloso pilosis viscidis, foliis breviter petiolatis ovato-oblongis acurainato-cuspidatis levuer CQL-datis argute denticulatis so p̄ a glabiis nitidis snbtus punctato-scabris, racemis in apice ramoram axillaribus et terminalibus, coiollis pilosiusculis. ^ in iuontibus Tamiriquijri Noiae-Andulasiae et Silla de Caiacas WUd nen sclmf ges. Berl. 3. p 425 G. scabra Willd. herb Cor. albo-rosea Folia adtilta glabra , janiora glandulosa-ciliata Peduelli flondi 2 hn., fiuctif. 4 lin. longl snbse-cundi Calyx glandulosi-pilosus. Aflnis G. erectae
ft. Mexicana, lamis ramulibque fere omnin6 glabiis, racemis eximie secandiflons, pedicellis 7-8 lin. longis, calyribns glabris maiginr pubescenti-ciliatis, coiollis extus valde villosis. j in Mexici dilione Cbalco (Andr n. 264)* ad Cuesta giande di Chiconquiaca (G Don gen syst 3. p. 841.) Bractea; niembianaceo-subscanosac glahra? glandulosi-ciliat.-e. (v. s.)
25. G. TRICHOCAIYCINA , iamulis glabrlsculis, fohis brevissime petiolatis cordiformibas acntis serrulatis ntiinquè glabns roargina ad basin cilia pauca gerentibus, laceiuis terminalibns secundifloris folio paulò longioribns , rabi pedicplbs bracteohsque sella apice glandalosis bispidis, bracteii ciliatjs adultis dorso glabris, pedicellis elongatis bracteolas a fete lineares gerentibus , calycis extùs bispidi&imi lobis acumioati^, corollà extiis pilosia^cnlā ^ in Mexico ad viam inter Pieblo-'ViejO et Heal del Moute maio flor. legit cl. Berlandier¹ AflnisG. odoratae var *fd* scd foliis cordatis jam pnma fronte diffeit. (v. s. à cl. inv.)
26. G. BRACHYBOTRVS, ramalis, setis nigns bispidis, foliis ellipticis apice acutis basi obtasis aut subacntis iDtegei rinnm suprà glabris niargine et subth setis nigiis hispidulis, petiolo bievi biisuto, xaceiois axillaribus folio dinndio bievoribns 7-9-lkHis, *hiM* teis ovali oblongis calycisque lobis lanceolatis dorso glabris uiargme junioribus ciliatis, coiolla ovata extus pubcrula ^ in Peruviae prov. Chachapoyos legit cl Mnthcw, Aflnis G. rnfescenti sed facile diffeit calce extùs glabro , G bracteatje sed pill nou glandulo^i, folia nib vere ovata, calyces glabii, etc. (v. s)
27. G."RUFESCENS , ramis petiolis pedancnlis calycibnsque setis rufis eglandulosis adpressis villosis, foliis elhptico-sublanceolatis seuialis acunnne calloso obtuso terminalis utnnquc setis basi subtubeiculatis adpiessist spa 1 sis et subtus secus nervos confeitionbns , nccmis folio paulò longioribns, biacteis fusi* dorso glabiis margine vix jumonbas ciliatis, corollis villosissimis. ^ in Pernviae prov. Cbacbaopoyos legit cl Ma thews. Aflnis G. bracteatae, sed setis omnibns apice eglandulosis, fol's basi augastiobus et biacteis doiso glabiis facile diffeit. Folia 2 poll fere longa, 3 lin. lata (v. s)
28. G. BRACTEATA (G. Don gen. syst 3. p. 840), ramis teretibus racbibnsque feirngineo-birsutis et glandnloso-pilosis, fohis bievifcr petiolatis ovatis macione calloso acntis serrato-ciliatis swprà laevibns subtus leticulatis pilis basi glandnlo^is sparse scabus.iacemis teiminalibas, bracteis junctionbus birsutis deMBfgbbiatis, pedneilis calycibusque albido-toraentosis, corollis rufo-biisntf^ in regnoQuiteisi ad Tuncaiagua et Cbimborazo(Cav.). Andromeda bracteata Cav icon 6. p 42. t 56?. f 1. Folia 1 | poll longa, polbcem lata , Miraim<£ in pilos apice glaudulosos sacpe decidaos abenntes. C01. dilute rosea.

i v. s. comm. ab amie. Delessert ex berb. 'Vent, ubi orta ex Saula Fé de Bogota et sub 110m. Gaullb. erectae latebat.)

29. G. ERECTA (Vent.! b. Cels. d. et t. 5), ramulis glanduloso-pilosis teretibus foliis petiolatis ovalibus mucronatis margine revolutis et subdenticulatis supra glabriusculis subiis prorsertim in nervis Terruginco-villosis, race mis axillaribus et terminalibus folio duplo longioribus secundifloris, bracteis oblongia ciliatis, pedicel 1 is rircurvis bauis bibracteatis, calyx baccato capsulam fitiudente. ^ in Peruvia. Cur. birsutaa. An satis à priore diversa? (v. s. in b. Deless.)
30. G. OVATA, glabra, rainis terelibus, foliis breviter* petiolatis ovatis a pice callosa-subacutis coriactis subnudis minutè punctulatis venoso-retioulatis dentatis, dentibus junioribus apiculatis dein muticis, raceinis axillaribus et terminalibus erectis 7-ioflori^, racibi pubescente, bracteis membranaceo-scapulosis pubescensciliatis, floribus nutantibus. ^ in Mexico inter Tampico et Real del Monte legit Berlandier. pi. exs. n. 3a^. l^ 10-12 lin. longa, 7-8 Jata. Calyx et cor. (erè omnino glabria. Antb. breviter 4-aristat^e. (v. s.)
31. G. ACUMINATA (Cib. tni. et Scbl. in Linnaea 5. p. 126 et 8. n. 5^4), glabra, foliis breviter petiolatis ovatis acuminatis acatis tenuiter serpuiatis, seriatis mucronatis, coriaceis reticulato-venosis discoloribus subtus nigro-panctatis utrinquè punctis clefatis scabriusculis. 5 in Mexico ad Seiro Colorado, San-Salvador et Ma I pays de Joya. Fl. albi. Fruct. nigri. Petiolus 4 lin. longus. Limbo fol. 1 J- poll, longus, 1 latos.
33. G. ELLIPTICA (Cham. et Schlccbt. in Linnaea 8. p. 50i), glabra enm rachide pedicellis corollâ et capsulâ pubescentibus, bracteis calycibusque ciliatis, foliis breviter petiolatis ellipticis utrinquè acutis mucronatis niaigiiatis subserrulatis supra nitidis subtus punctatis reticulato-venosis, racemis terminalibus et axillaribus subpaniculatis, bracteis ovalo-orbiculatis oblongis concavis. 5 in Aequinoctiali. Radicans. Folia pollicem circifer longa. Racemus a poll, longus. Cor. extiis pubescens. Species affinis G. acuminata; et veruall.
33. G. RETICULATA (IT. 13. el K. nov. gen. am. 3. p. 284), glabra, ramulis angulatis, foliis breviter petiolatis oblongis utrinquè acutiusculis serrato-crenulatis Kiuprà nitidis glaudinlâ terminatis, racemis in a pice ramorui congessis axill. et Jenuin. ilibus, pedicellis pubescentibus basi 3-bracteatis, cor. glabrat. £ in Audibus Quitensis inter Ofia et Loxam, in Paramo de Saraguru. Folia 12-15 lin. longa, 5-6 lin. lata.
- 34*. O. GLABRA, tota ferè omnino glabra, ramulis angulatis, foliis breviter petiolatis ovalibus basi subacutis apice in mucrone in apice glanduliferum productis serrato-dentalis utrinquè nervuloso-reticulatis subtus nigro-punctatis, racemis ad apices raniortim confertis folia superautibus, racibi angustata pedicellis (jue b^pc ind^c setulosis, bracteis oblongo-lauceolatis vix ciliatis, bracteolis liueaiibus ad basin pedicelli, calycis lobis acuminatis glabris, corolla extus glabrat in iiiiis pibernalâ, ovario sericeo-villosissimo. ^) in Peru via? prov. Gliachapoyas legit cl. Ma thews. Folia 1 poll, longa, 9 lin. lata. Species affinis G. reticulata et G. ovata. (v. s.)
35. G. COCCINEA (H. B. et K. 1. c.), ramis pilosiusculis, foliis petiolatis subrouudo-ovatis glandulâ terminatis acutiusculis basi rotundatis denticulatis glabris supra nitidis subtus punctulatis, racemis in apice rarnorum terminalibus et axillaribus, pedicellis longis glanduloso-pubescentibus basi bracteolatis, corollis glanduloso-pilosis. 5 i" monte Avilas propè Caracas. Cor. coccinea; Folia 1 a-14 lin. longa. Raceini bipollares.
36. G. RIGIDA (tt. B. et K. 1. c), ramulis subangulatis puberulis, foliis petiolatis ova to oblongis acutis leviter cordatis argutè denticulatis glabris subciliatis, racemis ad apices ramorum axill. et term in., bracteis baseos subrotundatis rigidis inargine pubescentibus, ad basin pedicellorum oblongis, corollis ^Bs. f^ \$ in inonie Cocoliar Cumanenitum. Andromeda rigida Huiub. ix^tfm p. 397. Cor. coccina?
27. G. TOMENTOSA (H. B. et K. nov. gen. am. 3. p. 287. t. 262), ramulis fucos-

centi-touienlosis teietibns, fohis petiolatis lanoeolato-oblongis acutis basi obtusis luagine integenimis et revolutis supià glabus et nitidis snbtiis feirug'mco-toinentosis, racemis in apice lamoram axill. et teiniin., biacteis ovalo-oblongis concavis corollisque extus toinentosis 3ⁱⁿ Andibus Quitensjum pi ope Loxam.

- 38 G. LANK, EH * (Hook ic.pl. i t 66), i amis junioi ibus hii j.utis, fphja bievis-siftie petiolatis oibicul.itis ngidisi convexit uiaigine levolumiis suprà nudiiiscuhs &ubtus lacenusque lani densissim.l fenngmed vestitis, racenm teimiriahbus ct axillaribus, biacteolis ad bdbin pedicelh, calycibus coiolhsqut c\luh b\spis /> in Ainei austi. ad Pa i a mo inter Oua et Saragmu alt. 10,000 pcd. latissima. Cor. urceolatd.

-j- *Species non satis notice.*

- if) G. BUXIFOLIA (Willd. nov. act soc Beiol 4 ex Peis enh. 1 p. 4^a), ramis bird's erectib, foins Mibiotuudo-ovatis dentatib sublus j)uuctato-.scabti5, pedtmculii bolitanii. axillaiibus. ^ in SUIUIO moute ad Caiacab.
40. O. scAiiRA fWilld 1.c exPeis encb. 1. p. 482), fohis ox.ito-coidalis acutis deutatis scabris subtus leticulato- venosib, iacenus axillaubiis siniplicibun , biacteis et calycibus piloso-glandulosls. t> ad Caiacas. Sempeivneus. Calyx baccatus.
- 41 G ? VEHU^TA , fohis brewsimè petiolatis cordatis acuimnatis intcgcuiniis patentibns, racemis nxillanbus et terininahbs ad apices iamorum confertis folio duplo loDgionbus, coiolls ovaiis. ^ in Biasihâ. Andiomuda pulthia Arrab fl. flum.4 t 96 non Cham et Schl. Anth.in icone biarisldtje . an lecte?
- ^2. 0? CANDIDA, suffrulirosa puhescenti-velutina, cauhbs phinmis teretibos eicitis subsimplicibus, fohis ovahbus oblongisve integeirimis mucionatis, 1a-cemis axillanbus folio duplo longioibus secundillons pateniibus, coiolls ovais 5-fidis ^ m Brasiliâ. Andioiueda Candida Anab fl flam, 4* f* 9&. Anth. foite biaristatae ex icone. Gaet. ign.
- /3. G * LIN\RIIOLIA , fruticulosa glabra, Ibizomnte ctasso , lamis vieclis tenuibus Minphcibns , foliii vix petiolulatis linearibus inucronatis maigine subrevolutis subtus fenugueis, raceims vix folio longioibus, pedicelhs uicdio 1-2-biacteolalis, calyc<> lobis acuUssimis. ^ in Biasihoo monlc Itacoluuu januar. floi legit cl Lund¹ Suffrutex humilimus 3-5-pollic Folia fl-10 hn. longa , oehnlineam lata. Cor. oval v Anth pioudctse in comua 2 elongata obtuse emaimata. Fiuct ign. An Gaultheiae spec'An genus propnum? (\. s coimm a cl. Lund)

-J-J- *Species exclusa.*

- G. CORDIFOLIA Rseasch. == Eplgjca coidifolia.
 G. HISPIDCLA Toir. = Phalerocarpus hispidulua
 G. LEUCOCARPA Kunz. = Perneltya leucocarpa.
 O. SEHDYLLIFOLIA PuTsh = PLaleioipa hispidolus.
 G. SPHAGNIOLA Rich. = tpigoea cordifolia.

IX. ZENOBLIA D. Don in Edinb. phi, journ 183/ft. jul G Don gen syst. 3. p. 830.— Andromedx sp. Linn. Michx.

Calyx 5-partitus post anlliesin nee accretiis nee eainosus. C010IU campanula^ feiè ultrà medium 5-fida, lobis revolutis sinu luterdiim dilaUto, aut oblonga breviter 5-loba. Stam. 10 lilam. glabus basi dilatatis; anthiae 4^a nstalde nempè loculis elongatis basi subdisjunctis, apicc J)iarjA|is! Stylus fihonnis. Stigma tiuncatum. Gapsuln 5-locul. 5-valvis sSBobosa locuhcido-dchisccens. Semina an^ulala liylo lateralí <x Don. — Frutices l)or.-Ameriedin glabn autgubpubescentes. Folia lterna, breviter petiolala , o\aha aul lanceolata, intgra aut crenato-

scrata. Pedicelii uniflori, recurvi, plurimi aggregating orti in nixillis sup re in is aut foliis deficientibus in racemum dispositi. Flo res albi.

Corolhs campanulatis 5-ftdis, cal. lobis ovatis.

z. Z. spFciosA. (D. et G. Don II. cc), glabra, foliis ovalib* subcrenatis deciduis, racemis abbrevialis subcompositis, calycibus ovatis obtusculis, coroliis campanulaiis. ^ in paludosis Carolina; borealis (Mich. Hose), à Virginia ad rioridam (Nutt.). D. Don brit. fl. gard. t. 33o. Loud. aib. 1109. f. 898-900. Andromeda speciosa Mich. £l. bor. am. 1. p. 256. Pursh fl. 1. p. 294. Ell. sketch z. p. 493. Andr. pulverulenta Duham. arb. ed. 2. v. 1. p. iy3. Folia dicuntur decidua ab antoribns Araericanis, persistentia ab Europacis. An revera in statione naturali et in horlis quoad durationem diversa?

A. *viridis* (Duham. I. c. sub pulverulentâ), foliis utrinquè viridibus oblongo-ovalibus.—Andr. speciosa nilida Puish 1. c. sed non est And. nitida auct. And. speciosa Lodd. bot. cab. t. 551. Andromeda cassinefolia nuda "Vent." h. Cels. n. et t. 60. malm. t. 79. "Variat foliis integerrimis aut plus minus serratis, obtasis aut acuminatis. (v. v. c.)

/?*. pulverulenta* (Don II. cc.), foliis subtus pulvrenlento-dealbatis ovatis aut sub lanceolatis obtusis acutisve iutegris serrato-crcnati.svc.—Andr. pulverulenta Bartr. itin. 2. p. 476. t. 3. f. 2. Curt. bot. mag. t. 667. Andr. dealbata Lindl. bot. reg. t. zoio. Andr. ovata Sol. in h. Banks ex Pnrs. Andr. cassinefolia /8 pnverulenta Vent.! h. malm. n. et t. 99, Andr. speciosa glauca Wats, dendr. a. t. 12G. (v. s. sp.)

** *Corollis cylindraceis 5-dentatis, cal..lobis acutis.* — An genus proprium?

2. Z. HACKMOSA, glabriuscula, foliis oblongis subdenticualis deciduis, racemis clongatis simplicibos secundifloris, cal. lobis lanceolatis acutis, corollis cylindraceis. 5^{vt} palodusis et uliginosiis à Ganadd ad Carolinam (Puish). Andromeda racemosa Linn. sp. 5^4. Micbx. fl. bor. am. 1. p. 255. Purshfl. p. 294. Ell. sketch 1. p. 492. Big. fl. host. ed. 2. p. 167. Andromeda paniculata Linn. sp. 5(4)? (ex specim. florido ejusherb. ad Lhei*. miss.). Lam. diet. 1. p. i58. Walt, car. p. 135. Andr. spicata Wats, dendr. t. 36. Lyonia laceniosa et Lencothea spicata D. et G. Don II. cc. Loud. arb. 1111 et 11 (4. f. 912. Icon Lher. ab auct. citata non edita fuit. Antherae certe 4-aristatae ut jam viderunt cl. Lherier, Elliott et Bigelow, ideu ad Zenobiam revocavi. Caules rubentes. Gemma? nqaamosæ. Hoc ex herb, suo pertinet Vitis idaea foliis et facie Unedonis Pluk. t. s36. f. 3, sed icon pessima ex Lher. mss. (v. s.)

3. Z. FLORIBUNDA, glaberrima, foliis oblongis serrulato-ciiiatis perennanlibns, racemis terraualibus congestO'paniculatis subsecandiiloris, cal. lobis lanceolatis acutis, cor. ovalo-cylindraceis. ^ in montanis Georgiae (Lyon) et Carglinse infer. (Fraser!). Andromeda floribunda Pursh fl. bor. am. 1. p. 488. Curt. bot. mag. t. 1566. Ker bot. reg. t. 807. Lencothea floribunda D. et G. Don II. cc. Flores numerosi purè albi. Pedicelii 2-brakteati. Anth. loculi biaristati. (v. s. in h. Lher.)

X. PIERIS D. Don in Edinb. phil. journ. T7./7. 159. G. Don gen, syst. 3. p. 83a.
— Androinedae sp. Thunb. D. Von }Vall,

Calyx 5-parlitus, lobis acuminatis. Cor. tubulosa ovoidea seu cylindracea, ore contracto 5-dentalo, dentibus revolulis. Stam. ioinclusa, film. vi_x basi dilatalis apice bisetosis, antheris brevibus incumbenibus muticis longitudinaflter et apice debiscentibus. Stylus robustus 5-gonus apice truncatus. Capsula 5-locul. 5-valvis loculicido-dehisces. Seinina scobiformia. — Arbores aut frutices Asiatic[^]pbriusculi sempervirenles. Folia alterna petiolata penninervia subcorocea plana aut subintegerriina. Ilacemi simplices aut ramosi, ramulos terminantes. Flores pedicellati, ^ululi, _Alln· ant rosei.—Pieris non epat Musa,

sed Musa Pierides dicta quia in Pieri& (aliis Pie ride) natae, aut ex Pierio pat re. Noinen ideo sensus expers.

§. 1. *Pierides verce Asiat ic ce ,/i lam. apice bisetosisl*

1. P. FORMOSA (D. et C. Don 11. cc), foliis lanceolatisbasi acurls apice acuminate serrulatis coriaceis glabris, racemis paniculato-thyrsoideis, corollis ovatis. /y in Nepaliā detexit cl. Wallich. Loud. arb. n i 5. f. 914- Andromeda formosa Wall.! list. n. 761. asiat. res. £. p. 3Q5 et in Spreng. nea. entd. 2. p. 258. D. Don prod. fl. nep. 149. Folia conferta, 4-5 pollic. longa. Racemi pnbe tenuisiuruā pruinosi. Cal. lobi nervo tmarginati. Cor. roseae. (v. s. ab bon. car. Ind. or. Angl.)
2. P. LANCEOLATA (D. et G. Don 11. cc.)» foliis lanceolatisbasi acutis apice acuminatis inargine integerrimis, racemis simplicibus becundifloris, cor. ovali-cylindraceis pubescenibus. /y in Nepaliā (Wallich!). Andromeda lanceolata Wall, asiat. res. i3. p. 3go ic. list. n. 762 et in Spreng. neu. entd. 2. p. 58 non Desf. Andromeda aquamlosa D. Don prod. fl. ncp. 149 ex G. Don gen: syst. 3. p. 332. Cor. albae. (v. s. sine LOUD, à cl. Wall, cornin.)
3. P. OVAXI FOLIA (D. et G. Don 11. cc), foliis ovalibus basi obtnsis apice aenminatis margine integerrimis, racemis siinplicibns secundiioris subpubescentibas, cor. ovato-cylindraceis puberulis. /> \$ in montibus Nepalensis et ad Sirinagur. Loud. arb. n i 5. f. 913. Andromeda ovalifolia Wall.! list. n. r63 asiat. res. i3. p. 3gi ic. et in Spreng. neu entd. 2. p. ?:>8; D. Don prod. 148. Andromeda capricida Ham. luss. ex Don.*(v. s. ab hun. cur. Iud. or. Angl.)
4. P.? JAPOwrcA (D. et G. Don gen. syst. 3. p. 83a), foliis lanceolatis crenatiti basi atteiuatis et intcgris, racemis terminalibas panicnlatib. /y in Japoniā juxta Nagasaki. Andromeda Japonica Tbunb. fl. Jap. 181. t. 22. Folia 1 ½-i poll. longa. Flo res rabri.

§. a. *Picris spuria Americana, antheris è dorso connectwibisctosis,*
— An genericè distinguenda?

5. P. PHILTYRE/EFOLIA , foliis ellipticis oblongisve brevibsimè petiolatis coriaceis nitidis ad margines subrevolutis apice obicure serratis , racemis laxis axillariibus folio sublongioribus , corollā ovali, stain, iilamentis apice biinflexis, antheris bifldis dor&o biaristatis. j in Florida occidental! ad Apalacliricola (Drumlin.). Andromeda phillyrefolia Hook. ic. pi. 2. t. 122. (v. V coll. a cl. Chapman et couim. à cl. Asa Gray.)

XI. LYONIA Nutt. gen. am. 1. (c818) p. 266 non Ell. nee Raf. nee Reichenb. (1)
— Lyoniae sp. Don, — Andromedae »p. and.

Calyx 5-lobus. Cor. subglobosa exliis pubescens 5-dentata. Stain. io_f fjlam. pubescentibus complanatis, anlheris muticis. Capsula 5-locul. 5-valvis , suturis crassis dense conferruminatis per dchiscentiam indivisis et valvulas surnumerarias inter valvulas veras confidentibus. Seniina 00 subulata.—Frulices boreali-AmeriqaiiAeucothoibus similes.

* *Foliis deciduis.*

1. L. TiGusTRiTFA, pnl^scens, ramis teretibus, foliis obovato-lanceolatis aenminatis tenuissime serrulatis deciduis, paniculā terminali apjjyllā, raiuis florid is racemosis, corollis capsulisque subglobosis pubescentibus, stylo deciduo. 5 £ in sylvis et paludosis fieqnens a Canada ad Carolinam. Vaccinium lignstrinnt Linn. sp. 560. Andromeda ligustrina Muhl. cat. 44. Ell. sketch 1. p. 4qo.Torr.! fl. 1. p. 421. Audr. paniculata Willd- sp. 2. p. 612 (excl. Lin. syn.). Ait! Mich! Pnrsh, Bigg etc. 1-yonia paniculata Nntt. gen. 266. D. el G. Don 11. cc. Wats, dendr. r. t. \$7. Andr. globu'ifera et pilulifera hortul. Andr. parabolfea Dubain.

(i)*LyoniaJfl. (1821) = Seutera ReJclienb. Lindl. -a Lyonia Reichenb. (i83o) = Cassandra Don. — Lyonia Raf. est genus inter Polygoueas dubium à Michauxiu anteà Polygonella, et post<A à Rafinesquio ipso, ut ridetur, Stopinaca dictum.

- nrb. cd. nov. T. p. 191. Andr. racraosa Lam. diet. 4. p. i58 nun alior. Andr. paniculata < *t nudiflora* Michx. fl. 1. p. 254. Capsula globosa, puberula, suturis nervosis ad dehiscentia obscure et incertè valvulifera. (v. v. et s.)
- yg. *capreacrifolia*, foliis ellipticis breviùs acuminatis, minus pubescent, racemis foliis paucis subiutermixtis. 5 *ⁿ hortis Europaeis culta. *Lyonia capreacrifolia* Wats. dendr. a. t. 127. G. Don gen. syst. 3. p. 831. Vide nr var. major è cultura orta. (v. v. s.) *
- y, *salicifolia*, foliis lanceolatis glabriusculis sublacidis. 3 >Q hortis Europeanis culta. *Lyonia salicifolia* Wats, deudr. 1. t. 38
2. L. *MULTIFLORA* (Wats, dendr. 2. t. 128), ramis teretibus jnnioribus pedicellisque ferrugineo-Dubescensibus, foliis ovali-lanceolatis tenuissime serrulatis. In basi acutis a pice acuminatis supra glabris subtilis pills spasis ferrugineis subscariosis, pedicellis fasciculi! (is, aliis axillaribus aliis in racemis laxura dispositis, corollis globosis sparse puberulis. ^ in Carolinæ merid. legit Fraser. *Lyonia multiflora* G. Don gen. syst. 3. p. 831. An mera var. L. *ligustrinae*? (v. s. sp.)
3. L. *FRONDOSA* (Nutt. gen. 1. p. 2H7), pubescens, ramis teretibus, foliis obovato-lanceolatis acutis serrulatis tonentosis, ianiis floriferis paniculatis foliosis, corollis globosis. ^ in Georgiæ (EH.), Carolinæ et "Virginiæ" (Pursh). *Andromeda frondosa* Pursh. fl. 1. p. 29.5. Audr. paniculata foliosillora Michx. fl. 1. p. 225. Andr. race 1105a Walt. car. 138. *Lyonia frondosa* G. Don gen. syst. 3. p. 831. Similis dicitur ligustrinæ. Anth. ex Pursh a vista toe ex Ntt. ID ut iced. Species dubia. ~| *
- ** *Fotis persistentibus*. •
4. L. *FERRUGINEA* (Ntt. gen. 1. p. 266), frutieosa, ramulis foliisqne subtilis ferrugineo-lepidotis, foliis coriaceis obovatis planiasculis subtilis nee supra venoso-reticulatis breviter petiolatis, pedicellis in axillis 3-4 aggregatis i-floris, corollis globosis. ?> in pi net is Georgia? (Fraser!), Florida; (Pursh), Mexici (Don). *Andromeda ferruginea* Walt. car. 138? Vent. malm. t. 80. Andr. ferruginea \$L fructicosa Michx. fl. am. i. p. r*52? *Lyonia ferruginea* G. Don gen. syst. 3. p. 830. Kamuli et folia juniora utriqua Iepidota rufo-ferruginea. Folia adnata superne laevia. Flor. jun. et jul. (v. s.)
5. L. *RIGIDA* (Nutt. gen. r. p. 266), arborescens, foliis coriaceis obovato-lanceolatis sen obovato-cuneatis breviter petiolatis margine revolutis utrinque venoso-Yetic^platis subtilis ramulisque furfuraceo-lepidotis, pedicellis axillaribus 3-4 nnifloris, corollis globosis. ^ in sylvis sterilibus arenosis Carolinæ. (Fras.! Bosc!), et Florida; (Pursh). Andr. ferruginea Willd. sp. 2. p. 609. Andr. ferruginea a. arborescens Michx. fl. 1. p. 252? Andr. rigida Pursh fl. 1. p. 29a. Lodd. hot. cab. t. 1/30. Pubes minus ferruginea quara prioris. Floret apr. maio. Cor. alba?, (v. s.)
6. X. *JAMAICENSIS* (D. et G. Don 11. cc), ramulis angulosis pubescentibus, foliis lanceolatis subintegerrimis utrinque acutulusculis coriaceo-iueembranaceis supra nitidis, subtus reticulato-venosis subpuberulis deinurn punctatis, pedicellis ad axillas fasciculatis i-floris. ^ i^u summis montibus Jamaica? (Sw.! Bert!). *Andromeda Jamaicensis* wartz! fl. ind. occ. 838. Folia a-3 poll, longa, 6-8 lin. lata. Cor. alba ovata exstans' sublepidota. Ovarium villosum.-Capsula ovato-pyramidalis pentagona s'Juris crassis albidis. Seraina subulata. (v. s.)
7. L. *Fasciculata* (G. Don gen. syst. 3. p. 831), ramulis ferrugineo-villosis teretibus, foliis^punctato-lanceolatis basi acutis apice obtusis integerrimis coriaceis perennantibus, junioribus utrinque fenginco-villosis, adultis supra lucidjs subtilis punctatis, utrinque venoso-relicolatis, pedicellis ad axillas fasciculatis i-floris, corollis ovatis lepidoto-punctatis. 5¹ monilibus Jamaicas australioris (Sw.! Bert!). *Andromeda fasciculata* Swartz! fl. ind. occ. 830. Cupsuja ovata, subtrinis crassis dichotomis, valvulas 5 intermedias lineares apice ^punctinalis ex subtrinis ortas exhibens. Cor. albae. (v. s.)
8. L. *RunioNosA* (G. Don gen. syst. 3. p. 841), ramulis teretiusculis ferrugineo-lepidotis, foliis coriaceis ovatis basi acutis apice obtusis integerrimis, supra lucidis venoso-reticulatis, subtus junioribus lepidoto-ferrugineis demum pallidis vix vennlosis, racerais brevibus axi Karibus confertifloris ferrugineis fo-

lio brevioribus. 3 in rupibus ins. Sancti-Thomasi. Andr. rubiginosa Pers. eucb. 2. p. 481. n. 19. Andr. pubescens Poir. diet. suppl. 1. p. 355. Folia sesquipoll. longa, 9 lin. lata. Cor. ovata lepidotæ. Capsula ut prioris pseudo-decemvalvis. (v. s.)

•j" Species cxcfusce.

- L. ARBOREA D. Don. r= Oxydendrum arboreum.
- L. CALYCULATA Reich. = Cassandra calyculata.
- L. MARGITATA D. Don. Leucotloe coriacea.
- L. MARIANA D. Don. =Leucothoe Mariana.
- L. RACEMOSA D. Don. = Zenobia racemosa.
- L. RHOMBOIDALIS G. Don. = Leacothoe coriacea.

XII. OXYDENDRUM.—Andromedæ sp. *Linn.*—*Lyonia* sp. *Don.*

»

Calyx 5-partitus, lobis acaminatis. Cor. ovata 5-denlata. Stain. 10, filara. crassis pilosiusculis, antheris crectis oblongs, loculis apicc discretis acuminatis sect inuticis. Stylus crassiusciius penlagonus. Capsula pyramidata pentagona 5-Jocul. 5-valvis, tawis medio sepLiferis, suturis indistinctis. Scmina 00 scobilbrmia. — Arbor in ordine inagna boreali-Americanæ glabra. Folia gustu acida, unde Anglo-Americanis *Sorrel-treeet Saur-tree* dicitur; ex his nominibus genericum nomen finxi.

i. O. ARBOREUM, glabrum, raniis teretibus, foH#petiolalis oblongis, serratis, paniculis terminalibis polystachyis, iloribus seciis ramis pedicellate snbsecundi.s patulis demum reflexis, corollis ovatis extus velutinis. fi a Pennsylvaniâ ad Floridam præsertim in vallis montinm Allegbanys. Andromeda arborea Linn. sp. 565. Sims bot. mag. t. 905. Micbx. f. arb. un. 3. p. 3aa. t. 7. Bart. fl. bor. am. ill. 1. t. 3o. Lyoniu arborea D. et G. Don gen. syst. 6. p. 8.31. Sonel-tree Cat. car. i.t. 71. Arbor pulchra. Folia Jidda. Flores albi. Folia nascentia ex Micbx. fil. villosa, mox glabra. (v. s. sp.)

Xlir. LEUCOTHOE—LencotBoe, Agarista et Lyonie sp. *D.* «?{ *G. Don I. c.*—*Andromeda Nutt. gen. am.* 1. p. 264 excl. sp. — Androraedx.sp: *Linn.* ct *auclor.*

Calyx 5-lobus, lobis nee demium carnosis IIJC sensim auctis. Cor. ovata aut cylindracea, 'rariis ovato-campunula', ore plus minus contracto 5-dentato. Stam. ioinclusa filam subdilatatis coiuplnnaiis sajpi villosis, antheris ovatis truncalis muticis apice biporosis. Stylus filibrmis. Stigma simplex capitatum. Capsula depresso-globosa 5-locul. 5-valvis loculicido-dehiscens, suturis nullo modo ut in Lyoniat valvae-fonnibus. Semina ovalo-angulata.—Frutices elegantes Americani aut Asiatici. Folia sempervirentia aut decidua, integra aut dentata. Flores albi aut rariis coccinei, dispositione varii.—Genus forte dividendum sed characteres hue usque inacuti non mihi sufficero videntur.

Sect. 1. EULEUCOIHOE.—*Leucothoe D. Don in Edinb. phil.journ. in p. 15g et G. Don gen. syst. 3. p. 83i excl. spec.*

Corolla; cylindracea. Kacemi spicali breves axilla res confertiflori.

1. L. AXILLAIUS (D. et G. Don 11. y.), foliis oblongia ovalibus lanceolatis acuminatis coriaceis cartilaginco-serratis snblts inumis&ime glandnloso-pijo-sinscnlis, ramolis pulverulento-pubescentibis, racemis axillaribus snicatis folio mullò brevioribus sessilibus, bracteis ovatis acutis, bracteolis 2 intinatis ad basin pedicellonim, <mv. oyato-cylindraceis. 5 inf m^ntanis Yiigini et Carolina*. Andr. axillaris Sol. in Ait. kew. 2. p. 8g. Pur.sh 11. 1. p. 202. Willd. cnum. 45a non alior. A. axillaris 0 Lam. diet. 1. p. 15. Leucotboe axillars. Locd. arb. in 3. f. yo8. Flores albi. Anth. mntiesc. (v. s.)

- jS. longifolia* (Pnrsh 1. c. p. 393), foliis line.'iri-lanceolntis longissimis.
 £ Hook. bot. mag. t. 2357. ^{i<o*i^{ex}} i^one vidcntir serrulatociliata.
2. L. snwuLOsA (D. et G. Don 11. cc), foliis ovato-oblongis basi obtusis a pice acuminatis snbspinuloso-serratis coriaceis utrinquè glabris, racemis axillariibus sessilibus subsecundifloris laxiusculis folio dimidiò brevioribus, bracteis ovatis acutis, bracteolis minimi's ad basin pedicelloram, corollis breviter ovato-cylindraceis. ^in deniisis Caroliuae et Georgia*. A. spAulosa Pnrsh fl. 1. p. 293. A. Catesbaei Walt. fl. car. 137. Willd. sp. 2. p. 6i3. Sims bot. mag. t. 1955. Lodd. bot. cab. t. 132o excj. nbique Cat. syn. Andr. Walter! Willd. cnum. 453. A. lanceolata Desf. cat. i36? A. axillaris Mich. fl. 1. p. 253. Ell. sketch 1. p. 487. Duham. ed. nov. 1. t. 39. Similis priori, sed certè disincta. (v. s.)
3. L. ACUMINATA, foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis sea serratis utrinquè glabris subtùs reliculato-venulosis coriaceis, racemis axillaribus brevissimis subcorynibosis nudiuscnlis, floribus nutantibus, cor. cylindraceo-ovatis./) in paludosis arenosis Georgia;, Florida, Carolina merid. Andr. acuminala Willd. sp. 2.ip. 6i3. Ait. kew. 2. p. 70. Smith exot. bot. t. 89. Pursh fl. 1. p. 293. Andr.* Incida Jacq. ic. rar. t. 79. A. populifolia Lam. diet. 1. p. 159. A. reticulata Walt. car. 1R7. A. forniosissima liatr. ex Pnrsh. A. laurina Michx. fl. am. 1. p. 253. A serrata et serratifolia hortul. Capsula globosa vix deppressa. Caulis cavitas medullosa cava undè *Pipes tern-wood* dic-itur (v. s.)
4. L. CORIACEA , glaberrima, ramalis triquetris, foliis coriaceis ovalibus acuminatis iutegerrimis suprà lucidis subtùs punctulatis nervulo subinarginatis et ad margines subrevolutis, pearoellis axillaribus aggregatis, cal. lobis linearibus, corollis cylindraceis, stam. f^lain. glabris. ^ in sylvis arenosis Carolina; et Florida;. Andr. lucida Lam. diet. (1783) 1. p. 157 non Jacq. A. coriacea Ait. kew. 2. p. 70. Curt. bot. mag. t. 1046. A. Mariana Jacq. ic. rar. 3. t. 465 non Linn*. A. nitida Michx. fl. bor. am. 1. p. 25a. Pursh fl. 1. p. 29a. A. marginata Dnham. arb. ed. nov. 1. p. 188. t. 40. Lyonia marginata D. et G. Don 11. cc. Audr. rhoinboidalis "Veill. in Duham. arb. ed. nov. 1. p. 19a. Poir. suppl. 1. p. 358 et ideò Lyonia rhomboidalis G. Don gen. syst. 3. p. 831. Andr. uiyrtifolia Salish. prod. 390. Co/, rqseae aut ferè rubrae (Andr* coriacea rubra Lodd. bot. cab. t. 672). Auth. inutical* dorso bisetosae. Caps. Leacothoes. (v. v. c. et v. s. sp.)

Sect. 11. MARIA.

Cor. ovato-campanalafll ad oram non contracts. Pedicelli umbellato-fasciculati (rachi vix ullà) nunc subaxillares nunc foliis evanidis subracemosi.

5. L. MARIANA, glabra , foliis ovalibus cludiculis utrinquè subaculis planis integerrimis subcoriaceis subtùs pallidis, rani is floi'idis aphyllis, pedicellis fasciculato-adgregatis, cal. lobis linearibus foliaceis, cor. ovato-cylindraceis, stam. illamentis villosis. fi in sylvis et puliidosis siccis arenosis à Novâ Angliâ ad Florida in. Andr. Mariana Linn. sp. !ft!. Sims bot. mag. t. 1.^79. Willd. sp. 2. p. 609. Duham. avb. ed. nov. p. 177. t. 37. non Jacq. Lyonia Mariana D. et G. Don 11. cc. Andromeda pulchella Salisb. prod. 289. Flores ampli albi. Capsula globoso.deppressa. Semina paiva angulata. (v.'v. c. et s. sp.)

ft. angustifolia (Pursh fl. 1. p. 294), foliis oblongo-lanceolatis. — Pluk. mant. t/448. (v. v. c.)

Sect. in. AGAURIA — Agaristae sp. *Don non DC.*

Calyx persistens subcarnosus. Cor. ovatac ore contracto. Kaceml terminales.

6. L. LITTOHALIS, ramis teretibus glabrist foliis petiolatis lineari-oblongis basi acuminatis apioe subobtusis callosulis margine integerrimis suprà laevibus subtùs albidis tenuissimè-venulosis, racemis axillaribus et terminalibus glaberrimis, pedicellis patu'lis su^.secundis, cal. lobis acutis, cor. ovato-cylindraceis. £ ad margines fluvior#m in prov. Emirna in interrorc ins. Madagascar legit cl. Bojer! Folia i5 lin. longa , a lin. lat.i. Cor. ex sicco purpurasceutes, extùs forte glaucescentes, 3 lin. long*, (v. s. sp. à cl. Bojer.)
7. L. 3AHClF0LIA, lainis leietibus glabris, foliis petiolatis angnstè lanceolalis

utiinque acamlnatis inlegenimis snpu vindibus snbtus iuonis , i<tcemis tei-imnalibus et ex axillis sammis oilis, pedicellis patcuti-recui vis subsecundis glabns, cor. ovall-oblongis \$ ff in ins Mauutii montibas et sylvis noc non forte in ins Madagasca (Noi !). Andromeda salicifolia Comm beib. Lam diet, i p. iSq Smith Jc ined. t. 58 Hook exot. fl 3. p. 1g2. bot. mag. t. 3286. Sieb ' 11. nuar. exs. 2. n. 249 Agaiista saliciolia Don gen. syst. 3. p. 8J7 Folia 3 poll, feielonga, 3 liu lata. Cor. violaceo-purpuiascentes ant in. pi. culta albulae (v. s. sp.)

(*t. pyrifoha*, foliis ovato-lanceolatis basi subacutis apice aenminatia. 3 ^>in ins. iVlauutu et Borbomae Andiomeda pyrifolia Pers. enh 1. p. n. 17. Pet. Th obi p 14. I'oha 3 poll, longa, polhcem lata so* pi us ot in var. *a. notata* lined ad ntluque latus folu in inedio laming clacti (ut in O cote A) qua; non est nervus veius et ex qua auctores falso dixerant folium tri-neivura. (v. s. sp)

8. L BUXIFOLIA, ramis teretibus, foliis brevissime petiolatis conaceis glaberri-mislate ovalis aut fere oblongis mncronatis basi subcordatis snpiā lucidis aub-tūs glaucis demuin subferrugiels, laceuiis terminahbus ebracteatis pilosinscu-lis, pedicellis patulo-incurvis subsecundis, coi ovato-globosis. ^ in msulae Borbonix montanis volcanuis nee non in in& Maaritii et Madagnscal (Bojer). Andromeda buxifolia Cumin ' herb Lam. diet x p. i58. Smith IC. ined. 1. t. 5g Hook. bot. mag t. 2660. Lodd bot. cab. 1494* Ann floi et pom. 1833. p. a5i. ic Agansta buxifolia Don gen syst. i p. 837 Cor. rnbellimas. Stain, filara. villosa. Anth. niuticoe, loculis ovatis apice di&cretis Calyx sub-cainosus pcrjijstens 5-lidus obtasus. Vanat foliis subrotundib ovatis et oblongis, lacemis glabris aut velutims aut subhispidis. (v. s. sp et v. c.)
9. L BOJERI, ramis teretibus rachibus calycibus nervoque folu medio subtūs setas rigidas mgias patente geientibas, lohis oblongo-lanceolatis basi sub-cordatib apice vix acutis margine revolutis neivo excepto glabris coiaceis, racennj. ex axillis supiemis aut apice ramoiara oitis, cal. lobis obtusis, corolis oblongis. 5 ad ripas flavoram in prov Proirna ins Madagascar detexit cl. Bojer ' Andromeda ciliosa Bojer' in litt. sed folia non veie nhosa dicenda com margmes smt nudi. Andr. revoluta Boulon' in litt. non Spreng. Folia 10-lin. longa, i.-i-| lata (v. s. sp)
10. L BRACAMORENSIS, arborea glabra, ramulis sulcate-angulatis, folns brevi-ter petiolatis ovato-oblongis atnuque obtusis obsolete mucronatis margue integeiimis et revolutis coriaceis et aveniis, 1 ace mis terminalibus solitarns erectis folio dupl6 longionbus. ^ in tempetatis Novae Granata* in prov Braca-morensi prope h Felipe et Paramo de Yam oca. Andiomeda Biacamorensis H B. et K nov. gen. am. 3. p. 288 t. a6i. Andromeda myrtifoha Willd. herb. Agaiista Bracamoiensis Don gen syst 3. p 837. Cor. coccineae rnagn. et forma Andr polifoliae. Placentae ad apicera colnmnas centialis caps. Seraina liearei-subulata.
11. L SUBROTUNDIA , rarois glandnloso-hispidis, foliis brevissime peioliatis snbro-tundis basi subcordatis apire letasis iuucionatis mtegerrimis apice ciliatis su-pia glabns subtūs ferrugineo-tomentosis, lacemis terminalibus subsecundis 8 9-flous rachi pedicellisque hispidis, ovario villosnlo 5 in Brasilia prov. Minaruin geneialium ad mpes ciicā villain Sanoti-JohanmsRegii Andromeda sobrotunda Pohl pi br. 2 p. 3a t. 121. Agaiista subrotanda Doa gen.syst. 3. p. 837. Cor. ovatae rnbrae.

Sect. iv. AGASTIA. — Agaristae sp. *Don non DC.*

Coiollte ovatae ore conlacto. Racerai axillares l.ixiusculi.

12. L NUAMOLARIA, ramulis giabns (aut jnnionbus hispidis), folns confertis bievisbiuc petiolatis cordatis subiotundis apice letus abiupte mucronatis co-uaceis glabiis venoso-ieiculatis, racemis terminalibas et axillaribus folia paulò superanlibns calychasqnc Inspidis, ovario pubescente 5 m Biasilia; nieriad. piov Rio-Grande do Sul legit cl. Scellow' Audi, nuinuuilari.i Cham, et

- Schl.' iulinna? à i. p. 520. Agarista nummularia Don gen. syst 3. p. 837.
Folia 6-7 lin. longa , 5-6 lata. (v. a. à mas reg. Berol.)
13. L. SERRULATA, Tamis teietibus, foliis subimbricatis snbsessilibns patulis 11-gidis ovatis cordatis acatts reticalatis veuosis margine leflexo et suprà jaxta marginemsermlato-clhatis scaberumis birtis, nervo sabtus cam ramis inflon s-centns calycibasqae hirtis, racemis teimnalibas et apicem versus axillaribns folia longc superantibus, cor. oyhndricà cal lobis acuinatn duplo longioie . ovario pubescente J^{1Q} Brasilia' aeqninoctiali. Andromeda serrulata Cbain. in hnnacà S. p 506. Agarista seirulata Don gen. syjt. 3. p. 838. "Vanat folus hiitis aut glabiiasculis.
14. L. FULCHRA., glabra, ramulis obtuse angalalis, foliis peliolatu ovatis inn-crouatis coriacis integeriimis, lacemis axillaribus et tenninalibus si*cuudn i5-3ofloris, ovario glabio % 3 in Brasilià tropicà. Andr. pulchra Cham et Schl in linnaeà 1 p. S11 et 8 p. 507 non Ariab Agarista pnlchra Don gen. syst. i. p. 837 Folia fere L nummulariai sed duplo niajoia et inagis ret lisa Variat glaberuma ant lamiis miunte pubescentibns
15. L. FULCHELTA., ram alls angnlatis, foliis breviter petiolatis coidatis ovato-oblongis obtusis mnernatn margmatis subconaccis plams, juuiorum costà sabtus et petiolo ramnlis mflorescentiisqae tennissime pubescentibus, lacemis tenninalibus axillanbusque 3-8-flooiib folia paulo superantibus, flonbus longc pedicellatis /) in Brasilia. Andromeda pnlchella Cham, in linnaeà 8 p. ^09 Agarisia pnlchella Don gen. syst. 3. p. 838. Afflnis L pulchi-c et neuifolue Folia semi-poll, longa.
16. L. PISTRIX, ramnlis obtnse angnlati, foliis birviter petiolatis ovatis cordatis, jnnioibus acntis, adultis obtusis, semper raacronatis couaceis marginalis, subtus cum 1 a III ill is inflorescentus calycibusque tenuiter dblido-tomentosis , racemis terminalibus axillanbusque folia superantibus, coi ovoideà pubescente, ovauo albo-tomeutoso £) in Brasilià Andiotnedi pistiix Cham, in hn-naeà 8. p.503. Agaiistt pistriK Don gen syst. 3. p 838.
17. L. CHLORANTHA., ramis teietbos infloiescentiis calycibasqae pnbescentibns, foliis breviter petiolatis ovatis corditis obtusis raacronati; coiaceis margine revolatis glabris, racemis teimmahbus axillaribusqie folia paulo superantibns, cor. ovoideo-ryhndicà triplo cal lobis lon^ioip, ovario puberulo t> in Biasilià. Andiomeda chloiantln Cham in liunaeà 8. p 508. Agarista chlorantha Don gen syst. 3 p. 838 Coi ex Sellow alba a pice virescens. Species affinis L. Bracamoiensi et revolutas.
18. L. REVOLUTA , ram a Us teretinscalis pube minimà pubescentibns, foliis ovalo-oblongis nttnque obtusis mucronatis conaceis margine revohitis integerumis glabriubculis tenuissime veuoso-reticalatis, racemis axillanbns subsecuncnis laxis 7-8-flons, cor ovato-cylindraceis 3ⁱⁿ Brasilia' tiopica legit Sellow' circa Kio-Janeiro cl. lid Gomez¹ Andi. revoluta Spieng neu entd. a p. I3I. syst. a. p. 291. Cham, et Schl' in linmeà 1. p 518 St-Hil voy. p 11. v a p. 407 Schiad. ill pl.br in Goett. anz 1821 p 710. Agansta Spiengelii Don gen. syst. 3. p. 837. Rami glabri teites, ramuh et fohorum junioiuin iieni imnutissime pubeiuh. Coi rubiae. (v. s.)
19. L. BAHIENSIS, ramnlis subangulatis pedcellis calycibnsqne tenaissimè pal-veialento velatm3, foliis petiolatis o\ahbas acuinatn mte^erriois atnnque glabus margine subrevolutis, lacemis axillanbus et terimnalibas fohi circirei longitudine 6-7-flons erectis, biacteohs minimis subulatis ^ cnca Bahia in Brasihaein snbulosis andis leger cl. Salzman (u. 314') et Blanchet (n 1680¹) Frntex 6-8 pedalis. Petioh 2 lin longi. Fol. limbi I-I ± poll, longi, 8-10 lm lati. Cor albae Toite hie species duas latent, nempe :

*• *Sdzmanm*, foliis ovalibus mucronatis ant in ilsdem ramis ovato-laDceo-latis acumin*to-raucronalis, supeine venoso-reticnlatis. (v. s)

#. *Blanchetu*, foliis o\alibus obtusis abiupie mucrouatis ad margines magis

- ievolulis, sncine Ianibus, paulò majoribus — Cor. 4 lin. longa. Capsula subglobosa (v. s.)
- 7? *Arrabidas*, foliisbasi angustatis. — *Andromeda nitida* Arrab. fl. flu in. 4. t. 94 non Michx,
20. L. CRASSIFOLIA, arborra, 1 amah's teietibns , foil Is confertls breviter petiolatis ovatis apice acutis basi emarginatis integerrimis glabris coriaceis, subtus ad lateia Dervi medii punctis oblongis pictis, racerois axillanbus folio longioubus niulniloris. *ff* in sucus montanis Brasilia[^] ad Itambe prov Minium geneialium. *Andromeda ciassifoha* Pohl pi. bias. 2. p. 34- Agasta Pohhi Don gen. syst. 3. p. 837. An *Andromeda crassifoha* Nenw. reis. ex floiâ 1821. p. 297. eadem aot diversa species? Cot. ign.
- at. L. MDLTIFLORA, glabra, rainulis tereliusculis, foliis longè petiolatis lanceolatis bdsi obtusis apice acuiinalis integeuimis, rjceuiis axillaubns circ. 16-flons folio parum brevioribns subsecundis, bracteohs ciliatis, ovanis glabns 3 in Brasilia? prov Minarnm geneiaium in montams ad Sena Rlantiqueia. *Andromeda mulufloia* Pobl pi. bras, 2: p. 33. t 122 non Wats. Andr. lanreolaM Arrab. fl. ilnm. 4. t 97 non Desf. nee Don. Agaï&ta multiflora Don gen. syst. 3 p. 835. 'Valde accedit ad L. encalyptoidem, sed diversa videtm ex larcium longioribas veie jxillaiibns, etc.
- aa. L. ELJCALYPIOIOES , glabra, raraufs teietibus, foliis longè petiolatis oblougo-lanceolalis acuminatis bisi obtusis iniegerimis sublus pallidis, lacmis latcralibus 7-8-flons biacteolalis cum bracteis et ovaio pubescentibus. [^] *f* in hiasilia merid. pro\ Rio-Grande do Sul legit Sellow. *Andromeda eucalyptoides* Ciara. et Scbl. in liniiaeâ 1. p. 518 *Agarista eucalyptoides* D Don gen. syst. 'f. p. 837. Fol. peliolus 6 hn. longus, limhus a poll, longus, 5-6-lin latas R.i-cemi ex foliornm delapsoiuin axillis 01 ti et ideâ lateules 9-10 1m. longi. C01. ovato oblong a? uiceq'atae (v. s. comm. à mus. leg. Beiol.)
- 23 L. OTEIFOLIA, glabra, foliis bieviter petiolatis oblongis snbacuminatis macionatis basi acutiusculis roaiginibus leviter icflexis, lotundatisve pl.inis, lacemis axillanbus eicclis longitudine fohoinin cue. 12-flons, ovario glabro *jfr* in Brasiliâ aequinoctidli. *Andromeda oleifolia* Cham, in linnocâ 8 p. 504. *Agarista oleifolia* Don gen. syst. 3. p. 8.18. Folia 2 poll longa consistently lau-liuâ C01. coccinea; Cal. lobi atuminnti. "Vanat Iniloiescentiis lmtis gldbiisve. • Capsula depressa spbaeioidea. Placenfae ad apicem columns. Sera, oblonga angnlate.
24. L. NERIIFOLIA, glabenima, ramulis angulatis, foliis petiolatis oblongo-Ian-ceolatis acutis basi ovatis coriaceis inlegenimis, paniculâ raccinosâ teiminali secndiflorj_T ovatio glabro. 3 " Brasiliâ tiopicâ Andiomeda neuifolia Cham. <@ Scbl. in linn.tâ 1. p. 5?2 Agausta neriifolia Don gen syst 3 p. 838. Folia 3 poll, longa > polhcem lata_t margmala, snbtus pallida reticulato-venosa. Floies cernui urceolato-tubulosi.
- *Species non satis notcc,*
- i5. L. IHCIFOLIA , ramuhs . . . foliis biewler pciiolaus rordatis latis cornceis veisus basin subJeutatis, junioubus ovalis lutegetmius, ilonbus lacemosis pamculatis. [^] m Pciuvia. *Andromeda llitioha* Pcis. enh. 2 p. 481 *Agarisla IJicifolia* Don gen. syst 3 p. 838.
- 26 L. CILIATA, foluj, chpticis obtusis mucronali* subseirialis leticnlatis, lacemis axillanbus secundis, biacteis couvoluns cibalis, coiollis cylindricis «in-theris muticis lmearibus *fy* in Btasiliâ Andiomeda cilidla INeuw. ieis. 1. p. 104, exfloia 1821. p. 297. Aflinisdicitut L ieolut?e.
- ^{^7*} ^{ij} COCCINEA , foliis elliptico-oblongis obtuse mucronatis integerrimis marginu sabrevolutis glabns conaieis, laceuus termiualibus biat.teatis secundis, coiols cylndicis *jj* m Biasilia piope Cabo l<n> vt "Villa dc Sahadoi legit Pi Max. de Neuwied Andiomeda corcineaNeuw. ieis. 1 p. 104 ex belli ad Gocll *n7. 1821. p. 709. Cor. pallide lubcns.
p 79 p
28. L. coRiior.iA , lamnlis teietibus glabris, foliis petiolatis oblongis aculis inn-

uronatib margine revolutis et integris conāceis utrinquè glabris , racemis ax.il-laribus subsecundis cernuis. fy in Brasiliā. *Andromeda coriifolia* Thunh. et Billb. pi. bras. dec. i. u. 5.

29. L. ERIOFHYLTA, ramulis , foliis ovato-subrotundis integerrimis suprà tomentosis infrà lanatis glandulâ cylindricâ terminalis, racemis terminalibus secundis brae tea tis, corollis ovatis. fy in Brasiliā. *Andromeda eriophylla* Tell. in Vand. fl. las. et bras. spec. ed. Ream. p. 107. Pers. encb. x. p. 482. Agarista eriophylla Don gen. syst. 3. p. 838. f
30. L. SERRATA , ram is teretibus, foliis breviter petiolatis ovalibas serratis basi obrusis apice sobacutis subtis penninerviis venoso-reticulatis, racemis subterminalibus erectis multifloris, cor. extiis villosis, bracteis lanceolatis. jy in Brasiliā. *Andromeda serrata* Arrab. fl. flam. 4. t. g5 non Smith. An the HE, ex icone, forte apice 4-aristatoe, an ideo Gaultheriae spec?
- 3z. L. HIRTA, foliis oblongis acumina tis denticulatis cilia tis utrinqnè hirtis, paniculis terminalibus, cor. ovato-caenpanulal. £) Fatr. et caet. car. ign. *Andromeda birta* Willd. enum. suppl. p. 83.
- 3a. LP SECUNDA, foliis subsessilibos linear-lanceolatis acntis nervo subtus albido secundis erectis, floribus aggregatis sessilibus lateralibus axillaribusque albis. £ calta in bort. *Andromeda secunda* Meench. mctb. 457.
33. LP KATAGHERENSIS, glabra, ramis subtriquetris stria tis, foliis brevi-petiolatis coriaceis ovalibus serratis acatis obtuse roucronatis reticulatis subtis ad venas fusco-glandulos-pnnctatis, racemis axillaribus solitariis (simplicibus folio brevioribus, pedicellis tribracteatis, corollâ ovali calycem partithm dnpl excede ad oram contracta, antherae loculis sablonge acuminatis, stigmate truncato. ^ iu Indise or. montibns Neelgerhanis ad Katagbery. An eeriè hujus generis?

•J- Species exclusae.

L. FLORIBUNDA Don. = *Zenobia floribunda*.

L. SFICATA Don. = *Zenobia racemosa*.

XIV. ANDROMEDA Linn. fl. lapp. p. 125. Hall. helv. n. 1017. R. Brown prod. 559 in adnot. D. Don in Edinb. philjouni. 17. p. 157. G. Don gen. sj'st. 3. p. 828.—*Polifolia Buxb. cent. 5. p. 5. t. 55. f. 1.* — *Andromeda?* sp. Linn. gen. et caet. auct. — *Daphne Linn. mss. ex Smith cycl. V. XL*

Calyx 5-partitus segmentis acutis non imbricatis. Cor. globoso-urellata ore contraclo 5-dentato. Stam. 10 incltisa , filam. barbatis, antheris brevibus, loculis 1-aristatis. Stigma truncatum. Capsula 5-locul. 5-valvis loculicido-dehiscens. Placenta 5-loba. Semina elliptica compressa nitida hylo laterali linearis (Don). — Suffrutex in hemisphaeris boreali sparsus glaberrimus. Folia alterna linearis-aut subovali-lanceolata integerrima, margine revoluta, subtus glauco-albida, breviter petiolata. Flores subterminales fere umbellati pedicellati nec ut in icone engl. hot. t. 713 suhsessiles , cliam per maturitatem crecti. Bracteae ovatse. Cor. albae aut rosen3.—Ex etymologit poelica in flor. lapp. explicata noinen Andromedyc hue pertinet.

§. 1. Foliis discoloribus margine revolutis.

1. A. POLIFOLIA (Linn. spec. 564). 5 ^{in tur^ osis} praesertim raor.tanis Enropae borealis et mediae (neinpè à Russiâ ad Galliau et Hiberniam, à Lnpouia ad Helvetiam), et America: borealis (neinpè à Pensylvaniâ ad Labradoriam). Linn. fl. lapp. 161. t. 1. f. 3. OEd. fl. dan. t. 54. Pall. fl. ross. 1. t. 1. Duham. arb. ed. 2. v. 1. p. 183. t. 38. Hayne arzn. gew. 3. t. 12. Palmst. sv. bot. t. 445. Dietr. fl. bor. t. 219. Lond. arb. 1106. f. 88g-8g3. Rhododendron polifolium-Scop. earn. n. 48a. Inter piures in hortis admissas varietatespraccipnac sunt uotanda ne rapè:

- a. *latifolia* (Ait. kew. I. p. 68), foliis la to lanceolatis planinscolis 4-5 lin. latis. — la uligiuosis America: borealis dicitor indigena. A. Canadensis hortnl. A. Americaua hortul. An A. glaocifolia Wender. ind. sem. h. maib. 1827 in app. n. 1? (v. v.c.)[^]
- fc. *media* (Ait. 1. c), foliis lanceolatis margine evidentiū revolutis 3 lin. latis. — In nliginosis et turfosis montanis frequens(v. v. sp.)
- y. *rosmarinifolia*, foliis linearis-blanceolatis marginc aretē revolutis, 2lin. latis. 5 ^m Terra'nova' (Lapyl.), ins. Sitcha (h. ac. Petr.), etc. A. ros-inarinifolia Parsh fl. bor. am. 1. p. 291. Don gen. syst. 3. p. 829. (v. s.)
- ¶ *glaucophytta*, foliis linearibns margine revolntis, floribns breviter pedicellatis. 5 ^m ^{amer.} boreal. Andromeda glaacophylla Link enum. x. p. 394.

§. 2. *Foliis concoloribus margine non revolutis, floribus racemosis.*
***Fruct. ign.* — An sectio propria? An fortè genus diversum?**

2. A.? VEHULOSA , frnticulosa erecta , ramulis petiolisque minatē pubescemibns, foliis glabris petlolatis ellipticis ntrinqaē acentis apice macronatis planis con-coloribas coriaceis utrinquè reticalato-venosis, gemrois sqoammosis, racemis in axillis sopreuiis solitariis folio brevioribus, calycis lobis obtasinsculis, ovario glabro. 3 in Novā CaliforniA legit cl. Donglas! Ex floris structnrā A. polifoliae conformi hie collocata, sed babitns valdē diversns et frnctas ignotas. Bracteae fascse ovatas acntae pedicellis triplo breviores. Cor. ovatse 5-dentatae. Stam. filamenla in fern è barbata. Antberae in clnsae breves dorso ad apicem biaristatas. (v. s. ex herb. hon. soc. horde. Lond.)
3. A.? BRACTEOSA, froticosa erecta, ratnis teretibus, foliis breviter petiolatis planis ovatis ba& obtusis vel subcordatis apice inacronatis minatissimē reticato-venalosis, racemis solitariis ant congestis folio subbrevioribas, bracteis foliaceis oblongo-lanceolatis pedicello longioribns, ovario hispidissimo. 3 ^{*n} Novā California legit cl. Drummond! Cor. et stam. prioris.
- A. *trichoclada*, rainulis petiolis rachibns bracteisqne setis sobgiandniosis pntulis bispidis, foliis janioribas dorso et margine snbbispidis demām glabrat. (v. s. à cl. inv.)
0. *hebeclada*, rainulis petiolis rachibns bracteisqne xnolliter velatino-pabescentibus. (v. s. à cl. inv.)

-I Species nomine tantium mihi notce.

- A. HALMIANA Meerb.
 A. MEMBRANACEA h. Cels.
 A. PILULIFERA Fisch.
 A. PIWNATA Ait. ex Stend.

•|| Species exclusce.

- A. ACUMINATA Ait. = Leucothoe acaminata.
 A. AWASTOMOSANS Linn. = Gaoltheria anastomosans.
 A. AWGUSTIFOLIA Pursb. = Cassandra angastifolia.
 A. ARBOREA Linn. = Oxydendram arboreum.
 A. AXZLLARIS Ait. = Leucothoe axillaris.
 A. BACCATA ^{ang.} := "Vacciniam resinosam.
 A. BRACAMORENSIS H. B. K. Z= Lea cot hoe Bracamorensi».
 A. BRACTEATA CQV. = Gaultheria bracteata.
 A. BRTANTHA Linn. = Briantbus Gmelini;
 A. BUXIFOLIA Sm.==Leacothoe buxifolia.
 A. CALYCULATA lAnu. = Cassandra calyculata.

fio8 D1C0TYL. SE« EXOGENJE,

ANDROMEDA.

- A. CAJIDIDA Arrab. = Gcuheria Candida.
- A. CAPRICIDA Ham. = Pieris ovalifolia.
- A. CASSIWEFOLIA Vent. = Zenobia speciosa.
- A. CATESBEI Walt. r= Leucothoe spialosa.
- A. CEHEA Linn. f. = "Vacciniura cereum.
- A. CHLORANTHA Cham. = Leacothoe chlorantha.
- A. CILIATA Nenw. = Leacothoe cilia la.
- A. CTLIOSA Boj. == Leacothoe Bojeri.
- A. cocxiNEA. Neuw. = Leacothoe coccinea.
- A. CJERULEA Linn. = Phyllocopt taxifolia.
- A. C&RULEA (6) viridifolia Pall. = Phyllocopt Pallasiana.
- A. CORIACEA Ait. = Leacothoe coriacea.
- A. CORIIFOLIA Thunb. == Leacothoe coriifolia.
- A. CRASSZFOLIA Pobl. = Leacothoe crassifolia.
- A. CRISPA Poir. = Cassandra angustifolia.
- A. OUPRESSIFORMIS Wall. = Cassiope fasiigata.
- A. DADOECIA Lin. zzz Dahoecia polifolia.
- A. DROSEROTDES Berg. = Erica glulinosa.
- A. ERICOIDES Pall. = Cassiope ericoides.
- A. ERiPHYLLA Taud. = Leacothoe eriophylla.
- A. EUCATYTOIDES Cham. = Leacothoe cacalyptoides.
- A. FASCICULATE Sw. = Lyonia fascicalata.
- A. FASTIGIATA Wall. = Cassiope fastigiata.
- A. FERRUGINEA Walt. = Lyonia ferrnginea.
- A. FERRUGINEA Willd. = Lyonia rigida
- A. FLORIBUNDA Pursh. zzz Zenobfa floribanda.
- |. FORMOSA. Wall. = Pieris formosa.
- A. FORMOssiMA JJaitr. = Leucolhoe acurainata.
- A. FROTIDOSA Pur.sh. = Lyonia frondosa.
- A. GLODuriFERA hortii. = Lyonia hgustriua.
- A. GLOMERATA CHV. = Gaultbetla anastomosans.
- A. HIRSUTA Arrab. = Gaultheia ierruginea.
- A. HIRTA. Willd. = Leucothoe hirta.
- A. HTPicoinEs Linn. = Cassiope hypnoides.
- A. ILICIFOLIA Pers. = Leacothoe ilicifoliu.
- A. JAMAICERSIS SW. rz Lyonia Jamaicensis.
- A. JAPONIC A Thunb. = Pieris Japonica.
- A. LANCEOLATA Arrab. = Leucolhoe multiflora.
- A. LAKCEOLATA Desf. = ? Leacothoe spinulosa.
- A. LAiEOLATA Don. = Pieris lanceolata.
- A. LEDIFOUA Huinb. = Arctostaphylos polifolia.
- A. HGUSTRINA Mnhl.= Lyonia lignstrina.
- A* LUCIDA Jacq. = Leacothoe acuminata.
- A. LUCIDA Lam. = Leacothoe coriacea.
- A. LYCOPODiDEs Tall. =: Cassiope hypnoides.
- A. JIARCIITATA "Vcill. = Leacothoe coriacea.
- A. MAniANA Linu.= Leucolhoe Mariana.

- A. MARIANA. Jacq. = *Leacothoc coriacea*.
- A. MEKTENSIANA Bong. = *Cassiope Mertensiana*.
- A. MULTIFLORA. Pohl. 5= *Leucothoe niultiflora*.
- A. MYRSINITES Lam. = *Pernettya microphylla*.
- A. MYRTIFOLIA Willd. herb, (an Meerb?) n= *Leucotboe Bracamorensis*.
- A. HERIIFOLIA Cham. =; *Leucothoe neriifolia*.
- A. NITXA Arrab. == *Leucothoe Dahiensis*.
- A. NITIDA Michx. = *Lencothea coriacea*.
- A. KUDIFLORA Michx. = *Lyonia ligustrina*.
- A. NUMMURARIA Cham, zzz *Leucothoe nummularia*.
- A. OCTAHYDRA Sw. = *Menziesia triflora*.
- A. OLEIFOHA Cham. = *Leucothoe olcifolia*.
- A. OVALIFOLIA Wall. = *Pieris ovalifolia*.
- A. OVATA Sol. = *Zenobia speciosa* /2.
- A. PANICULATA Linn. r= *Zenobia racemosa*.
- A. PANICULATA. Willd. z=z *Lyonia ligustrina*.
- A. PARADOLICA "Veill.n: *Lyonia ligustrina*.
- A. risTRix Cham. r= *Leucothoe pistrix*.
- A. popuLZFOLiALam. r=. *Leucolhoe acuminala*.
- A. PROSTRATA Cav. z= *Pernettya prostrata*.
- A. PUBESCENS Poir. = *Lyonia rubiginosa*.
- A. PULCHELLA Cham. = *Leucothoe pulchella*.
- A. ruLCHRA Arrab. = *Gaultheria vennsta*.
- A. PDLCURA Cham. = *Leucothoe pulchra*.
- A. PULVBniEWTA Bartr. = *Zenobia speciosa* /6.
- A. PYRIFOLIA Pers.rr *Lencothea pyrifolia*.
- A. RACEMOSA Lam. = *Lyonia ligustrina*.
- A. RACEMOSA Linn. = *Zenobia racemosa*.
- A. RACEMOSA Walt. = *Lyonia frondosa*.
- A. REDOWSKII Cham. = *Cassiope Redow&kii*.
- A. RETICULJATA Walt. = *Leucothoe acuminate*.
- A. REVOLUTA Spreng. = *Leucolhoe revoluta*.
- A. RHOMBOIDALIS "Veill. = *Leucothoe coriacea*.
- A. RIOIDA Humb. = *Gaultheria rigida*.
- A. RIGIDA Pursh. = *Lyonia rigida*.
- A. RUBIGIWOSA Pers. = *Lyonia rubiginosa*.
- A. RtiPESTRis Forst. = *Gaultheria rnpestris*.
- A. SALICIFOLIA Comm. = *Leucothoe salicifolia*.
- A. SECUWDA Moench. = *Leucotboe? secuuda*.
- A. SERRATA Arrab. = *Leucothoe serrata*.
- A. SERRATA Sm. = *Leucothoe acuminata*.
- A. SERRATIFOLIA h. Cels. = *Leucothoe acuminala*.
- A. SERRULATA Cham. = *Leucothoe serrulata*.
- A. SPECIOSA Michx. = *Zenobia speciosa*.
- A. SPICATA Wats. = *Zenobia racemosa*.
- A. SQUAMULOSA Don. = *Pieris lanceolata*.
- A. STELLERIAKA Pall. = *Cassiope Stelleriana*.
- A. SUBROTDNDA Pohl. = *Leucothoe subrotunda*.

A. TAXIFOLIA Pall. = *Phyllodoce taxifolia*.

A. TETRAGONA Linn. := *Cassiope tetragona*.

A. WALTERI Willd. := *Lencothea spinulosa*.

XV. CASSANDRA D. *Don in Edinb. phil. journ. jul. 1834. G. Don gen. syst.*

3. > 8To non Bigel.— *Lyonia Reichenb. Jl. exc. i. p. 4.14. non itoitt. nee Raf. nee Ell.*— *Diplaria Rafin. in litt. 1831.*— *Chamaedaphne Buxb. act. Petr. 1. p. 241. t. S.f. 1. Mocnch meek. |5>j.*— *Banniannia DC. hort. Gen. 1819 non not. VI.*— *Andromeda Gartn. fr. l.p. 304. £.63. non Don.*— *Andromeda esp. Linn.*

Calyx 5-partitus basi bracteatus. Cor. ovato-oblonga ore contraclata 5-dentata, rariis petalis plurimis discretis polypetala! Stam. 10 disco hypogyno 5-tuberculato inserts, inclusa, antheris bilobis, loculis acuminatis exaristatis. Stylus filiformis. Capsula globoso-depressa, epicarpio ad maturitatem 5-valvi, valvis ante sepala sitis longitudinaliter dehiscentibus, fovea carpella 5 cartilaginea, bivalvia, extus dehiscentia, ante petala sita et axi centrali basi adnata. Semina 00 angustilata. — **Suftrutices sempervirentes boreales. Folia alterna breviter petiolata oblonga subcoriacea utrinque (subtiis praesertim) lepidota. Pedicelli axillares breves i-flori secundi. Flores nulantes albi.**

1. C. CAXYCALATA (G. et D. *Don 11. cc.*), foliis ellipitico-oblongis obtusis planis, bracteis ovatis calyce triplo brevioribus, oal. lobis vix acutis. ^ in uliginosis et paludosis montanis partiam borealim Americas, Europae et Asiae. Andromeda calycalata angasiifolia Wahlenb. II. lapp. p. 106. non Ait. *Lyonia calycalata Reichenb. 1. c. Andromeda caiyculata Linn. spec. 566. Pall. fl. ross. a. p. 53. t. 71. f. 1. Lodd. bot. cab. t. 86a. 530 et 1/64. Sims bot. mag. t. 1286. Duham. arb. ed. a. v. 1. p. 189. t. 4¹-var. a et b. Gaertn. 1. c. Nutt. gen. am. 1. p. 264 descr. fr. opt. Henk. in flora 1819. p. 66. Load. arb. TIO8. f. 856. Cambasdapne calyculata Mocach meth. 45^. Variatnana et i-3-pedalis; foliis integrerrimas ant subserratis, plus minus soblius rubigiuQsis, latioribus et angustioribus; ramulis pubescentibasaatglabris; corollis gamopetalis aut irregulariter polypetalis ovato-oblongis aut ventricosis (v. v. c. et s. sp.)*

a. C. ANGUSTIFOLIA (*Don 1. c.*), foliis lineari-lanceolatis acutis margine undulato-crispis subrevolutis, bracteis acutis caiyce quintaplo brevioribus, cal. lobis acuminatis. ^ in paludibus apticis Carolina; et Georgia. *Andromeda angustifolia Pursb il. bor. am. 1. p. 391. Andromeda calyculata (6 angustifolia Ait. h. kew. 2. p. 70. Andromeda crispa Desf. h. Paris. Poir. suppl. 1. p. 356. Link enni. 1. p. 3Q4. Cassandra angustifolia Loud. arb. 1108. f. 897. (v. v. c.) ft. anomala, foliis linear-lanceolatis, floribus nunc 5-petalis, nunc gamopetalis irregulariter bilabiatis 4-5-andris. — Andr. calyculata anomala Vent. b. Malm. n. So. in adn. 2a.*

XVI. CASSIOPE D. *Don in Edinb. phil. journ. n. 17. p. 15; O. Don gen. syst. 3. p. 829. Lindl. nat. sjerst. 721.*— *Andromedae 8p. linn. Patw.*

Calyx 5-partitus persistens basi nudus. Corolla campanulata 5-loba. Stam. 10 inclusa, filam. glabris, antheris brevibus, loculis tumidis apice longe apiculatis. Stylus basi crassus conicus. Stigma obtusum. Capsula 5-locui. 5-valv., valvis apice bib'dis medio sepliferis. Placenta 5-loba. Semina oblonga nitida lucida. — **Suftrutices boreales humillimii glabri cricoidei sempervirentes. Folia sparsa conferta saipiis imbricata. Fiores solitarii, pedicellati, lalcales aut terminales, rosei, nubantes, interdiu 4-meri 8-andri.**

* *Foliis erectis quadrifariam imbricatis, pedicellis lateralibus-*

1. C. LYCOPODIOIDES (D. et G. *Don 11. cc.*), foliis quadrifariam imbricatis ovatis adpressis, pedicellis lateralibus, corollis campanulatis 5-fidis. 3 in declivibus montium circa marc Ocbotenbc, in Kaiut&chatka et ins. Beering (Stell. Pall.),

- in ins Unalaschka (Cham'). *Andromeda lycopodioides* Pall fl. ross 55. t. 72. f. 1. Hook.! fl. bor. am. *Erica lycopodioides* Waitz et Stend. — Guiel fl. sib 4. p. i3o t 57. f. 1. *Caespitosa diiTusa* *repent**, larais elongalis. C01. alba. Calyx rubens. (v. s.)
2. *C TETRAGONA* (D et G. Don 11. cc), foliis oppositis quadufanam imbricatis ovato-tqnnetris obtusis ninticis dorso i-sulcatis mioutissimè ciliatis, pedicellis axillaibus glabns J ad rupes montanas Lapponiae, Gioenlandiae, Labiodanae, ins Saucti-Lauientii, sinus Kotzebue, Canadae Loud. arb. 1107 *^v 895. *Andiomeda tetragonon* Linn sp. 563. fl. lapp. 16b. t. 1. f. 4 OEd fl dan. t. 1 oJo. Pall. fl. ross t. 73 f. 4. Grah new. Edmb phil journ. i83a juu. Hook! bot. mag t 3x8x. Wahlemb 11 lapp 11 200 Flores albi, variant 4-5-fidi, 8-10-andu *Folia* none glabemna, nunc niünutissiüne pubentia (v. s.)
3. *C MERTENSIAMA* (D. et G. Don 11. cc), folns oppositis quadufanam imbricatis oblongis subtnquetris obtusis gldbiis, pedicellis latcialibus pubescentibus. Jin insula Sitcha detexit cl. Bongard! *Andiomeda Meitensiana* Bong voy. Sitch n. 98. Caules adscendentes imá basi subradicantes. Ramuh tetragoni glabri. Flores albi 5-fidi. (v. s. comm. ab hon. Acad. imp Petrop.)
4. *C FASTIGIAIA* (D et G. Don 11. cc), folns oppositis quadifariaiu imbiicatis subtugonib dorso convexis et i-*ulcatis margine scauosis seuato-cilialis apice junioribus calycibnsquc mucronato-aristatis, pedicellis axillanbus floudis lanatis, denium glabuusculis. & in Himalaya ad Gossaiu-1 ban, Katnaon(Wall.'), in latau Chinensi ^Spieng). *Andiomeda fastigiala* Wall. act. soc. asiat. i3. p 304. pi. rat. J. p 5i. t. 284 et in Spreng. neu. entd. 2 p 258. Roy 1. ill. p. 260 t 63 f 1. Andi. cupiessiformis "Wall, ims D Don mem soc. wem. 3. p< 407 Cor. albac 5-lobae Caules adscendentes basi subradicantes Flores nantes et fructus erect! (Royl) Dicitur *Heath* a peregrinatonbus Anglo-Indicis. (v. s. comm. ab hon. Cur angl. Ind 01.)
5. *C ERICOIDES* (D. et G. Don 11. cc), foliis oppositis quadnfaiiam imbucatis iunluis doiso convexis et x-stilcatis maigine et ipicc longe setoso-cilfatl, pedicellis lateralibus glahns. \$ in rupibns fiibirix adflnm. Bjela el circà Ochotz, ID jugo Dahuiico supra Nerstchae foynes (Pallas) et in alpe Kawoktal (Tnrcz.'), ad htroia mans glacialis (Stev.¹) *Andiomeda eiicoidcs* Pall. fl. loss p. 5G. t. 73. f. 3. *Erica asiatica* YVailz et Mend. Corollas albae globoso-cainpanalatao 4-dentata? 8-andia>. (v. s.)
6. *C RUDOWSKH* (G. Don gen syst. 8. p. 820), folns quadufanam imbricatis sqaamifbimibus dorso convexis esulcatis lucidis lae'vibus ciliato-fluibriatis, pedicellis axillaribus glabiis Jin Sibiu onentali. *Andiomeda Redowskii* Cham, et Sch. in linnaea x. p. 517. Caules procumbentes. Rami viigati exacte tetragoni. Cor. campanulatJB obtusae 4-fidae 8-andrae.
- * *Foliis erectis inordinate imbricatis, pedicellis terminahbus.*
7. *C HYPNOIDES* (D. et G. Don 11. cc. gen syst f i3fi), foliis inordinate conferti-i aceroMS planiusculis, pedicellis lei minalibus, corolhs globoso-campanulatis piofunde 5-fidis J ad mpes montium Sibiuaj, Lapponiae, Norvegijj, Nordlandia>, Islandia; Gioenlandize et in montibus albis Ameiiae occid valdoboieahs(Boott.). Loud arb. 1107 f 894. *Andiomeda hypnoides* Linn. spec. W\$. fl lapp. i65. t 1. f. 3. OEd. fl lapp t 10 Pall. fl. loss. p. 55 t. 73. f. 2. Hook. bot. mag. t. 29^6. Wahleub fl. lapp. n. 201. Grah. in Edinb. phil. journ. 1829 jul Fiotienlus diffnso proembens musciforrais Calyx ruber. Cor. alba seu cinea. Pedicelli mfià medium i-bracteolati (v. s.)
- * * * *Foliis quadrifariam patulis, pedicellis terminahbus.*
8. *C STEILERIANA*, foliis patnlis apasis oblongis glabiis eciliatis snbserrulatis obtut.iDscos pedicellis bre\issimis terminalibus. J in insula Sitcha (li -Acad. Petr'), in 01a boreali-occid America; et in montibus scopulosis (Puisb). *Andromeda Stellenana* Pall. 11. loss. p. 58 t. 74 f. 2 *Menziesia enipeliifoimij»* Pnrsh fl. bor. am. x. p z65 non Sm. Cor. ^-iidx 8-andrae pallidè mbentes. Capsula 4 valvis loculicido-dehiscens valvis medio septiferis, stylos conicus ct

antherae bifid ae ad Cassiope genas hanc spec, redo cunt! (v. s. comm, abhon.
A cad. imp. Petr.)

Tribus III. *ERICEuE* (i) *D.etG. Don gen. syst. 3. p. 843. Lindl.*
nat. syst. cd. 2. p. 221. non ed. 1. nee R. Br.

Flores tetrameri, rarissimè pentamen. Corolla marcescens. Stamina hypogyna. Antberae ante anthesin saepius connatae. Ovariuni liberum i-4-rariùs 5-v. 8-locuIare, loculis 1-00-ovulatis. Fruclus capsularis, loculicidè v. rariùs seplicidè valvatim dehiscens v. in Salaxideis nonnunquam subindehiscens. — Frutices seu suffruticea sempervirentes. Gemma? esquammosse.

Subtribus I. *EVEKICEM,*

Ovarium 4-rariùs 5-v. 8-loculare , loculis pluriovulatis.

XVII. MACNABIA. — Nabca *Lekm.ind. sem. hort. Hamb. 1831. Klotzsch*
in linnced %p. 666.

Calyx 4-partitus, sepalis cartilagineis per paria oppositis , 1 exteriores carinatis, 2 interioribus plamusculis. Corolla calyce multò miuor, profundè /±-ida. Stamina 8 libera. Anthers tenucs, bipartite, muticae, rimà lon^itudinali dehiscentes. Ovariuni 4-loculare, loculis pluriovulatis. Stylus uncinatus, stigma obtusum tenue. Capsula 4-angula, /[-]o~cularis, loculicidè quadri-valvis. Semina compressa , membranaceo-alata. — Frutex Capensis, cricoideus, glaber, rigidus. Folia 3-natim verticillata. Flores ad apices ramulorum brevissimorum seciis ramos dispositi. Bractec 3 ovata?, appressae, calyce breviores. — Genus 11 o ribus primo intuitu ab Eriça yalde diver sum, sed omnes ferè cbaracteres in unā alterāve specie generis hujus polymorphi observantur. Semina omnino sectionis Platyspono , etiam calyx vix nisi propotione à sectione Lamproti differt. Antherai in Chromostegii aliisque Ericis veris potiis rimà longitudinali quam poro dehiscunt. — Women cl. Manabio ouratori indefesso horti Edinburgensis Ericarum cultivatori diligentissimo dicatum, paullulum mutavi, dum particula Mac nequam separabilis sit.

1. M. MONTANA. (Lehm.! 1. c. sub Nabea), in montibas colonise Capensis prope Capetown (Masson, Ecklon et Zeyher). — Calyces compressi 6-7 lin. longi. Cor. vix linearis. (v. s. sp.)

XVIII. CALLUNA *Salisb. trans, soc. linn. Land, <v. 6. p. 3i7-* —^{Ericae «P- ^nn-}
et auct. plur.

Calyx 4-partitus, sepalis per paria oppositis scariosis coloratis. Co-

(i) Tribus a cl. et amiciss. G. Bentham omnino elaborata et humanissimè communicata. — Cl. auctor me mouet in litteris 1° species hortenses ex liberalitate cl. fratrum Loddiges in Hackney, cl. Rollison in Tooting et cl. Lee in Hammersmith hortulanorum anglie locupletissimorum, nec non cl. prof. Graham qui egregie horum Edinensem curat, præcipue descriptas fuisse. 2° Ericarum divisiones et descriptiones imprimis stabilitas esse ex laboribus cl. doct. Klotzsch qui (annuentibus Herbarii regii Borussici administratoribus) integrum Ericarum exsiccatarum collectionem ad studium ei commodavit.

rolla campanulata, sub-4-partita, calyce brevior. Stamina 8 libera. Filamenta complanata. Antherae aristata; Stylus rectus. Stigma capita to-4-lobum. Ovarium 4-loculare, loculis biovnlati, ovulis ab apice columelke pendulis. Capsula 4-locularis, septicidè 4-valvis. Semina ovoidea exalata. — Fruticulus Europaeus ericoideus. Folia opposita quadrifariam imbricata. Flores axillares vel ramulos brevissimos axillares terminantes. Bractae sex, calyci appressae, per paria oppositae, exteriore 4 foliaceae, interiores u subscariosae.

- i. C. VUT.GARIS (Salisb! 1. c), in Europâ occidentali et boreal! vulgaris, etiam ia Islandia el in Terrâ-Nova Americas borealis. Erica vnlgaris Liun.! spec, p. 5oi. Calluna Erica DC! fl. fr. 3. p. 68o. Folia vix lin. longa. Sepala ova-ta, bracteas et corollas duplo soperantia. rosea v. alba. Capsala depre&sa, pilosa. 'Variat foliis sapiòs glubris v. nonnuuqam undiqâe dense birsatis. (v. s. c. et sp.)

XIX. PENTAPERAS Klotzsch in linnced v. 12. />. 497. — Erica sp. Guss.

Calyx 5-partitus, sepalis oequalibus. Corolla ova la, suburceolata, limbo 5-fido revoluto. Stamina 10, libera. Anlbcrae inclusae, muticae, laterales. Ovarium 5-loculare, loculis pluriovulatis. Stylus rectus. Stigma capitatum. Capsula 5-locularis, loculicidè 5-valvis. Semina.... — Fruticulus Siculus ericoideus. Folia 4-natim verticillata. Flores terminales 4-ni pedicellati. Bractese 3 à calyce remota. — Genus nonnisi numero partium ab Erica (sect. Trigemma v. Pachysa) distinctum.

1. P. SXCULA (Klotzsch! 1. c). —in rupibus calcareis maritimis Siciliae occiden-lalis Gnssone,Tineo. Eiica Sicala Guss! prod. fl. sic. 1. p. 463. Folia crassius-cola obtusa tenaite viscidio-paberula 3-4-linearia. Folia bracteiforoia plura ad basin pediuelloram. Co roll re fere 4 lin. longae , oti pedicelli bracteae et se-pala pallidè carnea viscidae. (v. s. c. et sp.)

XX. ERICA Linn. gen. pi, p. 192. Salisb. in trans, soc. linn. Lond. i>. 6. p. 316. et auct. (excl. sp. paucis.) — Erica Klotzsch in linnceâ ij. p. 359.—Erica, Gypso-callis, Blaeriae sp., Pachysa, Ceiamia, Desmia, Etirylepis, Eorystegia, Lo-phandra , Lamprotis, Callista, Euryloma , Chona , Syriugodea , Dasyantbe^ , Ectasis, Eriodesmia et Octopera D. et G. Don.—Microtrema Klotzsch in linnceâ 12. p- 499*

Calyx sequalis v. imbricatus , quadripartitus, v. rariis quadrifidus. Corolla hypogyna tubulosa , hypocrateri-morpha, urceolata , campa-nulata V. globosa , limbo" brevi rariis maximo quadrifido, connivente, erecto/patente v. revoluto. Stamina 8, rariu6-7, disco hypogyno glanduloso' inserta. Filamenta libera rarissimè submonadelpha. Antherae inclusae v. exsertae , terminales , ad insertionem filamenti appendicibus duabus 'aristatSB v. cristata3, vel omnino muticae, goro orbiculari v. oblongo v. rima longitudinali dehiscentes. Ovarium quadriloculare rariis (inE. concinnâ nee in E. Bergianâ) 8-loculare, loculis 1-00 ovula-tis. Stylus filiformis. Stigma obtusum, capitatum_f v. peltato-dilatatum, saepe breviter 4-lobum. Capsula 4-i'ariis 8-locularis, loculicidè quadri-valvis, dessepimentis demiiin fissis partim valvulis, partini columellae adhaerentibus. Semina placantis axilibus affixa, ovoidea v. compressa, testa adhaerente reticulata laeviuscula v. nitida , rariis in membranam tenuem expansa. — Frutices Europci v. maximâ parte Austro-Afri-canri iduli, ramosissimi; rariis flaccidi. Folia saepissime linearia, acerosa marginibus omnino revolutis et sub folio cohscrenibus pa-inara inferiorem veram omnino occultautibus, nonimnquam l?tiora

paginâ inferiore plus miniisve evidente, rariis omnino plana, verticil-fata v. rariis alterna v. sparsa. Flores in pedicellis unifloris axillares, v. terminales, solitarii, verticillati, capitati, v. umbellati, plerumquâ cernui. Bractae in pedicel lo saepissime tres, i oppositis, terliâ infra* sitâ rariis deficiente. — Genus vastum pulcherrimum, polymorphum, sed characteribus certis nequaquam in genera pauca divideendum. Subgenera et secliones sequentes ex antherarum et corolla; forma et inflorescentia, rariis ex calyce v. habitu foliorum, separata, plurima jamâ Saisburio indicata, v. à Klotzschio limitata, naturalia videntur, suepsimè tamen intermediis plurimis juncta sunt.

Subgenus I. ECTASIS. Anthers terminales.

A. "Parviflorce. Sect. i-vn. spec. T-38.

B. Grandiflorce. Sect. vin-x. spec. 39-49.

Subgenus II. SYRINGODEA. Antherae laterales. Corolla tubulosa ultrâ 51ii. longa, limbo erecto v. recurvo-patente. Sect, xi-xvm.spec. 50-117.

Subgenus III. STELLANTHE. Anthers laterales. Corolla hypocrateriformpha, limbo piano stellato-patente. Sect, xix-xxvr. spec. 118-1S1.

Subgenus IV. EUERICA. Anthers laterales. Corolla urceolata, ovata, campanulas, v. globosa, limbo erecto v. recurvo-patente. Sect, xxvn-XLIX. spec. i8a-4i5.

Sabgenus I. ECTASIS seu Acrostemones. — Macrostemonain sp. *Dryand.* — Ectasis, *Gypsocallidis* sp., *Eriodesmia*, *Desinia*, aliorumque sp. *Don.* — Acrostemones *Klotzsch excl. trlb. Reflexarum*,

-Corolla varia. Antherae terrainales (nempè loculis omnino adnatis, infernè saepius attenuatis et cum filamento subcontinuis), exsertae v. rariis iclusae, maticic v. rariis aristis in filamento decurrentibas appendiculata; — Species omnes, exceptâ *E. carneâ*, *Capenses*. — Antherarum structura in plerisque speciebus genas distictiissimum indicare videtur. Forma? tameu numerosaeambiguae occurrunt, tarn in *Didymantberâ* et *Chromostegia* sub Ectasi ennieratis, quam in *Hermi*, *Ceramiâ*, *Earystomate*, ct *Polycodone* sectionibus Enericae.

Seel. 1. CALLOCODON[^] — *Gypsocallidis* sp. *Don*, — Pudibundae *Klotzsch*.

Inflorescentia lateralis. Corolla ovato-campanalata. Antherae breves bipartite maticae.

i. E. CARNEA (Linn.! spec. p. 504), glabra, foiiis 4-nis linearibus rigidis, floribus breviter pedicellatis, bracteis parvis remotis, sepali lanceolatis carinatis aentis, corollâ glabrat calycem parum excedente limbo brevi erecto-patente, antheris oblongis exsertis, ovario glabro.—in Europae mediae alpibus ab Helvetiâ usqae ad Bohemiâ, Silesiam et Austriam. *E. carnea* Jacq. fl. austr. - !• p. ai. t. 3r. Lodd. bot. cab. t. i45a. E: berbacea Linn.! spec. p. 50i. bot. ^mag. t. 11. Wendl. eric. fasc. '9. ic. *E. parpnascens* Linn. spec. p. 503. ^{e*} parte, teste Salisb. *E. saxatilis* Salisb.! in trans, soc. Linn. Lond. v. 6. p. 343. *Gypsocallis carneâ* D. et G. *Don* gen. syst. gard. v. 3. p. 801. Flores secus rainos socundi, 2-2 | lin. longi. Cor. carneâ. (v. s. c. et sp.)

£. *occidentalis*, floribus parum minoribns, corollis apice sublatioribns, antheris brevius exsertis — in Hiberniae uiontosis Cunnemara, in agro Medoecori piopè Uurdigalam et in Lusitania, nee in regione Mediterranea! E^{Bot - ma g-} t. 471. *E. lugubris* Salisb.! 1. c. p. 343. *Gypsocallis Mediterranea* D. et G. *Don* I. c. p. 801. Varietas ab omnibus auctoribas uti species distincta, inihi characteribus valde iucestisjuncta videtur et intermediis numerosus cum *E. carnea* conjancta. (v. s. c. et sp.)

Sect. if. DESMIA Don. — Confertoe Klotzsch.

- Inflorescentia terminalis, capitata v. umbellata Bracteae subsepaliformes, laxai v. remota. Sepala lanceolata, saepius viscosa, nee sciaio<a, nee Linata. Corolla urceolata v. globosa, calyce lougioi, glabia. Antherae exsertae rauus mclusae mutirae. — Fiuticuli prostiati v. subscandentes glaberrimi Folia terna. — Huic sectioni species affines Euericarum in Ceiamia petentes
- a. E. HUMiMs, tenella, ramosissima, foliis patentibus linearibus tenuibus convexis obtusis v. breviter mucronatis, flonbus capilatis, sepalis lauceolatis obtusiusculis, corolla ovata inflata suburceolata, anthers exsertis, ovalio glabro — in colonia Capensi (Masson, Diege, exspetuu. cum E. tenui connixlis). — Sequentibus multo tenuior Cor i ^ lin. (v. s. sp. in heib. Hooker et Banks.)
 3. E. CONFERTA. (Andr. heath, t 59 (x)), ramis ligidis, foliis patentibus linean-elongatis rigidis apice teretibus anstatis, flonbus dense capitatis, seplis brc-ibus lanceolatis acutis carinatis, corollâ snbglobosâ, fauce contracia, limbo brevi, antheris exsertis, ovano glabro — in colonia Capensi (Masson, Niven). E. couferta Lodd. bot. cab t 1315 Desmia conferta D. et G. Don 1 c. p. 807. Foba 6-10 lin floralia capitula superantia. Flores in capitulo s*pius 10-20, singuli 1 I lin, longi, albi. (v. s. c. et sp.)
 4. E poriFOLTA (Salisb.¹ mss.), rimis flexuosis tenuibus subscendentibus, foliis patentibus linean-elongatis lanceolatisve plano-convexis anstatis, flonbus breviter pedirellatis, sepalis lato-lanceolatis acutis subcainalis, coiollis urceolato-campanulatis limbo brevi suberecto, antheris inclnsis v. vix exsertis, ovario glabro. — in montibus prov. Swellendam (Masson, Miller, Niven) E. cuspidata Klotzsch! in herb reg. Berol Desmia polifoha D. et G. Don 1. c. p 807 — Affinis E. xquah sed multò tenuior. Folia ut m ill A bine indè ad biacfas reducta Cor. 2-2 | lin., faoce non contractâ. (v. s. sp.)
 5. E EQUALIS, ramis flexuosis, foliis patentibus linea-elongatis apice teretibus anstatis, flonbs brevitei pedicellatis, sepalis lanceolatis acutis carinatis, corolla calyce partim longiore nrceolato-campanulatâ, limbo patente, antheris exsertis, ovauo glabro. — in montibus prov. Swellendam (Miller, Niven, Masson). Desmia aequalis D. et G. Don 1 c p 807 Habitu vaiabihs nonnunquam snbscandens. Folia E. confertae Rami floriferi saepe elongati pedunculiformes foliis parvis bracteiformibns; ran us usque ad umbel lam folia ti. C01. 2 lin. longa (v. s. sp.)
 6. h. OBTDATA (Klotzsch ' in heib. reg. Beiol), divaricato-ramosissim.i, foliis patentibus breviter petiolatis hneari-convexis elongatis ngidis obtusis ciassiusculis nitidis margine revolutis, flonbus subsessilibus capitatis, sepalis lanceolatis obtusis corollâ dimidio brevioribns, corollâ snbglobosâ glabratâ viscosâ, faucc contraciâ, limbo brevi, antberis vix exsertis, ovauo glabro — in montibus Gnadenhal (Drege), in colonia (Bergins). — Hinc E petiolatae, bine E aequali aff Ramuh tieuxosi. Cor. vix 1 ; lin (v. s. sp.)
 - n E PETiOLiR[^] (Thunb. diss. n. 7. t. 6), divancate-ramosissira, folis iongè petiolatis patentibus lato-lineanbus lanceolatisve obtusis crassis subtus sulcatis apertisve floribus subternis, pedicellis tomentosis, sepalis ovato-lanceolatis coiollam quantibus, corollis urceolatis subtetragonis, limbo bvevi patente, antberis snbxsertis, ovario glabio. — in prov. austro-occidentalibus, „ nionte Tabular! communis. E. petiolata Wendl enc fasc 27 ic ? Andr heath, t. ,i6. Lodd bot. cab t n50. E petiolans Salisb ' 1- c p. 334 Emyleps petiolata G. Don 1 c. p. 808. Petioh erecti appressi fere 2 lin. longi, pagina inferiorc SJB-p, us apeita. Cor. a-2 | lin (v. s. c. et sp.)

Sectio in. POLYDESMIA. — Stellares Klotzsch.

Inflorescentia terminalis capitata. Braclea2 sepaUformes approximatae. Sepala

(i) Edit in-8°. 6 torn. 1804. In editione priori majori, numeri diversi sunt.

sicca, rarlùfl viscosa, angusta. Corolla giabra, ovato-oblonga v. mreolata. Antherae mntiae v. aristis decurrentibns minutè appendiculata exseitae v. rariu> inclnsae. Folia 4-na, v teina.

8. E. STETLATA (Lodd ' bot. cab t. 8g3) , lamuhs glabrincahs, foil is 4-ni<- erecto-palentibas iinbritatis Iineaiibus durso sulcatis longe ciliato-birtis, capitulois densis cernuis, sepalis hnean-sabulatis birtis , corollis anguste nrceolatis calycem vix saperantibus , anthens subexsertU monte aiistatis, ovarlo glabto, stylo exerto, stiginate obtnso—in coloma. Capensi? E. solandroides Andr. heath, t. ago. E. incurva Wendl' eric. fasc. 11 IC. non Thanb. nee Andr E. stellaris Nois. Ectasis stell.ms G. Don 1 c. p. 827. Hurailis. Raoii dense foliati. Cor a lin Stylus primnm vix exsertas, denium corollà dimidio fere longior. (v. s. c)

g E. SETIFERA (Klotzsch^f in herb Berol), fohis 4-nia inenrvo-erectis snbpatentibasve hnearibas mucroaulatis dorso sulcatis ramuhsque viscoso pubeiulis, capitulis densis (?), sepalis linear-subulatis viscido-puberulis, corollà angustc urceojata. calycom vix superante, antbens exsertis, aristis ID in nt is decurrentibus, ova 110 glabro, stylo exerto.—in Cederbergen(Drege). Vix ab L. stellata diversa videtui. (v s. sp. specim pene deflorat, in hcib teg. Berol)

10 E. BARBICERA (Klotzsch' m herb Berol), ramulls glabrincahs viscosis, foliis 4-nis erctis v. squarroso-patentibus lioeau-cann^oitis vi&cidulis nitidis glabns v lunge cilia to hutis, capitulis densis cernuis, sepalis Iincau-subulatis nitidis glabris v. longe riliatis, coiolla angusle nrccolata calycom vix supeian- te, antheris exsertis uiuticls, ovaiio glabio, stylo exerto —in monte calcaeо intei Paailberg et Capetown (Drege n. 35J3). Folia in eodein tamо afia pilis numerosis bispidia, alia glabernua. In liac bimsque precedentibus, qoae omnes forsan unius speciei vallietates, bractea extenoi ascpe maxima oblonga. (v. s. sp)

11. E BRUNLJEFOLIA (Salisb ! 1. c. p. 340* ramulis pubernlis, folns 4-nis in- cnrvo-erectis laxe inibncatis linearbos obtaiis cihatis, capitolis densis cernuis, sepalis linearbus snbspathulatis cihatis, Lorollis nrceolatis glabris talycem vix excedenlibns, anlberis muticis v. minnte appendiculatis, ovano glabio, stylo longe exerto —in coloniA Capensi, (Masson, Roxburgh) Biania binniae-folia G Don 1 c p. 805. Folia siccitate plerumque nigrescunt. C01. 1 | hn, Hcec etiam species praecedentibas simihs est, sed &epalⁱs latoribus magis ciliatis et stylo longiore (3 lin. lougo) sat d^utincta videtnr. Stam. saepissime 8, lanus 6-7. (v. s. sp)

12. L STTLARIS (Spieng.¹ &y st. a p. 198), ramis pnbescentibus, folhs 4-nis rarius 5-nis patentissiuns incnrvis oblongis brevibus obtusis doiso sulcatis viscoso-hirtellis, capitulis densis, sepalis lanceolatis acuminatis vscosis, corolla ovato-lanceolata calycc diradio longiore glabta, aniheus exseitis innticis , ovano hispido, stylo demum longe exerto.— ill colomā Capensi? E coupes tit Lodd. bot cab L 1743. nou Wendl l'ol vix a lin longa Cor. fei< h.. Lehmanni. (v. s c in herb leg. Berol)

13. E. TURVITALIS (Sahsb. 1. c p. 34a), ramnlis villosis, foliis 3-niš patentibns ovatis snbtiis incauis inargine revolutis suprà tuberculo-hispidis, capitulis densis ovatis foliis Miffnlts, bracteis sepalisqne minimis oblongis margine glandnlosrs, corollà nrceolata subglabrà, antbvns subexscrts muticis, ovutio bispido.—in coloma Capensi (Mnndt). Plaeila tuimalis G. Don 1 c p 805. Folia a lin supra demuui Incida. Capitula 4 hn. diametrio Calyx vix conspicuus.Coi. a | ha. longa. (v. s sp comm. à cl. Hooker.)

Sect. iv. CHROMOSTEGIA.—Involucratae Klotzsch.

Inflorescentia terrinalis capltata, foliis supremis bracteis sepalisque cuneaua obovative (aiulagieo-coloratis ciliatis plumosise. Corolla ovato-nrceolata v. campannlata calyce subbievioi Anthera? exseitae v. submclnsa? basi ciliato-aus- latae, loliaqnata. Specjes I'seudeieiuns affines.

i., E. *sifiz*.¹⁹ (KJofzsch! in heib. leg Berol.), procumbens, folia erecto-adpiessUoblougo-lineaiibus ciliato-biapidis, foliis floralibus btactelsqae laxiusculij sepaloides, sepalis oblongo-cuneatis corollâ ox.ito-subnrcolata profunde 4-fida extusapice birtâ, antbeis mclusis, ovario pubescente, stylo longe c\erto —in Cedeibergen (Diege pi. exs n. 2966). Kami elongati flagellifoimes, lamuhs erectib. Cor. vix 14 lm. Stylos 3 lin. Jougus. Capaula hemi&phaeuca. (v. s. sp)

j 5 E. *INVOLCRATA* (Klotzsch! in herb. reg. Beiol), procnnibens (?), foliis m-cuivo-patentibus ovali-oblongis obtnsis bicvibus rigidis doiso sulcatis et ciliato-bispidis, floralibus numerosis biacteis sepalisque lato-obo\atjs cihatis ilores breviores dense involucrantibus . antheris exscrtis, ovano pnbesceite, stylo breviter exserto.— in raoute Winterboeck prope Tulbdgh (tcklon et Zeybc). Habitus Eremiae Capitula involucro cyathiforroi coloialo 5 lin. diametrio inclu&j. (v. a. sp. in beib reg. Beiol)

Sect. v. *ERIODESMIA* Don. — *Capitatae Klotzsch.*

Inflorescentia teiminahs, floiibns 1-4-nis, capita I isw* Calyx dense wlosolanatus Corolla nrceolata pilosa Antheiae muticae, plei unique exseil.u. Ovatum villosnm lolia terna, ranussubqiiatema.

16. E. *LANATA* (Andr. heath, t. iar nonWendl.) foliis 3-4-uis oblongo-linearibus lanceolatisve margine revolutis pilosis, floiibus laxiuscule capitatis, hracteis approxiraatis, &epalis ovatis oblongis spatbulatisve margine levoluto pilosisslrais coiollam urteolato-globosam extus pilosam arquantibus, antheris exsertis.—in tenâ Onteniqua prov. Geoige (Masson, Niven, Muudt). E. flaccida Link! enum hort. Beiol. p. 367. *Gypsocallis lanata* G. Don 1. c. p. 801. Folia nonnunquam ultâ lineam lata, suprà wridia, subtus cane¢ia. Capitalum semipoll. diametro, 4-6 florum. Bractea? et sepala alba. Cor. alba. (v. s.c. et sp.)

17. E. *VILLOSA* (Pink, iuant. p. 69. t. 347. f 9.), foliis patentibus lineaibus 11-gidiusculis hispidis, floribns pedicellatis teinis , biacleu. remotis, sepalis latolanceolatis extus hispidis coiolla paium vel snbdimidio bievioiibus, corollis ovato-niceolatis limbo subpatente, antbeis exseilis —in niontibns Klymivier prov. Swellendam (Ecklon et Zeyher). E. villosa Andr heath t. 200. E canescens Dryand' in Ait. hoit. kew. ed 2. v. a p. 407 E. euocephala Andi. heath, t 61.? Lodd hot. cab. t. 1370? E. pilosa Lodd.! hot. cab. t. 606. G. eiicephala G. Don I.e. p. 798. *Gypsocallis pilosa* ejusd. 1 c. p. 801 et I¹. villosa ejusd. 1. c p 802 Specim. culta saepe ah E. biumadi vix tlistingnenda et mtermediis plnnmis (E. pas^erina. E. gnaphalodis, etc. Hoi ml) connexa, sylvestna tarn fcpeloram forma quam pilis rigidis satis diversa videntur. (v. s. c. et sp.)

18 E *DRUNIADES* (Linn ! spec p 504), folns electis patentibns sqarriosisve pilosis lan<dis>ve, floiibus subtcims pedicellaris, biacleis plus minus\ie iemotij>, sepalis ovatis oblongis>ve extus lanatis corolla pa rum v. subdiuidio brevioribns, corolla ovato-niceolata pilosula, limbo subpatente, antheis exsertis. —in hnnidis arenows collibnsqne piov. anstio-occidentalium Afcae Capensis. Rami graciles, lamosiswini. Moies fere fc. capitals sed angustiores f lana Divea v. pallide inbescente, nee Miescente. "Variolates dua; sequentes interraedii n-imeiosis connexae sunt. Sepaloium forma el longitudo valde vabilis Tolia inteidûm ad basin rainoium squauosa apice appressa.

a. *squarrosa*, fohis omnibus squanosis plernmque ngide hispidulis E. vellenflora Salisb.! 1. c. p. 333. E. capitala Thnnb. diss. n. i5 ex Saliab. ^{no}n Linn. E. biumiale& Andr. heath, t. 6. Lodd ' hot. cab. t. i365. Ectasis. vellenflora G Don 1. c. p. 827. (v. s. c. et sp)

D. lanata, folns snperionbus omnibuive appressispleiumqne dense lanatis E. caibasina Salisb.¹ 1. c. p. 333. h binniades Wendl eiic. fasc. 16. ic. E. lasiocephala et E. euanha Klotzsch ' in heib. leg. Beiol. Ectasis brui/iades G Don 1. c. p. 826. An hoc etiam potius quam ad E villosam

syn. E. eriocephala suprà citatum ? In montibns prov. Worcester (v s c. et sp.)

19. E CAPITATA (Linn.' spec. p. 504), foliis Incurvo-palentibus brevibus snblus pilobis, flonbus subteiis pedicellatis ceinuis, biacteis approximatis subremotis>e, sepalis ovatis obtusis extus lanato villosissimis coiollâ urceolato-globosâ extus pilosâ paium bievionbus, antheris coiollam vix a?quanlibus.—in Inontibos cm a Capetown. & capitata Andr. heath. t. 51) Wendl. eic. fdr. 3. ic Lodd.¹ bot. cab. t. i5rg E. byssina Salisb' 1. c. p. 33g Enodesmia tapitata G. Don 1. c. p. 828 Folia r-a lin Flores numerosi, snbglobosi, 3 lin diainetro Bractae sepalis dimidiò breviores, nonnunquam remotae. Lana calycis densisaiina flavo-virescens Corolla alba, (v s. c etsp.)

Sect. vi. AMPHODEA *Salisb.*—*Spum osae Klotzsch,*

Inflorescentia terminal is, floribns snbternis capitatis. Bractae sepaloidex et sepa scanosa glabia, siccitate saepius corrugata Corolla urceolata glabia. Anther exsertae, taducissinae, basi brevissime et rigide austatae. Ovanam glabrtun. Foha terna.

20. F. SFUMOSA (Linn ! spec. 508), foliis erecto-appreusis snbpatentibnsve bie-
vibus lineaii-tngonis plabris, sepalis lato-ovatis cannatis scanosis siccitate coirugaiis coiollam *urceoharn* subaeqntibus — ID colonise Capensis prov. austio-occidentalibus commun». h. acariosa Berg. pi. cap. p. 102. Wendl. eric fasc. 21. ic E. spumosa Lodd.¹ bot. cab. t. 566, non Thnnb nee Wendl Lamp 1 otis spamosa G. Don 1 c. p. 810 et L. Loddiges ejusd. 1. c. p 811. Kami flexuotj, ramulis pabernlis Folia 1 lin Flores incarnati, a lin longi. Antheide nigrae. (v s c etsp)

11. E SEXI-ARIA (Dryand.' in Baaer icon, pi kew. t. ir), foliis patentibus sexfariam imbnctis latr Jineaiibus ngidis carinatis glabus, sepalis lato-ovatis carinatis scariosis coiollarn arceolatam iuperantibus. — in monte Tabulan. E. sexfaia Andr. heath. t. 88. K. spamosa Thumb. diss. n. 14 Eurylepis \$exfarfa D et G. Don 1. c p. 808 Folia daplo majora densiora tt ngidiou quam m E. spuiuosa Kamuli glabn Capitula majoia sepalis minus v, vix corrugalis. Antheraum arista? in filamento longè deconentes, apicibns breviter Jibeis divaricatis ngidis. (v. s. c. et sp.)

Sect. vii. GEISSOSTEGIA.— *Galyciflorae Klotzsch.*

Inflorescentia terminalis flonbus subterms, Bractae sepaloides; bubremotae v. approximatae cum sepalii imbr/catae, paleaceai v. coloatae, glabrae v. viscidæ. Coiolla calyce brcvior v. pa rum longioi, glabia v. leviter vUcido-pnbeinla. Antherae exseitaj, mticae. Ovanuin glabrtim v. rariùs villosnm — Folia terna, v. sscpe sparsa.— Species nonnullae section! Elytiostegiae valde afflnes.

22. E. NUTANS (Wendl eric. fasc. 3. ic), foliis 3-4-nis patentibus linearibos glanduloso-scabris, flonbus ternis pedicellatis, biacteis parvis subremotis, sep.il/5 ldiiceolato-ovatis obtusè aennjioatis hirtis, coiollâ ovato-urceolalâ viscid'a glabra, limbo bievi electo patente, antheris obmwis scabro-hirtis, ovano hirsuto.—Hab. . . . E pudibunda Salisb. 1 c. p. 345. tolasis pudibunda G. Don 1. c. p. 827 — Species mihi ignota , plnribas notis à settione differre videtur, &d evidenter E adanes afQnis. 'l'

a3. E. ADUNCI, foliis erecto-patentibus linear-i-trigonis acutu, glabns, bracteh sepalisque lpnceolalis acutis cariaatis corolla arceolato-globosa viscido-pube-
rulâ subbrevionbas, antheris subacuminatis obtusmsculis scabro-hirtis,
oval10 glabro, stylo nncinato —in coloniaCapensi(INiven). Folia leviier glaudu-
loso-scabra. Floies nameiosi 1 4 lin. (v. s. sp. coimm .1 cl. Lambert et in heib.
Ward.)

24. E. LFHMAUNI (Kiotzsch' in herb reg. Berol.), ramis hirtellis, foliis ovatis lanceolatisve^ snprà aspens hirtisve margine revolto subtus canescentibus, floribns breviter pedicellate, bracteis sepalfsqae lanccolatis subnlato aenmini-

- Us membiinaccis cihatis, corollā late suburceolato campanulaia* c*ilf ie longioieglatb 1 limbo erecto —in coloniā Capensi(Buichell n. 5908, 6981 Muudt et Maiie\ *I olid* i-a lm longa, saepe 1 lm lata Floies nunierosi 2 lm<< long! (v. s sp)
- a5. E. LYCOPODIOIDES (Lodd.¹ catal.), hannlis, ramalis vix paberulis, fohis lato-ovatis obtusis con\elis subtus pallidis, floubus pedicellatis, br.ictéis laxis sepalisque ovatis membranaceis coloratis corollā snburceolato-campanulitā bievioubns, o\ario villosa —Hab .. Folia 1 lin longa et lata, bullata, supiā glabia Pedicelli, bractae, sepala et corollae albae, minute glandulosopuberniae. Cor. x | lin. Autheiae nigro-fnscede. (v. b. c coruiu. a cl. Giaham)
- 26 E. PHYSANTHA , rdmulis glabiusculis, foliis partis imbricatis subpatentibus oblongis obtuas ciassis dorso sulcatis, floubus subsessibus, biacteis ovatis, sepalis lato-o\alis apice cannatis maigine minute ciliatis coiollā uiceolato-globosā inflatā glabia subdimidio bievionbns, ovario glabro—in colon 1ā Capensi (Burchell n 6714) — E. azale^efoliae affins sed abunde distmcta. C01 feie2 liu (v. s. sp. in herb Burch.)
27. E. AZALLJEFOLIA (Sallib ' U p 334), ramulis pubemlis, foliis paivis squ irosis obovatis oblongisve obtusis crassis nitidib , floubus snbcsitilibus , biacteis ovato orliculanbos, sepalis unguiculatis spatulati&ve apice bixer cannatis concavis maigine viscoso-pubt inlis coiollam urceolato-globosam InQatam pubernlam subsnperantibns, antbeii ovalis obtnsis glabris —in montibus Zwarreberg (Miven, Bmcbell (n. 7689), Lcklon et Zeyhei) E. pogonantbera Klotz&ch! m herb, rep Beiol. vix Baitl hurylepis azalcacfoha Q. Don I. c. p 808 Folia fere Loileleuriae olim Azalea* procumbentis. Coi iylin% (v.s sp.)
- [^]8. E. noGONANIUERA (Baitl. ex cbai. in linnasā 5. p. f>34), ramulis minute puberuhs, foliis paivis s[uai]Osis obovatis oblongisve obtusis crassis nitidis, lloribus breviter pedicellatis, biacteis ovatis acutis, sepalis sessibus o\ato-orbiculanbas apice brevitei cauaatis margine viscoso-pubeiubs glabrisve corollam urceolato-globosam glabiusculam subaequantibus , anthens apice pnipnreo-hntis—m monte Zwarreberg prope #Caledon (Niveu, Lcklon et Zeyher, Ludwig, etc). E. tiaiacilora (& squarrosa Klotzscb! in herb Beiol. Habitus E. azalea?fohae. llores ininores. Sepala et biacteai h. tiaiaefloiac. (v. s. sp.)
- 29 E. CRASSISEPALA , tamulis minute pubeiulis glabiisve , foliis terms sparsisve erecto-patentibus Imearibus ciassiusculis obtusis ngidis dorso cannatis sulcitisve, floribus breviter pedicellatis, bracteis fepabfoimibus, sep.tib o\atis obtasē acuminatis crassiusculis subcardlagineis yisudulis cotollain uiceolato-catnpanalatani sabaequantibus, antbeii glabriuscabs.— in colonia Gapensi (Buichell n 7354* 74°7» ⁸⁶ ^ et 8683). Habitus fere L. tiaiaeflorae sed corolla; forma diveisa Stylus longe exsertus. (v. s. sp. m lieib Burth)
30. E. INVOTVENS, lainulis pubeiulis, foliis erecto-incurvis hneaiibus obtusis ri^idis doiso sub atis glabris, floubus breviter pedicellatis, biacteis laxis, sepalis late-ovatis dorso bnealis maigine subiuembauaceis concavis coiollam subglobosam non depicssam viscidulain supcrantibus, antheris ovatis ohtubibsimis glabris.—In coloniā Capensi (Niveu, Masson). K ciassisepala- aliinis, sed flores duplo majoies Sepala 2 hu. louga, fouua feie E Petiveu. (v. 5. sp. co mm.'a Soc. Linn. Locd.)
31. E. SUFFULTA (Wendl.' in herb Berol. mss.), lanu's pubemlis, foliis erecto patentibus bneanbus obtusis ngidis doiso sulcatis glabiis, flonbus bieviter pedicellatis, bracteis l^xis, sepalis lato-ovatis obtuse acummatis apice cannatis inargine membrauaceis siccis corollam uiceolato-globosam subdepreisam glabiusculam vix superantibus, antbeii oblongis oblusiusculisglabru, in uiou-tibus prov. Stellenbosch. h tiarafloia <cstricta KloU&ch' in herb reg Beiol. Coiollā sepalisque ftie media mtei E. iuvolventem et E. tiaixfloiam , sed vix oniues unius spetiei vauttalts Floies in E ouffilUA VJX ultia lineam longi. (v. s. sp)
32. E. TIARJBFLORA (Andr health t 196), lainulis albanticibns, foliis hnoaubus

(Musis electo-patentibus glabiis, flonbus bievitei pedicellatis, bracteis Iaxis MI hi emotis, sep ilis oibitulaubus conrms membranaceo-paleaceis corollam 01 biculato-deprtssam & uperaatibus, an(heiibobtu&isglabii& —inmontibus prov. Worcester occidentals £ leptophyll t Klotzsch ' ID beib. Berol L placentae-floras Sahsb '1 c p 348 Gypsocalhs tiaraeflora G. Don 1 c p. 802 et Ectasis placentxOora tjusd 1 c p 827 Habitu vauetalibub nonnulhs I lmbucatee non dissimihs Cor bis tnplovelatiqurquaralonga, J-i hn diametro tohaplaque 3-4 hn longa. (v s c et sp)

33 E TRICEPS (Link'mum hort. berol p 371), ramuhs pnberulis glabratisve, folus latiusculc linea trigorus electo-patentibus obtusis glabiis, flonbus bre-viter pedicellitis, bracteis sepalisque ovatis icuimnalis apice carinaUs ID era-biaoaceis glabrib subviicosis coioli uiceolito tainpanulata vis>cosa snbbrevio-nbns , anthens oblongo acutis scabio hnlellis —in colonia Capensi (Masson) £ triceps Lodd ' bot cab t q6a t spumoba "Wendl enc fasr if) it non Linn Furystegia triceps G Dun 1 c p 809 ! olia 2 hn. snbiuibucata 1 loics albi Cor 2 hn Antherac fuscae. Stigma capitellata (v s c. et &p, comra a cl Waid.)

14 £ IMBRICA-TA (Linn ' spec p 503), lainis pubeuhs, folus ngide et saepius aDgaste linear! tngonis acutmsculis electo patentibus lecurvisve , floubus bre-vjter pedicellalis, hi ictesis imbucato appiessi: v laxis sepahsque o\atis obovuti-ve plus nümu!>ve cannati<> obtubis acuumnalJbve pileaceis glabiis, coioll\sobscanoså urceolato-v ovoideo-campanulata calycc brc\ioie v parnm Ion-giore, antheus obtusis lanus auituscmb glabiis scabusve —in coihbos prov. austro-occidentahuiconiraunis £ imbucata Andr heath t x H)(ma\e) Wendl eric, fasc 21 ic Lodd ' bot cab t n4i £ flexuo^a Andr heilh t 6> Lodd bot cab t. i4q,5 £ divaucala Wendl ' eric fa&r 7 ic h actaea Hoitul non Link F caesia Wendl eric fasc 24 ic £ pyramidahs! squamaeiloiia (anth in specim obtnsis¹) caesia¹ fltxoosa' et stylosa' Sahsb ' 1 c p 349, J5o F ra-in a IOSQ¹ imbricata' caesia¹ densiflora¹ branneo-alba¹ mynantha^ et porrigens ' Bartl ' in linuaå v 7 p. 632,633 £ glaucifolid' violatae' imbucata¹ oioata! mynantha' leptocephala' tnfana¹ densiflora¹ flexnosa' sparsa ' poingens¹ cae-sia¹ et paleacea' Klotzsch¹ in heib. reg Berol Gypsocalhs imbiicita, squamae-flora, cassia , flexuosa et stylosa G Don 1 c p 802, 803. Species volgatissiraa ab inctoibus varns modisdivisa sed mihi nee vaiietates certas praebere videtur. Habitu facile dignoscitur Kami flonfeu pyramidati, floubus nuinerosis (nisi in speciin depaupeiat) Folia 1 | 3 lin longa , saepius densa I lores longius breviusve pedicellati > sepahs bracteisque mtentibus rarius opacis albis roseisve. Cal. 1-1 4j hn longus Sepala latioia v angustiora , corolla longior v bievior Anther* erectae v divanotaa, saepius obtusae, nunc obtusi&sunae ranns aca-tiuhculae. Stigma vix dilatatnm — Species duae huic habita similhiae sed anthens bieviter laterahbus et stigmate peltato in Aisati qaaeiendae (v s. c. et sp)

35 I¹ CBRYSANTBA (Klotzsch' in herb reg Berol), ramis pubernlis, folus rigide et anguste linea tngonis erecto patentibus glabiis, flonbus brevitei pedicel-latis , bracteis parvis, sepahs hneari lanceolatis canmtis paleictis torollani tenuem asqaantibus, antherisobtusinscuhs —inmontibus 7warbeig ^Fcklonet Zeyher) Vix non vai tenuifloia E imbiicatx Cor. 1 hn. longa, flava (v s *p in herb reg Berol)

36 F ACCOMODATA fKlotzsch¹ in herb reg Berol)* ramis pubescentibiib, foliis electis patentibusve lmean tngonis rigidis glabns, bratteis sepahsque ovatis cannatis corollam globoso campanulitam supeiantibas , anthens obrii"iusou-lis, stigm ite snbpeltato —m montibus ad Klynnvierpiov Swellendaui (Erkbit et Zeyher) In omnibus inter E linbricaiam et E liscivdiu feie media Stamina pnons, stignj> hujuj. (v » sp in herb reg. Berol)

37 E DESMANTHA, folus longe peliolatislmcnbus squairoso patentibus obtusis qldLns doiso sulcatis, flonbus pedicellatis, biacteis ippressis ovati* sepaloides, sepahs ovato-lanceolatis obtusis. cra&suisculis VISCOSIS, corolla ovali viscoså ca-

lyce dimidio longioie, anthens oblongis obtusiusculis —in colonia Capensi (Masson). Species E. pemcillifloiae nonnihil affinis sed ab omnibus hujuscet sectionis petiolis fere lineam longis aliisque notis differt. Foliorum laminae i¹~2 lin. Cor. 2 lin. longa. (v. s. sp. comm à cl. Lee)

38. E. PFNICILIIFLORA. (Salisb ! I c. p. 348), ramis puberulis, foliis linearibus subsquato-patentibus carinatis glabriuscuis, floribus pedicellatis, bracteis appressis, sepahs ovatis carinatis bieviter acuminatis corollam ova tenuis glabram sequantibus, anthens linearibus acutissimis.—in tenuibus piov. Swellendam. E. calyculata Wendl. eric fasc. 4 ic E. rostellata Bedf. hort. Wob. p. 21. E. rastellum Spreng ' syst. 2. p. 196. E. rostrata Baitl.' m hnna? & 7. p 632 Gypsocalis lastellum G. Don 1. c. p. 801 Gyps, rostellata ejusd. 1 c. p. 803 et Ectasis pemcillifloia ejusd. 1 c. p. 827. Species variabilis habitu inter E imbiicatum et h intermedio media validates parviflorae illi similes, giandiflorae hmc pionchioes (v. & sp.)

Sect. VIII. GIGANDRA SciUsb. — Pictarum sp. Klotzsch.

Inflorescentia terminalis, floiibus cernuis. Bractea? imbricato-appressae, sepa-hformes. Corolla tubulosa, saepius inflata, rarius ovata, calyce dimidio saltern longior, limbo erecto Antherae longe exsertae, linearis, apice bimaculata, basi mucratae. Ovarium sessile glabrum. — Folia teina.

39. E. INTERMFDIA. (Klotzsch¹ in herb reg. Berol), ramis tomentosis, foliis linea-ri-tengoms erectis et subsquato-patentibus glabriuscuis, floiibus i-3-nis breviter pedicellatis, bracteis sepalsque ovatis obtusis v. acuminatis siccis viscosis carinatis, corollâ ovata oblongâ calyce paucis ruin v. dimidio longiore, anthens linearibus acutiusculis semibifidis.— in inouibus piov. Swellendam cum E. pemcilliflora, socciflora, bebaua (Masson, Niven, Ecklon). Inter E. pemcillifloram et E. soccifloiam reveia media, nee speciinibus alns prioti, aliis huic affinibus. An hybiidarum spontanearum series ? (v 8 sp.)

40. E. SOCCIFLORA. (Salisb.' 1. c. p. ^47), urnis puberulis, foliis linearibus squato-patentibus glabriuscuis, fluiibus i-3-nis bievitei pedicellatis, bractem sepalsque ovalis obtusiusculis carinatis, corollis ovato-rotundatis oblongis calyce duplo longioribus —in prov. Geoige et Swellendam' E. Sebana lutea Andr. heath t. 84 et E. vindis ejusd. t. 55. E. demissa Bedf. hort. eric, p. 8. E. Sebana breviflora Klotzsch¹ in herb. reg. Beiol. Ectasis socciflora et E. demissa G. Don 1. c. p. 627. Coiollae 4-6 lin. longae, formâ inter E. penicillifloram et E. Sebanam fere mediae, luteas v. virides. Caeterum E. >ebanæ similima et forte, praeeuntibus Klotzschio et aliis, hujus mera varietas. (v. s. c et sp.)

41. E. SFBANA (Dryand.¹ in Bauer icon. hort. kew. t. 10), ramis puberulis, foliis linearibus squarroso-patentibus glabriuscuis, fluiibus i-3-nis breviter pedicellatis, bracteis sepalsque ovatis carinatis bieviter acuminatis obtusis, corollis tenuis subincurvis basi inflatis sabaequahbusve calyce 3-4-plo longioribus, laciniis limbi ovatis brevibus.— in prov. austro-occidentalibus vnlgans. E. Sebana Wendl. eric fasc. 10. ic. Andr. heath, t. 83, 189, 190. Lodd. hot. cab. t. a3, 266. E. Peliven Linn. mant. p a35 non ahoi. E. coccinea Linn spec, p. 505? nou herb, nee diss. nee alior. E. baculiflora Salisb ' 1. c. p 346 et E* cothurnalis ejusd ! 1. c. p 347 Ectasis Petiveii ut hct. Sebana D. et G. Don 1. c'. p. 827 Folia densa constanter recurva C01 flavae, aurantiacae, fuscaj v. pui-pureae. Vanat sepahs latioribus anguationibusqne, glabiis viscosis \. pubescens, corollis amplioribus tenuioribus, 6-9 lin. longis, glabris v. viscidopubeiulis. (v. s. c. et sp.)

- 4a. E. PETIVFRI (Willd spec. 2. p 394 non Linn), ramis pubeiulis, foliis linearis tu'goms patentibus subrectis glabriuscuis, floribus solitariis sessilibus, bracteis sepalsque ovibus concavis paleaceis subenevibus uiuticis, corollâ lubulosa incurva basi sabaequah calyce subdmplo longiore, laciniis limbi ovali-oblongis.— in piov. Swellendamoccid. et Stellenbosch austi t Petivei Wendl. eic. fasc. 9 et 14 &c. Andr. heath, t. 78, 79 Lodd ' bot. cab t. 142G. E. folcularis Salibb ' 1. c. p. 348. Ectasis folculans G. Don 1. c. p. S27 Folia rigi-

diora lectiora quam in E SebanA, et sepala corollaque liibus ions tanter di-versa Cor. flavae A . aurantiacse, 6-9 Hn. longa?. (v. 6. c. et sp)

/6. *melastoma*, sepalis angustioibus, corollae limbo discoloe laciniis elonga-tis. E *melastoma* Andi. beath t. 3o Wendl. eric. fasc. 17. ic. Lodd.¹ bot. cab. t 333. Ectasis uiclastoma G Don 1. c. p 827. An sp. propriia? (v. s. c. et sp.)

43. E. VESTIFLU. (Salisb ' I.e. p. 34tf), ram is hirsutis, fuliis lineaibus mcarvo-patpntibus ciliato-bntis, floibus sohtains sessihbus, bracteis sephahscoe ovatjs concavis paleaceis obscare ncrvatis et bievissiine acuiuinatis niaticisve , corollN tubulosis incurvis basi sabaequalibus calyresabduplo longioribus, hinbi laciniis ovatisbievibus.—in montibui prov. Cape?v. StellenboscbP (Niven, Roxburgh[^] E Petiven hirsuta Andi bcatb t So. E picta Bedf hoit enc. p 19 Ectasis vestiflna et Ect picta O. Don 1. c. p 827. Calyces et corolla? fere E. Petiven , at species distmcta videtnr. (v. s. c et sp.)

Sect. IX. PELOSTOMA Salisb.—* Pictarum sp. Klotzsch.

Inflorescentia lateralies, floibus longmscole pedicellatis pendolis. Bracteae le-mota? , parvae Coroll tubulosa,«ca1yce longioi, limbo erecto Anthene liaeales , longe exsertae, apice bifidae , basi muticae. Ovaium sessile, glabrum. Folia teina.

44. E T, IN EAT A , foliis fasciculatis hnean-snbulatis subinenrvis, calycibas maxi-mis pyramidatis, sepalis ovatis conaceis lineatis, coiolls tubnlosis basi paium injiatis calyce dimidio longionbus.—in colomā Capcnsi. (Mundt) Sepala 2 | lin-lata, non caunata, lubescntia C01. K. Pluknetii (v. s. sp. m heibi Hookei)

45. E PIUKWETIX (Linn ' spec, p ^04), glabra, fohis rigide v subalato-lmean-bus fasciculatis incurvo-patenlibus erectisve, sepalib ovato-lanceolatis subhnea-nbusvf caiinatis, corollis tubulosis basi v. medio ioflatis-2-4-plo longionbus qnam latis —in montibus piov. austro-occidentaliura com munis F. Plakcnetii Bauei icon. hoit. kevv. 1 9 Wendl. eiic. fasc 1 et 2. ic Andr. beatb. t. 1J9, 186, 187. Lodd ' bot. cab. t. 1274. E. peniullata Lodd. bot cab. t. 1918 nou Andr. t. fosiformis Salisb.^f 1. c p. 345. E revolvens Baitl. inhnnaeā 7.p 6J1. Species varietatibus nnmeiosissiuiis Incht, cbaiaUcies tamen certi ad stupes definiendas desunt lolia nunc vix 2 lin. longa ciassa obtusa, sa^pius 4-8-li-neaua feie subalata Pcdicelli longiores v. bieviores. Sepala ovata i-?-hn. v ovato-lanceolata 1 J-4-bn , vci lanceolato-linearia 2-8' lin longa, coiollam acqu.intia v usque ad 5-b-ies brevioia, constantei caunata, caunā tamen nonnunqnam (t. levolvens Bartl.), sukatāsubapeita. Cor. 6-g lin. longa, basi v. versus medium plūs minusve inflata , punicca aurantiaca v alba. Stain, co-lollā dunidio v. duplo, imo fere tuplo longiora (v. s. r. et sp)

46 E PEWiciLiAiA (Andi. beatb. t. i35), fohis linearibus fascicalatis incarvo-patentibus ciectisve , sepalis ovato-lanceolatis acutis cannatis , corollis ovato-inflatis subglobosis calyce longioribus.—in montibus prov Worcestei (Niven, Drege, Eiklon, etc) h. Pluknetii inflata Wendl. eric, fasc 22. ic. et E. PI. conferta ejusd fasc 24 ic E. Pluknetii fx, breviflora y, Eckloneana ct 0, Dregeana Klotzsch ' E. fusiformis y, cT bahb I. c. p 346. Haeetiam forma*: forsan ad vaiietates numerosas L Pluknetii addenda?. Corollas tamen forma singularis, sa?pe vix longior quām lata. (v. s. sp)

Sect. x. DJDTMANTHERA. — Monadclphae Klotzsch.

Inflorescentia termiualis, flonbns i-3 subsessihbus cernniſ. Bractea? imbricato-appressc, sepalifoimes. Corolla tnbulosa, calyce lonpior, limbo erecto v. pa-lente. Anherae hneares, longe exsertae, subteiminales, illatnento articnlatap, bipartite, basi mnticsp v. breviter aristatae. Ovarium sessile. Folia terna.—Sectio inter Ectasin et Synngodearo media.

47. EMON'nETPHA. (Andr. heath t. 129), fohis lineari-trigonis erecto-palentibns brevibus glabriiscohs, jumoibus viscidnhs, sepalis ovatis obtnsis coloiatis maigme scaiiosis, coiolls calycc subtplo longionbus basi subinllatis limbo

- bievi erecto, filjmenlis antherā muticā lationbus, ovario glabro.— in niontibni prov. Stellenbosch austi. et Swellendam occid. L. furfaiosa Salisb. 1. c. p. 248. Ectasis furfurosa G. Donl c. p. 827. Habitu L. Petiveri proxima, sed staminibus distinctissima Sepala intei se subacqualia viscosa Cor. 5-6-Iin lubio-pm-puiea viscosa Hlamenta juniora submonadclpha. Antherae 2 lin. longa?. (v. s. c. et &p.)
48. E. BANKSII (Willd. spec. 2. p 395), depiessa divaiicato-ramosissiraa, foliis lineaiibus latliiscnlis tigidis acutis, sepalib ovatis acutis caiinatis margine scarnosis intenonbus longioiibus , corollis glabni limbo stellato-patenle, iilamentis autheuf mntica' sublatioiibus, ovaiio MHIOSO.— in montibus piov. Swellen-dam oicidentalnis (Niven, Masson, Ecklo'i et Zryher) E. Banksii Bauer icon, hort kew t. 29 Wendl euc fasc. 14. ic Andr heath, t 105, 106 E. fiagihis halisb. 1 c. p 3/6. E. inonadelphha Cuit. bot. mag. t 1^70 non Andi. lictasis Banksiana et hct. inonadelphha G. Don 1. c. p. 827. Kami rigidi bieves toi tuosi. I'oha densa subliicida Sepal.i valde inaequalia C01. tubas 6-lineaiis, limbi la-umh acutib pellucidib. Lilamenta ut in 1L. monadelphha. (v. s. t. ct sp.)
- 4 . E. VIRIDI*LORA. (Andri. heath t. 299), erecta divaricato-ramosa, foliis squar-losso-patentibus lineaiibus 1 ij^fdis acutis glabri&, sepalis o\ato-oblungis acutis roagine scaiosis subacqnalibus, corollis calyce 3-4-plove longioiibus glabris limbo bubeiecto, filameatis antheiā bievissime anstata tenuioiibas, ovario glabro.—in colonij Capensi (Mundt et Maire) E. virldifloiaLodd.'bot. cab. 1.917. Syringodea viridiflora G. Don 1. c. p. 814. Affinis E. Banksii etsi ab auctonibus pleisqdc ah eā longe lemota. Cor feie pollicans locvis vnidis medio pa-rum inllata, limbi laciniis inaigine snbpallidis. Autberae leveiā terminalcs (v. b. c. et sp)
- /S. [?] clavata, coiolls snbclavatis, aatheris mnticis. E. clavata Andr. heath, t. 208. Synngodea clavata G. Donl. c. p. 818.
- Snbgenns H. SYRINGODEA sen Tnbiflorae —Longiflora? et Coniflorium sp. Dryand —Syriugodea, Dasyanthe*, Chona et Euiylepidis necnon. Euiybte-giae i>p. Don. —Cla\ aelloiae, Intestimfloia? et Scoho&tomatum *p Klotzsch.
- Corollac tubus elongatus (G-18 lm longns et pleramquē duplo saltern longioi quani latus) aequalis \. inflatu«, htubo erecto aperto v, tevoluto nee stellato-pa-tente. Anrhera, laterales, muticae vel subulato-aiibtata; nee cristatse, to bum collla? sajius excedentes — Species omnes Capenseb.
- Sectio xi. EURYLEPIS. — Eurylepidis et Eurjstegiae sp. Don.
— Halicacabac Klotzsch,
- Inflorescentia teimmalis. Flores penduli. Bracteae et sepalalata, memlranacpo scariosa v petaloidea. Coiolla ovata v tubulosa, mflata, limbo erecto VI^conni-vente Ovarium sessile glabium. — Folia terna —Sectio habita inter Dydiman-therara et Dasyanthem media, ab iliā aatheris, ab Me ovauo distincta
50. E HALICACABA (Liun ' spec p. 607), depressa, divaiicato-ramosissima , foliis bnbrecoivo-patentibns liueaubus latiusculis ligidib, floubus i-3 bievissime pe-dicel la t is, biacteis approxunatis bepahfoimibus, sephs ovatis obtusiusculis caiinatib scaiobib glabiib, corollā calyce tiiplo longioie valde mflata glabia, limbo erecto connhente piofundē fisso, anheiis ovalis muticis.—in montibus prov. Cap. et Stellenbosch (Bnrch. u 6i5. Harvey n. 171). L. halicacaba Bauei icon hort kew t. 2. Wendl eiic fasc. 6. ic. Andr. heath t. ib4. E. rupestns Sahsb '1 c. p. 353 non Audi. Emylepis halicacaba D et G. Don 1 c. p. 808. Rami lobusti, toi tuosi. Folia 3-4 lin. longa Corolla palhdc lutea snbvirescens , 8-1 i-linearis, irregulaiiter et nonnnnqnam ultrā niedinm lissa. (v. s. c. et sp)
- 5t E. TANUGINOSA (Andr. heath t 122), humilis, subeiecta, foliis snbinenrv-o-patentibus longe linearibus marginc lanato cihatis, floibus subsoptariis sub-sessilibus, bracteis appressis sepaliformibns, sepalis ovatis apice cannatis ueiubranaceis subscauosis maiginc cihatls, corollis tal^te dimidio longioiibus

valde inflatis limbo erecto-conmvente extus tomentoso profunde fisso, antheris linearibus snbulato-aristatis — ad ostiamflum. Klynnvier prov Swellendam (Masson, Niven). Eurystegia lanuginosa G Don 1. c. p 80q. Corolla 7-9-hneans, sjepē ultra medium Gssa, snrdide albescens, basi et margmihus fusco-purparascens, formā singulau *h* halicacabae simihs Antheia? vix laterales (v s. o. et sp comm a cl Lee)

- 5a E. MONSONIAHA (Linn, fil ' suppl p 22i), foliis patentibns linearibus latius cnhs glabns, flonbus subternis brevissime pedicellatis, bracteis approximaiis sepalisque ovatis petalouleis, corollā tubulosā subinflatā calyce 'j-i-plo longiore glabrā, limbo erecto, anthers oblongis anstatis — in montibus prov Worcesteret Swellendam occid (Niven, Mundt, Ecklon etc). E. Monsoma? Bauer ic bort. kew. t 7. Bot. mag t 1916 F Monsoniana Andi heath t 173 Wendl eric fasc 11 ic E varufoha Sahsb.' 1. r p 35J Eurylepis Monsonu* G. Don I. c p 809. Rami elougati, lamuhs hrevibus dense fohosis. Folia su prema ramnlorum flora hum sxpe margine dilatala coloiata Moies candid is simi Cor io-u-lineans (v s c et sp)

Sect. xii. CALLIBOTRYS *Salisb.* — Syringodeae sp. *Don*

Inflorescentia axillans, flonbus mfia apices lamoium verticillatis saepius penduhs Sepala lato-ovata, rhombea , v. unguiculata, plus minusve scanosa. Corollae subinflato-tubulosae, limbo erecto v vix aperto, glabrae v roilentas nee viscid as. Antheiae saepius aristatae. Folia 4-6-na, rarius pluia

' Flonbus pedicellatis pendulis , anthers anstatis.

53. E. MAMMOSA. (Linn ' mant p a34), folns erecto patentibus glabns acutiusculis, pedicelhs pubrruhs, bracteis parvis remotis, sepahs lato-ovatis scanosis carinatis brevissime acuminatis, corolhs sobinflalo-cyhndticis basi quadnfos-sulatis, limbo erecto — in montibns prov austro-occidentalm communis E mammosa Andr heath t. 124, ia5 Lodd ' bot cab t. 125, 951.Herb de Tarn t 148, nonThunb E abietinaBerg.pl cap. p 105. Schneew pi n 23. ic non Linn. E speciosaSchneew. pi n. 3. ic E. verticillata Andr heath, t. 48 Lodd ' bot cab t 145. Syringodea mammosa G Don 1 c p 8a5 et S. verticillata ejusd. 1. c p. 821. Cor. 7-9-linearis, purpurea, coccinea v. pallida Pedunculi in speciminibcs nonnllis (forte hybridis), basi foliosi et tune vix ab E. cruenta distinguitnr (v s c et sp)

0 ? albiflora, corollis crassioribus albidis. Hab cam praeredente E gelida hortnl non Andr. An hujos, an E. gilvse var? Bracteae tamen et corolla* fossuls potias E. mammosae. (v s. c. et sp)

y ? pallida (hortul.), corolhs 4 5 lin. longis pallidis (v 3. c.)

54. E BOWIEANA. vLodd. bot. cab t 842), folns squarroso-patentibus brevibus obtusis glabiis, pedicelhs giabris, bracteis pams lemoris, sepahs rhombeis membranaceis vix carinatis breviter acuminatis, corollis subinflato-cylmdricis basi vix quadrangulanbus —ad prom. Bonae-Spei (Banks et Solander) F Bowei Bedf eric. Wob p 4 E. Baueiea Andr. heath t a52 Syringodea Bowieana G Don 1 c p 8i5 Bracteae E mammosae Corolla fere E gilvx paulò magis mflata, foliis et habitu ad ntraque diversa (v. s c. et sp)

55. F. GILVA. (Wendl eric, fasc i3 ic), foliis erecto-patentibus snbincarvis acutiuscuhs, pedicelhs glabris, bracteis sciriosis ovatis ^ . sepahfoimibus remotis approximatisve, sepalis amplis lhombis membianiceo-scariosis vix carinatis brevissime acuminatis , roiolis subinflao-cylindncis basi quadranganbas —m montibus prope Capetown E. gelida Andr. heath, t. 24. Lodd ' bot cab t 699 E. alveiflora Salisb ' 1 c. p 366 Syringodea gilva G. Don 1 c p. 825 Cor magnitudine E mainmosae sed plerumque crassioi, alba (v s. c et sp)

11 Flonbus densè spicatis, anthers anstatis

56. E ctivEFLORA (Sahsb.^f 1 c p. 665), foliis erecto-patentibus snbincarvis glabris, biacteis spalhulatis glabris insegnalibus, corolhs subinflato-cylindri-

cis rectinscalis.—ad prom. B. Spei (Paterson, Roxburgh). E. sessilifloru Andr. heath, t. S6. non Linn. Syringodea clavaeflora G. Don I. c. p. 824. Folia 3-4 lin. Spicae crassissirae x-a poll. Braeteae et sepala iuenibranaceo-scariosa. Cor. 12- i5-linearis, albovirescens. (v. s. c. et sp.)

57. E. SPICATA (Tbunb. diss. n. 71. t. 4), foliis erecto-patentibus subincurvis, bracteis linear-i-cuneatis approximatis, sepalis obovato-spathulatis longè uu-guicuiatis inacqualibus giabris, corollis subclavato-cylindraceis subincurvis» limbo erecto v. vix patente.— in inont. austraUoribns prov. Cap. et Stellenbosch. E. spicata Andr. heath, t. \$5. Wendl. eric. fasc. 2. ic. Lodd.! bot. cab. t. I2o3. E. sessiliflora Linn. ill. snpl. p. 222. F. favosa Salisb.! 1. c. p. 365. Syringodea spicala D. et G. Don I. c. p. 826. E. n. 7707. Drege! pi. exs. Habilu et colore florum praecedenti siinillima. Corolla tennior, iu bortis non-nunqnam viz 8 lin. longa, in spec. sylvestribus sxpiiis pollicaris. Folia nunc densè irabricata 2-3 lin., nunc laxiora 5-6 lin.(v. s. c. et sp.)

/3. *ciliata*, bracteis sepalisque ciliato-serratis. E. seep triform is Salisb.! 1. c. p. 365. Syringodea seep triform is G. Don I. c. p. 826. (v. s. sp.)

††† *Floribus densh spicatis, antheris muticis.*

58. E. ruBERULA (Klotzsch! in linnreà v. 9. p. 629. uonBarll.), foliis 6-S-nis sub-erecto-incurvis evanescenfi-pubernlis, bracteis linearibus, sepalis rbombcis glabris, corollis subclavato-cylindricis subincurvis, limbo ereclo v. vix pa-tente, ovario pobernlo.— ad Fransche Hoek Kloof, inter prov. Stellenbosch et Worcester (Mundt et Maiie). Folia rigida 5-6-lia., flora lia hasi gxpè scarioso-marginala. Sepala sessilia. Corolla E. spicata? v. paruoi minor. Species inter Callibotrydern et Pleurocallim media, (v. s. sp.)

Sect. xiii. PLEUROCALLIS Salisb, — Syringodeae sp. Don.

Inflorescentia axillaris, floribus infrà apices ramorum verticillatis erecto patentibus v. vix iiutanlibus. Sepala linearia v. longè acuinata. Corollne clavalotubnlusae , rectae v. iucurvae, ssepitiis viscosae. Antherae muticae. Folia sena v. plura, rariùs subquaterna.

'T Ovario 'villoso.

59. E. tOMGIFOLIA (Ait. in Bauer icon. hort. kevr. t. 4), foliis elongato-linearU bns deniis evanescenti-pnberulis, floribus densè verticillato-spicatis, bracteis subremotis, sepalis linearibus pubescentibus, corollis subincurvo-tubulosis •vix clavalis sub limbo contracts saepiis costalis pubescenti-scabris viscosis, ovario villosissimo.—in montibus prov. austro-occidentalium. E. longifolia var. y et <T Salisb. 1. c. p. 364. E. pinca Audi-, heath, t. 35 non Tbunb. et vix Wendl. eric. fasc. 1. ic. E. pinifolia Andr. heath, t. 137, i38 et 184? E. ves-tita coccinea bot. mag. t. 402. Lodd. bot. cab. t. 55. E. vestita et Em. 7705. Drege! pi. exs. E. pitbyophylla Spreng. syst. 2. p. 18c Syringodea longifolia et S. pinifolia G. Don. 1. c. p. 821. Species cum E. vestitâ sapcè confusa sed calycibus facilè distincta. Cor. minus clavatse, evidentius costalae, 8-10 lin. longae, coccinea;, rosea;, alhidæ v. colore raixtae. Cicterùm synonymia hujns et trium sequentim, in prov. austro-occid. vulgarinm, necnoii in hortis saipissime cultarum , valdè confusa est. (v. s_T c. et sp.)

60. E. LEEANA (Dryaud. in Bauer icon. hort. kew. t. 24), foliis rigidè linearibus erecto-incurvis patentibnsve , floribus bìxviter pedicellatis verticillato-spicatis, bracleis approximatis calycis dimidinm aeqnantibns v. superantibus, sepalis lanceolato-linearibus glabriusculis subviscosis, corollis clavato-tubulosis sub-incurvis costatis pubescenti-scabris viscosis sub fauce sub-contractis, ovario apice villosissimo.— in montibus prov. Swellendam Stellenbosch et Worcester confinibus frequens. Species E. longifoliae affinis et vix nisi foliis brevioribns cl bracteis sapcè distinguenda. Cor. 6-10-linearis , colore \aria.

a. *aurantiaca*, cor. 6-10 lin. longis aurantiacis. E. Leea, Andr. heath. t. 74. Lodd. bot. cab. t. 298. E. costaeflora Salisb.] 1. c. p. 363. Syrin-godea Leeaua G. Don 1. c. p. 822. (v. s. c. et sp.)

- [d. *tantbda*, cor. 6-9 lui. longis alb id is E. *Candida* BarU.^r in linnseā v. 7. p. 628. £ pinea Wendl. eric. fasc. 1. IC ? E. para Andi.? Don alioi. Syringodea pma G Don 1, c. p. 823. (v. H. sp)
- y. *wridis*, coi 8-10 lin. longis viudibus hirtis viscosissimis. E. *viridis* Andr. heath, t 148 Synngodea viidis G Don 1 c. p. 822. (v. s. sp)
- ¶ *minor*, cor 7-8 lin. longis* palhde viridibus minus hirtis. £. *glatinosa* ininoi Andi. heath t. 67
- t. *glaucescem*, cor. 8-10 lin. lougis puipureis coccineisve. E. *glaucescens* Bartl. in linnseā v. 7. >. 65»* (v. s. sp.)
- f. *pulchella*, cor, 7-8 lin. longis purpureis hirtis (viscosissiinis. E. *pulchella*, Thunb. diss. n 24, t. 4. E. *argutifolia* Sahib.! 1. c. p. 364. (v. s. sp. in hb. Banks.)
61. E. ONOSMICFLORI (Sahsb.¹ 1 c. p 363), folii* lineaubus laxiuscnlis paten-tibus, floribus longiusculu pedicellatis veitiullatis, biacteis paivis sappius le-motis, sepalis lanceolatis lineaum-acuminalis glabiinscuhs \iscosis demum uiti-dis, corolhs clavato-tnbulosis subincurvis sobcostatis \iscosis, ovaio apite villosissimo —in vallibus rnontium prov. Swellendam à Gnadenthal ad Klyn-rivier. E. *glutinosa* Andr. heath, t. 148 non Thunb E. *viscida* Wendl. eiic. fasc. 13. ic Syringodea onosrusciloia G. Don 1. c p. 822. E Leeaj valde affi-lls sed sepalis majobus lads crassiusculis et bracteis diveisa. Corolla flaves-rens, virescens v. alba laihs parpurea * Mepius majoi quam in E Leeana (v. s. c. et sp)
- 62 E. VESTITA. (Ihuub diss. n. 25), foliis elongato-hnearibus tennibns subala-tisve densib, floubus den.se vciticillato j>pjeat>, sepalis c basi lalā bievi longe lincaibus glabnnsrulis, corolhs clavato-cylindricis subincurvis vix costatib puberulis glabn&ve vix vibcosis, ovaio apice \lllosissinio — I U montibnsprov austio-OLcidntaliini ab uibe Cap usque ad Caledon E. vestita Bauer icou hort. kew t 2G. h. vestita puipurea Andr. heath, t. 198, Wendl. eric. fasc. 10. ic. Lodd. bot. cab t. 217. t. vestita coccinea et formosa Wendl. eric, fasc. 11 er 23 ic E. vestita fulgida, mcainata et rosea Andr. heath, t. 96, 97 ct 98 E. ye<>tita carnea Lodd. bot. cab t. 1696 Andr. heath t. 246. K. vestila blauda Lodd. bot. cab. t. 1716. E. vestita lutea Andi. heath, t. 247. E. vestita alba Andr. heath, t. 147 Wendl. eiic. fasc. 13 ic. Lodd. bot. cab. t. 243. E. longifolia vai. plur. Salisb ! I.e. p. i6i. E longifolia carnea bot. mag. t. 706. E. pinea Wendl. eiic. fasc i3. ic.Ihnnb. diss. n. 26? E. pimfolia Salisb.! 1 c. p. 5bi (fide specim. heib Banks sed illamenta calcarata descipsit). Syringodea vcstita et J> pinea G. Don 1. c. p. 821. Folia semper tenuiora quāiu in afiibus, 6-9 lin. longa, ssepe secunda. Coi. ssepis 9-10 lin. longa , rarius in specim. culris longior v. bievioi senuabortiva, colors vana, nnnquam veio ut videtur viridis et rarissime ilavescenti. (v. s. c. et sp.)
- * *Tōsea*, (Andr heath, t 82), foliis anguste hnearibus densis, floribus paucis subterminalibnSj bracteis subulatis , sepalis e basi latā bievi longe bneaiibus, coiollā cla\ato-tubulosā subpolhcii inrarnata glabrā, limbo erecto. E. losea Lodd. bot. cab. t. 782. Synngodea rose a G Don 1. c. p. 822. Vix nisi inflorescentiā ab E. vestitā diveisa. Hybiida ex iliā et Evanthe qnādam. (v. s. c.)
63. E. FULGIDA. (Bedf hort. eric. Wob. p. 11), folus elongato-linearibus erecto-patentibus vix incurvis, flonbas laxe verticillato-spicahs, biacteis remoth, sepalis e basi latā longe hneaii-acurniiatis glabiis, coiolhs clavato-tubulosis, subincarvis glabrl3, hmbi laciniis latis obtusis, ovano puberulo, genitahbns exsertis —in colonia Capensi (Mundt et Maire) E fulgida Lodd.¹ bot. cab t. i633. E. spetiosissima Klofzsch ' in hnmaea⁹. p 6^5 E. meia ejnsd ^ 1. c. p. 644 ? Syringodea vestita vai. G. Don 1 c. p. 821. Ab uffini E. vestita dif-fert iloubusE grandifloias simihbus , ab hac ova 110. Coi. rosea \. puipurea. (v. 8. c. et sp. in heib. reg. Berol)
64. E. RBGIA (Bartl. in linnsā v. 7. p. 6io), foliis late hneaubus imbricatis sqaarrosis eabobrusiB glabns, flonbus breviter pedictllatis, bracteis duabas

approximate, sepalis ovatis subobtusis crassis glabris viscosis, corollis clavato-tubulosis viscosis ore contracto, ovario albo-hirto.— in valle Zoo tend ael prov. Swellendam. Cor. 8-10 lin. longa purpurea. Ex descr. E. Hibbertiana? si milima erit nisi ovario birto.

65. E. EXSURGEHS (Andr. heath, t. 20, 21, 2i5), foliis angustè linearibus erecto-patentibus, floribus laxè verticillatis, sepalis è basi latè longè linearibus glabris, corollis clavato-tubulosis incurvis viscosis, limbi laciniis lato-lanceolatis acutis, ovario leviter puberulo. — in montibus prov. Stellenbosch frequens. E. exsurgens Lodd. bot. cab. t. 835. E. grandiflora b re vi folia Wendl. eric. fasc. 7. ic. E. pharetraformis Salisb.! 1. c. p. 36i. Syringodea exsurgens G. Don I.e. p. 819. Co roll ae circiter pollicares, anrantiacae, limbi laciniis forma ab omnibus hujus sectionis distinctae. Specim. fl. pleno legit cl. Roxburgh v (v. s. c. et sp.)

* *hybrida* (Andr. heath, t. 261), floribus carneis albidisve parùm diversa et veroshnil. ex E. exsurgente et E. vestita hybrida.

** *Jormosa* (Andr. heath, t. 227 non Thanb.), corollis laciniis obtusioribus, floribus aurantiaco-iubris. E. curviflora rubra bortul. Inter E. exsurgentem et E. coccincam hybr. ? (v. s. c)

66. E. COCCINEA (Berg! pi. cap. p. 92), foliis linearibus patentibus incurvis Aubsquarrosive latinsculis acutis rigidis, floribus dense verticillato-spicatis, sepalis ovato-lanceolatis viscoso-villosis niargine glanduloso-serratis ciliatis ve rariusuudis, corollis clavato-tubulosis subhincurvis costatis viscoso-pubescentibus glabratissive, ovario pubescente.— in montibus editioribus prov. Cape Stellenbosch. E. coccinea Bauer icon. Lort. kew. t. 25. Andr. heath, t. 57. Wendl. eric. fasc. 3. ic. Lodd.! bot. cab. t. i3^5 ct auct. plur. non Linn. spec. E. frondosa Salisb.! 1. c. p. 364. Syringodea coccinea G. Donl. c. p. 822. Rara magis divaricati et folia sprepius breviora rigidiora quam in praecedentibus. Scpala in sectione latissima. Cor. cocci nece 8-xo-liueares. (v. s. c. et sp.)

/E. *ecliflora*, floribns 6-8 lin. longis. E. echiiiflora Andr. heath, t. 260 I. odd.! bot cab. t. 364. K. glandulosa Wendl. eric. fasc. i3. ic. non 1%uub. E. ostrina Lodd.! bot. cab. t. 121S (cor. tenuioribus). E. pulviniformis Salisb.! 1. c. p. 364. Syringodea echiiiflora G. Don 1. c. p. 822. S. pulviniformis ejusd. 1. c. p. 823. et S. ostrina ejusd. 1. c. p. 824 (v. s. c. et sp.)

* *Archeria* (Andr. heath, t. 3), foliis 4-6-nis, inflorescentiâ irregulariter axillari v. subumbellato-terminali, calycibns ferè E. coccineae, corolla subinflato-cylindrica puberula, antberis muticis, ovario cylindrico (sec. hort. kew.) tnrbinato villoso (fide specim. hortens.). E. Archeriana Lodd. bot. cab. t. 1466 (vix eadem). Syringodea Archeriana G. Don 1. c. p. 822. Hybritiae plnres ex E. coccinea? et Evanthe quicindam ortae (v. s. c. form, plur.)

* *Rollinsonia* (Bedf. bort. eric. Wob.'p. 21), eadem corollis calycibusque glabris, corollis subliimbatis. Syringodea Rollinsonia G. Don 1. c. p. 826. (v. s. c.)

• ** *sanguinea* (UMf. borl. eric. Wob. p. 22.), ab E. coccinea differt sepalis brevioribus glabrioribus, corollis brevioribus et staminibus inagis exsertis. E. sanguinea Lodd.! bot. cab. t. 86. Syringodea sanguinea G. Don 1. c. p. 824. Forte ex E. coeined et E. grandiflora? (v. s. c.)

'I Ovario glabro.

67. E. TURPUREA (Andr. heath, t. 81), foliis linearibus erecto-patentibus incurvis rarius squarrosis, floribus laxè verticillatis, bracteis linearibus subremotis, sepalis è basi latiore lanceolatis .tuminatis glabris subviscosis, limbi laciniis latis obtusis v. vix acutis, genitalibus vix evserlis.— in montibus prov. Cape et Stelleubosc à Cape town ad Hottentots Holland. (Nivcn , Lurched n. 455, Sieber n. 80. Drege n. 7706. etc.). E. purpurea Wendl. eric/fasc. i5. ic? E. phylicifolia Salisb.! 1. c. p. 364. E. formosa AnJr. heath, t. 114. E. Salisburia Andr. heath, t. 288. E. pinea purpurea Lodd. bot. cab. t. 1259. P. aeutifoira Darll. inlinnapi'i 7. p. 65i?E. rigidiuscula Wendl.exKlotzsch, iuliima

9. p. 647? Syiingodea pnrpnrea G. Don 1. c. p. 823 et S. Salisbuna ejnsd. 1. c. p. 822 Habitus fere £. coccinea; calycihos etoxauo diversa. Cor. purparea 8-10-lmeaiis. (v. s. c. et sp.)

fi. argentiflora, flonbns albis Ad Fiansche-boek alibique piov. Stellenboscb (Niven) *h* *argentifloia* Andr. heath t 20a. Syiingodea *argentiflora* G. Don 1 c. p 822 (v. s. c. et sp.)

68. E AUHEA. (Andr heath, t. i53, 204), fblis longè linearibus erecfo-paten-tibno lucurvis, iloribus laxiuscale veiticillatis, sepnlis e basi brevi latâ snb-membranaceâ longè lineare-acnminalis, coiollis clavato-tubulosis incurws glabiib subviscoiis, limbi lacinns late ovatis obtusis, genilalibus \ix e^sertis.—in inontibus Koodesand piov. Woicester (Niven) et in mont. Diakenstein prov. Stcllenbosb coulimbus (Drege). £. *grandiflora* bieifolia Wendl eric, fasc. 7 IC. Syiingodea aiuea G Don 1. c p. 822. "Vix ab *K.* purputeâ fohis longionbus et calycibas differt Flores etiam sxpiüs majoies aorei nee purpurei. (v. s. c. et sp.)

£. *Discosissima*, sepalis brevibus breviter aenminatis, corollâ viscosiore In Fransche Hoek Kloof (Masson) (v. s sp. 00 in in. à el Lee.)

69. £. GRANDIFLORA (Linn £1. sappi. p. 2a3), fobis longè lineaibus biibeiectis, floibus laxe verticillatis, bi.ictesis hnearibus. bubremotis, sepalis e basi lalâ longe acuimnatis subfoliaceis glabiis, coiollis clavato tubniosis incuiMs glabris 6nbviscosis, limbi liuniis lato-ovaUs acatiusculis, gemtahbus longe exsertis —in colomâ Capensi (Masson). E *giandiflora* Andr. heath t 1(7 Bauei icon. Lort kew. t 8 hot. mag. t 189 Lodd.¹ bot. cab t. 498. E. *grandiflora* longifolia Wendl. eric. fasc. 6. ic E. stnetifoha Klotzsch! in linnseat 9. p_h t>46. Syiingodea *giandiflora* G. Don 1 c p. 822. Monbus majoiibub (ultiapollicanbus) ct stamibus constanter exsertis ab E. parpnrea parum diversa. (v. s c. et

70. E. HIBBERTIAITA (Andr. heath, t. 118), fblis incarvo-erectis rigidis im-bricatis, flonbas ad apices ramoinm subverticillatis pedicellatis, biacteis line^ribus remotis, sepalis lanceolatis obtusis n'gidis obtuse cannatis glabiis viscosis, corollis visco^issimis olavato-tnbulosis subincarvis, limbo ejecto con-nivente.—ininpiba* edilis ad flura. Zondereinde prov Swellendam (Niven). E Ilibbeitiana bot. mag. t. 1758. Syrigodea Hibbertiana G Don 1. c. p. 822. Ranii crassirigidi. Folia 2-3-lineana, v culta longiora. Pedicelli ciassiusciili, foliis longiores. Gorollae i5 lin. longae, basi lubrae apice viudeb. Habitu fere Bactridii -ed ovaiiuni sessile (v. s c. et sp.)

71 ? E HESSEANA (Wendl ex Klotzsch' in hnnaea 9. p. 634), foliis 4-5-nis elliptico-hnc.tubiis obtusis rigidis glabris, flonbns brevitei pedieellatis, biacteis approximatis, sepalis crassis lauceolatis carinatis, corollis subincuiio-clavatis glabiis viscosis, ovario glabio v. vix pubeiulo?—ad piom Bonae-Spei (Hesse). Specim. mancura vidi cuius inflorescentia potius E\anthem icferre videtai et vix nisi folns 4-nis et pedicellis brevioribus ab E transparent^ diversnm, cl. Klotzsch tamen in herb. Wendl. inflorescentia in lateralem vidit. (v. &. sp. in herb. reg. Berol)

Sect. xiv. EVANTHE *Salisb.* — Syringodeae sp. *Don.*

Inflorescentia teiminalis Tloies solitaui v. 3-4-<i-. Coiolla clavato vel subin flato-tubulo^a recta v. saipius incuiva. Ovarium sessile, glabium v. minute puberalum, 4-loculare.—Folia 3-4-na, ranssime 4-6-na.

* *Antheris aiistatis*, *corolla tubo tenui*, *bracteis par* *vis v. remotis*.

72. E. UHRiA(Andr heath, t. 149), foliis 3-nis lanceolatis linearibus glbris v. glanduloso-pubescentibus, floribus snbsolitaihs, sepalis ovalis oblongisve subeneivibus vi&coso-pubescentibus.—in coloniae Capeusis piov. austialionbus. E. decora Salisb ' 1. c p. 354. Ramuli flonfen bieves, versus apices lamorum congesti secundi. Coi 12 i5-lin, basi rubio-puipureA v. sangnineA, limbo erecto v. vix patente viridi.

- a., caljana*, (bins subglabus lucidis, calyce acute 4-angulo, sepabs ovatis
eneivibus rubentibns apice multi&tnatis E UbiiaAndr I c (v. s. c et sp)
/?. *Ewerana*, loins viscoso-pubeiulis glabrat&ve, talyre subtetragODO, se-
pahs lanceolato-ovatis, nervo lato obscurō percursis, margine late \11en-
tibus viscoso-pubescentibus pilosisqne, coiollis viscosissiniis.—in piov.
George (Pcklon, Diege n 7713). F Uhna pilosa Andr beatb t 150. E.
Uhiid Wendl eric fasc. 18. ic Lodd hot cab t i3o3 et 1992 E.
JweianaDryand in An hoit. kew. ed. 2 v 2 p 368 Syiingodea Lwe-
rana Don 1 c. p 8i3. (v. s c et sp)
- y. densifoha*, folns subglabnsIncidis, calycibus vix 4-gonis, sepal is lanceo-
latis subtus hneā inbrā sulcatis glabns v. maigimbus apicp pnbernlis. E
densifoha Willd spec pi. 2. p 35q Synngodea densifolia G Don I. c.
p. 82i (v. s. sp. in heib. leg*. Berol.)
- 7 3. E. WENDLANDIANA (Klotzsch' in linnseā, 9. p 652) , foliis 3-ni\ lineanhus
patentibns pubernlis, flonbus bubtciris, sepal is e basi lanceolatā lineanbus ,
coiollis clavato-tabulosis subincurvis pubeiulis, ovauo apice capitato-dilalato
minute pubeiulo. — pi ope lulbagh piov Worcester (VJundt et Mairc) Kami
divancato-ilexusi. Folia i-lin Corolla 8-10-bn Sepala 1 j hn (v. s. sp. in
herb. reg. Berol.)
- "4. E CRUENTA (Sol ' in Ait bort. kew ed 1. v. 2 p. 16), lamulis puberulis,
fobis 3-4-nis lineanbus patentibns glabris v junctionbus pnberulis, bepalis
ovato-lanceolatis acuimnatis glabris, corollis clavato-tobulosis incurvis glabns
limbo concolore —in moniibus prov Swell en dam (Niven, Bnicbell n 7580 ,
7928, Ecklon, etc). h trnenta Banei ic hort. kew t i3 Andr heath. t no.
Wendl eric, fasc 4 ^{1C}- Lodd.¹ bot cab t. i656 E melbflna Salisb.! 1 c
p. 354 Ramuh flonfen saepūs brevibsimi uniflon , foliis paucis onusti, inter-
dum buppeduncnhoi mes secūs ramos racemosi Cor. sanguinea 9-10-lin. (v. s.
c. et sp)
- J2. *lucida*, foliis calycibosqe nitidis, floribos ad apices ramorom sabternis
nee raceroosis F concinna Drege ' pi. exs non Ait. (\ s sp)
mutabihs (Andr beatb t 176), ramis suberectis viscoso-pubeiulis gla-
bnsve, iolns 4-ms recuivo-patentibus linean-convexis longe glanduloso-
cihati, flonbub longe pedicellatis umbellate 2-3-nisve, sepalis lanceolatis
giandaloso-ciliati!), coiolla; gLbiac tubo &ubclavato-cylindriico subincurvo,
limbo recurvo-patente, antheris an&tatis submutitibve, ovario glabio v.
villoso —E mutabihs Lodd ^T bot. cab t. 46, bot. mag t 2348 non Salisb.
Syringodea mntabibs G. Don 1. c p. 824. Cor sangninea v. pallida 8-10
lineans. Yerosimibter ex E. ciucnta et E. ITivemā orta (v s. c.)
- j5. E. CBLOROLOMA (Lindl ' bot. rcg i838 t. 17), ramnlis glabiis, foliis 3-4-
ni& rigide lineaiibus ereclis \ apice sqnanosis obtusis glabiis, flombns ad
apices lamorura subtemib, sepal is e basi ovata lincan-acuminatis glabns,
coiollis clavato-tubnlosis glabua vix incuvis apice subcontiaclis limbo disco-
lore — ad Bosjesman's nvier piov Albany (tcklon et Zeyher, Diege , etc.) E.
Dregeana Klotzbcb'inlinnaea 12 P 5oi Aff. E. truentap I olia ngidiora Kami
flonfeii lougiores foliati. Cor. 7 8 bn. subrecta?, junioies pruinosaes, tubo basi
coccineo, apice hmboque paivo vnescente. (v s. c in berb. Lindl. el sp. _m
herb. leg. Berol et Waid)
11. *Antheris aristatis*, corolla tubo tenui, bracteis caljci approximate subsepali-
formibus "
76. E DISCOLOR (Andr heath t. 160), foliis 3-nMineaiibus glabus v jnnio-
nbns viicido-pubeiulli), floribus subternis, sepalis olati& acutis v. breviter
acuminatis-cannatis glabns \ margue pubescenti-ciliatis, corollis clavato-
tubulosis mcui vis glabris.—ill prov incus austro-occidentalibus commuois E.
discolor Wendl enc fasc. 5. ic Lodd. bot. cab t. 1493 E. cnpiessifoimis
Salisb. l.^c. p. 354. E' difnsifloia Drcgc' pi. exs. non Willd. Synngodea dis-

- color G. Don 1. c. p. 8a3. Rami conferli densè folio.si. Folia f %-2-lin. Cor. IO-I2 lin. louga, caruca limbo viresoente. (v. s. c. et sp.)
- jfi. puberula*, foliis calycibusque puberulis.—in Atlaquas Kloof prov. George (Mundt et Maire). (v. s. sp. in herb. rcg. tterol.)
77. E. STKCIOSA (Andr. heath, t. 10s), foliis tcrnis liuearibus glabris v. junioribus viscoso-puberulis, (loribus subteinis, sepalislanceolatis acnlis v. breviter acumiiatis carinatis glabris v. margine puberulis, corollis clavato-tubuosis incurvis glabris.—in prov. australioribus ad Kaimansgat (Mundt et Maire, tfur-chell n. 5i(>o, 5169, 5731, 5926). Syringodea speciosa G. Dqn 1. c. p. 824. Afinis £. discolori at constauter distincta videtur sepalorum formâ. Corollas majores, 12-14 lin. longa?, basi rubrae, apice vircscentes. (v. s. c. et sp.)
- (*I. hineila*, foliis junioribus viscoso-pubescentibus. E. hirta Andr. beatb. t. 165. Lodd.! bot. cab. t. 111G. non Thunb. Syringodea hirta G. Don 1. c. p. 8a3. Knowl. floral cab. t. 29. (v. s. c. et sp.?)
- y. calycina*, sepalis latis canescensibus, corolla minus clavata niagna. E. speciosa Lodd.! bot. cab. t. 5j5. An hybrid a hortensis? (v. s. c.)
78. £. HEBECAKYX, foliis ici'i'm lioearibus latiusculis puberulis, floribus snbternis, sepalis lato-ovatis obtusis v. vix brevissijmc; acuminatis undique toraeutosis, margine cilia to-pilosis, corollis clav.jto-fubulosis incurvis vis glabriusculis viscosis.—in colonia Gapeusi (Mundt et Malic). K. speciosa et toruentosa Klotzsch! in linn sea 6. p. 656. E. discolori et E. speciosae afiinis, sed sepalorum forma distinctissima, nisi omnes pro unius specie varietaates baberes neglcctis sepalis (v. 3. sp. in herb. reg. l^erol. et Hook.)
79. E. VIHESCENTS (Link enum. 1. p. 359, ^{n o n} Tbunb.), foliis 3-4-ois linearibus pilis longis bispidis, iloribus hubteruis, sepalis è basi anguslè lanceolatâ Jinearibns foliaceis hirtis, coroliis reclis clavato-tubulosis viscosis.—in Attaqaa.s Kloof prov. George (Masson, Muudt et Maire). E. viridescens Lodd.! bot. cab. t. i33. E. hirta viridiflora Andr. heath, t. 166. E. unicolor Wendl. eric. fasc. a5. ic. Syriugodea virescens G. Don 1. c. p. 825. Folia 3 lin. longa, laxiuscnla*. Flores demù pendali. Gorollx virides 8-10 lin. longse, limbo bievi subpa tente. (v. *. c. et sp.)
- t t -dntheris aristatis, corolla tubo ampliore rectiore apice subcontracto, limbo socph obi 1 quo. — *Folia quaterna. Flores flan.* Cerantbe Salisb.
80. E. ABIETINA (Linn.! spec. p. 506 nou Berg.), foliis linear-iilifonnibus glabriusculis densè fasciculatis, floribus in ramulis solitariis secûs tamos subspicatis, bracteis linearil>ns approximatis, sepalis k basi latiusculâ longè linearibus, corolle glabrae tubo aruplo subinflato-cylindrico apice constricto, limbo brevi apice reenro deniùn revoluto.—in bum id is prope Cipe False prov. Stellenbosch (Niven, Patlersou), in montanis ad Kleinrivier prov. Swellendam (Ecklon et Zeyher). E. Patersonia Audr. heath, t. 181, a'28. Wendl. eric. fasc. i. ic. Lodd.! bot. cab. t. 1727. E. spissifolia Salisb.! 1. c. p. 355. Syringodea Patersoni G. Don 1. c. p. Sa5. Rami longi pyramidato-spicati. Folia 4-6-Iiu. Cor. 9-12-lin. Ha? species enm sequentibns 4 à cl. Klousch inter Scolioslomlibos enuuieratz cl. Salisburio seclionem propriam constituunt sed typns parùm differre videtur ab illo E. versicoloris, necnon aliarum sectionis Evanthes. (v. s. c. et sp.)
- Hi. E. FOLIACEA (Andr. heath, t. a63), ramis virgalis, foliis hrcvibus linear-iinonis erecto-patentibus glabris, floribus subquaternis subsessilibus, bracteis linear-i-carinatis approximatis, sepalis ovato-lanceolatis carinatis accminatis glabris, corolla; tubo subinflato-cyliudiico subincurvo glabio apice constricto, liubo brevi erecto-patenle. — ad ostium flum. Klynrivier prov. Swellentlam (Masson, Niven) et Palniet. rivierprov. Stellcubosch (Ecklon et Zeyher). Syringodea foliacea G. Don 1. c. p. 825. Ifabitu E. versicolori approximatnr, sed rigidior minus ramosa; folia breviora densiora. Corolla flava fere E. nauu* sed luinùs inflata tenuior. (v. s. sp.)
82. E. SACCIFLORA (Salisb.! 1. c. p. 355), foliis rigidè linearibus clecto-patenti-

bus glahris, floubiu biovissinie pedicellatis solitarfts, bracleu par **VIA** sabiemotis, sepal is lato-ovatis margine bcaftosis carmatis hrcviter acumiutatis glabris, *coioUae tuho ainpllo inflato cylndiico* incur vo glafoio, Jim ho hicvi npice i<- uitvo —in coloni Cipensi (Masson). E episioinu Lodd bot. cab t. ll8t). Synngodca epistoraia G Don 1 c. p 824 et S. sacufloria ejusd 1 c p 8a5 Siraili^ £ nanae nisi folia bieviou, bractae lineaes et coiolluc paurn brevioies. (v. s. c. et sp. in heib. Banks)

83. £. NANA (Saliib.1 1. c p. 355), humihs, diaricato-rainosissima, foliis tigide lincaubus ercto-incuvis patentibusve glabns, floribus suhtemis, btactcis appioxunatis, sepalis ovatis atanosis tariuatis brevitei acaminatis gldbu's, coiollc tubo amplio anhmilato-cylindrico submcuivo elabio, limbo brevi a pice lerui vo.—in alpinis Hottentots holland (Roxburgb, Niven, Patetson) E. naua Wendl. euc fa^c. 25. ic E depiessa Andi heath t 17 no 11 Linn Sjnnngodea nana G. Don 1. c. p. 824. Kami breves duri tortuo&i Folia *i-i I'm* longa Corolla lutea 10-ix-Imeaiis (v. ss. r et sp.)

'¶¶¶¶¶ *Anthem muticisv brevissune aristatis, bracteis calyci approximath*

84. E. SEHRTIFOLIA (Andr. heath t. 44), fohis 4-nis lineaaii-caiinatis cilialO" serratis pitentibus glabiis, llouibub bievitei pedicllatis snbsohtains, bracteis lineaui-lanceolalis subiemotis, sepalis. e basi latioie lanceolato-acuniinatis glabris, corolbs subiuflato-cylindriij, glabns. — Hab .. h senatifoha Lodd. hot. cab t. 1703? E. cyhndiiflora Sahs»b! J. c. p. 356. Syiingodea senatifolia G. Don 1. c. p 820 Aft * veisicolon et E. nanae, ct tam habitu quam corolla; formâ intei |||AS feie media, an non bybida hortensis? Coi. flava basi pubescent, (v. s. c.)

£. calycibn5plumoso-cill.itis. E. plumosa Wendl eric. fasc. ia. ic non Audi.

85. E. VLRSCOLOR (Andr. heath t. 47)1 folns teinis lineaibus elhplicisve glabiis v. junioibus pubeuhs sublucidis inagine ciliato-seirdJii nudisvc , floiibas sabbessilibus subteinis, <iep.dls lanccolato-ovatis cannatis lineaui-acumiinatis coloratis, corollis clavato-v. subin/lato-tubulosis rectij. incuvisve glabiis —in mpestiibus piov. Swellendam et Stellebosch austr. vulgaiib. Kami sticti I loies electi Corollae coccincae, lateit 1a? v. loseae, snpernè sapius flavescentes v. viiescentes», 9-12 lin. longac.

*. *subnuda*, fohia inagine nadis\, vix cihalis, corollis ecostatis. E. versi- coloi a. Q et y Salib.! 1. c. p. 153. E veisicolor Wendl. euc. fasc. 11 ic. Lodd. bot. cab. t. 208, 13IO. Syringodea versicolor G. Don 1. c. p. 818* (v. s. c. et sp.)

£ *major* (Andr. heath t. 24q)1 omnia var. a. nisi flores majores. E. refnlgens Andi heath t. 284 E refnlgeus «longifoha Klotschi in heib. ieg. JBe- 10I Syiingodea lefulgens G. Don 1 c p 818 (v. i. c. et sp)

y. *costata* (Salisb.! 1. c p. 354) 1 folus bievioilbns latioribus margine cihalo- seirali* apice &quano&is, corolhs costatis. E. costata Andr. heath t. i3. a56 E. \eisicoloi cihata Wendl eiic. fasc. 20. ic Syiingodea costota G. Donl c p. 818. (v. s. c. et sp)

86. F. niciinus (Spreng syst ». p 179), foliis 4-njs hneaiibuj. obtusiascnhs subtùs hirtis, floibus *ub-4-nis pedicellatis iuberettis, sepal is lanceolatis longe acumiutatis coloratis, coiollis clavato-tubnlosjs iiibmturvis glabiis •_i_n inontibns Attaqiaas kloof prov Geoige (Muudt, Diege (7716), ad Plappel Kraal (Niven). t. bicoloi Andr. heath t 54. Lodd bot cab. t 1001 non Ihunb. E dichromata Lodd. bot. cab. t. i^ii f quadiiilora Klotzsch' ialiameå y. p g^^ Sytingodea dichrus G. Don 1 c. p. 818 E lefulgens brevifolj 1 Klolzsch! m herb reg. Berol. Ab. E. veihitoloi folns bievionbub \illoioibus, pedicellis longiobus, floribus sajpius minonbns, et anthetis pleinmque bievioibus diversat (v. s. c. et sp)

87. E. TRAwrARESs (Andr heath, t 296), foliis 3-nis lato-linearibns rigidjs glabris, lloubus peditellatis i'lbtcinis pendnlis, sepalis lato-lanceolatis obtasis cannatis rigidis, coiollis (lavnfofubulosis inunvis glabiis uscosis —in Lange Kloof piov. George (Ecklon et Zryher); ad ilum. Cam tour, Nhen (Drege

- n. 7714)* E. transparens Lodd. bot. cab. t 117. E. diapbana Spi ! syst. a. p. 17&. Syringodea didpbana G Don I.e. p. 818. Folia 3-3-lin. Pedicelli 3-4-hn. lecarvi. Cor. 10 ha. longa, rosea , transparens , limbo alhovirescente (v. s. c et sp.)
88. E. PELLUGIDA (Andr. beatb. t. x83), tota pihs apice glandulosis viscosa , 1a- mis hispidis, foliis 4-uis patentibus linean-convexis obtusis glanduloso-birtis , floiibus 2-5-nis pedicellatis, sepalis lineanbns foliareis ciliato-hispidis, corolis clavato-tubulpsis incarvis subcostatis glabris v. spaise glaoduloso hirtis.— in prov George Albany et Uitenhage vanis locis (Niven, Mundt, Drefße, Burchell, Ecklon) Facile pdis glandulosis dignoscenda Sepala 1 |-i| lin. basi raro latiora Biactae brevioreset conforuies. G01. 6-9-lin. alba v plus minusve rubescens, pellucida.
- A. *exposita*, foliis brevionbns patentibns, sepalis parvis E. exposita Lodd ' bot. cab. t. i5ai. E. pellucida tabia Andr heath, t. 277. I*, pellucida tenera Klotzsch! in liunaeā 9. p 676. E glandulosa Thunb. diss Syungodea exposita G. Don 1. c. p. 826 et S. Bedfordiana ejusd 1. c. p. 819 non p 821 (v. s c)
- /?. *media* (Klotzsch ' 1 c), foliis longionbus minūs patentibus, sepalis raa- joiibus. E pellucida Audi, beatb t. 18J. Lodd. bot cab. t. 276. Syiingo- dea pellucida G. Don I c p 818. (v s c)
- y. *exsudans*, foliis var /£., corolla seahsque majonbus E. exsndans Andi. beatb t 216. E. pellucida absoluta Klotzsch' 1 c . (v. s. c. et sp)
- ¶T *hirti/lora*, foliis hispidioribus, corolbsbiitis E exsndans Lodd. bot. cab t. 287? E glandulosa Drege pi. exs. (v s. sp) *
- c? *breviflora*, corollis vix 5 lin longis apice dilatatis glanduloso-birtis. (v. s sp. in beib. Burchell. sub n. 4803)
89. E. INSULSA. (Bedf bort. eric. Wob p 12), foliis ternis, bracteis ajMaressis fo- liaceis, corollis mcurvo-cylindricis, bmbi laciniis cihatis, stylo^Bhxserto. Hab.... Syungodea insulsa G. Don 1. c. p. 818. Cor alboviridis. Spec valde dubia.
- t t t t t dnhens muticis *v brevissimè aristatis, bracteis minutis Del à calyce remotis.
- 90 ? E. OBLONGIFLORA. , foliis sub-4-uis ellipticis sublineaiibasve brevibns ligidis glabiusrulis cihato-serrulatis, flonbus pedicellatis sub-4-nis pendnlis, brac- teis hneari-lanceolatis snbiemotis, sepalis lato-lanceolatis obtusis carinatii n- gidis_y corollis oblongo-tubulosis snbmflatis glabris, limbo brevi erecto. — in colonia Capensi (Bowie). Habitus feie E. transpaientis sed cor. vix 5 lin. longa An Igitur ad brevifloras amandanda ? sed cum nullis eamm affQms videtur. E decuirensKlotzscb' in beib. Berol prope Rbinoceros-fontein ad Scb,istianbay lecta buic si mil is est, sed diffeire videtur antberis anstis longe decurrentibas appendirulatis : specimen tamen mancum (v. s. sp. in herb. Hooker.)
- 91 E BURCBELLII, foliis 4~nis sabulato-lineanbus pilis longis ciliato-hispidis , floribos sohtariis snbssilibus, bracteis minimis, sepalis è basi latiore longe lineanbas , corollis tubulfso-clavatis incarvis, anthers e fance exsertis corollâ brevioribua. — in prov. George et Albany? Folia fere E. virescentis 3,-6 lin. longa. Cor. E. curviflorse.
- a., *glabriflora* , corollis glabris, sepalis 3 lin. longis. B arch ell n. 60a3. (v. s. sp. in herb. Banh)
0. *hirtiflora*, corolhs hirtis, sepalis 1-2 lin. longis. In terrâ Houtniquas (Niveu, Burchell u. 5738) (v. s sp. in herb Buich et Linn, soc)
93. E. SULCATA, foliis 4-ms lato-hneaiibus plams snbtùs solcatis, supenonbus margine longe ciliatis, floiibus solitariis subsessdibus, biacteis seahformibus, subrcemotis seahsque minimis lato-ovatis ciliatis, coiolhs tubuloso-clavatis incurvis, antheris e fauce exseitis corolu bievionbns.—in colonia Capensi (Niven). Habitus E tubiflorx sed sepala vix ^ lin longa , mtra folia snprema occulta. (v s sp. comm. à Linn soc. *Lond)

91. *£. coNsricuA* (Soland. in Ait. hort. kev. ed 1. v. 2. p. aa), foliis 4-nia linearibus carinatis glabris pubescentibus villosisve, floribus subsoliiiaiiis brevissimè pedicellatis, sepalis ovatis oblongisve obtusis luoidis glabris hirtisve, corollis longè clavato-tubulosis incurvis undique pubernlis villosisve rariùs glabris.—in montibus prov. Stellenbosch Swellendam et George. Inter formas sequentes quoad vest it um diversa, facile calycibus recognoscenda. Corolla: 9-20-lin., saepius i5-i8-lin., rubrofuscse, lutescentes v. sordidx.
- et. glabra*, tota corollis inclusis glaberrima £. longiflora Andr. heath, t. 232. Lodd. bot. cab. t. 983. (V. S. C.)
0. *splendent* (Klotzsch ! in linnaeag. p. 671), sepalis foliisque lacidis glabris, corollis pubescentibus. £. conspicua Bauer icon. hort. kew. t. 12. Andr. heath, t. 12. Wendl. eric. fasc. 4. ic. Salisb.! 1. c. p. 359- £. elata Andr. 1. c. t. 112. Lodd. bot. cab. t. 1788. £. splendens Wendl. eric. fasc. 8. ic. non Andr. £. laniflora glabra ejusd. fasc. 19. ic. Syringodea conspicua G. Don 1. c. p. 820 et S. splendens ejusd. 1. c. p. 821. (v. s. c. et sp.)
- y. *lanata* (Klotzsch ! 1. c.), sepalis glabris lucidis, foliis corollisque villosis. £. lanata Wendl. eric. fasc. 5. ic. non Andr. K. verticillaris Salisb.! 1. c. p. 360 (forma bieviflora). £. longiflora Salisb! 1. c. p. 359 (forma longiflora). Syringodea lanata G. Don 1. c. p. 823. (v. s. c. et sp.)
- £*laniflora* (Klotzsch ! 1. c.), foliis, sepalis corollisque villosis. E. laniflora Wendl. eric. fasc. 2. ic. E. sordida Andr. heath, t. 191. Lodd. bot. cab. t. 1973. E. floccosa Salisb.! 1. c. p. 360 non Bartl. Syringodea sordida G. Don 1. c. p. 820. (v. s. c.)
94. £. FLAMMEA (Andr. heath, t. ?3), foliis 4;nis linearis-trigonis tenuibns brevisbusglabris, floribus subsolitariis breviter petiolatis, sepalis lanceolatis acatissmis lucidis subcaricatis, corollis clavato-tubulosis incurvis, tubo glabriuscule, limbo extus brevissimè puberulo, antheris tubo inclusis. — in montibus prov. Stellenbosch (Masson, Ecklon et Zeyher). £. bibax Salisb.! 1. c. p. 358. Syringodea flammea G. Don 1. c. p. S19. Foliis et corolla formà E. curviflorae et £. buccinacformi siruulis; sepala 3 lin: louga subglumacea. (v. s. sp.)
95. £. IGITESGENS (Andr. heath, t. 27), foliis 4-nis linearibus glabrinsculis, floribus solitariis brevissimè pedicellatis, sepalis è basi latiore lanceolato v. linear! acuminatis margine plerumque ciliatis, corollis clavato-tubulosis incurvis basi glabris v. vix puberulis, limbo exlus pubescenti-hispido.—in montibus prov. Stellenbosch. E. ignescens Wendl. eric. fasc. 8 et 20. ic. E. tubiflora Linn.! spec. p. 505. Thnnb. diss. n. 3i non altor. E. tubiflora * Salisb.l 1. c. p. 357. E. cuspidigera Salisb.! 1. c. p. 358. E. procera Wendl. eric fasc. 17. ic. sec. Klotzsch non Salisb. Syringodea ignescens et S. procera G. Don 1. c. p. 8aoet S. cuspidigera ejusd. c. 1. p. 824. Folia et flores sscpis majora quam in E. curviflora cui similis, corolla (11-13 lin.) limbo longiore laciniis acutioribus, basi ignescenti-rubrâ, apice pallidâ. (v. s. c. et sp.)
96. E. CURVIFLORA (Thunb. diss. n. 30), foliis 4-nis linearis-trigonis tenuibus glabris subciliatisve, floribus subsolitariis breviasimè pedicellatis, sepalis è basi ovata lanceolato-v. linearis-acuminatis brevibus, corollis clavato-tubulosis incurvis glabris, antheris è fauce corolla? subexsertis.—in montibus prov. austro-occidentalium vulgaris. £. curviflora Linn.! Salisb.! aliorumque ex parte. Wendl. eric. fasc. 3. ic. Lodd! bot. cab. t. 1663. E. simpliciflora Willd. spec. 2. p. 40a et anct. ex parte. E. fastuosa Salisb.! 1. c. p. 359. Synonymia E. ignescensis, E. curviflora et E. bucciniformis hie corollarum vestitura duce Klotzsch separatarum, valde confusa est, nee species ipsae facile distingnendae inter formas numerosas tam sylvestres quam excultas. Folia in omnibus tenuia 1-2 v. rarius 3 lin. longa, nunc erecto-imbricata nunc patentissima subsquarrosa. Ramuli glabri v. dense villosi. Sepala vix 1 lin. nunc ultra 1 | lin. longa, acumine angustiore v. latiore, nuda v. margine ciliata. Corolla 8-12 lin. longa?, tenues v. latiusculaj, limbi laciniis brevibus obtusiusculis v. majoribus acutis. Stamina sa?pius limbo suba?quilonia. (v. s. c. et sp.)
97. E. nccicKJEtfORMis (Salisb. 1. c. p. 359), foliis 4-nis linearibus carinatis gla-

bris puberuhsve, floribus solitariis brevissimè pedicellatis, sepalis è basi ovatâ linearî-v. lanccolato-acurauatis cariuatis, corollis clavato-tabulosis i near vis nndiquè pubescenlibas villosisve, antheris è fauce corolla? sabexsertis.—in montibas prov. anstrn-occidentaliuni cum K. curviflorâ communis. E. curviflora Linn.! Salish! aliornmque ex parte. E. simplicilora Willd. ex parte. E. curviflora Andr. heath, t. 16 et t. 211? E. simplicilora Wendl. eric.fasc. 17.1c. Syringodea buccinaeforunis G. Don 1. c. p. 824 et S. carviflora ejusd. 1. c. p. 820. In omnibus, practer corollae vestitam, E. curviflome siinilis et forsan ejas varietas. (v. s. c. et sp.)

98. E. SULPUREA. (Andr. heath, t. 241), ramis piloso-hirtis, foliis 4-nis linearisabtrigonis pubescenti-hirtis, iloribas solitariis hirtis hrevissimè pedicellatis, sepalis ovato-lanceolalis pilosissimis, corollis clavato-tubulosis iucurvis undiqè birsntis, anheris è fauce subexsertis.—in coloniae Capensis prov. austro-occidentalibas (Roxburgh, Mundt). E. snlfurea bot. mag. t. 1984. Lodd. hot. cab. t. 1762. E. stagnalis Salisb.! 1. c. p. 35Q. Syringodea sulphurea et S. stagnalis G. Don 1. c. p. 819. Ab E. baccinxformi facile sepalis distingaenda. Herba etiam hirsotior. Corolla flava 9-10-lin. (v. s. c. et sp.)

99. E. Tum²LORA (Willd. spec. 2. p. 403), foliis 4-nis linearibns planis v. mar- gine revolutis ran' us subtcretibus dorso sulcatis villosis, floribns solitariis brevissimè pedicellatis, sepalis è basi angustè lanceolatâ lorigè foliaceis dorso snlcatis, corollis clavato-tubulosis incurvis undiqè pubescentibus villosisve.— in prov. Cape et Stellenbosch communis. 1f. tubiflora Bauer, icon. hort. kew. t. 28. Andr. heath, t. 46. Wendl. eric. fasc. 4. ic. et auct. recent, non Linn. E. tubiflora (6 Salisb.! 1. c. p. 35§. E. coccinea Linn.! herb, nort ejusd. spec, ed. x. et vix ed. post. E. sordida Dregc! pi. exs. non Andr. Syringodea tubi- flora G. Don 1. c. p. 8'io. Folia et sepula saipè raarginibus non omnino revolutis paginani inferiorem canescentem ostendunt. Sepala 3 lin. longa foliis semper plus minuavc conformia. Cor. coccinea circiter pollioaris. Ex hâc spe- cie v. E. curviflorâ et E. ventricosù hybridje hortenses numerosx jam ad finem centennii ultimi ednctae sunt, quarum pi ares ad calcera sabgeneris Syringodeae enumerantur. (v. s. c. et sp.)

100. E. PERSPICUA (Wendl. eric. fasc. 1. i c), foliis 4-nis angustelineari-trigonis pubescentibus hirtisve v. demuin glabratis, floribns 1-3-11 is brevissimè pedicellatis, sepalis è basi ovatâ membranaceâ longè linearî-acuinatinis, corollis subclavato-tubulosis parum incurvis undiqè pubescentibus villosisve, antheris tnho inclusis.— in montibus Kleinrfvier prov. Swellendam (Masson, Niven, Ecklon et Zeyher). E. perspicna Andr. heath, t. 23o? non hortul. angl. E. litaiflora Salisb.! 1. c. p. 356. E. Linnseana Andr. heath, t. 75. Lodd.! bot. cab. t. X02. Syringodea Linna?aca G. Don 1. c. p. 818 et S. litaiflora ejusd. 1. c. p. 820. A prxcedentibus habita distincta etsi var. nonnullarum E. buccinae- fonnis affinis. Ramuli ilorifcri brevissimi racemum elongatum ferè ut in E. coloranti formant. Corollae saepius ierè rectae sub fauce subsconstrictae, 8-10 lin. longae, basi roscae apice v. ferè omnino alba?, (v. s. c. et sp.)

fi. latifolia, foliis latinscale 'Hnearibus rigid is hispidis. Cum praecedente Masson. (v. s. sp.)

* *Hnnccoidcs* (Audi¹, heath, t. 123). E. perspienne similis sed foliis longioribus confertis, floribus majoribus. E. hirsata Lodd.! hot. cab. t. ^54* no¹* Thunb. 11. Linnu»ana superba Andr. heath. t. 218. Lodd.l bot. cab. t. 177H. E. perspicua major Klotzsch! iu linn'så 9. p. 674. Syringodea linnaeoidcs G. Don 1. c. p. 819 et S. hirsata ejusd. I. c. p. 826. Series hybridarnm hortensium inter K. perspicuam et E. colorantem? vel altcram quandam Evauthis speciem eductarnm inter se panlo diversarum. (v. s. c.)

101. E. COLORANS (Andr. heath, t. 209), foliis 4-nis linearî-trigonis tenuibus brevibus evanescente ciliato-hispidis, floribus subqnaternis breviter pedicella- tis, sepalis ovatis scariosis acuminatis carinatis, corollis tubulosis glabris subreclis apice subgloboso-clavatis.—incolonia Capensi (Mundt et Maire). E. colo- rans bot. reg. t. 601. Lodd.! bot. cab. t. 224. Syringodea colorans G. Don 1. c.

p 8ai. Ram! denrè folia 'ti, ramnli floriferi breves secùs ranios racemosi so-cundi. Folia a lin. Cor. 7 JID., diapbann , alba , dein palhde rosea, prope api-cein abiupte inflcta, deia sub limbo bievN&imo constricta. (v, s. c. et sp.)

t t t t t foliis 4-6-nii {an potuis Dasyantlus sp ?).

lua E tmACHiALis (Salisb.' 1 c. p. 367), foliis 4-6 nislato-lineanbns ngidis gla-bns v margine glauduloso-puberulis, floribus pedunculatis fiolitariis paocisvc subteirainaltbus, biacteis fohaieis subapproximatis, sepalis ovatis lato-lançco-latis obtusis, corollis tubulosis aobinfiato-cylindricis sabrectis crassis inlus extusque v iscoso-pubescent I ba s, fi Id mentis dil.itatis anthera mutica vix lon-gioribns, ovano glabro.—in coloniA Capeasi (Nelson nee Masson) (t). Syiin-godea brachialis G. Don 1 c. p. 820 Species pluribas notis singnlaris nee rit cam alia sectione adsoianda. Coiolla 7-8 lin. hiubo brevi eieclo Cap-sula acute 8-costata viscosa glabra, colomella crassa cainosa, 5-valvi* (Salisb), interdum 4-valvis. (R. Br.) Ego nondum 5-valvem vidi.(v. s sp. in lieib. Banks et Hooker)

Species dubice sect. Evanths.

io3. E. FALLENS (And 1 heath t. 1S2), canle huraih, foliis ternis erecto-patentibas linearibus tomentOMS, floribns teuninahbiis 3-6-n>s anbsessilibus, biacteis ap-proximatis, sepalis lanceolatis acuininatis, corollâ cUvato-tubulosd subrectd glabra, anthers inclu&is mutuis.—Hab Synnpodea pallens G. Don 1. u. p. 818 E. Dickensoni Lodd bot. cab. t. 1793? non liedf S ? Dickensoni G. Don 1. c. p. 824? Videtnr E. verucoloii affiuU. Cor. luteo-alba polhcais.

io4> E CTLINDRICA (Wendl enc. fasc. 11. IC. non Thunb ncc Andr), glabia, foliis 3-4 u'" anguste linearibus ciecto-patentibus, floubus termmalibus soli rani bini&ve, bracteis subremotis, sepalis ovato-lanceolatis acutis berrulatis, co-rollâ tubulosâ rectâ basi sabinflatâ snperue contractâ limbo eiecto brevi, an-theiis inclusis maticis, ovano glabio.—Hab. Cor. flava. Nnllam hale ufUnem speciem vidi

io5. £. MERTEITSZANA (Wendl apud Klotzsch inlinna> q, p. 65g), ramnlis pnbe-rulis, foliis 3 4-nii* lineaibus subglabns, floribus terminalibus ternis pedicellatis, bracteis subremotis, sepalis ovatis arummatis puberuhs , corollis clavato-tubu-losis rectis glabris, antheris exseiti* brevi-anstatis, ovatio elliptico bericeo.—Hab.... spec, in beib. Wendl. ex horto quodam Anglicano descr. cl. Klolzsch. I.e.

Sect. xv. CHONA Don.

Inflorescentia terminalis. Corolla angstè tnbulosa, medio inflata, limbo pa-tente. Anthers aristata?, saepius exsertae, diu coharrentes. Ovariam sessile glabrum.—i Folia 4-na. Flores pedunculati.

xo6. E NIVEWI (Andr. heath, t 76), foliis distantibus reenrvo-patentibus li-neari-convexis obtusis gjanduloso ciliatis anstatische, bracteis pa 1 via remotis, sepalis lanceolatin viscosissimis a pice baibatis, corollâ yiscoso-pubescente.—in montibas prov. Swellendam occidentals. E. embothrifolia Salisb.! 1 c p 3^q. G. Don I. c. p 795. Chona sanguinea D. et G. Don I c p. 8x7. Rami longi flexuosi. Corolla tennis, sanguinea , 6-7 lin. longa. (v. s. c. et >p.)

§S. longiflora (Andi. heath, t. 227), corollâ 8-10 lin. longâ. (v. s. c. et sp.)

Sect. xvi. OCTOPERA.

Inflorescentia term in alls Corolla tnbnlosa rectinscula Anthers inclnsae ma-tics. Ovariaui sessile glabrum. Capsula 8-locnlans 8 valvis Folia subsena.

(1) Species Massouianac et Niveiana* » Salisbuno op. cit. nmues citantur uti bpoute in Hottentots-Hollaund nascentc^ Pluics tauicn rerte in mootibus. Roodesaud prov. Worcester *. in HouUiquas ten is prov. Geoige alusque locii longe a Hotttu-tots-Holland distantibus lectap fuerunt.

107. E. U»NCINNA (Solaud.! in Ait. hort. k»w. eil. 1. v. a. p. a3), foliis ungustis lincarihus glabriuficulis, floribns subsesulibus gloincratis, hractcis approximatis, sepalis ē basi ovalā linearibus ciliuto-dcntatiS) corollis puberulis.—in prov. .iistio-ooridentalibus. K. concinna Andr. bealb. 1. 58. Wendl. eric. fuse. 9. ic. K. verM. illatu Rerg. pi. cap. p. 99 non alior. £. palndosa Salisb.! I. c. p. 356. Syringodea concinna G. Don 1. c. p. 8a3. l'olia ciebra 3-4 lin. Flores erecti 7-8 III. longi rosei. Ovurium apice dilataluin concavuai. Capsula ooneavo-ifuncata, angulo extemo crislata, valvulis 8 breviter dchiscens. (v. s. c. et sp.)

Sect. XVII. DASYANTIIILS.—Dnsyanthis et Syringodeie sp. *Don.* — *Coniflora** grandes *Dryandcr cxcl. sp.* — *Iiitcsliiiflornriini sp. Klotzsch.*

Tnflorescentia terminalTM ninbellata v. subcapitata. Florcs sprepiis ceruni. Colla suhinflato-tubulosa, lirnbo brcvi stibcreto v. connivente. Anthra? saepius inclnsiC, inuticic v. aristatsc. Ovarium villosum , saepius villosissimum, sessile. Folia 3-4-na v. subsena. Bractcij scpaliforues, calyci adpiessae.

108. R. BRANHA (Andr. beatb. t. 107 non Salisb.), foliis subsenis patcntibns lificaribus subin<!urvis suprà planis tuargine glandulosis glabriusciliis, floribus laxc untbellatis, scpalis linearibns rigidis, corollis inQnto-oblongis supernè atlenuatis viscoso-pubenilis, limbo brevi recto, iintberis vix inclitis uristatis , ovario obovoidco puberulo.—in muntibus Franschbeuek(Niveti), Dutoits-Kloof (I)rcge). K. blanda Lodd. hot. cab. t. i3. K. inaiiiinosa Thunb. diss. II. 6<) non Linn. E. doliformis Salisb.! 1. c. p. 368. Gallista blanda G. Don 1. c. p. 826 et Syringoduft doliformis ejasd. 1. c. p. 826. Rami strict! dense foliati. Folia 3-ft lin. k^lor*os suepius longiu\$ pedicel la ti quaux in ic. cit. Cor. rosea 5-6 lin. (v. s. c. et sp.)

109. K. MEUAONI, foliis 5-6-nis rigide linearibns rreclo-patentibus breviter ci-lialo-serratis nudisvc, sepalis lanceolatis cainalis puberulis stibciliatis, corollis piibescensibus tubulosis sibinllatis, apice parùm coustriclis, limbo ercclo-pante, antberis inuticis v. brevissimè aiistalis, ovario sericeo-villoso.—in coloni.1 <!apeusi (Mcuron).K. vereennda Lodd. bot. cab. t. 1827 nou Salisb. K. iiietnLe-ilora Klotzsch! in linruca ia:p. 5oi (quoad spec, sylv.) vix Andr. non bot. mag. nee Lodd. Gallisla verecuuda G. Don I. c. p. Hi5. Habitus K. concinna; et colla; similes, sed ovarinui et capsulac distiulissiuia ! vix tamen in speciin. cultis à formisnonnullis bybridis sub non*. E, mctulaifloic distiguenda. (v. a. c. et sp. in herb, licrol.)

210. E. TUMIDA (Ker. bot. reg. t- 65), foliis 4-nis lanceolatis rigidis undiqoè pu-berulis et ciliato-bispidis, floribus suburobellatis cernuis[^] sepalis lanceolatis obtusis pubesceuti-viscosis ciliatis, corollis amplis inflato-tubulosis pubescen-tibus viscosis, aulheris aristatis, ovario villoso.— in Lange-Kloof. prov. Georgu (Thuuberg), in càd. prov. (Mundt. ot Maire). E. spleudens Audr. heath, t. x{o, non Wendl. ftyringodea tumida G. Don 1. c. p. 825. Corolla suhpollicnriti, fulra, valde i a flat a , superne constricta, liinbo brevi erecto-patcote. (v. s. c. et sp. in herb. reg. Berol.)

i n . £. CERINTUOIDES (Linn.! spec. p. 505), foliis 4-6-nis linear!-convexisrigidis erect is recur visque ciliato-bispidis pectinatisve, floribus unbellato-capitntis cernuis , sepalis lanceolato-linearibus his*^*idis , corollis inflato-tubulosis viscidis. liispidis, antberis niinutissimè aristatis v. muticis, ovario villoso.—in collibus à Capetown ad limites prov. Worcester vnlgaris. E. cerinthoides Bauer, ic. bort. Jtevv. t. 3o. Audr. heath, t. 307. Wendl. eric. fasc. 7. ic. bot. inaff. *. aao. Lodd.! bot. cab. t. 1^99. Herb, de lain. t. 108. E. crinifolia Salisb.! I. c. p. 367. Folia subtùs sulcata , longiora et brevlora, sella numerosis pluraosa v. breviter tantùin ciliato-serrata. Cor. mhiac 8-1 a lin., snb limbo brevi constrictaj. (v. s. c. et sp.)

112. E. SpAnMAwwi (Linu.! act. Helm. 177a. p: «4. t. a), foliis 4-nis linearibus rigidis selo'io-hispidis, floribus subquiaternis ad npices raninlorum subsessilibns

cernnis secua ramos subspicatis, sepnis lancolalo linearibus Otoso-bi" » pulissimi*, curollis inflalo-tbnlosis setis Jongis hispidissim, untheris mnticis, ovario ^illoso — in inontibus prov. Geoige er Uitenbat* e E .ispei.i Andi. heatb. t. 104. E. hystileifloia Salish ! 1 c. p 367. E. aunata ^picng syst. 3. p 184 ? non Klotzsch. Dasyanthes Spaiuanni D. et G. Don 1 c p. 82b Calista armata G. Don 1. c. p. 813 ? Coi. 6-7 lin ipsifl-> et setis longis flavidantibus obtecta, apice constucta, limbu luinimo counivenre bubclausa (v. s. c et sp)

n3 E. ELOHGIA (Lodd Lot cab. t 738), foliis 4-ms nblongis Hneaiibnsve brevibus ligidis crassis pectmato-tilialis, flonbns suhqnatcinis snb&essihbos cetnnis, sepalis oblongo-lineatibus lanccolalisvc cannalis pechn.ifo-cilia tut, coiollissubinflato-tbulosis stiigoso-hispidis v glabiul&culis, antheiis muticis, oraiio viloso — in raontibns. prov. Stellenbosch et Swellendam (Ihunberg, Mundt et Maiie, Drejke) E. ceiinhoides y Thunb. diss E tian&paiens Thnnb. fl cap. ed Scbult p 354 non Andi. E stiigilifolia Salish ' I. c p 367 ea. paite F venusta Klorz'cb ' inlinnacà v 9 p 605 non Sill&D) nee Bedf. i-y nngodea ti.insparens G Don 1 c p 818 et S. elongata ejusd. I. c p. 826 Folia i-t Un. C.01. alba 6-7 lin sob limbo parum constricts, limbo neclopate. Vaiiat sepalis latioibus angntioibusve Species à cl. Salihb. in lier bflmin cum E einbescnte confnsa , qaare noiutn Lodiligesianum ctianii poh-teiins scrvavi (v. s. sp)

114. E EnnESCEHs (Amir beatb. t. 1 i 1), foliis {-nis lanreolalis Incvibni ri¹llis era>sis pectinato-ciliatis, floibus subqnaternis bibsessihl)iis ceinuis, 10 pa I is tingmcnlati lito-ovatis cannabis m.ngine scniiosis pertinato-ciliatis, coiollis snbinflato-tibulosis itiigoio-bispidis, anthrii!, arist.ttis, ovauo viloso — in inontibus prov Uitenhage (Niven, 1'cklon et Zeyher, Mnndt cl Maile, etc) I*, reiinthoides H Thnob diss. n. 33 E. pectmifolia Salih. b. 1 r p. JG7. eL t sliigilifolia ejtsd ' 1 c. ex paile Syringodea ernbescens O Don 1 c. p. 819 Foli.i petiolata 1 | lin , floialia nti br.ictae subsepaliformia Cor rnbrac 7-S I>n. bail .itrrenuatsc, sub lnnbo bicvi p inim <ons.rücr.Tj I⁴, embescens Lodd hot cab. t 1826 ab h.1c specie uti ab allinibus difTeiie vidclnr pedicelhs clon gatis et sepalis angasih. (v. s. sp)

Sect, XVIII. BACTRIDILM Salisb.

Infloescentia Teiminalis ambellata, v. infii 'n pice in ramoroni sub\erticillaia. Corolla subin/lato-tbnlosa , limbo bievi subiecto Antheraj mclusa? Ovaiium longiuscule stipitatum glahrmu. — Folia 4-6-na | plnra

n5. E. FAsncDLAHis. (Linn fil' suppl p. Q19) , foliis senis pliiribusvc lincii elon^atis tiecto icciuvis glibus, biacleis pjms remofis, icpalis larucolato-lincalibus foliaccis >istosis, cotollis clongitis subinlato-tubulo^is fcubiniims ^JSC081S ^ .inlbcis aiislalis—in inontibus pro\ Stellenbosch 1' fastienhiis Bauer ic. boit. kew. 1.6 Wendl. cue. fasc. 14. ic E o< tophylla Hiunb. diss. 11. 72. t. 3> P- t'oiouala Aiidi. heatb. t. 109. E radiolloia Sahsb ' I. v p 360 Syiin'coded fasuculaiis 0 Don 1. c p 8i5. Raini ciecti vngati dense foliosi Folia*6 lin. 1<daies numerosi, primuin nmbellati teunirules, dciuuin tamo evenrrente iatcialcs \eituillati. Coi. ia-i5 lin. long.i mbra, apite VHCSJCCUS. (7 & c et sp)

- impeitalis (Audi, liedlh. t a6d), paiuin diuersa corollis magis inflatis limbo majoie. Eui^lomaimpeiaha (1 Don 1. c. p. 817. Hybiida hoitensis.

116 E. BuADrFYANA (Andr healb. t. 206?), fobis 4 '» ligide hneaiibus eiecto-incuvis glabris, floribus sccus ramos veriidllatis pedicellatij, penduhs, bractis paivii icmotis, sepalis lanceolato-ovatis ineinbiaiaceis scanosis can-natis bieviter acuminatis plabus, coroHis inilato - tubulosib apice altenuatis, antbens anstatis.— in colonia (apensi (Iboin). Calbsta Bioadleyaua G. Don 1. c p. 81 i et Synngodea Broadleiana ejusd 1. e. p 818. Specim. in omnibus emm ic cit. comenit piaetci antberas longe aiistatas et capsulam sp-piratam. Folia in descr Andr. J-na, in icone 4-n i. ('or. 7 8 Jiu longa. Species distirKti^mn (* • M¹ inluii) Hookei)

117. E. MASSOIU (Linn. ill. suppl. p. 221), foliis 4-nis brevibas oblongo-iine-ribus oblusis erecto-snhsquensis longè ciliato-serralis, in ramulis imbricalis plumosis, bracteis approximates subremotis v foliaceis, sepalis lancolatis carinalis glabris cilialis bispidis, corollâ viscosissimâ subinflato-tubulosâ subiicifirâ, antheris manticis.—in montibus prov. Capeet Stellenbosch. f. Massoni Tbunb. diss. n. 35. t. 3. Bauer ic. hort. kew. t. 32. Wendl. eric. fasc. 26. ic. bot. mag. t. 356. Lodd.! bot. cab. t. 1009. E. Massonia Andr. heath. t. 128. E. lycopodii folia. Salisb.! I. c. p. 361 nori alior. Syringodea Massoni G. Don I. c. p. 820. Speciæ sylvestria variant bracteis laxioribus appressis, sepalis magis in intus ve ciliatis. Cor. forma fere E. fasciularis sed brevior (9-11 lin.) crassior, basi coccinea, medio saepius flavescens, apice virescens, limbo nunquam stellalo-patente. (v. s. c. et sp.)

(i. *minor* (Hortul.), corollis hæc prioribus, sepalis bracteisqne linearibus mihiis ciliatis. E. ge mm ifera Lodd.! bot. cab. t. 47* bot. mag. t. 226G. Syringodea gemmifera G. Don 1. c. p. S20 (v. s. c.)

Hybridæ hortenses inter Tubifloras et JJmbatas à brevifloras eductæ,

A. SviuNGonioinEy*: Limbo corolla; obscure v. vix stellato, ovario sessili.

* *cylindrica* (Andr. heath. t. 60 non Thunb. nee Wendl.), foliis 4-nis angustè linearibus labiis ciliatis, floribus suhsessilibus tenninalibus, bracteis parvis, sepalis linearibus basi lanceolatis, corollis snhilato-cylindricis rectis glabris limbo demum revolato-patente, antheris aristatis, ovario glabro. K. cylindrica Lodd.! bot. cab. t. iy'it%. f. ambigia Wendl. eric. fasc. 16. ic. K. bybiida hortul. Syringodea ambigua et S. hybrida G. Don 1. c. p. 824. Cor. fci: pollicarJH iihra. (v. s. c.)

Patersonioides (Hedf. eric. Wob. p. 18), vix à praecedit distingueda, foliis ininoribus et floribiis tenuioribus umbellatis. E. patersonia coccinea Andr. heath. 1.134*- f. Andrewsii Klotsch! in linnoeâ 10. p. 314. (v. 9. c.) *magnified* (Andr. heath. t. 223), foliis 3/j-nis rigidè linearibus ciliato-puberulis, floribus versùs apices ramulorum i-j pedicellatis, bracteis Mirvis à calye remotia, topalis pennis acuminatis glabris, corolla ovoideo-inflata 7-8-lineari apice attenuata rosea glabra, limbo erecto profunde diviso, antheris aristatis, ovario glabro. Callista magnifica G. Donl. c. p. 813. An ex Kvanlh'e et Pachysa quadam enata? (v. s. c.)

rubida (Lodd.! bot. cab. t. 116G), foliis 3-4-nis rigidis linearibus brevibus subglabris, floribus tenninalibus subquaternis breviter pedicellatis, bracteis parvis remotis, sepalis parvis ovatis acuminatis glabris ruhris, colla tubulosa subinflata 4-5-lineari glabra alba deratim rubida, limbo parvo suberecto, antheris aristatis, ovario glabro. E. rubercalyx Andr. heath. t. 285. Syringodea rnbida G. Don 1. c. p. 826. (v. s. c.)

pallida (Lodd.! bot. cab. t. 1355 non Wendl.), foliis 4-6-nis rigide linearibus acutis glabris, floribus axillaribus terminalibus breviter pedicellatis, bracteis subremotis, sepalis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, corolla tubulosa subinflata 4-5-lineari glabra pallida limbo erecto v. paten I e rnbida, antheris manticis, ovario glabro. (v. s. c.)

B. EvAHTMi-sTETiTiE. Limbo corollæ stellato-patente, tñho elongato cylindraceo recto plus minus v. inflato, ovario glabro. — Folia 3-4-na subsparsa rariis 5-6-na. Inflorescentia terminalis. Anthers muticae. Formae numerosoc, plerisque inter E. tubifloram v. curvifloram et ventricosam v. 6tirpem quemdam jam hybridam natae.

* *radiata* (Andr. heath. t. 42), foliis rigidè el angastelinearibus longiusculis, floribus umbellatis v. rariis infrà apicem ramorum vrticillatis, bracteis remotis, sepalis lanceolatis acuminatis, corollâ rosed 10-1 x-lineari, tubo nūhilato, limbo parvo paleante concolor, ovario stipitato. E. calamiformis Salisb.! I. c. p. 362. Syringodea radiata G. Don 1. c. p. 819. (v. s. c.) *radiata discolor* (Andr. heath. t. 281), differre videtur corollâ bieviore, limbo discolore, ul ovario sessili?

&*vainsonia* (Andr. heath. t. 242), ab E. radiata diversa foliis et præscrīm floribus majoribus. Cullista Swainsonii G. Don 1. c. p. 876.

undulata (Lodd.! bof. cab. t. 179?), foliis densis glabria, floribus ~~pubes~~, bracteis subremotis, sepalis linear-lanceolatis, corollis rubris 10-0-linearibus viscosis, tubo basi subinflato apice undulato difformi, limbo irregulatiliter patente v. revoluto, antheris sa?piis difformibus, ovario sessili. E. undulata Andr. heath, t. 300. E. Westphalingia Hortul. Callista undulata G. Don I. c. p. 816. (v. a. c.)

rigida (Lodd.! bot. cab. t. 1286), foliis rigidè et angustè linearibus brevibus, floribus pedicellatis quaternis, bracteis reraotis, sepalis lanceolatis, corolla 8-9-lineari rubida subglabra, tubo parum ventricoso, limbo parvo patente discolorc, ovario sessili. Callista rigida G. Don I. c. p. 815. (v. s. c.)
spuria (Andr. heath, t. 90), foliis rigidè et angustè linearibus brevibus glabris v. ciliato-ruhescentibus, floribus mnbellato-capitatis, bracteis renotis, sepalis lanceolatis, corolla rosea 8-9-lineari, tubo angustè ventricoso pubescente, limbo parvo patente, ovario sessili. R. culcitineflora Salish.! I. c. p. 357. £. tnbulosa Wendl. eric. fasc. 16. ic. E. translucent) Andr. heath, t. 295. Syringodea spuria G. Don I. c. p. 819. Omnia forsitan hybridarii cortensium prima ex E. tabifloru et E. ventricosa educta. (v. s. c.)

perspicuoides (Bedf. hort. eric. p. 18), foliis rigidè et angustè linearibus superioribus pedicellisqoe sublanato-cilintis, floribus subunibellatis, bracteis remotis, sepalis lanceolatis, corolla roseo-alba/tubo parvum inflato xo-i i-lineari pubescente, limbo parvo albo patente, ovario sessili. E. perspicua Bedf. I. c. non Wendl. Syringodea perspicua G. Don I. c. p. 821 et S. Bedfordiana ejasd. I. c. p. 831 non ejusil. I. c. p. 819. (v. s. c.)
buccinasflora (Sims bot. mag. t. 2465), precedentibus binis simillima, differt corollis glabrioribus, limbo parvum majorc. E. luccina?floia Lodd.! bot. cab. t. 1127. Callista buccinxflora G. Don I. c. p. 813. Certè hybrida hortensis nec è seminibus Burchellianis enata. (v. s. c.)

calostoma (Lodd. bot. cab. t. 1759), ex icona (absqne descriptione), vix a praecedenti distinguenda. Callista calostoma G. Don I. c. p. 815.

stellifera (Andr. heath, t. 291), foliis patentibus linearibus plerisque pedicel I isque pilosis, floribus nmbellatis, bracleis remotis, sepalis lanceolatis acuminatis, corolla rosea, tubo oblongo-inflat. o 8-10-lineari glabrinuscule, limbo patente pallidiore, ovario sessili v. breviter stipitato. E. stellifera Lodd.! bot. cab. t. 162a. Callista stellifera G. Don I. c. p. 815. E. bi brae teat a Klotzsch! in linnxa 12. p. 516. E. ventricosa? et E. praeognantis var. plur. Hortul. Forma; numerosa hinc in praecedentes, bine in E. ventricosa in abeuntis. (v. s. c.)

C. PIJHJROCALLI-STELLAT/E, corolla; tubo subinflato, limbo stellato-patente, ovario pubescente v. villoso. Folia irregabriter 3-6-na v. sparsa. Inflorescentia irregulariter axillaris v. terminals. Pleraeqae verosi mi liter ex E. veatitt v. E. coccinea et E. ventricosa/i v. Eurylomatissppciebus educta?.

acuminata (A^Jr. heath, t. 101), foliis lato-linearibus recurvis nrstatis subciliatis, iloribus pedicellatis, bracteis laxis, sepalis (E. coccinea;) ovato-lanceolatis viscoso-villosinsculis acuminatis, corolla: incarnat-e glabra subviscosse tubo 7-8-lineari basi inflato, limbostellato-patente v. revoluto, antheris maticis, ovario stipitato apice pubescente. E. acuminata Lodd.I hot. cab. t. 216. Callista acuminata G. Don I. c. p. 813. Ex ti. coccinea et Earylomatis sp. quâdam. (v. s. c.)

carinata (Lodd.! bot. cab. t. 1071), foliis latiusculè linearibus rigidis reenrvis subaristatis glabris, floribus pedicellatis, bracleis remotis, sepalis ovato-lanceolatis glabris, corollas incarnatae v. purpureae glabrap subviscosae tubo pollicari vix inflato limbo stellato-patente v. revoluto, antheris muticis, ovario vix stipitato apice puberulo. E. acuminata ungustiflora Andr. heath, t. 25i. Syringodea carinata G. Don I. c. p. 8a3. Haec uti E. acuminata in horlis occurruut corollis mine distincle iuncte vix costatis. (v. s. c.)

* *pseudovestita* (Benth. botanist, t. io/{}), foliis lincari-subulatis ciccio-patculibus glabris, iloribus brevissimè pedunculaiis, bracteis retnotiusculis,

supalis basi breviter ova tie longè Hneari-acaraiuatis glabris, corolla; glabit tubo 7-8-linearis roseo vix inflato v. subclavato limbo brevi albido sibalellato-pacento, autheris aristatis, ovario villoso. Ex E. veslitâ et E. venticosâ? (v. s. c.)

* *rugosa* (Andr. heath, t. 236), foliis rigidè linearibus recurvis glabris, floribus pedicellatis, bracteis remotis, sepals lanceolatis, corollas saturatè rubra; tubo 7-8-linearis subclavato undulato-diformi, limbo patente, antheis ba&i sagittatis, ovario sessili villoso? Ex E. Niveniâ et Pleurocal-lidi quadrum? Syringodea rugosa G. Don 1. c. p. 8a3.

I). DASYAMTHI-STEHLATJE. Corolla? tubo ovato-inflato limbo to patente, ovario sessili villoso. Folia irregulariter 4-6-na v. sparsa. Inflorescentia terminalis umbelialis, anthers uiaticaa. Pleraeque ex E. cerinthoidi et E. ventricos& ana Up.

* *princeps* (Andr. heath. I. i40), foliis latè linearibus doisa sulcatia ciliato-hispidis subrecurvo-patentibus, bracteis suhremotis, sepals laoceolatis latis hispidis, corollas in brae glabrje v. strigoso-hispida tubo 8^9-lineari, fauce constrictâ, limbo brevi pptente. E. princeps Lodd.! bot. cab. I. G47. Enryloin a princeps G. Don 1. c. p. 817. (v. t>. c.)

* *oblonga* (Bedf. hort. eric. Wob. p. 27), ex descr. 1. c praecedenti similis calyce inflato, corollâ oblongâ.— Euryloma oblonga G. Donl. c. p. 18.

* *metulaflora* (Curt. bot. mag. t. 61a), foliis linearibus suprà planis erecto-patentibus suh recurvis ve arislatis margine subciliaffe, bracteis par vis re-raotig, sepals luuceolatis acumiuatis, corolla: intense rubrac tubo 6-7-lineari glabro, fauce constrictâ, limbo latiuscnlo patente. E. metulaeflora Lodd. bot. cab. t. 170S non Andr. nee Klotzsch. E. adjuvans grandiflora Klotzsch in Linnaed 12. p. 50a. Callista metulaeflora G. Don 1. c. p. 8x3. (v. 8. c.)

* *adjuvansparviflora* (Klotzscl! in linnaea n. p. 50a), eat fere eadem, E. ventricosse tauten paulo propinquior. (v. 8. c.)

* *metulcejlora* (Andr. heath, t. ^24, a6g), diversa videtur oorollia pallidis longioribus et form^ E. Meuronii propinquioribus cuicum junxit cl. Kloizsch. Haec tamen est species genuina Syringodea3, dum in iconibus Andrewslanis limbus corolla evldenter stellato-pateus.

" *Templea* (Andr. heath, t. "2Q'A), foliis latè linearibus imbricato-squarrosis recurvis ve arislatis ciliatis, bracteis subapprpximatis, sepals lanceolatis hispidis, corollâ rnbâ 7-8-lineari ova to-oblong a valde inflata glabru v. apice pilosâ, fafce parùm contractu, limbi laciniia brevibua latis. Callista Templeana G. Don 1. c. p. 8(4- (v. s. c.)

* *quadrangularis* (Andr. heath, t. 280 nan Thunb.), foliis latè linearibus recurvo-patentibus aristatU ciliutis, bracteis sepalsisque lanceolatis glabris, corollâ roseâ 7-8-lineari valde inflate tetragonâ glabvd, limbo revalto-patente, laciniis brevibus latis. E. erosa Lodd.! bot. cab. t. i33. Callista quadrangularia G. Don 1. c. p. 8i(>. (v. s. c.)

Hybridae inter E Massoni et Eurylomatis speciebus his affiniores snb Eurylome quaerendaa.

Suhgenua HI. STELLANTHE seu *Limbatae*. — Coniflorarom et Calycinarn sp. *Dryander*. -^ Liiubatae et Galycinarn sp. *Lift A*. — Limbatae Klotzsch.-r-Eavj-loma, Callista et Lamprotis A et G. Don excl. sp.

Corollas tubis globosus ovatus v. elongatua, basi inflatus v. rarius aeqnalis, fanx. constrictâ, limbus planus stellato-patens. Autheraa laterales iutit tubum inclasas, muticas aristatse ye| criatatae. Species omnes Capenses.

Sect. xix. MYRA Salisb.

Inflorescentia terminalis laxè umbellato-racemosa. Corolla calyca molto lou-gior, tuho ha&i inflato sqperqè attenuato. Antherae cristate. Ovariara sessile gla-brarw. — Folia alternâ v. sparsa, glauduloso-pilosa. Bracteae remota.

118. E. RUFESCENS (Klotzsch! hi, linnaul 10. p. 33a), foliis patentibus linearibus, ucutiusculis subius sulcatij,, &cpalis ovatis lauceolatisvc glabris vidcosis, corollac

viscose puberulac tubo inflato-cylindrico , limbo majusculo, ovano oblongo — HI colonia Capensi(eyhei) Ab L glutinosà differt praecipue coiolla 10-12 lm. longa, limbo mullo .unplioie. (v. s sp. fruslul. in heib reg Herol.)

119. E OLUTINOSA (Bcig ' pi cap p 98 non Amh), folia patentibus subre-
cuvis lineai i-convexisi obtusis, sepalis olati laiceolalisve glabris vistosis,
rorollae viscoMssimaj pnbeiuLu tubo oblongo-ovato inflito npice attenuato,
l'mbo parvo, OV.II 10 ovoideo.—in montibus circa Cape-Town et iu piov. Stel-
Icnbosrb australiori oommuois & glutinosa Uaoei icon. hort. kew. t. 17.
Wendl. eric. fate. 2? IC Andromeda droseroides Linn. mant. p. 239. E. dro-
scoides Andr. heath, t 18 Lodd bot. cab t 1683 Fiuticulns hnmlis nndi-
qne pilis glandulosis viscosissnnus. Volia »-4-l*« Cor. tubus 4-1 Anus 5-1 means
prope basin 2 lin. diametrio (v. ». c et sp)

fi. parviflora. E. droseroides minor. Andr. heath, t. 28\$,

1ao. E GLAXTDULIFERA (Klolzsch! in linn.x' 10. p. 333), fobis erecto-patentibii»
linearibi^f aculis, sepalis lanceolatis pilis glandulofis oblectis, COIOIIC »>cosib
biuitC subpubciulx* tubo submfato cylindriico, limbo minino, ovario tnibili-
nato ~in monte Wittembrg piov. Worcester (Mumit. et Maiie). Ab F gluui-
nosà calycibus facile dislincta. Folia rectioia, minora. C01. 3-3 7 lin., minùs
inilata: quain in K. glutinosà. (v. » sp. in htrb reg. Beiol)

Sect. xx. CIRAMUS *Salisb*,

Inflorescentia terminalis laxe nmbellata v. subracemosd. Coiolla glabia vix vii-
cosa ralyce multò longioi tnbo inilafo supeine dtlcnnato. Anllicia* anstato; v.
bubaiistatac laiuìs, inutic c, breves, basi oblnsae, poio bievi \ oLlongo debis»centes
Ovarium stipitatiim glabunn. — Folia 3-4-na. l*iactea*: lemotae v. ininima). Sec-
tio Calbstisbicvifloib afiuis.

ill. E. IKFLATA (1 hurkb. diss. 11 67. t. 2), foliis 3 4-nis spasisvelineui subula-
tis subsecuudis glabris, pedicellis puberulis, sepalis lanceolatis acutis coloia-
tia, corollac tubo ovato-inilato supeine atteuuato, limbo paivo, aullkeria uiuat-
atm —in montibus Cederbeigeu diclis —(Drege) et III prov. VV oici'stei »»
(Muudt et Maire, Massou.etc) h aiuabilis Salisb. I c. p d&j h Sainsbuiyaua
Andr heath t. 937. K. caimulalodd ' hot cab t 926 K. tarneoli f, Dun
I.e. p. 798. CaUista Sambbaryana ejnsd. 1 c. p 8ii ct Calhsta inilata (jui.il
1. c. p. 814. Folia seinipollicjua acutissima. Pedicrlli giaciles coloati. Cor. tubti-
3-4 lin. rarius 2 | hn. longus, limbo minimo. (\ s. c et sp.)

fi. brevijlora, E. ollnl Audi, heath, t. 275 Lodd. bot. cab. t. 1646. G Don
1. c. p. 794. ^x var. distincta. (v. s. c.j

12a E IWCARNATA ,lhnnb. diss. n. 8} non Andi.), folns 3-4-nit bieibus li-
nearibus latinscuhs subtugouis eiechs subpatenlibusve glabus, sepalis lanceo-
latis cauinatis bievibus coloati, (oiollai tnbo ovali-oblongo inilato superm
paiuni altennato, limbo paivo, antberis aristatis —in colonia Capensi (Ma&son,
Niven). fc. amaua S.ilisb ' 1. c p 2^9 non Wtndl [«olia 1-2 lin Jonga ligida
Cor. 4-5-lin., à basi ad apicein feie valde inllattc, faute ut in alhuibiib con-
stiicta. (v. 9. &J J" liorl. Banks et commi a Linn, MJC Lond.)

123 E. SAVIIEVNA (Andi. heath, t. Q38), folns 3-4-nis tenniter lineaii-trigonij>
erecto-patenibus glabiis ciliali^ptdicellis puberulis, sepalis lanceolatis acunu-
natis, comill'B tubo ovato mtlato superne attennato, limbi brevis laciiniis obtii-
sis, anlheus cristato-aristatis.—in moutibus piov. Woicesteret btellenbosch
confimbus (Mnnndt et Maite, DiegL) K. Savillij> Lodd. bot cab t. 96. fc. Behen
E, Mey.i in Dr pi exs ex paite. l'olia i-3 lin Cotolla incamata sub 4-hn.
limbi laciiniis Jatioubus quain lougis (v. s. c. etsp.)

ia4. E. PRACOX (Klotzsth' inlinuoeà 11. >. 517, non Lotld), folns4-nis lineaii-
trigonift dorso sulcalis ereclis niunionbus uudique hispulis dcmuin glabratls ,
ilonbus snbwcpmosis , pedicelhs pubernlis, sepalis lauceolalo-liueaubus <<n-
natis coloraris ulialis coiollai tubo ovajo inilato MIpcine attenuato, limbi
1 iciniis lalo-laueeolatib atulis, anlhcnis uiutiub v bievissiuie biauiiculalis — ail

Dntolukloofprov. Stellenbosch (Drège). E. Behen. E. Mey ! In Dieg. pi. exit, e* parte. Folia z $\frac{2}{3}$ -3 lin. pilis nitentibus patentibns subviscosis. Flores in axillis superioribas subverticillati 1 ace in am irregulaiem foimam. Coi. tabus 4-lin (v. «, sp.)

125. E. VZNTRICOSA (Thanb. diss. n. 36. t. i), foil is 4-nis subincarvo-patentibns linearibus supenoribus basi latiasculis plantis margine pilous, sepahs linea*ii*-lanceolatis louge acuminate carinatis, curollis inflato-ovatib subconicis limbo latiusculo, anlheiisbrevissemauriculatis aiistatisvc.—in collibns circu l'alsebay (Masson, Niven). E. ventiicosa Andi. heath, t. 197. bot. mag. t. ^5o. Weudl. eric. fate. 3. ic. Lodd ' bot. cab. t. 43r. Herb tie I.iii). t. 6a. E. venusta Sahsb ' 1. c. p. 385 non Bedf nee Klot7«ch. Call is ta ventiicosa D. et G. Don 1. c. p. 813. Species diuculta, in colonia Capensi laia videlui. Sperim. sylvestria ramosissima, humilia Fol. 6hn. Coi. tubns 6 lin. basi valde inflatus. Speciin. culta valde vau'ant fohis et corollae raaguitudie. Praeter vauetates, hyBridae innnmerae supia commemoratae bane speciem cum tubifligris plarimis conjongit (v. s. c. et sp.)

fe. grandiflora, corolla; tubo 7-lineari. — in colonia Capen^i (Burchell n. •7724)* praegnans Andi. heath, t. a3i. l.odd.I b6t. cab. t. 945. Calista praegnans G. Don 1. c. p. 813, (v. s. c. et sp.)

densa (Andr. heath, t. a13), ab E. ventiicosa diversa glabritie, foliis densis, floribus breviter pedicellatis aggiegatib, coiollis minus inflatis, limbo brcviore obtuso. E. glabra Link enum, hoit Berol p. 36a. liuiylcpis glabra G. Don 1. c. p. 809 et Synugodea dent'a eju'd. 1 c. p. 824, (v. a. c.)

Sect. xxi. EURYLOMA Don.

Inflorescenda terminalis nmbell.ita. Corolla vlscosissima caiyce molt6 longtor, tnbo basi praesertim inflate, apicem veibis baepè attenoato, fance valde contiicta, limbo piano saspe albo Antheiae mnlica? v. amlaiae, locuhs poro oblongo v. nm̄ longitudinah saepe debiscentibus basi saccatib di&tmtis v. divergentibus naepe retusU v. sabbiidis Ovarnlm stipitatum glabtam v. minute pubernlum. — Folia 3-4-na densa, appressa, v. plus minusve squarrosa v. recurva.

t Qorolla tubo i-6-lineari, limbo minimo, antheris aristatU. — PARVIFJLOKIE AB.ISTATJB.

136. E. PXCTITATA (Klotzschi! in linnrcā v. 12. p. 5og non Bartl.), foliis 3-nis appressis apice snbsqurosis brevibns oblongo-linearibos cras&cis maigine serrn-latis, btacteis remotis, sepahs linearibus paīlis, corollas lugoso-hispidae viscosissimae tnbo oblongoinflto basi et apice subditenuato.—m montibus prov. Slcllcnbosch (Ecklon et Zeyhei), in eadem prov ? (Bowie) Rami virgati tenues. Folia vix a-lin. viscosa. Coi. 5-lin ex sicco lubra Ovaiium oblongum longias-cnle stipitatum loculisplun-ovulalis. (v. s *p, in herb. teg. Berol. et mas. Biit.)

137. E. CURVIFOLIA (Salisb.! 1. c p. 380), fohis 3-nis siibsqrarroso-patentibas linearibus obtusis anstatis nudisve cartilagmeo-serrulatis, bracteis remotis, sepahs hneari-lanceolatis paivis, corollas glabrae v. ix sparse hi&pidulae viscoisimae tubo oblongo inflato basi et apice subattenuato.— m Inonhhns Bavians Kloof prov. Swellendam (Niven), ibidem³ (Roxboigb) E Comptoniana Andr. heatfc t. a55 E terminalis Klotzscb' in linna^t ia. p. 509 Calhsta Comptoniana G Don I. c. p. 813 et Earyloma curvifolia ejosd. 1. c p. 816. Rami elongati. Folia pleraque 3-hn. Coi. circiter 4-lin O\anum longiusiule stipitatum ob-ovoideo-oblongum, locuhs pluu-ovulatis (v. b. c. et sp.)

ia8. E. TRICHROMA, foliis 3-nis appressis v. squariosis linearibns crassinsculis bievibus cartilagineo-serrnlatis, bracteis paīlis, sepalis linearibus obtnsis bie-vibus, corollae glabrae v. sparse lmpidulde viscosisimae tubo ovato-inflato sa-pcinevixattenuaro, ovai 11 locuhs biovulads —in niontibus Franichehocks Kloof, prov Slcllcnfritsch (Niven). E. tiicolor Niven mss. non bortal. nee Spreng.

Habitus praecedentium sed humilior et ramosior. Corolla tubas 2-2 ~ Hn. Ion-gus. Anthera brevisimè aristatae. Ovarium longè stipitalm ovatnm parvum. Tāin habita quām characteribus inter Ericam pectinatam et Ereiniam uotabili-lera media et genera mīnis artiilcialia jungit. (v. s. sp. coram. à cl. Lambert.)

f 't Corolla tubo 3-6-linearis, /m?fō /wi/vo, antheris muticis.

— PARVIFLOR^E MUTICC.

121). E.ZEYHKRX (Ant.Spr. tent, sup pi. p. i2.exKlotzsch.! nonBartl.), foliis 3-nis appressis apice sobssquarrosis brevibns linearibus crassiusculis obtusis aristatis uudisve margine cartilagineo-denticulatis, bracteis reinotis, sepalis lanceari lanceolatis obtusis viscosis, corollae viscosissimse costata? tubo inflato versùs apiceiu nngustato.—propè Caledon prov. Swel]cndam(Zeyher), inejusdem prov.? (Bur-chelln.7750.) E. angusticollis Bartl. in linnaea 7. p. 638. Habitns E. pectinat&et E. cnrvifolia. Cor. tubns 5-lin. Ovarium longè stipitalum. Anlherce oraninò ranticae. (v. s. sp. in herb. reg. Berol. et Burch.)

130. E. SQUARROSA (Salisb.! 1. c. p. 380), foliis sub-4-nis sqnarroso-patentibus oblongo-linearibus obtusis crassiusculis longè ferrugineo-ciliatis, bracteis rxnotis, sepalis lanceolatis carinatis apice barbatis, corolla: glabrse viscosissimaj tubo oblongo basi inflato apicem versùs attenuato.— ad Tranche Hoek Kloof prov. Stellenbosch (Niveu)el in inontibus ad flum. Zondereinde(Masson). E. fcr-ruginea Audr. heath, t. 157. Callista ferruginea C. Don 1. c. p. 8x3, et Eury-loma squarrosa ejusd. I. c. p. 817. Pol. ferè E. Massoni. Cor. tubus 5-6-lin. basi pallidè carneus apice intensiùs coloiatus , limbo albido. Filamenta apice dilatata glandulosa, sed nee calcaria marginalia uec folia sena vidi. (v. s. C. et sp.)

131? E. RDSSELLIAZTA (Andr. heath, t. 286), foliis 3-iiii sparsisve erecto-recurvis lincari-trigonislucidis, bracteis remolis, sepalis lanceolatis carinatis nudis corollae glabrae tubo ovato inflato apice attenuato, liinbi laciniis acutis tubo pa-rum brevioribus.—Hab... E. Russeliana Lodd. hot. cab. t. 10i5. Species mihi ignota E. Macrolomati (inter Pachysas) quodammodo affinis videtur.

† ^j Corollce tnbo rariis 7 scepiis 8-15-linearis h'mbo latiusculo *v. maximo.—Cor. extùs glabra iriscosissima, antherce muticce, bractece subscpaloidce approximates v. re/no tee.—T ~~AMPULLACEA~~.

i3a. E. ARISTATA (Andr. heath, t. 15i, 203), foliis snb-4-nis oblongo-linearibus lanceolatisve squarroso-reflexis aristatis margine ciliatis, bracteis subreiuotis, sepalis lanceolatis obtusis subnudis, corollae cost a I a? tubo inflato-cylindrico versàs apicem vix attenuato liinbi lobis subretnsis brevibus.—Hab... E. aristata bot. mag. t. ia/ij) Lodd.! hot. cab. t. 73. Euiyloma aristata G. Don 1. c. p. 817. Folia ferè E. retortae at brevius ciliata. Sepala cirtilaçinea. Cor. io-i?-lin. rubrO'purpnrea limbo albido. An haec etiam slirps hybrida ex innumeris sec-tionis hujas elegantissimae in hbrtis anglicanis qnotannis ediMjitis? (v. s. c.) Hybridae sequentes imprimis ex E. Massoni et E. retrorla, ~~v.~~ ampullacea v.

R. jasiniflorū v. ex una altera've harum specierum et stirpe jam hybrid à natae suat. Omnes sc invicem intermediis plurimis conjoinctne.

- *crin* 1 *ta* (Lodd.! bot. cab. t. 1432). Affinis E. aristata?, foliis angustioribns squarroso-palentibus recurvis nee reflexis longiùs ciliatis, sepalis barbatis, corollae form'a ad E. Massoni approximate. E. Hartnelli Roll! cat. Eai-y-loraa Hartnelli et E. crinita G. Don 1. c. p. 817. (v. s. c.)

- *pinguis* (Klotzsch! in linnaä 10, p. 351), foliis siepiùs 4-nis plùs minhsve squarrolis longè aristatis ciliatisque, corollis ferè E. aristatae apice vix sttenuatis. E. tricolor dumosa, E. Clowieana hortul. (v. s. c.)

- *aristella* (Bedf.! hort. eric. p. 2), foliis pra?ced>nti», corollis verstu apicem niagis attennatis virescentibusque. E. tricolor's var. E. Sprengelii etc. hortul. E. aristata minor Andr. heath, t. ao3. E. exirnia Lodd.! bot. cab. t. no5. E. cqnestris Klolzsdi! in linneeä 10, p. i50. Eorylozna aristella G. Don I.e. p. 817. (v. b. c)

"Forbesiana (Ko|zsch) inlinnoefl 10 p. 3^0,), foliis praecedentium, corollis ;d forroam E. ampullacea) approximantibus. *Euryloma ampullaceoideb* G. Don 1. c. p. 817? (v. s. c.)

* *tricolor* (Nois. non Spreng.), foliis snbternis minus squarrosis quan in piae-
cedentibus, coiollis veisùs apicem plus niinifeve atenuatis viiescentibus.
Euiyloma tiiclor * et /3 G. Don 1 c. p. 816. (v. s. c.)

* *ducalis* (Klotzsch ! in linnaea 10, p. 347), folii^E. tncoloiiis saipiùs minus ci-
Jidtia, coiolla ad fonnam E. Shannonl approximante. (v. s. c.)

133. E. RETORTA (Liun. fil! suppl. p. 110), foliis 4~nis ovato-lanceolntis sqnar-
i oso-reflexis longe aristatis , biacteis remolls pdicellUqnc viscoao-pnbemlih,
sepalis lauceolatis carinatis longe .u is tat is, corolla} tubo e basi valde inflata in
collum longè attennato, limbi laciiniis ovatis acuminatis.— in montibus piov.
Stelleqbosch * (Roxbmgh, Muudt, Tbom, etc.), ad Kleinboulhach (Niven). E.
retorta Andr. beatb. t. a44. bot. mag i.3Ga Wendl. eiic. fasc. i5.ic.Lodd ' bot.
cab. t. 804. E. goi tet ixfolia Salisb! 1. c. p. 381. *Euryloma letorta* G. Don 1. c.
p. 817. Species bumilh, ramo&issimu, foliosa, elegantissima. C01. tubus roseub
io-12-lin. collo apice circa'antberas subinflato intense'colorato, lirabo pal lido,
(v. s. c. ct sp.) <

134. E. OBBATA (Andr. beatb. t. 3a et 13a), foliis oblongo-lanceolatis Imbricato-
appressis apice squanosis rigidis obtusis maigie ciliato-serratis , bracteis ap-
ptoximatis, sepalis ovali-oblongis lauceolatisve margine plomo tlli.itis,
coiollje tubo basi inflato-globoso apice in collum brevein abrupte attenualo
limbi aimplici laciiniis orbiculatis —in montibns Klyniivier et Babylon's. Towe prov.
Swellendam (Ecklou et Zeyhei, Roxburgh, etc.) E. capjx Saliib • 1. c
p. 38i. *Eiuylonia obbata* et E. capax G. Don 1 c. p. 816, 817. 'Sepala lata
coloiata maigie membiaqacea. Cm. alba v. plus nnnusvo roseo-colorat.i,
tubus cnca 9-hn. basi b lm. diaraetio, limbi laciiniaB bail bimnculataa. ^v. s. c.
et sp.)

135. E. AMPULFACFA (Curt. bot. mag. t. 303), foliitflanceolatis imbricalo apprcj-
MS apice squaiiosis rigidis maigine cilialo-senatis, biactcis bnbapproxinaatis,
fiepalis ovali-oblongis lanceolatisve margie ciliato-plumosi, roioJa? tubo ba&i
ovojdeo-iuflatoad medium in collum louguni attenuuto, limbi laciiniis ovatis.—
in montibus Zwaitebergen dictis. E. ampullacea Andr. beath, t. io3. Wend!,
ciic. fasc. 23. ic. Loddjbot. cab. t. 5oS. E. ampullafoiinis Salisb. 1. c. p. 38i.
Euryloma arnpullacea G. Don 1. c. p. 816. Folia et habitus K. obbatae Corolla
roseo-alba, basiet apice intensius coloratd, lineis rubiisutata; tubus pollicaris,
limb as albus. (v. s. c et sp.)

136. E. JASHINIFLORA (Andr. beat. t. 26 non Salisb.), foliis tecinis appressis v.
apice squariosis oblongo-lineaiibus obtusis caiiuatis glabris, biacteis subiemoti-
tis, sepabs lato-lauceolatis obtu&iu&culis, coiollaj tubo costato bjsi infiato àpi-
cemveiis ill collum louge attenuato,limbo amplo.—in colouia CapuM (Rox-
burgh). E. jaspinifloia Wendl. eiic. fasc 27 ic. I. lageuaefoimis Salisb! 1. c.
p. 382. E. AiUjBa a. jabiuinifloraKlo^sch! iuliunaei 10, p 34». E.iuflataboitul.
non Thunb. *Euiyloma jasmimfloia* G. Don 1. c. p. 816. Species ab E. Aito-
nianâ ovaiio stipjtato et corolla? tabo ba&i inflato crte distincta Folia circâ
3-lin. Cor. roseo-alba, tnbus n-i3-lin. collo minus distincto qu.mi in E. am-
pullacea, evidentiore quam in E. Shannoniana. Limbus feiè E. Aitonianac. (v
* c. et sp.)

* *minor*. Andr. heath, t. 320. "Verosimil. hybrida e* E. jasminiflorâ et
E. Irbyand nata«

i3*j. E. SHANNONIKA (Andr. heath, t. a3a), foliis ternis erecto-patentibas longe
lineaiibus rigidis cannato-canaliculatis aristatis ciliatis, bracteis paivi* lemotis,,
sepabs lauceolatis sublineanbusve acutis, coiollse costake tubo oblongo-inflato
apice in colloui brevem levitet attenuato, limbi laciiniis ovatis.— 10 montibus
ad Klemiivier piov. Swellendam (Maj»sou).E.Shannoni Lodd.! bot.cab. t 168.
Eurylouia Shauourana G. Don 1. c. p. 816. Folia semipoUicana. Cor. alba
tubo ra-14-Jiueari, limbo 4-5 liu diamctio. Foimae hybiid* hoiteuscs mime

rosac hone speciem enm E. jasminiflorū et K. Irbyanā connectunt. (v. ». c. et sp. comm. à cl. Lee.)

138. E. IRBYANA (Amir, heath, t. aig), foliis t era is erectly linear-i-trigonis rigidis laevibus Dudis, bracteis remotis, sepalis linear-lanceolatis acutis, corollae tnbo obloDgo basi subaltenato versu apicem longiusculē et leviter attenuato, limbilaciniisovatis.—inmontiba.sprov. Sweilendam occidentals (Niven,Ecklon et Zeyher). E. Irbyana Lodd.! hot. cab. t. 816 (forma hybrida a genuua pa r̄m diversa). Euryloina Irbyana G.Don 1. c. p. 816. Folia 3-5-lin. aristata v. sacpitis mutica. Cor. tubus 8-10, v. interdūm vr̄x ultra 7 Hn. longns, calyceem triplo v. vix daplo superans, liinbus 3-4 lin. dianætro. Hybrid® pi urea iiiter hano et E. Aitoniuai occurunt. (v. 8. c. et sp.)

* *Bandonia* (Andr. heath, t. ao5), differt «b E. Irbyanā foliis tenuloribns patentibus, corollā brevlore tubo a pice, magis attenuato, limbo majore ainplo. AD ex E. Irbyanā et Callistā quādam eaata?—G»Hi»tu Bandonia G. Don I.e. p. 8i3.

Sect. ^xii. PLATTLOMA.

Inffcrescentia, habitus et antherae Eurylomatis. Corolla vfocosissima tubo longo tenui 6uba?quali, fauce co n strict a, Jimbo ampio. Ovarium oblongum ~~missi~~.

139. E. AITONIANA (Masson! in bot. mag. t. 429), foliis ternis appressis oblongis linearibusvc brevibus obtusis carinatis glabris, bracteis lincaribus acutis rigidis remotis, sepalis oblongo-lincaribus sublanceolatisve appressis viscosis glabris, antheris muticis.—inbuniidis montis Zwarteberg (Massou, Patterson). E. Aitoniana Andr. heath, t. 102. Wendl. eric. fasc. 26, ic. E. Aitoniana Lodtl.! bot. cab. t. 144. E. jasminiflora Salisb.ll.c.p. 381 non Andr. E. Aitoniana recta Klotzschl in linnaed 10, p. 348. Eurylouia AitoniG. Don 1. c. p. 816. Ranii elongati virgati. Corolla pallidē carnca v. alba, tubq 15-16 lin. longo, limbo suprā niveo 0-xo Jia. ciiametro. Species frinc Eqrylomatibus, bine Callistispra;sartiu E. pavettaEflorae, affinis, (v. s. c. et sp.)

Sect. xxui. CALLISTA Don, — St el Ian the Salisb.

Inflorescentia terrainalis floribus quaternis rariū sulitariis, brevissime rariū longiusculē pedicellatis. Corolla sicca v, rariū viscosa, tubo calyce foliaceo lon-[^]ioie, a?quali v. venticoso, fa nee constrictā, limbo piano. Antherae muticae rariū minutē aristataj breves basi subintegrale, poro brevi rariū oblongo, Ovarinm bessile. — Folia in omnibus quaterna, subinenrvo-patentias tenuiter linear-i-tri-gona^rigidula , glabra v. juniora leviter ciliata. — Sectio naturalissimtf.

'f *Corollas tubo cylindraceo basi vix fatiore.*

x40. E. PAVKTT>FLORA (Salisb. 1. c. p. 38a), floribns subsessilibus bracteis approximatis sepalisque lanceolato-linearibus rigidis acutia, corpillaD glabrae viscosetubo longocylindrico abquali liinbi crassiusculalaciis sujKā farinosis, antherisminulissimeappendiculatis.—in raontibusprov. Stellenbosch au*tr. (Mas-Bon, Niven, Roxburgh).E. infundibuliformis Andr.heath. t. ai8 Lodd. bot. cab. t. 689. E. hypocrateriformw Tansch, bot. eoit. 1837, a, p. 49a. Callista iufundibuiiformis G. Donl. c. p. 8i3 et Callista pavettaeilora ejusd. 1. c. p. 8i5. Rami iioriferi laxē fastigiati, Sepala 3 lin. Cor, tubus 3-lio. earpeu^ Umbq duprā albo. (y, 8, c. et sp.)

+ *Coventryana* (Andr. heath, t. a 10), floribu3 brevjiorib* tuba basi subiu-ilato. E. Coventryana Lodd.l bat. cab. U 4'A\$, CaUUt Coveutryana G. Don 1. c. p. 815. (v. s. c.)

i4f. E. TENUIFT.ORA (Andr. heath, t. 146), floribus In ramulis brevibus subsessiti-bus, bracleia approximatis, aepalis lanceolato-lippearibusrigidis acutis, corollsc glaberrima? sicc⁺ tubo longo cylindrico tenui scuali liuabi laciniis brevissiuis ovatiji, antheris muticis.—io montibus prov. Stellenbosch et Worcester. Ramuli. iioriferi secūs ramos fasCKulatu-iacemoai, corolla: tubuii teuuisaimus flavesiens

5-6 lin. longus, limbi lacinix* \ix jliu. loujic fc. lenuifloia Audi 1 o. Lodd ' Lot. cab. t. 1717. E. cylindrica Thunb. diss 11 19 sec. Salisb non Wendl nee Andr. f. fistalaeflora balish! 1 c. p. i83 Callista tenuilloia G. Don 1 c. p. 812. (v. s. c. et sp)

* carnea (Andr. heath, t. 294), corollae carneae tubo 6-8 lin. longo, limbo majore albo. E. tenuiflora Lodd.' (v. s. c.)

* Chffortiana (Lodd.! bot cab t. 34), coiollae albae tnbo 6 8 lin. longo basi ampliore, limbo latiusculo. E. tenuiflora alba Andi. heath, t. 194* Callista Cliffortiana G. Don 1. c. p 8i5. (v. s. c)

142. E. LAWSONIANA (Andr heath, t. 267), flonbus snbssessihbus, bracteis approximate, sepalis linea-lanceolatis acutissimis rigidis, coiollae siccae minute pnberrulse vel glabiae tubo longo tenui basi leviter inflato, hinbl 1 acinus ovatis acentis suprà \ix farinaceis, antheris mnticis—in montibus prov. Swellendam occidentals (Masson, Niven, Ecklon et Zeyhei). E. Lawsoni bot mag. t. 1720. Lodd. bot. cab t. 488. E. infundibuliformis Baitl. in linnaM 7 p. 638 teste Klotzsch non Andr. L. leptocaipha Spieng. ill tent, snpl p. 1*i* teste Klotzsch. Callista Lawsomana G. Don 1. c. p. 814. Similis E. tenuiflorae. C01. carnea tnbo 5-6-lin. limbi lacmiis niajusculis acentis (v. s. c. et sp) #

x43. E. FASTIGIATA (Linn! mant. p. 66. non Andr.), floribus subsessilibus , bracteis appioxima'is, sepalis linea-carinatis acntissimis ngidis, coiollae glabrae tubo calyce vix duplo longioie aeqaali hmbi laciniis lato ovatis snpià faii-naceis, a nth en's mutici&.— in montibus prov Stellenbosch. E. fabtigata Wendl. eric fasc. 19 IC. bot. mag. t. 2084. fc fa&ciformis Sah&b.! 1. c. p. 38a E. mundula Andr. heath, t. 273. Lodd! bot. cab. t. 114. E. Humeana Lodd.! bot. cab t. 380. Callista fastigiata G. Don 1. c. p. 814. C. Humeana ejnsd 1. v. 8ii. et C. mundula ejnsd 1. c. 8i3. Ab E. pavettaeflora differt piaecipue corollae tnbo 4-5 lin longo. (v. s. c. et sp.)

* primuloides (Andr. heath, t. Q33), homiUor, corollae tnbo hreviore basi ampliato limbo latiore E. pumnloides bot. mag. t. 15^8 Lodd.! bot. cab. t. 715. Callista primuloiden G. Don 1. c. p. 816. (v. s. c)

~| I Corolla: tubo ovato-'v. oblongo-injlato apice attenuate.

144* E. DAFHRIFLORA. (Sahsb.! 1. c. p. 384), floribus snbssessihbs, bracteis ap proxiinatis, sepalis lanceolato hnearibus aenminatis ngidis carinatis, basi tantum margipe scariosis integris v. denticulatis, coiollae tnbo ovoideo calyce paium longiore, an the i is muticis.— in montibus prov. Stellenbosch, Swellendam et George. E. daphnasflora Lodd.' bot. cab. t. 543. Wendl. eiic fasc 26. ic. E. mcerta Klotzsch' in limmea ia p. Si|. E indigesla ejnsd.' 1 c. p 52^. Callista daphniflora G. Don 1. c. p. 8i5. Cor. pallide carnea, tubo 2 lin, limbi laoinhs 1 lin. longis. (v. s. c. et sp.)

145. E. PEDTCELLATA (Klotzsch' in linnxå 12. p 525), floribusbieviter pedicellatis, bracteis approgiamatis, sepalis lanceolato-linearibus aenminatis ligidis carinatis basi tantum margine scariosis integris, corollae tubo oblongo calyce dnpllo longiore, antheris muticis.—in montibns prov. Swellendam (Mundt). "VJX non vai. E. daphniflora. Cor. tubus 4-4 $\frac{1}{2}$ lin. longus. (v. s. c. et sp. in herb. Hooker)

146. E BARTLINGIAWA (Klotzsch' inlinnaeå 12. p. 52i), floribussubsessibus, bracteis approximatis, sepalis lato-lanceolatis vix acuminatis carinatis Incidis, margine scarioso integro, coiollae tubo oblongo calycem paium excedenle , limbo latiusculo suprà sabfarmoso, antheris muticis.—in collibus ad flum Zondeieinde prov. Swellendam (Ecklon et Zeyher). Inter E. daphnifloram et E. Walkeriauam ferè media et forsas hujus var (v. s. sp. in herb. reg. Berol)

147. E. DISTANS , fobis supeionbus paivisdistantibus, flonbus longedigellatis, bracteis appioximatis, sepalis late lanceolatisroargineintegioscaroho cauinatis, «orolde tubo basi inllalo calyce pluries longioie limbo latiusculo, antheris ninticis.—in rupibus Koude Bokkeveld piov. Worcester (Masson). Aflinis F.

Walkeriana) sed habit a et inflorescentia diversa. Cor. tibus 6-7 lin longus. (v. s sp. comm. à cl Lee et c comin à cl. Waid et in heib. Hooker)

I/8. E WALKIRIANA (Andr. heath, t 50), floribas subsessilibus, bracteis appi 0x1 mat is, sepalis ovatis v ovato-lanceolatis bievius longius acumiatis margine scanoso denticulato v subintegio, coiolla* tubo ovato v. oblongo calyc duplo saltern longiore, limbo tubo 3-4-plove bieviore, antheris muticis.—in coloniâ Capensi. Species calycis foimâ et coiollae magnitudine vanabilis ab E. daphmfloia divisa sepalis latiobus et floribus majonbas, ab E denticulata sepalis non spathulalis et fl majonbus.

A. *Andrewsiana*, sepalis lanceolatis oblongis vix acuminatis fere ad apicem denticulate, coiollae tubo S 3 | lin longo pallido — in montibus Zwaitebeig et Roodesand E Walken Andi. 1 c. Lodd hot cab t a5h. h j n - liana Nois Lodd hot cab. t 799. E. pnchra Sabbs ' 1 c p. ^84. Callist* Walkeriana G. Don 1. c p. 814 et C jnliana ejusd. 1 c. p 81i. (v. s. c. et sp)

fi platysepala, sepalis latioribus subacuminatis vix denticulatis, corollu tnbo 3 4 lin. longo pallido r. fasti^iata Andi heath t *2 Lodd. bol cab. t. 207 ** non Linn — in montibus piov. Worcester. (v s c et sp)
y rubra (Andi. heath t 200), sepalii vai a. Coi rubrx tubo 4-5 lin longo.
— in montibus Roodesand (Niven) (v s c et sp)

< *T grandiflora*, sepalis o\ato-lanceolatis longius acumnatis, corollâ rubrâ 5-8 lin. longâ. — in montibus prov Swellendam. An sp. propna? (v. s. c. et sp)

1^9 E. PR^STANS (Andr. heath, t. 232), floibns subsessilibus v. bieviere pedi* cellatis, bracteis approximatis, sepalis ovatis acuminatis magine scarioso integrinno, coiollae tubo oblongo calye duplo saltern longioie, limbo tubo vix duplo bieviore, antheris muticis —in montibus piope lulbagh piov. Worcestei (Ecklon et Zeyhei) ad Dntoits Kloof (Diege) vix non vai. t. Walkeiana^a limbo coiollx majore (v. s. c. et sp)

Sequentes vanetates hortenses verosimiliter hybndas praecedentibus propinqnos sunt, omnes limbo ampio donatae.

- *daphnoides* (Lodd 1 bot cab. t. i54)« omnia E. dnphniflor.ne nisi limbo corolla) dimidio tubi sui longiore Callista daphnoides G Don 1. c. p. Si5. (v. s. c.)
- *laxiflora*, E. piaestanti simillima nisi flores numerosi longiascule pedicellati E praestans Lodd. bot. cab. t. 1695 (v. s. c.)
- *hyaanthoides* (Andi heath t 167), db E. Walkerianâ mbiâ limbo ampio diveisa. Callista hyacintoides G Don 1 c p. 8i4- Huic siinlhma et veiosimihter eadem est E. Paimentieu Lodd. bot. cab. t. 197. Cajlista Parmentieii G. Don 1. c. p. 8i5 (v. s. c.)
- *mirabih* (Andr heath, t 271), sepalis E. Waikrianae a, corona alb® limbo amplissimo tnbo sno vix breviore. E. mirabilis Lodd. bot. cab. t. 1804. Euryloma mirabilis G Don 1 c. p 816. (v. s. c.)

i50 E. VEKUSTA (Bedf. hort eric p 28?ethortul' non Salisb. nee Klotzsch), flonbns subbessilibus, biacteis approximatis, sepalis obovatis v. oblongo-spathulatis carinatis margine scarioso lacero-dentato, corollâ tubo calye subtriplo longiore, antheris muticis —in montibus Zwartheberg (Mundt) E dentata Wendl. eric. fasc. 19. ic. non Thunb. E pellucida Salisb. l. c p. 384, ex parte non Wendl Plures vidi species Callistarum à Salisbury nominibns E. pellucidas vel F. polchellas salntatas Calhsta venusta G. Don 1. c p 8i5, et C pellncida ejusd. 1 c. p. 814. Ab E. denticulata diveisa tubo corolla 5-6 lin longo. (v. s. c. et sp)

i51 E DKHTICUI ATI (Linn, niant. p 129), flouibus subsessilibns, bracteia approximatis, sepalis obovatis spathulatis v. caulinatis margine scarioso lacero-deutato, corolla? tubo ovato calye ix duplo longiore, antherij, muticis.—in montibus pro\ auslio-occidentahuin comiaunib. fc dentata Thunb. diss. n. 3g. T. denticulata Wendl. eric, fasc a5. ic. Lodd. bot. cab t 1090. K. venusta

Hortul. nonnull. E. clentirulaiis Silisb ! I c p 334. Calhsta denticulHia G Don 1. c. p. 814* *epala nsquic ad apunn scauosa dcntdtm nervo medio \i\ excuirente. Coiolla flavesceus losea v. alba tubo 3-4 lm longo.—Species praece-
d en tea I4^j-i5r, chauctenbus \alde iuccitis intei se distinguuntur. (v s. c et sp.)

i5a. K MUSCARI (Audi heath c lio), iloubus bieviter pedirellatis, biacteis pat vis lineanbus subiemotis, sepalis lanceolatis acutis cauinatis maiginc sea-
nosis Integeitimis, corolla; tubo ovato, antheiis muticis. — in montibus prov
"WorceMei (Roxburgh, Niveu, Ecklon,etc.) et in Cedeibeigen (Drege). E. Mns-
cari Wendl eiic fasc. 18. IC. R. moschata Lodd. bot. cab. t. 614 non Andr.
E. fiagiaus Salisb ' I. c. p 383 non Andr. Cillista Muscari G. Don I.e. p 814
et C moschata ejusd 1. c p 815. Corolla; lutescens snavalentcs tnbo I | S
lin. longo (v. s c. el sp)

* *Crossula* (Lodd. bot cab. t. 668, 174*2), omnia E. Mascari nisi coiollae carnea* majores limbo amplioie, antheris nonnanquam aristatis. Callista trossnla O Don 1. c. p, 815. (v. s c.)

* *cruciforiQis* (Audr. heath t. 268), floribus subsessiltbus sabfastigiatis,
bractei* appioximatis, aepalis lanceoJaus acnminatis caiuatis maigine scanosis integiis v. minnfe deuticulaiis, toroll* tnbo ovoideo v oblongo calyce parùin v. subduplo longiore» fauce ajqnali limbo latiuscalo , antbe-
us brevitei aristatis. E. denticulata lutscens et E. fastigiata lutea Hortul.
E cuneifoimis G Don 1. c p. 790 et Callista Bedfordiana ejnsd. 1. c. p.
814. Cor. lutex v. lubescentes apice subvirescentes. Ex E. fastigiata et E Blndfoidianā? enata. (v. s. c.)

* *mdiflora* (Salisb M. c p. 383), floiibus breviler pedicellatis, br icteis appioxiniatis, sepahs lanceolatis acutis cjunari^ marline scarioso intento v. dentato, coioll-c tubo ov.ito fauce vix obliquā, antheiis bievitci arislatm muticisve.—Callista uidifloia G. Don 1. c. p. 815. Cor. alba tubo 2-3 | liu longo. (v. s. c.)

* *Bonplandiana* (Lodd.! bot. cab. t 345), floribus breviter pedicellatis, brac-
teis paivis hneaubus, sepabs lanceolatis acufis cauinatis maigine basi sc 1-
rioso mtegro , corollx lubo ovato fauce subobhqna , »nthens brevitei aristatis. £. Donplandiana bot. mag t 21*26 E fscolostoma Klotzsch ' in linnaea 10. p, 3aa. C01. roseo-alba limbo flavescente tubo i| lm. longo
(v. s. c.)

153. E. BLANDFORDIAWA (Andr. heath, t i54). floiibus breviasimē pfdicllalis subsohtariis, bracteis parvis lineanbus, sepahs ovato-latiteolatis obtnsiuscnlis carinatis marginc scanoso integio, corollae tubo o\ato subinenrvo, fanee obh-
quā, antheiis snbulato-ari&iatis.—in colon IS Capenu (Niven) E. Blandfordiana bot. mag. t. 1793. Lodd ' bot. cab t. 115. Cor. luteae J-4 lin. longae, forma qnomodo E. baccifloioe intei Kvanbes. appioximat. (T. s. c et sp.)

Sect. xxiv. C^ATHOLOMA. — Coloratae Klotzsch.

Inflorescentia axillaris v. subteiminalis. Coiolla sicca , tubo globoso calyce col-
lorato snbbicviore, fauce valde constrictā, limbo amplo conca\o*patente. Anthe-
la? inclusa?. O\arium glabrun sessile. — Folia teina.

154. E. IHUNDERGII (Linn. ill. suppl p. 220), huiuilis ciectiuscnla, foliis e recto-
paleniihus hneari-tngonis glabris, hiacteis lanceoldtis remotis, sepahs OVUM acntis cauinatis margine membranaceo-scaiiosib, nnthens inutitis — inmontibns KondeBocke\eld piov. Worcestei (Thunbergj, Cedeibeigen (Diege). E. Ihmi-
beigii Andi. heath, t. 244. bot mdg. t. 1214. Lodd bof. cab t 277. E mc-
diohfloia Sahsb < 1. c. p. i^i. Fnylepis Thunberpi D et G Don 1. c. p. 808.
"Vix unquam scmipedalis. Moies piiintim subtenninaies teini, ileinum laino excurrente laterales Sepala 2 | lin flavidantia. C01 tubus flavescens cucitci 2 lm duimetro, limbns pnliche inbei laciniis ovatis obtusis 1 4 lin. longis ADthirae oblongo-lineaies, feie Eurylomatnin , poro bre|i oblongo (v. s. c.
et sp)

f Ceisiana, 001 oils tubo mnjoic palbdè roseo limbo Jncarn[«]ito E. Cckiaiu Lodd bof. cab. t 177. Callista CeUi.ma G. Don 1 c. p 8i3. Forlè by bnda hoitensis.

x55. F. CORYDALIS (Snlib. 1 c p. 33^) fohis squat lono-putentibus oblongis convexis ciaiiis viscidio scabns lucidn , biaiteis puvis appioximatis , bepalislato-ovatis apice CH inatiscoloialls |iscosis. an the MH bievitei lanceolato-appendicnlatis.—in montibus piov. Woiceslei ? (Niven) Euiyategia CoiydalisiG. Don 1. r. p. 810 Species distinctissiua MelasteuionU nonnilul affirm sed coiolla tubo. onimuò at in Klhunbeigianà, globoso apicV valde constiiclo dñersa Coi. tubus 1 | lin. diainelio, hmbi lacinia* feiu i hn. loDgæ. Aiilheiaium loculi distincti ovati lute .ipein, apice augiiste membianaceo dilatali, bus! po&tice in «> pendicoiu bretem &cibraim piucti. (v, s c. comm à cl. Lambcit.)

Sect. xxv. PLATYSPORA Salisb.

Inflorescentia axillaris ran[“]us terinalis. Corolla sicpa tubo oblongo v. ova to calyce imbcato colorato scaifoso breviore v. non duplo longioie, faoce constricta, limbo piano patente Antherx inclnsae. Ovauim glabium v iipic pubciiuni, sessile. Seiuna plano-compicssa maigine raembranacea 1 cvia.

*f Inflorescentia lateralis, cmtherce muticce *v. aristata, Dracteccparvee subremotcc. Folia terna.*

156. E. ALBEN (Linn. mant. p. a3i), glabeiiima-foliiscieclo patentibus linearitiigonih, pedicellis brcvibns secùs tamos racemosis, sepalis o\atis acntiscaii-natis scanosis coloratis, rorolla? fnbo ovalo inflaro dimidiò bie\ioibus, antbe-lls muticis vel minntissime aiistulalin —in monlibus Roodesand piov. Worcester. E albens Wendl. eic fasc. 6 ic. Andr. heath, t. 2. bot. mag. t. 4/jo, Lodd.! bot. cib t q5 E albida Thunb. fl. cap. p. 347. E. viuiualis Sabsb. 1. c. p. {87. Fuiylepis albons G. Don I c. p 808. Habitat E. tetragona*. Colla subbrevioi niagis inflata albida exangulata (v. s» c et sp.)

yf longiflora, ^epalis angustioubus , coiollis .ipic longius attenuatîs, liiibi licinis .icutiusculis. In monlibas Zwaitebeig piov. Swellendam (Niven , Diegc, n 773b) (v. s. "»p.)

157 E TEIRAOONA (Ihunb d&n n. 5. t /), glabeuima, foliis erecto-patentibus linear-subulatih tugonis, pedicillis bicvibns secùs ramos racemosis, bepalin lanceolalis siibnlato acuminatis caiiiKttib, tubo coiollae o\ato inflato tetaagono bievionbus.anlbeiisnitucib.—in monlibub Outniquasprov. Albany (Niven) ad Kiomme flum. piov. Uitenbage (Diege). E. tetaagona Andr. healb t. 95. Wendl. eic. fasc 23. ic. lodd ! bot. cab. t. 123o. E. pngionifoha Sali&bJ 1. c. p. 387 Calhsta teJragoua G Don 1 c. p. 812 et Eurylepis tetragona ejusd. 1. o. p 808 Rami \iigati giaciles Folia 3-5-lin., acnta. Moies &ecundi. Sepala 11-gida 1-2% lm. Cor. vindi-flavesccns i ^-4 lin. Filamenta tenuissima, anlheuu minima¹. Seinina in bac et pmcedenle omnino MacnabLc. [v. s, c. et sp.)

158 ² E CHOROSI PAT A , foliis imbricatis elliptico-hneaiibus obtusis carinatis v. doiM> snlcatis, pfdicellisbievibiib pubeinlib, bracteis Iincari-caiiiatis subiemotis, hepatis lanceolatia cannatia conaceis coloiatis tubo coiolla; sub inflato vix brevioribns, anlheiissubulato-aiisttlis, ovaio apice pub#iulo —in coloniA Capensi ad Boschefcinans Pat (Masson , Buichell n 7098, Mundt) Specif&plunbns noti-idislinssima. Tolia ieic *. guaphalodib ;lm 1 loies secas lamos densi. Sepala u^ida viescenlia subfobacea nilenlia demuin iu sicco fuscescentia non-nnnqu..mcoiollarasubacqnautia. Cor. lubus 2 ih n., lirabus } lm. Tilamenta flbfoinia hemma non vidi (v. s. *». comm. à <1. Lee et in b/rb. Burch, tt Houkt'i.)

*tt Inflorescentia terminal 1 ?. Anthra: cristacco. Bractece sepaloidecs. Folia opposita *v terna*

159. E. DIANTHIFOLIA (Salisb '1 c p 338), ramis atrictis, foliis opposite ap- ples lineaii-caiinatii acntib , floribub subbiuis, pedicellis albo pubescentibcs, bratteis appirsbis, bepalw ovatis arummatib apicr caiinatis scauosis coiollce tubo

ovato inflato longioribus.—in collibas montibnsque prov. Swellemiam occidentalis (Niven, Ecklon et Zeyhei) E bl flora Link! en urn hort Berol p. 307. Lodd. bot. cab. t. 688. £ oppositifoha major Audi, heath t 179. Lamprotis dianthifolia et L. biflora G Don 1 c p. 812. Folia 4-5-hn. Bracteae et sepnla irobriata interiora saepe etiarn limbum corollae superantia. Semina in hac et sequente plana qaidem, tenuia et lac via, at inargine minus membranacea quam in £. albente et tetragona. (v. s c et sp.)

160. E ERIOFUS, ramis strictis, fohis terms rariis oppositis linearis-trigonis acutissimis, floribus a-3-nis, pedicellis cano-puberulis, bracteis laxis subremotis, sepalis ovatis acuminatis caiinatis seariosis corollae tubo sabgloboso longioribns.—in co Ion id Capensi (Buichell n 7117). Folia patenliora, flores minores quam in E. dianthifolid (v. s sp in heib. llurch)

Sect. xxvi. LAMPROTIS *Don*, — Anthodynates *Klotzsch*.

Inflorescentia terminally, floribus 2-3-nis, nonnunquam ad apices ramorum fasciulato-racemosis Coiolla sicca tubo calycc imbricate scarioso colorato breviore v. viz. duplo longioie, face plus nimutve consichta lirabo subplano. Anthera* tristatde rarius muticie v bietiter an^tatac. Ovanum sessile glabrora. — Folia opposita v. terna ranssime (in h coinosa) quitern 1 — Secio quoad plerasqnc species uatnrahs, etsi mediantc E coinosa Callistae affinis sit, et vix charactebus certis ah Euiystegia et Tugemrua separata.

j" *Antherce muticav. brevissunh arirtatce. Folia terna *u. quaterna.*

i d⁹ E. COMOSA (Linn' mant p. 234), fastigiato-ramosissiuia, foliis 4-nis brovibus subulatis glabruisculis, flonbus sub-4-nis gloomeiatis, bracteis patvissnh-reniotis, sepalis ovalisacutis acnmiiatisve cannatis tubo corollae parum inflato dimidio bievionibns —in montibus piov austio occidentalium commnms F. comosa Bauer icon. boit. kev/ t 18. Wendl eric fasc xa ic. Andr. heath, t. 10, 11 E. tianspareos Beig. pi cap p 108 tesie Sali&b E. gahiflora Sali&b? 1. c. p 383. Callista comosa D. ct G Don 1. c. p. 814. Raronli numerosissimum saepias pubeiuli dense foliati Flores carnei v albi Cor. tubus fere a lin. Antheiae saepius minutissime biaii&talatse. Forte ad Callistas amandanda. (v. s. c. et sp.)

x6a E STBINBERGIANA (Wendl. ill. ex Klotzsch¹ in linnaea ia. p. 531), ramis subfastigiatis, foliis terms linearis-trigonis subellipticisvc erecto-appressis glabus, floibus subses&ilibus capitatis, biacteis paivis appioximatis, sepalis lato-lui-ceolatis cannatis acutissime acuminatis tubo coroilae basi inflato subtetragono pa ram bicvioribas, anthers muticis.—in montibus prov. Swellendaui occidentalis (Niven, Hesse, Buichell) (n. 7086) Glaberrima. Folia z-a lin. Flores carni mnjoies quam in E. comosa tnbo 2-3 lin. longo. "Variat sepalis foliisquelatioibns angUAtioribasve. (v. s. sp.)

163. E. GLOMERATA (Andr. heath, t. a64), foliis ternis linearis-trigonis e recto-appressis glabus, floribns subsessilibns capitatis, bracteis approximatis, sepalis obovato spathulatis unguiculatisve bievissime acuminatis acutisve a pice caiinatis coroilis tubo basi inflato paium brevionbas, antheris minute subaristatis —in montibus pio\). Swellendam. h lubella Kei. bot. mag. t. 2165. Lodd. bot. cab. t. 658. E calycinades Bedf hort. Wob p. 4. E. rubella G. Don 1 c p. 792. Lamprotis rubella ejnsd. I.e. p. 81a et L. calycinades et L. rmbida ejnsd. 1. c. p. 811 Affinis E. Steinbergiana, calycibus distinctissima. Folia flora-ria saepius ovato-dllatata Cor. tubus a-lin. (v. s. c. et sp.)

164. E LJEVIGATA (Baitl ! in linnaea 7, p. 638), sticta sobfastigiato-ramosa, foliis terms appressis linearis-tiigoms acutis glabns, floibas pedicellatis aggregatis, bracteis remotis, sepalis ovatis acutis carinatis tubo corollas oblongo-inflato dimidio brevioribas, antheris bieviter anstatis.—iu prov. Swellendam occidentah (Masson, Mundt, Fcklon). E. oppositifoha rubia Lodd. bot. cab. t. 1060? (cui folia terna) non Andr. Inflorescentia feie E. Inteae, habitus nigidior, flores imnoies tubo vix 1 | Imeari, rubii (v. s. sp coinui. a cl Hooker et in herb. Reg. Berol.)

†† *Anther** minute, *sasph imihuhsimh*, *cristatce*, *filament* filiformibus*. *Folia opposita rariis terna*.

165. E. TUfuxroiiA (Linn. spec. p. 507), foliis oppositis appressis linearis-trigomis, floribus breviter pedicellatis, bracteis parvis subremotis, sepalis obovatis acutiusculis apice cannatis tubum corollae ovato-inflatum sublobosum subaequautibiis, ovario turbinato.—in montibus prov. austro-occidentalium E. oppositifolia rubra Andr. heath, t. 180 vix Lodd. E. linifolia Salisb! 1 c n *38f^b Lamprotis tenuifolia D. et G. Don I. c. p. 812. Vix nisi colore florum intense rubro et corollis brevioribus ab E. loteS diversa. Limbus corollas saepius at nou semper, brevior, latior. Cristae antheraruin in bac et tribus sequentibus specie bus minutissimis, saepè vix couapicua; ab auctoribus nonnullis neelectae Vv. c. et sp.

166. E. LUTEA (Linn. mant. p. 34), foliis oppositis appressis linearibus carinatis acutis, floribus breviter pedicellatis, bracteis parvis remotis, sepalis ovalis acutis apice carinatis tubo corollae conico basi inflato siccissime brevioribus ovario obovato.—in montibus prov. austro-occidentalium. E. imbellis Salisb ! J. c. p. 385. Glabra, rami filiformes saepius fastigiato-paniculati. Folia i-3-lin Flores ruinerosissimi. Cor. tubus 2-2 | lin. longus.

a. *lutea*, floribus luteis v. *flavanticibus*. E. Intea Linn. 1. c. Wendl. eric fasc. 1. ic. Andr. heath, t. 29. Lodd. bot. cab. t. 64. Lamprotis lutea G. Don 1. c. p. 812. (v. s. c. et sp.)

I. *albiflora*, floribus albis v. pallide rubellis, saepius brevioribus E. opnositifolia Andr. heath, t. 178. Lodd.! bor. cab. t. 1343. E. biflora hortul non Link. Lamprotis oppositifolia G. Don 1. c. p. 812.—Non E. lutea alba Bedf. (v. a. c. et sp.)

167. E. BORBONI-FOLIA (Salisb. 1. c. p. 386), foliis oppositis appressis linearibus cannatis acutis, floribus pedicellatis, bracteis remotis spathulatis leutis coloratis sepalis late obovatis acutis petaloideis corollae tubum ovato-conicum aequanti bus, ovario cylindrico.—in montibus Bavianskloof prov. Swellendam occidental is (Niveu), in eadem prov.? (Bnrchell n. 7762). E. togata Sims bot. maff t. 1626. E. aperta Spr. syst. a. p. 200. Lamprotis borboniacfolia, L. toala et L. aperta G. Don 1. c. p. 812. Rami diffusi, ramulis numerosis Folia 2-3 lin Corolla? tubus circiter 3 ± lin. Pedunculi, bracteae, calyces et corolla? carnea' (v. 8. c. et sp.)

168. E. TAXIFOLIA (Dryand. I in Baner icon. hort. kew. t. i, 9 | foliis ternis subreciriyo-patentibus linearis-trigonis acutis glabris, floribus umbellatis bracteis remotis, sepalis ovatis acuminiatis apice carinatis corollae tubum ovatum inflatum subsuperantibus, ovario lurbinato—inmoniibns prov. SteHenbosch australioris et Swellendam occidental. E. taxifolia Weudl. eric. fasc. 2. ic Andr heath, t. Q3. E. turgida Linkenm. hort. Berol. 2. p. 365. non Salisb. Lamprotis turgida G. Don 1. c. p. 810 et L. laxifolia ejusd. 1. c. p. 811. Folia 4-6-lin Rami floriferi fastigiati. Cor. tubo 2-lineari carnea; (v. s. c. et sp.)

S. major (Andr. heath, t. 243), sepalis bracleisque majoribus, antherisevi dentibus appendiculatis. (v. s. c. et sp.)

ff-f *Anthera evidentius cristate*, *filamento plus miniisve complanato*. *Folia terna rariis opposita*.

169. E. LAMPROTES (Klotzsch ! linnaea 12, p. 536), ramulis puberulis, foliis squaro-so-patentibus linearis-trigonis glabris, floribus ad apices ramulorum subternis cernijs, pedicellis brevibus birtis, bracteis parium remotis subsepaloides sepalis ovatis acutis carinatis corollam superantibus.—in montibus Houwhoeket prope Knofflockskraal prov. Stellenbosch (Ecklon et Zeyher), etiam in coll. Mundt. Species affinis E. biflorae videtur sed abunde distincta. Rami divaricato-ramosissimi floribundi. Sepala carnea 2-lin. corolla 1½-1¾ lin. (v. s. sp. commun. & cl. Hooker et in herb. reg. Berol.)

170. E. PALLUFLORA (Salisb. 1. c. p. 351), foliis ternis erecto-appressis linearibus

lanteolalis caiiaalis glabris, lloubus ad apices lamorum fasciculatis, pedicelhs
griabus, bractis lanceolatis oblongisve. cannatis subicinolis, scpdlis late ovatis
ohovatisvc kvitei caunalis suhacuniinatis corollam acquantibus v vix supeiau-
bus, <oiollâ subcainpanulatâ fauce paium constictâ, limbo vix patente (?) —
in piov Cape E pallid.* Wendl' ei ic. fasc a5 ic. non Salisb Lniylepis pal-
lnfloia G Don 1 c. p 809 et Lawpiolis palhda ejusdem 1 e p 820 Sinihs E
roufoliae et pio vaiietatem tjs piimm habni, sed corollae fonna ex sicco di-
vvisa videtui. Moies ciica 2 lin. lungi. An ad liigeraoiam ainandanda? (v
S. H.)

171. L BRACTEATA (Thunb. diss ii 3), foliis tcnis erecto-appressis sabpateuti-
husve limaribns v ovato-elhptici, com avis carinatu, floubus ad apices lamu-
Joum dense fasciculatis, pedicellis glabns, biacteis Imearibus oblongisxe
lemotis, sepalis obovatis aciiminatis apice vix caunaUs tnbum coiollae supe-
lanlihus—in mont. piov Stellenbosch austi et Swellendam occid volgans
1 coiifolia Linn ' heib ex paite K. obvallaiis Salisb M c. p. 386 et E. byssop-
ifolia e|Ubd 1 (p 387 E obcoidata Bcdf hoit Wob p. 17 E togatoides
lioitnl Euylepis ljracteata et E obcoidata G. Don 1. c p 808 Lamprotis ca-
lycina ejusd 1. c p 810 et L. hyssopifolia rjiisd 1. c p 811 Species ab>I* co-
ufolia distincta at diagnosis difiicilliua Folia snprema srepe o\ata maigine
bcauosi Moics carnei duplo plcimque majores quain in E COM folia, et
coiolla* piopoitiono calycis sajpius lou^ioies "Vanat taraen fobU angustis la-
tisve , iloribus majonbas ounoribnsve (v. s. c. et ap.)

172. E roRiFOLIA(Linn 'spec p 50^), foliis term'seiecto-appressis linearbaslan-
ceolatisve cailnatis glabns, floubus ad apices tamuloram fasciculatis, pedicellis
gLabns, bracteis linearbus v oblongo spathulatis subremotis, sepalis obovatis
acurainatis apice viv caiinatis coiollam saperantibus —in collibns pro> austio-
occidentalim conimauis E coiifolia Dauer icon boit kew t ar E calycina
Andr heath* t. 8. Wendl enc fa&c 10, ic. Lodd.' bot. cab t 5g4 et aucl. plui.
non Linn F. con folia spicata Wendl eric. fasc. 24. ic. E articularis Curt, bot
mag t. 423 non Linn. E tanlcata Baitl.inhnnaeå 7, p 636 h alopecias lausch.
bot zeit 20. (1837) p. 498 Ldinpicioiscorifolia G. Don 1 c p 810. Kami flou-
ferl panicalato-iainohisHimi electi stncti v lanus flexuoso-diffusi. Fol ngida
circa a-lin. Flores vix 11 lin. carnei. Sepala nunc bievissime none longius acn-
rainata, constanter ut videtur basi angustata. Species vauabilis nee ulhs Inui-
tibus certisallnitinns scpaiatui, torunae enim mtei mediae earn cum praecedente et
4 seqnentibns connectant h calycina Liun. est species valde obscma, à Sails
borio ad h. vespitinam relata (v. s. c. et sp)

173. E POLYGALJEFIORA (Klot7scb' inlinnxå 12 p 537), folns term's erectislinea-
1 i-soblancoelatis acutis, flonbus pedicellatis fascienlatis, pedicellis pnbernbns,
biacteis liuearibns oblongisve remotis, sepalis ovatis obovatisvc acammatis co-
ollas tubum vix aequaute, coiolla? limbo discoleie —in planitieCapensi (Drege,
Mundt) Folia roargine tenuia ssepe roembranacea ciliata. Pedicelli calycejub-
aequilougi. Cot. tubus vix 1 I lin. pallidus, limbo atiopnrpureo. (v s sp.)*

fi. major, corolla 2-2f-lineari. E. calycina melastom.i Andr. heilh. t 354.*
In montibus Houwhoek prov. Stellenbosch (Mundt). (v. ,s. sp. et herb.
Hooker)

174. £. FAiui\ (Klot7sch' inlinnxåia.p. 538), ramis sti ictis, foliisrectislineaii-
tiigonis deutis, floubushscicahli\$, pedicelli glabns, hiacteib linearibns oblon-
gisve lerootis, sepalis ovatis obovatis\e acummatis corolla, tubum subsnperan-
ibus, corollaplimbobrevidiscolore —in montibus piov. Stellenboschanstralions
(Ecklon et Zeyher) E. calycanlhoides Klolzscb' 1 c. p. 53q E polyglaefloiae
bimilliina Coiollae tabus albus, lmibus rnbescéus (v s. sp. iniieib. Hooker et
reg Beiol.)

175 E. NODIPIORA (Klotzsch! inlinnaså 12, p. 53g non Salisb), ramis flexaoso-
cliffus, foliis appressis linear-carlnatis acutis, floubus secùs ramos vel ad apices
forum fasciculatis, pedicellis glabns, biacteis parvis remotis, sepalis lato-ovatis

acutia carinata, corollae tubo subbievioribua, corolle limbo di9Colore.—cam praecedente leg. cl. Ecklon et Zeyher, Mundt et Maire et forsitan mera *varietas parviflora*. (v. a. sp. in Lerb. reg. Berol.)

176. f. TERETIUSCULA. (Wendl. eric, fasc ai. ic), foliis subincurvo-erectis appressis linearis-carinatis v. dorso solcatis saepius brevibus glabris, floribus fasciculato-racernosis subterruinalibus, pedicelis glabrispuberulisve, bracteis parvis subremotis, sepalis ovatis acutis v. obtusis levier carinatis opacis v. vix riten-tibus corolla; tubo plerumque sequilongis, corolla? tubo subgloboso fauce parum constricta limbo concolora.—in proviuciis anstro-occidentalibus coinmnis, E. flagelliformis Andr. heath, t. 262. R. Magellan's Link enuin. horl. Berol. p. 365. E. corifolia var. Salisb.! E. struthiolaeifolia ! et E. filiformis? ttartl. linnaea 7, p. 636. Lamprolis flagellaris et L. flagelliformis G. Don 1. c. p. 811. Habitus E. articulat et vix sepalis corollisque ab ea distincta. (v. s. c. et sp.)

177. E. ARTICULARIS (Linn.! mant. p. 65 non Thunb.), foliis subincrivo-erectis appressis linearis-carinatis v. dorso sulcatis saepius brevibus glabris, floribus fasciculato-racemosis subterminalibus, pedicellis glabris pubemlisve, bracteis linearibus oblongisve sepaloidis subremotis, sepalis ovatis acutis imbricatis carinatis nitentibus, corolla calyce breviore tubo subgloboso fauce paratuVonstricta.—in provinciis uistro-occidentalibus vulgaris. Ha mi saepiusvirpati tenues apice floribundi, inflorescentid nonnunquam ferè exilian. Folia 1 lin. rariū slin. longa. Flores carnei albidi v. sordide flavescentes, 1 lin. longi. (v. 8. c. et sp.)

178. E. CALEDONICA (Spr. HL suppl. syst. veg. p. i3), foliis inibijicato-erectis ovatis concavis crassis margine albo-pellucidis, floribus ad apices ramorum, longiusculè pedicellatis, bracteis remotis linearis-spathulatis, sepalis lato-ovatis brevis si rùe ucuminatis carinatis corolloe tubo dimidio brevioribus.—in montibus Hottentois Holland et prov. Swell en dam occidentalis (Ecklon et Zeyher, Roxburgh, Masson, Burchell 11. 7682). E. marginata Bartl. linnaea 7. p. 637. Humilis ramis erectis. Folia sexfariam imbricata. Pedicelli calyce longiores. Cor. tubus crassus ferè 3-lin. (v. s. sp.)

179. E. MCKERIAWA (Klotzsch! in Jinnaed 1a. p. 54i), foliis inenrivo-erectis subimbricatis ovatis oblongisve crassisculis margine albo tenuissimo v. nullo, floribus apices ramoruin longiusculè pedicellatis, bracteis reiuolis linearibus parvis, sepalis ovalis vix acuminatis carinalis corollx tubo brevioribus.—in montibus prov. Worcester occidentalis (Ecklon et Zeyher, Drège, etc.). E. pallescus Klotzsch! linnaea 1a. p. f>4i. E. caledonicai affinis, sed flores conslanter dimidiò minores. Variat pedicellis puberulis glabratisve. (v. s. sp.)

&>. E. CYCANTHA, foliis imbricato-erectis ovatis acutis coucavis orassis roarginè angustè albo-pellucidis nudisve, floribus densè fastigato-corymbosis pedicellatis, bracteis remotis linearibus elongatis, sepalis ovali-oblongis acutè-acuminatis, carinalis corollac tubo brevioribus.—in rupestribus montosis ad Klynrivier prov. Swellendam (Masson). Species pulcherrima praecedentibus affinis. Folia pleraque dorso sinuata acutissima. Flores carnei. Cor. tubus crassus 3 lin. longus, limbi lacinise ovatae acuta 1 j lin. longa*. (v. s. ap. coimm. à cl. Lee.)

181? E. VIRGINALIS (Klotzsch! in herb. reg. Berol.), glaberrima, ramis filiformibus rigidis foliis oppositis imbricato-appressis brevissimis obtusis carinatis nitidis, floribus terminalibus binis breviter pedicellatis, bracteis suberuotis, sepalis brevibus lanceolatis appressis carinatis, corolus tubulosocairpanulatis subtetragonis glabris^ limbo patente (?) brevi, auteris inclnsis oblongis cristatis, ovario sessili glutino.—in montibus prope Tulbagh (Ecklon et Zeyher). Species distinctissima hinc Lamprotis affinis, a quibus tamen sepalis parvis vix coloratis diversa; hinc O^ophani v. Lepiodendro, sed lirabus corollas stellato-patens videtur. Folia vix 2 lin. longa. Cor. robens 2-lin. (v. s. sp. in herb. reg. Berol.)

Sobgenus IV EUKRIC4. sea *BreviflorcB* — Breviflorx et Calycinaram sp.
Dryander — Knca, Pachysa, Geiamia, Lophandra, Octopera et Gypsocal-
lidis necnon Euiystegiae sp *Dun.*

Corolla brevls (sacpissime Infia 4 lin.) globosa urceolata , ovata v. campanulas,
limboconnivenle erecto .ipeito v. levoluto-patente nee stellato-patente Antheia?
lateiales inclusrc v. exserke.

Sect. XVII. EDRYSTFGIA —Eurystegiae sp. *Don* — Conicae *Klotzsch.*

Iiflorescentia teiminahs v. ramalfs florifens brevibus bine indē aphyllis
snblaterahs Bracteac sepaliformes bepala coloiaata margine imbnrata. Corolla
glabra sicca, conica ovato-inflata v subglobosa, apic plus minusve constiuta
calyce ranus duplo longioi, lnnbo bievi erecto v subpatente. Antheiae indusc
ciibldta?, ianus muticce v aiistatac. Folia tcina —Sectio bine buylepidi \.
Dasyanthi afhms hinc Limproli et inter has sectiones et liigemniain media.
Species omnes Capenses.

* "► *Bracteae laxcr. Sepala petaloideau. scariosa, Ovarium glabrum.*

18?. E EIEGANS (Andi. heatb. t. in), foliis linearbns patentibus glabris
glaucis, floiibus utnbellatis, sepalis amphs lato-ovatis petaloidejs col 01 at Is,
corollā inflato-ovata glabiā calycem brevitei supeiente apice contract^, limbo
brevi subpatenre antheiiis ciistalib —in raontibns Tulbagbensibus t. elegaos
bot. mag. t 966 Lodd.¹ bot cab t. i85. Eury&tegia eiegans G. Don 1. c p
ttop, Humilis Folia 4 S lm denka rigitlula, iloialia saepe biactexfoimra coloi.ita.
Sepala seimplicaria inrarnata. Cor. 6-8-hn. basi carnea limbo viridi. Filomenta
dilatata. (v. s c. et sp)

183. K. GTAUCA (Andi. heatb. t. a5), fohis sabincurvo-patentibus linear^-tu-
gonis glabns glaucis, floribus snumbellalis, sepalis ovatis oblongisve pcta-
loideis, corolljp tubo calycem ?ix aequante ovato-inflato limbo patente, antbe-
ris cnstatis. — in inontibus Dutoitskloof intei piov. Stellenbosch et Worcester
(Dregr) E glaucabot. mag. t. ^80 Lurystcgia glauca G Donl c p. 8oq. Fol.
4-6-lin Sepala incarnata fere 4-lin. Cor. 4-b-lin livide pnrpnrea limbo ssepitus
sabcoucoloie Hxc species cum pracoedente snipe confusa est oec^semper facile
dislinguitur, ntiaque inter Synngodeas, Stellanthes et Euericas*fere media, (v.
s. c. et sp)

* 184. E ANDROMEDJEFLORA (Andr heath, t 1Si), fohis subincaivo-patentibus
lineaubub acutissimis piloso-pubeiulis, floiibus in lamulos bievjssimoj, pedi-
cellatjs i-3-nis seciis rdinos racemosis, bracteib parvls, sepaTis ovatis apIce can-
iiddis scaiiosis coloratis, corollā ovato-viceolatā calyce dimidio longiore glabiā
limbo ecto patente, antheris cnst.itis.— in inontibus ad Klynnvier prov.
Swellendam (Masson, Nnen, Roxburgh). E androuieddc/loia boi. mag. t. i25o.
Lodd ' bot. cab. t. 521. E holosencea Salibb ' l.c p 35a. E.pomifeia Joftal.
Earystegia andioinedaefloia G Don 1 c p. 809 et Lampiotis holoseiicea
ejasd. 1. c p 8zi Folia ligidula semiplicaria Inflorescentia sub.ixill.uis,
pedunculi tamen pleiiquefohati. Sepala majoia quam inic. Loddigesiana. Cor.
4-5-1 in. uti sepala incarnatae. (v. s r. et sp.)

triumphans (Lodd ' bot. cab. t. 257), pedunculis vix foliatis, sepalis ma-
jonbus corollisque albis rubro-maculatis v. pallide carneis. E 'tnumpb.ms
bot mag. t. 2^2. E andromedaeflora alba Andr. heatb t. 201. Euryste-
gia triumphans G. Don 1 c p. 809. An ex E. andromedxflorā et E. Mou-
sonianā hybrida' (v. s. c.)

185. E. iwcrijSA. ^Wendl. fil ' in herb, leg Benol), foliis 8ubincnivo-pareniibns
bievibus hneiri-tngonis glabus, iloubns in lamulos bievissimoj pedicellatis
i-3-nis, sepalis ovatis scaiiosis coloiaatis, corollis cayfe dimidio* longioribu^
o\ato inflatis g'jbris, limbo ereclo, anlhens muticis—in coloniā Capensi
(Hesse, Barrhell n. 7oSIf 7113). Folia a-lin. Flores fere F. androraedaefloiae sed
minorcs. (/s. sp. in herb. Burcb. et reg. Berol)

f f Biauecc approximates cum sepatis imbricatcc.

186 E MODKSIA. (SalisL' 1. c. p 35a), humilis. fob is 3 4-nls brevibus lmea-nbj> oblongisve obtusis ligidis crassis senulatis ciliatisve subincanis, iloribus tcnis pedicellatis, sepalis ovatis obtusis coloziatis incanisve ciliatis, corollâ oblongo-mflata' glabra' pubernU v. a pice stngosâ fauce contiactâ limbo erecto-patente v. demum revoluto, anthens austatis austis subcristatis, ovano villoso.—iamontibusiov Swellendam(IVlasson,NiveD, Bu>chell(77ii), Drege). E. leucophylla KJolzbch linnxa 12 p. 507 ? Lampiotis modesta G Don I. <. p 8xi. Fiuliculus rigidus ramosissimus Folia vix lineain longa , junioia saepe mcana, adulta plei unique glabiata Cor. 4-5 lin longa Affinis hiuc Dasyanthis hinc sequentibus Spctuu Diegeanura in. herb leg. Beiol unicum tantam Tidi iloribus nondum explelis, nee earn caetens com pa rare potui, tamn eadem wdetui species, (v. » sp.)

187. E. PUMIA (Andr' heath, t. 23.), foliis patentibns linearibus obtusis crassis cauescentibos, floiibus terms bieviter pedicellatis, sepalis ovatis apice caiinati:> obtusis coloralis vjscidulis, corollu calyce subduplo longioaibus ovato-mildlis glabris sabviscosis, limbo ereclo, antheris cnstatis —in colomâ Capensi (Masson) E. comllora Klotzsch' in herb. reg. Derol. I<rnctiulns humilis. Cor. 3-lin basicalioca aptce vindis Afiuilas hinc cum E modesIA hinc cum Pachy&ig (l. s c. et sp in heib. Lee)

188. E. POLYCOMA, folns imbricato-appiessis brevibus obtusis crassis, junio rib us piiis albis coraafis , adultis cano-pnbescientibus subglabratissve, floiibus ternis pedicellatis, sepalU ovatis rarinate albo-canescientibus subcihatis, coiollis calyce subdiiplò lougionbns ovato-inflatis glabns subvi&cosis lirabo erecto, antheris ciiblatis.— in roloniâ Capensi (Masiton) Folia vix liuoam longa densa. Flores fere li. pumilx sed vix 2 lin. longi. (v. s sp. comni. à cl. Lee.)

189. E. SQUAMOSV (Audr. heath, t 91), lamis subiectis, foliis 3-4-n" erecto-patentibus densis linearibus obtusis rigid is glabris v viscido puberulis, floribus terms brevissime ptdn ellatis, sepalis lato-ovalis apice carinatis scariosis coloziatis glabiis, corollâ calycein vix supeiente urceolalo-globosa' glabiâ Hmbo patente, antheiis oibiculato-ciistalis.—incoloniaCapensi(Masson) E. tegnljcfolia Salisb ! I c p 35L. Lamprotis squatnosa G Doij 1 c. p 81a et Eurystegia-tc-gula;folia ejusd 1 c. p. 809. Habitos fere E sexfaiiae. Flores ejnsdem magmtudine sed antherainm stiuciua longe diveisa. (v. s. sp.'in heib. Banks et c. in heib reg. Beiol.)

igo? E FABRILIS (Sahsb.¹ 1, c p. 338), foliis imbricatis linearibus obtusis erases mtidis,,iloibus demûm lateialibus teinis brejritei pidicellahs, sepalii ovatis rigide carinatis maiginc scariosis, corollâ urceolato-globosa' calycein vix excedente glabra' limbo snbe^ecto, antheris aiistatis.— in roonlibns piov. Stellenbosch (Niven, Diegt*, Masson , etc) h. tonfeiiifolia Wendl. eric. fasc. ao. ic. E. montanj Bedf enc. Wob. p. i5 G. Dou I c p 790 et Lamprotis fabnlis ejusd. 1. c. p. 811 Planta humilis ramis ligide ilexuosis elongalis. Folia ferè E. sexfarije atbrevioia. Pedicelli tomeutosi. Ilores feie E. arlicularis 1 7 lin. longi. Semina compressa tecta laxa meuibranacea. An Lauiproteos <>p? lioibns tamen corollne vix patens videtnr. (v. s. c. et sp)

Sect, XXVIII. TRIGEMMA Salisb.—Calycinae Klotzs.

Inlorescentia terminahs ilonbus terms lauùs sabquaternis pedicellatis llracte<£ laxae v remohnsculæ angustæ coloratac. Sepala appressa corollam aequantia v paimn bieviora rolorata raembranacea scanosa v. viscossa, marginibus in flor aperto saepe vix irnbricantibus. Corolla urceolata s>pè viscossa fauce cotiacta limbo eierto patente bicvi Antherae inclusae rristratrc v. aristata; Ovatum glarium. Sectio hinc Paebysae afiinis sed calycibus diversa , hinc Lampioti à quA coiollae foimâ et calycibus minus imbricatis, parum differt Species omnes Ca-penses.

"*Sepalis margine imbricantibus.—Folia 5-fcna.*

zgi. E. TRIFLORA (Linn.! spec. p. 508), ramis pnbescientibos, foliis ternis linearis-trigonis acutis glabris cartilagineo-serrulatis, sepalis ovatis carinatis acuminatis margine scarioso imbricantibus corollam urceolato-campannlatam glabram xqnanlibas, antheris cristatis aristatis.—in inontibus prov. auslro-occideuium commnnis. f. triflora Thunb. diss. n. 79. t. 5. Wendl. eric, fasc. 12 et 22 ic. Andr. heath, t. 245. Lodd. bot. cab. t. 1733. E. pyrolaeflora et E. fugax Salisb.! 1. c. p. 35i. Edrylepis pyrolaeflora G. Don 1. c. p. 808 et Eur. triflora ejasd. 1. ic. p. 809. Folia 3-4-lin. rigida densa, siccitate nigricantia. Flores albi a'lin. longi. Anthraram appendiculae none ferè subalatse integraev. dentatae, nunc lanceolate cuneatae v. orbicnlata integrae v. incisae. (v. 5. c. et ap.)

J2. rosea, floribas roseis longi à spadicellatis. E. arbotiflora Wendl.! eric. fasc. a6. ic. (v. a. o.)

199 ? E. DILATATA (Wendl. fil.! in herb. reg. Berol.), foliis 3-4-nis linearibus dorso flacatis janforibus pnbetalis, floribas longè pedancnlati, bracteis par-•is, sepalis ovato-lanceolatis longè acuminatis membranaceis coloratis pnbetalis corollâ urceolato-globosa pnbernalâ pa rüm brevioribns, antheris aristatis ovario pnbetulo.—Hab. . . . E. hirta Wendl.! eric. fasc. 27. ic. non Thunb., Rami flexuosi foliosi. Cor. a lin. Sepalis ad Trigemmam accedit, corollis et ovario ad Ephebnum. "Verosimiliter hybrida hortensis qnarum nonnnllae E. triflorae affines öcenrrnt. (v. s. c. in herb. reg. Berol.)

193. E. AFFINIS, foliis 4-nis linearis-trigonis nctis glabris enlis, sepalis ovatis acaminato-carinatis margine scarioso imbricantibus corollam urceolato-campannlatam glabram aeqaantibus, antheraram appendicibns latè orbicnlatis integris.—in prov. Uitenhage (Zeyher). E. Zeyheri Bnrtl. linnsea 7. p. 635 non Spreng. E. Barlingiana Klotzsch! iti herb. reg. Berol. non ejasd. linnaea v. 12. Yix nisi foliis quaternis ab E. triflora diversa. (v. s. sp. frostnl. in herb. reg. Berol.)

194. E. BACCANS (Linn.! mant. p. 233), ramis glabrioscnlis, foliis qnaternis sob-erectis linearis-trigonis obtasis cartilagineo-serralatis glabris, sepalis ovatis sob-carinatis membranaceis margine vix imbricantibus corollam urceolato-globosa m glabram snbaeqaantibus, antheris cristato-aristatis.—in mont. prov. anstro-occidentallum commnnis. E. baccans Baner. icon. hort. kew. t. 22. Wendl. eric, fasc. 6. ic. Andr. hea'th. t. 53. bot. mag. t. a58. E. bacciformis Salisb.! 1. c. p. 352. Pachysa baccans D. et G. Don 1. c. p. 806. Rami virgati densè foliati. Folia rigida 2-3-lin. Flores incarnati 2 lin. diametro. (v. s. c. et sp.)

195. E. GIGANTEA (Klotzsch! in herb. reg. Berol.), ramis tomentellis, foliis 4-nis oblongis obtusis incurvis glabris dorso sulcatis, sepalis ovatis oblongis vix carinatis enervibnsve scariosis coloratis corollam urceolato-globosam costatam leqnantibus, antheris aristatis.—in Kannaland prov. Swellendam (Ecklon et Zeyhe^). Prope Platte-Kloof (Masson). Habitns altiore rigidore et foliis latis ab E. baccante diversa. (v. s. sp. in herb. reg. Berol. et comm. à cl. Lee.)

11 *Sepalis in flore aperto margine non imbricantibus calycem- tetragonum formantibus* — Folia terna.*

196. E. CHLAMYDIFLORA (Salisb.! I. c. p. 338), foliu snberectis linearibns obtusis coUs dorso solcatis viscoso-pnbescientibns, sepalis ovatis sobenervibus coloratis viscosis, corollis calycem aeqnabitibus v. vix superantibus urceolato-campannlati glabris viscosis fauce pa rüm contractâ limbo patente, antheris snbterminatibus hasi breviter lanceolato-appendicnlatis.—in colonia Capensi (Masson). E. plumigera Bartl. linnxa v. 7. p. 636? Lamprotis chlamydjflora G. Don 1. c. p. 811. Habitns et sepala nitentia E. gnaphalodis sed foliis diversa. (v. s. sp. in herb. Banks.)

igfr. E. GWAPHAIDES (Thunb. diss. n. 75 non Linn.), foliis erecto-appressis internodio plcrômque brevioribns linearis-trigonis obtusis dorso sulcati9 carina-risve glabris, floribufl snbracemoso-fascicalatis, spp*dis* ovatis a^{nt}is vix ;ipice

carinatis scaiiosis coloiatis nitenlibns coiollaiu ov.ito-mfldf.ira subuiceolataiu tetragonam aquaiitibusanhens cristatis.— in plamtie Capeusi E. gnaphalodes Weudl eric fasc 19 ic. E. gnaphaliilora Sahib M r. p. 3^7. E calycina minoi Andr. heath, t 108. L. pankolata Lodd hot. cab. t. 1194 non Linn. L. lilacma et E gn.iphn lodes Klotzich' in herb. reg. Berol. Lamprotis gnaphalodes etLamprotis pamculata G Don 1 c. p 811. Habitus * articulans quamcum in heibaihs saepissime confusa , sed sepals coiolhsque facile distinct!. E. gnaphalodes Linn spec. 508 est species ex charact. longe dhera verosiin. set - tionis Geihsostegix (v. s. c et sp)

198. E. BREVIFOLIA (Salisb ' 1. c. p 338), foliis erecto-patentibns snbsquairo-sisve brevibus obtu->is ciassis giabiis, sepalis ovatis subenervibus coloati viscosis. corollam urceoiuto-cainpanulatam glabram viscosam subacquanhbis, antbns sabterminalibnsbievilerappendirulatis.—in proxinciis anstio-occidentalihub commonis. E. callosa Wendl.' erir. fasc. i3. ic. E.%ohtusa LoddJ bo*t cab. t 1027. E. pachypbylla Spieng. syst 2 p. 199. E obtusa et V. callosa G. Don 1 c. p. 790 (excl. syn. Andi.). tnylepis pachphylla ejiiid. I. c. p S09 et Lampiotis bieifolia ejusd. 1 c p. 811. Habitus E. gnapha{o(jls sed ngidior, sepala non nitenhn Cor pallide rosca vix a lin. louga. Anthe-larnm loculi stipilati connectivo in lilainento decurrente basi in appendiculas breves latiusculas desinente. (v. s. c et sp)
199. E. SELAGIPUFOLIA (Sdlisb.! 1. c. j) 358), foliis erecto-patentibus snhincui-vis linear!-trigoms ngidis obtusis giabiis, sepalis Iato-o\atis apice carmalis cartilagineis ciassis visciduhs, corollâ uiccolato-globos.l glabiâ visridnla rah re diinidio longiore, aulheus cristatis.—in coloniâ Capensi (Masson). Lampiotis selagimfolia G. Don 1.c p. 811. Habitu qaodanimodo E. mucosae appioviiuatui, nee ab E. tiaraeflorsclonge assimihs. Cor. i 7-1 -j diaraetro. ^ v. s. sp. in licib. Bankii et comm. à cl. Ward.)

Sect. xxix. OXYLOMA.— Acutifissae *Klotzs*ch.

'Infloiescentia terminal is floiibns sesilibn» capitatis Bractea? et sepala iuibucala nda. Corollae tubo ovato v. oblongo, fauce constiictâ , limbi lacimis electis acantis concavis Anther* muticje T'oha 1-4-na v sparsa.—Sectio Polydesuiiae et Geissostegiae afiinis, sed aatherao brevitei lateiales et coiolla? foima pecnliaiis. Species Gapenses

200. E GEKisT.tlii'Oliv (Sallsb.' I.e. p. 337), ramosissima, foliis ternis palcenti-bns lineai ibns rigidis glabus, tlonbns subtemis, sepalis ovali-oblongis car-BOTis obtnsis corolla; inborn aequantibns, ovario glabio.—in snmmo inonte Tahnlaai (Niven), ibidem? (Roxburgh, Mundt et Maire). E. sessilifloia Wendl. eric fasc. 22 ic. non Andi T'olia 2-3 lin. snpia plana sabtus carinatd. Gal et hracteae iigidalx stibglntinosae. Cor. tubus 1 7 lin , limbos ! Un. intensiùs colo-ratns. (•• » »P)
- a. E. CUMULIFLORA (Salisb.¹ I c. p. 336), rain alls minutè pubernlis, foliis 4-nissquarroso-patentibus linearibns obtusis planiusculis glabris, iloribns dense capitals, sepalis oblongis spathulatisve membranaceis coloratis raargine minute fimbriatis tnbuui corollae -cquantibus, ovario pubralo.—in piov. Swellendam occidentali (Roxburgh, Mundt, Ecklon et Zeyhei). E. horizontalis Andr heath. t. 70. (capitula depanperatv). E. tricolor Spreng ! syst. 2. p. 193 non alior. E. cumuliflora G. Don 1 c. p 800 et Gypsotallis horizontalis ejusd. I. c. p. 801. Folia a-lin ctiam in«specim. in herb Salisb quateina. Capitula sub-glob6sa 6-12-flora. Cor tubos 2-lin uti calyces et bracteoe albas, limbns x-lin. atropoipureus lacinHS basi margiue ciliatis. Stylos exsertas (v s. c. et sp.)

- 20a. E RKCURVAi v (Audi, heath, t. 282), lamulis dense foliosis puherulis, foliis spasisis clongatis lmeaiibus obtnsinscolis cannatis minute pubeiuhs elabratissive, flonbos dense capitatis, sepalis lineai i Lanceolatis corolla m exccidentibus, ovario glabro.—in colouia (Japeusi? h. lecurvata Lodd.' bot cab.t. 1093 Bol mag. t 34^7 Furyloma iecui\ata G Don 1 c p 817. Species E ruinufiilarac alfinis, sed distincliissinn foliis uhra-seiupullu.uibus et cal^cibus. Cor 4-lin. tnbo flavuante limbo atro-puipmeo Stylus longe exseitus (v s. c)

Sect. XXX. PSEUDEREMIA.

Inflorescenda terminals capita ta. Bractae appioximata? et sepala longe citiata v. iiimbiata Corolla urceolato-globosa v. o|ata sicra limbo bievi erecto patente. Autheiae inclusae aristatae. Folia quaterna v. spaisa Sectio a Polyftesmiā antheris lateiahbus di|ersa. Species Capenses.

- 203 E CCRNUA (Linn. ill. snpl. p. 222), foliis erectis lincaribns rigidis dorso sulcatis margiue 1 iliatis, biacteis sephahsqc lanceoi.itis margiue longe ciliati**, corollā ovato-inflata-glahra fauct valde constrict à , ovario glabio —in coloniā Capensi (Masson) Cor 3 lin. longa (v & sp. in heib. Banks et leg. Beiol.)
- 204* E SOLANDRIANA (Audr beath t 89), buinibs, fob is incnrvo-patentibus lincanbus ciliato-frispidisHjnib, biacteis sephah&que linearibus longe ciliatis corollā uiceolatA paruin bievionbus, anibeiiia subcithalo-aiistatih, ovano pn-besciente.— in in pest rib as editis piope Barbies-Kiaal (Niven) Habitus feie Lreira? Folia i-3-hn Cor 1 J lin marnata (v. s c ct&p.)
205. E SPHENOCEPHALA (WeDill in boit leg fierol.), foliis linearibus electo-palentibus acutis anstulatis cibato puberulis, sephahs linearibus cihatis coiolU ovato urceol itā parum bievionbus, o|auo Ljlabnusculo—Hab. .. . Affiuis E. solandnanae sed mnlt minus ciliata, et folia divri^a (v s o in berb. reg. Berol)
- 206 K FIMMATA (Andr heath, t 63), foliis oblongo-linearibus ellipticis\ e brevibus incenivo-erectis imbcatisve uiaigine cihato-seiatiU, floibiib subqnaler-nis, biactois sepal&que obotatis spatbulaliscv corolla breviobus apice canna-tis coloiatj& maigine fimbriato cilians,corollā urteolafo-globosi, ovaiio hi&pid, fltigmate subpellato. — in monte Duyxclskop (Masson, Niven). E hiubnata Lodd 1 bot. cab. % 1047 Habitus fere Grisebachite. 1 oba 1-1 7 lin. Floie^ albidi v rosei 1 | lin 1 ilameuta dilatata Cilia calycis latubcula integia v. ut in Giisebarbus nonnolln pluraos.i. (v s c. ct sp)
ft. grandiflora, corollā 2-bncaii. — in coloiiid C^peosi (Mandt etMaire).(v. 8 Sp.)

Sect. xxxi. PACHYSA Don,— Physoideae Klotzsch.

Inflorescentin terniinalis pierfimqne umbrliata v hlnc inde rami^is abortien-tibas snblateralis, Sepala corollā dimidio saltern breviora. Corolla viscosa urceo-lato-globosa v ovato-nrceolatn. Antberse inclusse ciibtatae aristata) v. ranus mn-ticae. I^olia 3-4-na sjepius ligida. Species ouuues Capenses

• Flores omnes terminates. Cor 1-2 ranus 3 lin. longa.

- 307? E RAMENTACEA. (Linn.¹ in ant p. 232), foliis 4-nis linear-subulatis c recto-patenlibus g\abns, flonbus umbellatis, bracleis remotis, sepalis parvis lmean-hw*_f COIOM& initaro-globosis viscosis (siccisve?) buibo miniino subpatente, antberis cristatis, ovai 10 glabro —in montibus prov austro-occidentahum com-inunis. £. lamentacea Bauer icon. hoit. kew t. 23 Wendl. eric. fasc. 1. IC. (male). Andr heath t. 143. lodd ' bot cab t. 446 E. granulata Linn.¹ mant. p aJ4 K imnlumbellata Berg pi. cap. p no et E. pilulaejeinsd. 1. c. p. 111. E. bnllulans SalisbJ 1. c. p. J77 Ranii flexuosi giacilioies qaam in cseteris hnjas sectioms Folia 1 J 3-bn Floies rubri 1 J lin diametrio. Species quo-dammodo Oropbanis approximatur sed corolla saepius (vel con^Janter?) viscosa et affinitas com £ mucosā summa. (v s c. et sp)

- 208 E MUCOSA (Linn.¹ mant p. a3a), foliis 4 nisappressis subrecnrvsive linearibus elliptioisve obtusis cannatis glabris visoosis glanduloso-serratis nndisve, flonbus subumbellatis, bracteis remotis, sephahs ovatis viscosisrevitei et obtnse vindi-acuminatis, coiollā urceolato-globosa glabiā viscosa, antheris lanceolato-aristatis subcnstatisve, ovariolabro. — in dnnis Capensibus. F mucosa Bauer icon bort kew t. i5 Andr heath t. 174 Lodd ' bot cab. t. 35. Wendl. eric, fasc. 4 ¹ & pilulifera Audi, heath t 278** E pilnlans Lodd' bot cab. r. i563 non Linn. Kami elongati ilgidnb paium lamosi Folia 2-3-hn Cor.

iubia> v albr fulgentcs i 7 vel vix i lin feie globosae, fuuce latiascnli, hinbo bievisuhpatente (v & c. et sp.)

jS. *brevifolia*, foliis I-I f lin. E. inucosoides Lodd ! bot. cab t. 120s. (v s c. et sp)

y. *crenata*, foliis circa i-lin ellipticis oinnibns glandoloso-serrulatis. E. ere-naia E Mey.! in pi. Diege. (v. s. sp.)

aoy ? E. UMBEILIFLORA (Klotzsch ' in berb. BeioL), foliis terms eiecto-patentibus brevibns oblusjs cr.issis glabns, iloubus nmbellatis, biactis .ippioximatis. sepalis Idto-ovalis obtasis bicvibus cilia tis, coiolla glnboså subviscosa (?) lirnbi laciniislaticonniventibus, antbenovatis subulato-anstalis subninticisve, o\ano glabro.—in monteZwarterberg ad Attaquaskloofet (ain Calutso(Masson,Drege). Folia sapcius vix i lin nonnunqnan tamen 2-3 lin Cor li. fonnosae sed limbi forma diversa 1 ilamenta dilatati, inemva, longitudine fere coioll-c Vaiiat an-thens subinclusis exseitivs aristis srre bievissnnis aut nullis"¹ An ad Pyronium umandauda⁰ (v. s. sp)

210. E SPFCTALJILIS (Klol7scb' in beib Beiol), foliis ternis intnrvis breMssimis obtusis nutglne subtilialis, floubus longe peduni ulatis umbellatis, biaoteis lemolis sepalisque ovalis obtusis coloiatis, corollä uiceolato-globosa viscoa.i fauce \alte constiöt^, aulbeis ovatis austatis appendiculis III lila menlo dearentibus apice divalcalis glabns snbulatis, ovano §>labuu<culo —m Stiandweld (Drège) C01 et cal E foimosae sed peduncuh multo longioies, folia biactoe tt aather.e diversa. (v J> sp)

211 F. FORMOSA fibuTih diss. 11. 82 t 3 non Andr), foliis ternis subqnai 1 olo-natenlibii bievibus oblongis obtasis glabns v junionbns pubcinlis, iloiibns bteviter pedicellatis teinis, bracteis approximatis laxisve sepdlisque brevibus ovato-lanceoldlis squiauosijt, coiolla niccolato-globo&a viscosissimâ fauce*va!de const nef a limbo patente, antberis aristatis appendiculis butis glabrativs", ovar'10 dense birsulo.—inmonibus prov. George. E giandinosa Andi beatli. t a65. Lodd.' bot. cab. t 697 F quadrata Lodd ' bot. cab t 1943. F gran-dinosa G. Don 1. c p 791 et Pacbysa formosa cjsud 1 c p 866, Ram suvis-cosi puberuli Folia 1-1 I lin Flores albi x £-1 + lin. diametrio grandlnis grana simulant, (v. s c. et sp)

* *autumnalis* (bortnl), co roll is subovatis, antbciauin appendicalis lan-ceolato-cnstat. (v. s. c.)

21a. E. MTIDA (Andr. beatb. t. x3i), foliis term's patentibus lineail-trigoms obtnsis mucrouulatisve viscoio-pubeiulis glabratjsve nitidis, ilonbus ternis, biatteisapproximate, sephahs bievibus ovato-lanceolatis squarrosis, coiolla breviter o\ato-urceolata viscosa fduce parum constructa, antbeiis aristatis appendiculis pilosissimis, ovano busuto —in Attaquas Kloof et Lange Kloof prov Geoige E. nitida Lpdd ! bot cab. t. n3i E. tiagnlifeia Salisb '1 c. p. 374. E. Gordonia hortul. E. giandinosaet E. leilexae afhms. Car alba 2 | lin. (v. B. c.jfit sp.)

213. E REFLEXA (Link ennm hort. Berol.p. 371), foliis term's patentibus li-neanbus ohtusis brevibus glabns v. viscoso-pubeiulis, flonbus subleims, bracteis approximatis, sepalisbrevisbus ovato-lanceolatis appiessls squairon^ve, corolla ovato-uiceolata inflat superneattenuata viscosissimâ , autberis^ustatis appendiculisovaquoque hiisatis —in Attaquaskloofet Lange Kloof piov Geoige E. gloriaflora Salisb. 1 c p 3^o. E. reflexa Andr heatb. t. 283. Lodd ' bot cab 1.1787 E nilida var. KlotzscbMn herb leg. Beiol Pachsa gloriafloia G. Don! c.p S06 Inter E nitidain et E pbyosdem media C01 3 lin. albapallida parpurascens v. rubra. Antheiarum appendicali nnnc^reviter nunc longe et dense pilosi.

W

@ *cantharccformis*, flore longioie tcnaiore. E. canthariformis Lodd. bot. cab t. 190*1.

11 Flores ahi terminates ter n, alii ramuhs abortientibus, laterales Cor. 3-4-lin.

214t E. FIYSONDES (Linn.¹ spec. p. 500), foliis 4 DIS ranus terns patentibns

rigidis Linearibus obtusis 9imis glabris v. glanduloso-puberulis, floiibus temis hinc lade sublateralibus, biacteis remotis, sepalis ovatis obtusis, corollà inflato-urceolatâ viscosissimâ fauce constrictâ, limbo erecto-pa tente concolore, aathens ciistatis, ovano glabio —in monte Tabular! E. physodes Andi. heatb. t. J4. Wendl eric fasc. 7. ic bot mag. t. 443. Lodd.! hot. cab t aa3 E. sequax Salisb ! 1. c p 378. E. physodes G. Don I. c. p. 797 et Pachysa physodes ejusd. 1 c p. 806. Raaii n'gidi, folia dcnsa latiuscola 2-4 lin. longa apice uounanquam subcallosa Cor. albae v. sordidae S-fy lin. tongas, smubus limbi breviter appendiculato-dilatatis. (v. s. c. et sp)

* *Lambertiana* (Andr. heath, t. 17a), foliis reflexis, floribus pleisque axillaribas, sepalis lato-lanceolatis. Cstera E. physodis. E. Lambertiana Lodd. bot. cab. t. 3. Pachysa Lambertiana G. Don 1 c. p. 80(I Specimina sylvestra, hoc nomine salutata in herbariis collectoium anglicorum ad Y. physodein, E. vernicem v. ad K. aidentem pertinent, (v s . o.)

215. E. AROFNS (Andr. heath t. 5i), foliis ternis patpntibus ligidis linearibus obtnsis plauiusculis glabris, floribus tainis hino inde lateralibus, biarteis linearibus reniotis, sepalis lato-lanceolatis obtusis, coiolla ovato-urceolatâ viscosissimâ limbo erecto concolore, antheiis cristatis, ovario glabro — in montibus prov. Swellendain. E. ardens bot. leg. t. 115 Lodd. bot. cab t 47 Pathys i ardens D et G. Don 1. c. p. 805 Habitus R physodis, à^iiā diffei t piaecipur floribas intensu rabro-auranliacis. Coi. -i-4-lin. pel an the sin ovata , sinubus nudis, post anthesin valdo inflata (v s. c. et sp)

216. h. VERNIX (Andr. heath, t. 148, a5o), foliis ternis patentibus ligidis linearibus obtasis plamnscnis glabris, floiibus ternis hinc inde sublateralibus, bracteis lineanbns remotis, sepalis lanceolatis obtusis, corollà inflato-urceolatâ subglobosA viscosissimâ, fauce valde contactâ limbo erecto discojore, antheris cristatis, o| ai 10 glabro —in montibus Gi ootvadersbosch (Masson) «Redrall» pi ov Swellendam ? (Niven). E. vernix Lodd. bot. cab. t 679 E. blenna Salisb 1 c. p. 379. Pachysa vernix et P aristata G. Don 1 c. p. 806 et Ceiamia blenna ejusd 1 c p. 80/. Habitus praecedentium Cor 4~^~^in: IUDO fere globoso auantiaco v. rubro, limbo viridi laciniis latis obtusis (v. s. c. et sp)

a 17. E FLOCCIFLORA , foliis /(-nis irabricatis oblongo-linearibus obtusis jnnionibus tomeutoso-lanatis adnltis glabris, floribus ternis (hinc inde laterahbus ?), hracteii subapproximatis, sepalis oblongis obtusis submembianaceis, pedunculis bracteisqur floccoso-lanatis, coiolla urceolat.1 crassâ tomentosâ viscosa , limbo brevi erecto, antheris late cristatis, capsnlâ glabra —in colomâ Capensi (Bnrchell n. 499^)• Habitus praecedentium ab omnibus lana florum distincta. Cor. 3. lin. longa, apice valde constncta. (v. s. sp. fiuctif in herb. Burch.)

't' 't' t ffl^{pres} terminales 'longh pedicellad umbellad ramo excurrente rariū subracemosi. Bractea parve remotes. Cor. 2-4 hn. longa.

218. E. IXAITHERA, glabra, decumbens, foliis ternis patentibus linearibus planiusculis rigidis mtidis apice subcallosis , umbellâ multiflorâ, sepalis parvis lanceolatis obtusis crassis viscosis, corollâ urceolalo-globosa viscosissimâ fauce latâ limbo erecto, antheris viscoso-puberulis anstatis in filamento longe de- correntibus apice hberis, ovario glabro.—in coloniâ Capensi (Baichell n. 6942) Habitus fereE. carduifohas. Cor. 1 lin longa. (v. s.sp. in heib. Buich.)

219. E. CARDUIFOLIA (Salisb.! 1. c. p. 33o), decambens, ramis pedicellisque viscosis, foliis ternis patentibas lato-lineanliis convexis obtusis longè setoso-ciliatis, flonbus temis, sepalis brevibus ovatis obtusis viscosis subsetosis, coiollâ inflto-globosa suburceolati viscosa limbo brevi erecto, antheris aristatiff * aristis yin filamento dedfrrentibns, ovario glabro.— in montibus editioribus Babians*- kloof (Niven), et Gnadenthal (Drege). E apuca Klotzsch! in herb. reg. Berol. Folia tere E. Niveniana, 3 rariū 4 lin. longa Filainenta bievissima Coi. i Hn longa, (v.s.s.sp.com in. à cl. Laubheit, et in herb reg. Berol.)

220. E ODORATA (Andr. heath t. 177), foliis 3-4 nis longinsculè petiolitis re curvo patentibus lincanbns latiuscuhg rigidis apice callosis margine glandaloso-

serrnjatia, umbellâ multiflorâ snbracemosâ, sepalis lato-lanceolatis obtnsis, corollâ inflatâ urceolafâ viscosâ limbo erecto-patente v. recnrvo, antheris mnticis, ovario glabro.—in coloniâ Capensi? E. odorata bot. mag. t. 1399. Lodd.! bot. cab. t.633. Tota viscosa. Folia 3-4-lin. Cor. 4-5 lin. longâ albas v. pallidissimè roseae. Stam. brevia. (v. s. c.)

* *suaveolens* (Andr. heath, t. 2p,a), foliis subsenis erecto-patentibns, linearibus rigidis ciliato-puberulis glabrativs, nmbellis mnltifloris ramo excur-reute verticilliformibus, sepalis ovato-lanceolatis, corollâ suburceolato-tubulosâ 4-5-liⁿearisubvi^tcosa["]albidâ apice vix contracts, limbo erecto-patente, antherismuticis, ovario glabro. Inter E.odorata et Syringodeam quemdam hybrida. (v. s. e.)

* *Beaumontiana* (Andr. heath, t. 253), foliis ternis patentibns linearibus rigidis obtusis glanduloso-paberalis glabrisve, u m belli s paueifloris, sepalis lanceolatis obtusis, corollis ample campanulatis 4-linearibus al bo-rose is viscosis limbo lato aperto, antheris muticis, ovario pubescente. E. Beaumontiana Lodd.! bot. cab. t. 1686. Inter E. odoratam ? et Melastomonem qnemdam ? hybrida. (v. s. c.)

* *Wilmoreana* (Knowles Birm. bot. gard. t. 73), folii9 ternis linearibna rigidis obt'jsis sobtussnlcatis, floribus irregulariter axillaribus terminalibps-que, bracteisapproximatis, sepalis ovato-lanceolatis acutis, corollis oblongo-tnbalo^sis inflatis apice contractis, limbo brevi creto discolore, antheris inclusis aristatis.—Cor. rubras limbo viridi. An ex E. vernici et Syriugodea quadam orta?

11tt *Fl^{pres} umbellato'Subracemosi. Bracteceparyceremotce. Corollce limbns distinc-tus, erectus. Ovarium stipitatum. Species inter Eurylomata et Pachjsas media.*

221. E. OBLIQUA (Thimb. diss. n. 73. t. 1), foliis sparsis erecto-recnrvs linearis-te-retibos obtasis glabris viscidnlis, nmbellis mnltifloris sabracemosis, sepalis bre-vibus ovali-oblongis obtnsis, corollis snbnrcolatis viscosis, limbo erecto snb-aperto, laciniis ovatis tubo inflate dimidio brevioribus, antheris cristatis, ovario glabro.—In montibus prov. Stellenbosch. E. obliqna Bauer icon. hort. kew. t. 3. Wendl. & ric. fasc. 17. ic. Andr. heath, t. 33. Lodd. bot. cab. t* 14. Ceramia obliqua G. Don 1. c. p. 807. Raini elongati virgati snbsimplices. Folia 3-4-lin* Cor. ferè 4-lin. incarnata. Affinis habitu E. curvifolias, floribus Pachysis. (v. s. C. et sp.)

222. E. MACROLOMA, foliis sparsis erecto-recurvis linearis-cuneatis obtnsissimis margine eleganter glanduloso-serratis, nmbellis multifloris subracemosis, sepalis brevibus lanceolatis obtusis viscosis, corollce viscosae tubo ovato-campa-nulato, limbi laciniis oblongis obtusis erectis fnbo subaeqnilon^is, antheris cris-tatis, ovario glabro.—in great Hout Hache (Sfasson). Affinis E. obliqna? et (ex icono) E. RusseLliana). Fol. a-3 Im. longa. (v. s. np. in herb. Lee.)

-j- *Species duhitz Pachysis affines.*

aa3. E. VESICULARIS (Salisb. 1. c. p. 335), ramis erectis fastigiatis, foliis ternis •vesiculis nigris aspersis, floribus terminalibus, corollâ linearis viscido-pubes-cente, antheris inclusis calcaratis, calcaribus parallels cunealis, pericarpio se-riceo. •—Hab... E. conacea hortnl. nee Salisb. Pacbysa vesicularis G. Don 1. c. p. 806.

224. E. VERITICIFLTLA. (Salisb. 1. c. p. 335), foliis ternis viscidis, floribus terminalibus, corollâ 2 f linearis, limbo recnrvs, calcaribus aurito-cuneatis liirtis, pe-ricapio laivi.—ad Prom. Bona3-Spei (Roxburgh). Foliorum laminae obtusse acu-minata? in reduplicatura densè glandu^{ps}as undè nitent glut4ne effuso(Salisb.). An E. reflexas affinis ?

Sect. xxxn. ANACLASIS.

Inflorescentia terminalis, floribns pedicellatis x-4-nis. Bracteae remotae parva?. Sepala lanceolata subfoliacea demin reilexa. Corolla urceolato-globosa sicca

glabia. Anthei.u indusac cristatau v lato-ariatdae Ovaura sessile glabimu Folu quaterna —Seclio bine Pachysae bmc prsesertim Oiopham .iffinis t^o species ouiuces Ci peases.

325. E. BEROIANA (Linn.! mant p a35), raranlis birtis, foliis patentibus linea-ubus hutis railus glabiis cuhs, sepalis lato-lanceolatis apice vindibus obtusiosculis ie0exi», corollas limbi interstitiis larunosii, antheiis cristahs —in coloniâ Capensi (Niven, etc.) £ Retgiana Lodd ' bot. cab. t. q3q. E quadiflota Andr beatb t 5i. E lacunaefloia Salisb ' 1 r. p. 377. Ootopera Beigiana D. et G. Don 1 c p. 828. Kamo&issima Folia nonnunquam latiuscula paginam m- feiorem ostendunt C01 rosea v mcarnata ? -3 liu. longa. Capsnlain scmpei 4-loculaiem 4-valvem vidi. (v. a c etsp)

aa6. E FJORDA (Ihnnb diss n. 64 non Lodd), ramulisbiitis , foliis erecto-patentibos incurvisve lmeaubus obtusis hirtis, sepals hmaiilanceolatis rtflexis hirtjs, corolla? limbi sinobns acutis clausis, antbeis an&talis appendiculis latiusculisscabiis.—in niontibus Rodesand piov Worcesteri E Kergiana Wendl eric fasc. 9 ic ? non Linn. Aiiinis E. Bergiana Mores Dumerosiores minores formâ limbi constantei diel&i Lolia ut in E. Bergianâ variabilia. (v. s. c. ctsp.)

@. *parviflora* (Klotzsch'), Tulus cano-birsutis incurvis^nterarum appendicnlj. tenuionbus E mcurva Andr. heath t. ibg? non Tbanb. E canopy- lophylla Spr. syst. 2. p. igo? Spccimina nonnalla Dregcana flonbns plenii gaudent. (v. s. sp.)

327. E. CLPUCSSINA (Uedf hort. eric p 7), glabra v. minutè puberuia, foliis erectis patentibusve linearibus acutis subciliatis nnidisvc, sepalis Imeari-lanceolatis depnum reflexis, cofollis urceolato-globosis, fauce parâm contiactâ, limbi sinubus acutis clausis.—Hab . E. turrigera Salisb I. c. p. 677. Habilus feie £, rubentis, sed scpala feie ut in E. florid à leflexa Cor 2 lin. longa , forma mtei E. floridam et E. rnbcntem media. An hybnda bortensis? (v. s. t)

Sect. xx\ni. HERMES. — Hermes et Diphilus *Salisb*,

Inflorescentia laterabs floribus secùs ramos laceraosis v spicatis. Corolla nrceo-lato-globosa v campanulata, larius subtubulosa. Anlberae inclu^ae mncticac v. arista tæ raiissime subcristatac. Folia scna v plura, rarius 3-4-na. Species omnes Ca- penses, à Plenrocallidi floribus bievibus, à Gypsocalbd^ antheris inclusis dis- tincta?.

' Antheris anstatu.—Heimes Sahsb.

228. E REGEBCMINANS (Linn.! maijt. p. rti non Andi.), foliis 3-4-^{Q19} subsenis sparsisve hnearibus incurvo^patentibns glabns, flouhas longe pedicel! at is, biacteis pa 1 vis remolis, sepalis lanceolatiscarinatis coloratis, corollâ uiteolato- globosa glabrâ fauce contiactâ liml^o brevi, ovaiioglabro —in moutibus prov. Swellendam. E. nncifolia Salisb.! 1. c. p. 369. E Smitiana Lodd.' bot cab 1 1614. E Lichtenstemii Klotzsch' liunaea 12 p. £04. E. raccmifera Andr heath, t. 188. E juncea Bartl. hnnaea 7. p. 648? Folia 3-4-1'Q Ptdicelli lili- forms coloati. Flores numeiosi incarnati fere 2 lin. longi. (v. s c. et sp)

£. *grandi/toia*, foliis ligidionbus latioibus, corolla'11-3 lin longâ. In hn- lmdis pi op'e Swollen dam (Masson) (v. s. sp. comm a cl Lee.)

229. E. PULCHFIIA. (Hoatt nat. hist 4. P- 504. * ai. f. 1. sec. Sahib, non 'Ihnnb.), ramis» rigi^is wrgaiis, foliis ternis erecto-appressis brevibus obtusis dorso snlcatii, floribus pedicellatis, biacteis mmntis remotis, sepalis lanceolatn ohlotfgisve oblusis carinatis lucidis corollâ ovato-uiceolati glabrâ brevioibus , anthpiaium .irittis longis decaurrentifJas, ovario glabro.—in dunis Capensibus. E pulchella Andi. heath, t. 40. Lodd ' bot. cab. t. 307. E. articulaiis Thuub. diss n 58 non Link E retroflexa Wndl. eric fasc 8 ic. E. cadnceifera Salisb. 1 c. p. 370 E phyhcoides Willd. spec 1 p. 361 ? Lamprotis pbylicoides G. Don I. c. p 811? lol. || raniis a-lin Pedicelli saepius pbescentes Sepal.1 cra&susctln tor 1 l m mcarnata.(v. s c. er sp)

- 23o? E. iNC0N5PicuA(Battl. in linnaea 7 p. 642)* folhs 3-4-nis linearibns obtusis subtūs convexis eicctis sublrubrlcatis, bracteis iemotis, sepalis ovato-oblongis illiolatis corollā angustecaiupanulata* daplo bievionbus, geoitalibus indusis — ad Caledon (Ecklon).
- 231 E LONGiAiusTA.TA,ramls virgatis, foliis lernis ectis linearibus doiso sulcatis, floribus pedicellaUs, biacteis ininatis remotis, sepalis lanceolatis acutiusculis caiinatis toibllā tuhuloso-campannlala' telrat>ona 'glabia bieviouhus, a 111 be us longeaust<ms,ovario glahio.—in colonia Capensi yMundl). Folia longioia quam in E. pulcbella Cor. feie 2 lm. tubo (pei anthesin) non inilato, fauce apicitā, limbo ecto-pateate Antbeiamm appendiculae ultia medium filamenti dc-currencies. (v. * sp. coann a rl. Hooker.)
- 23 « t. FLAVIC OMA (Baitl.I in linnaea 7 p 639), foliis trruis imbiicato-appressin oblongis roncavis giabris, ilonbus congestis pedicellatis, sepalis oblongis <o-lollā urceolatā siibampullaccā tnplo brevionbus, antbeiamm aiistis abhreviatis—onca vallen Zontendael prov. Swellendam (Miss Joubeit) Similib E. pulchellC et forsan, tejte Rloizschio, ejus \anetas. Cor. flavsc (v s. sp. in beib. teg. Beiol)
233. K. EMPFTROIDES (Andi. be.tth. t. 19), foliis sub&ems incnrvo-patentibns lineribns obtusis hispidis, pedicelbs bieviisinm, biacteis lioeanbuii subremotis, sepalis lanceolato lineaibus apice piloib, coiollā glabiā tabo brevisstimo, lunbo latē campanulato calyce paium longioie, antbeus> subcribtatis, ovaiio glabro —in moutibuspr. Capetown E. empehoide&Lodd¹ bot. cab t. 1758. E. empetiifolia glauca Wendl. enc fasc. 11. ic E. pyidiflora Salisb]. c. p. 3ni. E. enipetnfohae habitu similis Cot. minoies foinia'diveis.e. (v. & c et sp.)
- a34. E. FMPETRiroLiA (Lino.¹ spec p 507), folns subsenis mcurvo-patentibus linearibns obtQiiis hispidib, pedicellis bievissimis, bracteis lineanbiib bubiemo-tis, sepalis Imeari-lanceolatis apice hi&pidis, coiollā glabiā v pilosā ovato-in-flata urceolata submcuiva calyre duplo longioie, liubi laciniib ovato lanceo-latis subpatentibas, antheisanstatih, ovano bispido.—in montibus piope Ca-petown. E empetnfolia bot mag. t. 447- Wendl. trie. fāc. 5. ic. Lodd ' hot. cab. t 1S75 b. empetiifolia etE 1ndlkol.11 is Sab&b ! 1. c. p. J70 Rami dense foliODi. Folia latinscula rigida subtus sukata 2-4 lin longa Floies (^uaveolen-les?) iufia apices ramoium den&e bpcati. Cui purpnrea v mbra 1 lin. longa. (v. s. c. et sp)
- *xntertexta* (Lodd ' bot. cab. 1. io34), foliis terms sparsisve sabfasciculatis patentibus lineari-convexis hispido-pilosis, pedicellis brevibus, biacteis parvis, sepalis lauceolatis bispidis coiolla dimidio'bievionbus, corolla late campanalatā glabiā, limbi laciniis ovatis tubo paiom brevionbus, antbeus aiistatis, ovano glabio Gypsotalbs intertexta G. Don 1. c. p Soi. Coi. 1 | lin albida —Hybuda hortensis ex Heimi quadani ? etE. Solau-dnanā ? edacta. (v s. c.)
235. E. FLUMOSA (Andi. heath t. 36), foliis 4-6-nis incurvo-patentibus linearibus obtusis hispidis, pedicellu folio sublongionbushiisulis , bracteis lineaibus lemotis, sepalis lanceolalo-lineanbus hispidis, corollā campanulatā snbmceo-latā glabia calyce diniidio longiore, antheis austatis, ovano viloso —m colomi Capensi (Masson). E plumosa Lodd ' bot cab t. 1702 li. amcena Weudl eiit. fasc 17. ic. non Salisb h. nolaeflora Sabsb.' 1 c. p. 371. E. Scboliana Lodd. bot. tab. t. J38. Hdbitus foboiura E empetrifobas, inflorescentia et ilorcs di-versi. Cor 2, lm. camea. (v s. c et sp)
- a36 E. FTLIPEWDULA, foliis quateinislinearibus incuivis glabns, pedicelbs elon-gatisbasi bifobatis , bractois remotii, s>pabs lanceolato lineaibusacutisiigidis cann.itii, toroll ovato-inilala' glabiā limbo brevi suberecto antbeus aristatis, ovaiio glfihiimsuilo stipiato. — in colonia Capensi (Bowie). A pixcedeatibus glabniie etfloibns, a sequentibiis anthens dmtincta Folia j-5-lin. Sepala fere a lin. Coi. 4-5-lm (v s & p 111 bcib. Hookd.)

|| *Antherat mutica* *v vix mirmissim⁹ decurrenti-aristatacB. —Dipilus Salisb.

237. E. FILAMifTO3A (Andi. heath, t. aa), foliis subsenis subulatis iucurvo-eiectis glabns, pedicellis elongatis, bracteis lemotis, sepalis lineaii-suhulatis basi brevissime lanceolatis, coiolla tubuloso-cainpanulalā glabiā viscosā, limbo brevi eirclo apeito, ovano villos⁹ —in cam pis argillosis prov. Swellendam (Niven, Mundt < t Mdire) E. filamentosa bot. reg. t. 6. Lodd.! bot. cab. t. 3g5. Syringodea filainentosa G. Don 1. c. p. 8a3. Cor. lo&ea 4-5 Iin. longa. (\. s. c. et sp.)

a38. E. DECOHA (Andr. heath, t. i5q)_t follis 4-6-nis subincurvis linearibus glabiisculis, pedicellis calyci aqnilongis longioribusve, bracteis approximat⁹ v. anā remota, sepalis linearibus viscoso-pubeinlis, corollis campanulatii costatis viscosis limbo btevi oreto apeito, ovatio villos⁹.— prope Capetown. E. decora Lodd bot cab t. 1385 E. viscaria Bauei icon hort. kew t i. Asimil-lima E viscaift non difTeit nisi peduncnlis elongalis et bracleis laxionbas. An ejus |i|r? Cor. carnea 5 Iin. longa. (v.s. c. et sp.)

a39 K. vise VRIA (Linn ! in ant. p. 23i), foliis 4-6-nis snbincuvis linearibns glabiis, jnnioibus viscoso-pnbeinlis, pedicellis bievissiinis, biacteis approxi- uiatis i>epali!»qie linearibns viscosis» corollis cainpannlatib cobtatis VII-COSS_t limbo brevi electo-aperto , ovario villos⁹.— in niontibus ciicā Capetown. F vi&caria Andr beatb. t /g Wendl. erir fasc 11. IC. Lodd.¹ bot. cab. t 726. ft. viscida Salisb ! 1. c. p. 37a. Rami erecti viigati. Folia densa a-4 hu. ligida. Cor. carnea 3-lm. Stamina coiolla multō brevioia. (v. s. c. et sp.)

940. E. roiriCA (Lodd. bot. cnb. t. 1179), foliis subsenis incai vo-erbctis linea-ribns glabuasculis, pedicellis brevissimis , biacteis laxis, bepalis lanceolatis acuminnitis coiolla diinidiō bievionbus, corollā obconico campanula's, linibi apeiti laciniis latis, ovatio glabio.— Hab. .. E. viscaria; habit 11 similis. Cor 4-5 hn. found ah a/iinbas diveisa, vix vKcosa. (v. s. c.)

a4i. E. AxriLiFroRA (Bartl. m linnaeā 7. p. 640), fohis 4-nis erectis linean-tn- gonis glabiin, flonbusaxillatibus racemose nutantibas glabns, pedicellis soli- tanis, sepalis abbieviatis coloiatis lato-o|atis subacummatis, coiolla campa- nulatā , lilamentis sabniuticis — circa vallein Zoutendael prov. Swellendam. Habitus E vi&cariae sec. Bartl.

342. E. PARILIS (Salisb.' 1. c. p. 371), follis 3-4-nis snbseuisve incurvis linearibns glabnusculis ngidis , pedicellis brcvibos, bracteis plei ūmque reuiotis , sepalis lineaii-subnlatis carinatis ngidis corollam subaequautibus , corollis uiceolatis snbtubnlosisve vix costatis viscosis subsiccisve limbo erecto-aperto, antheiis subterminalibns ranticis v. aristis minntis deconentibus appendiculatis , ovario glabio.—in montibus prov. Worcester (Niven,Burchbell (n. 8669), Drege, etc.). Habitus E. viscaiae flores nmltō minūs viscosne. Sepala rigida. Cor. 3-4-hn. fnlva v. rosea. Stamina coiollam suba?quantia. (v. s. sp)

/6. *flava*, co rail is flavis ureolato-rampanulatis 11-3 Iin. longis, sepalis proportione brevioribns. Cnm praecedente. E. flava Andr. heath t. 64. Lodd ! bot cab t 881. bot. mag. t. i8i5. E. festa Salisb. 1. c. p. 371. E. festa G. Don 1. c. p. 793. E. fla|a ejnsd. 1. c. p. 797 et Synngodea flava ejusd 1.o p. 8iq (v. s. c. et sp.)

y. *parviflora*, corollis vix 2 Iin longis. Cum preecedente (Niven, Masson).

E. fdllax Salisb. 1 c p. 371. (v. s. ap)

HI Species dubice forsor adPleurocallin referenda.

v|3? K. CERVICIFLORA (Salisb. 1. c. p. J62), foliis sems pluribusve, flonbas axillanbus (P),coiolla 5-b-lineari pubescentul^, tubo angnste utceolari, limbo patente, antheris inclusus minulecalcaratis.—Hab.. . Syiingodea cerviciflora G. Don 1 c. p 8a5. |

244? E. cEFHAZoTB!»(hnnb. diss n. 21), glabra, foliis senis lanceolatis incurvo patentibos subtus convexis, flonbus in apices lamorum verticil^ato-capitatis, corollā clavato-cylindnca obtnsā glabrā, antlieris inclusimnticis, stylo exserto

Hab ____ Syiingodea cephalotes G. Don 1 c p 822. Affims sec Thanh. E. cmpctrifoha et E. Leeana brevitfoiae |

Sect. xxxiv. LOXOMEJUA *Salisb.*

Inflorescentia laternlis flonbus ad apices iamoinni lacemosis secuudis. Corolla oblonga ore obliquo. Antheia subm^luste muticae Tolia 3 l-na. Species Eniopsea. 245 E. LILHRIS (Linn' spec p. WJ), ianns° landuloso-bispidis>, foliis patentibus ellipticis piano couvexis raaiginr revolutu. ciliato hisplicls , bracteis lincari- oblon^is bubremotis, sepalis lato-lancfolatis tibatis amtatis , ovano glabro.— in europae occidentals ericetis non longe ab Oceano distantibus, nerape in Anglia anstro-ocridenlali, Gnlhâ occidental!, Astuuâ et Lusitamâ F ciliaris bot. mag. t. 484. Lodd ' bot cab t 1^o^. Wendl. en'c fasc 7. |c Fqgl. Lot. suppl t ?618 Ab omnibus speciebus Euiopaeis facile distingaitar corollâ oblique ciie 5 lin longå (v s. c et sp.)

- * Watson, ramis pñberalis, folns 4-nis patenfibus ovah-ellipticii lineaibusve margine revolutis cihatii, \eiticilhs ilodium 2-3 ad apice* limornm tapitato-racemosis, pedicellis puberulii, bracteis approximatis, sepals lan- teolalis ciliatis, coiolla glabiâ oblongo-inflatj oie sabobliquo contiarto, autbens brevitei bubulato austafi!, o*ano puberulo — tuca liuio ad exlitulatcin unatio occidenulem ingli* cum h cilinn et Y lelialioi
- * ciesceutcm leg. cl II Watson In omnibus iulei T ciliatis et E. Ictialici media et evidenter inter eas hybnda sponlaneal! (v b sp. comui. a cl. Hooker.)

Sect. xxxv. EREMOCALLIS *Salisb.*

Tnflorescentia teiminalis floribub i-4-nis uuibellatis subcapilatis v ad apices rnmotum fasciculato-iacemosib Btacfeae approximate v. appreso; flrpahaideje et sepalas coiolla multo brevioia Corolla glabia ttpc.v ovato-uireolata limbo parvo. Antbersc inclasaa \ vix corollara aeqnantes austatde appendicibus ranus incuis. Species tuipea ab Oiopbanibus Capensisbus pauiin diversae.

246 E. IETRAX-IX (Linn.' spec. p. 50a), lamubs pubernlis, foliis zf-nis patentibus hneaubus v larius oblongo laureolalis raaigme leAolnlis ciliato-hispidiq v. demuni uudjj., flonbus uiubellato-capiiaiis, pedicellis cano-pubescentibu» sepalis ovato-lanceolati* ciliatis, antbens sabulato-aistatis, o\auo pubesceote. in eiicelis Europa; occidentalis et Geunaniae borealis> E. tetralix Cuit. fl Lond t. ai fc botuliformis Salisb ' 1. c p 36g Coi. 3-4-lm rosea. Vanat foliis plu& minu6ve cihalU pubescentib<>e. Speciuen monstrosom starainibns abortivis. comm. cl DC. (v. s c et & p)

jfi. Martmesii, tola cano-pube&cens», foliis lougionbus MX ciliatis. In Hispaniâ piope JNavalpiro (Laga&ca) h IVlaituebii Lag ' ined Jy. a. sp comm. a cl.DC)

a47. V.. MACKAYI (Hook I comp bot mag i i5o.), ratnulis vix pubernlis, foliis 4-nis naentibus ovab-oblongis bablineanbusve. maagine revoluuis ciliato-hispidisv. demum nadis, flonbus laxe urnbellalis pedicellis ghbriuscuj,, biacteA ana alierave subremotâ, sepabs ovato lanceolatis hispidis, antheiii subulato-anstatis, o\ario glabro — in montibus Ciaigba Mona piope Cunnemaia in Hibernia (Mac Gulla, Mackay, J. Hooker) et in Sieira del Peial Asturiae (Dnneti). h. tetralici afhuis at dibtmcta videtur Habitus sjepius hniulioi ramosior Folia dcnlioia plernraque bieviora latiora. Cor saepius brevior forma potias ad E* cmeream accedens. (v 6 sp. comm a cl. Jos Hookei)

a48. E. riNEREA (Linn.' tpec. p 5oi), mimalm pubeinlis glabnsve, foliis, 3-nis patentibiib ad axillas subfa&ciLulatib liueanbus acutiubculis, IncidU glabiis, flonbus fascitulato-iacemosis, sepalis lanceolato-hneanbus acutis, carinalis, 'anhe- nssubulato-aiibtatis, ovano glabio. — in Euiopâ occidentali a Scotia ad Lusitaniam, ab Oceano usque ad Rbenuin. E. cineiea Cuit fl Lond fasc. 1 t. a5. Lodd. ' bot cab t. 1409, i5o5. K. mutabilis Salisb ' 1 c p 369 non Andr. (v s c. et sp.)

)2. *Maderensis*, foliis non fasciculalis, co roll is angostionbus.—ia ins. Madeia montibus (Lemann). (v. s sp. cumin. à cl. Lemann.)

249. E. STRICTA (Andi. beath. t. 9a), lamulis glabriuscus, foliis qnateinis erecto-patentibus oblongo-hnetfiibas obtusis crassinsculis glabiis, iloubns uiribellatib, sepalis lanceolatis obtus'19, coiollis ovoideo-oblongis fauce consticta, antheris subulato-anstatis, oxauo hirsute—in niontibus Corsica?, Saidinisc et Hispanic australis (BOJSS ') etiam in Hiberniâ boreali (Lloyd in herb. Hcokei!) et in Oiientr (Labillardiere!) £. pendula Wendl I! eric fasc. 10. ic. non Lodd F. Innltauauhs Salisb ! 1. c p J69. £. ramulosa Viv. fiagm. 1. t. 7 non Baiti £ Coisica DC £1. fr. 3. p. 677. ic. rar^t. 17. Ranii stricti rigidi. Pedirelli calyce sspliuslongioies. Cor. 4-bn. (v. s c. et sp.)

a50. E. AUSTRALIS (Linn ! mant p.a3i), laraulis minale puberalis, foliis 4-nuelecto-patentibus anguste hneaiibus obtu&is glabns, lloribus subsessilibus, sepalis ONatis painalis margine submcmianaceis canescentibns, corollis oval-tubulosii VJX inilatjj, fauce vix contr.ict.i, auherib inci&o-arii>tatis, ovario liir-suto — in moniibus occidmtalibus Peninsula? Iberica? et in Africâ boieall-oc-cideutali. £. australis Andr. heath t. 52. Wendl eric. fasc. 9. Sabsb ' 1 c. £> i68. C01. ro&ca 3¹~ lm. longa. l^otiuà coiolas a seclione paium diveis.i. Haec species Salisburio aect. propiaui Tylospoiam constituit. (v. 5. c. et sp)

Sect, xxxvi. PYRONIUM *Salisb* %

Inflorescentia teiminalis floiibus ternis umbellatisve ranùs fasciculato-racemosis. Sepala parva. Coiolia uireolata glabra Sicca. Antbersc exsertx mnicae v. in unica specie aristatje. Folia teina, liueaii-iugona v. dorso sulcata hecapeila. Species uua Europaca, ~~et~~ Capenses ab Etemocallidi, Oropbam et Leptodcu-dio antberis exsertis diveisae, a Polycodon coioUac fouua floubassaepius majou-bus, à Ceramiâ pixscitim habili.

a51. E. UMBIFILATA (Liun 'spec p%(60), ramulispubernlis, foliis erecto-<>abincar'is bievibus obtusis glabnusculis lucidis , bracteis appioximatis, sepahs lanceolatis obtasis brevibus foliaceis, coiolla subglobosâ vd o)ato-inflatâ calyce 3-4-plo longioie, limbo bievi eicclo, ovario glabro.—iuLusitaniâ, Hispaniâ australi, et Afica ;boieali cuta Tingitem. E. nmbellata Audi, beatb t. 99 Bauer icon boit. kew. t 5. Wendl. eiic. fasc. 4 ic Lodd ' bot. cab. t 1217. E lentifoimis Salisb.' 1 c p. 344 Tolia 1-^J lin. Pedicelli filiformes, corollâ sxpius longioies. C01. 1 ^-2 hn cinea,apice sappius \alde contiacta. Antberae breMtei, Mylai longiuscnle exserta. Stigma late capitatum subbiidam (v. 6. c. et sp)

fi subcampanulata, coiollae fance aperliore , staminibus bievionbus, prope Cadix (Picaid). An sp. propi.'(v.s sp coram. a cl. DC)

a52. E. DELICIOSA (Wendl fil. in herb leg Beiol), ranmlis pnbeialis, foliis subpaventibus tenuibus glabiis vel jumonbus minute puberahs, bracleis paivis approximatis &nbremotisive, sepalis linea lanceolatis subcoloratib bievibus, coiolla ovato-inilata faucc contractâ limbo bievissimo lecto, ovanoglabro —in colonia? Capensis prov. George et Uitcnhage. F umbellata Baill linna?a 7. p. 647 T non Linn. E uiubellatac simillima et vix nisi foliiblongionbus tenuionbus diversa. Cor. camca 1 J-2-lin (v s sp)

253 E. DECIPIENS (Spieni; ill bee Klotzsch in herb, reg Reiol), lamulis]>ubt-rulis, foliis ereclo-patenlibiib snbincui visvc rigidulis obtusis Incidis glabuus-culu, biacteis parvis appioximatib subtemotisvc , sepal is bievibus lauceolalis obtusis colotatN, corola ovato-campanulata tubo paium inflato faa?e MV contractâ limbo brevi erecto, ovaiio glabio.—in provinces Swellendana Gtoige et Uitenbage h Constantia hoitul augl E. triviah et E. atiovindis Klol/stb * in herb. reg. Kcrol. Hxe etiam praeredentibus valde affims, sed coiolla bievioi (4-1 £ linn) vix urceolata , alba v. cinea. (v. s. c. et sp)

254 E »FMissA.(Klot7sch' in beib leg Beiol), ramuhs glabiiuscnlis, foliis iuihticaUs subpatentibus oblusis ligidis glabtii mtidis v. iuargme cihol.iiis, bracleis suba^proximalis, sepalis linea-oblongis brexibiis, coiolla ovalo-uci-ceilatâ limbo brevi patente, ovario puberulo —in montibus "Van Staadensrivici

prov. Uitenhage (Ecklon et Zeyher), ad flam Cam too (Masson. Baichell n 4709). E. *globuliflora* Klotzsch¹ in heib. reg. Berol (specimen fructif). Fol. 1 I-2 lin longa. Cor i-lin. junior sab lente niinntissirae lorulenta, adnltalae-vis post anthesin subglobosa Stigma parvuqa (v. s. sp.)

a55. E OPDELENTA (Wendl ex Klotzsch¹ hnn. 12. p. 499)»»amis pnbescensibus, foliis erecto-pa tend bus angustis hirtellis glabratissive, bracteis subicimotis, sepa- lis lanreolatis carinatis brevibus coloratis, corollis anguste tubuloso-campanu- latis, tubo vix inflato, fauce pa rùm contiactà, limbo brevi erecto, antheis aris- tatis, ovario glahro —in coloniâ Capensi (Hesse, Burchelln 6774). MiCrotrcma opulentum KJotzschi'. c. Species giacilis flonbunda. C01 vix 1 lm longa. Sta- mina saepissime 8, ranusfi-7. Ovauum constanter 4-localare v/di locuhs plun- ovulatis. (v. s. fip in heib. Buich. et reg. Berol)

256. E. DioJEFLORA (Salisb ' 1. c. p 342), ramalis puberulis, foliis patentibus laxis tenuibns glabus, pedicellis graribus, biacteis minutis ad basin pedicelli, sepalis miuitms, corollâ ovato-urceolatâ demuin globosâ limbo brevissimo, antheris pauiin exsertis mnticis, ovano pubescentc —in coloniâ Capensi (Masson, Niven) Ramosissima flexuo&a floribnnda. 1ol. 3-4-hn. Cor. 1 ^ lin. Ceramiib angustifoliis affinis sed mflorescentia et flores potius Pyronu (v. s. sp.)

[^]57. E. UNILATERAL[^] (Klor7sch! in herb. reg. Berol.), glabra, foliis eiedo-patentibns rigidulis cann.itis, floribus in lamulos brevissimos secūs umos racemosis secundis, biacteis remotis, sepalis lanceolatis oblongi&ve obtusis brevibus glabris margine scariosis, coiollā oblongā uiceolalā limbo bievi, ovario leviler pubeulo.—in monibus Vanstaadensrivier piov. Uitenhage (Ecklon et Zeyher, Burchelln. 3422). Folia 2-[^]-lin. Cor. feie E. australis a-lin. Stigm paivuin. (v. s. sp. m herb. Burchell et leg. Berol.)

Sect. xxxvii* GYPSOCALLIS Salisb.

Inflorescentia lateralis, floribus secūs ramos[^]iacemosis v. ad apices ramorum subverticillatis. Pedicelli capillares basi v infiā medium minute biaoteolati, brac- teis duabus rarius appioximatis. Sepala parva v. tenuia Coiolla mceolata v sub- campannlala glabia. Autherae exsei tx muticoD vel (in E petraeā) bie[^]ter austatx. 1'olia 3-4-na tarius pluia. Species Euiopeae v. Capeuses.

a58 E. MntTiFLonA (Linn.! sp. 5o3), glabra, foliis 4-5-ms patentibus linearibus obtusis ngidis, sepalis parvis lanceolatis obtusis, corollis ovatis, antheis oblongis bifidis, ovatio glabro —in Gallia; austialis et Hispania mediterranea; lupestribus calcareis E. multiflora Andr. henlh. 1.175. Lodd.' bot cab t. 109 E. multiflora longipedunculata Wendl. enc fasc. 5. ic E. pedunculaiis Presi del Prag. t. 89 non Salisb. E. vaga^sDC ' tl fr. 6 p. 438 non Linu. Gypso-Cdlhs multiflora D et G. Don 1. c. p. aoi. Species pulcherrima floubunda. Foha 3-6-lin Pedicellos folio semper longioies vidi. Cor. incarnata 2 lm. longa. Sl^{lus} tenuis stigmate parvo (v. s. c. et ap)

260. E FUCATA (Klotzsch¹ in heib. reg Berol. non Thunb.), *glabia*, foliis teinis fasciculatis incurvis linearie-teietibus obtusis, sepalis lanccolatis caiuatis collarum subaequantibus, coiollâ oblongâ campannidî limbo subpatente, an-

- theris oblongis ^T o\ario glabio.—In montibus piov. Stellenbosch austialis et Swellendam occidentalis (Lcklon et Zoybei). Flores numeiosi viv lineam longi. (v. s sp. in beib irg lieiol.)
261. E. rLTitJCJif glabia, foliis ternis iricurvcerectis brevibus oblongis obtusis ciassis dot so suicalis, biactefs duabus approximatēs sepalisqne lanceolato-oblongo-lanceolatis, corollā ovatā suburceolatā. limbo brevissimo, antheiis oblongis brevitei .install* mn licsve, ovai 10 glabro.—terrae Karumanassiae petrosisprov. Georg. (Masson) Habitus E. vagantis. Folia bracteae et anthera? diverse Cor. 11 lineans. Folia 1-2 lin. (v. s. sp. comm. à cl. Lee.)
- 262 E. CAPILLARIS (Baitl. in hnnrcā. 7. p. 647), ramnlis glabiis, foliis erecto-patentibus subunbncatis linearibas doiso carinatis sulcatisvc glabris cilia tisve, sephs parvis lineali-lanceolatis, corollis oblongo-campauulatis tetragonis, an-1 he 1 it.oblongo-linearibus,ovarioglabio.—in raonte Tabulaii. E. scariosa Thunb. fl cap. p. 350? non Lodd. Habitu E. articulari vel E. pulchelU affin. Inflorescenlia f. uudilloisc C01. nib ire, ferē Bslou'ae pui'puieae, 1 I lin long« (v. s. ap)
- ?63. E. NUDIFLORA (Linn.¹ raant. p. 229), ramnlis puberalis hirtisve, foliis ternis patentibus linea-sahngonis obtnsiusculis doiso snlcatis hispidis v. rauūs glabratis, sepalis lanceolatis obtasis, corollis ovatis tenaibas, antheiis ovato-oblongis, ovano glabio.—in coloniae Capensisprov. austro-occideotalibus vul-gans E nudiflora Sra ' IC. ined. 3 t. ^7 E flonbunda Wendl! eric fasc. i4* ic non Lodd E. alopecmoides Lodd. bot. cab. t 874 non Wendl E. micio-sloina Beig fl cap. p. 97. E sertiflora Salisb ! 1 c. p 34a. Gypsocalhs ini-rrostoma G. Don 1 c. p 801 et G. nndiflora ejusd. 1 c p. 801 Species busutie et longitudine folioruin calycis et coiollae valde variabilis Flores nu-merosi. Cor. incarnata 1 J-i] lin. longa, fance contracta v. aperta. Antherae plts minusve scabrae. (v. s. c et sp.) 9
264. E* RACEMOSA (Thunb diss. n 47. t. 5), ram is pubescenti-hirtis, foliis 4-nis patentibus linearibas margine cevolutis bispidis viscosis, sepalis brevibus ovatis oblnsis, coiolld urceolato-globosā v. ovatā, antheris ovati's ovario hispido.—in montibus piov. Swellendam et Stellenbosch? E. racemosa Wendl. eric fasc. 10. ic E. flexilis SabbsJ I.e. p. i^2. E bispida An dr. beatb. t. 69. Lodd.' bot. cat. t 1982. Gypsocallis hispida et flexilis G. Don 1. c p. 801. Folia 2-4-lin. ad axillas inteiduiu fasciculata, sablus piacsertim in specim. cuitis uti in Ce-ra mlis aperta. hlores ad apices ramornm racemosi, ramo raritis excurrente. Cor. ij ad 17lin. longas. Species foliis et iufloresoentia ad Cera mi as accedit. (v. s. c. et sp }

Sect, XXXVIII. CERAMIA Don.

Inflorescentia irregulaus floribus longiuscnlē pedicellatis, aliis terminalibus subarabellatis, aliis sacpiis axillaribus. Bracteae parva; longē reraotae (in E. filifoinu approximate). Sepala brevia socipis viscossa. Corolla orceolato-globosa \el ovata, glabiav \iscoso-pnbescens, limbo brevi. Antherae exseitaev. rariūs corolla pa turn breviores, muticae vel anstata? nee cristatae. Canles saepissime difTusi. Folia patentissima 3-4-na plano-convexa rarius hnean-teretia. — Sectio tota Capensis , natuialis qnidem sed vix chaiacteribus certis defimla. Species priores ad Desmiam accendant ob antheras anbtermmales. Species qmbus anthera? mclusae à Pachysā vix nisi babitu et foliis differunt. Exsertae à Gypsocallidi, pu-biflorae ab Ephebo inñoiescentiā mixtā et babitu vel praesertim viscositate corollas diverse.

a65. E DUMOSA (Andi heath, t 2i3 non Sahsb), foliis ternis ovalibus oblon-gisve bullato-convexis obtusis austatis ramisque visroso-pubeulis, pedicellis folio a-3-plo longioribus, sepalis ovatis gl.induloso-bispidis, corollis ovatis in-flatis supeinē contiaclis limbo minuto, antbens exseilis inutieis, ovario villoso. — in coloniā Capensi?E. longipedunculata Lodd.! bot. cab. t. io3. Gypsocallis dumosa etGyps. longipedunculata G. Don 1. c. p. 80a, 803- Foliorum pa gin a inferior vix canescens. Flores versūs apices ramoruru pauci axillares Cor. in-carnatoe 3-3½ lin. longac. Filamenta plana a pice angulata. (v. s. c) *

266. E. HIRSDTA (Klotzsch ! in herb. reg. Berol.), foliis 3-4-nis ovatis plano-convexis subtus puberulis supra cauleque hispidis margine longè cilialis, sepalis ovato-lanceolatis obtusis viscosis, corollis ovato-urceolatis inflatis viscosis limbo brevi, antheris exsertis muticis, ovario puberulo.—in colonia Capensi (MundO. Flores plerique terminales umbellati, paucisbinc indè axillaribns. Cor. 2-lin. Filamenta filiformia apice dilatata. (v. s. sp. in herb. Hook, et reg. Berol.)
267. E. MACROPHYLLA (Klotzsch! in herb. reg. Berol.), foliis ternis ovatis bulato-convexis subtus fomentosis supra cauleque villoso-viscosis, pedicellis folio vix longioribus, sepalis ovato-lanceolatis obtusis viscoso-birtis, corollis ovato-urceolatis inflatis viscoso-pubeulis, antheris exsertis, ovario lanato—in prov. Swellendam orientali (Niven, Hesse, Burchell n. 7118, 7330). Flores plerique terminales, pauci nonnunquam axillares. Cor. 2 $\frac{1}{2}$ lin. Filamenta subfiliformia. (v. s. sp.)
- a68. E. COHDATA (Andr. heath, t. 158), foliis ternis ovatis plano-convexis subtus albo-tomentosis supra canaque bispidulis subviscosis, sepalis ovatis obtuse dcmminatis viscosis, corollà urceolato-globosa glabriuscula viscosa, antheris subfnclusis mutieis, ovario villoso.—in montibus prov. Swellendam. E.punctata Bartl. inlinusea 7. p. 64& Ceramia cordata G. Don 1. c. p. 807. Folia suprasae-pitis nitida, crassiuscula. Flores longius breviusve pedicellati, terminales v. axillares. Cor. alba vix ultra lineam diainetro. Filamenta complanata. (v. s. c. et sp.)
- O. angustifolia*, foliis oblongo-lanceolatis marginibus raagls revolutis snb-clausis. Cum precedente (Niven). (v. s. sp.)
- 7.69. E. LATIFOTIA (Andr. heath, t. 72), foliis ternis oblongo-v. ovato-lanceolatis sublinearibusve convexis supra cauleque pubescentibus viscosissimis, pedicellis folia subaequantibus, corollis urceolato-globosis viscoso-puberulis, antheris subexserlis mutieis, ovario villoso.—in montibus Koodesand prov. Worcester (Niven), et in prov. Swellendam (Ecklon et Zeyher). E. suaveolens Lodd. bot. cab. t. 24 uon Andr. E. crassifolia Klotzsch ! in herb. reg. Berol. Ceramia latifolia G. Don 1. c. p. 807. Rami elongari. Folia supra pubescentia brevissima densa obiecta nee ut in E. cordatâncida. Cor. pallide vel intense carnea 1 $\frac{1}{2}$ lin. Filamenta complanata. (v. s. sp.)
- 'znp.? E. TBWUICALIS (Klotzsch! in herb. reg. Berol.), glabra, foliis ternis oblongo-linearibus planis subfalcatis nudis, pedicellis folio subbrevioribus, sepalis lanceolatis carinatis, corollà globoso-campanulata glabra viscidulâ(?) limbi lacuiis ovatis tnboparum brevioribus, antheris inclusis muticis, ovario villoso.—in prov. Swellendam (Niven, Ecklon et Zeyher). Species distinctissima foliis omnino planis et floribns omnibus axillaribus Ceramis affinis, staminibus inclusis et corollis campanulatis Lepidodendris proxima. Pedicelli filiformes. Folia 3-4 lin. longa rigida. (Cor. vix lineam longa. Filamenta brevissima filiformia. (v. s. sp. comra. a Linn. soc. Lond. et in herb. reg. Berol.)
271. E. THYMIFOLIA (Andr. heath, t. 195), foliis ternis ovatis plano-convexis aristulatis supra cauleque viscoso-puberulis glabratrice, sepalis lanceolatis aristulatis viscoso-puberulis glabratrice, corollis ovato-urceolatis glabris, antheris exseris oblongis mutieis v. minutè aristatis, ovario bispido.—in montibus prov. Worcester et Swellendam E. thymifolia y Salisb. 1. c. p. 325. E. planifolia Wendl. eric. fasc. 19. Pl. Haar. Xerophyt. t. 115. 116. Spec. fil. Ceramia thymifolia G. Don 1. c. p. 807. Affinis E. planifoliae. Folia planiora. Corollæ tenuiores 1 $\frac{1}{2}$ -1 $\frac{1}{3}$ lin. longas. Filamenta basi valde dilatata. (v. s. c. et p.)
- 27a. E. PLANIFOLIA (Linn. ! spec. p. 508), foliis temis ovatis lanceolatisve plauo-convexis aristulatis ramisque viscoso-pubescentibns, sepalis lanceolatis viscoso-pubescentibus, corollis urceolato-globosa viscidulâ, antheris breviter exsertis snbincnsive snbulato-aristatis, ovario hispido. — in montibus prov. Cape et Stellenbosch. E. thymifolia var. a. et 2) Salisb. ! 1. c. p. 3a5. Ceramia planifolia G. Don 1. c. p. 806. Pedicelli fere omnes axillares, folio saepiis longiores. Variat foliis margine magis minusve revolntis, staminibus longioribus brevioribusve. Cor. 1-1 J lin. diainetro. Filamenla E. thymifoliae. (v. s. c. el 6>.)

273. E. OXYOCCIFOLIA f Salisb. 1. 0. p. 3a4» foliis a-3-nis lato-ovatis plano-convexis nitidis ramulisqnt pilosolis vel demùra glabratis, sepalis parvis ovatis pilosalis, corollis late campannatis birtis limbo brevi erecto, antbeus minn-tissimè aristnatis, ova 110 glabio.—in montis Tabulans latere orientali (Ecklon et Zeybei) Ceranias oxycoccifolia G. Don 1. c. p. 807. Species pulchella Oxy-cocco palustri similis. Folia 1J-2 bn. longa, fere orbicularia. Flores axillares vcl uinbellati. Cor*^i* lin. diametrio. Filamenta basi sabdequalia. (v. s. sp. in herb. reg. Beiol.)
274. £. CYMOSA (£. Mey.¹ pi. Dieg. exs.), laniis filiformibus glabris, foliis 3-4-nis ovatis plnnis tenuissime membranaceis giabris, sepalis paivls laneeolato-ovatis meiEfbiaoaceis cilia Us, coiolla globoso-cainpanulata glabia hmbo bre*i* erecto patente, aulberis subinclusis aiistatis, ovario glabro.—ad Dutoitskloof prov. Worcester (Drege pi. cxs n. 1185). Species teneirima praecedenti affinis, Euceis pluribus habita dissimiis. Folia 2-3 lin. longa, i-a lata, mucionulata ciata. Floies p.irvi. Pedicelli elongati. Cor. i*‡*lin. diaraetro. Cymas nullas in plantam video, (v. s. sp.)
275. E. FLACCA (E. Mey.' in Drège pi. exs.), foliis ternis oblongo-lanceolatis liuearibasve convexis subteietibusque ciliato-hispidis aristnatis nudisve lam- Usque viscidulis, sepalis ovatis ciato-hiitismarginerevolutis, corollâ latèrceo-latâ glabia, antbcnsexscettis muticis, ovario glabro. — in montibus Cedeibeigen (Diege) E. flacca et E. tbyraoides Klotzsch! iu berb. reg Berol. Afiinis bine E iatifohec, bine E. fiUorrai. Flores feie a lin. longi, plerique axillares (v. s. sp.)
276. E. SUBTERMINALCS (Klotzsch ' in herb. reg. Berol), plabra, foliis terms an-gnste lineai i-teietibns, sepalis liuean-lanceolatis brevibus viscoso-pul*^e*iuilis, corolhs urceolato-globosii minutè viscoso-pubeiulis, antberis subexsertis subu-lato-aristatis, uvatio glabro. — in coloniâ Capensi ? Cor. fere 3 lin. longnc. (v. a. sp ? in bcib. leg Berol.)
277. E. FILIFORMIS (Salisb ! 1. c. p. 3|5 non Bartl.), foliis terms anguslelineari-teretibus subexpansive ramulisqnc vi&coso-hirtis glabiuscnlUve, bracleissub-approximatis, sepalis&que lineaiibus foliaceis viscoso-villosis, corolla oblongo-uiceolata deintum globobd viscosa glabiuscul.1, anhens exserhs subinclsive muticis, ovario glabro ← in piov. Swellendam occidental!. E. diveigens Wendl. E. flavida! et E. connivens Klot7bcb' ia berb. reg. Deiol. EcUisis filioimiH G. Dou 1 c p. 827. Vlorcs plerique teuninalcs pauci axillires. Cor vix ultra lineam longa. (v. s. ap.)
- 278.? E TRIPHYLLA (Link enum hort. Berol. 1. p. 366), foliis ternis patentibus glabiis, iloubus s.-J-nis terrainalbus breviter pedicellatis, bracteis approxi-matis, calyce foliaceo patente, corollâ viscosâ, antheus subinclusis muticis, stylo esseito. — Hab. . . . Syiingodea triphylla G Don 1. c. p. 81S. Folia 4-5 lin. longa. Cor rubra apice flava i-linearis, teste Linkio qui hanc speciem ex hoi tis Anglicis accepit. j"

Sect, xxxix. EPHEBUS Salisb. — Lasianthac Bartl.

Inflorescentia teiminalis, floribus 3-4-nis nmbellatisve. Sepala parva v. tenuia. Corolla sicca pubescens v. villosa ran 'üs viscoso-villosa urceolata, ran 'üs snh-campanulata limbo bievi erecto-patente. Folia 3-4-na. Antherae vanas saep-simè indusae. Species onines Capenses bine Cera mi is hinc Oiphonis similes Pubescentia corolla; constans vide tar nisi ia var. glabra E, catervaefloia;, ct E. intervallaiis.

'I Ceramioideae. *Foliis plano-convexis margme revolutis, pubescentia scepiu vis-cosd setis rigidis pliLS minùsve commixta.*

279. E. PEKIATA (Bedf.! hort. Wob. p. 18), foliis 4-nis patentibus ovatis oblon-gisve convexis subtùs canescenibus suprà ramisque setoso-ciliatis, floribus uinbellatis, bracteis remotis, sepnlis lanceolatis setosis viscoso-puberulis, corollis urceolato-globosis pubescentibus, antheris aabioclasis muticis, ovario !.i-uato. — iⁿ coloniâ Capensi. E. barbata minor And P. heath, t. 5 non Bedf

E. barbata Drege! pi. exs. Kami decuinbenes junfoFcs densè hispidi. Folia i^j-3-liu. Cor. i{ - if lin. diaiuetro, alba, limbo iu bat: ct in *E. telosa*⁴ majore quâni in afluibus. (v. s. sp. et c. in herb. reg. lierol.)

280. *K. SLTOSA* (Baill. in linnxâ 7. p. 646), setoso-hispida et glanduloso-pubescentis, foliis ternis elliptico-oblongis acutis convexis marginis revolutis et setoso-ciliatis, floribns umbellatis, bracteis approximatis v. una remota, sepalis lanceolatis seloso-hispidis viscidulis, corollis urceolatis pubescentihs, antleris corolla subbrevioribus cristatis, ovario villosa.—in iiiontibus Hottentois-Hollaud (Kcklon et Zeyher). Folia ferè *E. thymifoliae* v. *E. faustae*. Rami floribundi. Inflorescentia et flores ferè *E. perlat.c.* Cor. 1 { lin. (v. s. sp. in herb. reg. Berol.)

281. *E. BARBATA* (Andr. heath, t. 4), setoso-hispida et glanduloso-pubescentis, foliis 4-nis lancolatis oblongis obtasis convexis undique glanduloso-pubescentibus hispidisque, floribus nrabellato-racemosis, bracteis remotis, sepalis lanceolatis hispidis viscosis, corollâ ovato-urceolatâ villosâ subvisco^à, antberis inclusis crisfalisi, ovario villosa. —in monlibos prov. Swellendam occidenialis (Masson, Niven, Buicbelln. 7775). *E. pannosa* Salisb.! 1. c. p. 339. *E. barbata* Lodd.! bot. cab. t. 124. *E. barbata* G. Don I. c. p. 796 et *Eurystegia* panuosa ejusd. 1. c. p. 810: Multo hispidior qnam affiues. Cor. a-a{ lin. longa alba, (v. s. c. et sp.)

282. *E. MARIFOLIA* (Sol. in Ait. hort. kew. ed. 1. v. a. p.^5), rainis divaricatis pubescenti-hirtis, foliis ternis ovalis niargine revolutis tomentoso-puberulis, corollâ ovato-urceolatâ tomentoso-pubescente, antleris inclusis subnlatato-aristatis, ovario hispido.—in montibus prov. Cap. el Stellenbosch. *E. marifolia* Wendl. eric. fasc. 11. ic. Andr. heath, t. 127. Bauer icon. hort. kew. t. 14. *Ceramia marifolia* D. et G. Don 1. c. p. 806. Folia archer 3 Jin. longa, sa-pè •I lin. lata, snprâ canescens, subfus incana. Cor. alba nunc vix. a lin., mine ultrâ a | lin. Antherarum appendiculae glabrae vel scabro-hirtella?. (v. s. c. et sp.)

JB. helianthemifolia, foliis oblongis nonnunquam suprà medium latioribus. Cum j)recedente(Niveu), *E. belwritheinifolia* Salisb. J). c. p. 3a8. *Ceramia iicliunthemirolia* G. Dun 1. c. p. Soft. (v. s. «p.)

283. *E. tiRCEotARis* (Berg. pi. cap. p. 107), ramis tomentosis pubescentibusve, foliis ternis linearibus lanceolatisve margine revolutis subcancsceutibus seiceo-pubescentibus glabratissive, floribus umbellatis, hractcis remotis, sepalis lanceolatis cauo-pubescentibus, corollâ elongato-urceolatâ extùs villos^, antheris inclusis ovatis breviter subulato-aristatis, ovario hirsute—in montibus Roode-sand prov. Worcester. *E. urceolaris* Bauer icon. hort. kew. t. 16. Wendl. erio. fasc. 9. ic. Lodd. bot. cab. t. 1894. *E. pentaphyllu* Linn.! spec. p. 506. *E. cafra* Linn. spec. 502 non Salisb. nee alior. *E. lamellaris* Salisb.! 1. c. p. 3<7. *E. urceolaris* G. Don 1. c. p. 791 et *Ceramia urceolaris* ejusd. 1. c. p. 806. Folia sa?pè semipollucaria v. longiora. Cor. 3-3 j lin. Antherarum appendiculae diver-gentes.

ft. auricularis, foliis brevioribus, corollâ minore plabriore, antherarnm aristis ininutis. *E. auricularis* Salisb. 1. c. p. 327. *Ceramia auricularis* G. Don 1. c. p. 806. *E. n.* 7727 Drege! pi. exs. (v. s. sp.)

284. *E. AGGREGATE* (Wendl. eric. fasc. i3. ic), ramis tomentoso-puberulis hirtisve, foliis ternis linear-lanceolatis margine revolutis pubescenti-hirtis tiubcanescentibus, floribus umbellatis, bracteis remotis, sepalis lanceolatis cano-pubescentibus, corollâ breviter ovato-urceolatâ extùs pñherulâ, antheris inclusis aristolatis, ovario hirsnto.—Hab ... *E. aggregata* Lodd.! bot. cab. t 1678. Ab. *E. nrceolatâ* differt praecipue corollis carneis vix 1 ^ lin longls. An hybiida? (v. s. c.)

285. *E. FAUSTA* Salisb.! l. c. p. 326), ramis tomentosis hispidisque, foliis ternis ovali-ellipticis acutis marginis revolutis cauescentibus setoso-ciliatis, floribus subteruis breviter pedicellatis aggregatis, bracteis snbremotis sepalis lanceolatis densissimis ræ scotoso-hispidis, corollâ ovato-urceolatâ tomentoso-pnberulâ an-

- theris inclusis latiuscule senato-aristatis, ovano hispidp. — in monibus prov aastro-occidentalium (Roxburgh, Niven). HabituE marifoli-e affinis, ngidior, ramosior. Pnbescentia subviscosa Co 1 oil a a-lin (v. s. sp)
- 286 E HIRTA (lhunb. diss n 56 t 2), ramis viscoso-pubescentibus setosisqae, folhs ternis hneai 1-lanceolatis margine revolutis subviscosa-pubeiulis junionbus setosis, floribus teinis longiusculi pedicellatis, biacteis subremotis, sepalis lanceolatis setosis pubescentibnsque, corollā ovato-mceolatā pubescente, antheris inclusissubulato-aristatis, ovano hispido.—in piovinciis austro occidentibus E. urceolaris Salisb ' 1. t p 3a6 non Berg Lrectior et hispidior quam E. marifolia, viscositate et floiibus paucis laxis Cciauiisaffinis. Setae wultō ra 1 lores quam in E. fausta Cor. 2 | v. fere 5 liu. (v. s sp)
387. E ARMATA (Klotzsch' in herb reg. Perol. non Spreng.), ramis viscoso-hispidis, folns ternis patentibus hnean-convexis hispidJS, floiibus umbellatis, bracteis remotis, sepahs ovatis obtusis glanduloso-hispidis, corollis oblongo-inflatis viscosa-pnberulis, antheris subiutlisis aristatis, ovario glabro v. minute puberulo.—in montibus prov. W01 center et Stellenbosch, (Mapson, Riven, Diege). E. fausta; habitu affinis sed ab omnibus hujus sectioms corollis 4 lin. longis differt. Forma corolla: feie E hlandse (v s sp.)
288. E. GronosA (Andi. heath t. 116), ramis puberulis subsetosis , foliis ternis lanceolate oblongisvc margine revolntis setosis, floribus umbellatis, bracteis sub-remotis, sepalis lineaibus lanccolati&ve viscosa-pubeiubs vix setulosis, collā uiceolato-globosa inllata puberula , antheus oblongis subexseitis brevisime anstatis, ovano villosa —in prov. Stellenbosch australifieqnens (Kcklon, Niveu). t. peilata Lee sec Klot7sch in herb reg Berol Affinis hmc h. fa us tar ct E. hirtac , hinc £. aggregate. Cor. 2 lin longa caruea. (v. s. c et sp.)
289. E. CONSIANIIA (INois. sec Klotzsch' in herb reg Beiol.), lamis viscosa-pubescentibus, foliis teinis lincan-Ianceolatis margine levolatis setoso-cibatis, ilonbus iubumbellatis, biacteis remotis, sepahs lanceolatis setosis, corollā ovato-uiceolat†** tomentoso-puberula , antheis subiulu&is muticis, ovario pu- bescente — ha b .. Y. globosa? valde affinis sed corolla? forma pa rum diver&a (v. 8. c. in herb, reg Beroi)
- | I Solcatac,foliis hneari-teretibus dorso sulcatis marginibus clausis , pubescentiā brevi, molliſ|>. scabrd , ran us subviscosi
- ago.? E sicJEFOLt A (Salisb ' 1 c p 326), hnmilis divaricato ramosa, foliis ternis patentibus hnearibus acutis glabiis, flonbns subternis, bracteis lemotis, sepalis ovato lanceolatis obtnsi6 vi&coso-pubescentibus, coroll late urceolato-cara-panulaJa vucozo-pubescenti lunbi lacimis latis tubo parum brevioribns, antheris ovatib subulato-aribtatis, ovatio giabio —ad Babians Kloof prov. Swellen-dara (Masson, Niven). If. pygiaea Andi heath t 279. E sangninolenta Lodd ' bot cab. t 468 bot mag. t. 2263. Habitus Leplodendri, characters fere Ephebi nulli tamen speciei vere affinis l<olia 3-4 lin. rigida. Cot sordide pur-pmascens 3 | lin. longa , latioi et limbo majoie quam in caelens Ephebis. (v. s. c et sp)
291. E OOL-HYLLA, humilis, foliis 4-nis pa vis ovoider oblongisve obtusis mflato-teretibus doiso sulcatis viscobo-pubescentibus, floribus nmbellatis?, bracteis remotis, sepalis parvis oblongis, corollis ovatis viscosa-pubescentibus limbo brevi erecto discolico, auiheus inclusis ciistatis, ovario villosa. — in colomā -Capensi (Bmchell n. 1347) Folia vix hneam longa. Cor 1 lin. longa limbo intenſe colorato Specimen unicum paivum vidi. (v. s. sp in herb. Burchell)
- 29a. E. PROCUMBKNs (Lodd,! bot. cab. t io.p,3), lamis pubescentibub, foliis 4-nis pateatibus liueau'bas junioribus viscido pnbeiulls .iihtnlatis demum glabiatis, noiibnsunibHIdtis, hi.irfeis lemotis, sepalis lduccolatispubescejtitibus, VOrOld "iceolato-globosa pobescente , antheris subexsertis snbulato-aristatis, ovano villoso -- ii_ab Oypsocallis piocumbns G Don 1. c. p 801 1 oha 2-3-lin Coi 1 j lm Jini,i,j, t aggiegata?, foliis et coiollae formā parām di- vrsa (•• s. c)

- 293 E ALBESCENS (Klotzsch ' in heib teg. Beiol), ugida r.iraosissima , foliis 3-4-nis sparsisve brevibus lucurvo-patentibus obtusis, junionbns hispidis , flonbns subterms fasciculato-racemosis prditellatis, bia(teis lemotis, sepalis e basi ovatâ obtnsâ acuimnatis longecibatis nudisve, coiolls ovato-tampanolatis snburceolatis pubescentibus . antheis inolrnis oblongo Iineaubns cristato-aristatis, ovario hirsuto — in ten à Iradouw vel Kannal >nd prov Swellendam Mnndt et Maire Fiuticulus piostratus, laraulis bievibus dense foliatis flon-bundis Cor fere a-lin. (v. s sp. in heib reg Iterol)
294. E. CATERVENTORA (Sabsb 1 1 c p. 372), folns sub-4-nfs incurvo-patentibus hnearibus hulls, floubus lacemoso-congestis, biatteis remotis , sepalis ovato-lanccolatis paivis ^ubcihatis, corollâ o\ato urceolata subteliagona hntelld, antberis intlasis ovatis subtnstato-aristntis, ovano glabio —incoloniâ Capensi (Masson , Hesse, Mundt) h pubescens 3 villosaihunb diss n 61 1 4 F compacta Baitl ' in linna-à 7. p 044 Floiesm lainulis brcvius teuuinales, sed ram is priraaiis excurrentibus saepelaterales videutui. C01 2 | lin , junior sub-tubulosa (v. s. sp.)
- 0? *glabrata* , tota etiam roioll)s(m specimimbus fere fiuttiferis) glabratis
E. corymbosa liartl inlinnaea 7 p 648 ? F Siebenana KJolzsch' in heib.
rcg Beiol spec sylvestua. Specim. culta linta ab I* catervaJloia non
differre videntur. (v. s. sp.)
795. E. IRICUOPHORA, ramulis puberulis , foliis /,-nis pntentibtis tenuibus brevi bospilosis, floribns subsolitauis bre\iter pedicelldtis iu raims idLemoso-panicolatis , biacteis subremotis, sepalis ba&i ovatis liue.iii-acmninalis, coiolls ovato-oblongis subuiceolatis pubescenti-hirlis, anlhens imlnsis muticis, ovano glabro —in raontibus Kleinrivier prov Swellendam (Fcklon el Zeyhei). E piliferaKlotzschr' inlinnagå 12 p. 505 non Thnnb Tolid 1 hn C01 3lin.longa. (v. s. sp. in beib leg hierol.)
- 296.E PYRAMIDx*ORMis (Wendl erii» fasc. 241c.), ramis hiisntis, foliis 4-nis erect is brevibus oblongis hiisntis, flonbus ternis bievitei pdicellatis in rans pyramidatis, bt ictieis lemotis, sepalis basi ovatis bicviiei linean acmninalis, corollis o\ato*uiceolatis pubescenti-hutis, anthers inclusis muticis, ovario glabio.—Ifab.. . Cor 2 J-3 lin T 01 sari eadem ar t. pilifeia Klotzsch' quam inter Sciolostomataa Klotzschio collocatam, enn afflmbushujus seclionis non com pa 1 a vi
- ^97. E PATLIDA (Sahsb M c. p. 3^0), ramis pubescentibus hlsutisque, foliis ternis incurvo-patentibus brevibus linean bus obtusis tomentoso-pubernlis, flonbus snbternis pedicellatis, bracteis lemotis, sepalis linean lanteolatis obtusis puberuh, corollâ ovato-uiceolata tomentoso-pubeiulâ, anthers inclusis subexsertisve oblongis breviter aiistatis, ovario viloso —in piov auttio-oocidentalibuscommuns E. pubescens Linn ' spec, p 506 non alior. E pubescens pilosa Thunb. diss.n 61 teste Salisb. E puia Lodd ' bot cab t. 72 I incana Wendl ' eric. fasc. 18 ic. E pnrialis hortul Folia 1-2-lin. Raini floffen panclati floubnndi Cor 2 I lin. longa, alba v carnea Anthfia¹ tei qualeive longiores quam latii, appendicuhs ngidulis basi subdentatis. Nomiuia L. puiaj et puiialis in hortis etiam E aggiegatae et E. piocumbenti tribuuntui (v. s. c. ct sp.)
298. E. TOMEWTOSA (Salisb.! 1. c p. 327), ramulis tomentoso-pubescentibus, foliis terniserecto patentibas hnearibus pobeiulis, floribus i-3 nis,braoteis lemotis, sepalis parvis ovatis pubescentibus, corollâ ovato-urceolata mollitet tomentoso-pubescente, anthen;, inclusis bieviter ovatis anstatis,ovaiio viloso. —_m prov. Swellendam oendentah. E. velatina Bart.¹ in linnaea 7. []. 645. Folia ciica 1lin. Cor. a-lin. Anlheiaium appendiculx divaricau integrae basi laliuscuse (v. s. sp.)
- 299 E. PUBIGERA (Sahsb ' 1 c. p 372), lamis puberulis, foliis dense quaternis li- nean-snbulatis glabrmculis floribus snbqna ternis, biacteis re mot is, sepalis Hnearibus lanceolatisve pubescentibus, corollis ovato-mceolatis dense tomen- toso-pnbescntibus, limbi laciniis oblongis re cm vis discolonbns, anthers inclu-

SIS subulato-anstatis, ova no villosolo.—in piov. Swellendam, (Niven, Ecklon et Zeyher). £ pra?usta' Bartl.' inlinnaea 7. p 645. Folia vix 2 lin. Cor 4 lin. tubo in 6icco flavescente, limbo intense coloiate (v. s. *p.)

300 ? E. AN GUST AT A (Dai tl ' in linnaea 7 p 651), foliis ternis hneanbns teretiusculis patent-recurvis hirsutis, flonbus ternis nutanubus, sepalis foliaccis, coiolla tubuloso-conica villosa ore constncto, lirabi miniati loins lanceolatis leturvatis, anthem atistatis calycequeinclusis, ovaiioglabio —ad Zwarteberg in distr. Caledon (Ecklon). Floies rosei 1 4 lin. longi sec 13aill. An E. ovina Klotzsi?

30x. E. OVINA (Klotzsc'h! in herb. reg. Berol), foliis ternis lmeari-subulatis ianiulisque minutepuberuhs, flonbns sublernis, bracteis remolis, sepalis brevibns lanceolatis puberulis, corollis ovatis dense lanato-villosis limbo brevi conniventi, antbens inclusis ovatis snbulato-anstatis, ovatio vtloso —in montibus ad flmnen Zondeieindeprov. Swellendam (Lcklon et Zeyher). 'Vix nisi foliis tenuioribas et corollis angustioubus ab h uivah diversa (v. s. sp in herb, reg Bciol)

Joa. E. wivATis (Andr. heath, t. 274) > foliis 3-4-nis linearibus obtusis puberulis glabrativis flonbus subterms, bracteis remotis, sepalis btevibus ovato lauceolahs glabnusculis, corollis subglobosis dense lanatis limbo connivente brevi, anlhens inclnsis subglobosis subulato-austatis, ovario viloso.— in montibus prov. Swellendam occid. (Masson, Ecklon et Zeyher) E peziza Lodd bot. cab. t. 265 Habitus E palhdae et E. hirtiflorae. I olid tenuiora et coiollae(a hn. longs) diversissiinae. (v. s. sp. comm. à cl. Waid ct in herb reg. Berol) .

30i. E. DYSAWThA, lamis hirtis, foliis terms subsquairoso-patentibas brevibus linearibus bispths, floribus teinis, bracteis appioxiniatis, sepalis liuaribus hispidis, corollà urceolato-campanulata hispida limbo bievi erecto, anthem moticis ovatis mclnsis, ovatio viloso —incolonia Capensi (Burchell n, 7093, 7119). Folia 1-7 lin. rigida. Cor a-hn , fauce aperta vel levitercontracta (v. 8. sp. m herb. Bartb.)

3J4. E. HIRIIFLORA (Cart. bot. mag t. 481), ramis hirtis puberulisve, foliis 4-nis inrurvo-patentibus lineaibus obtusis hirtis f floibus sub-4-uis, bracteis 1 emotis, sepalis parvis ovato lanceolatis hntis, corollis ovato-urceolatis inflatis pubescenti-hiitis apice consrictis limbo bievi vix palentc, anihem inclusis ovatis aristatis, ovarioglabio.—in montibus prov anstio-occidentium frequens. K. hiitilora Lodd. bot. cab. t. 417. E. jiubescens Andi. heath t. 37. non Linn. K. pubescens major, hoitul. E. ovata Lodd.! bot. cub. t. 417. E. mitui-formis Salisb.! I. c p. 372. Species foliis birsutieque variabilis. Cor. 1 £hn. longa Antherium aristae scabrse vel. serrulala. Synonymia hujus et quatuor sequentim valde confusa , nee facile observautar chiaactercs e corolla? foi ID à sumpti in specim. exsiccatis. Antherarum appendiculse in eadem specie vanabilrs viden-tnr. (v. s. c. et sp)

(S. minor, corollis vix ultrà lineam longis E. pnbescens Lodd bot. cab t 167. E pubescens minor Andr heath t 38. R pubescens pilosa Wendl. eric, fasc. i5 IC. E taidiflora Salisb.! herb vix tians soc. linn. 6. p 373. E. puberula Bartl. hnn. 7 p. 044 non Klotzsch E giisea Klotzsch¹ in herb, leg Berol. (v s. c. et sp.)

305. E MOTLIS (Andr. heath, t. 272), ramis hulis pubernlisve, foliis 4-nis in-corvo patentibus lineaibus bushiitis, floibus subquaternjs, bracteislemotis, sepalis lanceolatis, corollà urceolato giobosa pabescenti-hutâ fauce constrictâ limbo pateute, antherisincitisis ovatis anstatis, ovatio glabro.—mmonte fabolari E. ramosissima Wendl heib. Beiol. vix tameri eiic fasc. 18. ic E modest a Bedf. hort. eric. Wob. t. i5 non Salisb. E. pubescens Sieb ' pi. cap exs n 171 non Linn, h albiflora Klotzsch ! in heib. reg. Beiol Floies saepe secūs ramos fascicalati. C01. 1 lin. longa, lirabo piopoitione majore etintensius colorato quam in afiimbus. Antherae nigia brevissimae appendiculis basi latiusculia saepius senatis. (v. s. c. et sp)

*06. E. EXIGUA (SalisbJ 1. c p. S73), lamispubescentibns, foliis quateinis, brac-tis remotis, bepalis patvis hncaribus lauceolatisve, coiolhs ovato-

urceolatis pubescensibus limbo brevi, antheris subulato-aiistalis in roris, ovario glabriusculo.— in montibus prov. Steilenbosch. Ab E. bhiiflora /2 differt praecipue foliis tenuissimis. Flores numerosi 1-1 7 liu, longi. (v. s. sp.)

yS. *inermis*, antheris muticis. E. inermis Klotzsch! in linnaea 12. p. 505. (v. s. sp. in herb. reg. Berol.)

307. E. PUSILLA (Salisb.! 1. c. p. 374 non Thunb.), ramis hirtellis, foliis quaternis in enervo-patentibus parvis linearibus tenuis, floribus sub-4-nis, bracteis re 3 otis, sepalis linear-lanceolatis, corollis suburceolato-camparjulatis hirsutis fauce vix contracta limbo brevi, anteris inclusis ovatis aristatis, ovario glabro. — in montibus Stellenbosch. K. villosiuscula Lodd.! bot. cab. t. 1844. E. canescens Wendl. eric. fasc. a3 ic? Habitu E. parviflorae sinnilis. Gorollac forma distincta. Flores 1-1 7-lin. longi. (v. s. c. et sp.)

308? E. TURGID A (Salisb.! 1. c. p. 345 non Link), foliis *Q-nia* incurvo-pateotibos linearibus hirsutis, floribus 4-uis subcapitatis, bracteis reraotis, sepalis parvis linear-lanceolatis hispidis, corolla¹ ovato-urceolata puberula limbo brevi, anteris exsertis subulato-aristatis, ovario minutè pubernlo. — in monte Tabulari et Wyuberg. E. raelliifera Link enum. hort. Berol. p. 370. G. Don 1. c. p. 799'. Gypsocallis Bedfordiana ejusd.l. c. p. 603 et Ectasis targida ejusd. 1. c. p. 827. Species anteris oinnind exsertis Pyronio affinis, sed corollâ pubernâ anteris et foliis discrepant. Cor. 1 7-lin. carnea. Stigma latiu exsertum.

309. E. RARIFLORA (Linn. spec. p. 506), ramis hirtellis, foliis 4-nis incurvo-palentibus parvis linearibus tenuibus, floribus subquaternis, bracteis remotis, sepalis parvis linear-lanceolatis, corollis angustè ovato-urceolatis hirtis fauce parvula consuetudinaria, limbo brevi, anteris inclusis ovatis aristatis, ovario glabro. — in prov. austro-occidentalibus. E. pubescens minima Andr. heath. t. 3Q. E. tubiuscula Lodd. bot. cab. t. 1157. E. tardiflora Salisb. 1. c. p. 373 ex Curt. syn. Cor. 1 7-lin. longa, junior ferè tubulosa, tubo demum parvum inflata. (v. s. c. et sp.)

310. E. INTERVALLARIS (Salisb.! 1. c. p. 375), foliis 4-uis incurvo-patentibus tenuibus puberulis glabratissime floribus sub*4-nis, bracteis reinolis, sepalis linear-lanceolatis brevissimè ciliatis, corollis angustè tubulosis tetragonis vix urceolatis pubescentibus glabratissime limbo brevi subpatente, anteris inclusis sobnato-aristatis, ovario pubescens rariis glabrat. — in provinciis antro-oceanicalibus. E. alopccnroidea Wendl.! eric. fasc. 10. ic. uon Lodd. Habitu inter E. parviflorani et E. palusfrem media. Flores secuti ramos innumerosi racemosi Corolla incarnata 1 7-lin. (v. s. sp.)

f. glabra, Iota etiam corolla glabrincola. Hab. cum praecedente. (v. s. sp.)

Species pubiflora non satis notice.

3 n. E. DISTORTA (Bartl. in linnaea 7. p. 644), ramis divaricatis, foliis linearibus hirsutis patulo-incnrvis subtus caualiculatis, floribus glomeratis, sepalis foliacies corollae campanulatae hirsutissimis tubum subaequantibus, genitalibus inclusis, anteris aristatis.—in monte Tabulari (Ecklon). An eadra ac E. mollis?

Sect. XL. OBOPHANES Salisb.

Inflorescentia terminalis, floribus T-4-nis umbellati.sve. Bracteo remotaj, rassisimè 2 subapproxiinatx. Sepala parva v. tenuia saepius foliacea nee reflexa nee margine imbricata. Corolla glabra, sicca, urceolata v. campanulata, limbo brevi erecto-patente. Anterae inclusaj aristatse Tel. crisalae. Folia 4-na rariis sparse subterna.—Sectio oinnind Capensis à Pyronio anheris inclusis differt, ab Ephebo floribus glabris, à Heliophani anteris appendiculatis, à Leptodendro foliis pie-risque 4"^{ms*}

"f. Fioribis umbellato-racemosis longiuscule pedice Uatls. Folia scope sparsa v, irregulariter 3-5-na.

3ia. E. SUBULATA (Wendl.! t-ic. fasc. aoiic.), ramis pilosiusculis glabrisve, foliis incurvis elongato-lincolibus tenuibus aristatis glabris, bracteis aubap-

proximatis sepalisque linear-subulatis setaceo - acuminatis, corolla* ovalurceolata faace conslnitá limbo subereito, mtheris oblongis suhulato aristatis, ovarlo glabro.—in. montibus Dotoitskloof (Drege, Barchell. n. 866b). Ramuli nonnanquam leviter viscidah. Folia 3-6-lin Cor 2 lin. v. paulò longiores pallide carneae. (v s. c et sp)

313. E. ARISTIFOLIA (Niven' mss.), glabra, foliis subquaternis sparsisve incnrvov-erectis patenlibns velineanbas aristatis, biacteis remotis v. bmis approximatis, sepalis hneau-lanceolatis acutissimis, corollà mflatâ snbgiobosâ fauce subclansâ limbo minimo erecto, anthens cristatis, ovano glabro. — ID montibns prov Worcester (Niven. Drege pi. exs n. 7766 in herb, nostr. hie tam en nameros in Dr. cat. i83g ad £. inflatam refertar qnem nonnisi sab n. 7737 accepi). Inflorescentia E. subalatae Folia latiora. Cor pallide carneae a § lin (v s sp)

314. E. PKDUNCUFARIS (Salisb 1 c. p. 3^9?), glabra, foliis 3-4 nis hneaii-tiigonis dorso sulcatis, bracteis remotis, sepalis lanceolatis appressis brevissimis, corollà globosâ fauce valde constrict à limbo brevissimo, anthens ciistatis. — in coloniâ Capensi (Masson), in montibus Koude Bokkeweld teste Salisb E inbens Thanb. diss. n 83? non alior. Folia a-hn Cor. 3 lin. longa. Specim a Dryandro ad E rubentem Thanb. relatum, qnod Salisbunm negare dicitai. INnl-lam taraen speciem inter Massoniaus nisi ha TIC vidi cum descr Thunbergianâ nee cum diagnosi Salisbananâ convenientem. (v. s. sp in herb. Banks)

315. E. VERECUNDA (Salisb ! 1. c. p 379), ramulis minnte pnberuhs, foliis 4-nis incarvo-erectis patentibns ve linearbus crassiuscnlis rigidis glabris dorso salcatis, bracteis remotis v duahns subapproximatis, sepalis linear-lanceolatis acntis rarinate glabus, co roll is acntiH carinatis glabris, corollà urceolatd inflatâ fauce constnetâ limbi laciniis ovatis bfevibus erectis, anthens enstatis , ovario glabro. —in montibus piov. "Worcestei E cernua An dr. heath, t 9 Wendl eiic fasc 8. IC Lodd. hot cab t. 8?i non Linn. Folia 2-3-hn. sape lucida Tedicelh purpuiei 7-8-lin Cor. pallide 2-2 J lin. (v s sp.)

/2. *lanceolate*, sepalis majoribns carinatis. E. cernna lanceolata Wendl. eric, fasc. 8. ic. teste Klotzsch! E. ignorata Klotzsch! (v. s. sp. in herb reg Berol.)

11 *Foliis quaternis , flonbns 1-4-fiu , anthens enstatis.*

316. E. LATERALXS I Willd. sp. 2. p 380), ramnlispnberulis, foliis erectis patentibusve linear!-tngonis rigidis glabris v, margine minnte ciliatis nitidis, bracteis rein ot is, sepalis lanceolatis carinatis nitidis glabris ciliatisve, corollà urceolato-campanulata glabrâ faace parum contractâ, limbo erecto patente, laciniis saepius gnttatis, ovario glabro —in provmcis austro-occidentalibus h. laterahs Andr heath t. 71 E. gnttaeflora Salisb ? 1 c. p. ^/ E. incarnata Andr heath, t. ib8 Lodd ' bot. cab. t i655 non Thanb E iabens hunulis Wendl. eric. fasc. 2 ic E. fibala Link ennm. hort. Berol p 368 E^ peduncnlata Wendl. eric, fasc a3 non Andr. Species staturâ valde variabilis Folia crassiora quam in E. rnbente Cor. 2-3-lin. pallide vel intense incarnata, fance minus contractâ quâra inE rubente, laciniis (constanter?) apice guttâ glandulosâ illitis. Stigma saepissime exsertum cnpitatum (v s c. et sp)

^6. *arbuscula*, corollis majoribuh snbviscosis. E. arbuscula Lodd ' bot. cab. t. 843. An hybrida hortensis ? (v. s. c.)

317. F. auBEifs (Andr heath t. 43. non Thanb.), ramnlis glabris pnbernlisve, foliis erectis v. incarvo-patentibns hnean-trigonis tenaibus acatiascalis glabna v. vixciliolatis, bracteis lemotis, sepalis basi lanceolatis acuminatis, corollà ovato-arceolata fauce constrictâ limbo brevi erecto, antherarum appendiculis incisis, ovano glabro.—in prov. Swellendara et Stellenbosch. E rnbens Wendl eric. fasc. i5 ic? Lodd ' bot cab. t. 557. E pendnU Lodd.' bot. cab. t. 902 non Wendl. E. nntans G Don 1 c. p. 796 non alior. E. lateralii affinis sed praesertim foliis tenuioibus diveisa. Cor. 2 J hn. incarnata vel paighda. Antherarum appendrcnlai variables, semper tamen cuneatae plus minusve mcisac. f v. s c et sp.)

- d. lasiandra*, antheiarum appendicata piloso-lanatis. E *lasiandra* Klotzsch ! m herb, reg Berol.
318. *h. LJITA* (Bartl' in hnnceā 7. p 648), glabra, fohis erectis linear-trigonis acatiuscolis glabiis, bracteis remotis, &epalis linearibus v basi lanceolatis, corollā ovato-urceolatā faace contract A, limbo brevi erecto, anthciarom appendicalis obovatis mtegns, ova no glabro.— in colon 1[^] Capensi, (Mundt, fccklon et Zeyher) Ab *h.* rnbente nonni&i antheris diversa. An ejus var ? (v. s. sp in *h* Hook, et reg. Berol.)
- 3zg. E. LACTIFRONX (Lodd f bot. cab. t. 990), rarois pnbernlis, foliis angnstē Hnearibas carmatis, margine ciliatis glabrisve , bracteis remotis, sepal is ovato-lanceolatlis margine subciliatis, corollis ovato-urceolatis faace pirum cons trietis, antheris breviter ciistato-aristatis, ovano glabro.— Hab . E. lac tea et E. Kennedy an a Klotzsch ' in hnn̄a 12 p 50(5, vix nisi colore florum albo ab E. tenellā differt. Gor a hn v. pa rum longiores. (v s. c)
- J20. E. TENELLA (Andr. heath t. 94), raraulis glabriusculis tenaibns, foliis patentibus tenuiter hneaii trigoms acntiusculis glabn&, bracteis remotisfse-pahs ovato lanceolatis acnmmatis brevibas, corollā ovato-oiteolatā, fauco const net a limbo patente, antheris cristatis snbmuticisve, ovario glabro.— Hab ... E teuella Lodd ' bot cab. t. 375 Rami pyramidati floribundi Folia i-a IJU. Cor. losea v carnea hmbo evidentiore et patentiore qoam in affinibus, lore Callistae. Antherarnm appendiculaa variabiles, saDpius minutae (v. s c.)
0. corollis majorbus E ambelhfera Wendl. eric fasc. a5 ic ? — in colonia Capensi (Masson) Inter Callistas etOrophanes media (v. s. sp. comra. à cl. Lee.)
- 3ai. L. MARGARITACEA (Sol. in Ait. hortJk^w. ed 1 v. 2. p 30), glabra, foliis erectis tenuibuslinean-tngonis acntiuscihs, bracteis remotis, sepalis tennibus lineari-lanceolatis, corollā urceolato-campannlatā fance vis contractā, limbo brevi erecto-patente, antherium appendicalis incisas, ovano glabro —in provinciis Cape et Stellenbosch Andr. heath t 126 E maigaritacea Wendl. eric fasc. 8 ic. E. obesa Salisb ' 1 c p 375. E rabenti affims bed tennior, flores breviores albi (v. s c et sp)
- 3al ? E. LEUCANTHA (hortal ' Klotzsch' in herb, reg Beiol), foliis 3-4-nis erec-tis hnean-tugonis ngidnlis, bracteis remotis, sepalis lanceolatis, coiolhs ob-longo-urceolatis £:labris, fauce pa rum contracta, limbo eiecto-patente, anthe-raruin appendicnlslanceolatis inciso-dentatis, ovario glabro — Uab.. E. leu-can the ra Andr ' heath t. 28 non Linn. E luteo alba Bedf. hort eric Wob. p 14 Lamprotis Bedfordiana G Don 1 c p 811. Ab affinibus facile distincta foliis sape terms et corollis tennibns apice calycibusqne siccitate flavidantibus. Cor. a hn. longae, in vivo albae. £ero&irailiter hybrida hortensis. A n exE Intea et E. margantacea? (v s. c)
- 3a3 E CURVIROSTRIS (Salisb ' 1. c p. 373), snbglabra, foliis m'mivo v. subre-cnrvo-patentibus hneari-tngonis nitidis, bracteis remotis, sepalis lanceolatis obtnsis cannatis nitidis, corollā campannlatā fance vix constrictā, limbo brevi erecto patente, antheris enstatis, ovario glabro. —in prov. Cape et Stellenbosch E dechnata Lodd ' bot cab t. 1663 Humilis ramosissima Folia 3.3 hn Cor. palhde carnea x £-a Hn formā à precedentibus diversa Stylus ssepitiis declinatus (v. s. c et sp)
- t t t *Polus 4-nu, floribus i-4-ms, antheris subulato-anstatis.*
- ta4 E GRACILIS (Salisb ' 1 c. p 375), ramis puberulis glabrisve, foliis parvis erecto patentibus lincari-tngonis , bracteis remoiis, sepalis parvis lanceolatis, corollā ovato-urceolatd , fance constrictā, antheis globosis anstis bievibus snbulatis suberistatisve, ovario glabro. —in prov Geoige et Uitenhage E graciblsAndr heath t. 68 Wendl euc. fasc 8 ic. Lodd. f bot. cab t 244. E tenuibMma Wendl ' euc fasc 6. ic E neglecta G Don 1. c. p 792. E. tec-nraKlotzsch ' in hcib rrg Bciol Rauu cieHi floiibundi Cor 1 MIn. carnea. (v- a c. et sp)
325. E SITIENS (Klotzsch'mlinnaea 12 p 505), foliis inenrvo-patentibus lenoitci

lineai i-tngouis glabus, II on bus sabsoli tain's, biacteis parvis subremotis, sepalis a basi ovatâ linearci-acurainatis, coiollis oblongis suprâ inedinm inflatis sub-mcuivis fauce obliquâ snbconsrictâ, limbo bievi erecto , ovario glabro — in niontibus ad Palmietnvier prov. Stellenbosch. (Erkloa et Zeyher). Raml Hombundi. Cor. ex sicco pallidoe 3 7-4-lm. longae, litnbi laciais margine albicantis bus (v. s. sp. in herb, reg. Beiol.)

3a6. £. VELITARIS (Salisb.' 1. c. p. 35^), foliis erecto-patentibus linear-triglobis tenuibus acutis glabuiscihs, biacteis paivis subremotis , sephahs e basi ovatâ linearci-acuminalis sablanceolalisve, corollâ urceolato-subcainpanulalâ fauce vix contiactâ, ovauo glabio — in prov. Sellenbosch australiore (Roxburgh). Synngodea vehtaris G. Don 1. c. p. 8a5. Habitus feie L. sitientis. C01. vix 2 I liu. loseae. Antheiae ova toe austis acutis. (v. s. sp.)

£. ligidior, antherarum appendiculis basi sublatioiibus.—ail Palmietflamen piov. Stellenbo«ch (Lcklon etZeyhei). E. beimsphaerica Klotzsch ' (v. s. sp. in herb, reg Berol.)

3a^ E. TITRBINIFLORA (Salisb ! 1. c. p. 377) , glabra, foliis erectis vel incurvo-patentibus tenuissime linea-tngonis, bracteis approximate vel onâ reinotâ, sepalisi hneari-lanceolatis acuiuaatis dimulicorollas longioiibus,coiolhs urceolato-cainpanulatisi fancc paiuin contractA, limbo erecto, antherarum aristis brevibub, ovaiio glabro.— in prov. Stelleubosch. v. Cape (Niven, Roxburgh). Habitual¹, giacilis. Cor. feie E. persoluta; 1 | lin. longoc. Ab omnibus sephahs bracteisque diversa (v. s. sp.)

328 E scABRiusrur A. (Lodd.! hot. cab. t. 517), foliis patentibus lineanbus obtusis suprâ convexis subtus sulcatis v apeitis lamisquc glanduloso-hfrtis, bracteia lemoris, sephahs bievibus laacetattis, corollâ ovato-urceolatll glabrd fauce parum contiactâ, antheris ovatis, ovario hirtello. — in vallibus piov. Swellendam (Muadt, Niven, burchell n. 577J, 5995). Folia a hn. longa. Cor. albae a-lin. v. vix breviores. (v. s. c. et. sp.)

3aq £. GIBBO*A. (Klotzsch¹ inheib Beiol.), ramis husutissimis, foliis paientibus bievibus obtusis levoluto-convexis tubeiculoso-setosis nitidis, bracteis iemotis, »epalis parvis ovatis, corollâ urceolato-campanularâ post antbesin iuflato globosa fauce constuctâ, autheiis ovatis, ovario hirtello. — in montibus piov Swellendam (Mundt, Drege n. 7785 et, Burchell n. 55fio, 5698). Affinis £. scabriusculae. tiabitu etiain £. aiboreaa. Folia vix lincaiu louga. Cor. 1-1 1 Im. iiuctifcia junioii valde dissiliuibs (v s sp)

330. E. STRIGOSA (Sol ! in Ait. hoit. kew. ed 1. v. a. p. 17), ramis hiusntis, foliis patentibus linear-lanceolatis acutis minute pubeiulis glabiisve setoso-cihatis, floribus ad apices ramorum nonnunquam subracemosis, biacteis remotis, sepalis lanceolato-lineaiibus acutis pnberulis, corollâ campanulalâ limbo brevi erecto, ovauo glabro.—in prov. austio-occidentalibus £. arboiea Ihunb. diss n. 63 teste Salisb non Linn. £ axillans Sahsb.! 1. c nonlhunb. Ii piducoxLodd.! non Klotzsch E piluliferaWendl.cnc. fasc iq ic.' non Linn. Lodd. hot cab. t. i4i3 Ii. lasiophylla Spieng ' syst 2. p 19^. L. scabriuscula Drege¹ pi exs non Lodd Habitu hinc £ scabuusculv, hinc £. deflexje affinis. Specimina sylvestra viscidula , foliis longe et ligide ciliatis, culta subcanescens, cilus bievibus Cor. 1 £ lin carnea. Stylus exseitus. (v. s. c. et sp)

331. £ NIDULRIA (Lodd.¹ hot. cab t 764), foliis liueari-oblongis obtusis subtus late sulcatis \el apeitis lamisque glabriusculis subcanescentibus, biacteis ininutis iemotis, sephahs lanceolatis obtusis puberuhs, corollâ ovato-urceolalâ limbo brevi, anthens ovalis, ovario pubeiulo —Hab.. .. E nudifloia et £ roanoides hoitul. Affinis £. persoluta?. 1 olia latiora paginam infeiioiem saepius ostendunt Cor. alba fauce magis contractâ quam in E. persolutâ. An vai vel hybiida hoilensis'(v s. c)

33a. £ MiRsoMnA. (Linn mant. p 230), foliis linear-tiigonis electis patentibusveliusus glabiisve, bracteis remotis, sepalis lanceolatis ciliatis nudisve, co 1 oil a caiopauulaia linibi laciniis ovatis tubo diuiddio v. tiiplo bievionbus siubus atulis clausis , antheiis brcvilei ovatis globosisvr, ovauo glabio v. puherulo. — in provincus austio>occideutahbus vulgaiis Species quoad hirsu-

tiem valdò vnriabilis. Corolla alba 1 |-i | lin. longa, fa nee apeitA v. piacsertim fintififer. i pauiin constuttâ. Authera* semper brevioies quâm in prxcedentibus formâ subvanabiles "Varietates tamcu sequentesintermediis numerosis conjunctas limite certo nee in sylvestribus nee in cultis separate nequivi.

ct. hispidula, Tnm|s|i|T|.Q||iit, folns pleusque •> ^-3 lin longis scabns birtellisve, antbcns subovatis E subdi\ancata Beig. pi. cap. p. 114. E proli- fera Sahsb ' 1. c. p 376 E assurgens Link ennm hoit. heirol p. 372. £. congesta Wendl. eiic fnsc. 17. ic, non Lodd. £. stigosa Wendl. eric, fasc 2 ic. Diege pi exs nonSoland E. cafra Andr. heath t 7 uon Linn. E. legeiminans Hortul ' vix Lodd E munna . E exsetiens ct h. palhdiflora Klotzsch ' in herb, reg Berol. E. setcea Dreg. pi. exs non Andi. E. eburnea hoitul. (v. s. c. et sp)

@. ICEVIS t rain is glabuuuscnlis, foil is brevioibus oblnsioribqs saepius ap- piessih glabiisucus, antbeiis subglobosis. E. laevis Andr heath, r. 221. Lodd ' hot cab. t. T30.3 E. cafra Lodd ' bot. cab t. 19b. E. lyafhiforinis Sahsb ' 1 c. p. 37. E pamculata alba Wendl. enc fasc 14 ic ? h. perso- luta major Wendl eiic fasc. 24 ic E. peisoluta, fc. n. 7761 et E. panicu- lata ,Dieg pi exs. L laevis alba hoitul. (v. s. c. et sp)

yj subcarnea, limbo corollie ejdentiore E. legermanns Lodd ' bot. cab. 1728 non Linn. E persolnta vai. hoitul. An hybnda inter E. peisolata et E. pelviformein (v & c)

333 E. QUADmcFroRA (Sabsb.! 1. c p. 375), glabrinclla, foliis brevibns sub- appressis lineaubns obtusis dorso sulcatis, brdcteis remotis , sepalis ovatis lan- ceolatisve breviter acuminatis, corollâ campanulato-subtetiagonâ limbo bre|i cieeto iinibus acutis, antbeiis glohosis, ova no glabro —in roloniâ Capensi (Roxburgh, Liechtenstein). E coiusca Lichtenst.¹ sec. Klotzsch ' in heib. reg. IJeiol. "Vix ab E. persolutâ distmcta etsi habitn diversa. Kami tenoes riguli virgati. Folia viz nltia linearâ louga. Cor. 1 ¹/₄ 1 means (v. s. sp)

334. E STENOPHYLLA, glabriuscula vel le|i itei pubemla, foliis bievibns subpaten- tibus teunibus, bracteis remotis, sepalis brevibus ovatis obtusis nitidis, corollâ subgloboso-cainpanulata limbo tubo subdimidio bieviore smibus acutis clau- sis , autbfis brevibns, ovario glabro — in coloniâ Capensi (D Thom). Hiec etiam praecedentibas affinis, sed folus tenuibnset sepalodium foimâ di versa Cor i- lin longa raagis inflata fauce snbeontracta. (v. & sp in beib. Hooker)

335. E. PELVIFORMIS (Sabsb 'J. c p. 376;; ramuhspubescentibns, folus lineari- tngonis brevibus erectis patentibusve glabnusculis, biacteis remotis, sepalis ovatis Miblanceolatis obtusis minute ciliatis nndisve, corollâ obconico-campa- nulata innbolaciniis ovatis tubo pauiin breviotibns, sinnbus lacunosis, anthe- us subglobois, ovario glabro. — in provincus Cap et Stellenbosch. E. perso- luta bot. mdg t. 342. Wendl. eric fdsc 141c non Linn.K viridi-purpnrea et E. Mauritanica Lmn. ncc Salisb h vuescens Thunb. diss. n 59? ex syn. E. regerminans Andr. heath, t. a35? non Linn E multumbelhfcia hortul. E. persolutae affinis at corollae founâ distmcta. Flores numciosissimi vix ultrâ hneani longi etlati, carnei,smibus corollae in alabastro lacunosis eleganti&simi. (y. 8. c. et sp.)

3i(). E. TRICHOPHYLLA , lamulis hispidulis, foliis tennissimis paivis ciliato- hirtis, sepalis hnearibns coiollâ parura brevioibus, corollâ subgloboso-cain- panulatâ tenerrimâ pellucida limbi laciniis latis tubo pa ruin brevionbus, an- thens ovali-oblongis, ovario glabro.—in coloniâ Capensi (Masson). Habitus et corolla feie E. steuophyllae sed tenenor. Cor. zfh n dJametio (v. s sp. comm. à cl. Lee.)

Sect. XLI. LEPTODLNDRON,

Inflorescentia leumn.ilis v ramuhsflorifeiis abortientibus irregnantei Litera- ls. Corolla niceolata v campanulata glabia sicca vel (m E. podopbyBa, pube- rula. Antherae inclusae Folia tema. Species omnes Capenscs ab Oiophauípracci- pue foliis ternis diitinctae

| *Bracteis remotis, antheris appendiculatis*

137. E. LEIFOTS (Salisb.¹ 1 c p. 3a<), pusilla diiaicato ramosissima, foliis erectis patentib*ib*ve tenibus linearii-tiigoms glahns, sepalis parvis ovato-lanceolatis, corollis campanulatis limbi laiciis acutiusculis tubo parum brevioribus, antheus subulato-anstalis, ovano glabio — in prov. austro-occidentalibus comraoms. E. div. iricata Bedf hort eiic. Wob p. 8 E longifissa Klolzsch' in herb, reg Beiol. E. tenuis ex parte E cap ill aria et E 7737 Drege! pi. exs. 'Variat foliis nunc tenuissunis vix 1-1J lin noao parum validioribas 2-3 Ha. longis. Cor. vix | I'm. alba (v. s. c. et sp.)
- 338 E TRPTOFUS, folns erectis linear-carinatis obtusiusculis glabris, pedicellis longiuscnlis dellexis, sepalis linear cannaiis rigid is glabus, corollà carapanulatà limbo brevi erecto, antheris subulato-aristatis, ovario glabro. — in coloniâ Capensi (Drege) E patula E. Mey.! in Dreg. pi. exs noc Klotzsch. Hunihs ramosis&ima. Peditelli fib formes. Cor vix lineam longs, (v s sp)
- 339 E. DEFLEXA (Bedf. hoit. eric. Wob. p 8), hamilis folus patentihns linearibus suprà coavexis obtusis sparse hirtellis, pedicellis bievibus deflexis, sepalis lanceolatis obtusis ligidis margine revolutig, corollà campanulatù hnibo bievi erecto, antbeiis breviter cristato au&tatis, ovano glabro. — Hab.... Inflorescentia sublaterahs. Folia saepius patentissima. Cor. alba i²lin longa. Stylus exsertus stigmata paivo (v. s. c.)
- 340 E DEPRKSSA (Linn.! roant p a3o non Andr.), humilis divaricato-ramosissima glabia, folus erecto patentibus oblongis hueanbus obtubis carinatis crassiu&culis, pedicellu bievibos suberectis, sepnlu> lanceolatis caiinatis inaigme snbmeinbranaceis coiollà campanulatà parum vel dimidio brevioribus, corollas limbo bicvi, antheris aristatis, ovario glabro. — in rnpibns piov. Capensi s. E depresia Tbanb diss n. 50 t. 6. E bumihs Sah&b.' I c. p 32Q. E rupestns Andr heath t i4». Lodd ' bot cab t 855 non Andr. E. depie&sa et E. neniuslucata Diege pi. exs. Kami tortuosibieves Cor ?-4 hn. longa alba Yariat sepalis majoiibus minoribusve, antheiarmn appendiculis subulatis Ian-ceolatisve nonnunquam sabdentatis. (v s t. et sp.)
341. E. MIRA (Klotzsch' m herb leg Beroi.), glabeniina, folns erecto-patentibos subincurvis hneaiibus obtusis dorso sulcatis, pedicellis longiusculis, sepalis bievibus Imean-lanceolatis glabris corollà ovato-campanulatà limbo brevi erecto, antheus longissime bubulato-an&tatis ovano glabio. — intei Diaai et Diiekoppe (Diege) Rami floriferi tetragoni paucifoliati. Cor. j-lin. (v. s. sp. in herb. reg. Berol.)
342. E. CARIWATA (Klotzsch' in hrb. reg Berol non Lodd), humilis crecta glabra, ramis virgatis, folns erectis angastelineari-trigonis, flonbus sobombellatis, sepalis lanceolato-lmearibas caiinatis coloziatis glabs, corollà nrceolato-globosa C¹) calyce parum longioie limbo brevi, antheris biévitae subnlato-aristatis, capsnlà glabrà — in montibus prov Stellenbosch (fecklon el Zeyher). Affinis videtur E. pilnhferac sed multo tenuior, flonbos 1 lin longis. (v. s. spec, frnctiferum in herb, reg Beiol.)
343. E. PILULIFERA (Linn ' spec p 507), 1 amis virgatis, foliiA sabsparsis efeetis linearibns ligidis margine ciliatis doiso sulcatis glabiisculis, floibus irregnlatei ambellato-racemobis, sepalis ovato-lanceolatis subviscosis coloratis apice vnidi-acuminatis, corollà urceolato globosa subtetragonà limbo brevi suberecto, antheris snbulato aristatis, ovario glabro — in monte Tabulari. E nudicanlis Berg pi cap. p. 113. t pilalseformis SalUb Me p. 3^8 E pedun>oiIataAndi heath t. iiy E uuica Spieng. syst 2 p 188 Kami subsimplices dense foliosi folia 3-4-lin. Umbellx foliosx multifloro; Cor. 2^ hu. (v. s. sp.)
- 344* E IRREGULARIS, iarais pnberulis, folns hnearibus obtusis dorso snlcatis glabiis, flonbus teiminalibns axillaribnsque irregularitei racemosib, sepalis ovatis ^abiis apice tarmatis, coiollà ovato-inflata subuiceolat^ hmbo brevi CMecto, antheris late cn&tatis, ovano glabro — in coloniâ Capensi (Mnndt). E. rupei.li!> mbra Andi heath t. *3j? Corollas E pilulifera a lin. longa? Sepala corollà vix dimidio breviora submeiubranacea (v < sp coiim à cl Hooker.)

345. E. LEUCODEIMA, foliis linearibus obtusis dorso suicati. 4, junio iibna ramisqae floccoso-toinctosis demum glabralis, iloribns terminalibus axillaribnsqne irregulariler subracemoſis, sepali. slincari-lanceolatis cariualis rigidis tomentosis, corollā ovalo-inflata sul'urceolalā glabra, limbo brevi erecto-patente, antheris arista I is, ovario lariato. — in colonia Capensi (Niven). Affinis E. irregulari. Rarai virgati, folia sa»pè fasciculata. Pedicelli rigidi longiusculi. Mores ferē E. pilulifere vix ijlineares. (v. s. sp. comm. à soc. linn. Lond.)
- 346.? E. PODOPHYLLA, hnmilis, rigida, foliis ad axillas fasciculatis longè petiolatis, limbo linearī crasso rigido lucido bispido apice recurvo obtusosubcartilagineo, floribus irregula liter ax ilia ri bus terminalibusqec subracemosis, sepalis ovatis acuminatis crassiusculis ciliatis pubescentibus corollā urceolato-campanulata extū tomentoso-puberula limbi laciniis tubo brevioribus v antberis latè ciistatis, ovario bispido. — in inontibus prov. George (Niven, Masson, Bowie, Burchell n. 7328). Species distinctissima, viz bujus loci, sed cmm nullā sectione in omnibus convenit. Cor. 1 j lin. v. parūni longior, formā fere £. acutae. (v. s. sp.)
- 347.? £. SAGITTATA (Klotzsch! in herb. reg. Berol.), glabra, foliis linearī-bul-latis acnlis, floribusirregulariter fasciculato-axillavibus (?), sepalis lanceolato . Iluearibus ineinbranacei.s acutis carinatis, corollā urceolatā, anheris subexserlis (?) sagiltato-aristatis. — in m on lib us "Vauslaaden (Drcge). Anthrae aec. Klotzsdi latrales, mihi sabtermiuales videntnr. '!' (v. s. spec, defloratum cum fl. unico delapso in herb. reg. Berol.)
- 'J'f Bracteis remotis, antheris muticis.
348. £. PASSERINE (Linn, ill.! sup pi. p. III), foliis brevibus crassis obtusis raniisque densè albo-lomentosis, floiibus subternis pedicellatis, calyce dense t omen to so semiquadrifido , laciniis ovalis obtnsis , corollis calyce duplo lougio-ribug latè globoso-campanulatis plicato-tetragonisglabris, limbo brevi erecto v. conniveute, iilamentis brevi.ssimis, ovario tomentoso. — in colonia Capensi (Paterson, Masson). K. passerinsefolia Saliab.! 1. c. p. 33a. Species ab omnibus distinctissima. Cor. 3 liu. longae. (v. s. sp.)
349. E. CAMPAULATA (Andr. heath, t. 55) , glabra, foliis incurvo-erectis paten-tibusve linearī-subulatis acutis, Iloribns snbsolitariis, sepalis ovato-rhombeis aenminatis ciliatis, corollā campanulal; limbi laciniis latis erectis, filamentis brevissimis , antheris ovatis, ovario depresso glabro.— in montibus prov. Stellenbosch austrialioris (Masson, Roxburgh). E. campanulata Wendl. eric, fasc. i 3 .i c Lodd.Ibot. cub. 1.184.E. campauularis Salisb.! 1. c. p. 33o. Rami ten lies flexuosi. Sepala bievia basi imbricautia. Cor. lutea a £ lin. longa. (v. s. c. et sp.)
350. E. FLAVICANS (Klotzsch ! in herb. reg. Berol.), glabra, foliis erecto-patenti-bus linearī-subulalis, floribus subsolitanis,sepnlis lanceolatis acumiuatiscou-vexis nit;dis, corollā ovalo-campanulatā limbi laciniis latis erectis, filamentis hrevissimis, antheris oblongis, ovario glabro.— in montibus prov. Stellcnbosch australioiis (Ecklon et Zeyher). Simillima E. campanulas et vix nisi formā se-palorum antherarumque distiucta. (v.s. sp. in herb. reg. Berol.)
351. K. HUPXCOLA (K.lotsch ! in linnaea u . p . 504), foliis angustè linearibus bre-vibus erecto - patentibus glabris, Iloribns in ramis brevissimis subsolitariis secūs ramos racemosis, sepalis parvis lanceolatis, corollis ovatis suburceolatis, fauce obliquā subconstrictā limbo brevissiuo, ovario glabro. —ia collibusad flum. Zondereinde prov. Swellendam, (Ecklon et Zeyher). Folia 1-2-lin. Corolla a lin. v. parūm longior. (v. s. sp. in herb. teg. Berol.)
- 'f 'f 'f Bracteis approximatis. Species anomalte.
352. E. CONDUNSATA, ramulis puberulid, foliis erectis linearī-trigouis dorso sul-calais glabriusculis , floribus subternis, sepalis bieibus ovato-rhombeis breviter acuminatis crassiusculis subviscosis, corolla ovatā limbo brevi erecto, antheris muticis, ovario glabro. —in colonia Capensi (Burchell n. 711a, 7391). Species anoinala habitu E. campanulata? proxima sed rigidior, uec E. rubente diss-

mi Us Cor. a-lin. Antberae nigrse, scabrac nt in Melastemone. (v. 8. sp. in herb, finrchell)

353. £ MEDIA. (Klotzsch! ia herb. reg. Berol.), ramulis albicantibus , foliis appressis brevibus linea-tiigonis crassiuscuh*, floribus terms, bracteis sepa-h&que ovatis obtusis cannalis brevibns, corolft ovato-campanolatâ limbo brevi erecto, antheis mutic^s, ovario glabto.— ad Hangklip pxov. Stellenbosch, (Mundt et Mnire). Habitu quadammodo E. arboeam refert, humilis tameii Folia vix i lin. longa Coiolla? i | lm. (v.s. sp in heib. leg. Berol)

354. E HYsophYLT A , humihs, foliis patentibas ovath* inflalis longè piliferib cacterùm glabris, floribus temis, sepalis oblongo-lanceolalis longe ciliatis, corollâ cauipanulatâ, authcris brevier .installs.— ia coloniâ Capensi (Burchell n. 7745). Species ab omnibus distincliissima. Folia 1 | lin. longa, pilis albidis folio ipso &a?pe longioibus pluinosa C01. 1 lin. longa (v. s. sp. in beib Bnrcb)

355 P fc. SETUIOSA, hutnilis, foliis ternls subqnaternisve oblongis obtusis brevibus setoso-cihalis, iloubus ALI ap<<ps laiuorum glomei.itis, sepalis lanceolate v* > ciclo-puberulis, coiolla campanulatâ touentoso-puberulâ limbo brevi electo , antberis muticis, ovario glabro. —111 lolomâ Capenbl (Niveni Species quoad affinitatem valde dabia. Habitus et iloies fcie £. strigosae, sed antbcus muticis et corollâ puberulâ ab Oiopbam di/fcit, ab Epbebo corollae formâ , ab Helio-pbani habitu ct coiollâ. (v. s. sp. comui. à cl. Lambeit.)

Sect, XLIX HELIOPHANES Salisb.

Inflorescentia terminahs , floribns sab-4-nis. Biactae parvae saspius* remotae Sepala brevia. Corolla tubulos v. obcomco-carupanulata, glibia v pnbeiula, limbllaciniiblatmsculis erect is lubo bieviobus. Stamina inclu^a mutica. Ovaium glabium.—Folia 4 "na 1'loiesradjorej.quam Oiopbam Specie* Capeuiiesp4ludosa?.

356. E. PArusTRrs (Audr heath, f. 77), foliis patentibus tenuiterhneari-trigoms glabris puberulive, sepalis linearibus puberuhs, coiollâ angste tubulobo-carapanulatâ, limbo tubo 4-5-plo breviore.—in paludosis montosis prov. Cape et Stellenbosch. E. palustris Lodd 1 bot. cab t. 4. E. cyrillaeiloia Salisb.¹ 1. c. p. 357. Synngodea cyiillieflora G Don 1 c. p 821. Caulis pluripedalis debilis diffusus Ranu tueeb. Cor. pallide carneac 3-lin. lougx¹, vix 1 lin Jatae. (v. s. c et sp.)

357.P E ROXBURGHir, foliis•subincnrvo-patentibus tenniter linearis-trigonis glabnuscnlis, sepalis e basi ovutâ hneari-acuminatis, corollis oblongis ample tubuloso-campanuUts glabiinsculis hmbo tubo plures breviore.—m paludosis prov Stellenbosch cum E. concinnâ et E. pyramidah crescenlem leg. cl.^ Roxburgh et Niven, et hoc teste foite hybiida est inter Illas sponte nata. Reveia etiam intermedia cst. Cor.'4 hn. longa. Capsula 4-valvis valvularnui marginibos intru&is sub b-locnlaiis! Semina tarn en perfecta videntur' (v. s. sp)

358. K. PYRAMIDALIS (Soland. in Baner icon hort kew t ^7) foltis patentibns snbincoivis tenuitei lineaii-trigonis glabus pubcinlisve, sepalis e basi ovatâ longe acuminatis, corollâ obconico-r.uupanulalâ glabrin&culâ limbi patenlis lacimis ovatis tobo dimidio brevionbus.— in huniidi prov. Cape et Stellenbosch. E. pyiaimdal is Andr. heath t. 14s bot. mag t 366. Lodd ' bot cab. t. 3ig Wendl. euc. fasc. 5 ic E obpyramidalis Sahib.' 1. c. p. 3JO. Syringodea obpyianndalis G Don 1. c. p 8a 1 Rami iloubundi pamculati. Cor. roseae 3-5 hn. longae, basi per antbesin attenuate, post anthesin inflatas. (v. s. c. *t sp)

fi' vernalis, coiolls brevioribns basi lationbus antheris corolla 'pa rum brevioribus, stylo exerto —Hab.... E. vetnalisLodd ! bot. cab. t. 1608. (v. s. c)

359 E. PROPFNDENS (Andi. heath t. 141), foliis patentibns tenniter liueaii-tngoms nrevibus pubeiulis, sepalis ovatis breviter acumiatis, corollâ Iatis-~~ime~~ campanulai A pubescente limbi lacinns latissimis tubo dimidio brevionbus. — in roloniâ Capensi (Niven). E propendens bot. mag t. 2140. Lodd * bot

cab. t. 63. Kami decuinbentes birsuti. Folia vix 2 lin. longa. Cur. rosea 31in. longa, ultrà 3 fm. tliametro. (v. s. c. et sp. coraro. à cl. Lambert.)

Sect. xLin. LOPHANDRA Don. — *Cornutarum* sp. *Klotzsch.*

Inflorescentia sab apice ramornm verticillaris, floribas longiuscalè pedicellatis. Bractae remotae. Sepala appressa margine scariosa. Corolla latè campanalata limbi laoiniis amplis ovatis. Antherac apice ultrà foramen productae. Kami elongati virgati. Folia 4-na v. plura, incuivo-patientia. Species Capenses.

360. E. CORONIFERA, foliis laxis, bracteis linearis-subulatis, sepalis lato-lanceolatis longè acuminatis corollâ paùrum brevioribus scariosis carinatis, filamentis nudis, antheris oblongis, ovario glabro. — in coloniâ Capensi (Burchell n. 5979). Similis E. cubica; Folia 3-4-linearia petiolo longiosculo. PedicelU densè albo-hirti. Cor. 2 ½ lin. (v. s. sp. in herb. Burch.)
361. E. CUBICA (Linn.! mant. p. 233), foliis laxis, bracteis lineal r-subulatia ,sepalis rectnis scariosis carinatis acumine brevissimo subfoliaceo corollâ dimidio saltern brevioribus, filamentis apice minutè biappendicalatis , antberis oblongis, ovario glabriusclo. — in prov. George et Swellendam orientali. E. cnbica Wendl. eric. fasc. u. ic. Andr. heath, t. 14. Lodd. bot. cab. t. 972? E. hottoniaeflora Salisb.! 1. c. p. 331. Lophaudra cubica D. et G. Don 1. c. p. 810. Folia 1 ½-2-lin. PedicelU pubescentes. Cor. 2 lin. (v. s. c. et sp.)
- 36ta. E. SERIPHIForIA (Salisb.! 1. c. p. 33r), foliis brevibus densis, bracteis brevibus oblongis, sepalis obovatis obtusis v. rariis acurainatis leviter carinatis coloratis corollâ dimidio brevioribus, filamentis muticis, autheris ovatis, ovario glabriusclo. — in prov. Swellendam orientali et George. E. cubica minor Andr. heath, t. 15. E. cnbica Thunb. diss. n. 46. teste Salisb. E. bella Spreng.! syst. 2. p. 197. G. Don 1. c. p. 799 et Lophaudra seriphifolia ejusd. 1. c. p. 810. Similis E. cobicae et forsan cum omnibus hojns sectionis, neglectis sepalis filamentoriimque appendiculis, ejus varietas. Folia plerumque vix ½-linearia. Cor. 1 -1 lin. (v. s. c. et sp.)
363. E. INCCRVA (Thunb. fl. cap. ed. Schult. p. 359 non Andr.), bracteis sepalis acutis carinatis viridibns , corollâ ovato-campannlatA mnbrA , filamentis mnlicis. — in interioribus province's Thunb. 'J'.

Sect. XLIV. MELASTEMON *Salisb.* — *Cornutarum* sp. *Klotzsch.*

Inflorescentia leruiinalis floribus subternis. Sepala appressa margine scariosa v. colorata tubo corollae saepius scqnilonga. Corolla latè campanulata, limbi laciniis amplis ovatis, tubo saepius requilongo vel longiorc. Antherae inclusae apice ultrà foramen productae v. rariòs obtusas nuda, ad insertiouem mnticae. Folia terna. Species oinnes Capenses. — Sectio apprimè naturalis, etsi species à cl. Don in sex generibns dispersae, à Lophandrâ inflorescentiâ, ab Eurystomate antheis differt.

364. E. TETRATHECOIDES, glaberrima, diffnsa, foliis remotis, bracteis parvis remotis, sepalisbasi subovatis marginescariosis carinatis longè acuminatis, corolla latissima , antheris scabro-hispidis acuminatis, ovario glabro.— in coloniâ Capensi (Burchell n. 7027)-KaranU pedicelli et calyces nitentes. Folia a-3-lin. Sepala a-lin. Cor. fere 3-liu. (v. s. sp. in herb. Burch.)

365. E. MUCRONATA (Andr. heath, t. 225), foliis longè lineaïi-lanceolatis planis trigonis rigidis acntis mucronatis ramulisque glabris, bructeis remotis lanceolatis, sepalis ovatis mucronatis subcarinatis, autheris oblongis breviter acuminatis, ovario glabro.—in montibns ad flum. KafTerkuyl prov. Swellendam (Niven). Eurylepis mucronata G. Don 1. c. p. 808. Ab. omnibus affinibus foliis 6-10 lin. longis distincta. Pedicelli pubescentes. Antberae filamento sablongiores. (v. s. c. et sp.)

366. E. MOSCHATA (Andr. heath, t. 226), foliis erecto v. recorvo-patientibus lineaïi-trigonisobtusis,¹ bracteis sepaliformibus laxis, sepalis late obovatis raera-branaceis apice brevissimè carinatis, antheris ovatis apice longè cornutis, ovario

- glabro v' minntè puberulo. — in montibus prov. Worcester et Stellenbosch.
 £. florid a Lodd.! bot. cab. t. 234 n^on Thuub. h. aulhina Spreng. syst. 2. p. 196.
 Rainuli puberuli. Folia saepè canesceutia. Cor. ampla 3 lin. lata, ultrâ 4 lin.
 longa laetè rosea. Pedicelli pubescentes. (v. 9. c. et sp.)
367. E. CRISTJEFLORA (Salib.! 1. c. p. 332), foliis erecto-patentibus subcarinatis
 v. dorso sulcatis obtusis glabris, bracteis ovali-oblongis approximatis, sepalis
 lato-ovatis membranaceis coloratis cariato-concavis, ant' hen's ovatis obtusis
 breviter acuminatis subscabris, ovario glabro, stigmate obtuso. — in prov.
 Georgè et Swell en dam. E. melanthera Thunb. diss. 11. 12 teste Salisb. non
 Linn. Ramuli puberuli rariùs glabri. Folia 1-2 lin. Cor. 1 £-2 lin. (v. s. sp.)
368. E. CORNUTA (Roxb.! in herb. Salisb.), foliis erecto-patentibus subcarinatis
 v. dorso leviter sulcatis glabris, bracteis approximatis ovali-oblongis, sepalis
 lato-ovatis membranaceis coloratis concavis apice carinatis, antheris ovatis ob-
 tutis acuminatis vix scabris, ovario glabro, stigmate latosubpeltalo.—in monte
 Tabulari (Ecklon et Zeyher) ibidem? (Roxburgh). E. blanda Salisb.! 1. c. p.
 331 non Andr. E. suavis Barll. in linnaeâ 7. p. 641 Plophaudra blanda G. Dou
 p. 810. E. cristaeflorae similissim flores minores et stigma constanter diversum.
 1. c. (v. s. sp.)
- /S. squarrosa, foliis rigidioribus squarroso-patentibus. — in coloniâ Ca-
 pensi (Muudt). (v. s. sp. in herb. Hooker.)
369. E. LAVANDULJEFOLIA (Salisb.! 1. c. p. 332), foliis erecto-patentibus subin-
 curvis linearis-carinatis, bracteis sepalisqne imbricatis ovatis carinatis margine
 seariosis, corolla; tubo tetragono, antheris ovatis vix acuminatis, ovario mi-
 nutè puberulo, stigmate tenui.—in cooniâ Capensi, (Niven, Masson,
 Mundl). E. monticola KloJzeh! in herb. Uerol. Rami canescens. Folia 2-3 lin.
 longa pallida, caeterum Luvandulae sat dissimilia. Cor. a-lin. Filamenta la-
 tiora quam in affinibus. Anthera? fuscae. (v. s. sp.)
370. E. GILLII, foliis subrecurvopatentibus parvis linearibus obtusis subcar-
 natis glabris, bracteis subbipaliforibus remotis, sepalis^vato-orbiculatis
 membra naceis coloratis cariato-concavis a pice breviter acuminatis scabris,
 ovario pubescente.—ad Attaqnaskloof prov. George D. Gill., (ibidem?) (Ecklon
 et Zeyher). Habitus E. moschatas sed corolla minor et ovarium pilis brevibus
 rigidis constanter onustum. Antherae nigrae. (v. s. sp. in herb. Hooker et reg.
 Berol.)
371. E. ncaiiFUSA (Salisb.! 1. c. p. 332), humilis ramosissima glabra, foliis op-
 positiste/nisque brevissimis appressis obtusis nitidis, bracteis ovatis subremotis,
 sepalis ovatis acutis cariato-concavis scariosis, antheris oblongis longè acumi-
 natis breviusculis, ovario glabro.—in rupestribus umbrosis montium prov. . . .
 (Niven). Ceramia humifusa G. Don 1. c. p. 807. Rainuli tenuissimi. Folia vix
 semilineam longa. Cor. 1 lin. Antherae fuscae. (v. s. sp. comm. à cl. Lambert.)
372. E. LFJOPHYLLA, humilis, ramosissima, ramulis subviscoso-pubescentibus, foliis
 patentibus minutiis crassis obtusis lucidis, junioribus glutinoso-pubescentibus, brac-
 teis oblongi* parvum remotis, sepalis obovatis carinatis, ovario villosulo. — in
 colouïâ Capensi (Paterson). Ab E. melantherii diversa prsecipiè floribus dimidio
 minoribus, et foliis vix seragineam longis. (v. s. sp.)
373. E. MELANTHERA (Linn.! mant. p. 232), foliis linearibus obtusis crassiuscu-
 lis dorso sulcatis nitidis glabris v. junioribus glanduloso-scabris, bracteis
 oblongis approximatis subremolivis, sepalis obovatis carinatis coloratis gla-
 bris, antheris oblongia breviter acuminatis scabris, ovario villoso.—in monti-
 bus prov. Swellendam, George et Uitenhage. E. lysiraachixflora Salisb.! 1. c.
 p. 332. Gypsocallis melanthera G. Don 1. c. p. 802. E. Mundtiana Klotzsch!
 in herb. reg. Berol. Folia 1-2 lin. longa. Rami floribundi. Cor. roseae r Jv.
 gaepius 3 lin. longa?. (v. s. sp.)
- ft.? adenophyUa, ramulis foliisque glauduloso-scabris hirtisve floribus mino-
 ribus. Au sp. propr.?—in prov. George et Uitenhage. (v. s. sp.)
374. E. LONGIFES (Klotzsch! in herb. reg. Berol. non Bartl.), ramis pubescentes*

bus, fohis Hueanbas obtusis dorso nalcatis glabnnsculis , pedicellis elongitis pnbescntibus, biacteis iuinutis remotis, hepalis ovatis carinatis obtase acuiuinatis glabnuscalis, anthens oblongi* bievissime acurainatis v apice nudis bievinscuhs, ovano villosulo — iu collibus ad Grasrueg in Uitenhage (Tcklon et Zeybei) & melantherae et £. vanae valde affinis sed flores majores et bractese antheraequne diversae. (v. s. sp in herb leg Beiol)

j2 *parviflora*, floribus E melantheioe parum minoribas — ia prov. George (Masson) (v. ^ sp comm. a rl. Lee)

3^5. E. VARIA (Lodd ' bot cab t 13a5), foliis patentibus hnean-teretibus obto sis doiso sulcatis opacis scabio-hiilelhs, bracteis oblongis snbapproximatis , sepalib ovatis camiatis coloiatis tomentoso-pubeinlis subglabiisve, antheris ovatis oblongisve apice vix acuiumatis nudis scabns, ovauo villosulo. — in pTov Swellendam montibus E Cassonii et E Caroliniana hoitul E. inuutata Wendi fil.^f in berb rpg Beiol. CalHsta varia G Don 1 c p 8i3 Folia longiora quam in E. melanhera, non lacida, erectiora v patentioia, plus minusve birto-pubesrentia, sitca v glandulosa. Flores E melanhei'B, ix. tamen ejas var (v s. c et sp)

376 E. CHAMISSOKIS (Klotzschbl m herb reg Berol), folns patentibus linearibns dorso salcatis apertisve rarai&que butis, biacteis minutis remotis*, sepabs obovatis retusis coloiatis villosis, ant hens ovali-oblongis» breviter acuimnatis, ovauo villoso.— in pioviaciif Uitenbage (Chaiuisso , Buichell n 355^ , Ecklon et Zeyher) Floies fere E. variae Species pulchra, hirsatiae et bracteis distinctis-siuia (v. s sp)

377 E. STENANTIIA (K.lotzsch' m herb. reg. Berol), foliis parvis sqnarrosis linearibus obtusis nitidis subtus sulcatis, bracteis oblongis lemotis, sepalis appressis ovatis acminnatis carinatis margine srariosis coloratis, anthens oeali-oblongis obtusis, ovano villoso —in monte Zwarteb erg prov Swellendam, (Niven, Ecklon et Zeyher) Species parva ramosissnna dense foliata flonbunda. Flores vix 1 lin. longi in sectione tenues Cor tabus subtetragonus hmbi lacinia subcannatae. (v s sp)

Sect. XLV. EURYSTOMA.—Muticarum pars et Reflexae Klotz&ch.

Inflorescentia teiminalis floiibns substeinis binisve Sepala appressa margine scanosa v. colorata tubum corolla aequantia v sapeiantia Corolla late campa-nulata, hmbi lacimis amphs ovatis, tubo aequilongis longionbus e ssepe ieflexis Antherae coiollâ breviocfs apice obtusae nee ultra foiamen piqdntac, id mseitio-nem anstatae rarius custatae. Folia terna. Species omnes Capenses plera>qne au-theria subterminalibus Ectasi proximoe.

* Calyce corollâ subdimidio breviore.

378? E ACITA (Andi. heath t. 1), foliis erceto-patentibus snbsquanosis linean-bns doiso carinatis sulcatisve acutissimis austatisve jumonbus ciliato-pnbeiuhs demum "labu's, bracteis subieinotis, sepalis ovato-lanceolatis eneivibus v cannto-arurninatis coloratis snbviscosis, coiollâ subuiceolato-campanulata subviscosa (?), antheiis uistatis, ovaiio glabro. — in coloniâ Capensi (Niven). E scanosa Lodd ' bot cab. t 477 E crossota Spreng syst 2 p 201. E. acuta G. Don 1 c p. 796 et Eurylepis crossota ejnsdem 1. c p. 808 Species inter Eurystegias et Eurystomata media Affinis hinc E bievifoliac , bine E vesper-tin ae Cor rose-B 2 lin longac (v. s. c et sp)

379⁹ E cnAssiFOLIA(Andr. heath t 257), foliis patentibos lanceolato-hneanbns obtusis glabiis lucidis ngidis, bratteis oblongis apice carinatis A calyce paium remotis, sepalis ovatis apice obtase cann.ito-mucrorutis glabns, anthens apice subcornutis, austis brevissirais nullisve.—E complanata Nois et Klotzsch' in herb, leg Beiol.—Hab.. Intel Melastemones et Euiystomata media, ha-bitu distincta Forsau hybrid i qnaedam hoitensis. (v s . c ^ n heib rcg Berol)

380. E. LACHNJEJA (*kndi* hedlb t. I'jo), folus lmbncatis breyibus crassis obtasis

ibiutè glaudnloso-pubeiulis subliis sulcalis, bractis oblongis cariualis parùm remotis, sepalis ovati.i cariaalis obtuse subacuininalis subciliatis, corolla!)aci-nüs paten ti bus, anherarum aristis acutis in filamento longe decurrentibus, ovario glabro. — in inonte Zwartberg prov. Svvellendara, (Muiult, Ecklon et Zeyher). E. lachna?;r;folia Salisb.! 1. c. p. 335. G. Don 1. c. p. 791. et Eurystegia lachna?;a?;folia ejnsd. 1. c. p. 810. E. Pohlmanni Lod/d. bot. cab. t. 1852? Folia vix | lin. Ionga densissime sexfaria. Mores 2-lin. albidi. Anth. nigroe loculis brevissimis, ad apiceni interiorem coineclivi oblongi in aristas breves divergen tea basi desinentes. (v. s. sp.)

H81. E. ARGENTEA (Klotzsch! in herb. reg. Berol.), humilis ramosissima, foliis brevissimis appressis concavis nitidis , bracteisovali-oblongis subapproximatis, sepalis ovatis acutis carinato-concavis scariosis coloratis marline ciliatis, corolla? limbo aperto, antheris oblongis scabriusculis basi brevissimè aristatis , ovario glabro.— in inonte Winterhock prov. Worcester (Ecklon et Zeyher). Habitus ferè E. humifusa? sed validior. Anberae diversissimae corollâ parùm breviores. Flores vix 1 } lin. longi. (v. s. in herb. reg. Berol.)

38a. E. FLOCCOSA (Barll.! in linnxâ 7. p. 640 non Salisb.), ramulis hirtis, foliis linear-trigonis obtusiusculis glabris, bracteis ovatis subapproxiratis, sepalis ovato-orbicularibus carinalis, corolla? limbo aperto, antheris ovatis subulato-aristalis corollâ subdimidio brevioribns, ovario glabro.— in monte Zwarteberg propc Caledon (Mundt et Maire. Ecklon et Zeyher). Habitus forè E. cristaeflorae. Kami fforibundi pyrauiidati. Cor. 1 lin. longae. (v. s. sp. iu herb. Hooker et reg. Berol.)

383. E. PATENS (Andr. heath, t. i33)» ramulis hirtis, foliis patentibas elliptico-linearibus subplanis margine revolntis, bractis remotis, sepalis lanceolato-ovatis acutiusculis , coroilis puberulis , antheris oblongo-linearibus brevissimè dcurreuli-aristatis, ovario villosissimo.—Hab. ... E. patcus Weudl. eric. fasc. •26. ic? Lodd. bot. cab. t. 1228. E. expansa hortul. Gypsocallis patens G. Don 1. c. p. S02. Ab af/inibas foliis latis subtùs apertis facile distincta. Flo res rosci vix 2 lin. longi, ferè 3 lin. diametro, (v. s. c.)

384. E- VESPBRINA (Linn, fil.! snpl. p. 221), foliis erecto-patentibns linearibus obtusinscniscarinatis rigidis glabris, bracteis linear-oblongis obovatissve subrcmotis, sepalis latissimè ovato-rhombeis obcordatisve carinatis margine scarioso-nitentibns, corollas limbo rigidulo aperto, antberis oblongo-linearibus cristatis, ovario glabro v. apice pilis raris bispidulo. —in luonibus prov. austro-occidentalium. E. calycina Thunb. diss. n. 78 et Linn. sp. p. 507 testc Salisb. non alior. E. gnidiaefolia Salisb. 1 1. c. p. 336. fe. Dickensouiana alba Bedf. hort. eric. Wob. p. 8. Klotzsch! in pi. Drège. Species valde variabilis. Rami crassinsculi foliis obtecti. Folia circ. a lin. Ionga suprà plana. Pedicelli saepè albo-hirti. Flores 2 J lin. albi. Antheraruin appeudiculse latae v. angust;c profnndè dentatac et longe acaminatx v. ovatae v. lanceolatae leviler iimbriatae. (v. s. c. et sp.)

&. *virgata*, foliis appressis, floribns minoribus, sepab's orbicularibus acutiosculis carinatis.— in coloniâ Capensi (Masson). Tix species propria. (v. s. sp.)

385. E. PRIPLOCJBFLORA (Salisb.! 1. c. p. 33^), foliis incarvo-erectis linearibus carinatis rigidis glabris, bracteis remotis, sepalis lato-ovatis orbiculatisve carinatis, corolla limbo rigidulo aperto, antheris oblongis breviter subulato-aristatis, ovario glabro.— in coloniâ Capensi (Roxburgh). Tix Don var. E. vespertinae. (v. s. sp.)

386. E. PRAGRANS (Andr. heath, t. i65 non Salisb.), foliis opposilis ereclo-appressis linear-trigonis acntis glabris, floribus binis, bracteis sepaloides laxis, sepalis ovatis cariuatis membranaceis , corolla; limbo reilexo-pateute, authera-rum aristis longe decurrentibus brevissimè liberis, ovario glabro v. apice vix bispidulo. — Hab. ... E. fragrans bot. mag. t. 218*1. Lodd.! hot. cab. t. 288. Gypsocallis#agransG. Donl. c. p. 803 et Eurylepis fragrans cjsd.l. c. p. 808. Habitus ferè Laniproteos, llores E. uigritae. Anthernc ferè Amphodeac. (v. s. c.)

387 t NCrRiiA (Linn 'mant p 15), i.imolis pubeiulut glabiahsve , folif. squ.nroso-pateulibus lauus suberectis lmeari-tngonis ugidis glabris, bracteis p.iiura lemolis, sepalis ovatis obovatiwe caunalis inargine subcihatiS, COIOHJL limbo lelkxo palente, anthens oblongo-hneaubus bitviter aiistatis, ovano villoso.— m moiitibas prov austio-ocidentalium hequens E nignfa Audi heath t öi.Wendl eric. fasc. 12 it Lotld.¹ bot cab t. 54 E. volutaefloia Salisb ' 1 t. p. 335 et t munda ejusd ' 1 c p. 337 t laricma Berg, pi rap p. 94 £ mtidnla hoilul Gypsocalhs nigncans G Don 1 c p 80a , Gyps mguta ejusd 1. c. p 804. el Lauiprotis munda ejusd. 1 c p. 811 1'olia densa a-lin. Cor albaefie 2-liu. Aulbeiae nigrse appendiubus niinutis v. subulatis basi paium dilatatis Species valde vanabilis pleimnque foliis densis squarrobis et floubns facile distincta , sed mteidum a vanetatibus nonnulliaE. vespertinat' »ugre di5tinguenda. (v. 6 c et sp)

fi. Niveni, foliis appressi\$, nntherarum appendicibas bubulatis (v 5
 »P)
y subcustrata > foliis squanosis, antheriam appendicibu:* basi latioubus dentatis t. acutangula LoddJ bot cab t 1868 Gyp~~OL~~ amtangula G. Don 1. c. p. 802 (v. s L et sp)
 «T tyngera, folns appressis, appendicubs latiusuhs dentatis E lyugeia Salisb ' 1 c p i3b t. ochioleuca Wendl ill ' in beib icg Beiol Gyp totallis lyrigera G Don 1 c p 8u4 (v. s. sp)
i marginata, sepalis inargine nigio-cihiatis, antheraram appendicibus ci is tatis. E uiarginata Andi. heath t. 214 Euiystegia maiginata G Don 1 c p. 809 (v. s c)
 ^ ? *mclanthra*, Lodd. bot cab t. 867^ non Liun

♦ I Caljrc corollä par 'urn breviore *v earn subccquante. Species Polycodonibm ct Eurystegiis affiies.

388. E. NIVB& (Bedf hort. eric. Wob p 16), glabra, foliis erec^o appressis bre vlns linear-i-trigouis dorso salcatis, bracteis oblongis lanceolatisve caunatis , seplhs lato-ovatis ctrinatis maigme scariosis , anthens cristatis, ovauu glabio — in coloid Capensi (Mnnndt et Mane) Habitus Lamproteos Cor alba, 1 | liu longaB, fere 2 lin lata?. btyl'is ezsertos. Stigma capitatuin. (v. s. c et sp in herb ieg Beiol)

3Sq >. TUCIDA (Salisb ' | c p 337), ramuhs giabriuscuh, foliis erecto-pateuti bns linear-i-tigouis lucidis glabns, bracteis pa mm remotis, sepalis lat* obovatis carinatis glabiis lucidis niargine scanoso-ciliatis, anthens mciso cristatis, ovano glabro — iu raontibus prov Worcester occidentals I¹. lucida Andi heath t. 172 E ngidifolia Wendl cue fasc. 20. IC E. nitem Baitl.¹ in hnnae* ^. p 652 h. Incida G. Don 1. c. p 794 Latnprotis lucida ejusd 1 c p. 811 et Eurylepis ngidifolia ejnsd. 1 c. p 808. Habitus fine vaiietatum mi no rum I* uiguta; Corolla? vix lin earn longae (v. s c et sp)

3jo h LAXA (Andi heath, t 73), ramnhs flexuosis pubeiulis, foliis eicto pateniibusappressisve remotiusculis linear-i-tngonis glabus, flonbus paivissub sessibus , bracteis appressis, sepalis ovatis obtusis v. brevitci acuminatis can natis scanosis coloiatis, anthens oblongis cristatis, ovaiio gLibnusculo —in inontibus prov. Worcester E rigens Baitl. in hnnaeA 7 p 635 Species valde variabibs , foliis remotis approximatisve, sepalis biacteisque majoubus min ribusve, laxis appressisve , an thera rum appendicuh magis imnusvc incisis C01 1 7 lm diametio (v. s c et sp)

Sect. XLVI. POLYCODON.

Inflorescentia ternimalis flonbus tern is Rractae parvae, lemotae. Sepala appressa inargine saepius scatlosa v colorata Corolla paiva late campanulata Antheio. corolla aquanlc v. sdcpius exserta,. btigma teuuc v Mibcapitatuw 1 olia terua Species Capcnsts à Pyronio COIOHJC ioimà diffeniDt, Aisacibus afbnes sed vix cum u's conjougeuda?

*f *Antheris subulato-aristatis**

391. E. DICOLOR (Thunb. diss. n. 5*) non Andr.), ramis pubescentibus, foliis linearibus obtusis glabris v. puberulis subtus sulcatis subapertis, sepalis ovatis obtusis puberulis corollâ dimidio brevioribus, corolla? limbi laciniis latissimis vix brevioribus, antheris subexsertis, ovario pubescente. — in montibus prov. Worcester et Stelleabosch. E. bicolor Wendl. eric. fasc. 21. ic. E. calathiflora Salisb.! 1. c. p. 328. E. concava Lodd.! bot. cab. t. i34. Bot. mag. t. a 149 (errore? inter moticas collocata). E. canalicalata minor Andr. heath, t. 167? Gypsocallis concava G. Don 1. c. p. 809. Gyps Lodigesii ejnsd. 1. c. p. b*3 et Ceramia calathiflora ejusd. 1. c. p. 807. Species hinc Enrystomati, hinc Polycodonibus ceteris affinis. Cor. i-linearis in bra. Stylus exsertus. Stigma parvum capitatum. (v. s. c. et sp.)

'f' T *Antheris muticis* i>. rariiis minutissimè aralstatis.

392. K. CANALICULATA (Andr. heath, t. i56), ramis pubescenti-hirtis, foliis patentibus linearibus subtus sulcatis subapertis, sep. dis la to-ovatis plants vel margine reflexo corollâ a-3-plo brevioribus, corolla; limbo tubo subnequilongo, antheris breviter exsertis.—ad Barbieskraal (Niven). Uabitu E. bicolori affinis. Folia a-liu. Cor. roseo-purpurea in sectione inajuscula 1 | linearis. (v. s. c. et ap.)

393. E. FLORIBUNDA (Lodd.! hot. cab. t. 176. non Wendl.), ramis pubescentibus, foliis erecto-patentibus linearis-carinatis dorso sulcatis obtusis glabriusculis, sepalis oyato-rhoinbeis coloratis glabris corollâ dimidio brevioribus, corolla) limbo tubo duplo longiore, antheris exsertis, ovario glabro.—in prov. George et Uitenhage. E. sparsa Lodd.! bot. cab. t. 1467. E. galiiiflora Bartl.! in linnaea 7. p. 643. E. macrostoma Klotzsch! in herb. reg. Berol. Flores numerosissimi Tix i liu. longi pluride vel intensiis carnei. Stigma tenue v. capitatura. Antherae nigrescentes. (v. s. c. et sp.)

/S. micrantha, floribus vix 1 lin. longis. —in prov. Uilenhage et Albany? (Ecklon et Zeyher, Burchell n. 3549). E. nemorosa Klotzsch! in herb. reg. Berol. (v. s. sp.)

394. E. POLYANTHA (Klotzsch! in herb. reg. Berol.), ramis villosulis, foliis in-curvo-patentibus lineavibus obtusis dorso sulcatis ciliato-hirris, sepalis ovatis pedicellisque piloso-hirris, corollae liaibo tubo suba>quilongo, antheris corollam acqantibus, stylo longè exerto, ovario glabro. — in prov. Uitenhage (Ecklon et Zeyher), ibidem? (Burchell u. 4763). Affinis E. floribunda?. Cor. ferè 1 lin. longa. (v. s. sp. in herb. Burch. et reg. Berol.)

395.? E. BRACHYCENTRA, pusilla, ramulis viscoso-puberulis, foliis parvis squarrosa-patentibus rigidis ovatis plano-convexis margine glandulosi-ciliatis, sepalis ovatis corollâ triplo brevioribus viscoso-puberulis et glandulosi-serratis, corolla? limbo tubo dimidio breviore, antheris exsertis minutissimè aristatis, ovario glabro. — in colonia Capensi. Rami tenues flexuosi rigidali. Folia 1 lin. longa Eremiae parviflorae. Flores breviter pedicellati niubellulati vix linearis longi. Haec species cum sequenti corollae limbo minore Pyrrhio affines sunt, sed ob corollam parvam canipannlatam hinc retuli. Affines etiam E. paniculatae sed antheroe evidenter exsertae et stigma tenue. (v. s. sp. comra. à cl. DC.)

396. E. POLYCODON, ramis pubescenti-hirtis floribundis, foliis erecto-patentibus tenuiter lineari-trigonis glabriusculis, sepalis ovatis tenuiter ciliatis subcoloratis corollâ dimidio brevioribus, corolla; limbo tubo dimidio saltern breviore, antheris breviter exsertis, ovario puberulo.— ad rivulum Hans 'Van Becling propè Camtoo flumen prov. George? (Niven). Frutex sexpedalis. Rami pyramidati numerosissimi. Cor. viz 1 lin. longa. Stylus exsertus stigmate parvo subcapitato. (v. s. sp.)

397- E. STAMINEA. (Andr. heath, t. ig3), ramis pubescentibus, foliis erecto-patentibus lineari-trigonis tennibas glabris, sepalis lanceolatis obtusis carinatis glabris, corollae limbi laciniis ovatis tubo longè exsertis

localis divergentibas.— in coloniū Capensi (Masson ?) *E. thalictriflora* Lodd.! bot. cab. t. 1294* *Gypsocallis staminea* et *Gyps. thalictriflora* G. Don 1. c. > 802. Affinis *E. leucantherae* cucum jungit cl. Klotzsch, at mibi sais distincta videtur. Gracilior cst. Cor. 1-1 7 lin. longa? flavicantes. Stamina demūm recurva corollae coucolores. (v. s. c. et sp.)

398. *K. LEUCANTHERA* (Linn. f. suppl. p. aa3), ramis pubescenti-hirtis, foliis erecto-palentibus squarrosive linearis-trigonis glabris, sepalis ova I is carinatis glabriuscnlis, corollae limbo tubo subaequilongo, antheris suhexsertis loculis appressis, ovario glabro.—in montibus prov. Worcester. *E. spireaeflora* Salisb.! 1. c. p. 350. *Gypsocallis leucamhera* G. Don 1. c. p. 801. Habitus fert *E. floribuadae* sed rigidior. Scpala rigida nitida. Corolla 1 lin. longa alba. Anthers. albae corolla in semper etsi breviter excedentes. Stigma latinscalnm at vix peltatum. (v. s. c? et sp.)

Sect, XLVII. ELYTHOSTEGIA.

Inflorescentia terminalis floribns ternis. Bractae et sepala imbricata paleacea v. carilaginea. Corolla calyce brevior v. pa rūm longior campanulata. Antherae-exsertae v. corollam subsnperantes. Stigma exsertum peltatum v. 4-fidum Folia terna. Habitus Geissostegiae sed antheris breviter lateralibus et stigmate diversa.

399. *E. GTUMJEFLORA* (Klotzsch! in herb. reg. Berol.), foliis erecto-pateutibus linearis-trigonis rigidis glabris, bracteis sepalisque ovato-lanceolatis carinatis corollain aequantibus, antheris exserlis aristatis, ovario glabro, stigmate 4-fido. — in prov. Uienhage. *E. leucosepala* Klotzsch! 1. c. Affinis *E. lasciva?* 1' ores raajores | lin. longi. *E. setula* Klotzsch ! 1. c. forsan diversa erit, srd ex specim. frqctiferis diagnosin certain eruere neqneo. (v. s. sp)

400. *K. LASCIVA* (Salisb.! 1. c. p. 349), ramis pubescentibis, foliis ereclo-patentibus linearis-trigonis rigidis glabris, bracteis sepalisque ovatis carinatis coroilam. Kiibexcedentibus, antheris exsertis muticis, ovario glabro, utigmate peltato v. breviter 4-fido. — in dnnis Capensis. *E. exsulta* hortul. non Bedf. *E. pa-chycépala* Klotzsch! iu herb. reg. Berdl. *Gypsocallis lasciva* G. Don 1. c. p. 803. Similis varietatibus *E. imbricatae* sed antheris et stigmate diversa. (v. s. c. et sp.)

401. *E. DIOSMJEFOLIA* (Salisb.! 1. c. p. 330), foliis squarroso-patentibus latiascnle linearis-trigonis rigidis glabris ciliato-serrulatis, sepalis ovatis carinatis ciliatis corolla brevioribus, antheris sabnlati-aristatis corollam aequantibus v. exsertis, ovario glabro, sligmate peltato. — in prov. Cape et Stellenbosch. *E. serrulata* Bcdf. hort. eric. Wob. p^A i'5. *Eurylein diosmaefolia* G. Don 1. c. p. 809. Raini crassi raraosissimi rigidi. Folia densa 3 lin. longa. Cor. alba i-if lin. longa ovato-campanulata, limbi Incinils tubo pa rūm brevioribas. (v. s. c. et sp.)

Sect, XLVIII. ARSACE Salisb.

Inflorescentia terminalis floribus subternis. Bractras remotae saepiūs pnrvae nonnunquam deiicientes. Sepala corollā breviora basi saepè connata. Corolla parva urceolato-v. globoso-campanulata, limbi laciniis tnbo saepiūs brevioribas. Antberce ioclusse rariūs subexsertae breviter aristatae velmutiae. Stigma capitatum v. saepiūs peltatum. Folia terna. Seclio sat naturalis videtur at diagnosis difficilis. Stigma enim saepissiuē latè peltatum in speciebus noonllis vaiabilc est. Affinitas cum Orophani et Leptodendro mediantibus *E. arborea* et *E. polytrichifolia*, cum Ceramio mediante *E. hispidula* >, cum Polycodone mediante *E. variabili* et species nonnullae inter hac et Philippia v. Bracken til alia media;. Species dnas Europea, extera Capenses.

¶' *Antheris aristatis*. — Europsea; seu borcali Africanae.

40a.? *E. POLYTRICHIFOLIA* (Salisb.! 1. c. p. 3^A9), ramis tomentoso-pubescentibns, foliis subsparsis erecto-patentibus tenuiterliuearibus glabris, sepalis ovatis brevibus glabris, corollā ovato-urceolalā, calyce 4-plō longiore, ovario glabro.,

stigmate capita to — in Europā occidental! mautiinA ad la Teste de Buch prope Brndigalam Endress et in Lusitamā prope Lisboa. E <odonodes Lindl. hot. reg. t 1698. E. lusitanica Rudolph, sec Gay Ann sc. nat. 26. p. 233, Habitus E arboreae. Folia tennioia. Coiolla major a feie 2 lin louga et formā diversa (v s sp)

403 E ARBorEA (LinnJ spec p 5oi), lauiis tonieutosis hirsutisve, foliis snbsparsis patentibus subiectisve lineaibas dor>o subsulcatis glabris pubeiclisve, sepalis ovatis bievibus glabu's, corollā campanulatā calyce 9-J-plo longioro glabi à limbo brevi erecto, ovatio glabro, stigmate capitato vtl peltato —in. Europae austialis legionibus calcaieis nempe in Hispaniā, Galliā austiali, Italiā, Grs>ectaetins mediterraneis etiam in Madera E. aiborea Sibth. et Sm fl. Grace. 4. p 45. t \$5i E taffra Linn. diss. n. 22 non ejnsd. spec, teste Salisb non alior. E scoparia Thuub. diss. n 80 et Linn sp. ex parte teste Salisb. E. piocera Salisb. !1. c. p. 328 non Wendl. Frutex oiyah*, mterdura i5-2o-pedalis. Rami iloiferi racemoso-pamculati floribmidi Calyx et corolla magnitudine et proportione variabilis, sed coi constanter campanulata videtur, 1-1 ½ lin. longa et stigma saepissime peltatum ranus capitdtum (v s. 4* et sp.)

404. E ACROPHYA (Fiesen. in florA i838, p 604), lamis hiisatis, foliis temislinearibus obtusiusouhs sabtus sulcatis maigiue glanduloso-scabiuiscnlis, floribus congestis breviter peduncnlatis, calyce 4-fldo dimidium feic coioll.x aequante, lacimis o\atis aculis apice cauinatis margine ciholatis, coiolhs bievibns campanulatis glabris laciniis obtuse, antberis inclusis subgloboso-ovatis setaceo-aristalis, stylo exerto.—in Abyssinia (Ruppell). Caulis 12-pedalis Differt teste Fresenio ab E arborea; cni a HED is snlco fohorom mintus proiundo , calycis et corollae proportione, bracteis niagu approximatis et antbeis — An tamen E. arboreae var.'

'F 'J' Antkeris aristatis (aristce scepiis minutissime)—Capenaes.

405. E SETACEA (Andr. beath. t. 87), raraulis pubescentibus, folus incurvo-patentibns linearibus obtusisdorso snlcatis margine et snprā aspens v. longè ci-hatis, sepalis brevibas obtnsis ciliatis, corollā urceolato-campanulatā glabrā v. pubeiula limbo brevi erecto-patente, anthens inclusis bievissime aristatis, ovano pbescente, stigmate subpeltato — in montibns prov. Worcester et Stellenboscb E. asperifolia Salisb.! 1. c. p. 324 Rami rigidi toituosi. Floies numerosi fere varietatam parvifloiaram E. arboreae. Coi. albida v. carnea vix x lin. longa (v. s. sp.)

406 E VARIABILIS (Klotzsch'in herb reg. Berol),ramis puberulis, foliis brevibns oblongis aspero-hirtis doiso snlcatis, sepalis lanceolatis obtusis bieviter ciliatis, coi oil'a obovoided v. demū late campanulatā glabrd limbo tubo parùni breviore, antberis inclosis vel subexseitis tenmssimē aristatis, stigmate capitato, ovario pnberolo —in montibns prov austio occidenTalium E. holocalycina et E cnmnata Klotzsch' I. c. Yix non varietas parviflora E. setaceae. Foimae numerosse inter se proportione foliorom sepalornm et corolloe diversae vix tamen diagnosi distinguends. Flores saepius |-| lin. longi. (v. s. sp*)

407. E. INCOMIA (Klotzsch' in herb. reg. Berol.), lamulis hirsutis, foliis inenryo-patentibus breibus obtasis ciassiasculis dorso sulcatis glandnloso hirtij., floribus congestis, sepalis lanceolato-ovatis viscosis ciliatis, coiollā carapanulatā glabrā, antheris inclusis aristis brevissimis, stigmate peltato — ad Ehtndsrivier prov. Uitenhage (Ecklon et Zeyher). Habitus feie E paniculatae Coi. vix lineam longa. Ab E variabili pubescentiā visrosā differt. (v. s. sp in herb, teg Berol }

408. E. PAWICULATA (Linn.¹ spec. p. 5o8 non Thunb. nee hortul), humilisras-mosissima, ramulis pubescentibus, foliis hneaii-tngonis erecto-patentibus im-bncatis glabnsculis, sepalis lanceolatis cannatis glabiis, corollā c.impanulatā calycem vix excede hmo bievi, antheris coiollam aequantibus lenuitei aristatis, stigmate latiuscole capitato. — in siccis montiura prov Stellenbosch anstrahons. E. millefloia Berg.' pi Cap. p 96. Salisb.! 1. c. p. 3nfo E. sodahs Klotzsch ' in pi. Drege Gypsocallis pamculata G.Don 1. c p.8o3 R>im dcust fastigJatO'pamculatiiloibnndi Flores vix | lin. longi. (v. s sp)

409. E SAIAX (Sahib ' I c p 336), ramosissiraa, foliis pa ten ti bus imbucatis lneaii-tngouis crassiuhcuh glabiis lucidis, sepalis ovatis corollā globoso-cara-panulatā brevioiibns, antheris iuclusis anstatis, ovano glabuuscalo, stigmate raagno peltato. — in rupibus umbiosis piov Stellenbosch anstialis. R.uni fastigiali flonbondi. Folia feie E. lucidae Cor 7 lin diametio limbi launus tubo vix breviobus (v s sp)

111 -dnthens muticis.— Capenses.

/jio E. HISPIDILLA (Linn ' spec p iG^a), ramis pubescenti-hntis folus mcnivo-patentibus ovatis lanceoldtis linearibusve dot so sultatis v. apertis scabio-biitis glabiatisve, sep.ilis hnean lanceolatis subovatisve , <*oilhs apertis globoso-campanulatis calyce dimidio v subdnplo longionbns, limbo tubo brevioie, antbens inclnsis v. corollam bubaequantibus ovatis, ovano glabro v puberolo ati^mate capitato v. peltato. — in prov austio-occidenlahbus fieqnens. E hispulula Wendl. eric fasc ai. ic F absimhooides Linn niant. p 6b E hispida Ihunb diss. n 20 E. virgata ejnsd 1 c n 18. Wendl. eiic fasc. i5 ic. E viigulaii Salish ' 1 c p S24 L colleter Spi ' syst. 2 p. igs F approximata Schl. ex Spreng.' syst 2. p rg6. E serrata Thunb. fl. Cap p 346 * E vugala, E dbsinthoidet* et hispidula G Don 1 c p 798 ct Ceraraia serpylifolia ejusd. 1. c p 807 Species valde vanabilis. Foimae sequentes inteiraedns nuineiosis conjunct a?, ippsse valiant folijj* hispidis glabrisve , sepalis longioibus brevioribus, corolbs viscosis siccisve , ovano glabio vel pubeiulo.

et. *serpylifoha*, foliis utnnque glabriuscnlis v suprà bispidis plcnsqne explanatis, flonbus cnca f lin diametro. V. *seipyllifolia* Andr heath t. 289 Lodd' bot cab t. 744 (v s c et sp)

(i *crassifoha*, foliis subtus albo-tomentosis plei isqne explanalis, corollis viscidis E. cordatae similis habitn E. aiachnoidea Klotzsch ' (v. s sp)

y. *hispida*, foliis plerisque levoluto teietibus hispidis, corollw var. ct. (v. s sp.)

«T *micrantha*, foliis vauis, flonbus vix | lin. diametro. E ininuta Klotzsch' (v s. sp)

s *fohacea*, foliis aspero-hispidissirais, brae tea una alterave sepalisque subfoliareis E. foliacea Klotzsch ' non Andr —E. gaboides Klotzsch ' non Lam huic etiam simillima (v. s sp)

4n.? E MINUTISSIMA. (Klotzsch ' in herb reg Berol.), pusilla ramosissima, fohis erecto-patentibus parvis lineanbos obtusis glabriusculis, sepalis ovalis linea-acumiudtis toiollā campanulatā semiqnadnfidā parum bievioribus, antbeus niuticis? capsulā glabrā, sligmate diJ.itato —in montibns Hottentots Holland (Eckl et Zeyhei) Specim fructiferum antheris fere omnibus jám delap&is. Flores vix j bo. diaraetro f (v s. sp. in herb reg Berol)

/ira. E. PELTATA (Andr. heath t. 979\ ramubs canescentibus, fohis erectis patentibusve linean-tngonis obtusis glabnusculis, bractea nnā alteràe calyci dppioximatā, sepalis parum insequalibus, coiollā globoso campanulatā calyce diinidio v. sub duplo longioie, filamenti&planii hbens, antheis brevitei exseitis, stigmate mdgno peltato —in prov. austro occidentalibus. E Actaea Link enum^hort. Beiol. p 371 E exseita Bedf hort Wob. p 9. Gypsocallij, Actaea G Don 1 c p. Hoa et Gyps peltata ejusd 1 c p. 803 Speues inter Encain et Philippiam media et forsani enm sequentibus ad hanc amandanda. Bractea? tamen saepe adsunt et calyx |x iirregujaris Cor Hneam longa palhde cinea (v s c et sp)

413 E TRIS TIS(Baitl ' mlinna? a7 p 643), ramuliscanescentibus, fohis appressis brevibus obtusis crassis glabriusculis, biacteis ad basin pedicelli subternis, sepalis ina? qualibus tribus subconnatis, corollā globoso-campaiuIaU clabiA calyce parum longiore, filaraentis bievissimis pianis nujmbianaceis, anLhcub inclusis, stigmate latè peltato — in montibus prov. Stellenbosch austr. AffinishincE. peltatai hinc Philippic Chamissoiis Moics e\ sicco intense toloiat iognit.idue Philippia: fhnmibsonis Uiacltac Lnex. Calyx Phihppia?. (v 4 sp)

414. E. UNIBRACTEATA (K-lotzsch ' in heib reg Brol), glabtiuscala, foliis appressis brevibus obtusis ciassis, biacteâ unâ sub calyce, sepalis subaequalibns basi connatis, coiollâ globoso-campanulatâ glabiâ calyce parum longiore, filamentis bievissimis latiusculis, aniberia inclusis, stigmate late peltato — in monte Katrivier Caffiorum (Ecklon et Zeyhei) & tristisiinilliina Flores m'mores (v. s. sp. in berb reg. Berol)

Sect. XLIX. CHLOROCODON.

Inflorescentiâ laterahs, floribas pedicelutis secus raraos raeemosis Bractese tres remotae. Sepala corollâ breviora basi saepe connata Coiolla parva globoso-campanulata Anthers inclosse muticae Ovanuiu glabium Stigma peltatum l'oba terna. Seclio ab Aisace nonmsi inflorescentiâ differt.

415. E. SCOPARIA (Linn ' spec p. 501 ex paite non Thunb), glabra, folus linearibus crassiusculis, sepalis basi v. feie ad medium < onnatis, corolla; hmbi lacinitis tnbo subaequilongis. — in Europâ aastro-occidentali, in Galliâ australi et occidental], Coisicâ, Sardinâ, Hispaniâ, Lusitamâ et in ins Maderi E fucata Thunb diss n. 9 Wendl. eic. fasc i5. ic E virgulata ejusd. fasc 21 ic Rami sxpmis incani sed glabu Folia rigida 2-4-lin Flo res numerou heibacei 1 lin. diametro v paulo mmores. Diagnosis hnjs spenei et F. coarctatae confusa, forsitan piures latent species tarn Europea quam Capenses, vel onines nnius vaiiitates? (v. s. c. et sp)

? *parviflora*^ stigmatelongeexerto. In Lusitamâ et inias Azoricis (v s sp)

416. E COIICITATA (Wendl eric, fasc 19 ic), ramis virgatis glabnuscalis, toliis erecto patentibus luieaubus glabris, pedioellis bievibus, sepalis lanceolatis fere à basi hberis, coiolls limbi lacinus tubo parum brevioibns. — in coloniâ Capensi. E axillans Soland.' in berb Banks an Thuub ? h minuteflora Andr. heath, t. 270? E. brcvipes Bartl in limnaea 7 p 643 Floiesnu-xnerosi vix 1 lin long! — h axillaris Ihnnb , fide specim à cl Klotzsch viso, ad Salaxidem dxillarempeitinel sed descr Fl cap p 345 (ncc forsian diagnosis) potius hanc speuem refeit. (v. s. c. et sp)

/2 ? *longipes*, pedicellis longionbus, anheis exserlis, stigmate subaiquali. Ad Elands Kloof piov. iJitenbage (Ecklon\ E longipes Baitl in linndeâ 7 p 643 non Klotzsch Hanc stupem non vidi, a Klotzchio tamen non admissa et praecedenti ex diagnosi afflms est.

J Species dubm.

- 417 E PILIFERA. (Thunb. fl. cap p. 350 non Klotzsch), decumbens, foliis termis imbucaitis tnponis sulcatis muciuatis seu apice pibfens glabris, floubus bubternis glibns, bracteis plarihus, coiolla' oblong 1, anthens exsertis routicis

- 413 E. CADUCA (Thunb fl cap p 356), glabra decumbens, ramis filiformibus llexuosis, foliis 4-nis patentibus lanceolatis, floibus caducis, corollis cylindricis — in sumnio Monte Tabulari lolia unguicnlana. Cor. albidae

- 419 E. TROTRUDENS (Link enum hoit Berol 1 p 87^), foliis 4-nis patulis spaise pilosis, floribus terminabbus umbellatis, biactis remotis, sepalis ovatis, coiollâ ovata, anthens subexsertis muticis, stylo exserto — Hab... . sepalia albentia Cor. alba 2-3-liu. An ad sect Pyronimm lefeienda?

420. F. cistifOTiA (Link eunm hort. Berol. p 369^, foliis 4-nis snblüs canaliculatis nndique pilis glandalosis tectis, floribus terminalibus capitatis peduncuhs (3-lin.) hirtis, bracteis nllis(?), sepalis hirtis apice vuidibus coroll duplo brevionbus, coiollâ (2 lin.) globosa albâ, antheis inclusis anstatis, stylo inclusio. — Hab .. . Gypsocallis cistifolia G. Don 1 c p 804 A° Ephcbus E barbata aff '

421. E FLEXTCAULIS (Dryand in hort. kew ed. a v. 2. p 3g5) foliis quaternis patentibus linear-i-convexis apice glanduloso-cihatis, floribus umbellatis teinii naliibus, bracteis paivis dnabus approximate, sepalis ovatis oblongisve bievibus maequahbus glaudnloso-cihatis , corolla ovato-niceolaiâ glabrâ? nitidâ, antheis inclusis muticis. — Hab... . E glandulosa Andr. heath, t 115 non Thunb.

Omnia videntnr Orophams nisi antbeiae muicse Inter Nivenianas null a hm^{*} affinem vidi nisi E. aimatam Kl cui taraen anthers coiollara aequantes et corolla pubescens.

4aa F CINLRASCEMS (Willd. ennm. hort. Berol. suppl. p. ai), folns ciliatis cauleque hirtis, floibus teiminahbs umbellatis, corollis ovatis, anthers mclusis aristatiN — Hab.. .

423 E. LACHUEOIDES (G. Don 1 c. p 795), foliis term's patentibus densis linea- nbns obtusis tomentoso-fannaceis, flonbcs terminalibus term's brevissirae pe- uicellatis, bracteis appresAii sepaloides, sepals ovatis obtusis corollâ plunes brevioibus, corollâ urceolato-cyhndraceâ (3 lin."*) pmpureo-pulverulenta, limbo brevi, antheris mclusis cnstatis.— Hab. . . E. lachnaea puipnrea Andr. heath t. 170. An Eurystegia E. pumilae affinis?

424 E wIEWs (Bedf. hort. eric Wob p 16 non Bartl.), foliis 4-nis pilosis, flonbns terroinalibus, bracteis snbrem6ti&, sepahs coloratis pilosis, corollas tubo cur\ato subclavato , antheris subexsertis aristatis.— Hab. . . Syringodea mtens G. Don 1. c. p. 82^ C01. basi rubra apice flava. An E Uhriae v E. speciosee var.P — in tabulâ systematic[^] operis citatae omissa.

425 E ADENOPHORA (Spreng syst. a. p 188), foliis terms lineoii oblongis maiginc revolatij* glanduloso-hibpidis patulis remotiusculis, floribus termina- libus aggiegatis glabiis, calycibus viscidis coloratis appressis, corollâ ovato- subgiobosa ore contiacto limbo patulo, antheri* mclnsis appendicnlatis, stylo exserto.— ad piom. B Spei.

4a6. F TEUCRIIFOLIA (Spreng syst. 2. p 189), foliis term's lauceolatis villo- biusculis subtus albidis patentissimis, floribns axillaribus cymosis, calye an- gusto patnlo, corollâ ovato-subglobosa' 01 e contrncto limbo patulo, genilalibus inclosis, antheiis appendiculatis.—ad prom B. SpeL Ceramia teucrifolia G. Don 1. c. p 807.

4^7. E. A THANES (Spreng. syst. a p. 19^)1 ramis hirsntis, foliis oppositis alter- nisque lineari-tiigoms obtnsinscolis scabris , floibus axillaribus terminalibns- quo, coiollâ cawpannlitâ, genitahbos intlusis, antheris muliris!—ad prom. B. Spei. Laiuprotos apbanes G. Don 1. c. p bia.

428. E sm^RANTHA (Spreng syst. cnr. post, p i46)> foliis terms linearibns obtnsis erectis glabns, ramis villosis, floribus snbcorymbosis tetminahbus, calycibus cihatU, coiollis globosis, genitalibus mclusis, antheris muticis. — ad Prom. Bonae-Spei.

429 E. APPRESSA (Spreng. syst. cur. post p. i4(>), foliis ternis minutis snbellip- tici& obtusis incano-pubescentibus arete appressis, floribus teimnalibus aggre- gatis, 1 alycibns lanatis , corollas pubescentis campanulatx limbo contracto, antheris inclusis muticis, stylo exerto. — ad Prom Bonae-Spei.

+ -|- Species exclusce.

E ARCTICA Waitz. = Phyllodoce taxifoha.

E ARTKMisiomES E Mpy. = Salaxis ai temisioides

E ARTIOULATA Thunb. = Syndesmanthus articulates.

t. ASIATICA Waitz =Cassiope eiicoides.

E AXILLARIS Thunb. = Salaxis axillans.

E BARBIGERA Salib z= Blaeia levoluta.

E BtFRiA Thunb. = BU-eiia encoides.

E BRUCKENTHA2.II Spreng. = Bruckenhalia spicnliflora.

F BRYANTBA Thunb. = Biyanthus Gmelini.

E CILICIIFLORA Salisb = Giisebachia velleiifloia.

F. CJERULEA Willd. = Phyllodace laxifoha.

E DABJECZA Linn.. = Dabaecia polifoha.

- E. DUMOSA Sali*b = BLetia puiputea.
 E. EMBOJPERA Salisb. = bimocheiluN depiessu&.
 E. EQUISETIFOLIV Sahsb. r= Bkena purpurea.
 E. ExiLib Salisb. rz Syndeamaniiis scuber,
 E. EXPKOMIA Spreng = Snuocbeilu* depresses
 E. FASCCULAIA Thunb = Syndesmanthus fasciculatus
 E. FEROX. Salisb. = Ereuria Bartiingiana.
 E. FLOSCULOSA SalNb. = Synde&inantruH paucifolius.
 E. CATIOIDES Lara. = Phihppia galiooides.
 E. GrABELLA Thunb. = Siiuocheilas glabellus.
 E. GLAURA Thunb. = Simocbeilus glabei.
 E. HIRSUTA Tbunb. =: Aciostemon hirsolus v. Grisebachia hispida
 E. LADXALIS Salibb. = Sympie/a capitellata.
 E. LYcoroDioiDFs Waitz. = Cassiope lyropodioides
 E. NODIFLORA Salisb. = Gnsebachia plamosa.
 E. NOTABILIS WendL = Eiemia tabercularis.
 E. ORBICULARIS Lodd. = Blaena ericoides.
 E. PALEACEA Salisb. = Synde&manlhus aiticolatus
 E. PANICDLATA Thuub. = Simocheilns obovatus.
 E. PECTIWATA Bartl. = Eremia totta.
 E. PLUMOSA Thunb. = Grisebathia ciliaris.
 E. pumpuREA Thunb = Blaena parpurea.
 E. PUSXLLA Thunb. = BUlia pusilla.
 E. SICDLA Gui,s. zz Pentapera sicula.
 E. SPICDLZPLOBA Saliib. =: Bruckenthalia spiculifloia
 E. STELLERIANA Willd. = Cassiope Stelleriana.
 E. TOTTA Bartl. = Eremia Bartlingiana.
 E. TOTTA Thnnb. = Eremia totta.
 E. TUBERCULARrs Salrsb. = Eremia luberculaiis.
 E. VULGARIS Linn = Calluna vnlgaris.
 E. XERA.NTHEMIFOT.TA. Sahsb. = Eremia lanata

XXL BRUCKENTHALIA Rchb.fl. germ. exc. p. 414.

Calyx subequalis 4-fidus. Corolla subgloboso-campanulata 4-fida. Stam. 8. Filamenta basi brevissimè subconnata. Antberaj per nnthesin liberae muticae. Stylus exsertus. Stigma capitato-truncatum. Ovariun quadriloculare locuiis pluri-ovulatis. Capsula 4-loculans loculicidè 4-valvis. — Fruticulus Europaeus ericoideus. Folia 3-5-natim verticillata v. sparsa. Flores in racemulis terminalibus dispositi verticilla u pedicellati. Bractea3 Dullae. Genus vix ac ne vix ab Ericâ distinc-tum, Dec à Philippiæharaeteribus essentialibus separatum,

- i. B. 8PiruLiFi.ORA(Reichb'l.c) Inalpibus Trausylvaniae, Rumelia3(Fiivald»ky), Gra?ciae (Sibthoip). Eiica spiculifloia Salib.! Hans. soc. linn Lond. v. 6. p 324 Siblh. etSm. fl. graec. 4 p. 47. t. 353. Menziesia Bruckenhalii Baumg. fl. transylv. 1 p. 333 Erica Bruckenthalii Spieng neu entd. 1. p. 271 Reichb. iconogr eur. a. p. 60. t. 169. Ramuli pubemli Folia 2-3 lin. palentia apice snbeihata. C01. 1 lin. longa. Adhaarentia filamenlorum bievissima et VJX couspicua. Stylos corollA duplo longior (v s. sp.)

**XXII PHILIPPPIA hlotzschm linnaea § p 554 — Sahxidissp WiUd — Philip-
pn et Eleuherostemon Klotzsch in hnned 12 p 213 et 219**

Calyx 4-fadus v 4-partitus, lacunā v. sepalō nitero majoie, s-cpius
lcvoluto Corolla paiva siibglobosa , limbo Drcvitei 4-hdo Stamina 8.
I llamenta connata v hbera Anthers pei antbesin connalac v. arete
appioximaldc mutica? Stylus s>ubpeisistens, stigmate ina^no peltato.
O\uum 4-loculare loculis plm 1-ovuJatis Capsula loculicide 4-valvis.
— Fruticuli Capenses Mauntiam vel Madagascanenses ei icoide* JTolia
3-6-natim verticillata Floresparvi ad apices ramuloiurn teinipluiesve
umbeJJati lanus se^siles subcapitati Braccae nulJa? Stylus saupius ex-
sei tus. Genus vix ac ne vix ab An>ace sectione Encae distinctum

Sect 1 EUPHILIPPIA.—Phihppia Klotzsch in hnnad 12.p 213.

Antherae vel filamenta plus imnusve connatae

* *Filamenta et anthera; arete connata*

- 1 P LEEANA. (Klotzsch'1 c), folns terms squarioso-pjtentibas ramuhsqae
glanduloso hispidis, flonbus bievitei pediLellalis, calycibus 4-hdit,, lacimis
ovatis coi oil a glibia pdiura bievioubus, stylo longe exseito — in inontibns
Hotteniors HolUud et Gnadeathal prov Swellendam ocud I olia crassiustula
iubtngona obtusa 1-1 | lin Cor vix | lin* diametio. Stylus feie Imeaiu Ion-
gas (v s. sp)
- 2 P CHAMHSONIS (Klotzsch' m linnaea 0 p 356), lanmlis minnte puberulis
glabiis, foliis 3 nis adpre&sis brevibus obtasis gl ibru. maigiae vix glandulo
sis, calycibas 4 *tidn>* laciaus ovatis nadis corolla glabia parum brevionbas,
stylo bievjter exserto — 1a col'ibns prov Cape coinniums I olia cras&iuscula
sabtugona vix hneam longa, in ramuliji iinbrnata I lores subterm | IIQ. dia
metio Stylus vix exseitus (v s. sp.)
- 3 P CILIATA , ramulis pabescentibus, folns 4 *nis* incurvo-erettis oblonco-
lineanbus glabnusculu. margine ciliatis, (onbus subsessilibas, calycibus^4-
Cdislauniisovatij.cjliati4 toiolla glabra dimidio bievioubus, stigmate vix ex-
seito — in Madagascar!! Ramiciassinscuh toha 1 1^ hn in riiiuJij, octo-
fariam imbiicata Cor 1 IJD diametio (l s sp in betb Hookei cl DC)
- 4 P? DKWSA, lamuhs craswusrulis albidis, fohis terms mcurvo eieclfc oblongo-
lanceolHlis glabuusculu. nudis, flonbus .—in Madagascana (Bojer) Salaxis
densa Bojei' mss Piactedenti simihs Folia ngida 1 / hn sexfanam iiubricata
(v s Jp sine fl m herb DC)
- 5 P MONTANA (Klotzst in hnnaea 9 p 359), lamuhs glabnusculis, folus
terms hnean-tngonieiectis glabris nitidis, flonbus breviler pedicellatis t tdlly-
CII. lacimis &uperioribns corolla glabia paium brevionbus, ^tlgnate vix oxserto.
— in IDS Mauiitu et Boiboniae Ranii ngiduh Folia 1-1 J lin. I loies parum
minorcs qudin m P ciliata majores quam ill catena speciebus (v s sp m
herb DC)
- 6 P GOODOTIWA (Klotzsch in linnaea 9 p 355), lamnlisglabiis, folus teinia
patentibus anguste lmeaubus gldbns, floiibai pedicellatis, calycibus profunde
4-fidis, lacima lorfma corolla glabra longioie auperioribus brevionbus, stylo
exserto — in Madagascanea piov Eimrna Iraamou et Beltasunene [Wodt]
lol 2 4 1>n J>ubtngona Tloies subteim magrutudine P Leeans- 'Antheias
apice glandulosae (v s sp in heib Hooker et DC ^
- 7 P PARVIFLORA, ramuhs tenuibon albidis glabuuscuhs, folus teims anguste
hneanbus appressis, flonbus breviter pedicellatis, calyribus profunde 4-hdii
lacmiis lato-ovatis corolla glabia paium bievioubus, **styl** breviter exseito —
m Madagascar^ (Lyall) Ramuli numerosi virgati kol vix lineaū flore*
minimi numerosissimi (v s sp in herb Hooker)

4. B. run PURE A (Linn ill suppl. p 117), foliis term's breibus appiessis raraulisquc glabiis, sepalis o\atis aculis basi subconnatis, coiollis longiuscnle subUKcalato-campanulatis calyce 4-5-plo longionbus, limbo erecto patente laci-niis nitegeiriinis, antheris subexsenis.— in montibus prov. anstio-occidenta* Hum fieqaens. Enca purpaiea Ihunb. fl cap. p. 356 excl syn et diagnosi Linnaei. Enca durnosa Salisb.' trans, soc. linn Lond. 6. p 3/£i exrl. syn. Blacria dumosa Wendl. collect 7. p. 1 j. t. 38. Bl. jacunda Rchb. in Sieber' fl cap. exs. fciioa equisetifolia Salisb '1. c p. 342. Blaeia cquisetifolia G. Don gen. syst. 3. p. 8o£ Species humilis fastigiata iloribunda. Flores mnbellati. Cor. I7-1 5-lin. lougae carneae v purpuieae (v. s.sp.)
5. B CAMPAIRurATt, folils terms adpiessis ramubsque glabris, sepalis ovatis acutis basi uubconnatis, corollà carapanlatà calyre a-3-plo longiore, limbo erecto lacimis breMssinie flinbnatis, antheris coiollam snbaeqnantibns — in colonij Capensi (Drege, Burchell n 7693, 7773), etc B glabella Drege pi exs. non Willd. A piaecedente satis distmcta videtur coiollà breviore latioie apirc ne-quidquam contract^ . (v. s. sp)

I 'l' *Antheris muticis.*

6. B. FIEXUOSA, glibia, ramulis filiformibns, folhs oppositis adpressis, sepalis linearibub crassls, coiollis mceolato-campanulatis angolatis calyce plus duplo longionbns, antheris subinclusis, stigmate obtaso. — ad flamen Steenbrass prov Stellenbosch (Niven). Fruticulus ramosissimns ramis tortuosih. Cor. | lin. longa. (v s sp comm. a cl Lambert et inheib DC.)
7. B. PUSILLA (Klotzsch^T in hnnacå 8 p. 657, ^{n o n} Linn), ramulis pnberuhs , foliis terniit &ubeiectis hibpiduhh glabiatisve , sepalis basi connatis ciliatis, coiollà campanulatà calyce duplo longiore limbo patente , anther is exsertis, stigmate longe exseitopdtato.—in colonia Capensi (Lichtenstein). Enca pusilla Ihunb. fl. cap p. 347' excl. syn Rami virgati. Cor { lin. longa. ttlania pusilla Linnaei est species valde dubia, nee e speciraine defloiatu in heibario suo ser-vato recognoscenda ; a Salisburio ad Simocheilam glabellum refertur. (v s. sp. in herb. reg. Berol.)

Sect. 11. PYCNOBLJEKIA.

Flores dense capitati Bracteje calyci approximate. Antherae mnticae.

- S. B. nEvoT.TUA (Bartl. in hnna3å 7. p '050), foliis 4-nis linearibus patentibns 1-axnnlisquc longe pilosis viscosis, biacteis snbulatis longr cihatis calyce duplo longionbus, sepalis linearibus margine glandnlosis , corollà urceolato-campa-nlatà limbo re\ oluto-patente, antheris exsertis — in montib. prov. Swellen-dam occid. (Ecklon et Zeyher). Erica barbigeia Salisb. trans, soc. loud 6. p. 341. Risen* barbigera G.Don 1. c. p. 8o5 Rami dense foliosi. Fol. a-3-lin Corollas membianaceae viscosissimae feie 3 lin. longae. (v. s. sp. comm. a cl. Ward et in herb, reg Beiol)
9. B. ERICOIDES (Linn ' sp. p 162), ramnlis pnbescentibus , foliis 4-nis linearibus appressis patentibus\ e hirsntis, bracleis sepalisque subaequahbus pilosis, corollà oblongo-urceolatà limbo erectopatente, antheris exsertis. — in montibus circå Cape Town. Erica Blacia Thnnh. fl cap. p 358. E orbicular is Lodd. bot cab. t. i53 Blaeia fasciculata Sieb ' pi exs. Bl scabra Drege ' pi. exs. Flores i-lin. longi prnpurascentes vel pallide rubri. (v. s c et sp.)

J Species exclusce.

- B. ARTICUI AIA Linn x= Syndesmanlhus articalatns.
- B. BicoLon Klotzsch = Sinocheilus bicolor.
- B. BRACTCATA Willd. = Sympieza capitellata
- B. BBU*I/P»OIIA. Don. = Erica brumaefolia.
- B. CARNEA Klotzsch = Sinocheilus carneus
- J. CILIARIS Linn = Gusebachia ciliaris.

- B. CILICIFLORA Don. = *Grisebachia velleriflora*.
- B. DEPRESSA. Licht. = *Simocbeilus depressas*.
- B. DEPRESSA Drege. = *Syropieza Knuthii*.
- B. PASCXULATA Willd. = *Syndesmanthus fasciculatus*.
- B. PLOSCULOSA Don. = *Syndesmanthus paucifolius*.
- B. GLABELLA Wendl. = *Siraocheilus glabellus*.
- B. IHCAWA Bartl. = *Grisebachia incana*.
- B. MULTIFLORA Kl. = *Simocheilus multiflorus*.
- B. HUSCOSA Ait. = *Scypbogyne inconspicua*.
- B. IODIPLOURA Don. = *Grisebachia plumosa*.
- B. PARVIPTORA Kl. = *Codonanthemum parviflorum*.
- B. PAUCIPLORA Don. = *Syndesraanthus paucifolius*.
- B. ^AUCIFOLIA Wendl. = *Syndesraanthus paucifolius*.
- B. PTILOTA Drege. = *Grisebachia bispida*.
- B. PUBERULA Kl. = *Codonanthemum pubernum*.
- B. PURPUREA Berg, rr *Simocbeilus glabellus*.
- B. PDSILLA Linn. = *Simocbeilus glabellus* ?
- B. SCADRA Willd. = *Syndesmanthus sealer*.
- B. THUWBERGII Don. = *Grisebachia ciliaris*
- B. TURMALIS Don. = *Erica turmalis*.
- B. XERMHTEMIFOLIA Don. = *Eremialauata*.

Subtribus IT. SALAXIDEM.

Ovarinm i-4-loculare, loculis i-ovulatis.

XXV. EREMIA D. Don Edinb. phil.journ.

Calyx profundè 4-Hdus v. 4-parlitus scqualis. Corolla urceolato-campanulata v. subclobosa, limbo 4-Hdo erecto-connivent v. patente. Stamnitia 6-8 rariisS, ovarium a-4-loculnre, loculis uniovulatis. Stigma obtusum tenue v. capillatum. Capsula i-4'''ociilaris, i-4-sperma , locu* liciè dehiscens v. (teste Klotzschio) septicida. — Fruticuli Capenses ericoidei. Folia 3-4-natim vrticillata , sa3piis squarrosa et hispida. Flores termiuales glomerato-capitati v. umbelJulati. Bractete 3.

Sect. 1. EREMIASTRA. —*Eremia Klotzsch in linnasd* 12. p. 218.

Ovarinm sessile 4-locnlare. Folia terna. Bract^ae approxiraata?. Habitns Ericainm. sect. Pseuderemia?.

*• E. TOTTA (D. Don 1. c.), foliis linearibus patentissimis subinenrvia ciliato-bispidis, calycis tetragoni laciniis lato-ovatis ciliatis, corolla quadrangulari-conica, antheris inclnsis, stigmate inclusio, ovario hirsute — in raontibns prov. Worcester. Erica Totta Tbnnb.diss. n. 17. Erica pectinata Bard. inlinnaea 7. p. 647 non alior. Folia a-lin. Flores a-Hn. Corolla calye pa rùm longior angulis valde prominentibñs. (v. s. sp.)

2. E. BARTLINGIANA (Klotzsch! in linnæa 12. p. 218), foliis linearibus patentissimis incurvis ciliato-bispidis, calycis campanulati laciniis lato-ovatis, corolla angustè urceolata, antheris inclinis muticis, stigmate exerto, ovario glabro. — in raontibns prov. Worcester et Stellenbosch. E. Totta Bartl. inlinn& n p' 647 non Tbunb. E. ferox' Salisb. tram. soc. linn. Lond. 6. p. 324. Pnicedentí babitn simillima, florum forma disinctissima. (v. s. sp.)

Sect. II. PODEREMIA.

Ovarinm longè stipitatnm 4-loculare. Folia terna. Bractea; reraotai. Habitns ere Erylomatam parviflorornra, qnibnscum aff^ntas maxima.

3. £ TUBERCULAR is, folns oblongo-lineatibus brevissimis appressis glabris mar-
gine cartilagineo-serrulatis, floribns subtnbellatis, sepabs lanceolato-linearibus parvis, corollā subglobotā resinoso-verrucosā, limbo nunimo, antberis moticis inrlusis — in montibus piov Siellenbosch austrnrioris et Swellendam occidentalis Erica tuberculaiis Sali&b ' 1 c. p 3io. Erica notabilis Wendl ' in Spreng. syst a. p 184. Eica tuberculans et Euryloma notabilis G. Don gard. syst p 798 et 816 Folia 2 v. vix 1 lia. longa. Corolla 1 1/2 lin. siccitate verru-
cosa Stipes ovarn 7 lin. longus. Erica tnchroma ab bac specie non diffeit nisi
corollā daplo saltern longioie rt ovarii loculis biovulatia (v. a. sp.)

Sect. III. MICREREMIA.

Stamina saepius otto. Ovanum biloculare. Biactae approximate.

- 4 E BREVIFOLIA , foliis 4-ms p. intentissimis incorvis ovali-oblongis brevibns mar-
gme levolutis cihato-bupidis, calycis lacimi oblongo spatbulatis coiollam sub-
globoso - campanula tain aequantibus, antbeiit sujbinclusis muticis bispidis ,
ovano hirsuo —in Attaquaskloof prov George (Masson). Folia vix lineam
longa. Capitula 3-4-flora ceinua 1<lores 4 lin diametro. (v. s. comm. à cl. DC.
«t Lee.)
5. E. PARVIFLORA (Klotzsch' in linnaeā ra. p. 4Q8), foliis terms sqillianoso-patentibus
sabfasciculatis parvis ugidis bieviter hispidis, calycis lacimis obovatis coiolla
subglobosā aium breviobus, antberis inclusis aristatis, ovano bispido. —in
montibua piov. Worcester (Niven), ad Kodinianskloof(Ecklon ei Zeybc). (v.
a. c et sp)
- G. E RECURVATA (Klotzsch' inlinnaeā 1a p. 498), foliis teimspatentmimis sqnar-
ioso-reflexiH ovato-lanceolati* ciliato-binpidis , calyns laciniis lineaii-oblongis
cihato-hispidis, co roll is tnbulo campanulas, anthens irulusii aristatis —
in niontibus Cederbergen (Diege) Species foliis sqaai rosissi in is distinctissima
G01. subtetragonx calyce daplo longioies. Stamina uounouquam 6-7 vidi. (v
ft. sp.)

Sect IV. HEXASTEMON.—Hexastemon Klotzsch inlinnccd 12 p. 220.

Stamina saepius sex. Ovarinm sessile biloculare. Bractex approximatas. *

7. E. LANATI, foliis ternis incurvo patentibus late linearibns dense lanatis,
bracteis lacinusque calycinis oblongo-linearibus spatbulatisve ciliato-bispidis-
aimis, corollā subtetragonā nrceolato-tobulosā , antberis mulicis inclusis —
in prov Swellendam ocndentali (Masson, EcklonetZeyhei). Erica xeranthemifoha
Sali&b. 1 c. p. 33<) Bla?na xeranthemifolia G. Don I. c. p. 885 Hexaste-
mou lanatns Klotzsch 1. c. Tota lana alba obtecta e pilis longis simplicibus
composita Cor. fere linearā longa glabia Ovanum glabrum Siam. sa?pe 5. (v
a. sp.)

XXVI. GRISEBACHIA Klotzsch in linnceā 13. p. 215 et Fincke ejusd. p 23r.

Calyx aqualis 4-fid^{us} v. 4-p^{ap}litus. Corolla urceolato-campanulnta
v. subtubufosa, limbo 4-fido, erecto-connivenie y. patente. Stamina
4 libera. Filamenta hispidula. Anlherae laterales. Ovarium 2-3-locl-
lare loculis uniovulatis. Stigma obtusum. Capsula a-locularis v. abortu
i-loculans loculicidi v. teste Klotzschio scpticidē dchiscens. — Fruli-
cuh Capenses ericoidei. Folia 3-4-natim verticillata saepè huta. Flores
terminales, capitati. Bractae 5 , calyci appioximatae, uti calyces piJis
simplicibus plumosisve oblectae v. cihatae. GenAs nonnisi staminuro
nuniero'ab Eremia differt.

Sect. i. EDGRISEBACHIA.—Grisebachia Klotzsch I. c.

Capsula saepius bilocnlaiis Coiolla ureolata v. campannlata.

'J' *Anthcns aristatts*

- 1 G INCANA (Klotzsch' 1. c), fuhib terms appressib Incauo-pctbescntibus \. demùm glabratis, calycibns 4-partitis laciniis oblongo-hnearibus plomoso-ciliatis, corollis urceolatis — in prov. Cape et Stellenbosch aastralioribos. Bleria incanaBaitl. inlinnseà 7, p. 650. Folia i lin. loDga, crassiuscula, sabtngona , obtu&a Cor vix i | lin Calyx tabo corolla; bievior Stana. corollam aequantia (v.s sp.)
- 2 G CILIARIS (KlotzschU c.) , fohis 4-nis rarius teinis oppress is lucid is subglabns, cdlycibus 4-partitis, laciniis ovali-oblongis plomoso-ciliatis, corollis mceolatis—in prov. Swellendara occidental. Blseiia ciliaris Linn. 01. suppl. p. 122 Wendl. collect 2 p 35. t. 49 Eiica plainosa Tbunb fl cap p. 364 Folia vix ultra` | lin. Cor. x jlin. Calyx tabo corolla; pa rum brevior. (v. s. sp.)
3. G. SERRULATA, foliis lernis appiessis glabris margine ciliato-serrulatis, calycibns semi-4-fidis, lacinus ovatis plurnoso-nliatis , corollis uiceolatis. — in Giftberg (Diege pi exi n 7802) G. ciliaii simillima, sedcalyce distincta el totlia longioia Antheraram aristae minutae. (v. s. sp)
4. G. HIRTA (Klotzsch' in linuaeà 12, p aaG), fohis term's erecto-patentibm piu-moso-hispidis, calycibus semi-4-fidis laciniis lanceolato-ovatis plomo&o-ciliais, corollis subtetragonis iirceolatis.— in planitie atenosà Capensi pr. Groenekloof 'Dregc) Folia ultrà lineam longa. Flores magmludine G. ciliaris. Antheraram alista? ramutae. (v. s. sp.)

'I 'I' *Antkeris muticis*

5. G. HirsDA (Klotzsch! in Unnaè 12 p 226), folns 4-nis electo-fpatcntbnspliu-inoso-hispidis, calycibus semi-4-fidis lacinus ovatis plamoso-cihatis, coiollis subtetragonis nrceolatis —in montibus prov Worcesteri. Blaeiia ptilota E. Mey¹ in pi Drege exs. Eiica hirsuta Salisb' linn. soc. trans. 6. p 33g an Ibunb * (cujns descr. fl. cap. p. 358, hue lefeue videtur, at specim. à cl. Klot/sch visani ad Acrostieuonlnrsutui peitmer) Blaeiialhuuber^ii G. Don gen syst. 3. p 805 Folia longioia et flores majoes qnam iu G birià. Ovarium soepiu> 3- loculaie. Capsula abortu a-vil t-locnlaris loculicide dehiscens. (v. s ip)
6. G. PIUMOSA (Klotzsch¹ 1 c), fobis lernis ^nberectis incurvis glabiis margine breviter cihato-seirulatis, calycibus vix ad medium 4-fidis, launiis. ovatis biacteique plomoso-uliatis, corollis urceolatis —in dunis Capensibus. Erica nodiflora Salisb ' 1. c p. 340. Blacna nodiflora G. Don 1 c. p. 805. Folia 1 {- 2-lin Cor. limbus subpatens propositioone tubi major et profundius lobatus quara in affinibus (v s. sp.)
7. G DRKGKAWA, foliis terms appressis pnbescenlibus subcanescentibus demùm glabus , calycibus 4-paititis laciniis ovali-oblongis ciliato-hispidis, pilis plerisque simplicibus, corollis urceolatis — in colonià Capensi (Drege pi exs n. 7803) SimillimaG. cilianetcum ilià confusa, at distinctissima antheiiscihisque caly<mis. (r. s. sp.)
8. G. INVOLUTA (Klotrsch' inlinna?à 12 p 227), foliis tern is squarrosislinearibus raargine scabris, calycibns 4-partitis laciniis oblongis bracteisque longe ciliatis, pilis simplicibus, corollis urceolatis.—ad Boschkloof(Drege). Folia 1-1-2 lin. longa Calyces et bractea rosei. Cor in genere inajuscula, fere 2 ^ ha, (v s. sp.)
- 9 G ZEYHERIANA (Klotzsch¹ * c), foliis ternis snbappressis glabris v jnnioribus scabro-hiuis t calycibus 4-partitis pilis longis simplicibuj, dliato-hjipidis simis, corolbs suburceolatis glabiis, anthers subscabns.—ad Olifantsrmer et Brackfontein prov. Clanwilliam austrialion\,(Ecklon ct Zeyhei) Fola G ciliaris. ' Capitula G. vellerifloras at miiiora. (v. s sp. in herb leg. Berol.)
- 10 G VILLKRIFLORA (Klotzsch' 1^ c), foliis terms subappressis glabiis, calycibus 4-partiti!, laciniis lanccolatis bracteisque longissime ciliato hispidissimis, pilis simplicibus, corollis puberulis ovoideo-campanulatis, antheris hirtis — in arenosis \ersus Ohfantsrivier (Drege , Masson). Eiica ciliciifloia Salisb.' 1. c.

p. 339. Blaena ciliciifloia G. Don 1. c p. 805. Habilos ferè Ericarom sect. Eriodesmix. Anthere exsertae. (v. s. sp.)

Sect. ir. FINCKEA— Finckea *Klotzsch* in linnced 12. p. 23-j.

Corolla ovalo-tubnlosa, limbo minimo connivente Capsola oblonga, abort a sp pius 1 locolaris 1-sperm a.

11. G. ERIOCEHALA , foliis terni* erecto-patentibus ramisque hispidis, calycibns * 4-partilii , lacinias lineanbui bracteisque longissime ciliato-hispidissimis, coiollis puberulis, antbeiiis longe exseitis subsc<tbris muticis.— in coloniâ Cap. nsi (Diege) Finckea eioocphaia Klotzsch' inlmnaeaia p. a38. Habitns G. Zeyfreianae et pili calycis et biactearum ildem. Coi. 1 lin. longa, medio inflate, apice constricta Antbeiae giaciles (v. s. &sp.)

11. G. BRUNIADES, folhs teinis prttentisMiuib bispidis, calycibus 4-partitis, laci-niis hneaiibus biacteUqne longc ciliato-bispidis, corollis pnberalib ca!y<e bre-vioribus , aiilheiib brevitei eic^ertis senbus.—in coloniâ Capensi (Exkloa et Zeyber). Innckea binnades Klotzsch 1. c. Folia pleraque 2-liu Cor. minores et tal. minus bispidi qnam in G. ciiocepbalâ (v. s. &sp. in herb. leg. Berol.)

XXVII. ACROSTKIVION. — Aciostemon et Comacephalns *Klotzsch*.

Calyx aequialis 4-fidus v. 4-p^{ar}t^u*. Corolla obovato-lubulofia, limbo 4-fido connivente. Slamina 4i bbcra. Filamcta glahia. Anthra? terminates exsertae. Ovarium 3-4-loculare , loculis unioVulntis. Stigma obtusum. Capsula 1-j-loculcUii, locubcidè (v. sephcidè?) de-hisceus.—Fruticuli Capcnscs ericouici. Folia 5-4-natim verticill.1U1 soipè hirta. Floics tecimicalcs capitati. Bractesc i-5 approxnnatae. Calyces pibs longis ngidis a I bis obiecti, corolla breviores. Genus vix acne vix staminibus à Grisebachiâ diU'ct.

- i. A. iwniRvus, foliis />-nis incurvis hispidis, calycibns 4-paililii, ovurio 3-/j loculaii, staramibas exseitis. — in montibns piov. Woicester (Ecklon et Zeyher).Comact;phalus incurvnsKlotzsch! in linnacâ 12 p 224 Ov.wium ssepiaiu at in Griscbaebi hispidum 3-locnlaie Folia x ♀ a lin Coi. x ♀ lin. calyce clapo longior glabra. ^v & sp in heib leg. Beiol.)
- a. A. INCAHUS (Klotzsch ' in linnaea*ii* p. naS), foliis terms su bap press is inemvis ovali-ellipticis junioiibus longe piloso-ciliatis, calycibus 4-tidis , st.uuinibiis exseitis, ovatio a-3-lomlau. — in tnont piov. Worcester. Folia \ix lineam longa latiuscula obtns.i laxe sex fa rum imbneata. Cor. et stamina A. incurvi Ovarium bsepissime bilocular. (v. s. sp.)
- 3. A. SQUISKTOIDES (Klotzsch! 1. c), foliis teinis appressis obloigo-line.ibus, jnnionbus maigine glanduloso-srabris ranus ciliatis, calycibus 4-fidi*, ovario 2-locnlan. Cum A. incano leg cl. Ecklon et Zeybei et foisan ejus var.? (v. s. sp. in herb. reg. Berol.)
- 4. A. HiRsUTus (Klotzsch! 1. c), foliis 4-nis patentibns lamisqe ~~ISCOM~~ piloso-hirtis nndiave, bracteis lateralibns minutis nullisve, calycibns 4-parfatis, ovano a-locnlan.— in prov.Stelleubosch australiore (Ecklon et Zeyber). Eiica busnta Thunb fide specinu. à cl Klotzschio viso, vix ex fl cap. p. 358. l'olia 1 ♀-2- hn. Corolla; viscosissimae. (v. s. sp, in herb. reg. Beiol.)

XXVIII. SIMOCHEILUS. — Plagiostemon, Thamnns, Thoracosperma , Simo-cheilns , Octogonia, et Pachycalyx *Klotzsch*.

Calyx crassiusculus nunc crassissimus, ovato-campanulatus , 4dcn-tatus rariis semi-4-fidus. Corolla ovato-vcl clavato-ttibulosa, limbo 4-fido connivente v. suberecto. Stamina 4 libera. Filamenta glabra. Anlherae cxsertaj terminates vel breviter lateralea. Ovarium 2-4-locu-

lare, localis uniovulatis. Capsula 2-4-locularis a-4-sperma vel aborlu i-sperma 2-4-valvis vcl indehiscens? — Fruticuli Capenses Ericoidei. Folia 3-4-natim verlicillata. FJores terminates, capitati. Bractae i-3 vel o. Calyces colorati saepissimè tetragoni, irucliferi subcarnosi, glabri v. apice breviter ciliato-bispidi, enerves v. grossè 8-costati. Geus Acroslemoni et Sympiezae valdè affine, ab liac corollâ, ab illo caiyce divers urn.

Sect. i. PLAGIOSTEMON. — *Plagiostemon Klotzsch in linnced* 12. p. 232.

Bractea? 3 approximate. Calyx telragono caiDpanulatus. Anthera? breviter laterales. Ovarioiu 2-ovulatum. Folia terna.

1. S. BICOLOR, foliis erectis linearibus glabris capitalis parvis subcernuis, corollis caiyce glabro iriplo longioribns, antheum aristatis glabris. — ad Waterfall prope Tulbagh (MundtetMaire). Blseria bicolor Klotzsch! in linnaeâ 8. p. 660. Plagiostemon bicolorjusd.! inlinnaeâ i'i.p. a32. Raini divaricati. Folia vix 1 lin. louga crassiuscula. Cor. x | iio. (v. s. sp. ia herb. reg. Berol. et Hooker.)
3. S. KLOTZSCHIANUS, foliis incurvo-erectis liaearibas pubescenti-birtellis, capitulis subcernuis, corollis caiyce pnberulo triplo longioribus, autheris breviter aristatis subscabris. — ID prov. Clanwilliam australiori (Eckloa et Zeyber). Plagiostemon pubescensKlotzhcb! inlinnaeâ ia.p.33u. Gauliserectior, Boies pa ruin majores quiau in S. bicolor e^t. (v. s. sp. in herb, reg. Berol.)

Sect. 11. THAMNUS. — *Thamnus Klotzsch in linnced* 12. p. 235. — *Thoracosperma Klotzsch in linnced* 9. p. 350.

Bractae 3. Calyx campauulatussubtetragonxiibasi obscurè 8-costatus. Anthers terminates. Ovarium 4-ovulatum. Folia terna.

3. S. ODOVATUS, foliis angustè linearibus subcrectis, capitulis nnmerosis paucifloris racemosis, calycibas breviter 4-dentatis, corollâ obovatâ caiyce duplo longiore, antheris aristatis. — in montibus Van Staadenrivier prov. Uitenhage. *Thamnus multiflorus* Klotzsch! in linnaeâ 12. p. 235. *Thoracosperma panicolata* Klotzsch in linnaeâ 12. p. 229 quoad specim. Eckloniana! anetiamspecim. ThumbergianoinPvixErica, pariiculataTheinb. fl.cap. p. SGo. Folia 1 -J-3lin. {>labriiiscDla, punclata. Cor. 1 7 lin. v.'scidula. Ovarium constanter 4-ovnlatui vidi. Capsule dissepimentis tenuissnnis vel evanidis subunilocularis 4-sperma v. abortu i-3-sperina, 4-vatvis, valvulis mine omnibus inter sc a-fjualibus, nunc uua alteiave, seminibus abortientibus, multo minore. Cl. Kloizsch in speciniine ThumbergianoTboracospermatis sui paniculati vjditbaccainexsuccain dispermam globosam asperain, arillis (?) duabus pntaminaçcis satis cras&is ovalibus favosis vacuis to tain baccam impletibus, semina nondum matura fuerunt. An non hi arilli potius pro semina immatnra difforraia v. monstrosa nuncupanda? (v. s. sp.)
4. S. QUADRIFtmis, glaberrimus, foliis angustè lincaribus erectis, capitulis numerosis pauciororis racrinosis, corollâ ovato-oblongâ caiyce semi-4-fido pl^{us} duplo longioie, antheris aristatis.—in coloniâ Capeusi (Burchelln. 6126). Ramluli lenues. Folia 1-2-lin. Cor. 1-lin. subhyalina, limbo minimo. (v. s. sp. in'herb. Burch.)

Sect. in. EUSIMOCHEILUS.—*Simocheilus Klotzsch in linnced* 12. D. S 36.

Bractea? 3, approximatoc. Calyx angustè telragono-campanulatus vix costatus. Antherse terroinales. Ovarium 2-ovuiatuni. Folia terna.

5. S. CARNETS (Klotzsch! in linnaeâ 12. p. 236), foliis appressis linearibus evanescenti-puberulis, corollâ obovato-campanulatâ calyce profundè 4-dentato duplo longiore, antheris aristatis. — in coloniâ Capensi (Mundt et Maire). Fol. 1-lin. Capitula parva. Cor vix 1-lin. Calyx nonnunquam ultrâ medium qua-

- drifidu9. Stigma latè capitatum Capsula 4-vahis 1-2-sperma. (v. s. sp m heib. Hookei et leg. Rerol)
6. S. MUITIFLOBUS (Klotzsch¹ c.), folus anguste linearis-tiigoms electis glabiis, calyce acute tetragono 4-dentato, corollâ oblongo-tubulo&à calyce plus duplo longiore, antheris aristatis. — in mpcstribus LangeKLoof prov. George (Diegen 7793, Burcheli n. 5x64) Folia i-lin. Cal glabemmus. Stigma rairnitam. Antbeiaium aristae latitudinem antheiae subaequantes (v. s. sp.)
7. S. SUBMUTICUS, fohis crassiusculis linean-tngonis adpresbis subglabns, calyce tetragono 4-dentato glabro, coiollâ oblongo-tubulosâ calyce plus duplo longioie, autheii& muticii* v. basi bievissime aristatis — in arenosis prov. Swellen dam (Mundt et Maire). Similis S. multifloiae sed robustioi, floribuspaium majoribus. (v H sp. in herb Hooker.)
8. S. ruBESChNs (Klotzsch¹ in linnaeâ 12 p. 236), fohis hneaiibus a dp res sis puherulis, calyce tetragono profunde 4-dentato ciliato-bnto, coiollâ oblongo-tubnlosâ calyce plus duplo loagiore , antheris aristatis, ovaiio paberulo. — ad flnmen Elands piov Uitenhage (Ecklonet Zeyher). Calyx saepe uti in S. caineo ad medium {itsus. (v. & sp. in heib. reg. Beiol.)
9. S. BLWIGER (Klotzsch¹ in linnaeâ 12 p. 237), foliis brevibus anguste lineanbus addressis glabns, calyce tetaagono 4-dentato apice biacteisque ciliatis, coiollâ oblongo-tubulosâ calyce plus duplo longioie, antheim aristatis, ovaiio apice pilosulo.— in monibus Vanstaadensivier prov. Uitenhage. Blaeiâ u 7798 Drege pi exs. *Vix à S. muldfloro distmctus. (v. s. sp.)

Sect. iv. OCTOGONIA. — *Oclogonia Klotzsch in linnoed* 12. p. 233.

Bracteae (excepto folio florali) nullae. Calyx ovatus v. subcampanulatus valde CTrissus tetaagonus basi octocostatus. Antherae subterminales Ovaiiam 2-4-0vulatam. Folia quaterna.

10. S. GLADELLUS, fob is angoste linearibus paten tibus glabiisve hinc indèhiitis, capitolis subcernuis, calyce apice vix constricto glabro pnnctato, coiollu, calyce duplo longioribus, antberii atistatis.— in montibus prope Capetown. Enca glabella Thunb fl cap. p. 364. Blaeria glabella Willd spec. 1. p. €\$i. Wendl collect. 2. p. 47 t. 55 Blaeiâ pasilla Linn. mant. p. 39. teste S.tlsh. Bl glabella & Thunbergiana Klotzsch¹ in linnaeâ 8 p. 662. Octogonia glabellâ & Thunbergiana ejusd. linnaeâ 12 p. 233. Bl purpurea Berg pl. cap p. 34. non Laun. folia 1 1/2 - 2 1/2 lin. Capitula fere Sympiezæ capitellatae. Cor. 1 1/2 lin. (v. s. sp.)
11. S. DEPREEssns, foliis anguste lineanbus patentibus hispidis, capitnhs subcernuis, calyce apice consticto ciliato-hirto , corollis calyce subduplicò longilibus, anthers aiistatis. — in montibus prope Capetown communis. Blaeiâ depissa Lichteib^t in Roem et Schult &y. 3 p. 168 Erica embolifera Salisb.¹ tians. soc. Im Lond b. p. 340 fcua expromta Spr. sy&t. 2. p. iq5. Gypsocalhb expromta G. Don 1. c p. 804 Blaeria glabella var. Barthngiana Klotzsch¹ luliunjeâ 8. p. 663. Octogonia glabella vai. ejusd ' in linnaeâ 12 p. 234. BI fa&ciculata Drege pi. e)s. Forsan ptxennte Klotzchho vauet.is S. glabelli, sed pra-lei hiibutiem diffcne \idetui calycis formâ et flonbus minoibub. (v. J. sp)
12. S. HIRSUTUH, folns hnearibuj* subpatentibns evanescenti-hispidis, capituli^ &nbceinuis, calyce oblongo glabimrulo , coiollâ calyce plus duplo longfoie , antheiis .. — in montibub intei Caledon et Babylonstower piov. Swellendain (FcUon et Zeyhei) Octogonia hiita Klotzsch¹ in linnaeâ 12. p. 233 Specimen unicum vidi flonbs jam emaicidii Coi tcnuior ct longoi qnam in S. glabellâ cm h.ibitu simillimus (v. s. sp in herb. reg. Berol)
- i.j. S. rATms, foliis, lmcaribuh patentibub hirtis, capitulis suberectis, caiycihib tubulosis tctiagoms hiitis, < oiolis subteictibus calyce plus duplo longioibui , anthers bicvissune aiistjlis — in colomA Capcnsi. Hjbitus fcie S. depicsM Moiet* et pi^&eitim calycLb lougioies Ovatuiiu sjepnsirae 4 ovulalnm. (v *• »j) iii herb DC)

14. S. OBLOHGUS, foliis oblongo-linearibus appressis evanescenli-hirtis, capitalis oblongis termioalibus suberectis, corollis calyce obscurè tetragono triplo longioribus, antheris mnticis. — in collibus arenosis Berg valley (Drege 11. 77\$6). Syndesiuanthus ? capitellatus Klotzsch! in pi. Drege. Fol. i-lin. Calyces etfolia floralia ciliata hirta. Cor. 2 J lin. Ovariura 4-gonura a-ovulatum. (v. s. sp.)

Sect. v. PACHYCALYX. — *Pachycalyx Klotzsch* in *linnaea* i'±. p. 230.

Bracteae 3, approximate. Calyx ovato-conicus valdè crassns tetragonus sub-octo-costatus. Antberae subterminales. Folia terna.

- x5. S. GLABER, foliis elliptico-linearibus erecto-appressis glabris marline evanesceiiti-ecbinato-seiTulatis, capitulis paucifloris, corollis ciliye glnbro vix duplo longioribus, untheris mnticis.—in montibns prov. Worcester. Erica glabra. Thunb.fl. cap. p. 346. Pactycalyx glaberet Pach. inaequalis Klolzsch! inlinnaea 12. p. s3i. l'-ol. i-lin. crassiuscnla. Flores 1-1 7ffl. inspecim. frnctiffris sa?pè solitarii. (v. s. sp.)

16. S. ECILONIAWUS, foliis linearibns erectis undiq' puberulis, capitalis pauciflois, calycibns minute' pnbernlis dentibus ciliatis, antheris mnticis. — in monlibns prov. Worcester (Ecklon etZeyher). Pachycalyx pubescensKlotzsch! in liunae 12. p. a3o. (v. s. in herb. reg. Berol. sine fl.)

17. S. iiispidUS , foliis linearibns snberectis raarginne dorsoque glandoloso-bispidis demùm rariū glabratis, capitulis parvis pauciflois, corollis calyce minutè puberulo subduplo longioribas, antberis mnticis. — in montibus Nieawekloof (Drege, Burchell n. 1000). Pachycalyx hispidus Klotzsch! in linnaea 12. p. 23i.(v. s. sp.)

XXIX. SYMPIEZA *Lichtenst. Klotzsch* in *linnoca* 8. 'p. 655.

Calyx crassiusculus, mine compressus bilobus, nunc tubulosocampunulatus 4-dentatus. Corolla obovalo-v. clavato-tubulosa , obliqua f limbo bifido conniventej. Stamina 4 libera. Filamenta glabra. Anlherac icrminales exsertai muticae. Ovarium bilocularc loculis uniovulatis. Stigma obtusum. Capsula bilocularis vcl abortu unilocularis. — Fruticuli Capenses ericoidei. Folia ternatim verticillata. FJores lermiiiales capitati. Bracteae praeter folia floralia nullae vel tres calyci approximata. Calyces glabri, margine ciliati.

Sect. 1. MICROGOMPHUS.

BractetC tres. Calyx campauulatus 4-dentatus. — Seclio inter SimocbeiJnm et Eosyinpiezam media.

1. S. KUNTHII (Klotzsch! in linnaea 8. p. 656), ramnis poberulis, foliis linearitiæonis ereclo-paientibus subincurvis, corollis tennibus calyce snbtripio longioribns. — in monlibns prov. Worcester et Swellendam occid. Bleria depressa Drege pi. exs. non Licht. Folia 1 Vi l'-- glabra v. margine pilosa. Cor. 1 | lin. post anthesin inflatae.(v. s. sp.)

fl. hispida, foliis patenlibns hispidioribns. Blajria ericoides Drege. pi. exs. uon L. (v. s. sp.)
y. brachyphylla, foliis inenrvo-erectis vix Jlin. longis. (T. S. in herb. Bnrchell/)

Sect. 11. EUSTMPIEZA.

Bracteae nallee. Calyx compressns bilobas.

2. S. ECKLONIAMA (Klotzsch! inlinnaea 1a.p.^ap), foliis angustè linearibas snbpatentibus, floralibus calyce dnpllo longioribus, capitulis oblongis necandis

corollis calyce longe ciliato triplo longioibus mcaivo-clavatis, anthe 1 is glabns — ill montibus ad Klynnvier piov Swellendam'(Ecklon et Zeyher) Folia crebra i-j ha C01. i-J Iia. (v s sp. in beib. reg. Berol. et Hookei)

- 3 S CAPITELLA.TA ^Llichtenst exKlotzsb'inlinuaèa 8 p. 655), folus lineaii-trigonis appressis vel incuivo-erectis, floralibas calyce vix longioribus, capitulhs subglobosis cernois, corollis calyce breviter cilia to triplo longioribus sabin-curvo-clavatis. — in montibns prov. Swelleodam et Stellenbo'&ch Blaena bracteata Wendl collect 1 p. 1. t 37. Eiica ldbialis Salisb. trans, soc. linn. Loud 6 p 340. (<olia 1-1 7 lin. Cor. fere 2-lin. Antherae glabrae v. mmote scabiae. (v a ap.)
- 4 S. TKHUIFLORA, folns hneail'trigouis suberectis incurvis, floralibas calyceni vix superantibus, capitulis subglobosis, corollis calyce bieviter ciliato 4 pl° longioibns tenuiler tobuloMs — in colonia Capensi (Forbes, Mundt, Bui-chelln 7801). Habitus S. capitellataa. Floies multo tenuiores a -J lin. longae. Antherae saepius margine birtellai (v s . sp.)
5. S. BRACHTPHYLLA , foliis ellipticis obtusis mcurvts sexfariamimbiicatis, floralibas calyces v 11 excedenibus, capitulU parvis globosis, corolli. calyce brevitei ciliato 2-3-plo longioribns. — in colonia Capensi (Foibes, Mundt). Folia ciebra lucida vix unquam hneamlonga Capitula numerosa. C01. 1-1 / Iia.long.-e. (v. s. sp.)

XXX. SYNDESMANTHUS. — Syndesmanthus et Maerolinam *Klotzsch.*

Calyx tenuis v. crassiusculus tubuloso-campanulatus v. turbinatus 4-dentatus. Corolla obovato v. subclavato-tubulosa, limbo 4~ dentato erecto v. connivente. Stamina 4 libera. Filamenta glabra. Anthera? exsei tie terminales muticas. Stigma obtusum. Ovanum uniloculare uniovulatum , ovulo ab apice placenta laterahs pendulo. Capsula monosperma indehiscens v. subbivalvis. —Fruticuli Capenses encoidei. Folia 3-4-natim veitcillata. Flores terminales capitati. Bracteae o vel 3. Calyces saepiis ciliato-hispidi. Genus habitu Simochcilo et Sympiezae simillimum, ovano distmctum

Sect. 1. EUSYNDESMANIHUS. — Sj ndesmanthus *Klotzsch* 12.
p. 24°*

Bracteae (excepto folio floral!) nullae Calyx sabcampanulata tetragonus Folia 4-na lanus sobtema

1. S. ARTICULATUS (Klotzsch¹ in Jinnaså 12. p 240), foliis elliptico-linearibus appressis evanesceuti-pubealīs, jumoribus apice barbatis, nnc omnibus hutellis, capitulis globosis cernuis, coiollis supra calyceni ampliatis calyce vix duplo longioribus. — in montibus prov austro-occidentahum Blaeia aiticulata Linn.^T mant. p 19ft Wendl. collect a. p. iq. t 44. Iiica arliculata Ihunb fl c\ p. p 357 frica paleacea Salisb ' trans, soc linn. Lond. 6. p. 341. Folia 1 lin. Capitula numerosa Calycis anguli et denies pilis longis ciliati C01. 1 j lin (v. s sp)

@. *hirtus*, foliis longioribns pierisque hirtis bubpatentibns Blseiiia senbia Wendl collect. 1. p. 85 t 3i? Folia feie sequenlib & floresS. aiticulati An sp. piopna ? (v a p.)

2. S. SCABER (Klotzscb'm linuaeå 12 p. 241;, foliis anguste linearibus patentibus bispidis , capitulis globosis erectis subceinui-e , coiollis temubus apice MX Jationbus calyce plus duplo longioibns —in prov. Swellendani BlariasobiaWiUd spec. 1 p. 627 vix Weudl. Eiica scabra Thunb. il cap p. II7 Erica ex- ii
 Salihb ' trans soc liun. Lond. (1 p 340? (or dimidi6 angustiou* paiuin longiores quam iu piaecedente. (v & *p.)

- j6. *gracihs*, omnibus paitibus multò minor, gracilioi cseteiuin simillimus. — in colonia Capensi (Buithell. u. 7553). (v. s. sp.)
- 3 S. GLAUCUS (Klotzsth¹ mlmnaeui? p. 242), foliis 3-4-nis oblongo*-hneanbns adpressis glaucis evanescenti-puberuli*, capitulia pa\is oblongis subglobosisve subcernuis, flonbus parvis, coroliis supià calycem amphatis. — in coloniu Capensi (Diege n. 779a, Buichell. n. 705, 7797). A S. articulatodifferentcapituhs et floribus dimidi6 minoribus , calycibus bieviùs et densiùs hiisutis. (v. s. sp.)
- 4* S FAbCicuLATUS (Klotzsch! in linnjta 12 p 240), foliis adpiessisevanescenti-pubemils juuioubus laius bispidis, adultis lucidis, capitulis subglobosis erectis, co roll is Mipta calycem ampliais. — m inoalibas prope Capelown. Blxna fasciculata Willd. spec. 1. p. 629 Erica fasciculata Thunb il. cap. p 357. Caules erectioies quatu in S. articnlato.' Rami vngafi. (v. s. sp.)

Sect. 11. MACROLINUM. — Macrolinum Klotzsth in linnced 12. p. 2^2.

Bractae nulae vel3. Calyx tetragouu9 turbiuatus v infuudibulifoimis. Caules depressi divaucato-iamosUsirai. I'olia teina.

5. S. QUARRO&US, foliis squanoso-patenlibus, capitulispaoocifloiscernuis, biac-teis. minulis nullisve, calycibus obovoideo turbmalis bieviler ciliato hulls — in colouia Capensi(D. lliom) Kami pubeiuli. Folia glabra 7-1 bn. Cor. calyce vix duplo longioif basi tenuis, suprà calycem inflata, limbo counivente. (v. s. sp. iu heib. Hooker.)
6. S. PAUcri-oLibs , foliis patcnibus, capitnlis ceinms, biacteis3 calyci appioximatis, calycibus e tubo brevissirao tetragonoo iuflalo-tubinatis louge ciliato-biipidis.—in montibus piov. Swellendam Occident, et Stellenbosch austi. Bl.iua paucifolia Weudl collect. 2. p. 17. t. 43. liljiia p.iuciflora G.Don gaid. syst. 5. p. 804. kiica llosculosa balisb ' trans soc. linn. Iond. b p 340. Blaeii flosculosa G. Don 1. c. p 805. Habitus S squaiiosi Ramuli glabu. Folia jumora ciliata. Biactae subalatae v. spathulatje in pedicello bic\jssiuo sitae. Cor. S. squarrosi (v. s. sp.)
7. S. CILIATUS, fuhis ininiinis patentissimis, capitalis ccinnis, biacteis minutis infrà aliculationeru flons sitis, calycibui cussiuscuhs glabns tubo elongato tetagono, limbo inflato, dentibns conniventibns eildtis. — iu prov. Swellen-dam intei Caledon et Babylonstower (luklon ct Zeyhei). Maciolinum ciliatuin Klotzsch'in hnnaå 11. p. 243 C.ipitula minima nuinerosissioapluulloia. Calyces colorati. Cor. 1 kn tenuissimoe tubulosae. (v s . sp. in heib. leg. Beiol.)

• Species exclusa.

S. CAPITELLATTJS Kl. = Sinocheilus oblongns.

XXXI. CODONANTHEMUM.— Codonanthemum et AnomalanthusKlotzsch.

Calyx campaiiulatus acqualis 4-denlatus, post anlhcsiu aucLus valde crassus Corolla obovoidco-tuhulosa v. apicc camp.inulata limbo crecto 4-dcnlalo. Stamina 4 libera. Filamenta glabra. Anlhrae lateiales, cxseitae. Stigma obtusum. Ovanum umlocularc ovulo unico ab apice j)lacenta3 Intemlis pendulo. Capsula monospenna subindehiscens. — Fruticuli Capcuses cricotdei diffusi v. divaricato-ramosi. Folia tcrnatim verticillata, hmc indfe spaisa,ad avillas subfasciculata. Flores ad apices rainuloiuin bievissimoium capitulati, capilulis secüs ramos racemosis. Biacte tres calyci approximate. Calyces per anthesin colollâ multò bieviiores, fruct'fcri corollam marccsentem ferè includentes. Genus vix ac ne vix authens à Syndesmantho distinctum.

1. C. PUBERULDM (Klotzsch' iuhiiuåja 12 p. 240), foliis unguste liucaribus fasci ouLtiis, juuiobus butellis, demum glabiis, cilyubas pubciulis buclaisqur uiaigie cilia!in, iiucliffeis Io;vibus, loiollia exiia calytem abiupte d latis

antheus aiidtatis.—in prov. Swellendam et Stellenbosch australiore. Blaeria puberula Klotzsch* in linnacâ 8 p. 2J9 (specitn. fractifeia). Anomalanthusbtopaiius ejusd' in linn 12 p. i^g Fol 1-2 hn. Cor. 1-1 7 lin. tubo intiâ calycem teuui, extia ralycem cyatbifonni globoso. Variat foil is glabiis hiitisve. (v. s. sp.)

- a. C. DISCOLOR, fol 1 is angnste linearibus, calycibns fructifeñs glabris ragosis.—in montihajj ad fluui. Gaunte (Ecklon et Zeyhei) Anomalanthus discolui Klotzsch! in hnnaeâ 12 p. 239. Species dibia vix a C. pubeiulo di&tmcta. (v. s. in herb. leg. Beiol.)
- 3. G. TENUUE, fol 111 lineanbns fasciculatis glabriusculis, calycibns extus glabiis biadcisqae margine ciliatis — in coloniâ Capensi (Buichell n 7898, 8725, Mundl) [*kolia* vix unquam lineam longa. C01. minor et tenuioi quam in G. puberulo. (v. s. sp. in herb Hooker et Burebel 1.)
- 4. C PA&VIFIORJIM (Klotzsch' in linnacâ ia p. 240), foñisobtusè bnearibnshir tellis v. demuui glabris, axillis subnudis, calycibns biacteuqne pubeiulib, antheris mnticis.—in coloniâ C ipensi (Muadt et Maire) lilaena parviflora Klotzsch! in linnacâ 8 p. 665 Folia ciassiora qaàm in praecedentibus, suberecta, 1-1 | lin. Lot. ovoideae limbo suberecto. (v s. sp. in herb. reg. Berol.)

XXXII COILOSTIGMA. — Thamnium et Coilostigma Klotzsch.

Calyx profundiè 4-fidlis subaequahs v. lacing un& majore. Corolla paiva oblonga v. ovnta limbo breviter 4-^do connivente. Stamina 4 hbera Aniherae muticae exserta?. Stigma cyatbifonni peltatum.¹ Ovarium'2-4-loculaie locuhs uniovulatis. Capsula i-4-locularis i-4-sperma. — Fiuticuli Capenscs encoidei. Folia ternatim verticillata. Floies ad apices ranmlorum subsessiles term v. capitellati. Calyces minimi. Bracteae nulla? rariis 2 minulae. Genus à praecdentibus stigmate diflert à sequentibus ovano, habitu Simocheilis affine.

Sect. 1. THAMNIUM. —Thamnium Klotzsch in linnced 12, p. 223.

Ovaiiam 4-locniare. Biactae a.

- 1. C. Gr \BRUH , glabemmnra, fohis erecto-appressis, corollis ovatis glabris.— in coloniâ G.tponsi (Rnirhell n. 687D). Habitu Simocheilo quadrifido similis sed btigina Goiloitigioatis. Folia vix x lin. Cor. 7 ha. (v. s. sp. in herb. Burch.)
- 2. C. TUBERULUM, rauiahis inmate puberulis, foliis subsqaairobis, corollis extus pubescentibus. — in collibus prov. Swellendam. Thamnium pnbcium Klotzsch' ia linnacâ !?. p. 22^ Folia vix lineam longa. Gor 1 lin. (v. s. sp.)

Sect. 11. EUKOILOSTIGMA.—Coilostigma Klotzsch in linnced |Q.p» 234-

Ovnrium 2-loculaie. Biactae nullae, laiissirne 2 minatis&imae.

- 3. C. TENUIFOLIUM (Klotzsch' 1 c), famulis tenaissime pnberulis, foliis adpres sis tenuibns glabiis, coiolhs extus puberalis. — in planicie Krakakammaet ^ylvis Ohphantshoek, piov. Uitenhage ^tcklon et Zeyher). G puberulo habitu simile. Cor. .j lin. Fioclus none compre^sus a-speimus nunc aboitu '-spermus globosus (v s sp. in heib. reg. Berol.)
- 4. C. ZEYHERIANUM Klotzsch' I. c.), ramulis glabris, calycis lacmns lato-lan ceolatis, corollis glabris. — in montibus "Vanstaadensvier prov. Uitenhage (Ecklon et Zeyhei) Habitus et folia pixcedentis Fiuctus saepiuime aboitu monospermus (v. i sp. in heib. reg Berol.)
- 5. C. DREGEVNDM (Klotzsch¹ 1. c \ ramulis tennissimè puberulis, foliis adpres sis ciasiinscnhs glabris, calycis laciiniis lanceolatis, corollâ glabiâ —in coloniâ Capensi (Drege n 775J) | Q Zeyheiiano vix ac ne vix foliis majonbus. et ha bnu ligidioie diffiteit. Calycis lacinia infira nnnc casleiiis vix longior, nunc duplo longior fohacea corollam subxquans. Gapsulam mono.spcrniani el dii peimam vuli (v s sp.)

XXXIII. CODONOSTIGMA *Klotzsch* mss.

Calyx campanulatus 4-dentatus æqualis. **Corolla cyathiformis** globosa, limbo 4-fido recto. **Stamina** 4 libera. **Antheræ terminales exsertæ** muticae. **Stigma** parvum cyathiformi-peltatum. **Ovarium** i-loculare, ovulo unico ab apice placenta? lateralis pendulo.— **Fruticulus Capensis ericoideus**, calyce Coilostigmati, ovario Scypbogynis affinis.

- i. C. KRINUS (*Klotzsch!* in herb. reg. Berol.) — in iuontibus Klynrivier prov.¹ Sweiendam (Ecklon et Zeyher). **Fruticulus** divariratus. Kami tenoes. **Folia** ternatim verticillata, -1 lin., pa ten ha, canescenticiliata. **Capiula** terninalis cernua. **Bractaeo**. Cal. ciliato-hispidi. Cor. vix calyce longior. Genitalia longè exserta. (v. s. sp. in herb. reg'. Berol.) .

XXXIV. SCTPHOGYNE Ad. Brongn.'voj. de la Coquille. t 54.— Tristemon, Omphalocaryon et Blepharispetum *Klotzsch*.

Calyx 4-partilus v. 4-fidus, laciniæ infimâ saepiis majore v. magis solutâ. **Corolla** globosa , urceolala , v. ovato-cyathiformis, limbo 4-lido recto v. conniveute. **Stamina** 5-4* Filamenta libera v. monadelphba. Antberse sub stigmatico magno peltato conniventes v. cobaerentes inutiae. **Ovarium** i-loculare ovulo unico pendulo. **Capsula** oblonga v. globosa subindebiscens.— **Fruticuli Capenscs ericoidei** tenuis ramosissimi. **Folia** ternatim verticillata parva. Flores omnium minimi numerosi sessiles vel breviter pedicelati terminates v. in axiliis superioribus dispositi, subterni v. capitellati. **Bractae** nullac.

Sectio i. TRISTEMON. — *Tristemon Klotzsch* in linnced 12. p. %/5.

Stamina saepiis tria. Filamenta non dilatata.

1. S. URCEOLATA, foliis angusto-linearibus ramulisqne tenuiter puberulis, floribus subternis, calycibus profundi 4-iidis laciniis lanceolatis corollâ brevioribus, corollâ puberlâ ovali-urceolatâ subliubo glabriuscule constrictâ. — in montibus propè Capetown. *Tristemon* urceolatum *Klotzsch!* in linnæa 12. p. 245. (v. s. sp.)
2. S. FUBERULA , foliis angustè linearibns ramulisqne pubescentibus, floribus subternis, calycibus profundi quadrifidis laciniis linearibns corollâ brevioribus, corollâ pubescente urceolato-globosâ limbo brevi connivente. — in montibus collibusque prope urbem Caledon (Ecklon et Zeyher). *Tristemon* puberulus *Klotzsch!* 1. c. (v. s. sp.)

Sect. 11. OMPHALOCARYON. — *Omphalocaryon Klotzsch* in linnccd 12. p. 243.

Stamina saepiis 4. Filamenta libera saepè dilatata.

3. S. INCONSPICUA (Ad. Brongn. 1. c.)» raraulis hirtulls, foliis subsquarroso-patenibus glabris, floribus subternis, calyce breviter 4-lido, corollâ ovato-cyathiformi calyce longiore, limbo brevissimè 4-fido lacero-ciliato, filamentis vix dilatatis. — in collibus prov. austro-occidentalium. *Blxria* muscosa Ait. hort. kew. 1. p. 150. *Omphalocaryon muscosum* *Klotzsch!* in linnæa 12. p. 243. Rami flexuosi densè foliosi. Folia 1-1 ½ lin. Cor. hyalina , uti in plerisque hojasce generis vix ¼ lin. longa. Hirsuties calycis variabilis. (v. s. sp.)
4. S. FASCIGULATA, ramulis puberulis glabrat&ve, foliis brevibus appressis, floribus subternis, calycibus semiquadrifidis, corollis obovato-globosis calycein vix superantibus glabris limbo miuimo ciliato, filamentis vix dilatatis. — in coluiâ Capensi (Burcheil n. 7716). Affinis 5. cipitatac. Flores multo minores. Cal. laciua; imcolato-lineares ciliata?. (v. 5. .p. in herb. Bluebell.)

5. S. CAPITATA , rainnlis pnbescentibns , foliis brevibus appressis, floribus capitatis, calycibus breviter et latè 4-fid is v. lacinia infimâ à basi soluta, corollâ urceolatâ calycem vix superante p liberal à limbo nado, filainentis dilatatis.— in raontibus prov. Swellendaru occidentalis et Stellenbosch australis. Oinphalocaryon capita turn Klolzschlin liunaæa n. p. a44. Folia 4 lin. Flores in genere majusculi f lin. diametro. Calyces facilè 4-partibiles. Cor. ore constricta limbo Dievissimo erecto. (v. s. sp.)
6. S. EGLANDULOSA f foliis brevibus appressis ramulisqae glabris, floribus subternis calycibus, brevisimè 4-fidis corollam superantibus, filament is dilatatis.—in montibus prov. Swellendam occid. Omphalocaryon eglandulosum Klotzsch! in linnaeâ 12. p. 144. Folia et flores omnium minima. Araherse aretè cobcerentes. Species inter S. muscosam et divaricataui media, (v. s. sp.)

Sect.in BLEPHAROPHYLLUM.—*Blepharophyllum Klotisch inlinncedii.*

p. 215.

- Stamina sa3pius 4. Filamenta monadelpha. Tlores snbterni.
7. S. DIVARICATA, Tainis glabriusculis, foliis patenlibus subsquarrosove glanduloso-ciliatis, calycibus breviter 4-iidis ciliatis corollâ globosâ subhirta brevioribus. —in montibus prov. Stellenboscb. *Blepharophyllum divaricatum Klotzsch!*
1. c. Species ncc babitu nee cbaracteribus genericè a prsecedenlibns separanda videtur. (v. s. sp.)
i. crassifolia (Klotzsch!), foliis brevioribus crassioribus minus patentibus.
Ansp. propria? (v. s. sp. in herb. reg. Berol.) <
 8. S. BREVIFOMA., ramis glabriusculis, foliis erecto-appressis glanduloso-serratis, nudUve calycibus subinfudibuliforiiibus breviter 4 -fidis nudis corollam ob-ovoideam glabram aequanlibus.—incolooit Capensi (Burchell n. 7631). Ramuli lungioies graciliores quâm in praceedente. (v. s. sp. in herb. Burchell.)

XXXV. LAGENOCARPUS *Klotzsch inlinnced i*.p. 214.*

Calyx 4-fi^{us}, Iacini4 unâ mnjore. Corolla pnrvn subglobosa limbo breviter 4-fido erecto v. cotinivente. Stamina 8. Filamenta monadelpha. Stigma magnum peltatum. Ovarium uniloculare , ovulo unico pcndulo. Capsula lageniformis subindehiscens?— Frutices Capenses Jiabitu ct inflorescentiâ Salaxidis à quâ uonnisi ovario diiferunt.

1. L. IMBRICATUS (Klotzsch! 1. c), foliis crassiusculis lato-linearibus apice incurvis. — in rupestribus prov. Stellenbosch austr. et Swellendam occid. Frntex rigidulus ramosissiaius. Folia I-I 7 lin. in ramolis densè sexfariain inibricata. (v. s. sp.)
2. L. TENULS, ramulis fjlifonnibus, foliis minimis angostè linearibus erectis appressis. — in coloniâ Capensi (Mnndt, Bnrchell n. 7034> 7^{k2}6). Folia triplo angustiora quâm in praecedente, vix unquam lineam longa. Flores miniuti. Antherie apice hispida?. (v. s. sp. in herb. Burch .et Hooker.)

XXXVI. SALAXIS *Salisb. trans, soc. linn. lond. p. 3i7- Klotzsch in tinnceâ 9.* p. 351 non JVHld.— Salaxfo et Cocosperma *Klotzsch in linnced* < v. ia.

Calix quadrifidus, laciñiâ una majore subsolutâ. Corolla parva subglobosa , limbo breviter 4-fido reclo aut connivenle. Stamina 6-8. Au-iherae sub stigmate magno peltalo arclè approximataj vcl connatas, mulicae. Ovarium 9.-4-loculare loculis i-ovulatis. Capsula subglobosa v. angulata 'i-4-locularis indehiscens v. in coccis -a-4 separabilis.— Fruticuli Capenses habitu et floribus Pbilippiis v. Ericis sectionis Chlrocodonis similes. Folia ternatim verticillata. Flores herbacei ad apices ratnorum in axillis foliorum sessilis solitarii. Bractes nullae v. rariis mi-nutissimæ. Genitalia corollae subaequilonga.

Sect. i. EUSALAXIS. — *Salaxis Klotzsch* in *linnад* 12. p. 21 T.

Filanienla libera.

1. S. AXHLARIS (Salisb. ex G. Don gen syst 3 p. 35i), ramulis glabris v jnnionibus minule pnberalis, foliis lineanbus flonbusque glabris, starainibu3*£, capsulis glabris globosis obsolete tnquetris plensqae tiispermis — in montibus prov. austro-accidentahum E. axillaris Thunb. diss de Ericā n 10. teste specim. à cl. Klotzchio viso, vix tamen cam deser. convenit. Folia pleraque § IIQ. longa. Cor. vix 7 lin diametro. (v. s. sp)
- a. S. FLEXUOSA (Klotzsch¹ in liunxå 12. p. 213), raranlis divaricatis flexnisis tenuiter evanesceuti-pubern'is, foliis lmeaiibus Ho rib usque glabiis, staraimbis 8, cap&alis pubeiubs subglobosis pleisqae tnquetris trispermis. — in montibus prov. Worcester (Ecklon et Zeyher). Simillira S. axillan et vix non ejus var. (v. s. sp. in beib. rcg Berol)
3. S. FUBERULA. (Klotzsch! in linnaeå 11 p. 212), raniulis foliisqneglabiis, calyci- bns pnbei nbs serai- j-fidis corollå apioe puberal A sabdimidio brevioibus, sta- minibus 8, stigmate snbtus glabmisco, capsulis puberulis subglobosis pleris- qne triquetus trispermis.—in montibus piov Stellenbosch austrahotis (Kcklon et Zeyber). Habitns Salaxidis axillaii*. Laciniae calycinæ latiores. (v. 9. sp. 11 heib. teg Berol.)
4. S. ciLiAiA, ramulis pubernlis, foliis brevibns obtusis glabris pnberalis ovoi- deis brevibunc 4-dentatis co roll am apice pubernlam sabxquantibus , staraimbis 8 , ovario ?-3-spermo, stigmate maximo subtus slyloqne cihato, capsulis globosis plsberuhs snepm̄s abortu monospermis.—in coloniå Capensi(Burchell). Folia 1-1 f lin crassa tiigona. Flores majores et stigma duplo latior qnåm in S. pubeliula (v. s. sp in berb Buicb.)
5. S. ARTEMISIOIDES (Klotzsch! in hnnaeå 11 p. ixa), ramnlisfiliformibnspnberalis, foliis angusLc bnearibus margine pubeinlis, flonbus glabris, staminibns 8, cap- sulis glabiis sobglobosis 3-/spermis. — in montibus Dietricbskloof, (Diege). Erica artemisioides E. Mey. in Diege pi. ex> ex paite. Folia fere S. octandia* (v. s. sp.)
6. S. OCTAPIDRA (Klotzsch! in linnaeå 9, p 353), ramuli"filiformibns glabris, fohis angnslisMine lineaibns iloubnsque glabris , st.uninibus 8 , c.ipsulis glabris compresso-globosis plensque dispermis. — in montibus prov. Stellenbosch austi. Folia vix ultra lineam longa Klores minoies quåm in S. axillaii.
7. S. MCRAWIHA, iflmiilis pubet>centibus, foliis liueanbus an^ustis maigme oa- lycibusque ciliato-pubciolis, corollis glabtiusculis, slaminibus 6, ovario bi- ovnlate. — in coloniå Capensi Roxburgh. S. octaudrx simihs. FIoics omnium minimi. Anlbeiae apice subglandulosae. (v. s. sp.)

Sect. 11. COCCOSPERMA.—Cocosperm.1 *Klotzsch* in *linnад* 12. p. 215.

Filamenta monadelpha.

8. S. HEXANDRA, (Klotzsch! in linnxåo. p. 35a), lamulis glabris, foliis obtusiascu- lis, staminibus plerumqne 6, capsulis subiugpsis. — in raontibus pi ope Capetown. Eiica artemisioides E. Mey ! in pi. Dregeexs. (occosperma Foibesia- nnm Klotzsch¹ in linnaeå 12. p. 215. S. axillari similis. Calyx valde insqualis. Capsula S. axillans (v. s. sp)
9. S. RUGOSA, ramnlis filiformibns albido-pobernlis, fohis angnstibsimis acntis , flonbus bexandns (?), capsulis rugosis. — Piope Capetown , (^eyhei). Cocco- sperma rugosum Klotz&rb! in linnaeå 12. p. 215. Habitus S. octandia*. Calycis lacinla? cihatae. Stamina non vidi. (v. s. sp in herb reg. Berol.)
10. S. SIEBERI, lamulis tenuibns puberulis, foliis angnstis obtusiascalis, floribns octandris, capsnlis breviuscnlis.— Pi ope Gapetown.Habitu intei S o'landram et S. rugoaoi media , S. axillaii siraillima. Antherae apice glanduloso-scabrae. (F. S. sp)

•j- *Species exclusce.*

S. ABrETiNA Willd. = *Philippia abielina*.

S. ARBOREscENs Willd. = *Philippia arborescens*.

S.*isoNTAifA Willd. = *Philippia montana*.

G. BENTHAM.

Trib. IV. *RHODOREJE D. Don in Edinb. philjourn.* 17. p. i5a.

G. Don nat. syst. 3.p. 84^.*LindL nat. syst.* 221. — Ericineae
Rhodoraceac *DC. théor. clém. ed.* 1. p. 217. — Rhodoraceae
Kent. tabl. 2. p. 449. — *Rhododendra Juss. gen.* i58.

Corolla? deciduae. Discus hypogynus glandulosus saepius esquamatus. Capsularum valva3 marginibus introflexis et ided septa bilamellata et dehiscentia septicida. — Gemmae florales saepius squamosae.

Subtrib. 1% *RHODODENDREJE.*

Corolla gamopetaia, petalis nerapè plus minus concretis.

XXXVII. BRYANTBUS S. G. *Gmelinfl. sib.* 4. p. i33. — *Bryanthi* sp. *D. Don in Edinb. phil. journ. n.* 17.p. 160. *G. Don gen. syst.* 3./>. 833.—'Menziesias sp. Swartz. *Pursh.*—*Andromeda* sp. *Linn. Pursh.*—*Erica* sp. *Thunb.*

Calyx profundè 5-partitus lobis imbricatis. Cor. ultrà medium 5-flda patens. Stam. 10 corollâ breviora, filam. planiusculis glabris , anlhcbris brevibus muticis poro dupiici terminali dehiscntibus. Stigma obtusum. Capsula 5-locul. 5-valvis septicido-dehiscens. Semina ooovoida lucida raphe carinalâ donata (lon). — Suffrutices procumbentes semperfurentes boreales habitu Phyllodocis. Folia sparsa patentia margine denticulata linearia obtusa. Flores ad apices ramorum solitarii aut subcorymbosi. Cor. rubentes.

z. B. GMELINI (D. et G. Don 11. cc.),ramulis prainosis, pediceilis elongatisapice corymbosis glandnlosis t antberis muticis, stylo filifonni. j in Kamtschatkà, ad portum Ochotsket in insnlâ Beiring. Menziesia bryantha Swartz trans, linn, soc. 10. p. 378. t. 30. f. b. Smith in Rees cycl. v. aa. n. 6. Andromeda bryantha Linn. mant. a?ift. Pall. fl. ro»9. p. 57. I. 74. f. 1. Erica bryantha Thunb. disH. n. 8. Bryantha rcpens, etc. Gmel- sib. 4. p. i33. t. 57. f. 3. Flores rabri variant 4-5-6-meri ex Gmel.

XXXVIII. PHTLLODOCE R. A. *Salisb. parad. lond.* n. 36. *D. Don in Edinb. phil. journ.* 17.p. 160. 6'. *Don gen. syst.* 3. p. 833.—Menziesia sp. Swartz.—Andromeda sp. *Linn.*—Erion sp. Willd.

Calyx 5-partitus, lobis saepius acuminatis. Cor. ovala ore contracta 5-dentata. Stam. 10 inclusa, filam. tenuibus glabris, antheris filam. duplo brevioribus truncatis muticis apice biporosis. Stigma peltatum 5-tuberculatum. Capsula 5-locul. 5-valvis septicido-dehiscens. Semina 00 compressa lucida.—Suffrulices boreales ericoidei humiles semperfurentes. Folia sparsa patula linearia obtusa, ulrinquè viridia, margine subdenticulata. Pedicelli terminales, imnc solifarii, nuncsubumbellati, i-flori. Cor. ca2rulea3 aut purpureae. — Genus à Daboecia tan tûrn distinclum numero partium quinario, antheris brevioribus et stigmata peltato.

- i. P. TAXIROLiA (Salisb. par. lond. t. 56), peilanculis piloso-glandulosis, calycinis lobis lauceolatis acuminatis, antheris triplo filamento glabro brevioribus, /Jin ericetis siccis paludosis Scotiae, Groenlaudiae, Lapponiae, Sibiriae, America; boreal. Labradoriae, montibus albis Amer. bor. (Boott!), Pyrenaeis prope Bagnères de Luchon (Munby). G. Don gen. syst. 3. p. 813. f. *ij*. Andromeda taxi folia Pall. fl. ross. 54. t. 72. f. 2. Linn. fl. lapp. ed. a. p. i33. t. 1. f. 5. OEd. fl. dan. t. 57. Andromeda caerulea Linn. *p. 5(i3. fl. lapp. ed. 1. p. i65. t. 1. f. 5. Erica caerulea Willd. sp. 2. p. 3pH Menziesia caerulea Swartz trans, linn. soc. 10. p. 377. t. 30. f. a. Smith engl. bot. t. 2469. Lodd. bot. cab. t. 164. Erica arctica Waitz. ex Steu<J.—Gniel. sib. t. 67. f. a. Variat floribus caeruleis purpureis aut ex cl. Pursh in America rubris. (v. s. sp.)
- a. P. PALLASIAXYA (D. et G. Don II. cc.), pedunculis floccoso-tomentosis et piloso-glandulosis, cal. lobis ovalo-lanceolatis acuminatis, antheris filamento pnbescente sesquibrevioribus. 3 in insulis Sitcha et Unalaschka. Andromeda caerulea f. viridiflora Pall. herb, ex Don. Menziesia Aleutica Spreng. syst. a. p. 303. Cham! in linnaea 1. p. 515. Bongard veg. sitch. n. io3. t. 3. Cor. virescentes (Mert.) albae (Cham.) orceolatae. Folia conferta nervo raedio crasso pnvlnvernlento. (v. s. sp. à cl. de Chamiso.)
3. P. KMFETRIFORMIS (D. et G. Don II. cc), pedunculis sparse glandulosis, cal. lobis ovali-oblongis obtusis glabris, antheris filamenti glabi longiludini aequilibas. 5 in America boreali. Menziesia empetriformis Smith trans, linn. soc. xo. p." 280 et in Rees cycl. v. 32. n. 5. Grah. new Edinb. pbil. journ. i83a. jan. Hook. bot. mag. t. 31J6. Corollae campannatae pallide rubrae.

XXXIX. DABOECTA D. Don in Edinb. philjourn. 17. p. 160. G. Don gen. syst. 3./>. 833.—Boretta Neck. clem. n. 351. —Menziesiae sp. Juss. DC.—Erica sp. Linn. —Andromedae sp. Linn.— "Vacciniisp. Huds.

Calyx 4-partitus lobis acuminatis. Corolla ovata ventricosa , limbo 4-dentato. Stam. 8 inclusa, filam. vix dilatatis glabris, antheris I in ea rib vis filam. longitudinem sequuntibus basi sagittatis apicc muticis poro obliquo dehiscentibus. Stigma obtusum. Capsula ovata hispida 4-locul., 4-valvis, valvis margine introflexis septicido-dehiscens. Semina 00 ovata. — Suffrutex occidentalis Europaeus sempervirens crecctus ramosissimus ericoideus, in parte superiore setis glandulosis hispidus. Folia ciliplata plana aut margine revoluta, subtiis albo-tomentosa. Flores pedicellati in racemos elongatos subsecundos dispositi purpurei.

1. D. poiFOMA (D. et G. Don II. cc. et brit. flow. gard. ser. 2. t. 276), \$ in ericetis lurfosis Europa j occidentalis nempe in Hibernia freqaens , in Andagari& rario, in demissioribus Pyrenaeis occid. fieqnens. Andromeda Daboecia Linn, syst. 406. Erica Daboecia Linn. sp. 5og. Smith engl. bot. t. 35. Menziesia polyfolia Juss. ann. mas. 1. p. 55. t. 4. f. i. Gray brit. arr. 2. p. 397. Andromeda montana Salisb. prod. ago. Menziesia Dabeoci DC. fl. fr. 3. p. 674. "Vacciniuin Cantabricum Hnds. aDgl. ed. 1. p. 143. Vulgo in Hibernia dicitur St. Dabeoc's Heath sen Irish heath, (v. v. sp.)

XL. MENZFESIA Smith icon ined. 3. n. 56. Salisb. par ad. lond. n. 44. D. et G. Don gen. syst. 3. p. 850 non Baumg.—Menziesiae sp. Juss. Pursh, Spreng.—Candollea fiaum. cat. hort. non Labill.

Calyx campanulatus 4-fidus aut 4-dentatus. Cor. tubulosa autglobosa, limbo brevissimo 4-dentato revoluto. Stam. 8 à corollâ libera inclusa , ft lam. subulatis glabris, antheris basi muticis bilocul. apicc poro obliquo apl & i dehiscentibus Stigma obtusum apicu lignosa 4-locul. 4-valvis , valvis margine introflexis septicido-dehiscens. Placenta 4-loba. Semina scobiformia. — Frutices boreali-Americanici. Folia al-

terna menibracea brcviter petiolata subtiis glauca margine Integra. Pedicelli terminates plurimi i-flbYi nudt nutantes. Cor. sordidè alhido-rufescentes.

^Y *Foliis deciduis pilosiusculis.* — Menziesiae verae.

1. M. FERRUGINSA. (Smith icon. ined. 3. t. 56), ramulis pediceliisqne hirtellis, foliis obovato-lanceolatis ciliatis, suprà sparse, subtiis secis nervam birtellis a pice glanduià apicnatis, calyce 4-den ta to, coroJlå urceolata: <J in America; boreal is tractn occidental! (Menz.), ad Coin mbia-river (Lewis , Douglas!) et in ins. Sitcha (Bong.). Pursh fl. bor. am. i. p. '264. Kong. veg. Sitch. n. 102. M. urceolaris Salisb. parad. lond. t. 44* Cor. ferruginea: (v. s.)
- a. M. GLOBULARIS (Salisb. parad. lond. n. 44. in adn.), ramulis pedicel Usque pilosiusculis, foliis ovali-ianceolatis ciliatis suprà sparse subtussecùs nervos birtellis, apice glandulA apiculatis, calyce 4~£do, cor. globoså. j in montibus altis Virginiae et Carolina:, abundè ad monies Cacapon prope Winchester (Pursh). M. Smithii Michx fl. bor. am. 1. p. s35. M. ferrnginca var. £ Sims bot. mag. t. 1571. Candollea azaleoides Bauin.! cat. hort. M. Jilosia Juss. ann. mus. 1. p. 56. Guimp. abb. holz. t. 27. Pers. enh. 1. p. 420. Azalea pilosa Michx in Lara, journ. h. nat. 1. p. 410. Lam. ill. p. 4<4. Cor. flavidò-ruffe, (v. y. c. in li. Monsp. et a. sp. comm. sine nora. à cl. Michx.)
- ** *Foliisperennantibus glaberrimis.* — Menziesiae spuriae (forte excludendoe).
3. MP Triflora (Dertero! herb. Spretig. syst. 2. p. 202), ramulis pedicellisqne glabris, foliis ovali-lanceolatis utrinquè glaberrimis, pedunculis lateralibus brevibns 3-floris , calyce 4-dentato, cor. cylindracea acutè 4-loba. _{k5}^{uu} _{mon-} tibus Jamaicac (Swartz, Bert!). Andromeda octandra Swartz fl. ind. occ. K40. Erica indiciv Waitz ex Steud. Flores pavvi albi nutantes. Fructus quoad dehiscent iam non satis notns et idéo genus dnbium. (v. s. sine fr.)

-j- *Species exclusae.*

- M. ALEUTICA Spreng.= Phyllodoce Pallasiana.
 M. BRUCKENTHALII Baumg.= Bruckenthalia spiculiflora.
 M. BRTANTHA vSwartz. == Bryanthus Gmeini.
 M. CTERULEA Swartz. =. Phyllodoce taxifolia.
 M. DABFOCI DC.— Daboecia polifolia.
 M. EMPETRIFORMIS Parsh. = Cassiope Stelleriana.
 M. EMPETRIFORMIS Sni. =Z Phyllodoce empetriformis.
 M. FOI.TF0riA Juss. = Daboecia polifolia.

XLI. LOISELKURIA Desv. journ. bot. 3. (T813) p. 35. Ram. et Schult. syst. 4. p. xxiv.n. 705. —Chamaeledon Link enum% 1. (i8ai)/>. 21 r. — Chamn?cislus Gray brit. arr. 2. (1821)/?. 401 non Don. — Azalea Gcertn. fruct. 1. p. 3oi. t. 63. D. et G. Don gen. syst. 3.p. 851 non Desv. — Azalea; sp. Linn.

Calyx 5-parlitus, lobis aequalibus. Cor. subcampanulata 5-fida sequaiis. Stain. 5 à corollâ sublibera aequalia recta corollâ breviora, anther is subrotundis ab apice lateraliler dehiscentibus. Ovarium subrotundurn. Stylus brevis rectus inclusus. Stigma capitatum. Capsula 2-3-locuI. 2-3-valvis, valvis ab apice dehiscentibus et bifidis. Semina numcrosa ovata, ininimè alata uec appendiculata. — Sufl'rutcx ramo-sissimus procumbens. Folia opposita petiolilata persistentia elliptica integerrima margine revoluta glabra. Pedicelli terminales solitarii i-flori. Cor. ex albo roseae.

z. L. PROCUMBENS (Desv. 1. c.). J in apiicis rapestribus inontanis imu alpinis

Enropae, in Pyrenaeis, Alpibus, iuontanis Anglic, Lopponise, Tilandia; (Hook.), Groenlandiae (Gies.), Labradorise (E. Mey.), Terne novae (Lapyl.!) etc. in Sibiria et in Americā bor. Rnipes quasi tapetara induit. Azalea procum bens Linn. spec. 1. p. 83a. fl. lapp. 90. t. 6. f. 2. OEd. fl. dan. t. 9. Pall, fl. ross. t. 70. f. 3. Smith fl. brit. 1. p. a3i. engl. bot. t. 865. Gaud. fl. helv. a. t. 143. Lodd. bot. cab. t. 762. Lodd. arb. n54. f. 964. Chamaelodon procumbens Link 1. c. Chainaecistns serpyllifolias Ger. em. 1284. Gray 1. c. Chamaelostas vii. Clns. hist. ^5. ic. iuf. (v. v.)

N. B. Azalea tomentosa Duroi hujas dicitar varietas sed mihi oninino obscura.

XLII. OSMOTHAMNUS.— Azalea sp. Adams.

Calyx 5-fid us, lobis subovatis. Cor. hypocrateriformis regularis, tubo suprà medium gibbo, lobis patentibus subrotundis. Stam. 5 corollse non adnata intrà tubum inclusa, anth.-subrotundis apice dehiscentibus. Ovarium subrotundum 4-suicum. Stylus brevis inclusus. Stigma capita turn obtuse 4-lobum. Capsula subelobosa 4-l^oc^e 4-valvis. Semina numerosissima linearia. — Frutices Sibirici erecti ramosK Folia alterna persistentia coriacea peliolulata ovala runcronulata % superne glabra, suoliis et in pectio ferruginea, fraganti-aromatica (undè nomen). Flores ad apices ramorum conferli subumbellati, breviter pedicellali, albi aut rosei. Gemmoe floralis squamae ciliatoc. — Genus medium inter Azaleam et Loiselcuriam, à priorc flore regulari genitalibus inclusis et capsulâ 4-locul., à posteriore corollâ hypocrate-nibrini capsulâ 4-locul. et seminibus linearibus diversum.

- I- O. FRAGRAIS, corymbis io-i5-floris, corollis reticulato-pictis. A in alpestris ad ostium Lenae (Ad.), inter Ircutiam et Ochotiatn (Scheleckow!). Azalea fra grans Adams mem. sou. mosc. 5. p. 92. Roe in. et Scbult. syst. 4. p. 379 non Raffn. Azalea multiflora Turcz.! in litt. 1834. Odor suavis Matricariae Chamomillae. Cor. rosea venis reticulatis *nicta* (Turcz.)* (v. a. à cl. Turczanow.)
- a. O. TAXLIDUS, corymbis 7-6-floris, cor. aeniis. #5 in rupibus Alpium Baicalensis legit cl. Turczaninov. Azalea pallida Turcz.! in litt. An prioria var. ? sed cl. inventor ex vivo distinxit. Ex eo odorem ingratum spirat. Cor. alba pauco suffuso rubore, aenia. (v. s. à cl. Turcz.)

XLIII. AZALEA Desv.journ. bot. 3. (1813)/>. 35. Rccm. et Schult. syst. 4. p. 78.
Link enum. 1. p. 209. Lindl. nat. syst. *ii. — Theis Salisb. in coll. 1H17. — Azalea? sp. Linn, etphtr. auct. — Rhododendri sect. Pentanthera G. Don gen. syst. '\$p. 846. — Anthodendron Reichenb.fl. exc. i.p. 416.

Calyx 5-partitus. Cor. infundibuliformis irregularis, 5-loba. Stam. 5 cum corollâ non concreta. Anlb. apice biporosac. Stylus elongatus, cum staminibus exsertus, apice non sensim incrassalus. — Omnia ideò Hhododndri sed flores constanter et regulariter penlandri et folia decidua.—An potiis sectio ex speciebus Rhododendri nonnullis stam. 5-9 gerentibus et hybridis facillimè in borlis inter horum generum speciebus arte fabricatis?

* *Americana.*

a. *Corymbis foliosis.*

1. A. viscosa (Linn. sp. 214), ramulis hispidis, foliis oblongo-obovatis acutis utrinquè glabris concoloribus setoso-ciliatis nervo subtus adpresso setigero, corymbis foliosis, corollis piloso-viscosis, tubo laciniis duplo longiore, calycis dentibus brevissimis rotundatis, filam. breviter et stylo longè exsertis. # in

paludosiset umbrosis sylvis Americas bor. à Canada ad Carolinam. Rhododendron viacosoinToiT.fl. i. p. 4*4. ** Don gen. syst. 3. p. 847- A. fragransRaf. anu. p. 1a, non Adams. — Catesh. car. 1.1. 57. Floret aduhis foliis. Cor. odoratac alb;e(Meerb. icon. t. 9), nut. var. rubrae (Lodd. bot. cab. t. 44 r. Rhododendron venustum Salisb. prod. '287?), et ex his coloribas variae. (v. v. < et s. sp.)

* *ornata*, pedunculis villoso-viscosis, cor. extus piloso-glaucosis lateis, flammatis, roseis, incarnatis aut ex his coloribas variegatis, tubo vix limbi longitudini a?quali. 5 Hybrida ex A. viscosa ab A. Ponticā fecundatā. Rhododendron ornatum Sweet brit. fl. gard. ser. 2. t. 137. Azalea Pontica-rubescens Gowen ined. Rhododendron visoosum ornatoria G. Don gen. syst. 3. p. 84. Cor. ferè Nyctaginis Jalapsc magnit.

2. A. GLADCA (Lam. ill. p. 49^-. t. no. f. 2), ramulis hispidis, foliis obovato-oblongis acutis ciliatis utrinquè glabris subtus glaucis, corymbis foliosis, calybris lobis hrevissirois rolnndatis, co rollis piloso-viscosissimis, tubo lobis dnplo longiore, genilalibas exsertis. £ ^{ia} uliginosis argillosis Amer. bor. à Novæ-Angliæ ad Virgiaiam. Pursh fl. 1. p. 154- Willd. enum. 197. Az. viscosa glanca IVfichx.fl. am. r. p. 151. Willd. sp. 1.p. 83a. Rhodod. glaacnm G. Don gen. syst. 3. p. H48. Rhod. viscosum glaucum Torr. fl. 1. p. 4^5. Flores albi odori. (v. v. c.)
3. A. HISPIDA (Parsh fl. bor. am. 1. p. x54), ramulis hispidis, foliis lanceolatis ufrinque acuminatis suprà hispidis subtus glabris utrinquè glaucis ciliatis, nervo medio subtus hispido, corymbis foliosis, pedicellis glandulosso-pilosis, corollis viscosissimis Inbo lobis vix.longiore, calycis dentibns oblongis ohtn.sis, genitilibus exserlis. ;5 in Noveboraco et Pensylvaniæ in littoribus lacuum, ad roontes cxrnleos America? bor. Wats, dendr. t. 6. ex Loud. Rhododendron hispidum Torr. fl. 1. p. 425. Loud. arb. 1144. f. 948. Azalea viscosa var. glanca Ait.? Flores albi, rabro marginuti, lubo nibescente. (v. s. c. in horl. Liverp.)
4. A. ARnREscKHS (Pnrsh fl. bor. a in; 1. p. 153), ramulis glabris, foliis obovatis oblusis utrinquè laevibus subtus glaucis margine ciliatis, uervo subtus fere |xvi|rorymbo folioso, cal. lobis oblongis acutis, cor. lubo nou viscoso lobis longiore, gtnitalibns exsertis. J 5 ^m rivnlis America; bor. ad montes caerulcos Pensylv. Rhododendron arborescens Torr. fl. nn. st. 1. p. 426. G. Don gen. syst. 3. p. 847. Flores arapli rosei. (v. ».)?
5. A. NITIDA (Parsh fl. bor. i.am. p. 153), ramulis gl.tbriscnf.s, foliis oblancen-latis parvis sabmucronatis coriaceis ulrinque glabris suprà nitidii, margine revolulo ciliatis, nervo subtus setigero, corymbo folioso, cal. deniibus brevis-simis, cor. tubo piloso.glandnloso lobis longiore. ^ in paludosis muscosis mon tin in 'Virginia; et Pensylvaniae. Lindl.bot. reg. t. 414. Rhododendron nitidum Torr. fl. iin. ». 1. p. 4*5. G. Don gen. syst. 3. p. 847. Iu specira. meo ra-rnuli hispidi. (v. s.)

b. *Corymbis nudis*,

G. A. NUDIFLORA (Linn. sp. 214), ramulis sobhispidis, foliis oblongis acotis basi angastatis ciliatis (excepto nervo medio paginae inf.jglahris, corymbo terminali foliis non cincto ante folia ant cum iis evoluto, calyce brevissimo, corollis extiis pilosiusculis non viscosis, genitalibus exsertis. ;5 ^m sylvis et collibus America! bor. à Canadâ ad Georgiam. Rcer. et Schult. syst. 4. p. 375. Deiaun. herb. amat. t. ill. Azal. periclymenoides Miehx.. fl- r. p. 151. Azal. pericly-mena Pers. enh. 1. p. 213. Rhododendron nudiflorum Torr. fl. r. p. 424. G. Don gen. syst. 3. p. 84. Species quoad colorem mirè varians et eliainsub-monstrosa evadens. Vmètates 44 cnumerat cl. Loud. hort. brit. p 66. (v. v. c. et 9. sp.)

4. *coccinea* (Cnrt. hot. mag. t. 180), corollis coccineis. — in Georgiâ sylves-tris prope Savannah. (Pnrsh.)
&> *rutilans* (Ait. kew. ed. 'j. vol. 1. p. 3 ly), corollis intense rubris. An satis differ I Rb. nudiilorum scintillans bot. mng. t. 3667. bot. reg. t. 14G1.

- y carnea* (Ait 1. c), corollis cai neo-roseis tubo basi rabro , cJycibus folia-ceis.— Lindl hot reg. t 120
£ rubra (Lodd bot. cab t 51), corollis intensè roseis.— Meerb. ic. t. 8
f. mixta, corollis palhde roseis, lobo infer latioie intùs flavicante, calyci-bus minatis
£. papilonacea, corollis rnbicundis lobo infer, albo, calycibus foliatei*
f. alba (Ait. 1. c), corollis albis
v. partita (Ait. 1. c), corollis cirneis ad ba&in usque quinquepartitis.
A. polyandra (Pmsh fl. bor am 1. p. i5a), floribus roseis 10-20 andris,
ciica Philadelphiam. Potius, ut precedens , mo as tram quam var
vera
1. *thyrsiflora* (Lindl bot reg t 1367), flonbus intense rubris am pi is
non visco&is in tbyrsum dispositis — Diritnr ex serainibas A coenese
oita
7. *A. SPECIOSA* (Willd enum. suppl p. 10), ramulis pilosis, folns lanceolatis ci-
liatis utrinque acnminatis, corymbis subnudis, cal. pnbescente, corollae senceae
lobis obtasis cihatis andnlatis, staminibus exsercis J in Amer. bor ? An A
nudiflorse sen calendnldcese vanet ant hybrida progenies? Rhododendron spe-
ciosnm G Don gen. syt.t. 3 p. 848 Loud arb. 1145 f 950.
£. coccinea, floribus coccineis Azalea coccinea major Lodd bot. cab.
t. 624.
£. aurantia, floribus aurantiaceis. Az speciosa anrantia Lodd. bot. rab.
t. 1255.
8 *A. BICOLOR* (Pursh fl. boi am 1 p. i53), ramulis piloso-hispidis, foliis
oblongis utnnque tenuissime cano-pubescentibns, ner\o non setigero, coryui-
bisnadiis, cal dentibos brevissimis, anà linearì longiore, cor parvis non vis-
cosis tnbo lobis vix longiore, stum, exsertis. 3 ⁱⁿ collibus stenlibns arenosis
Carolina: et Virginia;. Rhododendron bicolor G Don gen syst 3 ^847 Loud
arb 1142 Trew Ehret t 48. Mores palhde rosei fere albicantes/tubo satu-
rate rubro
g. *A. CAEAEHs* (Michx fl bor. am. 1 p i50), ramnhs villosis, foliis obovato
oblongis acutis basi attenuate supra glabris margine ciliatis subtus canescenti-
subtomentosis, nervo non setigero, corymbis subnudis, dpntibus cal. brevissi-
mis obtusis , cor tubo non viscoso lobis bieviore , staminibus exsertis j juxta
nvlos Carolina infer. Wats dendr t. 116 ex Load. Rhododendron canescens
G. Don gen syst. 3. p. 848 Plores rosei (v. s. sine fl.)
xo *A. CAXEmuLAf EA* (Michx. fl bor. am c p. T5I), ramnlis snbvilosii,, folm
oblongis mucronatib bají attenuatis ntrinqe pabescentibus margine ciliatis ,
coiymbis subnudis, cal. dentibus oblongia, corollae tubo hirsnto non viscoso
lobis breviore 5 ⁱⁿ Araer. bor. montams in Yiigimárf Caroling, Georgiá?
Rcem. et Scbult. syst 4 p. 375. Azalea nudifloia coccinea Ait. kew 1 p. 302
ex auct angl. Az pontica /S calendulacea Pers ench. t. p a12. Rhododendron
calendulaceumToir fl on. st. 1 p 4a5 Loud aib. 1142 f 946 (v v c ets)
Pluies var. hybiidas profert, mtei quas notanda seqtj
& crocea (Sims bot mag. t 1721), flonbus cioceis..
fl flammea (Ker. bot reg t. 1 |S), flonbns flammeo-calendulaceis.—Icon
t. a 143. bot. reg etiam homonyma fere ad var ^veigit.
y cuprea (Lodd. bot cab. t xiyi), flonbus sordide cupio flammeis
«T *subcuprea* (Lmdl bot. reg. t i366), flonbus spune rnbescentibui,
lobo supenore flavidio — Vid. hybrida ex A nudifloia lubrà et A calen-
dnllaccâ
i fulgida (Hook bot. mag t. 343q.), flonbus obscnre croceU, lobo super.
flavo. — Vid hybrida ex Az. nudiflorâ coccineâ et Az. calendulacea
{. lepida(Lmdl. bot. reg t 140a),floribus albissubioseis, lobo super, flavidio.
Hybrid a forte ex Az n.tida et A. calendulacea.
H. Stapletoniana (Lindl bot reg. t 1407), flonbns pulchrè roseis, lobo

super, flavidō.— *Hybrida hortensis* fortē ex *A. nudiflorā* rubrā et *A. calen-*
lndulacea.

J. *Morterni*, floribus capreo-roseis, lobo super flavidō. *Rhododendron Mort-*
teni Sweet brit. fl. gard. ser. a. t. 10. — *Hybiida* ex *nudiflorā* et *calen-*
dulacea aut nitidā.

** *Gerontogcee.*

11. A. *PoirricA.*(Linn. sp. 1669), foliis obovato-oblongis lanceolatis ciliatis sparsē
 pilosulis, racemis corybomis bracteas decidnas gerentibns, corollis extū pi-
 loso-giutiuosis a foliis non involucratis, geuitalibus exsertis dechnatis. 3ⁱⁿ
 montibos Caucasicis demissioribus infra Rhododendra (Rieb. Stev.'), in Ponto
 «d Trapezontem (D'Urv.¹), m Armeniā, Iberiā (Fisch.¹). Pall. fl. ross. 5i. t. 69.
 Andr. bot. rep. t. 16. Cart. bot. mag. t. 433. Loud. aib. 1140 f. 94a. Az.
 arborea Lin. sp. ed 1. p. i50. *Rhododendion* flavum G. Don gen syst. 4.
 p. 847* Sed *Azalea* flava Hoffmans verz 1862. p. 61. est forte (ex calyce bre-
 vissimodicto)diversa? *Rhod* ponticum Schreb. non Linn. *Antbodendron* pon-
 ticum Reichenb. fl. exc. 1. p. 416.— Buxb. cent. 5 p. 36 t. O9. Flo res aurei,
 variant flavi, amantii, enprei, imo albi fl.tvo nuxti (bot. mag. t. 2383). Cal.
 lobi oblongo-lanceolati inaeqnales pilo&i. Mel ab apibns ex hac elaboratum di-
 citur veoenatum ! (v. s. sp. et v. c.)

* *coronaria*, floribus congestis numerosissimis.— An bybrida ex *A. ponticā*
 et *nudiflorā* e* Sweet ?

*.**j lava*, co roll is flavis. — *Rhododendron* flavum coionariura Sweet brit.
 fl. gard. ser. a. t. 331.

0. *ardens*, corollis ignescentibus. — *Rhododendron* flavum ardens Sweet
 1. c. t. 3oG.

1a. A. *SINENSIS* (Lodd. bot cab. t. 885), ramnlis pilosis, foliis ellipticis acutins-
 culis piloso-pubescentibus margine ciliatis subtū glaucestentibus, corymbis
 multifloris, pedunculis corolli&que pubescentibus, ral lobis bievibus apice
 cihato-pilosis, stam. limbum bubsqnautibus. ^ in Chinā *Rhododendron* Si-
 nense Sweet brit. fl. gard. ser. 1.1. -290. Vaiiat floibus flavis (Sweet), rfut ex-
 tūs subflammeis (Lodd.). Cor. am pi*. Stam. filaments pilosiuscula. Folia i>ub-
 decidua penuinervia.

13. A? *MACRAZTHA* (Bnngē euum. chin. n. a35). foliis oppositis ternisve obova-
 to-oblongis mnciouulatis planis suptā pilis crebnoiibus adpiessis hispidis ,
 floribus terininalibus subsessihbus solitaries, pedunculo brevissimo bracteis
 involuciato calyceque seiiceo-hispido, corolla campanulata profunde 5 fid à
 extūs glabrā ^in frigidams Pekinensibus rulta. Cor. Rhod Indici, seel tioies
 solitarii, folia non villosa. An stam. 5 aut. 10? An eadem ac *A. Sinensis*?

14. A. *PTJNCTATA*(Lour. ooch. ed. Willd 1 p. r3q), ramnlis, folns lanceolatis
 glabris maigine scabris, floribus terminalibus cont^estis punctatis, cor. cam-
 panulatis. ^in sylvis Cochinchui. *Rhododendron* Lonrenianum G.Don gen.
 syst 3. p. 846. Flores albi Calyces, corolla*, antherae et ovarinm punctis 111-
 bns pnctata. Cal. 5-partitus. Caps. 5-loc

15. A. *MOLLIS* (Blum bijdr. 853), ramulis pilosis, foliis oblongo-lnnceolatis
 acutis basi angustatis ciliatis mfiā mollissimis, floubus fasciculatis, calyce
 brevissimo , cor. tubo externè seiiceo-tomentoso. fy in Chioi). Caet. ign

16,A *DECOMBhNs*(G. Don gen. syst. 6 p. 846sub *Rhododendio*), caulibus decum-
 bentibus, foliis ovatis aculis , floibus...., cal. lobis ovatis acutis ciliatis. £ in,
 Chinā. Flores pentandri kermesini

• Species via: notes.

- A. *HIVEA*. (Dehn. hort. cam. cat. p 17).
- A. *FIMBRIATA* (Dunt. Cours. bot. cult. ed. 2. v. 3. p. 337)
- A. *XUGI* ibid
- A. *PURPUREA* ibid,
- A. *viiTATA* ibid.

F' F' Species exclusae.

- A. ALBI Blum. = Rhododendron album.
- A. CELEBICA Blam. = Rhododendron Celebicnm.
- A. FRAGRANS Adams. = Osmothamnus fragrans.
- A. HYBRIDA BNNEANDRA Lindl. = Rhododendron enneandrum.
- A. TNDICA Linn. = Rhododendron Indicum.
- A. INDICA ALBA Lindl. = Rhododendron ledifolitum.
- A. JAVANICA Blum. = Rhododendron Javanicum.
- A. LEDIFOLIA Hook. = Rhododendron Ledifoliuin.
- A. MUCRONATA Blum. =? Rhododendron ledifolium.
- A. MULTIFLORA Turcz. = Osinotamnas fragrans.
- A. PALLIDA Turcz rrr Osmothamnus pallidns.
- A. PROCUMBKNIS Linn. = LoLseleuria prouuxnbens.
- A. RKTOSA Blum. = Rhododendron retasum.
- A. ROMARINIFOLIA fium. = Rhododendron Buimunni.
- A. SEYMOURI Lindl. = Rhododendron Seymouri.
- A. TUBIFLORA Blum. = Rhododendron tubiflorum.

XLIV. RHODORA *Duham. in Linn. gen. n. 567.* — **Rhododendri sect. Rhodora**
G. Don gen. syst. 3. p. 843. Loud. arb. 1145.

Calyx 5-dentatus persistens. Cor. calyci adnata ringcns, labio superiore varie v.-5-parti to , infer. latiore bilobo. Stain. 10·rf^qjiiiata, filam. inwqualibus , nntheris biporosis. Capsula 5-locuT.^5-valvis, loculis polyspermis , dissopimentis è rnarginibus introflexis valvularum. — Frutex uorecali-Amrcicauus. Folia decidua. Flores pallide purpurei.

1. **R. CANADENSIS** (Linn. sp. 56r), r̄amulis glabris, foliis obovato-oblongis , suprà sparsè pubescenribus, subtùs velutino-canescensibus, floribus ante folia ad apices ramorum è gemmâ squamosâ ortis 3-4 subsessilibus. J in lorfosis Ainericae borealis in Canadâ*, Terrâ novâ, Noveboraco , Pensylvaniâ. Lher.! Stirp. nov. 1. p. itii. I. 68. Lam. ill. t. 3⁴. Curt. bot. mag. t. 474. Guinip. abbild. holz. t. 14. Rhodora congesta Moench. Rhododendron Rhodora G. Don 1. c Rhod. pulchellum Salisb. prod. 287. Flores pall id i purpurei, valde quoad incisuram variantes nempe labii 3 et 2, seu 4 el 1 lobis donalis , im6 corollae hinc indè subpolypelala;! (v. v. c. ets. sp.)

LV. RHODODENDRON *Linn. gen. n. 548. Schreb. gen. n. 746. Gaertn. fr. 1. p. 304. t. 63.— Rhododendron et Rhodotbamuus Reichenb. fl. exc. 1. n. 417. Lindl. nat. syst.p. aai. — "Vireya Blum, bijdr. 854- G. Don gen. syst. 3. p. 848 non Rafin. nee Gaudich. (1) — Rhododendri sect, I-VI G. Don gen. syst. 3. p. 843.*

Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformis rariis campanulata aut rolata , nunc regularis nunc plus miniis irregularissemper 5-loba. Stam. 10 (rariis aborta 6-9) corollae non adnata ante et inter lobos sita , sspiiis declinata exserla. Anlhcrea poris 1 terminalibus dehiscentes. Capsula 5-locul. 5-valvisautin sect, priñâ 10-locul. 10-yalvis septicido-dehisceus. Semina axi coJumnari angulato adnata, compressò-scobi-

(1) Vireya Raf. = Dalbergaria Tuss. et ideo' videtur AHoplecti sp. — 'Viraya Oaudich. (etiam cl. Yirey dicata) est Leptorhyncbi sect.

formia subulata.—Frutices rariū arbores. Folia sempervirentia petiolata integerrima. Flores in corymbos terminales dispositi. Alabastra floralia squammosa. Cor. conspicuae purpureae albas aut (lavs.

Sect. I.BDRAMIA.—Booram *G. Don gen. syst. 3. p. 8i4**

Calyx 5-lobus. Cor. campanulata, tubo brevi. Ovarium 8-io-loculare (loculis nempē tot quot stamina) axi post dehiscentiam cristulis 8-10 longitudinalibns aucta.—Species Indicae. Folia coriacea sempervirentia.—An genus proprium ob capsulae loculos petalorum numero daplos nee iis sequales nt in sect, seqiuentibas?

1. R. ARBOREUM (Smith exot. bot. n. 6), caale arboreo, foliis lanceolatis glabris subtūs lepidotis micantibus, floribus coufertè corymbosis, ovario pubescenti-tomentoso 8-io-loculari., 5 in India; or. montibus Hymalaianis. Wall. list, n. 755. D. Don prod. fl. nep. z54. Lindl. bot. reg. n. 890, 1240 et 1982. Hook. exot. fl. n. 168. bot. mag. n. 3290. Arbor speciosissima varietates et stirpes hybridas pi a res in naturā sylvestri et in hortis exhibens.

et. puniceum, foliis subtūs pube adpressa* velatino-argenteis, corymbis confertis capitatis, cor. segmentis' apice subbilobis crenatis subundulatis. /in Indiae montibus Sewalicis propè Narrain-hetty ubi dicitur Bourang, Boovans seu Booram. R. arboreum Sm. in Rees cycl. v. 30. Hook. exot. fl. t. 168. Lindl. bot. reg. t. 890. Rh. pa a ice am Roxb. fl. ind. 2. p. 409. Boorans Hardw. trans, asiat. soc. 6. p. 359. Cor. puniceae seu intensè rubro-kermesinae. (v. s. sp.)

0. *roseum* (Lindl. bot. reg. t. 1240. Don in Sweet brit. fl. gard. ser. 2. t. 339), foliis subtūs ferrugineis, floribas roseis.[^] in Indiae or. montibus SLieopore. Ab hoc nisi foliis magis ellipticis non differre videtur R. Nilagricum Zenk. pi. Ind. p. et t. i5 in locis nudis veutosis circā Utacamundam observatum. (v. s. s.)

y. *album* (Wall. hist. n. 755. pi. as. rar. 2. p. 23. t. 123), foliis subtūs ferrugineis, floribas candidis intū supernè purparo-punctatis. /in Indiae or. monte Sheopore alt. 10,000 ped. suprā mare cum var. roseā legit cl. Wallich. Lindl. bot. reg. t. 1684. Hook. bot. mag. t. 3290. D. Don ft. nep. prod. i54. Ann. fl. et pom. 1833. p. 284. ic. Rh. album Hamilt. mss. Sweet brit. fl. Gard. ser. 2. t. 148. G. Don gen. syst. 3. p. 844. Stam. alterna ex Sweet ad basin filiam. appendiculata dicuntur. (v. s. s.)

< *cinnamomeum* (Lindl. bot. reg. t. 1982), foliis subfuscis cinnamomeis, floribas candidis purpuro et flavo macuiatis. / in Nepaliā. Rh. cinnamomeam (an arborei var?) Wall. list. n. 760. G. Don gen. syst. 3. p. 844. Var. priori valdè affline.

* *uttdulatum* (D. Don in Sweet brit. fl. gard. ser. 2. t. 340, foliis lanceolatis neutis undnlati utrinque glabris viridibus, co roll is purpureis flavo-maculatis. & Hybridum ex Rh. arborei var. hybrid! quādam à R. Pontico fecundata.

#* *venustum* (D. Don brit. fl. gard. ser. a. t. 288), foliis elliptico-oblongis subtūs ferrugineis, floribas roseis in corymbum am plum dispositis campa-nula tis, lobis emarginatis crispatis. 5 dicitnr hybridum hortense ex seini-nibus Rh. Caucasici à Rh. arboreo-fecundatis.

*** *Altaclerense* (Lindl. bot. reg. t. 1414), foliis lanceolatis utrinqāe attenaatis glabris subtūs pallidè subferrugineis, floribus laxiūs corymbosis, cor. campa'nulatis medio ad fancem parcè punctalis, lobii obtusis sub-emarginatis. 3 hybridum in horto Altaclerensi (Carnarvoniano) arte factam ex Rā. arboreo et specie quādam Americanā. Rh. arboreum Alta-clerense Hook. bot. mag. t. 34a3.

**** *Smithii*, foliis elongato-lanceolatis acutis, junioribus viscoso-villosis subtūs albo-tomentosis. 3 hybrida in hortis Anglicis nata ex R. Pontico à R. arboreo fecundato. Rh. Smithii Sweet brit. fl. gard. ser. a. t. 50. Rh. Ponticom Smithii G. Don gen. syst. 3. p. 843. Flores pulchrè rubri purpuro maculati, lobis obtusis. Capsula? io-locul. dicuntur.

***** *Russelianum*, foliis oblongo-lanceolatis basi obtusis subtus tenuiter tonientosis, junioihius villosis, corollis pamiceis imaiacnatis palentibus.
^> hybridum dicitur ex R. Catawbiensi à R. arboreo (aa potius à R. campanulato?) fecundato. Rh. Rasseliam Sweet brit. fl. gard. 6er. 2. v. x. t. 91.

2. R. FORMOSUM (Wall. pi. as. rar. 3. p. 3. t. 207), foliis lanceolatis obtusis supra Incidis subtus corollisqne extus lepidotis, floribns paucis terminalibns, calyce niimimo vix lobato, cor. subcainpaunlatae tabo angaloso, filam. villosis. /) in montibus Slllet Bengali orientalis confinibus. Rarai Iseves. Cor. amplae albae purpureo et flavo snbtinctae. Stylus stamina superans. Stigma crassum (Wall.). Ovarium 10-locnl. (G. Don gen. syst. 3. p. 845.)
3. R. BABBATDM (G. Don gen. syst. 3. p. 844), foliis oblongo-lanceolatis acntis h&Bi obtusis snbtus flavicantibas, petiolo nervoqae medio setosis, cal. lobis dillatatis meinbranaceis, fl. glabris, ovario glanduloso-hispido 10-loculari. & in Nepaliâ. Folia spithamea. Cor. intense rubrae, lobis latis rotndatis. |

Sect. 11. HYMENANTHES—Hymenanthes Blum, bijdr. i5. p. 862.

Calyx minimus 7-dentatus. Cor. subcampauulata limbo 7-partito. Stam. 14. OvariQi basi margine tunido cinctum. Capsula oblonga 7-locnl.

4. R. METTERNICHII (Sieb. et Zucc. fl. jap. 1. p. a3. t. 9), fruticosin, foliis oblongis vel obovato-oblongis acutis coriaceis supernè lucidis subtus ferrugineo-roinentosis, ramis terminalibus corymbosis io-i5-floris, calyce rainuto. 3 in Japoniae borealis montibussummis. Rh. maximum Tbanb. fl. jap. 181 excl. syn. Hymenanthes Japonica Blum, bijdr. 86%. Sekki-nan, etc. Kaempf. anioen. 877. Flores majoresquam Rh. maximi pulcherriuiè rosei.—An ex syn. Tbanb. hue referendum R. scab rum G. Don gen. syst. 3. p. 846? Bed. descr. vix quadrat.

Sect. 111. ED RHODODENDRON.—Brachy calyx Sweet. — Ponticum et Lepipherum G. Don gen. syst. 3. p. 843 et 845.

Calyx brevis 54obas. Cor. campanulata. Ovarium 5-locul. — Folia coriacea }er>jsteutia.

5. R. CAMAWLATIUM (D. Don in Wern. mem. 3. p. 409. prod. fl. nep. i53), caale frutescente, foliis ellipticis nincrouatis basi obtusis aut snbeordatis suprà glabris subtòs cinereo-pnvernrentis, pediculis petiolis ovariisqae glabris, floribus coryohosis, cal. lobis brevissimis, cor. carapannlatis lobis planis integerriiis apice rotundatis. 5 iQ Indi-e or. montibus ad Kamaon et Euidnm ex Wall.! cat. 11. 756. Lodd. bot. cab. t. 1944. D. Don brit. fl- gard. ser. a. t. 241. G. Don gen. syst. 3- p. ^kb. Ramuli glabri. Cor. amplae 2 poll, ferè diam. pallidè lilacinae maculis purpureis paucis hinc notatse. (v. s. sp. comra. ab bon. cur. angl. Ind. or.)
6. R. JAVAATICUM (Benn. pi. jav. rar. p. 85. t. 19), frutesceus, foliis ovalibnsnuin- què acntis glabris snbtus punctato-squamulosis, pedancnlis glabris, calyce ob- soleto, corollà infundibnliformi-campanulatâ, limbi laciniis late ohovatis emarginatia. 3 in ins. Javae montibus ad pedem montis Salak (Blum.) ad altit. Aooo ped. (Horsf.). Vireya Javanica Blum. bijdr. p. 35^j. G. Don gen. syst. 3. p. 848. Azalea Javanica Blum, in litt. Cor. sature anrantiacae (Benn.). Caps. 4-locul Hneari-oblonga.
7. R. ALBUM (Blum. cat. b. Boitenz. p. 7a), frutescens, foliis lanceolatis snbtus dense ferrugineo-lepidotis, calyce parvo 5-dentato , cor. snbcampanulatis, capsulâ siliqrcforini 5-locul. 3 " i^{os}- J&vi> montibus Salak supra' arbores (Bl.). Azalea alba Blum, in litt. Vireya alba Blum, bijdr. p. 854. O. Don gen. syst. 3. p. 848. f
8. R. PONTICUM (Linn. sp. 5fo), foliis oblongo-lanceolatis atrinqnè attenuatis glabris subtus vix pallidioribus, corymbis brevibus teriniualibus, cor. campanu- la-to-rotatis, calycis lobis subacutis brevissimis. 3 io Asiae minoria, Iberiae, Ar-

meniae subhumidis umbrosis nec non in Hispaniâ australi ad fretnra Herculeuui circâ Algesiras (Clem. ens. vid. p. 25S. Webb it. hisp. p. 29). Jacq. ic. rar. 1. t. 98. Lam. ill. t. 364. Sims bot. mag. t. 65o. Rhod. speciosam Salisb. prod. 287.—Tourn. voy. 2. p. 99. Flores ampli diam. circ. bipoliicari, purpurei saepè lobo superior punctato-maculato, lobis nunc lanceolatis acatis nunc obtusis. Folia subtùs pallida aut subferraginea. Flores demùm crystalla saccharina fondant, (v. v. c. et s. sp.)

)2. *Lowei* (Loud. arb. 1 i3i)_f corollis albis segmentis super, paucis seal latin is maculis notatis.—in hortis. R. *Lowei* gard. mag. xi. p. 199.

y. *hyacinti/Zorurn* (*Ann. fl. etpora.* 1830. p. 362. *ic. floribus plenis* 15-lobis. *£ in hortis.*

Aiv ^ mytofoKum (Don I.e. Load. arb. zx3i), foliis floribnsque nūnoribus. j
 cui^a* *Gibraltarlara* (Pall.) in Lusitania^c circa La Serra de Moncbiqae (Alst.).
 'iibli ^" m^y r^t f^o ^ u^u l Lodd. bot. cab. t. 908. R. Ponticum Pall. fl. russ. t. -29.
 " fig. inf. flor. Folia circ. 2 poll, tantū longa. Cor. diam. vix pollicari pur-
 purascentes immaculati. An potiu suadeute Lodd. Hybridum inter hir-
 sutum et punctatum ?

*¹ f.? *azaleoides* (Loud. 1. c), foliis lanceolatis subdeciduis, cor. lobis valde nn-
dulatis imraacalatis. 3 videtur hybridum bortense ex Rh. pontico ab Aza-
leā cjuādam fragrante fecundato. Rh. *azaleoides* Dcsf, cat. h. Par. 1815
0IW suppl. p. 272. Hoffmansegg verz. 1826. p. 19&. Guimp. abb. holz. t. 15.
sed spec, homonyma Spreng. neu. entd. 2. p. i3i est fortè diversa. Rb.
Ponticum dec id uu in Andr. bot. rep. t. 3ag. Hue etiam pertinepe videtur
. Rh. *odoratum* Lodd. ex Loud. 1. c.

f.? *obtusum* (Don 1. c. Loud. arb. 1 I3I), foliis ellipticis basi subcordatis apice obtusis planis glabris crassis subtus pallidis, floribus coi*yrabosis f squamib alabastri extus villosis, cal. lobis brevissimis. fi in hortis. An hybrida progenies? Rh. *obtusum* Wats, dendr. 2. t. 162. Refert Rb. Catawbiense, sod calycis lobi brevissimi nee elongati. Stam. iilam. villosa. Cor. rosea subbiliata, lobo super, parce maculato. Petioli crassi. An forte R. Catawbiense Sims bot. mag. t. 1671 hue potius quam vero Catawblensi referendum? An etiam R. ellipticum HofTmans. verz. 1826. p. 194? (?; v.c.)

g. R. MAXIMUM (Linn. sp. 563), foliis elliptico-oblongis acutis basi obtosis mar-
gine subrevolutis glabris subtus pallidis aut subferrugineis, corymbis bibrace-
mosis, cal. lobis ovali-oblongis obtusis, cor. campanula[^] lobis apice rotunda-
tis. £) in Amer. bor. à Canada ad Carolinam sectis rivulos et lacus. Sims. bot.
mag. t. 95i. Lara. ill. t. 364. Schmidt arb. t. iar. Michx. fil. arb. .3. p. 14^-
t. 4. Bigel. med. bot. 3. t. 5i. Rh. procerum Salisb. prod. 287. R. maximum
roseum Pursh fl. 1. p. 297.—Mill. ic. t. 229. Cat. car. 3. t. 17. f. 2. Aibores-
cens. Cor. pallide roseae(imù in var. interdum alba) circ. pollic diam., lobo
super, flavo purpureo aut viridi-pnnctato. (v. v. c. et s. sp.)

y6? *bigener*, foliis basi attenaatis subtus glaucescentibns f cor. pallide roseis, lobis obtusiusculis. 5 Hybridum in hortis Auglicis ex patre Rhododendro maximo et matre Azalea visco&a var. glauc&a teste cl. Herbert. Rh. hybridum *bigener* Lindl. bot. reg. t. 195. Rh. fragrans hortul. Cor. colore et magnit. Rh. raaximi. Folia inargine subrevoluta.

y.? *hybridum* (Hook. bot. mag. t. 3454), foliis basi attenuatis subtus vix glaucescentibus, cor. pallidè purpurascens lobis acutis. f) *Hybrida* progenies hortensis sed origo non satis certa. Flores fragrantes ferè magnit- Rh. Pontici. Folia plana. An fortè *hybriduro* ex Rh. Pontico et Azalea*quada odoratā? an fortè Rh. latifolium Hoffmans. verz. 1826. p. 19⁵ nuc revocandnm?

10. R. PURPUREDM (G. Don gen. syst. 3. p. 84 3), foliis latè oblongo-ellipticis platinunculis aciuis basi oblusis utrinque glabris et viridibus, floribus corynlobosis, cal. lobis oblongis oblusis. 5 in montibus "Virginia; et Carolina ad ^{la}_u^{l111}? rⁱ-pas. Rh. maximum y purpureum Parsh fl. bor. am. 1. p. ^97. EH- ^{s~^tC}5, "... p. 483. Cor. ampl-^c purpureae. Caulis interdum diam. sesquipoll. (Parsh). L^ap-salx ex Sims laeves et calyx foliaceus.

11. R.PUJU.HU(G.Don gen. syst. 3. p. 843), foliis cuneato-lanceolatis planis glabris gradatim basi atrenuatis subtus pallidis, floribus coryrabosis, cal. lobis ovalibus obtusis, segra. corolla; oblongis apice rotundatis.[^] in Amer. hor. Nova Caesarea et Delawaie, in umbrosis paludibus. R. maximum £ album Pursh fl. bor. am. i. p. 297* Ell. sketch i. p. 48f. Flores calbi mi no res quāni R. inaximi.
12. R. MACROPHYLLUM (G. Don gen. syst. 3. p. 843), foliis lanceolatis acutis basi rotundatis utrinquè pedunculisque glabris, floribus corymbosis, cal. lobis brevibus obtusis, ovario setoso. ⁵ in Americae borealis orā occidentali legit el. Meu/ies. Pefioli pollicera longi! Folia 7-8 pollic. Flores albi minores quam R. maximi. Filara. glabra.
- x3. R. CATAWBIKNE (Michx. fl. bor. am. 1. p. a58) foliis breviter ovalibus utriuque rotundato-obtnsis glahris-subtus pallidis, floribus corynibo-so-umbellaiis, eali lobis oblongis elongatis, corollis campauulatis. ^{g'iTi} montibus exceLis Carolina; borealis juxta originern fluminis Catawba (Mitfh.) et in 'Virginiâ' (Pursh). Sirns bot. mag. t. 1671 ? Loud. arb. n35. ic? Flores laetè rnbri (Ell.) seu pal. • lide violacei?"(Sim!)». Flores polius compacte racemosi ex Ell.
14. R. nRACHircARruM(G. Don gen. syst. 3. p. 843), foliis elliptico-oblongis obiasis subttis wibiginobO-tortientosis basi rotundatis, ovarii 5-locul. pedunculisque pilosis, calycis lobis brerissimis rotundalis revolatis callosis. £) in Japoniâ. Petioli semipollic. Folia 3 poll.longa.
15. R. CHRYSANTHUM (Pall. itin. 3. p. 729. t. N. ft 1. ft. fl. ross. p. 44- t. 3o), i foliis oblongis acentiusculis in feme'at teq u at is snpr'a impresso-venosissimis de- • iinuin glabris subtus pallidis, flor. umbellato-corymbosis, alabastri sqnainisju- >> nioiihus extus viliosis demum per&istentibus glabris[^]cal. lobis brevisbimis. ^ in • MJugisfrigilissiniis Dahnriae, Kamtschatkac et Sibiriae. Linn. f. suppl. ?iy. Woody. • tued. bot. 433. t. 149 Rh. aureum Georg. itin. 214. Rb. officinalc Salisb. para d. Loud. t. 80. —Gniel. sib. 4- p. 121. t. 54- Folia feticulala margine subrevoluta-. Contra rliumalismūm decoctūm in Sibfria' celebre. (^v. a. comm. à cl. Turrzaninow.)
16. H. CAUCASICUM (Pa?l. fl. ioss. r. p. 4[^], t. 3i), foliis Jancrōratiai ovalis aut sub- 'o Lovatis suprà ^cnujter veno.sis, subtus adpresjisiuiu ferrngineo-tomentosis biarginne revotut'is, fl. coiybosisj alabastri squainis oblongis concavii. pcrsis > -fentibus, corollis campanlato-infnndibuliformibus. 5 >ⁿ altisbimis Caucasi iratl nives perpetnas Loud. arb. ri36. f. g34. Rh. Caucabenm Sims bot. mag. t. 1145. Caulis d iff us us seu d ecu ni bens. Cor. extus roseae, intus albidas fauce Kij»»onlis-virldibus. (• fi «⁶P')- —'*!..) "
- " ")6. 'itrtunineum (Hook. hot. mag. t. 3422), foliis oblongis, corollis straminris infos fo'lvo-roaculatis. ^ fere mediuiu inter Cancasicum et cbrysanthum et horuin hybrids progenies diceretr si Rh. chrysanthum in hortis, ft-e- quentids. • * !
- y. pukherrimm (Lood. hth. ii36.), foliis oblongis, corollis ntrin-qne roseis. vi<(ttéldr bybridnm ex R. Caneawco et R. arboreo. Rh. pncherriuum ..Lindl.bot/re- t.1820. " " | - ' J I « I " -<• &% Nobleoiijn (Loud. arb. 1136), foliis oblrngis; corollis ntrinquc intense * rosei\$, ^ etiaia hybi i4um Uoillense., a priore vix.dive^nm. Rh. Nobleanum Liidl. hot. reg. t. ,|Uo. f. 1.
17. R. DDWCTATOM (Andr. bot, rep. t. 36), faliiis ovali-lanceolatis ulrinquè acutis glabris subtus punctis resinosis fenhgineJs cnm pedicellis calycibus corollisque pncntatis, floiinhns umbellalo-coi-ymbosis, cal. lobis brevissimis obtusis, corollis infandibuJiformibns lobis ovatis subandulatis. J in montibus Carolina? super, ad orig. »mnis Sav.tnnah. ^ent. hort. ceH. t. i5. Willd. sp. 2. p. 607. Loud. arb. 1137. if 9³[^]. R* Punctat^{mm} minus 'Wats, dendr. 162. f. A. R. minns Michx. fl. bor. am x. p. a5tf. R. parviflorum hortol. Cor. purpurascens a4, fauceia maculis'viridibus panctata. Capsulsc elongatse. (• v. c. et s.sp.)
- (i,maju\$, coiilli\$ uiajoribus rmraaculatis. 5 in hoitis cultum. R. ponctatum fL. Ker bot. reg. t. 3;. Flores pallide rosei. (v. v. c.)

18. R. FERRUGINEUM (Linn. sp. 562), oblongis utrinque attenuatis glabris obtusis, cor. infundibuliformis punctatis. 3 in pascuis et rupibus umbellatis, cal. lobis brevibus Auct. in Cuius c< t. y. ce et P. < l'cell" e. m. o. o. Auct. ad Austriam, in Jura et Pyrenaeis rarum, 4 laque 4 te, nivium perpetuam interdum in planities immo calidas d. 4 lape lacum majorem (Collegno) et lacum Comensem sub Buch ipse vidi! Jacq. obs. 1. p. 26 t. 16. f. 65. — Lob. ic. t. 366. f. 2 Cor. pulchrie coccineo-scarlatina. (v. % sp.) florum floibus albi.. J passim in Alpibus - Hall. helv. n. 1015 f.

a' Lr. 8 IDE ab aliis w. e. b. dit fl. S^ Ser. ^ t. a. 58. Mera varietas, atiam seminibus sajpe servatur. (v. V. sp.)

19. R. HISUTUM (Linn. sp. 5f. 52), folia ab ellipticis rigide ciliatis subtus ferrugineo-punctatis utrinque « Sili, foliibus ^ ^ lat. S, pedicelis setosis, cal. poso-punctatis. 3 ID Alpina ab Austria ad Yalesiam foite ad Dilnhamaln (Vill.) fl. au. tr. f. 8 * simis bot. ina. 1. 1853 Lodd. bot. cab. 1. 479. Clus. 2. 7. — coriace H. mi. P. k. rev. 10, f. ferra § in eo - ile, sed paulo minus, folia minus (v. V. sp. 7) rai elC. In h. us vauatex Don folis flavo-margina-

20. R. — — —

don! „ ramosissimis " i, ramulis undique setosis, foliis ovalibus utnnqo Vlepi- mer! „ r. n. S. i. reuxote lm. finalis subius " ginibusque setosis, pedicellis glo- S, ror. 6---a. o. 8la elp. IL ols. cal. cis lobia rotundas color-tw nud, crenula- lainth. n. c. m. B. analato* tata noa lepxdtd. 5 in Nephlensim monile Gos- " B. ? " B. jo. Q. se. n. b. V. 3. I. *". Suffitex .emiped. Coi. purpurea 2 nia. - W. 1. 8. " 1. fil. ba. al. b. d. b. " a Capsalu aubrotundo-ova? a. (v. s comm. acl. Wallich anno 1851, nnde suspicor hoc esse R barbatum Waif cat. n. 757 non Don.)

ai. R. RETSUM (Cenn. pi. jav. iar. p. 88. t. 20), frnlicosnm, umulis exaspera- llis loins angusté obovatis retasis satius squamalosis, pedunculo pubescente tubum cōioll* angui.to-campanulal'e subaque, geniāhbus exserlw. ^ in al- lumontibos J. « occidentalis (Blum.) in ins. Sumatra ad alt. 3000 ped. (Horsf.).

f. A S f. K. 5. fl. Q. red. caps. S. lobci 5. glau-

21. R. LEPIDOTUM (Wall. cat. n. 758. G. Don gen. ,yst. 3. p. 845), ereclum ramosissimum, foliis oblongis mucronatis baw attenaeL utrmque lepidotis subtus ferrogmew, flonbos x-3 te, mahbus subaggregatis, lobw d1. rotundatis ulia- tlm. Cr. /? t. Jepidototabo bievi limbo pateute lobis lotundatis, slam, filam. lanosis J. n Indiae or montibus excelsis, ad Coss.unthan, Kedarkanta et Kn- maywar tRoy. ill. p. 260. t. 64 f. x). Frutex humilis tortuoso-ramosus glaber. roha submembianacea ?-i5 hn. longa. Cor intense loseaj. PedicelHfiliformes. Jtam. 10. Folia paocissima basi ugide ciliata. (l s abhon. cur. Ind. or.)

22. R. LAPONICUM (Wahlenb. fl. suec 349 G. Don 1. c.), procnmbens divau- cato-ramosum, fohis ellipticis obtusis-ngidis ntnnqae lepidofo-panctatis, flo- iIDUS terminahbs pauris ombellatis, cor. exlns lepidota* tnbo brevi limbo ro- wto lobis subiotundis, stam. filam glabus. 5 in locis dnris elatis Suecia, bor., ^pponiae, Groenlandiae et in America boieah ad Labrador, white mountains et rocky mountains, etc. (Big ' Hook). Hook bot mag. t. 3106 fl. bor. am. a. P. 43 svnbk bot. t. 481. Azalea Lapponira Linu.fi lapp. 80 t 6 f 1. *L clan: 966. Pall. fl. ross a p 5a t 70. f 1 - Gmel. sib 4 t. 55 f. 1. Folia 4-7 «n. longa persistenta Flores rubri Stain, numero vauant 5, 8, 10. (v. s)

23. R. *fl. *fl. ?* (Tum* in ltt* 1834), crecum flexnoso-ramosissimum, foliis, QDiongis ootusis basi subattenuatis coriaceis superneparce, subfuscante fenu- gineo-lepidotis, floribns ad apices xamoium i-3 egemma foliacea ortis, pedicelhs calycibasqoe lepidotis, cor. campanulato-iotatis non lepidotis, slam. ba. bar- batis. 3 in paludosis montinm excels et medior jugi Baccalensis legit c|. Taicza-

- ninow. Kh. nova spec. Stev.! in litt. 1817. Sum. 10 exseita C01 purpurea? lobis rotundatis. Folia 6 lin longa, 1£-3 lata Capsule extus lepidotae AfHne R. lepidoto et lapponico, sed facile diMinctum. (v. s. a cl. Steven et Taicz)
- a5 R. DAHURICUM (Linn. & 56a), erectnm ranio&um, foliis ovah-oblongis sub-mucronulatis glabris utnnqne lepidotis subtus pallidionbus, flonbns ad apices ramorum i-3 e gemmā squamosā ortis bieviter pedicellatis, calyce brevissimo vix 5-dentato, coi campanulato-rotatis non lepidotis, stain, filamentia basi velutims. ^ in &ylvis mpestnbqs et pinetis Sib 1 rise Banaleusis, ad fluin Yene&see Lena et Uda, in desertis Mongolia; Ledeb fl alt a p 96.
4. *sempervi* Tens (Hook bot mag. t. 1888), foliis peisistentibns atioviridibas, cooilis intense purpuieis —R. Ddhnucum atrovirens Kei bot. reg t. 194.
fi. roseum, foliis deciduis, flonbns roseis.— R Dahnricam Pall fl. ross 1 p 47* t. 3a. Andr. bot. iep. t. 4. Curt. bot. mag. t. 636. Lodd. bot. cab. t. 605.— A mm. rath. 181 t 21 (v s. sp.)
y. album, foliis deciduis, floribuj, albis — m sylvis ad Angaram legit cl. Turczaninow Differt a R. albifloro calycis lobis bievissim oblongs foliacis. (v s sp)
- ab. R FARRhRIE (Tate mss. ex Sweet brit. fl. gard. ser. 1. t 95), fiuticosum, ramulis petiolisqne vjlloso-pilosis, foliis coriaceis ovatis obtusis mncronnlatis basi subattenaatis reliculato venosis ntrinqnē hirtis nee lepidotis margine subrecursivis ciliatis, flonbns terminalibns ex gemmā sqnamosā solitams, calyce brevissimo ^-lobo, coi. patente lobis nndalatis. 3 in China FI ores pallide roseoblacini.
- 27 R. TUBIFLORUM, foliis lanceolatis infrà dense feiogineo-lepidotis, calyce par\o 5 dentato, corolhs infundibuliformibus, capsula biliqtidefoimi 5 locul *y in Javae sylvib ahionbns Vireya tnbfiflora Blum, bijdr. 855. Azalea lubifloiar Blum, in litt Flores ooccinei. 'J'
- ^8 R MALAYANUM (Jack mal. misc. n 7 p. 17 et in Hook jonrn. bot. t. p. 369), subarboreum, foliis oblongis ntrinqnē attennatis pnctatis, floribus terminabns e gemmā squamosā ortis, pedicelli: cernuis, cor. tnbo ba\x gibbo. 3 % 5^{in summ mon} te Sugar-loaf orae Bencoolen ins Sumatra Calyx minimus 5-dewtatus. Cor kermesina , lobis apice caUosis An ceite hujus divis ?
- 39 R. CELEBICDM • fohis lato-lanceolatis subtuij tenaissime feriuginco-pnctatis, calyce brevi 5-dentato, corollā mfundibulifoimi, capsulā bihquaformi 5-locul. /) in syhis montosis insnl Celebes Azalea Celebica Blum m litt "Vneya Celebica Blum bijdr. Hores coccinei |

Sect. iv. POGONANTHUM. G. Don gen. syst. 3. p. 845.

Calycis limbns 5-partitus lobis oblongis obtusis foliaceis. Cor. hypocrateriformis turbo tereti ad a pice m mlus villosa, lobis subrotundis. Stam. inclusa. Ovanum 5 lōcu,j SuiTrutex Indicus foliis coriaceis sempervirentibus, flonbus flavis — Sect. vix à prioie diversa.

30. R AHTHOPOOON(D Don mem soc Wern 3. p 409 prod.fl. nep i53), folius ovalibus margue saepe levouitis submucionatis supra glabus subtub fennigineis lepidoto-tomentosis, ramulis pubescentibus, flonbus coiymbosis confertis, breviter pedicellatis, filaw glabiis. £ in India? orient, montibus sunimis ad Kdmaoo, Gossamthan (Wall.¹) ad Choor, Kedarkanta et Lippa in Kanawur (Royle) G Don gen syst 3 p 845 Wall ' cat n. ^5q. Royl ill. p abo t.64. f 2. Loud. arb. 1148 f 954. Suffrntex humilis i-a-ped. Folia 9 lin longa, 5 lin. lata Stam. ex D. Don 5, ex G Don 8, ex ic. Royl. 7 , mihi ign (v. s. sine fl. comm. ab hon. cur Angl. Ind or.)

Sect. v. CHAMJECISTUS G. Dongen.syst 3.p. 845 wov Gray.—Rhodothamnus Reichenb. inMoesl 2 p. 688.^/7. exc. 1, p. 4 ^ . LmdL nat. syst. p. 221. — Rhododendri sect. Rhodothamnus Koch syn. 4-18. — Adodendron Neck. elan, n, 354- — Ledum Mich, non Linn.

Calyx 5 partitus lobis acuminatis persistentibus. Cor rotate regalaris 5-loba.

patentissima Stain. 10 subaequahter patentia. Antli portis oblique dehiscentes. Stigma capita Hym Capsula snbglobosa ant ovata 5-locul transverse lugosa Placentae brevis costae depicso-umsulcata (Reich) Seinina scobifoimia.— Suffulices humiles piocuuibentes ladicantes, ramis adscendentibus Folia ovalia aut oblonga basi attenuata ngide ciliata semperviientia. Pill pleriique apice capitati. Flores terminates solilaui pedicellati erecti. Coi roseas calyce amphores.— Ex cor rotata ad Ledum feie accedit.

3r. R CHAMALisiITS (Linn sp. 56^h), foliis oblongis subtus kcvibus, cal lobis lanreolatis acuminatis, cor. lobis apice calloso-mnchronatis, staruinibus glabiis, capsula globosā, ^ in rupibus calcareis Alpinu et montium Austria?, Caiintbiae, Salii>burgi, lyiolis Cuit. hot mag I 488 Lodd bot cab t 1/(91. Schkubr handb t 1 i7. Hoppe 'cent exs Rhodothamnus Chamaecistns Reich 1 c.— Mich gen 926 t. 106 Chania cistus VIII Clus. hist. 76. ic Cor. diam 9-10 lin., cai neaj (v v c et ss sp)

32. R KAMTSCHATICUM (Pall, fl ross 1. p. 48 t 33), foliis ovalibus subtus reticulato-nervosis, cal lobis oblongis fohaceis, cor. lobis obtusis apice non tallosis, staminibus basi bispidis, capsula ovato-j5entagonA 3 ^n t"frsis ad Kamtschalkam et ins Aleutianas, in Unalascbka (Fisch'), ad montem Makekan (lurcz'), ad in> Banks et P01 t-Ldgecombe ad 01am bor -occid Amencse borealis (Hook). Cor. diam fere sesquipollis. puipureo-iubrac intus purpuro-mgio gultatac. (v. s.)

Sect. vi. TSDTSUSI G. Don gen. syst. 3. p. 845.— Beverinckia Sabl. ined.— Loiseleuiia Reichenb.fl. exc. 1. p. 416 (m adn. gen, Anthod.) non Dcsv.

Calyx 5-paititus, lobis foliaceis oblongis Cor. campanulata. Stam. 10 aut variant inteiduiu 5-q' — Frutices sempevirentes, foliis meuibianaceis bispido-pilosis, floribus puipuiascentibus aut albis

i3. R. INDICUM (Sweet biit flow. gard. ser. 2 n ia8 G. Don gen. syst. i p. 845), r.tinulis petiolis neivis foliorum et calycibns setis stiigohis adpressis eglandulosis onnstis, foliis cuneato-lanceolitis ciliatis utrinqnē arommatis, flonbus teiminahbus z-3 brviter pedicellatis, cal. lobis oblongo-lanceolatis non viscidis acutiuscuhs ^ 3^m Java circa Bataviam ad rivulos (Blurae), frequenter oltuiu in Japoniā (Ibuub.) et Chinā (Kaempf), forte etiani spontaneum. Azalea indica Linn ^pcc. 214 Blum, bijdi 85a. Tsutsusi Kxmpf amoen. 845-847 excl. vai. plui. et p. 846 ic Stups in hoitis mire vauans, neiupe : et pumceum (Sweel), floribus coccineo-seu puniceo-scarlatinis — Sims bot. mag t J480-

/6 *purpureum*, floiibus porpureis.— Sims bot mag. t 3667.— Braaiu icon Chin, t 37

y. *ignesce/iSy* floribus coccineo-flammeis lobo saperiore punctato.— Sweet biit. fl gaid t 128.

<T^o *lateritium*, floiibns solitaiis rubro-lateritiis pentandns immaciatis — Cal. lobi brevioies quam priorum. Azalea indica latentia Lmdl bot. reg. t. 1700.

1.? *-variegatum*, floiibus soiitanis alboef roseo-variegatis pentandns.— Azalea indica vatiegata Liidl. bot reg t. 1716. Blume bijdr. p. bD2

f.* *incarnatum*, flouibus (plenis) incarnatis — Azalea indica plena Sims bot. mdg. t. 250Q. Calycis lobi valde acuminati uude foite ad R pulchium refeicndumsem floies mmoiesnec U. indie co roll Is majores. — in specim. horti Genevensis stamina omnino in petala et carpella in folia conveisa! Plureb adhuc ex formā folioium et coloie floram memorant cl Blume 1* c et Don 1. c. sed vereor ne ex Us nonnallae ad R. ledifohum aut R. Fairerae sint rpferendne (v. \ c)

34 R. nLCHRUM (Sweet biit. flow gard. ser 1 t. 117), lamulissetis fei rugineis snbadpressis birsutis, foliis elliplico-lanceolaUs basi et apice attenuate atrigosis, floribus 2 3 terminalibus, cal. 5-paitito hirsutissimo eglauduloso lobi*

lineariibus acuminatis. & in India Rb iadieum Smithii vSweet bort subuib. ed. 1 p 343 biit.fl gard. ser 2. t. i54. Rh. indicum pulcbinm G. Don gen syst. 8^5. Goi magcitadiue R ledifolii roseo parpaiae Medium intei R indicum et ledifolium à priore calycinij. I obis acummalis et coiolJis dupio majombn: et a R. ledifobo calycibus ner MSCOSIJ nee glandulosii differt. (v. v c.)

35 R.BunMAivxa (G Don gen. syst. 3. p 845), ramulisfemigineo hnsutis, foliis linear-lanceolatis raaagine reflexis hnsutis, llonbus 1-2 teiminabbs , calycis lobis linear-lanceolatis feirugmeo hirsute, cor lobis obovato-oblongis calyce triplo longionbus 3 in Japoma. Azalea rosm/frinifolia Burni ' fl md |5 t. 3. f. i. Blum bijdr. 853. C01. arapla, à Buim dicitnr flava sed ex ipsius specim. meis ocubs purpurascens. Accedit ad R pulcbrnm sed folia angustioia margine revoluta (v. s comiu ab amic Delesseit)

36 R LEDIFOTIUM, ramuhs patentim setoso-bi&pidi?, foliis elbptico-lanceolatis subadpiesse pilosis, florib* ad apices iamoiurn subteims pedicellatis, calycibus glanduloso-pilosis viscosis, lobis acnminatis 5 5^{ta} China. Diffeit a R. Indico calycibus glanduloso-viscosis et floibus dupio fere majoribas "Vdiat etiani florum colore, nempe:

A. *leucAnthus*, floribus albis. — Rb. leucanthum Bnnge chin, n 234. Azalea iudica alba Lindl bot. reg. t 8n,Lodd bot. cab. t 1953. Azalea ledifolia Hook bot. mag t 2901 Rhod ledifolium G Don gen. syst. 3. p. 846. An Azalea mucronata Blum, bijdi. 853 etideo Rbod Inuciondtum G. Don gen. syst 3. p 846 hue ievocanda? (v. v c)

fi. *phecmceum*, floribus phoeniceis, lobis tiibus superionbus maoulatis. — Azalea ledifolia & pboencea Hook, bot mag. t. 3^39 Sweet brit flow, gard a p 128 Rbod phoeoiceumG.Don gen syst 3 p.84b—Rbod. m-dicm speciosniu Sweet bift flow. gard. sei 2 t. i?t| bujus videtur varietas grandiflora, etiam forte in fig. infer 846 Kaenipfeii indicata

^> R ALBIFLORUM (Hook ' fl. boi am. 2. p 4^ t. 33. et III bot. mag. t. 3670), erectura, foliis deciduis elliptico-lanceolaiis membranaceis glabtis in apicibus ramorum pednnclnisqe fa&ciculatis, calycibus 5 pailitis lobis oblongis snb-foliaceis hispidis, coiollis rotato-campanulatis, stara eiectis ..equdlibuji infeine hirsutis. 3¹⁰ sylvis alpinis monlum scopulosoiutu (Rocky mount.) Araer. bor. Floies albi pedicellati 2-3 aggregati in umbellulas laterales et teirinales. (v s. in h. Delessert.)

-j- Species non satis notice,

* Species ut videtur genmnce sed quoad sectionem dubia.

38 R. MUCRONULA-TUM (Tnrc7 bull, sec mosc. 1837. n 7. p i55), foliis in petiolum decuripntibus lanceolatis raaagine icvolntis inutionulah* obscure punctalis glabris subtu;, glaucis, floibus lateabbus solitaiis bievitei pedunculatis, staminibus corollam campanulatam suba?quantibu& ^mChmA boieab. Caet. ign.

39 R. MICRANTHCM (Tuicz. bull, soc mosc. 1837. n. 7 p. i55), foliis in petiolum decurrentibus lanceolatis obtusis acuti&culi&ve raaagine icvolntis glabris snbtus glaucis ferrugmeo-punclatis, coiymbis lateralibns multifloris, staminU bns corollam subiotatam excedentibus./) in Chinâ boreah. Moies albi paivi. Antbeiae fenugineae Habitus potius Cletbisc Cset. ign

40. R. REhiuTATUM (D. Don mss. in G Don gen. syjt 3 p. 84[>), erclum fraticosum, foliis late ovatis acutis subcoiaceis pa ice pilosii subtiib glands et reticulato-venosis. J in Japoma. Vlor igu.

** Stirpes hybride inter Rhododendron et Azaleam media: subdecandi.

41. R. CARTONIANUM, foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis glabris, racemo thyroideo terminali multifloro, floribus infundibuliformibus regularibus, stylo ultra stamina longe exerto & hybridum hortense ex Azalea nudiflora & Rhododendro Catawiense secundato. Carton's Rhododendron Lindl

- bot. reg. t. 1449. C^ofa solace® ad fancem a Ibid re. Stam. xo. Habitac a' mat re diversissiinus, vix patri con form is.
- 4a. R. GOWENIANUM (Sweet brit. flow. gard. ser. I. t. a63), ramis toinentoso-pubescentibus, foliis sempervirentibus ant deciduis oblongis macrone acantis margine sabrevolatis, janioribus pubescentibus, adaltis glabris apice recurvis, floribus racemoso-corymhosis, tubo cor. lobis paulò breviore. /\$ bybridam ex Azalea nadiflora sea viscosa à Rhododendro hybrido quodam (Pontici et Catawbiensis filio) ortam. Rh. nadiflorum Gowenianum Load. arb. 1141. fig. 944. Cor. laetè parpareae siibregulares.
43. R. ENNEANDRUM, foliis perennantibus glabris lanceolatis basi attenuatis apice mucronato-caspidatis, floribus racemosis subdecandris infundibuliformibus. 5 bybridam in hortis natnm à semine Azaleae cujusdam albiflora polline Rhododendri Pontici fecandatae. Azalea hybrid a enneandra Lindl. bot. reg. t. ?308. Floresalbi, lobo anico viridi tnaculato. Stamina circ. ad faucem. Stylos longè exsertas.
44. R. SEYMOURI (Herb. mss.), corollis flavescentibus infundibuliformibus sabre-gularibus. Azalea Seymouri Lindl. bot. reg. t. 1975. Hybrida hortensis ex Rhododendron canadensi ab Azalea Pontica fecundatā. Ex. stam. 9-10 potius ad Rhododendron qoàm ad Azaleam refero.

•f-f Species exclusae.

- R. ARBORSCENS Torr. = Azalea arborescens.
 R. BICOLOR Don. = Azalea bicolor.
 R. CALNDUTACELM Torr. = Azalea calendulacea.
 R. CANESCENS Don. = Azalea canescens.
 R. DECUMBENS Don. =s Azalea decumbens.
 R. FLAVUM Don. = Azalea Pontica.
 R. GLAUCUM Torr. = Azalea glauca.
 R. Hispida Torr. = Azalea hispida.
 R. LOUREIRIANUM Don. = Azalea punctata.
 R. MORTERII Sweet. = Azalea calendulacea var. a..
 R. NITIDUM Torr. = Azalea nitida.
 R. NUDIFLORCM Torr. = Azalea nudiflora.
 R. ORNATUM Sweet. = Azalea viscosa var. @.
 R. POLIFOHUM Scop- = Andromeda polifolia.
 R. PONT 1 CUM Schreb. = Loiseleuria procumbens.
 R. PULCHELLUM Salisb. =Rhodora Canadensis.
 R. RHODORA Don. = Rbodora Ganadensis.
 R. SINEITSE Sweet. = Azalea Sinensis.
 R. SPECIOSUM Don. = Azalea speciosa.
 R. VENUBIOM Salisb. = Azalea viscosa et nndiflora.
 R. VISCOM Don. = Azalea viscosa.
 R. VISCOM GLAUCUM Ton. = Azalea gianca.

XLTI. RALMIA Linn. gen. n. 5^5. Gcertn. fr. i.p. 503. t. r>3. Lam. ill t. 363-

Calyx 5-partitus. Cor. tubo brevi hypocateriformis aut ferè rotata, limbo breviter 5-fido, subtiis producto in cornua 10 cava in quibus anthers nidulantur. Stam. 10, antheris apice obliquè bipartitis. Stylus brevis. Stigma ainpliatum. Capsula 5-locul. 5-valvis. Semina 00 ovata. — Fruticcs boreal i-America ni sempervirent~~€~~S. Folia alterna aut oppo'

sita imò subterna integernma Coty়mbi teimmales, lanus ramuiis clongalis axillares. Pedicel 11 elongati unifloii. Bractea? 3 ad basin , 1 ex lacln, 1 (bractcolaj) ad basin pedrcelh Gemmae floales uudae Collollaeiosca? aut var. albae.

* *Floribus corymbosis, calycibus nonfohaceis*

- 1 K LATIFOLIA (Lmn. sp %o), ramuhs rereibns glabris , fohis longe petiolatis tisspaisis ternisve ellipticis ntnnque acuminatis coriaceis planis utunqae vindibus glabeiftjmis, corymbis terminahbas viscido-pubf-centibus. <5 Incolibus lapestribuset montanis a Canadā ad Carolinam Curt. bot. mag t.175 Michx, fil. aib Am 3. t 5 Big med bol 1 p 133 t. li Schkuhr haedb. t. 1x6 Deldiin. herb, amat t. 151 — Catesb cai ? t. 98 Trew Ehret t. 18 f. x. Anglo AmencanisdictnriflMre/et *Calico busk*. Flores intense losei (v. s. sp. et v c)
- 2 K AMGUSTIFOLIA (Linn sp 56i), lamalis tereibos glabris, foliis petiolatis term** ovali oblongis planis atrinque glabns subtus sajpe feirogineis, corymbis laterahbs , bracteis lineaibus , pedicellis calycibu!>que glandnloso-pnbe¢ibiis A in sylvis arenosis et paludibus a Canadā ad Caiolinam Cnit bot mag t 331 Lodd bot cab t 50a.— Catesb car 3 t 17 f r Trew Ehret t 18 I. 2 Anglo-Arner dicitar *Sheep-Laurel* quia ovibus venenatuin "Vauat foil is obtnsis et ran us acutis, subtus vindibns autferrugineis Corolla intense rosese (v. v. c. et s sp)
- 3 K. CUNEATA (Michx fl bor, am 1 p 257), lamnhs teretibo;, pubernlis, foliis spar&is sessilibns cuneato-oblongis sabtus pubescentibas apice minute aristatis, coiymbis lateiahhus. fi inCaiolini (Micbx. Bosc ') ad Black-uver m distr mbis Geoigii » (FII sketch 1 p. 482) Flores albi in fundo pnrpurei (Michx) Alabastia mbra (Don). (v s a <1. Bosc)
- | K GrAurA(Ait kew 2 p 64. t 8) ramubs ancipitibus glabris, foliis oppositis sab&essilibus oblongis brevibussntbus glauds plnms aut margine revolatis, corymbis tecimilibus bracteatis , pednncahs calycibusqne glaberrimis A in tñrfosis montanis Canadae, Terras nova:, Noveboraoi et Pensylvaniae, in montibns .ilbis (Boott'), et insui.i Sitcha (Bong.). Curt bot mag t 177 Lam ill. t 363 f 2 Lodd bot cab t tSoB Duham aib ed 2 v 1 t 45 K polifoha Wangenb act nat Berl 5 t. /* "Variat raranlis snbtngonis , foliis in iisdem {jype lamis planis aul margine levolutis, ovalibus oblongis aul fere lineaibus Cor. icseae (v. v c et s sp.)
- # *rosmarinifoha* (Pnrsh fl boi am. 1 p 296), foliis linearibnA raagis revo lutis soblus vindibus £ urea Albany INoveboracensiuru K. rosmaiirufoha Dum -Corns bot cult a. p 150
- ** *Flonbits in axilhs solitarus, calycibus fohacets.*
- 5 K. HIRSUTA (Walt fl car i38) ramuhs teretibns hispidis, folns alternis aut oppositis snbsessilibns ellipticis utunque plus minus hirsntis, pedunculis axillaribus 1 (Ions foln longitudme, calycibus fohaceis hispidis 5 in sylvis [«l0-id-e oneutalis(Mileb'), Georgia? (Michx. Fias') Michx fl bor am r. p 25?. ^m bot. mag t. '38 K cibata Baitr tiav p 18 Flores intense rosei A pnonbns calycis natuiâ, disposition florum diversissnua. Vanat cal. lobis ovahbus ai/t fere lanceolatis (v. s)

Subtnb II LEDEJE.

Corolla polypetala, petalis nempe non concretis.

**XLVII. LEIOPHTLLUM Pers. enck 1 (1805) p. 477 (Ledi sect) G. Don gen.
 <st 3 p 851 Lind.nat srst. 221 — Dendriura Desv juurn bot 3. (181 i)
 P 36.—Ammyisine Purshjl bor. am 1 (1815) p 3oi —fischera Swartz
 *ce soc mosq *i ^i9ij)p 10 non DC. — Ledi sp. Berg Lam**

Calyx 5-parlitus capsulae longitudinein subaequans. C01. petalw 5

obovato-oblonga. Stain. 10 exseita , iilamentis subulatis, anlherae loculis hne& lateiah dehiscentibus Ovanuin globosum. Stylus filiformis. Cnpsula 3-locial 3-valvis apice dehiscens. Semina plurnna ovala.— Fruticuli boieah-Amencani glabeinmi ramosi electi. Folia alteina patentia mlegeuima subpetiolala ovalia obtu*a conacea. Coiymbi ternunales, multiflori, bracteis fobaceis parvis interstincti. Pedicelli i-flon. Floret albi.

- x. L BuxironuM (Ell sketch x. p 483), caule erecto, foliis* ovalfrus obovatisve subssessihhus altémis, rapsnlà glabia J in Ameiiae bor montanis et in pinctis turfosis alienosis Nov< & Caesaiea?, Caiolinaet speciatini ad jugum Gatawba Ledum huxifohnm Berg act. Petrop. 1777 p « t 3 f 2. Led urn thymifohom Lam diet 3 (1789) p 459 ill. t 363 f. a Leiophyllum thynnfolium Don 1 c Dendnum buxifolium Desv 1. c Amrayisine buxifoha Pui&h 1. c Lindl bot. reg t 53r Fj&cheia baxifolia Swartz 1 c t 1 B (v s)
- a L SERRyn.ii-01 IUM , oaule erecto, foliis oblongls petiolatis oppositis, tapsu- lis sparse puberulis \$ⁱⁿ Amer. bor legit cl Michaux' Ledum seipylhfolia in Lber f heib et rass T lores longe pedicellati. Gapsnla extus spaise pubemla 2-4-valvis stylo apicalata ab apice debiscens (v s a cl Mich, in beib. Lher)
- 3 L. PROSTRATUM (Loud, aib n55), caulibus prostiatis, folus oblongis — Patr ign Aminyrsme ptostrata Sweet boit but ed 1 Ammyrsme Lyoni Sweet ed i83o p 344* Spec omnino dobia.

XL"VIII L1< DUM Linn gen n. 546 Gaertn fr i.p.|k^ t. 11' 1a. Lam ill t 363 f a —Led 1 sect i_a. Pers enh. n 108J —Dulia Adans fain 2 p ib5

Calyx parvus 5-dentatus Cor. petala 5 patentia. Stam 5-io , anthc- ris apice Jiporosis. Stylus starrtinibus aequalis Gapsula subovata 5-locul 5-valvis , axi 5-angulato Semina nurnerosa hneana utnnquè alà mem- bianacea aucta. — Frutices sempci vnenteb , tnti subodoiati. Folia alterna, mtegra, sublus feriigmeo-tonientosa , margine plus minus re- voluta Flores albi pedicellati in corymbum umbellatum teiminalen dispositi, pedicelli basi bractcolati.

x. L PALU>TRE (Linn, sp 5QI), foliislinejiibus, staiuimbus 10 corollà longiu- bus ^ in spbagnosis, palustubns et uliginosis Y uropoe pra?seitum horealii. , Sibiuae et Araencae septentr OEd fl dan t. 1031 Duham arb 1 t. 67 Lodd. bot. cab. r56o Scbkahi bandb. t. 117. — Cam epit 546 IC Cauhs erectas a 3-pedalis i*ohd 3-4 lm lata (v v et s)

£. decumbens (kit kew. 1 p 65), canlc deenmbente spithameo , folns angus- tib&imis ^ in sino Hndsonis (Ait), veiisim in insults Kunlis (Stev obs. in h Willd), ad fre turn Beering et in ins Ghamissonis (Cbam). £. Mey pi labi. p 48.

2 L TATIFOHUM (Ait kew a p 65), folns elliptico-oblongis, stamimbus 5co- rollT; cncler aequalibns ^ in tnifosis pauidosis America; bor |n Cinadá, Pen- sylvamà, Labrador, lerra novà, sinu Hudsoms, montibns albis (Roott'), nee non in Gioenlandia (Horn.¹), ins. Sitzba (Bong), Guiuap abbild. bolz t JO Jacq ic. tar 3 t 464. Lara ill. t 363 Delaun herb auiat t a4i L Groea- landicum Relz scand ed. a p. 4g3 L. palustre latifohum Michx fl am boi. x p a59 (v. v et s)

/? . Canadense, folus subtns albido tomentosis (nee feuuginei&) J in Canada. L Canaden&e Lodd bot cab. t 1049

Species excluscc.

L BUXIFOLIUM Ait = Leiophyllum buxifolium

L bERPYITFOHUM Ihei = Leiophylluui scryllifohuni

L. IBYMILOHUM Lam = Leiopyllum buxifolium

XLIX BFJVRIA *Mutis ex Zea anal.* 3 p. x5i *Vent h. Ceh n. Si* — Befana
Mutts ex Linn sjerst veg. ed i3 p. 368 gen.ed Schreb n. 8iz. Humb et Bonp.
pi. eqmn 2. p. u8 H. B. et Kunth nov gen. am. 3. p. 290 — Acouna R el
Pav fl per prod 69 t. 12.

Calyx profundè et acutè 7-fidus aut 7-dentatus. Petala 7 palula oblonga Stain, petalorum numero dupla, à petalis liheia, filani. subulatis basi hirsutis, anlh mnlicis osciljatoi 1ls apice biporosis Ova-nuni subrotundum 7-sulcatum. Stylus elongatus Stigma depresso-capitalum 7 sulcatum. Capsuia depicssō-globosa calyce peisistente cmcla stylo terminata 7-locul. 7-valvis, loculi[^] polyspermis. — Frutices Amerucani. Folia sparsa saepius conferta integer 1lma couacea. Flores lace-moM aut coryinbosi, biakteati sajpissime purpmei

- * B. RESINOSA (Mutis <im ic 1 t 8 ex Linn suppl 24A), ramulis velutmfs, fohis d vat is laevibus, corymbis tenuimalibus conge&tis, pedicelliA velotinis, coiollis resinoj»il» vi&cidis, calycibus ; *iidis* § in Nová-Granatā (Mut), in colibus excelsis Peruviae (R et P) Vent.' choix r 5J. Acunna lauceolata R et Pav. syst. fl. per. ia3 ex Vent, et ideo B resinosa et lauceolata G Don gen syst. 3. p. 849 Cor pinpureae aut roseae (v s in h. Dclesseit j)
- 2 B RACEMOSA (Vent' h Ccls n. et t. 5i), ramulis spar&e et r gide bispidis, fohis ovato-lanceolatis glabiis, lanus dp ice in laceium elongdtum productis, calycibas 7 dentJtis J in drenosis Georgia m iusalā Cumheiland et in Carolina ubi&exEll sketch 1 p 533. hoitensis mtroducta. B paniculata Michx.¹ fl. Lor. am. 1. p. a80. Cor. albae roseo-tinctae (v. s.)
- 3. B. GLAUCÀ (H et Bonp.pl equin 'i p 118 t. ii7), glabra, fohis oblong is obtusis subtu§ glaucis, racerais terminahbs et axillaribus, pedicellis snbfastigidiis, calycibns piofande 7-8-fidis. ^ 5 *ⁿ excelsioubns Venezaelae juxta ca-cuwen montis Silla de Caracas H B et Kunth nov gen. am 3 p. 291 Flores meat nati
- 4. B COARCTATA (H et Bonp pi eqmn. 2 p. 125 t 121), raniolis tomentoso-pubescentibus, fohis oblongis glabris subtus glaucis, corymbis terminahbus simplicibus, peduncuhs pedicellis rachi calycibusqae feirugineo-tomentosis 5 in Peroviae fngidissimis prope Caxaaiarca H B. et Kunth nov gen. am. 3. p. 291. Acunna lanceolata Cav? Cor purpuiea (v. s. in h Delessert)
- 5. B. GRANDIFLORA (H. ct Bonpl. pi eqmn 2 p 222 t 119) fohis ovatis supra glabiis sobtus cam pedunculis pedicellis rachi calycibus et ramnhs ferragineo-tomentOMs, coi-ymbis terminahbus subiamosis. § m frigidis legm Quitensis. H. B et Kunth nov gpu. am. 3 p 292 C01. poipuiea
- 6. B JEBIAWJI (Mut ex Linn iuant 242 suppl 247), folus ellipticis suprā snb-glabiib sub I us pubescentibus et glancis, junioiibos ferrugineo- tomentosis et i»landnlosos-ciliatis, torymbis t«rminahbus simplicibus, pedunculis pedicellis rachi calycibus rainnliiqne glanduloso-hnsatis vucusu. 3 3 ^{ln} Nová-Gianata prope Gonzanama 'Vent thoix n 52. m adu et ex eo Acnnna oblonga, R. et P. fl. per. syst p 123. Befana oblonga Pers. cnch. sub n a. Cor. pnpruea.
- 7. B LFDFOLIA. (H et Bonp pi. equin 2 p 124. t 120), foliis oblongis snbraucroDdtib maigine levolutis subtis glaucis utunque in nervo medio glandulo-so-pilos, 1 ace in is teimmahbs, pednucuhs pedicellis lachi ramulis calycibusqec gldndaloso-hirsutis tt viscosis. -J in Venezuelā ad cacumen montis Silla de Caracas H B. et Knntn nov. gen am 3. p 293 Cor purplea
- 8 B CAXAMARCENSIS (H B et Kunth nov. gen am 3. p. 294), ramulis pilosi*, foliis obloiiigib snpia glabiis subtus pnbesceuti-hntis et glaucis, corymbis terminahbus siniplicibns, petluuculis pedicelhj idchiqnc piioso-tomentosis ferrugineis, cdlyubuspilosohirtis j in]Andibns C dXdnartcn*ibu& Peiuvue Coiolia pnpruea Afliois B. ledifolia? ct resinosx.
- 9 B HISPIDA (Pocpp. Et Endl nov gen 1 p. 2\$ t. 39), ramulis pednncriisqu

hirsutis viscosis, foliis ellipticis serrulato-ciliatis setosis suprà bispidis'siimis subtàs tñberculatis seabris ferrngiueis, coryrobiis tenninalibus raraoso panicalatis , floribus bexameris. 5 *n Pernvia; orientalis Audiuni jngō Questa de Carpis prope Acomajo prov. Huanaco. Flores saturatè coceinei.

10. B. MEXICANA (Benth.pl. bartw. p. i5. n. 92), ram is feiTugineo-birtis, foliis oblongo-lanceolatis ntrinquè pilis minntis rariss sparsè pubemlis siibtùs glaucis, race mis terminalibus coymbo<is subfoliaiis. — in Mexico. Species foliis angustis et floribns amplis facilè distincta dicitor.

L. CLADOTHAMNUS Bong. <veg. Sitch. p. J7. *. 1. mem. acad. Petersb. -2.
p. i55. t. 1.

Calyx profundè 5-partitus persistens, lobis ellipticis. Petala 5 oblonga oblunga patentia. Stain. 10 brevia, filam. basi dilatatis, antheris adnatis ? apice poro obliquo dehiscentibus. Ovarium 5-6-sulcatum globosum. Stylus elongatus. Stigma globosum obtusè 5-lobum. Capsula subglobosa 5-6-locularis 5-6-valvis , valvis ad margines introflexis et ideo dehiscentia septicida. Placenta centralis 5loba. Semina 00 ovata pellucida membranacea involuta. — Frutex borealis orgyalis raniosissimus glaber. Folia sparsa oblonga basi attenuata integerrima mucronata subliis glaucescentia. Pedicelli axillares solitarii. — Genus Rhodora-ceu in ex anthrarum et capsulae structura, scmine pellicula involuto Pyrolaceis accedit. 1

1. C. wROLiEFLORuS (Rong. 1. c), ty in insuU Sitcha ad or am occid. America* arntica; Pyrola fruticosa Esoholz. mss. Color llorum in descr. ODÜSSOS nee ex sicco specim. deterriinaadus, verisim. albidus cum cl. aact. dicat flores Pyrolce (v. s comm. ab bon. acad. sc Petrop.)

| *Genera Ericacea incrtce tribiis.*

LI. ENKTANTHUS. — *Enkianthus Lour.fl. cock. ed. WiUd. T. p. 339 (Car. /ah.). Sims hot. mag. t. 1649. Hndl. hot. reg. t. 884. nat. syst.p. J>2I.— Melidora Salisb. trans, linn. soc. 1. p. i5r».— Encyanths Spreng. syst. 2. p. 287. — Encinthus Desf.*

Calyx 5-fidus aut 5-partitus persistens coloratus. Cor. campanulata 5-fida, facilè 5-partibilis (petalis nempè vix concrelis), basi foveis 5 nec tariferis cal. lobis alternis donata. Stam. 10 inclusa , filam. basi corolla? inserlis, antheris bicornibus apice biporosis. Ovarium 5-locul. polyspermum. Stylus et stigma simplex. Fructus, ex Lour, et ex ic. Chinensi Londini servata tesleBenth., baccatus, ex Lindl. capsularis. — Frutices Chinencs. Ramiteretcsnudiapice foliosi. Folia ellipticautrinquèacumi riata petiolata decidua integerrima. Gemmae flora I es ad apices ramoruni squamosse sa?pè coloratac. Flores 1-6 pedicellati, è gemmâ orli, milantes, rosei aut albi.— Genus in ordinc incertae sedis. Si fructus baccatus esset Arbutea ? Si capsularis verisimiliter Rhodoracea , sed , si dehiscit, dehiscentia ignoratur. Women Loureirianuir. pessimum alludit ad sententiam falsamab eo de dignitate partium conceptam. Gemmam habebat ut involucrum et flores ul flosculos.

i. E. QUINQUEFLORUS (Lour. fl. cocb. 1. p. 339? Lindl. bot. reg. t. 884), foliis oblongis uirinque acotis marginatis longè petiolatis, floribus è gemmâ florali 5-7,081. lobis ovato-lanceolatis in arisram desinentibus ovarii longitudine, foveis diapbanis coloratis. 5 fy? in 'Cbinâ circa Canto'nein culta. Cor. rubi-

ciindae' MeKdora pellucida Salisb. trans, linn, soc 2 d T56 fv * i-

2. E. RETICULATUS (L'udl. bot. rCfl. t 8851 fnliifi niral:k *
oulak brevier petiola, U, florins i ^It^f^StT* *!* * ^{reti-}
 Sims bot. mag. t. ^49? (ex formâ cal. c. colorc corolle{ ... quinqueflorus
 t. .4? Cor. basi ruben.es apice alba. Cal. rab. subobtusus: ~ Braam. ic. chin.
 3. E. BIFOLIARIS (Lour. cocb. 1. p. 340), folii, lanceolato-ovaiis h.,- .
 tis, florib. e gemmâ florali bi_nls. «1. lob!s UncollaUs. 3! n Chiui " petiola-

UJ. PICKERINGIA Nutt.journ. acad. se. not. Phil. v. m_p, , (1834) p. 95.
 Lindl. gen. s,st. 321.

C»lyx paryus 5-partitu*, lobis oblongis auctus. Pelala 5 oblonea
 itei. 5 petalis paulo breviora, anth. exaristatis bilocularibus ev U'
 culis basi diyergentibus quasi sagituiis obliqu^ dehiscentibus. Ovarium
 iiberum globosum. Stylus simplex. Sligma minutum indivisum. cT
 sula i-loculans subglobosa polysperma. Semina minuta placenta cer-"
 tral. (ut in Lys.mach:a) raserta.-Frutex Floridanus sempervireTs
 Folia alterna Integra parva coriacea oblonga obtusa. Flores paniculati
 et Ericaceis affine

1. P. PANICULATA (Nutt. l. c.), 3 in Floridâ orientali. Cyrilla paniculata Nutt.
 in Sillim. journ. 5. p. 290.

Ordo CXV. EPACRIDEJE R. Brown prod. 535. BartL ord. nat. i5jr. G. Don gen. syst. 3. p. 773. Kunth hnndh. p. 44²- Juss. diet. sc. nnt. 15. /?. i. —Epacridaceae LindL nat.syst. p. 222. — Lysimachiaceae Epacrideae Reich, consp. p. 127. — Ericeae sect. Epacrideae Link handb. i.p. 601. — Epacrideae Plumbaginearum sect. Reichenb. handb. p. 203.

Calyx liber 5- (rarissimè 1-) partitus saepè coloratus persistens. Corolla hypogyna ferè ubique` gamopetala , petal is nunc tubo semiadnatis nunc rariùs omninò liberis, limbo regulari 5-lobo, lobis per aestivationem valvatis aut imbricatis , rariùs lobis cohaerentibus et tune corolla clausa transversim dehiscens Stam. numero loborum cor. aequalia, iis alterna, aut rarò pauciora. Filarn. nunc tuboadnata, nunc libera. Antherae simplices receptaculo unico pollinifero, septum romplettim rarò marginatum constitente, indivisa?, longitudinaliter dehiscentes. Pollen nunc subglobosum paruum angulatum, nunc spbaerulis 3 connalis compositurn. Ovarium sessile saepiùs squamis hypogynis basi cinctum ferè ubiquè pluriloculare. Stylus 1. Stigma indivisum aut dentatum. Perirarpium drupaceum baccatum aut capsulare. Semina minuta albumine rarnoso, embryone recto tereti axili dimidiò albumine longiore. — Frutices raritùs Arbusculae. Species ferè omnes ex Australasiâ ortae. Pubessi adest simplex. Folia allerna rarissimè opposita integerrima aut rarò serrata , saepius petiolata, interdum basi vaginantia, substantiâ coriacea. Flores in spicas vel racemos terminates dispositi aut axillaros solitarii, saepius bracteolis texturâ calycis conformibus stipati. Corollae cyanieae nempe albae roseae purpureae rarissime caeruleae nunquàm luteae.

Ordo inter Calycifloras et Corolliflorasambiguus, Ericaceis proximus sed antheris unilocularibus nunquàm calcaratis distinctus et sic (invito equidem habitu) ad Monotropeas subaccedit. Character equidem laevis sed in Ericaceis antherae videnturstructurâ magisquam in caeteris ordinibus solemnes.

An hue revocanda Wilsonia Rafin. speech. 1. p. 15[^], à Wilsoriiâ R. Brown omninò diversa, et incompletè descripta ?

Trib. I. **STYPHEL1EM** BartL ord. nat. p. i5o. G. Don gen. syst. 3. p- 773. *Lindl. nat. syst. 223. — Epacrideae sect. 1. /?. Brown prod. 5*^7. — Stypheiacex Reichenb. I. c.*

Ovari loculi i-spermi. Pericarpium indehicens drupaceum bac-

calum aut ciustaceum Pollen simplex (Br). Corollas lobi acuti plerumquè (fortè semper) per aestivationem valvati.

I STYPHELIA R Brown prod p 537 Room, et Sck sjrst 4 p XLI G.Don gen. syst 3 p 774.—Styphelise sp Smith. Spreng.

Calyx 5-partitus subpergamaceus bracteis 4 plunbusve brevionbus texturâ conformibus cinctus. Cor elongalo-lubulosa , tubo lnliis juxtâ basin fasciculis 5 villorum , limbo lobis demlim revolutis supetnè barbatis. StaiD. filam. tuboadnata, apice longè exserta , antheus lineaoblongis. Squamulae 5 hypogyna? distinctae raniis concietae Ovanum 5-loculare locuhs i-spermis. Drupa subexsucca putamme osseo solido — Frulices Novo-Hollandici erecti raniis adscendentes lamosi. Folia spjrsa vix petiolata mucronata. Floiesia axillis soli tarn , rarius term, subsessiles, patentes , raniis nulnntes. Cor. rubentes aut vuides.

1. S. LONGIFOLIA (R Biown ' piód. 537), erecta , ramuhs pbescenli-hirlis, foliis elongato-lanceolalis apice attenaatis supra concaxiusrulis margine Iambus, pedicellis uciflons ^ in Novâ-Hollandia' oientali (h mus Pai.') ad Port Jackson (Bi.') Ker bot reg t 24. Lodd bot cab. t. i58? Sieb ' fl. exs. DOV. holl n 77. Gorollae pollicem longa? \hides limbo revoluto superne hispido. Anlbeise fuscae. Folia 1 poll, longa, vix 3 Im ad basin lata. (v. s.)
2. S. ANGUSTIFOLTA , erecta , lamalis hirlis , foil is anguste lauceolalis acuminatis sabpatentibns planis maiginc scabiis, flonbus ad axillas bulit.uns subbessilibis pateati-deflexis. \$ ^{1Q} Nova-Hollandia' (Sieber') St la>ta Sieb' pi cxs. n Loll n 79. lion Brown. St laeta var. angu&tifolia Benth in Hug enuni p 76 lraetei not.is supia intlicatas diffeit a St. ketà <oi |o|ns innlo magis busulis Folia 9-11 III longa, 2 bn lata. Coi ex sicco rubeutes (v. s.)
3. S. LiET\ (Brown ' I c), erecta, raruulb pubescenli-bulellis, foliis ellipticis su oblongo-lanceolatis planis glauns uiibraticis marginif denticulatis iicibiis, flonbus solitams subsessilibas 5 in Novâ-Hollandia' ad Poit Jackson (Br ') bt. latifoba Sieb ' pi exs nov holl. n 80 nou Br Coi vix polbrem longa, ex Mcco videtor ioj>ea, lobis Hneaubus angustis Mipeioe raodice hispidis (v s)
4. S ADscEMDENs(Biownl c), caule diffuso, lamisadsceudentibus, foliis lameolatis planis margine dentato-tiliatis scabris <ubtus glaucis striis manifestis ^> in insnW Yan-Diemen.
5. S LATIFOLIA (Brown 1 c), eiecla, ramnlis pubescent!-hi 1 tit, foliis lite ovatu> acutis imbncatis supia concavinsci 1U maigine scabiis, floibns solilaiis snb seiiSilibub erettinsculib J in Novâ-Hollandia prope Poit Jackson (Br)
6. S. TRIFLORA (Andr. bot. rep 1 t ^a), eiecla, ramulis glabiis, foliis elliptico-vel oblongo-lanceolatis planis glaucis imbncatis ulnnqae et ad rnargineslaevibus, pednnensb brevissimis subcorymbosis i-3-0ous. \$ in Novâ Hollaudil circi Poit Jackson (Br.') Brown' piód 537 Sims bot mag t 1297 St. triflor.i etSt glancescens Sieb ' fl. cxs. n holl 11 75 et 86 Spieng syst et cui. post G Don gen sysl i P< 77^ Coi pollicem et ultrâ longa?, tuborseo, lobis flax is superne hirtis (v. s.)
- 7 S viRiDis(Andr bot lep. t. 312), erecta, ramalis tennissime v el minis, foliis obovato-oblongis snbobtusis mncronalis plauis patentibus uiaigine vix scibus aapia lacvibus, pedicellis brevissimis i-ilorit, flonbus subhouVontalibus K in Novâ-Hollaudiâ onentali (h. mus Pai ') ad Poit Jackson (Bi ') Roein et Sch syst 4. p. 468 St viiditlora Biown'prod. 537. Sieb' pi exs n holl n. 79. Sweet fl austi t 50. I*olia9lin longi, 1 lin lata. Coi fere pollicaus viidis. (v. 8)
- 8 S TUBIFLOKA (Smith no/ holl /5. t 14), emta, ramulis pubeseenti-hiitelhs, folns lineaiibus angustesubobo|atis uiucionalis supra subscabi uiscubs maigine icvolutls, floubus bohtanib nutuntibus patulisvc J in Novji-Hollandia' HI

Port Jackson Brown! prod. 5'Sy. Lodd, hot. cab, t. i<38. Sieb.! fl. nov. boll, exs. n. 76. Corollas iubrae polliceni longs lobis linearibus supernè densè hirtis. Folia 5 lin. lougae, 1-1 | lin. lata. Genitalia longè exserta quā notā facilē à St. reflexā Rudg. differt. (v. s.)

y. S.? REFLEXA (Rudg. trans. Linn. soc. 10. p. 396. t. 19. f 1), erecta, foliis oblongo-linearibus margine revolutis sabacantis, floribus in racemnum terminalem congest Is subsessilibus. j in Nova-Hollandia. Roetn. et Schult. 4. p. 468. Spreng. syst. 1. p. 655. n. 12 non 11. 3. Folia referunt St. tabiflorae sed ad buc minor. Cor. tnbos brevissimus lobi supernè hirsutissimi. Stam. ad fancem filam. subnallis, antheris longis erectis. Fruct. indescr. "Verosim. à genere aliena? et ad A&troloma referenda?

't' £typeli<z exclusm.

- S. ABETIHA Labill. = Cyathodesabietina.
- S. ACE a os A Sol. = Cyatbodes acerosa.
- S. ACUMXHATA Spreng. ^s Leucopogon acuminatos.
- S. AOGREOATA Spreng. nr Acrotriche aggregate.
- S. ALTEBNIFOLIA Spreng. = Leucopogon alternifoliub.
- S. AHPLEXICAULXS Rudg. = Leucopogon amplexicaulis.
- S. APICUL^TA Spreng. = Leucopogon apiculatus.
- S. APIRESSA Spreng. = Leucopogon appressus.
- S. BIFZORA Spreng. = Leucopogon biflorus.
- S. ciARIff ATA Spreng. r= Leuoopogon carinatus ot L. assimilis.
- S. COLLINA Labill. = Leucopogon colliqns var. ct.
- S. COMPACTA Spreng. = Astroloraa compaclum.
- S. CORDATA Labill. = Acrotriche sobcordaM.
- S. 'CORWIFOHA Rudg. = Trophocarpa lanrina.
- S. CUCULLATA Spreng. = Leucopogon cucullatus.
- S. CIISPIDATA Spreng. = Leucopogon cu&pidatiut.
- S. CTMnLJB Spreng. = Leucopogon cymbula?.
- S. DAPHN0IDK8 Sm. == Lissantke daphnoides.
- S. DEALBATA Spreng. = Cyathodes dealbata.
- S. DEFORM it. Spreng. t= Leacopogon deformis.
- S. DENTICULATA Spreng. = Astroloma denticnlatum.
- S. DENDUATA Spreng. =: Leucopogon denudatus.
- S. DLPRESSA Sm. r= Acrotriche depressa.
- S. DISTANS Spreng. = Leucopogon distans.
- S. DIVARICATA Spreng. =r Acrotriche divaricata.
- S. ELLiPTICA Sm. = Monotoca elliptica.
- S. ERICOIDES Sm. = Leucopogon ericoides.
- S. ESQUAMATA Spreng. = Leucopogon esquaniatus,
- S. FASTIGIATA. Spreng. = Leucopogon appressus.
- S. FLEX IF OL 1 A Spreng. = Leucopogon flexi folios.
- S. GLABELLA S preng. c=Lencopogon glabellus.
- S. GIAUCA Labill. = Monotoca lineata.
- S. GWIDIUM Vent, zzz Leucopogon parviflorub.
- S. GHACILIS Spreng. =z Leucopogon gracili^.
- S. HUMiFU A Pers. = Astroloma humifusum.
- S. IMBRICATA.Spieog. = Leucopogou iuibicatu>'

- S. INNOTUCRATA Spreng. =: Pentacobondra involucrututia.
 S. JIJNIFERINA Spreng. nr Leucopogon juniperinus.
 S. LANCEOLATA Sin. = Lencopogon lanceolatns.
 S. MALAICA Spreng. = Leucopogon Malaianas.
 S. MARGARODES Spreng. =r Leucopogon margarodes.
 S. MICROPHYLTA Spreng. = Leucopogon microphyllus.
 S. MULTIFLORA Spreng. = Leucopogon multiflorus.
 S. OBOVATA Labill. = Leticopogon obovatas.
 S. OXYCEDRUS Labill. z=. Cyatbodes Oxycedrus.
 S. PALLIDA Spreug. =s Astrolorna pallidura.
 S. PARVIFLORA Andr. = Leucopogon parvifloms.
 S. PENDULA Spreng. == Leucopogon pendulus.
 S. PINIFOLIA Spreng. = Stenanbera pinifolia.
 S. POLYSTACHYA Spreng. = Leocopogon polystachyus
 S. PROCUMBENT Pers. = Melicbras rotatus.
 S. PROPINQUA Spreng. = Leucopogon propinqnns.
 S. PROSTRATA Spreng. = Astroloma prostratum.
 S. PVMILA Spreng. =r Pentacobondra pumila.
 S. REFLBXA Spreng. == Lencopogon reflexus.
 S. RKVOLUTA Spreng. <= Leucopogon vevolutua.
 S. RICHEI Labill. =: Leucopogon Richei.
 S. ROTUNDIFOLIA Spreng. = Leucopogon rotndifoliu;*
 S. RDBRICAULIS Spreng. = Leucopogon rabrlcaulis.
 S. RCSCIPOLIA Spreng. = Leucopogon ruscifolias.
 S. scoPARiA Sai. = Monotoca tcoparia.
 S. SETTOSRA Spreng. = Lencopogon setigeran.
 S. SFRRULATA Labill. = Astrolooma bumifnsam.
 S. SPVRIA Poir. =1 Leucopogon ericoides.
 S. STRAMTHEA Spreng. = Cyatbodes straminea.
 S. STRIATA Spreng. = Leucopogon strialns.
 S. STIRGOSA Sm. = Lissantbe strigosa.
 5. TAMARISCINA Spreng. =r Leucopogon tamariscinus.
 6. TRICHOCARPA Labill. = Leacopogon tiichocarpus.
 S. TRICHOCARPA Spreng. = Leucopogon ronticos var.
 S. VILLOSA Spreng. = Leucopogon villosos.
 S. VIRGATA Labill. = Lencopogon virgatus.

II. SOLENISCIA.

Calyx 5-partitus pergamateus adpressus, bracteis 4 brevioribus obtusis concavis geminatim oppositis cinctus. Cor. tubus calyce sextuplolioigior teres gracilisintiisadapicrm velulino-barbatis, lobi lineares demum revoluti superne barbali. Stam. filamenta tubo adnata, a pice exserta, loinis cor. longitudinem subaequantia, antberae lineares dorso infrk medium inserts. Ovarium basi nudum seu esquammatum ellipsoideum. Stylus staminibus longior. Stigma vix capita turn. Fruct. ign. — Suflrutex Australasicus glaber. Folia ovala sensim acuminato-pungentia coriacea integerrima aut vix sub lente subdenticulata erecta subitus glauca substriatella supra laevia. Flores in axillis solitarii sessiles

pollicem iongi folio triplo quadruplove nempelongiores, crecti, in sicco albidi.— Genus affine Styphielia? sed differt tubo corolla; longiore graciliore apice extiis velutino nee basi fasciculis barbatis instructor staminibus brevius exsertis; squamis hypogynis nullis. — Nomcn ex ~~Chrysanthemum~~ tubulosus.

- i. S. ELEGANS, in Novā-Hollandia ad Swan-river legit cl. Drammond! Folia 5 lin. louga. Stam. filamenta et anherae fusco-nigraDtes. (v. s. à cl. iav.)

III. STOMARRHENA.

Calyx 5-partitus, poliiis 5-pbyllus, sepalis subpergamaceis acuminatis, bracteis 4 brevioribus obtusis textura con for mi bus cinctus. Cor. in fun-dibuliformis, tubo calycis longitudine intiis barbato, lobis 5 acuminatis supernè barbatis demium conniveutibus nee revolutis. Stam. filum. tubo cor. adnata, lion exserta, Anth. ad faucem subsessiles linear-i-oblongac. Squamulae 5 hypogyn; e distinctao ovario a3quales. Ovarinm 5-loc. loculis i-spermis. Stylus iilifbrmis antheris circ. aequalis. Stigma sub capitellatum. Fruct. . . . — Suffrutex Novo-Hollandiae erectus ramosissimus glaberrimus rigidulus. Folia sicca sparsa erecta acnininato-subpungentia, extiis striata convessa, intùs la? via. FJorcs inaxillis super, sessiles solitarii.— Aifinis Stypheliae sed differtcor. tubo calycem non supcrante et antheris ad faucem subsessilibus; inde no men ex aTO/t* OS et affin mas-culus.

- i. S. xEROPHYLLA, foliis linear-i-soblaiceolatis integerrimis. ^*» Novā-Hollaudi ad Swau-river legit cl. Draimiiond! Suffrutex vix pedalis. Folia 6-7 lin. longa, liueam lata. Calyx folio brevior. Cor. ex sicco armeniacca;

2. S. SERRATIFOLIA, foliis ovalibus basi attcDaatis apice acurainatis margine rigidè berratis. 5 in Novā-Hollandii ad Swan-river legit cl. Drummond! 1'olia iubricata extiis glanca striata 5 lin. longa, 2-2 | lin. lata. Kracteolae inucronata*. Cor. ex sicco purpurascentes, tubo medio triuidulo et ibi iutùs fascicolis 5 barbatis instructo. Antherae ad faucem se&siles intrà barbam occultatee. Ao prioris oinninò congenter? (v. s. à cl. inv.)

IV. ASTROLOMA R. Brown prod. 538. Rccm. et Schult. 4. p. XLI. G. Don gen. sfc 3. p. 775.— Stypheliae sp'. Spreng. — Vintenalix sp. Cav.

Calyx 5-partitus pergamaceus bracteis 4 vel piuribus naturâ confor-mibus cinctus. Cor. tubo ventricoso calyce duplo longiore, intiis juxta basin fasciculis 5 yilloso, limbo brevi patente barbato. Stam. linearia et antherae inclusae. Discus hypogynus cyathiformis subinteger. Ovarium 5-loculare loculis i-spermis. Drupa subexsucca putamine osseo solido.— Suffrutes Novo-Hollandici humiles ssepiis diffusi. Folia sparsa saipiiis linearia ciliata mucronata glabra. Flores axillares subses-siles erecti. Cor. rubra?.

1. A. HUBIFUSUM (R. Brown prod. 538), prostratmnramosissimni, raraulisapice hirtellis, foliis lauceolato-linearibus namerosis soprà convexiasculis margine ligidulo-cilialis mucroDe bubulato terininatis. 5 *ⁿ Novs-Hollandiae oris oriental, et merid. et in insulâ "Van-Diemen. Sims bot. mag. t. i43y. Lodd. bot. rab. t. i554- G. Don gen. syst. 3. p. 775. f. i32. Vintenatia'humifnsn Cav. icon. 4. p. 28. t. 348. Styphelia humifusa Pers. enh. 1. p. 174. Poir. diet. 7. p. 4*^i*— Spreug. syst. 1. p. 658. Cor. rubra? semipollicei longae. (v. s.)
2. A. PROSTRATOM (Brown I. c), prostraiui ramosissioinm, foliis lanceolato-lineaiibns ciliatis supii planis sabtùs convexiusculis. /> ad Novae-Hollandiae oraui nieiidionalein. Slyphelia proslrata Spicng. 1. c.

3. A. DENTICULATUM (R. BIOWD! 1. c), procuinbens nuncerectInsculum, ramulis pubescentibus, foliis lanceolatis planis subtm striatis margine serrato-ciliatis, ciliis basi dilatatis. — in Novie-Hollandiaj orā merid. Slyphelia denticulata Spreng. 1. c. Folia paulb latiora breviora et rigidiūs erecta quarn A. procunibentis. (v. s. comm. à cl. invent.)
4. A. PALLIDUM (Brown! 1. c), diffusum, rain nils adscendentibns opice pubescentibns, foliis lanceolatis acuminatis sessilibus serrulato-ciliatis imbricatis suprà concaviusculis, finNovse-Hollandiae orā merid. ad portum Regis-Georgii (Br.!), oriental! (h. nins. Par.) et ad Swan-river (Hug.). Ciliis foliorum ripftumerosi brevissimi regulares. Folia subtūs pallida, 5 lin. longa, 1 {lata. (v. s.)
5. A. COMPACTUM (Brown 1. c), diffasam, ramalis adscendentibus brevisslmis, foliis obovato-lanceolatis ciliatis petiolato-attennatis suprà concavinsculis. />ad Novae-Hollandix oram meridionalera. Stypbelia compacta Spreng. syst. 1. p. 657. .
6. A. TECTUM (Brown 1. c), erectnm subramosum, ramalis a pice birteilis, foliis linear-i-oblongis obtusis mucronatis planis imbricatis margine brevissimè denticulatis scabris. 5 in Novae-Hollandiae ora meridionali (Br.) et orientali (h. raus. Par.). Stypbelia tecta Spr. 1. c. Folia 5 lin. longa, lineam lata, laevia, subtūs substriata. (v. s. comm. à mus. reg. Par.)
7. A. BAXTERI (A. Cunn.! in litt. i836), erectum ramosissimum, ramulis pnbescenti-hirtellis, foliis linearibns mocrone apiculatis serrato-ciliatis erectis, cor. lobis linearibns glabriusculis. 3 ad Novae-Hollandiae oram merid. legit cl. Baxter. Calyx et bracteae ferè Stypbelia?. Cor. ex sicco rubra, lobis ferè omnino glabris ut in Conostepblo, erectis nee revolutis. (v. s. comm. à cl. Cunn.)

V. CONOSTEPIUM Benth. in Hugel enum.p. 76.

Calyx ovoideo-ohlongus bracteis pluribus (8) coriaceis imbricatus. Cor. tubulosa extrà calycem veutricosa conoidea, limbo minimo erecto imberbi, lobis acutis, tubo intùs juxtà basim fasciculis 5 villorum. Filamenta corolla? altè adnata linearia brevissirna. Anlh. inclusaj. Stylus breviter exsertus. Ovarium 5-loculare loculis i-ovulatis. Drupa exsucca. aborlu i-sperma, putamine osseo solido. — Fruticulus Novo-Hollandicus erectus, ramulis tenuissimè pubescentibus. Folia sparsa oblongo-linearia breviter mucronata margine revoluta subtūs multilineata et villis canescentia. Pedunculi axillares 1-2 lin. longi recurvi.

«. C. PENDULUM (Benth. loc. c). /> in Novā-HollandU ad sinum regis Georgii el livurn Cycnonim. (v. s. ex coll. Drumm.)

VI. STENANTHERA R. Brown prod. 538. Ram. et Schult. syst. 4. p. XLI. G. Don gen. syst. 3. p. 77a. — Stypbeliae sp. Spreng.

Calyx 5-partitus bracteis plurimis cinctus et cum iis persislens. Cor. tubulosa tubo calyce duplo longiorc ventricoso intùs absque fasciculis villorum, limbo brevi patenti semibarbato. Filam. inclusa carnosa antheris latiora. Discus hypogynus cyalhiformis integer. Ovarium 5-locul. loculis i-spermis. Drupa subexsucca putamine osseo soJido. — Frutex Novo-Hollandicus erectus glaber. Folia confertissima tenuia acerosa subscabriuscula. Flores axillares erccli. Cor. tubo basi coccineo, limbo flavo viresceAi. Bracteae et calyces post anthcsiii connivenles in alabastrum coniciim pa Hidè rufescens.

• S. rmiFOLiA (Brown! I. c.). 5 in Novā-Hollandiā circd Port-Jackson. Kci bot. reg. t. 218. Sieb.! fl. exs. n. holl. D. 70. Loud, encycl. p. 144. 11. 23att. u. Styphelia pinifolia Spreng. sybt. 1. p. 65g. (v. s.)

VII. MELICHRUS JR. Brown prod. 53\$.— Vintenaliac sp. Cav.

Calyx 5-lobus bracteis pluribus irabricatis scarioso - pergamaceis cinctus. Cor. rotata seu scipiis urceolata 5-loba juxta basin fasciculis 5 glandularum, lobis semibarbatis. Genitalia inclusa. Discus hypogynus cyathiformis subintegcr. Ovarium 5-loculare loculis i-spermis. Drupa subexsucca subglobosa putaminc osseo solido. — Suffrutices Novo-Hollandici erecti aut procumbentes. Folia lanceolata longitudinaliter striata integra. Flores ad axillas subsolitarii sessiles crecti. Cor. rubrae. Glandulae melleo colore donatae, undè nomen.

§. i. *Corollis rotatis, foliis piloso-barbatis.*

- i. M. BOTATUS (Brown! 1. c.), procumbens seu erectiusculus, foliis lauceolalo-linearibus ntrinquè marginibusque pilosis, calycibus villosis, corollis rotatis. 5 in Nova-Hollandia' orientali et intra-tropicali. Sieb! pi. exs. n. holl. n. 64. Vintenatia procambens Cav. icon. 4. p. 28. t. S49. f. 1. Styphelia procnrobens Pers. ench. 1. p. 174. Floras searlatini. Foliajuniora irabricata, demùn patentia, 6-8 lin. longa, snprà nitida, snbtùs pallid a striatala.

§. 2. *Corollis urceolatis, foliis glabris.*

- a. M. MEDIUS (Cunn. in Fields geogr. mem. new South-Wales, p. 314, ex linnaea 1827. p. 130), erectns, foliis lanceolatis attenuatis acatissimis macronatis concavis marginc membranaceis denticulatis, calycibus pilosis, corollis arceolatis. 5 in Novas-Cnmbriae australis planitiebas ad Bathnrst.
3. M. URCEOLATUS (Brown 1. c.), crectiascalus ? foliis lanceolatis pa ten ti bus a pice attenaatis ad margines brevissimè denticulatis, calycibus glabris, corollis urceolalis. t in Nov.-Holl. ad port Jackson. Folia 7-9 lin. longa, ferè a lin. lata, snprà laevia nitida, sabtùs multistriala. (v. s. à cl. Gandich.)
4. M. ERDBESCENS (A. Gunn! in litt. 1836), erectiusculus, foliis linear-lanceolatis, jnnioibus suberectis, demùn subpatulis acuminatis margine denticulato-scabris, calycibus glabris, corollis urceolatis. <\$ in Novae-Cambriae australis sterilibus plani'ebus circa Liverpool legit cl. Cunningham. Affinis priori sed folia angustiora vix ultr4 lineam lata, striis circ. 11 nee i5 snbtùs notata, alabastra oblonga a pice bnbpurpurascens. (v. s. à cl. inv.)
5. M. ADPRESSUS (A. Conn! in litt. 1836), erectns, foliis inferioribns ovato-lanceolatis, super, lanceolatis, omnibus acuminatis adpressè imbricatis brevissimè denticulatis utrinquè glaucis, calycibus pubescenti-villosis, corollis . . . jj in Novae-Cambriae austral sterilibus ad Wellingtoniam vallem. Species distinetissima. Bractae et cal. lobi obtusissimi Cor. ign. Bacca globosa supernè areolatim rugosa Isevis. (v. s. à cl. inv.)

"VIII- CTATHODES R. Brown prod. 53\$. Rocm. etSchult. s/st. 4- p- XLI. G. Don gen. syst. 3. p. 776. — Cyathodes et Stypheliae sp. Labill. — Lissauthis, Stypheliae et Trochocarpo sp. Spreng. — Ardisiae sp. Gaertn.

Calyx 5-lobus bracteis pluribus cinctus. Cor. infundibuliformis, tubo calycem vix superante, intiis absque fasciculis villorum glandulisve, limbo patente barbâ rarâ aut nullâ. Filam. inclusa. Discus hypogynus cyatbifbrmis 5-dentatus. Ovarium 5-io-locul. loculis i-spermis. Drupa bacca la. — Frutices Australasici aut Sandwicenses crecti rarnosi, interdùm arbusculae. Folia subtisi striata. Flores axillares ercti vel subnutantes, parvi.

§• 1. *Lobis corollce barba tis, axi intiis simplici.*

1. C. GLAUCA (Labill.! no v.-hoi 1. 1. p. 57. t. 81), arborea, foliis in term ptc con-

fertis subverticillatis patulis linear-i-anceolatis mucronatis sublùs glaucis, drapâ 8-10 locnlari. ^ *ⁿ insulae Vau-Dienien (Br.) sylvis humidis et umbrosis.(Cann.). Brown prod. 529. Poir. diet. 8. p. iç)6.Trochocarpaglauc.i Spreng. syst. 1 .p. 660.Pentachondrainvolncrala ? A. CUDD.! in litt. i836. Foliapolliceiu et ultra longa acaminato-miicTonata. (v. s. com in. à cl. Lab ill.)

J2. brevifolia, foliis semipollicem longis abruptè inucronatis. /> cum priori, (v. s. corooi. à cl. Brown.)

2. C. STRAMINEA (K. Brown! 1. c), frulicosa erecta, foliis interruptèconfeggis subverticillatis ovali-oblongis obtusis muticis patulis subtùs multinerv^{9Ht*};‡ in insulae Van-Dienien nionte Tabulari. Stypelia straminea S>ren#S^rst. i. p. 556. Folia 4 lin. longa basi subattenuata subtùs pallida. Drupa globosa magn.. Pisi minoris. (v. s. comm. à cl. Brown.)
3. C. DEALBATA (Brown 1. c.), fruticosa procombens, foliis linearibA erecto-patulia mucrone tabescenti apicalatis subtùs i-3-nervibus, drupft »-5-loculari. 5 in insulâ Van-Diemen. Stypelia dealbata Spreng. syst. T. p. 65g. Ex cl. Don folia brevissiuë ciliata subtùs 5-nervia.
4. C. TAMEIAMEIJE (Ciam. in linnaeâ 1826. p. 539), fruticosa, foliis cuneato-an-gustè-obovatis petiolulalis obtusis mucronulatis sublùs mnltinervibns drupâ 5-8-loculari. ;j in Archip. Sandwicensium nempè in clivis aridioribus ad ra-dices inontium circa Hana-raru ins. O-Wabu (Cham.), ad moutem Kaab ins. Owhyhee (Macr.). Toto ccelo differt à Leucopogone obovato quocum jungere voluit Sprêngel. Frutex cnbitalis ramosissimus. Sepala ciliata. (v. s. comm. ab hon. soc. hortic. Lond.)
5. C. BAXTERI (A. Cunn.! in litt. i836), luffraticosa erectiuscula, foliis llneari-ribus acuminato-mucronatis utrinqnè enervibus subtùs pallidis, drupâ ^ ad Lucky-Bay in orâ ineridionali Australia; legit cl. Baxter. SofTrutex vix pedalis diffuso-ranjosus. Folia sparsa semipollicem longa patula in sicco snprâ convexa subtùs concava. Cor. lobi apice breviter et densè barbati. Fruct. nou vidi. (v. s. comm. à cl. Cunningham.)

§. 2. *Corolla, lobis imberbibus, axi intits scipiùs elevato.*

6. C. FARVIFOLIA (Brown! prod. p. 640), frnticosa, foliis linear-i-lanceolatis pa-tulis brevissimè serrulato-subciliatis, sublùs glaucis 5-nervibus, nervis omAi-bus simpliribus. An insulâ Van-Diemen (Cunn.), iu inonte Tabnlari (Br.). Lissanthe parvifolia Spreng. syst. 1. p. 660. Ramuli hirtelli. Folia 3-4 lin. longa. Drupa globosa 5-locularis Piso dimidio ferè minor, (v. s.)
7. C. OXYCEDRUS (Brown! I. c.), frulicosa, foliis linearibns patulis acuminato-iiucronatis roarginé integerrimis subtùs glaucis 5-nervibus, nervis omnibus simplicibus. 5 in insulâ Van-Diemen (Labill.! Br.), ad fretum Bass (Br.), in Novas-Holla ndjaj orâ merid. (h. in us. Par!). Stypelia Oxycedrus LabilK! nov. holl. 1. p. 49. t. 69- Lissanthe Oxycedrus Spreng. syst. 1. p. 660. Frutex or-gyalis. Folia 7-9 liu. longa. Drupa globosa 5-locul. magnit. Pisi. (v. s.)
- & C. ABIETINA (brown 1. c), fruticosa, fglis linear-i-lanceolatis plantis confertis-simis imbricatis subtùs 5-7-uerviis margine callosis integerrimis , nervis omni-bus siinplicibus. 3 in insulâ Van-Diemen. Stypelia abietina Labill.! nov. holl. 1. p. 48 t. 68. Spreng. 1. c. Epacris juniperina Forster prod. n. 71 cx Spreng. quispecim. vidit. Frutex orgyalis. Kamnli pnbescentes. Folia 6-7 lin. longa. Dru'ia sobglobosa styli basi mucronata. Cor. lobi in iconEBil). intus pnbescentes, ex Brown imberbes. (v. s.)
- !• C. ACEROSA (fy-own prod. 53\$ in adn.G. Don gen. syst. 3. p. 776), fruticosa , foliis linearibus patulis acuminato-mucronatis margine integerriints subtùs glaucis 3-5-uervihs, nervid lateralibus ex I`us pinnatim ramosis. J in Nov/1 Zeelandiâ (Cunn.). A. Cunn.! anu. nat. hist. 2. p. 47. Ardisia acerosa Oaertu. fr - a. p. 78. t. y4- * a- Slyphelia acerosa Sol and. Ill ss. Epacris jnniperiu Porsi. ex Stend. Lissauthe acerosa Spreng. I. c. Frutex laxus. Ratuuli Untiè pubescentes. Folia 6 lin. longa. Drupa globosa 5-locularis. (v. s.)

10. C. MACRIBANA, fruticosa, foliis linearibus oblongis subobovatisve mucrooatis patentia-deflexis margine ad apicem ciliolato-scabridis subtus albidis multinerviis, nervis ad apicem extus ramosis. J in insulâ Owhyhee Sandwicensim ad montem ignivomnm legit el. Macrae! Ramuli pñberuli. Folia 3-4 lin. longa. i | lata, patentia iino deroum deflexa. Cor. ia meo specira. nullae sed ad hauc sect, refero ob aftiuitatein nervationis cum C. acerosâ et assert, cl. Brown circâ duas species Sandwicense ineditas. Drupa globosa Piso dimidio minor. (v. s. comm. ab bon. soc. bortic. Londin. et à cl. Gadicbaud.)
11. C^AH^RKsii (Gaudich. voy. Freyc. bot. p. 98 sine descr.), fruticosa, foliis HnenKis. inucronatis erctiusculis integerrimis subtus pallidis vix glaucis, nervis ad apicem extus ramosis. £ in ins. Sandwich. An à priori satis diversa? (v. s. specim. mane, ex b. Gaudich.)

•j- *Species exclusae.*

- C. DISTICHA Labill. = Decaspura disticha.
C. iiAURINA Br. = Trophocarpa laurina.

IX. LISSANTHE R. Brown prod. 540. Roem. et Schult. syst. 4.p. xxn. G. Don gen, syst. 3.p. 776. Lindl. nat. syst. aa3 (excl. Cav. syu. ex spbalm. citata).—Lissanthes et Stypheliae sp. Spreng.—Stypheliae sp. Smith.

Calyx 5-lobus bibracteatus aut ebracteatus. Cor. infundibuliformis rarius urceolata limbo imberbi. Genitalia inclusa. Discus hypogynus cyathiformis 5-lobus. Ovarium 5-loculare, loculis 1-spermis. Drupa buncata putamine osseo solido. — Fruticuli Novo-Hollandici erecti. Folia sparsa subtiis Jineata. Flores parvuli axillares racemosi aut Solitarii. Cor. albae.

§. 1. *Calyce ebracteolato, corolla tubo intiis pubescenti-villoso, racemis axillanibus paucifloris, pedicellis basi bibracteatis.*

1. L. SAPIDA (R. Brown prod. 540), ramulis minutissimepulverulento-velutinis, foliis oblougo-linearibus mncronatis margine revolutis snbtus dealbatis pluristriatis, racemis recurvis 2-3-floris, drupâ lasvi. ^ in Nova-Hollandift circâ Port Jackson. Lindl. hot. reg. t. 1275. Hook. bot. mag. t. 3147. Sieb.! fl. exs. n. boll. n. g5. Folia pollicem longa, 2 lin. lata, patentia. Cor. albae lobis a pice virescentibns. Drupa globosa, styli basi nuicronata, rubra, magnit. et sapore Yaccinii macrocarpi, edulis et Anglis diet. *Australian Cranberry* ex libr. entert. knowl. a. p. ^11 tesle Liudl. (v. a.)
2. L. STRIOOSA. (Brown! 1. c.), ramulis velutino-pubescentibus, foliis litieari-snbulatis snbtus 2-4-striatis mucronatis, racemosib subspicatis paucifloris erectis, drupis vix sulcatis. J 5^m m^s. ^ aⁿ Diⁿnien et in Nova^u Hollandia^a ad Port Jackson. Stypbelia strigosa Smith nov. boll. 1. p. 48. Simillima S. subulatae. Ab hâc non differre videtur L. propinqna A. Cunn.! in litt. in partibus Novae Hollandiae interioribuslecta. (v. s. à cl. R. Brown et Cunn.)
3. L. INTERMEDIA (A. Cunn.! in litt. i836), ramnlis glabris, foliis linearibus mucrone elongato rigido acuminatis subtus 4-striatis concoloribus, racemis erectis 5-6-florIs. 5 in collibus rupestribus Novae Cambriae austral is legit cl. Cunningham novemb. flor. Fruticulus multicaulis erectus vix pedalis glaber-rimus. Folia 6 Lin. longa, rigida. Racemi folio circ. aequales. Media inter L. snbulatametstrigosam. (v. s. à cl. inv.)
- 4* L. SUDULATA (Brown 1. c), ramulis glabris, foliis linearis-subalatis subtus concoloribus bistriatis mucronatis racemis 4-5-floris erect is, drnpa 10-striata. 5 in Nova-Holiandiii ad Port Jackson. Sieb.! il. exs. n. boll. n. 104. Folia 4-⁶ lin. longa. Racemi foliis breviores. (v. s. ex coll. Sieb.)
5. L. RIGIDA (Benth. in Uugel ennm. p. 76 in adn.), ramnlis glabriuscalis» foliis lanceola to-linearibus mucronatis subplauis *ubtus concoloibus 4-striatis >

lacemis pluntiois erectis, cor urceolatae tubo intus pubescente /)in Nova?- Hollandiae orā orientali (h. mus. Par ' ex itin. Baud), in sterilibus ad flumea Lacblan Nov -Cambriae inteiioris. L ulicina A Cunn.' in Hit i836 Habito&L. subulatae et stiigosae bed folia pau!6 latioia rigidioia (v. &)

[^]- 2. *Calyce bibracteolato, corolla urceolatd tubo fauceque nudis, spicis axillanbus paucifloris.*

b- I. MONTANA (R. Brown I.e.), rainnlis... foliis oblongo lineaributvobtns uiuticis snbtus glaucis *fj* in insula "Van-Diemen. Caet ign

7. L MUCRONATA , inmulis giabiis, foliis oblongls plams basi obtnsis apice valide inncionatis subtus palhdis multiveniis, spitis folio brevioribus, drnpis obovatis stylo bievissimo apiculntis. £ in Novap-Hollandiae ora orientdli Folia petiolnata 7-lin lata, venis basi 5-7 subparallelis apice raraosis. Cor lobi mtus gldbn. (7 s comm. à mus reg Par)

&• 3. *Calyce bibracteolato, corolla infundibuliformi fauce villis deflcxis intlusis, Jlonbus axillanbus solitaris.*

& L DAPHHOIDES (Brown! L c), laniulis apice hispidolis , foliis elliptico-Ian- ceolatis concaviascnlis mucroQe bievissirao calloso subdpiculatis, corOLe lobis glabpirimis. 5 i^Q Novā-Hollaudia tiopica' (Bi) et orientali (b. inus. Par.¹) et in ins. Vdn-Dicwen (Br '). Lodd. bot. cab t. 466 Styphelia daphnoides Smith nov boll. 1. p. iS. C01. paivae dlbu? paucu ruboie admibso, lobis acuminatis, (v.s)

[^] h. CUNNINGHAMI , lamulis apide hispidulis, foliis ovatis basi obtasis apice uiucioue calloso terminatib, junionbus subcihatis, adultis inagine nudis, [^]alycibns ciliatis, cor. lobis glabeirnnis. ; in Novā-Hollandia mteiiori ad flamen Lacblau legit cl. A. Cunningham ' Tolia IU n&deu lamisinteidumsbro- tunda Species afiniis dapnoidi et ciliatae, à prioii talye lobis cilidts, a pos- tenori folioium mucrone calloso, ab utiaque foliis* ovalis disUnt ta. (v. s a cl. inv.)

*o L. ciLiATA (Brown 1. c.), lamolis,.. ., foliis elliptico-lanceolatis plants uiucrone pellucido apiculatis, marginibus senulato-ciliatis, corollas liinlo scabuusculo ;)in insula "Van Die men Caet. ign.

•J Specie t exclusc.

[!]" ACKROSA Spreng. = Cyalhodes aceiosa

ⁱj OXYCI onus i»preng. = t-yathodr* Oxycedrus

[^] PARVIFOLIA Spreng. •= Cyathodes pai \ ifolia

¹ STRIGOSA Sieb. = Leucopogon Sieberi

^X LFUCOPOGON R. Brownprod 641. G.Don gen sjrst. 3./>. 777 — Stypheliae sp Labd Spreng.— Peijoja Cav icon 4.p ig.— Perao Pers. enh n. 3yg.

Calyx 5-lobus bibracteatus. Cor. infundihulifoimis limbo ^atenti 5-lobo, lobis supcrnè barbatis! Filam. inclusa, coiollae tubo adnata. Anth. ad faucem sessiles. Discus hypogous cyalhiformis sublobatusj aio nullus. Ovanum a-5-loculare. Drupa baccala aut Crustacea aut xsucca 9-5-locul locubs i-spermis.— Frutices suffiuticesve fere om- ^es Australajjici, saepè humiles, rdmosissimi, laniis subarboiei. Folia sparsa, interdum mtcnuptè confeita, conacea aul subacerosa, integra ^argiubus sae P* serrulato-aut ciliolato-scabris, subtùs saepe'lineato- stiata. Flores axillarcs terminalesve saepiis spicati Cor. albae, lobis bartri alba supemè hispulis.

§ I. *Pbilostachyi*, *nempe spicis axillarihus multijloris, drupi* bac-*
catis R. Br. 1. c.

- 1 L. MALAYANUS (Jack, nial niisc i n. i et in Hook bot raise a p. 71), rauulis glabi is, folis lanceolatis mucionatis sabenerviis subtus glaucestentibus, spicis axillaribus erectis folio brevionbub, drupā 5 loculau globosa & ia peninsula Malaic circa Singapore fiequens (Jack) ad muntem Opbir (Wall') Wallif ind a p 30i list, n 37 JO G Don gen syst 3 p 777 Slybelia Malaca^preng cm post p 67 Folia pollicem longa, 4 lin. lata, conacea, phylodia *Acacia* leferentia Slylus villosus Haec sola geneus species cxtiā Au&tr<diam reperta¹ (v s comm ab lion cut Angl Ind 01.)
- a. L. LVNCEOL AT us (Biown prod 54iexcl.syn Andi. et"Vent.) , lauauhs glabns, foliis lanceolatis planis 3 nervibus, spicis aggregatis nutantibus folio sublongioribus dissitiflons, ova ins a-loclnlaibus, drupis ovalibus. ^ /) ^{1Q} Novi-Hollandiā orientali et mend (h. nius. Pai') m monfbus canuleis fiequens (Conn') Hook bot mag. t 3i6i opt Cnnn' in Field n. S Wai. p. 341 Sweet br. fL gaid. t 47 non Sieb Stypbeha lanceolata Smith nov boll 49 <*xcl. syn. Willd sp 1. p. 835 exel syn et patna. Leucop austrahs Sieb' H. <xs. n.holl n io3 non Br Folia pollicein longa, 7-5 hn lata, palhde virentia 9abglauca. Spicnlae 1-1 | pollic (v a.)
9. L. I-ASCICULATUS (A Kicb. Toy astr p. 215) aiboeus lamnlisglabris, foliis snbeonfertis liiearibns sublinceolatis acuminate-mucronatis &apr venis 5 1m- piessis sabtus basi plariveniis, spicis snbteruiinahbas foliis iseqaalibas rerarvopendnlis sabsolitnrns giacilibus 7 xi-flous, diupā (ex Rich) globosā. /j in Novoe-Zeelandiae sylvw (Forst), ad npa< flaiuinnm (A Cunn' ana nat hist, a p. 47?). Epacri9 fasoicolata Forst. prod. n. 7a. Folia pollicein longa, vix 2 illl. lata, supra et pra?cipue sub tut* pallida, inargine substabia (v. s com in a cl. A. Cunningham)
- 4 L AUSTRALIS (Biown¹ I c), caule finticoso erecto apice piaeisen'im ramosissimo, ramuhs glabiis, foliis erctis Hneari-lanceolatis subtū tenne 5-nervibus id margines subiecuvis laevibos, spicis eiectis fohi longitud. aequahbus, drupis depiesso-globosis 5 local *tj* in Novā-Hollandiā mendionali et in insulā ⁷an-Diemen (Br'). Folia 1 J »6 lm longa, 1⁴j-a lin. lata, mucrone hievi subfubcesente terininata. Certi&siniē a L Richei (qu&rum Spteng conjuuxit) diveisa (v s. a cl Brown)
- 5 L. TENCIS, caulihns suffi uticnlosis A collo pluniuis cieclis simplicibus aat apice subramosis fohisqne glabns, foliis hneau-vix lanceolatib utrinqae attcnatis erectis laBviuscolis, spicis axillaribus folio longionbus inultiflons, brac-teis pei&i&tenlibos lanceolatis dor&o atnatis & in Novā-HollaudU ad Swatt-nvei Icgit cl. Drammoiid¹ Gaules 6-9 poll longi giaciles. Folia 6-8 hn longa. Cor tabus calyci aequalis, lob baibā albā coifertissimā superne hirsuti Fract igu (v. & à cl. inv)
6. L. riMKLFoIDES (A Cann' in htt. i836), frnticosa lamosissiuia, rauinlis pusbescenti-hnlellis, foliis hnearibns subacominitab subtu* 5-neiviis margue ad apicem subscabris, spicis ex axillis summis solitauiset teiminalibus subconges** lis folio panl6 longionbus erectis ciic g-flois gracilibus j^ in sylvis aienoffli* ins Stradbrotke in sinu Moreton No'ee Cambiiae austr ad latit. giad a7> 30^r legit cl A. Cunningham. Folia patentinscnla palhde virentia, 5-8 l^{a*} longa, lineam lata Ramuh et spicœ tacheb infi I met. ign (v s à fl inv)
- 7 IJ RicHti, lainulis glabnusculis, foliis oblongo-lanceolatis planis margin* enneatis i-5-neiviis basi stuatuhs, spicis axillaiibas folio subdequalibus eiec- ij, drupā 5-loculari. J in Nova-Holland 1'a orientali et merid. (h mas. Paiib.'J in ten'a Van-Leuwin (Labill') Styphelia Richei Labill' no\ -boll. 1 p 44 t. 60 Spreng syst. 1 p 65? exel syn. lolia pollicem longa, 3-3 5 lin lata Spkae demūm folio fere longioies Floies uiagib remoti qnām L. paivifloii Ramuli juniores lenubsiine velutini Drupa paiva cdulis cl. Richei in d~~ser~~to Leuwiniano deenantis vilam servavit (v s)

- 8 L CUNNINGHAMI (R. Drown mss ex A Conn.! in lift i836\ rainuhs glabus , foliis lanceolalis uirinque attenuate mucionulatis planfo niaigme lxvibus snpia 5-venua subtus basi pluiixeniiN caiteruuieuer\ns, spicis axillaiibns ad apicc* lamouium congeslis folio xqualibns ereclis, lacbi gldbpinmå, biacteis striatis, cal. lobis ciliolatis. t\$ 5 *^m Nova-Cambua' australi ad ruuutem Ilbwaira detxit cl. Cnnninghain ' Folia i5 18 lm longa, 4 lin. lata, palhde virenlia ^picaecic. i5 floia? Find igu (v s a tl im.)
- 9 L DRUMMOHDI , raraulis glabiis , foliis lanceolalis basi subobtusis opicc attennatis Jtuiia*callosJb plains, supia glabiis5-7-neMJis , subfus femiitei vefufmis 7-9 nervjis !>pcis axiHdiibus ad apuej. taiioruni subpamculatis folio panic longionbiib, idchi augulatà pubeiulå , biacteis paivis iloiso cannulatls, cal. lobis ulinthi albidis, cor lobis maxiine hii&ulis. \$ m Nova Hollandia' ad Swanriver cum pluub alns btiipibub ranssuiis legit cl Diuummoml¹ AfHnisL Cunninghaiui. Toha spoil longa, 3-i J lin lata Spica? cue. 1 j-3o-florae Racbis ad basin inliå flores biacteolas plunmas linbncalas getens (\ 6 a cl jnv)
10. L. AFFINIS (Brown 1 c ;, foliis elong<uo-lanceolatis planis, spicis erect is, drupis ovahbus 2-i-locul. £) in insulå 'Vai -Diemen. bolia unciå longioia. Caet. igu.
- ¹¹ L PARVIFLORUS (Liodl bot reg t 15bi)), laiunlis glabiis, foliis lanreolati*, oblongihve plains 3 5-neivbns inargme subiecurvjs spiuia aggiegatis erectis folio brevionbus, o\arhs 4-locilaiibub ^ in N<>v Hollnndia' rarus ex Cnnn. Slypbeliapaiuiloia Andi bot. 1 eg t. ^87 SivpbeljaGnidiumVent.il malm I aj. Leuc. lauteolatus Sieb.¹ il ty, n. holl. n 102 Loud encycl n ^324 non Br L. polybtatbyus I odd bot cab t UIGuon Ki L Ricbei Brown piod. ^41' Hook bot. mag I. 3i5i? I tutex bnmilis à L. lanceolato eerie diveisiis. Foha magis vuentia, 3-plin. louga, 1 | lata, supeme 3-stiata. Spicae | 7 lin longae. (v a.)

^{1^} L CYMBUL>C (Labill ' serl caled p 36 r 1<>), foliis oblonpo-lanceolatis lufis concavis , spicis eiectis snbcrnnnalibus folio brevioiibus, bracteis ciliatis, drnpis obo|atis 5-loculaiibns ^ in ^ova Caledonia Stypbeli.) cymbula Spieng enr post p 67 Cor lobi pilis iuft(tutibus nee albis barbati (v s. a cl. ancr)

^{1/} L iNTtRRUPius (Biown 1 c) foliis ad apices lamoruni veilicillato-confertis filiplicifc palentib* mnllmep\ibiifct apicis subtemnnalibus j nd Novae-Hollauidia; 0lam meidionaleni. Lodd. bot cab t 1411 bpicae el ltone folio bievioiesconfeiliflone. Folia ex Bi. sesquiucinlia.

^{1/} L vKRTirti.LA.ics (Biown 1 c), foliis mteriupio-veitiullarN oblongo-lanceo-atis apice attenaatis, spicis snbteimialibiis aggiegatis , fractifens uutantibns, diups 5-locnl putamine 5-gono fyui Novao-Mollandiae 01 å inendionali Folia 3-4 imcialia

^{1/5} L GLAUCESCENS, glaberumum, foliis congesto - verticillatis rarins sparsis lato-lanceolatis acumiuatis basi sessihbas multmeivirs Inevibus glaucescenlibus, "upia 5-7-ucivns, subtus multiveiviis, spicis axillanbus larius lateialibns fe- "ujssunis {o-40-JlorJS,lloibusreiuoUs, bracteis oblongis ovalibts\e stuatulis, ^orolhs ad faucom el basin loboiuin paice baibntis ^m Nova Hollands prope Swan uvei legit cl Diuimumoiid ' hoha 3 poll, longa, i-q Jin lata, feie Draco pbilly C01 tabus talyce duplo longioi, lobi acuti Biaclea? paraisteutcs patnlae. An eadem ac. L veitaillatus? ex descii Browruauå bievisbiuiå non dijudicare 4neø(v s a cl im.J

§ a. Brachystathyi, nempc spicis axillanbus nunt terminahbus flonbus 3 plunbuH'c, talyce biatteisque coloratis, diupd sub-exsuccd, Joins nori cordatis. R. Bi. 1, c.

^{1/} L. APiruTATUS (R Biowu piod 542), fohis lanceolato oblongis eieus con- caviu,culis maigine Uvibns <*alloso-mucronulatis, spicis terminalibns stibaf?- eregatis 5 7-Uous, bracteis hncoleolatis, subtendculi parum majoie, drupi*

crustace IS depresso-turbinatis ralyce brevioribus > in Novae-Hollandiee oia
raeidionali. *Styphelia apiculata* Spreng. syst 1. p 656

et lainulis folusque glabns Di. 1. c.

£. ramalis foliisqae pubescentibus Foisan distmcta species ex Dr. 1 c.

- 17 L POT/TSTACHYUS (Brown' I. c), ram alls glabns virgatis , fohis Kneari-lan-
ceolatis muticis convexo concavatis adpresse erects, spiles axillanbus ter-
minalibusve aggiegatis 7-10 flons, rachl hirsnta, drupis exsuccis ovalibus
a pice depresso ^ in Novæ-Hollandia aastrdliori dd portum Regib Ceorgii (Br.¹
Baxt.) *Styphelia polystachys* Spreng syst 1. p. 65g Cor. jobi hirsutissimi.
Bractese calycesque info coloratae glabrae (v s comru à cl Brown et Cunnn-
gham.)
18. L BRACHYCEPHAXUS , fruticnlosus gl iber sparse ramosas erectus, foliis ob-
ovaiis oblongisve electis\ix acuriusculis margine laevibus, juncioubas et summis
subtus distinete stnalis, inferionbns subtus et omnibus superne laevibus, spi-
ris paucifloris plonbus in capitnrum tenninalein aggregatè, bracteis subacutis,
corollas lobis angustis so pern e baſba Candida copiōsa hirlusissimis ^ in No\â-
HollanihA ad Swan-river legit cl Diuimond¹ Suffitex I-T | pedalis» Folia
2-2 I 1m. longa coriacea. Calyces tubo coiollae paul6 longiores (v s à cl.
inv.)
- 19 L MDLTIFIORUS (Brown 1 c), foliis lanceolatis snbarnroinatis mnchronatis
iinbncatis sublus convexmscnlis ad marginos laevibns, spicis axillanbus folio
brevionbus, calycibas bracteisqec roargine lanatis £ ad oram Novje-Hollan-
diae ineidionalem. *Styphelia moldflora* Spreng 1 c
20. L RTIBRICAULIS (Biown I. c), raraohs glabris, foliis linear^oblongis obtnsis
muticib supia. convexinsculis lasvibns f margimbns snbiecurvis denticulatis,
spicis snbrerminahbus aggiegatis 4-5-floris, calycibus bractei&qae glabriascu-
lis», diupis oblongis 5 ^ INovas Hollandiae 01â ineridionali. *Stypbclia rubri-*
c?uhi> bpreng. 1. c Ex éadem legione lecepi à cl. A. Cunningham sub eodem
nomine specimen fnliis margine kevibus An diveisa forte species? (v s.?)
- 21 L VIT.TOSUS (Biown 1. c.), lamnlis villosis, foliis hneari-oblongis obtusius-
cnlis muticis erecto patnlis utrinque villosis, maigmibus sub recur vis denticula-
Iis, spicis subterminalibus aggregate ^m No\ su-Hollandiae ora' meiid. (Bi)>
ad King Geoiges Sound (Hug). *Styphelia villosa* Spr I. c Nimis videtur L
mbricauli affinis.
- 22 L CILIATUS(A CunD.'in litt. i836), ramnlis pnberulis confertis, foliis linea-
ri-oblongis muticis apice ciliatia ntrinque glabns, spicis terminalibus subsoh"
tarus folio paulo longionbus q 10-flois, lachi puberulâ fý m ins "Van-Die-
nen orâ occidenlah legit cl Cunningham Ex eo valde accedit ad L. villosnm
' mihi ignotuin Folia 3-4 lin longa planiuscula Spies 4-5 Im. longae Flores
' couferti Lobi coi supra bnsutissimi (v s. a cl inv)
- 23 L PILBCNDUs (A Cunn.'in htt 18^6), ramulis fohis biacteis calycibusqae
villis patentibus hirsoto-hispidis ciliatisque, foliis linearisublanceolatis ma*
^ cione brevi apiculatis bïbtus stiiatnlis margine subrecnrvs, spicuhs axdlan-
Jbns 3-flois sessilibus bievijisimis , cal lobis subnlati, drupâ exsuccâ membi^'
' naccâ ellipsoideâ biloculaij iu colibus lapidosis ciicâ Bathurst Nov -Cambri*
austr. novemb flor legit cl Cunningham Cor lobi superne albo birsotissimi-
Stylui brej»simus tiuctus minimus substiatus glaberrimns (v s. comm •*
cl inv)
24. L OBOVATLS (Brown 1 c), lamulis minutissime \ el minis, foliis obovato-
oblongis obtu&is mucronalatis margine subrecurvis lsevibns, spicis terminalibus
subsimplicibus 5-7-floris folio panulum longionbus, dmpis subglobosis 5-lo-
culanbus. 5 iu Novæ-Hollandia mend ad tenam "Van-Lenwin (Labill.¹) Sty-
phelia obovata Labill ' nov holl. 1. p 48 t 67 *Styphelia obovata* Spreng
1. c. et CHI. posi p. 67 exel syn Folia 3 4 hn. longa erecta. (v s.)
25. L RLVOLUTUS (Biown 1 c)» ramulii minute hirtello-pubescentibns, foln[«]
lineal i-obloHgis obtnsis umticis apiculo calloso obtuso , snpra couvcxis scabn

dis, mnrgiuibns recurvis nudis, spicis subtermiaalibns ad^regatis 4-5-floris, oalycibii.s bracleisquu tcmii&imè pubescentibus, subtendemi dimidin minor* drupis exsaccis 5-locnl. obovatis. Jj ad Novae-Holl. oram ineridion. (l\$r.), ad sinura regis Georgii (A. Cunn.). Si'yphebia revoluta Spreng. J. c. Variat' foliis erectis pateulibus. Cor. lobi supernè albo-hirsutissiui. (v. s. a cl. Cunningham.)

a6. L. MARGAROLIES (Brown ! 1. c), ramulis minote hirtello-pubescentibns, foliis modice patdbtibus linear-ohlongis obtusis muticis marginibus subrecurvis la? vihus, spicis jmllaribus subtrifloris folio brevioribus, drupis bilocularibas basi liaccatis, suprà exsuccis corapressis. ^ "u Novà-Hollandiâ intra-tropicali. Styphelij margHiodes Spreug. I.e. Folia 3-4 I'm. longa. Bracteae et calycis lobi t'iloliati. (v. s. coimm. à cl. Brown.)

^?. L. jjNiPOLins (A. Cunn.! in litt. i336), ramulis minutè velutino-pobescen- (ibijs, foliis linear-oblóngis acuminatis planis margine minutè ciliolato-sub- scabris utrinquè laevibus enerviis, spiculis axillaribus 5-floris folio brevioribus. 5 in ericetis sterililms Novas-Cambria; anstralis circâ Moreton-bay octob. flor. legit, cl. A.Cunningham. Folia 4-5 lin. longa, linearn latapallidè virentia erec- liuscula. Brnfcfa; flore diuidio breviores. (v. s. à cl. inv.)

?8. L. CAPITKriATUS, ramnlis inintè puberulis hirtellis, foliis linearibus acumi- natis erecto-patnlis supernè et margine minutissimè scabridis subtùs glabris , capiulisi 3-5-flori.s folio brevioribus ad axillas sessilibns, bracteis obtusis, cal. lobis ciliolatis, cor. lobis barbâ alba confert^ supernè hirsutis. f in Novà- follandi^ ad Swan-river legit cl. Drummond! Affinis L. linifoliò, sed folia diradio angusliora multò magis acuminata supernè scabrida. (v. s. a ol. inv.)

29. L. MUTICUS (Brown ! prod. 543), ramulis glabris, foliis linear-oblóngis obtu- sis submuticis erecto-patnlis, marginibus laevibus suhrecurvis, spicis axillari- bus erctis 3-6-floris folio paulò brevioribus , bracteis obtusis, drupis 5-locul. angulaths glabris. ^ in Novà-Hollandiâ circa Port Jnckson (Br.), in collibns I'upestribns propè Jiathurst (A. Cunn.). Styphelia trichocarna var. Spreng. 1. c. Leuropogon adpressns Sieb.! fl. exs. nov. holl. n. 101 non'Br. Folia ramorum inferior a hincinde obovata aut cuneata. (v. s.)

30. L. TRICHOCARPUS (Brown 1. c), ramulis minitè pnberulis, foliis linear- oblongis obtusis mucronulatis confertis, spiculis axillaribns subnutantibus 3.floris , bracteis acutis, drupis 5-locul. 5-angulatis pilosiasculis-^ tn ins. Van- rjieraen (Labill.) et in Novae-Holl. orâ meridionali (h. mas. Par.). Styphelia trichocurpa Labill. nov. holl. 1. p. 47. t. (56. Lencopogon, obovatus herb, mas. Par.! Rachis spicae pilosa. Ovarium pilosura. Drupie sparsè pilosae hinc iude glabriuscula;. Foliorain margines subrefle^xi. (v. s.)

31. L. RACEMULOSUS, ramulis glabris rigidulis, foliis linearibus margine recur- vatis mucrone subpungentli apiculatis utrinquè glabris suprà convexis subtùs concavis substratiis subglaucescentibns, racemulis axillaribus 3-5-floris folio brevioribns, bracteis minimis pedicello brevioribns, bricteoili brevibus sub- rotndis, calyce tubo cor. dimidio breviore, lobis corolls acuminatis suprà drnsè et* brevissimè barbatis non revolutis. ^ in Novà-Hollandiâ ad Swan- river legit cl. Drummond ! Antherae snbexserta?, ad sinus corolla breviler pedi- cellatac, lobis breviores, lineares. An ideo species cœte congeuer? (v. s. i cl.inv.)

32. L. JERICOIDES (Brown I c), ramulis glabris, foliis oblongo-linearibus modice patentibus mucronatis märgine recurvis suprà scabriusculis, sp?cis axillaribus ;ij>proximalis 3-5-flois folio brevioribus , bracteis muticis, calycihius tnem- branaceis , drupis exsuccis angulatis. 3 in ericetis arenosis sterilibus Novae-Hol- landiae orientalis (Br.! A. Cunn.! h. mas. Par.! Gaud.), et meridionalis (h. mas. Par.!). Sieb.! fl. exs. n. holl. n. 105. Rœm. et Schult. syst. 4. p. 473. Loud. "ncycl. n. 2327. ic. Styphelia cricoidea Smith nov. holl. t. 48. Epacris spuria flav* ic. /, p. 27. t. 347. f- r. Styphelia spuria, Epacris spuria et Styphelia eri- coides Poir. diet. 7. p. 435 et suppl. 2. p. 556. (v. s.)

33*. L. ORACITXIMUS, fruticulosus erectus ramosissiraus, ramis tenuissimis glabris,

foliis teretinsculis vix acutis stridè adpressis glabris, spicis abbreviatis terminalibus solitaires aut subcongestis, bracteis obtusiusculis substriatis, cor. »ubo calyci aequali, lobis superne viljis a Ibis confertissimis hincidis. J i^Q Novæ-Hollandiæ ad Swan-river legit cl. Drummond! Suffrutex vix pedal is. Folia 1-i liu. longa ! (v. s. à cl. inv.)

34. L. PROPINQUUS (Brown 1. c), ramulis . . . , foliis lanceolato-liucaribus setaceo-mucronatis supra Ixibus inarginibus revolutis exsertis denticulatis, spicis axillaribus sublifloris pedunculatis, bracteis cuspidatis. ^ prod Novae-Hollandiae oraih ineridionalem. Stypelia propinqua Spreng. 1. c. ^

35. L. VIRGATUS (Brown 1. c), ramulis glabris virgatis, foliis linear-lanceolatis apice attenuatis acutissimis convexo-concavis imbricatis patulisque margine ciliatis, spicis terminalibus et axillaribus subgregatis 3-7-floris, calycibus bracteisque submembranaceis, subteudenti rainore. § in Novæ-Hollandiæ orientali et meridionali (Br. !h. mils. Par. !), ad moniescatrileos (A. Cunn. !), ad Swan-river (Drumm. !), et in ins. Van-Diemen (Br.). Sieb. ! (1. exs. n. holl. n. 107. Stypelia virgata Labill. ! nov. boll. 1. p. 46. t. 64. Drapa ex Labill. ovato-globosa 5-locul. (v. s.)

36. L. COTXINUS (Rcem. et Schult. syst. 4. p. 479), ramulis puberulo-hirrellis, foliis oblongo-linearibus acutiusculis muticis erectis uliginosè laeviusculis marginie ciliatis, spicis ramulos laterales abbreviates terminaulibus 5-7-floris, bracteis subciliatis infimis subfoliaceis tendentibus calycom tequanlibus. §

et. *Billardieri*, foliis plausis per totam longitudinem ciliatis.—ju insula "Van-Dieinen (Labill. !). Stypelia collina Labill. ! nov. holl. 1. p. 47. t. 65» Poir. diet. 7. p. 484. Color herb a? ex sice, subfuscus. (v. s.)

fi. Brown ii, foliis margine recurvis bine indeciati-denticulatis. — in insula Yan-Dieinen ad portum Dairy in pic (Br. !), et in Novæ-Hollandiæ orient, et merid. (h. mus. Par. !). Leucop. collinus Brown! prod. 543. Color herbae ex sice, pa. Hidè vires. An forte spec, propria ? (v. s.)

37. L. ANGUSTATUS (Beiith. in Hug. enum. p. 77), ramulis glabriusculis, foliis ovali-ellipticis sublanceolatisve obtusis muticis margine subtevolto-convexis, supra glabriusculis subtus pilosis, spicis paucifloria terminalibus congesto-capitatis, bracteis calycibnsque subcoloralis glabris. £ in Novæ-Hollandiæ ad portum Regis Georgii.

§. 3. (Jardiophylli, nemq; spicis axillaribus vel terminalibus > bracteis calycibusque membranaceis vel foliaceis, foliis cordatis aut rariis ovatis. R. Br. 1. c.

38. L. AMPLEXICAUUS (Brown I^Q prod. 543), ramulis patentibus et niolliter villosis foliis cordatis amplexicaulibus acutis muticis multistriatis subtus minute pubescentibus marginibus recurvis villosis, spicis axillaribus terminalibusque pedunculatis patulis gracilibus 9-15-Horis, drupis lenticularibus bilocularibus. § Novæ-Hollandiæ ad Port Jackson. -Sieb. ! 11. exs. n. holl. n. 192. Loud, encyd* n. 232O. ic. Stypelia amplexicanlis Rüdg. trans. lin. soc. 8. p. 292. t. 8. \$P^e cies spectabilis distinctissima ! Folia pollicem ferè longa, 6 lin. lata, exactè cordiformia. Spicarum rachis glabra. (v. s.)

39. L. ALTERNIFOLIUS (Brown 1. c), ramulis glabris, foliis alternis cordiformibus amplexicanibus acutis muticis raultstriatis glaberrimis, spicis axillaribusque 5-9-floris, drupis crustaceis lenticularibus bilocularibus. § Novæ-Hollandiæ ora meridionali ad portum Regis Georgii. Stypelia afterw¹⁵ folia Spreng. syst. 1. p. 655. Folia sesquilineam louga et totidem lata. Spicæ 2-3 lin. longne patentes. (v. s. comm, à cl. Brown.)

40. L. DISTANS (Brown prod. 544), ramis parvè pilosiusculis, foliis ovato-cordatis patemibus muticis supra convexis striatis glabris subtus dense albo-velutinis» spicis terminalibus flexuosis in paniculam rere dispositis, fructibus cistifloris» in Novæ-Hollandiæ (Br.), ad King's George's sound (A. Cunn. !). Stypelia distans Spreng. 1. c. Folia 1 1/2 lin. longa, totidem lata, subcordacea remota.

Bracteolae rt calyces minuthsime albido-pubescentes Cor loli spneme albo-hisutissirai Drapae ex cl Brown crnsUiceae 5-locnl depresso-obovatae An nostra Canninghamiana oranino eadem ac Biowniana ** (v < a cl A.Cann.).

41. L. Gr*BELLUS(R Brown 1 c.), iaraulis glabiis, foliis altemis late cordatis acutij uiuticis planiusculis patentibus suhtus nulli sliiatis, flombos m axillis superionbns sessilibus in spicain fohaceam teiminacl digestis, bracteis taly-cibusque glabiis. £ in Novae-Hollandiae otamerid (Bi), ad King's George's soandjannar. flor. (A Cnnn.¹). Stypelia glabella Spreng 1 c. Folia i lin. longa, 2-a | lata, coiacea, floies subaequanlia. (v s. a cl. Canmngh)

42. L. TANIGERUS (A Cunn ' in litt. 1836), ramalis parce pilosiusculis, folus ovato-coidatis acutis submuticis utnnque hhsntuln. subtus ninlli-sliriatis remo-tiuseuhs, floibns ad axil las snpei lores sessilibus in spicarn foliosam termma-lem dispositis confeitis, bracteis calycibus pmberulis 3. a d o r a m INOVJJ-HOI-landix meudioualem (Baxt A. Cunn '). Folia i 7-2 Jin. longa totidemque lata Rachides floribus delapsis ad apicera ramorum persistentes. Cor. loW snperne husutissimi. (y s. à cl. inv)

43. L. HEFIELUX (Brown piod 544), lamnhs *ix apice pubescentibns, fohU oblongis vix subcordjtis muticis omnino rcflexis , superne margmibus recuivis convexis glabris, subtùs concavis pilosis hneatis, spicis ad apices iamorum plaubus panciflons aggregate ^ ad Novae-Hollandi* oram mend (Br), piope King's George's sound (A Cunn ') Stypbelia lelexa Spreng^g 1. c. Folia v lm. longa, explanata lineau lata. Calyces et biactcae subvilloosi. Diups ex Br. ciastacce 5-loculaies. (v s. a cl. Cunningham.)

§. 4. Perojoani, nempe spicis terniinahbus, calycibus bracteisque suhfohaceis, drupd exsuccd, foliis non cordatis R. Br. 1. c—*V&-rojoa Cav. ic. 4* P-²9.

44 L. microphyllus (Brown 1 c.), ramulis hirtellis seu puberlinis, folis ovalibus oblongisve obtasis muticis planis utrinque concoloribus margine laevibus, spiculis ad apices ramorum confeitis paucifloris, calycis lobis acuminate-subulatis semifoliaceis, bracteis subtendentibas foliaceis neivosis, d>upiscrustaceis i a-locnl. \$ fiequens in Nova-Hollandia onentali circa Port Jackson, Botany-Bay Sieb. fl e|s n. boll n. 106 Perojoa microphilla Cav icon. 4. p. 20 t 34q f² Peioa microphilla Pers enth 1 p 174 Stypelia raicro-phylla Spreng syst 1. p 65b i<oha I>-I | lin (bnrg. Interdnm ictu insect! culosdam adveniunt gemmae foliaiese fohis lanceolatis acuminatis stiatiis margine cihalis constantes (v. s.)

45 L FRATBRIHJS, ramnis glabrincaLs, foliis oblongis calloso-suhmiicronnatis pi an is ant margine subieciivisetsubscabris subtus stualis erectis, spicnlis tei-minibus pauciflons solitanis aut subaggregatis , biacteis brevissimis , calyc. lobis acuminato-sabulatis £ in Novoe-Hollandiae montibns cjeuleis legit cl A Cunningham¹ L. denudatus Cunn.' in litt non Sieb Lrnnus lignosns.cassus cyhydraceus polhem longns. Kami plurimi erecti lamosissimi n<gucantes lolia a lin. longa, hueam lata. Affinis hinc L microphyllb, llinc L denodato vero. (v. s. a cl inv)

46 L DBWUDATUS (Sieb ' pi- exs. n holl p 109), ramnis glabimsculis, foliis linearibus acutis erectiscnhs maiginc laevibus vix subtus ad apicem 3-sttiati glabns, spicalU snbaggregatb termmalibns axillaribns panciflois , cal lobis bracteohsque basi ovatis apicē acuminato-sabulatis, bracteis subtendentibns xnnoribns 5111 Nova Hollandia G. Don gen. syst. 3 p 77q. Stypflia denudata Spieng. oui. post p 67. Folia 3 4 lm. longa, bcnilineam lata. tx calye acce-dit ad L microphyllnm sed notis mdicatis facile differt (v. s.)

47. L TAMARiscus (Brownl. c.), ramulis glabris, fohia iinbrfcatis adpressie ovalis routim concavo-convexis snbtus lineatis glabns , spicis aggiegatis solita-rhsve multillciis , calycibns bracteisque foliaceis glabris. Jy ad Novae-Hollan-diae oram mendionalem Stypelia tamaiiscina Spieng. 1. c.

48. L GRAnr is (Biown "1 c.), ramnlh glabris (iifoimibus , foliis lanceolato-

- lineanbusciectis muticis concavo-convexis subtus nervosis tiilinoatis margine licibus, spins cougcstis 4 6floii», calycibos biacieisque subfoliaceis glabris. *Q* in stcnlibusencetis Novae Hollandiae me rid. ad poitam Regis Georgii (Bi ! Cunn !). Stypelia giacilis Spieng. 1 c 'Vix pedalis glabei, ramis wrgatis jām a basi oitis. Cot lobi intensissime albis **pilis** barbati. (v. s)
- 4q. L MELALEUCOIDES (A Cunn ' in litt rb36), ramulis glabriuscnlis, foliis lineaiibus mucionatis atiinqne lsvibus concoloibus margine vix subscabridis basi subpetiolatis erecto-imbricatis, spicis ad apices ramorum aggiegatis 4"7" floris, biacteis ova tis vix subacutis. j in&tenhbus dumetis Nova-Hollandiae ad Hunters-rivei legit cl. A Cunningham ang. fl Folia 5 lm. longa, viz lineaui lata, mtidula Calyces et corolhe extus subiabentes (v. s à cl inv.)
50. L. STRIATUS (Blown 1 c), ramulis glflbns, fohis ellipticis mnlicis erectis subtus couvexuscuhs nervosis supta concaviusculis, spicis aggiegatis, bracleis calycibusque subfoliaceis margine nudis, diupis crustaceis bilocularibns I) ad Novae-Hollandiae ora in meiidionalem. Stypbeha stiiala var. Spreng. 1. c.
51. L NERVOUS (Brown 1 c), laruulib pubescentibus, fohis ellipticis imbricatis brevi-petiolatib muticis suprā planis subtus convexmsculi* nevis elevatis, spiculis conge&ti& pauciflons, bracteis calycibu&que fobaceis giaberrinn. & ad oiam mend. Novae-Hollandise. Njmis L stnato a ffin is ex cl. Brown et bujus vat. ex bpieng qui plantam non vidit.
- 5s. L. SQUARROSUS (Bentb. in Hug enum.p 77), lamulis pubescentibus, foliis ovalih lauceolatis acutis ciliatis subglabus basi subadpres&is apjce rccurvis, spicis pauciflons terminalibus aggregatis, bracteis calycibusqne subfobaceiti glabriM J iu Novā-Hollandiā ad Swan-ri\ei (Hug) Affuis L reflexo videtur, sed folia non cordata nee snbtus pilosia (B.)
53. L CORIFOLITJS (Endl nov. st dec. a n 10/), foliis lanceolatis acatis margine tevolutis patentibus vel reflexis ramuhsqne his»pidis, spicis terminalibus pau-ciflons coDgesto-capitatis, calycibus bracteisque beibaceis villosis. f)in Nov - Hollindia ad Swan-rivei semina legit cl. Hugel. C01. lobi dense baibati.
54. L. CARINATUS (Brown 1. c.), lamnbs pubescentibus, foliis hneaii-lanceolntis iiiuUcis iinbncatib glabns supra planis subtus convexo-subcarinatis stiati, margine denticulate, spicis soli tains aggregatis\|e, bracteis calycibusqne folia-ceis glabefiimis. J in Novae-Hollandiae orā mend. (Bi.) ad Regis Georgii sinnm (Cunn.¹). Stypelia ca 11 n^oila var. Spieng. 1 c Folia ngida, pallide vindia, 5 lin longa, vix lineaui latfi (v. s. a>cl Cunningham)
55. L. ASSIMILIS (Biown 1. c), ramulis. . . foliis lauceolato-lineanbus imbn-catis adpiessis muticis snbtus convexis stiatis, paginis concolonbus, maiginibus deuliculatis, spicis aggregatis, o\ams 5 loculaiibus. 5 **& oram INovaj-Hol-landiae meiidionalem (Br.). Stypbclia carinata vai Spreng. 1 c Caet. Jgn.
- fi. callosus*, ramulis ramisve\elutmo-pnbescenUus, foliis petiolulatis plamculis apice cailosis margine subintegeinmis.—ad Regis Georgii sinuin. Folia 6 hn. longa , lineaui Tata*. Ramuh flondi approximati Spicae ternii" nales multiflorae basi spiculas paucilloias geientes. L. assimilis Cunn ! >ⁿ litt. An ceite eadein ac species Brownana ? an species diveis.) ? (v. s. à cl* Cunningham)
- 56 L. CUCOLLATUS (Biown 1. c) , ramulis . . . foliis ovalis obtnsis muticis cw cullatisimbricatis sessihbus subtus lineaui margine nudis, spicis aggiegat^ 4-6-flons, bracteis subtendentibus foliaceis, diupis 5-llculanbus. ^)ad No%w-Hollandiae 01am mend Stypelia cucullata Spieng. syst. 1. p. 656.
67. L CYMBIFORMIS (A. CunB.' in litt. i83b), lamulis glabnusculis, fohis imbn-catis lanceolatis mutronatis superne plano-concavis laevibos subtus subcaim¹¹, tis stnatis margine subdenLiculatis, spicuhs aggregatis pancifloris, calycibus brevissime ciliolatis J ad Novae-Hollandiae 01am mendionalem legit cl Baxter. Folia 2 lin longa, cue semihieneani lata Cor. lobi albo-hirsutissimi (^» * •* cl¹ Cnnn)

§. 5. *Axilliflon*, *nempe pediincuhs axillanbus brevissimis biflons ant abortu i-flons et tune calyce pluribractealo, drupd exsuccd.*
K. Br. 1. c.

- 58 L ptNDUIus (Brown prod 545), raranlis glabris, fohis oblongo-lineanbtis erecto-pataliM innocue raacronatis glabris marginibns lecarvis Ixvibus pedunculi:, subbiflons lecurvis, coiolke tubo calycem supeante, drupis'clavalis ventricosis laevibus glabi is J ^ Novae-Hollandia oram meridional em prone portum Regis Georgu legit cl Biown et mecum cum pluribu., alns humauksime comm. Stypbeha pendula Spreng syst i. p 657 (v s)
- 59 L. BIFIORUS (Brown 1 c), ramulis . . . folns patalis lmcau-lanceolatis planis mucrone pungenti marginibus laevibus, pedumnhs biflous recuivis, corollas tubo calycem aeqnanle J in Novâ Hollands ad Port Jackson Folia 3-hnearia. Stypelia biflora Spreng. syst 1. p. 65g
60. L. SEIGLER (Brown prod 545), ramulis glabiinsrnlis, foliis leinotiuscolis patulis lanceolato-linearibus acuminatis, raurcrone setaceo pungenti, marginibus lecaivis obsolete denticulatis, pednnculis axillanbns bi- laius tnflons talyce longionbtis patulis, cal lobis subnlato-acuminatis glabus, biacteis brevissimum J in Nova-Hollandia' orient ciica' Poit Jackson (Br.), in montibns caernleib (Cunn '). Sieb ' fl exs. n boll n q4 Stypelia setigeia Spreng 1.c Folia 5 Jin. longa , supra la:via, subtus subtiliter shiiata (v. s)
61. L. SPARSUS (A. Cunn ' in htt), ramulis glabus, foliis, remotis patentibus lanceolato-linearibus rigidc cuspidato-mucronatis glabris ntiinqie concoloii-busetad margmes l-e\bas, pedicellii brevissimis i 2-floris bracteis obtusissmis glabns Jin collibus rnpestiibos planitiernm INovae Cambnae austiahb propc Liveipool legit cl Canninghai' Folia pallide virentia, 5-6 hn longa , 1 \ lata, nonnulla casn sababortiva ovaha obtusa triplo breviora (l s a cl. inv)
62. L. SIEBERI, ramulis busntulis , foliis pa tolls line^n-Ianccolatis in mucio-nein setaceum apiculatis plamusculis nliinqne glabiis maigme subedentuh supra laevibus subtus \ix stnatulis, pedicel I is ad axillas brevissimis 1 -{floris erectis, corollas lobis parce barbatis, dinpå ovoideå snb-i-speima * in Nova-Hollandia legit cl. Siebei Lissanthe stngosa Sieb ' fl exs n holl'n. 96 non Brown Folia nuraeiosissima snbmtida f 4 lin , longa lineam lat 1 Diupacius-tacea semen unicum et loculos a aboitivos exhibens (v. s ex coll Sieb)
- 63 L. ACDMINATUS (Brown I c), ramulis.. . foliis erectinsculis linean-lanceolatis acotissimis planis, mucrone setaceo, marginibus scabris denticnlatis, pe-dnnculis brevissimis erectis subbiflons ^)in Nova-Hollandia mtru tropicum Stypbelia acnminata Spreng 1. c
64. L. cusriDATUS (Biown ! 1. c), ramulis glabiinsculis, foliis modice patentibus planis obovato oblongis arnminato-cnspidatis, mucione sub&pine¢e marginibns scabns denticulatis , peduueulia brevissimis eieuis i-a flolis' bracteis ovalibus apiculatis calyce tiiplo brevioribus. j in Nova-Hollandia' intra tiopicura (Br.) Stypelia cuspidata Spreng syst 1. p. 677 Folia 4 lm longa, 1 f lata (v s. a cl Brown.)
65. L. LEPTOSPERMOIDES (Biown' prod. 546), ramulis rachibnsque albo velntmo-hirtelhs, fohis hnean lanceolatis modice patentibus planiuscnlis "labiis acatiisimis, mucione rigidulo, marginibus minutissime denticulatis, p dunculis brevissimis erectis 1-4-floris, bracteis caloso-subapiculatis ^ in Nova-Hollandia orientah intr  tro^picnm (Bi ') Stypelia leptospeimoides Spren" 1. c. Folia 6 lin. longa , 1 \ lata (v s. comm. a cl inv) r t>
66. L. MUCRONATUS, lamulis velutino hiisutulis , foliis oblongs thstmcte mn-cronatis planis niaigme inlegeriimis supi  glabiiuscalis snbtus sparse hirtellis coriaceis conf<TMnis subimbucatis, flonbus in axillis folioian i axillaribns in &pirain foli.iccam digestis , bracteis calycib &que subvelutinis 5 in regiombus steilibrns Novae-Hollandijc mteioris ad lat. 29°, 10' et longit. or. 100°, 3i' Jcgit cl Cuunningham L. lauigei Cu-nu.' in litt sed a lanigero vero mihi divti-

sns videtur foliis ovali oblongis nee coidatis, imbnatatis nee lomoliusculis, supia glabtiusuhs nee hii&utnlis, mucrone ligido dislinctissimo, coiollas lobis muho minus birsutis, etc. (v s. à cl inv)

- 67 L RECIINATUS (A Cunn ' in litt. 1836), ramnlis pubescenti-subhirtellis, fohis ovatis ovalibusve larius oblongis imbucatis mucronatis maigme integer-liinissupu laevibus sub I us pluristuatis otunque glabiis, floubus in axillis so-liUins subsessilibus in spitam foliosam subdigestis, dmpa ovoideā evsutca i-a-speimā ^marenosis campis Novae Cauibuae inteuous legit cl. Cunniugbani! Hutex lamosissiinus, verisiaulitei ex nom. à cl autoptā adimsso, plus minus lecLnafus, proxiinus L mucronato sed folia snbtus glabiā llami mgii-cantes. kolia 1 | lin. longa, hueam Iala Diupt vixstiiata (v s a cl inv)

fi. oblongifohus, ramulis pubescenti-husutulis, foliis oblongis (paucissiuis ovatis), drupisstriatis 5ⁱⁿ Nova; Cambiix australis legiombus interious legit cl. Cuuningbam. Dlstlnctub a L leclinato habetur à cl invent, sed saltern ex sicco diffeienUac meos oculos fu^iunt praeter levissimas t̄upia notatas Coi. lobi snperne densissiine barbati Folia 2 lin feie longa , vix ultra semilineam Iala, sed hinc inde adsunt qnaeJam m^{at}gis o\ata ut in var. a., adsunt etiam qujedara oblonga. (v. s. a cl. inv)

68. L. IMBRICAIUS (Blown 1. c), ramulis... foliis imbnatatis ovalibus obtusis enspidatis concaviuscubs marginibus edentulis Ixvibus , pedunculis bievihiis erectis i-2-flons./>in Nova-Holl ictia tropicum (Br). Stypbeha itnbiiicata Spreng. syst. r. p. 656

69. L NESoruirus, ramulis subpnberulis, foliis planis imbricatis obovalis> rigidē mncionatis subtus stnatis, maigimbas subscaiioMS denticulatis, pedunculis axillanbns brevis&imis i-a-ilous. § in Nova Zeelacia ad binura insniaexn Leucop. Fraseri Canu.¹ in litt. sed e\ideuter lapsus calami et species a L. Frascn diversa Aflinis videtur L imbcato sed niaigines folioium nee laeves nee edrntuli. Iolia 2-3 lin. longi, 1 | lin l?ta snbglaucescentia ramulos omnino obtegentia Biactese obtusissimoe (v. s. à cl. Cunningbam.)

- 70 L. RUSCIFOLIUS (Brown \. c), 1 am nils. .. foliis erecto-patnlis obovato-ellipticis acutinsculis pa rum concavis mucionatis, maiginibus laevibus obsole-tissime denticulatis, pedunculis brevissimis eiectis subbifloris ^>in Nova-Holl. intrā tropicum Stjphelia inscifolia Spreng I.e.

*ji L PAUCIFLOKUS (Biown prod. ^46), aiboiescens, ramnlis . . . , foliis an-gusto-lanceolatis modice patentibus planis, mucrone brevisjimo subcalloso, mirgimbus laevibua, peduncuho bievissimis creclis subbiflois. /)ad littoia INo-vse-Hollandiae intia tiopicura Stypbeha paucifloia Spieng. 1 c.

- 72 L. ATTNUAIUS(A. Cunn ' in Field mem. p 34i et inlinnaeā 1837 p i3o), ramulis tenuis&ime pubescentibus, foliis oblongis distinete inucionatib planU inarginc integeirimis utrinque glabus subtus subtihei sniatis subconfeiti'* eiectis, sum mis imbnatatis, floiibusm axillis 1-2 sessilibus, calycibus biacteis-qne glabns. j in Nova' Cambria anstrah ad Cox-liver octob. flor. legit cl. Cunningbam Folia omoinu L. mucronati sed glabra, jumora villis decidois apice subcibata, adulta subglaucescentia. (v. s. à cl. inv .)

- 73 L PAKVIFOLIUS, ramnlis glabus, foliis o\atis concavo-cymbaefonmbusobtasis muticis margine integernus subtis stnatis utnnque glabns, floribns in axillis folioium supeuorum sensim decrescentjum solitariis sessibus in spicam ideo elongatam foliaceain dispositis, diupis obovato-globosis sub-i-speimis. f) io Novae-Hollandiae orā meudion ad apices colluiu prope Regis Georgn sinuin legit cl. Cuuningbam L. cucullatus Cunn ^T in litt nee Br. Differt à descu'pt-J encallati nuhi ignoti florom dispositione in spicas sobtaiias nee aggregata^, necnon diupis crustaceis i-speimis subbilochnlanbns nee 5-locul — Iolia t 7 lin. longa stu'etc adpiessa fere amplexicaulia coriacea. Cal. glabrl ciliati. Coi lobi superne hirsutissimi (v. s. à cl inv .)

- 74, L KOTUNDIFOLIUS (Btown^f I c), iamulis brevissime snbyclutinis, foliis obovato-cunrahs am subrotundis bievissime petiolatis modicr patentibus pla-nis mutronulatis glabns supra laevibus snbtus striis temssimis divergeutibiw

- sublineatis, tuaiginibns pellucidis tenuissiuesubcihatis, peduuucuhsbicwssimis
iectis 1-2-floii. J in Novae-Hollandioe ora mend. (Bi.! Cnnn.'). Styphelw
rotundifolia Spreng 1. c. loha 3-4 lin. longa, 2 J-3 hn. lata. (v s)
75. L. PETIOLARIS, lamuhs glnbiuscuhs, fohi longiuacule petiolatis imbiicatis
ovatis mucronatis glabns suprā nihdis subtus albidis venis 5-7 parallelis strinti*
raagine callosis integeriiniis, peduncuhs brevis&imis eiecli<, 1-2-iloii fy JU
insulā Van-Diemen prope Hobait-town legit cl. d'Uiville I olia 2-3 lin longa
sesqmhn lata petiolo calloaoiufo hncam longo. Cnr lobi snpeine bievitei et
dense hirsnti. Biacleac apice ciatse (v. s.comm. a cl. IUV.)
76. L. COELOPHYLIUS (A Cunn ! iu hit. 1836), lamuhs hiisutuhs, foliis ovatis
seu ovato-lanceolatis brevissime peliolulatis eiectiuscuhs apice taloso mu'itis
concavo-convexissapici enerviis breviteret sparse pubcinlis, subtus pihs longis
hiisntis roultUttualis margine integerumis, pedicelhs bievissimis i-a-floris,
hracteis cibatis, cor. lobis lineaibus superne brevissiroe hittellis. £ m Novae-
Hollandiaeoiā mend legit cl. Baxtei. Folia 5-b lm longa, 2-2 ; lala. (v. s.
comm. à cl Cunningham.)
77. L. FRASERI (A Cunn.' in lilt. r836), lamuhs pubescentMiirsutis, foliis snb-
lanceolati-hneanbus acuminalo-imicionatH eieclis margine scabris ad hasin
pilosinscuhs suprā plano-concavis lavibns subtus convexis sltiatis pallidiou-
bus, peduncuhi bievissimis 2-3 floii, biacleis obtuwssjrais. /> in Olā No\ae-
Hoyandiae ineidionali. Intex ligidns. 1 olia 6 lin. longa, 1 £ lata. Ramuli
flondi bieAes. (v s comm. a cl. Cunuinghaua ex heib Iraseii)
78. L. CONOSIEPHIOIDES, caule eiecto lamosissimo, lamulis giabiiuscuhs, folus
erctus hneari-suhlanceolatis acuminate-pnngentibus convolutis glabns sub-
tus striainlis suprā Iambus, iloiibus axillaibus geimmis subsesHihbus patulis ,
bracteis minute apiculntis j ^u No\J-Hollandia ad Swan-iivei legit cl. Drum-
inond' Suffiutex ligidus loha 5 lin louga. Calycis lobi pergamaci acnroiDati
tubo coi. tequales. Cor lobi acuminati supeinc baibati quā notā facile stirps
a Conostephio, cui habitu affmis, di\esa (v. b à cl inv.)
- 7g. L. IIAMULOSUS (A Cunn ! inlitt 1836), 1 amis ramulisque brevissimis piibes-
centi-hirsutis, folus erectis lanceolatis mucrone betaceo longo apiculatis niai-
cine recurvatisntrinque hispido-pilosiusculis, flonbusin fohoruin ramulouium
āxillis solitanis subsessihbus, bracteis^ubiotundis calycibusque hispido-pilo-
sulis. ^ in Novae-Caiubiæ austi. inteiioois slcnhbus inter fiumina Lachian et
Macquane raiissima, aug. flor , legit cl. A. Cunningham! Species hiisutie
pdosi omnium partium facile diversa. Cor. lobi superne albo-hirsutiasnui. ^\.
s. a cl inv)
80. L. BLEPHARODES , rainosissimnni glabrum h»mile, fohiu hneftri-lanceolHlis
mucronato acummatis sboonvolutis maigine denticulato-cihalis ufiinque gl.t-
briseiectis floubns axillaibus solitarus sessihbus, biacteis 4 obtusissimis ,
calycibus acnminatis, cor lobis acummatis. 3 in Novā-Hollandii ad Sw.iu-
river lecit cl Diuramoid¹ Spccied foliis ligide ciatis faede dislincta, ambigit
inter Stomairienara et Leucopogonem, puon extractcis quateinis, posteriori
ex disco hypogyno clathifouni obtusissime 5-fido afiinis. (. s à cl mv)
- *• L. RIGIDUS (A Cunn ' in li» i83G), lamnlis tenue pulioscenlibns , foliis gla-
bns ereclo-^ubpatnlis lanceolatti acuminalo-mucionnhtis planis iut supia
concavis marcine integemmis supn̄ laivibus subtus slriatis, pednnncuhs axil-
laribus brevissimis i-3-flons, biacteis obrusiss.mis calycibusque glabus. 5 ..d
NovjE-Hollandia oram meiid legit cl Cunningham, tiatex humilis ramosissi-
mus, ramis diverpentibns. Folia llm. longa, Imeam lata. Cor. lobi supeme
O'miores) parce barbat (v. s a cl. inv.)
- 8a - L. juNirERiwus (Brown! 1. c), ramulis densē hittellis , foliis pntnlFs lineaibus
setaceo-mucronatis glabris, maigmibus iccurvis bre\iter dentFculatis,
floribus subsessilibus sohlaiisi hinisve, biacteis 3-5 calycibusqne mocionatis.
5 in Novā-Hollandia' ad Poit Jackson Lodd. hot. cab. t. 4/J7. Styphelia juni
peiina Spreng. I.e. non Pes. Tloics in paite ramoium infeiioic o'lli. Coi.lohi
hneaines acuminati supeme dense et bioitci birli. (v. s. comm a'cl. Kiovyo ^

83. L. RECURVATUS (A. Cnnn' in hit i836), ramuhs pubei ulis, foliis erectis lanceolate rancronatis, margine recnivntis edenliculatis glabris supia laevibū* buhtus mullistrialis, pednnculu. axillaribus brevissimis i-3 flons, bracteis subrotundis bievious \$ *n Novae-Cambriae anstrahs montibus fiulga <id Hnntet's*- uver legit cl Cunningham jpi llo. Affuis L juniperino ex cl. mv sed facile diversus Folia 2-3 hn. longa, lineam lata Coi lobi Miperne albo-hirsntissimi (v. s. à cl. mv.)
84. L. INSULARIS (A. Conn' m ht i836), ramnlis pbescenti-suhvelntims, foliis lanceolate patulis apice in mucronem ngidulum elongatum apiculatis maigine recui valis et edentulis ntrinque glabris laeviuscuhs subtū ad basin subetuatis , floribus ad axillas bohtanis erectis snbsessihbus <\$ in vail 1 bus arenosis insulaa Rottney ad uram occidentalem Novae-Hollandiae januar. flor. detexit cl Cunningham Suffrutex ramosissimns rigidulus Folia 4 lin longa , explanala se&- quilin. lata. (v. a a cl. inv)
85. L. EPACRIDIS, ramuhs pobescenti-subvelatims, foliis patolisimd sobreflexis lanceulatis, basi subinfexo-cordatis apice niucionato-pnngentibiis maigine recnrvatis conaceis utrinque laevibns glabris subtus snbglauca, flonbus axilla- libus sohtarns patulo-reflexis, bracteolis calyciaque obtu&is, cor calyce dnplo iere, longioia , tnbo mtus ad basin fa ace lobisqae breviter harbatis 5 in Novā-Hollandiā ad Swan-river legit cl. Drummond' Folia 4-5 lin longa, i I lata. Kami rigidi divaricati. Cor. rabrae , fere Epacndis, 5 lin. longae, faucejobco- nicā, lobis acuniinatis. Affinis L insular!, (v. s. à cl. mv.)
86. L. DELORMIS (Brown'I c), ramuhs pobeio-villosis, foliis ereclo-pdtolis sublanceolato-hneaiibus acurainato-mnernatlj planiusculisi la?vibus, maigine obsofte denticulatis^ floiibus sabsessihbs snlitams multibracteatis, ovano 3-loculan ^m Nova-Holl. ad Port Jackson Folia a-2 / lin. longa , bemilineam lata. Stypheha deformis Spreng I c. (v. s. comm. a cl. Brown)
87. L. FLEXIFOIUH (Brown 1 c), ramnlis., foliis confertissimis imbncatU huearibns uiucronatis tortilibns, margine scabris denticulatis, floribus subset- silibus solitarhs ovano 5-loculan. ty in Novā-Hollandiā intra tropicum. hty- phelia flexifolia Spreng sysL 1. p 659.
88. L. APPRESSUS (Biown I c. non Sieb.), ramolis glabris, fohis imbricatis erecto- adpressis lanceolatib acuminatis mnchronatis planiusrulis margine minute den- ticolatis suprà laevibus snbtū minatissime striatnlis, pedunculis brevissimia erectis i-3-flons £ in Novae-Hollandiae ericetis sabnlosis circa Port Jackson. (Br. Sieb.), ad Kingsfalls (Cnnn') Guill ic lirh. t 10 L. fastigiatns Siebei ! fl. exs. n holl n 108 L appressus et fastigiatus G. Don gen syst. 3. p. 770. Stypheha appressa Spreng. syst. x p. 658, et Stypheha fastigata Spieng. cui. post, p 67 Kami plarimi virgati subcorymboso-fastigiati. Folia 7-9 hn. longa, 2 hn lata. (v. s.)
89. L. ESQUAMATUS (Brown' 1 c), ramnlis glabris, foliis sparsis erecto patnhs lanceolatis snbacminatis mucronatis planis aversis, marginibuj. pellncidis sca- bndis, pedunculis brevissimis erectis 1-a-floris , biacteis. ohtusis , ovanu, bilo- cularibus, disco hypogyno nnlo <J in Nov.1-Hollandiā onentali (h. inus. Par'), prope Port Jackson (Bi.') Sfypheha esqvaroata Spremp. 1 c Similhmu L. ap- presso. Folia 6 lin. longa , vix ultrā lineam lata. (v. s.)
- j- *Species non satis nota.*
90. L. FORSTERI (A. Rich voy. atr. (1832) p. 216 G Don gen. syst 3 (i834) p. 780) arboreus, foliis sparsis linearibns cuspidatis serrulatis, floribus sessi- libas solitanis termmalibns vel axillanbas jj in No|x-Zeelandix sjlvis (Foist), m loco Gallij. dicto Havre de rAstrolabe'(d'Uiv.). Epacns junipeina Fot&t tar gen. 10 11 a prod, n 71 Drup-e pisiformes apicnlatap deppressa? 4-5 lotul. locnlis i-spermis Pednncnh brevissimi squamulosi Cor indescr. — Specimen habeo ab ipso Urvilleo in Nova-Zeelandia ad fietum Cookianum lectum et b,ni descr sat conveniens, sed folia maigine mtegeriira subtus glauca &trns 3-5 h- neata petiolata d-4 hn longa scmih. lata Ramuh pubernh. Cor lgn Tract, descr. Rich, siuijhs (v. s.)

XI. ATHEROCEPHALA.

Calyx extiis bibracteatus 5-partitus seu fortè 5-phyllo, sepalis membranaceis basi subdilatatis in acumen ferè subulatum valde elongatis corolla? tubum superantibus. Cor. infundibuliformis, tubo tcreti glabro, lobis angustis revolutis apice summo nudis, caeterum suporne lanâ densâ albâ barbatis. Stam. a' corolla libera, fi la mentis exsertis, antheris oblongo-linearibus dorso infrâ medium filamento insertis. Ovarium subglobosum 5-loc. 5-ovulatum. Stylus filiformis exsertus. Stigma obtusum minute capitatum. Cact. ign. — Suffrutex Australasicus ramosissirnus 6-8-pollic. Rami teretes, juniores subpuberuli, adulti glabri. Folia glabra inferne imbricata basi subvaginantia apice subuiata acerosa. Flores albidi in spicam densam ovatam terminalem, calycinis lobis cuspidiformibus (fere ut in Diantho barbato) exserlis, dispositi. Folia floralia seu bracteae basi magis dilatata et parce ad apicem producta. Bracteolac duse opposite carinatae bractea breviores. — Genus affine Leucopogoni sed staminibus exsertis et calycis strutura diversum. — Nomen, ex *3'j'f cuspis arista et *«pax» caput, allud.it ad spicam capitiformem calycinis lobis cuspidiformibus ornatam.

i. A. DRUMMOND: J in Novâ-Hollandiâ ad Swan-river legit cl. Drummond! (v. 8. à cl. inv.)

XII. MONOTOCA R. Brown prod. 546. Ram. et Schuk. 4. p. XLII. G. Don gen. syst. 3. p. 780. — Stypheliae sp. Sm. Labill. — Monotocæ sp. Spreng.

Calyx bibracteatus 5-lobus. Cor. infundibuliformis limbo 5-lobo fuceque imberbibus. Stam. non exserta. Discus hypogynus cyathiformis lobatus. Ovarium i-spermum! Drupa baccata subglobosa. — Frutices seu arbusculæ mmosissimse. Folia sparsa ad margines intcgerrima saepè subtillis glauca aut lineato-striata et ad apicem mucrouata. Spicaa terminates aut axillares pauciflorae. Cor. albae parvs, interdiu vitio organorum dio'cae.

§. 1. Arbusculce aut frutices orgyales, floribus abortu dioicis,
bractcis sublendentibus caducis.

1. M. ELLIPTICA (Brown! prod. 546), ramalls rachibnsqae spicararu rminatissirae puberulis, foliis elliptico-oblongis mucronatis latitudine suâ quadruplo longioribus, spicis erectis subterminalibus aggregatis vel axillaribus solitariis. \$ in Novâ-Hollandiâ circâ Port Jackson. Sieb.! fl. exs. n. holl. n. 99. Styphelia eliptica Smith nov. holl. p. 49. Folia pallidè virentia subtus glauca lineata, C>lin. longa, 1 j lin. lata. Spicæ foliis terroinalibus suhaequales. (v. s.)
2. M. ALBBNS (Brown 1. c.), raranlis rachibnsqae glabris, foliis oblongo-linearitns breviter raocronatis subtus albis lineatis latitudine sua qminqnis longiori-^{*>}ns, spicis erectis solitariis terminalibns axillaribnsque. \$ in Nova-Hollandia ad Port Jackson (Br.), in montibns caernleis (Cunn.). Sieb.! fi. exs. n. holl. n. 98. Folia 5-6 lin. lon^a vix ultrâ lineam lata. Spicae foliò doplo triplovc breviores. (v. s. à cl. Sieber et Cunningham.)
- 3*. M. LINEATA (Brown! 1. c), ramulis rachibnsque minutissimè puberulis, foliis oblongis rariùs obovatis acuminato-raucronatis planiusculis latitudioe smt qna^{ar}nplo quintuplove lnngioribiis, spicis axiliaribus paacifloris bieviter peduncula's folio multe brevioribus. \$ in insulâ Van-Diemen (Labill.! Br.). Loud. ^{en}cyd. n. a3a3. iu. Styphelia glauca tabill.! nov. holl. 1. p. 45. t. 61. (v. &)

- jf. *pauciflora*, floibus nunc 2-3 in axillis bispicatis mine solariis. ^ in Novae-Holla udise oīā mend. Folia longiora et magis albido-glaucā qua'in \ar. tt. (v s co mm. à in us. leg Par)
4. M. PATENS (A. Turin' in litt i836), ramuhs glabris, foliis oblongo-hneaiibus ligide murionatib latitbdme suā \ix quadruplo longioiib* subtus snblineatis vix pallidiobus, pedunenhs axillaibus biewhsimis i-3-flois. \$ in Novac-Hollandiae austf. ocud. deseitis inter Bnsban et Moreton-bay julio /lor legit cl Cunningham' Frutex iamosissiruus erectas. Folia 3-4 lin longa , lineam lata, coiacca Media inter pnorein et secundam geneis sectionem. Aflinis M. albenti ex cl Cann. (v. s. a cl. mv.)
- §. 2. *Frutiuli, Jlonbus hermaphroditis, bractcis subtendcentibus persist entibus,*
- 5 M. SCOPARIA (Brown' prod. ^47), canie erecto, lamulis glabris, foliis linearilanceoiatis mucronatis matgine revolutis, iucemnlis axillatibus brevissicnis pauciflois subs>essilibussubnutantibas /) in Novd-Hollandiā circā Port Jackson. Sieb ' fl. exs. n boll. n. 07. Srybelia scopana Smith nov holl. 1. p. 335. Diopa minima 1-sperm» nee 5-locul nt volait cl. Smith Folia 5-7 lin long.i, lineam lata, nonnulla aliis ssepe intermixta plana obovata 2-3 lin. lata raar-gine membranacea videntr nbnstrosa (v s.)
6. M. LEDXFOCIA (A. Cunn. f in litt i83t)), c.mlc erecto, ramis'toitao&is etiam jnnionbus glabris, fohis oblongls latitudine duplo tnlove longionbus obtusis callosis subtus lincato-stualis, floibus axillaibus aut subterinalibus paucissimis subsessilibus. ^ in No\al-HollandiA ad montfs *Cenileo* legit <1. Cunuinghani¹ Aflnis dicitnr M empetnf >iae sed a ilesclpllonr Biownn iccdit canle erecto, (olus snpia planis \ix ac nc vix sublu* dealbatis mucroue destrutus et magi& cieclis. (v. s. à cl. inv.)
7. M. PROPINQUA (A. Cunn ' in litt. 1836), caule erecto, iarais etiam junioribus glabrib, foliis linear-oblougis latitndje qnintuplo bextuplo\e longionbns planis inucionatis subtil lineato-striatis, floibus ad axillas paucis raceinulosis bubnutantibus Jin Novā-CambiiA interiori in collium liipehtiibus apr. floi. legit cl. Cunningham. Ex eo valde aflmis M. empetifoliae sed nee piostrata necfoliisdivaricalis supra convexis donata (v s à cl. rtiv)
8. M. AMPFIRIFOLIA (Biown prod. 5^), caule prosti.Uo, lami§ . . , foliis oblongo-ovalibns mucronatis divaricatis suprà convexis, subtus stuatis dealbatis, 2>piciliis axillaibus nutantibus -2-3-floris. j in insulā 'Van-Diemen.

¶ Species exclusa.

M. PUMILIO Spreng. =Ncedhamia Pumiho.

XII.ACROTRICHE7J. Brown prod. 547. G Dongen.sjst. 3 p. 780 —Styphelwe bp. Labill. Spreng.

Calyx bibractcatus 5-partitus. Cor. infundibuliformis limbo J-lobo , lobis apice barbā deflexā penicillatis Stamina subexserta lobis coroll@ breviora. Discus hypogynus cyathifoimis sublobatus. Drupa baccata depresso-globosa sube^succa putamine 5-locul. cellulose—Fiutices humiles Iamosissium ramis ssepiis divaticatis. Folia spaiza ra.uginc integcrnina. Spicae laterales longiusculae veiaxillares breves pauctloiae. Flores parvi albi aut subrubentes. Drupa; parvae.

* *Spiculis axillaris*

1. A. nivxRicATA (Brown prod 547), ramulis vix pubescentibas elongatis, foliis lanceolate mucronatis divancato-palulis planu ntiinque ^iridibus niaigine loevibub, spicnlis pauciflois axillaibui> iolio niulto bu*ionbus. J III Novā-Uollindiā ad Poit Jackson Sieb ' {1 exs n. holl n. t>H Stypheba dnaiicata

Spreng sysl. i p 658 r_oba61in longa, vix ullia' lineam lata (v. s. ex coll. Sieb.)

- a A AGCRFGATA (Biown' prod. 5⁷), ramulis pubescenli \elutinis abbreviatis, fohib oblongo-lanceolatis coucaviusculis patulis inucionatis margine laivibus suprà luadis subtus glaucis, spiculis pauciflons axillanbus folio mullo brevioribus gin Nova-Holldndia' ouentah miia' tiopicum Styphelia * aggiegata Spreng. 1. c. Suffrutex bumillimus. I olia 6-8-lin. longa , i 1.2 l_n. ja,a⁻ t^{*} _{bm} coram. a cl. Brown.)
- 3 A. ARISTATA (Bentll. in Hug enum. p 76 in adn), ramohs \illosis, fobis oblongo-lauceolatis cuneatis\ e anstato-subinucionatis subplanis subtus stnatis margine Iambus, pedunculis subbiflons axillaubns gin Auslialia ex b mus. Pal. C01. calyce dnplo longior, tnbo mtus wloso, lacicjis apice baibatis' Dinpa oblonga 5-lociil cellnlosa (v s) coinm à mus. Par.)
- 4 A SERRULAIA (Brown 1. c), lamubs subpubeius, folns Hncaii-ldnceolatis cmpidalis patulis pilosis et glabrinsculis, maigimbus serrnlato ciltatis *picis axilldiibus pauiiflons folio bieMonbus Q in No\ae-Hollandiae 01à meudionali (Hr. h mus Pai ') et in insulâ Vau-Diemen (Labill '). Styphelia serrulat.i Labill ' uov. boll 1 p 45 t. 62. Spieng 1. c I olia 2-2 1 lin. longa, senii-lineam lata, sublus trineiMd. Spirula: 4 8-floiae (v s)
- 3 A. AFFIKIS, lamubs bntellis, folns lanreolatis cuspidatis patulis glabns mar- gine et supeinc laewbus sublus S-5 nei\ulatis, spicis .xillaibus 7-8-florig /olio paulo bievioubus. g in No\aj Hollandiae 01à meudionali. Aci afiinis &er- rulataj beib. mus l\ai.» Folia 3 lin. loiga, feie lineam lala. (v. s. comm. a mus. leg. Pai ex itin Baud)
6. A. PATULA (Bioviri 1. c), ramis divancatis , folns o\ato-lanceolatis acumi- natis mucionatis planiusculis' palulis, spioulis axilldibus. f_j in Nova-Hollan- dia 01à meridional!. Sljpbelia pjlula Spieng syst. 1. p. 65.
- 7« A. SUBCORDATA , lainulis nüDutissiiie subvelutims, foliis petlolulatu ovatin b.isi subcoidatis apice callosis mnfics planin subtus sfnattilis, Jloubns ad axil las paucia subspicatis subsessilibus gin INovae-Holl indiae oia meudionali (Labill.¹ h inut, Par.') ad Kiug's Oeot-ge's sound (CunnJ). Ex ipso Billardieni spetim folia iconis nimis coidua btypheba coidata Labill ' nov. boll. 1. p. 4b t '03 AciotNcbc coidata et Aciotucbe ovabfolia Biown prod. 548. Aciô- tncheovalifolia Hook bot. mag t. J171 (v s comm a cl. Labill Cunningb. et h. mus. Par)

* * *Flonbus axdlaribus sohtarus*

*• A F L\TIFOLIA(A Conn.'in litt. 1836), glaberrima, folns sessihbussubcorda- lis subiotandis mucion_oitis maigiuo laevibus plams patulN utnnquc concolo- nbus, flonbus ad axillas subsessilibus solnani^ £ in JNovT-Hollandiae ori meiidionali legit cl. Baxtei Species distinciissiroa foitea genere lemovenda. *'"oha a-a 1 lin longa, 3 lin lata. Cor. mibi ign. Bacca sicca ovoidea, nee ut in Acroitiicibus ^eiis globoso-depressa, stylo mucronata 5-loc. 5-speima calycis lobis ovabbus obtnsis dnplo longioi. (v s a cl Cuumngbam)

* * • *Spiculis rameis laterahbns*

- 9- A. RAMIFIORA (Brown 1. c), ramulis .. folns linea-lanceolatis mucronatis divaricatis subtus discolonbus ner\osis, marginibus lecuivis, spiculis lamicis. 5 in No\ae Hollandiae ora mendionali. Siypbelia lamifloia Spieng 1 p. (J5Q")
 10- A DiPRtssA (Biown piod. 548;, caule depiesso, ramulis. , , foliis ovatis subcoidalis mucronatis di\aricatis supia convexis subtus venosis, spiculis ra- ^eis. giu Novae Hollandiae 01à mend. Floies ex cl. anct. ignoti Styphelia depiessa Spreng. syst 1 p 655.

¹. *Laddigesu*, canle cieecto lomoso, foliis planiu^cubs cdiolahs, spicolis ¹ifia folia in ramis vetuslis oitis deflexis g in Nov -Holl. A diagnosi Bro^niana ¹«vibsimâ vix distinguenda et vide'ui vanetas à coltuiat orta. (v. v c. in h. Genev ex hoit. Loddiges.)

XIV. TROCHOCARPA *R. Brown prod. i. p. 660. G. Don gen. syst. 3. p. 781.* —
Trochocarpae sp. Spreng. — Cyathodis seu Sfypheiae sp. Rudge.

Calyx bibraclealus 5-partitus. Cor. infundibuliformis limbo patente barbato. Stain, inclusa. Discus hypogynus cyathiibrmis 5-Iobus. Ovarium 10-loculare. Drupa baccata depresso-gloiosa putamine rotato 10-lobo demum paribili. — Arbuscula Novo-Hollandica tola glabra, ligno durissimo. Folia sparsa petiolata nervosa nitida ferè Laurina 5-nervia ad margines laevia. Spies terminales et axillares graciles folio breviores. Flores albi. — Genus Decaspora proximum sed habitus diversissimus.

- i. T. TURINA (Brown! 1. c.). 5 ia Novâ-Hollandiâ ad Port Jackson (Br.! Cann.!). Hook. Lot. mag. t. 33a4. Cyathodes laurina Brown ohm in herb. Banks, Ilndg. in trans. linn. soc. 8. p. 29. t. 9 (& ob nomine Stypheliae cornifoliae). Arbor ao-pedalis (Cunn.) Folia 3 pollices longa, pollicem late. (v. s.)

"j- Species exclusce.

T. DISTICH A Spreng. = Decaspora disticha.

T. THYMIFOLIA Spreng. = Decaspora thymifolia.

XV. DECASPORA *R. Brown prod. Stf. G. Don gen. syst. S.p. 781.* — Trochocarpae sp. Spreng. — Cyathodis sp. Labill.

Calyx bibracteatus 5-lobus. Cor. campanula la, limbo 5-lobo, fauce barbatâ, lobis vix laxè barbatis. Stamina exserla. SquamuliB 5 hypogynae basi connalse. Ovarium 10-loculare, loculis i-spermis. Bacca globoso-depressa stylo superata, 10-pyreni — Frutices ex ins. Van-Diemen orli pulchri. Folia sparsa petiolata 3-5-nervia glabra margine laevia utrinquè concolora. Spicae terminales saepiis nulantes multiflorae. Bracteæ sub floribus ovatae persistentes. Cor. rubra?. Baccac violaceac.

- z. D. DISTICH A (Brown 1. c.), ramulis glabris, foliis lanceolatis acutissimis planis snbtis nervosis petiolo 8-plo longioribus. \$ in insulâ "Van-Diemen. Cyathodes disticha Labill. nov. boll. 1. p. 58. t. 82. Trochocarpa disticha Spreng. syst. 1. p. 660. Folia fortè non stricto sensu disticha, supernè lseviuscna, 6-7-lin. longa, 2^3 l.m. lata. Cor. faux barbata lobis glabriuscnis. Spicae nutantes. (v. s. à cl. Labill.)
- a. D. CUNTINGHAMI, ram alls piloso-hirtellis, foliis oblongis ant snbovatis wucronatis planis soperne elegantè venosis petiolo 5-plo longioribus. 3 *n P^luJ°" sis insulae Van-Diemen ad oram occid. januar. flor. legit cl. Cunningham. Dec. thymifolia? Conn.! in litt. i83(>. Priori affinis sed differtramus pilots, folioruoi formæ et praesertim nervis 3 subtis ut in seqnenti prominulis, soperne venas disticho-pinnatas proferentibas. Cor. faux barbata lobi glabri. Spicae nutantes. (v. s. à cl. inv.)
3. D. IHYMIFOLIA (Brown ! 1. c.), ramulis pubescentibns, foliis ovatis acutinsco-lis mnticis snbtis obsoletè snbtrinervibiis petiolo vix quadruplo longioribus. J in insulâ Van-Diemen ad montem Tabnlarem (Br.!) sen Wellington (Cunu!). Trochocarpa thymifolia JSpreng. 1. c. Dec. oxycoccoides Cunn.! i» litt. Frutex ha mil is. Folia 2 Hn. longa, apice callosula. Spicae alia? nutantes alia; erectiuscul*. (v. s. à cl. Brown et Cunningham.)

XVI. PENTACHONDRA. *R. Brown prod. 5*9. G. Don gen. sysl. 3.p- 781.* — Siypheliae sp. Spreng. — Epacridis sp. Forst.

Calyx 5-lobus bracteis 8 cinclus. Cor. iufuudibuliformis, limbo 5*

lobo patentc, lobis longitudmaliter baibalis. Squainuke 5 Jiypogynae. Oviium 5-locul. Bacca pyicnis 5 monospeiniis constaus. — Frūticuli erecti in monlibus insulae Van-Diemen spontanei. Folia &parsa petiolu-* tata. Floies sessiles sohtain aut subagiegati ad apices raimorum crecti albi.

Sect. i. EDPENTACHONDR.

Stamina exseita. Brae tea? 8 ad basin calycis. folia supeine striata. Caolis crectus.

i- P INVOIUCRATA (Biown' 1. c), ram nils pnbcescentibus., folns ell'mtko sea liaeari-Ianceolahs pluri-nervibns margme (saltern janionbus) villoso-tilidts, bracteis calycibnsque cihatis. J in insnlā "Van-Djeraen ad montem r.tbtilarem" (Bi ' \ Stypheln involucrata bpreng syst i. p 555. lolia 1-6 lin lon*»a , i - r | h n lata Flo res ad apices ramoruio solitarii foliis 5 involucrati (v s : comui. à cl, anct.)

Sect. II. EPACRIDIUM.

Stamina mclusa. Biactae 4 ad basin calycis. Folia saperne lacvia. Gaales prostrati — An genns piopnumm **

³ PPrumirv (Biown' 1 t), i.tuiulib glabris, folns subellipticis glabernmis subtus pallidionbas -i vejins mdrgine mtegeriiuis, flonbus subsolitaiis terminalibns. -5ⁱⁿ ml>ue Y.in-Diemen summo inonte labulari ^ Br.') et in Nova-ZeeLmdia (Forst d'Urv '). Rich, voy astr. bot p. 218. Epaens pumila Forst. prod, n 70. car. gen t 10. f a-h Styphelia pomila Spieng 1 c 656 An planta Diemenica certe eadem ac Novo-Zeelandica ? (v. s)

¶ Species exclusa.

^ INVOLCRATA Cuun n= Cyatbodes gknca.

XVII NLEDHAMIA.fi Brownprod 549 G.Don gen syst 3. p 781 non Cass. (1) nee Scop (a). — Monotocae sp. Spreng

Calyx bibi'JCteatus 5-lobus. Cor. hypocratenmorpha, limbo 5-fido miberbi, lobis lotundatis, sitiibus elevatis, aestivatione pliratā. Stam. 5 inclusa. Discus hypogynus scutelhforrms Ovanum bilocularc. Drupa exsucca 1-2-spernia. — Fruticulus pusilliis electus lamis apice pu-^escenibus, ladice perpendicular parçē ramosa Folia opposita ini-^utè adpressa cannala integeirima ciliata. Flores m axillis supieims s'ohtaui sessiles, in spicam terminalem electani ovato-oblongamdispo-»ti. C01. alba?

'• N HUMILIO. ti in NovTB-Hollaudiae orā mendionali (Br' Cunn') ad portnm ^egis Georgii (Br') Monotota Pumilio Spieng syst. 1. p 654.

* Brownn, caule basi simplici apice ramoso, folns omnibus oppositis dono obtusiusenle convexis (\.s comm a cl Brown)

^. Cunmnghami, canle à basi raraosissimo lamis, exterioribus adscendentibus, foliis infer oppositis snpei. altemis dorsq acatjns cauhatis. (v. s . omm a cl. A Cunningham)

XVIII OLIGARRHENA B. Brown prod. 549 G Don gen syst. 3 p ,8i.

Calyx quadriparlitus bibracteatus. Coi. 4-^ida imberbis a3stivalione valvalā peisistens. Stam. 2 inclusa Squamulae 4 ^ypogyna^. Ovanum

(0 NEEDHAMIA Cass. = Narvalma Conf vol. 5. p 533.

KV NEEDHAMIA Scop. = Epiprosia.

hiloculare. Stylus brevissimus. Drupa Crustacea ovato-globosa i-sperma.
— Fruticulus Novo-Hollandicus ericoideus erectus ramosissimus. Ramuli hirtello-puberuli. Folia sparsa ad pressa minima integerrima extiis convexa apice vix acuta. Spicae terminales crectae. Bractae subtendentes persistentes demum patentes. Flores parvi albi.—Genus in ordine numero staminum insolito insigne.

I. O. MiCR4Nruv (R. Brown! 1. c.). J in Novx-Hollandise orā meridional! (Br.! Baxter!), ad Lucky bay (Br.!). Folia vix ultra linenm longa. (v. 8. com no. à cl. Brown et Cunningham.)

Trib. II. *EPACREALReichenb. consp.* 128.—Epacriere *G. Don gen,* syst. 3. p. 781.—Epacrideae sect. 11 *R. Brown prod.* 550.—Epacridaceae *Lindl. nat. syst.* 223. — Epacriidae genuinac *Bartl. ord. nat.p.* 158.

Ovari loculi polyspermia. Pericarpium capsulare dehiscens. Pollen sphaerulis 3 constans. (R. Br.) Lobi corollae snepiūs (fortd semper) obtusi per aestivationem imbricati.

XIX. EPACRIS Cav. ic. 4 (1797)p. a5. *Smith exot. hot.* 1. (1804)/». 75. *LabM.* nov. *holl.* 1. p. 4 c *R. Brown prod.* 550. non *Forst. et excl. hinc inde spec,* —"
Epacridis sect. i^a *Poir. suppl.*

Calyx coloratus 5-partitus, bracteis plurimis naturae calycis conformibus cinctus. Cor. tubulosa limbo imber*>*i. Stam. corollae inserta, antberis suprà medium peltatis. Squamula? 5 hypogynae. Capsula 5-locul. 5-valvis, placentis columnae centrali adnatis. — Frutices Australasici ericoidei, ramulis glabris aut villosis. Folia sparsa sessilia aut breviter petiolata subcoriacea. Flores axillares saepiūs solitarii subsessiles in spicam foliaccam ssepè digesti. Cor. albæ aut purpurascens. — Nomen à Forster conditum scd species omries Forsteriante mine ad alia genera remotae.

* *Foliis cordatis.*

1. E. ruRPURAscENs (Brown! prod. 550), foliis sessilibus subcordatis in acumen lanciatum acuminatissimum subreourvum basin superans produc-tis, floralibus corollam aequantibus, cal. sepalis acurainatis tubum cor. oequantibus. f) in Novā-Hollaiidiā orientali(h. rans. Par.! Sieb!) propè Port Jackson (Br.!). Lodd. bot. cab. t. 876. Delanu. herb. am. t. 155. Epac. pungens Sim^s bot. mag. t. 844. Sieb.! fl. exs. n. holl. n. 74 (non' Cav.) Spreng. syst. »• p. 629. excl. syn. Raiui foliis obtecti in intervallis denudatis velutino-villosi. Cor. roseo-subpurpureae ant pallidè roseae, lobis mucronulatis. (v. s. sp. ^{et} v. c.)

2. E. PULCH^{LLA} (Cav! ic. 4. p. a6. t. 345), foliis sessilibus cordatis concavinsca-lis in aenmen patuln prodnctis, floralibus corollā hrcvioribus, spicā basiflora, cal. sepalis acuminatis tubum corollas aequantibus. 5 *ⁿ Novae-Hollandiae orā 'oriental' ad Port Jackson (Br.! Gaud.! Sieb!). Sims bot. mag. t. 1170. BroWD! I.e. Loud, encycl. pi. n. 2307. ic. Lodd. bot. cab. t. 194. E. pnpurascens Sieb! fl. exs. n. holl. n. 3[^]. Kamuli foliis minii9 tecti qnām purpnrascentis E- inter folia pubescentes. Tolia u lin. longa. Flores albi ant roseo tincti in parti inferioris lantūm ramulorum azillis ses&iles et ideo spicati. Cor. lobi subrotandi* (v. s. sp. et v. c.)

3. E. MICROPHYLLA (Brown! prod. 550), foliis sessilibus cordatis cucullatis acutatis, junioribus erectis dein patulis imò səpiūs reflexis, spicis elongatis apicifloris, floribus in axillis subsessilibus, cal. lobis obtusatisculis tubum aequantibus. g) in Novā-Hollandiā orientali (h. mus. Par!), circā Port Jackson (Br.! Sieb!). Hook. bot. mag. t. 3658. E. pulchella Sieb. fl. exs. n. holl. n. 78 non Br. Flo-

res fere omnmu albi, in spicā numeiosissiim usque ad apiteni rainornm. Folia lineani longa, i J i lin.lata enervia (v. &)

fi.rumjans, foliis duplo majoubus substnatis, floubns paucionbus * in Nova-Hollandia circa Poit Jackson ad nulos E rivnlaris Sieb • fl exs n holl. n 91 G Don gen syst 3. p 782 Spieng syst add p' 62. H o; lelatd juxta sententiam cl Bentham jin Hug enam p > Foi tetaraen in posterum diMmg'ieuda? (v. s)

4 F. AuacDLAT^ (Bemh in'Hug eunm p 76 in nota) folii, sessil.bcs cordatis obtuse annenlatis adpiessis mucronulahs, raineis imbritatis, spicis elonsat calycis lobis cor tubum aequantibns biacteisque obtusiuscuhs / jn Nnv* H I landia vensim oriental! E micropbylla Sieb ' II. exs n holl n \$q, n 0 ^ u Rami juniores sabpubentes non glabu. folia longitudme sul latioia mac brevissimo apiculata nee snbacuminata. flonlia flore dimidio bievidra (rone ex coll. Sieb.)

5 E PEDTCELLATA , fohis subcordatis obtusiasculis utnnque laevibn^ patalis a P- P'oximatis, spicis abbreviatis subracemosis, lloium pedicelhs folio cue .ton libus rainntissime bracteolatis, cal lobis vix subacutis capsula apne uiubih cato-deprcessa paulo longioribus J m Nov*A* Holl enca Port Jackson legit cl Oaudicband¹ il micropbyllaGaudith 'heib.nonBi llaimglabii. I olia jūnioia concava roox. plana C01 nou vidi. (v s a cl Gaudichaud)

(> T. R_{ir}RiA (Brown prod. 550), folns coidalis planis acuimnatij, patnlis calycis lobis setacco jcumiuaatis tubum coiollae buba?quantibus ^> in Nova-Holf ad P011 Jackson Cael. ign.

7 L roNGIFLORA (Gav KOU 4 (x797) p ^ t J44) folij, foliolat. sot cat lobis ^acteisque acum:natis, corolh. cylindraceis calyce quad/uplo longion: bus 3 3; n Nova-Hollandia or.entah c.rra Port Jackson Pers enh 1 p , J Collah. npul 30 Delaun beib amat t i85 E. grandiflora W,lld \n .1. p 2 (i7q8) p. 834- Smith exot bot 1 p 75 t 30. Sieb ' fl exs n holl' 11 81 Sim,bot mag t.,98a Brown' piqd. 5So NomenCav. velustius et anim, le.inendam ' Rorarl, v.lo. r Folia 4-6 ltn. longa, a J-3 lata apice fere sobpan' gentia Corollae fere pollieares, basa poniteae, apice albo flavidae (% s sp. et v.)

8 E. APICUI ATA (Cnnn. in Tield'snew south-Wai p 340 exG.Don cen svst 3 p 782), lanrn velutinib, foluj, subilibns cucullatij, pilosis basi auiiculati su penoubus lnibncatis in acumen obtusum callosuui piouduchs, segments calvinis lanceolatis acnminatis voiolla? tubum oequautibus ^ m Novae-Cambiiæ austiahis tnrfosis humidw decliVibns ad King'i lable Land.

** *Folus non cordate.*

9 E. vARiABiLis(Lodd bot cab t. 1816. G Dqjigen. syst. 3 p. 782), fohis ovatis acuminatis patulo-subieflexis, floubus fcievitei pedicellate pendnlis suhspicatis, coiollis tubulosis calce tnpllo quadiiiplove longin;ib_{us} ± m inhUJ* x an Diemen (Lodd), et in Nova-Hollandia si ut suspicoi E iusci?olid Sieb I exs. nov. holl. n. 82, hue pertinet (v s. ex coll Sieb)

¹⁰ « B. CAMPANDLATA (Lodd bot cab. t. i<*35), folus peliolulatis o\atis subcor^ctis acuminatis plains patulo-ieflexis, floubus 11 axillis pedicellatis p^tentis nbtrectis, cal lobis atuminatis, corollà tubuloso-campannlatà calyce-duDlo iplove longiore. ;\$ in msula Tan-Diemen (Don) seu Novi-Hollandia (Lodd). p - t ruscifolia Sieb » fl exs n holl n 82 (non Bi.), hue a cl. Bentham reata, forte potius ad E vanabilem lefeienda'

£. *alba*, floribus albis Lodd tab. t. iqji.

¹¹ h RUSCIFOLIA (BroTvn'piod 550), foliis elliptico-Lmceolati, acnminahs revissime^petioUlis patulis ngidis subenerviis ant aubtus 3-neivns flonbus xiUdrivas breviter ptdicell*j*w minntissime bracteolatis, cal. lobis atuminatis corollà cyhndrace. J in msula Vai<Diemeii (Br.), i msalfs freli Bass (P,i

- in litt.) Fiutex hnmillimns ngidns ramis abbieviatis glabrib Folia 3 lin. longa apice subspinosa. (v. & (uiuiii a cl. JUown.)
- 12 I', IMPRESSA (Labill' nov holl. 1. p 4^t. t 58), ranmlis pubescenti-velulini, foliis sessilibus patuhs> lanccolatis attenuato-acuraiuatis mucionalis, pedicelis axillaribus calyce tuplo bievionbus, floubm patulo pemlulis, coiollis cylindiacris tal lobis acuminatis duplo tiiplove longionbus. § in Nova? Hollandiae ons mend, et onent (b mus Par'), et in msulâ Van-Diemen (Br.¹). Brown¹ prod. 55i. Sweet fl. austr t. 4. Lodd. Jot cab t 1691 Hook bot. mag. t J407 Poir' diet &uppl. I p 554. Giab. in Jam. journ. 1833 apr. p. i85 Coi. roseae, 5-6 lin. lougae, extus ad basin foveolis 5 impress®. Stylus exsertuv. (v. s)
- ? *parviflora* (Lmdl. bot leg. 1839. t 19), folus acutissimis pnngentibns maigine scabris, coiollae atio-roseae tmbo cylindraceo, lirabi laciniis acli^simiit Jjm terrâ "Van-Diemen.
- x3. E WIVEA, ramnlis velutinis, foli is ovato-lanccolatis patenli>sinii& nudincnis infia nervosis apire attenuatis mutronatii> maigmibub scabiib, ilonbus axillanbub solitams &ccandib fere spicatis, cor lubo subcanipanalato calycibus acutis cihatia mullo longtoie 3ⁱa NovA-HollaadiA L. nival is Grab, in James, jouin 1833 apr. p 184. Lodd bot cab. t 1821. Hook bot mag t 3Q5J Lmdl bot. leg t. i5ii. Floies nivei (unde potius mvea quani uivalis dicens 1) Affinib & inopreb&ae, cenefloras el campauulatae
14. L.. rtRAFioRi (Giab. in new edinb phil. journ i832 jun), ramulis 10-iiiento&is , fob is lauceolatis acuraiuatis apice attenualo mucionatib patentissiims undiusculis maigine wabiib, floubns axillaibus patulsi solitarns secandis subsessilibui, coi tubo ovato (alycem acutnm cilialnm duplo snperante £ in msulâ "Vjn-Diemen. Hook. bot. mag t. 3a43 Coi albae lobis revolutis.
15. £ SVARSA (Brown prod 551), fob is oblongo-lauceolatis petiolatis mucionalis avenue, peduncnlis* spaisis calyceci acutum sub-equantibns, flonbos .. 5 in Nova-Hollandia' pi ope P011 Jackson Gael ign
16. y RIGIDA (Sjeb ' fl. exs. n. holl. n 90), ramulis vix pubescentibus, foJii* sessilibus ovato-oblongis ubtnsis cartilaginei<> eieclo-patulis neivo roedio snbtòs proimnente carinatis, lion bus in axillis supieinis solilanij* subconferlis pedicello brevi biacteolato donatis, calyce oblinsiuscalo coiollae tubo aequah ^ in Nov.-Hollandia(Sieb'), M montes cjeiuleos Sept. floi (A. Gunn.¹). E. carinata A Gunn ' in htt 1836 (v. i> a cl Sieb. et Cuun)
-] ^. E. OBTUSIFOLIA (Smith exot bot 1 p. 77. 1. 4o), ramulis pubescentibus t fobis subpetiolulatis lanceolatis erecfs subimbntatis apice callosis obtusiusculis snblus subtiimeivus margine laevibus, flonbi» axillanbus subssessihbus secundis in spicam foliosain dispositis patulis, calycibus obtusis cihatis tubo cor. scqualibus , staiu. indnsis 5 m Novâ Hollaudiâ orient et merid neinon in ins Van-Diemen Brown' prod. 45i. Sieb ' fl. exs n holl n. 84 Roem. et Schult. syst 4. p 381 et 794 Lodd. bot cab t. 293 I lores albi,tubo subab- breviato, limbo patente obtns. (v. s)
- 18 E HETFRON^MV (Labill' nov holl 1. p. 42 U 56), laraulis hiusutis, fohis pctiolulatis eiectis subniibritatis ellipUco-lauceolaiis arnininatis concaviuscoli* subtus 'substnatis maigine carlilagineis integns, ilonbus axillanbus subsessili- bus cnectis, calycibuv acutKsiuñs longttudine tnbi, slaminibus inclosis? stylo glabio J ^ iusula* Van-Oicina (Labill') R. Brown prod 55 r. Poir diet. soppl. 2 p 554 Trntex 1-2-pedabs ramis numeiosis confertis. Folia hubtus tenmssime vlineata. 1 lores albi nunc secus ramos sparsi, nunc apice subs^ncati. Cor. lobis ovati snbacuui. Stain inasqualia. (v. & a cl. Labill.)
- £ ? subreflexa, foli is stipeiionbns p.itulls, infenoiibus leflexis, cor. lobis ob-tUMs, stamin. filameutis breVissimis. ^ m JVovae-Hollandie monlibn* cae- rtileis legit d. A (nmngbain. K beteronema Hook bot. n<a^ I. 3i57 Mores albi in spicam oxatam teuninileru dispositi An spetils piopua⁹
- 19 F PALUDOSA (R Biown¹ prod. 55i±, raninhs pbescenli-villobis, folis a--

gusto-la nceolatu* aruminatis erect is pi a u is subtus slriatis ad margines scabris , ilonbus io axillis suprenus snbessihbus la spied m ova tarn foliosam dispositis calycibus acutibsimis nndis feie longitudine tubi, staminibus inclusis, stylō glabro. £ in Novae-Hollandia? palodoMs circa Port Jackson (Br.!). Botany Bay (Cnnn '). Lodd hot. cab t 1226. Siebcrfl. exs. u. holl. n. 81. Folia confertā bubimbncat.i 5-6 hn. longa (v. s)

20. E. VILLOSA (Cav. ic. 4. t. 347. f. a), rauinlis villoso-hirsutis, foliis linearibus acuumnatis setaceo-mucronatis patulis glabris sabaveniis ex marginibus sabiecurvis snbnts subcoucavis, flonbus axillaiibas snbse&silibus, calycibas acotis corolla; tubo dimidio brevioribns , genitahbas inclusis. fr in Nova-Hollandia ciica Port Jackson. AfGnis videtur £. lanugmosae. (v. a.)

21. E. iANUGiffoA (Labill ' nov. holl 1. p. 42. t. 57), ramulis villoso-sublanatis fohis linean-lanceolatis accuunnatis glabris confertis erectis margine scabris subtus subconvexis, flonbus axillaiibas ad apices ramorum in spicas foliosas subcapitatas digestia , calycibus acuminatis roargine cihato-lanugmosis longitudine tnbi, staminibus incluws, stylo hirsuto. J in mMiae Van-Diemen (Labill.' Br.) cam pis elevatis steiilibus. (Cunn.¹) Cor. albidae. Squamae hypogynae lanceolate ex Labill. (v. s)

^a22. E. PAucirLORA (Less, et Rich voy astr. bot. p. 213. t. 29), iamnlis sabap-bsscentibns, folhs sessilibus ovah-oblongis snbacuminatis glabris snbaveniis integemmis coiaceis erecto-imbricatis, floribns axillaribus solitaiis breviter pedicellatis secus pedicellura minute et arnte &quamellosis , calyce tubum collze brevissimum superante .5 in Novae Zealandix encetis apiicis (A.. Cnnn !), loco Galhs dicto baie des isles (Less et Rich.). Floies albi, in spetim. meo multo nnmerosiores quam in iconē citatā, in spicam elongatain foliosam dispositi. (v. s. à cl Cunn.)

^a23 E. COR 1 ACE A (A. Cunn.! in litt. 1836), ramulis hirsntnlis, foliis petiolatis coriaceis obovatis apice callosis obtusis utnnque glabris margine integerrimis, floribus axillaribm pedicello bracteolato jnsidentib&, calycibas obtubis tnbo cor. bievissimo longioribus. jfy in Novā-Cambriā austr. ad montes Illawarra nov. flor legit cl. Cunningham' Folia 4 hn> longa, 3 lin lata, planmsciila ant pr;es. juniora concava , erectiusculn. (v. s à d inv.)

H' E. ONOSMAFIORA (Cnnn ! in Field, geog. mem. i8a5 p 340 ex lihnaed 1827. p. i3o), ramnhs cano villosis , fohis patentibus elliptico-lanceolatis acnminatis mucronatis cucollato-concaviuscnhs subpetiolalis margine cUIatis nitidis, floubus axillaribns. snbessihbus, calycibns acuminalib nitidis tubo brevioibns) corollis cylindrareo-ventneosis, stylo glabro. J in Novā-Hollandia ad montes caruleos loco dicto Black-heaths alt. £400 ped. supra mare legit cl Cunningham ! Hook. bot. mag. t. 3168. Don gener. yyst. 3. p 783. Lysinema ruscifolnm Sieb ! fl. ex*, n. holl. n. 73. Spreng. cm. post. p. 64. Habitus fiondescentiae fere Sprengeliae. Coi. olbae. (v. s a cl. inv.)

^a25- E. MYRTIFOLIA (Labill.' nov. holi. 1. p. 41. t. 55), ramulis pubescentibus, foliis petiolatis ovatis mucronulatis planis crassis margine callosis, flonbus e8- rollam ajquantibus, calycibus acutusmlis nudis tnbi longitudine, bracteis obtnsinscuhs, staminibus intlusis. J ins "Van-Diemen (Labill ! Bi), ad montem Wellington jan flor. (A. Cnnn !), nee in Nova-Holl. ut mcaute Poir. suppl. 2 P- 554. Folia 3 poll, longa , * lin. lala. Bractea imbricate (v. s.)

^a26- E. EXSERTA (R. Brown 1. c), foliis lanceolatis acutis erectis suprā planiasubtās convexmsculis, calycibus obtusiuscuhs tubum aequantibus, anthens peni*xs exseitis. £> » ins. Van-Diemen. Caet. ign.

^a27 E. SERPYLLIFOLIA (R. Brown' prod. 551), demissa, ramulis glabris, foliis Petiolulatis ovatis acutis snpii nitidis subtus i-nerviis margine laevibus, flora^bus corolla dimidio brevionbus, flonbus axillaribus subterminalibus, calycibus acutis nudis longitudine tnbi, staminibus inclusis J in in&ula Van^ieruem ad montem Tabulaiem. (Bi.?) Frutioulus luiniinus Holia i-r 7 hn. loi »ga. (v. s 4 cl auct)

28. E. CRASSIFOLIA (R. Brown 1. c), canle procumbente, ramulis adsoendentibus illifornibus etiam janioribus glabri9, foliis petiolatis ovalibus obovatissimis obtusis muticis oartilagincis planis basi acutis, floralibus axillaribus pedunculatis, calycibus obtusinsculis ciliato-lanatis. \$ in Novâ-Hollandiâ prope Port Jackson. (Br.)

 0. *ciliaris*, foliis submembranaceis villis longis ciliatis. \$ in montibus caero* leis locis cretaceis legit cl. Cnnningbam! Cor. calyce doplo longior. An omnino eadem ac var. <c? ecd de ciliis evidenissimis si let cl. anct. (v. s. à cl. inv.).

ag. E. MUCRONULATA (Brown 1. c), foliis lanceolatis acutissimis erecto-patalis, nmcrone pellucido pungenti, calycibus acutis margine nudis. Jin ins. 'Van Diomen. Cat. ign.

"*j*- Species exclusce.

- E. ATTENUATA Iiodcl. = *Lysinema pungens* @.
 E. CAPXTATA Poir. = *Sphenotoma capitatum*.
 £. CERXNTHOIDES Labill. = *Prionotes cerinthoides*.
 E. CILIATA Poir. = *Lysinema ciliatnm*.
 E. GONSPXCUA Poir. = *Lysinema conspicannm*.
 £. FASCICDLATA Forst. i= *Leucopogon fasciculatas*.
 E. FRONDOSA Gaertn. = *Dracophyllum longifolium*.
 E. GIACILIS Poir. z=z *Sphenotoma gracilc*.
 E. JUNIFERXNA Forst.= *Cyathodes acerosa* seu *Lencopogon* Forsteri.
 E. LASUNTHA Poii*. = *Lysinema lasianthaink*
 E. JLOWGIFOLIA Linn. f. = *Dracophyllum longifolinm*.
 JE ODORATA Sm. = . *Lysinema pnngens*.
 «E. PENT APET ALA Poir. := *Lysinema pe n tape tain m*.
 E, ruauLA Forst. = *Pentachondra paraila*.
 E. ruitGENS Cav. = *Lysinema pungens*.
 E. RIPARIA Sieb.= *Lysinema pungens y.*
 E. HOSE A Lodd. = *Lysinema pungens y6*.
 ,£. nosMARnFOLIA Forst. = *Dracophyllum rosmartinifoliam*.
 E. RUBRA Spreng. = *Cosmelia rubra*.
 E. SECDNDA Poir. = *Dracophyllum secondum*.
 E. SPURIA Poir. = *Leucopogon ericoides*.
 E. SQUARROSA Poir. r=: *Spheuotoma squairosura*.

XX. LTSINEMA *R. Brown prod. 55a. Don gen. sjsl. 3./». 783. Spreng sysu 1. f**
630. —Epacris sect. Lasyrema Poir. suppl. a.p. 555. —Jalietia Lesch. mss»

Calyx coloratus 5-partitus bracteis pluribus texturâ calycis confonib⁹
mibus cinctus. Cor. hypocrateriformis tubo unguibus petalorum nun⁹
concretis mine distinctis constante, limbo imberbi lobis dextrorsuni⁹
(lexis. Star⁹iinuim filamcuta corollae non aduata; antherae inclusae supij⁹
medium peltae. Squamulae 5 hypogynae. Capsula 5-locul. 5-vaiyi⁹
placentis columnae centrali adnatis. — Fruticuli Australasici habil⁹
Epacridis.

* *Unguis petalorum non cult vix apice concretis.*

1. L. **PENTAPETALIUM** (Brown 1. c), petalis inter se liberis, nnguibns calyce lo**
gioribns exiūs glabris, ralycibus obtusiusculis ciliato-lanatis. 3 in Nov4-Ho*>
landiu merid. ad portum Regis Georgii (Br. Lesch!) ad Swan-river (Hog-
Druinm!). Folia minima trigona glabra obtusa conferla imbricata. Flo res »

- apices ramornm subcorymbosi albi. Cor. tnbus 5 lin. longas. Cal. lacinia *el*
bracteae acuta angustae margine ciliato-lanatae. (v. s.)
2. L. CILIATUM (Brown I. c.), petalis inter Be subliberis nnguibns apice cohaerentibus longitndine calycis extus glabris, calycibus aocminatis ciliato-pilosij.. 5 in Novae-Hollandiae orā meridional! (Br.) in collibus circa King's George's iound (Cunn.! Lesch.! d'Urv.! ad Swan-river (Hng. Druram.!). Julieta unguiculata Lesch.! herb. Differt à priore prater notas indicatas, foliis laxioribus vix imbricatis, floribus laxius spicatis, calyoibus basi ciliis patulis nee lanatis instructis, apice aeuminatis nee oblusiusculis. (v. s.)
 3. L. VIRGATUM , pelalis inter se snblieris, unguibns apice cohseribus calyce duplo longioribns, lobis reflexis 6uperne transverse rugulosis, calyoibus bracteisque fasco-scariosis sabciliatis, caalibus (ramisve) elongatis simplicibns glabris apice snmmo pilosinscnlis, foliis ovatis acuminatis dorso striatis. 5 in Nova-Hollandia ad Swan-river legit cl. Drnninond! Canlis sesqnipedalia. Folia imbricata 3-4-liu. longa apice callosa superne laevia. Flores spicati in axillis sessiles. Bracteae 8 per paria opposite. Cor. tubus subpentagonns intus barbatus 7 lin. longus, lobis nempè quadruplo et ultrà longior. Ovarium albo-velutinum. Squama 5 hypogynas apice subdentatae. (v. s. à cl. inv.)
 4. L. LASIAITTHUM (Brown I. c. Smith in Rees cyc. vol. xxi), petalis inter se liberis, unguibns extus lanatis limbo quadrnplo quintuplove longioribus.^in Novaj-kollandiae orā merid. ad portum Regis Georgii (Menzies). Folia ellipico-oblonga obtusa lsevia subtus convexa. Flores pauci bpicati pollicem longi. Cal. inargines membranacei fimbriati.

* * *Unguibns petalorum in corollam gamopetalam concretis.* — Sèct, media inter Epacridem et Lysineinata vera.

5. L. coNsncuM (R. Brown! prod. 552), tubo cor. 5-fido calycein superante, foliis lanceolato-sabulatis ndpressis. Jin Nova>Hollandia? orā meridionali ad portum Regis Georgii (Br.) Frutex pedalis. Rarouli glabri. Folia stiictè adpressa vix acuta glabra 3 lin. longa. Calyces angustè acuminati basi ciliati. (v. s. à cl. Brown et Cunningham-)
6. L. PUNGEKS (Brown! prod. 55i), corolla? tubo indiviso calycein aqnannte, raraulis cano-villosis, foliis ovatis acuminatis subspinescentibuspatulis, floribus axillaribus scssilibus in spicam foliosam (saepius secundam) dispositis, stylo hirsuto. 5 in Novâ-Hollandia circa Port Jackson (Br.! et Sidney (Cunn.!). Epacria puugens Cav! icon. fl. p. 16. t. 346. Epacris attenuata Lodd. bot. cab. t. 38. E. odorala Smith ex Roem. syst. 4. p. 383. Cor. albse. (v. s.)

fc rosea, floribns rubris aut roseis. — Epacris pungens Sims bot. mag. t. nog. Epacris rosea Lodd. bot. cab. t. 863. Lysiuema attenuatum Link enûm. n. 2009.

Sicberi, floribus albirs, tubo coroll* ealycem breviter superante. 5 LysinemaSieberi Benlh. in Hug. enum. 7 6. Epacris riparia Sieb.! fl. exs. n. holl. n. 83. Don gen. syst. 3. p. 782. (v. §)

4 Species exclusis.

^{L-} RUSCIFOLIDM Sieb. = Epacris onosmacfloro.

XI. PRIONOTES R. Brown prod. 552. Don gen. syst. 3./». 783. —Epacridis sp. *Labill*— Piionotis sp. Spreng.

Calyx ebractcatus 5-partitus. Cor. tubulosa , fauceaperta , limbo imberb i S b o Stam. 5 hypogyna , filain. corollae sul^aequalia tubo semi-adhærentia , antherae septo completo. Smae 5 hy^gynrc. Capsula 5-locul. 5-yalvis placentis Fruticuli erecti glabri. Folia serrate, Flores in axillis solitarii pedicellali patuli seu penduli, pedicellis squa-
Dula, gerentibus.

1. P. CERINTHOIDES (Brown 1. c.), foliis oblongis petiolulatis, iloribns pendulis, corollis cylindraceis, stylo exerto.[^] in ins. "Van-Diemen. Kpacris cerinthoides Labill. nov. boll. i. p. 43. t. 5g. Stain, filaraenta basi et apioe tabi adnata, external libera. Cor. 10 lin. longa. Folia 10-12 lin. longa. Placentae ex Labill. solutac et pendulae; an recte?
2. P. AMERICANA. (Hook. icon. pi. t. 30), foliis ovatis sessilibus, floribus patolis, corollis campanula tis, sylo inclusu. 3 ad Caput'Horn et in Sta ten-Land prope Terram ignis. — Sola buc usquè Epacridea in Americā detecta. Folia 2-3 lin. longa. Cor. 1 lin. longs. Placentae suprà axin capsulae sessiles. Stam. à corollâ libera. An certe congenere?

XXII. COSMELIA R. Brown prod. 553. *Don gen. syst. 3. p. 784.* — Epacridis sp. Spreng.

Calyx foliis cinctus, 5-sepalus, sepalis foliaceis linearibus acumina-tis basi attenuatis. Cor. tubulosa, unguibus petalorum demiim ad basi a lobi distinctis. Stam. corolla? adnata. Anhherae apicibus ciliatis filam. adnata?, basi solutae, inclusae. Squamae 5 hypogynoe obtusissimae. Capsula 5-locul. 5-valvis, placentis columnnx centrali adnatis ad utram-quc extremitatem liberis. — Frutices Novo-Hollandici erecti ramosi. Kami foliis delapsis non cicatrisatis. Foia semi-vaginantia basi cucul-lata apice acuminala nitida margine integerrima subciliato-villosa. Flores ramulos axillares terminantes solitarii subecrnu. Ramuli scu pedunculi foliis confer tis caulina referentibus onusti. Cor. ruberrimse.

- I. C. mBRA. (Brown! 1. c.), foliis basi dilatatis dorso laevibns vix ac ne vix ciliatis. J in trnfosis Novaj-Hollandiae merid. prope King's George's sound (Br.! Conn.!). Lindl. bot. reg. t. 1822. Epacris rubra Spreng. syst. 1. p. 629. Rami floiidi abbreviati. Foia à basi 4 lin. lata. Cor. 9 lin. lougae. (v. s.)
- a. C. AN GUST 1 FOLIA, foliis vix basi dilatatis dorso striatis margine evidenter cilia*tis. J in Novā-Holl. forte' orieutali leger. Botanici exp. Baud. Folia ad basin '2 lin. lata. Ramuli floridi elongati. (y. s. comm. à mus. reg. Par.)

XXIII. ANDERSONIA R. drown prod. 553 nee alipr (1). *Don gen. syst. 3. p. 784.*

Calyx coloratus 5-partitus, bracteis foliaceis 'x pluribusve imbrica'tus. Cor. tubulosa longitudine calycis, limbi lobis basi barbatis. Slam* cum corollâ non concreta, antberis infrâ medium adfixis. Squamul* 5hypogynae, nunc connatae. Capsula 5-locul. 5-valvis, placentis cO'' lumna centrali adnatis brevibus è fundo capsulae ortis. Semina ercta* pauca maturescenlia.—Fruticuli Novo-Hollandici squarrosi, ramis dur*ⁱⁱ denudalis noa annulatis. Folia semivaginantia basi cucullata acuinin^{la} coriacea conferta. Fiores erecti, nunc axillares verstis apices ramorut^d spicati, nunc ramulos terminantes solitarii. Corollae purpurascentes.

* *Floribus spicatis bibracteatis.*

1. A. srREKGELiDES (Brown 1. c.), caule erecto, ramis dense folio sis, foliis p.^{fl*} tulis subspiranter rotis acumines piano. ^{2. in} ^{3. in} ^{4. in} ^{5. in} ^{6. in} ^{7. in} ^{8. in} ^{9. in} (Br.), ad King's George's sound. (Conn! d'Urv!) Swan-river. (Dramm.) Sims hot — t. 1645. Folia 3 lin. longa nitidula. Spicæ capitatae. Cor. roseæ vix foliis floribus duplo longiorss. (v. s. sp. et v. c.)

[i] Atidersonia Roxb. cat. est Mcliacea. = Spbacrosacme Wall, seii Amoora Roxb. seu Aphanomyxis Blum. — Andersonia Rctfb. herb. = Anogeissuin sect. Conecarpi. — Audersonia Kcenigmss. = Psilocarpa sect. Stylidii, — Auderonia Schlecht. Reem. et Sciult. = Oartuera.

- ² A GRACILIS, (dule crcto, lulus basi cucullatu? apice subulatw vix aripitssis, Mirumib aroplius vaginantibns 3 ^{*n} ^{^ov} ^{**} Hollandiâ ad Swan-nvei legit cl. Diumraond' Affins A sprengehoidi, seel iuulto mag is elougata , qiaulior, nus foliosa , folia non sensim torta, floies tertiatâ parlc majores, toiolloë mtus paulo inagis hnsutae. (v. s. a cl. inv)
3. A PARVIFOLIV (Biown' 1. c), caule erccto, folns adpiessis lectis acumine tnqnetio 3 ^{*u} Novac-Hollandiae orâ mendiouah. (Bi ' Cunn ') Folia 1-1 | lin longa Spicae paucifloiae. I lores foliis florahbus iriplo quadiuplove longioics And paivifloia Roeni. et Sciliult. syst. 4 p 384 (v. s)

** *Floribus ramulos terminantibus muhibracteatis.*

4. A MICRAKTHA (Biown 1 c.), caole erecto lamosissimo, folnn adpiessib acunne triquetro, flonbns bolitams aut s»ubaggiegatis, slylo infia medium pubecente. ^ in Novae-Hollandiae oil mend (Bi), ad King's George's sound (Cunn.¹). Affinis ex habitn A par vi folia sed flores subsoil tarn ct styb puberuli (v. a. a cl. Cunningham et a mus. Par)
5. A CJERULEA (Brown 1 c), canle erecto, foliis modice patentibus, novellis taly cibusque extus pubescentibus, stylo hirsuto. J ad oram mend Novae Hollandiae (Bi. Cunn ') Toba 5 lin longa, basi valde dilatata acumine piano sub-tortili Ramuli approximati nniflou in spicam elongatam foliosam digesti. Corollas ex nomine caerulescentes sed in sicco calyces subiosei videntui Coi tubus subconicus, lobis basi hirsntissimis (\. s a cl. Cunningham)
- B glabriuscula, foliis basi minus dilatatis sensim elongatis calycibusque glabrusculis 3 ^m Nova-Holl. leger. botauici exped. Baudimana?. (v ^{t>} comm a mus. rcg Par)
- 6 A SQUARROSA (Brown 1 c), caule erecto brevi raraosissimo, foliis squanosis divancatis recurvisse glabris margme nudis, calycibns slybsque glabtis J ^a [^] Novae Hollandiae oram meridionalem. A depressa Cunn ' inhtt. I<rticulus bu mills. Raraali congesti nee spicati. (v. s [^]omin. a cl Cunningham)
- 7 A. LANUGINOSA (A CUDQ ' in litt. 1836), caule demisso, foliis modice squai losis anguste lanceolate subtortilibus uiargine bracteisque longe ciliato-husutis, calycibus extus villosis, stylo hirsuto. ^ ad oram Novce-Hollandic meudionalem legit cl. Gul. Baxter. Folia 5 lin longa, basi sesqui-lin lata. Ramuli breves secus ramos nref?ulantei spicati Calyces ex sicco palbdi. Cor. lobi matus birsntissimi (v. s. a cl Cunningham)
- 8 A. DEPRESSA. (Brown 1 c), caule depresso, folhs sqnar[^]osis divaricatis rccm visve pnbescenlibns margine ciliatis, calycibns glabris, stylis mcdio pibfeus 3 ad oram Novae-Hollandis meridionalem.

XXIV PONCELETIA R Brown piod. 554. Don gen syst 3.p <%>. Sprcng syst, i./r. 676 non Pu. Th.

Calyx 5-phylus, sepahs foliaceis margme hyalinis constans, foliis minibus lmbncatis cinctus. Cor. bicviter campanulata 5-fidaimbeibis. Stam. inclusa, flam. corollae non adnata, anlhci ae imbei bes infra medium peltatae septo marginato. Ovarium 10-sulcatum. Squamula; hypogyna; [^]ulla. Capsula 5-locul. 5-valvis, placantis columna centrah adnatis.— Fruticuh JVovo-Hollandici [^]labenimi vngati, lanns dum denudatis ^oon annulatis, ramuhs floniens fragilibus. Folia confeita subdisticha iaevia basibus cucullatis semivaguantibus. Floies ramulos teiminants sohtarn crctti. Genus piacseiLm mediante P. monticolâ vix à Spicngebâ d i stid um

* P SPRRHGELOIDES (Biown¹ I c), canle ramulisquc crectis , folus basi ovatis et ample cucullalis latitucline suâ duplo longioribus, calycis raaiginibns hyalinis m alabastio tiistac moie exbcrtis, antheiis libens 3 ^m ^{^oy} [^]Hollandix

circā Port Jackson (Br.! Sieb.! exs. n. 71), et Sidney (A. Cunn;!), ad rapes semper madidas (Don). Habitus Sprengeliae incarnatse sed folia paalò breviora. Cor. ex sicco albidae. (v. s.)

2. P. MOFFICO LA (A. Cunn.! in litt.), caule depresso, ramulis diffasis, foliis linearibus basi subcucullalis latitudine su& quadruplo longioribus, calycis marginibus planis, antheris connatis* & in Novae-Hollandiae montibus caernleis legit cl. A. Cunningham! Folia vix ultra lineam basi lata, 3 $\frac{1}{2}$ lin. longa. Calyces vix foliacei. Cor. ex sicco roseae. (v. s. à cl. inv.)

XXV. SPRENGELIA *Smith act. Stockh.* 1794./?. 260. t. 8. *tracts p.* 267. t. 2. *R. Brown prod.* 554 non Schuh (1).—*Springalia Andr.*—*Poiretia Cav. icon.* 4. (1797)/?. 24. t. 343. *Poir. diet.* 5. p. 449 non alior (2).

Calyx subcoloratus, bracteis plurimis cinctus, 5-partitus. Cor. 5-partita rotata lobis angustis imberibus, cor. et cai. acuminatis aequalibus. Stam. filam. à coroll4 libera glabra, antherae connatae vel liberse barbatae aut imberbes, septo immarginato. Squamae hypogynse nullae. Capsula 5-locul. 5-valvis, placentis columns centrali adnatis. — Fruticuli Australasici erecti ramosi ram is diim denudatis vix annulatis. Folia semivaginantia basi cucullata acuminata glabra integerrima erecta apice obliquè patentia. Flores ramulos axillares brevissimos foliosos term' mantes , in paniculam confertam dispositi. Cor. purpurascentes tubo brevissimo demiiin à-basi soluto. ,

1. S. INCARNATE (Smith II. cc.), antheris connatis barbatis, calycibus coloratis, foliis longè acuminatis. ft in Novâ-Hollandiâ orient, et merid. (Labill.! Br.! Sieb.!), nee non in insula Van-Diemen. (Br!). Brown! 1. c. Sieb.! fl. exs. nov. holl. n. 72. AD dr. bot. rep. t. 2. Delaun. herb. amat. t. 220. Poiretia cncullata Gav. ic. 4* t. 343. Folia caulina 5-6 lin. longa, peduncularia seu bractealia 4-6 minima. Calyces purparascentes. (v. 8.)

/?.*longifolia*, foliis pollicem et ultra longis sen si m nec abruptè acuminatis magis patentibus.—in Novâ-Hollandiâ orientali. (v. s. couim. à mus. reg. Par.)

2. S. PROPINQUA (A. Cunn.! in litt. 1836), antheris liberis barbatis, calycibus coloratis, foliis minus aenminatis. 3 in montibus insnlao Van-Dieuuen prope Hobart-town legit cl. Cunningham. Folia 5 lin. longa, basi latiora quain prioris. Ramuli floridi magis conferti- Calyces albidi. Media omnino videtur inter priorem et sequentem. (v. s. à cl. inv.)

3. S. MONTANA (Brown 1- c), antheris liberis imberibus, calycibus semicoloratis, foliis brevi acuminatis. & in insnlâ Van-Diemen. Flores purpurascentes. Caet. ign.

XXVI. CTSTANTHE *R. Brown prod.* 555. *Don gen. syst.* 3. p. 555.

Calyx 5-phyllos subfoliaceus sepalis margine vix subhyalinis. Cor. clausa calyptraformis transversim dehiscens ,basi truncata persistenti. Stam. corolla? non adnata persistentia exserta, filam. subspiraliter tortis, antheris imberibus apice bilobis. Glandulae hypogyna? nulla?. Capsula 5-locul. 5-valvis, placentis ab apice columns centralis pendulis solutis. —Frutex habitu Spreugeliae et Ponceletine sed rami denudati sunt annulati et flores ad apices ramorum congesto-capitati.

(1) Sprengelia Schult. anno 1809 condita videtur Pentapetis sp. conf. Prod. r. p. 498

(2^ Poiretia Ginel.(i799) est Houstouia. — Poiretia Smith (1808) est Hovea-Toiretia Vent cst genus.inffci Loguminosas admissuin Prod. II. /> 3i5.

*• C. SPRBNGEI10IDES (R. Brown! l. c.). 5 in iu&ul% Van-Dlonum turfosis elevatifi m on tan is (Conn.), circa Hobart-town (d'Urv.), et ad latera montis Tabalaria (Br.). Folia basi vaginantia lanceolata acuminata. Dractee sab flore breves triquetro-carinataa.

«, foliis elongatis pa tenti-recurvis. — Ad latera nmbrosa tuontium. (v. s.)
/6. foliis paululum brevioribus magis erectis. — in summis montibus. (v. s.)

XXVII. PILITIS *Lindl, nat. sist. p. 443. n. 3i.*

Calyx foliaceus pungens. Cor. calyptraeformis transversim discens
asi tnmcatâ persistente. Stam. corollae non adnata persistentia*. SquamuJac hypogynae bilobae. Caps.... — Frutex ramis annulatim
icatrisatis. Folia glaberrima acerosa basi cucullata. Ga pi tula florura*
terminalia ovata bracteis imbricatis pungentibus.

*• P, ACEROSA (Lindl. l. c.). 3 in insula Van-Dieinen legit cl. Gnnn. Cat. ig_n.

XXVIII. RICHEA *R. Brown prod. 555. Poir. suppl. 4. p. GSo. Don gen. sijse. 3. p. 785. non alior.[i]*

Calyx membranaceus ebracteatus 5-lobus. Corolla clausa caiyptrae-
formis Uansversim dehisccos, basi trim cat à persist^Dtc. Stain, corolla*
&on adnata persistcutia exserta. Squamulae 5 hypogynae. Capsula 5-
'ocul. 5-valvis, placentis ab apice columnar centralis pendulis solutis.—
^rutex habitu Dracophylli caractere fere Cystanthis, sed ab hac dis-
(inctus squamis hypogynis et calyce membranaceo nee folioso. Folia
Unbricata adpressa rigida, basi membranacea dilatata amplexicaulia,
limbo ensiformi pungente margine verrucosis punctis scabriusculo.
Flores sessiles in spicam interruptam terminalem dispositi.

C. R. DRACOPBYIXA (R. Brown I. c. Guill. icon. litb. t. 3). t> >^a insalâ Van*
Diemen ad caenwina montis Tabularis. Statura varians : in summis inontibus
fratex hnmilis sesquipedalis, in sylvis ad latera Inontiutn quaudoque ai buscola
10-pedal (Br.)

XXIX. DRACOPHTLLUM *Labill. vojr. reck. Lapeyr. 2. p. 211. t. 4o. nov. hol:*
2. p. xi8. —Dracopbylli sect. i^a. *Brown prod. 556.* —Epacris *Forst. excl. sp.*
secundd. —Epacridis et Prionotis sp. *Spreng.* —Epacridis sp *Poir.*

Calyx 5-t*yllus ebracteatus. Cor. tubulosa infundibuliformis,
limbo 5-partito lobis patentibus imberibus, tubo tereti aut ventri-
oso ad faucem contracto. Stam. 5 corollas non adnata. Squamae 5 hy-
Pogynae. Capsula 5-locul. 5-valvis, placentis ab apice columnae centra-
ls pendulis solutis. — Frutices vel arbuscula3 Australasicae ramis
diim denudatis annulatis. Folia imbricata basibus cucullatis semiam-
plexicaulibus, elongata nervis parallelis. Flores in racemum spicamve
^rminalem dispositi. Bracteae subtendentes deciduae. Cor. albae. —
^iores interdiim hexameri! ex hac structurâ et ex venis foliorum ut in
^onocotyledonibus parallelis genus ad Asparageas primium referebat
^abillardiere, sed, ipso docente, certissime Epacrideum.
^- D. HECUNDUM (Brown! prod. 556), fruticosum, foliis elongatis planis mar-

(0 Ricbea Labill. cst Craspedia Forst. conf. prod. 6. p. 151. — Richaeia Pet.
Tli. cst Gnssipouiea Aubl. conf. prod. 3. p. 33 — llicbiea G. Dou c*t RitchUea
Brown.

- glue serrulatis, racemo subspicato secando, peduncalis infimis divisis seu fasciculatis, cor. tnbo vix ventricoso lobis obtusiasculis. § in Novae-Hollandiae tñrfosis propè Port Jackson (Br.! Cnnn.!) Guille. ic. lith. p. x. t. i. Hook. Lot. mag. t. 3a64. Sieb.! fl. exs. n. hoi I. n. 69. Reichenb. icon. exot. a. t. 108. Epacris secunda Poir. suppl. a. p. 556. Prionotes secunda Spreng. syst. 1. p. 631. Folia 2-7 lin. longa nitida. Race mi 2-6 pollic. longi. (v. s.)
- a. D. LONGIFONUM (Brown 1. c.), arboreum, foliis linear-lanceolatis integerimis (?), racemis erectis simplicibns articulatis flexuosis lateralibns, cor. tubo cylindrico, lobis brevi&simis acutis. £ in sylvis Novae-Zeelandiae. Don gen. syat. 3. p. 785. Rich. et Less. exp. astr. bot. p. 21g. Epacris longifolia Forst. car. gen. t. 10. f. i-m. prod. n. 68. Willd. sp. z. p. 834. Ep. frondosa Gaertn.
 3. D. LATIFOLIUM (Soland. mss. ex A. Conn.! in lilt. i836\ arboreom, foliis lato-lanceolatis elongatis margine denticulatis sed laeviusculis, racemo paniculato nutante. ^ in Novae-Zeelandiae siccis ad sinm insularura legit cl. Cunningham! Folia 8-24 poll, longa, basi 7-10 lin. lata, denticnlis obtusis lacvibns crenulala. Panicula terminalis nutans. Calyx persists. Cor. in specim. decidua. Capsala depressa stylo superata. (7. s. à cl. inv.)
 4. D. VERTICILLATUM (Labill.! voy. 2. p. a.n. t. 40. nov. holl. a. p. 118), frnticosum, foliis lato-lanceolatis planfs acuminatis margine denticulatis sublaevibus, racemo terminali erecto paniculate*, ramis nempc ramosis confertis alternis sen subverticillatis, cor. tnbo snbcampanulato abbreviate. <\$ *n Novae-Caledonia montanis. Rami florales in specim. ab ipso Labill. comm. snnt alterni nee ut in icone verticillati. (v. s.)
 5. D. ROSMIRIN 1 FOLIUM (Brov?n prod. 556. in not. gen.), fruteqeens adscendens, foliis linearibaa obtasis, floribas axillaribus solitariis sessilibas, cor. tnbo <rylindraceo, lobis obtusis. § in summis montibus Novae-Zeelandiae. Rich. voy. astr. bot. p. 220. Epacris rosmirinifolia Forsr. prod. n. 69. Willd. sp. 1. p. 834.
 6. D. URVILLEANCM (Rich. voy. astr. p. 221), fratescens, foliis fascicalalis linea-ribns rigidis subtùs convexis margine scabridis, floribus ad apices ramulorum lateralium paucissimis (a-j) sabspicatis, bracteis vaginisque foliorum ciliatis, cor. tubo subcampanolato brevi, lobis ovalibus acuminatis. 5 in Novae-Zeelandiae rupibus (D'Urv. Cnnn.!). Folia 1 |~i 7 poll, longa, fere acerosa. Bractcsc sab floribus ovatae breviter acuminata; (v. s. comm. à cl. Cunningham.)
 7. D. LESSORIAHUM (Rich. voy. astr. p. a33), frntescens, foliis fasciculatis elongatis linear-subulatis margine scabridis, floribns 6-8 in racemain spicatum terminalem dispositis, bracteis vaginisque foliorum snbciliatis, cor. lobis oblongo-lanceolatis. ^ in rupibus NovceZeelandia* legit cl. D'Urville! Folia z ^-a poll, longa, minùs conferta quam prioris, suprà pinna. Rami graciles apico tantùm foliosi. Sepala ciliata longit. corollse. Bractae ovatae longè acuminatae. (v. s. comm. à cl. D'Urville.)

f Species exclusae.

- D. OAACILE Br. = Sphenotoma gracile.
- D. CAPITATUM Br. = Sphenotoma capitatum.
- D. SQUAREOSDM Br. = Spbenotoma squarrosum.

XXX. SPHENOTOMA Sweet fl. a use. t. 44- Lindl. Bot. reg. t. 1515. — Dracophylli sect. Sphenotoma R. Brown. — Epacridis sp. Poir. Spreng.

Calyx 5-phylus bibracteatus. Cor. hypocrateriformis tubo gracih fauce coarctata limbo 5-partito lobis cuneatis obtusissimis patentibus imberibus. Stam. corolla? adnata inclusa. Squamulae 5 hypogynaë- Capsula 5-locul. 5-valvis, placentis ab apice columnar centralis pendulis solutis.— Frutices Novo-Hollandici, ramis diim denudatis annulatis. Folia imbricata lanceolata acuininala margine villis lougis ciliata basi-

bus cucullatis semivaginantibus. Flores in 8picam sirnplicem dispositi.
Bractese subtendentes persistentes. Cor. alba?.

- i. S. GRACILK (Sweet! fl. anstr. t. 44)» ramis floriferis spicā ovata multoties longioribns, foliis caulinis subulato-lanceolalis patnlis recarvisvo, raraeis adpressis. 3 in Novae-Hollandiae orā meridionali (Br. Conn.!) ad portm Regis Georgii (Baud.! D'Urv.!). Dracophyllum gracile Brown prod. 556. Rcem. et Schalt. syst. 4. P- 386. Sims! bot. mag. t. 2678. Epacris gracilis Poir. suppl. 2. p. 556. Spreng. syst. 1. p. 629. (v. B.)
- a. S. CAPITATUM (Lindl. bot. reg. t. 1515), ramis fl on* fen's spicā ovata multoties longioribus, foliis caulinis ensiformi-lanceolatis erectiusculis, rameis adpressis. 3 in Novae-Hollandiae orā meridionali. Dracophyllum capitatum Brown prod* 556. Lodd. bot. cab. t. 1846. Hook. bot. mag. t. 36a4- Epacris capitata Poir. suppl. a. p- 556. Spreng. syst. 1. p. 629.
3. S. SQUARROSUM (Don gen. syst. 3. p. 785), ramis floriferis vix longitadine spicae, foliis squarrosis ensiformi-lanceolatis. ^ in Novae-Hollandiaa ora' me rid. Dracophyllum squarrosum Brown 1. o. Epacris sqnarrosa Spreng. et Poir. 11. cc".

Ordo CXVI. PYROLACEJE *Lindl. nat. sist. p. a 19.* —
Pyroleae Lindl. coll. bot. t. 5. synops. p. 175. — *Ericearum gen* Juss. etc.*

Calyx liber 4-saepius 5-partitus persistens. Petala 5, nunc libera nunc plus minus coalita, perigyna? per aestivationem imbricata. Stam, petalorum numero dupla, petalis non adnata; antherae biloculares, poris 2 dehiscentes. Ovarium 3-5-locul. disco hypogyno impositum. Stylus 1. Stigma subrotundum aut lobatum, interdum subindusiatum. Capsula 3-5-loc. 3-5-valvis loculicido-dehiscens, valvis idem septiferis. Placentae ad centrum adnatae. Semina indefinita, minuta, pelliculâ indusiata aut alata. Embryo minutus ad basin albuminis carnosus, cotyledonibus parce distinctis. — Herbae in Hemisphaera boreali spontaneae, perennes aulvix suffruticosae, glabrae. Gaules teretes nudi aut foliosi. Folia simplicia, integra aut dentata. Flores racemosi subumbellati rariis solitarii, albi aut rosei. — Ordo affinis Ericaceis imprimis mediante Cladothamno, et Monotropaceis mediantibus Pyrola aphylla et Pterosporâ.

Trib. I. PYROLEAE DC. non *Lindl.*

Stun, filaraenta inter se libera aut vix imâ basi subcoalita, omnia fertilia.

I. PYROLA. *Salisb. in Gray brit. arr. a. p. 402. Don gen. syst. 3. p. 863.* — *Pyrole sp. plerqao Linn. sp. 554* Rod* mon. 1821. Ser. in mus. helv. p. 3i. Smith in Rees cycl. n>. 28.*

Calyx 5-partitus. Cor. Petala 5. Stam. 10 per paria antef petala sita, filam. subulatis medio nou dilatatis, anth. basi brevissimè bicornibus biporosis per anthesin inversis. Stylus crassiusculus. Stigma 5-tuberculatum 5-radiatum. Capsula subrotunda utrinquè umbilicata 5-locul. 5-valvis, à basi loculicido-dehiscens, suturis tomentosis. Semina minutiissima scobiformia. — Herbae hemisphaerse borealis incolss perennes sempervirentes glabrae. Radices repentes. Folia radicalia petiolata coriacea subintegra autserrata. Scapi recti, apice racemosi aut subnudi, saepè angulati. Flores pedicellati nutantes, albi, nunc roseo nunc flavo-viridi tinti.

§• I. *Staminibus adscendentibus, stylo declinato petalis longiore, stigmate annulato.*

I. P. ROTUXTDIFOLIA (Linn. sp. 567), foliis subrotundis sobintegerrimis petiolo brevioribus, acapo angulato, lobis calycinis lanceolatis acantis patefacti-reflexis, corollâ patente, stigmate obtuse 5-dentato. Tf iu sylvis arenosis lapidosisve Eroniae, Asie et America: borealis. Lara. ill. t. 367. f. 1. Sow. engl. bot. t. 2i3. fl. dan. t. 1816. sv. bot. t. 304. Grertr. fr. 1. p. 303. t. 63. Schkuhr liandb.

- t. 119. Ser.! mns. helv. p. S3. t. 3. f. x-iv. Rad. 1. c. P. declnata Mcench. meth. 3o3. P. minor Gilib. fl. litb. P. Noveboracensis Cold, noveb. 99 ex Torr. P. major Lam. fl. fr. a. p. 53o.— Fnchs. hist. 467. ic. Racemus elongatas. Flores albi. (v. v.)
- jS. *incarnata*, racemo elongato laxo, corollis incarnatis sea rubicund is. *IL* in Daboriâ. P. *incarnata* Fisch. lin litt. P. *conferta* Willd. herb.? (v. s. comm. à cl. Fiscb. et Turczan.)
- >. *grandiflora*, racemo abbreviate conferto, corollis albia panl6 majoribns, stylo vix petala aequante. % in Groenlandiu, Sibiria, Amer. boreali. P. *grandiflora* Rad.! mon. p. 27. t. 3. f. a. (v. s.)
- *. P. ASARIFOLIA (Michx. fl. bor. am. x. p. a5i), foliis rentformibus repando-subcrenatis petiolo dilatato duplo brevioribus, scapo angulata, calyo. lobis ova-tis acuminatis adpressis, slgmate 5-lobo.^ in pinetis Canada) (Michx.), Bostoniae (Big.!), Pennsylvania (Don). Torr. fl. nn. at. x. p. 433. Big.! fl. boat. ed. a. p. 173. P. rotndifolia 0 nnnmnaria Mnhl. cat. 44* P« rotndifolia var. Gold, in Edimb. pfail. jnrrn. 182a. apr. P. chlorantba Nutt. gen. x. p. 375. excl. •yn. Scapi squama plares convolutoa. Flores ex albo snbvirescentes. (v. s.)
- 3- P. ELLIPTIC*. (Natt.! gen. 1. p. 373), foliis ellipticis raerabranaceis minntissimè serrulatis petiolo longioribus, scapo snbnndo sabanglato, bracteis subulatis, col. lobis acntis apice snbreflexis. *If** in sylvis siccis praecipue pinetis America bor. non infrequens. Hook. fl. bor. am. a. p. 46. t. x34. Torr. fl. 1. p. 433. Rad. mon. p. 3i. t. 5. f. x. Bart. fl. tphil. 1. p. 40a. P. reticulata Raf.! pi. exs. Flores albi, ex Nntt. odori. Folia variant obtusa ant acuta. Stylus corolla pa old longior. Affinis P. rotandifolis. (v. s.)
- 4- P. CHLORANTHA (Swartz in act. holm. 1810. t. 5), foliis orbicnlatis retnsis obsoletè subcrenatis petiolo linear! brevioribos, racemo paucifloro, calyc. lobis brevibns obtnsis, petalis oblongis, stigniatis disco obtnsè 5-lobo.Q^ in sylvis Helvetia ! Delphinatus ! Gerraaniae ! Suecia ! Tjcraniae ! Tauriae! nee non in Canada soperiore (Don) Noveboraco (Torr.!). Lodd. bot. cab. t. i5^i. Reichenb. fl. exc. 1. p. 415. Ser. mas. helv. p. 35. t. 3. f. i-3 (sab nom. P. virens). Ad lacam Haronensem, in Canada, ad Saskatchewan. Hook. fl. bor. am. 3. p. 47. t. i35. P. virens Schweigg. ex Ser. P. asarifolia Rad.! mon. p. a3. t. 4. f. 1. non Michx. P. convolnta Bart. phil. p. 5o ? P. minor. Parsh fl. 1. p. 299? Flores 3-7 campanalati ex albo snbvirescentes. (v. v. et s.)
5. P. OCCIDEVTALIS (R. Brown in herb. Banks ex D. Don in Wern. mem. 5. p. a3a), foliis snbrotnndis meiubranaceis obsoletè denticulatis petiolo linearri dnplo longioribns racemo pancifloro, calyc. lobis oblongis obtnsis, stigmatis disco 5-lobo. % in insnlâ Sledge ad oram occid. America) borealis. Habitns P. minoris; sed folia minora. Scapi triqaetri. Flores globosi lactei.
- 6- P. DEWTATA (Smith in Rees cycl. v. a8. n. 6), foliis elliptico-obovatis coriaccis ^asi acntis petiolo linearri doplo longioribns integerrimis ant remotè erenatis, racemo elongato pancifloro snbsecndo, petalis ovalibus, stigmatis disco elongato 5-lobo. % in insnlâ Nootka ad oram occid. Amer. borealis D. Don mem. Wern. soc. 5. p. 235. G. Don gen. syst. 3. p. 864. Scapi angulati nudi. Flores campanulati lactei.
- ?• P. BRACTKATA (Hook. fl. bor. am. a. p. 47). ^{fo}I's Iato-ovatis acutis integerrisen levissimè crenatis coriaceis acatis nitidis, scapo snbbisqnamoso, racemo kracteato bracteis lanceolatis aenminatis flore longioribns, calycis segmentis ^ttenuatis'alabastro longioribos. % in Amer. bor. ora occid. Folia a-a J poll, longa.
8. P. PICTA (Smith 1. c.D. et G. Don 11. cc.) , foliis ovatis mucronnlatis coriaceis snbserratis petiolo linearli longitudine aeqlalibns subtùs rubris snprå venis albia Pictis, racemo multifloro, petalis sabrotnndfl, stigmatii disco 5-lobo.!^ in inulâ Nootka ad oram occid. Amer. bor. Hook. fl. bor. am. a. p. 47. Scapi iqnetri rubentes squamis istructi. Flores globoso-campanulati albi.
- Q- p- APHTHA (Smith 1. c. D. et G. Don 11. cc), foliis veris nulljs, scapo a ~~ngulato~~

basi squamis plurhnis instmcto, racemo multifloro, calyc. lobis ovatis acutis crenulatis, petalis subrotundis, stigmatis disco elongato 5-crenato. 2£ in ins. Nootka ad oram occid. Americas bor. Sea pi numero.si. Flores globosi lactei. Species absentia foliorum spectabilis et quasi ad Monotropeas vergens.

§. a. *Staminibus crectis ad pistilium incurvis, stylo declinatopetalis longiore, stigmate exannulato.*

10. P. MEDIA (Swarfz act. holm. 1804. p. a57- t. 7. non Hayn.), foliis orbicnlatis aut rotandaio-ovalibas crenulatis coriaceis petioli basi subdilatati longitudine , scapo angulato, racemo multifloro, calyc. lobis ovato-lanceolatis acentis demùm reflexis, stigmate capitato obtusè 5-Iobo.^ in sylvaticis et dumetis nmbrosis Angliae boreal is et Scotiae (Sm. Don), Sueciae (Sw.), Silesia?, Thuringix et Has-siae (Rad.) Dahirix (Patrin.). Smith engl. bot. t. iq|5. Rail.! mon. p. 21. t. 3. G. Don gen. syst. 3. t. S64.P. rotundifolia OEd. fl. dan.t. nononLinn.Scapus ferè semper spiraliter tortus. Petala alba subvirescentia inargine subrosea. (v. s.)

§. 3. *Staminibus erectis, stylo rigido, stigmate exannulato.*

11. P. MINOR (Linn. sp. 567), foliis rotundatis ovalibus coriaceis repando-crenn-latis petiolo basi snbdilatato longioribus, racemo subspicato, bracteis pedicellam snbasquanlibus aut eo longioribus, calycis lobis brevibus subacutis, stylo brevi inclusu, stigmate 5-lobo. 7] in sylvis et dumosis raoutanis Europae et Asiae bo-real is freqnens et in America horeali rarior. OEd. fl. dan. t. 55. Ser.! mus. helv. p. 36. Don gen. syst. 864. Dietr. fl. bot. t. 445. Svensk. bot., t. 55o. P. minor et P. rosea Smith engl. bot. t. 168 et '2543. Rad.! mon. p. i5 et 18. t. 1 et 1. P. rotundifolia Pall. ind. taur. — Grael. fl. eib. 4. t. 56. f. x. Riv. monop. t. 136. f. 1. Scapi angulati, Folia apice mucronulata. Racemus conferlus aut lazier in speciminiibns cseterum simillimis. Cor. globosao albae roseo-sublincta*. Species duac à Smithio propositce non, imò nt varietates, admittendo: videntur. (v. v. et s.)

12. P. SECUNDA (Linn. sp. 56?), foliis ovatis acatis membranaceis acatè serratis petiolo linear! longioribus, racemo secundo seu unilateral! calycis lobis brevibus subobtusis, petalis oblongis, stylo exerto, stigmate depresso 5-lobo.T^ in sylvis dumetiset montanis Kuropa?, Asiae et Americas borealis non infrequent, fl. dan. t. 402. engl. bot. t. 517. Ser.! et Rad.! 11. cc.— Gmcl. fl. sib. 4. t. 56. f. 2. Riv.monop. t. i38. f. a. Moris, ox. s. 12.1.10. f. 4.Dalech. lugd. p. 1148. f. 4. Flores albi subvirescentes. (v. v. et s.)

yS. *hybrida* (DC. fl. fr. ed. 3. n. 2815), ex oinni parte minor.— in Delphina-tia distr. Chamsaar. P. *hybrida* Yill. dauph. 3. p. 583.

‡ *Species exclusae.*

- P. MICULA-TA Linn. = Cbimaphila macnlata.
- P. MENZIESII Br. = Chimaphila Menziesi.
- P. UMBELLVTA. Linn. = Chimaphila umbellata.
- P. VNIFLORA Linn. = Moueses grandillora.

II. MONESES *SalisbAn* Gray brie. arr. a. p. 403. Don gen. syst. 3. p. 365. — Pyrolas sp. *Linn*, etauct. — Bryopbthalmum E. Mey. pfl. gate. p. 101.

Calyx 5-partitus. Cor. 5-partita patens. Stam. 10, nempc duo anlè quemque cor. lobum regularitersita. Antherac basi bicalcanitae, dcniuum inversae, ad apicem cujusque calcaris poro hiantes. Stylus rigidus. Stigma radiato-5-partitum! Capsula 5-valvis 5-locul. loculicido-dchiscens , tomento in suturis nullo. Scm. 00.— Herba perennis in hemi-sphaera borcali crescens simplex humilis glabra. Radix repens. Folia ad

apicem caulis conferta petiolata rotundata veuosa. Pedunculus terminalis caule longior i-florus, infra medium i-bracteatus. Flos albus sericeus Parnassiaj palustris.

I. M. GRANDIFLORA. (Salisb. in Gray 1. c.). % in sylvis prasertim montanis inter zonos in partibus borealibus aut frigidis Europae, Asiae et America. Pyrola multiflora Linn. sp. 568. OEd. fl. dan. t. 8. Sow. engl. bot. t. 146. Schkuhr bandb. t. iio. Ser. mon. in mus. helv. p. 41. Had. diss. p. 10.—Moris, ox. s. 10. t. ia. £ a.—Variat floribus /f-parlitisoctandris Vill. daupb. 4. p. 538. Schkuhr bandb. i. p. 1077. (v. v. et s.)

III. CHIMAPHILA Purshii. am. bor. 1 (1814). p. 300. Nutt. gen. am l.p. 274. Don gen. syst. 3./>. 865. Hook. fl. bor. am. 2. p. 49—Chimaphila Radius diss. pvr. (1821) />. 7 <* 33. Reichenb. fl. exc. i.p. 415. — Chinaza R. Brown in h. Banks. Pyrolae sect. Chimaphila Smith in Rees cycl. *v. 28. Ser. mus. helv. p. fa. Don mem. soc. wern. 5. p. 2ao. — Pyrolae sp. Linn.

Calyx 5-fidus. Petala 5 patentia decidua. Stam. 10 nempe duo ante quodque petalum sita, filam. medio dilatatis! anth. Pyrolae. Ovarium rotundato-obconicum, obtuse angulatum apice umbilicatum. Stylus brevissimus in umbilico ovarii latens. Stigma orbiculatum tuberculato-5-crenatum. Capsula Pyrolae!, sed loculi apice dehiscentes et valvulae tomento non connexae. Sem. Pyrolae. — Sufurulices in hemisphaera boreali spontanei, sempervirentes, glaberrimi, radicibus repentebus, caulinibus bine inde fibrillas agentibus. Folia sparsa vel subregulariter vermicillata lanceolata coriacea dentato-serrata. Pedunculus terminalis saepius umbel la seu corymbo terminalis. Bracteae subulatas sub pedicellis. Flores albi, antheris violaceis.

1. C. UMBELAT (Nutt. gen. 1, p. 274)» staminis filamentis glabris, bracteis linearisubnatis, foliis cuneato-lanceolatis coucolonbns. If. § in Europae, Asiae et frequentius Americae borealis sylvis. Rad. diss. p. 33. Don gen. syst. 3. 365. Chimaphila corymbosa Pursh 11. 1. p. 300. Pyrola umbellata Linn. Td 565 Gmel. fl. bad. 2. p. a n. f. 2. Oberl. cbor. p. 70 et 82. t. 5. sv. bot. t. 27. fl. dan. t. 1336. Sims bot. mag. t. 897. Sering. mus. bclv. p. 45. Big. med. amer. bot. t. x. Dune. ann. uied. 4. p. 340. t. 7. Bart. raed. bot. 1. t. 1. Herbae (pipsissewa in Amer. bor. dictaj), infusio insigniter diaretica! Umbellae 5-7-floric. (v. s.)

#jg. Mexicana, major pedalis ferè sesquipedalis, foliis in verticilos 5-6 dispositis. % in Mexico circa nr bem. (v. s. com in. à cl. Alaman 1 in Berl. ! pi. exs. n. 605.)

2. C. MACULATA (Pursh fl. bor. am. 1. p. 300), staminis filamentis infra dilatationem villosis, bracteis linearisubnatis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis superne seciis nervis medium fascia albida maculatis. j in Americas bor. sylvis umbrosis arenosis seu glareosis à Canadà ad Carolinam. Rad. mon. p. 35. t. 5. f. a. 1st art. fl. north.-Amer. ill. 1. t. 11. Pyrola maculata Linn. sp. 565. Mich. fl. i. P. ** J. Se 7ⁿ?!, niDS!! ^ 1v' i't- ** V^{Cnrt}: b o t m a S' « 897. — Pluk uiant. t. H9- f. 4- λ a « at umbellis 2-5-llons. (v. s.)

3. C. Minutii' (Spreng. syst. 2. p. 317. Don gen. syst. 3. p. 856), stam. filamentis medio barbatis, stylo elongato, bracteis subrotundatis, foliis lanceolatis acuminatis discoloribus. J in Ainer. bor. orà occ.d. Hook fl. bor. amer. 2. p. 40. t. 138. Pyrola Menziesii K. Brown in b. Banks. Don trans. wern. soc. 5. p. 345. Folia subtis robra. Flores penduli albi. Calycis lobis ellipticis aonti. Priorem valde refert ex Don.

Trib. II. *GALACE/E DC.* — Galacinearum gen. *Don.*

Stam. filamenta in tubum ad apicem usque concreta, 5 antherifera, 5 sterilia.

I'V. GALAX Linn. gen. n. 276 [ex syn. et excl. car.). *Dryand. h. kew. ed. a. i>.* 2. p. 37. *Don gen. syse.* 3 p. 204. — *Belvedera Gron. virg.* a5.—*Yin èel la Mitch,* gen. 24 non *Dill.* — *Erythrorhiza Michx. fl.* 2. p. 35. l. 36. — *Blandfordia Andr. hot. rep. t.* 343 non *Smith.* — *Solenandra Beauv. in Vent. malm.* t. 69. — *Galax* et *Solenandra Pers** *ench.* — *Pyrolae sp. Clajt.*

Calyx 5-partitus persistens. Petala 5, calyce duplo longiora, cum tubo staminum basi cone re ta. Stam. filamenta omnino concreta in tubum ferd urceolatum 10-dentatum, dentibus 5 sterilibus obtusis, 5 breviorybus intiis antheriferis. Anthers subrotundae. Ovarium subrotundum. Stylus brevis. Stigma 3-lobum. Gapsula ovata 3-locul. 3-valvis, valvis medio septiferis. Semina 00 parva recept. centrali affixa. — Herba boreali-Americanica perennis sempervirens glabra, odore sternoreo donata. Radix rubra repens. Folia radicalia petiolata reniformia crenata. Scapus aphyllus simplex. Flores longè racemoso-spicati albi parvi, rariis 6-meri et fructus 4-meri.

1. G. APHYLLA (Linn. sp. ^89). % in montanis ad scatnrigines in Virginiam, Tennessee, Carolinam et Georgiam. Nutt. gen. 1. p. 145. Sims ibot. mag. t. 754* *Blandfordia cordata* Andr. 1. c. *Solenandria cordifolia* Michx. 1. c. *Erythrorhiza rotundifolia* Michx. 1. c. *Galax roliindifolia* Pnrsh fl. hor. am. 2. p. 446. *Pyrola urceolata* Poir. diet. 5. p. 743. (v. v. c. c. et c. sp.)
-

Ordo CXVII. FRANCOACE^E Ad. Juss. ann. sc. nat. *5
 (1832) p. 9. Lindl bot. reg. n. 1645. key. p. 47. nat. sysU
 \$d. n.p. 33. — Galacinearum gen. Don Edimb. phiLjourn.
 oct. 1828. Lindl. nat. syst. ed. 1. n. 146.

Calyx 4-(rarissimè 5-) partitus, lobis aequalibus foliaceis. Petala 4 (rarissimè 5) imo calyci inserta , ejusdem lobis altern a. Stam. cum petalis inserta, fertilia petalis numero duplo, rudimentaria seu sterilia nectarifera, totidem cum fertilibus alterna. Filam, subulata. Antherae ovatae basi inserts biloculares. Ovarium ovato-oblongum , 4-sulcatum, constans ca rpellis 4 ad apicem concretis et petalis oppositis. Stylus o, Stigmata 4 breviter obovata apice truncata acutè marginata. Capsula membranacea 4-locularis 4-valvis loculicidè aut septicidè dehiscens. Semina 00 angulo loculorum interno ad fix a »inuta. Embryo minutus ad basin albuminis carnosí. — Herbae Chilenses, nunc acaules, nunc caulescentes. Folia alterna sessilia aut petiolata, pinnatim palmatimve lobata. Rami florales scapiformes. Flores in racemum dispositi, bractea linearis suffulti. Petala alba aut purpurascens, ssepiis longe persistentia. — Ordo prope Crassulaceas suadente cl. Ad. de Jussieu, prope Oxalideas judice Bertero, inter Olacineas et Sarraceniaceas docente cl. Lindley, olim prope Rosaceas ex mek sententi4 inserendus, nunc potius suadente cl. Don et consentiente cl. A, de Jussieu prope Saxifrageas referendus, hue usque in Prodromo omissus, hie insertus ne in serie Calyciflorarum omnino desideretur, et ex affinitate cum Pyrolaceis à cl. Don subodorata, Galacineae enim hujus botanici, ex Pyrolaceis Galaceis nostris et Francoaceis veris constabant.

1- **FRANCO A** Cav. icon. 6.p.yj.t. 5g6. A. de Juss. ann. sc. nat. 3. p. 19a. t. xa. «*!». i5.p. 6. Hook, et Am. hot. misc. 3. p. '24^. Don in Sweet br. fi. gard. ser. 2. /1: 151. Lindl. hot. reg. n. 1646. — Paukeis sp. JVUD. non Molinta.

Petala regularia inter se aequalia. Capsula septicido-dehiscens. — Fo Ka pinnatisecta lyrata , lobo terrinai niamaximo.

x- **F. APPENDICULATA** (Cav. icon. 6. p. 77. t. 5g6), subacanlia, foliis utrinquè villosis pedolatis lobis neuipè iuferioribns non decurrentibus et à basi petioli Jeniotis racemissiibwmplioiboscalcibnsqae velutino-tomentosis. If. in insula San Carlos de Chiloe, ad Talcahuana , Coquimbo (Cav.). Hook et Am. 1. c. Lindl. bot. reg. t. 1645. Hook. bot. mag. t. 3178. Don syst. 3. p. 204. Petala pallide rosea, immaculata aut rariùs maculata. (v. v. c.)

*• **F. SOKCHIFOLIA** (Cav. 1. c. in adnot.), canescens, foliis ntrinque villosis sessilibus ant amplexicanlibns im6 deenrentibus , lobis nempè ad basin nsquè in petiolum malatu indecurrentibns, racemis snbsimplicibus calycibosqne velutino-

- tomentosum. 5 ^f " Chili ad montes (Feaill.) prope Conceptionem (d'Urv. !)
 Hook, et Arn. 1. c. Don gen. syst. 3. p. 204. Panke sonchifolia Willd. sp. a.
 p. 487. Fr. appendiculata Ad. Juss. ann. sc. nat. 3. p. 195. Don in Sweet
 brit. fl. gard. &er. 2. t. i5i? — Llnupanke Fenill. obs. 2. t. 3i. Petal a intju-
 siis rosea saturatè maculata. Prioris var. ex Lindley. (v. v. c. et sp.)
3. F. RAMOSA (D. Don in Edimb.phil. journ. 1826. oct. et gen. syst. 3. p. 204),
 caulescens , foliis petiolatis, racemis spicatisereclis , lobis calycinis lanceolatis
 obtusis enerviis. Jj If, in Chili prope Santiago (Don) Valparaiso (Gamm.).
 Hook, et i m . 1. c. Herba ex Don pilosa ramosa, foliis sapremis indivisis,
 floribus minorib. 4* F. GLABRATA , »ubacaulis» foliis sabtus villosis petiolatis ad basin usque plu-
 minus alatis lobdisve, racemo simplioi subspicato cam scapo et calycibas
 ovalo-lanceolatis enerviis glabris. Qf in Chili ad demissiores Cordilleras legit
 cl. C. Gay. An F. ramosa Lindl. hot. reg. n. 1645. in adn. ? Petala alba vix
 calyce longiora. Folia snerne glabra. (v. s.)
- II. ^TILLA. DC. prod. 4. p. 667. A. de Juss. ann. sc. nat. *5.p. 7. Hook, et
 Arn. hot. misc. 3. p. 338. Guill. in Detess. ic. sel, 3. p. 43. t. 77. — Dimorpho-
 petalnm Bert. mere. chil. 1829. n. X2-I3-I4> hull. sc. nat. 20. p. n o sine
 descr. — Anannosa Aliers. mss. ex Book, et Arn. I. c.

Petala 4 inaequalia, 2 mult6 minora. Ovarium glanduloso-pubescentes
 2-4-loculare. Gapsulae loculi suturâ dorsali rupti nempe loculicido-
 dehiscentes (Juss.). — Herba subacaulis pilis raris apice glandulosis
 hinc inde donata. Folia subradicalia petiolata cordato-orbiculata pal-
 mati nervia sinuato-dentata , petiolis basi subdilatatis'. Scapus simplex
 aut ramosus, apice flores racemosos gerens. Pedicelli bracteati erecti.
 Flores albi parvi. — Genus olim ad Saxifragaceas ex habitu ad Mitel-
 lam accedente et speciminibus vix fructiferis relatum, sed nunc , praa-
 euntibus cl. auctoribus citatis , ad Francoaceas tutiis reductum.

1. T. HYDROCOTYLJEFOLIA (DC. prod. 4. p. 667). If, in Chili in fissuris rupiam
 ad Concon (Poepp. !), Quillota , Tagua-Tagaa , montem la Leona (Bert. '),
 Valparaiso (Gamm.). Hook, et Arn. 1. r. Don 1. c. Guill. 1. c. Dimorphopeta-
 lum Tetilla Bert. ! 1. c. viilgd Tetilla ex Bert., Teta de Cobra sea Culantrillo ex
 Bridg. (v.8.)
-

**Ordo CXVIII. MONOTROPEJE Nutt. gen. am. p. 272. DC.
et DubyboUgalL i.p. 319. Bartl. ord. nat. i56. — Mono-
tropaceae LindL nat. syst. ed. 2. p. 219. — Ericaceae Mo-
notropeae G. Don gen. sjrsL 3. p. 266.**

Calyx ovario non adnatus 5 5-partitus, persistens, interdùm aut nullus aut bracteis nonnnllis suppletus. Cor. perigyna persistens, petalis 4-5, nuiic plus minus concretis in corollam °vatam 4-5-dentatam, nunc liberis aut imābasi subconnexis. Stam. petalis numero dupla, cum iis non concreta, filam. subulatis, antheris subpeltatis horizontalibus saepius i-locularibus, varie (sed nunquam poris terminalibus) dehiscentibus. Appendices filiformes interdùm inter stamina sitae. Ovarium liberum depresso-globosum aut ovatum. Stylus filiformis rectus. Stigma discoideum submarginatum. Capsula 4-5-locularis 4-5-valvis, loculicido-dehiscens, valvis nempè medio septiferis axeos basi adnatis. Placentae 4'5 «xi adnatae. Seta ina numerosa minutissima ferè sphaerica, pelliculâ samaraeformi inclusa aut apice alata. Albumen carnosum. Embryo ad picem albuminis minutus indivisus.—Herbae Orobanchoideae carnosae simplices, in radicibus arborum parasiticae, nunquam virescentes. Folia vera nulla, sed eorum loco squamiae alternae secus caulem. Flores nunc terminales solitarii pentameri, nunc racemosi aut spicati, terminali 5-mero, caeteris 4-mers. Cor. albae aut roseae. —Ordo Pyrolaceis valdè affinis, terospora et Pyrolâ aphyllâ praesertim mediantibus.

I. PTELIOSPORA Nutt.gen. am, |p. 269. n. 386. LindL coll. hot. n. et t. 5.

Calyx 5-partitus lobis lanceolatis. Cor. perigyna (Lindl.) gamopelta ovalaore 5-denlato reflexo. Stam. 10 incfusa, cum corolla non concreta filam subulatis, antheris dorso prope bnsin bicalcaratis ^ilocularibus. Ovarium obtuse 5-gonum .Stylus brevis teres. Stigma obuse 5-lobum. Capsula depressa , roluDdatoō-gona, apice umbilicata, stylo aoiculata, 5-loc. 5-valv. valvis medio septifens. Semina 00 mi- *iuu afe terminali reticulatâ cristata. Embryo minutus m apice albuminis carnosî — Herba Boreali-Americanica parasitica brunnea erecte viscido-hirsuta simplicissima. Folia squamiformia linear-lanceolato ^cuminata. Racemus terminals. Pedicelh bracteolati mcurvi i-floni. Cor. ex albo subrose*. — Habitus Monotropearum. Caracteres florales ferè Ericearum et Pyroleakuni.

2. P A .. (Tnnt 1 r) (T) in argillosis Canada sapenoris propc Niagarae cataractas (Whitl.), cir- dun. Seneca (Gray), circa Albany in Noveboraco (Beck. Torr.!), ad Saskatchewan (Drumm.) in vinetis orge occid. ad Columbia-river (Dougl.!). Herba circ. sesquipedalis. (v. s.)

II. SCHWEINITZIA *Ell. sketch i.p. 478 in adnot. Nutt. gen. am. in add. G. Don gen. syst. 3. p. 867.* — *Monotropsis Schwein. in Ell. I. c.*

Calyx 5-sepalus marcidus, sepalis crectis basi unguiculato-gibbosis fornicatis. Cor. gamopelala campanulata 5-fida, limbo demiim reflexo. Nectarium 5-fidum ad basin corollas. Stain. 10 inter nectaria. Anthera clavato-saccatae (Ell.), filamentis adnatae, basi in versâ biporosas (Nutt.). Ovarium. 4-5-gonum subglobosum. Stigma subglobosum inclusum intiis 5-fidum. Capsula 5-locul. (Nutt.). Sem. . . . —Herba Caroliniana babitu priorum et verisim. parasitica. Flores in spicam lerminalem aggregati, sessiles, bracteis amplis stipati.

1. S. ODORATA (Ell. I:e. Nutt. gen. pag. ult.). *2f in sylvis pingnibus Carolina; borealis in Comitatatu Stokes saepius foliis cooperta (£11.)ad Salem (Nott.!)• Schw. Caroliniana Don 1. c. *Monotropsis odorata Schwein. in £11.1. c. Flores rnbentl-albi odorem "Violas spirantes. (v. s. corara. à cl. Nuttall.)*

III. HYPOPITYS Z)i7./£i«*/>.i34. t. j.Hall. hefo. T./>. 4*7. *Scop. cam. n. |*}&- Nutt. gen. am. i.p. 270. G. Don gen. syst. 3. p. 866.* — *Orobanchoides Tournact. acad. Par. 1706. p. 65.* —*Monotropae sp. Linn. Schreb. Juss. Lam.*

Calyx 4-5-scpalus, sepalis coloratis lanceolatis. Pelala tot quot sepalas, iis alterna et paulò longiora, concolora, cum iis ereclo-conniuentia etdecidua, basi cucullata et glandulifera. Stam. 8-10, hypogyna?, filam. subulatis persistentibus a petalis omnino' liber is, anther, •i-locul. parvis. Ovarium liberum. Stylus cylindraceus. Stigma discoideum urningilaturn. Capsula ovata autglobosa, sulcis 8-ioexarata, ^-5-loc., 4-5-valvis, loculicido-dehiscens, septismembranaceis. Recept. centrale 4-5-gorium subcarnosum. Sernina numerosissima subulata nempe pelliculâ scobiformi membranacea vestita. Albumen carnosum. Embr. . . . —Herbae parasiticae subcarnos© odoratae, recentesslramineab» siccatas fuscescenes. Caulis simplex. Radix squamosa. Folia squamiformia. Flores in racemum terminalem, virgineum nutantem , adultum erectum , disposili, laterales tetramerri 8-andri, terminalis 5-meru3 10-ander.

1. H. MULTIFLORA (*Scop. carn. ed. 2. n. 178*), capsulâ ovali-oblongâ, petalis genitalibusque hirsutis. 2f in Europæ sylvis, parasitica in radicibus Pini sylvestris, Abietum et aliarum arborum imò ex Reichenb. Fagi sylvaticæ. H. Riviñi Rupp. jen. 180. H. Intea Dill. giess. 99. Gray. brit. 2. p. 404. H. Euro-pasa Don* I. c. Monolropa bypopitys Linn.'sp. 555. OEd. fl. dan. t. »32. Lam. ill. t. 36a. f. a. Reichenb. ic. crit. f. 674. Wallr. sched. crit. IQ3. Schk. handb. t. 116. Smith engl. bot. t. 69. *Monotropa bypopitys* 0 birsata Rotb tent. »• p. 46a. (v. v.)

{&. *Americana*, dlmldiò minor fusco-flavescens. 7^ in Pinetis Canadensisbus ^ Pensylvanicis. *Monotropa bypopitys* Micbx. fl. 1. p. 271- Hypopitys ^" " ropa? aNutt. gen. r. p. 271.

a. H. ftLABRA (Bernb. ex Reichenb. fl. exenrs. snb MonotropA), capsnlâ globosa, petalis staminibusque glabris. JL in sylvis snper radices Fagi sylvaticas p^{211^*1*} tica in Germania praesei-tim Eifordensi et Thurlngincæ (Reichenb.) rariis (f^t forle) in Oallia ot Anglia. *Monotropa hyj>oj>ligea* Wallr.! sched. 191. Reichenb. pi. crit. f. 675. Hypopitys liypoj>h<j>ea Don I.e. Mouotropa J^{ppp} t. ib5. Monolr. hypoxya Spreug. syst. I. p. 317. — Mentz. pug. t. 3. Moris-oxon. s. 1 a. r. 16. f. i3. Prioris varietas A pluribus (forte non immeriloe% Drees in liuna; à 18^, p. 237) habetur. Differt rncemo paucifloro, glabritie ferè tota , stylo breviore, capsnlâ globosâ. (v. s.)

3. **H. LABUOXBTOSA** (Nntt. gen. am. z. p 271), caale squarais floibos genitalibusque velatmo-pubescentibus, pedicelli* (lore duplo triplove longioribus, tapsalA subglobosd. % in sylvis pinguibus Carolina (Michx.), Georgia (Ell.), Novar Cesaiese (Torr.'), Noveboraci (Kaf'), a Pensylvania 'ad Carolina in (Parsh) snper arboiam vaniam radices paivasitica (Ell). Monotropa lanaginosa Michx fl bor am. 2. p. 266. FU sketch 1. p 478 Bigel fl bost. ed 2. p. X7G. Darl fl. cestr. ed 2. p. 267. Mon. hypopitys Walr. car 1^6 Calyx numero sepaloiam inconstans, etideò à qaibnsdam et specialim a cl. Bigelow, at brae tea lum V£iticillas habetur. (v. s)

IV. MONOTROPA *Nuu gen am. n 38S G Don gen sjrst. 3 p. 866* Mono-tropae sp *dnn. et auct.*

Calyx nullus. Petala Serecta persistentia basi cucullata et nectari-fera. Stam. 10 filam. persistentibus, anheris reniformibus hontonta-hbus pollen in medio per foramina 2 transversa cmittentibus. Appendices 10 è toro orta? staminibus alternae glabra? reflexae. Sugma orbiculatum nudum. Gapsula semper 5-meia, caeterium Hypopitydis. — Herbae Boreali-Amencana;, unilora?, modorcC, habitu Hypopitydi similes.

¹> M. MORISONIANA (Michx. fl. bor. am. 1. p 266), caule elongatostrictissimo, sqaamis distantibus, flore erecto *If*, in sylvis umbrobis Vugmiae et Carolina* (Puish). Moris, oxon. 3. s. 12. t ib f 5. Mon Monsoni Peis. enh. 1. p 469. Flores pauli6 majores quam sequenUs, non iaiò dodecandri (v. s)

[^]M U27IFLORA(Linn. sp. 555 exel syn Moris), caule snbabreviato apicein-enro, sqaamia appioximatis, flore cernoo, fiucla electo *'if* in sylvis nrabrosis Amencae borealis à Noveboraco ad Carohnam (Pur&h), in agio Bostoniensi (Boott I), *m* Mdr[^]landia et agro LIimoensi (Raf!), in Te'ia-Nova (Lapy!). Nutt gen am. 1. p. 27? Lam ill t 35a f r. Bart. fl. bor am. ill. 3. t 86. ft — Cdtesb car. x. p. 36 t. 36. Radix dicitur lotadata magnit. IVacis. Berba albida Stam. filam pubescentia. (v s)

•j" Species exclusce.

M HYFOFITVS Lmn p= Hypopitys multiflora.

M HYPOPITYS Gaartn. = Hypopitys glabra.

M HTPOPBKGEA Wallr. =r Hypopitys glabria.

M HYPOXIA Spreng. = Hypopilys glabra.

M HY>OPITTS Walr. = Hypopitys lanuginoso

M. LAKUOXNSA Michx. = Uypopitys lanagmosa.

ADDENDA ET CORRIGENDA

PARTFS SECUNDAE VOLDMINIS SEPTIMI.

Ordo CIII. STYLIDI&E.

3" STYLIDIUM LAXIFIORUM , scapo vix foliis longiore pilis patnhs apice giandnlosis hispido, foliis linearibas margine arete levolutis et ideo teretiusculis rigi dnlis pube miuimd velutinis, sqnamis linearibns paucis folio sabaugubtioribus, racemo simplici laxo, pedicellis elongatis, bracteis linear-sabnatis, cal tubo pilis apice glandnlo&is hispidibsimo %, in Novâ-Hollandiâ ad Svan-iiver legit cl Diummond' Heiba a-3 pollic Radices panes graciles bimpches Folia apice callosa. I*edicelli S-io lin. longi Co roll ae ex sicco alhidae sen carneae (v. s à cl inv)

V*. S HEBEGYNUM , scapo pilis apice glandnlosis patentim hirto , folns linearibas margine revolntis pubescenti-hutellis, sqnamis linearibas folio vix lationbus acutis, racemo subLamoso. If, in Novâ-Hollandiâ ad Swan-river legit cl Diummond' Hcrba semipedalis n'gidula. «olia 4-5 poll longa Calyces extus et cor etiam sed parciub piloso glandnlosi. Oxaria ovata. Differt à St birsnto raccemo subramoso laxiore, a St. red u plica to squamis angastionbus, ab utioque foliis velutino-pnberahs (v s à cl inv)

|%m* S SQUAMFLLOSCM , scapo eieclo foliis multo longiore spa'rse piloso, pilis pie risque apice glandulobis, foliis linearibas pilis glandulobis tans ciliatib , squamis brevibas subfoliaceis extra et inter folia sitis, racemo simplici, bracteis liueaiibus pedicello quadriplq brevionbns, cal tubo seu capsnlâ liueuri-bovatâ spaise piloso glandulosâ feièplahrâ. If? in Nova¹ Hollandiâ ad Swan-river legit cl Duiiniiond¹ Heiba 5-7 poll longa Folia pollicnn longa Radical a? simplices fasticulatae Coi. violate*, cal lobis longiores , columnâ sexuah breviores. Capsula ab apice ad basin dehiscens, fere media inter priinam et secundaiu sect (v s ex coll cit)

4" S. SCHENOIDKS, scapo erecto foliis feie dnplo longiore pilis patnhs eglando^ losih longib basi hispido, superae et in pedicellu calycibnsque pilis glandalosis bievissiims velutino, foliis hneanbus glabus, squamis scanoisis utrinqne foln basi stipniae more adnatis, paucis hberis, racemo 3-5-floro subambellato. % in Novâ Hollandiâ ad Swan-rver legit cl Dinmmond¹ Ambigit inter prirnam el secundai Tolypnngii diisionpm An squamae vera? à foliis distinguendai? an tantmn fnhorain expans>iones junioies omnino adnatae, deraom apice seceden-fab quasi bilidae et stipnlifoimes? Folia vtnsta basi fuscescentia apice tian-cata et deusta Cor puipura¢es fere magnit St. hiisnti (v. ». à cl inv.)

8 S. GHAMINIFOIUM adde Gonf Morren in nonv mem. acad. Brux. vol. *xi cam icoue anat

it* S SKTIGFRUM, foliis linearibas confeite caespitosis ciliatis utriaque glabris setâ longâ teirniuatj?, scapo elongato setis *flav'ulis* patalis infeine eglandulosi? in lacemo glandulobis hibpido, racemo subpanimlalo multifloro bracteis linear! lanccolatis et biarteolis hneai.bus instiucto, calycebilabiato-5-pailito coiollâ que piloso-glandulobis. Of in Novâ-Hollandiâ ad Swau-rñer legit cl. Drammond¹ Folia 8-14 hn longa , hneam vix lata , setâ 3-4 Ha terminata Scapns i-i I pedalis Cor m sicco albida. (v. b a cl inv)

2?* S. CAUIESCENS, caule in parte foliiferâ elongato glabio , foliis infer, alter-nis, super, congessto-subverticillalis oblongo spatbnatis rancrone callobobie-vissimo subapiculatis ^laberrimis integlis, peduncalo (scu scapo) elongato folia linearia 4 5 verticillata gerente glabro, rachi pedicellis calyribusque pilos bie-vissiinos apice glandulosos gerente, racemo simplici If. in Novâ-Hollandiâ ad Svvm-iiver legit cl Diummond * Cnlib pars foedata | poll longa , pars sea pi-lormis i I pedali* Cor ex sicco palhde violates? (\ s a cl inv)

- 13\ S TNYRSIFORME, foliis petiolatis obo\ato spathulatib basi longe cunealis callose et obtuse Inucronatis supia puberulis margine levolutis subtia glabris, bcapo adscendent-i-ei ecto fob is duplo fere loDgioie pilis ahis glandulosis alus eglaudulosis conferte hiisato, racemo composito confeito gianduloso-husnto, biactei* linearibus, pedaaculis lateralibus 2-i-flons, corolla subhiisuta. If ID Novā-Hollandiā ad Swan-iuer legit cl. Drummond¹ Col I urn squamis (veteitira foho rum leliquus) palhdis hiisutis cmctum. Folia petioloincluso3-polhc. limbo 3-4 hn lato Cal lobi 5 subaeqoales. Coi. albidae (v. s. à cl inv)
- 33**. S. LEPTOBOTRYS, folns ladicaahbus angnste hneari-lanceolatis atiinque attenuatis glabii*, scapo folus quadrupio longiore nudo teieti glabio, rachi sparse pedicelhs calycibusque confeite piloso-glandulosis, lacemo elongato dissitifloro composito, calycis lobis subxquahbus a pice setaceis If in Nov.l-Hollandiā ad Swan-iiver legit cl. Diunmiond¹ Folia i-6 poll, longa , a hn lata. Scapus in thyrs anguloso conipessus Peduncuh laleiales 2 3-floii Cor. ex sicco pallida* (v s. à cl inv)
- 33***. S. LEPTOFHYLLUM , foliis radicahbus confertis eiectis anguste linearibus glabris, scapo teieti folns duplo tnptove longiore hispido, pilis infeine eglandulobis et in parte super, racemi bracteis et calyce glanduloMS, lacemo 1a A thyrsiformi, bracteis bracteohsque acutissiniis, calycis lobis subacquahbus vW acutis aut subobtusis. If in Novā-Hollandiā ad Swan-river legit cl Drummond¹ Srapus pedahs aut seinipedahs Pedunculi lateiales 2-5 lion Capsulae immatnrae lineares Cor violacea* parce pdoso-glandulosc. (v. s a cl. inv)
- 33***. S. IHESEOIDES , foliis ladicaahbus erect is linearibus glabus, scapis 2-4 eiectis folia tiiplo quadruplove supeianhbus glabus, rateiuo composito laxo, pedicelhs calycibusque hincmde paice piloso-glandnlosis, talycis lobis sabaeqna libns atutis, coi tubo bievissiwo, capsulā linearis pedicello suo paulo longioie If in Nova Hollaudiā ad Swan-rivei legit cl Drummond. Uerba 6-12 poll, longa, tenella, Thesii fere facie. Mores flavi (v. s. à cl. inv)
- 35* S ANDHOSACEUM , folus hneaii-setaceis glabris, scapo folis a-3-ve longiorc uudo glabio ad apicem subglandaloso, floubus coufefto-capifatis, bracleis oblongis obtusiascoh concavis basi solutis involacum fei simulantibub, calycis lubo hneari apice parce piloso glanduloso. If? m NovA-Hollandiā ad Swan-liver legit cl Drummond. Habitus Andiosates rarneae Kadicula; 2-3 ri "Idulo: Scapus 3-pollic. Cal. labia bi et tnpartita Coi albidae tubus lobis cal subaequahs (v s. à cl inv)
- 35**. S. SLARIOSUM, foliis confertè csspitosis linearibus rigidulis acutiuscuhs supra et maligne scabiidis, scapis i-3 eiectis folia inulto supeiantibus glabris omnino nudis, racemo subspicato , biacteā sub pedicello hneaii-lanceolatā acuminata basi solutā, bracteolis sub iloie opposihs bractedque margine searriosis, calytis lobis valde inxqualibas maigie scanosis, corollae tubo bievissimo % in Novil-Hollandiā ad Swan-nvei legit rl Drummond! Heiba Anueriac facie x 1^l pedahs l'oha radicaha 8-10 hn longa Spicajonioi conica ex bracteis bracteolis calycisque lobis maigine scaiosis subargentea. Coi. ex sicco forte rosea?. Cal. tubas hnearis. Caps ign. unde locus in geneie subdubins. (v. s. à cl. inv.)
- 49*. S. nDHOTOMUM , caule erecto dichotomo glabro ad rainicaliones folia fasciculata gerente et radicem vahdam agente, folds subulatis inacronatis basi ad raargnēs angnste membranaceis glabris, pednnculis scapiformibus hispidis, pilis in parte infer eglaudulosis in super et in lacemo apice glandulosis, racemo composito, bracteis bracteohsque acutissimis, cal. lobis subobtusis. % in Nova-Hollandiā ad Swan-river legit cl. Drummond! Herba Inbricaahs 6-8 pollic Folia secus ramos sparsa, polhcem longa, tenuia, ad apices ramornm congesto-faseicnlatd. Floies ex sicco flavi. (v s à cl. inv.)
- 59**. S. rROtFERUM, canle erecto gracili glabro ramoso sub fascicnlis radicante, fainis c fascicuhs fohtoum 3-6 ortis, foliis in paite ranii infer sparsis, ad apicci congesto-fasciculalis linearibus glabiis atutis, pedunculo terminali hispido, pilis partis inf^r egUndalosis , racemo subcomposito paucifloro , caly-

cis lobis obtusis subaequalibus. *If* in Novâ-Hollandiâ ad Swan-iiver legit cl. Drumznond. Herba 5-6 pollic. Rami rubentes. Folia secùs ranios aubpatentia 3-4 Hn. longa, suprema crecto-fasciculata, 7-8 lin. longa. Caps, hneares. Cor. è flavo roseae ex sicco vid. (v. s. à cl. inv.)

49*** S. ERiopoDUM, canle abbieviato beibaceo di-tnchotoine ramoso glabro e nodis ladicante, foliis secùs tamos sparsis ad apicem congesto-fasciculatis linear-teretiusculis acutis glahus, pedunculis e fasciculi's oitis vix folia supercrantibus pilis lanatis patulis eglandulosis hirsutissimo, lacemo spicifouni confeito brevi muhifloro, bracteis bracteolisque folia lcfelientibus, calycis tnbo apice parcè piloso-glanduloso, lobis bievibus obtusissimis adpiessis Q^ in Novâ-Hollandiâ ad Swan-iiver legit cl. Drummond¹ Caul is 9-3-polhc Folia pollicem longa. Cor. ex sicco albidae. Hacc dnabas pnoribus valde affuis et cum us sec-tiunculam fere format, (v. s. a cl. inv.)

Ordo CIV. LOBELIACE[^]. (i)

X. GRAMMATOTHECA p. 348. — In charact. generico : heibae Capenses , *adde* : et Novo-Hollandicœ.

T. DREGEANA, *adde*: in paludosis ripae flaminis Zwartkopsiivier prov. Uitenhage Presl in Eckl. et Zeyh. enum. pi. afi. anstr. p. 400), et in Novâ-Hollandiâ prope flu men Cygnorum (Drummond¹). Ex speciinmibus siccis miniinè diffēlunt plants Capenses et Novo-Hollandicae, in priori antheias praeter barbas breves terminates dorso pilosiusculae; in postenoii nntherae pleiaeque dorso glabrae nonnunquam pilosiusculae, barbae terminales simillimae. (v. s.)

XIII. DOBROWSKTA nee Dobrowskia ut errore scripsi p. 355.

5*. D. STRICTA (Presl enara pi. afr. austr. Eckl ct Zeyh. p 8q3), scabra, canle crecto ramoso stneto, fobis spaisis oppositisque sessilibus linear-lanceolatis acutis maigmatis ciliato-puberuhs , inferioribus utrinque 2-3-dentatis, inediis i-dentatis, superioribus integris, pedicellis axillaribus strictis folio sextuplo longioibus basi bffiracteolatis, calycis laciniis linearibus acntis erectis tabo breviter tubinato 10-nervio diradio longioribus, corollâ extùs seiiceo-pubes-cente. *ip* ad Caput Bonae-Spei in lapidosis humidis montiam Lange Kloof.

6 D. STELLARIOIDES , *adde*: in locis humidis montis Winterberg prope fontes fluvii Katrivier. (Presl in enum. pi. afr. austr. Eckl. et Zeyh. p 393.)

XX. LOBELIA, p. 357.

2. L. LEPTOCARVA, *adde* : Rapuntinnm Mundiannm Presl in enum. pi. afr. anstr. Eckl. et Zeyh. p. 3g5. In tenâ liraosâ Kano prope Uitenhage.

2". L. ERICETORUM , glabra, cauhbus erectis panicnlato-ramosis ramisque terribus , foliis sessilibus angustè hnearibus obsolete denticulatis, pedicellis axillaribus folio triplo longioibus basi bibiacteolatis, florlbns pubcscntibns, calycis laciniis lanceolalis aenminatis tubo turbinato 10-nervio sublongioribus, corolla; laciniis lobisque ovalibus subaequalibus 1fad Caput Bonae-Spei in terrâ ericetoium plamtiei Capensis prope Doornhoogde. Rapuntium tenuifolium Piesl in enum. pi. afr. austr. Eckl. et Zeyh p. 3g^r), non L. tennifolia Willd.

19. var. /2 OLLatior lege elatior.

21. L. FLACCIDv , post num. G6 locanda et enim roonet cl. Presl enum. pi. Eckl. et Zeyh. p. 3qfi, antheias 2 infer, solum hirsutas esse. — in humidis mon-tiam prov. Albany.

25. L. SETACEA, *adde*: in arenosis fiuticetis planitiei Capensis et Stellenbosch. (Presl 1. c. p. 398.)

27. L. HIRSUTA L. *adde* : non L. hirsuta Andr. bot. rep. t. 444» qoae L. pubescens.

29. L. riNiFOLiA , *adde*: in prov. Stellenbosch et Worcester. (Presl 1. c. p. 398.)

39. L. cHAM-eriTYs, *adde*: in lapidosis montis Zwarteberg. (Presl 1. c. p. 399)

- 3a. L. (ElftAiopHYiLA, *adde*: in locis lapidoso alienosis prov Stellenbosch (Pre& 1. c. p. /100.)
35. L. SIMSII, *adde* in locis lapidosis arenosique planitiei Capensis. (Presl 1. c. p. 400.)
- 5i. L. LITTORALIS, A. Cumngh* in ann. of nat hist. 2. p. 50
58. L. suBMtRSA, A CuniDgh ' in ann of nat. hist. 2 p. So.
- 66*. Conf. ad num ai.
68. L. BELLIDIFOLIA *fl brevidens*, calycis laciaii tubo aequilongis.—in humidis piov. Uitenhage et Swellendam (Presl 1 c. p. 3g6)
- 74*¹ L. IHCSA, pubescens, caulis decumbentibus ramosis ramisque angolatis, foliis petiolatis cordato-ovatis acutis Inciso-duplicato-fccuteque dentatis in pectiolui decmientibus, floribus axilla rib us laiemosis, pedicellis folio ovato-lanceolato subaequalibus, calycis laciniis lineaaii-biibulatis tubo tuibinato duplo longioiibus, coiolla glabeuiina' laciniis lobisque ltncaribus If ad Caput ftonae-Spei, mtei lapides fruticesque monti&in piov. Swellendam. Rapuntiuni iucisum Piesl in enum pi. afi. austi. Eckl. et Zeyh p. 397.
76. L. ruBESCENS, *adde*: L. hiiisnta Andr hot. rep. t 444, Don Linn, nee Thunlfc
77. L. CUNEIFOLIA, , *adde* : inter frutices montiura in Lange Kloof. (Piesl 1 c)
- /?. *hirsuta*, caule ram Is foliisqae pilis lineam longis patentissimis albis hii-suti&. Credit ibid (Piesl 1 c)
- ¹¹ i30. lin p6nult. Daxinâ *lege* Dahuriâ.
- J70*. L. PHYSALOIDES (Ciiningh. in ann. of nat. habt. 2 p. 56), glabra , canle anguloso subiamoso, fobis ovato-oblongis longc petiolatis acutis maeqaalitei serratis, laceims teiruinalibus nutantibus, laciniis calycinis lineaubub dirai-dinni corolla} vix aequantibus, capsula globosa toilosa. ^ in sylvis insulae sept NovoB-Zelandiae, ubi *Odu* vel *Oru* vocatur. Colt in h. kew. Plantd a-3-pedalis, ba^i suffruticosa, ramuhs lotundato-angulatis purpureo lundis. Tolia 3-4 uncias longa , petiolis 2-unci.ilibus, seriatuns glandplosa-callosis Kacemi 6-8'flori. Bractae lincaie&. Corolla caeiulea unciam longa. Antheiac exseitae apice penicillata? Sugina dilatatum bilobuin.

n 172. West *lege* Test.

XIII. MEZLERIA. p. 350.

- « M. FILICAULIS, —in terra hmosâ ad margines aquarum stagnantium pi ope Uitenhage (Piet.1 enum. pi. afr. austr. Eckl. et Zeyh. p. 33.)

XIV. MONOPSIS. p. 35i.

2. M. SPECULUM, *adde* : in tenaericetoram montium Brackfbntein prov Clan-wilhain. (Presl in Eckl. et Zeyh. ennm pi afr. austr. p. 394)

XVI. ISOLOBUS. p. 35a.

1. I. COEYMBOSUS, *adde* : in locis arenosis inter lapides montis Tabnlas et mon-tuum Hottentotts-Holland. (Presl in Etkl et Zeyh. enum pi. afi. austr. p. 3g4)

floribus deciduis, pedicelhs biacteolisque persistentibus — Stellenbosch.
(Piesl 1 c.) ^ ^ ^ PARASTRANTHUS. p. 354.

- 1 P. LUTEUS, *adde*-: in locis hmidis montium Tabnh» et Duyvelsberg. (Presl in Eckl. et Zeyh. ennm. p. 3g4>)

£. *latifohus*, m humidis planitiei Capensis prope Dodrnhoogde (ibid.)

- ¹* P. FLAVUS , caulis diffusis infeine crebie foliatis, foliis sessilibus linearibus acutis callosoque seirulatis, lacemis biflois, pedicellis biacte.1 foliis confoimi duplo longioiibus basi bibracteolatis , calycis hirsuti laciniis linearibus a< umi natis pateutibus tubo turbinato longioribus, corollas laciniis lobisque lanceolatis. If, caput Bona3-Spei, ad rivulos vallis Talbacji prov. Woicester. Rapuntiunflavnu Presl in enni, pi. afr. austi. Eckl. et Zeyh p. 3g4.

- a. P. CAPITATUS , *adde* IU huuudis plauitiei Capen*is prope Doornhoogde.
(Presl ibid)
3. P. VARIIFOLIUS, *adde* ;in hamidis vallis Tulbaob prov. Worcester. (Presl ibid)
- 4 P. XRICOIDES , *adde* • in terrâ ericetoram arenosâ mtei Zoatrivier et Rietvalley. (Presl 1 c)
6. P. EUPHRASIOIDES , *adde* in humidis onentalibos montis Tabula. (Presl 1. c.
ubi descnptio deest ut in prodr. ejusd)

Ordo CV. CAMPANULACE.E. (i)

II LIGHTFOOTIA. p. 417

Species sequentes addit cl. Boek in Eckl et Zeyh. enam. plant afi. austr. p, 372-377, quoarum pars forsan in genus Wahlenbergia tudit. Corollam enim 5-iidam fete semper dixit cl auctor, qaudraio in Lightfootiis obveuit. Dibtinclio genernm et habitu ex seminibus melior interdum quam ex pioprio charactere à corollâ desunipto

- 4* L. CAPILLARIS (Buek 1 c. p 372), canle lignoso, ramis adscendenlibas lili-formibus simplicibus snperne pamcalatis, folns sparsis alternis sesilibus capillaribns 4-bn longis remote denticulate patnhs, floribus pamculatis, pedicellis capillanbas, corolla 5 fidâ lobis calycims duplo longiore, calycis tnbo hemisphaerico glabro vel scabiusculo, lobis hneari-lanceolatis denticulatis patentibus tubo longionbus, capsulâ . — ad Caput Bonae-Spei in montibus prope Gnadenthal et Caledon
- 4** L TKYMFONIA. (Baek 1 c p. 373) * caule erecto lignobo paiam ramoso superne tan turn fohoso, foliis alternis oppo&itisque sacpe subvei ticillatis snbn-latis acuminatis snbmucroDatis integemmia patentibus, floubiis solitariis in apice ramoram vel laxe racemo&is longe pednnncalatU, pedunculis glaberrimis, corollâ 5-fidâ lobis calycims duplo longiore, calycis tubo ovoideo, lobis linea-nbus acutis tubo longioibus, capsulâ .. — ad Caput Bonx-Spei in montosis lapidosis Albany.
- 4*** L 1 ARICWIWA (Bnek 1. c), canle lignoso ramoso, folns alterni& oppositis-qne saepe snbverticillatis patentibas lineanbus 3-4 lin. longis integenimis, floribus paucis, pedunculis 1-floris pubescentibus lateralibns terminalibusqne, corolla 5-fidâ lobis calycinis longiore, calycis 5-fidi lobis lougissiniis foliis similibns, capsalae valvis acentis ipsias basi aequabbns. — ad Capul Bonje-Spei prope Uitenbage.
- 6*. L UUTENHAGEiis (Boek 1 c), caule ramosissirao lignoso, ramis erectis simplicibus pube*centi-veltinis rubentibas, laruis floufeiis divaiicatis, folns alternis saepissime fascicnlatis sessihbus lineaii-Ianceolahs acuinatinis sobtus margine levolutis ciliato-dentatis, flonbus laxe raceinosls subpaniculatis, pedunculib axillanbus ranus oppositifolirs, corollâ 5-iidâ lobis c.ilycinis TIX dimidio longiore, calycis 5-fidi pilosiusenh tubo hemisphaenco, lobis linea-nbus acentis maigine tevolntis integris, capsulâ pubescenti-velntinâ lobis calycinis electis terminatâ, valvib acutis ipsius basi bievioribus —ad Caput Bonae-Spei prope Uitenhage.
- 8*. L RUBENS (Buek 1 c ^, caule erecto ramoso bgnoso pnbebcnte basi nudius-cnlo, ramis adscendentibus simplicibus larius raranhs iloriferis divergentibus acntis rubenti-velutinis, foliis alternis saepins fascicnlatis ramos nbique tegentibus erectis hnean-lanceolatis acutis maigine infrâ revolutis basi denticulatis glabns junioribus vindibos adultioribus rubescentibus, floribus in a pice ranaa-lorum fasciculatis subspicatis rarijli laxe racemosis breve pedunculate, pedunculis aiillanbus ranâs alanbus rubentibus, rorollae 5 fidâ laciniis liuearibus lobis calycinis duplo longioribua, calycis 5-fidi lobu. setaceis integris glabnâs , capsula; lobis calycinis electis, valvis acutis ipsius basi aequahbus. —• *& Caput Bonae-Spei piope Uitenbage.

- 9 L MACROSIACBYS, nee L. spicata. Nomen delenduru proptei L spicatam Buek.
- 9*. L SPICATA (lioek 1 c p. J74 non Alph DC), caule .., foliis alterm'sreflexis linean-lanceolatis setdceo-dentatia glaberrimis, floribus den sò spicalis sessibus , calycis 5-fidi lobis linean-lanceolatis margine revolatis pubescentibus, corollâ 5 fidâ lobis calycis aequali lacinhs pubescentibus, capsula. —ad Capnt Bonae-Spei in valle ToILach pro? Worce&tei De nomine nostro L. spicata conf. 9.
- 9**. L. INTERMEDIA (Buek l. c. p. 374), caule erecto lignoso, ramis floriferis paniculatis divaricatis, foliis alternis fasciculatisque sèpe subverticulatis setaceo-denticulatis mucronatis, floribus paniculatis, corollâ 5 fidâ lobis calycinis duplo longiore, lobis calycmis erectis liaeari-lanceolatis, capsula: valvis obtusis ipsius basi brevioribus.—ad Caput Bonae-Spei, intei frutices circa Uitenhage Priori et seq siinilis, ab istâ folns setaceo-deutictilatis mucronatis, ab hâc flonbes minoiibas lobis calycinis erectis non niucronalatis differt
- 9***. L. DIVARICATA (Buek 1. c.) , canle electo lignoso ramoso, lamis floriferis divaricatis, foliis alternis fasciculatisque in junctionbas rauis subverticillahs reflexis setaceo-denticulatis submucronatis, floubus pamculatis , corollâ sub-5-fidâ lobis calycinis tiiplo longiore, calycis 5-fidi lobis setaceis recuvatis sub-mucronulatis , capsulae ^alv!» ipsius basi brevioribus.—ad Caput Bonae-Spei in lapidoMs oriental prope urbem Graham
- 9****. L. MUCRONULATA. (Buek 1. c. p. 375), caule.. ., ramis flonferis pilosis, foliis alternis lineaii-laDceolatismucronulatis ciliato-denticulatis, floribus apice rainoi urn subsolitanis brevis&ime pedunculatis, coiollâ 5-fidd lobii calycinis vix longiore, calycis 5-fldi pilo&i lobU tnangulau-acuminatis raucionulatis, capsolae valvis acutjs ipsius basi bievioubus —ad Caput Bonae-Spei prope Uitenbage.
10. *Add* synon L. Thonbeigiana Buek in Eckl. et Zeyh enum. pi. afi p. 376. quae cam tab. cut. Tbunbergu convenit
- 10*. L. TEWERRIMA (Buekl c p 37^, caule electo rarooso lignoso , rarais floriferis divergentibus, foliis alternis reflexis ovatis obtusis cra&siu&cuhs mtegris margine revoluta , floubus paniculate , coiollâ 5-fidâ lobis calycinis duplo longiore, Cdlycis 5-fidi tubo pubescente, lobis ovatis amts capsule valvis acutis ipsius basi snblongioribus — ad Capnt Bonae-Spei, in collibus siccis piope Swellendam. A L. tenellâ, cui siuilliina , di/Teit ex cl. auct foliis et floribus ininoribus , pedunculis gr.cilioribub et mfloreacentia
- 10**. L. DIFFUSA (Buekl. c. p i^61, caule ramosiwimo bgnoso, ramis diffusis brachiatis pa rum foliosis, folns alienu axillâ foliis niinoibus fasciculatis tnangularibus acutis leflexis 1 a-dentatis crassiuscuhb margie levolatis, florbas laxe racemosis lutenuin fa^cicul.ttib pedunculis bie^ibus, (.01 oil a 5 fid à lobis talyciois duplo longioie, calycis -5-fldi pubescentis lobis lauceolatis arutissimis maigine subtus revolutis inlegm, capsule valvis acutis ipsius basi bieviobus. — ad Caput Bonae-Spei in collibus calceareis Uitenbage L. tenellaj affinis sed toto habitu diversa ex cl auct.
- ¹ o'». L. NODOSA (Buekl c p. 376), caule suberecto lignoso ramo&issimo, ramis" adscedentibus , folns mini mis altomis sscpiis fasciculatis reflexis rrassiuscuhs ovato-acutis integeirimis , floribus paniculatis corymbosis, corollâ 5-fidi lobis calyciuis 4° longiore, calyois 5 fidi lobis acutissimis tubo duplo longioribus, capsules valvis aculis ipsius basi longionbus — ad Caput Bonaa-Spei prope Uitenbage. I^olia in raims aduitioribus in glomeiulos adeo fasciculata ot Qodosa appareat plauta el Saljcoriuae strobilacex habitum referat.
- '8*¹. L GRI'EA (Buekl c. p 374_a)» <<ne electo lignobo ramoso, lamis erectis *implicibus tomento griseo tectin, foliis altemis si pe fasciculatis linear!-ian ceolatis basi dentatisacuminatis gnseis ssepissime supra villosih, floribus subspি atis pamculatisque, coiollâ 5-fidâ lobis (ilycims dnplo longiore, lacuiispnb « ~~seq 4 jns~~, calycis 5-fidi tomentosi tubo obconico foliis teclo, lobis folu's.

siinilibas, capsnlae valvis tontis ipsius Lisi acqualibns — ad Caput Bonse-Spei ia montibus prope Uitenhage.

IV. MICROCODON, p. 421.

3 et 2. Sub nomine M. Caxidolhani species 1 et 2 meo sensn diversas, junxit cl. Buek in Eckl et Zeyli. enum pi. affi.austi p 377.

2*. M. rYGMIEUM (Buekl. c.), caule erecto vfc pollicaii simplici rarius ramoso ciliato, cilis albis, foliis alternis, inferioibus oppositis, amplexicaulibus linear-i-lanceojatis denticulatis acutis, flonbus gloraeratis in apice cauhs rarius in ramnlis solitarhs bracteatis, bracteis flonbus subbievoribas linear-i-lanceolatis ciliato-dentatis, corollā lobis calycims longioie, calycis tubo hispido, lobis erectis, capsuU. ...—ad Caput Bonae-Spei in locis lapidosis inontis Leuwenbeig.

a** M. BREVIBRACTEATUM (Buek I c.), caule ramoso eieclo, lamis radicalibus divergeutibus oppositis simplicissimis subpubescentibus paium foliosis, foliis alternis linear-i-lanceolatis subglabris, superioibus pilosiusculis denticuldtis , floribus in apice lamorum et oaulis glomeratis rarius ex axillā solitanis sessilibus, bracteis raiis ovato-lanceolatis acuminalis basi cLliatis (Lores aequantibus , corollā 5-lobā lobis calycmis duplo longiore , calycis tubo bispidissinio , lobis erectis brevissimis, capsula hispida.— ad Caput Bonae-Spei in valle Tulbach prov. Worcester

a***. M. LONGEBRACTEA.TOM (Buek 1. c.), caule brevissimo ramoso, lamis divaricatis simplicibus pilosissimis, foliis hnean-lanceolatis serratis, floribus glomeratis longissne blacteatis, bractPis ad basin ciliatis foliis siraillibus, coiolla 5-lobā hi .idem miilto brcvicfii , « nlyc c Hubvonliicoso piloso, lobis talycims pin- naudo-ciliata, capsuU***= caput Bonae-Spei ad latus oient. in on t is Tabulae.

a**** M. HNEARE (Buekl. c.), caule erecto ramoso teiti foliisque glabilus- euhs, foliis alteiriis oppositisqne linearibus angaslis &ubdenticulatis ruargmc icvolutis, pedicellis folio bievionbus, tubo calycis spbajroideo bispido lobis elongatis linearibus angntis subpilosis tubo, qaadiuplo longionbus corollam tubulosam apice 5-lobam xquantibus, capsula spbaeiicA subpilosā Qjad Caput Bonac-Spei, in arenosis, prope Bergnvie (Dreg. pi. exs) et in valle Tulbach prov. Worcester (Eckl. et Zeyh.). Campanula linearis Linn, suppl. p. 140. Tbunb. prod. p. 38. mem. acad. Peteisb. 4. t. 5. f. 3. fl. cap. ed Schult. p. 171. Rami infer ssepē oppositi. Folia ssepis basi ciliata pilis panels albis. Capsula certe localis cum lobis calycinis alternantibas. (v. s)

IX. WAHLENBERGIA, p 424.

9. W. LIR&ARIS deleatur; conf. ad Microcodon hneare

15*. W. DEBILIS (Buek 1. c), caule herb a ceo dcibili raraosissimo glabro, ramis illifoimibus dichotomis diffusis ubique foliosis, foliis alteinis oppositisqne ses- silibus margme cartilagincis denticnlatis glabiis, pedicellis axillaribus et terminahbus capillaribus corolld tnbulosā apice 5-lobā minimā lobis calycinis subbreviore, calycis 5-fidi glabri tubo bemisphaenco, lobis setaceis tubo duplo longionbus, capsula globosā lobis calycinis patentibus teiminatā —in aie- nosisplamtiei Capensis <*cTZarland. Lobelia debihs Eckl. herb, non Lmfc. Habitas W. exihs Pedicelli 6 lin. longi. Planta tota 3-4 poll, longa.

21. W. STLLI AROIDES , adde prope Grahamstown et ad flumen Tischivier Al- bany. (Bnek in Eckl. et Zeyh. enum. p. 381.)

3a W. HISPIDULA., adde: in arenosis vallis Tulbach provinc. Worcester (Buek 1 c)

42*. W. rnosA (Buek 1. c. p 38i | canle à basi ramoso, ramis divergentibus ad- scendeutibus hispidis, foliis alteinis sesahbus linear-i-lanceblatis acuminatis den- ticolatis pilosis, floibus panicuiatis, corollā infundibulifoimi apice 5-lobā lobis calycinis triplo longiore, calycis tubo sphauico retrorsum hispido , lobis linearibus ciliato-denticulatis tubo vix dimulio longioribns recuivis , capsula <pbauicā pilosissimā lobis calycinis peisicntibus recuryatis teinoin^td. —ad

Caput Bonae-Spel, in arenosis prope Ohfantrmer et Brackfontein piov Clancwilham Piiori habitu simihs, lobis calycinis brevionbus lecuivis piaeseitim diversa.

⁴⁴ W. FANICULATA, *adde* • in aienosis collium prope Tulbajjh pio>. Worcester. (Buek in enum. pi. Eckl. et Zeyh p. 380.)

^{44*}. W. SwELLENDAMtwsis (Buek 1. c), caule à basi ramoso pilosiuscalo, ramis erectis superne pamculalis, foliis in superioie paite lamoium laiioribus alternis sessilibus erectis lincanbus angustis remote dentatis ad basin cilialis, flonbus panicnlatis, pedicellis brevissimis axillaibus et termiualibus, coiollā sub 5-iidā lobis calycinis dimidio longiore, calycis scabriusculi tubo niinnnoherai-spbaeiico, lobis longissimis linearibns acuminatis mtegiis tubo 4^Q lonejionbas, capsula sphaeroidea glabiā lobis calycinis longissimis patentibus munita. — ad Caput Bonae-Spei, in lapidosis montium Swellendam. Lobi calycis 3 lin longl W pamculatae similis, sed multo robabtioi, pedicellisbievissimis, lobis calyci- ius longissimis diveisa.

35 W. MASSONI, *adde* in teir[^] limosā collnm prope Berralley. (Buek in enum. pi. Eckl. et Zeyh. p 380.)

⁴⁷ W. DDNANTII, *adde*: in locis arenoso-lapidosis lateris ouentalis montis Tabul p. (Buek in Eckl et Zeyh enum p. J80.)

⁴⁸. W. PIXOSA, nomen mutandum m W POLYCLADV piopter W. pilosam. Buek 1. c.

⁴⁸ W. DFWTluLATA, *adde* • in locis aigilloso-liraosis ad fontes fluvii Keyriviei et nlihi in |irmim . TiriilmJūJnml et Uilvhngc (ftuckl t p 380)

40*. W. LCKTOITII (Buek. 1. c), caule a basi lamoso piloso, lamis simplicibus adscendentibus superne paniculatis, foliis in superiore paite lamornm laiion- bus alterms oppositisquc Imeaibus acuminatis integus ciliatis, flonbus in apice ramorum paniculatis pedicellatis, in axillā folioium solitanis sesilibns, coiollā infundbulifoimi apice 5-lobā lobis calycims dimidio longioie, calyx scabrius- culi tubo hemisphaericō minimo, lobis longissimis tubo 6° longioribus setaceis acuminatis integris, capsnlā . —ad Caput Bonae-Spei, in fissuris lupium inon- tis Winteibaksberg prope Tulbagh piov Worcester.

C6*. W. ZrYHERi (Buck 1. c. p. 379), oaule bimpiici angulnlo pills rariss erectis albis tecto buperne glabro, foliis alteiniis semiaujplexicaulibus, infenoibus pe- tiolatis in ptiolum decuirentibus ovalo-lanceolatis glabiis serrato-denlatis, rantis duplcato-senatis, pedunculis longissimis subnudis pauciflons, pedicel- lis filifoinibus, corolla campanulat) 5-lobā lobis calycims 4» longioie, calycis glabri tubo subspbcrito, lobis tubo duplo longionbus triangulaii-lanceolatis obtusiuscuhs, capsulā.... — ad Caput Bonae-Spei, in declivitatibus graminosis montis Winterbeig.

⁴⁷. W. NUDICAULIS, *adde*: In arenosis planitiei Capensis prope Rietvalley, in teriat Zwartland et ad fluvium Beigriviei. (Buek in Eckl ct Zeyh enum p. 380)

76. W. ANDROSACEA, *adde*: in arenosis campornm provinc Uitenhage (Buek 1. c.'p.380.)

^{47*} W CUODROPHVLLA (Buek 1. c p 38i), taule piocumbente lamosissimo ra- misque diffusis glabns striatis, foliis alteiuis oppositisque lineaum-lanceolatis glabris acutis remote denticulatis maigine caitilagineis, Hoīibus solitariis axilla- libus et terminalibus longe pedunculatis, corolla tubulosa apice 5-lobā lobis calycinis tr^x longiore, calycis giabn 5-fidi lobis Jineaiibus denticuLtib maigine cartilagineis, capsulā obconic.^{II}! giabia lobis calycinis erectis teiminata. — ad Caput[^]Bon.-e-Spei in aienosis humidiusculis planitiei, mtei Dooinhoogde et Constantia. Semina nitida minima.

XI. PRISMATOCARPUS, p. 442.

*** P. CANDOMfCANUs (Cham, et Schlecht. m linn. S. p. 197), ramis rectis tereti-

bus subpubescentibis dense foliosis, foliis erectis sessilibus e latiou basi longe attenualis sublineanbus acutis margine revolutis laius denticulate, lafenon bus snbtus pnbescientibns glabris basi paucidentatis t spied terminali lemotiflo lâ, biacteis basi dilatalis roncavis amplectentibus pmnafidis pmnulis antrois acutis, lobis calycinis lanceolatis acntis integerriuiis glabris coiolla 5-fida dimidio brevioiibus. ^ &d Caput Bouae-Spei pi ope Ruiterbosch (Mnndt) — Buck I. c. p. 333. Rami annotini pedales et sesquipedales cinnamomei \el rn-belli, folia semipollicana Corolla g-liu. Stylus inclusus.

7 P. XNTE&RUPTUS , adde: in locis lapidosis inter Woicester et Tulbagb. (Buek in Eckl. et Zeyh. enuin. p 382)

7*. P BERGiANUS (Cham, et Schlecht. in linn 8 p. 199), ramis angulatis pubescentibus dense foliosis, folas fasciculatis hnearibus acutis canalioulatis subacerosis obsolete cihatis recurvia, paniculâ teiminali aphyllâ glabra dichotomy elongatâ Iaxâ , ramis erectis teretibus filiformibus , bracteis subulatis ininutis, lobis calycinis Kneari-lanceolatis acutis, coiolla 'subcampanulata' 5 lid à lobis -calyciuis 4⁰ longioie —ad Caput Bonae-Spei m collibus aienosjs pi ope Riet-valley (Bergius med) et in plamtie Capensi (Eckl. et Zeyb.) — Buek in Eckl et Zeyb enum. p. 382. Coiolla 6 lin longa vel major.

10 P FRUTICOSUS, adde: inter fi utices lateris orient, montis Tabulae in monlibus Hottentotts-Holland (Buek 1 c p 383)

11 P. ALTIPLORUS , adde in latere orient montis Tabulans. (Buek I c. p.383.)

ia P CRISPUS, adde *in arenoso-lapidosis montium vallis Talbagh piov. W01-cestei (Buek 1 c p 383.)

13 P KcKXoxm, adde ' in lapidosis montis Zwarkeberg prope Caledon ct in monte Baviarjsbeig pi ope Gnadontbal. (Buek 1. c. p. i8i)

14. P. LINARIEFOLIUS, adde. in provinci* Uitenhage locis infer (Buek I c. p. 383)

15. P. STBICTUS, adde in terrd encetornm proviaciae Uitenhage. (Buek 1 c p. 383.)

i5\ P. JUHCEUS (Buek 1 c p. 383) , caule ramoso herbaceo infeine lignoso pi loso snperne stria to glabro , ramis longissimis erectis, subaphyllis, foliis infeuouibus stbsilibus decmrentibus ovatis arutis denticulatib margine revolutis supra glabiis subtus pra?sertm ad nervura medium hirsutis, superioribus hneari-lanceolatis glabris, bracteis setaceis, spicA Iaxâ, floribus sessilibus binis ranus ternis, coiolla profunde 5-lobâ lobis calycinis dqpllo longiore, calycis tubo brevissimo lobis acutis glabris, capsulâ subcomca.— ad Caput Bonae-Spei locis lapidosis Tambukiland et territorii cssi.

15''. P TEWERRIMUS (Buek 1 c p. 384), caule electo ramoso, ramis filiformibus rubescentibns glabris, Uonferis paniculalib secundis pa mm foliosis, foliis alterms sessilibus hnearibus acutis glabus, bracteisjfolus snuillimis, flonbus subspicatis sessilibus secundis sou tains in apice ramoiura ternis quaternisve, calycis glabri lobis aenminatis mtegeriimis tubo brevissimo lobis vix longioie, corollâ infumlibulifocmi 5-lobâ lobis calycims dnpllo longioie 5 ^a[^] Caput Bonae-Spei in niontibus Swellendam. Capsula pm̄matica 4 ^a[^] longa.

*6. P. NXTIDUS, adde • prope cararactas lateris onentaha montis Tabula?. (Buek I.e. p 584.)

XII. ROELLA, p. 445.

5. R. DuzrAKTî Ex herb. Eckl el Zeyh. in plamtie Capensi nee ad cacumen montis Tabulans crescit (Buek 1 c. p. 384)

7' R. GRACIMS (Buek 1. c. p. 385), gracilhma, canle aufraticoso ramoso erecto infia nudo, ramis foliosis, foliis brevissimis alteinis saepè fasciculatis subulato-linealibus glabris, floribus solitanis in apice rainoinm subpedunculatis, calycis tubo biacteis longis lanceolalis ciliato dentatis tecto , lobis calycinis longissimis linear-i-lanceolatû. valde atiiminatis ciliatis vel lacuiato-dentalis 3 «d Caput Bona-Spci lotis lapidosis uiontium prov Stellenbo6cb iupti Palmietnvicr

10*. R. SFCURDA (Ruek 1 c. p 386), caule raraoso glabro vel velntino, ram is paniculatis sapissime secundis foliosis, foliis linea-acaminatis Inteiduiudenticulatis vel ad ba&in ciliatis, floribns solitains vel saepius fasciculatis apice raioruin, bracteis latis 3 5-cuspidatis, calyris glabn tubo itnmmo, lobis ovato-lanceolatls valde acummatis, corollâ tubulosâ 5-lobâ lobis calycmis dupio longiore ^ ad Capnt Bonae-Spei in arenosis huraidiusculis prov. Uiteuhage. loha 2-4 hn longa Lobi calyrini in flore patentiasuh apice incurvi

ii* R LcKLoniANA (Buek 1 c p 385), caule ramoso hgnoso flexuoso-erecto glabio, ramis panicnlatis alternis xpissimè secondis simplicibos ubique foliosis puberulis, foliis alternis xpius fascicalatis sessihbus linear-acuminatis ab basin ciliafib integris, floribns fascicnlatis ranus soli tains m apice rainulorum, caly-
cis tubo bracteis tecto tubus late ovatis longissime acuminatis cihato-dentatis , lobis longissimis linear-acummatis integris glabris, coroll 5 loba lobis calyci-
nis breviore. ^ ^ Caput Bonae-Spei ad Uitenhage. BractesB acuiuine 3 lin.
longo Lobi calycis 4 lin.

ii*. R MINOR (Bnek I. c p 385), posilla , canle erecto snffruticoso pilosissimo, ram is adscendentibus, foliis alternis cam fascicuhs folioruin mmoruin patentibus hnearibas pilis longis albis obiectis, floibas sohtariis in apice ramornin , bracteis et lobis calycims ciliatis den tat is, dentibns longissimis rubescitibus rectangnlanbus, corollâ lobis calycinis vix longiore <£ ad Caput Bonae-Spei,
m aienoso-Iapodosis montis Zwartebieg prov Caledon

i V*. R. BRYOIDES (Back 1. c p 386), caule ramoso hgnoso glabro , ramis erectis puberulis, foliis alternis sessihbus reQexis linean-acuminatis ciliatis vix 2 lin longis, foliis ssepe rainonbus interpositis praesertim m ramis sterilibus ramos densissiine tegentibus, floibas solitanis in apice ramoium raiius subspicatis , lobis calycmis linean-acuuinatis ciliatis incurvo-patulis, corollâ 5-lobâ lobis calycinis duplo longiore, stylo exerto f ad Caput Bonae-Spci in prov Clanwilham.

«6*. R. ERICOIDKS (Bnek 1 c. p. 385, non Spreng), caule ramoso hgnoso, foliis hneari-subolaii glabris, floribus in apice lamoium, ralycis 5-lobi lobis lance*-
latis acominatia glabiis, corollâ . rapsulâ ... — ad Caput Bona-Spei inter ru-
pesmontinm Hottentotts-Holland supra Palmietrivier (Eckl. et Zeyh 1 c.) An
Piisraatocarpus?

ib**. R. GIAUCA. (Buek 1 c. p 386), sinedesenpt. Species mihi iguota, e prov.
Swellendam

XVIII SPECULARIA, p 489

« 3 var ^ Libanica, lege: Libanotica

XXI. SYMPHYANDRA, p. 4^4.

1m 'a fine terlw, Sericodon, lege: Sericocodon.

XXIV. MERCIERA, p 496

¹ M. TENUIFOLIA, adde intei rupes ad \iam novain trans montem Hauhoeks-
berg prov Caledon (Bnek 1 c p. 387)

* M. BUEVIFOLU, adde • prope Caledon (Buek 1 c)

5. M LKPTOLOBA . adde inter rupes uiontium Steenberge prope Muysenbuig
in piov. at bis Cap (Bnek 1. c)

3* M. filIONIANX (Bnek 1. c), canle erecto, foliis alternis inteidùm fascicula-
tis linear-acuminatis flombus lateralibus sessihbus, corollâ folis lon-
giore apice 5-lobâ lobib lancpolafis patentibns glabris, stylo exerto corollâ
paiura longiore 3 ad Caput Bonâ Spei inter rupes in valle Tulbagh pro vine.
Worcester Polia 3-4 lin longa. Coiolla lacte caerulea

3**. M HETEROMORPKI (Buek 1. c | caule erecto, foliis oppositis connatis canlem
et ramos ubique tegenlibn-, subulato-aeuminatis recurvis ad basin ciliatis, flo-
ibus sessihbus lateralibus et teriniuahbus solitarii , calyois 5-fidi tubo ovoldeo

minimolobis longissimis foliis snnilibns, corollà foliis breviore tubulosà 5 6-lobi, lobis acatis apice fimbriatis, stylo corollà subbreViore ^ ad Caput Bonae-Spei, inter rapes montis Babylons-loorensberg piov. Caledon. Folia giisea. Planta singulars, fortasse genus propnum constituens, habita ab omnibus hujus ordims plantis raaxime diveisa, ex cl. aacior.

Ordo CVI. CYPHIACE^, p. 497. (1)

In chaiactere generis post verba *dehiscentid serotind in plensque ignotd, adde* • demùm apice 4-valvi Pio verbis *semina tnqueta* : seinina angulosa, ex Cyphiâ Phyleuinâ obverse pyiauidata, angulis quatuor membranaceis, albuiuinosa, embryone recto axili albamine triplo breviore. Ad finem cbaract. gener. *adde* : confer Alph DC. mem. sur les Lobel. et Cyphiac inann.se nat. Par. ann. 1839.

a. C LINARIOIDES, *adde* incolis Weldbaron. Radices magna edantar ex cl. Piesl in Eckl. et Zeyh. enum. p 391.

y* *major*, caule elongato, foliis duplo longionbus, racemo evidenter pednnculato. In colibus Tumbukiland (Presl 1 c.)

5. C. CARDAMINES *adde* : pedicelh non brevissirai ex cl. Presl in Eckl. et Zeyh. enum. p 388.

6. C. INCISA, *adde* : pedunculi non brevissimi ex cl. Presl in Eckl et Zeyh. ennm. pi. afr. p 389.

10*. G. ECXLONIANA (Presl in Eckl et Zeyh ennm. p. 392), foliis sessilibns digitato-tnpaititis, laciniis lineaubas obtusis ciliatis obsolete denticulatis, flonbus raremo&is, pedicellis biacteâ j-partilâ brevionbus, calycis lacmiis subulatia tubo duplo longionbus, corollae lacinus linean-lanceolatis —ad Caput Bonae-Spei in collibus prov Swellendam f olia tenuiter coriacea. Corollae tubus, intus villosus.

11*. C. ZETHERIANA (Presl in Eckl. et Zeyher enum. p 392), foliis linearibns scssihbus remote serratis inferiotibus floralibnsque digitato-quinuae-partitis, laciniis maequalibus lineanbus neutiuscuhs integiis remoteque bCrratU, floribas axillaribns brevitei pedicellatis folium sequanibus, calycis Iaumis lanceolatis acntisMinis tubo aequahbus, corollae lacinus oblongis obtusis.—ad Caput Bonae-Spei locis lapidosis montiuin pro\inc. Clanwilbara. Folia herbacea. Floies C. Ecklomanæ duplo fere majores laete caeulei. Corolla hypocraterimorpha tubo demum basi in 2-5 lacimas rupto interne vjlloso. Antberae glabise.

12. C. AKGUSTILOBA, nee angustifblia ut eirore bcnpsi.

ia*. C. LONGIPETALA (Piesl in Fckl. et Zeyh. enum. p 389), foliis breviter petiolatis tn-quinque-parlitis tenuiter conaceis, lacinns lineaubns acutiuscuhs mtegerrimis maequahbus maigme revolutis, fionbus racemosis , bracteis sessilibus tripartitis pedicello sequilongis, laciniis lineanbus , calycis laciniis irregolaubus acuminatis tubo tuibmato snblongionbus, peraloium unguibus stamina duplo superantibus.— ad Capnt Bonae-Spei, iu collibus regionis montis Zwartebieg piovinc. Caledon. Affinis C. angu&tilobae sed foliis floribusque distincta.

13*. C. ANOUSTIFOLIA (Piesl in Eckl. et Zeyh. enum. p. 390), caule r a mo so, lamis divergentibus, foliis elongato exacte lineanbus angustissimis curvatis acutiusculis integrerimis basi incisive remote dentirulatis, lacemis laxis elongatis nudis , biacteis oppositis capillaceis minutissimis medio pedicelli, calyci subturbinati laciniis lanceolatis acutis erectis tubo aequilongis, staminibus petala snbasquantibus.—ad Caput Bonae-Spei in montibus provinc. Uitenhage. Antherae interdum virides.

13**. C C^MPESIRIS (Presl in Eckl. et Zeyh. enom. p. 391), caule striato basi ramoso ram is divergentibus', foliis alterms anguste exacte lineanbus integerrimis obsoleteque denticulatis acutis, racemo terminali erecto nudo, bracteis oppositis ovato-setaceis acutissimis, calycis laciniis ovato-lanceolatis acutis erectis tubuui subaequantibus, petahs stamina mult6 superantibus —ad Caput

ADDENDA ET CORRIGENDA.

7g3

Bonae-Spei, in tend limosa collinra prope Zwartberg prov. Caledon Radices tubnosae ab incolis eduntur.

r3**\ C LATIPETALA. (Piesl in Eck! et Zeyh enum. p. 3gt), caule volubili, foliis sessilibus tiifidis laciniis linearibus acutiusculis integerrimis margine levitei levolutis, medio duplo longiore, flonbs lacemosis brarteis tulobis pedicello duplo bievioibus, calycis laciniis tuangulaiibus acaminalis eiectis tubo zcquilonis petaloium 1 'ciniis latitudine duplo longjonbas aequalibus patentibus.— ad Caput Bonae-Spei, inter fissuas rupium supià Palmietivie piov Stellenbosoh. Tlores albi in coloiem palhde caeiuleniu vergentes. Ab omnibus legulantate coiollse et latitudine laminarum petalorum ovato-oblongornm distinrt ex cl. Presl

14* C. SAIICIFOLIA (Piesl in Eckl et Zeyh, enum p. 3QO), foliis anguste lanceolatis utiinqne atotis integemumis remotcque sennlatis, pedicellis axillaibus, floribas duplo brevioibus, calycis laciniis lanceolato-triangulanbus acutis erectis tubo aequilongis.—ad Caput Bonae-Spei ad pedem niontium prope Brackiiviei piovin Clanwilliam. Affinis C crenatae sed folns sessilibus ilhco distincta, ex cl. Presl.

H**. C. ATRIPI ICIFOLIA (Presl in Eckl. et Zeyh enum p 389), folns lanceolatis obtusiusculis serratis in peliolum acaminato-angustatis infra medium ntunque subaugulali& basi irregeirirais flonbus .ixillanbus , calycis lacuiis hnean-lanceolatis acutis patentibns mxqualibus tubo tiiplo longionbus. — ad Caput Bonde-Spei, in dunis areuosis plamtie Capenbis.

x4***. C. SYLVATICA (Eckl. in Sooth afiic journ. i8io. p. 373), caule angulato subrarnoso, ram is divancatis, foliis alteinis lemotis lanceolatis elongatis ang&tis integernmis vel remote denticulatis acutis apice callosis in petiolum sensim angustatis, flibus axilla rib us solitariis pedanculatis, peduncuhs r-ra lius 3-flous petiolo duplo longioibus, bracteis oppositis capillaceis minutis pedunculo multoties bievionbus, calycis turbinati lacinns snbolatis erectjs tubnui sabexcentibus, petal is stamina innUo snperanhbis —ad CapotRonac-Spei in sylvis provinciae Uilenhage, nbi incois Boschbarou — Presl in Eckl. et Zeyb. enum. p 388. Caulu. volubilis Radices magna succulentae ab Hottentottih ednnntur. Species ex cl. Pie&l distmctisbioia

ix**++. C. UNDULATA (Eckl. in South afr journ. i83o p 373), caule simplici folioso foliis radicabbus coogestis oblongo vel ovato-lanreolatis cnspis , caulis alternis lauceolatis remote regulariie grande dentate submcisisve, floribus angnstissiime lineaibus integerrimis, omnibus mcrassatis obtubiusculii, flonbus racemosis secundis, bracteis oppo^iis capillaceis minntis pedicello multoties bievionbus, calycis urceolaiis lobis lmeari-lanceolatis acutis eiectis tubum superantibus, petalis stamina excedentibus*.— ad Caput Bona»-Spei in prov Uitenhage —Presl in EtkJ. et Zeyh mum. p. 3go Incolis Vlaktebarou. Radices ab Hottentotlis eduntur. Folia maxillis minora. Racemns mdu»

¹5*. C. ANOMALA. (Presl in Eckl. et Zeyh. ennm p. 390), caule snbpresso a'cutangulo apice intedum rnmoso omnino folioso, ramis eiectis flonfens, foliis alternis angnste elongato-lanceolatis obtusiusrulisi 1 emote denticulatis, racemis erectis nudis valde elongatis, btacteis oppositis capillaceis minutis pedicello duplo brevioibus, calycis uiceolaiis laciniis ovato-lanceolatis acutis erectis lubum superantibus, petalis stamina excedentibns. —ad Capnt Bonaj-Spei in piov. Uitenhage

¹7- C SYLVATICA, conf. num r 4***.

^x9 C. SALICIFOHA, conf. num. 14*

²0- C. UNDULATA,conf num T4****.

^ai - C. LONOIPETALA , conf numa 12*.

²2 C LvrirETALA, conf num t3***

\$- C ErKLO^iAKA, conf num. 10

M C. zCYUERTAETA , conf num 11*.

P. 512, n. 58. SCIBVOLA. ? NOVÆ-ZEBLANDIJE (A. Cann. ann. of nat. hist. a. p. 5a), calyce (5-partito?) ovario moltò breviore, foliis obovatis obtasis valde reticulatis glabris distanter denticulatis, axillis barbatis. — in Novae-Zeelandiae littore ntaritimo insulis Cevallos opposito. Cat. ign.

P. 516. n. 37. GOODENIA REFERS, *adde* Goodenia littoralis R. Brown gen. rem. in Flind. <voy. 2. p. 56i. ex A. Cunn. ann. nat. hist. 2. p. 5x.

P. 522, ad calcem ROUSSJBA *adde*: Quid sit R. SALICIFOLIA. Spreng. syst. 1. p. 49 ex Montevideo? Omnimò mihi ignota? An vere congener?

P. 53 J. n. a3. GESNIRIA STRICTA, *adde* Hook. bot. mag. t. 3738.

n. 23*. GESNKRIA MARCHXI (Wail. rass. ex Hook. bot. mag. t. 3744) inolliter pubescenti-tomentosa, foliis ternis petiolatis ovatis crenatis, verticillis florum nuxnerosis terminalibns subapphyllis, pedicellis flore longioribus, corollae subcylindraceae vix curvatae basi supernè insigniter gibbosae limbo subaequali 5-lobo, stylo staminibasqne corollam subaequantibus, glandnlis hypogyuis 5, snperioribus 2 in unicum magnara nnitis. % in Brasilia; montibns Organ legit cl. G. March. Cor. extns rnbescens, intiis flava.

P. 553, ad calcem gen. CERATOSTEMA *adde*:

n. 5. C. nFLORUM (Poepp. et Endl. nov. gen. 1. p. 6. t. 10), ramnlis glabris, foliis ovalibns obtasis breviter petiolatis, pedicellis axillaribas geminis i-floris. § t^o* Peruvian orientalis scopulosis frigidioribus Cerro de San Christobal ad Gachero.

P. 560, lin. 18 : ANDREUSIA.

Genus à cl. Dnnal admissum et egregiè descriptam et in serie optimè collocatam sab nomine Andreusias, idem est ac Symphysia Presl epist. ad Jacq. 1827. et Tauachia Preissler in flora 1828. p. 43 non Schlect. Ergo ex prioritatis jure admiUendum noinen SYMPHYSIA et Andrensia cam Taaschià inter synonyma generis rejicienda. Quoad speciem admittenda est SYMPHYSIA MARTINICENCIS Presl 1. c. cum icon, et synonymiae *adde* Tanschia Uederaefulia Preissl. 1. c. Marckgravia ombellata Sieb. fl. martin, exs. suppl. n. 38. Andrensia Guadalupensis Dnnal! in DC. prod. 7. p. 560.

P. 564, ad calcem gen. THIBAUDTA *adde*:

n. 25*. T. SECUNDIFLORA (Poepp. et Endl. nov. gen. x. p. 5. t. 7), ramis teretibus laevibus, foliis ellipticis acuminatis basi obtusis quintupli-nerviis coriaceis rigidissimis glaberrimis, racemis axillaribus patentibus, pedicellis erectis secundis, calycis dentibas ciliato-glandulosis, staminibus alternis brevioribus. 3^o Peroviae orientalis Andibns sylvarum locis rupesribus ad Casapi et Cuchero.

p. 577. post lin. 27 ad calcem §. 1. *adde*:

TIII*» SPHYROSPERMUM Poepp. et Endl. nov. gen. et sp. x. p. 4- t. 8. Hook. ic. t. 11a. Endl. gen. n. 433o.

Calyx tubo globoso ovario adnato, limbo 4-5-dentato. Cor. calycis limbo iinoinserta, urccolata limbo 4-5dentato. Slam. 4-5calycisidentibus opposita inclusa, filam. liberis, antheris dorso muticis apic tubulosobicornibus. Qvarium 2-4-loculare, loculismultiovulatis, ovulis in placenta anguli centralis basi adnat& adscendentibus. Stylus simplex obtusus. Bacca globosa calycis limbo coronata. Seniina cuneato-trigona testa subcarnosa striatā. — Frntex Peruvianus foliis alternis coriaceis reticulato-venosis, pedunculis axillaribus solitariis i-floris, floribus albidis.— Genus in ordine spectabile ob stamina corollas calycisque lobos numero acquantia nee dupla.

i. S. BUXIFOLIUM (Poepp. et Endl. 1. c), \$ in arbormm vetustaram vel collapsarui trancis in sylvis Andiam Peru via; ad Pampayaco et Cuchero.

JP. 584, lin. 4<t P-⁶7 > dele VUis-ldea.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

795

P. 592, *Un.* 8, nomen raonente cl. Endlicher potius ex etymologiâ scribendum esset GAUTIERA, sed Gaullheriaoī servo ne oninino confundatur cum Gaultier 1 Vittad.

P. 593 y n. i3, *adde* Synonymiae: *Gaotiera myrtilloides* Poepp. et Endl. nov. gen. i. p. a5. t. 41. non Schlect.

V. D93, n. i3*, G. CJESPITOSA. (Poepp. et Endl. nov. gen. 1. p. a5. t. 3-7), cespitosa, ramis glahris, foliis oblongo-lanceolatis utrinquè angustatis obsoletè crenatis nitidis margine suhtusque setulosis, pedicellis axillaribus solitariis 1-floris medio bibracteolatis folia aequantibus, antherarum cornibus breviter bidentatis. *fj* in Chili australis sumniis Andium jugis ad Antuco et Chilian.

P. 594, n. 16, G. FtuviaTitis *adde* A. Cunn. ann. nat. hist. 1. p. 49. *Andromeda rupestris* Cunn. mss. 1834 non Forst.*

P. 594, n. 17, G. ANTIPODA. *adde* A. Cunn. ann. nat. hist. a. p. 49.

P. 594, n. 18, G. RUPESTRIS *adde* A. Cunn. ann. nat. hist. 2. p. 49.

***£94**, n. 19, G. VERNALIS *adds* Poepp. et Endl. nov. gen. et sp. 1. p. a6. t. 4a.

^. 637, *Un.* 33, BACTRIDIUM Salisb. *adde*: non Link.

***645**, *Un.* 29, CALLISTA Don, *adde* : non Lour.

I*-73a, *Un.* a, synonymiae Cladothamni *adde* : Tolmiea Hook. fl. bor. am. 2. />. 44, etp. 50; et post *Un.* 16, *adde*: T. occidentalis Hook. 1. c.

^' 77^, *Un.* i4, synonymise Chimaphilae *adde* : Pseva Rafin. 1809.

INDEX NOMINUM ET SYNONYMORUM

SF.CTIONIS SECUND.E. PARTIS SEPTIMJE.

Obs. Nomina admissa litteris rontanis, Synonyma italicis tradunlur, nenipè in utrâque classe:

Ordinalia majoribus,
Tribnalia uiajnsclnis,
Generica vulgaribus,
Sectionalia minoribus.

Acbimenes <i>P. Br.</i>	535	Argophyllum <i>Forst.</i>	57S
Acosta <i>Lour.</i>	55?	Arsace <i>Salisb.</i>	689
Acrostemon <i>Klotzsch.</i> <i>Benth.</i>	702	ASTER/INTUEJE <i>Reichb...</i>	55^
Acrotriclie <i>By.</i>	766	Aster an thos <i>Desf.</i>	55i
Aculeosa <i>Pluk.</i>	4^5	Astroloma <i>Br.</i>	738
Acutinn <i>R. et Pav.</i>	731	Alheroccpbala <i>DC.</i>	755
Adenophora <i>Fisch.</i>	49 ¹	Aviculuna <i>Gessn.. ></i>	49
Adodendron <i>Neck.</i>	725	Azalea <i>Desv.</i>	715
Agapetcs <i>D. Don.</i>	55a	Azalea <i>Don. Gaertn.</i>	714
slfiarista <i>Don.</i>	602 , 603	Azalea <i>Linn. et Auct..</i> . . . 7yj., 715	
Agastia <i>DC.</i>	60*	Azodendron <i>Neck.</i>	
Agaurla <i>DC.</i>	602	Baumannia <i>DC.</i>	610
Aikim* <i>Salisb. Alph. DC.</i>	426	Befaria <i>Linn.</i>	731
Alloplectus <i>Mart.</i>	545	Bojaria <i>Mut.</i>	ibid.
Amecliania <i>D.C.</i>	578	BeU'edera <i>Gron.</i>	776
Animyr sine <i>Pursh.</i>	729	BELVISEJE <i>Br.</i>	55o
Ampliichila <i>DC.</i>	516	Behisia <i>Desy.</i>	ibid.
Amphodea <i>Salisb.</i>	618	BKLFSIACE/E <i>Lindl.</i>	ibid.
Anaclusis <i>Benth.</i>	661	Bemonin <i>Endl.</i>	34 ¹
Annrnmsa <i>Miers.</i>	778	Besleria <i>Marl.</i>	537
Andersonia <i>Br.</i>	766	BESLERIEJE <i>Bard.</i>	537
Andersonia <i>Keen.</i>	335	BUcria <i>Linn.</i>	6V)≥[
Andreusia <i>Dun.</i>	560, 794	BLtndfordia <i>Andr.</i>	77^
Andromeda <i>fAnn.fl. lapp.</i>	606	Blepharophyllum <i>Benth..</i>	71°
Andromeda <i>Linn. gen. et Auct.</i>	610	Blepharophyllum <i>Klotzsch.</i>	ibid.
Andromeda <i>Gaertn.</i>	do	Booram <i>Don.</i>	720
ANDROMEDEM. <i>Don.</i>	580,588	Boretla <i>Neck.</i>	713
ANDROMEDEAE <i>DC.</i>	588	Brachycalyx <i>Sweet.</i>	721
AnomaLanthus <i>Klotzsch.</i>	707	Brossaia <i>DC.</i>	59 ¹
Anotocalyx <i>Alph. DC.</i>	494	Brosstsia <i>Plum.</i>	iW;
Anthodendron <i>Reichb.</i>	715	Bruckentbalia <i>Reichb.</i>	69*
Anthopterus <i>Hook.</i>	58	Bryauthus <i>Gmel.</i>	71 ³
Anthotium <i>Br.</i>	520	BryophUialmum <i>E. Mey.</i>	77^
Apenula <i>Neck.</i>	80	Buramia <i>DC.</i>	72°
Apxyllanih.es Dalech.	41S	Byrsanthes <i>Presl.</i>	4°7
Apoclixna <i>Alph. DC.</i>	13		
ARBUTEAE <i>DC.</i>	580	Callibolrys <i>Benth.</i>	624
Arbutus <i>Linn.</i>	58r , 584	Callicodon <i>Benth.</i>	614
Arbutus <i>Tourn.</i>	58 j	Callisla <i>Don.</i>	613> 79 ⁵

- Calluna *Salisb.* 612
 Calogyne *Br.* 517
Cattippannpsis *Br.* 426
 Campanula *Schrad.* 451
CAMP ATNUL ACE AE DC.,.., ILA
CAMP ANV LACE JE Juss..
CAMPANULEM Alph. DC. 41L
CAMPANULKAE G. Don. fa_g
Campanumaca Blum. 423
 Vanaria Linn. /i'i,
 Canarina *Juss.* ibid.
Candotica Baum. ^i3
Omdollea Labill. ann. 332
 Cassandra *D. Don.* 610
 Cassiope *D. Don.* ibid.
 Cavendishia *Lindl.* 565
Cavinium Pet. Th. 55a
 Centropogon *Presl.* 344
Ccephalostigma *Alph. DL.* 4^a
<eramia *Benth.* 668
 Veramin *Don.* 613
(oramus Salisb. 641
Ceratostema *Juss.* 55a, 794
Verbena Louf. 505
Cervicina Alpn. DC. fo
Cervicina Delii. 424
(liamx'cistus *Don.* 725
Vhanuvicistus Gray. 714
t hamcedaphne Buxb. 610
(liamceledon Link. 714
C.liinapbila Pursh. 775
Chimaza *Br.* ibid.
Chimophila Rad. Hid,
fhona *Don.* 6r3
^lioua *Benth.* 635
CUorisanthra *G. Don.* 5*6
^hromostegia *Benth.* 61G
Chupalon Adans. 560
Cladothamnus *Bong.* 73a, 795
Clermontia *Gaud.* 34c
Clethva *Geertn. Linn.* 588
Clintonia *Lindl.* Ml
UNTONIEAE Presl. ibid.
Coccosperma Klotzsch. 711
^occosperma *Benth.* ihd-
^odonantlie *Mart.* 5{o
Wodonantheinum *Klotzsch* ^ *Bc nth.* ^o_j
Cndonia Spreng. 42f
Codonophora Lindl. 5a₄
Codonostigma *Khlzsch.*, *Benth.* .. 709
^oe>otliPca *Alph. DC.* 42J
lir>Hlostigrna *Klotzsch.*, *Benth.* 70₈
Colema And. 312
Jhimeilia *B. et Pav.* 5Q
^LUMELJL.IACEAF *Lindl.*, *ibid*
[pLUMEUA/E D.Don., ibid.
^flumnea *Plum.* 54*
*^*nacephalus* *Klotzsch.* 702
h narpstyr *J. Zucc.* 58
- Conostcpium *Benth.* 730,
Conradia *Mart.* 5a5
COJSRADIEM *G. Don.* 5a3
Cosmelia *Br.* ^66
Crnntzia *Scop.* 545
Crossotoma *G. Don.* 5i'2
Cue Ifaria II. ct Pav. 588
Cuellaria *DC.* 5gq
Cyanaja *Gaud.* 3/3
Cyathodes *Labill. Br.* n_o
Cyalloloma *Benth.* 648
Cyphia Bars? 4₈, 793
CYPHIACEAE^//^. *DC.* 497
Cyphium *Ginel.* ^og
Cyrilla *Llicr.* ,,, 555
Cystanlhe *Br.* ,,, 768

 Dabcecia *G. Don.* 713
Dalbergaria *Tuss.* 545
Dampicra *Br.* 5oa
Daphne Linn, mss. 606
Dasyanthes *Don.* 613
Datyautes *Benth.* 636
Decaspora *Br.* 758
Delissea *Gaud.* 342
DFXISSEACEAE Presl. 340
Dendrium Desv. 729
Dtsmia *Don.* 613
Diapasis *Poir.*, 5o£
Diaspasis *Br.* ibid.
Didymantha *Benth.* g₂a
Dimo?j)hopeialum *Bert.* 7^a8
Dlph'Uus *Salisb.* 66a, 664
Diplaria Raf. 610
Diplocosia *G. Don.* 591
Diplycosia *Blum.* 591
Dislylis *Gaud.* 517
Dittauthera *G. Don.* 5?5
Dobrovvska *Presl.* 355, 784
Dortmannia Rudb. 357
Dracophyllum *Labill.* *6S§
Drymoma *Mart.* 5/j3
Dulia Adans. ^30

Ectasis *Don.* 6i3, 614
Kktasis *Benth.* 613
Edraianthiis *Alph. DC.* A48
Rleutherohtemon *Klotzsch*, *Benth.*, (ig6
Eliottia *Muhl.* 5(jo
Elytostegia *Benth.* 5go
Enchysia *Presl.* 4₈
Encynnthus *Spreng.* 732
hnkianthus *Lour.* ibid.
Enkyanthus *DC.* ibid.
EPACREJE *Reichb.* 760
EPACRIDEAE Br. 73Q
EPA CRIDA CEM *Lindl.* *ibid.*, 7Go
Kpacridium nSa
EVACBIE/E *Don.* 760

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <i>Epacris Cav.</i> | .760 | <i>Gcertnera</i> Retz.... | .548 |
| <i>Epacris Forst.</i> | .769 | GALACEÆ DC. | .776 |
| <i>Ephebus Salisb.</i> | .670 | <i>GALACINEJE</i> Don.... | <i>ibid.</i> |
| <i>Epigaea Linn. Sw.</i> | .50X | <i>Galax</i> Linn.... | <i>ibid*</i> |
| <i>Episcia Mart.</i> | .546 | <i>Gaultberia</i> Kalm.... | .59a, 795 |
| <i>Eremiastra Benth.</i> | .699 | <i>Gaylussacia</i> H.B.K.... | .556 |
| <i>Eremia D. Don.</i> | <i>ibid.</i> | <i>Geissostegia</i> Benth.... | .618 |
| <i>Eremia Klotzsch.</i> | <i>ibid.</i> | GESNERACE/E Lindl.... | .5a3 |
| <i>Eremocallis Salisb.</i> | <i>GldS</i> | GESNEREM Rich.... | <i>ibid.</i> |
| <i>Erica Benth.</i> | .6i3 | <i>Gesneria</i> Linn.... | .5a£, 53a, 794 |
| ERICACEAE Lindl. | .580 | <i>Gesnca</i> Mart.... | .5a6 |
| ERLC/E Juss. | <i>ibid.</i> | GESNERIACEAE Nees. | .5a3 |
| ERICEJE Br. | <i>ibid.</i> | GESNERIETE DC. | <i>ibid.</i> |
| ERICEÆ Don. | <i>ibid.</i> | <i>Gigandra</i> Salisb.... | .6ai |
| ERWINEJE Desv! | *.**.**.**. | <i>Glosocomia</i> D. Don.... | .4 ^a 4 |
| <i>Ericinella Klotzsch.</i> | .697 | <i>Gloxinia</i> Lher.... | .53a |
| <i>Emma Noul.</i> | .4 ^a 7 | GLOXINLEJE G. Don.... | .5a3 |
| <i>Eriodesma Benth.</i> | .617 | <i>Goodenia Sm.</i> | .5ia, 794 |
| <i>Eriodesna Don.</i> | .6i3 | GOODENIACEM Benth.... | .50a |
| <i>Eriphixz P. Br.</i> | .537 | GOODENIALES Lindl.... | <i>ibid.</i> |
| <i>Erythrorhiza Michx.</i> | .776 | GOODENIEJE G. Don. | .5ia |
| <i>Eucephalostigrna Alph. DC.</i> | .420 | GOODENOVIEAE Br. | .50a |
| <i>Euclethra DC.</i> | .588 | <i>Grammatotheca Presl....</i> | .348, 784 |
| <i>Eucodon</i> <i>Alph. DC.</i> | .408 | <i>Grisebachia Benth.</i> | .700 |
| <i>Eucollotigma Benth.</i> | .708 | <i>Grisebachia Klotzsch.</i> | <i>ibid.</i> |
| <i>Euepigixa DC.</i> | .591 | <i>Guallichria</i> Scop.... | .59a |
| EUERICEÆ Benth. | .61a | <i>Gymnostegia</i> Benth.... | .508 |
| <i>Eugesneria DC.</i> | .627 | <i>Gynocampus</i> Lesch.... | .338 |
| <i>Euglossinia DC.</i> | .53a | <i>Gypsocallis</i> Don.... | .613 |
| <i>Euisotoma Alph. DC.</i> | .4i3 | <i>Gypsocallis</i> Salisb.... | .667 |
| <i>Euleucothoe DC.</i> | .601 | <i>Hedranthus</i> G. Don.... | .450 |
| <i>Eulysipoma Alph. DC.</i> | .349 | <i>Heliopliaes</i> Salisb.... | .682 |
| <i>Eumicrodon Alph. DC.</i> | .421 | <i>Hemilola</i> DC.... | .534 |
| <i>Eupentachondra DC.</i> | .759 | <i>Hemisiphocampylus</i> Alph. DC.... | .397 |
| <i>Euphilippia Benth.</i> | .695 | <i>Hermes</i> Salisb.... | .66a |
| <i>Eurclaxis Benth.</i> | .711 | <i>Heterochaeria</i> Alph. DC....(J) | 1 |
| <i>Eurimocheilus Benth.</i> | .703 | <i>Heterotoma</i> Zucc.... | .i50 |
| <i>Euripliocampylus Alph. DC.</i> | .398 | <i>Hexastemon</i> Benth.... | .700 |
| <i>Eurhododeudron DC.</i> | .721 | <i>Hexastomon</i> Klotzsch.... | <i>ibid.</i> |
| <i>Eurylcpis Benth.</i> | .6a3 | <i>Hippobroma</i> G. Don.... | .4 ¹⁹ |
| <i>Eurylepis</i> Don.... | .6i3 | <i>Holosigma</i> G. Don.... | .36a |
| <i>Euryloma Benth.</i> | .64* | <i>Homochilus</i> Alph. DC.... | .383 |
| <i>Euryloma</i> Don.... | .6i3 | <i>Hymenanthes</i> Blum.... | .72 ¹ |
| <i>Eurystegia Benth.</i> | .654 | <i>Hymenanthes</i> DC.... | <i>ibid.</i> |
| <i>Eurystegia</i> Don.... | .613 | <i>Hypocyrta</i> Mart.... | .54° |
| <i>Eusympycra Benth.</i> | .705 | <i>Hypopitys</i> Dill.... | .780 |
| <i>Eusyndebmatus Benth.</i> | .706 | <i>Hypsala</i> Alph. DC.... | .350 |
| <i>Euthales Br.</i> | .517 | <i>Hypsal</i> a Presl.... | <i>ibid*</i> |
| <i>Eutupa Alph. DC.</i> | .391 |
 | |
| <i>Evautlie Salisb.</i> | .6*28 | <i>Isolobus</i> Alph. DC.... | .35a, 785 |
| <i>Finckeia Benth.</i> | .70a | <i>Isotoma</i> Lindl.... | .41 ^a |
| <i>Fincheia Klotzsch.</i> | <i>ibid.</i> |
 | |
| <i>Fischera Sw.</i> | .729 | <i>Jasione</i> Linn.... | .41b |
| <i>Flasrhea Spreng.</i> | .49 ^f | <i>JuUeta</i> Lesch.... | .764 |
| <i>Forsfera Linn. /</i> | .3 ^a 8 | <i>Juiaa</i> Adans.... | .588 |
| <i>Frnncoa Cm*</i> | .pjj |
 | |
| FRANCO ACEAE Ad. Jus.... | <i>ibid.</i> | <i>Kalmia</i> Linn.... | .7 ^a ft |
| | | <i>Klugia</i> Schlect.... | .5/3 |

Lagenocarpus <i>Klotzsch.</i>	710	Mezleria <i>Presl.</i>	350, 785
<i>LamprotuDon.</i>	6'13	Michauxia <i>Lher.</i>	457
<i>Lamprotib Benth.</i>	650	Micreremia <i>Benth.</i>	700
<i>Latouria Endl.</i>	5i ₉	Microcodon <i>Alph. DC.</i>	4*i, 7^8
<i>Laurentia Mich.</i>	40 ₉	Microgombpus <i>Benth.</i>	705
<i>LecheEaultia Endl.</i>	5-ig	Microtrema <i>Klotzsch.</i>	6i3
<i>LEDEAE DC.</i>	729	Mindium <i>Adans.</i>	457
<i>Ledum Linn.</i>	730	JJitaria <i>Out.</i>	53jr
<i>Ledum Mich.</i>	7*5	Moneses <i>Salisb.</i>	774
<i>Leeuwenhoekia Br.</i>	338	Monoclilia <i>G. Don.</i>	5i6
<i>Leeouzia Dur.</i>	489	Monopsis <i>G. Don.</i>	35i
<i>Lefophyllum Pers.</i>	729	Monopsis <i>Salisb.</i>	35i, 408, 785
<i>Lepipherum Von.</i>	721	Monotoca <i>Br.</i>	755
<i>Leptoblaulia Benth.</i>	697	Monotropa <i>Linn.</i>	780
<i>Lpnt#wln.iflrou Benth.</i>	6ra	IVIonotropa <i>J.Mutt.</i>	781
<i>IS ^ ^ MaBr. : \ . . .</i>	5\$	MOMjrJtOPACEM LindL.	779
<i>Leucopogon Br.</i>	^	JMONOTROPEAE <i>Nutt.</i>	ibid.
<i>Leucothoe Don. DC.</i>	601	Monolropsis <i>Schwein.</i>	780
<i>Lightfootia Lher.</i>	4>7- 7<6	Musschia <i>Dumort.</i>	4,5
<i>Linarioides Alph. DC.</i>	440	Myopsia <i>Presl.</i>	350
<i>Lissanthe Br.</i>	74*	Myra <i>Salisb.</i>	640
<i>Lobelia Linn.</i>	357,7&4		-
<i>Lobelia Plum.</i>	505	Nabea <i>Lehm.</i>	611
<i>Lnbelia Presl.</i>	3g6	Wapoleona <i>Beauv.</i>	550
<i>LOBELIACEAE Juss.</i>	33g	3N APOLEOTNEAE <i>Beauv.</i>	ibid.
<i>LOBELIEAE Presl.</i>	350	Weedhamia <i>Br.</i>	7^9
<i>Ubelioides Alph. DC.</i>	44°	Nematanthus <i>Schrad.</i>	544
<i>Loiseleuria Ues >.</i>	7*4	Nesophila <i>Alph. DC.</i>	4a6
<i>Lopbandra Don.</i>	6i3 , 683	Nitramium <i>Endl.</i>	335
<i>Loyhia Desv.</i>	545	Ochrosantbus <i>G. Don.</i>	513
<i>Loxomeria Salisb.</i>	665	Octogonia <i>Benth.</i>	704
<i>Lusmcia Spreng.</i>	556	Octogouia <i>Klotzsch.</i>	ib,J*
<i>Lyonia Nutt.</i>	A99	Octopera <i>Benth.</i>	635
<i>r • P^irhK</i>	610	Octopera <i>Don.</i>	6.3
<i>Ljoma Reichb.</i>	764		
fe. ^ %, -D'd::: 349	OI_{is} Uena *-, 5 9		
rV<IDOMFAE Aloh DC..	348	Omplialocaryon <i>Benth.</i>	709
		Oncogastra <i>Mart.</i>	041
		Oivbanchia <i>Veil.</i>	545
		Urobanchoides <i>lourn.</i>	700
		Orophaeus <i>Salisb.</i>	6,5
		Osmolampus <i>DC.</i>	7g^
		Oloca, <i>ML DC.</i>	4
		Oxycoccus <i>Pers.</i>	576
		Oxydendron <i>DC.</i>	601
		Oxoloma <i>Benth.</i>	^
		Pachy Yea <i>Benth.</i>	658
		Pachrycalyx <i>Klotzsch.</i>	705
		PacfaaVon.	6.3,658
		Paliavann <i>Vand.</i>	53a
		PnnkeWilld.	777
		Parastranthus <i>G. Don.</i>	354* 7*5
		Pelostoma <i>Salisb.</i>	622
		Pentacobondra <i>Br.</i>	7^8
		Pf*t*8<nii Tab.	4»9
		I'entanthent <i>Don.</i>	7'5

- Pentapera* Klotzsch 6i3 *Rapuntium* Tourn 357
Pcnlaphragma Wall 49\$ *Richca* Br. 769
Pentaraphia Lindl 5a5 *RHODODENDRA* Juss. 580, 71a
Pernettya Gaud 586 *RHODODENDREJE* DC. *ibid.*
Pernecttra Scop 422 *Rhododendron* Linn. 719
Peroa Pers 743 *Rhododendron* Auct. 714, 7*5, 719
Peroja Cav *ibid.* *Rhodora* Linn. 719
Petromarula Bell. Alph. DC. 456 *RUODORACEM* Vent. 71*
Peyrusa Rich. ^60 *RHODORE'E* D. Don. *ibid.*
Phalerocarpus G. Don 677 *Rhodotiamnus* Reichb. ^19, 725
Philippia Klntzsch 695 *Rhyncopetalum* Fres. 396
Phyllachne Forst 338 *Roella* Linn. 44» 79°
Phyllodoce Salisb 712 *Roelloides* H. Banks. 44^a
Phytcuma Linn 4^° *Rcemeria* Dennst. 505
Phyteumoides Alph. DC. (11) *Rollandia* Gaud. 344
Pickeringia Null 733 *Roucela* Duin. 4^4» 4^7
Picria Lour. 537 *Roussxa* DC. 522
Piddingtonia Alph. DC. 341 *ROUSSAEACEAE* DC. 52i
Pieris D. Don 598 *Roussea* Sm. 5a2
Pilitis Lindl 769 *Rousscauvia* Boj. 522
Plagiostemon Klotzsch 703 *Rnusson* R. et Sch. *ibid.*
Plagiostemon Benth *ibid.* *Rytidophyllum* Mart. 524
Platycodon Alph. DC. 4^aa
Platyloma Benth 645 *SALAXIDEAE* Benth. 699
Platyspora Salisb 649 *Salaxis* Salisb. * 710
Pleurocallis S. a. l. i. s. b. 6 24 *Salnxis* Klotzsch
Podauthum G. Don. 454 *Sarcocarpaea* G. Don. 508
Podercmia B. n. t. h. 96 9 *Sarinientu* R. et Pav. 547
Pogonandra DC. 511 *Scacvola* Linn. 505, 70,4
Pogonanthera G. Don *SCJETOLACEJE* Lindl. 50*
Pogonanthum G. Don 7^5 *Scaevarolia* DC. 512
Potroneles Lindl 512 *SCAEVOLEAE* Br. 502
Polycopodon Benth 687 *Schnllem* Roth. 576
Poiydesmia Benth 615 *iSchuftesin* Roth. 4a4
Poncc-letia Br. 767 *Schweinilzia* Ell. 78a
PONGA TIE AC Endl 548 *Sclerotheca* Alph. DC. 356
Pnngatium Juss. *Scyphogyne* Bvongn. 709
Ponticum Don 7³1 *SclUeru* Cav. 516
Porphyranthes G. Don 515 *Selliera* G. Don. *ibid.*
Prasanthea DC. 532 *Sericocadon* Endl 494
Pratia Gaud 340 *Simocoelius* Benth. 702
Prionotes Br. 765 *Sinmcheilus* Klotzsch 7p3
Prismatocarpus Alph. DC. 442, 789 *Sinuingia* Mart. % 533
Prismatocarpns Lher. 44 2» 4?9 *Sinningia* Nees. **ibid.*
Pseuderemia Benth 658 *Siphogampylus* Pohl. 396
Pseva Riff. 79⁵ *Soledanthis* lk. Alph. D C 4^X^
Pterospora Nutt. 779 *Solenanthis* Kunth. 4ⁱa
Pycnobraeria Benth 698 *Solenandra* Beauv. 77
Pyrola Salisb 77² *Soleniscia* DC. 7³7
PYROLACEAE Lindl *Solenopsis* Presl. 4°9
PYROLEJE DC. *Specularia* Heist. 489, 79¹
PYB.OLEM Lindl *Speculum-veneris* Ger. *ibid.*
Pyronium Salisb 666 *Sphenocleaceae* Marl. ibid.
liapihia Lour. 548 *Spcnotoma* Sweet. 77°
Rnpunculus Dalech 450 *Sphyrospermum* P e p p 79⁴
Hapunculum Trag *Sprenelia* Sm. 768
Rapuutium Alph. DC. 357 *Skingelia* Andr. 768
liapuntium Lob 4^° *Stellanthe* Benth. 640

NOMJNUM	KT	SYNONYMOK	ULVR.	801
<i>Stenanthera Br.</i>	*'3g	<i>Trevivama Mart.</i>	535	
<i>tiifedtum</i> Audr.	33a	<i>Trigemma Sahsb.</i>	655	
<i>Stomarrhena DC.</i>	«3S	<i>Tnmeris Alph. DC.</i>	357	
<i>STFLIEDJE Br.</i>	53,	<i>Trimens Presl.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>S TYIADIACEM Lindl.</i> . . . , w.	,	<i>Tristemon Benth.</i>	709	
<i>STYLIDIEAE Juss.</i>	<i>ill,</i>	<i>Tnslemon Klotzsch.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>StyJidium Sw.</i>	33a, 783	<i>Tritamidium Endl.</i>	^2L	
<i>Styphelia Sm. Br.</i>	«35	<i>Trochocarpa Br.</i>	758	
<i>S TYPUEUA CEJE Reichb..</i> . -3	-3	<i>Tsutsusi Don.</i>	726	
<i>STYPHELIEAE Bartl.</i>	<i>iJ,</i>	<i>Tupa G. Don.</i>	3gi	
<i>Symphyandra Alph. DC.</i> . 494,791		<i>Tutsaca Richb.</i>	537	
<i>Sympyera Licht.</i>	no5	<i>Tylonium Alph. DC.</i>	3f	
<i>Synanthera G. Don.</i>	525	<i>lyiomium Presl.</i>	391	
<i>Syndesmanlhus Klotzsch, Benth.</i> . 706				
<i>Synchlaena Alph. DC.</i>	438	<i>Ulixia Juss.</i>	54Q	
<i>Synotoma G. Don.</i>	623	<i>Unedo Hofm.</i>	58i	
<i>Synngodea Benth.</i>		<i>Urceolana Feuill.</i>	547	
<i>&yyngodea Don.</i>613,6a3	<i>Uva-ursi Tourn.</i>	584	
<i>^apeinotes DC.</i>	544			
<i>Tapma Mart.</i>	<i>ibid.</i>	<i>VACCINACE&</i> Lindl.	55a	
<i>Tetilla DC.</i>	778	<i>VACCINIEAE DC.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Tctraphylax G. Don.</i>	5i5	<i>Vaccinium Linn.</i>	565	
<i>Tiamnus Benth.</i>	703	<i>Pelleia Sm. Labill.</i>	5IH	
<i>Jhamnus Klotzsch.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Velleya B. et Sch.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Tiamniura Benth.</i>	^08	<i>Ventenatia Sm.</i>	33a	
<i>Thamnum Klotzsch.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Figiena Arrab.</i>	5ia	
<i>Theis Sahsb.</i>	7T5	<i>Vmtenatia Cav.</i>	738, 740	
<i>Thibuidia Humb.</i>	556	<i>Pireya Blum.</i>	719	
<i>Unbaudia 11. et Pa >.</i>	560, 79!	<i>Viticella Mitch.</i>	776	
<i>Ihibauidia Wall.</i>	55a	<i>Fitis-idcea Tourn.</i>	565	
<i>Thoracnspernia Klotzsch.</i>	703	<i>Volkameria P. Br.</i>	588	
<i>Twus Linu.</i>	588			
<i>Tolmiea Hook.</i>	795	<i>Wahlenbergia Schiad....</i> 4^4» 7^8		
<i>Tolypaugium Endl.</i>	33a	<i>WAHLENBERGIEAE Endl.</i> . 414		
<i>Trachelium C Bauh.</i>	487			
<i>j^rachelium Lmn.</i>	491	<i>Xanthomeria Presl.</i>	354, 788	
<i>•Freverama G. DOD.</i>	535	<i>Xerocarpxa G. Don.</i>	508	
<i>Trevirana Willd.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Zenobia D. Don.</i>	597	

FINIS INDICIS.

Irapressio abboluta die 20 wens decemb. i83y.

LIBRAIRIE DL TRFLTJTLLE EI W URTZ, A P\RIS, RUE DE LILLE, K° i7

NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE CLASSIQUE
ou
COLLECTION DES CHEFS-D'OEUVRE
DE
LA LITTÉRATURE FRANÇAISE;

PUBLIEE SUR LES TEXTES LES PLUS AUTHENTIQUES,
ET ACCOMPAGNEE DE NOTICrS, LA PLUPART INEDITES, SUR LA VIE ET LES
ÉCRITS DES AUTEURS.

**80 volumes in-8°, sur beau papier, avec portraits. Prix 3 francs le volume
d'environ 400 pages; et 4 fr. 50 c. sur papier vehn supei (in.**

Celte collection, aujourd'hui complète, se compose des ouvrages ci-après

N. B. *Chaque auteur de la Collection se lend tiparement*

**Lc Recueil quo nous a\ons publid sous le titrede NOUVELLE BIBLIO-
THEQUE CLASSIQUE est la COLLECTION DES CHIEFS-D'(EUA nr des di-
vers genres de LITTERATUR FRAKOAISE, des 17^e et 18^e siccles.**

Nous avons pensd qu'a une Ipoque où rinstruction morale et la culture de Pesprit sont devenues plus que jamais un besoin général, une telle collection était une entreprise utile au progrès de la raison ainsi qu'aifi maintien du bon goût, et nous n'avons rien épargne pour en rend re Texe'ction digne dc son objet.

Nous entemlons surtout, par auteursclassiques, les e'crivains des^{7^e} et 18^e siècles qui se sont le plus distingu's, non-seulement dans les ouvrages He goût et purement littéraires, mais dans la littérature historique, morale et philosophique.

Afin de donner à cette collection unpins grand dcgré d'intérêt, nous avons dû Id restreindre aux ouvrages principaux qui ont reçu la sanction du temps, et qui sont considérés coimne classiques par toutes les nations de PEurope.

Trop fréquemment des e'diteurs ont publié sans cboix toutes les productions d'un même auteur, *en yajoutant* des pièces non avouées ou peu dignes dela baute réputation dc Pécrivain. Nous rfavons point imité cet exemple, et notre publication a été bornée aux seuls *Chefs-<TOEuvre*, choisis avec discernement par le concours et le conseil de plusieurs hommes de lettres distingués. Il en résultera pour les lectcirs plus ou moins livrés à leurs diverses occupations, et pour la classe la plus nombreuse de la société, une e'economie de temps et d'argent.

A cet avantage nos Edition? re'unissent cclui d'olTrir un texte revu sur les mcilleures éditions publie'es du vivant des auteurs, et comparées avec les éditions subsc'quentes, dont plusieurs offrent des fuites ou des inexactitudes plus ou moins remarquables. Nous avons ainsi mis tous nossoins pour rétablir le texte et la ponctuation dans leur pureté primitive.

11 nous a paru nécessaire aussi d'accompagner nos Editions de notices, dont plusieurs sont ine'dites, sur la vie et les e'erits des auteurs, ainsi que (Tune table raisonné des matières, table qui manque en général aux ouvrages qui en sont susceptibles , dans les Editions pre'eddemment publics.

Une exécution typographique très corrccte répond aux soins littéraires de la collection, par lc cboix de caractères neufs, agre'ables à-l'ceil, et par une impression très nette, sur beau papier. Cliaque ouvrage est ornd du portrait de son auteur, gravd par un des plus habiles artistes. On adû adopter le format in-8°, ce format e'tant plus convenable que tout autre pour une collection destinée à ornerla bibliothèque d'un ami des lettres.

im vw kvl lxt/ i,vi

LEGISLATION CIVILE, COMMERCIALE ET CRIMINELLE DE LA FRANCE,

QU COMMENTAIRE DES CODES FRANCIS, TIRÉ DES TRAVAUX PRISPARATOIRES, LS
COMPLÉMENT FORMÉ PAR LES LOIS ET LES ACTES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE, QUI
S'IDENTIFIENT AVEC LES CODES J

PAR M. LE BARON LOCRE;

~~SECRETAIRE GÉNÉRAL DE L'ANCIEN CONSEIL D'ÉTAT, OFFICIER DU SERVICE D'ORDRE ET DE LA LEGION~~
D'UNNEUR.

OUVRAGE COMPLET,

31 FORS VOLUMES IN-8°. — PRIX, 2*17 FR.

Un important ouvrage est distribué comme suit: le Commentaire, etc., suivant le *Code civil* forme les 16 premiers volumes; le Commentaire, etc., sur le *Code de commerce*, les tomes 17 à 20; le Commentaire, etc., sur le *Code d'procédure civile*, les tomes 21 à 23; le Commentaire, etc., sur le *Code d'instruction criminelle*, les tomes 24 à 28; enfin le Commentaire, etc., sur le *Code pénal* forme les tomes 29 à 31, tout le dernier comprend une Table générale et raisonnable des matières de tout l'ouvrage.

La hauteur s'est proposée d'offrir par son travail tout-à-la-fois le *Commentaire* et le *Complément* de nos Codes.

Le *Commentaire* est tiré des diverses et nombreuses discussions qui ont précédé et préparé chacun de ces Codes, et que les devoirs de sa charge obligeaient M. Locre de recueillir; il est donc en quelque sorte un *Commentaire général*. Le *Complément* donne les lois, tant antérieures que postérieures, auxquelles les Codes se réfèrent ou qui se réfèrent à ces Codes, et les actes du pourvoir réglementaires, destinés à en organiser l'exécution.

Il est difficile d'un tel ouvrage ne saurait être contesté: pour connaître parfaitement la loi, il faut en avoir saisi l'esprit; et cet esprit se révèle surtout dans les travaux et les discussions dont elle a été le résultat final. La cour supérieure a, plusieurs fois reconnu ce principe.

Le public verra donc, sans doute avec plaisir, paraître au grand jour ces *procès-verbaux* du conseil d'état, qu'il a tant d'intérêt à connaître. Ceux du Code civil n'avaient été publics qu'en partie; et la partie qui manquait n'est pas moins intéressante, sous plus d'un rapport. Ceux des autres Codages sont entièrement inédits; et lorsqu'aux lumières *qua* donnent les

procès-verbaux du consil, viendront se réunir celles qui jaillissent des autres travaux préparatoires, il ne sera plus possible de se tromper sur l'esprit delator

Si le nom sous lequel paraît un ouvrage entitlément compost d'éléments officiels pouvait ajouter quelque chose à son mérite, il en est peu qui seraient plus que celui-ci à l'attention publique.

Pour en faire apprécier l'importance, nous nous bornerons à transcrire l'opinion exprimée sur l'ouvrage dans deux journaux également recommandables.

EXTRAIT du journal officiel des Chambres.

« SANS M. Locrl, notre haute gloire législative n'eût pas été entière. Il a fallu qu'il en thât les preuves de son porte-feuille; c'est-à-dire qu'il produisit ^ grand jour les discussions du conseil-d'état, restées inédites, et qu'il avait a^lysees autrefois comme rapporteur des conférences de ce conseil.

« Ces publications de manuscrits importants sont donc un service réel rendu au pays. M. Locrl ne s'est point borne à cela; il a rendu analytiquement les dis cours, les travaux préparatoires, ensuite les lois en dehors des Codes, et tous les actes qui s'identifiaient à ces Codes. De ces éléments est sorti un corps compl^t de notre droit civil, commercial et criminel, des *Pandectes françaises*.

« M. Locre" a rassemblé" ces matériaux sous les titres auxquels ils se rattachei^ puis il les a éclairé's par des *notes analytiques* et de renvoi liés aux diverses dispositions de chaque article. Par ce travail, il nous a mis h. ihème de retrouver sans de longues recherches, les passages qui expliquent et qui complètent \$ Codes. Le lecteur peut, en les rapprochant, y puiser l'esprit de la loi, un com^mentaire officiel.

« C'est là ce qui distingue ce grand travail de cetix que d'excellents esprits ont publié* sur nos Codes. Le jurisconsulte le plus savant, qui n'eût que d'apris ses connaissances acquises et ses idées particulières, ne présente jamais qu'^r^le opinion plus ou moins en valeur, et sous laquelle on ne peut point plier ab^lument.

« Il n'y a pas, ici, que cette simple opinion. Le législateur y explique sa p^us secrète pensie, et se manifeste tout entier: il explique ce qu'il a voulu, ic^s motifs qui lui ont fait vouloir, les résultats qu'il a cherchés en le voulant. explications formelles de l'esprit et de la philosophie de la législation, n^ous permettent de juger la loi, de voir si l'inexpérience, qui est la pierre de touche des législations, a justifié ou trompé les prévisions des auteurs des lois. Ces explications s'identifient avec la lettre des Codes, lèvent les doutes, développent les lois, déterminent leur action, règlent l'application, et donnent le commentaire officiel; elles l'achèvent en quelque sorte, car plus d'une fois le législateur s'est reposé sur les procès-verbaux et y a renvoyé, dès la première confection, pour les développements que la concision nécessaire du style légitif ne lui a point permis d'insérer dans les textes. Ces explications traient également à la doctrine, à la jurisprudence, la route qu'elles doivent suivre pour remplir, dans le sens de la loi, les lacunes qui se rencontrent dans toutes les lois. C'est ce système (de complément, d'interprétation et d'application) que Ton appelle doctrine, usage, jurisprudence, et qui à la fin, et lorsqu'il est véritablement réuni, a une puissance qui le place tout près de la loi.

« Cet ouvrage est, avant tout, le guide des législateurs : s'ils ignorent quel bien la loi est destinée à établir, quel mal elle peut empêcher, (uels moyens

•ont vagues, incertains, taux, us ne seront point assez clairs pour des travaux
^gislatifs.

« C'est aussi le livre des professeurs, des sièves : les premiers ne peuvent puiser leurs leçons dans une source plus pure; les seconds ne seront que des praticiens appliqués à la routine, indignes du beau nom de jurisconsulte, s'ils n'apprennent que la lettre morte de la loi, si l'étude de son esprit ne les élève P's jusqu'à la science législative.

« C'est le livre des magistrats; ministres de la loi seulement, ils usurperaient fe pouvoir du législateur et renverseraient le principe fondamental de notre liberté, la séparation des pouvoirs, si, négligeant d'étudier les intentions qui ont dicté la loi, ils l'interprètent et l'appliquaient selon leurs opinions différentes; ils y substitueraient un fantôme. Un autre mal découlerait de là, et bien grave !

« L'unite de cette législation, cei avantage immense dont Bonaparte a entendu doter la France en lui donnant ses Codes, s'évanouirait devant la diversity des opinions. Chaque ^our, chaque tribunal, aurait un code d'arrêts, de précédents; ^a Waç, e l u i qui aurait gagné son procès à Toulouse pourrait le perdre à Rouen..... »

EXTRAIT du journal intitulé : *le Temps*.

« EN 1815 quelques législateurs demandèrent l'abrogation des Codes Napoléon, Nos moeurs, qui sont satisfaites par ces belles créations législatives, les sauverent. On n'en déchira point les pages, qu'une habile philosophie y a introduites. La suppression des Codes jut d'être une insigne folie, car le lendemain des difficultés insurmontables eussent paru dans les affaires. Une impudrieuse ne cessait nous eût ramenés aussitôt à ces oracles accoutumés. Aucune partie de l'ancienne législation monarchique n'eût pu garantir les droits acquis depuis vingt ans par les citoyens, et se concilier avec le moral de la France de 1815. Pour refaire les Codes, des années eussent été nécessaires, et ces Codes étaient, ^ cette époque, aussi indispensables à la France que le souffle à l'existence.

« Louis XVIII déjoua ces trois rigues en ratifiant l'adoption des Codes, le mouvement des Tronchet, des Portslis, des Cambacérès, des Lebrun, des Treilhard, ^es Berlier. Il n'y fit *ye^r <1^{re} ^²⁵ dénominations qui rappelaient l'Empire. Ce Prince, que l'expérience corseillait, avait bien vu que ce n'était pas sans de Stands dangers qu'il laisserait refaire simplement pour refaire. Lui aussi avait ses douleurs sur la puissance artificielle de ses anciennes doctrines. Aussi une ordonnance royale du 17 juillet 1816, maintint-elle l'état des choses, moins les dominations qui rappelaient l'ancien gouvernement. Cette décision fit désirer ^vantage un *Commentaire legal* des Codes : déjà ces éléments existaient épars ^ans les procès-verbaux du conseil-d'état, du tribunal et du corps-législatif; ^a M. Locre eut seul le courage d'aller les reprendre dans ces vieux papiers. *Où il avait depuis long-temps une parfaite connaissance. Son travail a remis ^sous nos yeux les Codes et les explications officielles des discussions primitives ^de *1 y a trente années. Il a suivi les débats législatifs depuis les travaux préparatoires jusqu'à la rédaction définitive. Il a réuni aux lois anciennes la portion de lois complémentaires qui appartiennent à des époques subsequentes.

* Ces lois sont commentées avec les mêmes soins. M. Locré fait son analyse historique selon les dates. Cette savante analyse rapporte avec exactitude les

discussions importantes. Elle rapporte en fin toute la partie significative des procès-verbaux, et les pièces mêmes des gouvernements.

« M. Locre fait présenter les différentes parties de cette précieuse analyse du sommaire qui marque, avant même l'introduction, les idées fondamentales des lois et des dispositions législatives, leur objet politique, social, etc. Cette partie de son livre abonde en révélations.

« Jusqu'à présent les procès-verbaux des séances du conseil-d'état n'avaient été publiés qu'en partie; le plus grand nombre était resté enfoui dans les papiers de la chancellerie, et surtout ceux du *Code civil*. Les cartons du gouvernement sont restés trop long-temps pleins de ces anciens documents sur l'Empire. Napoléon, lui-même, s'était toujours opposé à leur publication, par des raisons tirées de sa politique. Il a pensé, dans les dernières années de son règne, que le temps de publier le franc-parler de ses hommes d'état durant la rédaction des Codes n'était point arrivé, et il en a même fait envelopper les dernières discussions. On ne les a point connues. Ce silence, imposé par son intérêt politique, avait aussi éloigné des yeux de la justice des observations précieuses que 14 sections, du tribunat adressèrent successivement à l'Empereur après la communication officielle des articles des Codes de commerce et de procédure. L'Empereur en a tenu religieusement compte, comme on verra. Il a fait venir Wanic souvent ses projets d'après ces observations.

« M. Locre a rendu public aujourd'hui ces observations des sections. Les analyses qu'il présente ne sont pas des index bruts, mais des histoires complètes des lois, les Commentaires qui peuvent le mieux servir à leur juste interprétation. Cette collection est tout-à-la fois analytique, bibliographique et critique. Les faits qu'elle contient faciliteront largement la recherche. Vous y retrouverez soudain la pensée des lois par un renvoi direct à toutes les sources où se conserve cette pensée. À chaque titre M. Locre a rattaché un énoncé des questions qui s'y rapportent, et un renvoi pour ces questions aux documents, aux paroles officielles qui en renferment la solution.

« M. Locre juge ensuite ce qu'il a analysé dans des chapitres particuliers qu'il rédige avec ses abondants souvenirs. Il fait ainsi l'histoire des séances du conseil-d'état et de l'Empereur au conseil-d'état. M. Hesron de Pansey a défini, avec des expressions simples et très-justes, l'objet rempli par cet excellent Livre: à quoi nous voulons savoir ce que le législateur a voulu dire dans une loi, allez aux sources conservées par M. Locre, vous y trouverez. »

Ce grand ouvrage appelle particulièrement l'attention des hommes d'état pour une instruction bien digérée et originale. C'est un travail critique, explicatif qui vivra comme les Codes. Peu de plumes seraient capables de lutter aujourd'hui avec les beaux récits d'histoire de M. Locre, simples, graves, lumineux et enchainés par une rare puissance de style, par une suite d'idées remarquables. Secrétaire général du conseil-d'état impérial, rapporteur de ces immenses travaux, c'est à lui, sous sa plume, que toutes les lumières venaient aboutir. On s'explique que son esprit élevé, enrichi par ces longues communications soit devenu particulièrement propre à diaboliser l'histoire de ces Codes.

K. B. Les personnes qui ne voudraient pas prendre hâte de la totalité de l'ouvrage, pourront la faciliter de le retirer par deux volumes chaque mois.

L'LIBR/URIE DE TREUTTEL ET WÜRTZ, A PARIS, RUE DE LILLE, N° 17;
A STRASBOURG, Grand'Rue, n° 15.

MEDITATIONS RELIGIEUSES

FORME DE DISCOURS POUR TOUTES LES RÉPONSES, CIRCONSTANCES ET SITUATIONS DE LA VIE DOMESTIQUE ET CIVILE; TRADUITS PAR MM. MONNARD ET GENCE,
L'APRÈS L'OUVRAGE ALLEMAND INTITULÉ :

STUNDEN DER ANDAGHT.

VIII TOMES DIVISÉS EN 16 VOLUMES IN-8°, 64 FR. PRIS À PARIS;
ET 80 FR. FRANC DE PORT POUR LES DÉPARTEMENTS.

La traduction franchise successivement public de cet ouvrage remarquable, dont on ne cesse de réimprimer l'édition allemande, est maintenant complète; elle forme VIII tomes, divisés en 16 volumes in-8° de 24 à 25 feuilles d'impression chacun, en gros caractère.

La hauteur de cet ouvrage, étranger à tout esprit de secte et de parti, et proton* Jijinent versé* dans la connaissance des hommes et de la nature, a développé* dans ces *Meditations*, avec simplicité et profondeur, les grandes vérités de la morale et de la religion; et par la diversité des sujets appropriés aux différentes félations de famille et de sexe, aux divers âges, états et situations de la société, il a fait de ces vérités, dans son ouvrage, l'application la plus variée et la plus étendue, comme la plus juste et la plus utile.

Les annonces successives qui ont été faites de cet ouvrage dans divers journaux sans autre influence que celle de *Topinon*, et qu'on reproduit ci-après, pensent d'entrer dans plus de détails sur son objet et sur son exécution. L'on peut orné à donner la table des sujets traités dans les huit premiers volumes, et commander l'ouvrage à l'attention de tous les chefs de famille qui désirent fonder, par une instruction solide, les dispositions morales et religieuses de leurs personnes qui leur sont attachées.

Table des sujets traités dans les huit premiers volumes des MEDITATIONS RELIGIEUSES.

PREMIER VOLUME, OCTOME I. 1^e *Panic.* — AVANT-PROPOS. — PRÉFACE. —
2. *Le Culte domestique.* — 3. *Le Culte public.* — 4. * < **
5. *L'Irt d'être content de son état,* — 6. *De la Jouissance du plaisir.* — 7. *La Fausse économie* — 8. *Le Pert de famille.* — 9. *La Mère de l'Ule.* — 10. *Indépendance d'un Chrétien dans la vie civile.* — 11. *Diminution de l'aisance.* — 12. *Soucis domestiques. Bonheur domestique.* — 13. *Dangers de l'avarice.* — 14. *Avantages que peut offrir la pauvreté.* — 15. *Dangers de l'oisiveté.* — 16. *Avantages de la richesse.* — 17. *Plaisirs domestiques.* — 18. *La Religion de Venfance.* — 20. *Les Nouveaux Mariés.* — 21 et a3. *Le*

Marlagc. — 22. *Le Beau-Père et la Belle-Mère.* — 24 et 25. *Le Celibat* —*
26. *La Vieillesse.*

SECOND VOLUME, ou TOMB I. 2^e Partie. — 27 0*28. £' ^ r* < e parvenir < *
une heureuse vieillesse.—29. *Le Baptême.* — '5o. *Le Labourcur.* — 3i. *L'Artiste A
VArtisan.* — 32. *Respect pour tous les dtats.* — 53. *Conduite envers les domestic
ques.* — 54. *Conduite du Chrétien dans le temps présent.* — 35. *De nos Jugements
sur les e'venemcnts publics,* — 36. *La Socicté 'domestique et la Socicté 'civile** ***
37. *Le Dénouement an bien public.* — 3b. *De la Publicite 'des bonnes ouvres.* ~~
39. *Devoirs du Chrétien de concourir au. mainticn de la simplicite des mcccurs da!**
sa patrie.* — 4°. *De la Diversite des Religions.* — fi. *De nos Devoirs envers l's
yersonnes d'une autre religion,* — 4². *Inipôts et Charges publiques.* — tfi. ^
Patrie souffrante. — 44*. *Mourir pour sa Patrie.* — 45. *La Concorde civile.* ***
46. *Respect pour les nations etrangères.* — 47« *Respect pour notre propre nation*
— 48. *La Destineedes nations,* — 49* *Dicu manifeste'dans les destinies des n^os
tions.* — 50. *Le fxux Culte.* — 5i. *La solennité du Culte public.* — 52. D^o
Danger de repréſentcr Dieu par des images.

TROISIEME VOLUME, ou TOME II. i^{re} Partie. — 1. *Le Coour pur verra Dieu**
— 2. *La Dévotion.* — 3 2t 5. *Le Chretien place 'dans le tumulte de la vie ordinaif'*
— 4» ^a *Cène de Jc'sus-Christ.* — 6 ci. 6. *Le Chrétien au jour de la Pdque.* —
7. *Ce qui fait le prix des sacrifices.* — 9. *Infuence de Vhumeur sur le sentinel
religieux.* — 10. *Dangers de la prioipitaiion duns les résolutions pieuses.* — 1¹
La Prière domestique. — 12. *Infuence dc la prière sur les destincs humaines.* **
i5. *Efficacile de la prière.* — 14. *La Foi et les OEvres.* — i5. *Les OEvres*¹
la Foi.* — 16. *Nature de la craintc dc Dieu.* — 17. *L'Amour et la crainte^
Vieu.* — 18. *Le Triomphede la religion chre'tienne.* — 19. *Devoir du Chrétien*⁶
propager la religion.* — 20. *L'Incre'dulitc.* — 21. *La Foi chretienne.* — 22. E^
pire de la superstition. — 23. *Simplicite do la Foi.* — 24 et 25. *Les Progrès A
lumleres.*

QUATR1EME VOLUME, ou TOME II. 2^e Partie'. — 26. *De VOrgueil en matièr
de piété.* — 27. *Sur la légèretc' avec laquelk on traite le Péché.* — 28. *Un Péché
piinciple de tous les autres Pe'chés.* — 29. *Une Vertu nèfede toutes les autres VerV¹²*
— 30. *Dela Ticdeur dans le Christianisme.* — \$1. *Comment l'homme est cntra^
faire abjuration de sa Foi.* — 32. *Dc l'lmportance des Cérémonies religieuses d'
la vie civile et domestique.* — 33. *Le Pcche' et Vignorance.* — 34. *Llicure &&
tentation.* — 35. *La voix de Dicu s'adressant au cceur de Vhomme.* — 56. *R*P^{er}
tance sincère. Résolution énergique.* — 37. *Illusion sur les moyens de salut**
58. *Le Pardon du PéchL* — 39. *Le Pécheur obtenant sa grâce au tribunal de V¹²*
— 40. 11 n'est pas difficile d'être Chretien. — 41. *La double loidans le c<X^{ur}
Vhomme.* — 4²« *Vccux inconside'res.* — /[\d] Fermete'de principe et inconsM^c
— 44*. *La Constance du Chrétien.* — 45. *J'e la lecture de l'Ecriture sainte-*
46. *Eternite' de la parole de Dieu.* — 4;. *La YchU chretienne dépend-elle de l'M^r
d'un siecle et des mcccurs d'un pays?* — 48. *La Vie de Vhypocrite.* — 49*
Triomphe du pècheur. — 50. *L'Endurcissement volontaire.*

CINQUIEME VOLUME, ou TOME III. i^e Partie. — 1. *Meditation pour le ^
mencement d'une nouvelle annce.* — 2. *La Providence.* — 3. *Le ISom de VieU"*
4. *Le Règne de Dieu.* — 5. *Notre dépendance de Dicu.* — 6. *Le Courage ne'eess**
ik la vertu. — » 7. *Négligence pour faire le bien.* — 6. *Juste appréciation des ffl*

Pemens de noire ame. — 9. *L'Apparence et la realite.* — 10. *Le Conflit des devoirs* — 11. *L'Homme et ses actions.* — 12. *Le Sage aux prises avec sa destinee.* — 13. *L'Homme createur jes propre destinee.* — 14. *Soumission conscientieuse to Chretien a la hi et au gouvernement.* — 15. *Grandeur d'ame d'un chretien.* — *6- *La Prudence mondaine et la Sagesse chrdtienne.* — 17. *Le Prix de la vie* — 18. *Erreurs des hommes de Men dans Vappreciation de la vie.* — 19. *La Calomnie,* — 20. *La Douleur dese voir m'connu* — 21. *Le Danger de mcconnaitre etde juger to autres.* — 22. *Les Passions.* — 23. *Les Bicnfais de la solitude.* — 24. *L'Art d'hrc heureux.* — 25. *L'Homme mecontent de son sort present.*

SIXIEME VOLUME, ou TOME 111. 2^e PARTIE. — 26. *Bonheur paisible.* — 27. **sDonsde la fortune. — 28. *Les Jugemejis de Vopinion.* — 29. *Prejugés pour et centre les ckoscs nouvelles.* — 30. *La Foi en la vertu humaine.* — Si. La Puis-
»cc de la virilL — 32. *Le Monde niroir de Vhomme.* — 33. *Vhomme propose,
^u dispose* — 34. *La Connaisance de soi-même.* — 35. *L'Egahté de Vame.* —
36- *L'Inquietude sur Vavenir.* — 57- 0« souts de la fortune. — 38. *Diminution du.
hic n-étredomestique.* — fy. *Les Souffrancees passe'es.* — 48 L'Homme autcurdc
ses souffrances — 4i. *Vivr'edans le présent.* — fa *Dangers des reveries de
Pagination* — 43. *L'Amour-propre.* — 44. *Le Chretien dans les heures de
tolasscmtn.* — 45. *Les Soucis.* — 48. *Lgt quelques Vefauts ordinaires a ceux qui
c1*rchcnt u'ameliorer leur fortune.* — ttf. *La Discretion dans les paroles.* — 48.
^temperance de la langue. — 49. *L'Annivenairc dc la naissance.* — 50. *Pour
la ttn de Vannc'e.*

SEPTIFIEME VOLUME, ou TOME IV. 1^{re} Panic. — 1. *Sentimcns qu'on e'prouve
«u jour de Van.* — 2. *Qui est mon prccchain?* — 3. *Obligation de donner un bon
excniple.* — 4- ^{Sur lc} *penchant a dc'primer les autres hemrnes'.* — 5. *Reconnaitre
k mfrit' e fautrui.* — 6. *Vlnsociabilitc.* — 7- 0 « *Preventions dans le cours
Winairedclavie.* — \$• *L'etragtr.* — 9. *La Prudence dans les Discours.* —
10. *LeServient.* — 11. *La De'licatesse de conscience.* — 12. *Le Baiser du trattro.*
^ 13 *De la fidelite dans les petites choses.* — 14. *La Restitution.* — 15. *Sources
Cities inconnues.* — 16. *Rupture de VAmitié.* — 17. *D'''*TM* . ** ''<;<*•*
^ 18. *Nos propres avantagesetccux des autres.* — lg. *L Jmmittie du mediant
^eve Vhomme de bien.* — 20. *Comment le Chretien defend son droit* — ai. *La
^nqeance.* — 22. *La Victoire sur ses adversaires.* — 20. — U *Chretien et ses
^ncmis.* — 24. *La Reconciliation.* — 25. *Souffrir pourautrui est une jouissance
Weste.*

HUITIEME VOLUME, ou TOME IV. 2^e Parlie. — a6. *La ChariM tolerante.* —
^7. *Estime pour ses inferieurs.* - »8. *Nc point abuser des faiblesses d'autrui.* —
^9. *L'Envie* — 30. *Les Soucis.* — 3i. *Le Luxe.* — 3,. *L Ingratitude.* —
55> *Défauts'dcs Bienfaiteurs.* ~H- *La Douceur et la Patience subjuguent les exurs.*
^ 35. *i jollcur* — 36. *Biens le'gitimcs ct Biens mal acqms.* — ly. *Respect
J o ^ les biens d'autrui.* — 38. *Le Prix de Vhomme.* — 39. *Les Aveugles et les
^ds Muets* — 40. *Fain l'Aumtne avee sagesse* — 41. *Le Suicide (premier
Scours).* — 42. *Le Suicide (second discours).* — 43. *Appcitions de Morts, et
^res sentimens* — 44. *Bonne Renommée apres la mort.* — 45. *Des Predictions.*
^ 46. *Devoirs envers les Morts.* — 47. *La derniereVolontL* — 48. *Devoirs
^r5 les animaux.* — 49. *Considcrez la fin.* — 50. *Pour la fin de Vannée.*

*Extraits de plusieurs Journaux de Paris sur les MEDITATIONS
RELIGIEUSES, en forme de Discours, etc.*

Extrait du Constitutionnel.

Les MEDITATIONS RELIGIEUSES (*Stun(lender Andachi)*) sont regardées en Allemagne comme un code de devoirs civils et publics, destiné au chrétien et au citoyen. Elles offrent une grande variété, et paraissent avoir d'eux-mêmes de ce point de vue : « Perfectionner la religion, la supposer des formes vieillies, la réduire à ses principes, & sur une lumières morale. » Ce recueil précise ce que doit être la physionomie religieuse du 19^e siècle.

Dans ces 600 discours les vérités morales et religieuses prennent des formes sensibles, fruits de l'art et de l'imagination de l'orateur. Une imagination vive, une Elocution simple et variée y sont employées pour frapper l'esprit du lecteur. Figurez-vous Massillon, ou un prêtre formé au milieu des lumières de notre quart de siècle, ayant atteint la portée des dernières vues des études, s'adressant à une haute raison abstraite qui existe enfin, que nous voyons, < qui regne, parlant des devoirs de la vie civile, privée, politique. — Cet discours ou ses improvisations seraient d'éontés, et on trouverait du charme à toutes ses images tintes dans les écritures. La raison à cela, c'est qu'il connaît la vie du temps, ses besoins, et descendu la religion et ses préceptes parmi les devoirs les plus simples. Cette tâche, que par une fiction on donne ici à un moindre illustré, a été réalisée dans les morceaux renfermés dans ce recueil. La traduction de MM. Monnard et Gence est digne de ces discours, et reproduit les traits touchants, le coloris, l'effet profond des morceaux originaires. Les chefs de famille se procureront cette collection, source de réflexions utiles. Ils feront passer ces pages animées sous les yeux de ceux qui leur sont chers. 60,000 exemplaires, ou trois millions, ont suffi à picuer, en quelques années, aux besoins de toutes les classes de la société en Allemagne.

Extrait du Journal des Chats.

En Allemagne, les MEDITATIONS RELIGIEUSES (*Stunden der Andacht*) sont dans toutes les familles; et il n'y a pas de livre sur le même sujet, sur la morale et la religion pratiques, qui soit ouvert plus souvent; ou ne cessera de l'y imprimer et en multiplier les éditions. Le succès qu'il y obtient s'explique au sein des mœurs douces et pieuses de ce pays, où la religion est plus claire, où, avec un caractère protestant unique, elle passe dans tous les écrits, et où en parler est une chose toute simple, qui intéressera vivement le peuple; c'est parce que là sa raison est cultivée; c'est parce que l'appui des institutions l'élève depuis longtemps. La nation franchise n'en est point encore là; pourtant elle tourne à la gravité; c'est dans de telles circonstances que des livres aussi vrais, aussi persuasifs, aussi loquents que ces MEDITATIONS, sont des secours pour la raison publique.

Extrait du Messager des Chambres.

La popularité toute populaire que les MEDITATIONS RELIGIEUSES, consacrées à la morale pratique et à la religion claire, ont obtenu au-delà de l'Illinoïs, promue par le succès par les vues mêmes qui remplissent cet excellent livre. Ces vues ont pour objet d'éclaircir la vie actuelle, dans ses diverses conditions, par les lumières de la religion. L'ouvrage expose avec une élégante simplicité, tout ce qui est praticable dans les prescriptions de notre grande loi religieuse. Il console l'homme guide à travers les étapes de la vie, dans ses plaisirs comme dans ses chagrins.

On ne sait pas précisément quels sont les auteurs de ce livre. Qu'importe d'ailleurs l'origine du bienfaït; mais que bûmes soient les mains qui ont tracé ce code si touchant de la vie journalière; celui-là du moins est un livre utile! Il a éclairé plus d'un esprit incertain sur les vues morales, endormi des douleurs, et converti aux doctrines de la sagesse et aux charmes de la vertu. Ces pages sont faites pour toucher toutes les raisons naïves ou sévères; on cultivera et aimera les formes larges du langage.

liibiairic de TREUTTEL et WUBTZ, A. Paris, roe de Lille, n° 17;

\ Slt:\«l:OIRO, UIUNn'RII , N° IK.

ICONES FILICUM

AD EAS POTISSIMUR?

SPECIES ILLUSTRANDAS DELINEATE,

QVM HACTEISUS

VEL IN HERBARIIS DELITUERUNT

PRORSUS INCOCNJTI,

VEL SALTEM NONDUM PER ICONES
BOTANICIS INNOTUE6UNT;

AL'CTOniDUS

GULIELMO JACKSON HOOKER, LL. IX

DOTAMCLS IN ACADEMU GLASGUENSI PKOFESSOIE nEGIO

ET RCGIE ANTIQLIAHIC ET MNJJEAN/E SOCIETATW LONDINI SOD\I.I,

LT

ROBERTO KAYE GREVILLE, LL. D.

RCLAS SOCIETATIS EDINA ET LINN.TANX LONDINI SOI>LI.

2 volumes in-folio sur papier v&lin. (Ouvrage complct.)

Prix des exmplaires, avcc 240 planches en noir. . . 5G0 fr.

— — — en coulenr. . . 600 fr.

La famille des *Fougères*, que. Von compte ge'neValement parmi les produc-tions vc'ge*tales les plus e'le*gantes et les plus gracieuses, et qu'un cdlèbre au-teur français vient d'e'*levcr au rang de *Classe* distincke parmi les plantes, n'est pas encore aussi ge*néralcment connue qu'elle me'rite d^e T6tre. Outre la beaut^ extdrieure des *Fougères*, qui frappe mime l'obsenrateur Ic moins at-tentif, la puissance et la sagesse du Crâteur sc manifestent surtout dans les formes curieuses et varides de Icur fructification Elcs semblent tenir le mi-lieu cntre les plantes *Cotyledonus* et *Acotyledonus*, comme participant un peu des premières, et posse~lant, pour la production de leurs graines, um* plus

PLANTAE ASIATICA E ET AFRICANORES

OU

DESCRIPTIONS ET FIGURES

DE YEN-GOUK.

DE PLASTES INEDITES DE L'INDE OCCIDENTALE

PAR A. W. VILLIMAN M. D. F. H. D.

BUREAUX: 17^e AVENUE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA COMPAGNIE DES INDIES ORIENTALES,

A CALCUTTA,

MÉMÈRE DES SOCIÉTÉS ROYALES D'ÉDINBURGH ET DE COPENHAGUE,

DES SOCIÉTÉS LINNAEENNE, GÉOLOGIQUE ET ROYALE ASTRONOMIQUE DE LONDRES, ETC., ETC.

i Volume M **nantu4 lo-fbl.**, enrichis de 300 figures coloriées avec le plus grand soin.

OUVRAGE COMPLET. — PRIX*: 900 KHAMJL

De teutri 1m (rtada* t*pn̄m du glbbe, l'mtc Orimul* <(urn runt, li plus remarquable MMtfUta/i*4.Ubr «i<rti l'utilité de ses orwbdipons naturelles, i es parfums, l^ MMMIMIU, I * t>mut, IM^O^I md*, en un mo MM objets de commerce les Pttttprtoru.rUmttIJnolMicl^Milt ouz uMortf uine indienne. C T«'»44*!.mtlfrt«l#pi,ttMtii...|rt/t qu'inspirent les végétaux dr l'lod« OriMULT, II »V» but 4* U*of.mj qu'ils soient connus avec tous les détails qu

d'Mtn «UI,MI MI MMM Mduil ft wM|HHHH I t ottyi^a, irr. »». ^u«Wes ponr l«in ^poquM. (MM ttijourd'tmi wrantii, d# M N * H dr Humpi, qui m w*il V»» •«****• toW ftmutir* M« pmpWUe *rai« «u Min« 4M pUoLM I** d« lire exact IMMtd OfUM-Ct d<lt loutr. \mn H(i les, mais fwU d* nnilr«ri ifiiiitfiMi i.i.s, c'est encore 4uit en o«vrMj« que !'«••• putarr IMH «a qtii a rtMWrt tui v^u>x de l'Inde, et leur importance est telle qu'a» Mt«r«IM«eA«rt>.!octeur l»IJRMI,4»A«MMiii publié de utanu mMMAUKii Mr ri/ort« jr«i«|«riMi rt MI l'Herbarium Amboinense.

Le tout dans des éditions dans les conditions les plus favorables pour ntftr au jour un ouvrage aussi parfait que possible sur la situation comme directeur du jardin botanique de Cal-

cutla pendant plusieurs anne'es, et tin sejour dc plus de vingl années duns I'ludc, durant lequel espacc de temps it a exixuUi des voyages considerables dans l'Indoustan., le Napaul, la p^ninsule de Malacca, et les contrees du Banna, l'ont mis a mc'nie d'e"tudier ayee soin les vege'taux les plus rares ct les plus utiles. Aide" des lumie'res des illustres botanistes europe'ens, avec lesquels il.a depuis lonfctemps entretenu une'active correspondence, il a pendant son , dernier sejour en Angleterre public les resultats de ses tongues obser-vations.

T

L'ouvrage, dislribue en *douze* Vivraisons, est entierement termirni et forme 3 vol. grand in-fol., sur papier royal velin, enrichis chacun de 100 plan-ches colorizes avec le plus grand soin.

Les dessins originaux ont ctii faits-d'apres nature, sous la direction de Tauteur, par les peintresde I;i coinpagnie des Intles Orientales. Les descrip-tions soot en latin, langtie universelle, la plus commode et la plus precise poiii¹l'histoire naturellc.

Prix des 3 volumes, en douze livraisons, o« cartonnds, 900 francs.

Autres ouvrages de la Librairie TREITTEL et WURTZ.

OANDOIXE (A. P: de). *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, sive enumeratio contracla ordinum, generum, specierit^nquc plan-tarum hue usque cognitarum.juxta mthodi naturalis normw digesta;* vol. I à VII in-8° 105 fn

CANDOLLE (A. P*. de)Collection de mdmoirespour servira l'histoire du regne ve'getal (formatit en quelque sorte le commentaircdProdrorius): 1°sur les *Melastomactes*; 2" les *Crassulactes*; 3^u les *Qnagraircs*; 4* les *Paro-nicfyiees*; 5° les *Ombelliferes*; 6° les *Loranthactes*; 1° les *Valerianees*; 8° les *Cacties*; in-t° avec planches. — Prix des hnit m(Sinoi)s pu-blics. 68 fr.

CINDOLLE (A. P. de). *Regni vegetabilis sistema naturale; sive Ordines, genera et speciesptantarum, secunditm mtthodi naturalis normas di-gestarum et descriptariiin;* in-8°, vol. I et II. * . . 27 fr.

JAIME SAINT-HILAIRE. Exposition des families naturelles et de la germination des plautes; 4 vol. in-8° avec 117 planches. . » t . . 36 fr.
— Lc m^rne ouvrage, en 2 vol. in-4D, planches en couleur. 96 fr.

HUMUOLDT(A.)ETBONTLAND. PlantesdquinoxialeSjrecueilliesau Mexique,aux Andes de la Nouvelle-Grenatle et au-Perou, avecleur description.— Ou-vrage complet, public en 17 livraisons, formant 2 vol. grand in-folio avec 144 planches. 500 fr.

mtta pendant plusieurs anne'es, et un s'jour dc plus de vingt années dans Tlnde, durant lequel espacc de temps il a executé des voyages considérables dans Plndoustan, le Napaul, la pe'mnsule de Malacca, et les contrées du Rarraa, Pont mis à m'eW d'lstudier avec soin les ve'gctaux les plus rares et les plus utilcs. Aide* des lu mi Sees des il lustres botamstes europe'ens, avec lesquels it a depuis lonfctemps cntretenu une active correspontance, il a pendant son d'crrmer s'jour en Angleterre publié les rdsultats de ses tongues obser-vations.

L'ouvrage, distribué* en douze volumes, est entièrement terminé et forme
J vol. grand in-fol., sur papier royal vellin, enrichis chacun de 100 plan-
ches colonnes avec le plus grand soin.

Les dessins originaux ont été faits d'après nature, sous la direction de l'auteur, par les peintres de la compagnie des Indes Orientales. Les descriptions sont en latin, langue universelle, la plus commode et la plus précise pour l'histoire naturelle.

Prix des 3 volumes, en douze livraisons, ou cartonnés, 900 francs.

Autres outrages de la Librairie TREITTEL et WURTZ.

TNDOLLE (*A. P. de) *Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, nvc enumeratio contracta ordinum, generum, speciemque plan- tarum hue usque cognitarumjuxta methodi naturalis normw digesta;* vol. 1 à VII in-8° 105 fr.

CANDOLLE (A. P. de). *Regni vegetabilis systerna naturale; sive Ordines, genera et species plantarum, secunditm methodi naturalis normas digestarum et descriptarum*; in-8°, vol. I et II 27 fr.

JAUME SAIW-HILAIRE. Exposition des familles naturelles et de la germination
des plautes; 4 vol. in-8° avec 117 planches. • • 1 . . . 36 fr.

— Lc même ouvrage, en 2 vol. in-4o, planches en couleur. . . . 96 fr.

Il*ui>ino*LDT(A.)ETBoNPLAND. Plantes e'quinoxiales,recueilliesau Mexique,aux Andes de la Nouvelle-Grenade et au-Pdrou, avec leur description. — Ou-^{ragecomplet, publid'en 17 hvraisons,formant 2 vol. grand m-fol\o avec 114 planches.} 500 fi.

EXTRAIT DU CATALOGUE
GÉNÉRAL
DES LIVRES DE FONDS
ET EN NOMBRE,
DE LA LIBRAIRIE TREUTTEL ET WÜRTZ,
A PARIS, RUE, DE LILLE, N. 17,
A STRASBOURG, MÉME RAISON DE COMMENCE, GRAND'MJE , N° 15.

JYota. Les frais de reliure se paient en sus des prix de ce Catalogue.

- ADD-AIXATIF.—*Relation de Ptigypre, par Abd-AUatif, thiedecin; traduite dc Parabe, et accompagnée de notes; suivie de plusieurs morceaux inédits, extraits de divers écrivains orientaux, par M. Silvestre de Sacy.* 1 vol. in-4. 1810, ^4 fr. — Sur papier fin collé. 50 f.
— Le m8mc, sur papier vélin superfin satiné. 48 f.
AGINCOUBT (Séroux d'). — *Histoire dc PArt par les Monuments, depuis la décadence au quatrième siècle, jusqu'à son renouvellement au sixième.* 6 vol. grand in-fol. avec 3a5 planches. De l'imprimerie de Didot Paine" 1823. (Ou\rage complété.)
— Le intone, sur papier velin superfin salme. 14^0 fr.
L'ouvrage de M. d'Agincourt tient à combler, dans l'histoire de l'esprit humain, un vide de douze slides. L'entreprise fail de longue haleine, hérinée de difficultés de toute espèce. M. d'Agincourt s'y est hanté tout en lier avec ce rôle persévérant qui unit par l'ensemble de plus grands obstacles. Fixé à Rome depuis l'époque où il fut permis de quitter les affaires, il a employé les dernières années de sa vie à recueillir et à ordonner les matériaux du grand ouvrage dont il avait depuis longtemps conqui et arrêté le plan. L'ardeur qui l'animaient s'est communiquée à un grand nombre de savants et d'artistes, avec lesquels ses couts et besoins étaient en relation, et ils ont fourni à son appeler lui adressant de toutes parts les résultats des recherches qu'il avait provoquées. De cette longue succession de travaux, contenant dirigés vers un même but, de cette longue accumulation de documents puisés partout aux meilleures sources, enfin de ce rare concours de plus vivants habilités réunies sur tous les points du plus vaste sujet, est enfin résultée *VHistoire de l'Antiquité moderne*, dont la publication a été vivement désirée et si longtemps attendue dans le monde littéraire.

Ici nous ne pouvons mieux faire que de laisser l'auteur exposer lui-même le plan de son ouvrage :

« Je l'ai commencé, dit-il dans sa préface, par un *Tableau historique de l'Etat civil et politique de l'Grèce et de l'Italie, depuis la première époque de la décadence de l'Antiquité jusqu'à celle de son renouvellement complet.*

« Après ce tableau général moyenâge, j'envisageai matiérie, et, partourant 1

i.iiis ses trois grandes divisions, j'offre successivement l'histoire de V Architecture, celle de la Sculpture et celle de la Peinture.

« Le titre de mon ouvrage, *Histoire de V'Art par les Monuments*, indique assez clairement le but que je me suis proposé d'atteindre pour faire prouver la marche que j'ai suivie. Ce que les historiens des beaux-arts se sont contentés de dire, je voulais le montrer dans un livre; ainsi c'est à peu près sûrement que devaient parler... Trente années des centaines de monuments plus assidues, des recherches les plus actives, et les secours abondants que j'ai reçus toutes parts ont à peine suffi pour rassembler ces immenses matériaux et pour les ordonner convenablement entre eux sur les planches de mon ouvrage. Celles-ci sont au nombre de trois cent vingt-cinq, dont soixante-treize appartiennent à la lecture, quarante-huit à la Sculpture et deux cent quatre à la Peinture. Les documents dont elles offrent une représentation, soit entière, soit partielle, excèdent le nombre de quatorze cents, et plus de sept cents sont incroyables; gravées sous mes yeux par les plus habiles artistes, elles sont exécutées avec une fidélité dont il y a peu d'exemples.

« Il était indispensable de les accompagner d'une notice détaillée de tous les objets qu'ils renferment: c'est ce que j'ai fait en râgissant, avec l'attention la plus scrupuleuse, une *analyse* des planches, qui contient, outre l'indication précise de tout ce qu'il rapporte de savoir sur chaque monument, une foule de documents précieux qui ne pouvaient entrer dans le tissu des discours historiques... Je n'enlaires de la plupart des intéressantes productions de l'art pendant douze mois sous forme jusqu'à présent plus d'un tiers du texte de l'ouvrage et j'ose croire qu'il offre, sans aucun sujet que j'ai oublié, la collection de faits la plus nombreuse et la plus soignée que existe en aucune langue. »

Il Pour donner une juste idée du modèle de l'ouvrage de M. d'Agincourt, nous transcrirons ici le jugement qu'en porte, dans le *Journal des Savants*, M. Qualremère de Quincy, membre de l'Institut, qui, depuis longtemps, fait autorité en pareille matière par la profondeur de ses connaissances et par la sûreté* de son goût. — « L'ouvrage de M. d'Agincourt, dit-il, a d'autant plus de droits à la reconnaissance publiée qu'il est du nombre de ceux qu'on ne devait guère soupçonner de voir entreprendre et que très probablement on ne l'ira jamais..,

a II a fallu qu'il se renouvelle tout seul son travail et l'utiliser à ces grandes collections de, matériau pour l'histoire que la zette des savants bénédictins n'eût pas pu le temps d'achever. C'est un de ces ouvrages que l'on peut évaluer à 200 francs, et auquel il faut ajouter le prix des documents et des manuscrits dont la recherche personnelle aurait consommé la vie dans un huium.

« On peut comparer. Voyage de M. d'Agincourt, pour le travail et l'utilisation à ces grandes collections de, matériau pour l'histoire que la zette des savants bénédictins n'eût pas pu le temps d'achever. C'est un de ces ouvrages que l'on peut évaluer à 200 francs, et auquel il faut ajouter le prix des documents et des manuscrits dont la recherche personnelle aurait consommé la vie dans un huium.

« II n'est donc point de bibliothèque qui ne doive le ranger au nombre des collections historiques les plus indispensables. v

Cet important ouvrage, publié par libraires à deux éditions, oï nombré de vingt-quatre, est aujourd'hui entièrement épuisé. Les personnes qui n'auraient pas encore fait l'acquisition de ces derniers livraisons pourront le commander pendant six mois.

AGINCOURT (Séroux d'). — Ecceut de Fragments de sculpture antique c»

terracuites. In-4- avec 57 planches et 1 portrait de Paulin, i8i/j. a4 fr.
— Idem, Siurpnyr vulin, 5C fr.

ALMANACH des Dames, pour l'année 1836. 1 vol. in-10, a8ec8 gravures. 0 #*

— Lip. même, pour les années précédentes, chaque volume. 0 #*

Ce journal Almanach, qui paraît depuis le mois d'août, se commande par le bon choix des articles qui le composent. Il vient aux frais de 10 francs, et il coûte, l'an* les prix de 8 francs à 30 francs.

assez ressernS lout co que la science et l'industrie humaiiics out enfanle¹ dans le oures de Pan-
nie, et cepcndlal donncr, dan3 une suite d'articles suffiaamment ctcmius , classés avec ordre
et rcdiges avec clarle", une idee exacle tie loutc découverle, en indiquant scrupuleusement les
sources où Ton peut au besoin. puisez de plus grands details, telle est la tache que remplit
cbaqie annce eel ulile Recueil.

AIUSTOTBLES. — *Aristotelis opera omnia, gr&ce , ad optimorum exemptarium fi-
dem recensu.it, annotationem criticam , throrum argumenta et novam versionem
latinam adjecit J. Theoph. Bulde.* 5 forte vol. in-8. 1791 à 1800. 55 fr.

— Papier fin. 50 fr.

II en a ciu tire quelques cxemplaires sur papier de Hollande.

ATREH£US. — *Athenai Detpnosophistarum libri quindecim. Esc optimis Codicibus
manuscriptis Btbliothecm imperiatis Parisina nunc primum colat's emendaxlt f-
ct nova vers'tone latina, animadversionibus Is. Casaboni alioramque doctorum
virorum et suts, commodes que Indicibus iltuslravit Jok. Schwetgueuser.* 14
torts vol. in-8. 1801 & 1807. ia6fr.

ATHENE. — OEuvres, ou lc Banquet dea Savants; traduil du grec, laot sur
les texles imprimés que sur plusieurs poanuscrls, par Lefebvre de Ville-
btune. 5 vol. in-4. 17S9. 60 fr.

— Les raSmes, sur gnuid pap. d'Annonay. 120 fr.— Sur gr. pap. vel. i5o7r.

I&GGESEM — La Tarlheneide, ou le voyage aux Alpes. Idylle traduitc de
raUemaud par M. Fauriel. Tres joli volume in-12. fig. 1810, 3 fr.

— Sur papier veiin. ,6 fr.

BAR(F.-C.).Recueildes Costumesreligieuxetmilitairesde toutes IesNations.
Ouvrage public en 56 livruisons, formaat6 vol. in-fol. orn6s de pres de
800 sujetcs pcitits d'apres nature i?85. 1200 fr.

tAABAziN. — Fabliaux et Contes des poetes francais des n^p, 12% i3% 14° et
I i5" siecles. Voytz Fabliaux. Wr

UABJAUD et LAKDOIT. — Description dc.Londrcs et de ses edifices. 1 fort vol.
in-8. aveo 4^a plancbes. »8io. 18 fr.

BABTOII (P.-S.)- — Recueil tie Peintures antiques', trouvecs à Rome; imitees
fidèleraent d'apres les dessins colories par Pieire-Sanlc Bartoli cL autres
dessinateurs , et publicé par Caytus, Marielte, Barlhélemy ct Uive. z vol.
grand in-fol. avec 60 planches très soigneusement peintesj et les double?
épreuves au trait. i?85 à 1787. 1200 fr.

— Lcme"me, sur papier dc Hollande, dont 11 n*a etc tire quo 6 exeinp. 2^00 fr.

EATSCU. — Botaniquepour les Femmes; in-8. aveu 101 fig. col. 1799. 6 fr-

BIBLE (la Sainte), contenant l'Ancien et le Nouvcau Testament, revue sur ks
originaux, et retouchée dans le langage, par David Martin; avec l'indir
calioa des passages -paralleles. Kdition stereotype d'Uerhan, d'aprts son
procede perfectionnc. Grand in-8. pa'pier dit cavalier. 1 fort vol.'de 1600.
pages, pouvant se relier en deux vol. . ' • 8 fr.

— LainGme, sur papier grand raisin fin. 10 fr.

Sur papier grand raisin vel in. ao fr*

BIBLE (la Saintc), on le Vieutetle Nouveau Testament, trad, nouvellcment
en francaU, sur Ics texles hebreu et grec, par les Pasleurs ct les Trofce-
eieurs de l'Kglse et de FAcadyuiic de Geneve. 2 loiaeae en 1 vol! iu.fai-
Geneve, i8o5. 24 fr.

assez resscrre" jout co que la science et l'industrie humaines ont enfaate* dans le oours de l'an-ne'e, et cepondanl donner, dans une suite d'articles suffisamment e*tend us, classés avec ordre etrdigés avee clarte¹, une idée exacte de toute découverte, en indiquant scrupuleusement les sources où Ton peut au besoin puiser de plus grands details, telle est la lache que remplit chaque an née cet ulile Recueii.

ARISTOTELES. — *Aristotelis opera omnia, gracie, ad optimorum exemplarium /? dem recensuit, annotationem criticam, librorum argumenta et novam versionem latinam adject J. Theoph, Buhle.* 5 forts vol. in-8. 1791 à 1800. 35 fr.

— Papier fin. 50 fr.

Il en a été tire* quelquea exemplaires sur papier de Hollande.

ATHEKSUS. — *Afhenc Bi Deipnosophistarum Ubri quindecim. Ex optimis Codiribus manuscriptis Bibliothecce imperialis Parisirue nunc primum collatis emendavit; et nova versione latina, animadversionibus Is. Casauboni aliorumque doctorum virorum et suis, commodisque Indicibus illustravit Joh. Schweigfimuser.* 14 forts vol. in-8. 1801 & 1807. ia6 fr.

ATRÉNCE. — OEVRES, ou le Banquet des Savants; traduit du grec, tant sur les textes imprimés que sur plusieurs manuscrit*, par Lcfebvre de Ville-brune. 5 vol. in-4« 1789. 6° fr»

— Les mfinies, sur grand pap. d'Annonay. 120 fr.—Sur gr. pap. vél. i5o'fr.

BAGGESEN. — La Parlhenéide, ou le voyage aux Alpes. Idylle traduite de hillemand par M. Fauriel. Trèsjoli volume in-i 2. fig. 1810. 3 fr.

— Sur papier vilin. .6 fr.

BAR(F.-C.).Recueil des Costumes religieuxetmilitaircsdetoutes les Nations. Ouvrage publié en 56 livraisons, formant 6 vol. in-fol. orn6s de près de 800 sujets peints d'après nature 1785. 1200 fr.

BAHBAZAN. — Fabliaux et Contes des poëtes français des 1 r, 12% i3", i4^e et i5^e siècles. Foyez Fabliaux.

BARJAUD et LANDON. — Description de Londres et de ses édifices. 1 fort vol. in-8. avec 42 planches. 1810. 18 fr.

BAETOII (P.-S.). — Recueil de Peintures antiques, trouvées à Rome; imitéed fidèlement d'après les dessins coloriés par Pietre-Sante Bartoli et autres dessinateurs , et publié par Caylus, Mariette, Bartbélémy et Rive, s vol. grand in-fol. avec 60 planches très soigneusetnent peintes, et les doubles épreuves au trait. 1783 à 1787. 1200 fr.

— Le m6me, sur papier dc Hollande, dont il n*a été tiré que 6 exempl. 2zjoo fr*

BATSCU. — Botaniquepour les Femmes; in-8. avec 101 fig. col. 1799. 6 fr.

BIBLE (la Sainte), contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, revue sur led originaux, et retouchée dans le langage, par David Martin; avec l'indication des passages parallèles. Edition stéréotype d'Herhan, d'après son procédé perfectionné. Grand in-8. papier dit cavalier. 1 fort vol.'de 1600, pages, pouvant se relier en deux vol. 8 fr.

— La niène, sur papier grand raisin fin. 10 fr.

Sur papier grand raisin velin. 20 fr.

BIBLE (la Sainte), ou le Vienxetle Nouveau Testament, trad, nouvellement eu français, sur les texles hébreu et grec, par les Pasleurs et les Professeurs de l'Kglise ct de FAeadénie de Genève. 2 loine3 en 1 vol. in-foJ-Genre, i805. %! &

*- *Idem*, grand in-foL gros caractère.

3g f..

BIBLIOGRAPHIE générat^ee de la France, ou Indicateur raisonné des LIVRANOU-
veaux en tous genres, cartes géographiques, estampes, œuvres de musi-
qUC , et C P A bLi s FranCC, Ct daSS, Par Ordre de malies 5 ^ gces
1798 t i835. 38 vol. m-8. à doubles colonnes.

Get ouvrage bibliographique, le seul en ce genre qui ait été publié en France depuis le commencement du siècle, réunit dans un même cadre tous les travaux des écrivains français et étrangers qui se rapportent aux sciences, aux belles-lettres ou aux arts utiles; il fournit de bonnes et courtes notices de tout ce qui se publie en France, en offre une collection complète, peu coûteuse et commode à consulter, en rangeant les articles par ordre de matières. Il en paraît un volume tous les ans. — Prix de chaque annexe ou volume.

i8 f.

On peut aussi se procurer cet ouvrage par cahiers mensuels, sous le titre de *Journal général de la Littérature de France, etc., etc.* — Prix de l'année, franc de port.

f8 f.

BIBLIOGRAPHIE étrangère, ou Indicateur raisonné et analytique des Ouvrages intéressans en tous genres, publiés en langues anciennes et modernes dans les divers pays étrangers à la France, pendant les années 1801 à 1830. So vol. in-8. dont les six premiers d'un cadre plus étendu.

450 r/

Ce second Recueil, créé pour les ouvrages étrangers, sur le même plan que la Bibliographie générale de la France pour les ouvrages français, lui sert en quelque sorte de complément.

— De la belle Collection, la table générale séparément, ou catalogue systématique des ouvrages qui ont paru dans l'étranger pendant les années 1801 à 1850. 6 vol. in-8.

~0 ff. o/v

BIBLIORÉQUIE (INORVELLE) CLASSIQUE, ou *Collection des Chefs-d'œuvre de la Litterature française*; en 80 vol. in-8. imprimés en caractère dit Cicero, sur beau papier, avec portraits. 1831 à 1836. — Prix de chaque volume, 3 fr.; et 4 fr. 50 c. sur papier velin superieur satiné.

Les auteurs déjà publiés, dont chacun se vend aussi séparément, sont:

Oeuvres de Moltre. 7 vol. — *Oeuvres choisies de P. Corneille.* 4 vol. — *Oeuvres de J. Racine.* 5 vol. — *Théâtre choisi de Voltaire.* 7 vol. — *Oeuvres de Boileau Despraux.* 3 vol. — *Oeuvres de Rousseau.* 2 vol. — *Fables de La Fontaine.* 1 vol. — *Henriade de Voltaire.* 1 vol. — *Poésies diverses de Voltaire.* 3 vol. — *Mélanges de Littérature, etc.* * *de Voltaire.* 2 vol. — *Contes et Romans de Voltaire.* 2 vol. — *Gil Blas de la Diable-Bolteux de Le Sage.* 1 vol. — *Oeuvres choisies de Gresset.* 1 vol. — *Discours sur l'Histoire Universelle, par UossueU* 2 vol. — *J??-sai sur les Mœurs et l'Esprit des Nations, par Voltaire.* 4 vol. — *Siecle de Louis XIV et de Louis XV, par Voltaire.* 3 vol. — *Histoire du Parlement, par Voltaire.* 1 vol. — *Annales de l'Empire, par Voltaire,* 2 vol. — *Histoire de Charles XII par Voltaire.* 1 vol. — *Histoire de Russie, par Voltaire.* 1 vol. — *Aventures de Télemaque, par Fénelon.* 2 vol. — *Petit Cartme de Massillon.* 1 vol. — *Oraisons funèbres de Bossuet.* 1 vol. — *Moralistes et Pensées de Pascal, Maximes de La Rochefoucault, Caractères de La Bruyère.* 2 vol.

*

Les 17 volumes qu'il reste à publier et qui sortent sous presse, sont : *Esprit des Lois, par Montesquieu.* 3 vol. — *Lettres Persanes, par le même.* 1 vol. — *Grandeure des Récits ouvins, par le même.* 1 vol. — *Mélanges de Politique,*

*par Foitain. 1 YOJ. — Melanges de Philosophie, par Ic mSMe. 5 vol.—
OEuvres choisies de Buffon. 6 vol.*

En publant la *Nowelle BibUothlque classiqite* on a pense* qu'à une é'poque où rinstruction morale et la culture de l'Esprit sont devenues plus que jamais un besoin général, une telle collection c'était une entreprise utile au progrès de la raison ainsi qu'au maintien d'un bon goût, et nous n'avons rien tyargné¹ pour en rendre l'excellence digne de son objet.

Nous entendions surtout par *auuturs classifies* les écrivains des 17^e et 18^e siècles qui se sont le plus distingués, non-seulement dans les ouvrages de goût et purement littéraires, mais dans la littérature historique, morale et philosophique.

Afin de donner à cette collection un plus grand degré d'intérêt, nous avons dû la restreindre aux ouvrages principaux qui ont reçu la auction du temps et qui sont considérés comme classiques par toutes les nations de l'Europe.

Trop fréquemment des Miteurs ont pulilié dans choix toutes les productions d'un même auteur, en y ajoutant des pièces non authentiques ou peu dignes de la haute dignité. Nous n'avons point imité cet excès de publication se bornant aux seuls *Chefs-d'OEuvre* choisis avec discernement par le concours et le conseil de plusieurs hommes de lettres distingués. Il en résultera pour les lecteurs, plus ou moins avisés, à leurs diverses occupations, une économie de dépenses et d'argent.

A cet aramage se joint celui d'affirmer le texte revu par les meilleures éditions publiques du vivant des auteurs et comparées avec les éditions subséquentes dont plusieurs offrent des fautes de plus ou moins remarquables. Nous avons ainsi mis tous nos soins pour rassurer le texte et la ponctuation dans leur pureté primitive.

Il nous a paru nécessaire aussi d'accompagner nos éditions de notices, dont plusieurs sont incisives, sur la vie et les écrits des auteurs, ainsi que d'une table raisonnée des malécrits, table qui manque en général aux ouvrages qui en sont susceptibles dans les éditions presque entièrement publiques.

Une exécution typographique très correcte répondra aux soins de la collection, par le choix de caractères neufs, lisibles à l'œil, et par une impression très nette sur beau papier. Chaque ouvrage sera orné du portrait de son auteur, gravé par un des plus habiles artistes. On a dû adopter le format in-8, ce format étant plus convenable que tout autre pour une collection destinée à orner la bibliothèque d'un amateur des lettres.

BIBLIOTHÈQUE universelle des Voyages. Voyez Boucher de la Richnerie.

BUR. — Collection des Portraits des grands-hommes, femmes illustres et autres mémoires de la France, gravés au layus et imprimés en couleur.

48 livraisons avec explications; petit in-folio. 1788 à 92. 384 francs.

BOILEAU DESPRESSEUX. — OEuvres. Édition très soignée, accompagnée de Notices en partie éditées. 3 vol. in-8. 1852. sur beau papier avec le portrait de l'auteur. " 9 francs.

— Les mêmes, sur papier vélin superfin. 3 francs. 50 centimes.

BOISSY-D'ANGLAS (le comte de). — Essai sur la Vie, les Ecrits et les Opinions de H. de Mahuberbes; suivi de Notes, de Lettres et de Pièces inédites. 2 vol. in-8. et un petit volume de supplément. 1819 ;* 1821. 13 francs. 80 centimes.

— Le même, sur papier vélin. 7 francs. 80 centimes.

BOSSUET. — Discours sur l'Histoire Universelle. Édition très soignée, accompagnée de Notices en partie inédites, 2 vol. in-8. 1835. sur beau papier avec le portrait de l'auteur. " " 1 franc. 80 centimes.

Le même, sur papier vélin superfin. 0 francs.

— Oraisons funèbres. Édition très soignée, 1 vol. in-8. 1855. avec portrait. 3 francs.

Les mêmes, sur papier vélin superfin. 4 francs. 50 centimes.

BOUCHER DE LI RICQAHDEBIE. — Bibliothèque universelle des Voyages, ou Notice complète et raisonnée de tous les Voyages anciens et modernes dans les quatre parties du monde, publiés tant en langue françoise qu'en langues étrangères, avec des Extraits élendus de ceux d'entre eux qui sont le plus estimés sur chaque pays, efforts vol. in-8. 1808. 5 J fr.

— Le même ouvrage sur papier vénin. Jfr f_r

Le grand nombre de relations de voyages qui nous ont fait connaitre tous les parties du monde, a fait désirer depuis longtemps une *Bibliothèque universelle des Voyages* soigneusement classée par ordre de pays et dans un ordre chronologique.

L'auteur a consacré six dix années de sa vie à exécuter ce grand travail; et, tout en faisant la nomenclature de tous les ouvrages publics sur chaque continent, il a eu l'ingénieuse idée de faire connaître ce que chaque pays offre de plus remarquable, en donnant l'extrait plus ou moins étendu du meilleur ouvrage qui en traite.

BRUNNER (le docteur). — Livre de Prières et de Méditations religieuses, à l'usage des Chrétiens éclairés de l'église catholique; ouvrage traduit de l'allemand, et révupar M. Gauze. 1 vol. in-12. 1822. 3 ft.,

BUFFON et GÉNÉAU DE MONTBELIARD. — Histoire naturelle des Oiseaux.

10 vol. in-folio, très grand papier (Imprimerie royale), 1⁸35 ^ ^ 86
^20 fr.

— Collection de 1008 planches d'Oiseaux enluminées, pour servir à l'intelligence de l'histoire naturelle des Oiseaux, par Buffon; format grand in-fol. 1008 fr.

La même Collection, format grand in-4. ^56 fr

« Cette Collection de planches enluminées de Buffon, dit M. le baron Cuvier, est devenue la Collection fondamentale et classique de figures pour l'étude de l'ornithologie, celle qui comprend le plus d'espèces et les fait le mieux connaître, celle que les naturalistes sont toujours obligés de consulter et de citer, malgré les ouvrages infiniment plus magnifiques dont cette branche de la science a été enrichie dans ces derniers temps. »

M. le baron Cuvier ajoute: « Aucune des Collections existantes, n'est plus complète, à beaucoup près; ou pourrait dire même qu'en ayant regardé tout ce qu'un pareil ouvrage exige, aucune n'est aussi parfaite; car il n'en est aucune où les détails des formes du bec et des pieds, ces parties si essentielles à la détermination des genres, aient été ex primés avec autant de soin. »

BUFFON — OEUVRES choisies. 6 vol. 111-8. avec le portrait de l'auteur (sous presse).

BUSGHIKG. — Geographic, nouvelle édition originale, revue et augmentée. 16 vol. in-8. J⁸5 à 1797. Q_o fr.

CAMPAIGN (the) of Waterloo, illustrated with Engravings of les Quatre-Bras, la Belle Alliance, Hougomont, etc. and other principal Scenes of action] together with a grand view of the Battle, on a large scale; 1 vol. grand in-folio avec planches en couleur et plusieurs planches de portraits en médaillon, et fac simile. London, 1816; % 6p fr.

CAMPION (Henri de). — Mémoires contenant des faits inconnaissables sur une partie du règne de Louis XIV, et les premières années de celui de Louis XV. 1 vol. fn-8. 1807. 5 f.

CAUDOLLE (Aug. Pyrame dc). — Regni vegetalium Systema naturalis; *i, r. Ordines, Genera et Species Plantarum, secundum methodi naturalis normam. digestarum et scriptarum, Volumen primum: iustitiae Prolegomena et Online*. 5 f.

- quinque, nempe: Ranunculaceas, Dilleniaceas, Magnoliacea*, Jnonaceaset Menispermneas; in-8. de 568 pages. 1818.* 12 fr.
- *Idem, voluinen secundum: sistens ordines sex, nempe : Barberidas, Podophyleas, JSympheceaeas, Papaveraceas, Fumariaceas et Cruciferas; in-8. de ?50 pages. 1821.* 15 fr.
- CdKDO[LE(&ug Pyrarne de). *Prodromus Systematis naturalis regnive vegetabUis; sive enumeralio contracta ordinunt generum specierumque plantarum hue usque cognitarum; in-8.Tom. I. Sistens Thalamiflorarum Ordines LIV. 182/;.* 18 fr.
- *Idem. Torn. II. Sistens Calyciflorarum Ordines X. 1825.* 1G fr.
- *Idem. Tom. III. Sistens Calyciflorarum Ordines XXVI. 1826.* 12 fr.
- *Idem. Tom. IV. Sistens Calyciflorarum Ordines X. i830.* 17 fr.
- *Idem. Tom. V. Sist. Calicereas et compositarum tribus priores. *836.* 17 fr.

Le nombre immense des Ve*ge'taux connus aujourd'hui et le besoin absolu que les Botanistes entrent chaque jour davantage (Tune énumération complète des Ve*ge'taux connus, faite d'après les principes de la mfohodenaturelle, dont Us appuScient de plus en plus Futilité* et l'importance, ont décidé M. de Candolle à interrompre raumentane'ment la publication de son *Sistema*, pour donner, sous la forme la plus abrégé'e possible, un *Précédwrnui* qui fera connaître l'élat actucl de la science botanique, et pre*sentera : 1° Les caraclères des classes et des familles naturelles réduits à leurs termes les plus simples; 2° Les caractères abrégés des genres avec indication de l'auteur qui les a établis, et une description où les détails du genre sont sp&ifiés; 3° Quant aux espèces, on j trouvera pour chacune d'elles, son nom, l'indication de l'auteur dont la nomenclature est adoptée, la phrase caractéristique, le signe qui indique Ja dur^e, la patrie, etc, etc. Tous ces objets sont résumés de telle sorte, que chaque article d'espèce ne contient que trois à quatre lignes. On a donné un soin particulier à classer les espèces dans les genres, de la manière la plus propre à faire voir les degr^s r^els des affinit^s réciproques des plantes.

- CANDOLLE (de). — Collection de Mémoires pour servir à l'Histoire du règne végétal, format in-/j. avec planches gravées.
- Premier Mémoire : sur la famille des *Melastomactes*; in-4- avec 10 planches. 1828. 10 fr.
- Second Mémoire : sur la famille des *Crassulacées*; in-4* avec CG *5 planches. 1828. 10 fr.
- Troisième et Quatrième Mémoires : sur la famille des *Onagraires* et des *Paronychides*; in-4* avec 9 planches. 1829. 8 fr.
- Cinquième Mémoire : sur la famille des *Omnellifères*; in-4- avec 19 planches. 1829. 15 fr.
- Sixième Mémoire : sur la famille des *Loranthacées*; in-4* avec 12 planches. 1830. 10 fr.
- Septième Mémoire : sur la famille des *Valérianées*; in-4. avec 5 planches. 1832. 5 fr.
- Huitième Mémoire : sur la famille des *Caciques*; in-4, avec 10 planches. 1834. 10 fr.

L'auteur n'ayant pu, ni dans le *Prodromus* dans le *Quarr de Botanique* qu'il publie, donner sur certains points de la science les développements qu'il paraît nécessaire pour fixer l'attention des botanistes, a cru devoir publier séparément une série de Mémoires servant à compléter aux deux ouvrages ci-dessus mentionnés, et dont dix form front un volume. Cel ouvrage, accompagné de planches et de même format que les Mémoires du Muséum national, se compose de deux parties, à savoir une partie principale, intitulée *Mémoires du Muséum national*, et une partie secondaire, intitulée *Supplément au Prodromus*.

Chaque Mémoire est tendue par drap.

- CAHDOLLB (A. P.de). *Astragalologia, nempe Astragali, Biserrula et Oxytropidis Historia; cumftg.* — 1 vol. petit in-folio. 1802. 54 fr.
CARTE de l'Espagne et du Portugal, d'après Lopez, en 6 feuilles. 12 fr,
CARTE des Environs de Paris, dressée par Donnet; gravé par Michel; in-4*
1824. * 1 f., 50 ct
CAUTE générale des Etats danoid, par Poirson. Uoc feuille. 4 &
CASSAS. — Voyage pittoresque de Tlstri et de la Dal ma tie, rédigé par Joseph Lavallée; ouvrage orné d'estampes, cartes et plans dessinés et levés sur les lieux par Cassas, peintre architecte, et gravé par les meilleurs artistes. 1 vol. grand in-fol. Paris, 1802 (ouvrage terminé). 210 fr.
— Le mēne, papier vélin. 350 fr. — Avant la Icttre. 4^o fr.
CASSAS et BENCE.— Grandes vues pittoresques des principaux sites et monuments de la Grèce et de la Sicile, et des scpt^ collines de Rome, dessinées par Cassas, gravées par Bence, et accompagnées d'une explication des monuments, par Landon. 1 vol. in-fol. athmrique. i8i3. 72 fr.
CATALOGUE systématique et raisonné de la nouvelle Littérature franchise, ou Répertoire général des livres nouveaux en tout genre, quontété publiés en France dans le courant de l'année i835; in-8. i836. , 1 fr.
Depuis le commencement du siècle les éditeurs publient tous les ans un Catalogue systématique et raisonné des livres nouveaux qui sont parus dans le cours de l'année précédente. Prix de la Collection des trente-cinq années. 30 fr.
CATTEAU DB CALLBVULLE. — Tableau des Etats danois, 3 vol. in-8^ avec une grande Carte des possessions danoises. An X. 15 fr.
— Papier vélin. 30 fr.
CHAMPOLLION jeune. — Précis du système hiéroglyphique des anciens Egyptiens, ou Recherches sur les éléments premiers de cette écriture sacrée, sur leurs diverses combinaisons, et sur les rapports de ce système avec les autres méthodes graphiques égyptiennes. Seconde édition, revue par Tautour, et augmentée de la Lettre à M. Dacier, relative à l'Alphabet des hiéroglyphes phonétiques employés par les Egyptiens sur leurs monuments de l'époque grecque et de l'époque romaine. *De l'Imprimerie Royale*, 1828. 1 vol. de texte, grand in-8., et un vol. de planches, précédées de leur explication. Prix des 2 volumes. .^ f.
Cette seconde édition d'un ouvrage, dont la première, qui parut en 1824, fut entièrement (puisque depuis deux années, se distingue de la précédente par d'importantes additions. On y trouve de plus que dans l'autre : 1° Un Avertissement relatif aux progrès actuels des Études historiques sur l'Egypte; 2° La Lettre à M. Dader relative à l'Alphabet des hiéroglyphes, ouvrage documentaire sur ce sujet publié en 1822, et qui manquait entièrement dans le commerce depuis quatre ans; 3° Des développements nouveaux sur quelques points importants de la matière, tirés de monuments examinés par Tautour dans la collection de France et d'Italie; 4° Un travail tout nouveau et très développé sur le fameux passage de l'Egypte d'Alexandrie, relatif aux écritures égyptiennes; travail duquel l'un des nos plus habiles critiques, M. Léronne, donne l'Insistit. Il résulte de cette augmentation que le volume de texte a, dans la seconde édition, 80 pages de plus que dans la première.

Toutes les planches, au nombre de 32, dont un assez grand nombre de format in-folio, ont été refaites pour cette seconde édition. Elle a de plus que l'autre 4 grandes planches in-folio pour le chapitre de deuxième (Lettre à M. Dacier); et *Vocabulaire hannonique Egyptien*, les trois suivantes d'évêque, mis en concordance avec les alphabets brevetés et grecs, B

Lei archive* de la i>o>ar\li:c wpagnola avajent Mu jusqu'a HOS jours fermles, ct les Iroors qu'ellcB gontiennent enfouia ei pcrdui p >ur In science.

Le few roi Charles IV consul, tl y a pluade qu^rnnte ans, Vheuretise idfo tie fair* faip des recherches dans ces drpfrs, si rlcho* en document prteieux et ine'dtols sur la dfooutei te et Bur l'hir. oire de t'Amerique, el sur les navigations »* Espagmi-. II en confia le &oin à M. de Navarrele, ufficier de marine jtlein dezvle cl li'instrucciion, aujoord'hui directeur du D^ptt hydrographiifue de Madrid, drittdeurde l'Acad^mie rnyale d'liisLoire, etc., etc. (> savant distingué¹ a consacre plus de trenle anuses h era l:iliorimiars ,invcali:;iiio:t8j ai^t*. [ar !Vu M. Wu-uo et par U. Tlioaias Oqnzales, pomervaleurdca ardiives da Sittiyncng.

* C'est 1c rrsullal do ces !on;;9 travaux que nous oifrons riujourd'hui au public; it p:ir;iiir:: d'autan plus important qu' noua n'av>n».encore ricn, absolon! rien ilc parfatterocnt autbeuliquesur Tiiisioirede Ctristophc CoIOmb, dr.i ~~et les découvertes cepend~~ laril onl cu une si grandeinfluence sur |OB J>stées de PAmJen-JUotide.fl sur relicas du Niuivcatf.

11 a par u a Lord res une *Ht'noire. de la f're et tics l'*>yp;cs de Christoffie Cofambj mais quelquL* int'rei que puisst; offrir celouvrage, il ne caurnit lenlr lien dr (L-liti que noi:s pu-blioDs. Ici nous voyons Ciiristopbe Colomb <I scs principsux pompa^nonsraconler em-niAmes, ayec une candour reinarqurtfi'i*, l'liatoirc de luur voy;it-'; ils noua foul. partager les émotions divers ts qu'ils onl éprouv<Vs, t'l nous assovu*i>t vu <Ie que sorte a letirs danpers comrae à leurs eucces.Ces documentls ot'licicls du phis II.-KII int'rtri accompiagnent ces rt-iations.

COIIKKILLB (P.) —OEvresohoisies; tidiiuu ires soignee, ai^compagju'e de Notices, en parlie tncdites, sur la vie oA les cciis tic Panic or. /| vol. in-8. 183i. sur beau papier, aveo^jortrnii. is fr.

— Lea infmes, sur papier velin supcifin, iH fr. COBRECI. (le). — Son CKuvpe coinfel, pr'tc6'!t: d'une Notice *sui* Ba vie, reduit et grave nu trait, et public par tandon ; » vol. grand In-4* 50c. * — *Idem*, sur papier ve-lin, format iii-folio. 1uo fr.

COSTAKTINI *Naoia Scelta di Prose UaUcma* (Nouveau Clioxcle'Prose italiennc), extrah des inelleurs auteura, pour Stervii' ;i Tiitudo de cetieldgue. ? vo~ lumesin-ia. 182a, 6 fr.

— *Morale Poeiica itafiana* : in -12. Londrcs • j 821. 4 * at> 0.

DEPPING (G.-B.). — Histoire du Coinmcrc entre le Levant ei l'Kuropc.. ih- puis te^ CfoUtdcs jusqu*a \A foQdation des colonies d'Anicrique; ouvrage couronne par l'Academie des iQ^criptiooset Ueltea-tetrcts; 2 vol. in-S.()e rimpiainetie rople; iK5u. 1;, ;,.

DBSCRIPTIOS du Pachalik de Bagd.id, suiviu d'une Notice liistorique stir-les Wahabis, etc., pur M***, dpubltu p;u- M. Silveslre de Saoy. 1 vol. in 8- 1809. k fr. 50c.

DiODuRus SICWLUS. —*DiodoriSicutl Biblioheca historicse tjhri f/ui supersunt. e tecenswne Petri Wesseimgii, cilm tntcrffretaiioM tttina tour, ilhodomani, atque Qnnotationilisi,<,tarwriini'h,tegrh^ Indicibu&quicidtuptetissintB, Nova tditio, cam commenialionbus lit, Ckr, Gottt, Hey nil et cam argumentis d'tsputaiio-Tiibusque Jtr. Ni<\ Eyringti.* 11 vol. in-8. Blponti. i^jp. 66 fr.

DOMIWICIK. —*Sou* (Xiu/re coinpiet, pn&cde d'uue Notice sur sa vie, ré-dull ft grave an trait, et public par JLindon; 5 Kvraiso&s fortiant t fort vol. gr. in-4. (OuTrage termint':..) r:(t r.

— *Idm, bur* papier veliu, format in-fu!. 100 fr.

Dowjet (Alex.), — Dex-ription des environ? de P;ms, tonsid^re.s sous les •rapports topographique, historique cl monumental, avee uae jolie Carte gravée par Hichelj cl Oa gmures «n loille-douce, reprenant Ics prin-

clpaux Élifices el les Vues pitloresqubs tics sites lus plus remarquablc*

1 vol. gr. in-8. i8a4-

ao fr.

— Le mfirae ouvrage, snr pnpcr vclin superfin saline.

4° fr*

Keaucoup'd'auieurs onl tfcrit sur Paris, mais personne n'avait encore decrit avec exactitude lea environs de cetele capitale, de celle reine desile's. Paris cst pour ainsi dire enveloppc d'une cemture de monuments de tous genres qai, place's A distance i negate et. sou vent grouped ensemble dans un rayon de quelques lietica, p'njsentenl le spectacle le plus vane" et 1« plus intcressam pour loutes Ics classes de curieux.

En cinq excursions qui ont pour but un monument d*une haute importance, commo Fontainebleau, Coropiegne, Versailles, etc., etc., l'auteur de l'oavragc que nous annoncpns conduit]^ voyageurdans lous les Ticuxqai mcridentda fixer son alientioa aot sousle rappori hfjtorfqe, pitloresque, manufaturicr, soil par les monuments des arts qu'ilsoffrent a l'étude cl à la cu-riosite. I/auteur a visile lous Ics liuux qu'il a decrits, mesurc et dtsuind toua lee moaumenls, lous Ics sites qu'i! a representés.

Les planches out e"tē dessinées cl gravées avec on talent remarquable par M. Clcmoece nrcliitecte, et parflJ. Beaugcau*

DCMAS (Ic gaeaal comle Mathiou). — Precis des Evt'inemens mititaires, ou Essaiis historiques sur lea campagnes dc 1799^ 1807, nvec cartes ct plans; in-8. 19 vol. avec 8 atlas in-foi. oblong. u4« tr.

— Le mCme ouvrngR, sur papier v^elin superfin. 4^0 fr.

iV. B. L'liisloirc da chaque campnijne ?e -vcnii s^pnrcment, comint; suit:

Gauipagnede 1799, nouTcille edition eotiorcment rcfonduc. a vol. in-8. el uir'titlas in-folio obfong. 1817. i\ IV.

Carapagnerle 1800. a vol. io-8. CL unnlfas in-fol. tiblong. 1816. 50 fr.

Carapagne dc 1801. a vof. in-8. nt un atlas in-fol. oblong. 1817. 24 fr.

Campagne do 1802. 2 vol. in-8. et un alias in-fol. oblong. 1819. 24 h*

Catnpagne de i863 cti8o4- 2 vol. in-8. et un atlas in-fol. obi. 1820. 24 fr.

Campagnede i8o5. 4 vol. in-8. et un atlas in-fnl. oblong. 1823. 4^ fr*

Cauipagnc de 1806. 2 vol. in-8, et un atlas in-folio oblong, 1824. 50 fr.

Campagne de 1806, suite, ct de 1807. 3 vol. in-3. et un atlas in-folio oblong. i82\< 39 fr.

Cet ouvrage, recommence en i 817, a rc\$u du public eclair^ 1c plus favorable accueil. L'auteur, qui Tavait présenté comme une espce <é chroaique raisonnde, el ainsi qu'il le disait lui-*m&ma* dans son Prospectus, *CQtnnie ime indication de materiaux: pixipatds pour ceux c/ui vaudraient itn jour tcrire Vfisloire*, pa rait, d'aprcs fe jugement des meilleurs critiques, avoir term plus qu'il n'avail promie. C'esl en effet une grande composition, un tableau généra! de lous les éWinements poliliques et militaires. Les campagnes successives ont servi A t'autcur dc divisions clironologiques', mais il ne ev^t paa borne a repr^sooter la sdrie des fails, il n'a pas non plus pretend a </ialj!tr nl juslifier cc qu'on a improprement appell le nouveau syslemo do guerre. II a in\$mc 4vii^ les Tormca didaetiques pour que Je fond de l'ouvrage , c'esl-a-dire !a narration hiefotique, remarquable p4r sa lucidity et son imparlaliu', put coavonir a tous les temps et a loutos les classes dc lecteurs. On ne trouvedans le l<xte quo les observations qui naissent du sujet,ct qui servent de transitions naiurellea pour encbatner lcs ('veucmenisetles circonsances donl la diversity est le GaracteVc distinctif de eelte perioae la plus memorable de Hiisloire moJerne. Les opinions particuliires de Taulenr sont consign!es dans de» nolos qu'il aejritez plus librement el conscientieusement.

Le style deeclouYr.ifC cst correct, eoutenu cl mime oratoirc i In maniOrc des ancien

Let'piecesqualificativs soot pour la plupurt tics documents oriijitiaux et autKentques, el qu'on ne Irofcwraig dans aucuu autre rccocit.

— HISTOIRE de la guerre dans (a Pcninsule ct dan elc Midi de la France, depiris

clpiaux Edifices cl les Vues pittoresques des sites les plus remarquables-
1 vol. gr Vin-8. 18*4. 20 fr.

— Le m^eme ouvrage, sur papier v^élin superfin saliné. 4° &

Beaucoup d'auteurs ont écrit sur Paris, mais personne n'avait encore démontré avec exactitude les environs de cette capitale, de celle reine des dieux. Paris est donc ainsi dire enveloppé d'une ceinture de monuments de tous genres qui, placés à distance égale et souvent groupés ensemble dans un rayon de quelques lieux, présentent le spectacle le plus varié et le plus intéressant pour toutes les classes de curieux.

En cinq excursions qui ont pour but un monument d'une haute importance, comme Fontainebleau, Compiègne, Versailles, etc., etc., l'auteur de l'ouvrage que nous annonçons conduit l'¹ voyageur dans tous les lieux qui meritent de fixer son attention soit sous le rapport historique, pittoresque, manufacturier, soit par les monuments des arts qu'il offre à l'étude et à la curiosité. L'auteur a visité tous les lieux qu'il a décrits, mesuré et dessiné tous les monuments, tous les sites qu'il a représentés.

Les planches ont été dessinées et gravées avec un talent remarquable par M. Clémence architecte, et par M. Beaugear.

DUMAS (Le général comte Mathieu). -*- Précis des Événements militaires, ou Essais historiques sur les campagnes de 1799 à 1807, ^{a TCC} cartes et plans;

in-8. 19 vol. avec 8 alias in-fol. oblong. 240 fr.

— Le m^eme ouvrage, sur papier vélo super-fin. 480 fr,

N. B. L')isloire de chaque campagne ?e vend s^{ame}prément, comme suit:

Campagne de 1799, nouvelle édition entièrement refondue. 9 vol. in 8. et un alias in-folio oblong. 1817. -21 fr.

Campagne de 1800. 2 vol. in-8. et un atlas in-folio oblong. 1818. 50 fr.

Campagne de 1801. 2 vol. in-8. et un atlas in-folio oblong. 1817. 24 fr.

Campagne de 1802. 2 vol. in-8. et un atlas in-folio oblong. 1819. *4 ft*

Campagne de 1803 à 1804. 2 vol. in-8. et un atlas in-folio oblong. 1820. 24 fr.

Campagne de 1805. 4 vol. in-8. et un atlas in-folio oblong. 1822. £8 fr.

Campagne de 1806. 2 vol. in-8. et un atlas in-folio oblong. 1824. 50 fr.

Campagne de 1806, suite, et de 1807. 3 vol. in-8. et un atlas in-folio oblong. 1826. 39 ft.

Cet ouvrage, recommencé en 1817, a reçu du public p^{re}laire* le plus favorable accueil. L'auteur, qui l'avait présenté comme une espèce de chronique raisonnée, et ainsi qu'il le disait lui-même dans son Prospectus, comme une indication de matériaux préparés pour ceux qui voudraient un jour écrire l'*histoire*, paraît, d'après le jugement des meilleurs critiques, avoir tenu plus qu'il n'avait promis. C'est en effet une grande composition, un tableau général de tous les événements politiques et militaires. Les campagnes successives ont servi à l'auteur de divisions chronologiques; mais il ne s'est pas borné à représenter la série des faits, il n'a pas non plus prononcé l'*élablissement* ni justifier ce qu'on a improprement appelé le nouveau système de guerre. Il a indiqué ^{avec} les formes didactiques pour que le fond de l'ouvrage, c'est-à-dire la narration historique, remarquable par sa lucidité et son impartialité, pût convenir à tous les temps et à toutes les classes de lecteurs. On ne trouvait dans le texte que les observations qui naissent du sujet, et qui servent de transitions naturelles pour enchaîner les événements et les circonstances dont la diversité est le caractère distinctif de cette période la plus mémorable de l'*histoire moderne*. Les opinions particulières de l'auteur sont consignées dans des notes qu'il a érigées plus librement et consciencieusement.

Le style de cet ouvrage est correct, soumis et malice oratoire à la manière des anciens

Tes pièces justificatives sont pour la plupart des documents originaux et authentiques, d' où on ne trouverait dans aucun autre recueil.

-Histories de la guerre dans la Péninsule et dans le Midi de la France, deux fois

*80?jusqu'à 1814, publiée par le coiouel Napier et le lieutenant-général cointe Mathieu Dumas (faisan suite au *Precis des tenements m'Uitaires.*)
Voyez NAPJBR.

ENCYCLOPÉDIE DES GENS DU MONDE, Répertoire uaiversel detoutes les connaissances nécessaires , utiles ou agréables dans la vie sociale, et relatives aux Sciences, aux Lettres, aux Arts, à l'Histoire, à la Géographie, etc.; aveo des Notices sur les principals Families bistoriques et sur les Personnages les plus célèbres, morts et vivants; composé par une Societe de Savants de Littératours el (TArlistes, • français et étrangers. i5 tomes °r. in-8° divisés chacun en a vol. — Les i3 premiers volumes sontpublies; le i4me est sous presse. II en paraît un volume tous les trois rnois. Prix de la souscription : 5 fr. le volume; pour les non-souscripteurs le prix du volume est de 6 fr.

L'EmMoc que prcsque tous les journaux français et Grangers ont fait de cet ouvrage nous dispense d'entrer dans de grands détails sur son esprit, son contenu, sa ported, et d'enrelabrir longement le mérite. Ce qui a particulièrement fixe l'attention des critiques, c'est l'unité de plan et d'exécution qui preside à ce travail, la manière dont les articles s'encabinent les uns aux autres et se compétent réciproquement, la clarité avec laquelle les matières, même abstraites, sont mises à la portée de tous les lecteurs, l'impartialité* avec laquelle sont jugées les personnes et surtout les contemporains, enfin la sobriété dont les auteurs font preuve dans le choix et dans la réddaction des articles, toujours substantiels et concis, admettant les ornements du discours,* mais sans longueurs et sans superfluités. « Il suffit, a-t-on dit dans un de nos journaux les plus accrédiés*, il suffit de feuilleter un seul volume de cet immense répertoire pour se former une idée des trésors de science qu'il renferme et pour reconnaître à quel point il peut satisfaire la curiosité* des gens du monde, servir de guide dans les affaires, dans les conversations et dans la vie de famille, et seconder même le savant dans ses recherches. »

Aujourd'hui quedeja 13 volumes de *VEncyclopédie des gens du monde* sont publics (lesquels ont fuyisé les plus fortes lettres de l'alphabet), on peut juger si l'exécution répond aux promesses du Prospectus, si les noms propres dont nous nous étions autorisés (et parmi lesquels figuraient les plus hautes notabilités scientifiques et littéraires) devaient être de véritables garanties, ou seulement un appât jeté, suivant un déplorable usage, à la crudité grand nombre; si c'est un ouvrage de bonne foi et de conscience ou une simple spéculation que nous avons voulu entreprendre; enfin, si Ton doit ou non nous taxer de préemption pour avoir annoncé que notre désir était de faire de *VEncyclopédie des gens du monde* un monument de notre époque, comme la grande Encyclopédie du dernier siècle Ta ^té de la sienne.

Nous ne nous sommes pas dissimulés* les difficultés de cette entreprise et nous n'avons pas la prétention d'avoir constamment satisfait à toutes les exigences, quelques unités étaient inévitables au début jusqu'à un certain nombre d'articles pourra sembler faible, et en cherchant bien, on découvrira sans doute par-ci par-là quelques erreurs; mais le progrès est manifeste d'un volume à l'autre, et les petits défauts disparaissent dans un si vaste ensemble, fruit de l'association de près de 500 écrivains français et étrangers. Voici ce que disait dernièrement à ce sujet un journal quotidien ; « Avec un si grand nombre de collaborateurs, nécessairement à chaque branche à un homme spécial, il était difficile d'entretenir l'unité, et ce sera pour les éditeurs une manière de plus aux yeux des personnes insultées que d'avoir fait courir l'exécution du même plan les opinions quelquefois divergentes de tant d'écrivains dont les talents divers sont toujours utilisés de telle sorte que tous les systèmes qui ont trouvé crédit se trouvent dans un jour convenable, sans se combattre. » Et Ton a ajouté : « Le point de vue que les éditeurs ont choisi domine les préoccupations actuelles et locales, le caractère particulier à leur ouvrage, caractère assez nouveau pour être digne de remarque, connaît dans une parfaite indépendance sous les rapports religieux, politiques et philosophiques,

dans cctc tendance émincminenihisloriquede ne jamaia isoler an fait ou unc ihéorie, de l'itat de civilisation auquel il appartient. »

Chaque article del'ouvrage esl signé'dii nom de son auirur.

*QUOUIM*V Encyclopédic det> gens du monde*, ainsi qne le«lit son litre, nc soit pas spéoialementdcstine'eaux savants, les savants eux mèmesconsulUrontavec fruit un grand nombrcdesef articles, partni Icsquds plusieurs déjà puttiés peuvent Åtre appellésde verilables chefs-d'ajuvre. Qu'il nous soil p.Tinís d'en rappeler quelques-uns: BOTANIQUE, parM. deCamollej CHIMIK, par M. Ajasson do Grandsagne el revu par M. de Berzulius ; ANIMAL, par.M. Cuvier; ACIDES, par M. Orfila; BÉGAISKEM¹, par IVI. Mag. ndie; ACCOUCHMENTS, ALCHIMIE, ANATOMIE, GHO^{*} LÉRA-MORBUS, parM. Ralier; BOLRGOGKEJGONDOTTIEIII,CONSTITUTION, parM.de Sismond^A CENTRALISATION, par M. de Gérando; BOJLEAC/, Saint BERNAUD, CEKSEUHS ROMAINS, par M. Daunou; Saint AMBITOISE, par M. Villemain; ABÉLAHD, ATOMISMS, el BUAHMAMSME, par M. le baron d'Eckslein ; ARMÉNIENS, BOUKHARES el BouDDiiiSME,par foa M. -KKiproih • A T-TILA, B^LisAinh, CATULLE, GOMMODB, CopfsTAisTiw-LE-GnAtID, par M. Naudel; AFRIQCE, £.TAT3 BARBARESQUES, BASQUES, CAI-TE? C^OGRAPHIQUES, par M. le biTon Walckenaer; Lord BYRON el LITTLRATURC AP>GLAJBB, par INI Louis Sp.ici; CESAR el CHAM-LMAOIVE, par M. Mi-clieLel; ALEXANDREI*-, CATHCRIKE II el CHRISTJAMSME, par M. Scltniufer; CATHOLICISME, par M. l'abbé de Labouderie; Saint AUCUSTIN, par M. Pevrue Guillonj BiBLr el CALVIN, par M. Matter; AuTOGnAPHr.s, BIBUOTHÈQULS, CoaAFirLt, p;ir M. Villonase; CLAVDILN, Coa^ELIUs!NBPOs, par M. Viet. Led ere : Col*STANTib-Por.piiYnoGr,isi Th, par M. Hase; ALCMAJT ct CTÉSIAS, parM. de Sinner; CARTHAGE, parJM.deGoll>éry; ANACRÉOW, ARISTOTE, parM. Gui-gniaut; ARIMOPHAAE, parM. Arlaud; CiCER ori, par M. Hinn, COURIER (*Paul-Louis*), parM. Dehriqué ; CASSIODORE el CHOISADES, par M. Schlosser, à Heidelberg j AnT c1 CHATLJUKRIAND, par JNllleOz^nne; AifrcDOTEb et Co^TE, par M:ne la ccmtessi¹ d> Brady; Co>3TA^Tl^opLE, par MM. Berber deXivrey,Sui.kau et l\oulieddri-Elfendi;Co)K,par IM.lecapitaineDuinontd'Urville ; CuLTUiE, par M. Lecirc-Tlioum ; EMPIRE BaTANNiQF E, par M. Dopping; AMOITISSE-ME^T, par fcu JM. Ganilh; ARtHTECTURE, CoLOJl^E8elCoLOK^ADEs, par M. Hillorf; AMYOT, BEAUMARCBAlS, par M. Jules Janin; COMMERCE (*hisioire du*) et CoMMu^E3, parM. Sa\agner; AbSOCIATiOAs, par M. Jules Leclievalier; CLJAS, j\ar M. JDupin aine*; CHARTS, par M. le comte de Viel-Casicl; BASOCHECICOUR D'AMODII, par]l.PaulinParii; CHA^SOT?, parM. Dumersanj BaoGLiE, CALLOT, CHAIILET, par 31. FcuiSlot df Conch«S ; CAHOTA, CHCRUBINI,CONCERT, p^r M. M el; BEETHOVEN, CASTRAT, CLAVIER, Cr-Ancix, CORSKU^SCS, parM. Anders ; ACCORDS et AcajMPAGNriaENT, parM.FetKi CONTREPOIKT par feu M. Pieicha; AWAXAGOBE, AKAXIMANDRK, par M. Jouffroy; COMPTABILITÉ PCBLIODE , par M. Boul.ttignicr; BEAU, BEMAMIN-CONSTAAI) parM. Bervilie; CONSJTITUANTE^ par M. Capefigué; CO>VEATION NATION ALE, par M. Dufauj COMITÉ DE SALUT PUBMC, par M.Lare*ellierp-L(pi aux; CATHER^E DE JMEDIIS et CROMWELL, par M. Am. Renée; DROIT DE CITE, parM. TailJaodicer, BAGXES, par M. Charles Lucas; CHINE, CAMELIA, parM. Ed. Spacli; BIR^ADOTT*, par M. fzarn \ C^STAR.TiN¹ PADLOVITCH, par M^{nic} de LlauicusIrauch, née princesse Gietlroyc; BAR (*conjideratione*), par M. Théodore Momviski, etc., etc. Nous ue pouss.rons pas plus loin celte Enumeration,, bdllante par lei 110ls propres el plus encore par le fond des articles cités : ejle pourrraitcependart dire allonge^ indoliniment et nous nous propo'ons dedi^tribuer procbaincment un Réperoire des artickss lt3 plus importants el les plus indhpensabUs a ronsuller, contenus dans les 13 Volumes ou demi' tomes \6j\ publics, suivantTordre alphab&iqedcs auteurs.

On le \oi!, les savants sont loin d'élrc d'sinléressés dans line telle publication, «t pourlafl e'est de sa tendance à meltre la science à la portée de tous qu'elle tire son principal mér^e* CVst ce qu'a observé judicieusemeDt une feuille anglaise (*LiverpoolJournal*) dans laquelle DOUS avons lu celle relWion fait*» a proposderEntyclopt^dio desgensdu monde : *The French suroass us in many things, certainty in the art producing a popular cyclopedia* (| & Francois nous surpassent en plu^ieurs tlio-es, et cevtainement dans Tail do composer u»¹⁰ **Encyclopédic popubirej.**

En titfet, noire principal objet était d'offrlr I¹ instruction tout dci former >^réabk# et de

la rendre accessible à tous; noas avoas voulu, non-seulement attirer b. elle les gens da ino.'ide, à qui lea affaires et les plaisirs laissenl trop peu de temps pour des étude? suivies, mais encore servir les intérêts de la jeunesse, donl les progrès ne peuvent qu'être faciljtes par le» nolions générales sur chaque branche de science que leur offrira cet ivrage.

Nous avons aussi eu en MJC les intérêts de ce sexe dont l'influence est si grande sur les jge-
rations nouvelles, elqu'un degrade connaissantes plus Sieye* rendraitencore plus digne de belies ocalion. Les femmes, ettpuaantdans, noire Encyclopédie une insrucion sans tongue, y ir^pi-ront aussi ks moyens'de repoudre aux questions multipliers que l'enfanee h ur adresse, et de lui douuer sur chaque chose dt-s Lées exattes sans l^quelles il ne saurait y a\oir de vo-
itable éducation.

L'ouvrage, escompost'ra de IBlooms giandin-8°, sur papier grand raisin, chacun divise en dru\ volumes dc plus de 400 pages à deux colonnes, en petit caraclete nruf, *Ail gailinn/e.* —

MIS csp'i Tons/d'apres les di'jpisilions qui ont tfto faites, que *V6ncjclo>t'die des ^m's du unde* nexcperda pas les 15 tonics anno/KCS. Cependant si, vu la marJie rapiedes ovren-
menis, l'abondance des arolie« soil hisloriques, soil poliiques, exigeaiii, sous >eine d'ltre in-
cbmplel, de dépasserce nombr, nous nous flattons qu'on nous saurait grd de ne pas nous y
asfrcindre irop ri^Dureusomt.

FABLIAUX et Conies des Poëts ftaneais des 11% 12% i3% !/f ct iS'sicciEs,
tirés des meillciirs x\nLcurs; pulilics par Barbazan. Nouvelle cJinon, aug-
menlce clievue par M^{on} 4volumes ifl-8. ornes tie % 180&, sur papier
fin. * 4" fr.

— *Idem*, les tomes III et IV scpareinrent, contenant *VO'vdene de Cherateric*
et le *Casloitmentf* papier ordinaire. ' ' fr.

FELICE (M.-G. de). — K-sai sur Te^piit et le but de rin>iiiiion Bibliquo,
ouvrage couronné par le Coiuile de la Société liiblique prol^tante rle 1\J-
ris. i TOI. 'UI78/1824. ^ 0 IV.

FENKLON_A ventures de Telcmaque. Edition très soignée, accompagnée
de Notices en pailie inédites. a vol. iu-8. 1836. sur beau papier avec le
portrait deTauteur. CIV.

— Les mèmes, sur papier velin superfin. 9 fr.

F^LASSAN flocomte de). — ilistture générale et raisonnée de la Diplomatic
française, ou de la Polilique de la France, depuib la fondation de la mo-
narchiejufrqu'« fi° ^ll r^ 8ne dc Louis XVI, avec des Tables chronologiques
de tous les Traites coucltjs par la France. Seconde édition, corrigée
et conMdérablenient augincntee. 7 forts vol. in-8. 1811. 45 IV.

Le uiëioc ouvrage surp.»pier velin. 90 IV.

— Hisloire du^Jongrès de Vienne, depuis son ouverture jusqu'aux Trailés
du 20 novembre 1815 incluMvemenl, avec l'Aote general du Congrès, les
Annexe?, etc. 5 vol in-8. 1829. ai fr.

Le inëiiiie outrage sur papier vt'lin sating. 42 fr.

FH^DEIVIC II. __ (MSuvrcs complètes de Frédéric II, roi de Prusse. 20 vol
in-8. avec portrait, 1788, edition originate. Go fr,

Sur grand papier velin anglais. ' »o Tr.

OK'-ivrcs liistoriques, déluchées de In colk'ClQM coinplele de ses OLuvres,
ontenant les Mcmolres he firandbourg, ,YHisloir* de mon temps, 1740 à
i;45 ; YllirtoiredelaGtlem de Sept-Ans; Mimoimde 176? a'177f. 6 vol.
in-8. 24 fr.

FHANCOIS DE NEUFCBATEAU.—Institution des Eniants, ou Conseils d'un père à son fils, iraduction libre du latin de Afuret, en vers français; petit vol. in-12, à l'usage des maisons d'éducation. La douzaine. 5fr. 6oc.

FABDIAENDBR (le docteur). — De l'Education physique de l'Homme. 1 vol. in-8. i8i5. ^ 6fr.

GALIANI (l'abbé Ferd.). — Correspondance inédite avec madame 4^e pinay, le baron d'Holbach, Grimm, etc., pendant les années 1765 à 17819 édition imprimée sur les lettres autographes de l'auteur, et accompagnée de notes par M***; précédée d'une Notice sur la Vie et les Ecrits de l'abbé Galiani, par feu Ginguené; avec des Notes additionnelles, par M. Salfi, et accointagnée du Dialogue de l'abbé Galiani sur les Femmes. 2 vol. in-8, 1818. 12 ft.

CANILH.— Des Systèmes d'Economie politique, de la valeur comparative^ de leurs doctrines, et de celle qui paraît la plus favorable aux progrès de la richesse. 1^{re} édition, avec de nombreux additions relatives aux controverses récentes de MM, Mallhus, Buchanan, Ricardo, sur les points les plus importants de l'Economie politique. 2 vol. in-8. 1821. 12 fr.

— Théorie de l'Economie politique. Seconde édition, entièrement revue, corrigée et augmentée. 2 vol. in-8. 1822. 12 fr.

— Essai politique sur le revenu public des peuples de l'antiquité, du moyen-âge, des siècles modernes, et spécialement de la France et de l'Angleterre, depuis le milieu du quinzième siècle jusqu'en 1823. Seconde édition, considérablement revue, corrigée et augmentée. 2 vol. in-8. 1823. 12 fr.

GAUBIL (le Père). — Traité de Chronologie chinoise, composé, par le Père Gaubil, missionnaire à la Chine, et publié par M. Silvestre de Sacy*. 1 vol. in-4. 1814. 15fr.

GOETHE. — Herman et Dorothée, traduit par titaubé* in-18. figures. An ix. • 1 fr. 50 c.

*— *Idem*, sur papier grand raisin vélin, fig. avant la lettre. 5 fr.

GRESSET. — OEuvres choisies. Edition très soignée, accompagnée de Notices en partie inédites. 1 vol. in-8. 1835. sur beau papier avec le portrait de l'auteur. 5 6»

— Le même ouvrage, sur papier vélin superfin. 4 fr. 50 c.

GRIMOABD et SR&VAN (les généraux).—Tableau historique de la Guerre de la Révolution de France, depuis son commencement, en 1792, jusqu'à la fin de 1794? précédé d'une introduction générale, contenant l'exposé des moyens défensifs et offensifs sur les frontières du royaume, en 1792, etc. i accompagné d'un Atlas militaire. 5 vol. in-4* 1808. 60 fr.

— Le même, sur papier vélin. 120 fr*

Cet important ouvrage a pour auteurs deux généraux distingués qui, par leur rang et leurs fonctions, ont été & même de puissants ministres dans les sources les plus authentiques.

GUIBERT (le comte de). — Journal d'un Voyage en Prusse et en Allemagne* 2 vol. in-8. fig. ido4- • 7 fr. 50 c

HAGEB(J.).—Description des médailles chinoises du cabinet impérial de France, précédée d'un Essai de numismatique chinoise, avec des iconogr.

- cisjseinents sur le commerce des Grecs avec la Chine, i vol in-4« papier grand raisin vélins avec gravures, 1805. 36 ft,
- HAGER (J.). — Monument de l'empereur Yu, ou fa plus^ancienne inscription de la Chine, suivie de 52 différenles formes des plusancicnscaractères chinois, avec des Remarques. 1 vol. grand in-fol. pap. gr. raisin vélins superfm double. 1802. 56 fr.
- La Bibliothèque royale de France est le seul dépit littéraire, en Europe, qui possède une topic Gdclede ce monument de la plus baute antiquité j elle la doit au zèle du Pore Amyot, missionnaire en Chine. Dans Sédition que nous en publions, on a mis unsoin scrupuleux a figurer les caracères dans leur forme et grandeur primitives.
- Panthéon chinois, ou Parailèle entre le culte religieux des Grecs et celui , des Chinois. 1 vol. in-4. pap. gr. raisin vélins, avec grav. 1806. 36 fr.
- HALÈBI *historia (selecta ex), e Codice arabuo Bibliotheaca regia Parisiensis edidit, latine vcrlit et adnotationibus illuslravit G. W. Freytag;* 1 vol. in-8. De Ylmprimerie royale, 1819. 1 a tr.
— Sur grand papier vélins. 4 F*
- HAMILTON. — Champs pliçgrôens, ou Observations sur les volcans des Deux-Siciles. Nouvelle édition, revue et augmentée. Ouvrage destiné à faire suite à la Collection des Voyages pittoresques, uotamment à ceux dc Sicilio. do Tabbède Saint-Non et dc Houel. 2 vol. grand in-fol., papier ordinaire, figures en noir. An vn. 200 fr.
- Le même, sur papier vélins, à pUnchus doubles, les unes en noir, premières épreuves, lea autres sur papier de Uollandc, coloriées. 800 fr.
- Sur papier grand aigle de Hollandc, tiré seulement à 25 cxuuplaires en touleur. * 800 fr.
- » HEEREN. (A.-H.-L.).—Essai sur influence des Croisades; ouvrage qui a partagé le prix décerné par l'Instilut de France, traduit de Tallemand par Ch. de Villers, etc.; in-8. 1808. 6 fr. — Papier vélins. 12 fr.
- Mélanges historiques et poliliqch, 1 vol. in-8. 1817. 4 fr.
- IHBIIIEII (C. L r). *Stirpes nova, Descriptionibus e* iconibus illustrates;* grand in-fol. atlant. fascic. I A VII. 168 fr.
- Comas; in-fol. avec 6 planches. 1788. 12 fr.
- HEEODOTI *Historiarum Ubri IX, grace, cum nova versione latina, rarias tectiones, ex quinque Codd. MSS. Parisiensibus eura Boissonnaadii coilaiis, emendas et locupletatas, TFesselingü et Walkenaru ahorumque annoiationes et suas adjecil, cum indice, Jolu Schweighcuustr.* C tomes en 12 vol. in-8. 1816. Papier ordinaire. 0 fr#
- Idem, sur papier vélins grand raisin.* 144 fr.
- Lexicon Herodotem, quo et sty li II erode lei umversa ratio enucleate explicatur, et quam plurimi muSaram loci ex professo illustrantur; passim eliam partim grasea lectio, pariimversio latina quas offert ArgentoraUnsis edilio id vindicatur vel tmendatur; instruxit Joh. Schweighamser Academics regia Inscript. etc. 2 vol. in-8. à deux COIOMHJS. 1824.* 20 fr.
- Le même ouvrage, sur grand papier vélins. 55 IV.
- Co nouveau travail, de M. Job. Schwgbaeuser, est disposé dc manieie k servir non seulement pour Tédilion grecque d'HiWote en 12 vol. in-8, qu'il a publiée en 1816, mais encore pour toutes les éditions grecque de cet historieu, pubWes ju&qu'à ce jour.

- HOMÈRE.** — L'lliade, trad, en vers français, suivie de Notes critiques, etc.,
par E. Aigmin, de l'Instnl; deuxi&me édition, 2 vol. in-8. 1812. la fr.
HooKCl (J.) ol GRLVILLE (U.-K.). — [*cones filicwm : ad eas potissimum species*
illuslrindis deliueatcn, quce hactenus vel in Iwrbariis delituerunt prorsus incognita,
vel saltern no nd ant per icones bolanicis innotucrunt; cum tabulis mneis.
Le texte en latin, av^tf 240 plauche&; 12 livraisons formant 2 vol. iu-fol.
»ap, vil. Londres, 1851. (Ouvrage complet.) Les planches en noir. 360 fr.
— Lc mPme ouvrage, les planches en couleur. 600 fr.
UdRiTirs. Edition mignonne io-64 (chef-d'oeuvre de typographic) Farte.
iP₂8. 6fr.
- IIOBIGANT (A.-C).** — Mceursct Costumes des Russes, représenté en 50 planches coloriées, accompagnées d'un texle explicatif, in-fol. 1821. 36 fr.
Cetie coUeciioo, exJcat^e d'unc manière large et liardie, offre le rare mérile d'une grande exactitude dans U representaiou du costume, ot d'uo vérité frappante da la peinture da caracl^re national; un docteur russe ne voyait jamois ces dessios saQS dire qu'il so crojait iransport^ dans sa pti*
HUBOLDT (A.) cl JjONPtisb.— Planter équinoxiales recueillues au Mexique,
aux Andes de la Nouvelle-Grenade et au Pérou, par MM. de Humboldt
et Bonplaud, avec leur description. 17 livraisons formant 2 vol. in-fol. aveo
i44 planches. (Ouvrige complet.) 5ao fr.
- JAUMC SAI>T-II!LAIHB. — Exposition des Families* uaturelles et de la Germi-
nation di'S Plantesj 4 vol. gr. in-8. aveo 117 planches en noir. 1805.36 fr.
— Le m&me , 2 TOI. iff4 planches en couleur, papier ordinaire. 96 fr.
Lc mOmc, 2 vol. in^4., planches en couleur, pap. vélins. 144 fr.
- IaüriTioHE Cnaisn (DE) *librj quatuor.* 1 vol. petit in-fol., pap. vélins superfia
double, avec le tableau du S&uveur, gravé par Klauber, d'après Stella*
Didot jeune '(très-belle édition)* 4^ fr<
- IMITATIONB CHAISTI (DB) *libri quatuor, ad pervetustum exemplar^ Internarum*
*Consolationum dictum, necnon ad Codices complures ex diversa regione ac edi**
*tione!, CBVO et nota inslgnlores, zariis nuicprimum tectlonibussubjunctls, recen**
ntii etindicibus locupistati. Studio j.-B.-M. Gence. 1 fort vol. in-8. aveo
6 planches , sur papier fin, 1826. 7 fr. 50 c*
- Lc norabre d'&li lions publics *de l'Imitation dp Jdsus-Christ*, en langue latine, en hngttf
iran^ai^e, et en divers autres idiomes de l'Europe, cat incalculable; et cepeodan! aucune jus*
i|ik ce jour n*a 6l& soigncusement collationn^e avec les aociens mauuscrls de ce pr&cieui
livre qui se lvouent dans les dñrverses bibliolhèques de France et des pays Strangers. M. Gence
a le premier entrepris cestudieui iravail avec tout le zèle, la persevérance et Ja sagacitdqu'ofl
lui connat, discutant dans dca no\es les différentes variantea des manuscrits et des e\lkion0
qu'il décril, et a'atfathanta r6tabllr le texte dans sa pureté primitive. 11 pr&cnie apjour'dbui
lo fruit de se&longues et pénibles rechcrebea.
- Déjà nous devons à M. Gence tine tradudioD franchise de cct iniinilable ouvrage, faitc avec
beaucoup d'oniion et ^exactitude d'aprē le manuscrit de son édition latino alors prfite ^
^tre miscsous presse. Cettc traductioaaobtpnu uu suffrage général, et eetdevenne classiqac
en France,
- IMITATION de J'sus-Gbriat^traductiOD nouvelle faite d'après une édition latine
revue sur'les levies les plu9 authenliques, et principaleient sur le plus
adcién inanuscrit en qualre livres, inédit, et conservé à la Bibliothèque
du Roi; par M. J.-B»M. Gcace, £ditit)Q gter^otypo d'Hcrhan, d'après son

procédé perfectionné en matrices mobiles dectrvre. i vol. in-18 de 428 pages. 1820.	1 fr. 50 c.
Sur papier vélin.	a fr. a5 c.
- Le même ouvrage , in-12.	2 fr.
Sur papier vélin.	3 fr.

Par une décision du Conseil royal de l'Instruction publique, en date du 22 mai 1835, les deux éditions de limitation du Jésus-Christ, donnees par M. Gence, Vene en latin, l'autre en françois, ont été adoptées par l'Université pour dire places dans les bibliothèques des colléges et faire offrir en prix aux élèves studieux. Dans le rapport préalablement fait par le directeur du Conseil royal sur les clefs de l'Église, celle en latin est recommandée pour la pureté de Son texte, riche avec soin sur les manuscrits les plus authentiques, et celle en français pour la fidélité de la traduction et l'onction du siège.

IMPROVISATEDR (!) frau?ais, par S. (Recueil de pensées, d'anecdotes, de bons mots, d'épigrammes, etc., appliquées presque chaque mois à la langue française, et classées en forme de dictionnaire). 21 volumes. in-12. 1804 , 1806.

Cvfr.

«T6xjR5ALgeneral*doJa Lillecrainde France, où Indicateur bibliographique et raisonné des livres nouveaux dans tous genres, cartes géographiques, etc. qui paraissent en France, classés par ordre de matières; suivi d'un Bulletin de la Littérature étrangère, in-tij. — Année 1836. Un tableau par mois.

Prix de la souscription pour Tannay, franc dépôt. 15 fr.

— La Collection des ouvrages 1798 à 1835. 570 fr.

Cet ouvrage périodique réunit dans un même cadre tous les travaux décrits dans la France, dressés en quelque sorte pour l'usage des étrangers, des étrangères, des nations étrangères, soulignant le rapport des talents et des lumières.

Il dit sur chaque ouvrage ce qu'il faut pour le faire connaître, fournir aux étrangers des indications, offre aux nations étrangères un aperçu de nos efforts et de nos progrès. Il rassemble pour l'avenir l'étude de la bibliographie et présente d'unes et abondantes matières à l'histoire littéraire de la France.

JOURNAL général de la Littérature étrangère, ou Indicateur bibliographique et raisonné des livres nouveaux dans tous genres, cartes géographiques, etc. qui paraissent dans les divers pays étrangers à la France, tous classés par ordre de matières; in-8. — La Collection des trente années publiée, dont six d'aujourd'hui plus étendue. 450 fr.

Ce Journal, créé sur le même plan que le Journal général de la littérature de l'Europe, est décaliné en quelque sorte à lui servir de complément. Pendant que l'un nous offre un tableau complet des productions scientifiques et littéraires de notre propre patrie, l'autre nous fait connaître les productions intéressantes des nations étrangères dont les traînées sont presque perdues pour nous. Réunis, ces deux ouvrages forment une bibliographie générale de l'Europe; sans doute fournissant sur la bibliographie de chaque nation les renseignements les plus satif- fassants.

IV. B. Depuis le mois de Janvier 1831, le Journal de la Littérature étrangère est réuni au Journal de la littérature de France, et en forme d'annexe sous le titre de Bulletin de la littérature étrangère. Ce dernier ayant une pagination distincte peut au besoin être relié séparément.

Extrait s'd'). — Recueil d'Architecture, représentant, en 34 planches, palais, châteaux, hôtels, maisons de plaisir, églises, jardins à l'anglaise, etc., exécutés d'après ses dessins; in-fol. atlant. 1791. 24 fr.

LABORDE- (de). — Description générale et particulière de la France, ou Voyage pittoresque de la France, ouvrage national, orné d'estarapes, an no rob re rle 828, dessinées et gravées par les artistes les plus distingués de la capitals. 12 vol. gr. in-fol. (publics en 86 livraisons, dont 6 de disc ours et 78 de planches; plus, les livraisons 52 et 60 bis.) J781 à 1796. 1200 fr. Ce grand et magnifique ouvrage, qui est complet, a été publié par livraisons successives.

Les personnes qui n'ont pas la totalité des 12 volumes ou 86 livraisons, pourront se procurer séparément les livraisons qui leur manquent.

LABORDE (de) et ZURLAUBEH. — Tableaux de la Suisse, ou Voyage pittoresque fait dans les treize Cantons du Corps helvétique, 1780 à 1786. Ouvrage complet; première édition, gr. in-fol. 4 vol. pouvant se reliquer 5, lorsque l'on veut que les planches, au nombre de 40, sur 277 numéros, soient intégrées dans le texte. 600 fr.

— Secoix^e édition, 15 tomes formant 8 volumes in-4- de texte, et 2 vol. gr. in-fol. de planches. 450 ifr.

La Suisse^a, riche des plus curieux phénomènes comme des plus beaux sites de la nature, a tellement attiré les voyageurs, et il n'en est aucun qui, après l'avoir parcourue, n'ait désiré de pourvoir, à l'aide des arts, retracer à son imagination les tableaux enchantants dont il avait joui, ou qui, de retour dans ses foyers, n'ait été jaloux de donner à sa famille et à ses compatriotes une idée de ses jouissances, en fourrur et enlumine des images fidèles de tous les objets remarquables qui avaient fixé son attention ou charmé ses yeux.

Place^c presque au centre de l'Europe et considérée par les géographes comme la contrée la plus élevée de celle parmi du monde, la Suisse est aussi la plus intéressante dans son développement intérieur. C'est du sommet des Alpes que jaillissent les sources du Rhin, du Rhône, du Tessin, de la Tarentaise, de la Reuss, de la Inn et de l'Adda. Les lacs qui ornent les chaînes de tous les ordres de montagnes qui entourent la Suisse^b les eaux minérales qui «ourdent de ses rochers, et les plantes salutaires qu'on y découvre^a sont autant d'objets dignes de l'observation du physicien et du naturaliste.

L'histoire de ce pays, les mœurs et les usages de ses habitants, fournit des tableaux et des traits infiniment intéressants. Les Suisses sont la seule nation république et belliqueuse qui, contente de sa liberté, ait été toujours exemple de l'esprit de conquête.

Les Tableaux ou Voyage pittoresque de la Suisse enlaidis dans la vue de faire bien connaître tout ce que cet intéressant pays offre de curieux dans tous les genres, tant à physique qu'à moral, ont été exécutés par le concours de plusieurs savants littérateurs et artistes recommandables^c. La description minéralogique est traitée avec beaucoup de soin et d'exactitude. Ce qui est relatif à l'histoire et aux institutions des cantons de la ligue est en grande partie l'œuvre de M. le général Zurlaub^a de Zoug, membre de l'ancienne Académie des Inscriptions et homme d'état profondément versé dans la connaissance des annales civiles et militaires, de rare^a que des antiquités de sa patrie. La topographie est calquée sur Fribourg, le plus exact et le plus complet des géographes indigènes de l'Helvétie. L'accueil favorable qui a été fait à cet ouvrage, si son originalité, a fait voir combien il était désiré et le succès complet qu'il a obtenu doit faire présumer qu'il a rempli l'attente du public.

N. B. Il ne reste plus qu'un très petit nombre d'exemplaires de la première Edition. On pourra se procurer séparément les dernières livraisons et la Table générale des matières qui manquent dans beaucoup de bibliothèques.

Yk BRUYÈBE. Veuillez Moralistes.

LACHEICUB (ainé). — Ouvrages divers*, Mélanges de philosophie et de littérature. 5 vol. in-8. 1802. 100 fr. — Sur papier vélin. 50 ft*

LACHETELLE (Charles), de l'Académie française. — Histoire de France pendant le dix-huitième siècle. 14 vol. in-8. 1819 à 1826. * 86 fr*

LACETELLE (Ch.). — Histoire de la Révolution française. 8 vol. in-8. 1821 ù 1826.	56 fr.
Sur papier vélin.	11a fr.
— Pour Iudit ouvrage, une Collection de 1 ^{er} gravures in-T*. exécutées au burin, et représentant les principaux événements de la Révolution. 8 fr.	
— L'Amour, avant la lettre et avec les eaux-fortes. " 16 i'r.	
LA FONTAINE (J.), Fables, précédés d'une Notice inédite sur la Vie et les Mérites de La Fontaine, par feu M. Des Renaudis. Édition très soignée, 1 vol. in-8. avec portrait. 185 francs.	6 fr.
- Les mêmes, sur papier vélin superfin*	9 fr.
• V GARDE (le comte de). — Voyage de Moscou à Vienne, par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucharest et Hermanstadt, ou Lettres adressées à Jules Griffith, 1 vol. in-8. 1824, avec le portrait de l'auteur.	7 fr.
LALLMAND (M.-A.). — Traité théorique et pratique des opérations secondaires de la guerre, à Pusnje ¹ des officiers de toutes armes et de tous grades, 1 vol. in-8. et un atlas gr. in-4- de 45 planches. 1826.	48 fr.
Pour dormir une siéde degré d'intérêt qu'offre cet ouvrage, nous nous bornons à rappeler ici l'extrait d'une lettre adressée aux écrivains par M. le général corse Mallieu Dalmatia, dont l'opinion fait nullement en pareille matière.	
« Je viens de faire une lecture très attentive du <i>Traité des Opérations secondaires de la guerre</i> , par le colonel Lallmand. Elle a confirmé l'opinion que j'avais concede cet excellent travail; je trouve que l'plan en est bon, et que l'auteur l'a bien rempli. Je ne balance pas à dire que ce livre classe qui manquait de renommement militaire. Tous les chapitres sont naturellement, et chacun, selon la matière, rat traîler professio. Je n'ai aperçu dans aucun de ces chapitres de principe erroné; les applications sont exactes et toutes simples bien choisies. Enfin cet ouvrage, fruit d'une longue expérience et d'une immense lecture, servira beaucoup les progrès de la science; ce sera un véritable <i>Catechisme</i> des Opérations militaires que les Officiers et écrivains de tout grade se presseront d'acquérir. »»	
^AMBILLE (la princesse de). — Mémoires relatifs à la Famille royale de France pendant la révolution, publiés pour la première fois, d'après le Journal, les lettres et les Entretiens de la princesse de Lamballe, par une dame de qualité (madame Catherine de Foy, marquise de Govion Broglie Solari), attenue au service confidentiel de cette infante princesse. Avec son portrait, 1 vol. in-F. 1826.	11 .V.
^ Sur papier velin superfin patiné.	100 Ir.
^ANDON (C.-P.). — Galerie historique des Hommes les plus célèbres de tous les siècles et de toutes les nations, contenant une Notice abrégée de leurs vies, avec leurs portraits gravés au trait, etc., 13 vol. in-ia. 1805 à 1811.	117 fr.
~- Le tout ouvrage, sur papier vélin satiné.	• a 54 fr.
La Galerie historique peut tenir lieu de dictionnaire historique; elle en présente les principaux ovations sans enfoncer les inconveniences. La plupart de ces dictionnaires sont, ou trop longs, et contiennent une foule de personnages dont on n'a guère le temps de citer l'histoire, ou trop abrégés, et ne présentent qu'une réunion toujours trop nombreuse d'articles rapides qui ne contiennent que des daf66ou des titres. La galerie bisionne au contraire, est un recueil de portraits gravés et illustrés des hommes les plus célèbres de tous les siècles et de toutes les nations. Chaque notice est de 3, 4, 6 ou 6 pages suivant leur importance. Pour justifier l'accueil que le public a fait à ce	

ouvrage, il suffit tie nommrer les principaux collaboratene: MM. Aagrr, de Itaracte, Blot, tfourdois, Cuvier, Durdent, Fcillet, Landon, Lo Breton* Qqatrcinère de Quincy, etc., ck*. Les portraits qui accompagnent cbaque notice ont &e gravés au trait -d'après les meilleurs originaax et 1~~S~~ plus auhentique6. Cet OUTrago se compose de 936 notices et d'aulant de portraits, qui out && distribute aux souscripteurs en 3d livraisons, formaot 13 volumes. Les personues quilje possèdent pas la collection coioplète penvent encore se procurer oe qui leur manque.

LANDON (C.-P.). — *Choix de Biographie anciennéet mod erne, à l'usage de la jeunesse, on Notices sur les Homines illustres des diverses nations, avco leurs portraits gravés au trait, a vol. in-12, avec 44 gravures. 6 fr.

— Lc mêm, snr papier vélén, cartonné. 1 a fr.

Cercueil, qui est admis dans plusieurs maisons d'éducalion, a le double rae'rile d'instruire et d'amuser; e'est un des outrages les pluB propres à éYre offert en présent à la jeuoesse.

LAW DOT? (C.-P.). — Vies et OEuvres des Peintres les plus célèbres de toutes les céoles; recueil classiqoe réduit et gravé au trait. a5 vo). in-4- 6a5 fr.

— Le mllrae ouvrage, Jn-folio papior vélia superOn. 1250 fr.

Cette collection se compose des maîtres ci-après: *Dominiquin etchoix de VALbane*, 3 vol. ; *Haphably* 8 vol.; *Poussin*, 4 vol. j *Michel-Ange, Baccio Bandinelli et Daniel de Volterre*, a vol.; *JLesueur et choix de Jouvenet*, 2t^eol.; *Corrége*, 9 vol.; *Leonard de Find, I'to'en, le Guide, P. Féronhsey* i vol.; *Peinlures antiques*, 5 vol. — Ghaque maître se vend e-
parlment.

Reunir en un aeul corps d'ouvrage tous les travaut du mdme maltrq disperses dans xne foule de cabinets et dans diff'rents pays, en rendre la composition aWc une fidelite* scrupuleusc, les offrir en un format uniforme, graves avec une grande puret^ et pour un prix ex-
trdmement modfré, tel est le plan que l'^diteur des ocuvres ci-dessus s'est proposé, et qu'il a rempli avec une louable perseverance. Quand on considère toute l'influence qu'esercut les beaux-arts sur les moëurs et les habitudes d'uno nation, amsi que sur ses produils industriels, on doit former le voeu quece recueil, si propre à en propager le goût, devienne en quelque fiorte le manuel de tousles artistes,et soil place^t dans toutes les bibliothèques.

LAROCHI: (de).— *Eryngiorum nee non generis nwi AUpidem Uistoria*. Vol. in-
fol. avec 3D planches. 1808. 36 fr.

LA ROCHEFOUCAULD (le due de). — Maxluies et Réflexions morales, avic son portrait écrit par lui-même, et une Notice sur sa vie. Édition stéréotype d'Hcrhau, d'après son procédó perfectionné; in-18. i8ao. 5 c.
Sur pajpier vélén. 1 fr. 50 t.

— Le m^tinc ouvrage, in-ia. 1 fr. — Sur papier vélén. a fr.

— Le même ouvrage, in-8. Voyez Moralistes.

LAVALLÉE-POCSSIN. — Nou'reilo collection d'Arabotques. (Voyez Arabesque.)

LAVAUX(J.-Ch.).— Vie de Frédéric II, roi de Prusse. 7 vol. in-12 avec por-
trait. 1^o fr. 50 t.

— Le mê me ouvrage, en y voi. grand in-8. 3a fr.

La BRBN(J.-B.-P.). — Caierie des Peintres flamands, hollandais ct alle-
inands; ouvrage enrfchi de 201 planches gravées d'après les^n^eilieurs ta-
bleaux de ces maîtres, par les plus habiles artistes de France^ dc Hoi"
landc etd'Alleinagnce, etc. 3 vol. grand in-folio. 1792 à 1796. 300 fr.

Cet ouvrage, comjns6 des seules productions d'une ^colc distinete el sc'par^e, es accom-
pagné d'un txctc daqs lequel M.Lc Brun a dt^veloppé toutc l'étendue des connaissances qu'un*
éudo particulicce dc.Ia ptintupe, one loogae xpériencee et de friqueuts voyages daus I*³

pay Grangers, loi ont fait acqu&rir. — Qaoiqne coronhsocc' en 1776, 11 tt>a Gt6 terming qn'esi <79G, et se trooroit, par la moH de l'auteur, sous le sceJM depots ptusieurs annfcs. Il consiste en :

lo Douze livraiaopi de 13 planches chaquo, UQ premier supplement do 80 planches, an second supplement de 7 planches.

2° Trois volumes de texte, eavoir: le tome I, de 77 feaites d'impression; it, do 29 feuilles; Hf, de i9 feuilles

LBCBAWD.—Monuments fle la Grece, ou Collection del*chefs-d'oBuvre <)*Architecture, de Sculpture et de Peintnre antiques, gravés au trail d'après les mciileurs auteurs, comparés entre eux, et accoiupagnés d'un texte historique, analytique et descriplif, gr. in-fol. avec 100 planch. 1808. 96 fr.
LscnAifD (J.-G.) et LANDON.—Description de Paris et de ses Edifices, avec un Précis hisiorique et dos Observations stir le caractère de leur architecture, et sur les principaux Objets d'art et de curiosité qu'ils renferuicnt. Ouvrage divisé en 4 parties, savoir : la première, figlises et Monuments religieux; la seconde, Palais; la troisième, Places, Fontaines, Marches, Théâtres, Hôpilaflx, et autres édifices d'ntilite publique; la quaUierue parlie, Hôtels et Edifices particuliers. Seconde édition, oorrigée avec soin et considérablement augmantée. a vpl. grand in-8. enrichis de 120 pi. avec un Plan de P.irN et de ses embellissements. 36 fr.

Pour donner une jasle idée des monuments les plus remarquabW do Paris, l'e'diteur a pensé que des plans et des élé\alions g^ométriques qui détaillent & la fois l'^tendue, la distribution et les justes proportionas des &liGces ^taient préférable* à des vues perspectives qui ne donnent qu'un seul aspect et où Ton est oblige" souvent de sacrifier A l'effet pittore&que It's parlies les plus précieuses de Tenseible.

Cet ouvrage doit beaucoup intéresser let artistes, lei amateurs, ainsi que les Strangers qui visitent la capitale, et qui, familiarisés d'avance avec les beaux monuments dontPari6 .offrc un ensemble surprenant, les verroni avec plus de fruit, et en conserveront mieux lo Jtouvenir.

1^{re} SAGE. — GiLBbs et le Diablo boiteux. fidlition très soignée, accompagneM de Nydicea en parties inédites. 4 vol. in-8. sur beau papier, avec le portrait do l'auteür. 1 a f_r.

- Lti mfime ouvrage sur papier vélín superfin. !3 r_r

iEsriEca (E.), — Son OEuvre complet, précédé d'une Notice sur sa vie_f i*-.
duit et gravé au trait, et publié par Landon. a Uvraisons form ant un voL
grand in-4- (Ouvrage complet.) 5₀ f_r.

—Idem, sur papier vélín, format in-folio. 100 ^

HENBEGEa (J.-F.).—Initiatypograph'tca. Opus ctlebccr. 6'cfuepflniVindirias typographical elucubrans, nee non ear am contlnuationem offer ens; in-4.
8!- > 8fr

?roEHE (D.-J.-Ant.). — Hietoire critique de ('Inquisition d*Ecp>g_{CJ}) j e ^
puis l'époque de son établissoient par Ferdinand V, jusqu'au Y^gne d'
Ferdinand VII; tirée des pièces originates des Archives du conseil-de la
Supreme, et dc celles des tribunaux subalternes du Saint-Offirc, etc. Se-
conde édition, revue, 4 forts vol. in-£. 1818. 26 fi.

LOCRÉ (le baron). — legislation civile, commerciale et criminelle 4e la
France, ou Commentairc et Complément des cinq Codes français, tl-
TL i_y etc.; par M. Ic baron Locre, lecretaire-général du conseil d^tat, sou3

le conslat et sous l'empire, officier do la Ligion-d'Honncur, auteur de *VEsprit du Code civil, de VEspirit du Code de commerce, de VEspirit du Code de procédure civile et etc.* 3i forts vol. in-8. 1826 à 185a. (Ouvrage enièrement complet). Prix des 3i volumes. 217 fr.

Cet important ouvrage est distribué* com me suit: le Com men la ire, etc., eur le *Code civil*, forme les 16 premiers volumes; le Commentairo, etc., sur le *Code de Commerce*, Tea tomes 17 à 20; le Commentairc, etc., sur le *Code de procédure civile*, les tomes 21 à 23 ;, le Com iiplaire, etc., sur le *Code d'instruction criminette*, les tomés 24 à 28; enfin, le Coramilaire, etc., sur lo *Code pénal*, forme les tomes 29 4 31, dont le dernier comprend une tal*le généralc et raisonnable des malières de tout l'ouvrage.

L'auteur s'est proposé d'offrir par son travail tout'a la fois le *Commentary* el le *Complément* dc nos Codes.

Le *Commentaire* esl lire⁴ des diverges et nombreuses discussions qui ont précédé["] et préparé chnecn de ces codes, et que lea devoirs de sa charge obligaient M. Locré de rccueillir; c'e6t done en quelque sorte un Commentairc officiel. Le *Complément* donne les lois, tant anle* ricures que postérieures, amquelles les Codes sc re* f6 rent ou qui se réfèrent àces Codes, et les actes du pouvoir exécutif et re"glemenlairedestinés à organiser 1'execution.

L'utilile' d'un tel ouvrage ne saurait Atre con tea tée. Pour connaitre parfaitement la loi, il faut en avoir saisi l'esprit, et cet esprit se révèle Burlout dans les travaux et les discussions dont elle a 6t6 le r&ultat final. La cour suDerieure a phuf d'uno4bis reconnu cc principe-

Le public verra done, sans doute avec plaisir, parailre au grand Jour ces proccs-verbaux. ^ du conseil d'Etat qu'il a tant d'intérêt à connaitre. Ceux du Code civil n'avUient dié publics qn'cn partie, etla partie qui manquait n'est a^aurément pas la moins intéressante sous plus d'un rapport. Ceux des autres Codes Bont onlièrement iné\llt9; et, lorsqu'aux lumières que donnent les procès-verbaux du conaeil viendront se réunir eel les qui jajliissent des autres travaux ptf para to ires, il ne sera plus possible de se tromper sur l'esprit de la loi.

Si le nom sous Iequel pa rait un ouvrage eniièrement compose* dYle'mens officiels pouvait ajoaler quelque chose à son mérift, il en esf peu qui se recommanderaient plus que cclui-ci à l'atteolion publique.

LOCRB (Je baron). — Législation sur les Mines et sur les Expropriations pour cause d'utilité publique, ou Lois des 21 avril etB mars 1810, expliquées par les discussions du Conseil d'Etat, les exposés de tnlifs, rapports , iliscours, et généralement par tous les travaux préparatoires dont die? sont le résultaf; et complétées par los actes de Tautorité publique qui les concernent; 1 fort vol. in-8. de 656 pages. 1828. 8 fr.

Les deux loi** qu'on donne ici avec leur commentaire et avec leur complement sont extraites du livre de la *Législation civile, commerciale et criminelle de la France*, où «*les forment, avec quelques autres, l'appendice da livre II du Code civil.

Cus deux lois constituent la législation sur deux matières de la plus haute importance. Les mines, lef "•"cres, les carrières et les tourbleres 6ont J*obj*t <runie infinité d'enlreprises et de speculations. A l'lgard de l'expropriation pour cause d'uTilité* publico, il n'est pas un eeuil proprie'taire qu'elle ne puisae alleindre.

LOB&KZ (Joli.-Mich. Prof.-Argent.). — *Historic* Gallo-Francce cixilis et sacra stimma.* 4 vol. in-8. 1790. 15 fr.

Cet ouvrage, fruit de quaranle anne'es de rccberches, off>c, on foimc de table et par ore're chronologique, la réunion de tous les fails remarqunbles do Thistoire dc France, rivet: l'indication scrupuleuse des sources où l^iuteur a puist>. C'est une bibliothèque immense on abrège*, également pr^cieuse pour leLude de Tbistoire et iKur le^ recherbes qui y ont rapport.

Louis XIV. —OCuvres complètes, contenant ses Mémoires poliifquesct mi-

— a 5

Htaircs, ses instructions pour le Dauphin son fils; ee\$>agenda, notes et
Ietlre9 particulières; ses ,opuscules liltcraires en verseten prose, avccune
Collection de pièces int̄ressantes, inédites on peu connues, et une No-
tice stir sa personne et son règne, publiées par MM. Grouuelle et de Gri-
moard. 6 gros vol. in-8. avec portrait et 22 planches représentant le fac
simile de Pécriture de Louis XIV, et de celle des principaux personnages.
du temps. 1806. 56 fr.

— Papier vélin.

y% fr.

Cette collection des forits originaux de Louis XIV a été⁴ imprimé⁵c, pour la plus grande
partie, sur des manuscrits authentiques et inédits, dont les plus importants et les plus consi-
dérables avaient élo remis en 1786, pap lo feuroi Louis XVI, à M. le général Grimoard. Ceux-
d ont e'lé collationné^s avec les minutes et fragments autographes et auires qui existent à la
Bibliolhèque royale.

Les ceuvres de Louis XIV eont accompagnécs de notices liisioriques, d'explications, de notes,
do preuves choisies, classics et re'digtes avec un soin digne du sujet.

LUCIANUS. — *Lucianl opera qum extant, omnia, grace et latine ad editionem Tib.
Hemsterhusii et /• Fred. Reitzii accurate express:; cum varietate lectionis et
annotationibas.* IO forts TOI. in-8. 178941795. 70 fr.

MAGAZIN. (*Historlsches*) fitr Verstand void Hertz. (Magasin historique pour
Tcsprit et Ic cœur.) Ouvrage en langue allemande, destine' & servir de
thèmes de traduction; avec un Vocabulaire des mob les plus difficile9.
Neuvième édition. 3 vol. petit in-8. 1829. \ 4 fr, 50 c.

Ce rccueil diiistoiresjntdrossantes, faciles & traduiro qt choisiés avec discernement, est g^
n^ralrment a»lopt^ dans Jcs college* et les penslonnal* pour l'e"tude de h langue allemande.

MALLIOT (J.). — Recherches sur les Coſtumes, les Moeur^, les Usages reli-
gieux, civijs etmilitaires des anclens peuples, d'après les auteurs eklärbes
et les monuments antiques; ouvrage mêle de Critiques et de Préceptes
ntil aux jeunes Peintres, Sculpteurs, Architecles et auires Artistes ou
Amateurs. Public par P. Martin, membre <de la Commission cjes monu-
menrs d'Egypte. 5 forts vol. in-/j. 1809. avec 296 planches grayées an
traih 72 fr.

Cct ouvrage a pour but de fariliter aux artistes l'étude defi costumes et des moeurs des pea-
pies de l'anliqmile, el de leur e"pargner un temps pr^cieux.

L'antcur, en consacrant à ce travail plus de trente aonées de pa via, a voulu offrir on ouvrage
•Mémentaire complct sor le costume des anciens, et ne présenlerquedfrs exemples dont l'au-
thenticil^ esl prouv^e par des monuments el des auteurs célélirea dont il a eu eoin d'indiquer
lenom àc6t6dechaque sujet. < , !

Le premier volume contient dans un trea grand ddtal le rostume, b² mœurs, les usa-
ges, etc., des Romaina, d*apr^9 les médailles el plusicurs aulrcs monuments antiques, en sui-
vant lesdifférents ftfies, depuis Boinulus jusqu'aux derniers empccrcts de Consfantinople.

Lc second voluino renferme des détails du méne genre sur plus de trois cents peuples on
villcs de l'Europe, de l'Asieet de l'Afriqc, notainmont sur les Greçs, les Gaulois, & £trus-
ques et IPS figyplieus, et m&me sur les Chnⁱiens dos premiers siècles de l'£glise.

Le troisiène volume, qui offre un grand inténit, esL exclusivemcnt consacr^t nux costumes,
ma?urset usages des François, dejuii le commencement dc la monatvhie jusqa'an règne de
Louis XIV.Les gravures sont toutes tirées des im'daillo et des monumentsdechaque e'poque,
Chaqne volume'se vendaqssi fi'parément.

luiiN. (P.)• — Histoire de TExpedition française eu Egypte pendant les
années 179ft ^v iBo^.*? vol. in-8. 1815. 10 fr.

MARSILLON.—Petit Carfime. Edition très solgftée, aqcompagn^e de notices tn panic ioédites. vol. in-8. gur bean pap. avec portrait. i836. 3 fr.

— Le mérue, sur pap. vélin superfio. . 4 fr. 50 c.

MAZOIS. — Lc Palais de Scaurus^ou Description d'une Maison romaine; fragments d'un voyage fait à Rome, vere la flnde la république, par Mero-Tée, prince des Suves. (Cadre ingénious pour peindreles mœurs romaines, qui rappelle celo du Voyage (*la jepune Anacliaris* pour la Grèce.) Seconde Edition, 1 vol. ,in-8. orné rie la figures gravées par les premiers artistes, 1822, papier fin, 10 fr.

ft!CDITATIÖKS religieuses en forme de di9cour», »our toutes les époques, circonsiaaces et situatious^de la vie domestique et civile, traduites par MM. IMonnard et Gqge^ d'après ltoivYag©! allenland intitulé : *Stunden der Andacht;* 16 vol. 10-8, imp rimés e» caractère dit *cicero gros ceil.* i830 A 1836. -80 fr.

Cette induction Fran<jaisoGdelo>n irès soignee, d'nnouiTagoqu'oa tie ccesseder^Imprimer en Allemagne^ est maintenantachcvfent Vouvrage te trouve parfaitemeo com plot.

L'auteur dc cet ouvrage, Stranger à tout esprit dc secte et de parti et profondlment verté dans la connaissance des bommes etdc la nature, a d'sveloppé dans cesMéJitnlions, avec simplicity et profootlcur, les gran Jes 6ritcs de la morale etde la religion; et par la divers tie de sujets appropri^s aux différentes rulalions de famille etdc eexe, aux divers âges, états et situations de la sociétd , il afaitdeceavéritcs, dans son ouvrage, 1'applicaiion U plus variéo et la plus dlendue, coiume la plus jusle el la plus ulile.

Lesannonces successives qui ont Ité failcsdecet ouvrage dans divers journaux, sans autre influence que celle de l'opinion, dispensent d'entrer Jans plus de détails sur son ohjet et sur eon execusion. Void comment e'expriment à son sujet deux de oos jourraaux les plus acrédités. (Le *Journal des Débais* et le *Constitutionoel*)

« Les Méditations religieuses (*Slunden der andacht*) peuvent ÿtre, à juste litre, regardé* n corame un code de devoirs civils et publics, destiné au chrltien et au citoyen. Elles off rent « une grande vari^t^ et paraissent avoirete" dcrites de ce pointdo vue : *Faire bien comprtn-dre la religion , la séparef des formes vie'llies, la rendre'a ses principes, à sa lumire u morale,* Ce recueil precise ce que doit être la phyaonomie religieuse du dix-ncuvieioe « èiècle. »

« EQ Allemagne les MÉDITATIONS RELIOIKUSES (*Slunden der andacht*) sont dans toutes k4 families; et il n'y a pas de livre sur le mfluio sujet, sur la morale et la religion pratiques, qui « eoit ouvert plus souvent; on ne cesse de le réimprimer et d'n multiplier leu éditions. Le a succès qu'il y oblienls'explique par les vues mdmes qui remplissent cet excellent livre. Ces « vuesont pour objet d'éclairerla vie actuelle^dans ses diverses conditions paries lumières de « la religion. L'ouvrage expose avec uce élégante eiraplicit^ les prescriptions de notre grande « loi religieuse j il console l'homme, le guide A travorsles Episodes varies de la vie, dans ses a plaisirs com mo dans BCS peincs.

a On neaitpas prćciscinunt quds sout les auteurs dc cet ouvrage. Qa'importe d'ailleurp a rorlglije du bien fait; maisquo bénissoeil Irs mains qui onl tmc^ce Code si loucliant de a la vie journali^re, cclui-là du moins est un livr» utile II a Idairú plus d'un esprit incrtai « sur les vaes morales/ calmf des douleurs et convert! aux doctrines dc la sagesse ct aux a charmes dc la vrtu.

<t Les chefs de fa mi He se procureront rei ouvrage, eouïco da iant de réflexions salutaires. Ib a feront pnsscr cea pages anitu^s 01 persuasives sous les yeux dc' tons ccux qui leur eont « chers. »

MESSIAH^.—Li Messiadc; collection de 20 Eatampes repräsentant les sujets dc la Messlade, poeuic épique de Klopstock, gravées par Joho d'après

les dessins de Fflger, aveo lear description tfrée dc ce poème; volume
in folio, 1815. ^5 f.

MILLING.— Voyage pittoresque de Ccnstantinopole et des rives du Bosphiore,
d'apr̄es les dessins de M. Welling dessinateur et ardbiteete de la sullafie
Da.didge', soeur de Sclim III. a vol. grandjn-fol. doot un de texte etun *dc*
planches, au nombre de 5a, gravées dans de grander dimensions pa:
les artistes les plus distingués de Paris, et publiees en *treize* Hvraisons suc-
cessive*, sur napier velin double superiin* — Guvrage entierement ter-
mini, tpreuvcs avec la lettre. i56p f.

— Le m&me ouvrage, dpreuves avant la lettre. a34o fr,

Ce voyage piftoresquo, que la nouveaute" et l'intérAt da sujet, la bcautf des dessins et la
perfection de la gravure onl déjà place¹ au premier rang des plus curieuses et des plus belles
productions du mdme genre, est da a un artiste distingue' qui a sejoornd dix-huit ans w
Constantinople.

Il a pour objel de fair© connaitre, par les Jre*%et par l'esprit, tine contrde célébre dans les
annales du monJe, et riche des plus merveilleux dons de la nature; de repr̄esenter, avec une
6crupuleuse fidè'lif el dans une suite systcmatique de tableaux, les sites pittor'bques ^
l'Hellespont, Paspect incomparable de Constantinople, et les points de vue ravissants qu'offre
de toutes parts IeBosphore j de peindre enfm une nation entièredans aes monumenls public?
et priv&, dans son costume, dans ses travaux, dans ees cerémonies, dans sea fêtes, dana ses
institutions diverges,dans ses moyens militaires el mantin^es.

L'extrait suivant du prospectus fera connaitre les dirférents genres d'int̄e'e't que r^unit cet
important ouvrage:

« Depuis que l'art de la gravurea donn* naissance auj *Voyages piuoresques*, il y a pcu de
contr^es en Europe dont les sites principaux n'aient v/l6 explores le crayon à la main et re-
produits dans des collections d'estampes accompsnées de descriptions. La capitale de Pumpire
Ottoman et ses magnifiques environs sumblent sculs, jusqu'a ce jour, avoir et& oubliés de no,
artistes. Et cependant, quel pays réunit à un plus haut degre" toutes les conditions, tous les
genres d'tote^t, q»» constituent essentiellement le mérite 4'un voyage pittoresque, que celui
ou tout est grand, riche et vari^dans Iesouvrags de la nature/tout est nouveau, extraordi-
naire dans ceux de l'homme, dans l'homme lui-incrne?

e On avail done lieu d'etre surpris qu'auciiD des artistes qui visilaient *Constantinople et*
ses superbes environs n'eût encore tent<* de nous en offrir le spectacle dans une suite de vues
prises sur les lieux. Mais rdlonnement cessait lor^{qu'on} venait A refl'tebir aux difficultes de
l'Gxticuiion d*un pareil ouvrage. Les moeurs et les préjiTgés du musulman, qu' excitent si
-ivement notro curiosity, fiembent opposor un obstacle invincible à Tétranger qui tenterait
de la satfsfaire. Nat^{rell}<*nient m^fiant, il norte à un ttl point son aversion pour les arts
d'Europe et pour ceux qui It's culiivent, ruflfeessinateur Iui parait presque loujours un
ennemi.

« M. Melling dtait venu très jeun*> & Constantinople. L'atirayante nouveaut^ des objets
Tavait fnpp#, et il employait ses crayons à les reproduce aussi fréquemment que lee circon-
s tan res le Iui pcrmtiaient. Henreusement la fortune sembla sc q laire à favoriscr ses travaux.
Les Turcs, domi il^avait gajnd Taffection par une longue habitude, par sa fariliie" à parler leur
langue et par des nianieres analogues aux leurs, finireot par le voir sans pcine se livrer au
milieu d'eux à des occupations qui, s'il av^it ea moins de Hires à leur confiauce, n'auraient
pas manqué de leur donner de Tombrago. Bieniot il fut appell/- prcs de la sultane Hadidge,
soeur du sultan Sélim III, poar diriger, comme ardiictcte, les tmbellisseracnts de son palaV
Son travail plut au «sultan Iui mGnn' qui le chargea peu apr'r«de coiistiuire dans sa maison de
[rfaisance d* BeiJn'k-Tach un pavilion et une galerie. Dc lors l'emploi que Ton faisait de ses
talents leva jusqu'au moiudre obslacle qui aura it pucn contraricrl'exercice, et tout lui/ut ou-
- it, jusqu'à 1'iDterior aim du serai I. C'cet de eelte q>oqae que, soumeltant a un plan

pulier doe travaus si^nombreuz et si van 'As, if combina celui-ci de maniere que tout ce que Constantinoplo oi les rives du^Bosphorc offrent de sites piltoresques et d'objets interessantfl se trouvât distribué dans quarante-hnii tableaux Il03 entrc eux com me les parlies d'un seul tout, et cependant p ré sen tan t chacun unc scène distinete el complète.

« Après dix-huit annécs de séjottr, M.Moiling quitta Constantinople et vint s'établir à Paris, cspérarl y trouver plus fa(ileipent qu'aillcurs les moyens de publier la rangnifique collection de ses dessins. Son atlente n'a point de* trornpee: des éditeurs ont osé se charger de ceite immense enlrcprise, et ils ont ^té déterminés pnr les suffrages unanimes des hommes les plus éclairés, de ceux surtout que leurs propres travaux rendaient les meilciui juges dans une pa-reille matière. «Cette collection, Jeur fcrivaft fil. le baron Vivant-Denon, joint au mérledo « la plus belle exécution un caractcrede vérité qni sera jusiernent appréciéparlosvoyageurs ft inslruits que l'amour des sciences et des arts a conduits dans cette control. » — « Les vuea « de Constantinople el du Bosphore que m'a m on très IVJ. IMelling, leur mandaît M. 1c comte « de Choiscuil, m'ont surpris par leur exactitude, Jeur vcrilé; clje ne connais rien de rnieux (i exécuté dans ce genre. La collection des estampes précicuses quevous allez publier devien- « dra un supplément nécessaire do in on o^rrage pour ceux qui desirerent se faire unc idée « parfaite de la capitale Je l'empire Ottoman. Cest en grande parlie sous mes yeux. quo <t M. Melling a travaillé; je lai -vu acquérir son talent par une constante étude de la « nature. »

« Dans Texccutron d'un ouvrage tel que le VOYACB WITORE'QUE DE Co?rSTA^IIIroPLE ET DES BIV^SDU BOSPHONIC, la panic la plus importanle sans doule,etcellequi présental le plusde difficult, c'tail la gravure diés (*juaiante-huit* dessins de M. Milling. La, grandeur des planches paraissailld^thesurée; mais elle^tait une condition indispensable qui re'sullait ^vidummcntdu (araclère spcial dc l'ouvrage. Le devcloppemcnt des vues dossincés parM. IM ell ing répondant & l'elendue des sites, à la grandeur, à la riagnificenc dn spectacle qu'il avail sous les)cuk; la moindre réduction, on diminuanlia valeur des détails, aurajl affuibli IVffel de Ten-semble; on 6'est donc determiné à conserver aux plantbes les Tastes dimensions des dessins oiiginaux, ct Texécution en fut coufie'e aux premiers aitistesde lacapilale.

« La rédaction du textc d eg liné* A accompngner les planches, et à faire connatre tous les lieux el tous les objets dont elies offrent une fiiJè'o représentation, exigeait en roème temps la coopération d'un écrivain distingué".

u M. Charles Lacretelca bjen voulu fie charger do rédiger cc texte eur les notes de M. Mc-
lling cl sur des descriptions rédigées avec soin par un voyageur francois, homme très inslruit, qui lui-mftme avait observe chaque site, chaquo point devue, chaquecircongtance des tableaux de M* Melling, et qui souvent de:rivait à ses cölés les objets que celui-ci dessinait; en fin , BUT un grand nombre de communications offertes par diverses personnes à qui Icurs lumières, leur goùt pour les arts, et l'exp'rence arquiso par un lung stjourà Constantinople, ont inspiré le désir et fourni les moyens de seconder le zèle des èVliteurs. Le travail dc ce judicieus historien, correspondent à cbac^HLis planches, Torme sous sa plome Elégante une suite de tableaux oon mo:ns inl^ressaHj^pe crux ausqucls ils sont destines à servir tl explication.

" Une troisiéroo parlie do Voyage pitioresque a dû dtre, à cause dc son importance et de si nouveaule Vobjetc la plus sevère attention; e'est la partie topographiqu. Pour publier un plan de la viile dc Constantinople et deses faubourgs, tanl en Asie qu'en Europe, et uiie carte lopographique du Bosphore et de ses environs, qui, par la grandeur des dimensions et par l'authenticité dc ses dt'lails, re*pondissent au reste de l'ouvrage, il fallait sc livrer, iun Travail neuf, dont les éléments n'existaient encore que dans des dessins matiuscrits. M. Barbier du Bocage a bincn ^oulu to charger dc ceUe lAche p6nible, et il l'a remplie avec une su-périority e*galea celle donl il a déjà fait preuvc tant dc fuis dans la m^rne carrifae. Lns deux inagnifiques carles qu'il a dress'res pour ce Voyage ont élç gravécs par M. F.-P. Michel j les descriptions qui les accompaguent garantissent leur fidélite*, en citant les malcriaux que lautcur a employés pour les con 31 ru ire. On j a joint un plan, indiquaut, par la simple ou-

verrière des angles qui y sao1 traces, la direction et l'ext^endue de la plpart des vues dont se compose l'ouvrage. Il sert Jour ainsi dire do lien à toutes les parties sparées de ce vaste ensemble. >

« On a cru devoir placer en t&e de l'oavrage je portrait de Sdlim III, très soigneusement grave* par M. M&ller, parce que c'est sous son règne et par sa protection que M. Milling .1 executé la belle suite de ses dessins. Le cbiffre impérial Ottoman, en or, orne le litr d'l'ouvrage. Lorsqu'ou 6'efforçait de ne rien oinetrcde lout ce qui pouvaijeontribuer à la pei-faction du Voyage piuoresque de Constantinople, on n'a pu négliger de lui assurer l'avantaj tie Ja plus magnifique execution typographique. Le papier vdlin superfin double qu'on y a em-ploye" a élé fabriqué exprès, el il porte dans sa pale le titre de Touvrage; lo teie a é'le im-prime* par M. P. Didot, et e'est sans doute une des plus belles productions des presses de ce célébre typograplie. P

Ce magnifique outrage, aujourd'huf complet, a été publié en Ireize livraisous succses-sives, dont la dernière renferme la partie topographique, dressée et décrite par M. Barbier du Bocage, le frnlispice et le portrait de Selim III. Les personnes qui n'auraient pas la fatalité de l'ouvrage pourront se procurer s^paremēt les dernières livraisons qui leur manquent.

MEMOIRBS tie M. de falckcnkiold, officier général an service de S. M. le Uoi de Danemarck, & Tepoque du ministère et de la catastrophe, <lu comte de Strucnbée; contenant l'exposé fidMe et impartial des causes étdes circons-tances de cette catastrophe, dans laquelle l'auteur a été lui-même entraîné; et le Hécit de sa duteotion pendant cinq ans dans le fort de Munrkholm; publiés par M. Phil. Secretan, vice-président de la Cour des Appellations sufffimes dir canton de Yaud. 1 vol. in-8. 1826. 7 fr.

MEMOIBER concernant PHistoirc, les Sciences, les Arls, les Moeurs, les Usages, etc. des Chinois, par les Mbsionnaires de Pékin. Toine XVI, sui-vis du Trnile de la chronologie chinoise, par le pcre Gaubil. 2 parties en 1 vol. in-4 1814. • 24*fr.

MEMOIRES sur la dernière guerre entr'e la France et TEspagne, dans les Py-rénées occidentales, par le C. B**, avec une carle militaire, in-8. 1802. 4 f%

MiciM. (Jos.).— F/Italie avant la domination des Romain9; ouvrage traduit sur la seconde édition italienne, par MM***, et accoinpagne d'un Discourb préliminaire et de Notes, par M. flaoul Rochette, de rAcadémie des In-scriptions et Belles-lettres. 4 vol in-8. et un atlas in-fol. de 67 planches gravées en taille-douce, avec une carte de l'Italie ancienne. 1824*. j5 fr.
RICHET-ANGE. — Son Oliuvre compl\$yjLQ6d^e d'une Notice sur sa vie, réduit et gravé au trait, et suivi d'Ira^Toift de l'GEuvre de Baccio Ban-dinelli et de celui de Daniel de Volterre , avec leur portrait, et publié par Landon; 2 livraisons formant 1 vol gr. in-4 (Ouvrage terminé). 50 IV.
— *Idem*, sur papier vélén, format in-folio. 100 fr.

MiaiBCAIT. — De la Monarchie prussiennc sous Frédéric-Ie-Graud. 8 vol. in-8. et atlas. 1788. 48 fr.

IOLIERE. — Ses (fluvres complètes, KrJition très soignée, accompagnée de Notices, en partie inédites, sur la Vie et les écrits de TAuteur. 7 vol. in-8. sur beau papier, avec portrait. 21 ^

— Les mêmes, sur papier vciin superfin. 5x f# *50 c

ONTESQUIEU. — Esprit des Lois, Ldition très soignée accompbgnée dc noli

- ces, ea parlie inéditea, sur cet ouvrage. 3 TOI. in-8. sur beau papier, avec portrait. i836. g fr.
- Le inême ouvrage, sur papier vélinsuperfin 1 fr. 50 c.
- Lettres persanes. %it. très soignée, i vol. in-8. avetrport. i856. 5 fr.
- Les mēuies, sur papier vflin supeifin. 4 fr. 50 c.
- Grandeur et décadence des Remains, Edition très soignée. 1 vol. in-8. sur beau papier, avec fwrtiait. i836. 5 fr.
- Le même,, sur papier vélia superfin. 4 fr, 50 c.
- MOBALI^TES. Pensées de Pascal, Maximes de la Rochefoucauld et Caractères de la Bruyère. Sditiou très soignée, accompagnée dñ Notices en partie incdites. 2 vol. in-8. sur beau papier avec portraits. x836. 6 fr.
- Les mfrnes, sur pap. vélinsupefin.^ g fr. ,
- MORGAN (Lady). — Florence Macarthy, nourelle irlanrfaise, traduile de Tанглais sous les yeux de Pauteur, enrichie de Notes et d'une Préface de sa main, qul ne se trouvent point dans Pédition originate, et ornée de son portrait gravé par Mecou. 4 *ol. in-12. 1819. , 12 fr.
- NORWAY (DupIcsMs). — Rlemoires el Correspondsnces pour servir à l'Histoire de la Réformation et, de? Guerfes civiles et religieuscs en Fiance , sous les r^gnes de Charles IX, fifenri III, Henri }V, Louis XIII, depuis Tan i5^i jus^u'en 1B25. Edition complète public sur les manuscrits originaux, et précédée de» *Me:noires de modame de Mornay* sur la vie de son mari. Merits par elle-même pour TinbtrucHon de son fils. 45 forts vol. in-8. avec le portrait de Mornay. Les sir premicrea livraisons formant les tomes. 11\ XII paraksent. Prix de chaque volume'. , 7 fr.
- Le mGme ouvrage, sur papier vélinsuperfin satiné ; chaque vol. i'4 fr.
- Philippe de IMornaj est sans coatredit un des pUis beaux caractères dc l'Histoirc moderne. Il fut)e rainis're, Ic conseiFer et Tami de Henri IV, qu'il serrit de sa plume et dc SOD £pc« Tout le raonde se rappelle le portrait qu'en fait Voltaire dans *la Ifenriade*.
- Mornay ayant eu part à tous les grabds événements qui ont roarqué la fin du seizicrae et Is commencement du dix-septièmo siècle, les papiors quM a disposes <Jaos les derninc; années desa vie, pour servir il'Hisloire de son temps, contiennent une foule dc documents du plut grand inlf&. Peil après sa mort, Daillf (SOD secrétaire) en puMia deux volumes d la Forêt-sur-S.vre, etplus tard deu% volumes en Hoilaode, diez les Elzevirs. Ces volumes sont pea connus en Frauce, et difficiles à Ifouver. Daille¹ 6!agua beaucoup de pièces int'pressaotes, notamlhentdes pièces qui pouvaient compromettre des horrnmrs encore vivanis. Aussiles Ménoires qu'il puMia off rent une grande ^ uae qui va 6tre reqQ>lic. Les manuscrits origin aux s de Duplesis-JVIornay, qui fa rent religiSPment *come n is al* cunfiés au£ soins des éditeurs, leur pernsettent de publier la partie la plus essentielle de la correspondence et des travai poliliucs deDuplessis. Dans celte collection, toutes les pièces iaiporiantes qui avaient^té supprimées seront rétablies; la auuelle édition comprendra plus da double dc l'ancienne.'Oa y trouvera, de pins, les observations dcDunlessis-Momay sur l'hisloire du président dcTliou, observatinns dont tous les biographes avaient trop prématurément explore* la perte, etquenou^ avons eu le bonheur de retrouver écrits de sa prcppe main.

Les Mfmoires de Mornay ne font point parlie da l'ancienne Collection des *Mémoires sur l'IL'stoivde France*, ni de la nouvelle Collection récemment pubhte parM. Petitot; ils formenta euxseuls un ouvrage important el complet, et pren^roni rang à edit des *Economic* ivyales de Sully*, dont ils feront le peudant nécessaire.

Les tomes XIII, XIV et XV aont sous prtssc.

Mesles (le^J et le G^aie de la Peinture, de la Sculptarc et de VArchitecture;

collection d'estampes au nombre de a;, dossinécs par Angelica Kaafftoann avec ^explication des Ggures. i vol. grand ia-folio, 1789* 56 f/

— Le même, aver fig. imprimées en couleur et retouchées au pinceau. »2 f/
NAPTER (W.-F.-P.) — .Histoire de la guerre de la Poninsule et (tons le
Midi dc la France, depuis l'annēe 1807 jusqu'i Tarnee 1814 , ecrite d'a
près les documents les plus authentiques; traduction revue , corrigee el
accompagnée de Doles par M. lieutenant general comte Mathieu Dumas
auteur du *Precis des Evidnements militaire\$* laquel l'ouvrage du colonel Na'
pier sert de continuation. Tom. I a VIII, in-8. 1828 k 1806. 56 f.

Nous D'avmns point encore d'hisloire generate decelte guerre, dont les tenements ont si
imissamrapnl influe sur le sort des nations europeenncs. Les auleurs miiiairu, francais n'e
⇒ole'crit quedes fragments plus ou moins important*, seloa lapariqueces militaires ont pris
enx-m&nes aux cnic&ents, d'après les divers poīts de vue d'ou ils onl pu les observer sur
< e rasie ihcalre. Le pétäral Foy est le seul qui ait entrepris d'en presenter u_n tableau d'en
emble; mais, trap l6t ravi 41'arraée, aux leltres, comme à la tribune nationale, ce terrier"
^(Slebre 4 ton 1 de litres, n'a pu coniinuer ce qu'il avail si biea commence*. * * *

Les Anglais ont aussi beaucoup &rit atir cetle guerre; inais, si Ton eiccpte le *Jburnal des
sièges entrepris par l'armée anglaise*, il n'a para jusqu'ici que des esquisses imparfaites.
Ouvrage du colonel Napier, l'un des officiers les plus distingués de l'armée anglaise , donne
ne relation complète de tous les événements de cette guerre. Elle est écrive avec clarté, avec
ureie, el avec toute 1 impariaJiW qu on peul, attendred'un ecrivain conscientieux. Toutes les
tuuses politiques y soul indiquees d'une maDiere aussi juste que precise. La situation inlè
rieure de l'Espagne et da Portugal, pendant ccite terrible crise,y est peinte avec de vives
uleurs. L'ouvragedu colonel Napir est rempli dc details enticrement neufs pour nou\$.- il
<-l'e une vive lumiirc sur les ressortg Bcrots de U poliique du temps. On we saurait pr^sJn
tor aux radilaires sludieux, aux amateurs eclairis de Thisloire modernc, rirn de plus mile Jt
V plus insructifque la iraduciuon de cet ouvrage, qui acquiert ux| nouveau prix'par let noles
. dicicuaes donl le general Dumas l'a accompagne.

IV. B. La suite de l'ouvre est sous presse.

NAPOLEOW andCanoca's Comcrs&tions; yol. in-8. London. 1825. 5 f.

NECEER. — OEdTres-complètes, contenant un grand nombre de morceaux
inédits. Edition publiéc par les soins de M« 1c barop de Staël, son p'eiitl
fils. J5 vol. in-8., avec un beau portrait de M. Neckcr, grave par Miiller"

-- Sur papier vélinsuperfin satiné. 90 fr.
xg o n ir.

> CKEA DE SAUSSURE (inadame).—Notice sur le caraqtère el lesécrils de m:
d'une de Staël; in-8., jivec le portrait de madame de Staël. 1820. 5 J.

— Papier vélinsuperfin satiné*. 10 fr.

OBGANISATIOITS cwi!e et religicuse des Israélites" de France et du royaume d'I
talie, décrétée le 17 mars 1800; suivie de la Collection des Acteade TAS
semblée des Israéljcb de France et du royaume dltalie , etde celle dei*
Procès-verbaux et Décisions du Grand Sanhédrin. YOI. in-8. 1808. 6 f.

OBLOFF (le comte Gr.). — Ménaories historiques, politiques et litferaires aur
le royanmede Naples, publiés avec des Notes et Additions par M. Amaury-
Duval 5 vol. in-8. Deuxième édition revue et corrigee. 1825. 55 /.

^~ Essai sur l'Ilistoire de la ftlq§ique en Italie, depuis les temps les plus an-
ciens jusqu'à nos jours. 2 vol. in-8. 1822* 10 fr.

PASEA. Pensées. Foyez Moralistes.

PETSON AND DAVENPORT, — a new Dictionary manun-english,french , english-

- Italian-frenet , and french-italiun-english.* Troisiieinc'edit, a Torts vol. in-8.
London, 1828. 40 fr.
- POPE (Alex.). — *Evsalo sobre O Homem, tradusido, verso por verso, por Franc. Bento Maria Targini, visconde de Stw Lourenpo, etc.* •—Essai sut l'floinme, d'Alexdndre Pope, traduit veip par Ters en langue portugoise, accoin*-pagné d'un grand nombre de notes. Très belle édition publiée par une Société privée; 3 vol. in-4-5 papier vélins, avec gravures. *London, 1819.* 150 fr.
- POUSSIN. — Son OŒuvre complet, précédé d'unc Notice sur sa vie, réduit et gravé QU trait, et public par Laudon; (livruibons fonnant a vol. grand iu-4. (Ouvrage teruriné). 100 fr.
- *Idem* sur papier vélins, in-folio. aoo fr.
- PYTHAGORE. — Vers dorés, expliqués et traduits pour la première fois, précédés d'un Discours sur Pessence et la forme de la poésie che« les principaux peuples de la terre, par Fabre d'Olivet, in-8. 1815. 6 fr.
- Sur papier vólin. 12 fr.
- QATHEMBEDE QuiNGT. — Essai sur la nature, (e but et les nioyens deriini-lationdans les Beaux-Arts; 1 vol. grand in-8. sur beau pap. 1825. 8 f.
- QUIHTCS SMYRRSUS. — *Quinti Smyrmei Posthomericorum tibriXIF, Niuiopri* mum ad librorum MSS, fidem recensult, restituit et suppler it T/i. Christ. Ty-clisen> Accesserunt observations Chr. Gottl.Heynii.* 1 vol. in-8. 1807. 8 fr.
- Papier vélins. 16 f»
- RABAUT (J.-P.) et LACBETELLE (Ch.). — Précis hisloïque de la Uc\olulif>ai franchise. 6 vol. in-18, avec figures. Nouvelle édition., 30 fr.
- Le mêtie ouvrage, sur papier vélins, avec figures avant la lettre et à Peau forte. 60 fr-
- Ces six volumes *BQM*I jdssemblie.constituardel* par Rabaut, 1 vol.—*MipmbUe legislative,* par Laretelle jeune> 1 vol. — *Convention nationale* par le même, 2 \oj. — *Direcloire cxd-cutif*, par le même; 2 vol. Chaque section sc; vend aussisóparcément, à raison do 5 fr. le volume* sur papier ordinaire.
- RABAUT(J.-P.).—Precis historique de la Révolution franchise, *Assembled constituante.* ivol. in-02. papier ordinaire. 1 fr. 50 c. — Papier vélins. 5 fr.
- RACINE. (J.). — Ses OŒuvres. idilion Irès soignée, accompagnée de Notices en partieinédites, sur la Vieet les écrits dcl'auleur. 5 vol. in-8. sur beau papier, avec portrait..i83i. 10 fr-
- Le même , sur papier vélins suj^rfin. aa fr. 50 c.
- RAPHAEL. — Son OŒuvre complet, précédé d'une Notice sur sa vie, réduit et gravé au trait, et publié par Landon; 8 livraisons foruaant 4 vol. gr. in-4- (Ouvrage tenniné.) 20° fr-
- *Idem*, sur papier vélins, format in-folio. 400 A*
- Analyse du Tableau de la Transfiguration, traduit en anglais d'après l'original espagnol de Ben. Pardo di Figueroa; avec les Remarques et Observations de Vasari, xMengs, Reynolds, Fuesli ctaulrcs artistes distinguos qu'ont écrit sur ce célèbre Tableau. Outrage enrichi de 17 tèles dessinées d'après le tableau original, et gravée9 dela même grandeur, par M. Gau-baud, ancien directeur dc TAcadémie dc Marseille, et aujourd'hui premie¹ pcintre de S. A. R. le prince d'Orange avec le portrait de Raphaël et une

- gravure au trait du Tableau de la Transfiguration, grand infol. atlantique sur pap. vél. Londres, 1817. Ouvrage de la plus belle exécution. 150 fr.
- CHERCHES asiatiques, ou Mémoires de la Société établie au Bengale pour Taire des recherches sur l'histoire et les antiquités, les arts, etc., dc PASie, traduites par A. Labeaume, revues et augmentées dc notes par MM. Langlès, Cuvier, Delambre, Lamarck et Olivier. 2 forts vol. jfrand in-4. ^avec figures. 1805. ^{^4} fr.
- CBERGES sur la force de l'arriée franpnise depuis Henri IV jusqu'en 1806. in-8. 3fr. 50 c.—Le mème, papier vclin. 7 fr.
- CORD (*an illustrated*) of important events in the Annals of Europe during the last four* years, comprising a series of views, of the principal places, battles, etc 1 vol. grand in-fol. Londres, 1816. * 264 fr.
- Le inème ouvrage, sur grand pppier vlin, format atlantique. t 028 fr. Lesvues, colorizes avec soin, reprisenent : Moscou, le Kremlin, Smolensk* Dantzich, mbourg, Berlin, Dresde> Leijsig, Hqna, Francfort, Amsterdam, La Haye, Rosiere, ris, el Vile d'Elbe, plus une Carle, un'planjedo portraits et *It foie simile* des signatures principaux personnages qui ont joué un rôle pendant lesdits evenemens.
- XUEIL des Costumes religieux et mflaires de toutes les nations, par F.-C. Bar ; ouvrage public en 56 livraisons formant 6 vol» in-fol. orne de près le 800 sujetspeints d'après nature. 1200 fr.
- cuEit d'Histoiresinstructives et amusantftS suivies d'un choii d'ldylles de JJessner, en français et allemand. in-8. An vi. a fr. 50 ^c.
- DOUTÈ (J. P.)* — ^{Le}* Liliacées. 80 livraisons iormant S vol. grand in-fol., brmat atlanlique, les planches coloriées et retouchées par Tauteur. Edition 'irée à un très petit nombre d'exemplaires. Magnifique ouvrage entièrement termiué. 4^{oo} fr.
- HFUES> L'Espagneen 1808. Rechères sur Tétat de FAdministation, des Sciences, des Lettres, des Arts, etc., faites dans un voyage à Ma- du'denrannée 1808:2 vol. in-8. 1811. 10 fr.
- Idem*, sur papier vlin. 20 fr.
- MUSAT (A.)— Essai sur U Langue et la Litterature, chiooiaes; in-8. i 8 n. " * * 6 fr.,
- AUD (F.).— Recueil eho&i des plus belles vues d'optique des jfolais, cbâ- "eaux et'nai>on& royales de Paris et tleb environs, dessinees d'apris nature, au nombre de 121 pièces; grand in-jf>io en noir. [#] 121 fr.
- Lesmrgmés, eniumiuéei, afecsoin. - 480 ft.
- tu. Cours^e Littérature, grecque moderne, par J. Rizo Néroulos, ancien premier*ministre des hospodars grecs dc Valachket de Aloldavic ; public par fti- Humbert. Seconde édition, revue etaugincnt-le. 1 vol. in-8. Le le portrait de U. Rizo, 1828. 5 fr.
- IMAN du Reuart (le), publié d'aprs les Maquicrits, de la Bibliothèque du joi, des xm% x»'V ^{xv} siecles ; par M. Meon { edileur dii Roman de la Rose, des Fabliaux et Conies de Barbazan, etc. | 4 vol. in-8- a|eo quatrc gravuics, 1826. ⁱ 4J »i-
- Le même, sur papier grand-iai&in vclin bispeifin, satinc, graYuics avantla leltre. • ¹⁰⁸ &•
- Le raème sur pap. gwyl raisin d'Hoilandc, grav. avant la Icttre. 120 fr.

- | | |
|--|--------------|
| ROQUEFORT, —Glossaire de la Langue rottnne , jcontenant Pelyrnolo"j<j et la signification des mots usités dang les xi, XII, xm, xiv, xv et xvi* siè-
fi!es, etc. Ouvrage utile à ceux qui voudront consulter ou connaitre les
éorits dcs premiers auteursfrançais. 2 forts vol. grand in-8. avec gravure. | |
| 1808. | . 2 4 fr. |
| ROSCOE (TV.). — Vie de Laurent de Médicis, trad, de Panglais par Fr. Thu-
rot. 2 vol. in-8. 1796. | • 10 fr. |
| MOUSSCATT (J. Bapt.). —QEuyres. Edition très soignée, accompagnée de no-
tices, en partie inédites, sur la vie et les écrits de Pautcur. 2 vol. in-8.
avec portrait, sur beau papier. 1802. | G fr. |
| — Les mêmes, sur papier vélinsuper | fin. <j f.r. |
| SACOHTALA, on l'Anneau fatal, drame traduit de la langue sanskrit, aveo
une explication du Système mythologique des Indiens; in-8. i8o5. 4 fr. | |
| SALVO (le marquis de). — Lord Byrori en Italie et en Grèce, ou Aperçu de
sa vie et de ses ouvrages. 1 vol. in-8., papier vélins, avec le portrait de
lord Byron. 1825. | ia fr. |
| SARTORIUS (profess.). — Essai sur l'état civil et politique des peuples d'Italie
sous le gouvernement des Golhs; Mémoire qui a remporté le prix proposé
par Tlnstitutde France. 1 vol. in-8, 1811. 5 fr. — Papier vélins. 10 fr. | |
| SCHMIDT. — La Corbeille de Fleurs, conte dédié à Fadolescence, traduit par
Derôme; in-12. 1826. | 1 fr. 50 c. |
| — Rose de Tannenbourg, Histoire da vieux temps; traduite par le même ;
in-12. fig. 1826. | 1 fr. 80 c. |
| ScnoEPrxm (J.-D.). — <i>Findicica Typographic^;</i> in-4- ^vec planches, 1770. | 5 fr. 60 c. |
| SCOTT (Sir "Walter). — <i>The life of Napoleon Bonaparte emperor of the French ;
with a preliminary view of the french Revolution.</i> 9 vol. in-8. pup. fin p/ite
yelin, avec portrait d'après David. 1827. * , , 27 fr. | |
| SCOTT (Walter). — Vie de Napoléon Bonaparte, empereur des Français, pré-
cédée d'un Tableau préliminairc de la RévolutionFrançaise. 9 vol. in-8*
papier fin, avec portrait d'après David. 1827. ' 27 fr. | |
| SCRIPTORES EROTICI GR^ECI : <i>Achilles Tatius, Heliodorus, Longus et Xenop/wfl
Ephesius. Textum rccognovit, selectamquc lectionis varietatem adjecit Chr-
Gulf. MiUcherligh ; 3 tomi in IV parties.</i> 4 vol. in-8, 1798. * 21 fr. | |
| SÉGCR (le général comte Ph. ^e). — Histoire dc Russie eWde PiQrre-le^
Grand, in-8. 1829. * % 8 fr. | |
| SENEFELDER (Aloys), inventeur de la Lithographie. — Art de la Lithographie*
ou Instruction pratique contenantla description des différents procéde^
à suivre pour dessiner, graver et imprimer ?ur pierrcj précédés d'uO^
Histoire de la Lithographic etde ses divers progre*. 1 vol. in 4. orné du pot"
trait de rauteur;avecunRecueilde planches gramin-4. offrant un model^
des différents genres auxquels la Lithographie est applicable. 1819. 36 fij. | |
| StRiEs («) of Twenty four views illustrative of the Holy Scriptures ; select^
from sir Robert Ainsley's celebrated collection of drawings in Palestine, Egyp^f
Syria, Corinth, Ephesus, gr. in-4. avec 24 planches color. London. (*o P^l | |
| SIMOND (L.) — Voyage en Suisse, fait dans les années 1817, 1818 et 1819. | |

suivi d'ua Ebsaihistorique sur les mœurs et les costumes tie Pflelvétle an*	
cione et moderne, etc. JSecondc édition, entièrement revue et auguien-	
tée d'une Table raisonnée des matières. 2 forts vol. in-8. 1824/ i5 fr.	
SISMONDI (SIMONDE de). — Histoire des Républiques italiennes du moyen-	
fige. Nouvelle édition. 1G vol. in-8. 1826. (Ouvrage complete) 112 fr.	
Un petit noinbre d'exemplaires sur papier#vélén. 224 fr.	
— Histoire des Français; tomes I à XX.I. 1821 ð 185G. i6t^ fr.	
Les mêmes, sur papier vélén. 536 fr.	

Après avoir présenté l'Histoire de l'Italie sous un jour absolument nouveau, M. de Sismondi a entrepris de faire sortir de ses antiques monuments une véritable Histoire des Français, exempte de toute prévention nationale et de tout esprit de parti. Les peuples éprouvent le besoin de connaître l'influence qu'exerça sur eux, aux diverses époques de leur histoire, le gouvernement auquel ils obéissaient; quelles circonstances accélérèrent ou retardèrent le développement de leur intelligence, favorisèrent ou détruisirent leur industrie, leur moralité* et leur repos; quelles furent les révoltes «de la condition privée»; par quelles calamités des troupeaux d'hommes avaient été roulés et n'avaient plus que la propriété de marchés souvent barbares; par quels progrès réguliers, ou par quelques secousses, ces maîtres esclaves levèrent graduellement à la condition de serfs, de vassaux, de sujets, de citoyens. W. de Sismondi trace le tableau de ces vicissitudes de la nation française. Vingt-un volumes, déjà publiés, conduisent cette histoire nationale jusqu'au commencement du 7^e siècle. Les divisions chronologiques par dynastie et par règne, qui s'adaptent si bien à l'histoire des rois, n'ont point autant de vérité pour l'Histoire des peuples: celle-ci ne se divise proprement qu'en périodes morales. D'après M. de Sismondi a presque deux invasions des Gaules par les Barbares, sous les Mérovingiens et les Carlovingiens, et la fusion de ces conquérants avec les autochtones; il a fait voir la France, pendant les règnes des premiers Capétiens, partagée entre un nombre infini de chefs indépendants, et unie seulement par le lien féodal de la féodalité. Il a montré ensuite le pouvoir monarchique constitué au milieu d'elle, au treizième siècle, avec l'ardeur des hommes de loi; le pouvoir absolu ne fut pas plus étendu sur la nation, que trois systèmes de guerre, qui caractérisent trois époques différentes, révolutionnent de son établissement. La possession de ce pouvoir causa les premières: ce furent les guerres de succession avec les Anglais; les prétentions au dehors de ceux qui l'exerçaient cadrent les secondes: ce furent les guerres de succession des rois de Naples et de Milan; les rivalités auxquelles ils prétendaient au dedans causaient les troisièmes: ce furent les guerres de religion. Le pouvoir absolu se reposa ensuite dans ce qu'il croyait sa force. Cette force n'était que faible; elle amena la Révolution. Telle est la suite des périodes morales que M. de Sismondi propose de parcourir: il ne marche qu'appuyé sur des preuves puisées aux sources originales et tout ce qu'il dit est le résultat d'une étude approfondie, et consciente.

SISMONDI (J.-C.-L. Simonde de). — Julia Sévère, ou Kan quatre cent quatre-vingt-^uze (Tableau des mœurs et des usages du temps ^1: Clevis s'establit dans^es Gaules). 3 vol. in-12. 1822. *	7 fr. 50 Cm
— De la Littérature du midi de l'Europe. Nouvelle édition, revue et corrigée. 4 vol. in-8! 1829. * 28 fr.	
— Histoire de la Renaissance de la Liberté en Italie, de ses^ Progrès, de sa Décadence et de sa Chute. 2 vol. in-8. 1832. ia 1r.	
La partie sur papier vélén. * 24 i>	
— Des Espérances et des Besoins de l'Italie, brochure in-8. 60 c.	
— Histoire de la chute de l'Empire romain et du déclin de la civilisation, de l'an 250 à 1000; 2 vol. in-8. 1855. i5 'fr.	
- Etudes sur les Constitutions des peuples libres; formant le tome i ^r de ses Etudes sur les sciences sociales. 1 vol. in-8. 185C. ny l1c	

Si5M0NDi(J.-C.-L. Simonae de).—*Etudes sur l'économie politique; formant*

Ic tome 2^e de ses Etudes sur les sciences sociales. i vol. in-8. (*sous presse.*)

STAEL - HOLSTEIN (la baronne de). — *Oeuvres complètes*, contenant un grand nombre de Morceaux inédits et des Additions importantes faites par l'auteur & quelques-uns des ouvrages qui ont*paru de son vivant; édition publiée par les soins de M. le baron de Staël, son fils, et ornée d'un beau portrait de madame de Staël, d'après Gérard. 17 vol. in-8. 1821. 102 fr, la même collection, en 17 vol. in-12, avec portrait. 51 fr.

L'on vend aus'sl se'pare'ment:

- *Corinne, ou l'Italie.* Nouv. édit.; revue et corrigée. 2 vol. in-8. 1820. 12 fr.
Le même ouvrage. 2 vol. in-12. ^ 6 fr.
- *Delphine, roman; nouvelle édition, revue et corrigée, terminée par un nouveau dénoQment, et précédée de Réflexions sur le but moral de l'ouvrage.* 3 vol. in-8. 1820., * 18 fr.
Le même ouvrage. 3 vol. in-12. 9 fr.
- *De l'Allemagne.* Nouv. édit., revue et corrigée. 2 vol. in-8. 1820. 12 fr.
Le même. 2 vol. in-12. * /6 fr.
- *De l'influence des Passions sur le bonheur des Individus et des Nations;* nouvelle édition, revue et corrigée; in-12. 1820. 3 fr.
- *De la Littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales.* Nouvelle édition, revue et corrigée. Fort vol. in-12. 1820. 4 fr.
- *Lettres sur les écrits et le caractère de J.-J. Rousseau.* Nouvelle édition, revue et corrigée. Petit vol. in-12. 1820. 1 fr. 20 c.
- *Considérations sur les principaux événements de la Révolution française.* Nouvelle édition, revue et corrigée. 3 vol. in-12. 1826. / . 9 fr.
- *Oeuvres inédites de madame de Staël, extraites de ses Oeuvres complètes, et comprenant Dix années d'Exil, Essais dramatiques, etc., etc.* 3 vol. in-8. 1821. 18 fr.
- STIEL-HOLSTEIN (le baron Auguste de). — *Oeuvres diverses précédées d'une Notice sur sa vie.* 5 vol. in-8. 1829. 18 fr.
- *Notice sur la vie de M./Necker; in-8. avec portrait.* 1821. 5 fir*
- Sur papier vélin. , -^ 10 fr.
- *Lettres sur l'Angleterre.* Nouvelle Edition, augmentée de quelques Lettres inédites. 1 vol. in-8. 1829. 9 fr*
- SoPHonis *Tragedie VII* grace, cum Versione latine et No's criticis cur.* Brunck. 2 vol. in-4. grand papier. Argent. 1786. Belie édition (épuisée et très rare). no fr.
- *Idem, édition in-8. 4 vol. gr. pap. (épuisée et fort rare).* *. 96 fr..
- *Idem, tomes III et IV de rédilion in-8., contenant les anciennes Scholies, celles de Triclinius et celles recueillies dans les anciens grammairiens, les Fragments, le Leccicon-Sophocleum* et la Table.* Ces deux volumes*, pouvant servir à toute autre édition de Sophocle, 6e vendent aussi séparément, savoir: Sur papier sans colte. 12 fr.— Sur grand papier de France. 18 fr. — Sur papier d'Annonay. 30 fr.
- SOILAVIE(J.-L.)—*Mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI,* depuis son mariage jusqu'à sa mort; ouvrage composé sur des pièces au-

- thentiques, et eurles pièces juslificatives rccneiliics après Ic 10 aoQt dans
Jes cabinets de Louis XVI, à Versailles et au chftteau des Tuileries. G vol.
in-8. avec 7 tableaux, et trois grandes planches gravées, représentant 114
portraits de personnages remarquables de ce règne. 1802. 30 fr.
Sur papier véTm. . Go fr.
- TERENTII *Afri Comcedim VI ad (idem optim. cod. rccensuil Branch 1* vol. grand
in-4. sur papier vélín anglais, 1797. 4² fr.*
- *Idan*, un seul exemplaire sur peau de vélín.
- Trssfi (le inaréchal de).— Mémoires et Lettres contenant des Anecdotes et
des Faits historiques inconnus, sur une partie des règnes de Louis XIV et
de Louis XV. a vol.in-8. 1806. 9 fr.—Sur papier velin. 18 ft.
- TESTAMEKT (le Nouveau) de Notre-Sefgneur Jésus-Christ, iraduit sur la Vul-
gate, par le Mnittrede Sacy. 1 vol. grand in-8. caractere ciccfoà deux co-
lonnes. Imprimerie de Finn in Didot. 1816. 3 fr,
- *Idem*, Traducion de D. Martin- avec la citation des passages parallèles.
tdilionstéréotyped'Herhanjd'apn's son procédéperfectionné. 1 vol.grand
in-8. de 5»8 pages à deux oolones. 1820. Papier grand-raisin, a fr.
- Lamêui traducion, avec la citation des passages parallèles, format in-i8.
vol. de 792 pages. Édition stéréotype d'Herhan. 1 fr. 50 c,
Sur papier vélín. . 3 fr.
- THÉATRE CLASSIQU DES FRANCAIS, fonfiant la premUre section dc la NOXVELLE
BIBLIOTHÈQUE CXASSIQJUE, oil Collection des Chefs-d'OEuvre dc la lillérature
francaibe.—Édition très soignée, dans Iquelle on a rétabli le texte et la
ponctuation dans Icur purcté primitive; accompagnée de Notices, eu parlie
inédites, sur la Vic etles Écrits des Autcurs ; ainsi que d'une tableraison-
née des matières. 23 vol. in-8. sur beau papier, avec portraits. 69 fr,
- Le mëine, sur papier vélín superfin saliné. 103 fr. 50 c.
- Le Théâtre classique des Français se compose com me suit :
- OEuvres de *Molière*. — 7 vol. in-8. avec portrait. 21 fr.
QEuvres choisies de *Pierre Corielle*.—4 vol. in-8. avec portrait. 12 fr.
OEuvres de *J. Racine*.— 5 vol. in-8. avec portrait. i5 i'_r.
Théâtre choisi de *Voltaire*. — 7-vol. in-8. avec portrait. 21 fr.
Chaqè auteur se vend scparément.
- THÉBT (A.-F.).— Précis de l'Histoire d'Ang!cterre, depuis lespremiers temps
jusqu'à noA jours. 1 vol. in-8. 1824. 5 fr.
- TOULONGEONJF.-E. dej. — Histoire de France, depuis la Révolution de 1789,
écrite d'après les Mémoires et Manuscrits contemporains, recueillis dans
les dép6t% civils et militaires, avec carles et plans. 7 vol. in-8.; de l'impri-
mer?e<le Didot jeunc.^ 1801 à 1818. Ouvrage terminé. 45 f.
- Le m6me ouvrage, en 4 vol. in-4., avec Cartes et Plans. (J6 fr.
- Manuel du Muséum français, contenant une description ahalytique et
raisonnée, ovec une gravure au trail de chaque tableau, tous classés par
écoles et par oeuvres des grands maitres; in-8. — I" Jivraison, OEuvre
du Poussin avec 19 gravures, 3 fr.—IK QEuvre du Dominiquin, avec 20
gravures, 3 fr. — III*, QEuvre de Rubens, avec 4B gravure9, 9 fr.—
IV*. QEuvrc de Raphaël, aveo 39 gravure? 9 fr. —V*. OEuvre dc Lcbrun,

avec 35 gravures, 9 fr. — VI^o. OEuvre de Vnn Ostade, Gérard-Dow et Van Dyck, avec 49 gravures, 9fr.—VIP. OEuvre de Vernet, aveoSo gravures, 7 fr. 50 c. —VIII^o. OEuvre du Titien, avec 24 gravures, 6 fr. — IX% GEuvre de P. Ver6nfces, avec 17 gravures, 6 fr,— X^o. GEuvre de Lc-sueur, avec 2&gravures, 9 ft". — La Collection des 10 livraisons, publiée de 1802 à 1808. 70 fr.

Le mSme ouvrage, sur papier vélin et d'HoIIandc. 140 fr*

Get ouvrage donne une description historique et raisonnable des tableaux des grands jnait res composant le Musdum fran^ais. On a pcnse* que ce serait rendre un service re'el aux Yrts quo d'indituer, dans cbacune de leurs productions, Ics beaute's qui les rendent suplrieurcs et les negligences qui rcntrrent dans le médiocre

I/ouvrageest divise*par livraisons do plus ou moins d'ctendue, cbaque livraison donnant 1'ceuvred'un grand maître, avec une notice sur sa vie et une^opieau trait de chaque tableau. La copie gravén d'un tableau ne rend jarnais la peinture\$ elle ne peut rendre que la composition, et pour cela, un trait nettement esquissé nous a paru suffire.

Lc Manuel du Museum franca is sera an guide précieux pour ceax qui voudront voir avec fruit celte immense reunion de chefs-d'eeuvre. Ghaque volume se vend séparément.

USTBRI *Delectus Opuscularum botanicorum*. 2 vol. in-8., c. fig. 1793- 12 fr.

VAUBAN (le maréchal de).— De Piimportance dont Paris est à la France, et du soin que Ton doit prendre de sa conservation. Mémo ire inédit; in-8., fig. Londres, 1821. > 2 fr. 25 c.

VIES et OEUYKES des Peintres les plus cflèbres de toutes les écoles. Recueil classique {yoy. Landon). f

VIHERS (Ch. de).—Essai sur PEspirit et l'Influence de la réformation de Luther; ouvrage qui a remporté le prix (lucerné par Tlnstitut de France, vol. in-12. 1820. 3fr.

— Précis historique de la Vie de Martin Luther, traduit du latin de Melanchton, avec portrait et des notes; in-12. " 1 fr. 20 c.

VINCI (QEuvres echoisis de Léonard de), du Titien, 'du Guide et de Paul Véronèse, précédés de Notices biographiques, réduits et graTés au trait, et publics par Landon, 1 vol. grand in-4^o 1824. s * 25 fr.

— *Idem*, suj- papier vélin, format in-folio. 50 fr.

VIOMÉNII (le baron de). — Lettres particulières sur la Polognc et sur son , démerabrement en 1772. 1 vol. in-8. 4 ft-

— *Idem*, sur paffier vélin. ^ fr»

ViRGiLit filaronis *Bucolica, Georgica et Mneis*, ed. Brunch. 1 vol. grand in-4^o sur papier Telin anglais, 1789. * 4^a ft¹-

— Du mûme onvragc, un seul exemplnire sur peau de vélin.

VOLTAIRE. — Théâtre choisi. Ildition très boignée, accompagnée de Notices en partie inédites. —7 vol. in-8. sur beau papier, avec portrait. 21 fr.

Le m&me > sur papier vélinsuperfin. 3i fr. 50 c.

— Henriade. MSme Edition, etc. 1 vol. in-8. avec le portrait de Pauteur. 3 fr. Sur papier vélin superfin. 4 fr- 5° c.

— Poésies diverse^. MSme &2itioii, etc. 5 vol. in-8., aveopoitrait. 9 fr. Sur papier vélin superfiu. *3 fr. 00 c.

—Mélanges de iittérature.Même tdilion, etc. 2 vol. in-8. avec portrait. 6fr. Sur pnpiere vélin superfin. 9 ^r.

— Contes et Romans. MCmc fidition, etc a vol. In 8. ovec portrait.	6 fr.
Sur papier vélin superfin.	9 fr.
— Essai sur les Mceurset l'Esprit des Nations. M6me Edition, etc. 4 vol. in-8. avec portrait.	12 fr.
Sur papier vélin superfin.	i8f r.
— Siecle de Louis XIV et de Louis XV. M ^e me Edition, Qtc. 3 vol. in-8. avec portrait.	9 fr.
Sur papier vélin superfin.	10 fr. 50 c.
— Histoire du Parlement. M ^e me Edition, etc. 1 vol. in-8. avec portrait.	3 fr.
Sur papier vélin superfin.	s 4 fr- 50 c.
— Annales de l'Empire. M6me Edition, etc. à vol. in-8. avec. portrait.	6 fr.
Sur papier vélin superfin.	^ 9fr.
— Histoire de Charles XII. WLme Edition, etc. 1 vol. in-8. avec portrait.	3 fr.
Sur papier vélin superfin,	4 fr- 50 c.
— Histoire de Russie sous Pierre-le-Grand. M ^e me idit. i vol. in-8.	3 fr.
Sur papier vélin superfin.	4 fr* 50c.
— Mélanges de politique. M ^e me Edition, etc. 1 vol. in-8. (<i>Sous presse</i>).	
— Melanges de philosophic M ^{to} e Edition, etc. 5 vol. in-8. (<i>Sous presse</i>).	
VOYAGE pittoresque de TOberJand, ou Description des Vues prises dans TO- berland, district du canton de Berne. 1 vol. grand in-4* avec i5 planches coloriées et une carte itinéraire. 181a.	72 fr.
— <i>Idem</i> , avec les doubles planches coloriées etau trait.	84 fr.

La partie du canton de Berne qui est l'objet de cet ouvrage est la plus riche en scènes gracieuses et pittoresques; c'est le point de la Suisse le plus fréquenté* par les voyageurs; en effet, ranger qui ne peut faire un long séjour en Suisse, et parcourir plusieurs régions de la chaîne des Alpes, ne saurait mieux employer son temps qu'en visitant l'Oberland bernois. Les vues sont prises sur les Lacs et au midi du lac de Thun, où la nature semble avoir déployé toute sa magnificence; elles sont exécutées par un artiste indigène, et colorées avec beaucoup de soin et de fidélité. Le texte de l'ouvrage, dont le talent et une grande élévation d'idées, contient une foule de notices et de documents nouveaux; il ne peut qu'ajouter beaucoup aux jouissances de ceux qui iront visiter ce beau pays. | \$

WALDCGRAVE. — Mémoires de Jacques, comte de Waldegrave, membre <
Conseil privé sous le règne de Georges II, et gouverneur du prince de Galles, ensuite Georges III; in-8. 1825. 4^{er} 50c.

WALCKENAER (G.-A.). — Histoire naturelle des Arachnides; avec figures colorées. Livraisons 1 à 5, format in-i2. oblong. 25 fr.

WALLICO (N.), surintendant du Jardin botanique de Calcutta.—*Planta asiatica rariores*, ou Descriptions et figures d'un choix de Plantes inédites de l'Inde orientale. 3 vol. in fol. avec 500 planches soigneusement colorées; le texte en langue anglaise. Londres, 1830 à 1832. goofr.

Ce grand ouvrage publié à Londres sous les yeux et sous la direction immédiate de l'auteur, a paru en douze livraisons successives de 28 planches chaque, avec texte. Il est aujourd'hui entièrement terminé et se distingue parmi les plus beaux ouvrages d'histoire naturelle publiés de nos jours.

De toutes les grandes régions du globe, l'Inde orientale est sans conteste la plus remarquable, pour la variété, la beauté et l'utilité des productions naturelles. Les parfums, les médicaments, les lissus, le sucre, l'indigo, en un mot tous les objets de commerce les plus précieux et les plus recherchés ont toutes une origine indienne. Cependant, malgré le puissant influence

qu'inspirent les végétaux de l'Inde orientale, ils en faisaient de beaucoup qu'ils solent connus avec tous les détails que la science exige de nos jours. À l'égard de la plupart d'entre eux, on n'a fait même réduit & complété les ouvrages, très remarquables pour leurs époques, mais aujourd'hui surannés, *dcfihede* et de *Rumphius*, qui se sont plus appliqués à faire connaître les propriétés vraies ou imaginaires des plantes, qu'à décrire exactement celles-ci dans toutes leurs parties. Mais faute de meilleurs renseignements, c'est encore dans ces ouvrages qu'il faut aller puiser tout ce qui nous porte aux végétaux de l'Inde, et leur importance était telle, qu'un naturaliste comme le docteur Hamilton, a publié de savants commentaires sur *VHortus Malabaricus* et sur *VHerbarium jdmboinense*.'

M. Wallich a eu l'avantage d'être placé⁴ dans les conditions les plus favorables, pour mener au jour un ouvrage aussi parfait que possible sur les plantes de l'Asie. Sa position comme directeur du Jardin botanique de Calcutta, pendant plusieurs années, et un siège de plus de vingt années dans l'Inde, durant lequel espace de temps il a exécuté* des voyages considérables dans l'Indostan, (à Népal, la péninsule de Malacca, et les contrées du Cachemire, l'a mis à même d'étudier avec soin les végétaux les plus rares et les plus utiles. Aidé des lumières des illustres botanistes européens, avec lesquels il a depuis longtemps entretenu une active correspondance, il a publié, pendant son séjour en Angleterre, les résultats de ses principales observations.

L'ouvrage est composé de 5 volumes in-folio, contenant chacun 100 planches coloriées avec beaucoup de soin. Les dessins originaux sont 66 faits d'après nature, sous la direction de l'auteur, par des peintres de la Compagnie des Indes orientales, qui sont des naturels du pays.

AVEISS KTIFIG (der). — Relation des faits et gestes de l'empereur IV Jnxi Biilienl*, rédigée par l'empereur Iui-inème, et par le secrétaire impérial Marx Tritz, saurwein, en vieux tangage allemand, avec 32 anciennes figures en bois, gravées dans le seizième siècle, par H. Burgaier. 1 gros vol. in-folio. Vienne, 1755. • 4^{me} fr.

Cet ouvrage fait le pendant du Mebre Tewrddnck.
WOUVEDUANS (Ph.). — OEuvre, gravé d'après ses meilleurs tableaux, par J. Moyreau, graveur du roi. Collection de 100 planches grand in-folio oblong. 200 fr.

WUBTZ (Dr. Georg.-Christ.). — *Conamen Mappce generalis Medicamentorum simplicium, secundum affinitates virium naturalium, nova methodo geographica dispo sit ovum ; juncta mapta eleg. ari incisa*; in-4. 1778, 1^{me} - 6 fr. — Mémoire sur l'établissement des fioles de médecine-pratique; in-8. 1784. , 1 fr. 20 c.

— Mémoire sur la melioration du Commerce maritime de la France, par la colonisation de la Guyane française; in-8. 1822. 2 fr. 50 c.

YORKB et LEAKE. — Les principaux monuments épigraphiques du Muséum Britannique, et quelques autres en Angleterre, expliqués d'après le système phonétique; 1^{me}-4. avec 40 planches. Londres, 1827. 20 fr.

AUTEURS CLASSIQUES GRECS ET LATINS, DITE DE DEUX-PONTS,

EN 192 VOLUMES in-8. reliés à l'identique.

-v-

Parmi les éditions usuelles les plus correcles des auteurs classiques anciens, la Collection complète de Deux-Ponts a été la plus généralement distinguée et accueillie dans toute l'Europe civilisée et savante, ainsi qu'en Angleterre.

Cette Collection qui, commencée aux Deux-Ponts a été continuée à Strasbourg, et qui se compose dès lors présent de 77 volumes d'Auteurs Grecs et de 115 volumes d'Auteurs Latins

tops d'un mame format in-8, est removable de son succès an zèle constant des é^iteim pour enrichir successivement des meilleurs ouvrages dans tous les genres de littérature, aux soing particuliers employés par eux pour la revision des textes et le choix des lemons les plus accré-ditiles, aux remarques accessoires qui ont beaucoup facilité l'intelligence des passages obscufs et contribué à rendre ces Editions d'un usage général; en Gn, à l'extrême modicile de leur prix, qui les met à la portée de toutes les classes de lecteurs.

Chaque ouvrage est précédé d'une Notice historique et littérale sur l'auteur, sur ses écrits, sur les me i lieu rés editions et sur les commentaires et les traductions qui en ont paru dans les diff^rentes langues.

Une nouvelle édition latine de *VHoratius*, de *Cornelius Nepo** et de *Claudianus*, ainsi disposée, vient de paraître; ces riouvelles éditions donneront ja me sure des soins qui seront apporlés à la réimpression surcessivo des Auteurs de la Collection qui sont' puisés et qui ne se vendent plus se'paré'ment; ils sont marqués par une * 4^e DS l^f Notice ci-après.

AUCTORES CLASSICI GRJECORUM ET ROMANORUM;

Versionibus)Commentarii\$, variis Uctionibus, notisque illustrati IZBELIN DCBALLV, BRCNCK, BUHLE, CaOLL, EMBSBE, El(NESTI,JxTCh, HEYNE, MITSCHLRLICn, MORUS, HEITZ, J. SCHWEIGUGUSER, TIEDEMANN/FYCHSEN, G.-J. VOSS.

A adores classici Grwci.

AcniLLES TATIUS. — Vide *Scriptores EroticL* Vol. i.

ARISTOTELES. — Ariilotelis opera omnia, graece, ad optimorum exemplariuin fidem recensuit, annotationem criticam, librorum arguinenta, et novam versionem latinam adjecit J. Thcoph. Bthile. 5 vol. in-8. 35 fr.

— Papier fin. 50 fr,

Il en a été tiré quelques exemplaires sur papier d'Hollande.

ATHENyEIS — Athenaei Deipnosophistarum libri quindecim. Ex optimis Codicibus manuscriptis Bibliothecac imperialis farisinsc ounc primum c^llatia emendavit; et nova versione latiaa, animadverbionibus Ih. Casauboni aliorunique doctorura virorum et suis, commodisque Indicibus illustravit Joh. Schweighaeuser. 14 vol. in-8. i'iG fr.

DIODORTS SICULOS. — Diodori Siculi Bibliothecac histories libri qui supersunt, e r^censione Petri Wesseliugii, cum inlerprctatione latina Laur. Rhodomani, atque annotationibus variorum iotegris, Indicibusque locupletissimis. INova editio, cum commentationibus III. Chr. Gottl. Heynii et cum arguments disputationibusque Jer. Nic. Eyringii. 11 vol. in-8. 6G fr.

HbUODORUs — Vide *Scriptores JSrotici** Vol. II, pars prima et secunda.

HERODOTUS. — Herodoti historiarum libri IX, graece, cum nova vrsione latina, varias lectiones, ex quinque Godd. MSS. Paribiensibus cura Boissoondii collatis, emendatas et locupletatas, Wesselingii et Walckenarii aliquorunque annotationes et suas adjecit, cum Indice, Joh. Schweighacuser. Six tomes en 12 vol. in-8. Papier ordinaire (épuisé). QG fr.

Le m6me ouvrage, sur papier vélin grand-raisin. 14^ f.

— Lexicon Hérodoteum, quo et styli Herodotei universa ratio enucleate explicatur, et quam plurimi musarum loci exprofesso illustrantur; passim etiam pattini graeca lectio, parlim versio latina quasoffert Argentoralensis editio vel vindicatur, ?el emendatur; in3lrxuit Joh.Schweighaeuser- a vol. in-8 à deux colonnes. 20 fr.

Papier vélin, grand-raisin. 35 f.

LONGUS. — *Longi Pastoralia.* — *Vide Scriptores Erotic' ^ vol. III.*

LUCIAHUS.— <i>Luciani opera quae extant omnia, graece et latine, ad editlonem</i>	
Tib. Hcmsterhusii et J. Fred. Reitzii accurate expressi, cum varielate lec-	
lionis et annotationibus. 10 vol. in-8.	70 fr.
Papier fin.	100 fr.

* PLATO. — Platcnis Philosophi opera, 12 vol. in-8. (fipulse.)

QUINTUS SMYRNEOS. — Quinti Smyrnaei Posthomericorum libri XIV. Nunc primum ad librorum MSS. fidera recensuit, reedituit et supplevit Tli. Christ. Tychsen. Accesserunt observations Chr. Gottl. Heynii. 1 vol. in-8. 8 f*.

— Papier véin. 16 fr.

SCRIPTORIIS EROTICIS GILECI : *Achilles Tatius Sy Reliodorus St Longus et Xenophon Epliades*, Textum recognovit, selec^tamque lectionis varietatera adjecit Chr. Guil. Mitscherlich ; 5 tomis in IV paries, 4 "vol. in-8. 21 fr.

THUCYDIDES.—Thucydidis de Bello Peloponnesiaco libri octo, gracie et latine, ad edit. J. Wasse et C. A. Dukeri accurate expressi, cum varietate lectionis et annotationibus. 6 vol. in-8. (Upuisé.)

XENOPDON ErHcsius. —Vide *Scriptores Erotiti*, vol. III.

Auctores classici Romani.

^AMMIARDS MAICELUISIJS. a vol. (Epuisé.)

Une nouvelle édition se prépare.

AMPCLIUS (L.). — *Fide* FLORUS.

APULRICS (L.). 2. vol.

5 ft*.

AVIANUS. — *Fide* PHJCDRVS.

AviEinus(Rufus Festus). — *Vide* MKLA.

AuBEIUS(Sext.) VICTOR.—Vide *Hist. Rom.* *tcriptoreb minore**.

AUSONIUS. — D. Magni Ausonii opera. 1 vol.
— Papier collé. 1 IV. <J C-
a fr. a5 c.

* C^ASAR (C. Jul.). —Editio secunda. s vol. (Epui^{'c.})
Uuenouvelle Edition se prépare.

CAPITOLINUS (Julius). — Vide *Hist. Rom. scriptore*

CATO (M. P.). -r Vide *Rei Rustics scriptores*.

CATTTLLCS, TiBuitvs, PROPERTiUrt, cum Galli fragueihsis Pervlgillo Veueri?.

**CELSIUS. — A. CORNELIUS CEBI DE UIEDICINALIBRI. NOVA EDITIO, EX RECENSU, VT
EDITIO SECUNDA, 1 VOL^o, -A FR. 50^o «**

cum nolis Leon. Tārgae. 2 vol. 9 *r#
CICEBO. — M. Tull. Ciceronis opera, cum Indicibus locupletissimis et clavis

latinitatis. J3 vol. 4⁸ fr.

II n'en Teste plus qu'un petit nombre d'cxmplaires.
CLAuriAwus. — C. Claudiani opera. 1828. 1 vol. 4 fr. 20 c.
5 fr.

— Papier fin.

Co LAMELLA (L. T. M.). — Vide *Rei Rusucc scriptores* 3 fr.

CORNELIUS NEPOS.— Editio secunda. 1828. 1 vol. 5 fr. 60 0

— Papier fin.
Graffiti — *Le papier à dessin* — *Le papier à dessin*

Curtius (Quint.) RUFUS.— Edilio secunda. 2 vol.

FIACCUS. — C. Valerii Flacci Argonauticon libri. <i>i</i> vol.	i fr. 7J	4
— Papier cojlé.	2 IV.	35 c.
FLORUS (L. Ann.) et AMPELIUS (L.) — Editio secunda. 1 vol.	a fr. 50 c.	
FRONTINCS. — Sex. Julii opera. 1 vol.	1 fr. 50 c.	
GALLUS, — Galli Fragrncta. — <i>Vide CATULLTIS.</i>		
* GRILLIUS (Au..). 2 vol. (ipuisé.)		
Ure nouvelle édition ae prepare.		
HISTORIC AUGUSTE SCRIPTORES. 2 vol.	3 fr.	50 c.
* HISTORIC ROMANS SCRIPTORES MINORES : <i>S&it. AureL Victor; Sext. RufuA; Eutropius; Blessala Corvlnus.</i> 1 vol. (lipuisé.)		
Une nouvelle Edition se prepare.		
HORATIUS (Q.) FLACCUS. — Editio tertia. 1828. 1 vol.	4 fr.	20 c
— Papier	fin.	5 f _r
JUSTIRUS. — Justini historian Philippics. Editio secunda. 1 vol.	3 fr. ^v	50 c
JUVENALIS. — <i>Vide PERSIUS.</i>		
LACTANTIUS. — L. Ccelii Lactantii Firmiani opera. 2 vol.	4 fr.	
LAMPRIMDS (JE.) — <i>Vide Hist. Aug. scriptores.</i>		
LEXICON UTJSTICUM. — V. <i>Rei Rustic[^] scriptiores.</i> "Separatim. 1 vol. a fr. 50 c,		
* LIYIUS. — T. Livii historiarum libri, cum integris Jo. Freinshemii supplements. i3 vol.	48 fr.	
In'en resle plus que <i><uelquesxemplaires.</i>		
IUCANUS. — M. Annaei Lucani Pharsalia. Edilio secunda. 1 vol. 2 fr. ?5 c.		
LUGILIUS (C.). — <i>Vide PERSUJS.</i>		
LUCRETIUS.—T. Lucretii Cari de rerum natura libri VI. Editio a ^{da} . 1 vol. 5 fr.		
MACROBIUS. — Aur. Theodosii Maurobii opera. 2 vol.	4 f _#	
MABTUIIS. — (VI VALERIUS.) 2 v%l.	4 f _r	
MARTIALIS GARGILIUS. — <i>Vide Rei Rustirce scriptores.</i>		
MELA. — Pomp. Melac de situ orbis libri IIII, cum not. liter, et indicc'copiosissimo. Accedunt Sexli Rufii Avieni descriptio orbis terra et ora maritima : Prisciani Periegesis: Rutilij Itinerarium et Vibius Sequester. 1 vol. 3 fr.		
MESSALA. CORVINUS. — <i>Vide Hist. Rom. scriptores minores.</i>		
OBSEQUENS (Julius). — <i>Vide VALERIUS MAXIMUS.</i>		
OYIDIUS.—P. Ovidii Nasonis opera. Editio secunda. 3vol.	12 fr.	
— Papier collé.	15 fr.	
PALLABIUS (Ratil. Taur. ^EmiL). — <i>Vide Rei Rustic® scriptores.</i>		
PANEGIRICI VETERES : <i>Nazarii, Pacati[^] Mamertini[*]Eumenii</i> , etc. — <i>Vide PLINII EPISTOUE.</i>		
*PERSIUS. — A. Persii Flacci et Dec. Jun. Juvenalis satirae cum Sulipiae-satira; accedunl C. Lucilii fragmenta. 1 vol. (tipuisé.)		
Une nouvelle édition scprdpree.		
PETRONIUS. — Pelronii Arbitri Saliricon. Accedunt velerum poetarum catac lecta. 1 vol.	1 fr.	50 c.
PII [^] DRUS. — Phacdri fabulae. Acc'udunl Publii Syri Sententiae, Aviani et Anonyini veteris Fabulic. 1 vol.	3 f _#	
PLAUIUS.—M. Aecii Plauti comedise, novissime recognitaet emendatse a Rich. Fr. Phil. Brunck. 3 vol. in-8.	,5 ^	
— Papier fin.	8 fr\$	

- * PuNits. — C. Plinii secuadi historia naturalis. 5 vol. (Epuisé.)
Une nouvelle édition se prépare.
- *PLINIUS. — C. Plinii secundi (junioris) epistolae et panegiricus. Accedunt
alii panegyrici veteres. 2 vol. (tipuisé.)
Uac nouvelle édition se prépare.
- POLIIO TREBELLICVS. — Vide *Hist. Augustas scriptores*.
- PRISCIANUS. — *Fide* MELA.
- PROPERTIES. — *Fide* CATILLUS.
- * QUINCTILUNUS. — M. Fab. Quinctiliani opera. 4 vol. (fipuisé.)
Une nouvelle édition se prépare.
- Uū RUSTICVS SCRIPTORES vetères latini: *Cato, Farro, Columetta, Palladius* , qui-
bus accedunt Vegetius de Mulomedicina, et Gargilii ftlartialisfraginentum,
cum lexico rustico. 4 vol. * 10 fr.
— Papier collé. 15 fr.
- RUTILIUS. — *Fide* MELA.
- SALLUSTIUS. — C. Crispi Sallustii opera. Editio tertia. 1 vol. 3 fr.
- SARBIEVIUS. — Math. Casimiri Sarbiewii (Sarbiewski) Carmina. 1 vol. 5 fr.
— Un petit nombre d'exemplaires sur papier fin. 5 fr.
- SENECA. — L. AnnaEji Senecae philosophi opera. Editio nova. 5 vol. 18 fr.
- SENECA. — L. Annaci Seoecae epistolae morales, ad fidem vetcrum librorum
in his trium MSS. Argentoratensium , recognovit, emendavit, notisque
erilicis illustravit Job. Schweighasuser. 2 vol. 10 fr.
- * SENECA. — L. Annaei Seneca tragedia; x vol. (fuisé.)
Une nouvelle édition se prépare.
- SENECA. — M. Annaei Senecesc Rhctoris opera. Edilio nova. 1 vol. 4 f.
- SEXTUS RUFUS. — Vide *Hist. Rom. scriptores minores*.
- * SIMUS ITALICUS. — C. Silii llalici Punicoruin libri. 1 vol. (tpuisé.)
Une uoinelle edition se prépare.
- SOLINUS. — C. Jul. Solini Polyhistor. 1 vol. 1 fr. 50 0.
— Papier collé. 3 fr. 75 c.
- SPARTIANUS JELIUS. — Vide *Hist. August** script,
- *STATIUS. — Papinii Statii opera. 1 vol. (ipuisé¹.)
Une nouvelle édition se prépare.
- SUETONIUS.— C. Suetonius Tranquillus. Edilio secunda. 1 vol. 3 fr. 50 c.
- SULPIČIA. — *Fide* PERSIUS.
- STRUS PUB. — *Fide* PHCDRUS.
- * TACITUS. — C. Corn. Taciti opera. Editio secunda. 4 vol. (tpuisé.)
Une nouvelle édition sc prépare.
- *TERENTIUS. — Publii Tarentii comajdiae. 2 vol. (fipuisú.)
Une nouellei'dition se prépare.
- TIBULLUS. — *Fide* CATULLUS.
- VALERIUS MAXIMUS. — Valerii Slaximi dictolum factorumque memorabilium
libri novem. Accedunt Julii Obsequentis quaj supersuift ex libro de Prodi-
giis. % vol. 5 fr. 50 c.
- VA. — [tl. Ter. Varronis de Liuguu latiui libri qui aupcr?uiU , cum qus