

B I J D R A G E N *auctio*
TOT DE
F L O R A

VAN

NEDERELA *H INDIE,*

op eene, in de *N*
'cr Java, waa *O R*

C. L. BLUME, M. D.,


COMMISSARIS VOOR DEN BERGERLIJKEN
GENEESKUNDIGEN DIENST, DIRECTUER
VAN 's LANDS PLANTENTIUN TE.,

BUITENZOKG, ENZ.

gde. Stuk.

B A T A V I A
TER LANDS DRUKERIJ

1825.



B Ij D R A G E N

T O T D E

F L O R A ,


S Y N O P T I S C H E B E S C I I M J V f N G
v'an cenige planten, beboorcmle tol tie familie 'lcr
*Urtice*ⁿ op eene, in do jaren 18a>`¹⁸²i t.c*
iaue reis over Java, waarycnomen en bcschrevcn,

SECT. I. PIPIOIEOSANTHEAE.

Meceptaculum commune sqitamis snhclanmm
Orcufffas Jlosculos vel in eodem vet in d'st>'ncto
individuo. Embryo in albumine carnosو inver\$ui.

BR0&GNIARTIA, Bl.

*Monoecia Hexandr. L. fam**. nat. *Urttcانmu*
Keceplaculurn turbuatiim, coriaccu'n, basi bi-
bracteatiim, ore squamls 4 conniventibus subchtii-
sum, intus obsituin floibus aut miscallf aut fen i-
Heis ecaliculatis el apet&lis. MUic<: Stamina cirdtei
**>7 \ filamrnta parva • anfherae njmx ftdnatM.*
Fein.: Ovaria plura, pyramidata, i-ovulatn: sti r-
ma obiusam, sessile. Baccac rcccptaculo fisso et
nvexiuscido urabellattm insidentes, monosperniai.
Albumcm carnosum. Embryo inversus.



Genus liocce distinctissimum ad *Mti/tru latean*
zYiqmd accedons dicavi Cl. *Adofpho JJ rongnart*
 BoUnico meritissinio.

BRONGSIARTIA CORI./C^{E.A.}

Arbor procera, foliis suboppositis ell; ^{ptice > obk} longis
 verins apicem repamla-seiratis, raceuu^ axiilaribus
 lateralibos Te conj] > ositis.

Cr.:scit: in montosis S"-alak, Parana etc.

Floret: Novembri; Martio.

fflonwn: Kiba^{ra.}

FICUS, Linn.

Hecplaculuni carnosum, globosum aut turlii!
 tum^ basi bractatum, apice squamulis conni^{ven} hu &
 subclaiisuin, intus obsitum floribus pcdicllaug, Mas*
Calix tripartitas. *Stamina* tWa⁺ flu>di menturn Pi-
 stilli. Fcm.: *Crlix* "J o-partitus. *Ovarium* snpe-
 rum. *Stylus* 1 atcraJis. *Hfigmata* dao. *sJceniu* in
 tunicatani* *Kmbryo* iu albumine carioso inv<ersus.

*A^{r.} foliis integerrimis**

FICUS RELinOSA* Linn.

EV foliis longlssime pctioiatis subrotimdo-ovatts ac
 miiKUiisanis basi Mxbrepandis, fructibus globosis
 geminatis sessilibus, caule arborco.

Petio!. loii^it. 3 — 5 JK»IIIC. *

— it. 2¹ —

lat — 6

Cres-

* Dimensione Anglica.

Crescit: circa Bataviam.

Nomen: Buntit Kalodja.

✓ *y^flCUS RUMPHTI, BL*

F: fonis lato-ovfrtJs acuminatis basi sub IT prmd o-cov-datis, fructibus sul>~~globo~~sis gcmlnods sessilibus vor-rucosis, c;axle avborto. (Ar]or Concillorum Rumph. 5. t» 92.)

Petiol. longit. $il = 3$ pol'ic.

Folior. —— 3 — 5 —

—— latit. $2\frac{1}{3} = 4\frac{1}{3}$ —

Cr>scii: prope Bat a via m.

Nomen: Antsjak, Cajn Eodi.

✓ *Z⁷* /Yri⁹* SAXOPHILA, BL*

F: foli^ws coui^{ertis} ovate > - oblongis aaminatis br^{si}
Sub cord alia membranaceis glabris subtus palli*
t'i^{oribus}, frⁱ ictJlnis pisiformifjus umbonatis lae*
vibus gemi uatis sessilibus, caulc arboresccntc-

Petiol. longit. 1 — 2]-rollic.

Folior. —— 4 — Cf — h

—— latit. $2\frac{1}{4} = 3\frac{2}{3}$ —

Crescit: in mentanis Provinciae Bantani.

Nomen:

✓ *7CTO LAEVIS, BL*

F: foliis subrritundo-ovatis L ellpticis acuminatfs basi rotundato*subcorda Us fiuciibiisijue cerasiformibus

penrTu^{lf}<; *otitnriis laevibus, gemmis acummnntis ~~gjac~~
Lns, cauie **scaudente**, (afF. *F. laevigaiats* West.)

Pe iol. longit. i_c — s§ pollic.

Folior. —— 5 — 8 —

—— Ult. S\ — 5 —

Crescit: in niotife fia'afc.

Women; Leles a¹ oy.

*Jmrio** foliis infra **subtiKter** rcticulatis. fructl-
rib as suhstrigosis, gemmis subsericeis.

Variety h, orania praecedentis scd fructibus majas<*
cu'is, caale arboresceute.

*Var*W. c*, foliis ovato-ellipticis acuminatis in vei
subtus fructibusque subpubesctntibus.

y *FICUS COnDIFQLTA*, BL

F: foliis **cordatis** ovntis v. ovato-oblongis acuminatu
corinceis supra **glabris** suhtus tomentosis, fructi-
bus o'tovatis pcduuculatis glabris solitariis »caule
arboreo.

Petiol. Tongjt. a ^- s{ pollic,

Folior. ••••• 4i — cj —^-^

—— latit. 3 — 5\ —

Cr<"ic:t: ad muilein Parang.

Women:

F7CTTS PELTATJ, BL

F: folijs pejifltis suVotundo-eHipticis *hnsi* ~~sibinae-~~
O ~~f~~ **cordatis** cauie radicautc parasitico.

Pe-

(439)

Pgtiol. longit. § — | pollio.

Folior. 6 * 7 —•]

— latit 4½ —

Creacit: in sylvis altioribus Javae insulae,

'Women: Kitjili-Badak.

FICUS COMPRESSICAULIS, Bl.

F: foliis elliptico-oblongis acuminatis basi profunde subinaequali-cordatis supra glabris tenuitor reticulatis infra in costis petiolis ramulisque compressis villqsis, caule parasitico radicaate.

✓ Deob Petiol. Jongit. 1 — i§ pollic.

Folior. — 8 — n —•

— latit. l| — 4| —

Credit: in montanis Provinciarum Luitenzorg, Ban[^] tam, elc.

Nomeni

FICUS TtUPESTRIS, Bl.

F: foliis cordatis acutis v. acuminatis subobliquis membranaceis scjis longis obsessis subtus tcjuuissiine reticulatis, caule radicante villoso.

Petiol longit. J — J. pollic.

Folior.—i'. — 2 J —

— latit. ² — 2 —

Ctescit: ad rmpes ol catar<arias monlis Burangrang/ ac in monUms Saiak et Cede.

•*Nomen:*

FI-

FICUS TENAX, Bl.

F: foliis ovato-oblongis acuminatis basi rotundato-
subcordatis glaberrimis in foliorum juiiiorum ve-
ijis subliis pctiolisque rubentibiis,, fructibus . . .
. . . , caule arborescute, ramulis stria tis .

Petiol. lojigit. § — 2 pollic.

Folior. —— 3 — 8 ——
— latit. $1\frac{1}{3}$ — $3\frac{1}{2}$ ——

Creicil: e China iutroducta.

Nomen:

FICVS JAPONIC A, BL

F: foliis oblongis acuminatis basi rotundato - ror-
datis supra liispidis subtus glabriusculis, fructibus
• • • v • • • , cuule frulicoso.

Petiol. lojigit. 1 — $i\frac{1}{2}$ pollic.

Folior. —— $5\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ ——

«»~"..." lalit. $2\frac{1}{4}$ "TM $0\frac{7}{12}$ *~"~"TM

Crescitex. JapQtia sub nomine F. erect a a Doct,
Ulcbold niissa.

Nomen:

S\$ICUS STIBCORDATA, ^

F: foliis ex ovato-ellipticis obtiusculis basi rotun-
dalis subcordatisve transverse parallelo-stria tis lac-
.vibus, caule arborescente.

Pcliol. longil. 1 — $i\frac{1}{2}$ pollic,

Folior. —— 5 — Gl ——

— latit. 3 — 3§ ——

Cre\$-

Crescit: in insula Timor vel etiam regione ibns occidentibus Proviticiac Ban Lam insulae Javae.

Nomen:

 **FICUS LJXATJ, Bl.**

*F. foliis ovalibts acammatissimis basi rotundatls co-
riaceis subtus reticulato-venosis ramulisc[ae] lana-
tis, faudibius pisiformibus pedicellatis couertenis
glabriusculis, caule parasitico scandent^.*

Petiol. longit. | — 1 pollic.

Folior. ——— 3 — 4 —————
——— latit. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ —————

Crescit: in sylvis Salak.

Nomen:

 **FICUS VILLOSA, fil.**

F: foliis oyato-oblon^is acmniadiis, basi rotundatls interdum subcordatis margine recurvis coriaceis reticulato-venosis subtus potolis ramulis fructibus (sic) mollissime villosis, fructibus pisiformibus couertiis sessilibus, caule scandente.

Petiol. longit. § — i pollic.

Folior. ——— 3§ — G§ —————
——— latit. ij - $2\frac{1}{2}$ —————

Crescit: in sylvis montium Salak, Gcde etc.

Nornen: Aroy Konjal; Konjal Beas.

 **FICUS STRISOSA* JM**

F: foliis elipticis obtusiusculis cum macrone basi ro-



(44*)

tundato-subcordatis coriaccis tenuissime reticulatim
subtus punctatis et in costis petiolis ramulisque
strigosis, caule scandente.

Petiol. long. 2 lin.

Folior. —— 2 — af pollic.

—— latit. i — i* —

Crescit: in calcaieis syhaticis Parang.

Nomen:

FICUS FILIFORVs, Bl.

F-' foliis oblongis obtusiusculis basi oblique-cordatis
supr[^] scabris subtus pubescentibus et tenuissime
reticulatis. caulibus Jrliformibus scandentibus.

| Petiol[^] ongit. 'l — i§ I in.
|^M^ J*lior. —— I — 11 pol'ic.

fifescit: in montosis Parang*

• ^ *Nameji:*

FICUS UICROCARPA, Bl.

F-: foliis ex ovato-ellipticis acutiusculis integrerri-
mis basi rotundato-cordatis coriaccis supra gla^{**}*
briusculis subtus reticulatis in venis margine ra-
mulisque strigosis, fructibus axillaribus subsca-*
silibus, caule scandente radi[^]ante.

Petiol. longit. | — § poNic.

Folior. —• i| — 4 —

—— latiU i} — aj —

Cresc:

Vrescil: in syh-is altioribus Fruvuisnua oCCt-dentalium.

Nomen: Koiijal beas*

~~FICU~~ \$ **CHRYSOCOMA**, Bl. ~~= fulvo~~

F • foliis ovalibus acutiusculis basi subcordato-rotundatis margine j*ecurvis coriaceis glabris• **venii** sub tis prominentibus reticulatis ^ gcmtnis ~~coni-~~ cis fulvo-pubescentibus , caule arboveo.

Petiol, lonjot. I —• Z ix>llic

Folior.—3. | — 5 —,

— f i 3 r*3 —

Crescil: in calcareis prope Kuripjii.

Nomen:

FICUS SERPUJJFOTJA, Bl.

jp.* foliis oppositis snbrotutidis junionl>U5 utrinque pilis minutis adpressis, caulo radicantu iJUiormi.

Petiol. longit. $\frac{1}{2}$ — 1 lin.

Folior* — $\frac{1}{2}$ — 1 pollic.

lait. | — | —

Crescit: ail 1K;viornn iipas lUuutiaJU a!tt>rum Javae itisulae.

Nomen: Djukut Seria%van.

prcrs I err OPT r,r~R 'I n.

*F**: foliis ovato-ol>longis obiussiuseui;s basi obi_{usis} coriaccis fclubris albido-c^it.st's, fructibus glo-

bo-

(444)

bosis pedicellatis geminatis verrncoſis, caule arboreo. (a(F. F: bengalensi et F: iusipidae.)

Petiol. longit. | — i\ pollic.

Folior. —— 7 — 9 —

— latit. 4 — 51 —

Crescit: circa Bataviam, Buitenzorg, etc.

Women:

!stems **FICUS LUCESCENS**, Bl.

JP: foliis oblongo - lancolatis acutis basi rotundatis ubemarginatis lucidis subtus tciuissiine reticulntis gemmisqie elongato - subulatis glabris, caule arboreo,

Petiol. longit. § —. 1 pollic.

Folior. —— 2 — 4i —

— latit | —'if —

Crescit: ad ripas fluviorum circa Buifenzorg etc*

Nomen: Loa.

FICUS ALTISSIMA, Bl.

JF: foliis ovalibus utrinqiie acudusculis 1. basi sub* rotundatis coriacēis glabris venosis, ycnis snbtus tfenuiter reliculatis, fructibus ovalibus gcmiiis solitariisvc sessilibus, geminis acuminatis sericeo-pubescentibus , caule al'boreo. (accedit'F; callophyllae, F. procerae et F. cotoneaeioliae.)

Petiol. longit. i| — 2 pollic.

Folior. —— 5 — 6 —

— latit. 2| - 31 —

Crcs-

Creauli in montosis praesertim calcareis.

Women: Kiara jinkaug.

FICUS CALLOPHYLLJ, Bl J *lun*

F: foliis ellipticis obtusiusculis basi parum attenuatis inargineque callosis venis approximatēs parallelis pergamaceis glabris, caule arboreo. (all. *F. reflexac* Thunb. et *F. insipidae* Willd.)

Petiol. longit. 1 — i§ pollic.

Folior. — 4 — 6 —

— latit. 2½ — 3½ —

Cretcit: iii sylvis Solashie Provinciae Tjanjcr.

Noinen:

FICUS PROCERJL (Herb. Rwdt.)

F: foliis elliptico-oblongis margfne cartilagincis sub» recurvis utrinquu acutiusculis pergamaceis glaber- rimis vcui9 su!)lus pro mine nti lms ct tenuiter reticulatis, fruedbus ovalibus sessilibus geininatis axillaribas, gemmis acutiusculis glabris, caule arboreo. (aflinis *F. altissimae* et *F. rubeseenti*, sed difTert magnitudine partium veuis^ue iul'ra maxime promineutibus.)

Petiol. longit. 1j — 3 pollic.

Folior. — 6 — 9½ —

— latit. a} — 4i —

Crescit: in sylvis inontanis.

Nomen: Kiara Payung; Polm Kiara.

ly ~~FICASTIC~~ A, No?S.

F: foliis ovali-oblongis acixtis mnrgine rccnrtis l>asi p.u-uin aculis tenuissime costatis coriaceis glaber-riuiis, canle arboreo.

Pctiol. longit. 3 — 3| pollic.

Fo ior. ——1 — 2 ped.

— laiit. 5 — 7 pollic.

Crpjcil: in ca'careis.

Nomen: Karet; Karet Tapok.

Variety bengalica: foliis acumioatis margine subundulatis.

CrescU: ex liorto botanico Calcultejisi allata*

FICUS PILQSA, Herb. Rwdt.

JT: foliis clliplico-oblongis acuminntis basi rotunclato-oblusis subcordiUisvc iiijacquillatribus coriaceis stip^a nitidis juniovibus ramylisque sul)tus j)<bc fciTtigüiea deliquescesti-toincentosis, fruclibus oblongis gcmigatis sessilibus, caulo arboreo.

PelJoL longit. § — i| pollic.

Folior.——5 — i3——

——la'.il. u| — 5——*

Crëwil: in sylvis altioribus nionlis Salak.

Women: Matta **bagns**.

FICUS AVI AVI.

T| foliis ex Qvato-cllijy'ticis oblusis margine sub car ti-

laginejs nndulnus basi **rotund** .-its coriacets **g!a-**
berri**nis, fmctibus**
caule arboi'cn.

V< ttoi. longif. 2 — 2| pollic.

Folior. — 5 — G —

—. — filii. L^TC *** P. — m. —

Crescii : ox **insula Madagascar** allata.

ISi.men : sub **nomine** avi avi **incolis cognita**,

✓ *VVICUS INVOLUCRATA*, BI.

f.* foliis ovulibin **obtosiascolis** basi **rotundads i** pa-
 ram ationuatis **pcrgamaccis** {labris};, fructibus ^r-
Tthinatis sessilibns subi^obosls calice **involci**ratis,
caulc arborco.

IV*tiol. longit.* i — 1j **pollic.**

Folijor. — 5 — 7½ —

—. — I II I I f-J j — 3¾ —

Crest- i^rla tuonta **S. Jak**,

Namen:

✓ *FICUS CONSOCIA* T. /, Bl.

P: **folia** versus apicem rnmornm confertis lon^itcr
 pctiolatis **elliptico-oblongis** actitis basi **obtnsig**
 Lripiiiic'i'vii's coriaceis supra **glabris** sifbtas cvn-
 descente-torocntosis, **fracibus** globosis conglome-
 mei-atis sessilibus **folvo-tomcntosis**, canle arboreo*

Petioi. longit. i — a pollic.

Eolior. — i| — $\frac{gr}{2}$ —

— latil, i^Ts — a* —

Cres-

(443).

C'escii: in mouto&js Salak*

Nomen: Kiara Gniinng.

~~F~~ *FICUS MAiHOLTAEFOIJA, Bl*

F: foliis oblongis breviler obtuse acuminatis basi obtusiuscraiis depivsso-biglandulosis coiaceis glabris remote pursillelo - vcuosis « venis ^iibtufr promiucntibus leuuissimc rcticuiatis, fmctibus: cerasiornibus breve peduncilatis geminis, caule arboreo. vffffis affine F. insipidae Willd.)

Fetiol. loJigit. | — | pollic.

Fo!i»r. ————— Si — 8 —————

————— klit. ;2 — 3 —————

Crescil: in sylvz̄s .Salak.

JNomen:

FIC'TS ASW'LATA, BL

F: foliis elliptico-oblongis acuminatis bfli rotundatis v. obtusiusculis coriaceis glubris, venis infra subrcticulato-prominentibus, fructibus ovato-globosis geminatis breviter pedunculatis % eaulc scandentc, ramulis casu stipularutu velutino-pub^s-rentiuui aiiimtatis.

Pefiol. longit. 1—2 pollic.

Fo'ior. ————— i 5 — 9 —————

————— lalil.: a — ?%————

Crescil: in sylvis obs curio rib us monlis Salak.

Nomen. Kiara aroy; Tnrrup aroy.

Fa-

Kariet. • foliis oblongis **ntridtfMc** acuminniis.

CretcU: in *sylv* is m uitis l*rf"aii; *L*, Provinciae Tjanjor.

^ **FICUS** **VALID** As **BL**

F: foliis oblongis **acuminatie** basi. **obtasiuscolis** venosis **Gtibtns** vcliuino-tomentosis reticulatis, iructibus **globos**is gcminis pcduncuintis **Iaeyibiis**, caule arborescente.

Pctiok loncit. 3 — il pollic.

To ior. — i — ♀ — i pcd.

>^r *• kilil. i^ — 4 poliic.

*escit; in **Bvlris monlifl** Satak.

Nomen:

FICUS FLAVESCENS, B).

V foliis oblongis acuminntissimis bnsi **attetitmtu** subcoiiaceis **glabxis-remote** parnlclu-vi'iiosis, gCminis acmniuai^s **glabris**, critic scandente, r&muïis •uperue anuulatis* (**maxime** accc<!it F. annuinri,)

Petiol. longit, JJ — a pullic.

Foiior. — 8^ — i'A — — —

Crescit: id moulaiis Saiak et Oede.

Nomen: Kiara Konneng.

FICUS GLOBOSA, BL

F: foliis cliptico -oblongis acuminatis basi rotund Mis V. obtusiusculiii C*riaccis* glabris, veris subtus valdc proimntniiljiis **reticulatis**, uuciibas **cerasi-**

f'oiuui—

for rūth us go minis kcvvis-iinc petJuiVcitlatis umbilic
lice> pi a; 10 gcnr.xq^Ri* acuoiiuat.ss!mis glabris,
cuaie scandcate radicaute*

PettoL longft. i — 2 ;_{follic.}

Folior———G* — u',
——talit. 23 — 31 —

O| i*s*•i ; •s; ;v*mo* lit is Parang.

Nomen:

~~FICUS~~ **DEPRESS A, BL.**

✓ **F:** foliis cliiptico-oblonus acuminatis basi rotund;_{atis}
uounuliis basi acutiuscalis ooxtaccis glabris veuis
subtus redculads, fructibns pruniformibas latere
de[JL'essis lougiter pcdauculatis gemnils umbilico
prominciHo gemmisqae acuniiiatis glabrisj caule
scitndente* (respcttu formaea folioi'um valdc ac-
t'L'dit ad F. i;lo!)osairi.)

I^oiiol. Longtt. i — i| jiollc.

Folior. ——5 — 8 $\frac{1}{2}$ —
——Utit 1 $\frac{1}{2}$ — 3 $\frac{1}{2}$ —

Cresci: in sylvis altioribua Su!ak.

JS'omen: Tmrrtfi Aroy.

~~FICUS~~ **SUNDAW4, VA.**

✓ **F:** foliis obloii^i's obtuse acuminatis basi Icatiuscalis
suLbtrinerviis margnic subrecurvis coria<ceis glabris
infra tcnuilur sn!>]Ka'iillclo-^L^nu sis, gemmis sub»u-
latis glabris, cattle orborco. (Proximc incedere
videtai¹ ad Ficuin iervo sam Rot].)

I 45*)

Peliol. longit. \ — 1 pollic.

Folior. —— 4½ — 7 ——

—— latit. 1½ — 2½ ——

Cresci: in moatosis Provinia riim Btutenzcirk, Tjan-jor, etc.

Nbmen: Kiara ,lii)j;uig.

FICUS Pi: LA TFOUMTS, Bl

F: foliis ohlongo-lanceoWis lonelier acamioatM co-riaceis glabvis distauter paraUelo-venosis sobtosmie levi•u-i- reticu!atis, fVticiibus ovato-oblongis pc-dsmculatis geminis glabris, gemmis elougatia subaUs, caule arboreo. (an I | insipida, Wild.?)

JVliol. longit. 2 — i pollic.

Folior. —— 4i — 7 ——

—— ialil. 1| — i§ ——

QjjscU: in Bylris moults Btiraugi-ang.

^Vume.i: tiara bua.

FICUS GLABERRIMA, Bl

F: foliis obi o up is acn.uiuatis basi vix attemutlfs frabusqne pedancolatii piMlormibns ^CMUnis glaberruiis subparallelo-vcnosis,, gcmnis brevibus subu]atis« caule ;rbo;co. (nil. l\ suiicij'v.iae Valbl, ct ./'. ncn'osae Hoili.)

Petiol. loupt. 2 — 1 pollic.

Folior. —— 3 — 6½ ——

—— latit. 1½ — 2 ——

Cres-

(frescH: it:i B\$ivia tatmilio ribus montis Sala)

Nomen: K iara rii n bay.

FICtJS GLABELLA . IH.

F: foliis ultiptico-ouli.n:Ms **utnque** obtusiuscnlis clu-
Ijerrinus **supra** vcnosis SUIJULS **tenuissime** ruticu-
lati.s, pcliolis subgeuictilaLis, frucLibus **pisiforroi-**
]us **icssiliLus** **geminalis**, **gerrtmig** obLasis, c;r
arboreo.

PcUol. loMgii. | — i pol'ic,

Folior.	—	$\frac{1}{2}$	—	4	—	
—	—	^o	—	—	—	
—	—	latit.	$1\frac{1}{4}$	—	2	—

Cre: %cU': ad margincs iluviornm circa iUutcnzorg, etc.

Nomen: Kia eas.

FICUS PUBISERFIS, Bl.

*T: folHs oLlongis olilusiuscults **kifii** aLtcnuatis co-
riuccis ad eostam infra pctiolis **gemmisque elo-**
gato - subulatis scriceo - pubcscutibus, fmctibu*
gl>bosis **geni:na:i i i** subscssilibus, caujc arbo*co*.
(ttff." F. elfihraciuliac WitM.)

Pctidt. longit. J — l poliic.

Folior.	—	—	— 5	—
—	—	—	—	—
—	—	latit.	1 — $1\frac{3}{4}$	—

Crest it: in montosis.

Kopping.

Va.

Var'let. : fuliis lauccolalis obtuse acuniimiti.s*.

I**e'vol.* longil.—• £ p*)llie.

Folior. —— s| — 3 ——

— latit. $\frac{2}{3}$ — 1 ——

Cresci': ill **Provinciac Bantam** rejzionibus nnmtnsis.

IS omen: Kia-a attul.

~**A

FICUS RUBMSCEtfS, BL

F: foli is elliptico-o Montis aCq_{tinusc}ills basi obtn_{sis} mnrginc recur vis covtaceis glaberrimis ad c#etam sdbtus ranmlisonc nibicundis, fructibus ovato—globosis geminatis sessilibtis, gemmis acuminatis suhscrccis, caulk arborco. (uff. F. rubrac Roth.)

Vrliol. lon^it. \ — i pollic.

l"olior.—* 3| — ' > ——

— latit. $1\frac{1}{3}$ — $2\frac{1}{4}$ ——

Crescit: in montanis.

Noms.i: **Kiara** peneng.

i|^FWUS RXJBRA? |M.

i-* fuTus ovalibus u Erin (pie oLtusiuscivlis corlaccis glabins **Umniter** parallclo-wnosis, jcmtius **aciuninatis** longitudinc tnodiocri, caido arborco.

Petiol. LongH; j — ^ poll ic.

Folior. —— 23 — 4 ——

— latit. $1\frac{1}{3}$ — $2\frac{1}{4}$ ——

Crescit: ad monter **11** Salak etc

Nomen: **K.tara** aiinjik.

EA

FfCr/S Pl&OCA'RP I. BL

F. foliis ovaKbus obtuse acuminaUs basi .sotundatU giabvis snbtsn tennissime reiiculato-venosis, Irac-til»us pisiformibos geminatis sessilih^p pi a no-um-bilical is. gemmis brevibus subulatis, caule arbo-reu. \ai\ t . striatae Roth.)

Petiol. Jongit. i — | i>ollic.

Folior. ———'i\ — 1 —

— latit. 1\ — 2 —

*Crettcit: in montdsifl Ocnle.

Nomen:

FJCUS VIR 3ATA. (Tlcib. Rwdu)

F. foliis obloiiigo-lanceolalis acuii minati basi acn tis transverse pai*nlle]o-vcnosis laevibas, fructibas pisiformibns brcviter pctlunculatts c genins is axil-l.'irihus sabsolitariis glabris, caalc wborescente ranns virgatis. (aff. V. stnatac Hotlr.)

Petiol. longlt. | — | p ollie.

Folior. ••— 4 — 7 —

— latit. U — 2\ —

Crescit: in Moluccis et sylvis Tji.ingassae Provist- ciac Bantam. Javae insulie.

Norn en -

fl< S US UM30SATA. (Herb. Rwdt.)

F/* foliis elJiptico-oljlongis utrinque acdj^cnli* in-sequilate•vibus C'riacer's ntri inque scabris venis su b-

(455)

*ins pi'ominentibus subreticulato-punctatis; fruc**
*tibus obovato-globosis breviter pedunculatis sub**
*geminatis umbilico hiantc ramiiliscjue scabcmimis **
caule iiriuioco.

Peliol. longit. | — f pol?ifc.

Folior. —— 3\$ — 4i —•

—• latit. ij — a —->

Crescli: in insulis Moluccanis.

Now en z

FICUS NITIDA, Thunb.

F; foliis ellipticis obtusiusculis glabris tenuissime pa-
rallelo-striatis, fruc tibus pisiformibus suhgeminata-
tis scssilibus depresso-umbilicatis, gcmnis subu-
latiis, caiile arboreo.

Petiol. longit. J — J pollic.

Folior. —• 2| — 3§——•

—• latit. i§ — 2 —»

Crescit: in regionibus cultis.

Nomen: Siringen', Kiara ramboy.

FICUS LITTORALIS, BL

F: foliis ovalibus utrinque obtusis pergiaccis gla-[^]
fcerrimis margine. subcartilagineis parallelo-striato-
Venosis subtus glauco-\irescenibus, fi-uctibus pi-
siforj[^]ms sub geminatis scssilibus verrucosis pia-
no-tfBrilicatiff, pemmis brevibus subulatis, caulo
• fcaudemc (loii[^]nim forma j[^]roximc accedi r,

ad t\

C 456)

ad F. *nlfidam*[^] recedit tamcn foiiis rigid icrr[«] bus submarginntis, fructiuim iiinbilico piano m-c reluso , et caule scandentc. An satis distincta est a F. aggrcgata Person?)

TeLiol. longit. J — } poliic.

I'olior. ——* 2 — 4 ——

—→ lalit. ii — a{——

Crescti: ad/ipas iiLtotum Nusae Kambangae Insulat.

Komen:

jy[^] **FICUS EENJJMIWJ, Linn.**

JP; foiiis ovato-1. ovali-oblongis obtuse acuminatiff basi obtusiiisciilis tcuuLssirne]Kirnilelo-sti'i;itis gla[^] berrimis > iVactibus pisiforinibu[«] bubsuisilibus , geumis subulatis, caule arboreo.

Fcliol. longit. 5 — § poliic.

Folior. ^— a — 3J——•

— Inlit 1 — i₃*——

Cre&cit: locis culiiff.

Xio/nen: Varingin, "Waringi, Tja;-ingiu ^ Cagaway, Kiara jajava.

v FICUS DiriSBSTFOLM, Bl.

F: foiiis obovntis rnrius lanccolat^{is} coriaccis laevibus subtirs (lavesctitibus glandalisque sacpc atropurpurcis in a-sillis vcnariim notilis, ii'uctibus ovnlibns pcdunculaiis subgeminatis, C2^K fruticoso interduiu **parasitico**.

(45*)

PetioL longit. 1 — a lin»

Folior. ————— 1 — i| poJlic*

— latit. 3 — 1 1 —

Creicil: in sylvis monlosis.

Notnen: Tankurat.

FICUS ALLUTACEA % Bl. *Tankurat*

X^l: foliis ovatiis acutis basi obtusis marginc carti* lagineis recurvis coriaccis glabris subtus reticulatis puncuitis. friiciibus cerasirorinibus pcduiiculatift solitariis, caule scaudente.

Petiol. longit. J — 1 pollic,

Folior. ————— 4 -* 7 —————

— lalil. 2j — 4 —————

Crexcii: in s)Ivis iuiniidis inonlis Salak.

Nomen:

Ohsprvat. in montanis Parang observavi specimen cauiibus compressis, foliis praecetlenti vakte milori has- submembranaceis oblongis acutis basi oluosis subtus asperis et reticulalo-puiictatis inoccipilateibus; forte planta junior liujus speciei?

FICUS RECJTRrAj BL. f.

Fi Wfiis ovali-oblongis acutis basi oblusiiisculis mar* girje rtxurvis coriaceis supra nitidis subtus reticulati~~yillo~~sculUs, iuetibus pisilbrmibus glabris~~anglo~~merittis scsillbus, caule parositico scandente, yanuius uitiiuis lusco«villobis»

Pe-

Petipl. longit. I — § pollic,
 Fulior. —— • 3\$ — o|——•
 ——latii. » § _ 3 - r s —

deficit: in arboribns circa Buitenzorg/Parang, etc.

Nome n: Amp las Aroy

✓ FTCTIS TRICHOCJRPA, BL.

P: foliis ovnibus acutiusculis bnsi rotundatis[^] rigulis supra scabembris subtus reticulato-vcnosis fi'ucubuscipie pisiformibus pcdunculatis geminatis ramulis[^]uc villosis, caule scandente.

Petiol. longit. | — ^ pollic.
 Ft»lior. —— • a| — 5 ——
 —— latit. 1 — i| ——•

Cresc'U: in syVis montiq Pangoerangoe,

JNo/nen. Ilampclos Aroy.

✓ FICUS DISTICH A, Bl.

F: foliis ovalibus subemarginatis basi attciualis coriaceis glabris marginc sub recur vis subtus reticulatis puiictatis, fructibus sul)gcmiuatis oL ova I is brcviter pcdunculatis glabris, caulc scaudente? raiuis distichis.

"petiol longit. | — { pollic.
 Folior. —— $\frac{4}{3}$ — $1\frac{2}{3}$ ——
 —— latit. $\frac{2}{3}$ — 1 ——

Creacit: in sylvis Salak.

jYomen; Pereng gaiitong,

FTC.T⁸ MACROCARPA, Bl.

foliis cuneatis apice rotunda to-emarginatis inaequilateribus coriaccis glabris subtus albido-purpureis, fructibus subrayscaleo-iso-pendulis maximis, caule radicante scandente, (aff. f. punctatae Thuub.)

Peliol. longit. 2 lin.

Folior. — 1 — 11 pollic.

— latit. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{2}$ —

CrescU; in ay 1 vis m on tan is.

Nomen: Kontol Mnnding.

Ohserval. Description F. falcatae Thunb, rite quodrat cum planta juniore hujus speciei, et sine dubio cadein cst.



foliis ovato-oblongis basi rotundatis v. subcordatis glabris, venis infrigi pectioliscjuc puhentibus, fructibus pyriformibus pedunculatis confertis lateralibus laevibus rubro-variegatis, caule arboreo,

Peliol. longit. | → i§ poliic.

Folior. — 3J — 5 —

— latit. $2\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$ —

Crescit: in sylvis moiilium Salak, Parang, etc.

Nomen: Koidal.

~~ACUTS~~ LEPTCARPA, Bl.

foliis ^Hfiu's rniarius oppositis elliptico - oblongis acutis v* acuauinatis basi obtusis v. oblique rettudata-

lunrlntis suScoriaceis glabris, iructibus **globosia**
 SLSsliibiis geniinatis t̄cruisvc scabiiusrulis **superne**
 anuiilo squamuloso cinclis, cuulc airborco. (aff#
 JF, iistulosae.)

PelioL longit. J — a pollic.

Folior. —— 5 — ç) .»— ^

— latit. 2½ — 4 —

Crescll: in nmb'osis ad niar~~g~~iiios fluvionim,

Notnen: Ru..jiig-ljai; Tjangiiti Kras.

✓ FW/S *MELISOCARPJ*, BL

F: foliis ovalibus acutiusculis basi depresso-bigian^
 dulosis oblique roluudato-subcoi-datis iiiacquali^
 lateribus supra asperis snbLus ramulisquc vein-
 tino - mollibus, fructibus globosis peilunculntis
 geiiainatis scabris_f caule nrboleo. (Vlaxiuie acce<<
 dit ad l'\ *excelsam* Valil,)

Fetioi. longifc. J, — § pollic.

Folior. —• 4i — 7—*

— lalil. aj — 3§ — -*

CrencU: i» sylvis Salak.

Notnen i Ainplas Badak,

JB,foliis diiformhua%

^^ FTCUS SAXA 'IILTS ~~B~~;

F: foliis ovali - oblongis rostra tis b a ^ j p t i use ill f^
 subrepandis subtus scabriu tenuissime xeticulatis,

fructu-

(Uh)

fractions pisiforinibus brcviiev -pedmiculatitf vci^{1*}
yucosts sub^eminalia, caulc irulicoso.

Petiol. Ion git. a — 3 iii.

Folior* longit jf — 9 pollic.

— latit. $1\frac{2}{3}$ — $3\frac{1}{3}$ —

Crescit: m declivitatibus Bylralicis mtmtimn Pavanf.

Innan : Foven , Peri ng.

FUCVS CELEBWA, B).

F: foliis oblongo-lanceolatis acuminatissimis nasian**
gustatis supra basin cxigue **denticulatis in retica-**
latione vcnarum stibtns ferrugineo-pilosiusculis,
fruciibus brcvissime **poduuculatii** globosis miuuiis
subsolitaiis liispidulis, **cattle** frulicoso,

PeLJoiriotigil. — X pollic.

Folior. — 5 — 8 —

— latit. 1 — 2 —

CreacU: in iasuU Celebes.

Women:

FICUS SUBULATA, Bl.

F: foliis ovaliis cura ftenixSne <>'tnso basi acutis
latribus **siibinaequalifrus** toriaceis ylabris ve-
nosis, **fniptibns** globosis brovissimc pedunculatis
puberulis, gemm*iQ* cioiifcJii.is .subulntis? cauJe scan-
dente.

P_{Co}

Petiol. longit. § —• f pollic.

Fulior. ——• - 4i — 10J —

— latit. 2 — /§ —

Crescit: in sylvis montis Pa rail g.

Nomen:

FICVS PA7UETALTS, BL

~~F~~oliis cliiptico- oblongis longiter acuminate ha si
snhrepandis inacqualilateribus supra glabris sub-
tus molli-pubescentibus ^eticulato-venosis, petiolis
ramuliscjue ferruginco-tomentosis, caule scuiideile.

Petiol. longit. ^ — | pollic,

Folior. —— 5 — 8 —

— latit. a — 3 —

Crescit: ad parieles uionlis Parang.

Nomen :

Variet. ovalis: foliis exacte ovalibus cum acumintf
subulato, fractions pisiformibus breviter pcdua-
culatis subgeminatis muricatis.

Petiol. longit. | — 5 pollic.

Folior. ——• 4J — G —•

v——lulfl. 2J — l|——•

Cresc'U: ad monlcem Bonkok Provinciac **Tjanjor**,

Nomen: Draudan minjak.

FICUS AVRITA. (Herb. B t) d ^ . ^

F: foliis oblongi^ longissime aruniinauv^uHsi exfus
cum nppeudicc oblicjuis rcpaudis iufra subpubes-j

~~centi^rr, frnctibus pisiibrinibtu neduneolatifl sub*~~»
~~geminatis₉ cuuie huctcoso scnudcnte.~~

PelioJ. ioJigit a ~ i I'o.lic.

I'o ijor. —— • 6 - 1 2 ——

———— latit, aj — 3 ——

Cres ic&; in Moluccis.

Women x

*FICUS RIB*E?i** (Herb. Rwdt.)

F: foliis obiongo-l*nceolalia longiter nctmunats o¹*-
 solcie dtst:mtor serrnlHtis l:usi am ti use a) is in»e-
 quilateribus glnbriuscui*, iruciibos SLi')^lo')o.sis
 supefne gibboso - depressis breviter pedicelJ;»tis
 gcniiit^tis Ciifti foiiortiai rieemoso - paniculati.s,
 caule ai'boi*'Scenlo. \Huii»pb. Herb. A.inb, 3 I. yo.)

Pciiol. lungif. \ — \ ; o ii.

Folior. —— 2 — 5½ ——

———— latit. ¾ — 1½ ——

Crescit: in umbrosis sylvaticis.

No>iew Walang, Amis Malta.

FICUS ANGUSTIFOLIA, Bl

F: foliis lanceolatis acuminatissimis (non rostrat's)
 bine illii.c gibbosis basi Htfe emuat B glnbris sub-
 tus tcimissime trailsvers;: neticulat's sX hpmnetat's,
 iiur.t'Kus entile fruticoso. (Ma-
 ximc acccdit F- cusjjiuaUc.)

Petiol. longit. 1 lin.

Foliar. —— a — 4 pollic.

— lalit. § — 2 —

Crescit: in. Mctfuccis.

Nomen:

FWUS CUSPIDATA. (Herb. Rwdt.)

F: foliis laiiceoLitis rostrntis (*) **integerrimia** v. **df-**
foriiitgy reparcdis **bam arttennaris** ii^{naequalilate-}
iJbu[^]Pnbris li[^]klis supra lucidis subtus tennis-
riue **transverse reticulalts punttatis,** (ructibu*!
ixDuirais, b^{revissime} ^sdicell&itia cuiifurtis axilla-
rib us, cattle fruticost).

Putiol. longit. i| — 2 lin.

Folior. —— 3 — t§ potlic,

— laiif. § — i —

Crescll: in sylvis rnontosls.

Nmien: Pereng.

Variet: a, foliis iuturdmn dpntr; instruotis, *venis*
inira majiis pronaiueiuibus, caule **parasitico,**
Petiol. longlt. 11 — a li^{ll.}

ic.

JFolior. latit. si — ↑ poll *

*Crescit: oircA origiaein fluvii TjibiumW * ita-«*
Va-

* *Folium resfrttum* cujos alcemni latiis subito angustatum et In nca*
DgtOB SaCIM! iiKMi yam excursit.

2^r<grriet. • b. **faliis** pleromrjue grosse repandis scandente.

Peliol. Jongit. j| — 2 lirc.

Folior. —— 2} — 5 pnSlic.

— latit. $\frac{2}{3}$ — $1\frac{1}{3}$ —

Cr^scli: ia montosis Burumgrang.

X/^FTCUS IWSTRJTJI Lam.

J^; foliis cl!iptico-o!iloneis difformiter repandis rostratis basi ^cutls su^ra lucidis subtus reticula scabnustulis, fnictibus. pisifaruibus brevissime pL'diceilutis confcrUs axiliaibus, caalu Iraticoso.

P<j{iul. loirjif. 2 — 2J lia.

Foliur. —— > 3 — 4J pol'ic.

— latit. $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{3}{4}$ —

Crescti: ia montaim.

Nomen: Drendeng, Tlamplas.

*Varlet**; fo]ils iiitegerriinis.

Pelio!. longit. | — * pollic.

Folior. —— 3 — 4 —

— latit. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ —

Cfcscit; in sylvis altioribus Proviuciae BauUm.

FICUS RiaiDu⁴, Bl. -7 Gibbosy

foliis oMongia acuus v. **acamiaatis** snepe dill^{or.} miter gibbosifl Iasi oblique - attenuaiifl [anioribuj subtus rauftaiisqu€ sca&A'iusculis inat- qualilateribus

coria-

(4rc>

corinripi's rigirli's glnhrjs sn'ifciifl *P. nvescentibus*
(SIVVHUOIW fusco-v;»ri<»ptis^. frunliWs pisKormi-
bus St'ss!ji!>us o gemiuis axillaribus sub^eminatis,
Caule arbofi:ot

Peli.il. longft, | — J pnTlic.

F,i ior.—:—* - (§—

—• Jatif. i| — aj —•

Cresch: in sylvis m >nk sis.

No Pe^%png; Kia'a Peér.

Variet. ~~foliis~~ longioribus reticulatlonē sul>tu*
xnujus promiiieite.

✓ *FICUS HETEROPLEXTRA* | Bl.

Jp: foil's c>lipt.icis rostFnts has! j<tf*nn;>t's Integerrimis iiiit^rduMi ivp:>iifl's ^a'lri.s saprn Iurirlis sahtus irticu'jitis ja'iioriUus sii'mis scnliris, frurtiluis pisifor'ni^as)f(luhcu]»t;s confertis vcriut-o^is,
Cuuie arborecente.

rostata
folia

Petiol. longit. $\frac{3}{2}$ — 4 mol'ic.
Folio. — $\frac{3}{2}$ — 6 —
— lat. 2 — $\frac{1}{2}$ —

Crescit: in sy'vis montaiiis»

Nonun; DraudaMg Kaj.i.

FJC'hS GTBBOSA, Bl.

*foliis oblongis utrin(ue araminatis difformiter pc-
pn!:<lo-^iM)os s iM;H-cj?ialil;Ucn)MS roriaccis gh*b*ris
iuira pallicle-vircsceutibus (siccaliouc fusc. scenti*

Varie-

variiPTtVO rmrg'ne scabris, fruct''* «nis pisifomnnoj epmiintis pciuluiis, cauie arboi'co. (alF. F. li*gidae.)

Petiol, longit. ^ — ^ pollic.

Fo'ior——. 3 — 5| —

— lalit. i| — ij —

Cresc:7: iii S3'.vis muntauif.

Nomen:

*Var'''f, n, foliis oMonfo-lanceo]atis,^UI scaudeute**

Peliol. longit. | — J po^ic.

Fulior. — 2 $\frac{1}{4}$ — 3 $\frac{1}{2}$ —

— lalit. 3 _ ,| —

Cresclt: atl montent Parang.

*Tsarlet, b** fuliis lauceuiatis, cattle arborcscme.

Petiol, longit. | po He,

Pol or.——3j — 4|,

— lutil. | —' I poiic.

Crescit; in calafeia prope Kjpang.

Nomen: Kiar'a Waling.

FICUS PARADOXA, Bl.

F: foliis dimidiato-rhomboideo-oblongis acuminatis besi altenuntis rigidis supra nitidis suhtus scabris renisque r^ticul;-iis prolnuentibits, canle fruucusu purasiuco* [accedit h| gibbon; c.)

Petiol. Ion git. } — i pollie.

Folior. —— H — 8 —•

—— lalit. ij — l\ — -

Crescit: ad moutem Sa.Uk.

Nomen:

FICUS CUNEATA, Bl.

*IV foKj4^Hflttato-oblongis acuminatis difformiter si-
nuat. ——————;is inacqualilateribus coriaceis suhtus
marg. —————— amulisque scab ri use ulis, caule fruticoso
para6itico. (aff. F.' ^ibbosac.)*

Petiol. longit. — j pollJc,

Fo'ior. .——I — Gl——

...
...

Crescit: ad pedem montis Salak.

Nomen:

EIJOV S QVERCIFOLXA^X.

*I'i,Sf^ cliliptico-oblongis rostratis basi acutis remote
sinuato-dentatis supra nitidis subtus scabris reti-
culato-venosis, fructibus pisiformibus confer tis
brcvissiine pcdunculatis verrucosis scabris, caulk
fruticosp. (niuiis aff. F. siuatae Thuub.j*

Peliol. iongit. J — j pollic* *t*

Foiior. —— 4\$ — 9i ——

—— lalit. if — 2J —•

Cresctt: in syivis muutium Gede, Salak etc.

Nomcn:

Van

Varlet. *a** foliis repando-dentalis,

Variel. *b.* Iblis subintegerrimis.

Varict. *c.* foliis -diffovmitcr repandis, subtns confertissinie rcticulatis,

G foliis dentalis.

j JF7CC7S SUBR4CEM0SA, J&.

HF: foliis ovato-oblongis acuminatis superne rcpn(lou-
den ticulatis basi rbtuidatis subcordatisve glabris,
fructibus obovato-globosis subracemoso-conlertis,
caule Mrboreo. (fructus magiiituclinc pruni ma-
joris, *F. lalerijlora*e Vahl uiinis aff.)

Peliol. longit. i§ — t_k pollic,

Folior. —— 5 — 10 ——

———— latit. 3 — 6 ——

Crescit: in sylvis monfiinis.

Women: Kondang.

FICUS HTSPWJ, Liniu

F: foliis oppositis (altcro minorc) elliptico-oMon-
gis acuminatis basi oblitjue rotund at is subcorda-
tisve deuticulatis utrinque scaberriiT)j| ^ilosius-
trails, fructibus pjriformibus pcclunetuis' race-
mosis (ad basin trnnci) strigoso-iiirtis, caule ar-
Loreo, ramulis fiftulosis. (ifcriui Teregam llort.
Malab. III. u 61.)

?j /ton, Ficus fecund a mi hi, vi< Catalog. Hort.

Botanic. Buitenzorg |j;ig. .^b'.

IVlio'. longit i — 3 pollic.

Foliar. —— 5 —> i5 —

—— luLit. 2| — 7 —

Cresc fV: in nmbrosia paludosis.-

Nomen: Bisoro.

FIGS FISTULOSA. (Herb. *wldt.)

*F*oliis alterm's **rarius** oppositis eliptico-oblongis
acdtis subrepandis basi **oblique-roUtiidatis** imiL:-
quaiiateribaa supra glabris snl>tns in vci-is pule-
jis, fructibus obovalo-gJobosis **cotifertis** subra-
cuniosis verracosis , canle arb ores ecu te > *fannis*
(stulosis. (aff. *l\ hispulae* Linn*)

Peliol. longit. { — a jwllic.

Folior. —— 4 — 11 —

1 —

Cretcil; in sylvis niuataiiis*

Nomen: Btmjiug.

FICL5 CORONATA, (Herb, ftwdt)

* ftllis ex ovRto-cllijuicis **acomminatis** basi oblique-
roUjtlati lateribus valde **inaequ libns repaudo-**
dentatis sca**briuscuiis**, frnctibns **coniertts** pisi-
formibus brevit**L¹** peduncut) cis 'i iihlllicb stpianu-
loso hiante **coronatis** hitsutis, Cuaxc iiauc^so.
(aff. *F. montanae*.)

Petiol. lougil. f — § pollic.

Folior. —— 3\$ — 4i —•

— lalit. 1J — '2\ ——

Crescit: in sylvis montosis.

Nomen: Amplas fiadak.

FICUS PURPURASCEVS, Bl.

✓ foliis bivalibus obtuse acuminntis hrsi rotunrintis
re pun do * deuticulatis interduin grossc simittto*
deutatis supra glabriusculis subtus purpur; seen*
tibus scaberrimis, fructilms pi sif or mi bus brevi-
ter pedicellatis subgcoiuatis axiliaribus, caule
fruticoso.

Petiol. longit. 1 — i| pollic,

Folior. —— 5 — 8 ——

— latit. 3 — 4 $\frac{1}{2}$ ——

Crtscit: in inontauis Px*oviiiae BLütenzorg,

Nomen:

FICUS MONTAXA? Burm.

W:; foliis elliptico-oMongis acuminalis repanclo-ser*-
ratis basi acutiuscii:is supra nitidis subtus sra-
bris, fructijjus pisiformibus brevessime p*alic^l-
latis subgeniuatis, caule fruticoso.

Petioh longit. | — | po^{fl}ic,

Folior. —— :?| — 8 .—-

— lalit. ij -^ 4 .—

*Crts**

Crescit: in friiticia mantanis.

Nonien:

FICUS DENTICULATE[^]Vakl. y - i,

Fz foliis oblongis acuminatis indivisfs 2-6 lobišve *In-*, nuato - denticulatis basi integerrimis obtusiusculis subtus reticulato-Venosis fructibusque pisiformibus pedunculatis scabris, caule fluticoso de-cumbente.

Petiol. longit. § — § pollic.

Folior. — 3 — 5 —

— latit. 1½ — 2 —

Crescit: circa Bataviam ad rivulas.

Nomen:

✓ *FICUS P0LTTRIA1 Lam<_ , 7 ^ , / • * '*

F: foliis oblongis obtuse acuminatis basi attenuate subrcpandis inaequalilateribus scabris (plantac juiioris inciso- sinuatis), fructibus pisiformibus pedunculatis geminis confertisve umbilico squarooso biante, caule arborco*

Petiole longit. J— Jpoljic.

Foliov. — 3i — 6 —

— latit. 1½ — 2 —

Crescit: in to to Java.

Nomem Amplas, Ampelas, Polm Ampelas.

FICUS AMPELAS? Lam.

i^.-^foliis oblongis vel ova to-oblongis acuminatis bss|
rotuadatis inaequnlilatribus denticulntis utrinque
scaberrimis, fructibus pisifonnibus pcdunculatis
geminatis confertisve nmbilico biante, caule ar*
borescente. (valde aff. F. greviaefoliae.)

Petiol. longit. | — | pollic.

Folior. ——— 2 | — 5 ———

—— latit. 1½ — 2 ———

Crescit: in tota Java.

Nomen: Ampclas.

! *FICUS GREVIAEFOLIA*, W.

F: foliis oblongis obtusf-acuminatis basi oblique—
obtusis LtttR^ualilateribus repando - denticulatis
supra glabris subtos tenuissime rcticulntis sea-
bris, fructibus pisiformibus breviler pedicollatis
Verrucosls subgeminatis, caule arborescute *a—
mulis scabris. (aff. F. Ampclas.)^ T~hi

Petiol. longit. ——— * pollic.

Foliar. ——— 3J — 6 ——— n

—— latit. 1½ — 2½ ———

Crescit: in sylvis proviuciarLim Buitciuorg, Uau
tain etc.

Nomen:

FI-

SIFTCUS OtiSCURA, Bl.

F: foliis aVrius ohlongis acu'iiinatis basi oblique-rotundatis inaequalifiterilms exserte serratis supra scabris snStus molli - pubescntibus, fructibus cerasiformilms verrucosis pedunculatis confertis Lirsntis, caule fruticoso, ramulis fusco-tomen-
10**3. (aff, *F* grevlaefoliae et F. ulmifoliae.*)

Petiol. longit. J — | pollic.

Folior, —— 6 — 8 ——

— — — — —

Credit: in sylvis montanis.

Nomen: Kia'a Draulang, Terangtan.

FICUS SCAIiERQIMA, Bl.

F: foliis su!)sessilibus oblongis acuminatis basi oMi-
quc rotuiulatis inacqualiateribus obsolete cleuti-
cul.'tis supra scaberrimis subtus luojji-pubescent
tjl)us, fniciibus pisiformibus confertis sessiibus
h iS'itis, caule arborescente, ramulis fusco-to-
ijKNJtosis. (a^F^jjbscura vix diversa nisi fruc-
libus ruinutis sessiibus.)

Petiol. longit. 1

Folior. —~ 5 — 6f pollic.

—~ lalil. i»4 — aj- ——

Crescit: in mont'ini9.

Nimen: D^andin Beas.

Varitl:* iolils rigidioribus basi obtuslusculis.

(4-5)

Pctiol. loiigit. i lin.

Fo'ior— Q — 5j pol'ic.

— latit. ij — 2½ —

Crescil: in m mtosis Sa ak.

Nome: Kiara Beas.

FICUS liULASDUL, Bl.,
✓ *f querens*

F: foliis clliptico-objongis integris rnrius lobatls
acumiutatis basi rotundatis subtusqnc bi^landuio*
sis lateribus subiiinequnlibus rariter dentatis utrin-
que fructibusque cerasiforuibus pedunculatis sub-
solitariis scabris, caule fruticuloso ducumbente.
(nimis aT. F. ulmifoliae, sed differt foliorum ibr-
xna> pedunculisque petiolo vix longioribus ac.
niaguitudine fruclus.)

Pctiol. Ion git. ^ — J po^ic.

Folior. — 3½ — 4½ —

— latit. || — 3 —

Crescil: prope Bataviam locis humid is,

Nome a:

JF1CVS CHRYSOCARPAi (Herb. Rwdt.)

F: foliis ovalibus acutis bnsi subrotundatis raiiter
denticulatis supra ramulisqiiie scabris subtiis reti-
cillato-venosis fructibusqiiic cer^siforniihus gemi-
natb fiubscssiJibus tomcutosis, caule arborescente.

(4;6)

Peliol. longit. x — if pollic.
Folior. ——. 4 — 6* —
• — latit. aj — 3* —

Crescit: in monlosis.

Women: Kondang Kutiing.

I -•* - rjñ/o NIKEA, BL

F: foliis approximates ovalibus acutis basi obtusiusculis **versus** apicem exigue denticulatis supra scabris subtus niveo-tomentosis, fx*uctibus cex'asi-fbx-inibus subgeminatis sessilibus laevibus, caule IViiticoSQ v. ni'boxxscente (a f\ alba diflei't foliis nuucjuam lobatis ncc basi subcoidatis, pe-lioliscfue multo brevxoribus.)

Peliol. longit. § — 1 pollic.
FoUor. —— 3k — 5 — *
—— latit. a — a| . —

Crescit: in sylvis montanis.

Nomen: Ilamberang.

D. foliis lohatis,

^~ *FICUS HIR TA*, Vahl. *Tum* y

Jp: foliis cordatis oblongis indivisis txulobisque repandis supra laevibus subtus hirtis. (plauta junior.)

Crescit: e jreguu CUiuia intnducta,

Nomen:

FI-

(477)

j y^ VICOS ALBA, (Herb. Rwdt.)

F: foliis subrotundis v. ovato-oblongis basi sub cordatis indivisis sinuato-3-5-lobisve, lobis acuminatis denticulatis, supra scabriusculis subtus albido-tomentosis, fructibus cerasiformibus subgeminatis sessilibus.

Petioi. longit. 2 — 7 pollic.

Folior. — 5 — 9 —

— latit. 3 — 9 —

Crescit: in montanis.

Nomen: Scgian,

 **FICUS TOXIC ARIA**, Linn.

F: foliis cordatis inciso-lobatis (senioribus interdum subsinuatis) exigue denticulatis subtus albido-tomentosis³fructibus subglobosis breviter pedicellalis tomentosis geminatis, caule arboreo.

PetioL, longit. 4|-* 10 pollic.

Folior. — 1 — ij ped.

— latit. 6 — 16 pollic.

Crisct: in montosis.

Koine a: Biiong.

FICUS SETOSA, Bl.

F: foliis subcordato-oblongis acuminatis dentatis in-
divisis sinuatis 5-lobisve supra birtis subtus vil-

Bony
losis,

losis, fruetiSus cerasifortnlbus ~~geminatis~~ ~~sessilibus~~
ri·nis j>ctioiis(£iiie s^tosis, caule fruticuloso, (ac*
Cedit F. hirtne Valil.)

Pefiol. long't. § — *§ pollic.

Folior. —— 4 — 10 —

——* latit. 1j — 6 —

Crescit: in regionibus occideatiilibus Javae ~~instulae~~,
in fruticetis.

Nomen:

~~F~~*XFICUS PULVGEVS, (Herb. Rwdt.)*

JP; foliis cordatis ovato-oblongis acutis indivisis ra-»
rius lobatis exiguc denticulatis supra hirtis sub-
tus fcri'u^inco-inollibus, petiolis ramulis gemuiis-
c[ue] scjis rigidis hispidis, caule arborespeute.

Petiol. long it. 4 — 5J pollic.

n Folior. —— 8 — 12 —

¹ — latit. 6j — 8 —

Crescit: in Moluccis.

Ifoinen:

~~F~~*SFICUS FVLVA, (Herb. Rwdt.)*

~~F~~foliis cordatis juuioribus sinuato-5-lobis adujfio-
ribus subrbomboidco-orbiculatis acutis dcuticu-
latis repando-siuuutis sub-5-lobis supra scabris
su!>tus reticulatis-mollissime tomcentosis, fructibus
giobosis fulvo-pilosis subsessilibus geuuuatis, cau-
le cuLoreo. (aff. F. hirtae Vabi.)

P_ejiol. Iongft- ij — Zh pollic:

Folior. —— 7 → i3 ——

—lall. 5i — 11 ——

Crescit: in montania ad lnargieff fluvionim.

Nomenx Amberotfg mirrlia.

/FWUS DQCIP1E&\$, (Herb, R_wd*.)

Jr: foliis subsessilibus oblongis acuminatis basi angustioribus subcordatiis supeinc la do rib us ct sinaato-S-5-cuspidatis grosse iiiacqun-liter subulato-dentatis supra hispid is subtus pUosiusculis, fructu-JJIS axillaribus sessilibus, caule fruticoso.

Pelioj. lojigil. | — I pollic,

Folior. —— i5 — 20 ——

— latit. 8 — io ——

CrescU: in umbrosis in&ulae Celebes.

Nome n:



SECT. 2. ARTOCARPEAE.

J?lores in eoclem vel in distincto indL>idu& supra recap taculum oblongum aut glohosum dense spicatL Embryo exalbuminosus, inversus,

ARTOCARPUS, Fowl.

Flores monocci, in rcccptaculis oblongis globosive dcDSc congctL Masc.: *Calix* tubulosus, apice fissus. *Filamentum* uiuum, longitudine calicis# Fern,:

Fern.: *Calix* null as. *Ovaria* tot a longitudine vel basi tantum connata, ovulo pcndulo ins true ta. *uikenia* baccutim coalita in baccam unicam varic tubcrculatam affit rcticulatam. *Membrana* seminis ex tern a chartacea. *Embryo* exalbuminosus, in versus, cotyledonibus inaequalibus.

Observ. Genus forsan in posterum dividendum ob structuram dissimilem stigmalis; in *Arlocarpo incisa* stigma sessile bifidum, in *A. glauca* punctiforme cst; in *A. rigida* autcm re vora stylo-capillari ins true turn et peltatum se ostendit.

/ *ARTOCARPUS INCISA*, Linn. fil.

A: foliis pinnatifido-sinuatis subtus pubescenti-scabris, laciniis semilanceolatis intcgerrimis, amentis jnasculis cylindraceis cernuis feinincis elliptico-globosis. (lores masculi: calix tubulosus, superne fissus; filamentum longitudine calicis; liores fern.: Calix null us. Ovaria fusina, basi varie angulata et connata, superne teretiuscula, libra, scabra[^] l-locularia, l-spora; ovuluni versus axim locatum, ad latus superius unibijico filiformi praelongo ins true Lum. Stylus nusius, stl[^]matc biiido.

CrescU / in cullis Jarae.

Floret: omni ttmpove.

JYomen: Kluwie; Tiuibul; Sukkon,

2sĀ&T0CARPV^S ELASTICA, (Herb. Rwdt.)

A: foliis pinnatifido-sinuatis utrinque bispidis, laci-
niis sinuato-incisis acuminatis, ameatis mascujis
cylindraceis.

Crecil: ad oslia fluviorani.

Flo-et: toto anno.

Nomen: Bunda, Buda, Tmep.

3 ARTOCARPUS PUBESCENS, Willd.

^•foliis ovalibus (in plant, juniorib. interdum %- fidis) utnnquc acutis aspcios in costis subtus /*> pubescentibtis, amentis masculis cylindraceis rugosis nutantibus, femueis clliptico-oblongis cres- tis muricatis. (arbor 50-60 pcd.)

Crescit: in pagis ad pedem montis Salak et circa Euitenzorg ad ma-gines flnvii Tjeliwung.

Floret: fere per totum annum.

Nomen: Bendaah.

h ARTOCARPUS POLYPHEMA, Pers.

A: foliis oblooiigis utrinque obtusiusculis emarginaiis V. integerriinis (plantae junior, sinuato-3-lidis) infra ramulisque setigeris, amends oblon^o cjlindraceis.

Crescit: in montauia.

Floret: Septembri, etc.

Nomen: Tjamped-

4ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA, Linn.

A: foliis ellipticd-oblongis apice obtusatischlis bnsi acutis v. ol/ludiusculis integerrimis (plant, junior, simiato-incists) subtus scabris (cullura glabrks), anicntis fcmiiicis oblongis. (Uumpb. I. t. 50.)

Cres&t: in regionibus cullis.

Floret: toto anno.

Notnen: Nanka.

Variet. tuncinata. fblis oblongis ncuminatia basi tiffloruiilcr sinuato-incisis subtus scabris.

Crescit: in ilionlis.

Nvnven: Pdssaiv, Nauha.

ARTOCAKPXJS RIGTJD, til.

A: foliis ovali-oblongis apice mucronatis lasi rotundatis (plaiilac junior, aculis) intt^ernniis rigidis infra strigoso-asperis, amends glubosis. (arbor 50 ped. A. integrifoliae acceclens. Flor. ninsc. sacpc glandulis peltalis intermixti. Calix tubu-Josus, apice rumpens.' Filainctum longiludinc calicis, raro bifidum; antbera clul^nia. tlor. fern: Calix hullus. OvAria ciineata vnrib com: ptessa* muricata. Stjlus cnipillaWs. Stigma ptluuim.)

Criscit: in montosis Proviuciaruin Tjanjcr, Kra-wang, Buitenzoi g.t

Floret: Julio, Olc.

*N*men:* Pussalr.

ARTOCARPUS GLAUCA, BL

f Å: foliis oxalibus utrinque acutis intcgerimis subtu\$
gluucis, aincentis globosis. (arbor 60-80 pcd.)

Crescit: in sjlvis montinm.

Floret: Jiinio, etc.

Nomen: Tiwu LandiJi.

GYNOCEPHALUM, BL

Plores diocci, dense capita to - coDgesti. Masc.t
Valix 4-partitus. *Slamina* 4/ iilimeritis longis.
M ud hue n turn pis till 1. Fein.: *Calix* tubulosus, sub*
4-iidus. OparZft/ncylindraceum, l-ovulatum. *y/y-
Z:5 brevis, semibifldus. *Drnpae* congestae, bac-
catae, vnrie angulatae, nucleo rugoso monospermo*
Tfsnta fragilis. *Embryo* exalbuminosus, cotylcdo-
11 ibus Dianimis , contoriuplicatis j radicula brevi\$
supera.

GYXOCEPIIALVM MACROPHYLLUM.

Frulcx scandens, foliis alternis cordatis integer-'
rimis, floribus femincis in rcceptaculis globosis^
~~masculis~~ 111 capitulis spicato-paniculatis.

Crescit: in sylvis primaevis inonliun Salaf*

Floret: Octobri 5 Martio.

Notneti: aroy Piet - tjun - tjelleng.

CONOCEPUALVS, BL

Florcs dioecii, capitato-spicifli* *Calix* tubulosus,'
4-fidus^ Rfcsc: *Stamina* 4} fdamenlis non ex-

scrtis,

sfertis, camosis. *Rudlmentum* pistilli. Pcm.: *Ovarium* oblongo - cylindraccum, l-spornm; *stylus* lougus, iudivisus. *Aihenia* subbaccata, cnlice ex-crescente tccta, congesta, compressiuscuft. *Membrana* seminis subchartacea. *Embryo* exalbuminosus, invrsus, *Cotyledon.es* subfoliaccac, plano-convexae* *Radicula* brevis.

Genus a *Gynocphalo* diversum cui nimis affine calice tarn ia masculis <jam floribus femineis tubuloso; stylo simplici, et praecipue ob structural jseminis.

CONOCEPHALUS SUAVEOLENS.

Frutex scandens* foliis alternis clliptico - oblong's repandis, capitulis subcorymbosis axiUaribus v. cusu foliorum lateralibus.

Crescit: in fruticetis liumidiusculis»

Floret: totu anno.

Nomcn: Kekkegoan aroy.





BIJDRAGEN

TOT DE

F L O R A

VAN .

NEDERLANDSCH INDI



BIJDRAGEN
TOT DE
F L O R A
VAN
NEDERLANDSCH INDIË,
UITGEGEVEN
DOOR
C. L. BLUME, M. D.,

COMMISSARIS VOOR DEN BURGERL^FJKEN
GHEESELUNDIGEN DIENST, DIRECTEUR
VAN 'S LANDS PLANTENTUIN TFI
SU12ENZ011G, ENZ.

±ode Stuk.

B A T A V I A,
TER LANDS DRUKKERIJ,
±825.

B I J D R A G E N

T O T D E

F L O R A .



S Y N O P T I S C I I E B E S C H R I J V I N G

Van cenige planten, behoorende tot de fainilie der *TJrticeb'n* en *Amentaceeën*^ op eene, in de jaren 1823—1824 gedane reis over Java, waargenomen en beschrevcn*



SECT. 5. COENOSANTHEAE.

Flores monoeci aut dioeci plerumque dense spicati aut glomerulatiy rariua solitariL Em brjo in albumine inveraus**

CELTIS_y Linn*

Flores polygami vel monoeci. Calix 5-partitus. Stamina 5, uno alterove interclumabortiente. Ovarium 1-loeulare, ovulo solitario pendulo. Syli 2, breves, pubentes, distantes. Drupa baccata monosperma. Embryo curvatus, inversus. Co/yledones aubfoliaceae.

CELTIS ORIENTALIS_y Linn

C: ramulis birds, foliis ovato-oblongis acuminatis scrrulatis basi liiaequali-subcordatis supra scabiis jsubtus scrigeo-moliissiinis.

Cret-

r 486 >

Crenelf: in m on tan is*

Floret: toto anno.

Women: Ang - grug*

***CELTIS^AMBOINENSIS*, Willd.**

C: ramulis substrigosis, foliis ovato - oblongis (Ion*
giter) acuminatis serrulatis basi aequalibus rotun-
datis utriiKjue scabriusculis.

Crescit: in montosis Proviuciat Bantam*

Floret i toto anno.

Nomen:

CELT IS RI3IDA*, Bl

C'''ramulis tetragonis aasperis, foliis ovato • oblongis
acumiuiatis serrulatis basi inaequalibus rigid is su-
pra nitidis infra cinerascentibus subtomentosis.*

Crescit: prope Tugu in montosis Meganieuduug*

Floret: toto anno.

Nomen:

***BROV8SONETU*, Vent.**

*Flores dioeci, dense spicati. Spicae mascuiae cylind-
raceae. Calix 4-partitus. Stamina 4. Rudimentum
pis til li. Spicae femineae globosae, scjuaniis
davatis et floiibus dense obsitac. Calix tubulo-
»us, ore 5-5-dentatus. Ovarium l-ovulatura*
Stylus elongatus, latcralis. Aheneum pediecllatum,
calice tectum.*

BROUS-

(48₇)

BROVSSONETIA PAPYRIFERA, Vent.

Jis foliis ovato-cordatis acumiuatis et (plantae junio-
nōis) sinuato-lobatis.

Crescit: regionibns cultis.

Floret | Septembri, etc.

Nomen: Sail, Diluwang.

MORUS, Linn.

Flores monoeci, dense spicati. *Calix* profnnde 4-parlitus (rnrius 3-partitus), laciniis biseriaibus* *Flores* masculii *Stamina* 4 (rarius 3), longu, *Rudimentum* pistilli (an in omnibus? in Indicis constanter observavi), *Flores* femineii *Stylus* profunde hipariitus; *Ovarinm.* s-ovulatum (in nostris i-ovulatum, ovulo pendulo). *Akenia* calice peisjstentc cacnosa tecta, baccatim congesta. *Membrana* semi-nis externa Crustacea. *Embryo* in albumine curvatus, inversus.

MORUS INDICJ, Linn.

M: foliis ovato-oblongis et (plantae junioris) sinua-to-incisis basi rotundatis v. sub cor da Us inaec^ua-litcr serratis supra scabriusculis,

Crescit: ad segetes.

Floret: toto anno*

Nomen: Bobosaran; Kaju Bobos-jaren.

MORUS MAURITIAN A , Jacq.

M: foliis clliptico-oblongis utriucjue attenuatis inte-
gcerriuxis scabris.

Cres-

(488)

Cresdt: ex insuia Mauritii allafa*

Floret: Septeinbri*

Women:

MORUS JAVANTCA, BL.

M: foliis al tern is ovali-oblongis acutis basi leviter subcordatis ad apicem exigue denticulatis inae* ijualilateribus, cauie fruticoso* (Flores masculi 5-andrL)

CrfovU: in calcareis Jayae ac Nusae Kainbangae in&iiilarum.

Floret: forte toto auno.

Now en:

EPICARPURUS* BL

Flores dioeci interdum polygami. *Calix* bibra^c-
teatus, 4-sepalus, in femineis pcrsistens. Masc:
Slamima 4, longa. *Rudimentum* pistilli in centro.
Fern, i *Oifarum* l-ovulatutn; stylus profunde bi-
partitus. *Fructus* baccatus, stylo persistente in-
structus, i-spermus. *Seminis* meiibrana extern a
Crustacea. *Albumen* earnosum. *Embryo* curvatus,
inversus; *Cofyledones* cochleatae.

Genus a *Md/o* distiictum floribus femineis hand
spicalis et fractu*

EPICARPURUS ORIENTALTS.

Arbor mediocris, ramosissimus. lactescens. Folia
alterna, breviter pedicellata, oblonga, serrulata, ri-
gida,

{;Ma, seaSra, ad basin petiolorum stipulis exiguis deciduis iñstructs. Flores mascali den^{as} spicati, fe* iminci pedunculati > subsolitarii. (vid. Hurt. Malab, t. 1 t. 43.)

Crescli in argilosis circa Bataviam, etc.

Floret: toto anno.

Nomen i Kisemut.

***TROPffTS*, Linn.**

Flores dioeci, spicati. Masculi: *Calix* 4-sepaIus, sepalis conniventibus infcrne subcoalitis. *Stamina* 4; *filamentis* Joigitutline sepalorum. *Rudimen** *turni* pistilli in centro. Feminei: (ex Schreb.) *Calix* null us v?). *Stylus* bipartitus. *Jacca* (an potius *Drupa* baccata?) monosperma,

***TROPHrS SPTVOSJ*, RoxK**

T: spinosa, foliis ellipticis cuspidatis intcgerimxs glabris.

Crescli: in caicareis prope Kuripam

Floret: Aprili, etc.

Nomeni Tja-tjuk Kaliageh.

***ASTIARIS*[^] Lechen.**

Flores monoeci, in spicis disjunctis dense con-'' ferti, scjuamis imbricatis tecti. MHSC.: *Stamina* nu* xnerosa, brevissima, rceptaculo oblongo-conico in- sert. Feni.: *Ovarium* 1. *Styli* 2, longi, diver-* geutes. *Drupa* c^{as} dice inclusn (character ex descripu *Ursin* act. soC. Batav. t. MIL)

(490)

ANTIARIS TOXICARIA, Lchen.

A: foliis ovalibus obtusis basi inaccjunli-corclatis.

Crescit: in Javae sylvis orientibus.

Floret: Jiinio, etc.

2^onem Ant jar; Upaa Ant jar; Pohn Upas.

URTICA, Linn.

Urticae et Boelimeriae species autornm.

Flores monoeci vcl dioeci. Masc.: *Caix* 4-rarius 3-5-pariitus fidusve. *Stamina* 4 rarius-3-5; *Jilamen* la exsertn, in praefloratione incurva. *Pistilli* rudimentum aut nullum. Fern.: *Calix* tubulosus opice den talus, aut 2-aut 4-partitus. *Sligma* sessile, subulatum, pluinosunu *Aheniutn* calice persistente plus minusve tectum.

Arbores, frutices vel lierbae, plures pungentes. Folia alterna vel opposita, stipulacea, veriosa vel nervosa. Flores solitarii vcl capitato-cougesti in, racemis paniculis umbellis aut verticillis axillaribus.

Genus forsan in posterum denuo dividendum, sed characleves ex forniatione calicis desumpti ob incons tan tiara in diversis specie bus non sufficient.

*Foliis oppositis**

VRTICA RVGOSISSIMA, (Herb. Rwdt.)

V: foliis oppositis subratundo-ovatis acuminatis basi obliquiie-subcordatis trincrviiis serratis rugosissimis supra hispidis subtus pilosis, spicis subumbel-

latis

1*9*)

latis axillaribus (bracteis imbricatis) folio multo brevioribus, caule fruticoso. (Spicae glomerulatae, masculis femincis brevioribus. Masc.: Calix extus pubescens, 4-partitus, laciniis ovulibus acutis. Stamina 4, laciniis calicis Opposita; filamenta longa, subinmembranica. Rudi men turn pistilli in centro. Fern.: Calix ovarium arete cingens, sapcrnc contractus, 5-dentatus, externe pubescent. Ovarium compressum, clivice inclusi. Stylus (Iiformis₇ pubescens.[^] stigma simplex.)

Crescit: in fmiticetis monUnis,

Floret: oinni lempore.

Nomen: Ramc Euais.

VRTICA PILOSTUSCULA, Bl_f

U: foliis oppositis altero mi no re sub ro t undo -ovatis acuminatis basi interdum sub cord ads 5-nerviis dentatis l'ugosis supra hispidis subtus pulcsceu-> tibus, spicis glomerulatis interruptis axillaribus solitariis, caule fruticuloso.

Crescit: in inouloais Javae insalae.

Floret: to to anno.

JS'omeih:

URTICA MOLVCCASA, BL

17: foliis oppositis altero mi no re, ovato-oblongis acuminatissiniis ai[^]gute scrratis rugosis discolori- bus supra liispidis subtus molliter pubescentibus, inajoribus basi rotundalis, minoribus oblique sub-*

cor-

corclatis, floribus glomeratis axillaribus, caule arborescente. (maxiine accedit (J. rugosissimae.)

Crescit: in insulis moluccaiis.

Floret: omni tem pore.

Nomen:

URTICA CAVDATA, BL

V: foliis oppositis subrolundo-ovatis acuminatis grosse serratis basi rotundatis trinerviis utvinquc molli-* bus, spicis dense glomeratis (cylindraceis) axilaribussolitariis folio brcvioribus, caule fruticoso.

Crescit: in monlosis Proviuciae Tjanjor.

Floret: Augiuto.

Nomen:

URTICA SPICAT A, Bl.

TJi foliis oppositis ovatis longiter acuminatis grosse serratis scabriusculis, spicis glomeratis inlerruptis, caule fruticuloso.

Crescit: ||| liorto BoUnico Buitenzorgiano, e Japonia allata.

Floret: toto anno.

Nomen:

VRITCA CELERJCA, Bl.

XT: foliis oppositis ovato-oblongis acuminatis obtuse serratis rugosis basi rotundatis v. acutiusculis trinerviis supra hispidis subtus pubescentibus, spicis

cis pnniculatis glomcratis interrupts axillaribus_T
caulc fruticoso.

Creacit: ex iusula Celebes allata.

Floret i omni'teinpore.

Notneii:

URTICA LEUCOPHJEA, Bl.

U: foliis bppositis altero minore ovato-oblongis acu-*
minatis gvossc exscrle serratis basi aculis triner-
viis utrinque pubciitibus subtas cinerascentibus_f
pAiiirculis a^illaribus folio subaequantibus, flori-
hus secundis, caule sulTruticoso scaiideatc*

Creacit: ad monlem Tjerimai.

Floret\ Septembri, etc,

-Nomen: Poboau,

VRTJCA GLABERRIMA, Bl.

U: foliis oppositis altero minore ovnto-aut oval!-*
oblongis acuminatis basi rotund at is trinerviis re-
mote exserte serruhitis glaberrimis, pnniculis sul->
geniuatis axillarihus folio duplo brcvioribus , cmle
sufruticoso inau. (U. Icucopbaeae aliquiid acce-
dere videtur^)

Crescit: in montosis Pioviaciae Tjanjor.

Tloret: tolo anno.

Nomen: Popolian.

Varivias: foliis' oblongo-lanceolatis acuminatis basi
attenuatis zncdlo ad npiceyi argute sc mil a us.

Cres-

Crescit: ad ripas fluvii Tjap:is in montosis Salak.

Floret: Septembri, etc.

JJRTICA ELONGATA, Bl.

TJ: foliis oppositis altcro niinore ovali-oblongis acuminatis b.-isi obtusis Irinerviis crenalo - scrralis glabriusculis, paniculis axilla.rib us clongatis virgalis, caule safTiLiticoso iuari. (minis affinis. U. leacophacac, quac diffcrt foliorum scrratuva et pauciuilis longissime pedunculatis pendulis.

Crescit: ad catarractas calidas moiilis Gede.

floret: Majo etc.

JN^omen:

URTICA ANGTJLATA, Bl.

TJ: foliis oppositis o vali-oblongis acuminatis basl rotii!jdatis trinerviis obtuse serratis, stipulis fol'accis ovalihus, raccmulis axillaribus brevissimis, caule licrbaceo an^ulato.

CreicM: in monUnis Provinciae Tjanjor.

Floret: Auguslo, etc.

Nomen:

UJITICA LUTESCENS, Bl.

TJ: foliis oppositis oblongo - lanceolatis acuminatis basi acutiusculis trincrvii rugosis supra nitidis Tcnis subtus subpubescntibus, iloribus dioccis conglumralis axillaribus, caule fruticoso. (Sti-

pulac semilancollatae^ carinalae, margine dia-phanae, profuntie bipariitac.)

Crescit: in motitosis ad ripas fluviorurn.

Floret: ojimi teiuporc.

Nome 11: Popoliau.

URTICA CAERULEA, Bl.

U: foliis oppositís oblongis acuminntis dcuticulatls basi acutiusculis trincrvii in vein's subtuspubescentibus, floribus gloineratls axillaribus, caule suf-fiutic^so, ramulis caerulescentibus.

Crescit: in montosis Pro vine iae Tjanjor.

Floret: omni tempore.

Nome n:

URTICA STRIGOSA, BL

U: foliis oppositis ovato-oblongis ntrinqne acmis in-legcrrimis 5-nerviis subtus molli-pubescentibus, floribus verticillatis, caule repente lierbacco siri-goso hirto.

Crescit: circa Buitenzcg in paludosis ; 'm Protfln-cia Kravvang xiica TjL'adjas«

Floret: tolo anno.

Nomen;

URTICA HFRTA; Bl.

If: foliis opposite subscssilibus ovnto-oblongis nrn-minatissiiniis basi subcordatis j-jeuerviis integer-

rinn̄s

yimis utrinque piibescentjhus, floril)us verticilla<*<
lis axillaribus, caule herbaceo'scandente.

Crencit: in gratniosis iinibrosis ad pedem Sa^Talc;
in dedivilulibus moutis Eutu ad ortuut
fluvii Tjibunuin.

Floret: tuto anno.

Nomen:

URTICA TRTANDRA, Bl.

17: foliis oppositis subsessilibus ovatls obtnsis basi sulicordalis integerrinnis 3 - nerviis glubriusculis^ floribus verticillatis axillarib us, caule herbaceo inferne rcpente lineis 2 al tern ami bus puberulis, '(afT. //• *hirlao*, sed multo minor, floribus pie* rumquc 5 - audris.)

*Crescit i circa Builenzorg in g^arniosis hurwidis**

Floret-, oimii tempore.

Nomcn:

* * *Foliis alternis**

URTICA PELT AT A, Bl.

U: foliis a!term's peltatis subrotundo - ovatis acutis deniculatis subtus villosis, paniculis axillarib us divaficatis, caule arboreo. (Flores dioeci, feminei in paniculis subumbellati. Calix bipavitus, uuibracteaius. Ovariuin orbiculatun, cauiprcssum. Stigma pcuicilliormc, lulcr^c.)

Cres-

Crescit: in monlanis Parang.

Illoret: Julio elc.

Nomen:

UR T C. I INC AN A , TO.

7[#]: foil's alters is subrotundo-ovatis acuminnntis den-* tiruhitis bpsi subrurdatis 1—viis subserratis infra albido - tomeiitosis, spicis paniculatis glomera- tis ihtriTuptis axilinribus, caule fruticoso. (Fru- ti'X 8 pedal., vmosus, ram is divaricat's cine- jascentibus. Folia lon^itor pctiolata, niajuscula* su>ra pubentia. Spicae albidae; florus maseuli: calix tjuadripartilus; stamina cjiintuor; Vestigium lifeiliatquin villos!usrulum pistilli in centro \$ florcs feiuuiici: Ovariuni calice intcgerrimo inclusum; stigma pciicillatujn.)

Crescti: in caVareis Provinciai'um occidentaliuxi
Swarn insulae.

Floret: omni tempore.

Women: Tjam uum

VRTICA CINETiASCENS, Bl.

XI: foiiis alternis ovato-oblongis aenminatis e^tsertb serrulatls basi rotunda tis aut subcordatis trluer- viis supra albido-punctatis stibtus cincrascentibu3 fiiibtonieritosis, spicis subramosis glomeratis in* trri)lis axillaribus, caule fruticoso. (maxinie accedit U» iucauae.)

Cres

*Cricit: in Moluccii***Floret i* Into anno.*Nom:**WRTICA CANDIDISSnij, Bl.*

Th foliif ftlternij majusculis OTato-eJlxpticU acuruinatis argute serratis barub's ~~btus~~ supra Hi it is suhtns niveo-tomeniosis, capitulis pcflniunt.iii; axilla i it>us geuiiiut>£. (caulis iVutlcosiis, 10-18 pedL ah.)

*Cresell : in montosia.**Flo>rtU : omai tempore.**Nomen : Ribimtar.**WRTICA TyiFEUSTFOLTA, Bf.*

tf: foli is alter nan til) us mnjoribus acuminatis argu te- scnatis trincrviiis rugosis supra scabris suhtus rcticulato - niveo - tomeuiosis , majorrbirs ovnli- oblo n^is basi rottndadi , RUnoriblM ovato-ob— longte basi snbconfalis, paniculis axillarihus sub- geminatis EvVto dnp!o brenoribus , caule fruticosa.

*CmeU: in caicarcis Javac insulac, ut cliam in Moi
Inccis.*

*Floret: loto anno.**Nomen: Raine.*

VR*

VRTICA ALBA, BL.

{7; foliil literal! oblongts acuminatis mcdio ad apict iu
acnic Kerrule' tis basi acius trincrvts subtiu rcti-
culalis albido- tonu'ttrosis, capitulis pcdi iu ulatis
gcmatis axillaribns, caule iniicoso. (in spcci-
11 due tam [lt!ollf Celebes quunt Insulac >usac
Kambangac folia longiter in\<-iiimnr pcliuluU, ser*
laiuris di^liictioiibus*)

CrescU: in calrareis instilao Juvac#

F/arel: omni tern pure.

Roman: KibimUr; T)tnau flambat,

Variefas: folijj a pice cxigue serralntls subtus tenui-
tcr rcticulutis.

Crescit: in insula BnmU.

VRTICA DWIOTOMA, BL

XI: foVils altering < lljj>lico-oblougis acuminatis serra-
ns I-as i ohiu.su i. rotuttdtUi trincrvs subttis rcii-
cul:itis stibalbido-tomcntosis, capitulU in aor^ni-r
J>is dichotomic axillartbus br evissimis , caiih ini-
licoso. (VariaL ioliuruui lat'tn^iBf ul longilmliue.
Stipulac bificUe.)

Crescit: fa <yylvia titioribai Saluk cl Ocde acl \VA%
Qaviorom.

Flvrgl: omiii teiii|K>i*e.

A'owcn ; Totem - o - Rtt.

(500)

URTICA ANQUSTATA, BL.

XJ: foliis alternis angusto-lanceolatis acuminatis argute serratis rugosis basi obtusis trinerviis supra pufcescentibus subtus cinerascentibus ramuiisijue pilosis, capituiis in peduncalis axilaribus brevissipin bilidis, caule iruticoso. (proximo accedil C dichotouiae.)

Cre^ctt: in sylvis Provinciae Tjanjorlocis humidis.

Floret: omiii tempore.

Nomen:

VRTICA COXGLOBATA. BL

V: foliis alternis ovato-oblongis grosse obtuse serratis basi rotundatis trinerviis discoloribus rugosis supra hirtis subtus cauleque suffruticoso mol-Jissitnis, glomerulis axillaribus sessiibus.

Ctescit: ad pedem nionis Sdiak*

floret: Septeuibri, etc.

Nomen:

VRTICA SANGVINEA, Bl.

TJ: hispida; foliis alternis ovato-oblongis acuminatis dentatis rugosis basi rotundatis parum attenuatis 5-nerviis, subtus pubescentibus et in nervis petiolisque sanguineis, %>iibus ^loineratis axillariibus, caule iruticu\$o,

Cres-

(*Sox*)

Creacit: prope linga Jattie Pro vino iae Cheribon,

Floret: omni tempor^.

Nomen: Kapierit.

Varietas ginbrata: foliis supra glabris sobtus ~~pud~~
beris, cauie humiliore.

Crescit: in montosis Saiafc.

Floret: toto aniiQ.

•*Nomen:*

***URTICA MOLLISSIMA*, Bl.**

U: foliis al tern is ovalibus acutis » aruiniuatis ~~sub-~~
inlegerriinis basi rotundatis trinerviis subtu^ niol-
lissimis, spicis dioecis solitariis confertisve glo-
meratis iuterruptis axillaribus I olio brevioribus,
cauie fruiicoso*

Creadt: in monticulis calcareis prope **Kuripan.**

Floret: omni tempoe*

Nomen:

***VRTICA HEPANT>A*, Bl.**

U: foliis al tern is ovalilms acu*is basi 3-nerviis ro-
tundatis v. subcordutis subrepandis discolori»us
in costis infra pube adspevsis, spicis glomeratis
interrupts confertis axillaribus, cauie scaudeute.

Credit: in montosis.

Floret: omni fe e tompore.

Nomen: Naucic Aruji Reliikaa Aroy.

Variet.: foliis elliplico-oblongis acuminalbus in costis purpurascenibus.

Crescit: ad pcdcm monlis Salak.

VRTICA GLOMERATA, Klciu.

77; foliis alternis ovato-lanceolatU integerrimis supra glabris margine venis^ue subtus adpresso-pubnibus, floribus axillaribus glomeratis, caule herbiceo erecto tereti.

Crescit: in Immidis Provinciartun occidentalimu Ja-
vae insulae.

Floret: omni t^umporc,

fflctnen:

URTICA PARVA, Bl.

Th foliis alternis ovato-laaceolatis integerrimis cilia*-
tis utrinque pubescentibus,- iloribus axillaribus
glomeratis, caule herbaceo repente tereti, (Spe^
ties valde aifinis U. glomeratac.)

Cresc'U: in graminosis circa Rompieu,

Floret: toto auno.

JNomen:

VRTICA HETEROPHYLLA, Vahl,

JJ: foliis alternis (majusculis) subrotundo-ovatis in-
tegris aut_r5-i-lobis grosse dentate bagi subcor-

datis tn'nerviis utrumpic piloslusculis, spicis elougatis axillaribus simplicibus, caule suffru^{co}ticoso inani.

Crtscit: in fruticetis montanis.

Floret: Augnsto etc.

Nomen: Kouies Badak.

VRTICA CANUICANS, BL

XJ foliis alternis (majusculis) siibrotunclo-ovatis acu* minatis grosse dentatis pilosinsculis, junioribus subtus cinereo-maculatis, spicis paniculatis glo- mevatis imerruptis axillaribus folio valde brevioribus, caule herbacco fistuloso. (radix perennis; aff. IT. intcrruptae.)

Crescit: inter lapides ad ripas iluviornm in Java occidental! :

Flor&t: omni tempore.

Women: Kiparay*

URTICA JAVA NIC A, BI.

t^r: foUis alternis ovatU acuminatis grossc scrnntur utriuque cauleque erecto herbacco striato subpu- bescutibus, spicis glomeratis interrupiis **axillari-** bus folio acqualibus.

Qrescit: in ruderatis et hnmidis,

Floret: omni tenipore.

Nomen: Soroni*

VTITTCA SCABIiA_i Bl.

V: foliis alternis ovato-oblongis acuminatis basi St_{rk}* cordatis inaequaliter creuulatis setis aspernis ad-Spersis, capituiis pedunculatis axillaribus subge-jtninatis, caule suffruticoso ramoso. (aliqu₁ ULt acce-dit U. murali.)

Crescit: circa Bataviam in nideratiB,

/Voret: omni tcmpor«.

Nomen:

Tarieta\$: foliis ovatis basi truncatis*

Crescit: cum priori.

VRTICA ARDENS, BL

t^r foliis alternis ovalibus acutis basi rotundato-subcordatis integemmis venosis, paniculis axillaribud folio brevioribus. (folia urentissima.)

Cre^citi in humidis Provinciae Tjanjor*

Floret: Julio, etc.

Wo/nen: Pnitis Malaba,

VRTICA OVALJFOLTA, Bl.

U: foliis alternis ovalibus (majusculis) apice rotun-da tis cum acumine basi acutis integerrimis pen-ninerviis, coryuibis dichotoinis axillaribus, caulk fruticoso.

Crescit: in hovio botanico Buitenzorgii colitan

Floret: Julio, etc.

Ifo/uen: Daua Catal.

(505)

VRTICA COSTRACTA, BL.

V: foliis alternis ovali-oblongis acuminatis basi rotundatis integerriinis penninerviis, pauciculis axillaris ribus contractis, -caule arborco* (aff. U. ovalifoliac et U. urentissiniae. Folia baud uremia.)

Creicti: in Provincia Tjanjor.

Floret: loto anno.

Nome u: Till us Bezaar,

VRTICA STIMULAVS, Liinn. fil.

JJ: foliis akernis oblongis acutis v. acuminatis bnsi cunctis obtusiusculis integritimis, pauciculis axillaris folio subaccualibus, caule fruticoso.

Crdicit: ad Imrgiues fluviorum locis nmbrosis.

Floret: toto anno* .

Komen: Pulus.

JavietciH oblusa: foliis lato-oblongis obtusiusculis basi subcordatis integrerrimis, pauciculis dongatis,

Crescit: prope Tjuu iu I'roviacia J> an lain.

Floret: tolo anno,

JSibmeu: Dauwii JaUal.

URTICA SIS UAT A, BL.

XI: foliis alternis oblongis acuminate basi cuncatis obtusis versus apicem. rcpaule, pauciculis axillaris folio brevioribus, caule fruticoso. (prgx-iuw accedit U. stiuuaoti.) .

Cres-

Crevcil: in fniticetis et ad ripas fluvioram,

Flojet: omni lempore,

Non.en: P.ilns.

URTICA PARASITTCA, Bl.

JJ: foliis altevuis elliptico - oblongis acumiuutis basi obtusis **integerrimis** setis minimis adspci-sis juniores in venis subtus **purpurascentibus**, porym-Lis axiJlaribus minimis, caule sufi'ruticoso radi-^
cante.

Crescti: in sylvis Salak.

Floret: Novembri.

Ttfojnen:

URTICA RUBESCENS, Bl.

U- foliis allcrnis ovali-oblongis acuminatis basi obtusiusciilis v. rotundatis superne repandis glaluiusculis, capitulis masculis **in** pedunculis axillaribus **geminatis**, caule fruticoso ramosissirno.
(Species proxima *U. sylvatica* quae diversa foliis repaudis et peduncuiis axillaribus solitarlis bifidis, nunquam racemosis.)

C/escil: ad peclem mo/itis Salak, etc,

Florel omni fere tempore_a

Xvo/nen: Nancie.

URTICA SYLFATICA, BL

U.• fpliis akernis ovali-oblongis acuminatis basi rotuudatis medio ad apicem obluse-serrulalis in costa

'côsta siibtus petiolisque pubescentibus, capitulis subfasciculatis coufertis axillaribus laWralibusve; (arbor 1J-20 ped. Stipulae semilauceolatae, carinatae).

Crescil: in calcareis montis Parang.

Floret: omni tempore.

Nomen:

p'arielas a. ramulis foliisque subtus pubescentibus;

Crescit: prope Sadjra Provinciae Bantam.

Floret: Febiuario, etc.

Varietas b. foliis oblongo-lanceolntis acuminatis bast attenuatis, pedunculis brevissimis.

Crescit: ad monlem Tjeriinai Provinciae Cheribon*

Floret. All gas to, etc,

VR TIC À ? SPINOSA , Bl.

U: foliis alternis breviter petiolatis oblongis obtuse-acuminatis cum mucrone basi obtusis superne remote-serratis glabris, spicis axillaribus laterilibusve dioccis, caule fruticoso spiuoso. *Lah Ejpicarpurus* Sp. ?)

Crescit: in sylvis Salak,

Floret: Octobri.

Nolhen: Panawar Bead.

PROCRIS, Juss.

Floresmonocciautdioec(?^i; *Calix* 4-1. 5-partitns:
Masc: *Stamina* £-5 Jouga, laciuiis calicis adnexa;
Audi-

JXudimonlum stigmatis nulhim v. niinutifisimuni
Ovariuni .ovatain, monosporum; stigma sessile,
 planum, pubescens. *Akenia* supra receptaculum
 camosum congesta, calice persistente cincta.

Genus *Urllcae* proximum, stigmate sessili et
 habita attaineu distinctiim.

Hcrbnc suffruticosae , foliis alternis stipulaceis in-*
 accjunlilateribus, floribus femineis in receptaculis car-*
 nosis axilJaiibus scssiiibus, juiascuiis interdum spica-
 to-raccmosis.

PRO CMS LAEV1&A TA, BI.

P: caulescens; foliis oblongo-lanccolatis acuminatig
 basi obiupie-atteniiftlis superne exigue denticular
 tis pergamaceis glaberrimis, floribus moi)oecis,
 masculis in raccmis paucifloris brcvissinuis (accc*
 dit ad *P. acuminatam*).

Creact: in hamidis Salak ad ripas rivttlorum.

Floret: toto anno.

Nomen:

P ROC MS LONGIFOLTAy BI

P: safTruticosa; foliis oblongis acuminatis basi obli-
 que attenuatis ad apicem obsolete denticulatis
 glabris, floribus monoccis, masculis corymboso-
 trifidis. (aff. *P. laevigatae*, sed folia hujus speciei
 duplo luugioia^ et flores IUUSCUU corytubosi suiit.)

Cres-

Creseili in saxis calcareis prope Kuriparu

Floret: Junio, etc*

Nomen:

***PROCRIS CUNEATA,* BL.**

P: suffruticosa; foliis cuneato-oblongis cum acumine brevi inflexo versus apicem denticulatis lacivis floribus masculis corimboso-trigidis. (maxime aff. *P. laevigata*, sed characteribus datis facile distinguitur)*

C'escit: ad ripas rivulorum in sylvis insulac Nusa^{cc} Kambangae.

Floret: Octobri, etc.

Nomen:

***PROCRIS LATIFOLTA,* BL**

P: suffruticosa; foliis longiter petiolatis elliptico-oblongis obtuse acuminatis basi obtusiusculis integrerrimis glabris, capitidis subsessilibus.

C'escit: in Provincia Lautam prope Sadjra locis nimbrosis.

Floret: omni tempore.

Nomen:

***PROCRIS RIRSVTJ,* BL**

/ . .

P: suffruticosa; foliis oblongo-lanceolatis elongissimis rosiratis basi oblique attenuatis glabris, capulis

~~dumidato-verticillatis~~ ~~hirsutissimis~~

Cresc:

Crescit: prbpe cataract as montis Buraflgrang Pro*
vinciae Krawaug.

Floret: Angnsto , etc.

Nomen:

***PROCRIS FRUTESCENS*, Bl.**

P.- frutescens; foliis membranaceis elliptico-oblongis
acutis v. acuminatis basi oblique-attenuatis su-
perne repando-serratis glabris, iloribus masculis
in corymbis dichotomis longiter pedunculatis p
femeis in glomerulis axillaribus.

Crescit: in sylvis montis Salat.

Floret: Novembri, etc*

Nomen:

***PROCRIS ROSTRATA*, (Herb. Rwdt.)**

jP.' suffruticosn; foliis oblongis longitev rostratis basi
oblique attenuatēs versus apicem strerratis glabris
in veais snbtus puberis, caule sup erne bisulcato.

Crescit: ad montern Bonkok Provinrjae Buitenzorg,
et ad uiontem Suling prope Kompien.

Floret: Angus to, etc,

Nomen: Tjak-ljok-buwu,

***PROCRIS PALVDOZA*, Bl.**

P: herbacca; foliis brevissime petiolatis diinidiata*
ovato - oblongis longiter acuminatis supra basin
profunde awtc srratis, stipulis membranaceis

peti-

(5 u)

petiolo triplo longioribus, capitulis peduncular
%ois* (accedit. P. fagifoliae.)

Crescit: in paudibus montanis,

Floret: Augustq, etc.

Nometi:

PROCRIS SESQVIFOLTJ, (Herb. Rwdt.)

P: siifFruticosa; foliis lanccoiatis acuminatissimis basi oblique-atteuuatis versus apicem exigue crenulatis ad costam subtus pubescentibus , floribus glomcru-latis dimidiato-verlicij]ju|is. (fl. iem: Calix 5-part., pcrsistens; laciniis scmilaiiccolatis pvimo connive nti bus , demum patcntibus; Ovariuin filamcntis 5 inflcxis cinctum. Akeniuu calice patente sta-Uiinibusque stcrilibus inflexis ciuctum, purpu? rasceiis, ovatuin, compressum.)

Crescit: in uinbrosis moutiun Salak, Gcde etc.

Floret: omni lempore.

Nomen:

PROCRIS SINVATA, Bl.

*P.** herbacea; foliis mcmbranaccis cliptico-oblongis acuminatis basi oblic[iie attenuatis supra basia grosse sinuato - exscrte - serratis glabris in costa infra puberis, floribas confertis axillaribus, (aff. P. strigosae et P. paludosae a cjuibus ob inllo-~~rescentiam~~ minus congestam distinguiur.)

Cres-

Crtscit: in piludosis ruouUuis

Floret: OcLobri, etc*

Nomen:

P ROC RIS STRISOSA, BL

P: berbacea; folits ellipiico-oblongis rostratis b.isi obJi<£ue-attenuatis mcml>ranaccls supra niculiuin gvosse inaequaliter serratis glabris in veins sabtufl ramalisqae itrigosb, glouioralU dimidiato-verti- ciliatis pubcscutibus.

Cre.uii: in montosU.

Floret: S^pleuibti, etc.

Nomen:

pnochnis PARVJ, m

P: herbacea; foliis ditnidiato-ovato-oblongis obtusiuscuiis supra basin ncuie sei'i'alis in \en issublus glomerulisque dimidlato-verticijalls hirstilis.

Crescit: in bam id is sylvarum montis Me^auieu dung.

Floret: ouini teinpoi'e,

fibnum

PROCRTS MLMURjtNAC EA, BL

P: bevbacea; folii« tenuissimc mctubranaceis oblongo- Ian ceo la lis longiter acumiuatis basi oblique* aitcunatis medio ad apicem grosse obtuse s<;r- rat ill glabris, glouicruis diuudiatiq-vcniciliatis. (all'. P.paivac.)

Cres-

Crescil: in montosis Gede.

J'loret: omni fere Icmpoie.

PROCRIS GRACILIS, Bl.

P: licrbacca; foliis subgcssilibus lauccolatis a cut is bnsi angiistutis supra basin sermUs glabris, stipu*-
)is membranaccis carinatis, capUulis subscssilibufl
iiivolucralis.

Crescit:-ad ma^gincm rivulorum insulae Nasaje Kam-
bati^ae.

Floret: forte toto anno.

Nomen:

GVXVER.I, Linn.

*Flore** hermapiirodiți • rooilioeci dioccive, spicnti*.
Calix urccolaius, bidcuiatus. *Siamina* duo, dcu-
tibus calicis alterna. *Ovarium* ovatum, ovulo pen-*
dulo. *Sfylus* pvorundc bipnrtitus. *Akcnia* mar-
^inata, baccatini congsta. *Mem bran a* semiuis ex*
terua Crustacea. *Embryo* in perispennio inversus.

Herbne subacaulcs. Folia petiolnta. Pciuuculi
raraosi, floribus denslssiue spicatis.

GUSSERA MACROPHYLLA, Bl.

C- muricata; foliis rcmformibns sinuatîs inaeqnnii-
ter-dcnticiilalis, scapo pctipio bxc'viore, floribus
znoiiQCCis.

Cres-

t Sii }

-*Crescll*: clīca cilaractas furvidas iu uioiito igiivo-
mo Gede.

Floret: oimii temporc,

Nouieii:

APQRQSA, BL.

Flares dioeci ,• densissiinc sjiiqnti. Masc.: *Calx* profundc 4-partitiiS, laciiniis hisciialihiu. *Ulamlna* 2, brcvia; *anlherarum* loculi rotundi. *Jiudi'' menlum*. Pis tilli cen^ralc. Flores fc̄minti:

Genus ad Cccropiām spec tans.

Frutcx foliis allcrniis oblongis acuminatis bas^ acn-
tis integemimis yenosis subtus scabriuscalis, spicis
masculis confertis a^illnribts peduiiculalis.

APOROSA FRVTESCENS.

Crescit: in sylvis Nusac Kambangac insulae.

Floret: Ortobri, etc.

Nomen: Kallak*

SCIAPUTLA, Bl.

Florcs monocci. RJasculi: *Qali\$* s^xpa^ūtus^ L.
ciniis rcflexis, apice \illoiuscnlis. *Corolla* nulla.
Fllamenla nulla ; *Antlerae* 6, calici ndnatae,
ejusdem Iaciisiis oppositac. *Flo res feminei*: Ca-
Ux marts. *Anlherae* stcrites. *Qvaria* pKira, ie»
ceptaculo convcxe impositn, i-Iocutarria, l-ovufata;
Sligma sessile, punctiförinc, *JJaccav* tot quot

ova-

{5x5)

Ovaria, glandulis pellucidis tectne. *Se'mina solitaria*, subii'icpictra; *Membraiiā ceterua subcoriacca**
Albumen.

SCIAPHILA TENELLA.

Planta tenuissirñft, daHi'ofea, àphjlla. *Scopus simplicissimus*, erectus, slipulis alternis ovalis. Flores j-acniosi, niUatiteS, ſupci^oi^cs, m^stili.

*Crtbcit: in uinbiosis montis Mena^ae ac sylvarum Jil**
6Lilac Nusae Kauibaugac.

*Floret: to to aimo**

Nomen:



SECT. 4. CANNABINAE.

Flores clioeci, masculi paniculati, feminei côn? ſerf/y nubsessiles. Embryo exalbuminosus, cur*| vatus, inversus.*

CANNABIS, Totmu

Flotcs dloCei. Masci *Calix* profunde 5-partitus. *Siamina* 5, *filamenti** brevibus. Fem.: *Calix* oblongus,, latere bians- *Ovarium* i\$ *Vyli* 2, *jikenium* bivalve, calice tec turn, l-spermium. *Embryo* curvatos, inversus.

CANNABIS SATIVA, thin.

*JTdrietaS indica: foliis digitalis angustissimis iufra ggriccis, caule fruticoso**

Cres-

Crettcit: in liortls coUtur.

Floret: loto anno.

Nomen: Ginji.



A M E N T A C E A E .

SJLIX, Linn.

'Florcs amcentacei, dioeci. *Amenta* xnascuia el fcminka imbricata squamis unifloris. Masc.: *Stamina* 2, rarius 1, 3 aut plura, glandulae inserta. Fern.: *Ovarium* stipitatum, ad basin st̄ipit̄is glandula ins true lum. *Stylus* brevis, 2-fidus. *Cerp~sula* unilocularis, bivalvis, poljsperaa, *Sem̄na* lanata.

SJLIX TETRASPERMA. Roxb.

S: foliis lanceolatis acuinatis scrrulatis glabris sub-*
lus glaucis, stipulis minutisaimis.

-*Crcscit*: ad se>cs circa habitacula Chlueusiin prope
· Builenzorg.

Floret: • • • •

SALTX JAPONIC A , Tbunb.

S: foliis lanceolatis acuniinatis scrrulatis glabris sub-
tns glaucis junioribus subtus raraillisque subvillo-
fiis, stipulis ovatis acuinatinis obliquis subserrulalis.

Crescit'- ex Japouia allata.

(5 , 7)

SALTX STEBOLDIAVA, Bl.

S: foliis oblongis acuminatis basi rotundatis inne-
qaaliter obtuse scrratis (scrraturis subcnrlila^incis)
glabris subtas giaacis* stipuìis foliaceis semifulca-
tis scrratis.

Creictt: suh nomine *S. albac* a Doct. v. *Steroid*
ex Japonia missa et mine in liorto buLa-
mico Cuitcjizorgii culta.

Jl/y RICA| Linn.

Amenta mnscula ct feminca in eadem ant in dls—
tinctis plantis, iulcrdnm monoeci. Squamae i-florae,
Flores masculi: *Stamina* 4-6. Flores fcminci:
Qvarium scjuamulis cinctum% l-ovulatum, *S/y/us*
jbipartitus, pnuetis pcellacidis obsscessus. *Drupa* bac-
cata, granulata, nuclco l-speruio. *JEmbryo* e&albu~»
minosus, in versus.

MYMCA JAFANICA, (Herb. Rwdt.)

M; foliis obovatis racdio ad apicem scrrulatis coria-
ceis glabris, aineutis dioecis, fcinincis (ififorinibus
subsiraplicibus Toëio brcvioribus, masculis pani-
en] a tis iblio lon^ioribus.

Crexit: in caciitnine montis ignivomi Gedc«

Floret: omni leinpore-

Nojneti:

QUfIRCUS, Tourn.

Flores monoeci; masculi: *Amentum*, filiforme.
Calix 6-9-paititus. *Stamina* sex aut plura, Fem.:

Invo-

Iuvofuciriifn l-florunif e fcrjta.imulls itaTrticatis clcmum ill cupalam coriaccani coaHlis. *Calfx* sup ems, minutissimiis, styliuu vagina us. *Stylus* bre vis* «S//y-jnala 5. *Ovarium* 3 - loculare, luculis ovulatis. *Glaus* luonosperua? cupula ciucia.

Foliis integerritnis,

QUERCVS 'EL&GAX8, Bl.

Q: foliis abavatGH-^blbagis obtuse «icuminatis in petiolum augit&talis glabiis % fmclfbas cauiòi'lis, cu~ piilis urecGtatis C crenulis concentrieis tuberctJa- \$ls» glainlibus bciliisphifcvlcis^ disco subtus ~~parum~~ deprecfiso in ambiluiu favcolato.

Vrétvil: pi-ope Tjiafigtosaui Prbvinciae ~~Bauana~~

Ftynt: , . . . Fibrnatio fidget,

fiornen:

QttERC&S FLAČETfTslULIA, Bl.

Q: foliis falcatis 6Vat6-ttbIongla obtii^c decumintatis Ibsi iotuiidati^ tta'i'tateis glabrtiniis, ff*uctibus coufc'i'ti^, CTpli!s piàiitt^citliS ba^i àttenantis ton-ccnlricc tuberculailii, ^latidibtts brbicalntis dc-
~~presq;~~? siileatìs; disdo sab tits convexiusculo.

Crescti: in altioribus iHaitfti6 Gede.

Floret: Apiili.

Nomen:

Synon. *Quercns depreisa* Diiln 'in Act. Socict. Batav* t. 1%. *Uk. I.*

QUERCVS GLABRRTtlMA, EK

Q: foliis subfulcato-oblongis obtuse acuminatis basi obtusiusculis glabcmiruis, fmctihus canferUs, cupulis plauiscnlis s(|uamoso-tuberculalIs, glniidi- bus subrolundis, disco subtus depresso^ nioclio eonvo^iusculo.

CrescU: nd orfnm fluvii Tjiburrnm; *in* mo.ntosis Gcjer binthij iu cacuniiie inoukis **Barau-** graug.

Floret-. Junio. oh¹.

JSTotnen:

Variolas, ibliis br.si **attenuatia.**

Crcscit-. in sylvis monlosis Scribu*

itioret: . < Majo frugat.

QTL REGUS PSEUDO-MOLUCC

ft)Kis clipplico-oblongfs nrnminnrjii basi ncnlls glabvis snpra lucid is sub ins glaucis, nmentis ^u<-fcrtis tcrninalibus, enpn??. nbbrevfatis plain's ltn- liircata^scjuamasis, glandihu.i Ijpmispbacricia, disco Subtus depresso alvcohvlo. (aff. Q. angnslatac)*

CrescU: in sylvis jnoiitosi? GecTo, oLc.

Floret: Julio, cfc.

Nomen: Passau belli!.

Karie/a. cupalU plauis squamulis squarrosis imbriciUis, glandibus ovato-subrotundis.

Cres-

C'-eicit: in montosis Salak.

Floret: Ma jo, Jnnio, etc.

Nomen Pussan Sasu, Passan Kalimbovot.

QUERCUS AN&VSTATA, Bl.

Q: foliis oblongo - lanceolatis utrinque acuminate supra lucidis subtus glauds, a mentis axillarihus terminalibusque elongatis, cupulis plnniusculis imbricato-sqnamosis basi convexis, glautibus ovato-globosis, disco subtus depress*) alveolato.

Ci'esclt: in sylvis obscurioribus mojiluim Cede et Pangrango.

Floret i Jtuiio, etc.

Nomen:

QUERCUS SUN DAW A, Bl.

Q: foliis cllipticis acuminatis basi pa rum attenuatis supra glabris subtus ciuerco-glauccscntibus coslisqiic to men to lacvi obscssis , amentis solitaries f cùpulis p!aniuscu!is subsquarroso-iubricatis, glan-dibus orbiculatis depressis.

Crescit: in montauis Proviuciarum (auUm, Bui-tenzorg, etc.

Floret: Octobri, etc.

Nomen: Passan.

*Varietas a** foliis angustioribiis brcviter acuminatis rigidioribus in costis subtus raiijiisque dense tomentosis, glandibus ovatQ-heniispliuericis, disco subtu* convexiuscuJoB

(5 '')

Grescll: in monlanis Seribu.

Floret: . . . ; • Martio fnigot.

*Varietas h** foliis majisciilis basi anguststtis glabris.

Cresc'U: in sylvis insulae Kusae Kambang.ie.

Floret:

QUERCUS PRUJXOSA, Bl.

Q: foliis ov&io-oblongis acuminalis basi snbrotundatis sab:iL3 amentisque coifcrtis fnlvo-lepvosis, cupulis planiusculis s qua mo so -ccbinatis, glaudiibus ovato-orbicnlatis subtns depressis.

Cresc'U' in sylvis allioribns montium Gcdc el Pan-garango.

Floret: Ma jo.

Notnen: Passan mienjak.

QUERCUS ROTUTfDATA, Bl.

Q: foliis oblongis acurninatis basi attenuatis glabvis subtus glaucescentibus, cupulis hemispbaericis mar*gine squamuiis adprcessis cine Us basi attenuates edcntulis, glandibus suj^crnc piano-convexis in*feme rotundatis.

Crescit. in sylvis aitioribus Salak.

Floret: Angnsto,' etc.

Xfomen: Passan Köppia,

QUJBR-

QUERCUS INDUTA, Bl.

Q: foliis elliptico - oblongis longitcr acuminntis bast
acutis glabris subtuş cinerasceiuihus, cupulis he-
misphacricis basi attenuatis rugosis cdentulis , glan-
dibus homisphncricis parum depresso, disco sub-
tus dcpresso iu ambitum alveolate

Cresclt: in sylvis primacvis moiitis Cede inter ovtuin
fluvjorum Tji\va!ing et Tjiburrum; in smu-
njo monlis Burangrang Provinciae Krawang.

Eloret: Majo; *Jnllo frnget.

Nonien:

Varietas. glandibus ovato - globosis minoribus*

CrescU: in sylvis Gede.

QVERCUS COSTATA, BL

Q: foliis oblongis acuminatis bnsi acutis glaberrimis
subius glauco-cinerascntibus, amentis ramosis,
fructibus pedicllis clavatim-incrassatis insidenti-
bus, ^landibus saperne plains inferne rotund a tifi
cupulis cdentulis circinaliter costatis iumersis.

CrescU: in sylvis altioribus Salak.

Floret: Julio , elc.

Nomen: Passan Ijotjok,

Varieta s. foliis ad basin vix acutiusculis t gl an dibits
superue plano-convexis, cupularuin costis parurn
prominentibus.

CrescU: cuni prioii.

* * *foliis*

* * *foliis serratis.*

QUERCVS GEMELLTFLORA, BL

Q: foliis oblonga-lanceolatis utritique acuminatis superne remote serratis supra nitidis suhtus glaucis, pcflunculis fcniueis subgemellifloris * cupulis bemispliaericis iaibricato-squainosis[^] glaudibus ex avato-oblongis, disco subtus depresso-alveola to*.

Creaclb: in syl\ is montis Sdiak.

Floret: Aiigasto, etc.

Noinen: Passan hieries.

QUERCVS TURBIXATA, Bl.

Q: foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis supra basin argute calloso-serratis glabris, amentis femineis paucifloris, glandibus ovato - globosis cupulis turbinatis caliculato- scjuamosis seiuiin-jnersis.

Cresclt: iit sylvis obscmioribus motitis Salak»

Floret i Septembii, etc.

Noinen:

QVERCVS LFVEATA, BL

Q: foliis oblongo • lanceolatis utrinque acuminntis serratis subtus fusco-villosis approximato-pMral-lelo-venosis > amends brevibus axillaribus termi* nalibusque, cupulis scjuauioSQ-caliculatis. (arbor 80 pud. alt. ct pitta.)

Cres-

CrescU: in sylvis a'tioribus moutis Burangmng.

Floret: Julio , etc.

Nomen:

Sjjeclcs adhuc dubia.

QUERCUS PALLID A, Bl.

Q: foliis integerrimis oblongis acuminatis basi acutis supra glabrls subtus pallide-glaucis, amciilis terminalibus ramosis fastigiatis dioccis. (arbor 90 ped,)

Cresett: ad ortnni flnvii Tjibuirucn,

Flomt: Juiio.

Nomen:

CASTAVEA, Tom-n.

Florcs poly garni. Masc: Amentum Ion gum, floribus iiterrupte glomevulatis. *Calix* subscxpartitus. *Slamiña* 5-20 ; Hermapbr.: *Involucrm* commune sub-5-florum, 4-ad-polypbyllum. *Calix* 5-6-pai¹-titus. *Stamina* sterilia 6-12. *Ovarium* 3-6-Ioculare, loculis 2-ovulatis. *Sfyli*-5 6. *Nanci* 1-3, involucro ebinato inclusi.

SECT. 1. FOLIIS SERHATISJ STYLI 6.

CA STANE A VESCA, Gaci-in.

C: foliis oblongo-Inncolatis acuminatis setaceo-ser-ratis subtus nudis.

CrescU; ex Japonia introducta.

CAS-

CASTANEA PbMILA, Mill.

C: foiiis oblongis acutis niucronato-serratis subtus alb o-tome niosis.

Crescit: ex regno Cliinensi allata.

SLCT. 2. FOLIIS INTEGERRIMIS. STYLI 5.

CAST A SEA ARGENTEA, Bl.

C: foiiis oblongo-lauccolalis lougiter cuspidatis basi angustalis glabris subtus orgeuteatis , amenlis scriceis.

Crescit: i; i montcsis Pioviuciarnm occidentalimn Javae.

Vloret: Septembri, etc.

Nomen: Saniuti.

CASTANEA TUNGURRUT, B).

C: foiiis elliplico-oblongis acutis basi subrotuudatio subtus cinercis et in costis amentiscjue tomentosis*

Crescit: in monlauis Proviiciarutn Bantam > Buitenzorg.

Floret: Novembri, etc.

Nornen: Tnngnrrut.

CASTANEA JAVANICA, BJ.

C: foiiis subfalcatis oblongo-lanccolatis utrinquc acuminatis glabris subtus fuscescentibus, amentis foliiscjue junioi'ibus fulvo-tomeutosis. (arbor egregia.)

.Cre\$

*Cre*vit* iii S3'vis pvhnaevis inontls iguirouii Gcdc.

Floret: Octobii, etc.

Nonien: Kalimborot.

fariet.: foliis minoribus, obtusiusculis*

Ci;eaclt: in sylvis montis Sa!ak.

Floret: Novernbri, etc.

Namea: Ta»g - goo - goo.

*Spe cies du blae**

CASTAXEA? MO ^TAS A, BL

C: foliis elliptico-oblangis acuminatis basi acutis supra glabris subtus griseis et ramulis tenuiter fus* co-tomentosis. (arbor So peel. aff. C. Tungurrut.)

Crescit: in cacnmi:ie Gogar biiitin et montosis Gi'de.

CASTAIVEA? LATIFOLIA, BL

C: foliis ovalibus acuminatis subtus aH)i<lo-glnuces< centibus in costis infra ramulistjue tonitntosis* (arbor 5o ped. alt.)

Crescit in sylvis montis Tjorimai.

LITHOCARDUS, BL

Flores polygami, in amentis filiformibus interrnp- tc-glomerulatis. Masc.: *Callx* 6-partitus. *Stamina* 12-20. Herm.: *Callx* et *Stamina* niaris. *Ovarium* sterile 111 centvo.: Fem.: *Callx* polypbyllus, im- bricatus. *Ovarium* triquetrum, 5-locularc, loculis 1-ovulatis. *Stigmata* 5 * punctiformia, sessilia. *Drupa* uinbonata, exsucca, mice rugosa, 1-sperma.

LITHOCARPUS JAVENSIS.

Arbor Val Ida, foliis alternis oblongis utrinque acuminatis integrifoliis glabris,

Creacit: in sj'lvis primaevis moiitiuiu Su'ak ef Gcde.

Floret: Septembri, etc.

Nome n: Passau Bat a.

LIQUID AM HER, Linn.

Florcs mouoeci; Masc.: *Am&nlum gloiosuni aut coicam,* inuuitum involucro 4-J>IJJ11O, cuiluco. *Caltx nullus.* *Stamina liuuerosa;* *filament a brc-* vissima; *anthrae .oblongac,* tetragonae, utrinque longitadjiaiitci' deliiscntes. Fern.: *ameuturn &lobosum,* mmiitutn involucro 4-phyllo nt in mare, compositum ex caiicibus inverse p^ramidatis, inter se conlitis. *Qvavia i|no , unflocularia,* basi inter se et en in claiicibus suis conferru|mmta, *stylo quodquc suo praelongo recurvato teiTnitiaf**. *Capsrt/ae dtuie,* basi coalitac , rostratae, semi hi valves , introrsum dehiscentes. *Semina numerosa,* vari'c augulata, ar>culo inter no capsularuin affixa.

LIQUIDAMBER ALTLVGIANA, Bl.

JL: foliis ovato-oblongis aciimiatis semilatis glabrii.

Cresclt: i|| Provinces occilonfa'ibsis Javae; in Provincia Kiawan^ at tainen rarissima.

Floret: Majo, Junio.

Nomen: Rassamala.

Synon. *Altingia excelsa*, Noronb.

ESGELHARDIA, Lcclien.

Amenta monoi'ca aut dioi'ca, pendula, laxe im-bricata, composita e squamis l-floris. Muse: (iu monoecis inferioribus) *squama* sehii-5-rarius multiG-da, absrjue calice fovea stamiua 5-12. *l^ilamenta* brevissiina; *antherae* didymac, pubescentes. Fern.: *squama* foliacea, maxima, 5-loba, reticulato-venosa, demum excrescens, ovariuln cupulatini semi-iicladns. *Calix* superus, pawns, 4-lidus. Oi-vz-rium inferum. *Stylus* profunde 2-5-rariis niultiidus. *Nux* l-locularis, evalvis.

Genus *Carpino* proximum, liabitu attamen di-versum, ct in co ad *Fraxinum* spectans.

ESGELHARDIA SPTCATA, Lechen.

E: foliis abrupte-pinnatis sub-5-jugis, foliolis sub-membranaccis oblongis obtuse acuminatis basi oblique attenuatis, amentis monoecis paniculatis longissimis, squamis masculis S-il-andi-is.

Cresci: in sylvis altioribiis.

Floret: Januario, Febrizario.

Nomen: Kihugang.

ESGELIARDIA RIGIDA, Bl.

E: foliis abrupte-pinnatis sub-4-jugis, foliolis rigidis ellipticis obtusis* marginis recurvis basi obliqua-attenuatis, amentis dioecis ramosis brachivibus, Sijuamis masculis δ-andris.

Crescii: in sj^lvis monti^ <r=<V propc Pas sir Java.

Floret: Scptenibri.

Komt I:





BIJDRACEN
TOT DE
F L O R A
VAN
NEDEKLANDSCH INDlt



BIJDRAGEN
TOT DE *U[•]* *Gang^e*
F L O R A *en h. No^r*
VAN
NEDERLANDSCH INDIË,
UITGEGEVEN
DOOR
C. L. BLUME, M. D.,
COMM1SSARIS VOOR DEN BURGBRIJKEN
CENEESKUND1GEN DJENST, D1RECTEUR
VAN '«LANDS PLANTENTUIN TE
BV11ENZ0HG, ENZ.

ude StuL


B A T A V I A,
TER LANDS DRUKKERIJ.

$\pm 825.$

B I J D R A G E N

T O T D E

F L O R A .



S Y N O P T I S C H E B E S C I I R I J V f N G
van eenige plaiiteii, bchoornde tot de familie der
Polysfoneen, *Chenopode'vn% jimaranthaceen**. *Her-x*
nandieeriy Laurineen en *Myristiceen*, op eene,
in de jaren 182.I—i8a4 gedane reis over Java, waar-
genomen en beschrevcru



P O L Y G O N E A E .

***POLYGONVM*, Liun.**

Calix (juinque - ranus (quadripartitus, eoloratus.
Stamina 4-g, plerumquc glandulis intermix la. *Syl-*
lus bi-aut trilidus. *Stigmata* capitata. *Akenium*
lentkulari-compressum, aut triquetrum? calice m-
terdum baccato teqtua* *Embryo* unilateralis.

/. Caule erecto aut procumbentt.

Stylo bifitiQ; akenio lenticulari.

***POLYGONUM DICHOTOUUM*, BI.**

JP; caule procumbente glab^o, foliis lanceola.tis mar-
gine ciliato-scabris, vagiiis iinternodiis breviori-

bui

Jus nudis ad basin set is patentibus cinctis, spicis brevibus corymboso-dicbotomis, floi'ibus peii< tandris scim̄digyiis.

Crescit: circa Bataviam locis liumidis.

Floret: Majo, Junio, «lc.

Women:

POLYGONVM TENELLUM, Bl.

JP; caule repente, foliis angusto - lanceolatis margin* ciliao-scabris, vaginis brevibus truncatis setaceo-ciliatis, spicis terminalibus soliuriis brevibus , floribus 5-andris, digynis*

Crescil; locis uliginosis montis Gedc«

Floret: Julio , etc.

Nornen:

POLYGONVM PULCHRUM, BL

7* caule prociv:J>ente, foliis oblongo - lanceolatis longiter ocuminatis et spicis virgatis Vclutino-subvillosis, vaginis internodiis parum brevioribus sub oblique- truncatis strigosis setaceo-ciliatis, floribus heptandris semidigynis. (aff. P. tomentoso.)

Crsscit: in aquis stagnantibus circa Bataviam,

Floret: omni tempore.

Komen: Rumpnt Walang - gnie,

Varui.: foliis angustioribus dense sericeis.

Crescit: cum prwcedeiili.

(5 5 i)

POLYGONUM AMOENUM, Bl.

P: caule erecto divaricato, foliis ovato-oblongis acuminatis basi subcordalis molliter villosis, vaginis internodiis valde brevioribus hypocrateriformibus petiolisque lanatis, spicis subvirgatis nutantibus, floribus 7-andris scmidigynis.

Crescit: prope Bataviam ab Hoi tulauo Zippelio lee tum*

Floret: Scptembri, Octobri,

JSomen:

• • Stylo trifido; akenio triangulare.

POLYGONUM ORYZETUM) BL

P: caule adscendente, foliis liueari-lancicolatls supra ad eos lam margine et in venis subtus strigosis^ vaginis internodiis subaequalibus truncatis setaceo-ciliatis) spicis axillaribus solitariis terminalibus interdum geminatis filiforinibus pendulis, floribus 7-3-andris scmitrigyiis.

Crescit: in oryzetis vulgatissimum,

Floret: Apiili, Ma jo, etc.

Nomen z

Variet attenuatum.* caule procumbente, vaginia internodiis triplo brevioribus.-

Crtscit: circa Bataviam ia aquis stagnantibus.

Floret: Jiwio, etc,

POLYGONUM PUBESCENS, BL

P: caule adscendente, foliis lanceolatis acumiuatis supra scabris subtus villosis, vaginis internodiis subaequalibus truiicatis strigosis setaceo-ciliatis, spicis solitariis filiformibus, floribus 8-andris Sft-mitrigynis.

Cresctt: in summo montis fiurangrang ad orttun flviorum.

Ftortt: Julio, etc.

Nomen:

POLYGONUM FIS SUM, BL

P: caule adscendente foliis linear-lanceolatis margjne ci'ato-asperis, supra scabriusculis subtus pubescentibus, vaginis internodiis subacqualibus truiicatis Jaceris strigosls setaceo-ciliatis, spicis virgatis filiformibus densifloris, floribus 8 - and r is seniitrigynis. (aff. P. rivulari.)

Crescil: in uliginosis prope Rompien,

Floret: Majo, Jnnio, etc*

Nomen: Djukut Tjaran.

Variety: foliis oblojigo-lanceolatis ad costam uti'incue margineque strigosis, vaginis internodiis du-plo brevioribus.

Craicti: circa Bataviam.

POLYGONUM CESPITOSUM, Bl ,

P: caule procumbenfc, foliis lanceolatis acuminati* utrincjue Lirtis, vaginis brevibus trracatis setifi-rigi-

tigMJs adprcessis setoso-ciliatis, spiels v'rpat's fiTI-fonnibus s tri'e'us, floribus 7-8-andris seinilri^ynis*

Cresclt: in hnmidis montosis.

Floret: omiiitenipore.

Noinen:

POLYGOXUU BAnBATUM, Linm

Pi caule procumbentc, foliis lanreolatis glabriusculis, vaginis laxis brevibns truiicatis sctaceo*ciliatis, spicis virgatis, floribus hcxandris tri^uis*

Cresclt: in ham id is circa Sadjraai Pro vinciae Baiitdiil.

Floret: Fobruario, etc,

Nomen:

POLYQONUM PANICULATTJM, Bl.

P: caule suffrtiticoso erecto; foliis elliptico-lancro-latis parallelo-venosis in Ten is subtus pubcrulis. Vaginis internodiis brevioribus acuminatis laceris", punicula tcrminali divaricata, floribus octandris trig} nis.

Cresc't: in sylvis altioribus nxontis Cede*

Floret: omni toinpore.

Nomcn:

POLYGONUM conrirDosmr, wm.

P: caule suflruticoso, foliis oblons^is acutis v. ocit-minatis basi parum nttenuatis ititerdum suhiaasta*tis suuimis subscssijibus, Aa^uiis iutcrugdiis bre-

vitnvhū* l*6&-i«, cdrymbd tērtninnli **dichow**
to mo glnnduloso * pilosiasculo , floribus oc-
taiulris trigjnis.

Crescit: in fossis et loci's himiidig Provincianiūm
occicleiitalium Javae.

Floret: toto anno.

JNbmen: Titiwoait.

*P*ariet** a. foliis oblongd-lanceolatis acuminatis basi
suhlto attenuatis (rigidioribus) infra ad cos tarn
fccabris, petiolis interdum auriculati9.

Crescit: in sylvis alliori)us mantis Cede.

Variet. h. subhastatinn : foliis subhastatis ad con-
tain infra scabriusculis, petiolis sub-2-auriculati^>
corymbis dcnsis*.

Crescit: cum praecedenti.

ydrieK r. dfinsifiorum: foliis ov:>libus acutis sub-
coL-dato-hastatis glabrii, petiolis brevibus biauri-
culatis, corjjtobfs coiiti*actis«

Crescit: in sylvis altioribus montis Tjerimai.

Variet d. aspernmi* ramis obverse asperis, foliis
oblongis acuminatis basi subcordato-liastat's ađ
costam utiinque pubcris, petiolis biauriculatis_p
corjmbis divaricatis.

Crescit: in all is montium Gede et Burangrang.

fTariet. e puberufti:* i*amis obverse asperis, fblite
oblongis acuuuaUš baai sub cord sUo-liastat's **uwin-**

que

que dense puberulis, petiolorum auriculis, oiliatis,
corymbis contractis.

Crescil: ad caUrractas calidas in montqaii Gedo.

2* *Cauh scandente <\ volubilu*

POLYGONUM TETRAGONUM, BL

P.* caule scandente tetragono obvci'sc hispido, foliis
ovato-oblongis basi parum attenuatis glabris mar-
gine scabris, vagint acuminatis nujis, 6picis sub-
virgatis, flonbus bxaudWs ciig^uis.

Cresclt: in altioribas niqnlis Burangrang loois uli^
ginosi*.

Floret\ Julio, etc,

Women;

POLYGONUM PEUFOLIATUM, Linn.

Jp: caulibus scandentibis petiolisrjue retrorsum acu-
leatis, foliis triangularibus subpeltatis> vagais
^ubrotundis perfoliatis patcntibus.

Crescil: in frutioetis monlanis.

Floret: toto anno.

Nonien: Gam mat Glinting.

POLYGONUM HISPIDULVM, BL


{*: caulibus subscandcutibus ut vagini^ petiolis et
iolorum costis infra retrorsum bispidis, vaginis
jiiteriodiis dinadio brcvioribus olitusis seloso-
ciliatis, fbliU 5a^iuatis? s^icis subvirgads. (aff.
P. sagiiato.)

Cree-

Crenolt: in montosis Java©,

Floret: Augusto, etc*

Nome n:



C H E N O P O D E A E .

SALS OLA, Linn.

Calyx quinquepartitus. *Stamina* quinque, foliolis caliciis opposita. *Stylus* unicus, bipartitus *Siy** *li* 2, approMinati* *Semen* unicum, inchisum calico comiuenti. *Embryo* cxalbumiuosus, sphalitev ia* **volutus**.

SALS OLA ILVDICA, W&a.

Calice post florescentiam aucto, immutato.

S: fruticosa, foliis linearibus semiteretibus carnosis_f floraiſ bus minoribus.

*Crescits ad littora circa Bataviam**

Floret: omni tern pore.

Noinen: Jankar - uierak,

BASELLA, Linn.

Callx urceolatus, quinquelobus, bibractcatns. *Sra-+jnina* quinque; *fila/ncntis* brevibus, bnsi lads, lobis calicinis oppositis. *Sfyli.tres*, *stigmatlhus* intvor-gu<n adnu{is,, verruco^is. *Akeniunt* calice baccato

BASELLA RUBRA, Linn.

JB: foliis pi an iş ovatis ucuminatis cum mucrone has!
 parum attenuatis siin]liciter venoms, spicfc sirm-
 plicibus filiformibus (vid. Ruiupli. Herb. amb.
 V. t. i54> fig. a\

Cresciti in friiiUcetis propc Pamauukan Frovinia~~iae~~
 Krawang.

Floret: omni tempore*

Nomen:

BASELLA alba, Linn,

Variet. a] foliis undatis subcordato-ovatls cbtusl-
 usculis cum mucrone basi pnrūni attenuatis, venis
 subr'ticulatis, spicis simplkibus longiLudine fo-
 lioruin*

Crescit: circa Baitenzorg in frntieelis ~~nliginosia~~.

Floret: to to anno*

Women: Gandola nierha.

Varfem hi foliis concavinsculis snbrotnndis v. sub-
 rotndo-ov.'itis basi parum attenuatis, vonis sub-
 yciculatis, spicis simplicibus iulio subae(|ualibus.

Crescit: cum praecedente.

Flotet: omni tem]ore.

J^om̄eni Gandola.

A M A,*

AMARANTHACKAE.

SECTIO I. JOT,TA ALTFUXA,

AMABANTHUS, Linn.

Flores tnoiiocci. *Calix* tri-aut <]uiiu}uc-partitns>
Stamina tria nut quincjuc: *Filamentis* liberis |
 antlicris I)ilocularil)us. *Stylus* trl-aut bi-partitus,
Capaula uioiiospcrina, circiunscLssa,

• TrSandil

AMAJIANTHUS BTCOLGB, No*«.

A: rnulc crecto Mibramoso , foliis oblon^o - lanceo*
 latis ol)tuse ncuminatis cum mucrone bnsi cumentis
 flnpnmc repnndis, glomernlis fiessl'il>ns capitatis
 mnltifloris, branlis ovatis apice Bubulatis ralice
 brevioribus, laciniis caiicinis oblongis aristatis*

Crescit: in liortis Javae IVequens, seil foile e China
allata.

Floret: o'lini lempore.

Konien: Scugan Inirrhā.

AMARANTHUS pOLYSTjiCHYVti? Willd.

A: raulc i\imoso adscenclentc« foliis ov.ito-oblongis,
 icfiisis · rurt^ mucrone bnsi subcmicatis, glome-
 rulis imiliidoris appro\imalis, spiels ~~oxillaribus~~
 «f. fernalibus paniculatis, bractcis ovato-ob-*
 lon(jis nrmis caiicc brcvioribns, laciniis calicinis
 oblongo-lanceolatis aeulis, ~~capula rugosa.~~

Cres-

*Oi-ero't: Wi i incultis circa lialritaeula**

Floret: omni tempo re.

Nomeni Cnyain.

AMARANTH US PRO STRATUS? Batt.

A: raulo prostrato ramoso, foliis obovatis emarginatis ion^itudinc pctioli, glomonilis mnliifloris axillaribus ac dense spicatis terminalibus, bracteis ovatis acutis calice brevioribus, laciniis calicinis oblongis (margiuc membranaceis) obtusiusculis.

*Crescit: circa Bnilenzorg locis apriels**

*Floret: tolo anno**

Nojnen:

AMARAXTHUS OLERACEVH, Lm».

A: caule ramoso crcto , foliis subriiombeo * ovatis mucroiuilato-aristatis bnsi cuncatis, glomei'ulis axilla rib us multifloris ramosis tcrninalibus intersriiptc spicatis, bracteis laciniisque calicinis obloii^o-lanccolatis acuminnto-niucroiiiauis (marline nacnibranaccis) ~~subaequ'alibus~~

Crescil: locis apricis.

Floret-. lo|o anno.

Nomen; Eayam; Sajor Bayat

AMARANTHVS CRUENTVS, Linn.

A: caule ereclo subrmoso, foliis oblongo-lanceolatis
miicronulatis, glomernlis multinnris divisis, spin's
interrnptis remotift pa till is pñheTifiSns ter-
minnli omnium lon^tssimn, hrnrteis »rid« «n^na-*
tis callcc longioViT)us glanduloso-pilosiusciilis, la*
ciniis calicis mucronatis*

deceit: loci incnltiā* .

Floret: toto anno.

Nomeni Bajam Salassf#

AMARANTHUS RETROFLEX''?? L?im.

A: canle rrecto subramoso, ramis pñbescenlhuis,
foliis ovato - lanceolntis mnrronatis, glomerulis
multifloris clivisis approximatis, spicis axillari^ns
et termijjalibus rectis, brnotcis apire subulatia
caice longioribus, laciniis calicinis oblongis acu-
inatis.

Cresc't: rx nideratis circa Buitenzorg.

Floret: toto anno.

Nomenz

AMARANTHUS SPyOSTW, Linn.

A: caule erecto ramoso splnoso, foliis lanceolato^
oblongis mucronato-aristatis, spicis tcmiijalibu^

pani-

- . paniculatis gloinerulisque multifloris axillaribus,
bractcis subulatis calicem vix aequantibus, laciniis
calicis oblongis mucronatis, stjlo 2-5-partito.

Crescit: in ruderatis et incuUis.

Floret-, omni tempore.

Nomen: Bajam monjet; Eajam Douri.

***LESTIDVDESTA*, Aub. Tbouars.**

Calix quinquepartllus. *Stamina* quinque, basi
in cyathiiluni edeiitulum conuata. *Antherae* bilocu-
lares. *Ovatium* polysporum. *Stylus* 3-i-lidus.
Capsula polyspcrma.

***LESTIBVDESIA LATIFOLTA'*, BL**

L: caule fruticoso, foliis alternis ovato-l. oblongo-
lanceolatis acuminatis, spicis axillaribus solitariis
gcminisve, pis till o tripartito. (spicae casu folio*
rum paniculatae.)

Crescit: ad littora Javae orieatalis et in Moluccis.

Floret: Julio, etc.

Nomen:

***DEERINGIA*_y R. Brown.**

Calix 5-sepaIus, bibracteatus, persisteiis. *Sfa**
mina 5; *filament is* basi in cyatImlum cdentuluno^
Qonnatis j antJieris bilocularibust *Otwrium* xnultio-

vulsturni. *Styhi** brevis trifidus. *Barca* cnrnosa,
inflta, unijocularis, 1-5-spemia. *Albumen* i'ariia-
leum. *Embryo* periphericus, curvatus*

DEERIVIA INDTCA, Reiz.

D: frutescens; foliis alteruis ovatis acuminatis inte-
gerrimis, spicis pauiculatis terminalibus ramulis-
ç[ue] tomentosis.

Habitat: in fruticetis prope Linga Jallie Proviu-
ciae Cheribon.

Floret: Seplb-, Oct. etc.

Nomen: Bantj iluiiu r.

DRIER A, Forsk.

Calix qniquesepalus, irregularis, Irihractentus^
bracteis lateralibus mtus squumula deinUm dicfaotomo-
excrescente instructis. *Slamhia* quiue, *filament is*
basi leviter conuatis^ *antkerae* biloculares. *Stylus*
wins, &ti<rmate emarginato. *Drupa* glabosa, apice
Jbidentata, calice cincta, inonospernia.

DISERA FORSKAOLT, BL.

D: foliis ovato-oblongis acutis basi parum attenuatis
glabriusculis, spicis clongatis, caule decumbente,

J^arietas. foliis latioribus basi interdum inacqualibus.

Cresdt: circa Bataviam.

Floret: Majo^ Juii®, elc.

Notnen:

PTILOTUS, R. Brown.

Calix quinquepartitus, foliolis lanceointfl. *Stamina* initia quiuque, busi in tubum adentuluin connata; *antherae* biloculares. *Stylus* longus, indivisus. *Stigma* en pita turn. *Capsula* monosperma, evalvis* inclusa calicis foliolis tribus interioribus, medio luiia cohacrentibus, supra pa teiitib us nadis.

PTILOTUS CORYWtiOVVS, R. Brown.

P: capitulis subcorymbosis, filamentis superife filifoi-inibus, (bliis iufrioribus lauceolatis, superio* rib us linearibus.

Crescii in Moluccanum iusulā Flores.

Floret: oimii tenj^e*

Notnen:

Ohserv. an *Gomphrena angu\$llfoJia* Vahl eliara hujus generis?

CELOSJA, Linn.

Calix quinquespalus, bribracteatus* *Stamina* quirque, *filament is* basi in urceolum plicatum ovario parum longiorem connata. A nl he rat bilocularis. *Stylus* indivisus, *stigmatp* obtuso aut 3-4-fidutn. *Capsula* poljsperma, circuinscissa.

CELOStA ARGESTEA, Linn.

Variet. a: folii* lincari - lanceolatis, iuferioribus oblongo-lancolatis, spicis alteruis ovatg-cjliu^ dricis su hasigatis.

Cres-

Crescti: in ruderis cl in liorLis.

Floret: toto anno.

Nomen: Berodjo.

Far let. b: foliis praecedentis purpurascenibus, spicis solitariis terminalibus oblongo-cylindraccis*

Crevcil: cum priori.

Floret: eodcm tempore.

Nomen: Berodjo mcrha.

***CELOSIA CRISTATA*, Linn.**

C: foliis ovato-lanceolatis acuminatis, stipulis subfalcatis, pedunculo striato, spicis infcrnc cylindraceis superne dilatato-comprcssis plicatis.

Variet. a. foliis concoloribus et pictis, spicis coccineis purpureis et flavis.

Variet b. Comosa:* spicis superne comosis.

Crettcit: in hortis frequens.

Floret: oinni lempore.

Nomen: Janwcr a jam.

SECTIO II. FOTJA OPPOSITA»

***PSILOTRICHUM*, Bl.**

Calix 3-bracteatus (bracteis non spinoscentibus) 5-partitus, foliolis lanceolatis, aequalibus. *Stamina* 5, basi in cyathulum edentulum connata. *Antherae* biloculares. *Stylus* indivisus, *stigmale* capita to.

tato. *Capsula* evalvis, monosperma, inclusa calcis foliolis conniventibus nudis.

Genus *Trichinio* R. Brown niniis affine.

Planta hierbacca, raraosa, decumbens, ramis geniculatis trichotomis, foliis oppositis, radicalibus spatulatis, reliquis lanceolatis, floribus spicato-capitatis axilaribus et terminalibus*

P8ILOTRTCUUM TRICHOTOMUM.

Cresc'U: circa Baitenzorg in uoibrosis.

Floret: omni tempore.

Nonicu:

ACHYRA WTHES, Linn.

Callx quiii(juc - raro quadri - j)artitus, regularis, tribracteatus, bracteis siruplicibus spiriescentibus. *Stamina* quinque, basi connata, squamulis fimbriatis interjectis. *Anthera* bilocularis. *Stylus* mius, indivisus. *Sigma* capita turn. *Capsula* evalvis, mono&perma.

ACHYRANTHES BIDENTATA, BL

A: caule stiffruticoso scandiue, foliis elliptico-lanceolatis acuminatis ramulisque tetragonis pubescens, spicis axillaris solitariis terminalibus <ub-5-uis, bracteis 2 dorsalibus persistentibus basi 2-dentatis.

Cres-

CrascU: i-i tLcc'ivilalibus inter moiilcin **Burangrang**
et Tankiivvan-F/ahiu

Floret: onuii tempore.

Nomen:

Variet. elcngatax foliis oblongo-lanceolatis ramulisjuc ascndentibus glabrinscuHs, spicis elongatis.

Crcscit. in liumidis montosis Megamendoeng, Salak, etc.

***ALTE11NANTHERA*, Forsk.**

Calix quinque sepalus, persistens. *Stamina* quinque, filanientis bisi in cyatmlum connatis, quorum duohus saepe castratis. *Anthrra* ovnlis, unilo culuris. *Stylus* brevis, stiff mate obtuso* *Capsula* compreassa, evalvis, monosperma.

***ALTERS A STTHE HA DENTICULATA*, R. Br.**

Variet: capitulis sessilibus, foliolis caliciniis glabris ovatis acuminatis capsula parutn longioribus, foliis oppositis angusto lanceolatis denticulatis glabris, axillis barbatis, caale procumbente tetr.igono glabro, ramis bifam̄m pubescentibus* (an Species dis tin eta?)

Cresell-, in graminositf.

Floret: toto anno.

Nonien: Telon-iaga*

Ohserv.: in siccis folia scint valde angnstiora*

(54;)

AERVA, Porsk.

Calix 9-3-bracteolatus (bracteis haud spinescentibus), quirujuepartitus, externe villosus. *Stamina* 10, alterna sterilia, basi in urceolum brevem connata. *Antherae* biloculares. *Stylus* UMIČUS, 0/*#-mate capitato-subbilobo. *Capsula* calice iucunda, cvalvis, l-sperma. *Semen* latere affixum. *l&tnbryo* incurvus, tpo farinaceo instructus.

AERVALANATA, Juss.

A: caule subherbaceo, foliis ovatis basi cuneatis, spicis conglomeratis axillaribus stimulate subbilobo*

Crescil: locis inculiis.

Floret: omni tenui pore.

JVomen:

AERUA SANGVINOLEXTA, Bl.

-^: caule suffruticoso decumbente, foliis oppositis ellipticis utrinque acutis, spicis axillaribus subsolitariis terminalibus gafci'tis, ^tigoato subcapi-tato.

Crescil: circa Bataviam.

Floreti toto auno.

Nomen:

Synon.: *Achyranthes sanguinolenta*, Linn.

GOM-

GOMPHRENSJ, R. Brown.

Callx 5-partitus, regularise *Stamina* 5, in tubum subcyliudricum ovario longiorcm conuata; *an-**
t/ierae unilocularcs. *Stylus* 1, apicc bifid us. *Capsula* monosperma, evalvis, circumscissa.

GOMPHRENA GLOBOSA, Lüim.

G: caule erccto strigoso, foliis oblongis pubesceati-
bus, capitulis terminalibus globosis solitariis di-
phyllis, bractearum carius alatis, calicc externc
lanato bracteis breviore, tubo stamiuco dcutato,
dentibus rotundatis.

Cresclt: in hortis frequens.

Floret: omni tempore.

Nomen: Bunga Knop; Radna Putie.

Variat capitulis albis ct purpureis.

CYA I¹ HULA, Lour.

Calix 5-phyllus, persistns. *Stamina* 5 basi in
urceolum brevissimum connata, squamulis interjectis.
Antherae bilocularcs. *Stylus* filiformis. *Stigma*
capita turn. *Capsula* calice pcrsistente inclusa, mo-
iiosperma. *Florcs* 2-5-fasciculati, lateribiis bractcis
2 totidcmjtue fasciculi's setarum apice uncinatarum
instructi.

CYA-

CYATHVLA PROSTRATA, Bl.

C: ranlo suTniticoso prosLPRta , foliis oppositis
rboinbro-ovaLis, spicis solitaries strictis, fforam
fascieuii.s patentilms tlciimm reflexis. ,

Cretcit: in graminosis.

Floret: toto anno.

Norneti:

Synoi. *Oesmochaefa proatr&ta[^] T)ec.* \$ *Achfran-*
thes proslrala,) Li»r«

TRYPMERJ, Bl.

Calr'x co roll In as 5-sepalus , 2 iuterioribus mino-
ribu.s. Stamina ", r;u-issinie 9-1 o, b[^]pogvna;
tuitherae bilocolares, extrorsac. Sly I? 5 , subulati.
Capsula Diem bra uacca, ealicc inunulato iuclusa, '^-
CODO , .)-Io(iilfit's , loculis 'i)ul\spcrmjs. Funiculus
Semiuum diJatntus, sncciTonnis earn appt'tulite. Al-
hitmen fartuosnm. Embryo peripbcricus» cuvvaiust
Radicutct CfitU'ipeta.

*

TRYPHERA PROSTRATA.

Tola albiflo-tomentosa; cauHbus lignosis noflos?s,
foliis obovatia fmcillaiis 'ternis_v capitulis inlraiolia*
tc/s Leriniiialibu:sve.

Crescil: to Uaajjilis et akl Hmites agrornm 11_{rome}
r.-tuanukaii, Provinoiae Krawangj viil-
garusima etianj jiixLa Cheribon;

Floret: Septf.r. —— Deehr.

Nomen: Kumpait.

HE R-

(5 Co)

H E R N A N D I E A E , B L

Flores monoeci, aut beiMi pbrodit. *Cnllx* duplex *x exterior* intérns, in floribus masoulis interdurn nullus; interior c>ro'linus, supra ovarian tuhn'atus, 4-^pariitus, deciduus. *Stamina* definita, rihiplici serie calioi interior! inserta, (uorum exteriora saepc sterilin. *Anlht'ra** loM^irudinaliter dehiscentes. *Ovarium* snperiin, ovulo pendulo. *Stylus* unicus, aut nullus. *Stigma* Litutn, depresso. *Dm pa* nuce fibrosa, monosperm. *Embryo* exaN Luininosis, in versus, CQt^ledouibus sublobatis, ru^osis, oleosis.

Ar^ ores foliis altern!s, integevrimis, spiels aut co*
Tjinbis axiljaribu5 Ml terminalibus.

IIERNANOTJ, Plum.

Flores monoeci. Masculi: *Calix* corollinus sexpartitus, ladiis biserialibus. *Glandulae* sex (stamina tsterilia), siipitatac, cireumpositac stmninibus 5, ad basin coaiilis. *Filamenta* brcvia, erecta; *antherae* & debiscentes. Flores feminci: *Calix* duplex; *exterior* inferns, brevis, urceolatus; *interior* corollinus, supra ovarinm coarctatus, ultra ♂-pnrtitus, deciduus. *FUamrnta* sterilia 4, glandulaeformia, ex imis laciniis corollinis calieis enata. *Stylus* non exscrtus, & fl<rmatf> lato, infundibuliformi. *Ovarium* l-ovulntum, óvulo pendulo. *Fruclus* (ex Gacrtner) drupaceus, ralice inllato veslitus, 8-sulcalus, intus fungosos, nucleo i-spermo. *Embryo* exalbuininosus, iuvcrsus, cot^ledonibus muximls, lobatis, torulosis.

HER-

(SSI)

HERNANDIA SOXORJ, Linn.

H: foliis pchalis ftubcordatis-ovatis*

Cresvil: in insulis Moluccani**

Floret: Augusto, etc.

No:nem.

INOCARPVS, Fom.

Flores hermapbroditi. *Calix* tubulosus, Lifidus, dcciduus. *Corolla* tubulosa ; limbo ô - 6 - partito. *Stamina* 10 - 12 ; *filament is* brcvissimis, dupli scric tubo corollae in Las aduatis; *asilkerae* did\mac, introrsac, laterc dehisceutes* *Ovarium* 1-ovulatum, ovulo peud.ilo. *Stigma* excavatuin, sulisces-silc. *Drupa* magna, nudeo reticulato - iibroso , i« sperm a. *Embryo* exalbumiuosus, invcrsus, cutyU* do nib us maxiuiis, taberculatis, suj>ra iüssls.

JNOCARPITS EDULLS, Linn.

/.* foliis obljnqis subcordatis iiitcgcriiiuis glabris, spicis axillaribas solitaiiis.

Crescit'. in locis cult is.

Floret: Augusta, etc,

Nonien : Gaj IH&*

C O X-



C O N S P E C T U S a E N E R U \ T
L U I R I . U E U U M J A V A -
N 1 C A R U E

J. *Ari/hnrae hiloctilares.*

- a) [lores fasciiciil.ili, invoiucratr, interdum dioeci}
bacca imdu. Genus *Lauras*, Juss,
- h) flores pauiculuti, saepe dioeci.
- * barcu calicis hibo baccilo intcgro inclusa. Genug
Cryptocarya, R. 13 rw.
- ^Y bacca calicis tul>o baccato lacinlis persistenLibuS
coronato inclusa. Genus *Cassylia*, Limi.

II. *Anlherae quadriloculares.*

- a) flows f'asciculiili, iñiyolucrali, napping dineci; bac*
c*i* calice traiiQato sulliUa. Genus *LUsaea*, Juss*
- 6) flores paniçtilati, hermapiroctili; bacca calice sejt-
lobo nñilhVta. Genus *Perse a*, Plum,
- . c) /lores pnniciiiuly liormapbroditi; bacca cincta ca-
lice cupulifonni porsistenle
|v| dontalo. (iei)iis *Clñnamoinum*, Burm.
vel iiitcgvo. Genus *Ocolea*, Aubl.

LA VRVS , Linn.

Flores licermapiroditi, rarius diocci. *Cah'x sex***
pnrtitus, accjualis; laciñis deciduis. *Slamma* fer-
tilia 9, 5 iijicriora bnsi bi^laucntosa, cum strrili-
hus a] tern a u tin. *Anthcrae* biocularcs. *Stigma*
capitatuiftt *Jiacca* niidu,

LAU-

LA VT? US BIB RA CTE 4TA, BT.

L: foliis iripliicrvüs ovnto-oMongis longiter no.u* ininulis l>asi iicalifl glabris siilitns ^laacis, CH^I-lulls pancidoris solitariis, 11 oribus dioccis bibræ teat is, caule lruticoso.

Crenel:: in syhls obsCiuioribus iconLiiuu Gede, **Sa-** lak^ etc.

Morel; .huiio, elc,

jYumeu;

LJVRUS CAESIA, Herb. Rwdt.

71; foliis ovato-oblongis longilcr acuiuiuatls |v.is| pa-iMin iitlcnu:ttis triplincrviis glabn's subtus ^iaucis, caiJe avborcsceute.

Crpscit: |r| sylvis moutanis.

Floret i.

Koaienv JJuru maduin.

LAURVS CAMPHORA, Linn.

L: foliis ovato-oblongis apice obtusriscnli? b<si' at-tenuiis triplinerriis supra uititiis sublus **laueis**, **caule** arborescntc.

Qrctcil: ex Japouia allata.

Floret:

R o m e u ; . • • • • •

. **LAU-**

LATJRVS SERICEA, BL.

JL: foliis elliptico-oblongis apicc obtusiusculis basi anj;ustatis supra nitidis subtus cacsio-^luucis sub-scriccis, caile arboreo*

Crescit: JbrLe ex Japo.iiia allala.

*Floret**.

Nonien: . . . , ,

LAURUS POLYANTHA, BL

X; foliis oblongo-lauccolatis loiigiter acuminatis basi attenuatis glabris supra lucid is sul>tus {^lauris, iuvolucris 4-p1i)llis uiultifloris subraccmosis di-Qccis, caule arborco*

Crescit: in sylvis moutis Burangrang Provinciae Krawang.

Floret: Julio, etc.

LAURUS SCIBUMBELLJFLORA ^B).

X: foliis lanccoJHlis acuminatis basi acutis glabris subtus glaucis, floribus dioccis subuinbellatijj, caule frulicoso.

Crescit: in Inontinis Panljar Provincine Rniten^org; ad podem niontis Tjeriniai Proviucie Clic-rib on.

Floret: Jimio — Sepfembri.

Aomcn i Hum Lcmulu

LAVRUS PAUCIFLORA, Bl.

L: foliis lanceoziatis utrinque acuminatis glabris ~~smb-~~
tus glauccscetuibiis, ptiluncnlis i-floris gemmatis
ternisvc axiliaribus, canle arborcscentc.

Cresc't: hi montam's Pr.m'ncjarnin cccideutaiiun
.) avae.

Floret: Angus to, etc.

Noinen:

LAVRUS GEMUIFLORA, TIL

L: foliis elliptico-oblongis utrinqne attennalis -nplce
obtusinsculis glaberrimis Inciclis, gemmis axillari-
bns solitanis multifloris, squaminiis ő.-'J-floris im-
bricatis, caule arboreo. (arbor 60-30 pecL)

Crescit: in syVis nionlum Parang.

Floret: Jimlo , elc,

Noinen: KUalJos.

T, /iXTTi 'Tfi li/S ji 71 jJNr^I. TO

.8; foliis venosis e] lip tic o - oblongis <icuminate?mJS
basi subinnequali-ntcennatis glabris, r.'iccmis cora-
positis axillaribns brevibus pctioli.sqnc jiinioribus
fusco-leprosis, caule arboreo. (an Sassafras species ,
cum iniiorescciua sit raceraosa? Arbor proccra.)

Cresc't: in sylvis montosis.

Floret: Februario, otc.

Nomen: Ilura Muduiig.

CRYPTOCARYA, ft. Tn'oivn.

Flores Tiermaphrociui, *Calix tubulosos*, limbo scx-H'lo, Hend no. *Slam inn* ftu'tilia 9, dnplici brdi-ill disposita, 7) httnoruin basi jilcrumquc biglandu*-los:1 et **c*i*:*i*** stajninibas stenibus gJnuttiinefor injbns alteniantia. *Antherae* bilo cola res* *Stigma* olru-*s\vn*, *Prrfcariicm* drupncuiun, Uctum tuba cali* **c*i***is baccalo, *i\^ce* subclauso.

SECT. 1. FOLIIS NERVOSIS.

CRYPTOCARYA LAE^fJATA. BL

C; f til is **Eriplraerviis** elliptico-oblonpt.'; **utrtnqae** at-
Icmiatis et **paa*OdJiJ*** n?;iKavibua bi'evibas glabcrri-
mis, ca-iKi **arborescenie**.

Cieidi: ill sylvTs montanis.

Floret: Augusta——Deceiubi i.

Xiamen:

Cf~~T~~YPTOCARYA DESSTFLORA, BK

C* folJis tripiiiervlis c]liptico-ob!ong»s pbtusc acumiualis **b*si** acntis j^!;iSr;:isc:i!i«; s:ibt:is glaucfs, pjHitcaHs **cor^mboos** axillaribrus terminaiibus<|ue l»ruvil>us stibtomcnto.sis, cauie arbor-~~zo~~.

& '4cU\ in sylvis obscurioribua inoutis Salak.

etc.

Nomen: Kitega.

SFXT. 2. FOLIIS VENOSIS.

CT1YPT0CARYA OBLOX2IFOLIA, BL.

C.: foliis venosis oblongis apice obtiisis bnsi parum attenuates subtus flavo-viresccntibus paniculisqut axillaribus tcmiualibus^ue folio subaequalibus, jmbe tonui obsussis caule arboieo. (arbor 60 pcd. alt.)

Cresclt: in sy?vi* a'tiojibis Provluciarma ~~Baile-~~
zorg_v Ba ut a in , Tjanjor.

Floret'. Octobri —— Decembri.

Nomen i Hani Kidang.

CRYPTOCARYA FERREA, BL

C: foliis venosis oblongis acamuatis basi acutiuscu* lis saepe obliqtiis glabri's subtns glaucis, paniculis contractis axillaribus terminalil)usque fcrru^ineo tomctosis, caule arborco. (arbor 2O-55]>ed; alt. C. oblongifoliac.)

Crescll: in nylvU ad p^d'm montis Tjerimai Pro~~s~~
vinciae Cleribooii*

Floret: Angnsto, etc,

Nome 11: liuru bessio.

Variet.i foliis basi subinaequali-rotundatis*

Crescti: in sylvis Salafc.

Nomsn: liuru Meiitek.

CRY-

CTtYPTQCARYA COSJATA, BL

C: foliis vgnosis ellipjico-qbloñ^is utvinquc acuml-nat's bnsi interdum obliquis glabris ju:iioribus in costis petiolis <at paniculis axillaribus teriuuiulür lmsifiic folio subaecfualibus iiisco-subtomerUQSis, fructi!)us ejliptico-oUlongis costali\$, cattle avbo/co. (arbar 3a pod, alt.)

Credit: in sylvis montanis.

Floret: Aprl.'i; Novembii.

Koine in Iluru u.ijuk.

CRYPTOCARYA CUNEATA, BI

C: foliis vcnosis obovatis V. obovato-oblongls ob-tusis v. acutiusculis subtiis ftlaucis ct pubcrulis, pQiiiculis axillaribus tcnninalibus(jue folio, bvevi-ğril)us, caulk arborco. (Arbor <O pcd. j aff. C% obovatau R. Brwn.)

Cretclt: hi sylvis lusulae Nu&a« Kambangae,

I'Yoret: Novembri, etc; fructus noil vidi.

Nomen: Palat.

LITSAEA, Juss.

Flores diocci, rnrius bевmapbroditi, umbellaſi, involucruti. *Involncrm* 4 - 6 - pbyllum, deciduum. Caux •T*6-mriis 7-9-partitus. Flores masculi: *Sfa~tnina* fertilia 6 - i 5, in to ñova plerumque glandulis ttd basin iiisuucu. *Antherae* 4-locuaries. *Jludi-*

turn turn pl̄stilli. Flores fcminci: ·GJanttlJtii ~~sta-~~
ininaque stcrilia. *Stigma* obtusum, sublobaluiru
Jiacca calici incrassaso truncate inside us.

LITSAEA ZEYLAJSTICA, Necs ab Esenb.

L: foliis oblongis acuminatis bnsi r.ttcnunlis tripli-
 hcrviis glabrm subtns caesio-glniw;ls, involrterii
 in gcminis (axillaribus solitariis) coufcitis 4-
 J>jyHis 4-5-lloris, calicibns 4-6-partitis, eaulc
 &rboreo«

Creact: in sylvis altioiibns inoiliuni Gedc tt Tj^«

Floret: Aprilu

Nomen:

LITSAEA TnTPLTXETiri.A, BL

L: foliis lancolatis longitcr aciirninatis basi ~~attenuat-~~
 t!s triplincrviiis glabris ^ubtus glancoscentibus,
 inVToficris in gemmis (solitnriis axillaribus) feul>-*
 solitariis scssilibns 4-pliyllis snb-4-ilorU^ cfcu?r
 arboreo. (aff. L. Zojlanicae.)

Crescil: in sylvis monlis^Alak*

Floret: Augusto , clc.

Noman:

LITSAEA SPTIAEHOCARPA, Bl.

I:* foliis in sumniō ramorum confertis obloflgo-Tan~
 ceolatis obtuse acuminatis subundulatis glabria
 supra nñiJis subtus glaucis, f rue lib us umbcllu-
 latis spaericis. (arbor 50 pcd.)

Cres-

(5Go)

Crtscit: in sylvls montium Parang.

Flortl: • • m • Jnnio fnt^oct«

Noinen: Hnru p:?yong alas.

LITSAEA ? PRUINOSA_f Bl.

JL: foliis mnjuscujis longiter petiolntls elliptica-olj-longis rplce obtusis basi ncutis maryineque infer nc cailosis glabris snbtus glnuco-pruinosis, ran*lc arboreo, ramulis vei ticillatis. (arbor procera.)

Crcscit: in sylvis moiiti* Solak*

Floretl.

Women: Hum talang

LTTSAEA SEBlFEnA, Vers.

I:* foliis majuscalis ovato-oblongls kasi attcnantis in¤ aequalilateribus supra glabris snbtus glatns sub-sci-iceis, involucris 4-pli^llis 5-6-iloris sabra¤* cemosis, caule arboreo.

Crerolti m montanis Java.*

Flartt: Angnsto, ct-,

Nomem Taakalak.

LITSAEA ? ROB VST A , Bl.

L: foliis majusculis elllptlco-oblongis utrinque am-tis glabris subtus glauco-vircscentibus et pctioiis pubc minuto aJpressis^ oaule arboreo. (arbor '50-60 pcd.)

Cres-

(56*)

Crescit: in sy'vis Salak.

*Floret: . . * • •*

Notntn: Hum Dapuun.

LTTSAEA RVB71A, BL

L: foil Is majusoulis oblongis obtusiusrulis 1)nsf ḥnrnm
attenuntis gl<!>riixs.eulis snUtuS cijierosrcutliiis, in<
volticris 4-plijllis 5-floris su!>vacemosis, caula
arboroo.

*C''e*clt: in syVis montiam Salak et Gede.*

Floret: Jannario: olc.

None i: Mohmal Burrum.

**Synon.* C -yp'ocarya ruhra milii.* Catalog. Ilort
Bui ten z. p. 65.**

LTTSAEA NOTIOXIIAE, Bl.

L; foliis majusculis oblongis superne Intioribm ol)-
tus nut utrimjne acutiusculis t;lnl>ris subtns gl;Mi-
cescentibus, iuvalucris 4-pb^llis 5-Ilgris, cuule
arboresceiite.

Crcscit: in montur̄s

Floret: toto anno.

Noineri: Mohinal.

LITSAEA FERRUGTSEA, Bl.

L: foliis m^jusculis oppositis oblongo - lauccolatif
utrinque acutis supra gl<J>ris subtos ramulis pctio-

lisque

Jisqiiic junioribus fermjñiieo-toiftcrrosis, īnvoluciis 4-plnliis sub-i-flim̄ fascleululis, caule ar* Lorco.

Crescili in irionianis Javae.

Floret: Novctnbri, Dccembri.

Nomen: Hum Tankalik.

SynOft: *Crſptdctrrytt ferruginea* milii ; Vli, CaL lion. Baitni2orr.fi >*g 65.

LtTSJSA LUCIDA, W.

L: foliis elliplico-oblongis acuminalis basi arntis supra lucidis subtus pnbent!bus< involucris i<<s-ciculatis 4-jjlijiis multifloris, caulu ~~arboreoscent~~ tc. (afT. L. Glabrarine.)

Crctcti: in monle Salak.

Floret i Ma-.tio, etfc.

Nomen: lluru Manga*

LIT SAB A JRESINOSA, BI.

*X.** foliis elliplico-oblongis basi ncutis rigid is glaTrtis, involucris fasciculntis 5 - 6 - phjllis 5 - 6 - IIov's, caule arboreo, ramulis obtuse angulatis. (all* L. angul-itae, *scl* folia sul>tu5 b;iud glauccsentia; arbor 3o. pcd.)

Cr̄scit: in sylvis Salalc *t Ge&e.

Floret: Januario, etc.

Jiomen: lituii Minjak* .

LTTSAEA AXUVLATA, BL.

L: foliis ciliptico-oblongis ncutis hnsi iiturdum obii* quu--a;teiui;itis glabris sublus glnucis, iuvolucris peduueiilntis subsolitariis 4-[>i}]]is sub-r5^lioñs, caule avboreo, ramulis ar^ute-angulalis. (arbor 120 pcd.)

Crescile in sylvls montis Sa'ale.

Floret: Noyemhri , etc.

Nomen; UUVVL wnj^kj IJuvu Panljar; Haru Mcranr%

ITTSAE4 ELLIPTIC A, BL

L: foliis ovalibus basi iutcvclum obliqm's glabris sub* tus glaucis , inrolucris iasciculads 4-plij]Jis 5-flo-
ris, caule arboroo. (ai-bor Go pcd. aft'. L. obtusae.)

Creicli: in sylvis altioribus moil tig Salak,

Floret i A~~ig'istQ~~, etq,

Nonjen: liiu*u inadang.

LITSAEA AM4RA.TA.

L: foYüs yenosis oblongis acutiusculis basi ebtusls su-
pra lucid is sub tus pnrruri tomeiitosis, iuvolucris
fascicularis 4-pbjlHs 5-flori^, caule ayborço. (aff.
L. moiopetalac; arbor Jo-ōO pcd. alu)

Crescit: in aiontails.

Floret: omni fcic tempore,

*Nomen**' Uixrii Linés,

*LIT**

tTSAEA G IMI^ATA, Bl.

L: foliis cilipllico-obloii^. S ulrinqiic acutis apice in-
to rdu in obtqsis supra lucidis siibtus subpubescen-
tilms, pcrluneulis apice 2-rniias .l-4-fidis, iuvo-
lucris 4-pbjllis multilloris, cnulc arborco.

Crescil: in sylvis piimaevis Gedo.

Floret: Septeaibri j Mi jo.

Nomen:

LITSAEA MULTTFLOfyt, Bl.

L: foliis cllipticis obtusis l>asi acutis subtus sericco-
subtomcntosis, iuvoSucnis u.nljellulatis 4-:phyllis
xnultifloris, caulc arborco.

Crescil: in sylvis montiaui Salak ct Gcde*

Floret: Julio, clc.

Nomen:

LITSAEA OBTZ'SA, Bl.

L: foliis oblongis obtusis bnsi aitenuptis g!:ibris supra
uiticlis subtus glaucis, iuvolucris subracemosis 4-
pbjllis 4-Uoris, caulc arboreo. (arbor 5o ped.alit.)

Crescil: in sylvis a'tioribus montis Luraugrang.

Floret: Juuio, clc.

Nomen:

LITSAEA. DIFERSIFOLIA, Bl.

L: foijis oblongis utrinqnc acuniiintis apice hitcrilum
obtusis v. roluudatis glabris subtus jlaucis, in-

Volucris brcviter pecluncuijftis solitaries geuatni.svc
4-pb\!lis 4-6-floriSj antUui'is intenaribus 2-IttuiL-
Jiiribus caale fniticuso.

Crescii; in sylvis mtmlurris Ct Jc eL Sal ait.

Floret: Majo: Juiio*

Nomen : I [m¹] ii Settaqg*

LITSAEA crnxrcvsis, m

*L**? foliis obovato-oblongis' atriueme obtusiuscul»s st^>
j|i*a nilithis siibtas .glaucis- ra/mili.4i|uc Aiilosiuscu-
lis, iQvolucris glomerulatis 4-ph\llis sub-v.j-Uoris•
caulc fruticoso.

Crescii: c CUina allata.

Florjt: Majo,

JVo//ten;

LTTSAEA MACROCARPA, Bl.

*X**: foliis cunctato-oJ)lon'tis- obtusiusculis Iactdis AVL-
berninis, fructijiis pruiilurmibas, caale urb(*i-e©f
(arbor, uo pctl.)

Crasciti in aylvis altloribjM montis Saiak,

Floral: . . . Octobri fptiget.

NomeJI: IJiirti ?»Iu:i, arawan.

ttTSdE / CtTRdT A, T\|

His ^laucb, involacris sebooryab*yab*iis i-unvll^s
5-floris, caule arborescente.

Cres-

*Crew't: propt>n^{rt} catarractns fi\ vias bi monte Gede;
in altioribus uijiitia Prohu elium irrequens.*

Floret: U to EUHIO.

*L*ondon • Kig_Rruk.

hrj|s $\vdash_{AB\vdash} f \quad AVCW^{\wedge} TrFOLrj, {}^{\wedge}$

L.,: foil's veijicillat is lcmgo-lanceolatis utrim^fae acu-
suaatis ^iu-U'is s i!>tus yLiacis, uauiu arborco.

Credit: m sy vjs Salak.

J'largent ; . . . ' . .

ies.

LtTVAEA GLOWER AT 4[^] Bl.

X* folita *majusculis* vei't'cillatrs oSovMto-oMgis acu-
r:; **haai** *oblique* -iULctmatts sa'otus **albido-in** costiq
raiuulis '|;.*r jiiiuoribiuui'* nif'u-totucruosisj **uivojacrUf**
brevitcr peda culq tis eQadlomeiatis 4-:>li\llis i-
5-floris, cadle arborca.

*Crestkt: in ay via indutuiia Proriau iiiL-um occiden-
tiau.i Jayae.*

Floret: Decemljri.

Hara païjon.

Sy •j/z: **t/aurus** i.;!oincraU milii, vil. catalog, liort, Eogor.
• 66.

L/7^{IC}; / TOME NTOSA i BL

E. foliis ma inserts ohovato-ol>lo.«gis acutis v. obtusiusculis basi inaequata-ii: -u Uciiu; iLii stibus glaucis vj»j •• uncutosis, involucris fas cictiatis s- m. lisis o-Horis, caule nuboreo.*

Cress

Cresc't: 'su sylvis Salak%

Floret: .1 HI 1 io , el c•

JSIoinen: Hum Mammal.

LITSAEA UACROPJIYLLA, Bl

JC[#] foliis ramuliscjue verticillatis oblongo-lancolatiS
vsubtus glaucis et dense tomentosis , pcliolis rnuuiis+
quc fulvo-tomentosis , caule arboreo. (hff. L. glo-
jneratac.)

Cresclt: in mojitosis insulae Nusae Kambangac»

Floret: • • • •

Nomen: Hum Kapok.

PERSE A, Plum*

Floros bennapbrotlitj. *Calix* limbo 6-parrito»
J)orsistente aut rarins decidao. *Stamina* fertilia 9 4
duplici ordiuc disposita, 5 interiora basi bi&Jm-
dulosa , cum sterilibus glaudiilaelormiflus aluu*-
nantia. *Antheran* 4 - lonularcs. *Stygnia* obtusmu.
Jiacca calico sexloho suifulta.

PERSE A GRAT/SSIMA, Gocrtn. fil.

P: foliis elliptico-oblongis obtusiusculis subtus pa-
rum pubentibus glaucescentibusrpic, pnniculis co»
rjmboso-confertis terrainulihus, calicilms cxLurne
scricco-tomeiitosis , fructu pjriformali,

Crescit: in Java culta.

Floret: toto fere amio%

ifomen;

PEX+

PERSEA MACROPMYLLA, Bl.

P: foliis obovato-oblongis aciliusculis rigidis sub his fejTugineo-tomentosis, paniculis axillibus laxiflovis, calicibus ceteris fusco-tomentosis, fructu oblongo. (arbor Yalida.)

Creicit: in sylvis monium Salak, Gede, etc*

Floret: Jauua; iō — iMarlio.

Nomen: Kilalis.

VarmU Cun&ct-fa: foliis cunctato - oLlongis acuminoiis subtns liisco tomcentosis. (forte species!)

Crescit: in sylvis montium -Saribu.

IHnret: Fobi uario•

Nomen: Kulta^Ias Bida^.

CINNAMOMUM, Burm.

Ploves herrnnpbrocitu *Calyx* 6-rarins S-g-partitus. *Stamina* fētiiia 9-12, dupli ordine disposita , quorum 5-i interiora brsi biglotidnlosa, cum filamniis sterilibus alienantia. *Antherae* 4-loclatae. *Stigma* oJuusuni. *Fructus* baccatus, calice eupuliformi deniato siifultii^.

Arbores vcl friitices foliis suboppositis , coriaceis integrimis, cestipulatis, nc:>vos:s; pedueulis axillrilmis et terinalibus paniculatis aut racemosis.

CI&NAMOHUM ZEYLANICUM, Garc.

C: foliis oppositis ovatis 1. ov:>to-oblon^is ol>tusimscul^is trinerviis, nervis supra ba&iu bubcoaiitis la*

teralious supra knsiti bifid is 'aplceia versus' era-nesrcntibus, petiolis ramulisque glabris, caul* arboresccntc.

Crescit: colitur in Java insult

Fleret'. Augusto, Septembri.

Nomem Kaju mannis; Kiamis.

VarieL: foliis subcordatis.

CINNAMOMUM CHINENSE, BL

C: foliis alternis cliliptico-oblongis obtuse acuminatis
fisi nttcmiatis triplincrviiis, nervis lateralibus su-
pra medium evanescntibus, petiolis ramulisque
glabris, caule avborescente.

Crescit: e China inlroduclm.

Floret: Roves fruchisque milii Jgnott.

Nomen:

CKVNJMOMUM BURMANNI, tfees ab. Escnt;

C" foliis oppositis intordura. al tern 'is ovato*oblongis
acuminatis basi parum attenuatis iriplinem'is, ner-
vis laternibus supra medium evanescentibus, pe-
tiolis ramulisque ginbris, eaule arbopescente.

Cresc't: in sj'Ivia nioulanis Proviuciaram occiiieii^
taliam Javae.

Flo-el: Uccembri.

*Aome.i: Kiainis..

PINVAMOMVM INERS, XlevK Rvdt.

C: foliis suboppositis oblongo-lanceolatis trinerviis;
Her vis supra basin coalitis lateralibus ad apicem
folii evanescens, petiolis et ramulis juuiori-*
bus glabris, caule fruticoso. (aff. C. Gassiac.)

Crenelt: in fruticelis mon'anis.

Floret: Jmiio, Augiislo, etc.

Women: Nuru mirha

CINNAMOMVM CASSI/t, Necs ab EsenK

C: foliis oppositis interdiim alternis oblongo-lanceo-
latis triplinerviis, nervis ad apicem folii evanes-
centibus, petiolis et ramulis junioribus scriceo-
to mo n to sis, caule arborescens.

Cresclt: ox China introductum»

Floret i . « •

Jfomcn: - • •

CIXNAMOMUM JAJ?ANTC17?>1, BJ.

C: foliis suboppositis majusculis elliptico-oblongis
acuminatis basi acutis trinerviis, nervis supra ba-
sin subcoalitis ad apicem folii cum nervo medio
confluentibus supra nit id is subtus transverse re-
ticulatis petiolis ramulis fuscis tomentosis, caule ar-^T
boreo. (a T. G. Malabatbro.)

Erasclt: in sylvis inontajiis Javac.

Floret: Julio, etc.

Nomen: Kitcja*

CINNAMOMUM SINTOC, Bl.

C: foliis oppositis oblongis v. ovato-oblongis obtuse acuminatis ha¹³¹ purtim atl*<:ii*natis triplinerviis, nervis lateralibns ad basin iiitei^p*<*tiini biOrfis ajnc'e mⁱ versus evanescen^{tib} iiset [gt;tlu]is r\$mulii cpt glabris ¹fo(londiboj sericeo-pabescctitib as), panculis laxis iuiOu-toii.ciiLosis, cuidc i.rljoicu. ^u^{ii>0}E -Q

J,e.l.)

Crencit: \n^usylvis pHmaevia Java?,

Sindac
j\o/ueu; SilltOCj

CINNAMO i/rw CULILAWA V, Bl.

C: foliis oppositis oblongo-Janceolntia v. cfliptico-pblongis at'iimiuitlis l>nsi itcutis tripliierviis, ncrvif lateralibus ad «pJr?m folit evanescen^{tib}ms, petio-ⁱis at raimtlis jiuioribos ^labris, caule arboreo.

Creacit'. in sylvis anterioribus.

y larei: . . .

tyomsn; Kulic - la¹van.

€I NNAMOMUM CAMPHORJTUM, ri.

C: foliis oppostis alternii^{se maiusculis} elliptico-oblongis longite;• acumliia^s 1asi atteimn^{tis} triner-^{^i1**} iiei'vifi subtus valdc prominentib^{'is} sapra i>.i-sin subconlitj³ apieem vetis «•. ranew•<'Mti!>uiJ, ne - uolis ramulisque glabris, c^wlc ari)ovco.

Crescit: in sylvis mouUnU Proviuciarutu occidentalism Javue.

Floret: • • • :

Nomen: • . • •

OCOTEA, Aubl.

1^olores bevmapbroditi, paniculati, mi'li. *Callx* 6* partitas, deciduus. *Stamina* frctitia 9, dupli seric disposita, ? intiora bast biglaiidiosa, cam stci'ilib us glandulaeformibiis al ternauteia. *Anlhherae* 4-locularcs. *Slignia* obtusiusculum. *Bacva* calico culpilorini integro persistence cine la,

OCOTEA EXCELS A, Bl.

O: foliis lanceolatis utrinf|ie acuuiLiatis glabris sub-tus glaucis, panicidis folio iinterdum longioribus axillaribus, calicibus scricco-pubescentibus, filamentis spathidatis. (arbor G0-00 pcd.)

Cresail: in caciuninc rnuntis Liu'anfirari^ Proviuciae ICrawau^ ac in sylvis mouUain Salai et Gcdc.

Floret: Au^ualo.

Nomen: KilaUiei.

OCOTEA DECLIXATA, Bl.

O: foliis lanceolatis ulrimjue acuminatis glabris sub-tis glaucis , paniculis terminalibus axillaribusve folio aeczialibus, cnlicis laciniis suLciliatis gla* lis, lumentis subspathulatis.

Cres-

Cresclt: in sylvis montis Salak, etc.

Floret: Dccembri.

Nomeh: Hum- Leu-ur.

Synnn.: Laurus declinata mihi, vid. Cat. Hort. BoU
Buitenzorgii pag. 66.

OCOTEA UMDELLIFLORA, Bl.

O: foliis venosis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis glabris lucidis, paniculis axillaibus terminalibusque subtomentosis, pedicellis umbellatis, filamentis ovatis, cnuie arboreo. (an potius Litsaeae species ob inflorescentiam ante anthesiu forte involucratam? arbor Go-oO ped, 5 fructus liondum vidi.)

Cresclt 1 in caTcarets Javae*

Floret-. April! — Julio*

Nomen:



LAURINAE DUBIAE.

LAURUS PSEUDO-SASSAFRAS, · BL

L: foliis venosis elliptico-v. ovato-oblongis acumminatis basi iinterdum inaequidi-rotundatis glabris, caule arboreo. (arbor valida, ligno **odoris** aromatici instax L* Sassafras.)

Cresclt

*Crescitrm sn^lis Pnm̄cianxm Bnifenzorg ot
Tjanjor.*

Floret: (lores nee fructus iuventi stnt.

Women: Hum Mentek.


LAURUS RfMOSA, Bl.

L: foliis venosis lanceolato-oblongis acutis basi an-
gustatis gkbris subtus glaucis, geounis. obtusis.
fusco-sericuis, caule arboreo, ramuiis* riinosls.
(arbor 40-50 pod. an species Liceae?)

Cresct: circa ortimi iluvii Tjiburrum in monta-
nis Gede.

Floret: . , . .

Nomen:



CASSYTA, Linn.

Plores liermaplioditi. *Callx limbo* 6-fiJo, la-
Cinls exterioribiis nanis. *Stamina* fertilia 9, cluplici
ordinc disposita, 3 interiova busi b̄giandulosa cum
sterilibus jglandulacibnnibus alternantia. *Antherae*
2-lociJares. *Stigma* obtusum. *Fructus* tectus calicis
tubo aucto, baccata, apice pcrvio, laciuiiscpc CO*
jonatus.

CASSTTA FILIFORMISj Linn,

C: caule filiformi glubro, spicis iudmisis pubes-
centibus.

Credit: in fnilrcietis circa Batavaam,

Floret: Au^nsto, eTc.

Notnen; dauwu tali,

MY-

J I T R I S T I C E A E ,

MYRISTICA, Linn.

Flores diocci, rarius polygami (in M. moscliata). Calix corollinus coloratus, urceolatus aut tubulosus, trifidus. Masculi? Filamenta in columnam arcte connate. Antherae 3 aut plures, exstrosurri adnatae, longitudinaliter debiscentes. Fecundini: *Calix* deciduus. *Ovarium* liberum, oviilo creto. *Stigma* subsessile, sublobatum. *Capsula* corticata, bivalvis, ziuclco a rill a to monospermo.*

MYRISTIGA MO SCHAT A, Thuub.

M: foliis oblongis acuminatis; basi acutis subsimpliciter-venosis. glabris, fructu solitario glabro.

Crescit: ex Mohiccis introducta et in Java null a.

Floret: tolo anno.

Nomeu: poliu Palk.

MYRISTICA INERS, Bi.

M: foliis oblongo-lanceolatis apice obtusiusculis glabris, venis siniplicibus, fructibus solitariis geminis, ferrugineo-leprosis. (aybor 120 ped. et Ultra.)

Crescit: in ay 1 via xanlinm Seribu.

Floret: . . Moztio frngftt.

Nomen | Lalka.

(5 , 6)

Varie U: foliis angustioribus et rigidioribus, floribus
fcmineis 4-6 breyiter pedicellatis subracxnis.

Crescit: in sylvis Salak.

Floret: Junio.

✓ *MYRISTICA GLAUCA*, Bl.

M: foliis oblqngis acutis basi parum attenuntis in-*
terdam rotuudatls glabris infra glaucis et veuis
tenuiter reticulatis, fructibus fasciculatis axillari-
bus et ramulis foliisque junio rib us rufo-leprosis,
(arbor 50 ped.)

Cr&cit: in sylvis Javae occidentals.

Floret: Septembri — Decembri.

Notnen: Klappa Ijun lied jo.

✓ *MYRISTICA GLABRA*, Herb. Rwdt.

M: foliis elliptico-oblongis utrincjue acutis glabri\$
simpliciter parallelo-venosis, floribus paniculatis,
(arbor 20-50-pedal.)

Cres^Jh montanis Javae.

Floret: Decembri; Apriii, Ma jo,

Nomen: KlappaJjoui.

z m Jaya MYRISTICA JAVA NIC A. Bl.

M: foljis oblongis rccurvato-acuminatis basi subro-*
tundalis undulatis glabris, vcnis sub trans versali-
bus infra tenuiter reticulatis, floribus paniculatis.
(arbor 40 pcd.)

Gres-

(5/7)

Crescii: in sylvis montanis Javae.

Floret: Junio, etc.

Nomen: Klappa tjonn.

MYRISTICA SPADICEA, Bl.

Mi foliis majusculis elliptico-oblongis acutis Tel acuminatis basi parum attenuatis glabris simpliciter parallelo-venosis subtus spadiceo-lepidotis, fluribas subumbellutis.

Crescit: in hoitis cnlta.

Floret: Angusto.

Nomen. • . . «

✓ MY RI STIC A IIOnSFIELDTA,m

J/; foliis elliptico-oblongis acuininatis basi rotunda* tis parallelo-venosis subtus ststillato-pubeutibus, spicis paniculatis interrupte-glomerulatis fcrrugineo-tomentosis. (Synon. *Horsfieldia odor a la*; Willd.)

Crescit: in hortis colitur.

Floret: Febrnai'io , etc.

Notnen; Tjampakka ZeyTan.

laureola **MYRISTICA TOMENTOSA, Thunb.**

bk M: foliis ellipticO'oblougis a cumin a tis basi obtusis v. rotundatis, venis shnpllicibus subtus glaucis et stcllato-toinentosis, ramulis fructibusquc subsolitariis rufo-tomentosis. (frutex i5-20 pcd.)

Crescit: in calcaieis Javae et Nusae Kmübangac In*
6i\lai'iun.

Floret: Julio •--> Novcmbri*

Nomtn: Sapie.



BIJDRAGEN

TOT DK

F L O R A

VAN

NEDERUNDSCH INDJ&J



BIJDRAGEN
TOT DE
FLORA
VAN
NEDERLANDSCH INDIË,
UITGEGEVEN
DOOR
C. L. BLUME, M. D.,

COMMJSARJS VOOU DEN BUKGEKLJJKEN
GENEESKUKCICEN DIENST, DJRECTEUR
VAN 's LANDS PLANTENTUIN TE
UUL'JENZORG, ENZ.

+2cle Stuk.

B A T A r I A,
3"ER LANDS DRUKKERIJ,
1825.

UIJDAGEN

TOT DE

F L O R A -



SYNOPSIS CIE BE SCIRIJVING

Tan eenige planten, belioornde tot jU^familie der *Euphorbiac'e'cny* op eene, in de jaren 182!)—i3'ii
gcdaue reis over Java, waargenooken en beschreven.



SECT. I. PIIYLLANTHEAE.

Flores monoeci aut dioeci[^] fasciculati, aut glo-
xncrati, aut subsolitarii, rarius racemosi > axillarci.
Calix 4-6-partitus. Petala nulli, rarius 5-5* SLa-
mina 5, rarius 2 aut plura; filamentis mine liber is,
nunc omnino aut par dm coalitis. Ovarium. 2-12-
loculare, loculis 2-ovulatis. Fruetus rarius carno-
sus, saepissime capsularis, 2-12-coccus, coccis 1-2-
spermis.

PIERApDIA, Roib.

Flores monoeci aut dioeci. *Calix* profunde 4-5[^]
partitus. *Corolla* nulla. Masculi: *Stamina* 5-8_f
brevia;* *antkerae* didymae* Rudimentum stigmatis
in centre Flores feminei: *Ovarium* 3-loculic
loculis 2-ovulatisj *stigmata* 3, sessilia, subbiloba,

Jacca

Bacca corticata, 5-Iocularis , loculis 1-2-spermis.
Scmina arillo succoso tunica la. Albumen viscoso-carnosum. Embrjo in versus,

. ***PIE RANDIA RACEMOSA.***

Arbor foliis alternis oblongis rcpando-crenulatis fcasi bistii J[^]ceis, stipulis niiutis deciduis* Raceiui pcnduli, 11 o^rib us di'o[^]fcis.

Crescit: in cultis Javae.

Floret: Anguslo elc.

\omen; Mcnliug.

ADENOCREPIS, Bl.

Flores diocci. *Calix* profimdc 4-partitns. *Corolla* nulla. Mas: *Stamina* 6, erecta, sub pisiilli Tuditimento cjathilormi iuserta, glandulis interposita; *antherae* didymae, intvorsac. Fein: *Gvarium* siib-globosum, 2-loculare, loculis 2-o\ulatis. *Stigma* obtusum, hirsutum, fessile. *Fructus*

Geuus *Thccacori* et *Pierandiae* prodmum.

ADENOCREPIS* *JAVASICA.

Arbor 4o ped. alt., foliis alternis oblongis obsolete crenulalis glabris bistipulaceis, stipiflis mil utis deciduis. Flores in racemis axillaribus laic* yalibusve brcriter pedicellati subitrni.

Cres-

(580)

Cre&cit: in sylvis moulosis Parang Provinciae Tjanjort

Floret: Juiio etc.

Nomen: . . .

FLUGGEA, Willd.

*Flores dioeci. CW/x profundc 5-partitus. Masc.:
Stamina 5, inserta sub rudimento pistilli bis 2-3-
Edo; filamentis cum glanduHs akernantibus; a/z-
therae didjmae, extrorsum adnatae. Fern.: Ova*
rium disco membranaceo insidens, 2-5-locularc,
loculis'2-ovulatis. Stylus subnullus; sligmata 2-3
rcflcxa, ernarginata vel bifida. Fructus capsularis,
aut subbaccatus. Semina 2 in quolibet loculo,
quorum uuum quando^ue cffoctum.*

FLUGGEA SilCROCARPJy Bl.

•Fvfoliis obovato-eHipticis glabris, rarois tetragouis.
(affi. F. Leucopjro, Willd.)

*Crescit: in fruticetw tftontosis**

Floret: oinui lempore.

Nomen: . . .

FLUGGEA JAVANICA, Bl.

i⁷.- ram oils in spinam desinentibus, foliis altcrnis
.t ovali~oblongis acuininatis obsolete remote^serrii-
.lttis, fioribus axillaribus subsolitariis.

*Crcscit: in montosis Parang**

Floret-. Junio — Augusto.

Nomen: < • • #

(*SBi*)

ACTEPIILA, BL

Floras monoeci. *Calix* profunde 6-partitus; labiciis biserialibus* *Pelala* 6, alterua, calicc breviora, circa discum emarginatum in masculis staninifcrum inserta. Masc.: *Stamina* 6, subulataj antberarum loculi subrotundi, extorsi. Piudirnenta pis till 9 rum 5 in ceutro. Fein.: *Ovarium* 3-lo^ culare, loculis 2-ovulatis. *Style* 3, breves, divaricati, semibifidi. *Fructus* capsularis, 3-coccus, coccis i-2-sperniis.

Genus a Savxa dis tine turn numero partium et anteriorum positions*

Frutex 15 ped. alt. Folia alterna, 2-stipuiacea^ elliptico - oblonga , integrerrima , coriacca, glabra , venosa. Flores glomerulali axillares , glomerulis pluribracteolalis; masculi subsessiles; feminci longilicet pedunculati.

Cresoit: ad littort insular Nusat Kaiwangae*

Floret: Octobri, etc»

Noinen: Sikaltang.

LEIOCARPUS, BL

Flores dioeci. I\lasculi Fern.: *Calix* parvus, 4-5-rarius-6-dentatus , persis-lens. *Ovarium* 3-loculare, loculis 2-ovulatis. *Stigmata* 5, fovea ovarii immersa et subcoaliu pcr^ sistentia. *Fructus* capsularis , ppice foveatus, cprti»

calix,

entus, intus 5-coccus, coccis chartaceis. *S*mina* 3 in quolibet loculo, quorum uuum quandoquc effoe-tum.

Arborcs scu fruticcs, foliis alternis integerrimis venosis, spicis confertis axillaribus.

LEIOCARPVS FRUTICOSUS, Bl.

L: foliis oblongis acuminatis basi acutis in venis sub* tus rainulis pectiolisque puberulis, caule fruticoso, fruetibus globosis.

Crescit: in fruticetis inontosis pvope Tjiradjas Pro-vinciae Krawang) ad pedein Salak, etc.

Floret: Julio , etc.

Nomen: Sassa benar; Sassa lumbut.

LEIOCARPVS ARBOREUS, Bl.

JL: foliis majusculis ovali - oblongis obtusiusculis ba-si acutis coriaceis glabris, caule arboreo* (ar-* bor 60 ped.)

Crescit: in sylvis montanis Salak et Seribu,

Floret: Februario ; Octobri.

Nomen: Kisampi; Palangontan; Huru paseng.

SCEPASMA, Bl.

Flores monoeci. Masc.: *Calix* 4-partitus; laci-niis biserialibus, conniventibus, 2 exterioribus la-* tioribus. *Glandulae* 4 alternac. *Filamentum* uuum , Ci'assuua, subclavatumj *antherae* 2, divaricatae, lo-

culis

euHs distinct!* mriYtnvo til a memo ntnnqiu* *adnatis*,
in !ou;;um dehis.-uiuiljiis. Fein.: *CaUx* /i-pttrtitus,
pcrsistt-ns. *Ovarium* disco ^lunduloso circiuni, 5-
3-luculare, loculis 2-oMuatts. *Stigma* .5-8,]>re-
\i», sessilia, ftftbemar^iuatt. *jFructua capsularisi*
globoso">depreuos, suJcatus, 5-*8-locularis. *Sctnitta*
2 in qaoibet luculu, quorum mmm ([u;itidu<[uc
effbetum.

Genus bine *Kpislylio* Sw. iiide *AnUomcnae* Ji_{iss.}
afTioe.

*Frute*X rrtmostw. Folia in ram til is fasciculati.s sub-
pinnatim disposiuu, alterna, sltpuLicca, **iuUsgeiruna**,
iuaequeUntera, glatnM. **Plorei** »xilU|rei, hrncteolati ,
peduucaJati« innsruli subgumiuaii, ieniiuci solilarii,
ocrasu ioliorum (lit;tsi raccniosi.

8CEPASM4 BUXIFOLTJ, Bl.

Crewit: in li-nticelia monUnis Saiak, **Gedo**, etc.

Florat: toto aiiiio.

Nomen: Tjunligi; Kipayong*

GLOCffWfOV, Forst.

Fiorcs monocl. *Cads*: 6-pt>riitus, lacinils J)?sr-
rtaliba*. *iitandtita** mil lac. Mas: *Stamina* 5-6,
filamentis infra conliLis; *anlJiftrU* sul> aptee ndna-
liH. **Pertit** *SiyitiH* siihnullns, ^{flul} st^li to iiumn
connnti. *Sthnnala* 5^*6 rariis i2, lirevia, *irecta*
Tel C^{aniv} outia, *Qvariutn* 3-6-rnri'i", i--iocul;mt

locu-

loculig 2->ovulatvs. *Fruc/us* capsuinris, oorticatns* ov.no-^lobosus aut globoso-depressus, iutus 5-6-rarius 12* coccus, coccis cbartaccis, 2-spcrinis. *Scmina* fenestrata.

Cynoon a dc Jusslcu dcsriptum forsani *|i|i|us* generis.

SECT. I. FnucTiBrs 6-I2-COCCTS.

GZ.OCUIMOV jtnaORUSICEliS. Bl.

C- folii fi elliptico-ohlonuift miicroiuintifl corinceis h% cidis ad costaiu suStus pu bun til MIS , fritrtiVms su!>< globosis ramulisrjue piiuaufuruiibus subtuincutosis, caule avborco.

Crescti: in mnntosis Provinciarupi Cujteazorg ft Tjunjor*

Floret: Aprili, elc.

I'romen; Ma ire me,

GLOCJIfDIOy MjiCROCARPUMi M.

¶: foliis elliptico-falcati^ acuminatis inacqiulateribus coriaciis ramisquc pinnaeforinibns glabris, fructi** *hiis* subglobosis glabris, caulc arborco.

Crescil: in «y I vis Cede udorigueui *Havii* Tjiburrum.

floret: Decembri, etc.

NomM: Marciuc Owewch.

GLoc/unroy JUCIDRM, Bl.

¶: fuliis ovnli-oblongis utrincipie acutis inacqnniiln-ttribus lucidi.s ramulis^ue pinnaefuruiibus at fruc* tibus

tibus subglobosis glabris, caule arborco. (aff. G. macrocarpo.)

Crescll: in sylvis allioribus montis Salak.

Floret: Auguslo fmctilic^{it}.

Nomen:

GLOCHIDION OBSCURVM, Bl.

G: foliis ovalibus obtusis vel obtusiuscalis inaequaliteribus subtus pubesceulibus, ramulis pirnnaeformibus fructibusque ovato-globosis torocntosis^ caule arborco.

Cresclb: in fruLiclis monlosis.

Floret: tolo anno.

Nomen: Ki - Lout.

Synon: Phjllantlius obscurus, Roxb,

GLOCHIDION LUTtiSCENS, Bl.

G: foliis elliptico-oblongis mucronulato-acuminalis coriaccis et ramulis fructuhiisq*ui*c subglobosis glabris, caule fruticoso.

Crescll: in montosis Nangnong ad nioulem Salu,fc.

Floret: Junio , etc.

Nomen:

GLOCHIDION LITTOKALE, Bl.

(7: foliis subrotuudo-ovalibus coriaccis ramulisque glabris, fniictibus globoso-depressis 12-loculari-Lus, cnule fruticoso. . .

Crescit: ad liltova prope Pamanukan Proviuclae Krawang.

Floret: Auguslo, etc,

Noinen: Katumba.

SECT. 2. FRUCTIBUS 5-COCCIS.

GLOCIIDION RUDRUM, Bl.

0: follis ovato-v. clliptico - oblongis obtuse acuminate basi rotundutis glabris lucid is, fructibus gioboso-depressis raminiscipic innaeformibus tetragonis, subtomentosis caule fruticoso.

Crescit: in fnilicelis Provinciac Buitenzorg.

floret: toto anno.

Noihen: Kinmka.

rariet. a: foliis basi acutis, raxnulis glabriusculis.

Crescit: in fruticelis prope Sadj rain Provinciae Bautam.

rarict* l| foliis basi aciuiusculis, ramulis puberulis.

Crescit; in montosis Seribu cl Mp[^].Liiictidiip; Proviuciae Cuitenzojg.

GLOCmniON MOLLE, Bl.

(1: foliis ovatis 1. ovato<<oblongis mucronntis basi subcordatis obliquis utrinque ramulisque pinnaeformibus molliter tomcentosis, fructibus de-pvesso-globosis tomciitosU, caule arborcescente.

Cree-

CresciC: in argitfosis Javae.

Floret: omni tern pore.

JVomen: Plillak.

Variat fpliormn longitadiuc et latitiul'nc.

GLOCHIDrOX GLAUCim, BL

Q: foliis oblongfs acutiuscilliis inaPijualilat^bus ga%
bris sul>tus gbucis, ramulis pi'.uaeformibus pu-
}csceutibus, fruclibus ovuto-oMontis subtomento-
tosis, csule arboreo.

Crescit: ia sylvis niontiuin Parang.

Floret : Juuiq, etc.

Nomen: Kipareh.

5JECT. 3. .MJEGASTYLIS*

,Styli in stipltcni lougam connatu

GLOCiiDfov vnLrc<txrv, BK

C: foliis oviili-oblong is t-icntis inacqualilnteribus co<<
riaccis subtus tcnuiter tomentosis, ramulis fruc-
lib usque fasciculatis fulvo-tonicntosis , caule ar-
borescentc. (capsula 6-cocca, ovato-globosa ,
sulcata, stjlo pcrsisteutc rostrata.)

Creacit: in Molucca.

Floral. Augusto , etc.

Nomen:

CLO-

GLOCHWIOXOPSTS, HL.

Flo res inonocci. Rlasc.: *Calix* 6-partitus, Fa-
Cniis biserialibus. *Filament a* .1, coalita. *Anther at*
5, sub apice extrorsuni adnatae. Fein.: *Caltx* ♂*
rarius 2-partitus. *Slyti* 3, subulati; *Ovarium* 3-
locularc, locuiis '2 - ovulatis. *FrucLus* capsularis,
~~ā-coccus~~, coccis 3-speroiis.

Genus 'Glocliidioiu' \i\ dlversum.

CLOCIIDIOSOPSIS SERICEA.

G; foliis oblongo-ovalibus obtusis bnsi subcordatis
subtus serictis, ramulis pinnaeforniibus i fructi-
busque tomentosis, caule arborcscente.

Crescit: in f uticetis mniitaiis Provincia'um occi-
denlaliiui Juvae iiisulac.

Floret: to to anno.

Komen:

jtSISOSEMA, Juss.

Florcs monocci. Masc: *Ca'ix* 5-partitus. *Glan**
tliciae 5 alternae. *Stamina* 5, filameutis crassis f
quorum 2*5 media longiora plane inter se coaliu,
5-2 lateralia sublibera; *antherarum* loculi utrinque
filamciitoruin apici adnati. Fern.: *Calix* 4-6-par-
tit us, (rlatalulae to tide m alleruae. *Stigmata* 6-io
~~brevia, secilia;~~ omriutn 6-io-locularc, loculis 2-

~~ovula-~~

ovulatis. *Pructus capsularis*, globosò-depressus, unibilicatiis, 6-io-sulcus. *Semina* in quolibet loculo gemina, superposita, angulata, nonnulla saepc abortiva. (Character ex a. Jussieu.)

ANISONEMA DUBIA, BL

A: foliis ovalibus apicc ob tiisiusculis subtus ramulisq; subtomentosls, pcdunculis femineis petiolo longioribust (Flores masculi nondum vidi[^] in femineis calix 5-i-par tit us; ovarium globosum, 6*loculare, loculis 2-ovulatis; stigmata 6 sessilia, brevissima.)

Cresclt: in fmciicetis prope Tangerang.

Floret: Februario.

Nomtii: • • • •

CICCA, Linn*

Flores Dionoeci, dioecive. *Calix* 4-partitus; la** ciniis biserialibus, intus cum glandulis approximatis alternautibus. Masc.: *Stamina* 2-4, filamentis liberis[^] autberis extrorsis. Foem.: *Styli* 4-5 reflexi, bilidi; ovarium 4-5-locularc, loculis 2-ovulatis. *Fructus* bacciformis, intus 4-5-coccus, coccis i-2-spermis.

CICCA NODFFLORA, Lam.

C: foliis ovato-oblongis inflmis floralibusque subrotundatis, floribus glomerulatis, caule arborcscentc.

*Cres**

Cresclt: loc is cull is.

Floret: \ o to an 110 •

Women: Tjimmai.

EMBLICJ, Gacvtn.

Flares monocci. *Calix* profundc 6 - partilns.
Masc.: *Filamsiila* coalita in unuin, supcrius 3-
 antlierifcrum 5 *anthcrls* cxtrorsis, filamento sub apic
 adnatis. . *GlancJulae* 6 aut nullac. **Fem.c** *SlyII* f>
 diclioiomij rellcxī. *Ovarium* tubo membranaceo
 cinctum, aut disco carioso impositum, 5-locularc?
 loculis 2-OYulatis. *Fruclus* drupaeformis, carnosus,
 iutiis 5-coccus, coccis 2-spermis.

EMRLICA OFFICISfALIS, Gacrtn.

Arbor, foliis alternis stipulaccis liucaribus mucro-
 nulatis pinuatim dispositis, floribus fasciculatis axil*
 laribus casu foliorum interrupte glomerulato-spica-
 tis, ovario tubulate

Crescil: in frulicetis Javae.

Floret: Martio — Angus to.

Nomen: Boa Malacca.

MELANTHESA, Bl.

PliyIlaiillii P^ Linn.

Flores monocci. **Masc:** *Calix* turbinatus, corla-
 ccus , dentibus 6 biscriplibus subclausus. *Stamina* 3 ,
 .nckisa, in columuam cacte coalit; *anlherao* ad-

natae,

ttatne, extrorsne, glandula cominuni tterminalac. Fern*: *Catix brcvis, urceolatus, 6-lobus, (cglandulosiis.). Stigmata 5 b re via, sessilia, interdum semibitida. Ovarium 3-locularc, loculis 2-ovulatis. Fntctus su?>baccatus, intus 5-coccus, coccis chartaccis, 2-spermis.*

SECT, I* STIGM\TA ACUTA.

MELAWTHESA RHAMNOIDES, Bl.

M: foliis ovnibus apicc rotundntis basi acutis gla-
bris, pedunculis axillaribus, inferioribus geminis
inasculis, superioribus solitariis fcmineis pctioio
subaequalibus, fructibus calicc abbi'cviato ciactis.

Crescit: in fniticetis.

Floret: omni lempow.

Jfomen: Tjtljirciiau.

UELANTHESA RCTBttA , BL

M: foliis ovato-elliptiols obtusis glabris, pedunculis,
axillaribus, inferioribus subtcrnis raasculis, super-
ioribus sjlitariis femincis, fructibus culice am-
pliato cinctis.

Crescit: in fruticetis montanii.

Floret: toto anno.

Nome/I- Kipaveli Kiljiel; Mar (Jav.)-

ME-

MELANTHESA RACEMOSA, BL.

M: foliis^ovato-ellipticis glahris floribus masculis inferioribus sub racemosis, femincis superioribus solitariis subsessilibus, fructibus calice abbreviate* cinctis.

Creicit: in fniticetis hnmidis prope Parong Pro* viuiac Btiitenzorg.

Floret: toto anno.

Nomen: • . • •

MELAST11ESA VIUCrATAy BL.

M: foliis ovato-oblongis obtusis glabris, pccVunculis axillaribus, inferioribus geminis masculis, superioribus solitariis femincis pctiolo cluplo longioribus, fruciibus calice urceolari ciuctis. (aff; i\L rhamnoidi.)

Crescit: iu fniticetis ad pedem iqontis Burangraig»

Floret: omni iempore.

|bmen: Katuk»

SECT. 2. STIGMATA SEMIBIFIPA.

MELANTHESA CHrNENSIS, BL

At: foliis ovato-clliptiois margine recurvis glabris, floribus subfascicuiatis axillaribus.

Crescit 1 in horto botanico Rogorieusi cult a «t forie e China inlroducta.

Floret: toto anno.

"•*Nvmen:* • • . .

***PHYLLAVTHUS*, Linn.**

Flores monocci, rarius cliocci. *Calix* 5^6-partitus, biserialis. Masc.: *Siamina* 5, rarius pltira; *filament* a conlita, glandulis nut disco cincta. Fcm. : *Ovariant* glanduh's cinctum, aut disco glanduloso vel membranaceo impositum, 5-loculare, loculis u-ovulaiis. *Slyti* 5, subbifidi, interdum counati. JPVMCIus capsularis, 3-coccus; coccis 2-valvibus, 2-spermis.

***PHYLLANTHUS ANCEPS*, Vahl.**

V: foliis lincari-laiiceolalis utrinque obtusis mucronulaiis glabris, floribus axillaribus, femincis longiter pedunculatis solitariis, masculis breviter pendunculatis subgeminatis, ramulis amiculatis, caule fruticoso.

Crescit: in argillosis Iinmidis ci'Ca fataviam, Bantam, Picm^icji, etc.

Floret: to to anno.

Itfomen: • • • •

Variat foliorum magnitudine; in umbrosis folia, inveniuntur fere duplo majoria.

***PHYLLANTHVS NIRVRI*, Lin.**

P: foliis ovalibus glabris paucimatis dispositis, pendunculis aillaiil)us, inferioribus solitariis feminis, summi subgeminatis masculis, caule fructuoso ramus^uc teretibus.

"Jrescllt in rntlcratis et gra:uinosis lnuniJis..

Floret: omni tempore.

JVomcn :

PHYLLANTHUS QTJA D RANGULARIS, Klein.

P: foliis ovalibus obtusis basi acutiusculis glabris pinnatim dispositis, iloribus axilloribus **soiitariis breviter** pctlunculatis, iniimis **masculis**, sumrais feraineis, **ramulis tetragoWj** caule subhcrbaceo.

Crescit in gtaminosis et incLiHis.

Floret; toto anno.

Notneii: . . . •

PHYLLASTHVS ALATUS, Bl.

Pi foliis **linear*** lanccolatis acutis basi oblicpic ob-lusis ciliolatis **pinna'tim** dispositis, fioribus a^il-laribus **breviter** pcdunculalis, **feminel**s **soiitariis** iniimis, masculis subgeminatis sviprioribus, va-mulis subalatis, caule berbacco.

Crescit: in iucultis **amUrosis**.

Floret: mnni temporc.

Nomen:

AGYNEIA, Linn.

Flores monocci. Masc.: *Callx* 6-Gclus \llcorner intas ves-* titus disco 6-lobo. *Stamina*.5; *filamenta* **coalita** in column am central era apicc 5 -lob am , lobis extus aiitberiferjs. FenAt: *Caiix* profundc 6 - **partitas**.

Ova-

(59)

Ovarium apicc fovcatuui, in fovca 3-stjllum, 6r locnlare, loculis s-ovulalis. *S/y/i* bifidi, divarlcati. *Friclus* capsularis, basi ad apicem 6-valvis (ex Jussicu ab apicc ad basin 6-valvis), 6-locularis ^ loculis 2-spcrJiiis.

stGYNETA BACCTFORMIS, Juss. fiL

A: foliis ovalibus acutis subavcuiis laevibus*

Cresell: in aigiliosis.

Floret: oiiinii tempore.

Nomen:

SAUROPOUS, BL

Flores moiocci. Muse.: *Calix* d'jpresso-orbiculatus, coriaceus, coloratus, ore 6-dentatus. *Glandulae* uullac. *Stamina* 5, in columuam apicc 5-fj-dam counata ; *antherae* lob is rcflexis ad apicem adnatac, extrorsae. Fern.: *Calix* sexpartitus, la* cihiis biseriabibus. *Ovarium* 5-loculare, loculis 2-ovulads. *S/y/tis* sub null us; *sligmala* 5 reflexa, bifida. *Fructuo* (caruosus), capsularis, intus 5-coccus, coccis cbartaccis i-2-spermis, *Semina* coch^ata ? difforrnia, angulo inter no arillo carioso olitecta, albumiue fere destiuita? cotyledonibus inaccjualibus.

Frutices iniercluin scandentes, liabitu *Phyllanthorum*.

SAU-

sAimopvs RHAMNOÏDES.

S: rainis pinnneformibiis scandgntibus, foliis ovuta
v. ovali-oblongis ncmninati basi rotuudatis.

Crescit: in fmitcetis propc IIadja Martala Provin-
"ciae Kruwang ct ad pcilem munlis Salak.

Floret: Jimio — Auguslo, elc.

Nomcn: . . .

8AUROPVVS JLBWASS.

S: ramis pinnncformibus patulis, foliis 6vato-oblou-
gis aciitis l>asi oblusiusculis. (a praeced^nti cti-
am differt rainis baud scanclcnubus, floribus valdc
minorib us.

Cresdl: in moiilanis Provinriarum Bnj!f>nzo:f; , Bau-
liin , Tjanjor elo

Floret', loto anno.

Nomen: . . . ,

nnrEDELTA, wau.

Florcs monocci aut diocci. *Calix* A-fldus. *P<-tafa* 5, mimila, calici inscrta, cjsudein laciuiis al-
terna. IMasc.: *Stamina* 5; *Ji lament a connataiu*
pistilli nborliv stipitem, disco ad ambitum sinuato
calici ndnato iimpos^turn; *antherae* introrsnm in-
ciimbciUcs. Fem.: *Styli* 2 biiidi; *Ovarium* dis-
co iutus submenibranacco sub - 5 - lido involutum,
2-locularc, Icculis u-ovulalis. *Fntctua* bacciformis,
intus 2-coccus, coccis cbartaccis i-2-spermis. *Samma*.
dorso gibba, intus cvcavaUi. *Cotyledones* orbicu-
latae, cocbleatae.

BRIEDELIA TOMENTOSA, Bl.

B: foliis oblongis utrinque acutangulis subtus glau-
cis ramulisque subtomentosis, caule arboreo.

Crescit: in montanis Bantan et Lijenborg.

Floret: Septembri, etc.

Nomen: Kantjere.

BRIEDELIA STIPULARIS, Bl.

B: foliis ovalibus acutis subtus ramulisque tomen-
tosis, floribus subternis axillaribus (dioecis),
caule fruticoso.

Crescit in fruticetis uliginosis circa Bataviam.

Floret: Junio; etc.

Nomen: Katuko Kelang.

Synon.: *Clutia stipularis*, Linn.

BRIEDELIA GLAUCA / . HI.

B: foliis elliptico-oblongis acutis basi rotundatis su-
pra glabris subtus glauco et in venis pubentibus,
floribus glomerulatis axillaribus, caule arbores-
cente.

Crescit: in sylvis ad pedem IQIuntis Salak.

Floret: Augusto, etc.

Nomen: Kawoijang.

CYCLOSTEMON, Bl. *

*Flores dioeci. Calix 4-rarius 5-partitus, laciniis
biserialibus. Petala nulla. Masc.: Stamina plu-
rima; filamenta basi annulo inserta; anthras in-*

tror-

trorsae, oblique. Fem.: *Ovarium* disco urgeo-
lari cinctum, 2-loculare, loculis 2-ovulatis. *Sty-
lus brevissimus.* *Stigmata* 2, lat., emarginata.
Fructus carnosus, forte indehiscent, bilocularis,*
loculis 1-2-spermis.

Arbores foliis **alternis** (stipulis 2 exiguis) sub-
integerrimis vel serratis coriaceis venosifl **bifaciens** inter-
dum obliquis. Flores axillares, fasciculati, bracteo-
inti, semiuei interdum solitarii.

CYCLOSTEMON If /r'/?oy HYLLUM, Bl.

G: foliis oblongis acuminatis basi oblique-acutiusculis
integerrimis • untilisque **gibrifl***

Crescit: in sylvis montis Salak.

Floret: Octobri, etc.

Nomen: Blau - Koudang.

CYCLOSTEMON LONGIFOLIUM, Bl.

P* **fulii oblongis acutis basi oblique-rotundatis mi-**
nutissime distanter serrulatis ramulisque glabris.

Crescit: in sylvis montis Salassie Provinciae Tjanjor.

Floret: Julio, etc.

Nomen: Kisokka; Kiparanga.

CYCLOSTEMON MUCRONATUM, Bl.

G: foliis elliptico-oblongis mucronulatis latis inae-
quali-acutiusculis integerrimis ad cedent subtus
rtiuuiisque **pulcrijs.**

Cres-

Crete'I: in sylvis Saluk.

Floret: Atignsto, *He*,

.*Nomen:* **Harikukun.**

CY.CLOSTEMOX SE&RATUM, Bl.

C: foliis elliptico-oblongis obtusiusculis basi ~~d*bi*~~—
que-rotuudatis serrnlatis subtus ratnu*Jisque* pu-
bcscejiibus.

CrescU: in **Lowong** Solassio **Provinciao Tjanjor.**

Floret: Juiio, etc.

Nomen:

C'YCLOSTEHON CUSPIDjiTUM, Bj.

C: foliiS ovato-ol>longis cuspiflatis basi rotundaiis
I. acatiusculis **integerrimis** glabris, peduticulis. fc-
niineis **mitantibus** solitaiiis. (arbor 4Q-5O ped.)

CrescU: in sylvis munlanis rarang.

Floret: Jooio, etc.

Nomen: Galimipiel.

SECT. II. **CROT6NEAB.**

Flores monocci aut dioeci, fascicnlati ..^racemosi,
panicuiativc, aut saepius spicatl-, axillares^dut teriu-
nales. Calix 2-5-r;triii5 multllidus pnrtitus've, rarissi-
bie nulJus. Pctala wulla, aut 5-10, rariiis coalita.
Stamiua dcliuita aut mdcfiijiia ? lib era, **aut***, **Taxic**

coali-

coalita. Ovarium 2-3-rarius pliiriloculare, loculis 1-ovulatis. Fructus carnosus, drupaccus, aut saepius oapsularis, 2-j-rarissime multi-coccus.

***TRIGOSTEMOX*, Bl.**

Flores monoeci. *Calix* 5-partitus. *Petala* 5, campanulato-conniventia, glandulis 5 interjecta. Masc.: stamina?); (ilamciitls inibrne in unum cownatlsi aijice liber is bifldis ; *anlheraniin* loculis superne divergentibus, extrorsum infra apicem adnatis. Fern.: *Ovarium* 5-loculare, loculis 1-ovulatis. *Slyli* 5, Lifldi. *Fructus* capsularis, o-coccus.

Frutex foliis sparsis in summo ramulorum ternatim-vermicillatis breviter petioplatis oblongis acuminatis basi obtusis scrrulatis subtus puberis, raccims simplicibus axillaribus, floribus 2 - 5- confertis bracteolatls.

***TRISTEMON SERRATUM*, Bl.**

Crescit-: in fruticelis iisulae Nusae Kambangae.

Floret: Novembri, Decembri etc.

Vomeii:

***RYPAROSA*, Bl.**

Florcs. dioeci. *Calix* 5-partijjs. *Petala* 5, iam femincis intus sStamina 5 , circa vestigium pistilli posita ; *Antherae* extrorsum adnatae. Fern.: *Ovarium* glandulis 5 pendicel-

dicellatis cum petaljs alternantibus cine turn, 2- locularc, loculis 1-ovulatis. *Sligmala* 2 lata , sessilia , cinarginata. Fructus corlicatns , CYSUCCUS (forte in-* dcliiscens') , subtomeutosus, punctalus , j-spernius, rariuf 2-locularis 2-jspcrmus. *Embryo* latralis.

I^ruclx foliis alternis c^stiptilaccis, oblongo-lanceolatis acumiuatis iutc^erriuiis vcuosis supra glabris sublus glaucis ct tcnuitcr strigosis, spicis simplici-
hus axillaribus solitariis« floribus brevitcr pedicollatris
i-bracteatis.

RYPAROSA CARSIA.

Crescit: in montosis Sallak.

Floret: Septembri, elc. •

Nomc'n: . • • •

CROTON, Linn.

Florcs monocci aut dioeci. Masc: *Calix* 5-parlitus. *Petala* 5. *Glandulae* 5, petalis alternne, *Sta-virnet* 10-20, rarius plura; //amenta longa, in prae- iloratione inflexa, postea erectn, i%eccptaculo nudo. aut villoso inscrtn; *anthrae* Rpici filnmentorum ad- natae, introrsac. Pern.: *Calix* /J-p.irtitus, persistens. *Feiala* nulla. *Qvarium* annulo glanduloso , glandu- lis aut appondictilis 5 cinclum, j-loculare, loculiS 1-ovulatis. *Siy.itvcsf* bifidi aut multipartiti. *Fructus* capsulaS, o-coccus, cocuis 2-valvibus,

CRO-

(C02)

CROTON AHiiYRATUU, BI.

C: foliis ovato-oblongis basi s.ubcordatis 2-glaflduio-sis , marline suhdcnliculato-crosis supra .glabris subtus argentco-nitentibus, slipulis subulatis, raccmis elpngatis tcrmiiialibus.

Crescil: in sylvis niontiuni ca^Tca"Corrm Proviucia- rum occidentalirihi Jayae.

Floret: Seplcmbri -^ Decembii.

Nom&n: Kii-endang.

f^arielas foliis ovatis acutis subintegemimis.*

Crescit: ad montem Pavang Provinciae Tjaujor.

CROTOX TI2LWM* Linn.

C: foliis ovato-oblongis acumin.ih̄s scrriil-'t̄is glabris bnsi biglandulosis, petiois lolio brevioribus, racie mis terYninalibus slmplicibus.

Crescit: in horlis fieciens.

Floret: önni tempofC.

Notneni Katnalakkian.

CROTON TI?TLTOTDES, BI.

C: foliis oblongis acumiuatis bnsi acutis subintcger-rinäs glabris, raccmie simpliribus terminalibus ? fruclibus globoso -tetragonis depresso-s.

Crescit: in S3]vis nioutaiiis.

Floret: Novembri, etc.

Nomen: Kamahikkua Guiung,

CRO-

CROTON LAEFIFOLIVM; Bl.

C: foliis ovali-oblōngis acutis v. acuminatis basl glan»
dulis 2 substipitatis cxigue distanter scrvulatis gla-
bris, spicis" interruptis axillaribus teruiiiialibusque,
(arbor 40-Jo pcd.)

Crescll: in sylvis Inoulis Enrangrang Pioviucia«
~~Krawang.~~

Floret: Jmilio, Julio, etc.

Nomen:

CROTON DEXTICVLATUM; BL

C: foliis suhrotundo-ovntss acutis inaecfualitcv-den-
tnlis basi subcordniis glandulis 2 pcdicellatis sul-
tus dense stellato-toriientosis, race mis alariims ter-
miiiaibusque, (caulis fruticosus.)

Ctescit: in sylvis Nusae KdmbangaeinsuTae*, in mon-
losis Parang Proyinciae TJanjor.

Floret-. Junjo — Oclobri, etc.

j\^o7iie/i:

BALIOSPERMUM, BL

Flores monocci. *Callx* 5-partitus , praefloratione
convolutivus. Pctala nulla. JMasc: *Stamiña* pluvi-
nia (16-20); *filainenla* in praefloratione ercta, disco
piano ad. ambitum glanduloso imposta, libera; *an-*
jktrarum loculi apici filamentorum aduati. Fcm. :
*Ov*u*ijajn* inferne margue brevi m?mbranaceo cinc-

tum,

turn, loculis 5 unioYulatis. *Stigmata* 5. scssilia, basi cohaerentia. apice latiora et emarginata, nnda. *Frurtitx* 5-coccus, coccis chartaceis, iritu* dehisce.ai—bus. *Scmi/ia* varicgata, superne areo umbilicali carioso instructa.

Genus *Adeliae* mnxime propinquum. An Concreveiba Guianensis Aubl. liijus loci?

***BALIOSPERMUM AXILLARE*, Bl.**

Frutex, foliis alterm's oblongis grosse repando-serratis basi biglfgj(lulosis^amnrginc subtusque pilis spars is strigosis sicut ct rainulis pcdunculis bractfis iloribus-qc. Florcs mascuii subiasoiculati, axillarcs, femineis solitariis intermixti ; pedicelli basi l-bracteolati.

Crescit: in niontosis.

.*Floret:* lolo anno.

Nomen:

***ERYTHROCARPUS*, Bl.**

!iores dioeci. *Calix* 5-6-partitus, biserialis, patens. *Corolla* nulla. *Masc:* *stamina* plurima, exserta , imposita disco convexo , filament is sterilibus squamiformibus intermixta, in praefloratione er^ota; *tontlierarum* loculi ad apicem utriuque adnati. *Jeminci:* *Ovarium* annulo crenulato cinctum, 3-locularc, loculis 1-ovulatis, *Sl'gmata* 3, sessilia, obcordata. *Fructus* capsularis, 5-coccus, coccis 1-spcrmis,

Genus *Gehnio* Roxb. valde propinquum.

Fruti-

Frūtices ramulis ultimis flexuosis, foliis oblongis bāsi exiguae bistipulaceis integerrimis coriaceis glabris, floribus glomerulatis. **Jt aul** spicatis bracteolatis oppositi illi foliis.

BH YTHROCARPUS GLOMERULATUS, Bl.

E: foliis oblongis obtusatis, floribus glomerulatis.

Crescit: in sylvis humilioribus insalarum Java VM «C Nusae Kambang».

Floret: toto anno.

*A*c*ci*s*, i*n*:* «Ganglo».

Kariet.: foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis, cana le arborescente.

Crescit: in sylvis montis Sindak.

Floret: Augusto, etc.

Nomen: Ki - nauk.

L n\ ru tRPI US SPIC ATUS, m.

E: foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis, spicis brevissimis fasciculatis.

Crescit: cum priori.

Floret: Novembri, etc.

Nomen: Panawac be⁴».

COLLIUM, Lumpi.

Flores monoeci. **M.**sc.: *Calix* 5-partitus, reflexus, in piaefloratione convolutivus. *Petala* 5, parva, cum glandulis alternantia. *Stamina* plur., in praec-

Bon-

floratione erecta, receptaculo convexo inserta; *an-*
therae summo filamentorum dilatatorum adnatae, rima
 deliquescentes. Fem.: *Calix* 5-fidus. *Petala* nulla.
Styli 5, simplices, elongati, reflexi. *Ovarium* infra
 glandulis 5 cinctum, 3-localare, loculi 2-ovulatis.
Fructus subbaccatus, 5-coccus. *

CODIAEUM VARIEGATUM, n. unph.

C. foliis lanceolatis obtusis variegatis.

Crescit: in hortis cultum.

Floret: Septembri, etc. *

Nomen: Kaju pouring.

Variet. a. foliis linearibus utrinque obtusissimis ru-
 bro-variegatis.

Variet. b. foliis angustio-linearibus obtusiusculis basi
 obtusis subtas parparascentibus.

Variet. c. foliis elongato-lineari-lanceolatis spicè ob-
 tusiæculis basi angustatis concoloribus; an specie?

* *ROTTLEA*, Roxb.

Flores dioeci. *Calix* 5-5-partitus. *Petala* nulla.
Glandulae nullæ. *Mas:* *Stamina* plurima, in praefloratione erecta; *filamenta* libera, **Mil** basi co-
 lita; *antherarum* loculi spici filamentorum utrinque
~~oblongi~~ ~~lanceolati~~ profundi 2-3-varius-6-parti-
 tus, intus plumosus. *Ovarium* 2-3-varius-4-loca-

Jnr«, loculis l-ovulalis. *Fruclus capsularis*, 2-3-yarius-4-coccus, iuermiš aut mo 1 liter ecbinutus. *Seminina* solitarin, tunicata.

BOTTLER A PAVLCULATA. Juss. fil.

Ji: foliis ovatis acuminatis (junioribus iiUcrdum subsi nuato - dentati-s) basi obtusis et biglandu!osis subtas albido-tomeutosis, spicis panicululis terminalibus, capsulis rariter cibinatis.

Cresclt: in m 011 tan is Pioviiiciarum occidentaliani Javae.

Floret: lolo anno.

N6,neni Tjalla Kaijing; Tja'ik anji.

BOTTLEA INDICA, Willd,

Ji: foliis oppositis ovato-.oblongis basi obtusis v, subcordntis subintegerrirais glabris, racemis axil-laril>us, capsulis midis.

CreteU: in memtauis 13atitam.

Floret: Martio, etc.

Komen: Eiiuig putjang.

BOTTLER A TILTAEFOLIA, BK

Ji: foliis suboppositis subroltnido-ovatis acuminatia subdenticulatis basi int,crdum siibcordatis si>pra glabris subtus ginucis, junioribus et spicis axillaribus terniiialibuscj[ue stellato - pubescentibus , caule arborescente,

Cresc

Crascil: ad liltora hisulamin Nusae Kambangae et Javae.

Floret: Octobi, etc.

Nomen: Tapen.

ROTTLEA OPPOTTFOLTA', Bl.

R: foliis oppositis alter o minorc ova to v. ovali-* oblongis acuminr.tis basi oblusis biglnnclulosis repandis su!>tus et spicis axillaribus pilis stella-> Us puberis, capsulis iucruibus. (arbor. 5o ped* alt.)

Crescti: in inositanis Sa!alc, Parang, etc*

Florvi: Mavlio , etc.

Nomen : Kinieon , Kima?akk/ail.

ROTTLEA DISPAR> Bl.

Il: foliis oppositiſ «Itero dupio mnore oblongis acumiiial's basi obtusis dcr.ticulntis su'mis ct spicis axilla rib as pubescentibas, capsulis mollitc^ cchinatis. (irutex 8 ped.)

Crescit: in ca^careis prope Ku:ipan4

Floret: Jnnio , etc.

Namea:

ROTTLEA VtSCTtiA, Bl.

RT foliis ovntis 1. subrhombco-ovntis acun:inal's sal)-> iiitegerriniis supra viscidjs s<ibtUs racemisquc siib-* simplicibus axillaribus Uvrminalibusque tanieulosis^ capsulis lucriuibus. (irutex i5 pcd.)

Cres~

Crescit: in umbrosis insulae Nusac Kambancac.

Floret: Octobri, etc.

Nomen: Sindukan.

SECT 2.

Flo ITS monoeei. **Antherae introrsum** i.]<uimbcn-
tcs, dorso **glandula** turniinaine. **Ovarium** disco aii-
nulari viiJoso **impositum***

ROTTLEHA MULTIGLAISTDULOSJI, Bl.

M: foliis 5ul>iotumlo-ovatis indivisis aut scniitiulobis
grossa sinuuto-flciilatis l>tsi gland ulosis supra
glabris subtus ct panicula tenniunli fastigiaU **fitel-**
lalo-lomcntosis, **capsulis** inermibus.

Cresett: in monlani.

Floret: toto a:iiio.

Nomeh: Hientja.

ABISCA , Bl.

Omnla Tlolflrrae sed florcs plcrumque Tnonocci
stamina nan -rcceptaculo **iusefta**, **basi** tantiim **coa-**
lit;i; **anth'erarwn** Ioculi **spici** lilamcniornm **grani-**
formi utrinqae adnaii. **Fructus** capsularis, 2-3-
coccus, raollilcr cchinaLus.

Arborcs ,iut frutlccs. Folia nkerim, **longiter** pe-
tiolata^, indivisa, subpcltaU. Florcs in spicis race-
niisvc axillaribus aut tenninalibus sioiplicibus' aut

ramosls, soiltnrii glomerativc, bractcolati. Capsulae
pills ant granulis iluvis obsitae.

Observ. *Ricinua integrifolius*, Willd. forsan hu-
jus generis.

AD ISC A FLOEIBUNDA, Bl.

'/: foiiis peltatis basi biglandulosis subrotundo-oya-
tis acutis v. ohtusis subrepandis supra glabris
ffubtus'glaucis pubentibus, spicis pauiiculatis.

Crsscit: in Piovincia Laiilam prope Sadjvam.

Floret: Januario, elc,

*

Nomen:

ADISCA ACVMTLVATA, Bl.

A: foliir*..peltatis eglandulosis elliptico-oblongis acu-
niinntis remote denticulatis supra glabris in venis
subtus pubcralis, spicis terminalibus latcralibus-
ve solitariis geminisvc simplicibus*

Crescit: insylvis prope Tjiradjas Provinciae Krawang.

Floret: Seplembri.

Nomen:

ADISCA SUB PELT ATA, Bl.

A: foliis subpcltatis eglandulosis elliptico-oblongis
longiter acuminatis subintegerrimis supra glabris
'Venis infra pabescentibns • spicis fernineis pauci-
floris supraaxillaribus. (flores masculi iguoti; ar-
bor 20-JO pcd. alt.)

Cres-

(G i i)

Crescit: in umbrosis nionliuni Provinciac Krawaiig*

Floret-. Angtislo, etc.

Noinen:

ADISCA ZIPPELTI, Bl.

A: foliis longiter petiolatis su'u'OUiriflo-ovatis aou-Iriinn̄ts distr'inler denticulatis suhtus ct spicis pr-nicilntis nxillarihus terminnlilmsque imtautibus dense stcllato-tonientosis, caule iruticoso.

Specicrn lianc pulciicrrim.im elicamus in lionorcum J* A. Ziippelio , qiii in perscrutntione Florae Javanice occidentails omui vi supplicas mihi odtulit, ct fruticeni hai:cçc priuio ad pedem monlis Salak obscravavit. •'

Crescit: in montosis Salak.

Floret: Septcmbri, Octobri.

*Women**. Tjalik aijjin.

ADISCA? ALB WANS, Bl.

A: foliis peltatis eglanclulos^s ex ovnto-ellipticis acil-minatis inacquilitr denticulatis supra laevifms subtus albicantibus tenuissiine Stellalo-tomentosis. (florcs i^uoti.)

Creicit: in sylvis Piovinciae Tjanjor*

Floret:

Nomen:

TRE~

(6 i a)

TREJVIA, Linn.

••"lores diocci. •*Calix* J-J-Gduš v. partitas. *Pelain* luiiln. IMiisc.: *Stamina* plurima (20-30), in praefiorntioie *cvccln* filament a basi subcoalita, receplaculo convexo i user la ; *anlherae* click mae, cxii'brsuiu .irhnntac. Fein.: *Ovarium* 5-aut 4-lo-
cularc , loculis 1-ovulatis. *Stylus* profundc 3-4-
pnrtitns, laciniis lon^is hi fid is, intus plumosis.
l'ruct/is capsuiuris, iiicrmis, 3-4-coccusj *cocci**
1-spc r:mis.

TKEIVIA MACHOPIYLLA, BL

T: foliis brcvitiT pctiolrtis cimcnto-oliloigis acu-
mhiatis sorratis. (arbor 60 pud.)

Credit: in sylvis iiiouluiiD Pavaig Provinciae Tjanjor,

l^'orel: Julio ^ clc.

jSonien : Kit jailing.

CLEwrny, VA.

Flo^'cs monocci. Masc.; *Calix* 5-pariitus, pa-
ten's. *Stamina* nUmcrosa , reccptnculo convexo
iiiSrrta ; *ant/irratum* loculis connxis, introrsum
sub npice adnatis, in lougum (transverse) dcliis-
ceniibus. Fcm.: *Calix* parvus, 5-parlilus, pei^
Histeiis. *Ovarium* did^mum, 2-loculare, loculis 1-
ovulatis. *Stylus* longus, bis bipartitus, persistcus.
Fructus capsularis, 2-coccus.

Genus *Alchornqae* Sw» maximg affine*

A i-

Arbor 30-40 pcdulis, foliis alterbis lo>^ticr petiolatis oblon^is serratis i^labris; ilovcj masculi in spicis a\ill;tribus siinplicibus glomcrulad; feminei ~~solitarü~~, pcdunculo Jcmuiu clavalo ititi~~deutes~~.

CLEIDION JAVANICUM.

Cresc'L: in monLc Eontok Provinciae Tjanjar,

Floret: Julio , etc,

JVofaen: . , . f

CHEILOSA, Bl.

Florcs tlloeci. *Calix* inacqnali-5-partitus, patens, *Petala* nulln. Masc: 'Uamlua 8-10; iilaniehtis exscrtis, Jlbcris; *anlherae* t~~erminales~~. *Jiadhn-*~~n-~~turn sti^inatis ia centre, anmdo brevi glaiululoso inclusum. Fern.: *Ovarium* urceolo iiiferoe cinctum, 5-''loculafe, locnlis l-ovulatis; ovulu caljptrato, pendula. St\Ius prof undo ri-pptiLus, laciniis i'ciliu\is npice hilitlis, persistens. *Fructus* globosus, 6-suicatas, tomentosus, 5-coccus, 5-\alvis. *Semina* sub-baccata.

Genus quandam afUnitatem cum *fioottlcra* osteu-
~~dere~~ -videtur.

Arbor procera, foliis altcrnis Gfinea~~O-oi>!~~ongis~~~~ Tersus apicin distanier serralatis eoriaceis giain~~is~~, racemis axillaribus compositis mnniisegtte pubescntibts.

*CHEI**

(6*4)

CHETLOSA MONTANA.

Crouch: in sylvis occidentalibus Javae insulae.

Floiet: Angus to — Octobri.

<*Nomen:* liuntjet.

CONCEFEIBUM, Rich.

PJores dioeci. Masc.: *Catfx* 2-3-partitas* *Sta** *mina* 3-4, c'xserta; (filamentis basi eonnatis, in prae* fio-ralione crectis; *.antherae* introsae. Fern.: *Caiix* 4-5-fidus. *Ovarium* 3-Joculare, loculis i-ovulatis* ^*tyLi* 3j basi interdum cohaerentes intuscjue plu- mosi. *Fructus* caj^sularis, 3-coccus.

CONCEVEIBVM JAVA SENSE, Bl.

C: foliis sparsis cuneato-oblongis repando - serratis glabris, spicis axillaribus terminalibuscjue ra- mosis.

Crescit: in sylvis montanis Proviiciarum Bantam, Buitenzorg, etc.

Floret: Scptembn, Octobri, etc.

No/nen: Kibe wok; Kissengat.

ERYTROCHILUS, Herb. Rwdt.

Flores dioeci aut monoeci. *Calix* 3-partitus. *Co- rolla* nulla. Masculi: *Stamina* piurima, in disco convexo approximata, squamis intermixta; *anthera** *rum* loculi in apice filamenti distincti, erect!, porig 3 ddiiscentes. Fern.: *l glandulae* 5, scpalis calicinis

per-

persislcntibus alternac. *Ovarium* 5-4-loculare, loculis 1-ovulatis. *Styli* 3-4, reflexi, intus plumosi. *Fructus* capsularis, 1-4-coccus. *Semina* arillo subbaccato tunicata.

Genus a Claoxjalone vix separandum.

- Frueticcs foliis alternis indivisis glanduloso-serratus. Stipulae minimae, deciduae. Flores axillares^ spicati, glomerulati, glomerulis injterruptis bractco* latis.

***ERYTROCHILUS INDICUS*, Heib. Rwdt.**

JS: foliis ovali-oblongis utrinque acutiusculis obtuse exserte serratis subtus pubentibus, spicis dioecis glomerulatis.

Crescit: in montanis Provinciarum Bantam, Buitenzorg, Tjanjor, etc.

Floret: omni tempore.

Nomen: Taling - Kup.

***ERYTROCHILVS MOLLIS*, BL.**

E: foliis lato-oblongis utrinquie acutis obtuse serrulatis supra sericeo-pubescentibus subtus mollissimis, spicis dioecis.

Crescit: in montosis Provinciae Bantam.

Floret: Febraario.

Nomen: . . . ,

ERY-

ERYTROCHILUS MLVOR, & }.

E: foliis oblongis acuminatis basi attenuates acute exserte scrrulatis subtus pubentibus, spicis monoecis glomerulatis. (Ab *E. iidico* differt: foliis minoribus angustioribus• texturac tenuioribus et spicis monoecis.)

Crescit: in montanls Provinciarnni occidenloJium Javae insuiae.

Floret: toto anno.

Nomen: . . . •

ERYTROCIIILUS LONGIFOLIUS, Bl.

E: foliis oblongo - lanceolatis acuminatissimis acute serrulatis in costis subtus puberulis, spicis dioe* cis laxifloris.

Crescit i in sylvis montosis Gede,

Floret: fere per totiun annum.

Nomen: Kile.it,

JANIPHA, Kunthi.

Flores monoeci. *Callx* cnmpañulatus, 5-p^{*}rtitus. *Corolla* nulla. *Masc:* *Stamina* io, libera, margini disci carnosí inserta, alterna breviorn. Flores feminei: *Stylus* brevis; *stigmata* 3, lobata, lobis in massani unicain sinuosam coalitis. *Ovarium* disco carnoso impositum, 3-locularc, loculis 1^{*} ovulatis. *Fructus* capsularis, 5.-coccus, coccis 2-Valyibus.

JANI-

JANTP HA MAN I HOT, Kami.

J: foliis 5-7-partitis (siiinmis interdum 3-partitis) subtus glaucescentibus, laciiiis acumiuatis iute-gerrimis.

Crescit : locis cultis.

Floret: Octobri, etc.

No/nen: Hui — Oaadar.

JATROPHA, Linn.

Flores monoeci, *Calix* 5-partitas aut 5-fidus* *Corolla* 5-partita aut nulla, praefloratione cou-toita. *Glariduiae* aut *squamae* 5, rarius nullae, nunc distinctae. nunc in annulum vel discum si-nuatum coalitae. *Masc.:* *Stamina* 8 - 10, //a* *mentis* infra connalis, quorum interioris interdum longiora; *antherae* erectae. *Fern.:* *Styli* 5, bilo-bi biilde, aut pluries dichotomic *Ovarium* 3*lo-culare , loculis 1 - ovulatis. *Fructus capsularis_f* 3-* *Coccus*.

JATROPHA MULTIFIDA, Linn.

J: ibliis multipartitis glabris, lacinia una alterave su-p^rne incisa (junioribus pinnatifidis), stipulis setaceo-multifldis, floribus corymbosis, calicibus 5-fiflis coloralis.

Credit: ex America iatrodiiicta.

Floret: toto anno*

Women: . . . , 9

SATRQPRA CURCAS, Linn.

J: foliis angulato-5-lobis basi truncato-cordatis integerrimis glabris, floribus corymbosis, calicibus 5-partitis, corolla intus villosa,

Crescit: locis cultis.

Floret: otntii fere tempore.

Women: Jarak - Kosta.

ELAEOCOCCA, Commers.

Flores monoeci aut? dioeci. *Calix* 2-3-partitus, in praefloratione valvatus. *Petala* 5 duplo longiora; praefloratio contorta» *Masc:* *Stamina* 10-12 (9 ex Th.unb.), *filamentis* infra connatis, 5 exterioribus brevioribus; *antheris* introrsis, duabus superioyibus saepe abortivis. *Fern.:* *Stigmata* 3-5, subsessilia, simplicia aut bifida; *ovarium* 3-5-loculare, loculis 1-ovulatis. *Fructus* carnosofibrosus, intus 3-5-coccus (char, ex Joss.).

ELAEOCOCCA CORDATA, Juss. fil.

JE: foliis ovatis acuminatis integerrimis aut 3-cuspidatis basi biglandulosis interdum subcordatis subtus ramulisque leprosis*.

Crescit: in borto botanico Baitea[^]orgii cwlta. et e& Japonia allaU.

Floret: . . • • • •

Nomen: • • • • •

Synoni Dry and/a cordala Thunb,

ALEURITES, Forst.

*Flores inonoeci. Calix tubulosus, 2 - 5 - lid us**
Petala 5, calice parum majora, cum glandulis vel
squamis alternantia. Masc.: Stamina plurima;
Jilamentis brcvibus, connatis in receptaculum co-
nicum columnare; anther is adnatis introrsis. Fcm.:
Ovarium 2 - rarius 5 - loculare, loculis 1 - ovulatis.
Styli 2 rarius 5 profunde 2-partiti. Fruotus car-,
nosus, ex maturitate apice dehiscens, intus 2-coccus,
rarius 3-COCGUS: coccis chartaceis . interius sub
apice hiantibus, 2-valvibus, nucleo 1-spermo.

ALEURITES MOLVCCANA, Willd.

A: foliis ovato-oblongis interdum (plantae junior.)
5-lobis acuminatis undulatis, panicula terminali
divaricata albido-leprosa,

Crescit: locis cultis.

Floret-. Septembii, etc.

No/neni Kamierie.

OSTODES, Bl.

Flores dioeci. Masc: Calix 2-5-fidus^ Petala
5. Stamina plurima, filamentis disco glanduloso
inscrtis; antherarum loculis discretis. Fern.: Ca-
lix 5-sepalu^; sepalis imbricatis, inaequalibus, deci-
duis. Petala 5, calice longiora. Ovarium margihe
crenulato carnoso cinctum, villosum, 3-loculare,
loculis 1-ovulatis. Stylus profunde -3-partitus, la-
ciniis bipartitis tortiosis divaricatis. Fructus 'globo-
sus, 6-sulcaius, iujus tricoccus; coccis osseis, 1-
*spernus**

Ge-

Genus maxime affine *Elaeococcae* Gommers. et Aleuriti, cuius yix separandum.

Arbor foliis alternis ramulorum confertis longiter petiolatis basi biglandulosis glauiduloso-serratis coriaceis glabris in- axillis vcnaruin subtus pubentibus , floribus paniculatis axillaribus.

OSTODES PANICULATE.

Crescit: in sylvis montium Salak, Barangrang et Tjerimai.

Floret: Octob i, etc.

Nomen: Kirendong.

ELATE RIOSPERMUM, «1.

Flores monoeci. Masc.: *Calyx* 4-sepalus, scpalis imbricntis. *L'etala* nulla. *Stamina* 10-15, disco interdum villosa in anbitu glauiduloso inserta, *filamenta* brevia; *antheram* loculi longitudinaliter adnati, introrsi. Fein.: *Calix* 4-6-sepalus , imbricatus, deciduus. *Ovariurn* annulo Tilloso setigero cinctum, 5-loculare, loculis 1-ovulatis. *Stigmata* 3, subsessilia, emarginata. *I'nidus* drupaceus, subglobosus, 5-4-sulcatus, 5-coccus. *Semina* solitaria, Bubpulposo- arillata.

Genus habitu ciam affine *Hyaenanchi* Lamb.

Arbores foliis sparsis versus apicem ramulorum sacpc«subverticillalis longiter petiolatis integerrimis

basi biglandulosis coriaceis glabris venosis et tenuiter reticulatis, floribus corymbosis Tel racemosis? axillaribus.

ELATERIOSPERMUM TAPOS, BL

E: foliis sparsis oblongis acuminatis transverse venosis , floribus corymbosis. (arbor^|60-80 ped.)

Crjescitx in sylvis montosis Provinciarum occidentium Javae insulae.

Floret: Octobri, etc.

Nomem Tapos, Tappos.

ELATERIOSPERMUM TOKBRAI, BL

E: foliis subverticillatis oblongis obtuse acuminatis subparallello-venosis, fructibus racemosis. (arbor. 60-30 ped, alt.; flores nondum vidi, sed sti'cula fructus eadem ac praecedentis.)

Cresc'U. in sylvis montis Salak.

*Floret i . . . Octobii — Decerabri fruget**

Noinen: Tokbrai; Tokpray.

SPATHIOSTEMON, BL

⌚ Flores dioeci. Masc: *Calix* 3-partitus, patens. *Petala* nulla. *Filamenta* plurima, verticillatim ramosa, inferne in columnam connata; antfaeris didymis. Feminei: *Calix* 5-partitus. *Ovarium* 5-loculare, loculis 1-ovulatis. *Styli* 5, longi, intus plurimosi. *JtVuctu** capsularig, 3-coccus_> muricaU[^]

Genus *Adeline* tft *Roillerae* aliquid accedens, oh
6 true I it ram pccuiinu'iu staminum tauicn **diversum.**

SPATHIOSTEMOtf JAFBNSE.'

Fnitcx 5-8 pedalisj foliis alteruis ellipticis acuminata **integcri'imis glabriuscufis**, spicis axillaribus lateris: **ralil>usve** solitariis gcmiuisve **piibeiis**, Horibns J> k>rai **tecola** tis, femincis pedicellatis, **mascolis** scssilibus.

CrascU: in sylvis **naonUum** Parang, Proviiiae **Tjan-jor** et prope Tjiradjas ia**Proyiucia Kwt-wa ug.**

Floret-. Junio, etc.

Nomm: Kibeu'ok.

HWINDS, Linn,

Fiovcs monoeci. *Calix* 5-parUtus, pracfloratione :alvatiis, **lacinia** uoa alterave **biportita**. *Petala* nulia. *Masc.*: *ft lament a* plurima, multifariam **ramosaj an-therarum loculi distinctly** sub apice lilamcntorum utrinque adncxi. *Tcm.*: *stylus brevis*, profunde 5-parti laciiniis lonsis plumosis. *Ovariurn* j-lo-culuve, locidis i-ovu!atis. *Fructus* capsularis, mol-liter ccliinatus. nut **ioeiliois, 5-coecos.**

RICINV\$ j,OMfUNIS, Linn.

R: foliis **peltatis** palmstis, lobis semilanccolati's serratis, cauJe **berbaceo** capsulisque ecbinatis pruinosis.

Ovsc^r'freqtientissiine ia Java cultiis.

Floret - iuto anno.

Nomen: Jerak Selassar.

RI-

***RICINUS AFRICANVS?* Mill.**

H: foliis peltatis palmatis, lobis senilanceolatis dentato-serratis, caule arborescente laeve, capsulis echinatis lucidis.

Crescit: in liortis.

Floret: omnitem pore,

Nornen: Je-ak KalikkL

***BICINVS RUGOSUS?* Mill.**

/Z; foliis peltatis palmatis, lobis semilanceolatis serratis, caule arborescente laevi, capsulis inermibus subrugosis.

Crescit: in eultis.

Floret: toto anno.

Nomem Jerak Kalappa.

***RICINUS SPECTAVILIS,* Bl.**

iJ; foliis peltatis digita to-palmatis, laciniis semllauceolatis elongatis inciso-dentatis, caule arborescente lacvi, capsulis echinatis,

Crescit: in montanis.

Floret: per lotum annum.

JVomeii: Jerak sclassie lacivitk:^{**}.

***MAPPA,* A. Juss.**

Florcs monoeci dioecive. Masc: *Calix* 2-3-par-litns. *Stamina* 2-12; *Jilamrnta* libera aut basi coa-Jita; *antherarum* IQCUI cruciatim bisulci, in longum

debis-

deliiscenles. Focm.: *Calix* irregulariter 3-3-fidus. *Slyli* 2-5 rarius 4, oblongi, rectlexi, iuuus plumosi, basi saepe coaliti 5 ovarii loculi tot (juot stjli, 1-ovulati. *Capmla* 2-0-cocca, echinis raris longis annata (rarius 4-cocca), aut inenijs. *Semina* tuuica subcariJosa arillala.

***MAPPA TANA RIV SI* Juss. fil.**

M: foliis peltatis ovato-oblongis acuminatis subrepans mis glabris subtus ramulisque glaucis, spicis dioecis rainosis longiter pedunculatis, caule avboreo.
(arbor 30 ped. altitudine.)

Creicit: ill montanis.

Floret: fere per totmn anniuni.

Nomen: • • • •

***MAPPA TOMENTOSA*, Bl.**

M: foliis peltatis ovatis acuminatis subrepandis subtus tomcutosis, spicis dioecis lous'itcr pedunculatis glabris, caule arborescente.

CreAcit' in sylvis liumilioribus.

Floret: fere loto anno.

Nomen: Pohon - mara.

***MAPPA 11 ISP ID A*, BL**

M: foliis subpeltatis ovato - cordatis acuminatissimis versus apicem denticulatis mollibus, petiolis ramulistrene obverse liispidib, racenxis aiillaribus simplicibus.

Crcs*

Crescit: in Moluccis.

Floret: Angus to , etc.

JNb/nen:

SECT. 2.

Bractoea in masculis et feminineis nrmltiflorae. O-varhnn 2-loculave, loculis 1 - ovulatis. *Syli* 2-stylusve unicus 2-partitus, intus plumosi. *Capsidd* incrinis, 2-cocca, granulr̄s resinosis conspersa.

MAPPA DENTICULATA, Bl.

M: foliis plottatis snbrhoimbeo-ovatis " acuminntis repaiulo-deiiUculalis supra glabris infra glaucis in reticulatione venarum fulvo-tonientosis, spicis paniculatis axillaribus,

Crescit: in sylvis mon'dtiui S^luk et Gdō.

Floret: Seplcmbi'i, etc.

Jumen:

Variety: foliis xnajoribus integrriuis.

Crescill: ad ortiun JInvii TjibiHTum in monlosis Godc.

Floret: Junio , etc.

MAPPA JAFANICA, BL

M: foliis ovato-oblongis aciininatis integrerrimis sn-pra glalr̄s subtus punctalis in reticulatione vcnariūm tenuiter fulvo-tomcntosis, spicis paniculatis axillaribus.

Cres-

(G26)

Crescit: ad pedem montium Gede et Salak, etc.

Floret: Scptembri, Octobri, etc.

Nomen:

PACHYSTEMON, Bl.

*Flores dioeci. Masc.: Caix tubulosus, 5-dcu**
tatus. Petala' null a. Stamen unum, liberum,
jlamentum non exsertum, crassum; anthem ter-
mina]is, poro dcisccns. Fern.: Calix urcojalus,
subiutegcrrimus. Ovarium globosum, 5 - 6 - sulca-
-tuin, 5 - 6 - loçuiare, loculis l-ovulatis. Sfygma
suhulnta 5-6, usque ad medium, coalita. Fructus
carnosus , globosus, sulcatus, 5 - 6- locularis, 5- 6 -
Vaivis.

Genus *Hippomani* pvoximum ;* babitu *Mappae.*

Arbor foliis a]termis longissime pctiolatis peltatis
trilobis glauduloso - dcnticulatis nervosis. Stipulae
geminatae, mugiae, decidune. Flores spicati (spi-
cis axilhiribus ramosis) , Lracteati. Bracteae in fe-
jnineis l-florae, in masculis niultiflorae.

PACHYSTEMON TRILOBVM, · Bl.

Crescit: in iriontanis.

Floret: Septembri, etc.

Nwnen: Mai ፩ a) Marra bQuruoi) Marrum buiTum.

OMA-

OMALANTHUS, A. Juss.

Flores monoeci. *Calix* liiscpalos, sc;»nlis reni-
ionibus, in masculis sibi accumbeiilibus, in fcmi-
jieis cad acts* *Xatc.*: *Slamina* cii'citer 10, du-
pljpi scrie disposita, *fitamefilia* brevibus, basi
subcoalhis; *nnlherar* extrorsam adoatae. Fern.:
Ovar'uun 2-locuJarc, **localls** i-ov»Uti. *Stylus*
br<ⁱvis, sliamatibus 2 longis » i;itus glandulosls,
Biai^{nit}; e\lus rc(lc\Is." *l'i'<oocclus* capstalarisj bivla-
lis. *Sajlna* solitan;i, arillata.

OMALAXTH US LECHENATJLTZd-
NUS_y Jtiss. iiJ. •

O: foliis rbumbco-ovvius, jimioribiis lato-ov.'itis basi
truncatis, raccmis simplicibus UTiuiliaibus.

Crestyi: in **mootosia** >raecipuc argilloin's.

*flore*t**: to to *fere* anno,

Nomen: Karnnihi.

Variet':: foliis majus acuminatis purpurascnubiis.

reach: in montosis Gedc elc. .

Flaret; omui tejnpure.

ACALfPHA, Linn.

Flutes mouoeci aut dioeci. **ftfasc***: *Calix* 4-ra-
rius-5-partitos. *Stamina* 8-16, iianiaa .0-6 ; y/Za-
mentis iufcL-ae incrassatis **fet connatis**; *antheraruffi*
Ioxulx utnnque iilamcnis sub .apice appensi, oblou-
gi, flexuosi \. recii. Fcm.: *Calis*; 5-purtitas. *Ova-*

rium

rium H-Ioculare, loculis i-ovulatis. *S'tyH* .1, setaceo-5-ant nulliidi. *Fractus* capsularis, 5-coccus.

ACALYMPHA INDICA, Linn.

Ai spicis a\llai'jliu9 superne masculis infernc feminis, involucris reniformibus dcutkulatis glabriisculis," foliis ovatis aciitis hasi subcuaeatis, caule hcrbacco.

Crest-it: circa Eataviam.

Floret: toto asino.

Nomen: Satronie.

ACALYMPHA HISPID A, Willd.

A: spiels yxillaribus supcrne masculis iufcrne feminis, involucris subrotuudo-cordalis acute dentalatis striyosis, foliis ovnlis acutis serratis basi rotundatis, eauie hcrbaceo lineis duabus obverse strigosis.

Crescit: ad vias et in raderatk Pt'o^nciarum occidentalium Javae insulac.

Floret: toto anno.

Nameu: Djukal Sarronio.

ACALYMPHA DENSTFLORA, Bl.

A: foliis ovatis acumiuatis basi attenuatis obtuse serratis subtus puberis, spicis dioecis axillaribus densifloris pcudulis, caule fruticoso. (Rumpb. Hort. Amb. -i. t. 56.)

Cres-

Crescit: in hortis frequens.

Floret: toto anno.

No incn: tali aujing.

ACALYMPHA CATURVS, BL.

A: foliis subrolnndo-ovatis .basi subcordatis crenulaiis in venis snbtus pubenibus, spicis dioccis interduin monoccis axillaribus pendulis, floribus fcniiicis solitariis masculis iiterrupte glomerulatis* (in floribus masculis calix cst 4-partitus; stamina 5-6, basi connata; antherarum loculi sub apice appensi, ovales, recti. *Calurus* ergo, ut *Ci. si. Jussicu* in tentamine Euphorbiacearum pag. 45 recic monet, *Acalyphae* adjuugndus cst.

Synon: *Caturus spicffiorus*, Linn.

Crescit: in frnticctis Javae iasfliae.

Floret: Oclibri, etc.

f f b m e n : . . .

TJiAGIA, Plum.

Floves monocci. Masc. : *Calix tripartitus. Stamina* 2.-'1, (filamentis brevibus. Fern.: *Calix* 6-rarius-5-8-partitus, persisieris. *Stylus* 5-iidus. *Fructus* capsularis? bispidus, 5 - coccus, coccis sub;lobosis, 2 - yalvibus, 1 -spcrmis; *semi nib us* coufor-mibiLS.

TRA-

(630)

TPAGFA HIRSVTÀ, Bl.

TVfoliis cordato-ovalibus acuminatis denticulatis niv
suds, calicibus feniineis sexpartitis iidivisis, cau
lc scandente.

Crexcit: in calcareis prope Kuripan.

Floret: Junio, clc.

Norneji: • , • .

CNESMOSA, Bl.

Flores monoeci. *Masc.:* *Callx urccolatus*, 5*-
fid us. *Stamina* 3 ; *filamenlis brevibus* ; *anfheris*
infra apicem adnatis, *cuspide filamentorum inflcxo*
terminatis, *introrsis*. *Fem.:* *Calix* 5 - *scpalus*, per
sistens. *Stigmata* 5 , sessilia , carnosa, iutus verru
cosa, inferne coalita, persistentia. *Fructus cap*
sularis, hispidus, 3 - coccus , coccis subglobosis, 2*
valvibus, i- spermis; scminibus conformibus.

Genus a *Traqia* diversum calice in femincis 5*
scpalo , stigmatibus sessilibus carnosis intus verruco-*
sis ut etiam habitu.

CNESMOSA JAVANICA_y Bl.

Herb a sufruticosa , hispidula , scandens. Folia al*¹
tern a , basi stipulacea , ovato-oblonga , basi exciso
cordnta , inaequnlitcr dentata. Spicac oppositifoliae,
solitariae, inferne nudae ; feminei inferiorcs, pauci;
mas culi plures; omncs 3-bractcati, sub sessile s, Plau-*
ta valde stimulans (nnde normm),

Cre-

Crescit: in fruticetis montanfo

floret: omni tempore.

tfbm\$n: Pulug aroy.

EXCAECARIA, Linn.

Flores taonoeci dioecive. Masc.: (ex Jusi,) *Filament am* basi simplex, mox tripartium, ibique instructuin squama sessili, simplici, interdum glandulosa; singulae filamenti Iaciniae squamula propria tinica aut duplii stipatae, nunc simplices 1-antheriferae, nunc 2-3-fidae 2-5-antheriferae. Fern.: *Calix parvus*, 3-fidus (interdum nullus ex Juss.) *Stylus profunde 5-partitus*, laciniis reflexis. *Ovarium* subpedicellatum, 3-loculare, loculis 1-ovulatis* *fructus capsularis*, 3-coccus.

EXCAECARIA AGALLOCHA, Linn.

J5: spicis dioecis, foliis ellipticis oblongis obtusiusculis distanter obtuse serrulatis.

*Crescit: in mangiinis Javae australi***

*floret: Septembri, etc**

Nomem Ka'ppal.

SECT. III. EUPHOKBIEAE,

Plores monoeci, in involucris foliaceis aut caliciformibus axillaribus aut terminalibus congesti. Calli in masculis 3 - 5 - in femineis 5 • la - partitus

fidus*.

fidusve, aut millus. Stamina polyandra aut solitari** Ovarium 3 - local are , lociilis 1 - ovulatis. Ff uctuf capsularis , aut sub earn osus, 3 coccus.

DALECHAMPIA, Plum.

Jiores monoeci, in involucro a - plijlo basi ap* ppiidiculis 4 stipulacformibus. Masc. in involucre proprio 3-5 pliylo uonbellati; umbellulae tionnullae •terilcs, mucilaginc rcsinoso obductae.. Singulis crt* *Ihx* 4 - 5 - partitus ; *stamina* uumerosa, filamentfe in stipitem infra connatis. Fejn.: involucrura pro- J)riuin siibsesfrtlc, s-pliyllum , 3-flortini; his *catix* 5 - 12 -partitus, laciuiis integris dentatis aut ciliatis. *Stylus* filiformis; *stigma* capitato-pel ta turn aut in* fundibuliforme. *Ovarium* 3-locularc, loculis' l- ovulatis* *Fructus* calice persist^ute ciuctu5, cap* Solaris, 5 - cocevts.

DALECHAMPIA BIDETJTA, Bl

I): foliis profundc trilobis basi biappendiculatis, lo-f bis serrulatis lateralibus ovata - oblongis media pblongo-lanccolatOp iuvolucris trilobis jeticulato* xiervosis.

Creicit: in sylvis montis Salak.

Floret: Novembri.

Nonun: Aroy- Kakapassang. •

EUPHORBIA, tinm

Flo'i'es masculi plures , squamis intermixtis , circat uuicum femineum florcm (^wgesU in involucro com-

&uni 4 - 5 -fitlo. Flores masculi pedicellati, paleis V. squamulis intermixti; filameirtum unicum, cum pcdicello articulatim; *anthera* didyma , apici insidens. Fqminci pedicellati, basi nudi, v. caliculo ins trued; styli 3 bifidi, interdum basi connati. *I^l* met us capsuluris , 3 coccus, coccis 1 - spevmis.

EUPHORBIA NEREJFOLIA, Linn.

E: aciileata seminuda , aculcis gcniiinatis , angulis oblique tuberculatis supernc foliosis, foliis spatulatis.

Crescit: circa Bataviam et aliis locis litorolibus Javae.

Floret: Septembri, etc.

Nomen: Susura.

EUPHORBIA ANTIQUORUM, Linn,

E: aculeata subnuda triangularis articulata , ramis pa-teutibus et erectis*

Crjsvti: locis marilimis et ad segetes circa Bataviauj fj-cquens.

Floret: Septembri, etc#

Afomen: , • • .

EUPHORBIA TIRUCALLI, Linn.

E: inermis seminuda fruticosa tereti-erecta, ramis patulis confertis.

Cresc'U: in paludosis circa Batayiam; Bantam, etc.

Floret: Octobri, etc.

Nomen: Tifcal - ballang.

(654)

EUPHORBIA LAEFIGATA, Vahl.

E: frutscens ramosa, foliis oppositis ovalibus avc^{*} niis integerrimis glabris.

Crescit: ad littora.

Floret: omui tempore,

Nomen:

EUPHORBIA CONGENERA, BL

E: caule suffruticoso, ramis alternis dichotomis, foliis oppositis oblongis acutiusculis basi oblique serrulatis 5-nerviis serrulatis infra ramulisque puberulis, umbellis sub-bifidis axillaribus terminalibusque. (accedit ad E. hypericifoliam et E. glaucophyllum.)

Crescit: in?Provincia Bantam.

Floret: forte per tqtum annum*

Notan: • , . •

EUPHORBIA RENIFORMIS, BL

E: foliis oppositis ovatis obtusis basi subcordatis obliquis serrulatis caulinibusque procumbentibus dichotomis villosis, cymis dichotomis axillaribus. (aff. E. pubeutissimae.)

Crescit: circa Batayiam*

•*Floret:* toto anno*

Nomen: • t • §

EU-

EUPHORBIA PUBERA, KL

E: caule tiubsimplici herbaceo, foliis oppositis brc* vissime petiolatis linear-lanceolatis serrulatis pu* bescientibus, cymis dichotomis axil la rib us.

Crescit: circa Bataviam in graniuosis.

Floret-, toto anno.

Nomen: • • . •

EVPHORBIA PILVLIFBRA | Linn.

E: caule erecto snbdichotomo , foliis oppositis brevi* ter petiolatis ovali-oblongis sen-ulatf^ obliquis utrin[«]* que pube adpressis , .capitulis didjmU pediueu* latis axilloribus.

Cjescit: in ruderatis et graminosii.

Floret: omnitempore.

Nomen: Nanan - Kaart,

yarietas a.: caule subslmplici supex^mne dense pilo-> so capitulis subsessilibus.

Crescit: in calcareis Kiuipan,

Varietas h: foliis pictis,

EUPHORBIA SERRULATA, Herb. Rwdt.

E: n̄erbacea_f foliis oppositis linearibus serralatis glabris , umbellis sub-3-fidis axillaribus.

Crescit: in insula Timor i CU Reinwardl detecta.

Floret: forte omni tcraporer

Nomeni . t , ,

EU-

EUPHORBIA TUYMIFOLU, Linn.

JE: caule prostrato dichotoma, foliis serrulatis oppositi ovalibus basi dimidiato-cordatis 3-nerviis, capitulis confer tis axillaribus caulib usque pubescen-
tibus.

Synon. *E. rubicunda* mihi in *Enumerat. plantar;*
Liort. Bogoriens. pag. ^5»

Cresclt: ad marines viarum oirca Bataviam, Bui-
teazorg, etc.

Floret: toto anno.

Nomen: Mumauiran,





BIJDRAGEN

TOT DE

F L O R A

VAN

NEDEFLLANDSCI₁ INDIK.



BIJDRAGEN
TOT DE
FLORA
VAN *Red p. & N.*
Indië
pet. filij
v62.
NEPERLANDSCU INDIE
U1TGKGEVEN " "
DOOR
€ L. BLUME, M. D.,

COMUJSSARIS VOOR DEN BURGERLIJKEN
GENEESKLNDJGEN DIENST, DIRECTEUR
VAN 's LANDS PL\NTENTU1N TE
BUriENZOiiG^ ENZ.

13de Stuk.


BA T A V I A,
TER LANDS DRUKKKP. |J..

±825.

.1) IJ U K A G K N

T O T I) E


F L O R A .



SYNOPTI & CHE BESCHRDVING
van eenige planten, bekoorende tol de fainihe der
Elaeag, *Combretace'n*, " *Sattta!ace»n*" , _*Thy**
mete»n, *Proteac^n*, *Caprifoiie'*n*, *LoranVie»n*
Ehenace'�, *Sly race *n* ? *Sapole^n* y *Jasmine* n* ,
Myrsine'o'n, *S^tanace'^n* , *Convoirutace'^n* , *Cam**
panulace'� en *Labeliacp'*n^* op eene, in rfe jaivit
lo2!>—.I3J4 gedane reis over Java, waargenonieu «n
bcschreven.



E L A E A G N E A E .



ELAEAZXVS, Tourn.

CaZAA? corollinus superus. campanulatus, subangu-
Luus, dcciduus; limbo patente 4-fido. *Stamina* 4^
*filametu*s brevissimis, inter lacinias calicis iusertis.
Ovarium 1-ovulatuin. *Stylus* crassus, *stigmate*
obtusiusculo. *Drupa* bacCata, *mice* rugosa 1-spcr-
ma. *Embryo*, erectus.

ELJEJGSTUS LATTFOLJA, Linn.

E: inermis; foliis ovato-v. cliplico'ohlonps obli^
slusculis basi rotundalis supra nitidis sublus ar-

ccn-

genteis, pedunculis coiffertis axillaribus uniflor&r
(folia saepe inveniuntur fusco-maculata.).

Qrescit: prope Bataviam in fmiicctis «ICCV

floret: oiiiui tern pore.

Nomen: Dudiirciian.

Wariel. foliis oblongis -obtusiusculfs basi a cups-

Cresch : ci'ca Euitenzorg.vulgatissiina.

Floret: omvii lompare.

ELJEAGNVS RIG ID A, Bl.

E: inermis, foliis oblongb-ianceolat'S utrinque acutis rigidis supra punctatis sub tus argenteis fusco-Icpidotis, pedunculis axillaribus subternis umbellatis (aff. *E. augustifoliae.*)»

CrescU^in cacumine montis Burangrang*

Floret-. Jmijo, Augnsto, etc.

Nomen: • • • • .

ELAEAGNVS JAJTASICA., BL

E: caule sciaiidcnre, ramis subspinosis, foliis ovalioblotigis obtusiusculis basi rotundatis supra niti \ll dis subtus spadiceo-argenteis, pedunculis subeminatis axillaribus subumbellato-inultifloris, iructu olivaeformi.

Cresqit: iti sylvis montanis Salak.

Floret: Jumjo, Ju'io, eic.

Nomen: Aroy \$u\$u munding.

Variet, foliis lae acutiusculis subtus arg^nteis.

Cresci: cum praecedenti.

Floret: • • • • ; Septembri frngot.

ELAEAZNVS CRISP A, ThuoB.

i?.- inermis, foliis elliplico -ublongis obtusis bnsi acu-
tiusculis cjiispato-uudulalls supra punclutis sub-
tus argeuteis.

Crescit: ex Japonia intmclucta.

Floret-

EZAEAGNU\$ GLABRA, Thunb.

L: inermis, foliis ova\$o-oblongis acuminatis snbtus nrgentcis et fusco - punctatis, floribus axillaribus subsolitariis.

Crescit: ex Japonia introducta.

Floret-

R LAEAQNUS PUtfGETfS, Tbuiit.

L: raimilis spincscentibus, foliis elliptico-oblongis obtusiusculis basi inter clam subcovdatis undulatis supra lucidis subtus argenteo-scpianulosis et fusc* co-punctatis.

Cretclt: ex JapoHia et China missa.

Floret: • : • • .

COMBRETACEAE,

***COM/iRETUM*, Loefl.**

Calix superus, deciduus, infundibuliformi-vel urceolari-carapajmlatus, limbo 4-5-fidus. Pefala[^]-5, pnrva, inter lacinias calicis inserta. Stamina 8-10, caiici gcmino ordinc inserta, plevumcjue exserta. jinthrrae iucumbentes. Ovarium 1-loculare, sub-4-5-ovulatuni. *SV#//.9 longus, sllgmate obtusiusculo. t'rticlus 4-5-aptcms, 1-lociilaris, indcliisceivs. Tirnbry* exalbumiiiosus, itiversus.*

C'OMiiRETUM PVSCTAT[^]M, BL

C: scan dens; foliis oppositis elliptico- oblongis acuziinatis utrinquc punctntis, spicis capitdtis panicu!jitis axillaribus ternnnalibusque, floribus octandris, calicibus intus villosis, fructibus oblongis tctj'apteris.

Cruscib: in moiitosis Parang, ef ad pedom moitlima Sa!ak, Tjorimai, eLc.

Floret: Majo — Scptcmbri.

JVonien: Ojot Jahaj Aroy Maugender.

COMDRETUM PURPUREHM, Vahl.

C: scandens; foliis oppositis ovato-oblongis (junioribus subtus purpurascentibus) calicibusquc nudis, spicis simplicibus secundis.

Crescit: ex.lnsula Mfturitii introductum.

Floret: • • . .

Nomem • t • «

COM-

COMBRETVM LATIFOLTUU, Bl.

C: scandens; foliis suboppositis ovalibus utrinquaque alteuuatis glabris, spici^simplicibus ramosisque axillaribus, fioribus octandris, calieibus iutus la*mentosis.

CrescU: in sylvis nioulosis Salak,

Floret: Octobri.

Nomen: Ai-o}' man ding jallos.

COMJiRETUM LUCIDUM, Bl.

C; scindens; foliis oppositis v. ternis oblongis nctu lihiatis v* obtusiusculis lucidis, spicis paniculatis axillaribus terminalibusque, fructibus oblongis 5-rarids 6-apteris, alis rigidis ^conf. c. C^o dcan* dro Roxb.).

Qrescit: in Ihnosis Bin lam ct ctiam prope Pamanu» Jvui Proviu'Jae Kiawang.

Floret: . . . Julio^—• Augusto frugcU

JVomen: Palawan*

QUISQUALIS, Linn,

Calix tubo longissimo, deciduo; limbo quinque^ fido* *Petala* quinque, siimmo calici inserta. *Slamina* Z filamnta dupli seric tubo caudis insposita, alterua brevior, exserta. *Opajriurit* iiifruin, unilocularc, 3-0u?aitim; ovula pendula. *Stylus* exscrtus, infenie inbo cr.iiicis arglutinatus. *Stigma* trifuncato^simplex. *Drnpa* cxsucca, 5-angulai*is mo-

nosperma. *Embryo* exalbuminosus, inversus, cotyledo nib us maximis, carnosis, piano-con vexis.

QUISQUALIS INDICA, Lihn.

Q: foliis ovato-v. clliptico-oblongis acuminatis basi cordatis \cl rotundatis, • spiels axillaribus ct ter-* jninalibus.

Crescid: in fruticetis et ad rivulos vulgatissjma.

Floret: omni tewpor\$.

Nqmen: Udani.

TERMINALTA, Linn.

Florcs polygami, inferne liermapliroditi, superne masculi, in praefloratione incurva. *Ca/ix* superus, patens, quincjuciidus; laciiniis aequalibus, deciduis* *jpclala* nulla. *Stamina* 10, duplii seinē calici inserta; *anlherae* bilocularcs, inlororum incumbelites. *Ovarium* 1-locularc; ovula 2 pendula. *Stylus* 1, disco 5-lobo villosiusculo in feme cinctus; *stigma* simplex, *Drupa* baccata, mice fibrosn, 1-sperma. *ISmbryo* exalbuminosus, inversus; cotyledoncs folia-ceac, spiraliter convolutac.

TERMIXAI+IA CATAPPA, Linn.

T: foliis obovatis basi si^bcordatis obsolete crcnula-^tis glabris'ad costam infra subpubescentibus. (se-cuudu^i Cl. \yilld. folia T. Catnppnc sunt cglan-duiosa , in planta nostra e controrio tnm adlitora qua in in rc&ionibus interioribus Javnc lecta folia infra ad basiu semper biglaudulosa juveniuntur.)

Cres-

tHresclt: per to lam Javam regionibus caltis,

Floret: toto fere anno.

Nomen: Kälappan; Kaiappan laut.

***TE RUIN ALIA MOLVCCANA_i* Lam.**

T.-foliis obovatls basi obtusis (bigiandulosis) integrimis utrincjue glabris. (a 2) *Catappa* etfam diflert floribiis fere duplo-majoribus, disco maximc rilloso ct drupis baud cristatis miuoibus.)

Crescll: locis cultis*

Floret: toto anno.

Koinen: Katappan*

***TEUMINALIA CIIEBULA*, Rctz.**

y.'foliis- obovato-oblongis integrimis (ad mnrginein remote glandulosis) acutis v. obtasivtsculis basi obtusis glabris ad eostam subtus puberulis, Jcliolis sujra bigiandulosis.

Ci'escit: ia montauis,

FlareL: Julio etc.

Noiriem Kalappau.

***BUCIDA*, Linn.**

Callx urceolatus, obsolete 5-dentatus, déciding. *Corolla* nulla; *stamina* 10; filamenta 5 basi ca-wcis inserta, cum longioribus fid incisuras calicis alternantia; *antherde* incuQibentes. *Ovarium* in-fiemm, 2-sporuni5 stylus disCo glanduloso cinctus^ subulatusy stigma simplex. *Drupa* baccata, mice

angiilata , 1* sperma. *lumbryo exalbucūnosiis, in-*
versus.

BUCIDA BUCERAS? Linn.

*B** foliis confer us clinuiformibus margine recuvv^{is}
 glabris nitidis, racemis simplicibus aaillaribus la-
 teralibusve.

Crescit: forsan ex insula Mauri tit introducta.

Floret: per totnm annum.

N o m e u :

CERATOSTACFIYS, Bl,

Ca lix su p e ru s, i n tege r. *Petal a sub - 8 , p ar vn.*
Stamina &- iJ, iaaecpialia. Qua/him 2 - ovulatum.
Stylus bvevis, sti^maLo bifldo. Drupa baccata,
culice corouata , nuce cornprcssa , 1 - sptariaat l£m-
hryo exalbuininosii5 (?), IJaversus.

CEIiATOSTslCHYS AIBOREJ.

C: avbor'procera, foliis spars is oblong is inlegcrvimiis
 glabervimis subtus glaucis, spicis ;t\i{iaribus casu
 iuijurum- Jatiiraiibus solitariis, lloribus dujisc ca-
 nt. itirf ptoccssibus iiliformibus spongiosis iutcr-
 mixtis.

Crescit\ \\\ sy'vis monlanu Salak.

Floret: nlajo, Juaio.

*Non M/I; **

***AGATRISASTHES*, BL**

Flores dioeci, dense capitati. Masculi: *Calix* 5-partitus, laciniis imbricato - conniventibus. *Corolla* milla. *Stamina* sub-1o; *Jilamentis* brevissimi*, disco piano iuscrtis. *Antherae* didymae. *Iudi-mentum* pistilli nullum. Fern.: *Calix* supcrus, brevis, 5-dentatus. *Corolia* nulla. *Stylus* brevis, 2», fidas, discum planum pcrforaus. *Ovariurn* i*ovu^ la turn. *Drupa* baccata, umbilicata, nuclco compresso 1 - spermo* *Embryo* exalbuminosus f inversiis.

Genus Bucidac et Ceratostachjdi intermedium.

AUATUI&ASTUE8 JA PANIC A.

Arbor vasta, ahitudiae 120 pcd., foliis coufertiS oblongis integerrimis coriaceis penninerviis, capitulis lougiier peduuculatis axillaribus latcralibusve solita- viis geniiuisve.

Crescit: in sylvis allioibus Javae ccci&eatalis.

Floret: Aprili.

Nomen: Hiiung.

S A N T A L A C E A E ,

***SANTALVM*, Linn.**

Calix tubo ventricoso, deciduo; limbo quadrisdq. *iilandulae* quatuor, fauci insertac, staminibus alternantes. *Stigma* 3-i-lobum. *Drupa* bacatta, spice marginata.

*SAN**.

SASTALVM MYRTIFOLWM, Linn.

S: foliis laiiceolatis apicc obtusiusculis basi augustatis glabris,

Crescit: iti Insula Timor, etc.

Floret i flores noncūim vidi.

Women; « ,

THEQIUM, Linn.

Calix infundibuliformis v. hypocrateiformis, 4*
5-fidus, eglandulosus, persistens. *Discus* glanclulo-
sns nullus. *Stamina* laciniis calicinis opposita, ex-
trorsum fasciculo villo'i'um instructa. *OvariuTn* i«
ovulatum. *Stylus* I, *stigmate* obtuso. *Drupa*
corticata, coronata.

THESIUM SPATVLATVM, BL

T: foliis spatulatis coriaceis nervosis, floribus sub-
umbellatis axillaribus, caule parasitico (aff. T.
umbellato).

Crescit: ad ortum lluvii Tjiburram supra arbores.

Floret i Julio, etc.

No/nenQ, • • .



Genera Santalaccis affinia, situ staminum et fructifl
supero diversa, *inde* Olacineis foitc adjungenda.

PLATE A, BL

Flo'i'es diocci, Majsculi; *Calix* parvus^ c[quinque*
phy-

pliyllus, imbricatus. *Petala* 5, basi coalita. *SlaP hilna* 5; filamentis levibus, inter petala basi infiertis; *antherae* didymae. Feminei: *Calix* maris. *Petala* nulla. *Ovarium* 1-ovulatum. *Stigma* magnum, sessile, discoïdeum, obtusum, *Drupa* bacata? nuce oblonga, rugis angulata, 1-sperma. *Albumen* carnosum. *timbryo* inversus.

N. Nyssa cui mimis affinis calice infero distincta.

Arbores foliis alternis integris coriaceis juvioribus ramulis et pedunculis axillaribus lepidotis, floribus masculis in spicis ramosis, femineis in racemis simplicibus.

PLAIEA EXCELSA, BK

P: foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integemimis subtus ciliato-virescentibus (arbor 80-100 ped, pit.).

Crescit: in silvis priinaevis monliuum Salak et Cede,

Floret: Jauuario, etc.

Noinem Dadurenan; Mandalaxa.

PLATEA LATIFOLIA, BL

P: foliis ovalibus acuminatis basi parum attenuatis integrimis costatis subtus grisco-lepidotis (arbor 40-60 pcd.).

Crescit: in silvis altioribus montis Salak.

Floret-. Angus to, etc.

Noinen: Hum Kapas.

Variet. foliis denticulatis.

Cresclt: in cacuiniue month Burangrang.

Floret ; Julio, Anguslo.

STEZWHURUS, Bl.

Plores licrmaphro.dili, ex abortu interduni dioeci.
Calix brevis, integerrinms* ant obsolete den tat as •
Petala 5 rarius 6, infeme coalita. *Stamina* 5 ra-*
 riui5 6, hjpogyna; *jilamenla* petalis alterna, com-
 pressa, singula ad apiccm muni La fasciculo villonim;
antherae bilocularcs, introrsac. *Ovarium* oblon-*
 gum, i-loculare, a-ovulatum; OMila pendula. *Stig-*
ma sessile, obtusurn. *Drupa* baccata, uuibilicataf
 nucleo i«spcrmo. *Embryo* in versus, parvus, ad api-^
 ccm albumini immersus.

Arbores seu frntices, foliis al tern is integerrimis^
 floribus parvis axiliaribus spicatis.

SECT. I.

Fi'amenta in praefloratione incurva, demum exscrta^
 patenlia.

STEMONURUS PATJC1FL0RUS, BL


S: fo!iis oblongis aenminatis basi* acutis glabris, pe-*
 duncnKs brevibus apice 2-δ-fidis 2-,1-floris,

Cresclt: in sylvis motiiis Siilak ad orientcm spec»
 tan lib us*

Floret: Novembri, Decembri,

Romen:

STE+



STEMONURVS SEOUNDIFLORUS, BL.

S: foliis oblong is aculis basi angustnis coriaceis gla
bris aveniis, spicis apice 3-4-fidis, floribus se
cundis (arbor 4o ped.).

Creacit: in sylvis montinni* Salak et Gede.

Floret: Decembri.

Nonien: Kiueong.

GTEMONURUS JAVANICUS, BL.

S: foliis oblongis utrinque* acuminatis coriaceis gla
bris vcnosis, cymis solitariis geminisve densi
floris*

Ciescit: in sylvis rnontanis Provinciae Buitenzorg-

Floret: Mario.

No men: Kitonger ret.

Variety foliis. ovalibus utrinque acuniinatis submem*
branaceis glabris, junionbus ad cos tain infra pu
lieris, cjmis dichotoniis solitariis (an species?).

Cres'U: in sylvis insulae Nusae Kauibangcie.

Floret: Novembri., elc*

SECT a. *ANACOLCSA.*

Filamenta in praefloralione erecta, baud exsei-t<.

STEMONURVS FRVTESCEN8, BL.

S: foliis eiiiptico - oblongis obtuse acuminatis basi
sculls veuosis gliioris ad cos tam sublus puberu
Us, peduueulis couTctris uuifloris*

*Cres**

Cr̄exctt: in aȳVis aitipribus monlis **Sallak.**

Floret: Dfrceuib-i, CILC

Nomen:



T I I Y M E L A E A E ,



DAPHNE, Linn.

*Cctlix infuTidibdiforniis** 4-raritis 5-pariiluS, ttiar-
cescens. *tSlamina* tf; rarius 10, inclusa. *Stylus* brc-
Vis. *Stigma* cupitalum. *Drupa* baccata, nuda.

DAPHNE DECAVDRÄ, Bl.

J): foliis a! tern is ovnibus acutluschiis basi oblique^ atlenuatis serrulatis glabris, iloribus glomeratis axiJlaribus, caule «rboresct*iiite,

Crescti: ad pedem mentis Tjerimai*

Floret: AugusLo, elc.

Numen:

DATS, Linn.

Florcs involucmi. *Caiix* corollinus longus, in* fuLtiibulifarmis, decidims^; limbo A-i*ari&s *-lk»o. *Stamina* 10 1. 3, ftmci iiiscta, inaequalia. *Ovarian** 1 -2-ovalatiun. *Stylus* filiformis, ^tiginate capitato', d«presso. *Drripa* baccata, nuclei's 1-2# 2-spermis. *kimbryo* exalbiMrw-Hostis (secnuclam Cl. *Gaenu** in Jk colinljoua «aru<^ui>g if ex CL. &prcn-
gel

gel vix ullns), iuversus; cotyledones masiciaei, plano-convexae,

***DAIS DUBIOSA*, Bl.**

D: 'foliis oppositis' oblongo-lancollatis utrinque acuminatis glabris, capitalis subses^ilibus axiUaiibas terminali basque, floribus .ortnnndris , d nip is 2<< spermis (an a I), oclandra satis distincta?).

Cresv'U: in sylvis montosis insularum Javae ac Nusae Kambangac.

Floret: omni tcinpore.

Nomen; Kakapassau; Godong Lawclu

***ERIOSOLENA*, BL**

Callx corollinus, iufundibuliformis, externe viHosus; limbo quadrifido; lociniis alternis brcvioribus, aestivatione contortis. *Stamina* 8, filamentis brqvisshuinis, dupli seriu calici superne insertis; anther an Hncarcs, quorum 4 semicxscrtae. *Qvariium* tubulo Vfiginatuni, I - ovulatuni." *Stylus* brevis* *Slignia* capitatum. *Drupa* baccata,

***ERIOSOLEXA MONTANA*, Bl.**

E: frutex foliis alternis oblongo - lancollatis subtus glaucis, capitulis bibracteatis lougiter peduncularis axillai*ibus solitariis.

Crpscii: iti syLvis uiouUiis»

Tlorct: ticto anno.

Nomen: Kamandan ulan,

P R O T A C E A E,

*HELIOTOPHYLLVM* Bl.

Plores hermapliroditi. *Oah'x tetraphyllus*, regularis, deciduus, foliolis spiraliter revolutis, apicibus Staminiferis. *Antherae* subsessiles. introrsae, apice mucrone terminatae. *Squamae* hypogynac cjuatuor % distincae* *Ovarium* breviter pedicellatum % biovulatum; ovula lateralia. *Stylus* filiformis, longitudo calicis. *Stigma* chivatum. *Folliv ulus* lignosus, stylo brevi terininatus, pseudo-bivalvis, l-spermatus. *Semen* aptcrum; radioula ktcralis.

Genus *Anadeniae* et *Lamberliae* niamime accedens.

Frutex foliis suboppositis I. 3-4-natim verticillatis brevissime petiolatis oMongis serratis glabris^ racmis axillaribus et lateralibus cylindraceis, pedicellis alternis gemiuatis.

HELIOTOPHYLLUM JAVANICVM, BL

Crescit: in s}rhdz montanis.

Floret: toto anno.

Nomen: Ivandung.



C A P R I F O L I E A E.

CAP RfFOLIUM, Juss.

Calix supcnis , parvus , quinquedcnUtus. *Corola* tubulosa; limbo .quinquelobo, subacquali aut bi-laMato. *Stamina* quinque, exserta. *Stigma* sub-glotosum. *JJacca* trilocularis, polyspcrma.

CAPRIFOLWM JAVANIQUM, BL

C: caule scandente, foliis omnibus distinctis ovato-aut ovali-oblongis acuminatis basi rotundntis cilia tis supra glabris subtus glauco-tomentosis, pedunculis bidoris axillaribus solitariis tenuiavibus subcorjmbosis.

Crest U: in sylvis montis Tjerimai*

Floret: Angusto, etc.

Nvinen:

CAPRIFOLWM LOUR EIRT, BL

C: caule subscandente, foliis omnibus distincls ova-to-oblongis acuminatis basi subcordatis utrinque pilosiusculis, pedunculis bifloris. axillaribus solitariis terminalibus dense capitatis.

Crc&cil: in caciumine montis Gede, Tjerimai^ etc*

Floret: omni tempo^e,

Nomen: Kikdt jainhaiig; Kiseroli,

CAPRIFOLIUM JAPONICVM, Sclmlt.

C: caule subscandeiitc, foliis omnibus distiuctis ova-to - oblongis acutis supra lucidis subtus glauccs-
centi - pubentibus, floribus binis teruiinalibus scs-
silibus.

Cresclt: e Japōnic el Cliina introductum*

Floret: omni lempore.

No men i.

: *MASTIXTA, Bl.*

Flores teti'andri vel pentandri. *Calix* superus,
4^" 5 - cienUitns. *Pttaia* i - o', ovr.ta, basi latiova*
Stamina dentibus culicinis opposita; aiitlerae ili-
trorsae, didymne. *Ovarium** infcrum, ovulo pendu-
lo. *Stylus* brcvis, disco ciiictus; *stigmate* obtuse
Drupa baccuta, umbilicata, nuce rugosa l * sper-«
ma. *Embryo* in albumine inversus.

MASTIKTA PEXTANDRA.m.

M: foliis al tern is oblongis acu:iiinatis glaberrimis,
corjinbo termiuiali, floribus peutaiulris 'v Arbor
50 - 60 ped. alt*)•

Cresclt: in sylvis aitioribos moiitium SaTal; Ba-
raugrang.

Floret: Julio; Decembri.

Nomen: fiuru liliu*

MASTXTA TRICHOTOMY, Bl.

U: foliis oppositis oblongis acuminatis subtus petio-
Us et corymb is tricbotomis terminalibus puberii-
lis; floribus tetrandris (Arbor 50-60 pcd.).

Crescit: cum pi aecedenti.

Floret; fere toto anno.

Nonien: Pala^lar burriet; Ten job.

VIBURNUM, Linn.

Calix superus, brevis, quinquedentatus. *Corolla* campaiiulata raro tubulosa, quinquefida. *Stamina* quinque; *Jilattenta* tubo corollae inscrita. *Stig-
mata* tria, raro solitaria^ sessilia. *Drupa* baccate,
nucleo compresso monospermico. *Embryo* iu albu-
zuiue carnosu iuversus.

VIBURNUM MONOGYNUM, Bl.

V: foliis ellipticis * oblongis utriuque attenuatis supra
basin glandulosi-dentatis coriaceis glabris sub-
tus pallidioribus, cymis divaricatis terminalibus pu-
teris, floribus monogyuis (aff. *V. erosum*, Tliuub.).

Creatll: in s^Mvia inontosis.

Floret: Novembri; Majo , etc.

Xfomeni Kikukuraa; Kia;w.

VIBURNUM LUTESCENS, Bl.

V: foliis oblongis obtuse acuminatis bnsi acutis grosse
scrrnlis coriaceis nitentibus subtus pubescentibus
cymis terciuialibus divaricatis puberulis,

*Cres**

Crexcti: in fraticetis monlanis Provinciarnm Kra-wang, Tjanjoi'j etc.

Floret: Ma jo , etc.

Nomen:

VIBUR SUM S4UBUCLVUM, Herb. Rwdt.

V: foliis elliptiro-oblongis ntrinque attenuatis subintegerriiiis ud costnm sul)tus cjniisc|ue termiua* libus divaricatls puberuiis.

Cresclt: in fruticelis moutosis*

Floret: Julio, etc.

Nomen: Kikatnmpan.

Varieias: foliis ovalibus tttrinque acutis superne scr-ratis glabriusculis.

Crescit: ad pedem monlis Saiak prope Tjilja Lcbak.

V1BURSVM CORIACEUM, Bl.

T: foliis ovnto-aut ovali - oblongis acuminatis denliculatis corir.ceis ghibris, cjmis termiualibus las-tigiatis, tubo corollae cjiindraceo.

Crescit: in sylvis altioribus Javae occidentalia*

'Floret: omni tempore*

Nomen:

SJMBUCVS, Linn.

*Calrx snperus, dentil)us quinis parvis. Corolldvo**
tatu, qiiiuqut'iicla. Stamina quinque. Stigmata
7% - 5, obtusiuscula, scssilia. Fruclus baccatus, nuclcis
5 -5 rugosis moaospcimis.

SAM-

8AMBVCUS JAPAVTCA, Herb. Rwdt.

*?• cymis tri-'aut quiuqucpartltis, stipulis 'foliaceis, foliolis oblon^{^o} - lanceolatis acumiiinūs basi obliquis argute serratis, serraturis glaudulosis, caufc suffmticoso.

Crescit: in montosis frequens.

Floret: oimii teinpore.

Noinen: Kitespon.

BIACICARPIVM, Bl.

Calix duplex ; inferus modo mai\$o brevis.; superus dcceudentatus. *Coro/a* *Stamina* • . • . ; *Stigma* (forte obtusum, sessile) *Drupa* baccata, obloienda, nucJeo compressò, apic profunde emarginato, biloculari aut abortu uniloculari, loculis monospermnis.

Genus forsau *Schoepjlae* Scrb. nimis affine.

Frutex foliis al term's ova to -obloigis acuminatis basi dimidiato - co'rdatis integerrimis subtus to mentosis, corymb is axillaribus dicbotomis.

DIACICARPIUM TOMEISTTOSUM, Bl.

Crescit: in sylvis montosis S~~a~~lak.

Floret: . . , . ; Aprili fruget.

Nomen: Kilutung.

DEUTZIA, Tlmnb.

Calix (forte supcrus Bl.) quinquefidus. *Pefalu* qnique. *Stamina* deeem, filamentis apice trifidis.

Styii 3* *Capsula triaristata, 5-locularis, 5[^]valvis_f*
basj debiscens, poljsperma (Char., ex Thuiib.).

***DEUTZIA SCABRA*, Thunb.**

D: foliis oppositis ovato-oblongis acuminatfc ~~serru-~~
 lads (scruraiuris glaodulosis) scabris.

Crescii: ex Japonia allat*.

Floret:

POLY GSM A, Bl.

Flores hermaphroditic *Calix superas, 4-dentatus_f*-persistens. *l'etala* 4, basi iiiitcrdum coalila. *8la-in 'tia* 4, libeva, petalis alttrua; *Jilamenla* linaria, sub membra n acea; *anther ae* introrsuin aduatae, 2-Ioculares, loD[^]itudinaliter dehisceutes. *Ovarium* incompJctc bilocularc, poijsporum. *Stylus* filiform mis, stigmate truueato-simpiici. *Drupa* subbaccata, nucleo mouospermo. *Albumen* subcorueum. *Jfm-bryo* in versus.

Arbores aut frutices foliis oppositis exstipulaceis_a floribus albidis racemosis axillaribus terminalibusvn 5-bractcolatis **odoratissimis.**

POLYOSMA ILICIFOLIUM, Bl.

*

P: foliis oblongis superne grosse cxsevtQ serratis_f caule arborescente.

Crescit: in cac'umine montiam altonim Javae insulae.

.Floret: omni tempore,

POLYOSMA SERRULATVM, Bl.

P: foliis oblongis digue terrulatis, caale fruticoso*

Crescit: in sylvis altioribus moutium Gede et Pan*
giirango.

Fforet: toto anno.

Nomen:

POLYOSMA IVTEGMFOLIUM, BL

P.-foliis oblongis integerrimis, caule arborco (ar-
bor 60 ped. alt.).

Crescit: in syltfis allioribus montis Buraiigrang.

Floret | Augusto^ etc.

Nomen:



L O R A N T H E A E .



LORANTUUS, Limn

Plores hermaphroditi, rarissime dioeci. *Calicis*
margo integer, ovariu[n] coronans* *Cordlla* 4 - 8 -
partita v. lissa, aut 4-8-petala. 'Stamina 4 - 8 ;
Jilamenta petalis inserta, superne libera. *Antherae*
introrsum longitudinaliter debiscentes. *Ovarium*
inferum, 1 - ovulatum. *Stylus* filiformis. *Stigma*
obtusum. *liacca* coronata, intus mucilaginosa, mo-
nosperma. *Albumen* carnosum. *Embryo* monocoty-
ledoneus (an potius pseudoinonocptykdeneus?), in-
Versus.

LORANTHUS ATROPITRPUREVS, BL.

L: racemulis confertis axillaribus, floribus tetrandris, foliis opposes ovuiibus obtusis subtus leprosis.-

Cre'jdt: in regionibtis cultissupraa'bores ulcirca Laiaviam , LJuitenzorg, Tjikao, elc.

I'lloret: oinni teijj)orQ.

Nomeni Mengundo tay burling.

Variat foliis oasi rotundatis et attcnuntis.

Farielas ; cuneatus: foliis obovatis utiin(jue glabris.

LORA WTHVS LEPWOTUS, BL.

L: raceniulis confertis axillaribus, floribus tctrandris, foliis suboppositis ovalibus subtus ferrugineo-lepidotis.

Crescil: in 5»}lvis allioribus supra arbores*

Floret: omni tempore.

Not no 11: • • • •

LORANTHUS FUSCUS, Bl.

L: pedunculis axil! a rib us subbiddis, floribus tctrandris, foliis opposilis obovatis aul ovalibus basi acutis coriaceis glabris, juuioribus infra ferrugineo -lepidotis.

Crescil: in sylvis primacvis xnontiutn Salak, Cede, etc.

Floret: Junio ; clc.

Is' omen: »

XO-

LORANTHUS FJSCICVLATUS, BL.

X: fasciculis lateralibus, floril>us tctrandris, foiiis oppositis verticillatisve obovatis supra venosis subtus aveuiis coriaceis glabns.

Crescit: prope Linga Jattie Proviuciae Clieribon supra aiboes.

Floret: forte per totiuu auniu.

*Nomen;*i: Mengando.

LORAXTHVS SPtIAERVCARPUS, BL

L: rncemis axilJaribiis solitariis geminisve, floribus bexandris, foliis breviter petiolatis opposhis ova-to - oblongis coriaceis glabris subius avcniis*

Crescit: ci ca Buienzorg, £aLavjam, etc*

Floret: per totum annum.

Nomeni Mengaiulo.

LORANTHUS PESTTAVORUS, Linn.

L: rncemis subsolitariis axillaribus , floribus pentnii-drif, ioliis alteniis oblongis obtusiusculis glabrifi.

Crescit: in arboribus ciixa Buiteiizorg, elc.

Floret: to to anno.

Nomeni Mengando tay biirnng.

*Varieias L. flat*us:* racciis confertis, tubo corol-lae inflato.

Crescit: cnm priori.

Floret: omui tciUporc.

LORANTHVS SVBUMBELLATVS, «•

L: racemis confertis axillaribus, pedicellis ultimis sub* umbellatis, floribus hexandris, foliis oppositis oblongo - lanceolatis loeigiter acuminatis coriaceis glabris (aff* *L. sphaerocarpo*).

Crescit: juxta Tji adjas in Provincia Krawang *in arboribus.*

Floret: omni tempore*

Nomen: Mengando.

LORANTHUS VENOSUS, Bl.

L: racemis coufertis axillaribus, floribus pentandris, foliis oppositis akeruisve oblongis pergammaccif infra subsanguineo-veuosis (aff. *L. pentandro*).

CrescU: circa Btütenzorg *in aiboribus.*

Floret: omni tempore.

Tfomen. Mengando*

Variat foliis utrinque attenuatis et apice obtusis.

LORANTHUS MACULATUS, Bl.

L: floribus , foliis oppositis alternisve elliptico - oblongis obtusis basi acutis nigromaculatis coriaccis glabris.

CrescU: in montanis Provinciae Bantam.

Floret: %

Nomen i :

10RANTHUS TETRAOOmJS, Bl.

Id: racemis confert'S axillaribus, floribus hexandris,
foliis oppositis sessilibus ovibus acutis 1. obtu-
sis pergamaceis glabris, ramulis tetragonis.

Cresc'U: circa Tjiradja3 Provincial Kiawanj iu
arboribus.

Floret i omni tempove.

Nomen:

LORANTUVS AVENIS, Bl.

L. pedunculis confertis axillaribus subbifloris, flori-
bus bexaudris, foliis oppositis augusto-lanceola-
tis CQriaccis glabri^ aveuiis.

Crescit: in sylvis montatiia Salak, Gede, Burang-
rang, etc.

Floret: Julio , etc.

JVo/nen: • • . •

LORANTHUS OBOVATUS, Bl.

Zr racemulis confertis axillaribus, floribus tctran-
dris, tubo corollas elongato, foliis subopposi*
tis obovatis glabris.

Crescil: circa Linga Jattic ad pedein mouth Tje-
rimai supra aihores.

Floret: Septerabii, etc.

Nomen: • • . • *

LORA VTHTTS S U A EL OV7 US | Bl.

L: raceinis solitartis axillaribus, floriūus pentaiidris
scundis, tubo corollac longissimo clavato angu-
into, foliis altcrnis ovalibus obtusis basi parum
attetiUatis pcrgamaceis ^labris (accedit ad *JL** *aa-*
vatum ct *L. lougiflorum*; flores flavi).

Crescit: prope Tjiradjas.

Floret: Julio , elc.

• *Nonien:* Meugando.

LORAXTHVS FORMO8V8, Bl.

L: raccinulis cotifertis lateralibus (casu iblioruncO,
floribus hexaudris, tubo longissimo clavato an-
guiato, foliis suboppositis ovnto-obloji^is coria-
ceis 'Subaveniis (flores speciosi, coccinei, laci-
uiis coroliae revolutis marline atro-purpureis)*

Creacit: in sylvis Salak supra arbores.

JFloreti Junio, etc.

No men> Meugando Kutjuwuug.

LORA_tTHUS COCCltfEUS, Herb. Rwdt.

L: pedunculis confertis axillaribus 1 - floris, flori-
bus pentaiidris, tubo coroliae longissimo clava-
to, foliis oppositis oblongis utrinçpe attenuat̄es
coriaceis subtus aveniis.

Cr̄escit: in sylvis moutosis.

Floret: Martio, eLc.

Nomen: • . • .

L&RANTHUS CVRVATUS, M.

L: racemis axillaribus solitariis, floribus pentandri*, tubo corollae elongato ourvato, foliis oppositis alternisve oblongis obtusiusculis basi acutis coriaceis subvenosis jdabris (tubus corollae flavus, limbo dilute aurantiaco).

Crescit: in altis montis Salak in truncis arborum*

Floret: Junio, etc,

Nomem • • • •

LORANTHUS ALBIDUS, BL

L: involucris imbricatis pcdunculatis confertis axilaribus (casu foliorum lateralibus) multidoris, Horibus hexandris, foliis oppositis ova to-oblongis acutis coriaceis (aff. *L* loniceroidi*).

Crescit: in sylvis montanis Salak.

Floret: fere per totum annum.

Nomeji: Mengando Keljibong.

LORANTHUS GEMMIFLORUS, BL

L: gemmis (Involucris imbricatis) axillaribus solitanis sessilibus multifloris, floribus hexandris, foliis oppositis ovatis 1. ovalibus obtusis coriaceis, ramulis tetragon is.

Crescit: in aylvis montanis Provinciarum[^] ~~Buitenzorg~~, Bautun, etc.

Floret: fere per totum annum.

Women: Mengando.

VISCUM j Linn.

Florcs monocci aut diocci. *Calix* margine obsolc-fus, integer, in floribus mascuūs null us. Masculi: *Corqfla* quadr!partita. *Antherae* 4 rarius 5, sessiles, laciniis coi'ollae adr.ntac. Stores fenilnei: *Pelaia* 4-*Ovarium* inferum, basi biovulatum. *Stigma* sessile, obtusum. *Dacca* umbilicata, intus mucilaginoso, monospernia. *Semen* hilo umhilicali semiciuctum. *Al-bumen* carnosura. *Embryo* dicotyledonous, invversus (secundum Cl. Gaertu,), aut lateralis.

VISCVM ORIENT ALE i Willd.

V: foliis oblongis obtusis basi aiigustatis **trinerviis** interduin subfalcatis? peclunculis axillaribus aggve-7 gatis paucifloris.

Cresclt: in sylvis moutanis supra arbores.

Floret: omni tempo re.

Nomeni Mengando Scringan.

VISCUM VM'HELLATVM\ W.

V: foliis obovuis trinerviis, ncrvis lateralibus bifidis, umbcellulis pedunculatis axillaril>u\$ confertis^ floribus masculis 5-andris.

Crcccil: in arboribus ad monlem Salak.

Floret: c:nr.i tcasf ore.

Nomen:

KISCVM MONILLI FORME, BL,

V: caule aplijllo inferne tcretiusculo, ramulis arti*
culatis ancipitibus, articulis nudis, floribus vcr-
ticillatis sessilibus (all. V. opuntiodi)*

Croscit: in arboribus* circa BiùUnzorg yulgatissi-
mum.

Floret: omni 1 em pore*

Nomen: Mangando.

VISCUM LIGULATUM, BL

Vs caule apbyllo . (inferne tcretiusculo) inarticulato
membranaceo-compresso, ramulis serrulalis, flo-
rib us subsolitariis,

Crescit: in arboribus ad ripas fluvii Tjapus.

Floret: omni tempore.

JXbmen:

riSCUM CAP ILL ARE, Bl.

V: caule aplijllo (inferne tereti striato) inarticulato
Uitjuetro, ramulis scrrulatis, floribus solitariis ses^
sili'aus.

Crescit: prope Tjiradjas in Proviicia Krawang su*.
pra arborcs.

Floret: omni (empore.

Nomen:

EBENACEAE.

DIOSPYROS > Linn.

•

Flores polygami. *Calix* 4-interdum 3-6-Gdus. *Corolla* uroelata vel tubulosa, 4-nunc 3-6-Sda. Flores masculi: *Stamina* per paria basi corollae iu-
serta, duplo plura quam ejusdem laciniac, *jRudi-
meatum* pistilli. Flores hermaphroditi et femyiei:
Stamina eil'oeta, pauciora, *Ovarium* 8-12-locula-
re, loculis mouospermis. *Bacca* globosa, calice pa-
tente suffulta. *Kmbryo* in albutnirie corneo inversus.

DIOSPYROS CAULIFLORJ, Bl.

D: foliis oblongo-lanceolatis acuminatis basi acutU
glabx̄ns, floribus masculis axillaribus, liermaphro-
ditis digynis in tuberculis lateralibus congestis^
floribus scmiqnatrifiriis (afT. D. digynae).

Crescit: in moutosis calcareis.

Floret: Junio, etc.

Nome.: IVel'ek,

DIOSPYROS tfRUTESCENS, Bl.

D: foliis oblongis acuminatis basi acutiusculis glabris
niticlis § fasciculis confertis axillaribus lateralibusve_f
floribus qiiadrifidis*

Crescit: ad ripas flnvii Tjiselandie prope Rompien
Provinciac Buiteuzorg.

Floret: Ma jo, etc,

Jomeu: , . • ,

*Variet** foliis clliptico-oblongis obtuse acuulinalis,
ramulis ultiinis puberulis.

Crescit: in sylvis Insulae Nusae Kambangae,

Floret i Novembri, eLc.

Women: Tallak..

VIOSPYROS MARITIME, BL

D: foliis oblongis obtusis basi acutiusculis subtusque depresso-biglandulosis coriaceis glabris nitidis, floribus axillaribus ses~~s~~ilibus, mascuiis coifertis , her-* maphroditis subsolitariis, floribus obli(jue-i-5-fidis.

Crescit: ad litora australia Javae insulae*

florete: Octobri, Novembri*

Nomen:

DIOSPYROS MELANOXYLCW, Vioxb.

D: foliis oblongo-lanceolatis basi acutis apice obtusis coviaceis gfcberriaiiis tenuiter venosis, floribus axillaribns subscssilibus oblique cjuadrifidis Zuasculis coifertis, licrmnphroditis solitariis.

Crevcit: in montinis caxaieis et argillosis.

Floret: Junio, etc.

Nomen: IYembel; Kibarsma; Kiklor.

DIOSPYROS KAKT, Linn. fil.

D: foliis obovatis et elliptico-oblongis utrinque attenuatis vel apice obtusis supra ad costam ramulis pctiolisc^ue juuioribus wmeutosis subtus pubes-

bcsecntibus, pedunculis masculis trifloris, feminis unifloris, floribus quadratidis.

Synon: D. cliinensis mihi vid. Cat. Ilor.: Bojj. paj, n o ct act. soc. Bat. IX pag. 167.

Crcscit: ex CliLia et JupaU introduce

Floret: oinui fere tempore.

Women: Kikwe.

BIOSPYROS MACROPJIYLTJA, BL

D; foliis elliptico-oblongis acuminatis basi rotundatis (iiitcrdurn suLcordatis) coriaceis glabris ad costam subtus ramuliscrtie to me a to sis , raccmis axillaribus (ran*us supraaxillaribus) p»ucifloris, floribus femine's inferioribus subsolitariis quinquefidis (arbor 60 ped. alt.).

Cretcti: in montosis Seiibu, Parang, etc.

Floret: . • • ; Februario frug'jt,

JSotnem KitjaZlung.



S T Y R A C E A E ,



STY RAX, Linn.

Calico urceolatus, quinqucderitJitus, aut subinte*gerrimus*. *Corolla* profunde 3-7-iida, *Stamina* 6-1G, rarius 5; *filamentis* subinonadclphis, tubo *corollae* iuscrisis. *Antherae* iincai'es, biloculares,

intror»

introrsum longitudinaliter dehlscentes. *Stylus* filiformis, *stigmae* obtuso, interdum depresso. *Drupa* corticata, unilocularis, nucleis .i-rarins 2-5 mo< nospermis. *Embryo* in albumine subcartilagineo inversus aut horizontalls.

STYRAX BENZOIN, Dryand.

S: foliis ovato - oblongis acuminate subtus albido-lcrosis, racemis compositis longitudine fructuorum, floribus 7 - 9 - 10 - andris.

res cU: in montosis circa Buitenzorg; in sylvis occidentalibus mentis Sa!ak; III district© Hdriang Provincial Kiawang.

Floret: # Decembri j Majo.

Nomen: po!m minjang.

STY RAX VILLOSTJM, BI.

S: foliis oblongis acuminatis basi acutiusculis inaequaliteribus subtus villosinsculis, racemis simplicibus folio brevioribus, floribus 6-raius 5-andris.

Crescll: in sylvis mortis Salak.

Floret'. Octol>>j eh*.

Nomen:

STY RAX JAVANICTJM, BL

S: foliis oblongi^* acutis basi rotundatis glitratis adcosuiin subtus pi rum tonientosis ? racemuis con*


fertis

frrtis mnliiflovia prtiol^o breviorib**njf** florihus he,
•mln's (**arbor** 'io-<50 ped.),

Crtsclii : in Bontanis Pa rang Prorinriae Tjanjor, ac
in sylvis moutit Umangruug,

Ttoret-. Augusta; etc.

Nomen:



S A P O T E A E.

UTMU\$OP8_t Lion.

Calx 8-vims 6-partilus; laciniis ^lbiseri-H-
bas * exterioribtu BUjoribai. f7o*o ^{lla 24-}partita: la-
einiii biferialibai, 16 * exterioribus patcotibtu, intc-
rioribof ~~trecto~~>-coaniveiitibos. *sTamina* 8, basi
eorollfl ioterU, ct annulo villofO ovnli adnexa,
cum sqnamis (filament. IteriL) nltirnnntin. *Ova-
rlum* 8-locnkre, loculis 1-OTOUU*. *Stylus* 1. 5//^-
ma obtnfum, d<pressn». *Fructus* baccatus, e* nbor-
tu plerumc|uc 1-locularii, i^{nauci}i in locnlamentii
•OHtoriia 1-ipenni s. *Albumen* c.trnosum, lenae.
Embryo subtiocurvus, trectos, co.j ledoniOUS sab-
plicatis.

SiiCT. l. fnictu rx altortn i-Ioculari.

MIMUSOPS ACUMWATAs ni.

ftf: folli^ nltcrnis OVftlibni nruminntifl bnsi pa rum In-
aequalibus (**nrbor** oltissima uO-lUO pcd. alt.).

Crass

Crescit: in sylvis maritim Seritut.

Floret: Decembri , etc.

Nomen: Genkoi.

MIMUSOPS OBTUSIFOLIA!, !.[«,,,

M: fo|uis * sparsis ovali-oblongb obiusis basi |pu*uu
BtUnUBbil (arbor 30 j>cil.).

Crescit: in hortis frequēis.

7. 2. v. anno. n ..

Nomen: Kniubang Tuttjong*

Mnil SOPS BALOT t% Gaertn. fil.

M: fo|X|s o>vatis rabemargiQatis.

Crescit: ill hortis colittit.

Floret: Jutio , etc.

Nomen; . . . i

SEV r. ? Itnhr. *icaria* , - fructi suli-8-loculari.

MIMVOPS TMBRI CAR ft, Liaiu

*M** folii sparsis ovalibus interdum retusit.

Crescit: in hortis culta.

Floret: Junio , etc.

Nomen: . . .

ACHRAS, Linn.

CV/vs expartitus, laciinis biserialibus. *Corolla* sub-
 canipanalaUi i9-fida\$ lacioiii bi serialibus, i?te-
 rioribus aiustioril>ii•;. *Stamina* 6, inclusn. ad me-

dium

iliū corollae laciniis interioribns interjects. *Ovarium* 12 - 6 - loculare. *Stylus* filiformis, *sligmale* obtuso. *Fructus* caruosus, ex abortu plerumq[ue] 1-loculnris, *naucleo* comprcsso 1-spcnno. *Embryo* in albumine crectus.

ACIIRAS SAPOTA, Linn.

A: foliis oblongo-lanceolatis apice obtususculis basi angustatis, pcdunculis solitariis axillaribus 1-Co-ris.

Crest-it: in Javao liortis colittir.

Flotet: Junio, etc.

X^omen: Boa Sauw.

BASSIA, Linn*

Calix 4-scpalus, biserjalis. *Corolla* catrrpanulatn, B-fida. *Stamina* 16; filamentis subulatis, subbise-rialibus, inferne subcoalitis; *anthcrae* cordatae, cx-ti'orsae. *Ovarium* superum, 8-locularc, loctilis I-ovulatis. *Stylus* longus. *Stigma* simplex. *Fruc*-tus* carnosus, ex abortu 5-1. 4-locularis, loculis naucleo monospcrmo.

*JijiSSIA SERICEA*_X Bl.

B: foliis oblongo-Ianccolatis acuminatis infra sericco-puherulis, peduticulis axillaribus coufertis 1-Ho vis petiolo brcvioribus (arbor 40-50 pcd<< alt.; an fatU a jj. *longlblia* dislincla?).

Cres-

Crsact: In sylvis m onto sis Parang Proviciae Tjanjor.

Floret: Julio, etc.

Nomen:

BASSIA CUNEATA, BL

7>; foliis cuncato-oblongis obtusuisculis glabris, pedunculis subutnbcllatis nxillaribus 1-floris pctiolo subacqnalibus (arbor. 60-30 jied.; accccUt ad *B** *obovalam*).

C/escit: in sylvis montiuni Salak. ct Gcdo.

Floret: AagnstOj etc.

Nonien:

SIDEROXYLOXfilAnn.

Calix parvus, quinqucfidus. *Corolla* tubulosa, decemfida; laciniis biscrialibus, intcrioribus aii&ustissimis. *Slamina* 5; ft/amenti.s tubo corollas insertis, laciniis Jatioribus oppositis. *Ovarium* quia-aelocularc, lociilis i-ovulatis. *Stylus* subulatus. *Stigma* simplex. *Fructus* (ex Gaevtn.) baccuius, naucleo 1-spermo. *Albumen* subcartila^incum. *Em** *bryo* oWiqc aelscendens.

SWEROXYLON NITIDUM, BE

S: foliis oblongis utrinque attonuatis nitidis, flovibns conferto-vaccmosis axilUuibus (arbor ^o ped, alt).

)

Crescit: ill sylvis monlis Snlin Provinciae Buitenzorg.,

Floret: Martio, elc.

Nosne.i: Njal'i.

NYCTERTSTITIOK, Ruiz, et Pav.

*Callx profunde 5-parlitus. Corolla campanulato-
;7-partita , calici su I) actual is ^ intus nutln. Slant'no,
5, tubo corollac inscrla, cjsudem laciniis opposita.
Ovariwn 5-locularc, loenlis l-ovalatis. Stylus
hrevi.i. Stigma trunctium , obsolete 5-cremilatum.
i^ructus carnosus, 5-locularis. J^anc/ri solitarii,
compressi, 1-spermi. Embryo in albumiiie ercctus.*

Genus a *VkryBophyJlo* vix scjungentliim, stigma-
te fere intcgro et fructu quiuijac-loculari paruna
diversiin.

NYCTERISTITION LAVCEOLATVM, BI-

.V: rnpiulis ferriigineo - tomciitosis ; foliis oblongo-
lanccolatis l)asi ol)]if[iie-attenuatis ad costam in-
fra tomentosis (arbor procra, alt. 60-80 ped.).

Creficit in sylvis monlailis.

Floret-. Febrnarioj elc.

Nomen: Kilakkalang.



T A S-

USMINAE.**JASMINUM, Linn.**

Calix quinque-nut octofidus; rarius subinteger.
Corolla b^o'po' crateriformis; limbo patente, quinque-aut octoiodo. *Stamnia* duo, inchisa. *Ovarium* biloculare; oval a 2 in quolibet loculo. *Stylus* 1. *Siliqua* bilobum aut bifidum. *Uva* didynia; coccis 1-2-sporniis, altero sacra abortiente. *Semen* exalbuminosum.

JASMISXTM SAME AC. Linn.

/; foliis oppositis ovatis aut ellipticis basi interdum subcordulis membranaceis, ramulis petiolis et pendunculis pubescentibus, laciniis calicinis subulatis.

Crescit: in hortis frequentissimum*

Floret: omni tempore,

Nomeii: Piatat*

Varietas. foliis mucronulatis subundulato - rugosis, floribus pleno,

JASMLNUM SCAN DEMS, Vald."

J: glabrum; foliis oppositis ovato - oblongis acuminatis basi interdum subcordatis nitidis, corymbis terminalibus subtrifidis, pedicellis subcapitatis, laciniis calicis subulatis hirsutis.

Cres-

. iii fruticetis montesi*.

Floret: fere, oinni temporc.

Nomen: Mqjlatti aroy.

JASMINUM TRINERVE, Valil.

J: glabrum; foliis oppositis ovato - lariccolatis acuminatis trincrviiis nitidis, floribus axiJlaribus terminalibusvc subsolitariis, laciniis calicis subulatis.

Crescit: in fniticetis prope Tjikao Provinciae Tjan* jor.

Florel: Junio, Julio, etc.

Nomen:

JASMINUM ELONGATUM, Linn. fil.

J: caule SGandontc, foliis oppositis ovato-oblongis acuminatis basi rotundatis interdum subcordatis supra pube adprcssis infra ramuliscjue villosis, cjmis terminalibus subtrifidis, laciniis calicinis subulatis.

Crescit: in montosis Salassie Provinciae Tjanjor.

Floret: Julio_x etc.

Nomen: Aroy Kamandcu.

VarieUwi foiiis omnibus basi subcordatis supra gla-* Lmisculis.

Grexcit; circa Linga JaUie ad pcdem lnontis Tje* rimai in fruticelis.

f'Vorel: foic .loto aiinoi

(6 7 9)

JASMINUM GLABRUSCULUM, B\.

J: caule subscandelite, foliis oppositis rarius altcrnis ovatis acuminatis basi rotundatis glabris ad costam infra ramulisque puberulis, cyniis tcrmiiialibus indivisis, laciniis calicinis subulatis (aff. *J. clongalo*).

Crescil: in frutireLis circa Liiiga Jalic Provinciae Cheribun.

Floret: oinui tern pore.

Notnsn:

JASMINUM GLADRUM? Horsf.

J: caule scandente, foliis oppositis ovato - oblongis acuminatis iftargine ct ad costam infra pctiolis ramulisque puberulis, pedunculis axillaribus pau< cifloris, calicis laciniis subulatis pubescentibus.

Cresc'U: circa Bataviam.

Floret: Septembri, etc.

Nomen: . • • •

JASMINUM CRASS/FOLIUM j Bl.

J: C& scandente, ramulis jtiniорibus glandulosopilosiusculis, foliis alternis (iloralibus plcrumquo oppositis) ovalibus aculis pergammaccis triplinerviis iitidis, pedunculis axillaribus tcrminalibusque confertis 3 - 5 floris, pedicellis longis_f calico tubulooso obsolete 5 - dentate

Crcs-

Crescit: in sylvis monlanis Provinciarurn occidentalium Javae. •

Floret: omni tempore.

Nomen:

NYCTANTHES, Linn.

Crtlix tubulosus, obsolete denticulatus. Corolla hypocrateriformis, 5-3-fida; laciniis conlortLs, oblique. Stamina duo, inclusa. Capsula obcordata, bilocularis, loculis monospermis.

NYCTANTES ARBOR TRISTIS, Linn.

Frutex, ramulis tetragonis, foliis ovatis I. ovato-oblongis acuminatis basi interdum subcordatis sessiles, umbellulis pedunculatis axillaribus terminalibusve involucratis.

Crescit: in lioviis colitur.

Floret-, omni tempore.

Nomen: Sergadin.

CHWNANTHTJS, Linn.

Calix parvus, quadridentatus. Corolla quadripartita; laciniis b'nenribus. Stamina duo (interdum 3-4), inclusa, basi corollac inter lacinias inscrita. Ovarium bilocularc, loculis 2 - ovulatis. Stylus vix ullus. Stigma subbilobum. Drupa bacata, monosperma. Embryo exalbuminosus, inversus.

CHIO-

CHTONAVTHUS MONTANA, BL

C: arborea; foliis oppositis elliptico-ohlongis acutis miliatis basi attenuatis in U'crrmiis ghilu'rrmiis f **pacemif** compositis axillaribis couicrlis **foliq** vade brevioribus,

Creavlt: in sylvis montium SaLak,, Paiang, etc.

Floret: Se jJ te in h r i, etc.

Nomen; Kiburriet.

PHI LYRE A, Linn.

*Calx parvus, q n a d r i d e n t i t u s. Co / *ol/a ro tn t a, qua-*
drifida. Slamina duo, exsertfu Ovar'ttm bilocu-
liirc, loculis biovulitiis. Stylus brcri. S/iyma ob-*
tusum. Drupa baccatn, uucleo nionospcruio. Kn-
hryo in albumiue caruoso inversus.

PHILYREA ROBUST A, Roxb,

P: foliis oppositis elliptieo - oblongis acuminatis (interdum obtusiusculis) integrim-imis glabris, paupula terminali diaricata villosa.

CrescU; circa Rotnpien atl flunpen Tjisedauie; i\%
 ca'careis ci:ca Kuripan.

Floret i Aprili, etc.

Nomen :

OLEJ, Linn.

Cal'x pnrvns, CfUiU'ideotatq. Corolla quadri-
partita, lifcmiis o bins is. Slavnna duo. (>i arium
biloculare. Stigma biadui, JJrujja bacata, mu-
 cleo .

oleo 1-2-loculari, i-2-spcrmo. *Embryo* in albumin© caruoso in versus.

OLEA FRAGANS, Tlmnb.

O: foliis elliptico - lancolatis acuminatis scrrulatis,
p c(l i cell is unifloris in ge minis axilla rib us latera-
libusve capitatis.

Crescil: ex Japonia et China, iutrodncla et frequen-
ter in liorlis nostris culia.

Floret: omni tempo re.

Nomen:

OLEA LASCEA? Lam.

O: foliis lancolatis acuminatis integerrimis in axillis
ven a rum subtus dcpresso-glandulosit.

Crescil: ex insula Maurilii introducta.

PACHYDERM A, Bl.

Calix inftTus, obsolete quadridcntatiis. *Corolla*
globosa, cbiiacea, ore scmiquadrifida. *Stamina* du6,
brevissima , corollae su])ra basin inserta. *Oi>arinm*
bi-Jocularē, Joculis biovulatis. *Stigma* subsrssile, ob-
tusum. *Uacca-* exsuçca , monosperma. *Albumen* car-
no sum. *Embryo* in versus.

Genus *Olea.fi* nimis afline, cui differt corolla glo-
bosa, stigmate incliviso ct fructu l>accato.

PACUYDERMA JAFANICUM.

Arbor foliis'oppositis breviter ptiolatis oblongo-
lanccoiatis acuminatis basi acutiusculis integrermis
gla-

ginbris siibvenosīs, paniculis tērruinalibus bracliatis longitudiue foliorum.

Crescit: in sylvis montis Sala&»

Floret: December, etc.

Women: Pat jar Ginning.

MYXOPYAUM, BL

Calix parviis, qiladrifidus, persistens. *Corolla* globosa, coriacen, iiitus plicata; limbo qaadrifido. *Stamina* 2 inclusa; *ftlamenlis* brcvissimis, medio tubi inscrlis. *Ovarium* 2-locularc, loculis 3-ovulatis. *Stigma* crnssiim, sessilfc, latcre angulatum, superne bicuspidatum. *Drupa* coriacea, 1-2-locularis,- nucleis i-4 angulatis monospermis,>nucilagene obvolutis. *Albumen* corneuui. *Embryo* erectus.

, Genus lioccc cum *Noronhia* rmaxime affine.

Frutex scantlcns, ramulis tetragonis, foliis oppositis ellipticb-oblongiſ auperne interdum serratis trine rū is glabris, floribus paniculatis axillaribus lateralbus ve.

MYXOPYRVM NERVOSUM.

Crescit: in calcareis prope Kuripan el ad petlem montis Sulak.

Floret: Apiili, Majo, etc,

Nome n| • • • «

M Y R -

M Y R S I N E A ' E .

ARDISIA_i Swartz.

Flcfres hermapbroditi, passim abortu *dioccu** *Cfa-**
lix 6-rarius 4-partitus, persistcus. *Corolla* sub-
VotnH , 5-rarius 4-partita, *blamina* 5_f rarius 4,
tubo corollae inserta. *Anllibrae* connientes, in —
trorsutu versus apicein poris 2 longitudinalibus de-
hiscentcs. *Onarinm* mtiiti-ovulatiun. *Stylus* su-
bulntus₄ slrgmate simplici. *Drupa* iaterduin bac-
catu, nuclco l-rarius 2-'.)~sperino.~

ARDISTA SPECTOSA, Bl-

A: foliis oblongis acumina'is basi pa rum attemintis
obsolete denticulatis coriaccis glabris, panicula
terminali divaiicata, pediceilis sfibunibellatis, la-
ciuiis calicis rotuudatis (aff. *A. divaricalae* Wiliclj^

Crescil: in sylvis montanis.

Floret: Junio <— Novembri,

JSoinetw Kissamplak.

ARDISTA PVR PURE A, Herb. Rwdt.

A: foliis oblongis utrin(jue acuminatis ititegerrimis
coi'iaccis glabris, pauicuia terminali pyramid a ta ^
pcdicellis subumbellatis, laciuiis calicis rotuudatis.
(alT. praecedenti).

*Cres**

(685)

Crcscti: in syMs montanis insnlarum Jay at et
Nusae Kambangae.

Floret: to to anno*

Nomen: Kilampani.

ARDISTA MUC&ONATA, BL

A: foliis oblongis utrinque acuminatis apice aristato-mucronatls integerriinis coriaceis glabris, panicula, terminali abbrevi:ita, pedicellis umbellatis, laci-niis calicis rotund a tis»

Creact: prope Tji-adja* Provinciae Krawang in sylvis iroiitaiis.

Floret: Julio, etc,

Nomen:

ARDfSTA SANQVTNOLENTX, Bl.

A: foliis oblongis ncuminatis basi acutis integcrrimis Cojriaceis glabris, panicula tterminali divaricata, pediceliis umbellatis, dentibus calicis acutis (nil*. A. *specl-osae*, sed floribus valde minoribus et calice 5-dentuto distincta).

Cresclt: in umbrosis montium Parang.

Floret: Julio, etc.

Nomen:

AUDI SIA ANCEPS, Bl.

A: foliis oblongo-ianceolatis utrinque ncuminatis sub-xvpandis glabris subtus tenuiter leprosis, pani-calis. a^illaribus' tterminalibusve brcvibus, pedi-cellis

cellis suTuimbclritis, dentibus calicis aciUiusculis, ramulis anticipitibus.

Crescit: ad Jittora Nnsae Kambangae Insulæ.

JFhret: Octobri, etc.

Noineni Sikattan.

***ARDISIA SCANDENS*, fil:**

A: foliis ovalibus apicc rdtundatis v. obtusig basi acutis iutegernniis glabris; paiciulis terminalibus nutantibus, pedicellis racemosis, dentibus cali^a ciuis acutis, cuulc scaudente.

Crescit: in sylvis montanls.

Floret: Februario, elc.

JNbnien: Ojot Katjambang} Kibarå Ialakkié.

***ARDISIA TENUIFLORA*, BL**

A: foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis injefer-
rimis glabris, paiciulis divnricatis axillaribus ter-
minalibusque, pedicellis racemosis, dentibus ca-
licinis acutis, caule scandente (flores miuutis-
simi).

Crescit: in sylvis Provinciarum Buitenzorg, Bau-
tatn, etc.

Floret: omni temporo.

Nomen: Kit jamb an g.

Variety foliis basi rotundatis;

Crescit: ad pedem moutis Salak.

ARDISIA PVNCTATA, S\.

*^: foliis oblongo-lancicolatis obtusiusculis. (transverse lineatis) iniegerimis glakris subtus punctatis (junioribus ramulisque fusco-tomentosis), timbcllis simplicibus axilluribus terminalibusque nutautibus, laciniis calicis aculis.

Crescll: ad rivulos in umbrosis Nusae Kainbangac Insulae.

Floret: Oclobri, etc.

jNbmen:

ARDTSIA HUMILTS, Valil.

As foliis oblongo-lancolntis utrinque acuiniiatís Integerrimis coriaceis glabris venosis, racemis compositis divai'icaiis terminalibus latralibusve, pedicellis umbellalis, calicis laciiis obtusiusculis (ciUolatis).

Crescii: in frulicelis Bantam.

Floret: foi'le loLo anno.

Noincn:

ARDISTA LURID A, BL

A: foliis oblongo-lanceolatis, utrinque ncuminntis integrjmis coriaceis glabris, pedicel]is subumbellalo-racemosis ax ilia rib us, lacimis calicis rotu'h-datis (aff. *A. iimbcllatae* Roth.).

Qresclt: in montauis Seribu el prope Tjiradjas.

Floret; cmni fere iempore.

Nomen; »

ARDISIA PUMILA, BL

A: eaule, suflruticoso interne procumbente rndl* cuncte, foliis lauceolato-ellipticis aculis basi in petiolum angustotis obsolete crenulatis transverse striatis glabris, florilms suljuinbeilalo-raceino.sis, calice 5-dentato, Jacuiis corollae cucullatis.

CrenclU: ia nmbrosis montis Sulak.

Floret: Novembri, etc.

Nomem.

ARDISIA OB Or AT A, Bl.

A: foliis obov.itis superne rotundatis v. obtusis in» tegerrimis cpracieis glabris ten niter para 11 d o . striatis , ftoribus subuinbcliMto-racemosis axiliari- tun; laciniis calicis rotund a tU (aff. A. pyriloiiac AUIJ. d.Tct. Tb.).

Crescil: ad JiUora InsuTae Nnsae Kambangae.

Floret: Septembri , Octobri, etc.

Noinen : Lampanie.

ARDISIA MARGIXATA, Bl

A: foliis lanceolatis ittrinque acuminatis integerrimis glabris sublas teuaiter puetatis transverse paral* lelo-striatis (vcnacpiu martini approximata cinctis), umbclJis saijcorjiubosis axiliaribus, -deutibus calicis ucutis (aff. A. pueraiac).

Crt'scii : in syivis a, li^ribus JIUQis Biuajigi'ang.

Floret: Julio , etc.

Nomen: • • • »

AR-

ARDISIA QUINQUEGO.VA, Bl.

A: foliis lancolatis utriixjue acuminatis obsolete crenulatis glabris, umbellis simplicibus Jateralibus, dentibus caliciniis acutis, fructibus depresso-5* gonis.

Crescti: e regno Chinensi introducta.

• *Fldreb* : omni tern pore.

Nomen:

ARDISrA CYMOSA, Bl.

A: foliis oblongis ob tusiusculis basi altenuatis integerrimis glabris transverse striatis, petiolis ramulis pedunculis (fii feirugineo-leprosis, cymis compositis axillaribus terminalibuscuae peclunculatis, pedicellis umbellatis, dentibus calicis acutis (an *Finis humUis Burin?*)).

Cresclt: in fmiticetis Provinciae Bantam.

floret: Februario, etc.

Nomen:

ARDJSIA MOLL IS, Bl.

A: foliis oblongo-lanceolatis utrinquac acuminatis crenulatis punctatis subtus villosiusculis, umbellulis axillaribus terminaiibusqiiie simplicibus, laciuiis calicis seifiiiaucco^atis acutis corollae subaequalibus (aff. A. glandulosae).

Crescit: in montosis Provinciae% Bantam.

Floret: Februario, elc.

Nomen:

ARDISIA LAEVIGATA, BL.

A: foliis oblongis utrinquac acuminatis integerrimis coriaceis glabris, racemis axillaribus lateralibusque simplicibus, laciniis calicinis acuminatis.

Crescit: in cacumine montis Gedc.

Floret: Maio, etc.

Nomen: • • • •

ARDISTA GLAXDULOSA, BL.

A: foliis oblongo-lanceolatis utriusque attenuatis margine glandulosis at repando-crenulatis lacvibus tenuissime venosis, cymis terminalibus subsolitariis recurvis, laciniis calicis obtusiusculis corolla triplo brevioribus (aff. A. circuulata; fructu 8 pedal.).

Cryptocarpus: in montanis.

Tloreb: toto anno.

Nomen: Lampaui.

Ohsefc. in horto Botanico Buitenzorgii colitur species ex Japonia missa sub nomine *Bladhiae crispa* Th., quae nostrae nimis affinis; differt tamen aliquid habitu debiliore et foliis venis infra subreticulatis.

ARDISIA JAPONICA, BL.

...; foliis subverticillatis (5-nis) breviter petiolatis cuneato-oblongis acutis argute serratis glabris, racemis simplicibus axillaribus, pedicellis subumb*

hellatis secundis, calite quinquedentato, eault
fruticnloso*

*Cresctt: ex Japonia. sub nomine Bladhiae Japoni-
cje aceepi.*

ARDISIA DENTICVLATA, BL

A: foliis oblongis utrinquac acumiuatis apice obtusi-
usculis superne denticulatis glabris, umbellulis
suscoiyhosis (rarius solitauis) tenuinalibus axil-
Liribusve, laciinis calkis ohtu^is, floribus plc-
runique tetrandris.

Crescit: ia montosis Seribn et MM Rompien.

Floret: Mailio, etc.

Nomqm • . . .

ABDISIA MACROPIIYLLA, (Herb.Rwdt.)

A: foliis oblongis (majusculis) acuminatis basi obtu-
sis integerrimis coriaceis sabtus et umbellulis sub»
covymhosis axillaribus tom&xito&is_f calicibus acn-
tiusculis.

*Crescit: ia montanis ProTiacwoiu occidentaliarn
Javac insulae.*

*Floret: onini tempoi-e**

Nomen: Lampanie Badak.

ARDISIA AV'ENIS, BL

A: foliis lanceolatis apice obtusiusculis basi angus-
tatis integerrimis coriaceis glabris subavcniis, flo*
ribus fasciculatis axillaribus latcralibus<jue, den-

tibus

tibus calicinis acutis (ai^rbor 20 ped* alt. Genericc nlicjuid ab Ardisiis recedit ob defectum styli et formam stigmatis obtusi depressi).

Cresclt: in siumnio 1110 at is Bjirangrang.

Floret: Janio, ale,

Nomen:

ARDISIA FULIGINOSA, Bl.

A: foliis oblongis acuminatis basi cunentis superne obsolete deuticulatis glabris (junioribus ramuliscjue fciTugiuco<-toinentosis), umbellulis subracementosis axillaribus, dentibus calicinis acutis (aff. A* solanaccac, abscpa recedit floribus miuoribus)*

Cresclt: in sylvis montanis.

Floret: omni tempore.

Ng/nen: . . • .

ARDTSTA GLABRATA, Bl.

A: foliis oblongo-hmceolatis utrinque acuminatis margine subglandulosis subcrenulatis utrinque laevis, umbellulis corymbosis termiiialibus, laciniis calicis semilanceolatis obtusis corolla subaequali-* bus (aff. praecedenti et A. glandu/osat).

Cresclt: in Piovincia Bantam.

Floret: Decembvi, etc.

Nomen: Lampanie.



Genus MjTsincis accedens.

AE-

AEGICERAS, Gaert.

C \ll /ar 5-partitus; laciniis oblicjne-imbricatis, campanulato - conniventibus. *Corofia* subcampanulata; limbo 5-pnrtiro, laciniis obliquis. *Stamina* 5 \ll exserta; *filameni* is infra in annul urn connatis. *Anikerae* sngittatae, incumbentes, loculis cellulosis. *Ovarium* 1-0 vail a turn (exCl. R. Brown poljspermui). *Stylus* subnlatus. *Stigma* simplex. *Friuctus* follicularis, l-spcrmus. *Semen* inlcgumcnto incompleto calyptraformi. *Embryo* exalbuminosus, erectus, *cofyledoni.bus* brcvissiniis. *l'lumuia* filiformis, longissima, in centvo embryonis locata.

AEGICEPAS OBOVATUM, BL.

A: foliis obovalis x $\%$ ctus venosis, umbellis pedunculatis axillaribus terminalibusque, fructibus cylindvaceo-subulatis subaruatis.

CresdL: ad littora iusulamm Javae ct Nnsae Kambar.gae.

Floret: tnto anno.

Nomen: Triiug-tung.

AEGTCERAS FERRBUM, BL.

A:foliis (parvis) spatulatis margine subrecirvis subnveniis, umbellis axillaribus et terminalibus, fructibus cylindraceo-subiilatis arcuatis (*Mangium Jerreum* Rumph. Herb. Amb. III. t. 79).

Crescit: ad Jit fora Javae olienialis.

Floret: omni terjiporc.

Notnen: Kaiemn[^]on.

S O L A N A C E A L

*SOLANUM*, Linn.

Calix urceolatus, cjinquc - dcemdivisus, rarius
iiitegcrriiyius* *Corolla* rotata, mrius carnpanulata \$
limbo 4-^6-diviso. *Sta?nina* 4, 5, 6; *anlherae*
coimiventes, npicc poris duo bus dehiscentes. *Stigma*
oblusum. *liacca* calicc persistence sufiulta nut ob*
tecta, bi-rarius mulliloculnris, poljsperina.

• Cuilc inciini.

SOLA SUM m& RUM, Linn.

Varietm a, canlc licrbaceo, ramis ultimis angulatis,
foliis ovato-lanceolatis iuterdum rcpando dentatis
scabriusculis, floribus snbunibclntis Jatralibus.

Crescil: in sylvis altiori]iuſ.

Floret: omni tempore.

No.nen: ,

Varlat. b: caulk licrbaceo, ramis angulatis denticu-*
latis, foliis oblongo-lanceolatis subrcpaudo-den-
tatis puberulis.

Crssrit: ad origin em fluvii Tj3)ftmrai.

SOLA SUM JVDAICmr, Bcsser.

S: canle lierbaceo ramisrpie subangulalo - muricatis ,
aculcis minulisshnis incurvjs , foliis ovato*oblon-

&is sinuatis \el repando-angulatis puberis basi iu
peliom angustatis, floribus umbellatis cernuis*

Crescit: in uligiiosis circa fitdtenzorg.

Floret: omui tempore.

Woman:....•

SOLANUM ULTGINOSUM, Bl.

γ* caule herbaceo inermi inferne procumbentc, foliis
altcrnis ovato-oblongis acutis basi cuneatis inte-
gerrimis utrin^ue ramisque puberulis, umbelJis
latcx*alibus 4-8-floris, pcdicellis secuudis rcflexis,
-calice obtuse 5-dentato (aff. *S. nigro* et *S. humili*).

Crescit: locis hum id is fveqaens.

Floret: tolo anno.

Nbmen: . . : •

SOLANUM RVMPHII, Dunal;

S: caule herbnceo angulato striato, foliis ovato-oblon-
gis repando-undulatis yelutinosis, floribus sab-
uinbcllatis.

Crescit: in liumidis mantis Saak*

Floret: omni tempore.

Nbmen:

SOLANVM RHfNOZEROTIIS, Bl.

S: pubescens, caule erecto herbaceo fistuloso tetra*
go no, foliis ovatis obtusis basi cuneatis integerrimis,
floribus uiibellatis **ctruiis** (aff. *S. fistuloso* Rich).

Cres-

CresCU: in umbrosis sylvalicis.

Floret: omni t em pore.

JSoinen: Laudja J>adak»

SOLAXUM ARDISIOIDES, BL.

S: caule * fruticoso , fuliis subaltcriiis oblongo-Ian-ceolatis utrinquc acuminatis supra bnsin obtuso deiiticulatis glabris , floribus cymoso-umbellatis oppositifoliis tetrandris, calice quadrigdo (acredit <S. ' laevigato).

Crescit: in sylvis monlosis Salak.

Floret: Angusto , elc.

Nomen: Kipoies.

Sjnon. *S. tetrandrum* Catal. Hort. Buitenz. pog. 55*

SOLAXUM BLVMII, Nees ab Escnb.

S: caule suffruticoso dicbotorno colorato glabro, foliis superioribus geminis, majori altcro oblongo utrinque acuminato basi interduin inaequali, altero minori ova to basi acuto, floribus aggregatis laterifoliis, calice integerrimo.

Crescit: in sylvis men fan is,

Floret: omni lemporc.

Notnen : Culuii; Bulung.

Synon. *Solanum violaceum* mibi in Catal. Hort, Botanic. Buitenz. pag. 55.

SOLANVM PARASITICMM, BL

S: caule fruticoso nodoso, foliis solitariis oblongo-* lanceolatis acuminatis basi acutis intrrrdum inaequalibus glabris, floribus aggregatis laterifoliis, «alice integerrLCQO»

Crescit: in sylvis montanis Salak supra ai bores.

Floret: fere per to turn annum.

Romen: Terongan.

SOLA SUM DENTICVLATVM, Bl.

.8: caule suflYutic'oso, foliis inferioribus solitariis summis getninis glabriusculis, altero ' majori oblongo utrinque acuminato, .iltrro minori ovato, floribus 2-5 aggregatis laterifoliis, calico decemdentato sulcato.

Crescit: in uinbrosM altioribus montium Cede, Buriugrang, etc.

Floral \ onini tcmpe.

Nornen: Bulling.

Varied a: foliis' pedunculis calicibusque birsutis.

Crescit: in montosis Tjeitnai et in cacumiue moatis Gegar Bcntin.

Floret: onini torn pore.

Nomen: Leiintja Bonglot (Clie'-ib.).

Varied b: peduncuhs solitariis, floribus aborttl tc* trandris.

Crescit: ad montcm Menarang P^ovinciae Buiteuzorgj ad pediciu moulis Sdiok*

***SOLAXUM MOLLISSIMUM*, Bl.**

j\$: caule snfiYuticoso **inani**_v foiiis geminis supra hū> sutis infra dense tomentosis, majori clliptico-oblongo ntrinqie acusninate, minori ovato, flozibus aggrcntis laterifoliis, calicibus decemūdis,

Creicit: in uv>ntanis.

Floret; Angus to, etc,

Nonicn: , • • • •

***SOLANUM VERBASCIFOLIUM*, Lind.**

S: entile fruticoso, foiiis ov<ito-oblong!s r« cumin alia inte^errimis sstellato-tomentosis discoloribus, co-
13 nib Is pedunculatis subterminalibus (v. alaribus)
dichotomis, calicibus scmicuinquelidls*

Creicit: ia monlosis.

forcl: omni tcnporc.

JSomcn: ToLa»

***SOLANUM DULCAMARA*, Linn.**

Wariet. puhcscp.ns: foiiis ovato-cordatis. supevio-
ribus subtiastadis v. subpinnaGdis utriuijne pu-
bescentibus, corjmbis dicbotomis opposkifoliis.

CrcacU: ex Japonia snb nomine 3 *lyrall*, Tlmsb*
nubis coinmuaicatiun,

• * Caule acufcato intcnluni incrmi.

***SOLASUU OriGERU.V*, Dun-**

Var/vf. irisanur?': Ctirfc sub herb aceo foliis<jue ovato-
oblongis subrcpaudis iucrmibus Lafii obliquiis

(699)

utrinque stelljto-toraeiUosis (juniovibus dense stel* . lato-tomentosis), pcdmiculis solitnriis 1 -floris, l)accis oblougis cjliadraceis (purpurasciiibus) •

CrsscU: in hortis freqj Lealer CULUH.

Floret: to to anno.

Notneti: Terong Fangang.

SOLASUM PSEUDO^UXDATUM Bl.

S: caule saffruticoso iaermi, *Mils* altercuis *ovntls* sinuato -repandis basi plerumque inaequalibus utrinque stellato-tomentosis, pcdim'alis solitariis unijloris (rarius 5-floris), baccis globosis culice semiinclusis (maxime accedit S. undato Lam* et S. presso, Dun.; flores violacei).

Crcscit: locis cu'lis.

Floret: omni tempo re.

No,uen: Terong Rangu.

Farief, albiflorttm: foYiis ovat?s obtnsiiiscuTis **Lasi** passiminae(juali-sii!)cor(Jiilis paruni npatidis utriu« quc ramulis^ue stoJlato-hirsutis i^ flores albidi)-

Creicti: in ho'tis co'itiir.

Jfo/nsn: Terong ieiles.

Variel. atm-purpurascens: staturne robustiövis , caule glabriisculo, ramulis petiolis fructibusque (majoribus) purpurascentibus (flores violacei).

Crcscit: cam praecedentibus.

<Nr/73W>: Terong Kuna.

Variet. leucocarpon: cauie verrucoso , foliis ovatta acutis , baccis alb id is ((lores albi).

Creicit: ad podem montis Salak colilar.

Nomen: Terong putie.

SOLA SUM USTDATUM? Lam.

Variri.: caule sufficiens remote aculeato, foliis ovatis subrepandis basi obovatae ramulisque puhe stellari subtomentosis ad costam utriusque calicibusque interdum parce molliter aculeatis, pedunculis solitariis sub-i-floris, baccis globosis (niam xitnc ad *S. sanctum* spectare videtur).

Crescit: in holis.

Florel: omni tempore.

Nomeni Terong pugber.

SOLJSUM CYANOCAnPHWM, BL

S: caule subaculeato herbaceo, foliis oblongis utrinque acutis sinuato-aequatis hirsutis (pilis Stellatis) in costis petiolis calicibus pedunculisque solitariis 1-floris molliter aculeatis, baccis (2-10-cularib.) globosis calice semi obtectis (aff, *S. jpresso*, Dun. ^).

Cresc'U: in oryzetis siccis monium Seribu*

Floret: Februario, etc.

Nomen: . • . • |

SOLAMT^M CANESCENS, Bl.

S: caule fruticoso foliisque utrinque aculeatis, foliis sinuato-lobatis basi subobliquis utrinque petiolis ramulisque stellato-tomentosis, floribus. suhumbellatis, baccis pisiformibus (aff. *S. sane* to & *S** *incanum* Forsk. forsan eadem species).

Crescit: ad sepes et in cult is.

Floret: omni tempore.

Nomen: . . , .

SOLANUM LASIOCARPUM, Dun.

S: caule fruticoso, foliis (majusculis) subcordatis sinuato-angulatis utrinque (pilis ramosis) tomentoso-lanuginosis aculeatisque, pedunculis (subcygnosis intrafoliaceis) caliciiosque aculeatis inermibus ye.

Crescit: in montanis.

Floret: omni tempore.

Nomen: Karondong Gtuning; Kaiondong Badalc.

SOLAVUM INVOLUCRATUM, BL

S: caule sufruticoso parce aculeato, foliis subrotundo ova acuminatis angulatis basi subcordatis supra hirsutis subtus dense tomentosae et pedunculis (fasciculatis lateralibus) calicibusque (coloratis) molliter aculeatis, baccis globosis hirsutis malice inclusis (accedit ad *S. ierrox.*).

Crssciti in humidis spontaneuin ct in korlis cultmu.

Floret: to to anno.

Noinem Ka/ondong; Krcmdoug Sapie,

'SOLASTUM TROXGUM, Poir.

S: caule sufTruticoso aculeato, foliis sinuato-pinna-ti/idis (lobis acutis) supra ramuliscjue hirtis utriu-quc calicibus([ue acuieatis, Uoiibus sohtariisj baccis globosis,

Crescit: locia apricis.

Floret: fere cmni ternpore.

Nomcn: Karondong.

SOLANUM PSEVDO-SJAPONACEUM, BL

S: caule acuicato fruticoso, foliis alternis geminisve sinuato-angulittis basi inaequaiibus supra glabrius-culis subtus tomentoso- (pilis stellatis onnimis) pulverulentis, corymbis lateralibus dicbotomis f fioribus secuijdis (a *S. saponaoeo* Duu, vis. dif-ferrc videtur).

Crescit: iii rnderatis.

floret: omni fare temno^e, -

Noinen: Tukikkaj Magay.

DATURA, Lhm.

Calix tuLnoso-veutricosus, quiiqueficiis_f deci-
tus; besi orbiculari pcrsistento. *Corolla* iufaiidi-
bulUurmiii; liubo pljcaig > aujulalo-cj^uincjiie-auL dc-

ecnidcntnto. *8lamina* quinque, pnrum cxserta; *an-*
th^{ft}ris Joigitiidinaliter dohisceiUiS^{us}. *Stigma* sub-
 Lilobum. *Capsula* biloculnris (loculis bipartitis),
 quad rival vis, plerunuje muricato-ccbiiata, *Semina*,
 Tcniformia.

DATURA METEL, Linn.

D: foliis ovatis basi obliquis subangulato-dentatis et
 calicibus basi inflatis tenuiter pubesoentibus, la-
 •iniis calicis longiter acuminutis meuibraaaceis.

Cresclt: in nideratis et in hortis.

Floret: omni tempore.

Rome11: Kitjubung.

DATURA FASTUOSA, Linn.

D: fcliis ovato-oblon^{is} subangulato-dentatis calici-
 busc^{uc} cjliudraceis glabiis, laciniis calicis ~~sch-~~
 miniat s incrassatis.

CrercU: cum priori.

Floret: codem tempo-c.

Nomenz Kitjiibung; *Kitjubon*.

LYCOPERSICUM, DmiaJ.

Cal/x quinque-aut sex parti tus , persistens. *C-*
rolia rotata; iioibo qiiinqiic^{aut} sexfido. *Slamina*,
 quiuquc. *Antherae* conicae, nieinbrana npicc elon-
 {ata connate , in tus ioiitudinaliter dejiscentes*
 •*iSacca* bi-aut tnlocularis, *Scmina* yillosa.

LY-

LYCOPERSICVM HUMBOLDTIT, Dun.

L: pilosum, pilis diversis, foliis inaequaliter pinna—
tisectis, segmcntis incisis, subtus glauccsentibns,
pedanculis pediccilisque ehrncteatis, laciniis call-
cis corolla duplo. brevioribns.

Crescit: ci-ca Bnitenj'org in ruderolis.

Floret: omni lempove.

Nomcn: Leuntja Kauier.

CAPSTCVM, Linn.

Calfx urceolatus, quinqm.'dentatus, persistcns. *Co-*
rolla rotnta; limbo plicato, qiiinqucrido. *S'nmina*
quinquc; *aniheris* conniventibus, longitudinaliter
clcliiscentibus. *Stigma* obtusum. *llacca* cxsucca ,
inflata, hi- rarius trilocularis, poljsperma. *Seminch*
cotnpi'cssa.

CAPSICUM FRVTESCENS, Linn,

C: caule fruticoso erecto, ramulis flcKuosis suban-
gulatis puberis, foliis ovato-lauceolatis petiolis-
(margin'e interdutn ciliolatis)-que glabris, pedun-
culis subsolitariis cernuis, fructibus oblongis ob-
tusis.

Crescit: in liovlis et ad sepes frcqucntissimum.

Floret: omni tern pore.

Nomen: Tjabe bezaar.

*CAP**

CAPSICUM BICOLOR, Jacq.*Variet. incurvum*, Bl.

C: caule fruticoso divaricato, ramulis flexuosis angulis puberulis, foliis ovato-lanceolatis petiolisque glabris, pedunculis subsolitariis, iructibus oblongis acuminatis incurvis peiidulis.

Crescit: In horis Cliveusiuui cult am.

Floret: omni tempore.

Nomen: Tjabe Wungoh.

CAPSICUM FASTIGIATUM) Bl.

C: caule frutescente, ramis fastigiatis tetragonis sensibiliusculis, foliis ovato-oblongis glabris petiolisque ciliolatis, pedunculis i.e superne recurvis, calice obsolete dentato, fructibus oblongis obtusis (parvis) strictis (a(T. 6\ sinensi, Jacq.).

Cretat: in hortis et lopis incultis.

Floret: toto anno.

Nonwn: Tjabe rawiet.

PHYSJLIS, Linn.

*Calix urceolatiis, quinquefidus. Corolla campaw nulato-rotata, quinqueloba. Stamina quinque. Antherae conniveentes, longitudinaliter dehiscentes. Stigma capitatum. Bacca calice inflato augulato membrauaceo iucrmi tecta, bilocularis, polysperma**

PIIYSJLTS PSEUDO-ANGULATA, Bl.

P: caule diciotomo, ramis strlatis petiblisqiiie puberulis, foliis ovatis repando-dentatis basi inaequangularibus, 11 orib us soli tärns, calicis Jaciniis acumiiia-tis, corollis campanulatis.

Cruscit: in montosis Seribu locis cultis.

Floret: Februario, etc,

Nomen: . . . ,

NICOTIANA, Linn.

Calix tubilosso-campanulatus, quinquefidus, persistens. *Corolla* infuqidibuliformis aut hypocvateriformis; limbo plicato, quinquefido. *Stamina* quinque; *Antherae* longitudinaliter debiscentes. *Stigma* capitatum. *Capsula* bilocularis, apice bivalvis, valvis bipartilibus. *Semina* minuta.

NICOTIANA CHINENSIS, Fiscb.

N: caule suffruticoso, foliis petiolatis ovato-oblongis integerrimis, corallae fauce inflato-veutricosa, liuihi laciniis acutis.

Crescit: in Java ciulta, sed forlc ex regno Cliinensi introducta.

Floret: per totum auuuin.

Xfo/nen: Tambakko.

LYCIUM.

Calix brevis, campanula to-tri-cpiinqucGd us, per** sistens. *Corolla* infundibulifonuis, fauce clausa villis filarnentorura basi tauiidorum; limbo profunde quinq

que-

qucfido. *AntJiera*e introreum iucumbentes, has! CDarginatae. *Stylus* cxsertus. *Stigma* obiusum, de~~*~~ pressum. *Bacca* b&locularis, polysperma.

LYCIUM CHIKENSE ? Mill.

L: caule ramisq[ue] dcpendcnibus striads raro spinosis, foliis p[er]tiolatis obovato-oblongis obtusis (rarius acutis), calicibus 2-5-dentatiis, stylo staminibus vix longiorc. (frutex l'aniosissimus, S ped., ramis patcntissimis, globris, spinis rarioribus. Folia brcvkca¹ petiolata, glabra. Podunculi solitarii vel fasciculali 2-5[^] foliis brcviorcs. Flores pallide purpurci, centro Stella Candida, extus rosati, post antbesin pallentes. Calix bin;vis, lubulosns, ore irregulariter 2, 5-5-fidus. Corolla iirfundibuliformis, limbo pa tent e ^-tido, laciniis obtusis, tubo aequalibus. Stamina laciniis corollae vix acqualia, basi villosa. Ovarium ovatum. Stylus filamentis parum longior; an rectius igit[ur] ad *L. Jj'rewianum* ducendum?)

CrescU: ex Japouia et China allahun.

Floret: toto anno.



Genus *solanaceis* acccdens.

COTYLANTHERA, Bl.

Calix campanulatus, quadriodus, persistens. *Co-*
Tola liypocrateriformis, quadripartita, marcescens;
laciniis aequalibus, patentibus. *Stamina* quatuor,
acqualia; *Jilamcnla* brcvia, lata; *antherae* cohni-

Ventes, apice poro unico dehiscentes. *Stylus* b'snlcas. *Stigma capita turn*, dupressura. *Capsuia* ovfitoglobosn, bilocnlaris, poljsperniu. *Dia&epimenta* cai>uosa, **atrinque** inflexa.

Herba earn OS a inter minorcs, radicibus arborum
Jnnnsceiis, senpo tercti nplijllo subraJiioso liinc illinc
stipulis **parvrs** geminatis **instructor pedicel!**] solitnrū
aut **geminati**, jnodio bibractati. **Flores** dilute cac-
ruluscuntcs,

COTYLINTHERA TESUIS.

Crescit: iti nmbrosis montis Menara.

Floret'. Marlip, etc,

Nomen:



CONVOLYULACEAE.



IPOMOEA, Linn.

Calr'x qurnqnopartitus« nudus. *CnroVa* campanula vcl **infandiboliforniis, quinqaeplicata.** *Otfarium* Li-scu **trilocalare**, loculis dispennis. *Stylus* indivisus. *Stigma* capftn to-simplex aut a-5— lobuiu. *Capsula* 2-5-locularis, loculis i-a-spcrmis.

IBOUOE4 QUAMOCLTT, Linn.

I; foliis pinnati-suctis, **segrnentid linearififormibus** decurrentibus, pcdiuuciis sujuniiloris iulio **vix longioribus.**

Cres-

Cretcit: in Iiortis vnlgatissima.

Floret: onini temporo.

Komenx Katilan.

***JPOMOEA PAVICULATA,* R. Brown;**

/: foliis palmntis glabris, lobis sabscptcnis ohlongo-lunceolatis acnmiiiatis inte[^]ris, cynn's dicbotoniis folio su');!eqaali!)iis, se[^]mentis calicinis obtusifi subaequulibus (flores dilute pui[^]uroi).

Crencil: f.(rte e Moluccis inlroducta.

Floret: Novembri; A>rīi»

.*Women:* • . • • •

***IPOMOEA PES TI3RTDIS,* Linn.**

/: pilosa; foliis pal ma to-sec tis, lobis oblon[^]o-lnn-ceolatis, capitulis peduuculatis iuvoiucratis (*co-*rolla Candida).

Crescit: in graminosis freqtiens.

Floret: toto anno.

.*Women:* • . • • •

***IPOMOEA riTlFOLfA,* Bl,**

. foliis sabrotando-cordatis 3-5-Iobis, lobis acutis r[^]pandis, panicnlis axillaribus foliosis, pcdiecllis su!)U!iibcIIiitis seçi[^]iidis calicibus(j[ue sceti[^]cri\$ (tlo-ix\$ sulpliurei).

*Cres-**

Crescit: in fruticclis Imniidis praecipue in argfflosis
et calcareis.

Floret: iolo anno.

Women: Aroy Kawa-jang,

Tariat foliis pilosiusculis et glabriusculis.

IPOMOEÀ HEDERACEA, Linn.

JT: pilosiuscula 5 foliis cordatis trilobis, lobis latera-
libus aculiusculis, in termed io ncuniinato, pcdun-
culis 1-2-floris, calicibus pilosis, scgmcntis Ian-
ccolato-aciuninalis patculibus, capsulis erectis tri-
locularibus, c.iulc obverse bispido (coroHac tu-
bus infundibuliiormis, alb us ^ liinbo patente cae-
ruleo).

'*Crescil:* ex China introducla.

Floret: omni Icjuporc.

JWomen: . . .

IPOMOEÀ TRWHOSPERMA.m.

I: foliis cordato-trilobis glabris, lobis ovato-oblon-
gis acuminatis lalorolibus interdum angilatis, pe-
dunculis axillaribus uiifloris petiole brcvioribus,
segmentis caliciuis obtasi.s subpubcscoiiubus, tabo
coroHac longissimo viavato, cauiu incrmi (*off** I.*
longijlorae , liumbdt.).

Crescil: in convallilms liumidis circa *Laitenzorg*.

Tlweb: fere per totiun annum,

Nomen: , . , ,

IPOMOEAE TJMoltEXSIS, Bl.

T: villosiusciila; foliis cordato-oblongis integerriniis sublobatisye, pedunculis solitariis 1-2-floris folio brevioribus, laciniis calicis uilosis tribus exterioribus latioribus subcordatis acumiuatis»

CrescU: in insula Timor.

Floret: omni tempore,

Nomen:

*IPOMOEAE**BRACTEATJ4,*

VabL

T? foliis cordatis mucronatis subintegris vel subtrilobo-hastatis glabriusculis ciliolatis, pedunculis unifloris folio subaequalibus > segmentis calicinis exterioribus bracteii'ormibiis, caule pubescente (Limbus corollae albidus; tiibo inferne atropurpurco).

CrescU: in montosis Parang.

Floret: omni tempore.

Nomen: • • . •

IPOMOEAE LUTEOLA, Jaccj.

/.• caule scabriusculo subangulato, foliis subrotundato-cordatis acuminatis subangulatis, j^edunculis elongatis racemoso - bifidis, calicis angulati laciniis linearisubulatis (flores coccinei).

CrescU: in rudei'atis.

Floret-, toto anno.

Noinen' Ajong Ajong.

IPO-

IPOMOEA BOS A NOX, Linn/

It glaberrima; foliis subrotunilo-cordutis acuminatis integerrimis aut interduin subangulntis , pedunculis i-5-floris elongatis, floribns secundis, calicibus mucrouatis , tubo corollac elongato ciliindmceo-, caule tercti muricato (corollae limbo candido, radio et tubo vindibus).

CeuU: ad ma giucs fliivioruin inter frutices.

Floret: fee ;ei- lolum aiuimn.

Nome a: Ku.ulik.

IPOMOEA BATATAS, Poir.

I: caule repente luberoso , foliis subrotundo-ovntid profuade cordatis saepe angulatis nervosis laevibus (mrgine ciliatis) pedunculis clon^atis, floribus fasciculatis, calicis glabriusculi lacuiis oblongis acuminatis, covoIJa campanulata ((lores nuc pallide purpurascens, tune candidi).

Crescit: in hortis culta.

Floret: fere to to anno,

Nomen: Obie; Obie Java.

IPOMOEA RADICANS_H Bl.

I: foliis cordatis aristatis integris angulatisve ad costam utiinque pubcris, pedunculis biidis multiiloris, segmciiitis calicinis rotundato*emarginatis, caule in ft rue repeute villosa (all'. / . *bijUae* / flores sulphurei }•

Cres-

C'e.tc't: in gi aminoais. humidis circa B^tavIauZ,

Floret: forte onmi lempore.

Nomen:

IPOMOEA LITTORALIS, •BL

I: c.iule repeutc, foliis suhrotundo-cordatis errtar-i
· giuatis cum mucronulo suban^ul:itis mavglne ci-
liolatis, pedunculis solitariis unifloris, segmentis
caliciuis cuspi(lat'S exteviorihus brevioribus tvecto-
pctentibus (flores lilacini, in fiindo purpuiMScentes):

Cresctii in sabnl<vsis inariliuiis Javae et **Nusa~~e~~**
Kainbangae.

Floret: omni tempore.

A'omeu:

IPOMOEA REPENS, Roth.

./• foliis sag'ittato-v. hastito-lanceoiatis mncreohulatrs
interdum angulato -dciiitatis inferioribus linear-
lanceolatis laevibus, pedunculis 3-4-floris^ late-
ral i bus longe serioribus, segmentis calicinis oblon-
gis acutiiisculis, caule repente - fistuibso (flores
purpurei, ad faucem pallidc lilacini }•

Crescit: in palndibns et gyaminosis circa Bataviam^
Builenzorg, etc.

Floret: omni fere temporc.

Nomen: . < . *

IPOMOEA A-STCEPS, XM.

/: foliis **cordato-oblongif** (plan tie [ontORi siiSi' o- f
tmitlo-ovatis prouLtidc-coLtlaLts et obtu&ioribus)
aristatis intcrdivn s uuatis **glabrmscitlis, pcdnnncnlis**
subtriflorts putiolor:im loagitiidme, laciiiiis cali-
cis (**hiaooaa exteiioribus** ova da **bracteiforuiibas** ,
CatLO 1-^-;;j;io alato (fl)i'cs albi).

CreacU: in limosii prope Tjikao Piorinciae **TjwJOR;**
ciiT-i **Tagal** etiam **freqticas.**

Floret: omui tcinporc,

No.'nen: . . . * •

IPOMOEA REPTA \\$, Vo'w.

It foliis h.nstnto-lanceolali's obtuse-acuminatis cum
jnucronc Jacvibus, radicalibus **triangtilaribos**, pe-
dnnctdifl uiiilloiis pctiolo brevioribtts , laciniis ca!i-
cis oblongis obtusis, entile rcpentc listnlos (corol^
lac tubo jMn*pui*<^>, liial)o albicante).

CresCH- in ht im id is i'io;i Houipietii

Floret: oaitii teinporc.

Nomen: Kangkung.

IPOMOEA SETOSA, BI.

I: foliis coi-datis v. s:ibhastnii>- cordatis acuminnti?
iutcgen-imis supra pubescentilms **infra villosioa-**
cSilis, **pctfanctdis** pstiolo **stibaef|tialibas** 1-2-flo-
ris, **segmentis ealicinis** lincMri-lanceolatis **ftenmi-**
Jiatissiints sc tigeris, cauie obverse pilosiusoula
(UOt'CS plHM'UMSCCUtCS).

Cres**

(γxS)

CrescU: in frulicells montanis.

IVoret: forte omni tempore.

JYojtien: . . * . •

IPOMOEA MALABARICA, Linn.

J: foliis cordato-ovalis acutis lnlcgemtnis^floralibus
interclum subbnstatis supra ^labriusculis ciliohilis
infra pctiolisque subpubescentibus , ppdunriiiS
axilla rib us clongnli? npicc l-J^flwr̄is, segniculis
calicinis c\terioril>us ovatis braetcaeformibus flo-
ws ocbroicuci, in iunclo plerumtjue alro-j)urpurei\

Crescil: iij . ca cards Pruviciuin JBuilenzorg ap
• **Bantam.**

Floret: lolo anno, Icmpore vcsj)ertinc»

Nomen: . • • •

IPOMOEA ACULQATA, Bl.

I: g]abra; foliis subroluiido-cordatis aruminatissimis
integerrimis, pcduiiculis axillaribus puliolo brc-
t'ioribus incrassatis uinfloris, seamentis calicinis
ro tmida tis, tubo corollae elongato , caule in feme
triquectro aculcuto (aft /. *tubocosaei* Jinibns W
rollae albicans : rádio viridi)•

Crescit: in frniicEli3 montiun Parang Provinciae
Tjanjor.

F/oret: Julio, etc.

Nomen: . • • •

IPOMOEA

IPOMOEAE PULCTIRA, W.

J: foiiis covdfito-ovatis mucronuiatis integerrimis supra laevibus infra pubarnlis, pedaneulis ffiiliari' Jms solitarils unifloris petiolo Btibaeqaalibus, segmentis calicmis roLundalis sti!>soriceis corolla ampla , i^uKli'juliforaiis, pnrptirasceas).

Creicht: n\ insulis Muluccauis.

Floret', omni tem;)Ofl,

JYogen:

Varirf,: foiiis acuminatis cum raucroue, ~~pedunculis~~ petiolo longioribus.

Crescti: in insula Timor.

IPOMOEAE LfLACIVA, hi

J: foiiis corflatis acuiranalis cum mucrone supra pti* besceuUbus subtua moNibus, pcduuculis petiolo subaei|aakbus apice a-l-iloris, segnuuiLis cali<is acutis pubtsceiitibus (afT, J, getneitae} Rolli.; flores lilacini \

Crescit: in graniinosis uligiaosis BaUiae,

Floret; omtii tempore.

JVumeii: • • « •

IPOMOEAE INSUAVIS, Bl.

J: foiiis subrotundo-cordatis acuminalis ^labris mar-gine ciliolalis, pcdtinculis unifloris soiitariis folio ~~subaequalibus~~, scf nit;a us callciuis ~~subaequalibus~~

pcmis, canle Iiirsuto (aff. *F. nhscurae*[^] florcs al-
l>iji, ia fundo atro-purpura).

C etctt: circa Buiterio:g fi'efjicns.

Illore! : loto anno.

JVomen: Aro.3" Ki - Kalindan.

***IPOMOEA SPECIOSA*, Linn. Cl.**

/.* foiiis cordato-ovntis mucronatis integerrimis su-
pra laevibus subius costatis ct dense sericeo-laiiu-
ginosis, pcdunculis axillaribus capitato - muhi-
floris (flores extu3 sericeo-tomeutosi, intus vi-
lacci).

Crescil: ia liorto botanico Buitenz. colitur.

Floret: per totum fere auiuin.

Nomen:

***IPOMOEA TRICHIOTOSA*, Bl.**

J: pllosissiroa; foiiis corda[^]o-ovmis acumiuatis inte-
gerrnnis paralielo - venosis , pcduiiculis pctiolo
loigioribus, floribus unibellatis involucrntis, se[^]-
rrieit.tis calicis lanceolatis acuminatis et corolla
extcrue sctis longis hispidis (ail. /• *captiaiaej*
corolla lilacina).

Crescti: in montosis Paiang[^] Salak, etc,

Floret: onini tempore.

J\o/nen: aroy lumih.

(7 * 8)

IPOMOEA VE.RRUCOSA, B!

/.• foliis cordato-ovatis acutis ciliolatis Incvihus, pcr dunculis nxillaribus elongatēs incrnnssatis umbel!i-floris , sejpnentis caliciuis ovalibus subacqu.»H-bns exterioribus verrucosis, caule volubiii pu-^ besceifle (flores atro-purpurei, limbo lilaciou),.

GvtcU: in paluiibufi prope Lalaviam,

Floret: tolo anno.

Nouien:

Jariet.z foliis maculatis.

IPOMOEA JMOEXA, BI

/.- foliis subrotiuiJo- cordalis acuminails' Intcgerrri-* mis utrinque mollissimis, pcdunculis clon^atis c\rnoso-niultifloris ^ segmeiitis cnlicinis lancco* latis acuminatissimis pcitcnjibus extrioribus majoribus (corolla purpurea).

Cresvit: in Moluccanisinsulis,lmnc etiam in lioile Cot. Euiteuzorgii culta. .

Floret: Novenibrij etc.

Nomen:

IPOMOEA BTFWA, Valil.

JI* foliis cordato-oblongis ncuminatis cum mucronc iiitegerrimis subtus sericeo - pubescentibus , pendunculis bifidis dichotomiſve nullifloris, pedicellis socundis , segmentis calicinis rolnudato* inucronulatis ^flores p;dlide iluvescuilcs).

Cres-

(7*9)

Crescit: lit frul'celis montanis.

I'loret: omui tempore.

Nomen: aroy Jutun.

*Synon** *L. cynzosa* milii. Catr Ilort. Bot. Buitenz. p. 50*

*Variet** *a:* foKis corctato -» obl*>ng!s obtuse acuflii-natis cum mueroue atrinquiu sei'iceo-mollibus.

Crescit: in montanis Parang.

Variety h: foliis glabriusculis*

Crescit: cum priori.

Variet. c: foliis cordato - lanceolalis sericco - mol-* Kbus.

Cresciti in calcareis Provinciae Tjanjor,

IPOMOEA NYMPHAEFCXLIA, Bl.

JT: foliis snbrotimdis cum acumine subulata peltatis (excep*tis* "flornibus) fnsi emargiiTatis aut subcordutis subrepandis glabris subparallclo-venosls, pediiQculis biOdis multiiloris_f segmentis caticinis oblusis mwcronuktis_y corolla campa-* i».u]ata (flores sutplnivei)*

Crescit: in fnticetis montanis et *hi* convallifaus unibrosis circa Luitonzorg,

Floret: omni tempove.

Nomeni aroy Tjaroi - uang.

IPOMOEA

IPOMOEA MARITIMA, R. Brown.

J: rcpns, glaberrima; foliis sul)rotundis emnrginnr
tis bilobisvc coriaccis basi sublus biglandulosis,
pedunculis uni-multiflorisve axillaribus, calicinis
segmentis obtusis mucronulatis extrioribus brcvi-
oribus (corolla violacea, in fitndo purpurnsceus).

Crescit: in ma-Uinils insularatn Javao, Nusae Kam*
bangae, etc*

Floret: to to Piino.

Rorneni Dauwn Calfarrt.

IPOMOEAE REISIVARDDTTAVA, BI.

jf; foliis eiliptlc-o-oblongis acuminatis bas^rotundatis
integcrriniis supra laevibus suhtus pubrris, pe-*
dunculis pnuciflorfs axillaribns petiolo breviori-
bus, segmentis calicinis obtusiusculis scriceo-vil-
losftsculis tribus extcrioi'ibus magnis.

Crescit: a CI. Reiuwa^lt sub nomine *Convo'h'uU*
QVAU acceleji ex insula, Timor*

IP OMOEA SER ICE A, til.

/: foliis ellipt'co-oblongis utrinque acutis Integcrrini-
mis pnrallelo-vénosis supra pube adprossis infra
sericeo- velutinosis, umbellis pedunculatis axil-
Liribus sollti:riis petiolo brevioribus, segmentis*
calicim's o!)tusis scriceo - villosis . (corolla lilacina,
externe sericeo-villosa)•

S^aou. *Cotwoivulus hericeus* Linn*

Cres-

Crescit: in sepibus et ad ripas fluvloriu vulgatissiina.

Floret; omni tempore.

JYomen: Aroy Kujapuli; Tatapajan.

IPOMOEA FILICAVIJS, Bl.

/.* foliis linear-lancollatis mucronatis hasi nuricu*
latis dentatis, pedunculis unifloris, laciuiis oali*
cinis acuminatis.

Crescit: ad ripas iluvioriujii

Floret: fere omui tempore.

Nomen:

Synon. *Convolvulus filicaulis*, Vahl.

IPOMOEA UNIFLORA, Burm.

/.* foliis lanceolatis emarginato-mucronatis, jiedun^
culis clongatis unifloris, segmentis calicis exter-
oribus dimidiato-ovatis magnis (flores albi).

Crescit: in fruticctis uliginosis circa Bataviaiu*

Floret: omni tempore.

Nomen:

IPOMOEA LINIFOLIA, Bl.

/: piiösiuscula; foliis linearibus integerrimis utrin-
nue obtusis mucromilatis interdum bns! subbas-*
tatis, pedunculis axillaribus folio subaequalibus
pauciflorii>₃ segmentis calicini obtusis glabris,

Crescit i in Molii^cis.

Floret i toto anno.

Nomen:

LEP2STEMOX, BL

Calix (juinquesepalus; scpalis campanulato-coi¹⁻niveutibus. *Corona* tubulosa; tubus medio inflatus, fauce coarclatus; limbos quinquclobus, patens. *Stamina* cpiinque, inclusa, s qua mis foi'riicatis con*i* u von lib us ad basin instructs. *Stylus* i. *Stigma* capi-Utum. *Capsula* biloculjtrU, loculis dispermis.

Genus proximum Ipomoeae, cui differt forma coroliae et **structura** slaminum.

LEPI8TEMON FLAFESCEVS.

Herb a pilosa, caule **volibili**, foliis cordato-ovatis iotegerrimis trOobisve, cymis peduncalatis axillaribus densifloris potioio brcvioribus.

Crencit: in fnilicetis **inontosis*** •

Floret: tuto tiniin,

fflomen: • . • *

BREIVERIJ, Rob. Br.

Caiix cjuinqcupartitus. *Corolla* infundibuliformis, pHcata. *Slyii* duo, **indivisi**, b;iii subconnati. *Stigmata* capitata. *Capsula* valvaia, loculis dispermis, caiice baud mutato **cincta**.

JlREFVERIA CORDATJ,K\.

1\$: torncntosa; foliis cordatis acaminntis villosis, pcdxmculis npico umbeJlata-j-^floris, segmentis cal•ciuis **acuminatls**, duubn\ t^tu'oribus majori-LUK, stj iis **tnaequalibus** basi couiiatis (aff. si. *J> anno me Tu Bx*).

Cre-

Crescit: circa Buitenzorg.

Floret: omni fere tempor*.

Nomen: • • • .

PORAVA, Linn.

Calix qm̄nquesepnlus; *sepalis* pcrs'stcntibus, in
fructu majoribus. *Carol.a* oampanulata, profumlg
C[u>ii(juetida, calicc lougior. *Slamr/tia* quinque 5
jilAm-nta iaacqualia; *antherae* rcniformcs. *Sty~*
lus profuude bipartitus ; scgmeutis cipillariluis ,
inaecjualibus- *Stigma/a* capitota, *Capsula* bilo-
cularis, bivalvis, loculis disj>ennis,

PORASA rOLUBLIS, Linn.

P: caule fruticoso volubili, foliis ovatis obtuse acu-
minatis basi interdum subcordatis intcgrrimls
glabris y paniculis term'nalibus axiliaribusque fo*
liosis elongatis.

Crescit: circa Bataviam ad vias.

' *Floret:* Junio, etc;

Nomen: • . • r

Variet. P. Burmanniana: foliis cordatis longlter acu-
miiatis cum mucronc.

Crescit: in Moluccis.

Floret: Au^nsto, cLc,

Kcmen: • . • •

COX*

CONVOLVULUS, Linn.

Calix quiftquepartitus, nudus aut bibracteatus. *Corolla* iufundibuliformis aut campanulata, quinqueplicata. *Oifarium* bi-rai*ius triloculare, loculis disperinis. *Stylus* indivisus. *Stigmata* duo, subulata. *Capsula* 1 - 2 - rarius 3 - locularis, loculis 1 - 2 - spermis*

OOSFOLFULVS PARVIFLORVS, VaM.

C: foliis cordatis acuminatis glabriusculis, pedunculis subumbelliflo'is dicbotomis villosis, segmentis calicinis exterioribus majoribus.

Crescit: ciica Bataviam.

Floret: Majo^ etc.

Women:

Variet.: foliis utrinque sericeo-pubescentibus.

Cresclt: Circa Tjikao Proviiiciae Tjanjor.

EVOLVVLUS, Linn.

Calix quincpepartitus.. *Corolla* subrotata, quinquelida, plicata. *Ovarium* biloculare, loculis dispermis. *Slyli* duo, biparliti. *Stigmata* simplicia, *Capsula* valvata,

EVOLVULVS JAVANICUS, Bl.

E: foliis lincarl-laiiceolatis sessilibus sericeo-villosis, pedunculis 1-lioris medio 2-bracteolatis loiigitudiiie folioruin, caule iufeme liguoso.

Cres-

(7*5)

Cre&clt: in snmmo montis ignivonii CoJrt.

Floret: Februario, etc.

Nomen'.



Genus ad Familiam Convolvulaccarum accedeus;

HYDRO LEA, Linn.

Calix quinquepartitus, pcrsistens. *Corolla* rota-*' to-campanulata; limbo profunde quinque-aut Sex-septemlido , patente. *Stamina* quinquu rarius sex y plerumque inclusa. *Filamenla* basi dilalata. *J/4n-therae* sagittatae. *Slyli* duo, rarius trcs , divaricU:. *Slisrimata* obtusa. *Capnula* ovata, bi-rarius trilocularis, Li-rarius trivalvis, sciniuibis minutis utrinque rccepiaculum lichenisphaericum carnusum obte- gentibus.

HYDROLEA JAVAIXICA, BL

i/.-incrnis; foliis linear-lanceolatis supeine tennl_a- sime ciliatis, pedunculis racemosis foliosis caK- ©ibusque glauduloso-pilosis. (//. *zeyianicae* ni- mis afliiiis)«

Crescii: in paluclibus et oryzetis circa EataYiam, Bai^ tenzoig, elc.

Floret: Juilio —— Angus to,

Noinsn: . , •

C A Mi

C A M P A N U I A C E A E.

CAMPANULA * Linn.

'Calix ovario superne adnatus, quin<jue-rarius qua-dripartitus. Corolla campauulata; limbo quihqueii-do, rc^ulnri. Slamina quimjue, libera; tilamcutis him dilatatis. Stigma tri-aul bifidum. Capsula tri-aut bilocularis; foratniuibus lateralibus dchisciis. Semina creberriina.

CAMPANULA *LAVANDULIFOLIA_f*
Herb. Rwdt.

C: caule filiformi angulato stria to, ramis 1-3 floris^ foiiis scssilibus liuclearibus obtusis obsolete remote scrrulatis, floribus (juincpeGdis, corolla ovariunn parum supcrante (ana C. graciji satis distincta?)

Crescit: in uiontliis orienta.ibus Juvae insulae.

Floret: Januario, etc.

CAMPANUMOEA, Bl.

Calix ovario inferne aduatns , quinqncpartiLu^.
'Pelala quinque, mnrgini ovirii inscrtta. Stamina quinque, libera; Ji lament is. subulatis. Stigma tri-lobum. Capsula trilocularis, muitivalvis. Recetptacula centralia carnosa, utriu(|uc inflexa, Semina creberrima.

Hcrbae scandentes, lact^scmes, radicibus tuberosis, foiiis opj>osiūs, peduacuiis axillaribus terminalibusve,

CAM-

CAMPANUUOEAE JJVANICA, BL

C: foliis loiigiter pctiolatis cordate-ovatis deuticulatis pubesceudbus, pttidunculis axUlaribus uiiloris.

Crescit: in sylvis Immidis montium Salak, Gedc, e!c.

Floret: tolo anno.

CAMPASSTMMEA CELEBWA, BL

C: foliis brcviter peliolatis oblongo - lanceolatis scr» rulatis infra sub lo men to sis, floribus subcor-yrbosis tcmiiij^libuSt .

Crescit: in Celebes*

Floret: omni tempore.

**L O B E L I K E A,***LOBELIA , Linn.*

Calix quinquefidas. *Corolla* tubulosa.; tubo bine longitudinaliter li-sso, raro iiiLcgro ; limbo (juinquepartito , subbilabiato. *Anther* an coimatae. *Stigma* bilobum, aut indivisam. *Capsula* bi-rarius trilocularis, npice loculicido-bivalvis. *Semina* crccberrinia.

LOBELIA NUMMVLAKLA, Lam.

L: caule herbaceo icppiitc villosiusculo, foliis cordato-subrotundis mucronulato-dentatis, peduneiis axiiiajibus uniiloris ioio vix loDgioribus.

*Crcs-**

Crescit: in humidis montanis.

Floret: omiii tempore.

Nomen: Tankal SaucL

***LOBELIA SUCCULENTA,* Bl.**

L: caule herb a ceo repente subramoso , foliis petio-
latis ovatis (basi parum attenuatis) mucronulato-
dentatis, pedunculis axillaribus unifloris folio vix
aequalibus, laciniis calicis inaequalibus ciliatis
(aiT. L. Zeylanicac).

Crescit: in graminosis circa Buitenzorg.

Floret: oumi tempore.

Nomen: . . • •

***LOBELIA MONTANA ,* Herb. Rwdt.**

X; caule herb a ceo procumbente ramoso teretiusculo ^
foliis oblongo-lanceolatis acuminatis argule-scr-
ratis glabris, pedunculis axillaribus solitariis uni-
floris folio diniidio brcvioribus (aff. *L. purjju~rascenli*, R. Brown)

Crescit: in sylvis montanis lmmidis

Floret: omni tempore.

Nomen: . • • •

***LOBELIA UEYNIANA,* Rocm. et Sdi.**

Variety: caule herbacco filiformi alato-triquctro f"
foliis subrhomboido-ovatis duplicato-serratis de-
curreniibus basi iiHegerrimis utriii<ue calicibus-

<juc

quc setis pubescentibus T pedunculis a*xillaribus
uuifluris folio subaequalibus.

Crescit: in montatiis.

Floret: forte omni tempore*

Noinen: . . . : .

LOBELIA TETRAGON A, BL.

£: caule herbaceo tetragono erecto, foliis ovatis obtusis basi subdecurreutibus sinuato-dentatis gla-Lris, raccrao elongato terminali (aff. L. uicotiaui-i'oiiae, Both.)•

Cresciti in pauidosis montis Saiak*

Floret: Junso •••* Augusto, etc.

Nomem . . . • .

LOBELIA CAESPITOSA, BL

X; hcrbacea ; caule tetragono diffluso procumbentc, foliis sessilibus (parvis) oblongis obtusis superne denticulatis laevibus, pedunculis axillaribus elongatis iiuifloris (aff. L. trigonae, Roxb.).

Crescit: in graminosis ad pedem montis Gede,

Floret: fere Loto anno.

JWouien: • . • •

SCAEVOLA, Linn.

Calix quinquefidus nut partitus. *Corolla* tubulosa, hinc longitudinaliter iissa; limbo inde secundo, qniquefido, laciniis marginatis aequalibus* *Antherae* liberac. *Stigmatis* iidusium ciliatum. *Drupa* baccata, nucJeo i-4-locularc, loculis monosperniis*

SCAEVOLA PLUMIE ft T, Linn.

S: cymis bis dichotomis foliisque glabris, floribus dichotonianim pedicellatis, calico quinquepartito ovarium subaequante, foliis obovatis pergamaceis integerrimis ramisque glabris.

Crescit: ad littora insularum Javae et Nusae Kambangae.

Floret: toto anno.

Nomen: Poliodoëlang.

SCAEVOLA KOENIAIL; Vahl.

S: cymis (sub) bis dicbotomis foliisque glabris, floribus dicbotomiq^{um} pedicellatis, calice quinquepartito ovarium aequante. foliis obovatis apicem obsolete repandis membranactiis ramisque glabris.

Crescit: cum praecedeiiti,

Flotet: omni tempore.

ISomen:

SCAEVOLA SERICEA, Forst.

S: cymis bifidis, floribus ^icbotomiaruin pedicellatis, extus tomentos, calice quinquepartito ovarium aequante, foliis obovatis apice obsolete repandis pergamacei* ramisque tomentosis.

Crescit: ad lit tora Insulae Nasae Kainbangac.

Floret: omni tempore. *

JNomen: . . .





BIJDRACEN

TOT DE

F L O R A

VAN

NEDEKLANDSCIËN INDIË.



B I J D R A (& E N
TOT DE
F L O R A
V A N

Reeds op den
1^{ste} Febr. 1826.
NEDERLJNDSCH INDIË,

UITGEGEVEN

DOOR

C. L. BLUME, M. D.,

COMMISSATUS VOOR DEN BURGERLIJKEN
CENEESKUNDIGEN DIENST, DIRECTEUR
VAN 'S LANDS PLANTENTUIN TE
BU17ENZ0RG, ENZ.

14de StuL

1; ^ T A V i A t

TEH LANDS DROKKERU.

1826.

B I J D R A G E N
T O T D E
F L O R A .



S Y N O P T I S C H E B E S C H R I J V I N G
vau ecnige planten, behoorende tot de familie der
Plantagineen, *JSycfaginerrij* *Plumbagineën*, *Pri-
rnulaceën*, *Lentibularieën*, *Hinanf/iëen*, *Sew-
phularineen*, *Bignoniaeeën*, *Sesameën*, *Acan-
thaceën*, *Verbenaceh'n*, *Labiateën*, *Boraginehi*
on *Qentianeeñj* op eene, in de jaren 1820—1824
gcdanc reis over Java, waargenomen en bcschrcvcn.



P L A N T A G I N E A E .



PLANTAGO, Linn.

Calix quadripartitū. *Corolla* tubulosa, marces-
cens; limbo quadripariito, patente. *Stamina* 4,
exserta. *Stylus* 1, indivisus. *Capsula* 2-4-locularis,"
circumscissa, loculis 1-2-aut polyspermis.


-*PLANTAGO ASIATIC A*, Linn.

P: foliissub 7-nerviis ovatis obtusisbasi angustatis gla-
bris, sciipo striato pilosiusculo, spica elongata
floribus distinctis.

CrescU: in monlam's freq:ion?.

Floret: or.mi tempo, o.

Nomen: K; i|ing Menj.'mg - an.



N Y C T A G I N E AE.



***MIRABILIS*, Linn,**

Invohicmm monopllyllum , campanula turn, quin-
querfidom, uniflorum, persistons. *Calix* corollinus,
f idfundibunformis : limbo nnincruelobo. *Slamina*
quinque. *Aleniam* tec turn basi calicis demum in-
durata, opice clausa.

***MIRABILIS JALAP A*, Linn.**

*M.** foliis pctiolatis ovatis basi subtruncatis marginc
ciliolatis, floribus bievilcr pcdunculatis axilla-
ribus solitariis, terminaiibus (>-5) subucubel-
latis ? tubo puDscscnte in.volucro quintuplo su-
pcrantCj caule Jineis duabus opposilis puberidis.

*a** flore purpureo.

b. flore flavo.

r. flore cxalbido, foliisquc j)asstm oblique cu-
ucatis.

CrescU: in apricis j in Ixorh's coUttir*.

Floret: luto anno.

No>?ien: Kambang iSore.

BOERHAAFIA, Linn.

Iuvolucrum polypli jllum , multiflonim, deciduum.
XJalix Uibulosus, medio coarctatus; limbo plicato,
deciduo. *Stamina* 1 - 4. *Akenium* tubo calicis
cipice clauso arete tec turn.

BOERHAAVIA VIFFUSA, Linn.

B: caule proeunibcate tercti puberulo , foliis ovatū
1. subcordato-ovatis obtusis subrcpnndis (mar-
line tenuiter ciliolatis) sikbtus candidis, floribus
enpi tato - corymb osis.

Cresclt: ad margues viaLiini prope Eat<iviani.

*

Floret: omni tempore.

BOERHAAVIA REPANDA, Willd.

Hi caule crcto superne letragono puberulo , foliis
ova to - oUongis aenminatis basi iutcrduru sub-
cordatis repando - sinuatis , floribus umbellatis
triandris.

Cresclt: in Provincia Baulam, etc.

*Floret**, omni tempore.

BOERHAAVIA GLABRATA, Bl.

B: caule diffuso tereti glabriuscule, foliis ovatis acu-
tis 1. ovato-lanceolatis iutcgris glabris subtus ni-
veis, capitulis paucifloris pedunculctis (an satis
distiucta a *B. glutinosa* Vahl.?),

PLUMBAGO AVRICULTATA, Lam.

V. foliis **infimis obovatis** superioribus ubovato-ob-*
 Joitgis ohtusiusi uiis miicrumitatis in petio **urn** an-
 gusUris subtus s;[aanioso-])iinctatJs, **pctiolis** basi
dilatatu cauleui striatom ampleteeuuius.

C'resell: in pa mlibus **Bataviae**.

Floret i Majo, Juuiu_f etc.

Nome_{ti}: Seriwati.



PRIMULACEAE.

- - ~ ^ _____

LYSIMACIIA, Liun.

Calix quinqncfidus, persistens. *Corolla* rotata. m-
 terdum ~~sn~~^{bcan}**tpanalata**; limbo piano, quinquefido.
Stamina qtunqne; *Olamentis* iufcrne **dilatatis**. *Slig-*
ma obtusuiu. *CapsuJa* globo.^n, imilocalai^{is}, 5-10-
 v-Ivis, sciiiuibus plurimis au^ulutis reccptaculo ccn-
 traui aHixis.

LY SIM AC III A JATAMCA, W.

L: raccrais termln.ilibus simpiicibus elongalis, brac-
 teis ~~subu~~laiis pcdiccllo brcvioribus, segmentis co-
 ruilac oliovatis, stannilms **exteitts**, ioliis lato-
 lanceo^I;itts **atrioque** •cununaUS in petiolnm de-
 cnnentibas (maximc afliiis L. dccuireuti et L,
 ati upurpuvcac).

Cres-

cr'r)

*Crescit: in g^aminosis mouta-iis tVovinciariim Tjall-
j>oo, lJuiteazorg'i etc.*

Floret i Jmiio , Julio,

LYSIMACHIA CUSPTB.4TA, Bl.

L. peclunculis 1-floris I«J lernainalibus fascicalatifi
cernais, ioltis ellijuico'-obloayis cas|>idaiis utrin-
q:10 birtatii lahtas p.dlidioiubus.*

*Crescu: in umbrosu monUuis Saiak, JBarangL-ang,
Gcde, etc.*

Floret: onmi tempore.

LYSTVACHIA ULTGr&O&J, Bl.

*L: pecitinculis unifloris axillaribus sofitnriis, foliissub-
oppositis ovatis basi param attenuatis**

*CrescU: ad ortiun flivii Tjiba.-ruiu locis uliginosis**

Floret: omtii tenijvore.

EPFTHEMjj Bl.

*Flores inrolacrat. *Calix* tubilosus, qainqnelidus.
Corolla iiiALudibulilurmis: *limbo subtiblahiato, ua* in-
quelobo. *Stamina* duo, *iucrasa*, basi iissa, cuuui-
Ventja. *Stylus* > ; *stigma* capita turn. *Ca/su-a calice*
inclusa, globosa, *circamsicissa*, *unilocularis*, pojjsperina. *Receptacula semliifera* duo, lib era, iila-Tal.t, divcrgen lia.*

*Plantn herbacca, caale simplici mrnoso ttreti, foliis
infei/oribus solitariis longit<r petiolatis cordato-ob-
long!s dcuiiculatis uuiuaufi pubcris di^cyloribus, Iu-*

(7 * 8)

ppriorSTms oppositis brcviter petiolatis, spicis pedunculis recurvis iavolucro cucullato inciusis, lloribus fccuudis.

EPITUEMA SAXATILE, BL

Crewlt: in saxis montium Seriba, etc.

Floret: Mdjo^ etc.

DORAENA, Thunb.

Calix quinqaefidus. *Corolla* quinqaefiJa; lacinffs acqu^hbus , conuivntibiis. *Stamina* quinque , inclus.-i; *Jilam^nla* brevissima; *anlherae* oblongae, subtetragonne. *Ovarium* superum. *Stylus* brevis, crassus; *sti&mate* truncato, 5-crenu!ato. *Capsula* (Thunb.; ex Gacrtn. fil. bacca indehisceus) univalvis, poljspcenna; *semina* pyramiduta, receptaculo ceutruli libcro affix a.

DOIAESfA JAPONrCAj Thunb.

Frntcx ramis aUernis divaricatis, foiiis al tern is oblongis acuinrnatis remote serrulatis glabris, spicis axiliaribus folio brevioribus*

Crescit: ex Japnnia all at a et in Horto botanico Buitenzorg ijii ctilta.

Floret: omui fe e tempo re.



LEN-

(7*9)

I E N T I B U L A R I A E ,



UTRICULARIA, Linn.

Cnlix dipliyllus. *Cirolla* personate ; labio inferiore hnsi calcarato. *Stamina* duq; filameutis intus aiitlieriferis. *Sliyma* bilnbiatum. *Capsu/a* uuilocul»ris, circumscissa, poi^sperma, *Setnlna* placentae Ceiitrali affixa.

UTRICULARIA FLEXUOSA, Vabl.

XI: scnpo Tiudo slmplici flexuoso, bracteis ovntis obtusis distantibus uniioris* labiis indivisis rotuidatis, infcriore majore patulo, supeviore fornicate. calcnre adscendente obtuso pubcrulo, pedicellis fructifcris reflexis*

Crescit: in aqnis slagnantibus circa Bataviam.

Floret: Majo — Angusto.

VTRICVLARIA PAUCTFf.ORA, BL

XI: sc.apo undo Gliformi simplici sub - 2 floro , calça-tre obtuso porrecto, capsula globosa (afT. U. bifloræ Lam.).

Crewib : in fossis circa Buitencorg.

Floret: Novembii, etc.

R H I N A . N T H E A E .



Bl'rCHNERA, R. Brown.

Calix tubulosns, striatus, <juin<juedetitatus, suboetjialis. *Corolia* bypocraterii'onnis; limbo subquiuquclobo, subaequali aut biiabiato. *Stamina* quatuor, didjnamn, inclusa. *Antfieras* lineares, inuticac, *Stigma* obtusum, subemar^inatum. *Caps.ila* bilocularis, bivalvis, valvis niedio scptifcris; j̄la»ccntu centralis, dcmum lib era,

* Corollis bilabiatis.

BÜCHNERA CURVIFLORA, R. Brown.

JB: hispidulo-scabra; foliis elongato - linearibus integrerrimis patentibus, ca licit us 5-s triads longiter acuminatis, labio superiore corollae breviore rectuso, caule ramoso tetragono.

Crescit: in gyaminosis Provinciarum occidentalitum Javae.

Floret: omni fere tempore.

*BÜCHNER*i EUPHRASIOIDES*, Vahl.

JJ: pilosiusculo - scabra; foliis abbreviate - linearibus obtusis iutcgerrimis, calicibus 10-striatis acuminatis, labio superiore corollae breviore bilobo, 4aula sub ramoso tetragono.

Crescll: in gyaminosis f- eqneus.

F/oret: omni fere tempo, e.

» * C o -

• • Coroileae liimbus subacqualb.

BÜCHSTERA TOMENTOSA, Bl.

B: snlomentosa ; foliis infei'ioribus oblongis obtusis grosse dehtntis, superioribus linenribus obtusis iijtcgerrimis, bracteis seuilanceolatis calico brevioribus , caule suliramoso tcretiusculo (confl cum *B. exasperata*, R. Brown.)•

rescit: in gratniuosis iuiindatis juxla .Kiiripaa Provinciae Buitenzoig.

Floret: omni tempore.

RHINCH02LOSSVM, Bl.

Calix bilabiatus, supra tri-, infra bifidus. *Corolla* ringens; labio supclore bifido, reflexo; 111-feriorc majore semitrilido , fiuice bicalloso; lacinia intermedia majore. *Stamina* (juatitor, subinclusa, quorum duo slerilia minima ; anthrae connexae. *Sfi'ryna* obtusum. *Capsula* rostrata, unilacularis, h i val vis ; dissepiinenta duplicata, incompleta , valvis contraria, utrinquc inilexa et placentilcra.

Genus valde affine *Gerardiae*.

Herba subramosa, parum pubescens, foliis alternis (altero supraaxillari nempe stipulariformi) oblongis valde oblicquis, racenio terminali nutantc, pellucellis secundis (Rbeede Hort. Malab. IX.t. 30.).

RHINCHOGLOSSUMOBLIQUUM.

Crescit: in montanis Seribu,

Floret; Februario, elc.

(ffa)

VERONICA, Linn.

Calix cpiadri - rarins quiKjuepartitus. *Corolla* quadripnrtita, lacinia una alteravc majore. *Sland-ria* duo. *Capsuld* bilocularis, loculicido-bi valvis.

VERGXICA JAFAJICA, BL

*V!** caule procumbente, foliis subscssilibus oppositis ovatis obtuse serratis pubescentil)us, spicis axilaribus tērnjiualibuscjic, laciniis calicis obmsis.

CrescU: h\ cacmnitie Sede-at) et ad ditaractds iluvii Tjikundul nioiitis Gecle.

Floret: lor to omni tempore.



S C R O P J I U L A R I NAE.



BUDDLEJA, Linn.

Cciliq quadrifidns. *Corolla* carnpanulata aut tnbulo—sa; limbo (jiadritido, accjuali. *Stamina* (juatuor , acqnalia, subinclusa. *Stigma* obtusum. *Capsitla*. bilocularis, apicc bivalvis , valvis seinibifidis. *Scmina* pluiima.

BUDDLEJA SALICIXA, Lam.

JS; foliis oppositis lanccolatis • acuminatissiinis denti-culatis petiolatis sabtus grisco-subftomeiitosis, race-mis terminalibus subpauiculatis eloigatis, pedicel-li\$ subtdiloris cernuis*

Cres-

resc)it: in montosU ail **ripas** flnviornin.

Floret: oinni tcniporc,

Women: Ki Juris sail. •

BUDDLEJA DENSIFZORA; BL

*B** foliis oppositis (breviter petiolatis) lancicolatls acti-
miaatissiinis basi acutis extrorsuni acute **serruiadi**
(sununis integcmmis) marginc rccurvis pancecen-
tibus subtns tjiveo-tomcntosis, racemis termina-
lib us (soiitanis tcrnisvc) , pedicellis multlflor
ccrnus (aft. *B. salicifolia'e* ac *O. serrulatae*)*

Crescli: m s\lvi> **attioribns** montis Tjeiimai.

Floret: forte onini tcniporc.

Nomen: Sumbnng lanah.

BUDDLEJA SVNDATCA, BL

*B** foHis oppositfs (potloij'.Us) lanceolatis utrinqne an-
ininatis sernilads (**saminis*iiitegerrimis**) sabtns.al-
L id o-to men to sis , spiels **paniculatis intcraptis** ter-
minaiibus elongntis, floribus **breviter pedicellaiial**
in giomçrulis snb-j-floris (all*. *B. occidental**
fet *B. di3b*lo rt)i* ^ ^

Floret: foil" omni **tempore***

BUDDLEJA A CUM T V. / TISSIMA, BL

B: fotiis oppo.sitis (**breviter petiolads**) Iflnccolatis a cu-
min atissim is **bail** acutis exiguc dcuiiculatis (sum-
mis integcmmis) sub ins albido-touK'ntosis, spi-

cis terminalibus interrupt - glomerilatis, glome-*
rulifl approxiinatts sub-o-flows, floribus breviter
 pcdicellatis (afF. *B+*atndaiace*, cui difieri foiiis
 acumiuatissimis ct pcdicellts **brevioribus**)»

Crescti : in moiitosis.

Floret; anni- teniporc.

MICROCARPAEA t n PAEA, R. Brown.

Ca Ux cbractcatns, tubidosus , 5-gonu», 5- fidus;
CforoMa biiabiata ; *tabus* caJicc **brovior**; laJio su-
 pcriore **minimo**, **emarginato**; infirao trilobo; la-
 cinia intermedia prodiiciiore. *Stamina* 2, antlic-
 rifra; sicrilia niilla; *anfherae* i-locularcs. *S/ig~*
?nce semibilamellatum. *Cap nut a* calico inclusa , 2-
 vulvis , dissepiment? contvaiio, demum libcro*

MICROCARPAEA %ALTERNIFLORA, BK

M: foiiis **in0mis** linenribas stimniis **subspatnlatis**, flo-
 rU>us soiitariis alteriris (an salis distineta a M,
muscosa?).

Crescit : in oryz flis Jniniitlfs.

Fiord: Februarie — Aptili.

G&ATIOLA, Linn. -

*Ca Sx qu» n q n e p n >• ti tu s, n e q u alis , b n s i h JJ > r , T C tc . i-
 (uflif C o / c' .(a tabs osa , i>ih biata ; la'i-o superiore
 bii>bo aut emjir^in&to ; inJcvio^e tiilobo. *Stamina*
 duo antherifera , duo **auf** inUT'lum tii;i steiiljuij*

*anthe-**

nnlherarum loculi divergentcs. *Stigma* bllamella-
turn. *Capsrda* bilocularis, bivalvis; valvis disse-
Jjimcnto parallels, iutcrdain bifidis.

• vnlvb iiUivisis.

***GRATIOLA VEROVIVAEFOLTA*, Linn.**

G: caule crecto deramm re pen to, foliis oppositls s^s-
silibus lanccolat^s serratis tcnuiter ciliolatis, r̄a~
ccino turiinali folioso , pedicellis opposLtis , cap-
6ulis subulaUs*

Crcsciti in lmnidis circa JjitiLenzovg, etc.

Flor??: oinai tempoi-e.

GRATIOLA REPTAVS,J{oxh.

G: caule rcpcntc^ foliis oppositis brcviler potiola-
tis oblongis obtusis fotunclis^ne serratis glubrius-
culis, racemis terininalibus, pedicollis oppositis,
capsulis subulatis.

Cresell: cum priori.

Floret: pet-lotmn aiiiuni,

***GRATIOLA SERRATA*, Uoxb.**

G: caule crecto di\tricatn ; foli's oppositis subam-
plexicaulibus ablongis obtasis setaceo - scrr.itis
glabri-s, race:nis alaribus tür ninalihuifne longiter
jxvlaiiciilalis, pedicellis oppositis brevibus, cap-
iidis liue^ril>a9 diver^outtbus.

Cres-

Cresv *Ui* iti graininosis cl incultis circa ~~Buitenzorg~~
satis fr̄cquens.

Floret: omni leinpore.

CURANGA, Juss.

Calix duplex, 4-sep&lus; exterior major_y inac-?
quali-bi valvis. ('orollae' ringentis labiuni superius
emarginatiim; itiferius dilatato-lrilobuui, fuuce in-?
%||& callis (filamentis sterilibus) •duobus in^tructum.
Stamina inclusa; antberac loculis discretis. *SUs**
ma spa tula turn, inaequaali-bHamclatum* *Cagsula* calicc
inolasa, cpmpressiuscu?a, 2-locularis, 2-valvis % po-r
Jjsperma. Dissepimeituiu simplex, valvis parallelling

CVRANQA AWARA, Juss.

.Caulis infci'ne rcpens , tetragpnus, bisulcatas, sup erne
puberulus. Folia opposita, petiolata , ovata, obtuse
^irrata. Ped-unculi axillares, solitarii, alterai, sub?
billori.

Crescit: ad pedem montis Salak,

Floret: oinui tempore.

¹ *JYU/net*: dauwn Kurang.

ELLOBUM, Bl.

Calix quinquepnrtitus, aequalis. *Corolla*, infun^
di^uliformis; limbō bilubiato; labio superiore re?
tuso: inferiore trilobo, majore; lobo intermedio
angustiore. *Stamina* quatuor, didynama, exserta ;
antherae bilocuiarci?, couue^ue, jnuticac# *Stigma*
pb̄tu-s.

obtusum , emarginatum. *Capaula* ? siliquaeformis ,
subulata > biloculuris ? polysperma.

llcrba radicals, pilqsa, foliis opposilis pcuolatis
pvatls surratis, racctnis aiiiaribus puuciiloris, pedi-
ccilis irucLifcris recur vis,

ELLOBVM THONTA *INUM.*

Cresck: in montoajs Proviuciao Bantam,

'*Floret.* F<bruario*

Jtiomen: Wkaraugott.,

JIERPESTIS, Oaertn,

Morinieria , Bruwn , Goertn,

Ctillx proiUnde quinqucpartitus, Lnaequalk; laci-
ynis doabus iateriorlbrus niiuoribus. *Corolla* iuiuu^
JibulUorniis, •aubbiLibiata. *Stamina* quuttuor, didy-
ziaua, iuclusa aut parum exsorta; *autlieraruni* lo-
pls divaricatis. *Stigma* obtusum, subeinai^tnaturn.
Capaula calice pcreistente tecja, bilocularis, bvy
valyis_f valvis bilidis; dissepimeifto pax'aiicloj dcium
(fbero; placentis adnatu.

HERPESTIS LA *TUGINOSJ, BL*

// T laougiuosn.; foliis ovatis duplioato-dcmatis, p_n«.
d incuHs pctiolo breviortbos, calibus bibractcaik,
Crescitl in humidia prone Sadjram.

cembri.

HER-

HE71PESTIS SPA TULA TA, BL

JFI: glaberrima; fqliis spatulatis superne obsolctt
ficrrulatis, peduiiculis folio longioribus, calicibus
bibracteatis,

Crescit: in uliginosis circa Bataviam et Buienzorg,

Floret: Aprili, Majo.

HERPESTIS FLORIBUXDA, R. Rwn,

fl: glaberrima; foliis lincari-lanceolntis obtasis in-»
tegcmimis, pcdiuiciis folio brcvioribus, calicij}
LibractcAti laciuiis reticulatis*

Crescit: cum priori, pruecipue in oiyzetis,

Floret: eoilciu 1cm pore.

H Elf PEST IS JAVA NIC A, Bl.

H: caulibus procuinbentibus villosiusculis, foliis ova*
tis iii»ec|italiter crcnatis glabriuscuh infya de»
presso-puH Ctatis, floriLus stibscssihi)us, calicibus
l)brae tea tis,

Crescit: in oiyzelis siccis,

Floret: toto fere anno.

LYMNOPHILA, R. Brown.

Calix bibracteatus, (juinquepartitus, aequalis.. *Co**
Toila infundibuliforrmis; limbo quinquefido, subaequa^
•Ji ^ nut subbilabialo; labio supcriore emarginato; iu-
feriore trifido. *Stamina* quatuor, didynama, inclu-
sii'p anlherae conacxae. *titignia* diiatato-cmargina-

turn, *CapsuTa bilocularis*, bivalvis, valvis bifidis J *receptaculum* dissepiumento utrinque adnauun, valvis parallel am.

LYMNOPtltA PINSATIF1BA, BL

Z: caalibus terctibus stviatis .superne calicibusqUd glanduloso-pilosiusculis, splits omnibus verticil^ latis &etaceo-multi(idis, floribus a^cillnribus ^ib-aessilibas solitariis (aff. *L. myriophjlloidi*).

Crescti: in vivitis propc Lin^a Jattic Province-cr Che:ibon.

Floret-. Septembri, etc.

Nomen: Gangang. .

LYMNOPHILA SESSIFLORA, BL

L: caulibus tercti)us calicibusque suhpubesccnibus y ioliis submersis verliciilatis setacco - multifidis, emersis tripartitis inciso-serratis, floribus axilla^ ribus scssilibns solitariis (aff. *L. gratioloidi*)*

Cresclt: in aquis atagnanibus Bataviae*

Floret: fere to to anno.

LYMXOPHILA GRATISSIMA, BL

Ix crule tercti striato, foliis omn^us ternalis sessi- Hbus lanceokto-Kncnribus serrntis, pedunculift raceinosis caKcibusque glanduloso-pilosis (Rliee,-* de ilor.U MaL 10: t. 6)«

*Crcs**

•esa't': In graminosis **innndfftia** circa **Bafccfa**

Floret-. Majo, etc. •

Nomen: Kantban[^] Biikkn- Bukkti.

LYM'sOPTTLA PUSCTATA, H.

jD: caule icrcū substriato, foliis omnibus opposftis
ternatisre • **amplexicvilibtia** oblongo - laBCcolatis
 saj-rotis glabrls utrinque **depresso-pumctatis**, pc-
 <luiKulis a\JIIaril)us uniflovis calicibasque sub-
 glandiuoso-pilosf[^].

Cresclt: iii !i:yniJis ji:xta Tjiradjas , Editenzorg, etc.

Flor&l: Angusto, etc.

LrtfNOPH TLA Ptt L 0 S4, Bl.

/* ^mii-e tcrcti viloso i fo'liis omnibus opposilis lai
peololb-Imearibus amp! exicauilibtys **serratis** piJo-
 siusculis, peduiKiilis axillaribus **solitariia** uaUlori"**s
 calicibusque yilloskiseulis.

Creiclti in hnmidis **montanisv**

Floret: omni temporo. *

Noj.-ie.i: Bob 11:111 a n g; rumpnt K u Kuhulan.

* *LOXO'PIYLLUM, Bl.*

Ca//.v b i 1 ab i a tus, sup i - , infra b iparti tus. Co-
 ro>lia bilabiata; tubo ventricoso; labio supcriord
 ^recto , emar^inalo; raferiore mnjorc, trifido , acquali,
 (. nee papiHosol *Stamina* qnntuor, didynnina, cx-
 *uv?a5 cwthe.rae comicvn^- *Stylus* inrlsnsns. *Stigma*

•Titnsum, emarginahim, *Capsula* globosa, bilocnla**
ris, quad rival vis; reccptaculo centrali quadripartite*,
dcmum iibero.

»

Genus a *Conobea* diversmn calice bilabiato , struc-
tura fructus et anther a rum, tit etiam habitu.

Herb a pub e seen s, caule ramoso nodoso , foliis al-
ternis (altero nempe opposito stipulari) oblongis
obliquis, pedunculis racemosis axillaribus.

LOXOPHYLLVM RACÈMOSUM.

Crescit: in saxis ad pert em montis Menara Prcviii-"
(riac Builenzorg.

Floret: Martio, etc*

DICEROS, Lour.

Calix (febracteatus) quinqnepartitus, ncqtialis. f^o-r
ro/la infundibuliforinis; limbo subbiiabinto, inter^
dum subacquali. *Stamina* quatnor, didjnama ;
jilamenta adscendentia ^ longiora basi callosn; r/v-i
thprarum loculi divergentes, cruciatim conniven-
tes. *Sligma* bilamellatum. *Capsula* subglo!>osa,
bilocularis, bivalvis; valvis indivisis, dissepimeuto
parallclis; receptacula utrinque dissepimeuto aduata.

SECT. I. Corolla subcampanuiata; liAbo
quadri.'obo, sub.^e^uali.

DICEROS LONGIFOLIUS, Pcrs.

D: foliis oppositis sessilibus lanceolatis serratis sea-?
bris, raceuio terminali clongato.

tire"-:

Cre:;cU: in **boundis** **juxla** Rom **pien.**

Flx/rit: fr, thr **anno.**

Nomen. " **Wiwige'naju**

SECT. 2. Covollae **limbna labiates;** Tutuo superior©
emarginato

DICEROS LATIFOLI

JD.-folYis opposaJs sn¹ft&**Wfe** cllintirisi obtusis basi
eun.-atis obttiso denta ils scitbrius GuUs r racenxo
terminali elongato, cm!o *subsimplici.*

Cresci: in humid is, moutanis.

Floret: omni tcuijK>re.

DTCKROS MONTANU3, BL

D: fotiis 6p?)0siiis ov?sLts OIUMSC tfentatis utrinque
caulibusqne **pjloimscal**is, pcdnricnWS axillaribus
solHni-ils sulnijullato .1-5-florii.

Crescit: iu tnontauia Salafc,

Florei: UAo atiuo.

DICE A OS GLJND7JLIFE R US, Bl.

D: pubcscons; foliis opposit's scssilil>tis ovatis obtu-
sis **crenulatis, rafcemo tei**min all gtiuduloso-pilos.

C/Vteft: tii g!Hrniii(jji3 prop« Buiteuzorg <t circa
Bfttaviaoa.

Floral: 01; 1111 **fora t ? n)** pore;

Dl-

DICEROS CAESPITQSUS, Bl.

Df* pttfeeseens; foliis oppositis scssllilms ovatis ser-
rulatls, pedunculis uniflbris subsolitariis extraaxH-
laribus.

Crrscit: in graminesis Provinciarum occidentalium
avae.

X'loyel;]Ki' luliun an aura.

Variet a** tota pilosa.

Variet. b. glaberrima.

MAZTJS, Lour.

CalJx campanulatus, quinqar^{ittlus}, aequalis. Co-
*ToUae ringcn.tis]rj)itnn sopci^os LrcvJus, j^{angustato-}
 pmargliiatam; jnfcrjus triiobum, pnicns, fauce gib-
 I>o£o-pnpfflosuni. u^/7//teracpcrpaii« coimcxac. Stig-
 ma biiamellatam. Ca\$3tila sitl)glo'ousi,]>i!ocularis,*
*bivalvis, polysperma; receptacula seminifera car-
 nosa, scrobictJata, utrlnq; disaepimestp valvis cou-
 trario athiata.*

MJZUS LAEVIFOLIA, Bl.

M: foliis spatulatis repandis utraq; ^{AC} laevibus, 3'nc-
 mu tern J i;. ;ii i la so glandulifero.

Crescil : circa BriStenzorg locis Tlx midis.

Floret: omul (en,pore.

TORENIA_y Linn.

Calix tubulosus, angulatus, quinquedentatus, an-
(ice lissus. *Corolla* ringens; lubio superiorc ob-
tuso aut retuso; infcriore latiore, triiobo, <*S/lamina* quatuor, duljnania, quorum longiora basi
biiida; *Antherarum* lobis divaricatis, interdum ef-
foetis. *Stigma* Jilamclatum. *Capsula* plerumque
calice inclusa, bilocularis, bivalvis, polyspernxa |
yalvi! dissepitiuento . parallelis, indivisis.

Geims *Mimulo* maxiine affine, a(juo vix separandum.

TORES IA ASIATIC A, Linn,

T: caule repente, foliis pectiolatis ova'to-lanceolatls
acuminatis repando-crcnatis* scabris, peduupulis
axillaribus termilalib usque unifioris, corollae la-
bio superiorc rotundato , capsula calicem aequantc*

Crescit: ad ripas jQuvioruin regionib us moiitsmis.

Floret i toto anno.

Nomen: Koku juan,

TORESIA OBTUSA % BK

T: caule repente, foliis subsessilibus ovatis obtusius-
culis . obsolete lepando-serratis glabriusculis, pc-
duiiculis axillaribus termiualibusve 1-floris, corol-
lae labio superiore obtuso, capsula calice lour-
giore.

Cresc'U: locis^ humidii ProTUiciarum occidenlalium
Javao,

Floret; tuto aimo,

TO?

(755)'

TORENLA MISVTA, Bl.

T: caule' repente, foliis breviter petiolatis ovatis setaceo-serratis subciliatis, pedunculis axilla rib us terminalibus ueirifloris, corollae labio superiore emarginato, capsula # calicein aeçpante (llhecđc Horl-Malab. 10. t. 50.; aff. *T. hirsutae*).

Crescit: in graininosis liuiuidis circa Builenzorg.

floret-, toto anno.

MTMULUS, Linn.

Calix tu!>u!osas, angulatus aut alatus, quinque-dentatus, interdum subbilabiatus. *Corolla* ringens; labio superiors integcmnio aut e margin a Lo ; iiiferiore latiore, trilobp. *Stamina* quatuor, didynama, basj. iudivisa; *antherarum* lobis divaricatis. *Stigma* bilanilliatum. *Capsula* calicc inclusa, bilocularis, bi-Valvis, pol>sperma; valvis dissepioiento contrarii^ (ex Gaertner; ex meis observationibus e conlrario in speciebus sequentibus desumtis structura capsula-ruin est eadem ac in *Torenia*), indivisis.

MIMVLUS JAVANICVS, Bl.

M! caule repente argute tctragono, foliis petiolatis ovatis dentatis scabriusculis, pedunculis axillariibus solitariis Icrminalibus subfasciculatis.

Crescit: in gramlnosis Provinciarwm occidentaiinru Javae insul.'ic.

Floret: per tottim aijnnni.

Nomen i Djiaut matta Kujup.

Vet-

VaritiL a. *pub&scens*: tou pubescens.

Variel. b. *pusiila*: in omnibus partibus minutus[^]

MIHTTJTS HIRSUTUS, Bl.

3.- himitus, foliis petiolaris ovato*-lanuginosus soaratis, j)ctiljceljjs runcemosus oppositis, caule crenatop argute tectoriano (flores flavi).

Crescil: in Provincia Canlam praecepit Tjoo.

Floret: Februario, etc.

yf/DENOSMJ, K. Biwvn.

fJallx bibracteatus, quinquep[^]rtitus; Inclinis superma majarc. *Cornlla* infundibuliformis 5 limbo staccinli (quinquelobo), aut bilabiato (guacrilobo). *Stamina* quatuor, didynama, cum riumento scriti; antli era e approximatae, localis is dtvaricalis. *Stigma* inaequale-biduum 5 iaciua supracma brevissima, bitleutatw, altera sordulata. *Capsula* subrostrata, bi]-9cularis, bivalvis; placentae sutiiris vaivarum ulrichii Q adnecitac, angustac. *Semina* subglobosa[^] foveolata.

ADENOSMA IN€J4NUM, W.

A: caule borbacco *pxacuwbarc.*, foliis oLJongojanceolatis obtusiusculis ba&i attenualis IUrinquę publico minuto nsparsis infra canescensibus, spicis terminalibus brachivibus, bracteis anterioribus lanuginosis acuminatis calicibusque ciliatis.

Cresci: m iimbrosb montanis et ckesL Buitenzorg
 • locis Iramidis*

Floret: omni tempofe.

Noinen: RouJoe Poeljang.

Sy/7r Ruellia incana mihi, Ga&L liorU Buitenz;
 pag, 85.

udDENOSMA LASGEOLATUM, Bl.

A: caulc safTniticoso adscehclientc, foliis oblongo-lanccolatis obtusiusculis bssi in petiolum angustatis utrioque parum pubentibus, spicis axillaribus tcrinalibusque dcnsis, bracteis cxtcrioribus lineavi-lanceolatis subulrilis calibusque glandulosopilosis et sctaceo-ciliatis.

Crescil: circa Tjikao Provinciae Tjanjor.

Floret: toto anno.

. ADENOSMA SPATVLATUM, Bl.

A: caulc lerbacco adscendente, foliis spatulatis ob-tasiusculis utrinque pubevulis, spicis axillaribus terminalibusqec laxilloris, bracteis extcrioribus spatiilatis acutis calicibusque glanduloso-pilosis*

Qrescit: in iiiiginosis Bataviae.

Floret: omni tempore.

ADENOSMA ELONGATUM, Bl.

A: caule herbacoo crcto, foliis oblongis utrinqni acutiusculis puberulis sub(us cancscentibus, spicis

terminalibus clongatis laxifloris, bracteis et calicis laciis linearis-subulatis pubescentibus.

Crefitclt: in modo non sis uiibrosiss.

Floret: toto anno.

Nomen: Tiindoli*

BIGNONIACEAE.

CONSPPECTUS GENERUM BIGNONIACEARUM JAVANICARU'L

SECT¹, I² VKBAE. *Semina transverseaffixa, membranaceo-alata**

Calix tuliulosus, truncatus. *Stamina* fertilia 5. *Antherae* loculis pendulis. *Sligma* bilamellatum. *Capsula* siliquaeformis, compressa. *Semina* alata exuicirculari cincta. Genus *Caiosanthes*, Bl:

Calix spalbaceus, fissus. *Stamina* fertili. 4, cum rudimentis quinti. *Antherae* loculis pendulis. *Sligma* bilamellatum. *Capsula* siliquaeformis, teretiuscula*. *Semina* utrinque iuxtam expausa. Genus *Spathodca*, R. Brwn.

(7 * 9)

SECT. 2. TRICHIOSPORAE, *Semina pendula**
utrinque ant apice aul basi in alam
*selaceam aut membranaceam expansa**

Calix tubulosus, sub-5-fidns» *Stamina* fertilise
2-4,, inclusa; sterilia 2 ailt nulla. *Anlherae* lo-
culis parallelis. *Stigma* subbilamellatum. *Capsula*
silicjuacformis, tercs. *Semina* basi meinbranaceo^
ata Genus *Tromsdorffia* Bl.

Calix tubulosus« scmi-5-fidus. *Stamina* fertilia
4, cum rudimento quiuti, inclusa. *Anlherae* lo-
culis parallelis. *Stigma* subinfundibuliforme. *Cap**
sula siliquaeformis, teres. *Semina* utriii(|ue in cau-
dam seliformcm expausa. Genus *Trichosporum*, Don.

Calix profunde 5-fidus aut partitas. *Stamina*
et *antherae* praecedentis. *Stigma* capita turn. *Cap-*
sula et *semina* *Trichospori*. Genus *Lysionulua*, Don*

Calix 5-partitus. *Stamina* 5, quorum 2-4-ex-
serta, fertj^[^] *Anlherae* loculis parallelis. *Stigmd*
bilamellatunT. *Capsula* et *semina* praecedentis.
Genus *Agalmyla*, Bl.

SECT. 3. CYRTANDREAE. *Semina pendula, nuda**

Calix tubulosus, 5-fidus. *Stamina* fertilia 2,
inclusa; rudimenta 3 sterilium. *Antherae* loculis
parallelis. *Stigma* capitatum, interdum cmargina-
tuni* *Baoca* calicc parum longior. Genus *Cyr-*
iandra > Forst.

Ca'rx pñrvus, 5-pnrtitus. *Stamina* fertila 2_f exsertii; rudimenta sierilium 3* *sfnth»rae* loculis in-Sertione iii2u*tualil>us. *Stigma* subit.fundimliforme* *Jjacca* calice muUo longior. Genus *iVhiua*^ Bl.

CaJx />-(i(lus. *Stamina* iertilia 4, inclus.'i. *sln~th'rar* uniioculares. *Stigma* obtusum. *Jiacca* glo-losa, calicc iaclusa. *lihyncholeihum*, Bl.

Calix tubulosus, 5-fidus, *Stamina* fertilia 4₉, inelusa* *Anthvrae* sagiltatae. * *Stigma* bilaincellatmn. *Bacca* oblonga, culice inclusa. Genus *L,ox-onia* ? Jack*

Calix spatTiacens, flssus. *Stamina* fertilia 4 f Jnclusa. *jintlerae* uuioculares, bas! calcaratae. *Stigma* capitā turn, *Jjacca* calice Jongior. Genus *Centronia*, BL

Calix 5-fidus. *Slam/ña* fertila 5, exserta. «^/7-*th^rae* iucumbentes, l>asi hifiilae. *Stigma* capi-tntmtt. *Bacca* ovaiia, calicc lun^ior. Genus *Hull-liciy* Rvvdt.

CALOSANTtlES, Bl..

Cafix coriaccus, tubulosus, truncatus. *Corolla* tubo brevi; fuuee cunpaaulnta; limbo (jamtjuelobo sul>bilab]Mto. *Stamina* (jiiuque, fertilia, vix ex-serta, (jiornin dat> Jon^iurn ; *antherarum* loculi e connectivo peciduli. *Stigma* bflainellntuni. *Caps/i/a* flippesformis, loi^issima, compressa, bivalvis ; dis-sepimento vjrlvis pnr;>llclo. *StmiucL* ala semicircu-lari iucuil)rauac<a cincta.

CALOSASTRES IVDICS, BK

*Arbor foli*s flecompos'to - pinnats, foliolis sn*ik
*onlato-ovatis, pauicula tcnniali eiccta (Rheed<
h t. 4.1).*

Syn. Eignonia ind'ca% Linn,

Cresctt: in regionibus in on tan is hnmilioriblt.

Floret i fere per to turn annum.

Women: Pompuran.

SPATHODEA. Bcanv, R. Br.

*Calix spathaceus, Liinc tissus, inde iiitcervimus
aut irregulanter dentatus. Corolla infiuulibuiiformis;
limbo qnincjuelobo, inaequali, subbilabi.-ito.
Stamina qnatuor, inclusn, di(l)paina, cum qui*i* to
sterili. Antheramm locnli in connertivo puuduwl
li, divaricnti. Stifma bilamellntum. Caps i a si-
licjiacfonnis, elongnta, terctiusctiia, subfnlc.:ta, l)i-
Valvis ; disscpimentum contrariu'n tubei'osuin , de-
xnxwn liberum. Seniina utriuquc in alam membra**
Haccam cxphnsa.*

SPATTIODEA GI3AXTHJ. BL

8: foliis decomposito - pinnatis , foliolis oblonpo*
lanceolatis acuminatis glaberrimis, pauicuiis ter-
minalibus strict is (arbor 3o pcd. aiuj.

Crescit: in sylvis monlosis.

Floret: per totnm annum.

Notnea: Kipaidii.

(7**)

SPATHOVEA GLANDVLOSA, BL.

S: foliis impari-pinnatis ternatisve, * foliolis ovato-
oMongis acuminntis glahris infra ad basin mal-
tiglandulosis, paniculis axillaribus terminalibusque
stvlctis (arbor 15T2/J ped.),

Crescit: in montosis Parang et ad pedem raontis
Tjenmai.

Floret: onini lemporCp

Nomen : Kilanglii'; Kipadaii lalakkie.

TROMSDORFFIJ, BL.

Calix tubuiosus, quadri-scū quinquefidus; lnr̄niis
pubaeq̄ialibus. *Corolla* infundibiiliforniis , sursam
amplinta; limbo inaequali, quinquelobo, subbilabi*
a to. *S lamina* quatuor, inclusa, quorum duo an-
tiierifcra; *anlherae* biloculares, cobaerentcs^ loculis
insertionc aequalibus. *Stigma* la tarn, subbilamcl-
latum. *Capsnla* siliquaeformis , elongata , pseud o-
qnadril ocular is , bivalvis ; disscp̄imenti.contrarii lobis
in margine revoluto scminiferis. *SemUatL* minuta,
pcndula, basi in alam membranaceam expansa.

Genus bocce *Didymocarpo* nimis affne, semini-
bus saltern basi membranacco-alatis distinctissimum ,
dixi in lionorem Cl. /. tf. *Trommsdorffj* qui de
usu ac utilitate perplrum plantarum, opera vnria
scripsit ct anal j sin clernicam earum part him egrcgic
illustravit.

Fruticcs'ecti aut radicantcs, foliis oppositis aut
altermis scrratis, jtedunculis elongatis axillaribus.

TROMS-*

TROMSDORFFIA SPEC 103A, BL.

T; caule erecto, foliis oppositis subaequalibus elliptico-oblongis acuminatis inaequaliter dentatis sii-r pra hirsuto-asperis subtus pubcscntibus, pedunculis confertis bifid is ant interdum dicliotomis, floribus diandris ((lores spcciosi, tubo inferne saturate violacco , fauce sulphurea. Filaments quatuor, apice villosa).

Crescil: ad ripas fluviorum Jsvae occidentalis.

Floret: tolo anno,

TROMSDORFFIA? ELONGATA, BL

T: caule scandente radicante, foliis al term's (alt (TO nano) ellipt!cis, utrinque atleuiatls duplicato-r scrratis pabescentibus, pedunculis solitariis longissimis apice umbellato-multifloris, floribus didynainis (fructus nondum vicli , sed slructura ovariorum et ovuloruin plane cum antecedentc specie convenit).

Crescit :HII Moluccis.

Floret: Julio, etc.

TRICHIOSPORUM, Don.

Aesc]i}'uau(!ius, Jack.

CaJix tu1)ulosiis, scraiquinquefidus, nequalis. Corolla lubulosa, incurva, fauce dilalata; limbo ob-Jiquo, subbilabiato. Stamina quntuor, did vn am a , «uin rudimeiUo quinti. Antlicrae connexae, loculis iñsertione parajlelis. Stigma excavatuin (subin-

fun*

functi^l Tmliforme% *Capaula* longissima* siliquae for-
mis, biv.-tlvis, pscudoquadrilocularts. *Semina* mi-
Uuta, utriique iu caudam sctiformem cxjt; m\$ a«

TRICNOSPNNMI NJDICASS,

Necs ab Esenb.

JP; caule radicante, foliis oppositis ovrt:s ant ovrw
libus acutis bnsi in ten! a in sa!)cor(l; tfs piiosiis-
culis nveniis, pedanculis axillnrihus trrmiiisilhus"
que bifloris bibnictentis (Flores coccin*^*i, intiis
gulpiuirci. Piudimcntutn Ola men ti (junti e\ig:iu»n),

Crescii: in sylvis insnlaruui Javae fet Suiualrae_a

Floret: omni tern pore.

TRICHOSPORUM PULCIIRUM, DL

5T: caule r.idicnnte, foliis oppositis lanccolntis bnst
rotundiuis aveniis glabrls, pedunculis hillatis bi-
brae tea lis fnsciculatis axillaribus tCi'ajualibust*^*i^
(tlores cocciuci).

CrescU- cum praecedente.

Floret: toto anno.

LYSIONV¹TVS, Don.

CaVx profundc quinquefidus aut quinquepart*tn<_f
aequalis. *Corolla* tubulosa, incurva, fauce dilate la;
limbo obliquo, quinquelobo, subbilabiato. *Stamina*
quatuor* didyuama, exsevta, cum rudimento quintif
Antherae liucwes, couoexae, loculis parallel:*** Stig~

ma eapitntnm , niterfinni ileprrssum, *Qap9uJa* ongis-*ii»a, siiiquacformis, bivalvis, pseudo-quad nlocularis. *Semina* unuulx, ulri.i^uc in cuudaui setiornicm dcsineiitia.

LYSIOSUTUS A\3USTIFOLWSi BL

l caule radicante* foliis ipfei-ioribus opposltis superiuribos sribvevlicillaLis lincari-iaiiceolatis ob-tusiusculis avemis, floibiu axiluribus suiiiiaiiis terminalibusque aggregatis.

Syn. B/ i.'iri'a angustifolia mibi. Gat. Buitenz. p« 8j, Bill. Verband. IX. p. i<j't.

Trichasporum anguaiifalium v. Botanisclie Zcitung, Rijensburg. 110. 9, 1^25.

GrescU: prope Buiteazorg supra arbores.

Floret-, lotu anno*

LYSIOSUTUS ALBIOUS, BL

L: cattle r.itUcante, foliis oMongo-lanccolatis snb-crennlatis glabris a\eniis» pedunettlia gabfinwicM* l;tt:s .iTillaribus termiuaiibasque biactcu minutis subulatis.

Syn. Bignonin ettbida mibi Cat. Buitenz. p. 81 , iiat. Verband. IX. p. 19,3.

Trichosporum albulum. Botamsclie ZcUuug. Rcgeusb-
burg. no. 9, i3uJ.

Cresclt: in sylvis montanis Provinciarum ocridfcn*
taliuin Javae.

Floret: per totum annum.

No men: Mengundo Munjal.

LYStOXUTUS LONGTFLOPUS, Bl.

jt: caule radicante, foliis oppositis oblongo-lanceo*
latis aut ovato-oblongis acuminatissimis integer-
rimis subavcnis glabris, floribus subfasciculatis
terminalibus,

Crescti: in sylvis moiilanis Proviiciarum Bantam,
Luitenzorg, Tjanjor*

Floret: omni tern);ore.

Variet. foliis angustioribus*

Cresclt: supra arbores in sylvis elevatoriibus mon-
tis Gede*

AGALMYLJ, BL

CaJix quinquepartitus, nqualis. *Corolla* tubu-
losa, incurva, fave dilatata; lhnbo obliquo, quin-
quelobo, subbilabiato. *Stamina* quinque, quorum
duo aut qualuor ferlilia, exserta. *Antherae* linea-
xeSj connexac, loculis parallclis. *Stigma* bilumellatum.
Capsula loDgissima , siliquaefonnis, bivalvis , pseudo-
qtiadrilocuoris. *Setlna* miuuta, utrinque in cau-
dam setiformein cxpansa.

Genus *fjysfönu/o* valde affine, sed stigmate bilu-
nicilato attjue hubitu aliquid seccdens.

AGALMYLA STAMTNEA, BL

*/. ' caule radicante petioliscfue hirsutis, foliis alter-
xiis oblongis acuminatis denticulatis basi subae*
(jualibus margine subtusq[ue] pubescentibus, flo-
ribus fasciculatfs axillaribus diandris.

Syn. Justicia parasitica, Lamarck. Illustr. I. p. 42*

Cyrtandra staminea, Vahl. Eiium. I. p. 105«

Crescit: in sylvis moutanis.

Floret: per totum annum.

Nomen: Tji-pait.

AGALMYLA ASPERIFOLIA, BL

A: caule subscandente, foliis oppositis elliptico-ob-
longis acuminatis denticulatis basi suhaequalibus
hispidulis, floribus fasciculatis axillaribus didy-
naniis.

Crescit: in sylvis liuidis montium Provinciae Tjan-j
jor.

Floret | Augusto, etc.

CYRTANDRA, Forst.

Calix tubulosas, quinquefidus, subaequalis, aut in-
terdum subbilabiatus* *Corolla* infundibnliformis; tubo
sursum ampliato; limbo quinquelobo, irregulari, sub-
bilabiato. *Stamina* quinque (ex Jack quatuor)>
iuclusa, quorum duo anthericra, tia minima sterilia.
Antherarum loculi insertione aequales (paralleli);
Stigma obtusum aul capitatum, saepe emarginatum.

I'ructns baccatns, calice longior; dissepiment! Jo-
L-is iu mnrgine Vevolulu semiuifcris. *Semina* uuda,
saepe foveata vel puuctala.

Friuicesscuherbae, caule erecto. aut procumhcnte ?
foliis oppositis, altoro passim abortivo, floribus fas-
cicala tis ant capita tis raro solitaries axillaribus brae-
teatis albidis aut sorditlc purpuraseentibus.

SECT. I.

*Ca*Ac lierhaceo proemnbeiiie, floribus albidis satis

Cis involucro submonopbjllo inclnsis.

CYRTAXDRA GLAB7IA, Jack.

0: **sabacavlis;** foiiis altorris (altero nano) Ionglcr
ptciolatis lalo-ov;ttis basi ; **liira sobcordatis**
serrulatis ~~glabris~~, capitulis **breTitcr** pedcnculatis
involuf involuero camiaunlato tuaximo (ilo-
menta nnyi, candidi, ffUce pallidn ilavcutcs. Fila-
Rtberifcra 2 crassa j **rudimenia** 5 sLt'iilium).

Crescit: in 33Jvis lmmidis Prff^'iiciarura **Bantam,**
1). . etc.

CYRTjflS DRA (*PENDULAy* BI.

C. earle in feme repente, **folia** oppositis longiter pc-
tiolatis elliptico-oblongis ucnmiua:is sev;itis SUJora
Jacvibm; in **veins** iitiVa \j.losiusenlis, capitulis in-
roKicratis longis 3iine pcdnnculatis pcndulis (aflf.
C. bicolori j. IIores it fdide albidi, in iiiudo puiwi-

(7*9)

tis purpurascutibus, Calix tabulosus, cimicifidus, latere fissus. Stamina stellaria 5, minuta; fertilia 2).

Criftscit: in kurn'dis montauis.

CYRTANVRA PICTA, Bl.

C: Caule inferne procumbente, foliis remotis oppo-*
\$itis altero fiaope abortivo longiter pectiolatis lato-
ovatis ncutis basi parum attenuatis aut subcordatis
serratis supra laevibus subtus in costis villosiuscu-
lis, capitellis involucratis axillaribus subsessilibus
(aff. *C. maculatae*: flores magni, albi, fauci
punciis purpureis. Slamina praeoccidentis. Stigma
dilatato-obtusum),

Crescit: cum priori.

CYRTANDRA HUMILIS, Bl.

y- caule ^focumbente repente, foliis approximalis
oppositis longiter pectiolatis orali-oblongis utrinque
obtusis aut basi rotunda lis serralis supra laevibus
in venis infra pubescentibus, capitellis axillaribus
involucratis sessilibus (aff* *C. pictae*. Corolla
pallida flavescens. Stamina fclilla antliciis dorso
viosusculis. Stigma cmarginatum)•

Crescit: in sylvis iusulae Nusae Kambaiigae,

SECT>. 2.

Caule suffruticoso erecto, floribus sordide purpu-

(77°)

rascentibus sen flavescentibus plerumque parvis et fasciculatis.

CYRTANDRA PILOSA, Bl-

C: caule adscendentc sitnpli \$uperne tetragono ; folls oppositis obovato-oblongis argute serratis sessili- bus supra pilosis subtus in venis strigosis, fasciculis breviter pedunculatis axiliaribus multifloris bracteis foliaceis involucratis (aff. C. rubiginosae_y Jack. Flores sordide flavi, labio iufimo intus rubi- cund o. Corolla bilabiata; labio superiore emar- ginato, inferiore majore?* trilobo. Stamina fer-tilia duo, cum rudimeatis 3 exiguis).

Crescit: in buniidis montium Salak, Gede, Seiibu, etci

CYRTANDRA SVLCATA, Bl

C'' caule erecto tetragono superne sulcato_nfusco-to- mentoso, foliis oppositis petiolatis oblongis lon- giter acuminatis basi inaequali-angustatis superne inaequaliter argute serratis supra glabriusculis in costis infra villosiusculis, fasciculis subsessilibus axiliaribus bracteatis (Flores*sordide purpurascen- tes. Rudimenta staminum sterilium 5, Corolla sub- bilabiata; labio supremo bilobo; inferiore ma- jo re trilobo).

Crescit: in sylvis humidis \f eg amend tuig,

VarieU foliis majusculis, floribus albis.

Crescit: in monjaiis Seribu.

CYR-

CYRTASBRA NEMOROSA, M.

C: caule crecto tctragono superne pubesceiite, foliis oppositis petiolatis oblongis acuminatis basi oblique - attenuates inaequaliter exscerte scrratis in vcoqis utriiKjuc subpubescntibus, fasciculis penduncuialis axillaribus (Calix subbilabiatus, supra tri-, infra bifidus. Corolla bilabiata; labio superiore emarginato, fusco; inferiore trilobo, magno re, sordide albo et in fauce fuscescente. Stamina 2 fertilia, siiperne iucrassata; sterilia 5_f quorum iiitermedium brevius)•

CrescU: in nemorosis Javae.

CYRTAVNDRA ROSTRITA. 'BI.

L: caule torcfubuuiu erccto, foliis superioribus alternis (altero nano) petiolatis oblongis rostratis basi iiiaequali-attenuatis superne inaequaliter argute serratis supra glabris in costis infra villosculis, fasciculis pcdunculatis axillax'ibus (accedit ad *C*, ri'morosam et *C sulcalanu* FJores sovdide purpurei, cxtus villosiusculi. Corolla subbilabiata, fauce gibba. Stamina fertilia 2; rudimenta strilium. 5).

Crescit: in sylvis montium Seribu, Salak.

Nomeni Gaiiepung.

Variat floribus albidis et purpureis*

CYR-

(77*)

CYRTANBRA FLAFESCENS, BL

6: caule terci erectiusculo, foliis oppositis petiolatia oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis inaequaliter remote serratis infra in venis pubescentibus, floribus solitariis axillaribus subsessilibus (flores sulphurei. Corolla infundibuliformis, bilabiata, externe villosiuscula. Stamina quatuor, quorum Sterilia minutissima in fundo tubi corollae),

Cresclt: in ft-uliceiis liumiclis Insulac Nusae Kam» bangae.

CYRTANDRA COCC/NEA, BL

(7; caule erecto tetragono, foliis oppositis longiter petiolatis oblongis acuminatis glanduloso-serratis bflsi obli(juis (in costis infra plerumque sanguincis) laevibus, fasciculis pedunculatis axillaribus passim subumbellatis (Calix vnti-icosus , miinqcflus, subbilabiatus. Corolla subbilabiata, coccinea, interdum albido-fusca. Filamenta fertilia 25 sterilia 5, minuta, Bacca elongata, rostrata),

Cresclt: in sylvis interioribiis Javae,

CYRTANDRA CELEBICA, BL

C: caule erecto tetragono, foliis oppositis longiter petiolatis cliptico-oblongis acuminatis basi inaequali-attenuatis crenulatis glabris junioribus aracl-Möideo-pubescentibus, fasciculis paniculatis axil*

lari-

laribds (maxinie affinis C. coceineae, cui praeel*
pue diflert fasciculis pauiculatis).

Crescit: in sylvis insnlac Celebes.

CYRTANDRA GRANDIS, BL

C: caule erecto terotiusculo, foliis oppositis longiter⁵
pctiolatis elliptico-ov^tis acutis basi interdum obli-
quc-cordatis duplicato glauduloso-serratis in re-
ticulationc infra subtouientosis, fasciculis **pedun-**
culturatis **wllaxibua** involucratis, involucro bifido
(flores **coccinei?** stamina 5 , quorum duo lon^iora
fcrtilia. Stigma dilatatum, einargiuatum. Bacca
obloDga, roslrata).

Creacit: in sylvia alliuibus moiUium Gede, Salak, etc.

*Variet** foliis inciso-serratis.

CYRTANDRA ARBORESCENS^*

C: caule erecto **tetragons**, foliis (mnjusculis) oppo-
sitis elliptico-oblougiiJ basi in petiolum decurrenti-
bus inaequalitcr **dentatifl** supra laevibus subtus sub-
tomentosis, capitulis asillaribus pcdm.ailalis HIVO-
lucmtis, involucro maxiino ioliacco bifido.

*Cteacit: in sylvis montaiiis liuiuitlis Provinciae
Tjanjor.*

CYRTANDRA CVNEATA, BL

C: caule **tecto tetr** **agouo** , foliis oppositis (altero
minore) peitolalis cuueato-obiou^is acuminatis
superne **obsolete** C (Iicuticuktis **sapfa** giabriusculis in

(77*0

veiiis infra suTistrigosis , uinbellulis longitcr p~~e~~
duuculatis axillaribus.

Crescit: in Muluccanis insulis.

*JVHTTA** Bl.

Calix parvus, profunde quinquefidus, aequalis
Corolla infundibuliformis ; tubo sursum arnpli;to ;
limbo quinquelobato, irregular!, subbilabiato. *Sfamina* quinque,. quorum duo antierifera vix exserta;
tria setacca sterilia. *Antherarum* loculi insertione in-
acquales. *Stigma* subinfundibuliforme. *Fructus* bac-
catus , siliquaeformis ; . dissepimenti carnosi lobis in
margine revoluto seminifcris. *Semina* nuda, striata,
pulpa tenui cincta.

«

Genus hocce a *CyrtancLrn* differt: calic parvo us-
que ad basin fere parti to nee tubulos , staminibus-
longioribus exsertis nee inclusis, loculis antherarum in-
sertione inaequalibus nee parallelis, stigmate infuudi-
liformi nee capitato aut e margin a to aut semibilobo.

Frutices scandentes , foliis oppositis intcgerrimis
obliquis altero miuore, fasciculis brevitcr pcduncii-
latis axillaribus bractcatis. ^

* fructu elongato.

WIIITIA OBLONGTFOLIA, BL

TV: foliis pblongo-lanceolatJS glabris, fascicuiis brc-
viter pcdunculatis axillarij5us? bracteis lauceolatis.

*Cres-**

Crescit: in sylvis montanis.

Floret: omni tempore.

[^]*omen*: Lid a bebek.

* * fractu oblongo.

***TVHITIA CARNOSA*, BI.**

*W.*¹ foliis oblongo - lancolatis infra subtomentosis i
fasciculis breviter pedunculatis axillaribus bracteis
duabus ovatis involucratis.

Sjru Cyrtandra carnosa, Jack.

Crescit: in sylvis inontium Seribu.

Floret: toto anuo.

***RHYNCHOTECHVM*, Bl.**

Calix quinquefidus, aequalis. *Corolla tuba* brevi,
carnpaimliito; limbo quinquelobo, inacqualL *Sta-*
mīna quatuor , subdid juama , inclusa ; *antherae*
[^]nilocularcs, liberac. *Stylus* incurvus. *Stigma* obtu-
sum, *Fructus* baccatus, globosus, calice cinctus ,
*i88epimenti cariiosi lobis revolutis semiuiferis. *Se-*
ft. na nuda.

Genus Cyrtandrls praecipuč diversum: stamini-
bus quatuor fertilibus, autberis unilocularibus et
fruciū globose

***RIYNCHOTECHVM PARVIFLORUM*.**

Frutcx caule simplici tercti, foliis oppositis ob-
longo - lancolatis scrralis infra villosiusculis , corjm-
his dichotomis axillaribus, pcdiceHis subfasciculatis.

CrescU: in montanis Seribitt

l'loreI: Mai Iio , etc.

***LOXONTA?* Jack**

Calix tubulosus, angulatus, < u n̄g lefidus. *Corolla* iiifandi])uliforniis ; limbo quinqueiobo , inaequali , subbilabiato. *Stamina* quatuor, dūljuama, ij.clusa. *jnlherac* sagittatac, lobis divaricatis. *Stiff* ma bilamcllatuni. *l'rucfus* culicc inclusus { an deliiscens?), bilocularis, dissepiniati lobis revolutis semiuiferis. *Semina* nuJa? ioveata.

***LOXOSfjt?* DECURRESfS, BL**

L: foliis oppositis oblongis acuxninatis basi cuneatis deciirreiltibus scrratis glabris, floribus fascIcuLtis axillaribns.

Credit: in humidis moiitimm Séribn,

Floret. Februano, eLc.

***CENTRONU,* BL**

Calrx spatliaccus, hinc fissus. *Corolla* infixndibulifonnis; Ursibo bilabiato, subaeqiiiali; labio superiors bilobo , crecto ; inferiore trilobo , pntcnie. *Stamina* qua'tnor, inclusa; ant/ierar uuilocularcs_f dorso ad basin calcaratae , lib era e. *Stylus* crassus. *Stigma* cnpitatUTi, *Fructus* baccatus, ssliquaeformis, dissepimciiti cartosi lobis revolutis seininLTorls. *Se-minti* uuda.

Planta inter minores, subcarnosa, in radicibus arborum parasitica. Scapi aphjlli, stipulis bracleis,jnq
lis unifloris ovatis-obtnsis instrucli.

CENTRONIX MIRABILIS.

Crescit: ia sylvis huniidis monlis Salak-

florebat: Septeinbri, elc.

KVILLIA, Herb. Rwdt.

Calix (juinqueGdus; laciniis imbricatis, persistent tibus. *Corolla* infuudibaliforoiis; limbo (jiincpie^{/*} lobo , subacquali. *Stamina* (jiincjue, exserta; an- tlicrae incuinbenics, basi bilidge. *Stylus* crctus, *stigmate* capitate *Fructus* baccatus, olivaeformis, dissepimenti carnosii lobis revolutis setuiuiieris. *Se- mina* nuda.

KUILLIA MORINDAEFOLU, Herb. Rwdt.

Frutex vamolssimus, foliis oppositis (ma j used is) ovalibus utrincjue acatiusculis integerrimis coriaceis - glabris undatis , panicula tenninali nutantc, pedi- ecallis subcytnosis.

Crescit: ad pedem n;ontis Salak satis fre(|tiens<

Floret: per totum fei-e annum.

Nomen: Tjaukuda utan*

Ellgnoniaceae non *sails cognitae.*



***BIGNONI*sl GRANDIFLORA, Thunb.**

B: foliis pinnatis, foliolis ovatis grosse serratis basi attenuatis, pctiolo coinmuni margiuato, caule radicante.

Crescit: ex Japonia introducta.



S E S A M E A E .



***SESAMUM*, Linn.**

Calix (julnquepartitus; lacinia superiore ml no re. *Corolla* tubo sursum ampliato; limbo plicato, sub-Lilabiato; labio superior emarginato; inferiore se* jnitrifido; laciua intermed^elongata. *Stamina* cjuatuor, didynama , inclusa, cum nidi men to quinti. *jiniherae* libcrae. *Stigma* bilumellatum. *Capsula* oblonga, tcfragona, pscudo-quadrilocularis, bivalvis; dissepimentura valvis conliarium, bipartibilc. *Semina* uniseriata, compressa, aptera,

***SESAMUM INDICUM*, Linn.**

S: foliis infimis ovatis trilobis, suprioribus lancolatis iudivisis, caule erecto (flores albi).

*Variei** flore roseo.

Crescit: in liabitatis cult urn; varielas aulem in montanis spjntanca.

Floret: to to anno.

Nomeni Wiljeru

JOSEPHINIJ, Vent.

Callx quinquepartitus , acqualis. *Corolla* lubo sursum inflato; limbo subbilabiato; labio superiore seniibifido; iiiferiore trifido; lacinia intermedia longiora. *Stamina* quatuor, didynama, cum ruJmcnto quinti; *ant ferae* liberae. *Stigma* bifidum, laciinis emarginatis aut semibiidis. *Drupa* exsucra, aculcata, pseudo-octolocularis, loculis uionospermis*

JOSEPH IN U CELEBICA, M.

J: foliis suboppositis olfcngo-lanccolatis puberulis, pedunculis petiolo brevioribus, drupis dense toxncntosis.

Crescit: in sylvis Insulae Celebes.

Floret: Augusta, elc.



A C A N T H A C E A E ,



C O N S P E C T U S G E N E R U M
A C I N T I U C E A R U M
J A Y A N I C A R U E



Calix 5-partitas, acqualis. *Corolla* bilabiata. *Stamina* 2. *A.iLkera* i-locularis. *O^arii* loculi 2-sper-* mi. Genus *Uypoestes^* R. Brown,

Calix 5-raro 4-partitus, acqualis. *Corolla* irregularis. *Stamina* tcrtilia 2. *Aatkerae* loculis saepo inaequallbus. *Ovariis* loculi 2-aut polyspermi. *Gtius* *Juslvia*, Linn,

SECT. 1. *Verae. Ovarii* Incnii 2-spermi.

SrcT. 2. *Genviutn, PJ^*±Qis xrll* loculi polyspermi,
Antlierarum locti'is iiifimis barbalis.

Calix 5-partitus, r.equalis. *Corolla* irrcguJaris. *jnlheras* loculi ^nacc[iaics. *Capsiilae* orbiculuris disscepircnta iucompleta, dcmum soluta. *Semina* 4, abortu solitaria. Genus *Dicliptera*, Juss.

Calix 5-partitus, aequalis. *Corolla* liypocrateriforinis; limbo 5-lobo, subae<juali. *Slet7nLnafevl||.* 2; sterilia 2. *Anikeraz* loculis pa'allclis. *Osarii* loculi S-spermi. Gcuus *JSra/it/icmum*, Liun.

Ca~

Callx 5-partitus, inaequalis. *Corolla* hjpocrateriformis, 5-loba, i-labiata. *Stamina* 4, inclusa. *Antherae* i-loculares, barbatae. *Ovarii* loculi 2-spermii. Genus *Harrachia*, Jacq.

Callx 5-partitus Cdusvc, sabaefualis. *Corolla* infundibuliformis, 5-loba, subacqualis. *Stamina* 4, inclusa. *Antherae* loculi paralleli. *Ovarii* locuU poljsperini. Genus *Ruellia*, R. Brown.

SrcT. i. *Calix* 5-partitus, aeqlalis.

SLCT. 2. Ca/« 5-lidus, parum inacqualis. *Corolla* tubo incurvp.

Ca/^r, ·*Corolla-* et *Stamina* Ruelliac. *Ovarii* loculi 2-spermii. Genus *Atystasia*, BL

Ca//.r 5-partitus, accpalis aul inaequalis. *Corolla* su>)bilabiata aut ringens. *Stamina* 4; *antherae* loculi suhparallel. *Ovarii* dissepimeita incompleta, ctnata. *Scmina* quatuor^jtut obortu pauciora. Genus *Strobilanths*, BJ.

SECT. I. *Callx* aeqliaHa. *Caroline* litnbo 5-Iobo, SLibbilabiato.

SLCT. 2. *Apopedania*. *Calix* inaequalis. *Corolla* ringens.

Calix 5-partitus, inacqualis. *Corolla* bilabiata, aut infundibuliformis, subaequalis. *Stamina* 4, inclusa. *Ankerae* loculi subparallel. *Ovarii* loculi 2-spermii. Genus *Lepidagathis*, Willd., R. Brown,

SECT. I.

SECT* I. *Corolla bilabiata.*

Srscr. 2. *Apolepals*, §1. *Corollue limbo 5 - Iobo > subae<[iiali.*

Callx tubulosus, semi-5-fidus, aequalis. *Corolla* ringcns. *Stamina* 4. *Antherae* loculi parallel. *Ovari* loculi polysperm. Genus *Hygrophila** R, Brown.

Cnr?^: 5-partitus, inactpalis. *Corolla* ringcns. *Stamina* 4, exserta. *Ant/iarae* loculi pnralluli. *Ovari* loculi poljsperm. Genus *Nomaphila*, Bl.

Calix 4-partitus, parum inaequalis. *Corolla* subtilabiata, 5-loba. *Stamina* 4; anthcrifera esserta. *Aniherae* loculi parallel. *Ovari* loculi 2-spcrmi. Genus *Barleria*, Plum.

Calix 4-partitas, inaequa]is. *Corolla* unilabiata. *Stamina* 4- *Aniherae* uniloculares, barbatae. *Ovari* loculi 2~sperm. Genus *Acanthus*, Linn*



TIYPOESTES, ^land., R. Brown.

Calix (juinquepartitus, acqualis, involucro quailripartito trifloro (abortioKc sacpe uuifloro) inclusus?. *Corolla* bilabiata. *Stamina* duo. *Antherae* unilocuLrcs. *Ovari* loculi bisperm. *Dtssepimoium* adxialum. *Semina* retinaculis sub tens a.

HYPOESTES FORSKuk(j>LI₉) Suland.

II: caule fruticoso crccio, foliis ovatis acuminatis super ne subrepandis infra puberulis, thjrsis axilla-

ribus terminalibusque subramosis secundis, involucri laciniis linearis-subulatis pubescentibus, interioribus brevioribus.

Cresclt: ad ripas fluviorum Provinciarum occidentium Javae.

Floret: per totmn annum.

Itfomen: Jaiupang Kai.

***JUSTICIA*, Linn.**

Calix quinque-raro quadripartitus, acqualis* *Corolla* imsgulaiis, bilabiata vcl ringcns. *Stamina* duo anihericera. *Anlherae* biloculares, loculis insertione saepe inacmialibus. *Filamenla* sterilia liulla vel obsoleta. *Ovariⁱⁱ* loculi di-rarius poljspermi. *Dissépimentum* adnatum. *Semina* relinaculis subtensa.

***JUSTIÇIA BICALYCULATA*, Vabl.**

J: caule suffruticoso erecto, foliis breviter petiolatis ovato-oblongis subrcpandis, spicis subramosis axillaribus terminalibusque, calice dupli, tubo corollac torto, limbo bilabiato.

Cresclt: in graminosis Provinciae Tjanjor.

Floret: forte per Lohmn annum.

***JUSTICIA DICHOTOMA*, Bl.**

T: caule inferne procumbente radicante, ramis dichotoinis, foliis longiter petiolatis ovato-oblongis lobgitcr acuaxiuotis basi acutiusculis subrepandis

utrin-

utruique pubtTulls, pnniciila torminali glamlulo-so-pilosiuscula , pcilicollis in c\mis simpHcibus (itli.svc secundis, corollac ringciitis labio superiove (Smargiiialo, inforiove trilobo.

Crescil: in umbj'osis sylvaticis.

Floret: ounii teinpure.

JUSTICIA PICT A, Linn.

J: caule fruticoso ejecto, foliis oblongis uti-inqiic ncults, florib'.is sul>J'«.st'Icitlatis nut r;iceruosis a^iilnribus, tubo corollae suvsuiu aiupliuto coinpiTSSO, limbi luciniis rovolutis.

Var • *albit*: foliis allido-nuiculatis.

Var % *litrido-sanguined* : foliis liu'itlo-sanguiucis.

Cresclt: iu **Jiortia**, vuTgatisslma.

Floret: toto anno.

Notien: IlauduUun.

* *JVSTWIA FULaWA*, Bl.

J: caule sufTruticoso,• ramis terfibus, foliis brcvilcr petiolatis angusto-lanceol.itis acuimnatis obsolete **dcentdictdatia sabpnbescentibas**, **racenmlls** axillari-bus **tcrmiuab'busqtie** subbilidis pauciflons, Lracteis linwari-lanceolatis calicibn<trjue gland uloso-pubesceiiiibm_f corollao lal>io **snperJoTc** obsolete bidentato; inferiore trifido.

CremLi: i:i ilolaccis.

Fi'r.rl • *JnHio*, fStC.

JUSTICU NASUTA, Linn

J: frutiçosa crecta; foliis oblongo-lanceolatis apice obtusiusculis, paniculis axillaribiis foliosis dichotomis, labio corollae superiore lincari obsolete bidei UaLo, inferiore lato trilobo (uulhcrauuui loculi obliqui).

Ci-escit: ad scgctcs.

v Ut

Floret: oinni lernporc.

Nomen: Trebc Japan; Kak\rara; damvn Sarou Burung.

JUSTICIA GANDARVSSJ, Linn.

J: fruticosa divaricata, foliis angusto-lancicolatis, spicis terminalibus foliosis strictis, floribus vorticillatis, aut berarum loculis itifimis (I. iuterioribus } basi calcaratis (fig, Illicedii IX. t. 42 optima).

*Crescil: in sepibns vivis, sed forsitan <>x iusulis Plu**
lippinis iutroducta.

Floret: per to turn annum.

Nbnian: Gandarussa; d\u00e4uwn fransmau.

JV STIC IA ADHATODAj Linn.

/: cauie frulico\u00f3o, foliis lato-lanceolatis longilcr acu* mhiatis, spicis longiter pedunculatis axillaribiis op-positis quadrifariam iinbricatis, bractea extevlore ovata perrnanento, corollae ringentis labio supc* yiore fornicate cmar^inato, inferiore irilobo.

Crescit: circa Linga Jaltie Proviuciae Cheribon ia segetibus vivis.

Floret: omni fere tempore.

Nomen: Kiraranntho.

JUSTICIA OCIROLEVCA, BI.

7; caule suffruticoso inferne procumbente, foliis Ion-giter petiolalis oblongo - lajiccolatis mucronulatis subrepandis utrinque puberulis , spica terminali, floribus verticillatis bractcatis, bracteis ovatis reticulato-venosis ciliatis, corollae ringentis labio superiore retuso, inferiore seinitriobo (aff. *J₉*, *Hetanicae*)#

Crescit: circa Rompicn.

Floret: Martio, etc.

Nomen: Djukut bnntnt seroh,

JUSTIC IA GLOUERATA, BL

/; caule suffrutico subramoso erccto , foliis longiter pctiolatis oblongo -lanccolatis acutis basi in pe-tiolum angustatis parum .denticulatis glaberrimis, spica tei'ininali, floribus verticillatis, bracteis ova-tis calice brevioribus, corollae labio superiore for-nicato emarginato, inferiore scmitrilobo.

Crescit: in umbrosis insulae Nusae Kambangae.

Floret: Octobiri, elc.

JVSTICIA ROXBVRGHIANA? Roem. etScli.

/.* suQruticosa adscenlens, foliis peliolatis ovato-ob-longis acutinatis supra scabriusculis subtus pubc-

ris ,

ris , capitulis involucratis fasciculntis tcrminalibus axillaribusve, iuvolucris diphyllis lincari - Ian ceolatis 5-6-floris, tubo corollae torto, labiis subaequalibus, superior[^] semitrifido, inferiore rotundato obsolete bidentato (Planta nostra a 7, *Roxburghiana* differrc vide tar iuvolucris fasci-* Culatis, et bracteis subaequalibus; flores rosei).

Cresell: in montosis Scribu*

Floret: per toLum annum.

JVSTICIJ ALBIFLORJ, BL

J: cnule berbacco erecto » foliis pctiolatis oppositis (altero sacpe abortivo) oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis inaequilateribus subintegreiTimis subtus pubescemibus, capitulis 5-8-floris fasciculatis tenminalibus, involucris diphjllis linearl - lanceowtis aequaalibas, corollae labio supcriorc trkTen-tato, infcriore rotundato (ab antecedentli praecipue differt forma foliorum et calicis lacinils multo longioribus subulatis)f

Crcscit: in montosis.

Floret: Julio, etc,

JVSTICIA SJLICIFOLU, BL

J: caule lierbacco ramoso inferne procumbente, foliis petiolais angusto-lanceolatis integerrimis in venis utriiKiue pubcrujis, capitulis 2-5-floris fas-

ciculatis termiaalibus involucratis, involacris di-
2>ViHs linear-lanceolatis inacqnälibus, cpfplac
labiis sübaccpalibus.

CreacU: in monticiis caicareis Kiiripan.

Floret: Majo, etc.

JVSTICIJ PROCUMBENS, VahL

J: caule horbaceo procumbcnlc repente obverse sca-^
bro, foliis brc\itcr petiolatls lanccolatis obtusius-
culis raro obovatis pube ininuto strigosis, spicis
nlaribus tcr mi nalib usque tetragon is solitariis, brae-
tcis lanccolatis dorso subpubescentibus et calicis
foliob's majoribus (cjosnli neinpe minutissiuo)
inargue membranaceis ciliatis,

CrescU: ad rivulos circa Tjikao Provinciae Tjaunjor«

Floret: onuu tempore,

f^amief. foliis lato-lanceolads utrinqnc strigosis, spi*
cis elongatis.

Crescit: in Proviucia Tjanjor circa Bandung.

SECT. Gcneium.

Anlberarum loculis inGmis ba\$i barbatis. Capsulae
loixi!is polyspermis.

JUSTICE PANJULATJ, Bnm.

J: berbacca ercta, foliis subsessilibus lanceolatis,
panicula bvacbiata divaricata foliosa, floribus se-
cundis ertxtis, iilamcutis anticc birsutis.

Cres-

(7*9)

CrescU: circa Bataviam locis siccis,

Floret: loto anno.

JVSTICIA LAXIFLORA, Bl.

! caule lierbaceo 'divaiicato, foliis petiolatis ovato* oblongis, ramis et pedunculis dicbotoilis, floribus secmidis crottis abrupte spicatis, filamentis antice barbatis.

CrescU: in sylvis montanis.

Morel: Jimio — Scptembri.

DICLIPTERji, Juss.

K[^]aux fiuiiKjuepariitus[^] acqualis. *Corolla* irregii-
l[^]s, bilabiata. *Stamina* duo. *jintherae* loculis
~~inserti~~^{tie} inaequalibus. *Capsula* Orbicularis, com[^]
pressa; dissepimenta inconspicua, a valvis carinatis
~~de n m n i s o l u a~~. *Senuna* in singula valva duo, aborta
solitaria, retiiliaculis sublensa.

DICLIPTERA BIVALVIS, Juss.

D: caule percniii retroflexo angulato, foliis ovato-ob-
longis basi plerumque angustatis obsolete cricnulatis
ubpubescentibus, pedunculis axillaribus trifidis
pedicellis 3-5 umbellato-distichis, bracteis subrol-
tundo-ovalis nervosis arisutis (planis) ciliatisval-
le inaequilibus.

CrescU: ad marines fluviomm prope Buitenzorg.

•*Floret i Junid[^] Octobri.*

Dh :

DICLIPTERA ISTERR.UPTA, DL.

D: caule herb a ceo erccto , foliis inferioribus longiter petiolatis ovato-oblongis, superioribus sub cordatis subscssilibus intcgerrinit̄, spica terminali subraniosa ititerrupta, bractcis ovatis acuminatis ven*tvicosis nervosis glanduloso-pilosiusculis subacrjua-libus.

CrescU: ixy umbrosis montanis.

JFloreI: ALTgusto, elc.

DICLIPTERA PECTIN ATJ , luss.

I: spicis axillaribus termiuaiibusque secuudis puberulis, bracleis doisalibus lanceolatis bifnriis (avcniis) basi margioe membranaccis calicibustpie ciliolatis, foliis lanceolatis obtusiusculis, caule erectcr divaxicato*

CrescU: circa Linga Jitltie Provinciae Cheriboix - locis bumidis.

Floral: Seplembi'i, elc.

Nomen: Kalum[^]an lanang.

DICLIPTERA CAERULEA, BL

D: spicis axillavibus terminalibusque seciindis sub* pubescentibus, bracteis dorsalibus bifariis Ian ceo-* latis margine membranaceis trinerviis calicibusque ciliatis, foliis lanceolatis, caule inferne repent*¹ (medium inter. 2). *repentem* et *D. trinerviam*)*

Cres-

Cheic't: in ambrosia montanis ad mirginea rivulorum;

Floret: oinni tempore.

Women: Pepe re - p* pc/ a.u.

Sfn. *Justicia caerulea* milu, *irf. Catal. Ilovi. Euitenzorgii pay. 'l.

rar. a. spicis omnibus lernunalibas, foliis elliptico-
iiuiccohdis.

Cresdt: in innntosts SalaTc.

^«r. Zx spicis sub^eminatis teiaiaalibus, bractcis la*
to-lanccoiatls.

Cresci: ad ||«dem montis Tje.'iaiai.

Vaf. c. foliis linear-laiiceolaUS aut snatulatis, call-
cibus baud cillatis.

Crtscit: in umfarosh hamitlis Insulae N.isae Kam-
bangae.

ERANTHEMUM, Linn.

Calix quin<jucpartitas, aequ:ilis. *Corolla* hypo-
cratfriformis; limbo qiiinquclobo, aequali aut paruru
i!1^Jcjiifili. *Slami/iaantlievifcra* **duo**; duo sterilia. Au-
werae loculis parajlclis, muticis. *Qvarii* locnli bi-
S]>urnii. *Cap&u/ae* valvae **navicolarea**, disscolnicuto
^dnato. *Semitia* rctiuaculLs **iabteusa**.

ERANTHEMUM PANICtTLATUM^ B?.

-G: caulc suffL-uiicoso, ioliis **opposltis** oMongis **utrin-**
true acutniuatis **subi^epaadis** ^iabris (sutis crass s),

panicula **termnali** contracts ex cymis dichotomis
conipos;tu, stamiuibus i'ci'lilibus exseuis.

C'esctt: in montanis Provincial Tjanjor.

Floret: Au[^];isto , elc.

E n A V Til IMM DIA V TH E RI'M, B oxb.

Jennie sufruticoso erecto, "fains brcviter ptiola-
t!s oMoti[^]o-lanceola[is *mt ovato-oblongis aca-
niinalis subn-pmtlis glnbris, racemis ti?rniiia!ltus ,
floril»us subfasciculati s, corolla **suhbiabiuta**, au-
thcns vix c\st,i'tis.

Creacit: in mon'.osis praeoipue calcareaia.

Floret: per tutuin aanuui.

BRASTHEUVM FASCH CULITUM, BL

JE: caule erecto sufruticoso , foil is byeviler petiola-
tis ovato-oblongis oblyf[^]ue-acuatiatLs basi acu-
tiusculis suhiTpniidis iu Vfetis infra pubescentibus,
pcdunculis axilkribus apice subtrifloris petiAo
longioribus (off, fc\ bicolori et *E. vincoidi*).

Creseiia: ia sylvis tuoutanli.

Floret: tulo

ERAXTiniMl / XJLACC ENSE, Ul.

E'• cattle suffruticoso erecto, foliis o Mongis uti
longiler acniniatiis subrcpandis glabiis, spi*;i i er-
inata elongata , lloriluis snbvertitciliJ&tis, capsulis
scabriuscalis (corolla azurea; aff. *E. tricto*).

Prisci 11 is ir.ontfjsis Salak-

Floret: omni fere tetnnore.

ERJ NTB EMXm VISCIDUM, Bi

E: caule ~~sugfuticoso~~ adscemlente, foliis brcviter petiolatis lanreolalis utiinque acuminatis integemmis, Spicia avUartbiU tenuinaliliusquc tclragonis imbricatis, brapfeis (uniHons) spatialatis caiicibuscpic glanduloso-pilosis, antberii tubo eorolae iudusis.

C€ c : Jii aontosis.

Floret: o:nni tempore.

Variet. foliis liucarUon ceolatis longissime acumiuaiis.

HARRACHI A, Jacq.

Calix quinquepari'uis, mo€jialis, tribracteatus.
Trolla hypocrateriformis; limbo unilabiato. quin-
tu's'lobo, scstivatione plicato. Stamina cjuntuor,
didynamia, inclu g a; (Zntherae uniloculares, barbatie.
Capsula compressa, bivuivis. Semir 10 in auovis lo-
culo gemina, retinaculis instructa-

HARRACHIA SPECIOSA, Jacq.

H: foliis ternis quaternisve ovato-lanceolatis, spicis terminalibus tetragonis, bracteis calicibusque pubescentibus longiter ciliatis.

Crescit: in hortis frequens.

Floret: per turn *qui*num.

lif/FLLTA_y Linn., Rob. Brown,

Ca⁷ix quinquepartitus nut quinquefidus, sabae-
qtialls. *Coro.a* infundibuliofrmis a at campanulas;
limbo quinquelobato, subnequali. *Stcim'tia* qnatuor,
subdidjnama, inclusa. *Anlkerae* loculis parullclis.
Qvnrii lucili polyspermi. *Capxula* subscsilis, bi-
^alvis; dissipiuta adjata. *Semir:a* relluaculis sab-»
ttnsn.

SLCT. I. F'oros sibsnTILarji. Coroiae limLo quin-
quelobo , subaequa.'i.

HUELLTA REPESS, Linn.

fi: caule herbaceo procumbente, foliis lanceolatis aut
ovato-lanceolatis acuminatis intcgrrimis pilis mi-
nutis adpessis, floribus axillaribus subsolit&rifs
scsilibus blbractcatis, bractcis ptiolatis foliapcis
calice longioribus, corolla campanulata.

Crescit: ail ripas fluviorum circa Rompicn vul^a-
tissima.

Floret: omni tempore.

SECT. a. Flores spicati, bracteis imbric*^i*, sub-
tetragon i. CaSix quinquelidns , iiiterdum
qainqnepa:litns, parmn inaeqnalls. Corol-
la infundib'iJiformis; tubo snbiiciU'To;
limbo quinquelobo, subbi'abiato.

ItUELLIA REPAID A, Linn.

M: caule berbaceo repente scabro, foliis oblongo-
lanceolatis (ahero iniuore) obtusiusculis repau-

dīs supra pilosiuscnlis infra Im'cteis cnlicibus^
quc hittis, spici3 axillaribus terminnlibusquc bre-«
vibus, bractels oblongo-lanceolatis ciiati.

Crenél: in montauis ad rivulos.

Floret: per to him annum.

RVELLU COLORATJ, Bl.

Jl: caule lierbnceo repente, foliis petiolatis cordato-ovatis f;rossc rreunl.-itis discoloribus (infra purpurcis) maipne scaberrimls, spiris term!nalibus tetrngonis, bracteis oblpngo-iaiscecoLlis obtusis ciifolutis.

Crescil: in horlis Javar.cr.siiiin.

Floret: omni fere tempore.

i\~ji/2tf.'i: Rendoë burrnin.

KUELLIA BICOLOR, Bl.

Jl: caiic 'herbacco adsrxndcntc, foliis ovato-oblon-gis ncu:nict:5 bod interdani obliqnis inU-gcrri-mis discoloribus (subins purpurcifi) infra scabris% spicis Hxillaribus termiiiftibusque tclrngouis, bvne-tvis oblongo-IniiceoiaLi's acutis loiaceis cili'jitis (iii: R. eloiigalae).

Crescl: in STVIS montaris.

Floret: Mnjo—— Augusto.

JVo. 'nen: Rauak iakkie.

JIUELUA FENOSJ, Bl.

S- cauic berli.icco infernc procrnnbciiitc, folilj oL- iongo-iauc«Oñalís sujreuaiidig gl'ubriiisculls paral- Iclo-

lelo - vrios's , snicts nxi'llari^{bus} terminalibusque
tetrasronis, **bracteia** elliptico - lanceolatis venosis
pilosiusculis.

Craxcit: in **humidis** circa Emten-org.

r'ui'd : omni iempore.

ASYSTASIA, Bl.

Calix quinquepartitus, aequalis. *Corolla* infundi-
Tmliforrais; limbo qiiinfjuelobo, panirn Inncq^al',
Sfa7?iina q';atuor, didynama, inclus*i: /A /Y/I" lo-
culis paniiclis. *Ovarti* loonli **bispermi*** *Ciipsufn* dn-
vntn , **bivalvis**, disocpimcno adnato. *Se?ni/ia* reiina-
culfs s;ibterjsa.

Hoi'bae oppositfoliae, cau'esreiitcs, sp'cis Ja\!s £< c-
cundis, sic•rlius aUcrnis tiibvactcolaiis.

ASYSTASIA INTRUSJ, Bl.

|A: cauic crcccto rnmosissimo , **foliis** ovuto - oMorj;is
nonminatis intcj;evn*Miiis pilis minutis adspeis;s , spi-
cis axillaribus ct termkialibus nutantibus.

Sy^3,7. *Rue'Iia intrusa*, Forsk.

Cresc'l: circa Pnitcuzorg in **ambrosia** **humidis**.

floret: omni fere tempo *c.

STROBtLANTHES, B3.

fVrV.v **quinciepartitus, aecpalis.** *Corolla* i nfundi-
bulifomiis; tiibo clongato, prtrum incurvo; **limbo**
quinq!obo, **sabbilabiato.** *Stamina*, qnatuor, di-
d^aama; *anthe* rae loculis subpuraliciie. *Oraril* Jo-

culi

ouli bispermi. *Capsula* compressa. **hitalvis**, disse-pimento mcoinp'eto atlnato. *Semina* rtithj&cuiis sub-teus:i.

Genus hoc a 8 for ho d'stincm;n disscpimeuto ad-nato; ad *Rueliam* est <juod *Di Clip I era* ad *Jusllcia*

Herbae cauh-scntes, oppositifolioe, floribus dense **capita tis** aut dense spicatis bractcis **majuacuiis tnibxi-**
Cdtis.

K

STROBILAXTHES HtRTA, Bl

hirta: cauit: **inferoc repente-diffuso**, foliis petfo-
I l a t i s elliptioo-obloifiis **utrinqtic acttniluotis serra-**
tis, spicis **peinncalatis axillaribus terminalitmsve**
so'.itorus geminisve, bractcis rotandutis supernc
liirlis.

Synon. *Tluella hirta*^ **VabL**

Cresclt: in **ombrosismonUni*** Proyinciarnmoccideu-tatium Javae **iiisulae.**

Floret: onmi iere **tempore.**

Variety crenuateu foliis crenulatis, spic^ **densiori-**
bns c<>su foliorum raccniosis, bractcis dorso sub-
inn 1 is **tnargine** cilia tis.

H

CteacU: in monLosis Provinciao **Tjanjor.**

STR OBILANTHES CERNUA, Bl.

cnulc infernc procumbente, foliis pctiolatis ellip-
tioo-olilongis utrinqne **acaminatis** dcnUts supra
pubcriUis, spicis **peduncuiatis** subglobosis axilla-
ribua

ribus ierminalibusque (casu foliorum fasciculntis) cernuis, bractcis subrotunrlis glabriusculis triner-viis (aff. *S. hirta*"i sed hracicis majoribus trinerviis subuudis stis dis tin etā).

Crescit: in montosis Salak.

Floret: Majo, etc.

Varicl. laxijlora. spicis oblongis erectly

Cresc'U: ad cata.Tacta3 iluvii Tja^{us} in nionte Salak;

STItOBTLdVTUES CR/SP.4,B\.

S: caule inferno repente genicalnto norloso, foliis cblongis atrin(?)uc acmninat'S cris[)ato-crenatis his-* pidu'iis, spicis o vat is axilluribus terminalib usque sessiibus, bractcis fuliaccis ovatis acuiuinatis cili-alls (an *RueLia crlspa* hujus loci?).

Crescit: la nmbrosis moulmis IVovinciaruni Tjaajor, Che^{ibon}.

Floret | omni fere Irmpjre.

Roman lla - lip tjai.

STROBLANTHE *!? ALATA, BI.

Si caule suffruticoso adscencicxitc, raninlis tctragojiis subahais, fohis oblon^o-Iauceolatis dcuticu-Jatis glabriusculis.

. *Crescit:* in sj-lvis Pi-ovinriae Bantai.i.

Fiord: llajes nondaai vidi.

(799)

•w:7i OiiUjAtfTIIES 'INPOLUCRATA, BL

*Si c;m!e divaricato geniculato nodoso, foliis obloji-
go-lanceolatis utrinquc acumiiiatis supernc sub-
rcj)audis, capitulis multifloris terminalibus axil-
laribusvc, brnclcls foliaceis ovato-oblongis veuosis.*

Crescit: in moiitanis Salak, Seribu, etc.

Floret: Martio, elc.

Variei. foliis supernc dcnticulatis scabrls.

Crescil; in montosis Proviticiae Tjanjor.

STROBILANTHES BIBRACTEATA, BL

*Si caule ramosissimo divaricato procumbente, foliis
breviter petiolatis lanccolatis utrinque aciiminatis
-scrratis parum pubescntibus, capitulis peduncu-
lads axillaribus tcrminalibusque paucifloris brac-
tcis duabus foliaceis serrulatis involucratis.*

Crescit: in montosis Salafc,

Floret: Junio, etc.

STROBILANTHES SPECIOSA, BL

*Si caule sulVuticoso crcto geniculato-nodoso, foliis
siibsessilibus lanceolatis utrinquc acuininatis argute
serratis villosiusculis, capitulis sub-5-floris casu
foliorum racemosis axillaribus terminalibusque,
bracteis lanceolatis trinerviis cxt ei'Dcpubescentibus.*

'Crescit: in innbiwis monlis Mngameudung.

Floret: Jlajo, file

SECT. 2. APOPEDANIA.

Calicis laciniis inaequatibus. Corolla rugosa. Flores laxi spicati*

STROBILAMTHES FILIFORMIS, Bl.

8: caule adscendente geniculato ramoso, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis serratis glabris, spicis brevibus paucifloris subpaniculatis axillaribus terminalibus et bracteis lanceolatis (parvis serrulatis) et luciniis calicis glanduloso-pilosis.

Crescit: in sylvis aliorum usus modiis Buraiigraiig, etc.

Floret: Angus to , clc.

STROBILANTHES CLANDULOSA, Bl.

S: caule adscendente geniculato ramoso, foliis inferioribus petiolatis ovato-oblongis crenulatis, superioribus sessilibus ovatis, spicis brevibus subpaniculatis axillaribus et terminalibus et bracteis (parvis linearibus) calicibusque glanduloso-viscidis.

Crescit: in sylvis allioribus nioiitis Gede, etc.

Floret: Jimio , etc.

STROBFLANTHES MOSCHIFERA, Bl.

8: caule herbaceo in feme radicante, foliis oblongo-lanceolatis crenulatis hirtis, spicis axillaribus terminalibusque densis, bracteis calicibusque glanduloso-pilosis,

Cres-

Creact: in cleclivitalibas monlosis Solassie **Provintiae Tjanjor.**

Floret: omni teinpoi^.

Nomen: Buutut Sieguug.

***LEPIDAGATUIS*, Willd.**

Calix «juin<jucpartitus, inaequalis. *Corolla* bila-
biata (raro infundibiliformis, et tune limbo subae-
cuali, 5-lobo ^; labio superiorc integro 5 inferiore tri-
lobo. *Slamina* quatuor, didjnama, inclusa, *Anthe-*
ranim loculi inscriptione subparallel. *Ovari*i loculi
tispermi. *Capsula* bivalvis, compressa. *Dlssepi-*
mentum ligncum, sulco exsculptum, adnatum. *Se-*
mina retinaculis subtensa.

***LEPIDAGATIirS PARVIFLOHA*, BL**

L: caule herbaceo repente, foliis ovatis 1. ovato-ob-
longis obtusiusculis basi subcuneatis, capitulis axil-
laribus terminalibusq[ue] secundis, bractcis calici-
busc[ue] glanduloso-pilosiusculis et ciliatls.

Crcscit: in calcariois Kuripan et etiam circa Ba^iu
viain et Tjifcao.

Floret: Mai 170——Aiignslo.

***LEPIDAGATJUS JAVANICA*, Bl.**

-t- caule herbaceo adsceudente, foliis ovato-oblone-
gis aut lato-lanceolatis utrinque acuminatis subre-
pandis, spicis secundis axillaribus terminalibusque
ramosis, bractcis calicibus[ue] glanduloso-pilosis.

Crescit: in montanis Gede.

Floret: tol o ani to.

*Vaviet** a, spicis contvaciiis **densioribtu** brevItcr p-
dunciilutis.

Cresciü: in lylvia kamiliovibns nionlis Tjerimai.

VarleU b, spicis deusionbus , **bractcis calicibusjj**
dorso nudis.

Crescit: iu monlusic Provincie T'jjinior.

LEPWAGATH18 SETIGEUA', BL

XJS cnnc herbaceo repente, foliis ovato-oblongis ant
eUiptxco-lanceolatis dentatis birsutia, capkulis axil-
Inribttfl tcrminnlihusque scciindis, braclcis **caliet-**
bosrnze setigeris.

Crescit: prope Tj'ik.9 o.

Floret: Jni io, etc.

SECT. 2. VPOLEPSIS.

Corolla rubulir.il, swrsuna ampliata.5 lubo inciirvo:
liml)o qTiiuq[uelobo, subacquali.

LEPIDAGATSIS REPAN&A, BL

X.-cnulc hrbacco adscendcntc gniculato -nodoso ,
foliis oblongis ulrincjuc acmninatis **repandis** gla-
bvis infra canescentibas, spfcis axillaribus 1er-
min«lib usque etagoni», braeters cun eatis colo-
ratis (intioresceDtia hujus plantae ouinin* ad
Ri<ellias nostras secundac scctionis spcctat, **cap-**
sulari loculis autcm dispermis ab illis reecedit).

Cres-

*Crescit: ad ripas in montosis Parang Provinciae
Xjanjor.*

loret: Majo, etc.

HY&ROPHILAI R. Brown.

*Calix tubulosus, seroqtauncjuefidus, aequalis, de-
nmm ^uinqacpanUus. Corolla ringens. 6^{tami} na
(juatuor, didjnamas antherarum loculi parralieli.
O^ar« locuH polysper mi. Capsula lei^{retius} cala,
diMepimento adnato. 6^{le} ina^{retina} c:uli^{retius} s u l tensa.*

7; YG **HOPHILJ UNDULATA**, *hl*
*m canlc herbacaD in&me repe me. foliis obovatis a^{III}
cliptico-lanceoktis intcgria hirsutis, capitulis aiU-
lnribus scssilibtis.*

Synoru Ruellia undulata, Valil.

Crescil: in piludosis Bataviae.

y loret: Julie.—Seplemtri

*/-.ariet. rolus Ion; jiter petiolalis oblor. go-!anceolatis
iiuerdum ob oTatl subuwdulaus.*

Crescit: circa Buiteozorg et Tjik»).

U3 GRÖPH riLJ DIFFiORMIS, Bl.

*Jf.-c aule herba ceo p rocombente, foliis Jiu.aW.-lan-
ceolati; integris birsaüs, capitulis axiUaiibiw ses-
8iibus,*

Synon difformis, Linn.

Cres-

d'encit: in pjitiuiiiMia ijtlavidae.

"*Floret:* cum priori •

HYCROPHILA? *PUSILLJ,* *BL.*

77: cr.ulc herbacco inferne rcpcnlc, foliis subsessili-hns linc:ui~IanccoL'itis an gust is pa* JO mi nn to adpressis, fl-ori'bns subsolitariis axiilnnbiis sessilibus.

Cresvit: in Moluccis.

Fhrci-. Angusto, e!i*.

NOUJPJIflJ, *BL*

Calix qunquepartitus , inafrqualiS'? lacinia cloi'Sali
maj u PC *Corolla* vñ gens. *Stamina* q n a tu o r . did y-
nama, esserta. *A-iihararuTn* loculi pnralldi. *Coj)~*
sit/a tcretiuscula, bllocularis, bivnlvis. *Dtssep'nunta*
adnata. *Semi/ta* plnra, retiuaculis subtensa.

- Genus *Huelliiae* tliversum cilice inaeqali eU co-
rolla ringente,

NOMJPJITLA *COUYMBOSJ,* *BL.*

Caulii; hrbaccus, rnmosus, ercttus; folia longiter-
putiolat;), opposita, lanceolata, utrlnquc acuroiuata,
Integra, glabriaacula^ corymbi axHlarcs, diciotomi_T
sicut ca!i;t_s glaudiilos-pilosi.

Cresci!: in gramiwosl Uamidla prope Tjtkao P.^{ro-}
vir;ciae Tjanjor,

Floret: Janic — Septembri.

SARLERIA, Linn.

Calix profiintfe qnadripartitas; laciniis interioribus angrtstioribus. *Corolla* infunrībulifbrim̄s; Rmbo quinquelobo, subbilabiato, acstivatione imbricato. *Stamina* antherifera duo, exscita, cai» rudimentis duo bus iu fundo tubi corolhic. *Antherae* loculi juscrtionc pnfullcli. *Ovarii* Toculi disperini. *Cqp&uiae* sessilis disscpiaicnta adaata. *Semiūct* relhiaculis subtoiisa.

BARLERIA PR1OMTIS, Linn.

B. spinis axillaribus pcdatis (juatcrnis, ramulorum subgcmminis scssili^as, foliis oblongo - lanceolatis marline subtusque pilis atlprcssis.

CrescUi in paliulibns Balaviae, praccipue in hortis vulgatissima.

Floret: Gomo Lanciflik.

ACANTHUS, Linn.

DrPivarria, Jirss

Calix profunde quadripartitus; laciiiis interioribus miuoribus, inclusis. *Corolla* unilabiata. *Stamina* auatuor, amlicrifera, didyiama. *Antherae* uiiloculares, barbatac. *Stigma* bilobum. *Ovarii* loculi dispermi. *Dissepiments* tdnata. *Semina.* reclinacalif subtensa.

ACANTHUS ILICIFOLWS, Lhm.

A: **canlfī** fruticoso acuiealo aut sublncri mi, foliis oblongis ruucinatis simutto-spinoso-dentrattis passimque integris *f* spica muitjilora, floribus trifrracteatis.

Crescit: in lerris adlnvialibus paludosis.

Floret: omni fere tempore.

Nomen: Galli calli.

ACANTH'IS ERRACTEATUS, Vabl.

A^f: canlc fruticoso incrmi, foliis oblongls **intcger-rlniis** (planis) passimque spinoso-deniatis, spicft mnluflora, floribus unibractcalis.

Creacit: cuiv prioii,

THXJNBERGIA, Linn.

Calix brcvis, Librae tea lus, niultiGdiis. *Corolla* tubulosa; tubo **supra basin ampliato** (bine caiinato); limbo **quinquelobo**, actuiuli. *Stamina* qtiatnor, **di-dynama**, **inclas.** *Stigma* infundibuliforme, atrinque emarginatum (quasi bilobnm). *Capsala* **inferne** globosa, superne compresso-rostrata, bilocularis. *Setuina* iu loculis **gemina**.

THVNBERGIA JAVA NIC A, Gacrt. fil.

7V foliis cordato-ovatis acutis intgorrimis supra scabris subtus puburulb, **pcdnncolis** i'olio brevionbus.

Miime varlat rat! one expansion!* foliorum at quo
Jmbcscntiae. Intcrdum pagina iufima foliorum est
glabriuscala, mine tomehtosa ; raro autcm folia utrin-
fjuc tomento stint obsessa.

Cre/tcU: in fmciicetis ct **in segetibua frequens.**

Floret: oinni lempore.

Komen: **Patok** inanokj Patok gfigak.



V E R B E N A C E A E .



C/:£:^ODE>ID R U M , Linn.

Volkameriae Sp, Linn.

Caltx campanu]ato-(piin<£uedcntatus aut-quinquc^
filus. *Corolla* lubo cylindraceo , saepins elong<toi
lim ho (**joinquefido**, aeqtali. *Stamina* quainor, di-
dynama, exscrta, secunda. *Ovarium* i]u.iclrilociare,
localis uni-ovulau'y. *Stigma* biCdum. *Drupa* bn'c-
ata, **calice'** sacpius ampliato ciucta, nucleis quataor

..... s.

CLERODENDRUM FORTUNJTUM, Linn.

& foliis vrticillnris tcmis qualcrnisvc !**ineari-lan-**
ceolalis integcrrimis glabris, fnsciculis pttlun-
culntis axillarihus • (calix campanulaLo - 5 - lidtis,
ad basin purpiirascensj (lores j,j;ili'i'le ilavi, tubo
ngissimo).

Cresr

Crescit: ciica Linga JaLlie ad rivulos spontaneuni;
in liuriis sacpe cullura.

Floret: omni tempore.

Nom^n: Jure.

CLERODENDUUM INETIME, Gacrtn.

C: foliis oppositis oblongo - 1. elliptico - lnnceolatis basi attiMiuutis apicc obtusiuscnlis integerriinis co- riaccis glabris, pedunculis axillaribus, summis 3- floris, iiifcrioribus biddis 7-lloris, calicc campa- nulato obsolete 5-dentato (flores a]Li).

Crescil: in fraticetis Inaülimis insularuin Javae^ Moluccanim, etc.

Floret: omni leuiporc.

Nomen: Oambir laut.

Varietas: calicibus campanulatis obtuse dentatis.

Crescit: in sylvis litloralibas insulae Nusae Kau* bangae.

Synon.: *Vollameria inermis*, Linn.

CLERODENDRUM LAHFIFOLWM, Bk

C: foliis oppositis oblonpo-lanceolatis utriiiHjue acu^ minatis iiitegerriinis glabeiriinis, paiciula ternii- nali braciato« c^ule tetraedro <calix canij)anula- tus profiuide cjuimjuefidus, purpurasceus; flores albidi).

CiescU: in frulicells moaUuiis Salak, Gc^le, etc*

Floret: Maitia, etc>

CLE+

CLERODEVDRUM DISPAMFALWM, BL

C: foliis oppositis longiter petioiat's oblongis acuminatis inedio ad apicem repandordentatis altero miiJore, panicula terminali brachiata laxa, caule suhtetra^ono (aff. C. calamiloso: calix <jmn<jiie-partitus, laciniis lancicolatis acuminatis 5 florcf paliidc flaventes).

Crescit: in motilanis Salak, SoiiLu, elc.

Floret | toto anno.

Variclas: foliis obsolete denticulatis.

CrcscU: in nirmlanis Seribu.

Obscrv.: folia ratione magnitudiuis in liacce specie secundum locum natalem valde differrunt; in sjl-vis allioribus plurimumque repaido-denuaa sunt et in utracj[ue pagina pubc tenui obsessa; in sykis contra Wnilioribus et (K)s calcareo - argiliosis folia fere integerriina et glaberrriina so osicndunt.

CLERODEVDRUM MJCROPHYLLUM, W.

C: foliis oppositis (majusculis^ ovalibus ntrinque aculiis intigerriuis coriaccis glabns, panicula terminali brachiata (enix campanulatus, quiuc*fl*ldus; corolla albida).

Crescit: in nmbrosis monlanis rroviiciianim occidentalhim Javae.

Floret: Marlio, elc.

Nomen: Raniak dagiu lalakki.

CLE-

(S i o)

***CLEROIMNDROM CALAMITOSUM*, Linn.**

C: folijs oppositis ovalibus utrinque acutis grosse *in-*
nequalitcr dentatis in vcuis infra puberulis , pa-
nic ula foliosa, caule tcreti (calix profuudc (pin-
rjucfidus ; flores albi).

Crencil. in liorfis frēquētiis.

Floret: loLo anno.

***CLERODENDRUM LASTUGINOSUM*, Bl.**

C: foliis oppositīs o vat Is acuminais basi interdum
subcordatis remote dentieulatis utrinque mollibus
junioribus (subintegerrinils) ramulis calicibusēmc
(extērc) lanuginosis, pedunculis dichotomis (ca-
lix campanulatus, cquinquellus, laciniis acumi-
naiis).

Cresclt: in montoais insularum Moluccuarum.

Fiord : to to anno.

***CLERODENDRVM SERRATUM** Bl.**

C: foliis oppositīs oblongo-lancolatis utrinquc ncu-
minatis scrvatis glahris, panicula terminali bra-
cliata (calix caupauulalus, obsolete (jtiincjucclen-
tatus).

Crcscil: in montosis.

Floret: cinni lōre tempore,

JVvmtsn: lAni&|i&|u

Synon.: Volkamrla scrrata > Linn.

CLE-

(8 n)

CLERODENDRUM FRAGRJS, Willd.

C: foliis subrotundo-ovatis acutis repando - dentatis
Lasi interdum subcordatis siibtusque glandulosis
utrinque pubescentibus, corymbo terminali lie*
mispliacrico.

Crescit: in horlis coilihur.

Floret: per tonum annum.

CLERODENDRUM VILLOSUM, Bl.

C: villosum; foliis oppositis ovatis acuminatis basi
plerumque cordatis integerrimis, paucula ter-
minali, calicibus ampliatis quinquclidis tubo co-
rollac subacqualibus (Rhcd. 2, t. 25).

Cresell: in frulicelis avgilloso-calcrcis ProvLiciarum
Builenzorg ac Bantam.

Floret: omui fere tempore,

***CLERODENDRUM IXFORTUNA-
TUM,*** Linn.

C: foliis oppositis acuminatis repando - denticulalis
utrinque tenuiter tomentosis, panicula terminali
(callx coloratus, parvus, puiuqucGdusj flores coc-»
ciaei. Rumpli. 4, t. 40}*
Crescit: in hortis frequens.

Floret: omni tempo re.

CLERODENDRUM PANICULATUM, Linn.

C: foliis oppositis subrotundo-cordatis quinquelobis
glabriusculis, lobis ovatis deupliculafis, janicula
brae-

(fin)

~~brachiat~~ **maxima** (calix coloratus, <juiii<jiteG<lus; dorrs auranliaci)•

Crescit: in Iiorlis fsoqn'Milor cnlttim.

Floret: **Intō** anno.

Nomcn :KaitiT)niiiT, bugang; Warudogong.

PIJ'EX, Linn.

Calix urccolnlus, quin'quedciualiis. *Caroline* lim-Lus hilabiatns ; Jabiuni superius bi-, inferius triflifun. *Stamina* qualuor, exscvtn, dīdynama , adscudentia, *anthera** bilobnc. *Ovarium* quad-nilocu!arc , loculis uniovulatis. *Sligma* s^mibifiduni. *Dm* pabaccata* nucleo qnadriloculari (aborlu uui-Lri]oculari),
loculis monospermis.

VITEX TRIFOMAT4, Linn.

V: fob" is ternat's qminsitisve, folio Us sessili bus oblongis acutis intc^errirnis subtus cuu:scentibus, intermedio majorc basi cuucalo , panicula terminali **crecta**.

Cresell: i:i fulicetis humidis cl ac ripas fluviorum.

Floret', orn ni t cm pore.

Nonien: Gdljjig **galing**.

VITEX PUBESCEXS, VaU.

V: foil is teruatlsve, foliolis clliptico-oblongis utrinquc nrutis intogerimis sublus puberuiis , lateralibus extonon!j>us ininovibus scssiibus inter-

mediis breviter petiolatis, pauciula Wrinaldi
varicuta.

resell: in fruticefis' Provinciaruin Kj-awang «i Tj nn-
jor freqatni c't etiam ad iiltora inaako
Knsae Kauibangae*

Floret: loto aimo.

VITEX LEUCOXYLONt Linn. fil.

V: foliis tenuis tenuis, foliolis **petiolatii** oblongis acutis (**iaterdniD acamintlift**) *integerrlo*th collaceis **gJabrla lalcralibas tninojrtbiis, paaieala tcr-**
ternunali pyraniidata, tirupis abortu nioDospcrinis-

Cit'scil: in sylvis moiilosis JVovmciaiinii U(..
Baiifam. etc.

Floret-. Septonbri, etc.

VITEX COFASSUS, Hexfr. Rwdt.

V.* foliis f:oip]icibus ternatisve **oblongis** **acutiusculis integerrioufi gkbris, paulcwa terlniuui**
p^raini<la(a (*Cojassus* , Rumplii Herb. Auib.
t. III, t. ii).

Cresclt: in insulis Moluccanis.

Floret: totja anno<

Nomen: Caji! Fassa.

VTTEX. UOLXWCASA, Bl.

V.- fo!{g simplicibus **subrotundo-OTfftii** aut oyaibns
acutiuscuiis subiutc^cmiiiis **coxiacea** inira **pube-**

rulis

nil is bff^*nc gland ulosis, panicuia terminali di-varicata(Tittius,Rumpli. Herb. Amb. t. III, t. 2o).

Crcscit: in Moluccanis insulis.

Floret: Augnsto, clc.

Nomen: Caju Titli.

GMELTJNTA, Linn.

Calix urccolatus, obsolete quad rid en tat us. Corolr la tubulosa, sursum iuflata ; limbo bilabiato; labio superiore fo mica to; inferiorc trilobo, brevirore. S lamina quatuor, didynama; antherae omnes bifidac (inagnitudine inacquales). Sligma simplex. Drupa baccata, mice triloculari; loculamento inferiorc yacuo.

GMELINA ASIATICA, Linn.

(*I:* foliis ovatis aut ovalibus acutis passim difformher gibbasis subtus ramulisque tomentosis.

Creacit: in fnilicelis uligiiGsis.

Floret: toto anno.

Nomen: • . • •

GUELINA PARVIFLORA, Roxb.

G: foliis ovatis tricuspidatis simplicibusve subtus glaucescentibus et glanduloso - punctatis et in venis ramulisquc pubcrulis.

Cresclt: circa Buitenzorg.

Floret: toto anno.

Nomen: * . • •

FREM-

PREMNA, Linn.

Caul urceolatus, obsolete bilabiatus, quincpier-
rarius i- dentatus, interduin bivalvis. *Corolla* tu-
buiosa, subbilabiata; labiuni siiperiusfornicatum, intc-
gratu; inlerius p»usus, trilobum. *Stamina* 4, sub-
didiyama, cxsurta. *Ovarium* 4- loculare, Joculis
1- ovulatis. .y/jr///, filiformw..V//?m/7 bjfidum. />/,/-
p» *baccata*, uunleo qundrijoculari ^aborln 3.-3-Iocul.);
*loc*ui's uionospcrjiiis. *embryo* exalbmniunsns, nvctus.

PREMNA INTESRIFOLTA, Linn.

J". Joliis elljptico-oblongis acutis intefrerriiuis (!>nsi
 ii-terciuni subcordatis) ^labriuscujis, calicibus *qua-*
*diidental*is,

Crescit: ||| fnilicctis monloii^

Floret: omni tetnpoie,

ftomeni Killeat.

Vanei.: foliis subtus tomcntosis.

Crescit; prope Pjiradjas'Provincjae **Krawang**.

PREMSA SERRATIFOLTA, Linn.

*P** foliis subrotundo-ovalis obtusis supcrne scrrntis
 glabris in axiilis costarmn infra pubcsceutibus,
 calice obsolete quad ride nta to.

Cretcit: in fruticelis circa Bataviaui, elc.

Floret: toto anno.

Noinem Grigilang.

PREMXA FOETIDA, Herb.Rwdt.

P: foliis avnibus acurninatis superne rcpando - cremlatis glahris in axillis costarain infra pubescenlib us , calicibus obsolete quiiKjuedeiitatis subbilabia Us.

Crescit: in sylvis Itiontosis.

Floret: tofeo anno.

Nomen : SCitai.

PREMNA PUBESCEKS, Bl.

P: foliis oyalibus acuniiati superne repanilo - dentutis utrinquc pubc&ccDtibus, calicibus (juinque-deiitnlis subbilabiatis (uff. *P* Jo?lidae*),*

Creicit: ad pedom montis Tjerimai.

Floret: omni tempo 1.e.

Noiiien: Kisangat.

PREMXA TOMEYTOSA₉Vn\U.

P: foliis ovnto-obloigis acnniinatis subrepandis snhtns tomeutosis, calicibus quiuquedcutails obsolete bilobis.

Qrenc't: in mo n tan is.

Floret: omni tempore»

Nomen: Bombulan.

PREMNA PARASTTWA, Bl.

P: foliis ftiajusmlis) ovalibus acutis intcgerrimis basi inter dun) snbeordato - peltatis in venis utrinque margineque puberulis, calice bilobo.

Cres i

(817)

*Creac't: In syTvi** monlosis supra arbores partsj'ti'ca.

Floret; Novembri, etc.

No/new. Kijatie aroy.

CALLfCAUPA, Linn.

Cahx urceolatus, qmtlnđentutus ant quadrifidus, po^rsistons. Corolla iiifundibuiiiorijs; limbo quadrup'irtiio, regulari. Stamina qnatuor, basi tulbi inst'Ufi, acqualia, exserta. Sty/us exsorlus, sUirma/ e ootusiiLsculo. Drupa baccata, ossiculiš quatnor monosperma s.

CALLTCARPA CASA_y, Linn.

C- ramulis terctibus }u!venilento - tomciitosus, foliis ovatis acutiusculis basi cuneatls iiitcgciTimis cfb-tuse-niucroimlato-dciitiçulatis supra vcnosis subtits ruticulatis pliiscjuc stcellatis tonictoso-canis, cjmis dichotomis pjilolo subaecjualilius.

Cresclt: in monluwis.

Floret: todem lc:n])ovc.

CALLTCARPA LOXZIFOLTA, Lam.

C; ramulis subttraprouis fusco-to»nçntosis, Foliis oblongo - lancicolatis utriiUgue acuminatis scrrulatis tasi apiceque iutgerriini subtus .pu!)e stellnri subtoraentosis, cymis di'jholoinis axiliaribas pellolo suuequalibus.*

Cres-

Crew'z in frn'icet sraonlosis.

Fl>rel: to'o i.nno.

No nen: K at amp an,

Varirt. a. foliis longiter acuminate, serratnns dis-
- tine tio rib us, cuius laxis petioio lon^ioribus.

Cresclt: in lerris a'gitloso - ca'careis.

Variet. b. foliis minute scrralatls glabriiisculis.

Cresclt: in fruiicelis mont.tuis SeWba circa Rompien.

CATJACARPA ALBIDA, Bl.

C: ramulis obsolete tetragonis cinereo-fariuosis, foliis lanceolatis exigue deiitculatis utrinque acurninatis a pice obtusiusculis basique intcgerriniis subtus albiclis, et tenuissime tomeutosis, cymis di oho to mis axilJaribus interdum sapraaxillaribus petioio sub-acqualibus (accetlit ad C. longifoiam).

deceit: in montosis.

Floret: omni tempore.

CALLICARPA DESTATA, Rotb.

C: ramulis teretibus dense fuseo- tomentosis, foliis ovato-oblou^is acuminatis basi rotundatis acute dentatis Kasi apiceque integerrimis infra piiis stellatis siibtotneiitosis, cymis diciotoinis petioio longioribus supraaxilJaribus, .

Cre-cit: in montosis,

floret: omni tempore.

(819)

CALLJCARPA HEYNII, RotTi

C: ramul-s tctra^onis dense fusco - tomentosis, *Mils* ovHtis acutis basi laiuustatis iuaequalitcr duutntis apioo basilic integerrumis supra rcticulnto-riifosis sujtus pube stclliri albido-tomentosis, oymis diciotomis axillaribus lougitudinc pctioloruni.

Crescit; in fruticelis ?noutauk Provinciae 1 jiiujor.

Floret: omni tempore.

GEVJSTSU, Bl.

Calix turbinatus, obsoJcie quincepicrlentntus. *Co** ralla tubo c^lindrico; limbo quiixjucrido, revoliito. *Stamina* quinque, exscrtn; *jilamenla* tubi b.-isi' iuserta; *aril/ier/s* pon's geniinis suj>erne debiscemibus. *Stigma* subpehntum. *Drupa* baccala, umbilicata, putaminc quadriloculari, loculis bipartibilibus 1110-uospermis.

GEVNSU FJRINOSJ, Bl.

G: foliis Oppositis alternisve ova to-oblong's acuminatissiniis suluus reticulntis et fnrinoso-siibtonicutsis, *cynis d who to mis a^illa^ibus divfirirafis.*

Crescit: in sylvh aih'onbiu Proviucj:inmi Uitcnzorg, Tjinjor, Krawdiig> elc.

Floret: Angusto, etc.

Nomen: Kihu - ut.

TEC*

TECTOVJ, LinYi.fi].

*Calix campnnulatus** 5-6-fidu\$; *Jaciniis* patcnli~i)us. *Corolla* rotata; tubo brcvi; limbo 5-6-partito, pla!:o. *Stamina* 5-6> laciniis corollnic allcriia,,exsert;i; filamentis tubo cOrollne inscrts; anlbcris intrurstnn incuinbcntibus. *Qvarium* c£ii.ulrilocu!ari\ loculis 1 -ovaliitis. *Stylus* exsbertus, scmibilidus. *Dru-pa* fcuheros.*, in Calico mcmbranaCco iiiflato, nudco c^ii-i(lrlilocaL'i (abortu triloculari)• *Strnina* solituria, *embryone* c&albuminoso crccto.

TECTOSfA GRASDIS, Linn. fil.

T: foliis parabolicis acutis (summis subrolunclo-ovr^* tis basi sabcuneatis) rigid is supra glabris (juuio-rihus scjberrimis) sabtus rcticu!r.lis et tcniilcr tomcntosis, panicala tcrminali brachiata maxima,

Crescit: in syl vis orient alii) us Javao Vn^gatissima ; iu Provinciis occidentalibus minua frequens.

Floret: f er totmn fere annum.

Noinen: Jali; t)jaU.

AVICENNIA, Linto.

Calic quinquepartitus, persistens. *Corolla* tubo breVi ^ superne ampliato; limbo quadrilobo , patente , subinaequali* *Slamina* 4, fiuperne tubo inserta erecta, subaequalia, exserta. *Ovarian** scmibiloculare, loculis biovulatis. *Stylus* brevls; s/lgmale semibifido. *Iructus* QQVI&GHVLS, dQixkam \$|imnen\$, mo-

nospennius. JZmbryy exalbumiuoaus, ereeliw. *Co/y-*
ledones reuiformes, coiulnpiicatac, maximao. *Jia-*
dicula parva, viljis ciucta*

AVICENStA TOMENTOSA, Lmn.

ji; follis obovato-cunoatis obtusia subtus gIauco-to-«
 nieutosis.

CrescUi in Biariliinis Javae.

Floret: omnj temporo.

Nomenx A pi apt.

AVICESSIA ALBA, rsl.

C: foliis oblongo-IanccoJatis acutis j. obttwmsculi's
 glabris subtus nivcis.

Crescil: ad **littora** insnlao **Niuafi** Kambangae.

Floret; toto anno.

Nomen : Api api.

LIPPIJ, Lmn,

Cal/x 4-; >-{lcutatns» demum bivnlvls- *Co, rolla* tu-
 bo snpcrne ampliato ; \lmho bilu!)iato; Itbium supc-
 riui.s cmnrijiintiim, iufcritis **trifldtiin*** titamma 4, **di-**
dynamia, tncliua. *Stigma* depresso-bbtusom, **rariuf**
Hneare. *Drnpn exsuoca,* cnlice bi^alvi inclusa, bilo-
 •cuJaris; locuJis monospermis.


LIPPIA NODIFLOnA, Tich.

*L*r' canlc hcrb;!ceo-rcpciite » foliis obovato - cnneatis
 apicem. versus serraiis »trigos9-puberLiJis, cupitu-

*Jfcf ovato-conicis longiter pedunculatis , bractcis cuneatis a cuds**

Crescii: in graminosis juxta Bataviam.

Iloret: Majo, clc.



L A B I A T A E .



ZIZIPIIORA, Linn.

*Calix (ubulosus, striatus, quinquedentatus, fauce Tillosas. CiroLa bilabiata; labio su peri ore reflexo, integr; inferiore trilobo. Slamina fvrtiliu duo, vix exsertaj aniktrac su^iuatae. Stigma inacquuli - bi-iiduui**

ZIZJPHORA JAVANICA, BL

Z: floribus capitato - spicaLis terminnibus , bractcis snbulntis ciiiatis, calicibus villosis, foiiis pctiolatis ovntis extrorsum grosse serratis utriuque fcaulibusque prostratis pubcsceutibus.

*Citi»cit: in cacnininc montis ignivomi Tjerimai Provinceiae Cheiibon**

*Floret: OctoBri, etc**

NEPETA, Linn.

*- dalix tubidosus , quinquedentatus, snbnequalis**

*Corollae tubus calice lougior^ liubo bilabiuto j la-
bio*

bio supcriore cmarginato; iiiferiore semitrilobo; lobis laterali!>us minoribus, reflexis. *Stamina* quatuor, didynamaj appro ximata.

NBPETA DISTICH A, Linn.

A^r; foliis ovatis grosse crenatis basi integerrimis utrinque moilibus, spicis verticillatis sncundis bipnrt'tis (an legitime bujus seii *ilallotar*. generis? *Calix* quinquefidus, aequ»lis, obsolete quinqne-gonus. *Corolla* bilabiata, fauce. villosa; tubo illatus squamis 2 ciliatis instructo; labio supOriore obtuso, margine reflexo; iiiferiore majore, trilobo; laciniis Inteivilibus reflcxis; intermedia magiore, emarginata. *S. amina* cl(l>naina , approximata, nntice barbatn, post lcnovaionem ad Jitus non reflexa. *Antherae* staminum longiorum umlocularcs, rcliquorum didjmac).

Crescit: in locis hnmidis el juxta vias piopeCataviam.

Floret: to to ieie anno.

Nomen: Kiliilut

Syn.: Ballota disticha, Linn.

NEPETA MALABARICA, Linn.

N: foliis ovatis utrinque acutis grosse serratis basi integerrimis utrinque pubescentibns, capitulis bifidis vc^icillatis axillaribus (aff. praecdenti, sed vfcritillis completis, et remotioribus diversa.

Flores

Versa, Plōws stint pūpurascents et respectu ~~co-~~
rollae structui'am cum ±V. *disticha* plane con*
veniunt).

Crescli: in pratis circa Bataviam et ad rivulns prop*
BuitenKorg.

Floret: omni tempore.

Nonuīi; Kiliilut.

BYSTEROPOGONt L> Ilerit.

Calix tubulosus, (juincjuedentntus, aequah's; fau-
ce villis instructa. *Corolla* subbilubiata; labio su-
priore bi-, inforiore trifido. *Slamina* c^uatuor, di-
d^nania, distanlia, subinclusa*

BYSTRROPOPOIOV GTiJVEOLENS, Bl.

B: Ci(ule errclo rHinoso pilosiascnlo, foliis ovaiis in-
ferioribus su!>cor<ialis duplicato - serrulatis sub-
pubescent! bus \$ capital is peduiicitlatis axillai ibus
Solitarijs, caiicibus pilosis aristato-dentatis (aff. *B.*
suaveolrnli).

Crescit: juxta Bataviam locis umbratis hit mid is.

Floret: Seplembri, etc.

ELSHOLTZIA, Willd.

Earbula, Lour.

Calix tubulosus, quinquedcntatus^ d en lib us sub-
acqualibus* *Corollae* labium inferius longids, conca-
vum, subintcgemmuin-) supcrius fornicatum, semi-

qua-

C 825)

quadrisidum. *Stamina* didynama, labio inferiore inclusa, ant distantin; *anthrrao* globosae^ **uniloculares**, audac. *Stigma* seniibjfidium*

SECT. RABPOSTA.

Stamina declinata* labio iufciorc inclusa*

ELSHOLTZTA JAFAVICA, BL

E: pniculis virgatis foliosis, pedicclis siibumbellatis^ foliis ovato-oblongis grosse dcutatis ulrinque pu» besceutibus.

Crescli: in paTudis moutanis.

Floret: Aprili, etc.

POGOSTEMOV, TkA

Calfx tuWosus. qninqnedentatiw; dentibua 0ub» acqualibiis. *Corolla* bilubiatn; labio superiore trilo* bo; inferiore integro , indivijQ. *Stamina* qivtluor, didjoama, subiucurva, antcu burbata aut Diida.

POGOSTEMOX MEVTHOIDBSn BL

P: caule herbaceo, foliis ovatis utrinque .icutinsmffg supra basin duplicate - dentatis]u')esrentil)iis, spica terminali clongatu 5inij)lici, verticiisiis iipproximatis, staminibus nudis.

Crescit: in sylvis umbrosis huimicjis moiitis Ged,

Floret: Majo, etc.

ME.V-

MENTIJA, Linn.

Calix quiiHjuedentatis, strintus. *Corolla* calicc param longior, cjuadrifidu; lacinia supcviore latiorc, emargiiata. *Slatnina* distantia.

MESTHA JAVAfolCA, Bl.

M: floribiis Capltatis, foliis lanceolatis medio ud apiceia d is tauter serrutis utrinr[uc puberulis, cuulc obverse liirsulo, stniiiinibus exscrtis (maximc accedit ad *M. acufifbliam*).

Ci'escil: locis hiuniclis circa Buitzenzoig ct in uliginosis.propc Tngn.

Floret: oinni temporc.

Nomen: Pu - ganknt.

DYSOPHYLLA, Bl.

Ca rix fructiferus clausus, (juiiifjuefidus ; laciniis aequalibus, ciliatis. *Corolla* tubulosa, quadriOcla 5 laciniis acquaiibus , erectiusculis. *Sta?n!na* qua I nor, subdidjnama, exscrita, declinata, medio barbata. *Stylas* lon^itudinestaminuiii; *stigmate* scmibifido. *Ale-nfa* quatuor, reccptaculo carnosو insidentia.

Genus *Mrnlhae* pvoximuin, calice fritctifcro cl.-ni-so, rccepctaculo carnosو-luiiido ac stuminibus declinatis barbatis distinctum.

DYSOPHYLLA AURICULAR!A.

J): pilosa; foliis ovato-oblongis grosse scrattis sossilibus, floribiis gloincrulato-spicatis (tliimpli. Hort. Amb. 6. t. 16. fig. 2).

Cres-

(827)

Crescit: in fossis et ad margines riruhuum in **Java**
et in Moluccis.

Floret: totci anno,

JSo/neu: Sulauking.

TEUCRIUM, Linn.

Calyx tubulosus, quinquedentatus aut quinquefidus. *Corolla* tubo brevi; labio superiore abbreviato, biiido; labio iuferiore trilobo ' lobo intermedio majorc. *Stamina* quatuor, didynamia, e fissura labii superioris exscrita.

TEUCRIUM ValsriDVM, BL

T: foliis ovnifs grosse inaequiflitter scrratis rugosis, r:jjcciiis axij'aribus termininalibusque secundis calicibusjiic viscido-pubescentibus, bracteis lauccolatis lougiturline calicis, caule tctragono subramoso (ad*. T. iusitauico)*

*Crescit: in hamldis moutanis propc Tugu ad pedem
nioulis Paii^drang.*

Floret: Aprili, elc.

LEONURUS, Linn.

Calix tubulosus, quinquedentatus; dentibus acuminatis aut longiter aristatis, subaequalibus. *Corolla* tubus calice paruin longior; limbo 'bilabiate; labio superiore iutegro, concavo 1. pianiusculo 5 infcriore trilobo; lobb medio subindiviso. *Stamina* quatuor, didynama, conniventia 5 antheraruin loculi approximati.

LEO-

LEONVRUS SMIRICVS, Linn

L: foliis ternatim scctis, segmentis incisis, calicibus strigoso-puberulis aristato-dontatis, labio coi'ollae superiorc concavo recto*

Crescit: in graminosis jiixta Bataviain.

Floret: toto anr.o.

LEOHURVS JAVANICVS, BL

L: foliis ovato-oblongis inaequaliter clentatis, calici-v bus strigoso-pui'eruiis, dentil us caliciuis pcumim- nntis pa ten ti bus, labio coroliac supeiore concavo emnr&inato : Jacinia in termes a labii inferiori* rotuudato crenulata, lateralibua acutusrulis.

Crescit: in umbrwsis montauis Javae occidejilalis*

Floret: Septemb-i, etc.

Nomen: Tji-lja bian ulang.

LEONVRUS OBLOXFQFFOLTUS, BI.

L: foliis oblongis acuminatis itiaequaliter clenticulatis, calicibus pilosissimis, dentibus calirinis subulatis, lacinia intermedia covollau Jaliii inllTioris rotuu-* data c^enulata, Intcraiibus acutis.

Crescit: ad i ipas flnvii Tjapus in munoflis **Salak**.

Floret: Octobri , etc,

Nomen: Kibuiu.

PHLOUIS, Linn.

Lencas, Rob. Br.

Callx tubulosus , striatus , 5-1 o-den tat us , ore truncatus aut obliquus. *Corolla* ringens; labio superiore fornicato, compivsso, integro, vilioso; inflo-
Tiore trifido ; laciñi.n intcmiecliā ma jo re. *Stamina* quatuor, didjnama labio superior! inclusa. *Anlhc*** varum loculi divergences.

PHLOMIS LIXTFOLTA* RotU.

P: caule crecto ramoso • rmmulis foliisque linear!* lanceolatis distanter seiTnlati puberul, vrticillis sub fas tig? at is, caiicibus ovntis oblique subocto-* denticulatis glabriuscus^s, dente supremo majoro.

Crescit: locis apneis et iticultis.

Floret-, oinni tempo re.

Nomen: Daun Setan.

PHLOMIS CHIVEVSRs? Rctz.

P: caule ramoso senndente, ramis ad angulos obverse pilosis, fblis ovnlis grosse obtuse s CMrat is Lasi acutiusculis et i 1:ter, errunis utriiiqiic pubescentibus, vrticillis 6*io-floris, calicibus oblongis pubesceuiibns 10-deiitaiis, deutibus subulatis alternis brevioribns.

Crescti: inter fmlices ad ripas fluvioniui.

Floret; Juicio, etc.

Variety foliis minoribus utrinque molliter pubescentibus.

Cresalt: in declivitatibus inlra montem Bu rang rang et Tankiiwan Prulm.

PH LOUIS CEPJIALOTES. Roth.

Varict. caule liirto , foliis oblongo-lanceolatis grosse serratis utrinquc pubescent! bus, floribus dense capitatis terrninalibus, bructeis subulatis, cnlicibus oblongis obliquis octodentitis" supernc pilosis, dentibus subulatis subaequalibus.

Crescit: in lei·ris caica^eo - argillosis circa Rompien , Eataviam, etc.

Floret: toto anno.

MELISSA, Linn.

Calix labio superiore piano, tridentato; inferiore bifido. *Corolla* bilabiata; labio superiore subfornicato, cmarginato; inferiore patente, trilobo; lobo iiitermcdio obcordato. *Stamina* quatuor, didynama, a.«surgentia.

MELISSA HIRSUTA, Bl.

M: capitulis vertlcillatis axillaribus, foliis ovato-oblongis obtuse serratis calicibusque hirsutis (&ff. M. ofTicinali).

Crescit: in caenmine montis ignivomi Tjcriinai Provinciae Chribou.

Floret: forte per totum aannm.

ORTGANVM, Linn.

Plores dense spicati, bractcis imbricatis suffulti^
Calix varius, nunc bivalvis, nunc latere fissus, Rut
 quiiKjuedentatus. *Corolla* bilabiata, subaequalis; Ja-
 lio superiorc bi-, inferiore trifido.

ORIGANUM BENGHALESE, Bum.

O: foliis o vat is basi in petlolum angustatis grosse in-
 aequaliter dentatis gjabriusculis, floribus capitato-
 spicalis, bracteis ovatis villosiusculis.

Crescil: in hmnidis ad pedem Inoulis Gcde,

Floret: lempestate pluviali.

OCYMVM Linn.

Calix bilabiatus; labio inferiore diviso fquadrifido). *Corollae* hibium superias quadrifidum; iufefius ijtegrum, aigustura. *Stamina* quntuor, didjnama, declinata, quorum breviora ad basin appendiculata, aut barbata, rarius edentula (Species quae ab *Ocjmis* veius etiam ob structuram peculiarem corollae et interfum autlicrarum sccernenda aunt); *antherae* uniloculares (in 0. graidiiloro l'ilerit. biJoculares), iuberbcs.

SECT. I. *Oryma* yera. *Stamina* breviora basi ap.
 peudicLiata aut Larbata.

OCYMVM MONACHORUM, Linn.

Of foliis ovalibiw obtusiusculis 1. utrinque acutis dis-
 tauter *si:rratis pubcrulis, petiolis ramulisque lere-
 tibus et calicibus iiiicue pifosiuscuiis, racemis

ieomposhis terminalibus, vrticillis distictis sexfiuris, bractois subcordatis sessilibiis, calieis labio inferiore (quadridentato aequali, staminibus edentulis alternis basi barbatis.

Creacit: jiixl.l vias iti slccls*

Floral: onni le in pore*

Women: Sarawang*

***OCYUMUM GRATISSIMUM,* Linn.**

O: foliis tantcolatd-ovntis ittrinqne dcuminatis supra basin grosse obtuse- scrratis supra ad costam et in vcnis subtus pubcris, petiolis junioribus ramulis[ue tetragoñis^ ubtomentosis, racemis terminalibus subsirrplicibus, vertkillts dislii Vctis'scx-tloris, bracteis ovalo-'oblongid acuminatis subsessilibus, calicis labio inferiore tridenfeto sub^ Aec^uati, dente intermedio semibittdo*

Creacit: in hoilis.

Floret: omni tempore*

***OCYMVM' BASILIQUUM,* Linn.**

Variet. a. foliis oblongo-lanceolatis utrinque acuminatis medio ad apicei serrulatis glabriusculis, raccinis terihinalibus striclis^ Vrticillis Vctnotis Sexfloris, l)racleis laiccolatis cuni*-calice pubescenti ciliatis, calicis labio inferiore quadridensato, dentibus infferniediis raajoribus.

Creacit:

C/V.fr/7: *in hovils colilnr.*

Floret: per iolu.'ii annum.

Nwnen: Salassie.

Variet/h. foliis lnnccolato-pvātis ptrfnqiic acnjis me-
dio ad apicem serruhitis in costis infra scabrius-
culis, racemo ^trieio,' vrtin'IU remotis sexfloris,
Lractcis lanccolqtis et calice pilqso piliatis, cajjcis
l/bio inferior cpadridentaio, dentibus inlermc-
diis longioribus.

Cresctt: in borlls eliam sub n&miiie S4|^sie colitur.

OCYUUU WUCfjUlVMi BL

Q: foliis laiiceolap-ovalis utrinquiie acutiusculis supra
.hnsin rcinocs scrulalis margine et in coslis ii|fra
puberulis, ramis fartigiaUs tiitragonis ubvewe bis-
pidulis, racciflis simflif;ibi|5, vqt}piUi> flistinctis
se^iloris, bmctcis ovatis prtiplntis ciim cnlrc
pubescente cili-itis, calicis Jabio U)ferlore qnnciri-
dentato, dentibus intermediis parum longioribus.

Crpscii: lqçis si^cis circautByiam.

Floret.-'onm tflnporę.

OCYMUM JRTSTJTVM, BL

O; foliis ovatis obtusis repando-crennlatis basi attc-
nuatls imegemfnis margine et in rcuis infra pubc-
ridis, i-amulis tctragonis et racemo subsimplici
obverse pubesctsntibus, verticillis remotis sextlo-

ris, bracteis ova tis acuminatis ciliatis sessilius, calicis labio inferiore quadridentato, dentibus intermediis longiter aristatis.

Crescit: circa Bataviam in graminosis*

Floret omni tempore.

SECT. a. ONTIOSA.

Corolla quadriflora, subbilabiata. Stamina edentula*

OCYMUM POLYSTACHWM, Linn.

Variet.' QtYus' ovatis acuminatis obtuse serratis basi cuncatis integerrimis glabriusculis, race mis paniculatis secundis et ramulis tenuis cum calicibus jnuricato-scubris, verticillis approximatis multifloris, bracteis minutis, calicis labio inferiori quadridentato aequali.

Crescit: in humidis juxta Bataviam.

Floret: toto anno.

Nomen: Wangling laiigit.

OCYMUM ACROCEPHALUM, Bl.

O: caule difuso tetragono, foliis linear-lanceolatis grosse serratis, floribus dense capita tis terminalibus, bracteis ovatis nervosis cinctis (species *O.ca-pilellato* aliqui affinis et forsaii a relicuis *Ocymēs* sejungendud).

Crescit: in graminosis humidis circa Roinpicn*

floret: oumi tempore.

Gen Italia Longissima. §tamina edentula. Antlerae Lilo-culajes.

OtiYMUM GRJNMFLORVM, L'.Hcrit.

O: caule frnticuloso tetrngono, foliis ova tis obtuse srrratis utrinrjue acutis integerrimis glabriusculis, reccmis tcrminaliws simplicibus, verliciis reniotis sexfloris, bracteis o vat is scssilibus, calicis labio inferiorc quad ride nta to, dentibus iutcruucdiis lougitcT arista tis.

*Crescit: ad rivulos locis umbrosis**

Floret i omni tempere.

JVo/nen: Rumies Kutjien.

Variat floribus albidis et Jilacinis.

PLECTRASTHUS, U. Heit.

OcMiii S-. Linn.

Calrx bilabiatus, labio infcriore diviso ((jnndrifido, lacinijis iutermediis plcrumque productioribus), striatus. CoroJ/ae labium superius trifidtim, 'l.'icinia media bifida ; infer!us longius ? integrm , plcrum- quc conc:ivum. Stamina quatuor, didynama, dedinata; ill amends cdentnlis, Sasi saepius inonadclphis; anthcris unilocularibus, iinbcrbibus.

PLECTRAXTHVS HfA(fROPHYLLUS, HI

P: calicis nirsuti labio infcriore trifido, lacinia intermedia lougiore scmibificla? (ilamentis tasi mo-

n ad el pli Is, verticillis distinctis, p[^]diccll^{is} ramosis, foliis sübrotundo-ovatis acutis inaequaliter obtuse serratis basi vix attenuatis' intcgerriuiis utrincipie puberulis (aroedit ad P. ingratum; folia iuira purpurascētia).

Crescit: in humid is sylaticis montosis*

Floret: omui t[^]mpore*

Nomen: Djewer Kol[^]ok beža[^]ir.

PLECTTLANTIIVS INDIJTUS, Bl.

P: calicis ^suti labio inferiore trifido « lacinia inlcr[^] media el on gat a scmibifida , lilamentis basi monaclephis, verticillis d^łtinctft, pedicellis sitbramosis_f foliis ovatis grosse crcnatis basi cizncatis integerrimis utrincjue puberulis (folia utrinque atro-purpurascētia),

Crescit: in montosis Proviiciarum occidenlaäuai Javae.

floret: omni tempore.

Nomen: Djewer Koltok.

PLECKANTHUS GALEATUS, VaM

P.* £aljicis liorsiili labio ififcriore trifido, lacinia in-, termedia lougiorę bifida, (llaTnci[^]tis basi nionadelbis , yerticillis distinctis , pedicellis rnmosis_f loliis qyatis acumiiifaps 4)a\$ı rpluñdalıs subcorda-r tisve exscrte acute serratis utrintjiię » pubei-ulif jaff. P. li[^]acronbjllo ct P. ingrato).

Cres-

Cresclt: in Inimitlis nmbr'atid monlanis.

Floret: oiiini ferē tēmpore.

Nomen: Djewer Koltok gunung.

PLECTRJNTHVS SCUTJELLARI- OIDES, BI.

P: calicis hirsuti lal)I# inferiore trifido, lacinia internicdia iougiore scmibifitla, fi la mentis basi JIIOn ad dp his, verticillis distinctis, pedicellis racemosis sccuntlis, foliis ovatis acuminatis gi^^e obtuse scrattis *husl* «cutis et integerrimis utrinque pubc-Yixlis (folia sujira maculis atrb-purpureis picfa),

"*CrescU:* in Liortis colitiu*.

Floret: toto anno.

Women: Djewer Kottok mirhtr.

PLECTRANTHU\$ BICOLO77, TU.

P: cālicibus ct stamihibus praecedeuium, vrticillis distinctis, pcdicclJis ranioso-bilidis, foliis (dispariis) ovatis acuminatis crnotis basi rotund a tls V. inntquali-uttenuatis ct integerrimis utrinque pu-berulis (folia infra purpurascenctiaj aff. P. macrophyllo).

Cresclt: ad pedem montis Salak.

Floret: omni tempore.

Nomen: Tjawer Kottok gunung

structa. *Stamina* 5 ant 4. *Stigma* bifidurii, subsessile. *Capsula* unilocularis, apice bivalvis, semi*nib us numerosis.

SfVERTIA JAVANICA, Bl.

S: cau'c erecto fastigiato-rataoso, foliis linear-i-lan-
cco!atis trinerviig scssilibus, pedueulis tetragonis
3-iioris, axillaribus subgeminis, termiualil)us :-;-
gregatis , cor oil is campanula to - 5 - parti tis calicc
tubaccjualihs.

Cresclif in altis montis Gede locis hnmidig.

florete: omni temporp.

ENICOSTEMJ, BK

(-alix tubulosus, inaequali- 5-fidus. *Corolla* infuiw
dibuliformis, 5-fida y aequalis. *Stamina* inclusn; *fila**
mentis dilatato-fornicatis. *Stylus* stamiuibus brevior,
stigmatic capita to, sulcemaarginato. *Capsula* oblonga,
uuilocularis, 2-valvis, valvis margine utrinque inflexis,
se^nufiferis. *Semiaa* uumerosa, scrobicul^u

ENICOSTEMA LITTORALE> Bl.

E: foliis oppositis linear! - lanceolatis triuerviis am-
plexicaulibus, capitulis axillaribus,

*Cresvit: ad lilora prope PattUliukan Fiovincia<
Krawaug.*

Florete: Augusto, etc.

(8*9)

TRIPTEROSFERMUM, Bl.

Calix tubulosus, quinquefidus. *Corolla* tubulosa, ore quinquefida. *SlaiAina* quinque, iucfnsa; *ant he** rap sagiftatae. *Ovarium* pedicellntum, bnsi nrrcolo fyjsvi cinctum. *Stylus* filiCormis. *Sligma* biidam, revolutum. *Baecia* carnosa, unilocnlnris, p'liysperma. *Semlna* strntis iribns parietibus baccae affixa, cris-tata. *Emb/yonU* radicula centi^fuga.

Herba volubilis, foliis oppositis ovatis acnfisiiUc-gerriniis glabris lrinei*viis, pcduuculis axillariLms uui-floris medio bibractatis.

TMPTEROSPERMUM TRINERVE, Bl.

Cresclt: in sylvis altioribus montiam Salak, Gcde, etc*

Floret: to to anno.

Nomett: Tjoppi-lnhnp.

MITRASACME, Labi]].

Calix angnlatus, qnadri-raro bffdus. *Corolla* tu-bulosa, angidata; limbo quadripartite (-fidove), ae-qaaK. *Stamina* aequalia , inclusa. *Anthrae* posticae. *Stylus* bifidus. *Capsula* inter divisuras stjli dchis-ccns , polysperma.

tlITRASACME NUDICAVLIS, Herb. Rwdt.
Jl/:scapo radicali elongate 5-fido, foliolis stipulifor-mibus oppositis rcmotis, uinbellia sub-3-iloris, corolla bjpcraleriformi, tabo calicem ter supe-

ran-

rante, follis radicalibus stellatis ovali - oblongij oinus.

Crescit: in insula Salor a ¹. Rcidwardt detecta.

Floret: Angus to , etc.

VILLARS1J, Vent.

Calix quinquepartitus. *Corolla* subrotata; limbo pntimte, qniqueparpto; laciniis disco piano, bnsi barbnto vcl squamulato, martini bus adscendentibus aestivatione inflexis. *Slamiña* ijuinque, laciniis alterna, cum'giandulis 5 hypogynis alternantia. *Stylus* bruvis, stigmatc bi-aut trilobo. *Capsula* uuloculnris pol[^]sperma, bivalvis (in *«nquaticis evalvis), *Semina* in stralis 2-5 longitudimditcr axibus valvularufu digesta.

VILLARSIA INDWJ, Vent.

V: foliis subrotndo-cordatis iiitegerrimis vel subrepandis, petiolis iloriferis, covollis supra pilosiusculis, stigmate trilobo.

Synon. *V** *macropliylla*, Piotb.

Crescll: in aquis lenle flentibus ciica Bataviam, etc.

Floret: omni temporo.

Nommi TaratLi Kitjil.

