

ENUMERATIO
P L A N T A R U M

IN PARTIBUS
SÆLLANDIÆ SEPTENTRIONALIS
ET ORIENTALIS

QUAM EDIDI

CHRIST. PRIEDER. SCHUMACHER,

*Proffjfor tertius in Academia Chirurgorum Regiæ
Hafniensis, Chirurgus primarius Nosocomii Fridericiani
Docens tneralogiam in Societate Nifloritæ naturalii
Hafniensis, hujus toque ac Linneana; Londinensis*

Sociemris Sodalit Societatum medico: Londinensis

ac mineralogies lenensis membrum

Correspondens

B - 3295

P A R S P H I O R.

HAFNIÆ, 1801.

APLD FRIDERICUM BRUMMER,

V I R O

NOMINIS IMMORTALIS BOTANICORUM

ILLUSTRISSIMO

MARTINO VAHL,

PROIETTORE REGIO AC PLURIMARUM QUIBUS PER
LITTERARUM ET ARTIUM TUVAUS SOCIETATUM

SOCIALI

AMICO SVAVISSIMO

HA.SC

COMMENTATIONEM

CONSECRAT



AUCTOR.



In fube Saelandiae tam ea pars, qua in fep-
tentrionem, quam quae in orientein vergit,
planiciebus^ campis, agris, ericetis, coliibus,
lyhis, fruticetis, rivulis, lacubus, ftagnis &
palu.dibus apparet varia, diftineta. Utramque
partem Oceanus ajmbiu Quo efficitur, nt
j^lant* hie gignantur, quae fiuftra quaeruntur
in tern*, quaium una eademque forma oculos
fati^at. Equiclem per annos vigind duos, va-
ria anni temptflate, partim praeunte *Pro-
f^e Jf<i^re Magni no minis Vahl* perva-
gans, partim folus perluftrms loca Havniam
fpatio' fex miiliarium circumjacentia, familiari*
tatem velut inivi cum horum locorum vege-
tabilibus. Ipfe interfui, ac vidi plantarum
plerasque, quas in hac coiimeatatione adtuli.

exceptis iis, quas amici mihi sunt impertiti,
 quibus gratum animum hic telor, quorumque
 nomina, ubi folum plants natae expratum
 est, adjunxi. Silere non debeo, memorari a
 me plantarum paucas, quas in itineribus, (Jll;e
 in insulam Monam & tractum Prusoenf, ui fu-
 fcqram, inveni. Quod hanc acciferere, tQ
 lector, r. in e0 a me p^a a i W jilctfa*, veniam
 precann des rngo. ExilUmavi Botanophilis
 non ingratum fore euchiridion, quod cci, •
 net folum eas plantas, quae in hoc tractu cir-
 cum ciica gignuntur. "Studui confulere iis,
 quae alias laborabunt apud exteros qterere,
 quae nostra sunt, & operas dedi qaantam-
 canque, ut, quod lector harum rerum, cnrio-
 fus, quaterf*, in millori numero ^{^^} . [^]
 lius possit. Quo minus peram gravari possit
 libri, quam eciidi, farcina, quoque com-
 modior, fieri possit hujus enchiridii n fus, in
 duaspartest. (Jibrum fum partitum. Pars
 prior viginti Ux^s cl;ffes priorcs contiMut. Pars

iecunda cbfTetn vicefimam quartam expli-
 cai it. J-Iabet hsc clafis plantas, quae cryp-
 togamicse vocantur, quarumque **ufus** per ae fla-
 tein eft minus counnunis, quam caruin, qux
 in parte prima explllcantur.

Ordinem quod attinet, immortal em Li N-
 KEUM in prima praecipue hujus opufculi parte
feutus fum, a quo in gene rib us acef]e bus
 finiendis nonnunquam difcefli, & ad Botani-
 corum recentiores nanfii, ubi perfvafum mihz
fiut, ab iis factam mutationem prscferri oport-
 t(]v, & characteres, tjuas indi **cavere**, tam ac-
curatius expreflbs, (juara priu **cipiis magi** foil-
 dis fundatos. Quæ characterum enumeratio
 cum ut Flora localis fpectari debet, ego ftu-
 dentium comniadis fimul confulens, partim
adjunxi, quæ de una alterave **planta huic** fini
 iii-rvii c exiftimavi. **Queitt** fuccefiun **habuit**

Liracc mea cura, **intelligentium** ai tiicum **judi-**
 citim **fit** Specieruin pauca^, quæ **novae nî** ihi
 vkise funt, **comitantur** in numero currei.ii,

VIII

nulla tamen nota distincta, id quod judicavi
adiaphoron fore tironibus, sed a provecis in
Botanico studio facile observatum iri. Nolui
in autoribus laudandis longus esse. Figuras
lectori representavi solum eas, quae commo-
dissimae vitae sunt.

L'ocum natalem primo generalius exprcffi
deinde specialius lingua *Danica*^ nt obfcu-
& barbarismus evitari possent*

Nisi valetudo adversa irapedimentum ob-
jecerit ingratum, spero, fore, ut libri hujus
patis posterior tempore^r mercatus autumnalis
post festum Michaelis pi odeat>



CLASSIS I.
MONANDRIA.

MONOGYNIA,

Salicornia. Calyx ventriculofus, integer*

Corolla nulla* Semen unicurru

Hippuris. Calyx fuperus breviflimus minimus*

Corolla nulla* Stigma fimplex. Semen uni*
cum fubrotundum*

DIGYNTIA.

*Callitriche** Calyx ntimus. Corolla dtpetaTa.

" Filamentum incurvum* Styli duo. Capfula
bilocularis tetrafperrna*

70

Monandria Monogynia.

MONOGYNIA.

I. *Salicornia.*

Calyx monophyllus ventriculofus integer.

Corolla nulla. Semen nnicum.

I* S. *herbacea.*

a. *patula*, articulis apice craflioribiis, ramis decurnbentibus patulis.

b, *ertcta*, articulis, fere cylindricis; caulfc flncto erecto, rarnis eiectiufulculis. Flor. Dan. 303.

a. inlittore murisBaltici Seelandi^ 8c Arnagrias

8C b. piaèiertim inter Sva.ie-Molkn 8c Conftantia in-Ytai. Flor. Aug.

2. *Hippuris.*

Calyx fii]erus brevidimus minimus. Corolla nulli. Stigma fimplex. Semen unicum Tubror\indum.

5, *H. vulgaris*, **foliis** octomis linearibub fubulatis.

a. *palujlrif* foliis patentibus.

b. *fiuriatilia* foliis fubmerfis reflexis, emeifis in fpiram contortis. Flor. Dan. 87.

b. in amne inter Nye-Mollen 2C Papkrs-Molhn

It a. in pajufie; ved Bernjtoifs Veien, Wallby*. Flor. Jun. Jul. 8c Aug.

DIGYNIA.

3. *Callitriche.*

Calyx nullus. Corolla dipetala. Filamentum longum iucurvum. Styli duo. Capi'ula bilocularis tetraferma.

Monandria digynia.

3

%. *C. androgyna*, florib'i* androgynis.

a. foliis cmmi'sus ovalibus. FJor«Dan. rsg*

b. ioliis fcipt rioiibtis ovalibus, intWionbus
linearibus, fubbifidis.

c. ioliis oiniibus linearibus, inierioribus
fuhbifidis.

in fossis rivulisque fed *b.* in amne vtd *St. Hans
Hospital.* Flor. May. Juru 8C interdum Jul,

4. *C. hernuiphivdila.* Floribus herrnaphrodiliSj
ioliis omnibus lin<·aribus apice bifidis.

In fundo f^buloso ar^illaceo af *JPtblinge Stie, Em**
drup-Soë, *itirkerbd-Soë* &Cc Flor. tempore
a!Uvali usque ad antumnum*

CLASSIS II.
D I A N D R U

MONOGYNIA.

* Flor. inferi, ^ monopetali regulares*

Ltgujlrum. Corolla quadrifida. Calyx quadri-
dentatus. Bacca tetraferma.

<* Flores inferi monopetali irregulares.

a. Fructus capfulares.

Veronica. Corolla limbo quadripartite: lacinia
inferiore angustiore. Capfula obcordata bilo-
cularis.

Pinguicula. Corolla ringens calcarata. Calyx
bilabiatus quinquefidus. Capfula unilocularis.

Utricularia. Corolla ringens calcarata. Calyx
diphyllus aequalis. Capfula unilocularis.

b. Fructus gymnospermi.

Lycopus. Corolla quadrifida: lacinia unica emar-
ginata. Stamina distantia. Semina quatuor retusa.

«## Flores superi.

Circaea. Corolla dipetala. Calyx diphyllus.
Germen inferum. Capfula uncinata - bivalvis,
bivalvis, Semina folitaria*

DIGYNIA.

Anthoxanthum. Calyx gluma bivalvis uni-
flora. Corolla gluma bivalvis longitudine
valvulae majoris calycinae: valvulae utraque,
antheram e dorso eminentem.

MONOGYNIA.

4. *Ligularia m.*

Calyx quadridentatus. Corolla quadrifida.
Eacca tetraſperma. (*Bacca bilocularis: locula-
mentis membranſi tenui wjtitis. Sefntna bina.*)
Hoft. ' ,

5. *L. vulgare*, foliis ovato-lanceolatis acutis; thyrfi
pedicellis oppofitis. Curt. Lond. 5. No. 51.

Ad fepes fed rarii^s 8c folummodo *bag Lyngbye
tat ved Soen* ohfcvari. Flt>r. Jul. 8C Aug.

4. *Circaea.*

Calyx diphyllus (foliolis calycinis reflexis).
Corolla dipetala. Capſula uncinata-hifpida,
bivalvis. Semina folitaria.

6. *C. lutetiana*, foliis cordato* ovatis, repando-
ferrulatis, acutis cauleque erecto pubefcente;
capſulis ovato - globofis. Curt. Lond. 3. no* 34.
SCc. Flor* Dan, 210. haud ban.

In umbroſis fere ubique *Charlottenlund, Dyre-
have* 8Cc. Flor. Jul. 8c Aug.

7. *C. intermedia*, foliis cordatis, repando-den-
tatis, acuminatis cauleque erecto glabro;
capſulis ovato - globofis.

In umbroſis humidis 8C quidem in fylv^e inter
Frkderichsdahl 8C *Kotkkolh* vulgo *Harejhov* legi.
Flor i\^x\ 8C Aug.

8* *C. alpina*, foliis cordatis dentatis acutis, caule-
que proſtrato vel erecto glabro; capſulis cla-
vatisSCc. Flor, Dan. 256?

In umbrifis humidis, cryptis radicium arborum
huud frequens / *Dyrehavt, Bukerod, Gialjkow*
fcc. Flor. Jul. 8C Aug.

*

6. *Veronica.*

Calyx quadri-vel quinque partitus. Corolla
limbo quadripartite, lacinia iufhna anguAiure.
Cap'ula bilocul'iris (obcordata).

* *Spicatae.*

§• V' *IP*TM*0** fp'""³ terminali; foliis oppofitis cre-
natis obtufjs (ovato-oblongis;; caule adfcen-
dante fiiiipliciflimo. Flor. Dan. Tab. 52.

«In littore ved *Frttdtriksfund, Dn. v. Holten* 8C
Maikujfen.

10. V. *officinalis*, fpicis lateralibus peduncu'atis;
foliis oppofitis, caule procumbente. Flor*
Dau. Tab. 248-

In f>lvis, ericetis 8C aliis locis. Flor. Jun. 8C
Jul.

•* *Corymbofo-raumofe.*

It. V. *Jerpillifolia*, racemo teiminaii fubfpiratn^
foliis ovatis glabris crenulatis. Flor. Dan.
Tab. 492.

¹ In pratis 8C alibi. Flor. May. Jun. 8C Jul.

42. V. *Beccabunga*, racemis latrralibus; foliis
ovatis crenulato - ferratis plants; caule repente.
Flor. Dan. Tab. 511.

In rivulis, ad *ioiUs*. Flor. seilate.

13. *V. Anagallis*, racemis lateralibus; foliis lanceolatis fenulatis; caule erecto* Flor. Dan. Tab. 903. habitat &c floret cum antecdfente.
14. *V. fcutellata*, racemis lateralibus alternis; pedicellis pendulis.
- a. *villosa* foliis lineari-lanceolatis subdentatis, cauleque villoso.
- b. *glabra*, foliis subovato-lanceolatis denticulatis cauleque glabro. Flor. Danic. Tab. 209.

In locis inundatis &c turfo&s haud infrequens.
Flor. aetate,

15. *F. montana*, racemis lateralibus paucifloris; calycibus hirsutis; foliis ovatis rugosis, crenatis petiolatis; caule debili. Flor. Dan. Tab. 1201.

Barius in locis umbrosis, fylvis ved *Kollekolle* & *Cgamrind Friderichsdal i Naffet*, Raft Danm. og Holft. Flota.

16. *V. Chamadrys*, racemis lateralibus; foliis ovatis, fere liliis, rugosis, obtuse ferratis; caule debili, bifariam piloso. Flor. Dan. Tab. 448.

In pratis. Flor. May. &c Jun,

* * * Floribus lateralibus folitariis.

17. *F. agrestis*, floribus folitariis alternis, pedunculis plerumque foliis aequalibus; foliis cordato-ovatis crenato-ferratis rugosis. Flor. Danic. Tab. 419.

§ *Diandria Monogynia**

In cultis 8C ruderati*. Flor. a primo vere usque ad autumnum, (*Folia inferioria oppositifolia alterna Junco*)

X%. V* *arvensis* fieribus foliitibus ahenis, pedunculis brevifloris; foliis inferioribus cordatis crenato-fenatis, rugosis, oppositis; floralibus ovato-lanceolatis vtiliter lanceolatis subintegerrimis. Flor. Jan. 51 j.

In agris 8C pratis ficiis. Flor, primo vere,

79- F. *condusifolia*, Floribus foliitibus, pedunculis fructiferis foliis longioribus, distichis; foliis inferioribus ovatis integris, interioribus atque superioribus cordatis, sublobatis. Flor, Dauid, Tab. 423. hinc bona. Buxb. Cent. 1, Tab, 39* f. 1, melior.

In agris 8C rudertu frequens, Flor, Apr. May* & Jun,

80, V. *nrna* Floribus foliitibus, pedunculis brevifloris; foliis digitato-partitis lacinia intermedia ovata; caule sub digitato. Flor, Dan, Tab. 252^

IIaud frequens in arvis 8c pratis ficiis *ved Cpn-Itantia, bagve'd Stolpegaard, Bnd\$-MulU, «Sorgenfrie Baktr* f Jorv primo vere,

91. V: *ptngria* foliitibus foliitibus, foliis lanceolate-linearibus glabris obtusis subseratis; caute erecto. Flor. Uanic. Tab, 407, In locula Amaia? *Midler*. Flor. Julii. 8C Jul.

7. *Pinguicula.*

Calyx bilabiatus quiiuefidus. Corolla pin*
gens calcaata. C<ip(til<i uniloculaiis.
(blaniina thalamo inierta).

25. *P. vnlgaris*, nectaiio cylindraceo longitujino
petali. Flor. Dan. Tab. g-j.

(*Folia oi/at a, carnoja: margine injltxo, de-
prijfa. Scopus unijlorus.*)

In locis humidis turfosis fcie ubique, flor. May,
8C Juri.

g. *Utricularia.*

Calyx diphyllus, iequalis, Corolla ringen*
calcarata. Capful a uniloculaiis.

53. *XJ. vnlgaris*, nectaiio fubulato-conico incirvo;
labio fuprerno compreflb: fcapo puipureo,
(*najlrif regionibus.*) quddti-fexQCtoflofo. Flor,
Dan. Tab. ijfc.

In ioflis 8C paludibus turfosis vaide profundis;
Lundehuus Muse, Lyngbye, Rirktroi 8C alibi,
Flor. Jun. Jul. 8C Aug.

24* *U. media*, nectaiio cOaico rdcto; labio fupve*»
mo explapato; fcapo bi-tvi-qu^driiloro, gia«
cili. Flor. Dan,

Rarius in paludibus turfosis 2 *Lyngbyt Mofe og i
Molen i Skoven imellem Rudergaard og Birkeiod*
folummodo obfervari. Flor. Jul. 8C Aug,

25t *U. minor*, nectaiio breyi carin^to; labio fu*
jiremo inferiore duplo minori; fcapo fili«
formi tri-quadriloro, Flor, **Dan.** Tab, 128.

jo

Diandria Digynia.

Rarius in paludibus turfoCs *LyngbyeMofe, Bir-
keiod, Ordrup*MoJe* 8C alibi. Flor.c.pnecedente.

g. *Lye op us.*

Corolla quadrifida: lacinia unica emarginata*

Stamina diilantia. Semina quatuor retufa.

s6. *L. europaus*, foliis ovato-lanceolatis, finuato-
ferratis. Flor. Dan, Tab. io8r.

Satis iVequens in fossis 8C aliis locis humidis 8C
paludofis. Flor, Jul. Aug. Sept.

D I C Y N I A.

10. *An tho xa nth urn.*

Calyx gluma bivaiyis uniflora. Corolla gluma
bivalvis longitudine valvulae majoris ca4ycinae:
valvula utraque ariftam e dorfo emittente.

27. *A odoratum*,¹ fpica ovato - oblonga: flosculis
fuhpedunculatis ariila longioribus. Flor. Dan.
Tab. 666.

In pratis 8C pafcuis. Flor. Maj. 8c Jun.

a. fpica linear i; foliis caulinis linearibus
fubfetaceis.

Habitat SC floret cum priori.



C L A S S I S III.
T R I A N D R I A.

M O N O G Y N I A .

* Floras fuperi.

Valeriana. Corolla cjuinqucfida, bafi gibba.
Calyxjiullus, Semen unicum.

Iris. Corolla monopetala, fexpaitita, laciniis
alternis* deflexis vel patentilnis. Calyx fpa-
thaceus. Stigmata petaliformia,

** Flores grain'ui ei valvulis glumae caly*
cinae,

Schoenus. Corollii nulla. Calyx glumae palea*
ceae univalves lafciculaKrn Cf)ui;eft^ . Semen
unicum fubrotunduin inter glumas.

Cyper us. Corolla nulla. Calyx glumae paleacea
didiche Imbricatae*. Semen unicum nudum.

Scirpus. Corolla nulla* Calyx glumas paleaceSB
imbricatae. Semen unicum vel nudum vel
viliis cinctum.

JErioptorum. Corolla nulla. Calyx gluma
paleacea undique imbricate. Semen unicum
lana longiditna cincturn.

*Nardus** Corolla bivalvis: valva exteriore kn^
ceolata, carinata, aditata; interiore acuminata.

Semen unicum lanceolatum, corolla adnata
tectum,

DIGYNIA,

* Calycibus trivalvibus unifloris.

Panicum. Calyx trivalvis: duces majores mitice
aut aristatae, tertio dorsalis, minima, Corolla
bivalvis.

£# Calycibus bivalvibus unifloris.

Phalaris. Calyx bivalvis, carinatus longitudine
aequalis, corollam includens.

Leu ni. Calyx bivalvis fertilis, linearis, trincatus
a pice bicupidato. Corolla bivalvis perianthio
minors mutica, inclusa.

Lolopicus, Calyx bivalvis, aequalis, carinatus,
lanceolatus. Corolla univalvis, apice
arilla longa terminata.

Milium. Calyx bivalvis; valvis subaequalibus
vertricofis. Corolla bivalvis, ovata, breviflora;
valvula altera minore. btigata pentacilliformia.

Agrostis. Calyx bivalvis, aequalis; valvis lanceolatis
acutis, yoxulla longioribus. Corolla
bivalvis; valvula exterior nodomutica, modo
aviihira, Stigma longitudinaliter hispida.

Trundia Calyx bivalvis, oblongus acutinatus.
(rotunda) hafi tanugiaoCa, Semen Una cinctum.

**^w Calycibus bivalvibus, bifloris,

Lira. Calyx bivalvis, aequalis acutus. Corolla

bivalvis: ^altera valvula faepe ad bafin aiiftatd;
absque iuterjecto TU dim en to tertii floris.

Melica. Calyx bivalvis, scqualis, obtufus. Co-
rolla bivalvis miitica, cmn ruJimento fecundi
vfcl tertii iioris.

**## Calyribus bivalvibus, multifloris.

Poa. Calyx bivalvis, muticus ovatus acuniina-
tus. (ioruila bivalvis: Valvulis acutiusculis
marginc fcariufis*

Briza. Calyx bivalvis, cordatus, concavus, ob-
tufus* COILlla bivalvis iautica aequalis.

Dactylis. 'Calyx bivalvi-*, CDrnpieflus: Glumae,
Jauceolatas macronata*; altera gluma major!
cainata. vCorolla bivalvis; altera valvula
apice ariflata.

Fejluca. Calyx bivalvis, fubulatus, acuminatus*
Corolla oblonga; valvulis oiuaonati&; altera
fepe aruilata ex apice.

Br o m u s. Calyx bivalvis, oblongus, acuminatus.
Corolla bivalvis ina?qualis, majore bifida,
ariflam infra apicem emittente*

*Avena** Calyx bivalvis, lanceolate* . acutu^
Corolla oblonga, altera valvula dorfo vel bafi
ariilata; arifta tortili in medio geniculata.

*Cynofurus** Calyx bivalvis> linearis, acumina*
tus. Receptaculuni floium unilateral^, folia-
ceum.

t:## Spica diflincta, receptaculofubu«
hto, dentato.

Rottbiffia. Calyx fimplex vel bipartitus, ovato lanceolatus planus. Flocculi alterni in **interstitiis** inserti.

¹ *Lolium.* Calyx univalvis linearis, firmis, rachis oppositis multifloris. Corolla inaequalis.

Elymus. Calyx bivalvis, aggregatus, multiflorus. Spiculae geminae.

Triticum. Calyx bivalvis ovatis subtriflorus fertilis. Corolla bivalvis, valvulis subaequalibus. Receptaculi basis ciliata.

Bordeum. Calyx linearibus, triflorus. Flocculi laterales saepe masculi.

TRIGYNIA.

fflonti a. Calyx ditrichocarpus; foliola ovata, obruta. Corolla trilocularis irregulata. Capsula unilocularis trivalvis.

Ho Ioftit '7i. Calyx pentapetalus. Petala quinque. Capsula unilocularis, subcylindrica, tipice dehiscentis.



TftONOGYNIA.

v u. *VaUriana.*

Calyx nullus. Corolla quinquefida, basi gibba.
Semen uuicuin.

28» *V. itioica*, floribus triandris dioicis; foliis radicalibus ovatis petiolatis, subintegris; caudicibus inferioribus bipinnatifidis; superioribus bipinnatifidis. Flor. Dan. Tab. 687.

In pratis urbis. Flor. Maj. SC Jun.

29. *V. ojjicinalis*, floribus triandris; foliis pinnatis pinnis deutatis, alternis. Flor. Dan. 570.

In uermoribus proliulis SC turfbis *Ordrup, Luri delws, LyngHye* SC alibi. Flor. Jun. SC Jul.

30. *V. olitoria*, floribus triandris; caule dictotomo; foliis caulinis linearibus subdentatis; radicalibus ovato spatulatis integris. Flor. Dan. Tab. 73S.

In locis ficcis, arvis, *Charlottenlund, Billewiw, CaJttUt.* Flor. vrle.

31. *V. dentate*, caule dichotomo, foliis oblongis, deutatis, femine tridentato.

In locis humidis. Flor. Jun. SC Jul. Rafn Dan. »g Holit. Flora.

12. *Iris.*

Calyx spatulata membranacea. Corolla monoperifala, sexpartita; petalis jlt^rnis deil^xis vel patentibus. Stigmata petaliformia, cucullata, fcellabiata.

32. *I. Pfmd-Acorusi* corollis imbeMbus; lacityU
interiorib'S fligmate minoribu|; foliis enfifor-
taibus. Flor. Dan. Tab. 404.

In p.iliilribus, tbffis, frequens. Flor. Jun. Sc
Jui.

33. *I> fpuritii* corollis imberbibus; gerrnibus
fexjiigularilms; caule tereti; foliis fubhneari-
bus. Flor. Dan. Tab. 734.

Olirn a *Kyllingio*, miperime a Dn. *Colsmanno* in
Infula Saliholm lecta. Floi. Jun.

13. *Schoenus.*

Calyx glutnse paleaceas univalves farciculatim
cong^llae. Corolla nulla. Semen unicum
fubrotundnm inter glunias, vel nuduin vel
f< tis iiiiiriis, e receptaculo proprio enatis,
cinctum.

34. 5. *Mariscus*, culmo tereti; foliis margine dor-
fo([iie aculeatis* Flor. Dan. Tab. 12^2.

In lacubus & amnis* *Lyngby-Søe*, *Orholm*,
*Nyt Molle** Flor. Jul.

35. <S, *albus%* culqio fubtriquetro foliofo; floribus
farciculaiis, fubdiandris uti in piaecedenti; fo-
liis fetaceis. Flor. Dan. Tab. 320.

Earius in palndibus turfosis; in *Tepri'Mofeto**
lummodo vkii. Flor. Jul. 8C Aug.

14. *Cyperus.*

CAyx. y\umx paleac^ae diftichae imbricate
Corolla nulla. Semen unicum nudum.

g6. *C. fufcus*, culmo triquetro nudo, umbella trifida pedunculis simplicibus inaequalibti*?, fycis conftrtis lin> aribus, Flor. Dan. Tab. 179, Haud frequens iu pratis paludofis i Iru'e-iSkov Lag ved Ba&fvard. Flor. Jim.

15. *Scirpus.*

Calyx; glumae paleaceae, unclique imbricatae. Corolla iilla. Semen unicum vel nudum vel villis cinctum.

* Spica Uiiica, terminal!, nuda*

97. *S. palujlrif*, culmo tereti, nudo; fpica fubovata tennin ili. Flor. Danic. Twb. 273.

In locis paludofis frequens. Flor. Maj.8cJun,

38. *S. Baothrian*, culmo tereti, ffricto, nudo, bafi vaginato; vagina truncata; fpica terminali, pauciloia, bivalvi; valvulis ovatis, fpica brevioribus, margine fcariofis: exteriorc breviorle. Flor. D.inic. Tab. 167.

In locis inundatis. Flor. Jun. 8C Jul.

Pra?cedente fmilis fed parvior. Anne folummodo vaiictds?

39. *S. cafpitofus*, culmo nudo, ffricto, bafi vaginato; vagina fubacuminata; fpica¹ bivalvi, terminali longitudine calycis; radicibus fqua* inula interihiiLtis.

In locis bumidismufcufis, ericetis. Inter *Ityng** *lyegaarden* 8c *Lyngbye*. Rafn 1. c.

40. *S. acicularis*²^&u\mo tereti, nudo, fetiformi: fpicula terminali ovata, bivalvi; feminibug nudis. Flor. Dan. Tab. 287.

In locis inundatis, ad ripas lacuum frequens
Peplinge-Soe, Fur-Soe, Lyngbye - Sot &c alibi.
Flor. septate usque ad autumtum.

41. *S. fluitans*, culmis teretibus, nudis, alternis;
spica terminali; caule folioso, illicido. Flor.
Dan. Tab. 10&2.

In paludosis inundatis locis. Piscino versus
Hartkov Dn. v. Holten rarissimam hanc plantam
legit. Flor. Jul. &c Aug.

** Spicis, lateralibus, nudis.

12. *S. fetaceus*, culmo tereti, nudo, fetaceo: spicis
lateralibus, subgemmis, subfililibus. Flor.
Dan. Tab. 311.

In littoribus lacuum haud frequens; *Langtfde vii*
Birkzrøds Lyngbye-Sbe &c alibi. Flor. Jul. &c
Aug.

*** Culmo polyflachio. Spicis involu-
cratis.

a. Culmo tereti.

43. *S. lacustris*, culmo tereti, nudo; spicis
pluribus, pedunculatis involu-
cratis diphylis. Flor. Dan. Tab. 1142.

In lacubus, piscinis, rivulis &c annis frequens,
Flor. Jun. Jul. &c Aug.

4. Culmo triquetro.

44. *S. Carids*, culmo subnudo, subtriquetro
spica terminali; spiculis distichis; involu-
crura monophyllum. Pollich. paUt. ao. 3[^] 11» b?
tis bona*

In pratis humidis nee non turfosis. Flor. Maj
Jun. Sc Jul.

45. <&. *maritimus*, culmo triquetro, panicula con-
globata ioJiacta; fpiculantim fquamis trifidis:
intermedia lubulata. Flor. Dan. Tab. 937.

In litcoi is frequent. Flor. Jul. 8c Aug.

46. 6'. *fylvatikus*, culmo triquetro, ioliofo; urn*
bella ioiiacea; pedunculis nudis fupradecorri-
pofitis, fpicis confertis. Flor. Dan. Tab. 707.

In humidis praeieitun iylvaticis: *bag vedQnrups-
Mofe, Sorgtn/rie* 8c aliis locis. Flor. Jun. 8c Jul.

16. *Erisphorum.*

Calyx glumae paleaceae, undique imbricate.
Corolla nulla. Semen unicnm, lana longifli-
ma cinctum.

* Spica unica, termiqali, nuda.

47. JE. *vaginatum*, culmis fubteietibus vaginatis;
fpica fcaiiofa. Flor. Dan. Tab. 236.

In paludibus turlofis, pratifeitim in palude *ved
Stolptgaardi* ciica *Hirkerod** Flor, Apr. Maj.
SC Jun.

48- JE. *alpinuniy* culmis nudis rriqtiefr^s; fpica
exigua, ovato lanceolata, fubinvolucrata.
Flor. Dan. Tab. 620, haud bona.

In palude vulgo *Jjyngbyz Moje* frequens, Flor.
Maj. 8c Jun.

•^* Spicis pluribus i t^rminalibus.. inv#-
lucratis.

4Q. *E. polyftachion*, culmīs teretibus; foliis plani*
(mucion brevi triquetro ; Ipicis pedunculatis
involucro diphylo a?qualibus vel longioribus.
Leers Herborn. Tab. i. Fig. 5.

In uliginōis turfosis ferp ubique. Flor. primo
vere.

(0. JS. *angulifolmm* culmis foliofjs, teretibus;
foliis caiidliculato triquetris; fpicis peduncular
tis; involucro fubtriphyllo: foliolo unico fpicis
triplo vel quadruple) longiori, reliquis brevio-
ribusvel fubaequalibus, vel haud longioribus.
In uliginōis turiosis fylvaticis *Birhrbd.* Flor.
primo vere.

17. *Nardus.*

Calyx hullus. Corolla bivalvis; valvula ex*
teriore lanceolata, carinata ariftata; interiore
acuminata. Semen unicorn lanceolatuin,
tectum.

51. *N. Ilricta*; fpica fetacea, recta, fecunda. Flor*
Dan, Tab. 1022.

In ericetis; *Dronning-Gaard, Chariot! in Iund,*
Birkroð SC alibi. Flor. Jun.

D I G Y N I A .

18. *Phalaris.*

Calyx bivalvis, carinatus, longitudine aequa
< \s, corollam includens.

52. *P. canariensis*, panicula fubovata fpiciformi
glurnis cauinatis. Schreb. Graes. Tab. X. Fig* *'

In ruderatis nunc fponde crefcit, & *flerfelhd*,
Ladegaarden & in aliis locis vicinis. Hor. Jun.
Sc Jul.

53. *P. phleoides*, panicula cylindrica, fpiciformi,
glabra, pafilm vivipara. Flor. Dan. Tab. 53 r.
In locis aienofis ficcis; *Nyemolle*. Flor, Jun. 8C
Jul.

44. *P. arundinacea*, panicula oblcimga, ventricofa
8C ampla. Flor. Dan. Tab. 259.
Fere ubique inripis rivulorum SClacuum. Flor*
Jul. k Aug.

ig. *Panicum.*

Corolla bivalvis. Calyx trivalvis, duae majo*
res muticae aut ariitatae, tertia dorfalif minima*

35. *Pan. viride*, fpica tereti, involucellis biiloris
fafciculato • pilofis; feminibus nervofis. Flor*
Dan Tab. 852.

In locis ficcis, inter vias *CharlottenluYid* 8C *Skov***
hovzd. Flor. Jul. 8C Aug>

20. *Phleum,*

Corolla bivalvis gluma minor, mutica inclufa.
Calyx bivalvis feffilis, linearis truncatus apice
bicufpidato.

36, *Phi. pratense*, fpica cylindrica longifiima, ci-
liata; culmo erecto. Schreb. Graes. Tab. 14.
In pratis fubhumidis 8C ioundatis. Flor. Jun. >C
fequentibus inenfibus.

Triandria Digynia.

57. *Phi. nodofum* fpica cylindrica; culmo afceateate; iollis obliquis; radice bnlbofa. Flor. Danic. Tab. 380.

In praxis paludofis nee non ia locis ficcis. § Flor. cum antecedtnte.

21. *Alopecurus.*

Corolla univalvis, apice arilla longa terminate. Cdi)\ giuma oivalvis: valvulis caiinatis, lanceolatib ifc4uaiibu9,

58. *A. pralenjjs*, calrno fpicato erecto; glumis villufis; coroliis muticis. Schreb. Graefer Tab. ij .Fig. 1.

In pvaf> % lotfis. Flor. Maj. Jun. & JuL

59. *A. geniculatus* 9 culmo fpicato infracto; corollis Diutkiş. Flor. Dan. Tab. g6i.

In praxis humidis 8C foi&s. Flor. Jun. Sc Jul.

23. *Mi Hum.*

Corolla bivalvis, ovat^, breviffima: valvula altera minore. Stigmata penicilliformia. Calyx bivalvis: valvis fubaequalibus ventricofis.

60. AT. *effufum*, floribus papiculatis, difpergis, muticis. Flor. Dan. Tab. 1143.

In nemoribus umbrofis. Flor. Jun. Sc Jul.

23, *Agrojtis.*

Corolla bivalvis; valvula exterior modo mutica modo ariftata. Stigma longitudinaliter

Tiandria Digynia.

*\$

hifpida. Calyx glurna bivalvis squalls; valvit lanceulatis acutis, corolla longioribus*

* ariftatae.

6r. *A. Spica venti*, petalo exteriori arifta recta* ftricta, longifilina, panicula patula. Flor. Dan, Tab. 85j- Flor. Jun. 8C Jul.

Inter fegetes, ad vias: *Ordrup, paa Cajlelsveien,*

62. *A. rubra*, panicula parte inferiore prius flo* rente patentiflima, arifta terminali, tortili re* curva.

In pratis fubhumidis, circa ^ *Birjterdd, Ruder* gaard, Frederiksborg* 8C alibi. Flor. Jun. 8c Jul.

63. *A. canina*, calycibus elongatis, petalorum arilla dorfa', recurva; cuhnibus proftratis fub* ramofis.

In locis ficcis Sc humldis. Flor. Jun. Sc Jul.

** muticae.

64. *A. Jtolonifera* paniculx ramulis patentibus; culnio reperate; calycibus aequalibus; flofculii muticis.

In agris, ad vias. Flor. Jun 8C Jul.

65. *A. capillaris*, panicula Icapillari patenfi; caly« cibus iubulatis, aequalibus, hifpidiufculis, co» loratis; flofculis multicis. Fl. Dan. Tab. 163.

In pratis, verfuris fere ubique.

a. pumila

in pratis yalde ficcioribus. Flor. Jul. Sc Aug.

66. *A. alba*, panicula coarctato - patula; culnio re* pentes calycibus aequalibus dorfb ferratis*

floscu'is muticis. Leers Herborn. Tab. 4* .

In fn(fis, locis luimidis ac inunilatis. Flor. Jun,
& Jul.

67. *A., tenella*, panicula divnricata capillari pauci-
flora rnutica; calyce flosculisqtie acutis i'ubæ-
quahbus. *Hojftn. botanrfch. Tofchtnb. Igoo.*
pag. 36.

In fylvi&, locis urnbrofis. Flor. Jul. 8C Aug.

68* *A. cuarctata*, panicula contracta; calycibus fub-
aequalibus; corollis haud brevioribus, obtu-
fiu ciili«, hifi idulis; foliis angufiifere filifor-
mibus fetaceis. *Hojfm. butanifch Tafchenbuch*
1800. pag. 37.

In locis cspitofis, circa *Birkerbd.* Flor. Jun.
ScJuL

34. *Air a.*

Calvx bivalvis^ bidorus. Flosculi absque in-
terjecto ludirmento* '

* Muticae.

69. *Air. aqudiicuj* panicula patente; flosculis mu-
ticis Isevibus, Calyce longioribũs; foliis .planis.
Flor- Dan. Tab. 38'•

In pratis humidis, paludibus: *Lundehuus Mofe.*
Flor. Jun. 8C Jul.

** Ariftatae.'

70. *Air. cafpitofa*, foliis planis, panicula patent©
(laxa iubfecunda ; petal is bafivilJofis arriilatis
que: aiiila recta bievi. Ilor, Dan. lab. 240

In loci* humidis deprefiis, foffis. Flor. Jun. SC
Jul.

71. *Air. flexuofa*, foliis fetaceis; culmis l'ubnudis:
panicula divaricata; pedunculis flexuofis.
Flor. Dan. Tab. 157.

In pratis aridis, fytvis. Flor. Jun. 8c Jul.

7?. *Air. canejctns*, foliis fetaceis; funnmo fpatha-
ceo* paniculam interne, obvolvente; (panicula
cnarc'dtal ariftis calycem lion excedentibus*
Flor. Dau. Tab. 1023.

In aivis arenosis praefertim arena rnobili, *Vthek*.
Flor. Jul.

73* *Air. praeox*, foliis fetaceis: vaginis glabrit
fulcato-angulatis; floribus paniculato-fpicatis;
arillis calycei fuperantibus. Flor. Dai.. Tab.
383.

In arenofis aridis; inter *Charlottenlund* 8C *Skovs**
hoved, *Brfide-Baker* & aliis locis. Flor. Maj. 8C
Jun.

74. *Air. caryophyllaa*; foliis fetaceis: vaginis gla-
bris, fulcatis; paucula divaricata; ariftis caly-
cem (uperantibus. Flor. Dan. TJD. 382.

In arvis 8C collinis arenofis; *Dyrehaven ved Ere-*
mitagen, *Brede • Baker*, *KolUkolk Granjkof* iC
alibi. Floi. Jun.

25. *Melica.*

Calyx bivalvis, aqualis obtufis. Corolla bi-
valvis mutica, cum rudimento Cecundi vc|
tertii flons.

75. *iff, nutans* panicula nufcinte fimplici} calyci-
ft-n trifloris. Flop Dan. Tab. 902.

In fylvis hand frequens; *Bagfvard, Dyrihave.*
Flor. Jun. 8c Jul.

76. *M. ii»ii/loni,i)dnicu1a* rara, calycibus bifloris?
BosctU) alftro hennaphrodito; altero flerilk
Flor. Dan. Tab. 1141.

PraeceiiLiui frtquenuor in fylvis; *Charlottes*
lund, DyrehdV(>, Birkerod SC alibi. Floi,rJun.

77. *M. c&rulea, paiucLiU* cnaictaU; iloribus *cj>*
. % linJricis. Flor. Dan« Tab. 2^9,
la palUdofis tuiiofis trequens- Flur» Augy

«6, P o o ,

Calyx bivalvi^, muticus, ovatus acurpinatus.
Corolla bivalvis: Valvulis acutiuseculis margb»
ne fcariofis.

78. *P. aquatica*, panicula diifufa; fpiculis fexflo*
ris, linearibus. Flor. Dan, Tab. 920.

In toflis ad n pas pifcinarum, lacuum frequent
FI01.J11.

79. *P. trivialis*, panicula diffufa; fpiculis trifloris,
bafi f»ubefcentibus; foliis planis; vaginis fca-
briubculis: Hgula aucta. *Curtis General*
Objervations on the Advantage which may rtfult
from the Introduction of the Sieds of our beji
Grafts, Fig. 7.

In pratis Cat copiofa* Flor Jun.

* \$0. *P. angujtijolia*, panicula primo confxacta poft
florafceatiam autem maxims divancara; fpl*

culis'quadriiloris pubescentibus; j foliis radicalibus filiformibus; vaginis brevibus: ligula brevi truncata.

In agris & inter vias. Flor. Maj. & Jun.

Ji. *P. pratensis* panicula diffusa; spiculis quinqueloris subpubescentibus; foliis planis, vaginis laevibus: ligula truncata. *Curt.* 1. c.

Fig- 3-

In pratis nec non inter vias publicas. Flor. cum praecedenti,

82. *P. annua*, paniculis diffusis angulis rebus; spiculis obtusis; culmo obliquo contoprelo.

In cultis rudericisque. Flor. a primo vere ad ferum autumnum.

S3, *P. maritima*, panicula subdiffusa, deinde patentem & demum retroilexa; spiculis quadri-quinque-septem-floris; culmo repente folo-nifero. *Flois Dan. Tab. 251.*

In Jittore maiis frequens. Flor. Jun. Sc Jul.

Eadem cum *Poa falina* Pollich. & *Leyfer.*; *Poa arenaria* Retz. & *Kafn.*; *Poa retroilexa* Curtis; *Aira aquatica* Hudson.; *Poa criitata* Gunner. Am eadem cum *Poa distante* Holui?

84. *P. palustris*, panicula attenuata subdiffusa; spiculis subtrifloris subpubescentibus ovato-rotundatis; foliis subtus scabris: ligula obtusa, *Flor. Dan. Tab. 749**

In foliis & pratis humidis; *Bagvard, Liminhuum-Mofe.* Flor* Maj. & Jun.

a g *Triandria Digynia.*

Culmus 8C panicula erectior 8C flrictior ell quant
in fequeute fpecie*

Jj. *P. nemortilis*, panicula attenuata, divaricata,
laxa; fpiculis fibbiiloris ovato-oblongis ari-
(h:6-mucronatis fcabris; cu 1 mo incurvo. Flor.
Dan. Tab. 750. Vaill. botanic, parfienf. Tab.
17. f. 5. melior.

In fylvis grameneft frequentiflimum. Flor. Jun.
\$C Jul.

86. *P. compreffa*, panicula coarctata fecunda; spi-
culis ovatis fexfloris pubefcentibus; culmo
obliquo compreffo. Flor. Dan. Tab. 742*

In muris, ruderatis, ad vias. Flor. Jul. 8C
Aug.

g7» *P. coftata*, panicula, coarctata rpiciformi;
fpiculis ovatis fubtrifloris fubpubefcentibus;
valvulis florum nervofis; culmo erecto vel
afcendenti, tereti.

Ip monticulis arenofis littoris inter *SpringforbU*
Sc *Papirsm bile*. Flor, Jun.

CulmMs pedalis Schaud altior, erectus, terea,
glabes, fubnudus, verfus bafin geniculatus. Folia
radicalia fubpedalia erecta filiformia fubfca-
bricula; culmea fubdua breviflima. Panicula coar-
ctata fpiciformis uncialis erecta. Spiculae oblong'
acutiufculae. Glumas fubsequales, lanceolate >
acute, fcabra? bi vel (filorae, Valvulae floruit
glutnarum fere longitudine, fubmucronatae, tri vel
quinque nervofae fcabridae.

27. *Briza.*

Calyx bivalvis, cordatus, concavus obtufus*.

Corolla bivalvis mucronata sequalis.

88. *B. media*, spiculis ovato cordatis; calyceis*
culis brevibus. Flor. Dan. Tab. 258.

In pratis frequens in pratis praefertim fylvaticis;
JRudergaard, Dyrehave, 8Cc. Flor. Jun.

28. *Dactylis.*

Calyx bivalvis, compressus. Glumae lanceo*
lata mucronatae; altera gluma majori carinata.

Corolla bivalvis; altera valvula apice ariflata.

89. *Z. glomerata*, panicula fecunda, glomerata.
Flor. Dan. Tab. 743.

In pratis, ruderalis, ad vias frequens. Flor.
aerate.

a. f. hejlfis, culmo altiori; panicula dif-
fusiore, patentiori, glomerata.

In locis umbrosis humidioribus fylvatum ac na*
morum. Flor. Jul. 80 Aug.

29. *Cynofurus.*

Calyx bivalvis, linearis, acuminatus. Ee*
receptaculum florum unilaterale, foliaceum.

90. *C. cristatus*, bracteis pinatifidis. Flor. Dan.
Tab. 238.

In pratis frequens. Flor. Jun. Jul. 8t Aug.

30. *Festuca.*

Calyx bivalvis, fimbriatus, acuminatus. Co*
rolla oblonga; valvulis mucronatis: altera
apice ariflata ex apice.

91. *F. bromoides*, panicula fecunda: fpiculis erectis calycis valvula altera integra, altera acuminata; lloribus ariflatis.
 In pratis ficcis vtd *Frbken Brow's Gaard nd Bernjlorf.* Flor. Jun. SC Jul.
 Culmi decurnbentes. Folia fetaqeo-linearia.
- gg. *F. ovina*, panicula fecunda, coatctata,^ariflata; culmo tetragono nudiufulo; folds fetaceis.
 In piatis 8C collinis arenofis aridis frequens.
 Flor. Jun.
 «. panicula mntiflora; culmo fuhfoliaceo,
 p. panicula fubinultiflora, amethystea; culmo fubfoliaceo.
 y. panicula paucilora; culmo nudo, altiori.
- 93, *F. ntbra*, panicula fecunda fcabra; fpiculis fexfloris ariftatis: flosculo ultimo mutico; culmo femiteretU Leers Herborn. Tab. g. fig. 1.
 In locis ficcis & pafcuis fterihbus. Flor. Jun. 8C Jul.
94. *JP. duriufcula*, panicula fecunda oblonga; fpiculU fexfloris oblongis laevibus} foliis fetaceis.
 Flor. Dan. Tab. 848.
 In piatis ficcis. Flor. Jun.
95. *JF. dumetorwn*, panicula fpicaeformi, pubefcente, foliis filiiormibus. Flor. Dau. Tab. 7(;0r
 In aggere Hafnienfi occidentein fpectante.
Midler Fl. Dan. nomenclatur.

96. *F. datior*, panicula subfecunda erecta; spiculis subaristatis: exterioribus tenuibus; pedunculis subadpressis.

Haud infrequens in pratis, foetis, advias. Flor. Jui.

97. *F. decumbens*, panicula rara, erecta, subfecunda; spiculis ovatis mucicis; calyce illo scilicet majore; culmo decumbente* Flor. Danic. Tab. 162.

In pratis, paucis, praefertim fylvatids haud frequens. *Charlotnluud, Caljukuv > Jtirfchhoim* Jltuv.* Flor. Jul. 8C Aug.

98. *F* fluitans*; panicula ramosa erecta; spiculis subfiliibus riuacis. Fior. Dau. Tab. 237.

In tuflis rivuhs, K lacubus tityueus, Flor-aellat^e.

31. *B r o m u s >*

Calyx bivalvis, oblongus, acuminatus. Corolla bivalvis inaequalis: majore bifida aristam infra apicem emittente.

99* *-B- fcalinus*, panicula patente; spiculis ovatis; valvulis externis corollarum apice bifidis aristatis; aristis rectis longitudine corollarum; feminibus distinctis. Leers Herborn. Tab. 11. fig- 2,

Inter fegetes 8C quidem in agris fecaliniis. Flor. Jun 8C Jul.

m. integer, panicula patente; spiculis oratis subaristatis; valvulis* (textum corollarum)

apice tnmcatiss, creniilatis, arifiatis; fo-
liis vaginisque iubhifutiuculis.

Inter fpg(tes legi. >

100. JJ. «/p«r, pan,cula patente-nutante fcabra;
fpiculis linearibus villofiuf.ulis decerniW-
ilonbus ariftatis; vagiⁱnis foliorum [^] ' us
deorfum iihfittis.

In agris SC locis humidis urribrofis; [^] m < 7 ger & ,

flor. Jun. SC Jul.J

lor. *B. mollis*, panicula erectiufcula fpiculis ova-
tispubeiVentibrjs: ariftis rectifi; foliis moJlis- i
fime villofis. Leers Herbom. Tab. n. f. j

Fere ubi<jue. Flor. Jun. 8c, Jul.

102. *B. JleriUs*, panicula patula; fpiculis oblongis
distuh.s; glurnis hy bu lato - ai i/latis. Leers
Herborn. Tab. ir. fig. 4.

Praecipue in **aggere** Kalnienn 8c aliis **locis**. FL
Jun. & Jul.

103. *B. arvmjis*, panicula fubnutante; fpicu]i,
ovato-oblongis ariftatis; foliis J)Ijnis f upra
Villonsj vaginis ftrictisj marginibus pilofis.

In arvis, ad vias paffim. Flor. Jul.

«. *inermis*, panicula fubnutante; fpiculis
ovato - oblongis muticig. flor. Danic.
Tab. 093. «

liarior inter fegetes

104. *B. pauciflorus*, panicula fuhcoarrtata erecta
ulis ovatis lcabridis fubariflatis quadriifloris;

aristis capillaribus brevibus; foliis superius & inferioribus
 hirsutis, vaginis glabris; ligula ciliata.

Ad vias injungens Lie agrorum baud frequens*
Birkuod, Btrnftur Jvz Un & lBagfva.rd\egu tflon
 Jul.

Cum praecedenti habits maxime convenit.

105. 7*. *lectorum*, panicula nutante; spiculis linearibus
 riuus. Leers Horborn. Tdb. 10 f. 2.

In rudcratis, muris tectisque. Flor. Jun.

106. JB. *giganteus*, panicula nutante; spiculis qua-
 ^ilrilioris linearibus anllatis; aristis capillaribus
 (brevibus longioribus; foliis vaginisque glabris*
 Flor. Dan. Tab. 440.

In nemoribus locis humidis *CJwrlottenlund, Ey**
reliave 8C alibi. Flor. Aug. 8C Septembr.

107. ij. *fylvaticus*, culmo racemoso, spiculis fe-
 libus hinc aibus, lateribus; aristis corollas glu-
 ma longioribus. Flor. Duii. Tab 164.

In locis fraticosis humidis; *Bi tdt-Bakkeri*
*i Krattet imtliem Dyrehave og Ordt up - Alofe**
 Flor. Jun. 8c Jul

108. J3. *piunatus*, culmo recedente; spiculis linea-
 ribus fevilibus? subcompressis; aristis corolla-
 gluing brevioribus. Leers Herb. Tab. 10. fig. 3*
 In fylvatici*; *Bagfvard** Flor. Jun. SC Jul

32. *Avena*.

Calyx bivalvis, lanceolatus acutus. Corolla
 oblonga, altera valvula dorso vel basi aristata
 aristata totum in medio gemculata.

109. *A. elatior*, panicula subcoarctata; calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito submutico, masculo ariftaro. Flor. Dan. Tab. 165.

Haud frequens in pratis; ad iolfas. 1^o lor. aestate.

110. *A. Jligofa*, panicula oblonga, contracta, fecunda; flosculis geminis apice biariftatis, dorfo arifta geniculata.

In agris avenaceis haud intrequens. Flor. Jul. in *A. fatua*,¹ paniculata; calycibus trifloris; flosculis omnibus ariftatis bafique pilofis.

Inter fegetes. Flor. Jul. *Rufn L c.*

114. *A. flavescens* panicula laxa; calycibus trifloris bievibus; flosculis omnibus ariftatis. Leers Herborn. Tab 10. fig. 5.

In pratis ficcis; *Friderichsdal Midler. Flor. Jun, 8c Jul.*

21 j. *A. pubefgens*, panicula subpicata; calycibus subtrifloris, bafi pilofis; foliis planis pubelcentibus. Flor. Dan. Tab. 1203.

In pratis; circa *Jagersbvrq 8c Friderichsberg* legi. Flor. Jun. 8c Jul.

114* *A. pratensis*, subpicata; calycibus quinqueflbris. Flor. Dan. Tab. 1083.

In pratis ficcis, nee nonylvaticis; *Charlottenlundy Jägersborgt Hirfchholm Skov.* 1^o lor. Jun. fiCJul.

33. *A run do.*

"Ctlyx bivalvis, oblongus acuminatus. Corolla bafi lanuginofa. Semen lana cinctum,

** Mutlca**

115* *At. Phra&miles*, calycibus quinquefloris; iloribus muicis; paucula laxa. .Leers Herb, Tab. 7. f. 2*

In lacubus, pifcinis foffis frequens. Flor. JuK 8C Aug.

116. *Ar. gracilis*, calycibus iiniiloris; iloribus mu* ticis: valvula exteriorie lanceolata fubtruncata crenulata: panicula erecta fubdiffufa} culmo ramofo, tenure. *An cunefcems Wigg>?*

In locis elevatis humidis; collinis maritimis in* ter *Torbeck SC Springforbie*. liar. Jun. 8c Jul.

117, *Ar. annana*, calycibus uniflois; floribus muticis valvula exteripre profunde bi vel tri- fida, laciniis acucis; panicula coarctata erecta; foliis involutis, mucronato-pungentibus FI. Dan. Tab. 917* *Viborg om Sandvaxt* Tab. 1.

In locis <le\atis ficcis, piaecipue arena mobili. fcl. in elevatis circa *Fuurjot tat vtd Kaningaar** den. Flor. Jun. 8C Jul.

' ** *Arijluta*,

118. *Ar. Calamagrojtis*, calycibus unifloris; flori- bus arifiatis: valvula exteriorie b!fida> anfta haud infra fi^uram gerente 8C valvularn liaud fuperante; panicula erecta laevis; culmo ra- tnofo; foliis lineari^ous. *Hot.* Dan. Tab. 280.

In locis humidis ylvaticis, ad foffas; *Charlotten- lund i Flq/ktkrot*, inter *KongshviU Htfridmchi** dat. Flor. Jul it Aug.

Xlg. *AT. Ericta*, calycibus unifloris; JWibus arildtis: valvula *exteiiore lanceolata; arifta ci* pillari dorfali longitudine glumae; panitula er^cta glorneraca fcabra; culmu rarnofe; foliis lineatibus. *Schmchz. Agroftogra,h. p, istsi. Tab. 5.*

In locis arenofis 8C maritimis; *Galfiov;* inter *Paphrs''Nolle 8C Eenu,m. Flor. Jul. & Aug.*

130. v4r. *Epigeios*, calycibus unifloris; flnribijs ariftatis; valviila exteriorre lanceolafa bi tiikla ariita dorlali biexiTtna; panicula erecta fubdiffufd fcabra; culmo erecto; foliis lanceolatis fubtus fcabiis.

la locis alevatis aridis nudis. Flor. Jul. SC Aug.

34. *L O I i u m.*

Calyx_vun!valvig, linearis fixus rachi oppofitus, muUiflorus. Corolla inaequalis.

<il. *L. peferlne*, fpica mutica; fpiculis compreffif niuticis, glumis longioribus. Flor. IJan. Tab. 747.

Ac) vias, in pratis, pafcuis |aflim. Ffor. JUQ, & Jul.

u. fpicata, fl iculis arlflaHs.

p. iamo^ra. fpiiaramoia; fpiculis fere ovatis IDlltICIS.

131. *L. temulantum*, fpica arifta^a; fpiculis coin*
~~fl~~ fl^r mutiris. Flor. Dan. Tab. 169.

In agris. ilor. Jul.

35, *Roßbollia**

Calyx dni'lex vel bipartibitis, ovato-lanreolatus plauus uniflorus. Flosculi altei'ni in rathidi flexuufa.

113. JR. *incurvata*, (pica tereti fubulata; gluma calycina fubulata adpreffa bipartita* Flor, Dan. *Td}*>. 938.

In pratis de-p.eITis *Infula Amagria* annis 1779.8C
1780 Jegi; circa *Lim - Fabriquen*.

36. *Ely m u s.*

Calyx bivalvis aggregatus, multiflofus. Spiculae gemius^.

111. 2£. *artnarius*, fpica erecta'', arcta; calycibus tomentofis ilosculo lougioribus. *Viborg om Sandvcfxt. T<*ib. 2.

In arenofis inaritimis. *Vebeck. Flor. Jun. 8C Juh*
125. *E.^K caninue*, fpica fubnutante; fpiculi*, cylindncis vei cylindrico - compreffis , villofis, recris aiiilatis; racbi glabro. *Leers Tab. ig#*
ilg. 1. II.

Rarius in littore maris; inter *Vebeck 8C LeSerm fabnOe. b\ur. Jul. 8C Atig.*

Spiculas unquain g^fib^as nee q»nidrifloras fed ornni tempore folitaviaa &Z multifloras obfer-yaru

37. . *T r i t i c u m.*

Calyx biv.ilvis ovatus fubtiiflorus, (*in no- Jlrif quadri-quinque vd midttjlorus*) feflilis. Corolla bivalvis valvulis fubaequalibus. Re-
•eptaculi bafo caltofa.

1a6» *T. junceum*, calycibus truncatis quinquefloris; Folhs involu is. Flor. Dan. Tab, gi6. Ad littorem inari^; Amagria; inter *Papiers-MolU* 8C *Vebeck*. Rachis glaber.

127* *T. repens*, calycibus fubulatis fubcompreflis, mucronatu>; foiiis planis; radice repeats; rachi villofo. Schrcb. Giaes. Tab, 26,

Iu agribj hoitis 8C alibi, Flor. Jul. 8C Aug.

a. ariflatuni) ariftis (nbulatis fi'icnia haud brevioribus rachi villoio, Flor, Dan. Tab. 748.

Habitat Sc floret cum praecedent«\

12g. *T. fiv/oreum*, «fpica bi velfubtiidigitali erecta; fpiciilis lanreolatis compieflis tñucronatis multifloris; ioliis fubinvolutis acutis.

In littore maris; inter *Torbek* 8C *Vebek* < *Amagtr*, Flor. Jul. Sc Aug.

«,' ar\jlatum» fpirulU ariftatis ariftis fpicula brevioribus.

Strictitate culmi, folioium, Sc fpicae nee non col^re glanco cum *T. juuceo*; forma fpiciilavum, vill iftate rachidis vc^o 8C reliquis c, *T. repente** conveiiU An hybrid^ eft?

38* *HOT d cum.*

Calyx hexaphyllus triflorus. FloscuH latera* les Jfaepe mafculi,

129. *H* tiurinum*, flosculis lateralibus mafculis ariftatis 1 doifo glabris; involnciis intermedia cilutis« Flor, Dan* Tab, 629.

Inter frequentiflornas plantas pertinet. Flor. Jun. & Jul.

130. *if. fecalinum*, [^]tectfts lateralibus fterilibus filiformibus ariftatis, dorfo glabris; involucris fefaceis fcabris. Flor. Dan. Tab. 630.

In maritimis *Apiagria* rarius; etiam inter *Hafniam* & *Vtbek* legi. Flor. Jul.

TRIGYNIA.

39. *Montia*.

Calyx di-triphy 11 usque; foliola ovata obtufa. Corolla monopctala. irregularis. Capfula unilocularis, trivalois.

131. *M. fontami*, foliis oblongo-ovatis, fubcarnosis; pedunculis unifloris, fructifeiis deflexis, interdum iterum afcendentibus. Flor. Dan. Tab. 131.

Ad rivulos, in pratis humidis; *Bagfvard* og *Fridenichsdal*; *Öflerfelled*. Flor. æflate.

40. *Hoi ojl t u m*.

Calyx pentaphyllus. Fetala quinque. Capfula unilocularis, fubcylindracea; apice dehifcens.

^T33. *if. umbellatum*, floribus uxbellatis. - Flor. Dan. Tab. 1304.

In locis ficcis *Dronninggaard* paa *Najfet* ligefor ~~Pala~~ *Ut*, og *Frydenlund*, ubi Dn. Holböll invenit.

CLAS s f s IV,
T E T R A, N D R I A,

M O N O G Y N I A ,

* FI ores mo nope tali, monofperni, fuperi,
aggcegati-

jpipfacus. Calyx communifc polyph; *illus.* Re*
ceptaciikun cotncum paleaceum. Semina co*
lunmaria.

Scabiofa. Calyx CQinmunis poiyplyillus] pro*
prius duplex, fuperus. Semiqa cwronata.

•* Flo res monopetali, monocarpi, in ted,

Ctntun culufi) Calyx quadrifutus. Corolla qua-
driflda pateas, Capfula unilocularis circum-
fcifTa.

plant ago. Calvx qnadrifidus, Corolla quadri*
fida, limbft reflexo. Stamina longifiima, Cap^
fula hilocularis tirciimfcifTa.

*** Flores monopetali, dicocci, fuperlt

JRubfn. fCoroll^ camuanulata. Fructus baccati
nu)nn9)ermi.

Galium. * Corolla moiiioptjfcala, plana. Semina.
duo, subrotunda,

Afp erula. Corolla monopetala,* infundibuliformis. Sernioa duo globofa,

\$h era rdi a, Coi ol^ttibulofa, infundibuliorrais, Semina duo tiidctitata.

» * * * jtHores teVrapetali, fuperi»

Cornus, Involucrum tetraphyllum. Calyx quadridentatus. Drupa nxicleo biloculari.

***** Flores inCoinpleti, inferi.

Alcliemilla. Ca'yx quadri- pctoiidus. Corolla nulia. Semen unicum*

D I G Y N I A ,

Cufcuyi. Calyx quadrifjdus. Corolla qaadrifida, ovata. Cap'lula carnoia, bilocularife cittumifcifa.

TETRAGYNIA,

Paiamogtto n, Calyx nullus-. Corolla tetra^pet^la. Stylus hull us. St-mina qaatuor.

Rap pi a. Calyx 1 nil us. Corolla null a, Semin* **quatuor** pediceljata,

Sagin a. Calyx tetraphyllum. Corolla t-etrapetala v'fcl jiuila, Capfula uailocuiaris, **quadri-valvis,** polyi'uerma.

4* *Tetrandria Monogynia.*

MONOGYNIA.

41. *Dipjacus**

Calyx communis poly¹¹ us. Receptaculum conicurn qaleaceum. Semina columnaria.

133- -D- *fylyjlris*, foliis lanceolatis, feffilibus, apice fenulatis; paleis rectis. Flor. Danic. Tab. 965.

Ad viay_# faepes haud frequens inter *Kibge* 8C *Walltk.* FKir. Jul. ft Aug.

412. *Scaiofa.*

Calyx communis polyphyllus, prop|ius duplex, iupfriuus, Semina coronata.

* Corullulis quadrifidis.

J34, *S. fuccifa*, corotlulis quadrifldis aequalibus, caule fim¹lici; .rainis aproximatis; foliis lanceoUtQ-ovatis. Flor, Dan. Tab, 279.

In pia is, paicuis humidis ac (ylvaticis. Flor. Aug. Stpt. 8cOctobr. Folia caulina interdum repando-dentaca vel ferrulata.

135. *S* arvmfiSy* corollulis quadrifldis radiantibus; foliis pinnatifidis incilis; caule hifpido. Flor. Dan, Tab. 447,

Advias, in pratis, arvis, aggerihus frequens. Flor. aestate.

** Corollulis quinquefidis,

136. 3* *columbaria*, corolluhs quinquefidis radiantibus; foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis fetaceis. Flor. Dan. Tab. 314,

In locis aëdis rarius; collmis herbidis *Chariot**
tenluad, llrtde-Bakktr, Lyngbye, Flor. Jul,
Aug 8C Sept,

43. *S h e r a r d* £-a.

Corolli tubulofu* infundibulformis. Semina
duo tridentata.

137. *Sh. arvensis*, foliis omnibus verticillatis; flo-[^]
ribus tenninalibus. Flor., Dart. Tab, 439.

Intei fegetes, Flor. Jul 8C Aug.

44. *AJperula**

Corolla infundibuliformis« Semina duo, §lo->
bofa%

138* *A. odorata*, foliis octonis lanceolatis; florum
fasciulis pedunculatis. Flor. Dan. Tab, 569,

In fyJvis ubique. Flor, Maj, 8C Jun,

45. *Gal i u m.*

Corolla monopetala, rotata. Semina duo sub*
globosa.

* Fructu glabro,

139* *G- palustris*, foliis quaterais* obovatis, inae-
qualibus; caulibus diffusis. Flor, Dan. Tab%

423.

In palludofia Frequens[^] Flor. Jun, 8c Jul%

cc. foliis quaternis, oblongis, aequalibus,
obtusis caule erecto* Siccatum nigrie-
ficat,

140% *G» uliginosum*, foliis fenis retrorsum ferrato*
aculeatis, mucronatis rigidis corollis fructu
majoribus.

In uliginofis. Hirjchholm-Skov 5 Birkerod. Floi
Jun. Jul. & Aug.

141. *G. verum*, foliis caujkis octonis, linearibus,
futcatis; raznis flotiieris' brevibus. Flur. Dan.
».,. Tab. IT46.

Vulgatiflimum ad vias, aggexes. Flor. Jul. fC
Auguft,

142, *G. Mollugo*, foliis octomis ovato-Iineari!)iis,
fubferratis, patt^iuiin.nis mnci\>i)ati>; caule
flaccido; rainis piteuiibus. Fl. Dan. Tab.455,
Ad fepes Si in fruti'zetis e, g. irittf &tringforbU
SC Paphrs-MolUn. Flor. JLUK

Variat caule infcn:e pubefcente,

143 *G. fylvaticum*, fohis octotiis laevibufi, fubtu*
(margiaibusque) Icabri.H, flortlibus binis, pe-
dunculis capiUaribus; caule lsevi. Flor* JJun.
Tab. 609.

Infylvis. Flor. Jun. Jul. Sc Aug.

, #* FrucMi hifpido.

3C44, *G. boreale*, foliis -(Juaternis lanceolatis, tri-
neiviis, g!a' ris; caule eiecto; feminibus hi-
fpidis. Flor.-Dan. Tal^ IU24.

In pratis liumidis baud inlre^uens. Flor. Jun.
Jul. SC Aug.

• •

145. *G. JLparine*, foliis octonls lanceolatis, carinis
fcabris, retrorfum aculeatis; geniculis villofis,
fructibus globofis hifpidis. Flor. Dau. Ta

i Inniderati[^], cultis, ad ftpes ubique. Flor. Jun.
IC JuL

146. *'fc u b i a**

Corolla campanulata. Fructus baccati mono*
fperrni.

146. *Jl. tinchmwi*, foliis quaternis, quinis vel
fenis elipticis afptris, cnule aculeate
A.i ftpts 8c foflas* 6f. *Jiirgtns-6'de* ubi per vi-
ginti aanos obiervavi.

47. *P / a J l t a g o.*

Caly: quadrilniuS. Corolli quar!rjrida limbo
reiiexo. Stamina lon[^]ifiima. Capfula bilo-
cularis circunjfcifTa.

147. *P. major*, foliis ovatis gbbris; fcapo teretii
fpica ilosculis imbticatis. Flor. Dan. Tiib. 46r.
Ad vidS in piatis &C palcuis litquens. Flor. JuL
8C Aug.

148- *P- media*, foils ovato-lnnceoLtis, pitbefcen-
tibus, breve j. etiolatis; fpicacyiindrita; fcapo
tereri. Fbr. Dan. Tal). 581.

In pratis, aggeribus, ad vias. Flor. Jun. JuL SC
AugufK

149. *P. lanceolata*[^] foliis lanceolati[^]; fpica fub-
ovata nuda; fca[^])o aug Jjto.

Ad vias SC in pratis fubflerilibus. Flor. Jun. JuL
«CAug.

«. *altijfima*, follis quinquenerviis longis[^]
fime petiolatis; fcapo pedali bipedali-
que; fpica ovata. Flux. Dan. Tab. 437.

\$. *capitata* foliis tri vtl quinquenerviis angulioibus, bre^e petiolatis, pttiolisque magis p[^]befcentibus, fcapo pedali baud ul ra ;" fpica ovato globofa. *l/*
y. *proliftra* fpicis prollferis. *Rtifn* L c. *Anm&rkning* p. 642. In *Arnagria*.

150. *P. maritima*, Foliis femicylindraceutis, integerrimis bufl l.matis ; fcapo tercti. Flor. Danic. Tab. 243.

In markhnis fi'equens. Flor. Jun. Jnl. & Aug.

151. *P. Coronopus*, foliis hirtutis linearibus dentat ; fcjpo tereti. Flor. Dan. Tab. 273.

In maritimis locis pafim. Flor. Jul. 8t Aug.

a. foliis linearibus dentatis vet fubdentatis villofis; fpica ovata.

(J. foliis lanceolatis fubpinnatifidis, fcapoque hirtutis i fpica cyliiidrica elongata.

48. *Centunculus*.

Calyx qnadrifidus. Corolla qindrifida patens*
Capfula unilocularis, ciicumfciffa.

152. *C. minimus*, foliis fuperioribus altfrnis, ovatis inf* ru)ribn's oppofitis; caule fubunciali-
Flor. Dau. Tab. 177. •

In-arenefis fnblmmidis rarius i *Hirfchholtn-Skovi*
in rijiis pifcinum: *Bagfyard-Skov* 8(*Lhngedarn*
vulgo inter *Birktrød* &C *EJhtmojt* femel o>

fervavi.

49. *C o r n u s.*

Involucrum tetraphyllum. Calyx quadriden*
tatus. Drupa nujfteo biloculari.

1x53. *C. fanguinea*, ramis rectis; ioliis ovatis con*
coloribus; cymis depreffis aphyllis. Flor,
Dan. Tab. 481* >

Haud irequens inter frutices 8C fepes: *Lyngbye-
Soe; Btrnftorfs Fafan-Guard; inter Spring*
farbie 8c Pupttrs-Molle: in littore maris fiuti-
cofo. Flor. Jun. Sc Jul.*

¹54- *C. fvecica*, herbacea; ramis binis; foliis ova-
libus, obpofitis, feffilibus, neivofis, interior
ribus rotundioiibus. Flor. D?n. Tab. 5.

In fylvaticis tuifofis: inter *Fredensborg Sc Hd-
fmgoer Dn. Holten. 8C Martenlyjl ved Helfingoer
En HollbolL I lor. Jun.*

50. *A I c h e m i l l a.*

Caly* quadri-octofidas. Corolla nulla. Sls^
men unicuin.

¹55. *A. vulgaris*, foliis reniformibus, radicalibus
novemlobatisferrato-dentatis petiolatis villo-
fis; cymis cojymbofis terminalibus trifidis;
caule glabro. I lor. Dan. Tab. 693.

In pafcuis, pratis fylvaticis vulgaris. • Flor. Maj.
8c Jun.

u. hybrida foliis lobatis fericeis acute fer-
ratis caule petiolisque denfe pilofis.

Haud frequens: inter *Frederichsberg S6 Damhuft*
a ¹^n. *Schousboe* lecta. ~**

156. *A. Aphanes*, foliis tripariitis, hinc in
vel quadri proiunj[^] dentatis, pubescentibus
floribus axillaribus ⁴U i[^]eraxis ironandris; ca-
lycibus quadrifidis *Aphanes aivenfis* L. Flor.
Dan. Tab. 973.

Vulgaciflima in arvis Scagijs. Flor. seilate.

D I G Y N I A .

5r. *Cuscuta*.

Calyx quadrifidus. Corolla quadrifida ovata.
Capsula carnofa, bilocularis, circumscissa.

157. *C. europ[^]Bil*, floribus subsessilibus confertis;
corollis quadriindis, laciniis orbatis: caule
filiformi volubili aphylo paraficico. Flor.*
Dan. Tab. 199.

In fruticetis, ad fcpes rarius: *Papirs-MvLU*•
JSirkzrbd. Flor. Jun. Jul. 8c Aug.

T E T R A G Y N I A .

52. *Potamogeton*.

Calyx nullus. Corolla tetrapetala.- Stylus nul-
lus. Semina quatuor.

- 158- *P. nawn^s*, foliis ob'ongo-ovatis petiolatis
oatantibus. Flpr. Dan. Tau. 1025.

In ftagnis frequentiflirnum. FL>r. Jun. & Jul#

- 159- *P. Jluitans*, foliis inferioribus lanceolatis vel
ovato lanceolatis breviflime petiolatis (fiembra-
naceis, superioribus tribus quatuor, vel quin-
que ovalibus subsessilibus obtusis coxiaceis* .

In rivulo: *fom gaaer ved Falkoneer-Gaard.*; at*
que in lacu *ved Uferöe-Aiblle.* Flor. Jun. Jul*
& Aug.

160. *P. /erratum*, foliis infi rjoribus ovali-lanceo-
latis, fubpetiplatis, bbtufiufculis, membrana-
ceis, alternis; fuperioribtis oblongo-ovatis,
attenuate, longepctiolatis, fubcoiaceis, op-
p.) fitis.

In lacubus, pifcinis baud frfquens: *Bagfvard}*
Peblingefoe. Flor. J11L 8C Aug.

16r. *P. IUCLIS*, foliis oblongo-ovatis, ferrulatis,
fubmiicronatis, planis in petiolos defin^nti-
bus, fuperioribus oppofnis, omnibus mem-
branacei«⁴ Flor. Dan. Tab. 195.

Hand inliequeps in lacubus: *Peblinge-Söe,*
JLyngbye-Söe. Flor. Jun Jul. & Aug.

161. *P. acuminatum*, foliis ovato-lanceo^atis,
planis, in petiolos definentiLus, acuminibus
fubulatis rigidis, fere pungentibus, fuperiori,
bus oppofitis, omnibus membranaceis.

In lacubus: *Peblingt-Sdt) Farum-Söe.* Flor.
Jul 8C Aug. Per phires«annos plantam lianc in
locis fupradictis obfervavi, fed tantum bis flo-
rendi vidi.

163. *P. heterophyllum*^ foliis fubmerfis lineari-lan-
ceolatis feffiibus, na^antibus ovato lanceolatis
petiolatis. Flor. Dan. Tab. 222.

Rarius in pifcinis, Sc quidem in pifcino tertio
~~minore~~ *Bagfvard-Skov.* Flor. Jun. 8c Jul.

*64- *P. ?e,folia,urn, foliis ^ datis & ovah) • Mr •*
as am, !exica,, lil,,s alt<-n,i,s, superioribus
!il, mtev, l1, 1 | 1h *otomi* *am t j ep-*

P'fitifc *Mor. Da.i. T.i'l. ,9.,*
In l . . . us; Bagjeard, Lyngbye, & Peblinge-
haud in i , q,,w1s. F|or> Ju| gj A | ^

caule dichotoniD.

165. P. crispum, *foliis Ijnceo,af;s iimIiiI:]tis ob-*
tufis alte,nis **pppofitbve fciBlibu., F|O1, Dan**
Tab. 9^7,

In rivulis, pif,in:s> lacub,,s. ,Flor. Jun. & J,,,

166. P. gMffMHtm, *foliis Uuceolatis, ao,tis fub-*
mucronatis, oppo fHK & 1 ternis *v illinium.*

Iapifdm, *ram,, 0(furiir; BirfcMolm-Si_u,*

Tarn a luurophyllh qtiamaXj«e arf</b <|;

lum aurhot inonfirac

167. P. tomprfum, *folfa BDea,ib_w oI)tl•fls mu-*
» one bevi, fcffis ,aI•ruis; caule com-
presso; spicis b evib us quatuor ad fexfWis.
Flor • Dan. T. ab. 203.

In ,ivulo red * eblingef, sir> Flor. J,,1. & Aug.

168. P. zosteraj. *« « ,, , 1, is I:11,jri)) us quatuor ad*
fexpollicaribus. obrufis, ,,,ve ,m(cr())nati,
alternis *ue sessilibus, caule com-*

In rivulo, piscinis
by_ . if Papier*//*<||<. *Flor. Juii. iic Ju*

169. P. *Puffillum*, foliis linearibus angustissimis
 pUnis, collis elevatis, oppositis alternisque,
 basi **patentibus**; caule tereti, spicis paucilo-
 ris **brevibus** **Vaill.** Tab: 32. f. 4.

Haud frequens in rivulis SC spicis -in is* *Ermdund*
8c Pridtrichtdais-MblU. Pier. Jun.

Folia l^{re} bipollicuria gvret.

170. P. *jtactum* foliis **linearibus**, marginibus
 involutis, ffaceis; caule filiforme tereti;
ptdunculif filiformibus tlongatis; spicis fere
tri^lomerads, **gtomerulis** r motis bi vel tri-
 fieri-. A ?. **fetaceo 1*. Uiverfa.**

Frequens in lacubus vul^o *Lyngbye* 8C *Fuurfoe**
 FI01. Jim. Folia **ufirha** 8c oppofra.

171. P. *ptchnaium*, foliis fetaceis parallelis, ap-
 proximatis, distichis, spicis glomeratis; **o-**
xneruli^ quinque vel ultra approximarum.

In fossis piscinis SC **lacubus**: / *Miile-Rtudn i*
llyngbyt'SCc *Ylox. Jun 8C.Jut*

172. P. *marinurti*, foliis **linear-fetaceis**, alternis,
 distinctis, infra **vagina**; caule sub-
 fl^{uoi} Flur. Dan Tub. **istr.**

In fossis SC aquis fl^{nantibus}: *ChriJliaqshavns-*
*Graven**; *Atnager* Sec. **F1** >r. Jul. &> Aug.

53. *Ruppia.*

Calyx minus. Corolla nulla. Semina quatuor
 pedicellata.

- l³« *ML murium*, pedunculis cnpillaribus vel
 trectis subspiralibus longiflans, vel brevifli

mis subcernuis; pediculis umbellatis. Foliis
 fetaceis; caule filiformi tereti. Hoi. Dan.
 Tab. 384-

In aquis stagnantibus ac fossis in littore mans:
Amageri Tomstrupfadfen; Charlottinlund etc
 alibi. Flor. Jun. 8C Jul.

54. *S a g i n a.*

Calyx tetraphyllus. Corolla tetrapetala vel
 mVda. Capsula unilocularis, quadri-valvis, poly-
 sperma.

147. *S. procumbensi* ramis procumbentibus; fo-
 liis linearibus*, conpatis-folibus glabris; pe-
 dunculis foliariis. Flor. Dan. Tab. 815-
 In paucis 8C locis fœcibus* frequens.
 flor. Jun. tt. Jul.
-

CL - A S S I S V .
P E N T A N D - R I A .

M O N O G Y N I A .

* Fores monopetali inferi tetragymno fpermL
Afpeiifoliae.

Echium. Corollii campanulata, limbo irregulari
fauce uuda.

Pulmonaria. Corolla infundibuliformis, fauce
nuda. Calyx prismaticus,

Lithofpermum. Corolla' infundibnliformis,
fauce nuda. Calyx quinqqepartibus, Senxiaa
quatuor, dura.

Symphytum. Corolla tubulofu-ventricofa, fauce
radiis laoceolatis claufa.

Lycopfis, Corolla infundibul^uformis« .fauoe
fquamis con vex is claufa, tubo incurvq.

Afp&rugo. Corolla infundibuliformis, fauce
fquamis claufa, tubo brevi. Calyx frite
tus comprefTus : lamellis piano - paxalleis
ftuatis.

Gynogloffum. Corolla infundibnliformis, fauce
iornicibus claufa, Semina (*arillataj* de ~~preffa,~~
interiore tantum latere ft) lo affixa,

Viola. Corolla pentapetala, irregularis, postice cornuta. Antheras coalitas vel connatae. Capsula unilocularis, trivalvis.

Impatiens. Corolla pentapetala irregularis; nectario cucullato. Antherae bifidae junctae. Capsula unilocularis, quinquevalvis, matura elastice a latere defiliens.

Rhamnus. Calyx tubulosus quadri- f. quinquefidus. Corolla: squamae filamenta munientes calyci inferae. Bacca bi-quadrilocularis,

Evonymus. Calyx quadri- f. quinquefidus. Corolla tetra v. pentapetala. Antherae fasciatae quatuor. Capsula tetra f. pentagona, quadrilocularis. Semina alba*

*** Flores pentapetali superi.

Ribes, Petala quinque filamentaque calyci quinquefidi cavo infera. Stylus bifidus. Bacca unilocularis polyperma.

Hedera. Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala, decidua. Bacca quinquelocularis polyperma calyce cincta.

***** Flores incomplete

Glauca. Calyx monophyllus quinquepartitus. Corolla nulla. Capsula unilocularis, quinquevalvis, pentapenna, superi.

Thegium. Calyx monophyllus, quadri-quinquefidus, filamentiferus. Corolla nulla. Nectaria filiformia calyci infera. Semen unicum*¹ intra calycem subtendens coronatum.

D I G Y N I A.

* Fiores monopetali, infer!.

Afclepias. Corolla contorta, quinquepartita. Nectaria quinque corniculurn exferent'd. Fil^l^menta breviflima corpufculo conico obtufo coalefcentia. Folliculi duo, oblongi, Sernina pappo coronata.j

Gentiana. Corolla campanulata plicata vel hypocrateriformis quadri-quinqirfida. Stylug niillns. Stigmata ovata. Capfula unilocularis, bivalvis longitudinaliter dehifcens-

** Floies incomplete

Hirniaria. Calyx, quinquepartitus. Stamina decem, quinque Her ilia 8C quinque fertilia alternantia. Capfulacalycccincta rnonofperma,

Chenopodium. Calyx pentaphyllus, foliclit coucavis. Corolla nulla. Semen unicum lenticulare intra calycem penfagonum,

Salfola. Calyx pentaphyllus perfistens. Corolla nulla. Capfula monofpemia. Semen cochleatum.

Vlm u s. Calyx quadri vel quinquefidus. Samara coinpreHb • membranacea.

*** Floies urnbelliferi, pen tape tali, fupeti difpermi. *Umbellata.*

*. Umbellis fimplicibus.

[^] *r y n g n* . Floies capitati. Involucrum univalfale polyphyllum. Semina duo, periantheo coronata. Receptaculum commune co« nicurn paleaceum.

Hydrocotyl. Umbellifera parva, p^vplifera. In-
V^o liurum <ii tetraphyllum K Pctali integra,
ovat³, acuminata. Fructus orbiculato-couⁱ*
piifius glaber,

β. Umbelliferae compofuis.

a. Fructu tt-cto acuk-is, It-iis ant 1 :n>ig:ne.

Sanicula [. Umbelliferae conlertae, fubcapkatae,

Flores > diici obortiente«, Fructus a^ule^z sus.

Cauc a I is. Corolla ratiatae vei fubiadiatiE*

Fiu till fti*- ant acirleis obf< Has.

JLthamanta. Corollae regulares. Fructus ovato-
oblongus, firiiitus, UtiuginofiM.

b. Fructunudo, fujcifo, ooflato ant flriato.

Scandi sc CoioHse rauwtae, Fructus elongatii»

Ivlhatus Oriatus.

Ch atrophy Hum. Cor<>lla³ fubaeqnales. Fructus
longuSj Ijevi*;, nitens.

Oenatht.* Corolla? radiatap, difci ft<^jriles. Ftuc*
tusoblongus, decemfiriatus fl calyce, Rylisqu#
perftRentilxis rertis cororiatus,

Phet la ndriuni. Corolke fuhxau[^]let, fertilesi
Fnichis oblongus, fubdeceinQriatus, calycc
coronatus,

Carum. Corolla fu->ipquales Tertiles. FvuctuS
ovalis fubgilibofus fubco.jtj lanatus» octoltria*
tus, Oylis deflexis.

JEGopodium. Corolla fuba[^]quales fubfertile**.
Fructus ovali oblongus; fUiis elevatis, p[^]
lidis. Iuvolucra uulla.

Pimpinella. Corollas aequales, fertiles, Fructus* ovato-oblongus; ftriis elevatis. Styli erecti. Involucra nullj.

Sium. Corollae aequales, fertiles. Fructus ovatus (hiatus vel fulcatus, absque colis.

Bupleurum. Corollas aequales. Fructus subrotundus, subcuneatus, (tus, ftriatus, haud rugosus.

Apium. Corollas aequales, fertiles, Fructus* minutus, gibbus striatus.

Aethusa. Corollae radiatae, fertiles. Fructus ovato-globosus, costato-fulcatus. Involucrum universale nullum; parziale diandrum, triphyllum longum pendulum.

Conium. Corollas aequales, fertiles. Fructus* ¹ 'subglobosus, ftriatus; ftriis crenatis'. Involucrum universale penta^-heptaphyllum; parziale tri-tetraphyllum dimidium breve*

Cicutaria. Corollas aequales, fertiles. Fructus cordato-globosus, compressus, costatus, costis subcrenatis. Involucrum universale nullum; parziale fetiphyllum.

c, Fructu alato.

i. Ala marginalis.

Anethum. Corollae aequales, fertiles. Fructus lenticulari-compressus, ftriatus; ftriis elevatis; ala membranacea cinctus. Involucrum nulla.

Artichocca. Corollas aequales, diffe fertiles. Fructus ovalis, piano compressus, ftriatus; ftriis elevatis; ala membranacea cinctus» In-

voicrum univerfale fubmonophylluni; par-
tiale nullum.

Selinum. Corollas aequales, fertiles. Fructus
ovato-oblong[^], compreffus, ftriatus-, ilriis
elevatis fubmembrauacus5 ala mtmbranacea
cinctus. Itivolucrum Cam partiale quam uni-
vetfale.

Heracleum. Corollae JraJiatas, fertiles. Fruc-
tus conlifonnis planus, (Iriatus; ^riis elevatis;
ala membranacea cinctus. Involucrum uni-
verfale plerumque nullum; partiale poly-
pbylium.

3. Ala maviginali ac doiTa.lt.

Angelica. Corolla ae(jiiales, fertiles. Fructus
-alis margiuiilibus duns,- dorfalibus quafi ab-
fcifliS. Involucfa partialia polyphytta.

Laserpitium. Corollas fubapquales fertiles.
Froctiis oblongus cofliameinbrarjacea-alatig.
luvolucra polyphyila.

TRIGYNIA.

•. Flores fuperi.

Vilurnum. Calyx quinquepartitus. Corolla
quinquefida. I^acca manofperma.

Sam hue us. Calyx qjjinquepartitus. Corolla
ijuinquefida. Uacca trifperma,

** Flores inieri.

Alfina. Calyx perrtaphyllus. Corolla pentape-
tala. Stamina tres- decem, Capfula unilocu-
laris trivalvis.

TETRAGYNIA.

*Parriaffifl** Cttlyx quinquepaititus. Corolla
pei tapetala. Nectana quinque cordata, ciliata*
ciliis^ capitatis. ' Stylus nullus. Capfula uni-
loculaiis, quadnvjlvls.

P E N T A G Y N I A .

S tat ice. Çalyx monopliyillus, plicatus, fcario-
fus. Coiolla pentapetala*

Linu'm. Calyx pentaphyllus. Corolla pentape*
tahi. Capful a quinquival vis, decernloculaiis;
loculamentis monofpermis.

Drofera. Cahx qiiinquetidus. Corolla penta-
petala. Cap Tula unilocularis, tri - quinque val»
vis apice dthifcens, polyfperma.

P O L Y G Y N I A .

Myo fur us. Calyx pentaphyllus, fupra bafin ad-
natus. Nectaria quinque ligulata, petalifor-
rnla. Rceptaculurtf elongatum, fcmioibus
tectum.



MONOGYNIA.

55. *My 0/0 t is.*

Calyx quirept' fulus, peififlens. Corora **by-**
pocrateriforinis, quinqu iida , lobis emargiia-
tis, **fauce** inrnicibus claufa.

175. *AT. palujlris*, **perennls**, laciniis calycinis **ova***
lib us, obtufis, **gtabris**, **tubo corollse ae^'ian***
ti!>us; **foliis** Luiceolatis obtulis; *caule fubium*
plici

In pratis liumidi^c. I lor. splafce.

176. *M. jylvat'tca_x* perennis; laciniis calycinis arn-
trs, piltjfis, tubo **coroHse** secfuantibus; foliis
lanceolatis hirtutis; caule **ramofo**. Hath I. c.
Flor. Dan. Tab. 583. fig. major?

In umbrofis. Hoi, dilate.

177. *M arvenfis*, airnua, laciniis calycinis ovali-
bus, acumimtis, hirtis, tubae corollae longlo-
ribus; **feminibua** rnaturis **calyce** inclufis; to-
liis ovato-larxt olatis **eauJaefjue ratnofo** hirtis.
Flor. Dan. T<;!). **533. fig.*minor.**

In agris, arvW \$C alibi. Flor. aftate,

178. *M* Lappuia* fe minibus **aclileis** glochidibus;
foliis lincolatis **pilofis**. **Flor. Dan. Tab.692.**

In ruderatis rariffime invent; *udtn for Amazt*
Port.

56* *Llthofpe /mum.*

i Cal)Ot <piinquepartitu^ . Cotolla infundibu'
formib, fauce nuda.

179. *L. Qfft<hiule, ft minibus lge vital* ^ co-ollis vix calyctin hipi rantibu**; i» his lai 1eolatis, acu* minatis, uezvofis, fcubri*. J/L>r. Dan. Tab. IOH4.

Ruins in ruderntis; *pdt n for Kiobeni'avns ujltr* port; 1> agfvtrd \$t aliis locis.* Flor. Maj. Si Ju:i.

180. *L. arvenfe. feinitiibui rucoils; co ollis vix calycein fupem atibus; Taliis Utureaiatifi sub-'acuti, ftv.b-is.* flor. Dan. T.ib. 455.

Inter ftgites Irequens- FJor. Jun«

57. *A n c h a f a.*

CalyK qxiincyie] artitus. Corolla *Infundibuli-* f rniis, iauce cUuia ioiuicibus. Snniu gibba, biifi tnfc II] ta.

IS 1. *A* qfficinaUs, foliis lancc-olatis, fffigofisj fpicis inibricacis fteuuuL.* iior. Dau. lab. 572.

Ad vias, foff.iS, in agris. Flor. Jun. 8C Jul.

58. *Cy n ogloffu m.*

Calyx cjinincjui G 1 is. C'o ollj iiiftindhulifot* .mis, *i'iuvc [dvnjcibus c'anfa , S-mi'ta -jr 11 ta (Nuets G&rtn. lip reffa, incetiore tantum la* tere ft>b» amoc 1.*

182. *C officinal , ftaminibu^c co-olli Hrpvloribn» foliis radicalibos lato-Unceolatis petio^atis, c u inisqne lauceoliris fffll libus totnentofe vil* lofj , fui'icinU Iujicabiidi». .blur. Danie. Tab. 1047.*

Ad vias, fepes SC aliis locis ruderatis. Flor,
Jua. — Sept.

59. *Pulmonaria**

Galyxjquinquedeptatus, pdsrnaticus pentago-
nus. CoiTolU inf'.indihuliiurnis, fauce nuda.

183. *P. angiiifolia*, fo'tis cauliais oljlongo-laa-
ceolatis **Eemianoplextcaulibus**, radicalibus elUp-
ticis petioLris. LI or. Dan. Tab. 483.

Haud I'req^tns in nemore; *Chariotunlund n&rK*
ved Grunfkovcn. Flor. Maj. 3C Inn.

184. *P. offlcinalus*, foliis caulinis ovato-oblongij
feffilibus, radicalibus cordads petiolatis. Flor.
Dan. Tab. 432.

Frequens in fylvis; Chatlottenlund, Ordrup
Dynhave SCc. Flor. Maj. Sc Jan.

60. *S y m p h y t i t m.*

Calyx qninquopaititus. Corolla tubulofo-
ventricofa, quinquedentata, iauce radiis Ian-
ceolatis claufa.

185- *S- officuialt,* foliis ovato-lanceolatis decui-
rentibus. Flor. Dap. Tab. 664.

• Haud frequens in locis humidis; *ved forte Soi*
Kafiels-Gravene, Friderichsdal, Hirfchholnul
Flor, Jun. Jul. 8C Aug.

6r. *Afferugo.*

Calyx fruatus, com|*ren\is: lamcllis plan*
paialtelis finuatis. Corolla infundibuliforru
Uuce fqamis claufa, tubo brevi.

ig6. *A. procumbent*, caly&bus florefcentibus erectis, poll iiorefcentiaui recur vis; caule dichotorno dc-i>ili, profirato.* Flor. Dap. Tab. 553. In rudeiatis, ad i'epes, vias. Flor. Alaj. &C Jun.

63. *Lye o pfi s.*

Calyx quinquefidiiis; 'Cořolla infuaclibuliforr mis, i'auè'e fquamis convexis claufa, tubo incurvo.

187. ^- *arvtnfis*, calycibus florefcentibus ercctis. Foliis lanceoiatis hifpidis; caule erecto. Flor. Dan. Tab. 475.

In arvis agris inter fegetes. Flor. ~~æftate~~.

63. *E c h i u m.*

Calyx quinquepartitus. Corolla campanulata-tubulofa, limbo Inegulari, fauce nuda.

188- -£• *vulgar**, caule tubeiculato, hifpido; fo-
• liis hifpidis, cauliis Janceol^is fedilibus, ra-
dical ibjs elHpticis petiolatis. Flor. Dan. 445.
In aggeribus 8c pratis arenofis, ad viaa, .Flor.
Jun. Jul. in Aug.

*Primula**

Calyx tubuiofus, (uiiiquedentatus, perfiflens. Corolla tubulofa, limbo piano vel cavo, fauce per via. Stigma globofiim. Capfula oblonga, unilocularis, apice decemdentata dehilcens.

189. *P. officinalis*, foliis rugofis dentatis; limbo corollarum concavo, tubi collo oblongo. Flor. Dan. Tab. 433.

In pratis SC nemoribus. Flor. Maj. & initio Jun 190.. *P. elatior*, loliis rugous dentatis, limbo cq rollarui piano; tubi jcollo ventricofu. Floi Dan. 431.

Habitat & C floret cum praecedente.

191, *P. farinofa*, loliis crenatis glabiis, fubtus farinofis; limbo coroliarum piano. Flor. Dan Tab. 125.

In pratis uumid:s..tqrfofis frequens. Flor. Maj SC Jua.

65. *Menyanthes*,

Calyx quinquefidus. Corolla infundibulifof mrs* fubcampanulata; laciniis interne nirfutii Stigma bifulum. Capfula unilocularis bivalvh

192. *AT. tnjofiatu* foliis ternatis. Flor. DanU Tab. 541.

In aquis flagnantibus praeprimis turfofis, paludibus. Flor. Maj. 8c Jun.

66. *Hottania.*

Calyx quinquepartitus, perfiflens, Coroll hypocrateriformis. Filamenta tubo corollae imposita. Stigma globosum. Capfula globosa unilocularis.

193, *H. paludifera* -pedunculis verticillato-multifloris. Flor. Dan. Tab. 487.

In aquis flagrantibus baud infrequens, Flor. Ji

67. *Samolus*,

Calyx quinquefidus, perfiflens. Corolla hypocrateriformis. Stamina munita squamulis

corolla?. Capfula globofa unilocularis, apice quinquevalvis dehifcens

194* *S. Valeiandi*, floribus corymbofo - racemofis*; foliis₄ obovatis, obtufis, cauHnis alternis fubpetiolatis, rpdicalibus in cefpitem' congeftis longe petiolatis. Flor. Dan. Tab. 193.

In pratis humiriis rarius; *red nyt Kvgevejen otn** trtnt vid *Corporal^Krotn*. Flor. Jul.

C3. *Lyfimachia*.

Calyx quinquefidus* Corolla rotata, Fila* menta bafi connata. Stigma obtufum. Capfula globofa unilocularis quinquead d^ceinvalvis.

^95. *L. vulgaris*, "papiculata, racernis terminalibus» foliis ovato-lanceolatis oppofti^, ternis^ rarius quaternis. Flor. Dan. Tab. C^g.

: Ad fepes humidas, foiTas; in pratis udis. Flor* aestate.

196. i. *thyriflora*, racemis lateralibus pcduhcula* latis; foliis lanceolatis aCuminatis oppofitis feirilibus; caule fimpliciffimo* Flor. Danic Tab. 517.

In paludofis, folTis turfofis. *Ofdrup, Lyngbyeföe Birkeröd* 8C alibi. Flor. Jun. 8C Jul.

' 197; *Li nemorum*, foliis bvatis acutijS^ floribus folitariis axillaribus; caule procumbente* Flor. Dan. Tab. 174.

In umbrofis rariffima. *Frederiksborg*. Flor. Jun* & Jul.

198. -L. *Nummularia*, foliis orbiculato - cordati[^]
 floribus foliatis axillaribus, caule repent*,
 Flor. Dan. Tab. 493,

In humidis, nemorosis; i *Fredricksberg-Have*
t en Graft ved Flafkkrot, 11 >r. Juii. Jul. SC Aug
 69. *Anagallis.*

Calyx subquinquepartitus. Corolla rotata
 Stigma capitatum. Capsula gibbosa, unilocu-
 laris monosperma circumscissa.

199. *A. arvensis*, foliis ovato-lanceolatis; caulibus
 procumbente; calycis segmentis lanceolatis
 Flor. Dan. Tab* 88-

In aëvis, agris, cultis SC alibi frequens. Flor
 sestate.

70. *Centaureum.* *Rafn**

Calyx pentagonus quinque-dentatus. Corolla
 infundibuliformis, plicata. Stamina tubo corollae
 inserta; antheris post pollinis dimissionem
 spiritaliter tortis. Stigma bifidum. Capsula
 linearis oblonga, biloculari, bivalvi
 longitudinaliter dehiscens.

200. *C* vulgare* (*Rafn*), caule firmi, floribus
 corymbose - fasciculatis terminante; foliis
 ovato lanceolatis, trinerviis, obtusiusculis; corollae
 limbo aperto. Flor. Dan. Tab. 61

Gentiana Centaureum L.

Haud frequens in locis ac pratis humidis, in
Torshavn SC *Springforbie* marem versus inter *Kiø*
fanhavn SC *Lonjantia*, & mager. Flor. Jui. A^u
 & Sept.

sax. *C. inapertum* (R*), caule ramofifTimo, dichotomo, foliis oblongis; corollarum limbo claufo. In pratis ac locis elevatis, circa *Kioge* > *Dn**
e *Scfwusboe*. Flor. Aug. 8c Sept.

S 70. *Convulvulus.*

a Calyx quinquepartitus. Corolla campanulata
u quinqueplicata. Stigma bifidum. Capfula bilocularis, locularum dispermis-

02. *C. artensis*, foliis sagittatis, utrinque acutis; pediculis unifloris; bracteis subulato-lanceolatis oppositis, remotis. Fior." Danic. Tab. 459.

Ad vias, in arvis, agris frequens. Flor. aestate.

03. *C. fepium*, foliis sagittatis, postice truncatis; pedunculis unifloris, bracteis oblongo-cordatis, calyce longioribus, approximatis. Flor. Dan. Tab. 458.

Ad fepes humidus; tat uden for Kastellet, & Jlerport; ved Valbye. Flor. Jul. Aug. Sept. Oct,

72. *Campanula.*

Calyx quinquefidius. Corolla campanulata fundo claufo valvis framiniferis. Stigma trifidum, Capfula tri.-quinquelocularis, poris lateralibus*; dehiscens.

* Foliis inferioribus.

104. *C. rotundifolia*, foliis radicalibus oblongo cordatis vel reniformibus, crenulato-dentatis, petiolatis; caulinis linearibus. Flor. Danic. Tab. 1086.

*Ventandna Monogynia**

In aggeribus SC loci? ficcis ac elevatis,

Jul Aug. 8C Sept.

a jlricta*, caule erecto flricto, fubratnofo,
ramis foliofis; foliis linoari fetaceis.

Folia radicalia non vidi. Icon autem Flora? Dan,
§55* hue maxime fpec"at,

to5. *C. jprficifolia*, ffoliis radicalibus ol>ovato-lan<
ceolatis, caulinis **lanceolate liqearibus fe-lull**
bus fubdecurrentibus remotis, omnibus fciro
latis gfabris; pedunculis elbngatis uniflorisv
Flor. Dan. Tab. **16S7.**

In fruticofis \$£ **fubhumldis** locis; ved Lyngbye,
5oe, *itndbm* Torbek og •Springforbie. Flui. Jun
Jul. SC Aug.

-a. *acuiangula*, caule angulato'; angulis
acutiufculU; foliis caulinis lanceolato.
lineaiibus, **marginibns** revolutis *femi*
amplexicaulibus , fubdecurreutibu;
fpaifis; pedunculis breyioribus, gel
minibus angulatis.

Habit fc floret rum pvaecedenti,

** Fuliis fcabris.

?o6. *C latifaliu*, foliis ovato lanceoUtis tluplicato
ferratis ; caule fimpltcifliino, tertti; floribus
axillaribus **inferioribua** fubgcuinia *superiori*
bus iolirariis; calycibus glabcis; fruxtibus *cer*
nuis, Flor. Dan, *j>z* x 83.

[n uinbrofis rarius; *vtdFupkrs-'Mblh*, Flor.J¹¹
C Aug.

907. *C. rapunculoides*, foliis cordato-lanceolatis, duplicate) ferratis; caule rarnofa; floribus fe» cundis, fpailis, calycibus fcabris, laciniis re* fl&xis.

1» In culdsoleraceis, ad vias, *iSteengierdetimellem porgeixfrit og Fuglehvad Molk Vej*, Flor. JuL 8: Aug.

108. *C. Tradium*, caule anguUto; foliis infe- rioiibus cordatis vel oblongo-cordatis fupe- rioribus lanceoiatis, omnibus dupHcato ferra* tis, peciolatis; pedunculis elongatis trifloro- racemoQs. inferioribus fubbifloris; calycibu* ciliatis. Flor. Dan. Tal>. 1026.

Ad fepes, vias, in fruticofis; *ved Lundehuftt** Flor. Ju!/Sc Aug.

it. *parviflora*, floribus multo minoribus; pedunculis breviflimis, inferioribus > uniftoris, fupe.rioribus geminis, fupre- mis fub glomeratis.

In pratis; *ved SpringforbU*. Flor. Jul.

β. *unlfioroy* pedunculis unifloris brevibus; caiycibus ciliatis; foliis profunde ferra- tis, fubacuminatis.

In nemore vtd *Fahrungaard*. Flor. 3ul.8c Aug.

7. *glabrata*, pedunculis unifloris brevi- bus; germiibus liifpidis; laciniis caly- cinis glabris, **foliis** inferioribus corda- tis, fuperioribus cordato lanceolatu.

Habitat 8C floret cum prsecedenti.

jog. *C. glomerata*, caule angulato, simpliciflora;
 foliis crenatis radicalibus ovato-lanceolatis
 petiolatis, caulinis cordato lanceolatis, sub-
 amplexicaulis; **floribus** sessilibus, axillaribus
 terminatis glomeratis, corolla brevior.
 In locis ficcis; ved gamle Kiøge Vei forbie Flujki*
 kroe; imt Uin Bugfv&rd og Kolltkolte, **Flor. Jul.**

73. *Lonicera.*

Calyx quinque-dentatus. Corolla monopetala
 tubulosa irregularis. Stigma cavatum. Bacca
 subglobosa. **uni-bi-trilocularis.**

210. *X. Periclymenum*, capitulis ovatis terminalibus;
 foliis oppositis obtusis inferioribus breviter
 petiolatis, superioribus sessilibus; caule volu-
 bili. Flor. Dan, Tab. 908.

In lylvattci', sepibus. Flor. Jul. Aug. Sept.

211- *L. Xylosteum*, pedunculis bifloris; baccis
 distinctis; foliis ovalibus integerrimis **marginatis**;
 caule erecto. Flor. Dan. Tab. 808.

In fylvis, fructibus; bag ved Ordrup*

71. *Jasione*.

Calyx communis ilecaphyllis; propeius **quid**
 quidentatus. Corolla quinquepartita **regulj**
 ris. Aatberag bafi subcoalitas. Cayfula **hiU**
 cularis, apice ut hiicens,

213. *J. mantana* caule erecto ramoso
 folioso ramisque piloso, ramis superne nu-
 glabris; foliis hnearibus undulatis pilosis.
 Flor. Dan. Tab. 519.

In arvis Sc pratis ficcis. Flor. Jul. Sc Aug.

75. *Viola.*

Caly* pentaphyllus, supra basin corollas adhaereus. Corolla pentapetala, irregularis, postice cornuta. Anthers coalitae vel connatae* Capitula unilocularis, trivalvis.

* Acaules.

213. *V. hirta*, foliis oblongo-cordatis, crenulatis petiolisque villosis; pediculis infra medium bracteatis. Flor. Dan. Tab. 613.

In sylvaticis Sc fruticetis; *Charlottenlund FrU derichsdal, Fugtehvad Molle.* Flor* April. Maj. Sc J m.

514, *V. odorata*, foliis cordatis, crenatis; stipulis radicalibus ovatis, ciliatis, mucronatis; pediculis apicem versus bracteatis; stolonibus reptantibus villosis. Flor. Dan. Tab. 309.

Frequens in nemoribus, aggeribus. Flor. Apr. Sc Maj.

315. *V. palustris*, glabra; foliis reniformibus; pediculis supra medium bracteatis. Flor. Dan. Tab. 83*

In paludibus; *Charlottenlund, Friderichsdal, JDr<ninggaard, Birkerød* Sc alibi. Flor. Apr. Maj. & Jun.

** Caulescentes.

316. *V. canina* caule adultiori ascendente; foliis cordatis, crenulatis, petiolatis; stipulis lanceo-

latis denbato-ciliatis acutis; pedunculis radicalibus vel caulinis supra medium bracteat^{is}.

In f>Ivaticis, fipibus.[^] Flor. Maj, 8C Jun.

177F. *F. tricolor*, caule triquetro* diffusp; foliis ovato-oblongis, crenulato - dentatis petiolatis; filipiis pinnatifidis; peduuculis axillaribus elongates apice bracteatis; corojhs calyce glabro dii)lo majoribus. Flor. Dan. Tab. 623.

Inter fegetes in ai>ri&, hortis. Flor. aestate.¹

9. corollis cal>ce glabro aequalibus.,

tl8« *V. arvepfis*, corollis calyce bifurcata xqualibus; ræceiis h[^]bitu autecencfentis.

In locis ficcis, a j p \ pratis. Flor. seftate.

Andillincti fpecies?

*Impatiens**

CilyK,diljl>y>lus. C010II4 pe[^]t[^]petala irregu< lai is; nectario cucullato. Anrliëise baft pills junctis. Capfula uiu'IoculaiU quiaquevalvis, matura elastice e later[^] dffilien\$.

919. *I. Ni>li tangere*, {[^]edunculis multifloris, foiltaiis; folijs ovatis, obtuf[^] ferrato - dentatis; geniculii cauiiuU tumefcentibus, Flor. Dan. Tab. 5S2.

In locik uinbrofis humidis; *Claufen's Have uden for Kajtllet, Bagfvard-Skov, Dronninggaard, Dyrthave* 8Cc. Flor. Jul. Aug.

*77. Verb[^]/cum**

fa|y'x quinquepartitus, Corolla rotata fubin-
æqualis. Filamenta inaequalia bafi lanuginofa*
Stigma obtufum. Capiula biioculaiisj bivalvif

i^o. F. *Thapsys*, foliis ovato-lanceolatis, utrinque tomentosis decurrentibus; caule sublimissimo; floribus densissime spicatis sessilibus, Flor. Dan. Tab. 631.

In locis ficulis, aggeribus, agris incultis glareosis. Flor. Jul. Aug. Sept.

;;!• V. *Lychnis* foliis radicalibus ovato-oblongis petiolatis, caulinis ovato-uneolatis trifloribus, omnibus oblique crenatis supra rugosis, subtus incanis villosis; floribus paniculato-tacemosis, racemis spicatis. Flor. Dan. Tab. 586. Eariffirnum; *garvnel Frøkrichsdal tætt for man kommer til Møllen pan en ætngierde.* Flor. Jul. 8c Aug.

2^o. V. *nigrum*, caule simplici; foliis inferioribus cordato-oblongis petiolatis, superioribus ovato-lanceolatis sessilibus, omnibus duplicato crenatis, villosis; spica composita terminali. Flor. Dan. Tab. 1088.

Haud infrequens ad vias, fepes. Flor. æstate.

78. *Datura.*

Calyx tubulosus angulatus deciduus. Corolla infundibuliformis plicata. Capsula bi-quadri-locularis, quadrivalvis.

223. D. *Stramonium* foliis ovatis, lobato dentatis, glabris; capsulis spinosis, ovatis, erectis, Flor. Dan. Tab. 436.

In littore maris frequent ved *Papier* - *Mølle* Flor. Jul. 8c Aug.

79. *Hyofcyamus*.

Calyx campanulatus acute quinque-dentatus. Corolla infundibuliformis, inaequalis. Stamina inclinata. Stigma capitatum. Capsula bilocularis, operculata. Semina reniformia.

*%/. *H. niger*, foliis radice ovatis, petiolatis, caulibusque oblongis amplexicaulis, iituitis; floribus sessilibus. *Plinck Icon, Medic.*, No. 97.

In ruderalis, ad vias, pagos, frequens. Flor. aestate.

50. *Solanum**

Calyx quinque-dentatus. Corolla rotata. Antherae subcohaesae, apice per geminos delincentes. Eae biloculares.

225. *S. Dulcamara* caule frutescente flexuoso; foliis superius hastatis; floribus racemosis. Flor. Dan. Tab. 607,

In fruticosis, in locis humidis, ad sepes. Flor. sellate.

226. *S. nigrum*, caule herbaceo; foliis cordato-ovatis, dentato angulatis, racemis nutantibus. Flor. Dan. Tab. 460.

In ruderalis ad pagos, vias &c alibi. Flor. aestate.

^ M a. baccis aurantiaco-lutifera

*id *Belfinger, Rafn 1. c.*

8t« *Rim m n u s.*

Calyx tubulofus quadri vel quinquefidus.
Corolla squamæ lamina munientes caud infer-
tae, Bacca bi vel quadrilocularis.

87. *R. catharticus*, spinis tenninalibus; floribus
quadrifidis diohis, filamentis fappius quatuor;
foliis ovatis serratis nervosis. Flor.
Dan. Tab. 850,

Haud frequens in fruticetis, sepibus; *imellem*
Ordrup Mose og Dyrehave; og *Kongslette og*
Friderichsdal narniere til Brozn.

88. *R. Fangula*, inermis floribus monogynis
hermaphroditis; foliis ovatis integerrimis
nervosis, Flor. Dan. 27S.

In locis nemorosis, foliis ac humidis; *bag*
ved Ordrup, Friderichsdal, Birkerød 8Cc. Flor.
Maj. Sc Jun.

89• *Evonymus.*

Calyx quadri-quinquefidus. Corolla tetra-
pentapetala. Antherae sex plus quatuor. Cap-
sula tetra-pentagona, quadri-quinquevalvis*
Semina arillata.

89. *E. europæus*, pedunculis compressis, fere
dichotomis, partialibus trifloris; foliis ovato
oblongis, serratis, subscutellatis, glabris.
Flor. Dan. Tab. 1089.

In nemoribus, foliis; i *Charlottenlund mod*
Søen, im Mtm Ordrup Alost og Dynhav. Flor.
Jun.



Ptinlandria Monogynia.

83. *R i b e s*.

Petala quinque flaminaque calyci quinquefidl cavo inferta. Stylus bilidus. Bacca uniloculais, polyperma,

330. JR. *nigrum*, foliis fubtus glandulis rotundis, luttis, adfpe. ifis; racemis pilofis flpribus oblongisi. baccis nigris. Flor. Dan. Tab. 556.

In fruticetis humidis; *Ordrup - Mofe > Orholm.* Flor. Maj. 8c. Jun.

131. R* *Grojfularia*, ramis aculeatis; petiolorum cili pilofis; baccis Jiirfutis*

Rariusin iepipdj^ggeribus, *Rudersdal, Birh-rdd.* Flon Apr. 8c Maj.

t33, R. *Uva crifpa*, ramis aculeatis; baccis glabris; bractea monophylla. Flor. Danic. Tab. 546.

Haud frequens in fylvaticis. *Birkerbd, Hirfch-holm.* Flor. Apr. 8c. Maj.

84. *Hede r a*.

Calyi quinquedentatus. Corolla -pentap^tala decidua. ' Bacca quinquelocularis pentarperma calyce cincta.

133. ff. *Heli±y* Foliis ovatis, quinquelobatisquet umbellis erectis. Flor. DJII. Tab. 1027.

Barius in fruticeto, *ved Fuglehvads-Mölle; i Krattit imellem Ordfups-Moft og Dyrehave* ved * *Led.* Flor.

85. *G I a u x**

Calyx monophyllus quinquepartitus. Corolla nulla. Capsula unilocularis, quinquevalvis, pentapenna fere.

134. *G. maritime*, p caule erecto, digitali, ratno* fo; foliis inferioribus oppositis superioribus alternis ovato-oblongis; floribus axillaribus*

"Flor. Dan. Tab. 54S."

In orientibus frequens, Flor. Jun,

86. *T h e f i u m.*

Calyx monophyllus, quadri-quinquefidus, flaviniferus. Corolla tubulosa Nectarium in faucibus calycis infera. Semen unicum intra calycem coronatum.

135. *Th. pratense*, foliis linearibus, obsolete ternatis; caule erecto; panicula foliacea. Flor. Dan. Tab. 1205.

Barbiflorum in collibus aridis pae Bakkerne ve4 *Bndt-Mollt.* Flor. Jun,

D I G Y N I A.

87. *A f c l e p i a s**

Corolla convoluta, quinquepartita. Nectarium quinque corniculum exsertit. Filamenta brevissima corpusculo communi obtuso coalescentia. Folliculi duo, oblongi. Semina pappo coronata.

136. *A. Vincetoxicum*, foliis cordato-ovatis, basi sessilibus petiolatis; caule erecto simplicifloro

pedunculis axillaribus; floribus fubumbellati?.

Flor. Dan, 849-

Haud frequens in fruticetis. *Brede Bakker.*

Flor. Jun..

88- *G e n t i a n* «.

Corolla campantilata, plicata, ve! hypocra-
teriformb quadri-qiinqueJida. Sty 1 us outfits.
Stygmata ovata. Capfula unilocularis, bival-
vis longifcutiinaliter dehifcens.

337. *G. Pneumonanthæ*, corollis quinquefidis cam-
panulatis, axillaribus. Iohis lanceolato-linea-
ribus, obtufis. Flor. Dau. Tab. 2Gg.

In pratis rjriu s: ved *Johnstrupi Ushold Over-
drev paa Kronhorg Amt.* Flor Jul 8C Aug.

538. *G. lancifoliay* .(Rafn) corollis hypocrateri-
furmibus quadri-quinqupartitis barbatis, laci-
niis lanceolitis acutis; Jaciniis calycinis lan-
ceolatis sequalibus; foliis lanceolatis.

Bariflitne in piatis; ved *Adhrsburg, Dn. Mar-
kujfen.* Flor. Aug. & Sept.

39 *G- pratenfts* > (Frolich) corollis liyoocrateri-
fonnibus, quadri-quinquefidis barbatis, laci-
niis calycinis .iniequalibus iolils lanfceolatis*
1 lor. Dan. Tab. 328.

In **pratw*** Fior.

340. *G. campeflris*, corollis hypocrateriformibu*
quadrifidis barbatis, laciniis obtufis; laciniis
calycinis binis rhomboidalibus; ioiis ovati*
decurreritibus; caule argute angulato. Flor
Dan. Tab. 367.

Non infrequens in pratis fuuhumidis. Flor.
Aug. 8C Sept.

gg. *Hern la r i a.*

Calyx quinquepartitus. (Staminadecem, quinque tterilia cumiertilibus quinquealternantia).

Capfula calyce ciucta rnofperma.

341. *H. glabra*, caulibus proltratis, c[^]spitofis, ramofis; foliis ovatis oppofitis; fior.bus glomeratis axillaribus. Flor. Dan. Tab. 529.

In arvis, pratis ficcis. Flor. ablate.

149. *H. hirtuta*, hirtuta, gloinerulis paucifloris.

Rarius in axenofis ficv is. (*Rafn.*) Flor. seflate.,

90. *Chtnopodium.*

Calyx penta[^]byllus, foliolts concavU. Corolla nuHa. Semen uijlcum lendculare calyce \ entagono cincto.

* Foliis angulatis.

343. *C. Bonus Heriricus*, foliis triangulari fagittatis integerrimis; fpicis conipollcis aphyllis, Flor. Dan. Tab. 579.

Inruderatis, ad vias, pagos, 8Cc, Flor, Jun. Jul. 8c Aug.

344. *C. urbicum*, foliis caulinis inferioribus triangularibus inaequaliter fubdentatis, fupenorv bu- lance lat s integerrii»M ; racem^{*}is confer^{*}tis ftrictifTimis, cauii approximatis !ongullimis. Flor. Dan. Tab. 1 148.

In rudeiaus ad pagos. Flor. Jul. Sc Aug.

*45» £• *ruhrum*, foliis lliombeo-trianguiarihns, erofis obcufe dentatis; ractmis glomeratis, folioiis, axiliaribus, foliis brtvioribus. Flor. Dan. Tab. 1149.

In ruderatis, fimetis, ad paeos. Flor. Jul. Aug. & Sept.

\$46. *C. murale*, foliis ovatis, acute dr-nfatis, nitidis; racemis ramoHs fubfoliuceis foliis Jongioribus.

Haud tVeijuens; *paa Amager*. Flor. Jul.— Oct.

447. *C. album*, ioliis rhoinboide^friangularibus, erofis, poliiceintegns, fumii.i^oalongis; acemis erectis.

* In rudeiacis, hortist, agris 8C alibi. Flor. Jul. & Aug.

848* *C yiride*, foliis rhomboideis, dentato-finuatis; racemis ramofis fubfoliofis, Flor. Dan. Tab. 1150.

Habitat 8C floret cum precedent!

-849. *C. hybridum*, foliis cordate-triangularibus angulato-d(ntatis, acuminatis, poLice integrriunis; racemia ramofis niuiis.

In cultis, ruderatis, Amager; uden for KajidU
Flor. Aug.

250 >, *C glaucum*, foliis ovato oblongis, repando dentatis, obtufis fubtus glaucis; ractmis^ndis fimpliribus glnmeratis. Flor. Dab. 1150

In cultis. ruderatis; ad fimeta, domos. i lo
JuU & Aug.

#* Foliis inteceiioiis.

251. *C. Vulvaria*, foliis rhomboidibus, inferius
gerrimis, quasi in arhuccis? floribus glomeratis
axillariibus. Flor. Dan. Tab. 1152.

In ruderalibus agris hand frequens: for *Ama-
ger-Purt*, for *Öjrt-Port* vtd *Salpttrvarket*.

• Flor. Aug. & Sept.

252. *C. polyphtrum*, foliis ovatis integerrimis;
caule erecto; cymis dichotomis, apicibus,
axillariibus; fetibus nudis. Flor. Dan. Tab.
1153.

In cultis, foliis rarius: ved *Flajtkroen*; *Heflkitii*
ved *Biskerbd*. Flor, Jul. Aug. Sept.

253. 6*. *maritimum*, foliis fimbriatis, (f. *tricuspidatis*) lindra-
ceis; floribus glomeratis axillariibus. Flor.
Dan. Tab. 49.

In littore: ved *Fla/kekroen*; imellem *Kajlliet* og
Charlutienslund; *Amager*. Flor. Aug.

91. 6. a I Jo I a.

Calyx quinquepartitus; perflens. Corolla
nuda. Capsula monoplocosperma. Semina coch-
leatum.

254. *S. Kali*, caule herbaceo decumbente, foliis
imbricatis, spinosis; cymis axillariibus. Flor.
Dan. Tab. 818.

In littore haud frequens. Flor. Jul. 8. Aug.

*55. *S. hirsuta*, caule herbaceo diffuso, imbricatis te-
retibus, obtusis lobis. Flor. Dan. Tab.
157.

Intra quens in littore maris: ved *Holuk* ~~Dn.~~
Prof. Vahl. Flor. Jul. 8. Aug.

92. *Uimu* *

Cntyx quadri-quinque[^]dus_f intus coloratus.
Samara compreflo membranarea,

356. *U. campejtrfc*, foliis du[^]Hcato-ferratis bail
inaequalibus; floiibus fubfefTilibusconglonie:
ratis pen[^]audris; fruttibas glabris. i lor. Dan.
Tab. 632.

Rarius fpontanea: in luco *ved Fahrungaard*.
Flor. Apr. Maj.

257. *U. fubzrofa*, foliis duplicato-ferratis, bafi fub*
scqnalibus; floribus fubfeffilibus gloineratif
tetraudris; rarnis fuberofis alatis.

Tantum vidi *ved Raningaardzn vtd jFuurfo&U*
Flur. Apr. Maj.

UMBELLATE

93. *Eryngium*.

Flores cnpitati. Involucmm univerfale poly-
phyllum. Semina duo perianthio coronat*
Beceptaculum commune conicum paleaceurtf

258. *E. maritimum*_t foliis radicalibus fubrotundi
plicatis, fpinofis; capitulis pedunculatis; pa
leis trJcMfpidatis. Flor. Dan. Tab. 875.

BarifTimura in littore maris: *ved Vtbek, Htlfi ng*
ox; Kiogc. Flor. Jul. Aug.

94. *Hydrocotyle*.

Umbella parva prolifera. Involncnim di
trapbyllum. Petals integra ovato: acumini

Fructus ocbiculuto • couiprt (Tus glaber.

5g. *H. vulgaris*, caule repente; foliis peltatis, orbiculatis, repand'ly erenatis, umbellis quinqueflor. Flor. Dan. Tab. 60.

In locis humidis, fossi. Flor. Jul. Aug.

05. *Santalinia*.

Umbellae compositae subsessilis. Flores dulci abortivae. Fructus aculeatus.

860. *S. eupatoria*, foliis quinquelobato-digitatis; lobis multifidis, denticulatis; caule nudato; floribus fevilibus. Flor. Dan. Tab. 934*

In siccis, nemoribus fere ubique. Floi. Jun. Jul.

96. *Coucalis**

Corolla? sessilis vel subsessilis, lobis abortivae. Fructus fetis aut aculeis obfus.

861. *C. Carotai* feminibus subsessilibus: angulis quatuor distantibus, bifidis; petiolis subsessilibus. (Involucris polyphyllis pinnatifido trifidis; foliis subsessilibus umbellis post florescentiam contractis.) Flor. Dan. Tab. 733.

In aridis, aggeribus, ad Vias frequens. Flor. Jul. Aug. Kit daucus Carota Linn.

862. *C. Anthriscus*, feminibus ovalibus dorso aculeis sparsis scabris. (Involucris subsessilibus heptaphyllis, lanceolatis, acutis; foliis bi-tripinnatis.) Flor. Dan. Tab. 919.

In fruticetis, ad vias, feres. Flor. Jul. 8C Aug. Est Toidylium Anthriscus Linn.

ml humilis, feminibus ovatis dorfo acnleis incurvis caule fuiipeUali, ramisque divaricatis angulofis.

In arvis ficcis: *imod Ftajltkroen**

t6j. *C. Scamlicinn, fructibus ovatis acutis, <dorfo aculels vel fetis inciU'vis. (tnyolu&ro paniali Jubptntaphyth: foliol'ts lariceoluti* cilwtis: univerfaii hand nului; foliis tripituiatis.) Flor. Dan. T.b. y6j.*

Ad fepes SC aggeres cojiiofa. Flor. Maj. SC Jun#
Ell Scaudix Anthrifcus Lin. -

97.

Athamanta.

Co roll ae r<-gulares feJ tiles. Fi uctus o vato • ob-
Ion^is, (tffiatua, Lmngiuofus.

464. *A. JLibanuiis, iructitms q vatiI incains, villo-
iis; iavolticris poly^b^ilia Inieanus. {loiii*
bl pihnatis glabriff cuult (wgtttato • canaticu'
lalU) bi fi jet is aridis cincto.) Mor, Dan. Tab,
754.*

RanHitna, in arvk: *ved Froken Urowns Guard
vtd Hernjiorf. Fl^rr. Aug. & Sept.*

98. *\$ c a n d i x.*

Corolla? radiutae. Fruccus tloftgatus, fubros-
ti-• is, ft.iatus,

265. *S. hniulay fnic'ii>iis ovato. la::ceo!afis, fub-
ac.uuunatis: unhiaruris laevibus: mature i
tis nigriratitiblis mtidis. (Irtvotucro m.iver'
fall pptrunique nullo y pariuli jttxa - ut/u**

*phyllo; foliis bi-tripinnatis, cauh purpura**
fcentc-maculQio fca bro.) Flor. Dan. Tdb.t)j8.
In fepibus, ad vias kifrequens. Flor. Jun. JuJ.
Ett Chxrophyllum temuluin Lin.

gg. *Cherophyllum**

Corollas fubaequales. Fructus longus, laevia nitens,

266. *C. CerefoUum** fructibus oblonaisfubrubar'iss
involucro univerfali **baud** nullo: partiali mo-
no- di-tti[>hylllo ; urnbeilis latt r.dibu£. {*FofiiM*
tripinnotia: pinnls plnnatifidisy cault gtnictt-
lia pubefctnlibus.)

In **ruDerattfi**, oleraceis, quaG indlgenum. Flor*
Maj. Jan. *E\$ Scandix Cerefoliui Linn^

267. *Cm fylveflre*, fructibus **oplongis**, flylis ap-
proximatis teriuinulibits; in*»lrnro uuiv< rfali
plt-runj<;ne nullo: partial! [lentaphyllo. (JFo-
liis trqritinaiis fulpu&ejenti HIS; vault ftriato
fukatpy gemcutis tumidiufculis pubefrentibus.)

In pratis; ad vias, *fepes obii|ue*. Flux. Maj.
Sc Jun,

loo. *O e n a H t h e.*

Cor6l|« radiatse: difci llerik-s, Fruchis ob-
loiiigus, rfecemftriatus, c. lyce I ylis «uit per-
fiilenribus, ^rectis, c orqnattj.

268. *S. Om. fatuhfa*, fruct **ibui** denfe **congeftris**; in.

t

(*foliis*) *Tofia fal* unullEa braistitutisolvphylloit

In locis paludosis, ripis lacuum: *Gi&lfkav; Pa**
fiers'MolUj Lyngbye~ og Bogjv&rd-Sot. Flor.
 Jua St Jul. *

101. *Phellandrium**

Corollas subaequales; fertile?. Fructus oblongus,
 subdecem striatus, calyce liliaceo corollatis.

16g. *Ph. aquaticum* involucrio univulvato nullo:
 partiali polyphylo. (*JfoUJM hi- iripinnatis:*
*piuittis dharicatis glabris; cauU crajfo filulij**
atticulatOi arnadis infimis radicantibus.) Flor.
 Dan. Tab. 1154.

In piscinis Si paludibus haud frequentans: '*Birke**
redd, Bagjvard; Hbfchhulnu Fior. Jul. Aug.

* 102. *Carum**

Corollas subaequales, fertiles, Fructus ovatus,
 subglobosus, subcomplanatus, octostriatus;
 foliis deflexis.

170. *C Cervix* involucriis plerumque nullis; foliis
 bipinnatis glabris: Quidam ad basim trifloris.
 Flor*. Dan. Tab. 1091.

In pratensibus ad vias inuenitur Flor. Jun.

103* *Augopodium**

Corollae subaequales, subfertiles. Fructus
 ovali-oblongus 5 striis elevatis palmaribus, In-
 volucria nulla.

171* *J'L. Pudagraria*, foliis radicalibus striatis

fummii ternati*; foliolis ovalibus incifo ferxatis. Mor. Dan. Tab. 670.

Ad fepes, iu dunattis, Her. Jun, Jul.

104, *Pimpintlla.*

Corolle aequales, fertiles, Fructus ovato-olilongus: ftriis elevatis. Sryli trecti» In- v»)Iucrti .in la.

372. *P. Saxifragn*, folns radicalibus pinnatis: pinnis ovaris, ftrratis vel proiui.de intifis* caulium phanis profundo incifis feu piimatU fidis lanceolatis vel lineaiibii.. Fror. Danic. Tab. 669.

In focis ficcis glareolis frequens. Flor. Jul. —* Septembr.

a. FoliU radicalibus pinnatis: pinnirc«- datis incifo-lobatis dentatis; caulinia 1 neaiibus.

273. *P. magna*, Euliis pinnatis uniformibus; pin* nulis ovalius vel ovato-oblongis incifo fer* ratis terminalibus trilobis. Flor. Dan. Tab*

1155.

In pratis humidis; locis umbrosis: *Lundthus** .Moje, *Fridtrichtsbtgr-Have*. Flor. Jul. & Aug.

374. *P. dijjecta*, fullia omnibus pinnatis; pirmig multipartitis: kcioiis fubfalcatis, acutis. Retz. Obfervat. botan. Fasc. 3. pag. 30. tab. 2.

. In locis aiiui* tkv^tis: *Orholm*. Flur, Ju(. fie

August.

105. \$ * w rn.

Corolla? aequales fertiles. Fructus ovatus, ftriariK ft ii f'llcatus absque coilis.

375. & *lenifalium*, fructibus ovato - oblongis, ftriis elevati¹; in voltms poJyj.hyllis, rtflexis-
(*Fuiiis ji&tnerfts ptJtkti laciiiitilis Itninjis in* cij's linearitka s; cnulium ofiloago lameolaiis argute ferratU a cut is.*) Flor. L)M, Tab. « j6.

In rivuli^, lacubus, **fbffist**. I lor. J til. — Sept. 1^6. «S. <g> *ifolium*, h'tictibtis ovatis; involucrig pJeruurjiie penrajiin liiy: toliolis **asiverfalii iategris** \ vel incilis vel pinnatiliilis I partialis iraequalibu bi-trjidntatis. (*loliis phtnaiis: pmnis d'vatis, aegute (krnttis* QztUii\ baft GU-n ul'iiis, txtiniis triiofmtis.*) Flot. Dan. Tab. S-17-

In riva'isj iv/l *Ravejkavs*Hakken*; *gammel Var* tov+* Flo- **Ju4**, / . ug.

t77. V. *inuiidaun*, frue'ibus ovaris, ftriatis; in-
\volucro univertali luud nullo: p. ntiali di-tri-
phvilo dimidiuto. (*F otiiis Jubmerjis pinnatoA multifidh capillaribus: emcrjis p'wnutis ctuwei orrnltbis tridentatis vel trifidel«» umbttlis laA terclilbiis oppvfii'folUs Jubbijidis pair cijlor is*n*)
Iior. Dan. Tub. 89- I

In pi fcinis, locis innndatis. *Norrt-Frlhd;* (*mehtndhufit i Skovrtli Bu\$fv<crd** **Finr. JulJ** &C It-il. Eft Sison intmdatutu **LilUL**

ff. Foius oinnibus ca^iluceis caul^ fu^l ertcto. ^

106. *Bupleurum*.

Coroll: * æquales. Fructus subrotundus, sub-
cotnpreffus, rtruifus, baud rugojis.

178. *H. tenuijftmum*, um Us a\l iiiiibus, alter-
j)l> fimpUtibus Li - trifidisve, pauciiWjris;
iavolucru uiiveribli. hi - triuhyllo: pavtiali
pentaphyllo. (*Jvliis HtuaiUus muauiiatis
glabris.*) Flor. Dan. 'Fab. iggo.

XII uiaiiittiis depress haud i'requens: 'paa'Amc*
str: *irrd CoaJipntia IUie for Urowfls Gaur.d tut
ved *\$otkattiu*i iNu JFlaJ*.kroe n. jflur Jul,*

107. *Apium*.

Corollæ spquaks ffrtiles. Fructus minutua
gibbus Il Latus,

179. *A. gravevUnSj* fruc^fibus ovatis, ban fubvein-
(ricf)fis; invcilucris |»lenunq' e null is 1 *Umbel**
*Us axitlorU/us terminu lib usque fuk-rjjilibuss
fii iis glabris niidh radlcuttlus pinnulisj cau-
iinis ternutis.*) 1-1 ir, Dan. Tab. 790.

In **tnaritimi** s rarior: *vtd Srrandkanun imod Fla**
Jtkkrotn. Flor. Jun. — Aug.

108. *sll t h ufa*.

Corollse radiatae fertiles. Fructns ovato-pjo*
bosus, collato fulcatus. I/ivulucaun univer-
fale milluin > pardale ^liniidiatum, tripiiyl,um,
longum p« iui lum.

180. *JE. Cyiiti; ium*, joltis glabris obfcure viridi-
bus **trininna^if** | piuauis ovaco-Jar ceolatis,

Peniandria Digynia.

profunde riciOs: Uciniis fublinearibus acuti-
mucronutis. Curt. Flor. Lond. Tab. 36.

In cultis oLeract is, fepil>us. Flor, Jul. Aug.

109. *Centum**

Cor Us* fubaeqnaUs, fertiles, Fructus fubglo-
bofus, fliiatu-; ftriis-elevatis crenulatis. In-
voicrum uuiverfile pfnta - heptapbylltim :
partiJ tri-tetra^Vylluin, diinidiatum, breve
281,, Con* machtdi&m, foliis inferioribus tripinna-
tis, fupenoribps bipinnaris: ninniilis oblon-
go-lanceolatis incifo dentatis obtufiufctilis;
caule lubUriato macttlis purpurafct ntibus bafi
pictoO Curt. Fl >r. Lond. Tab. 41. ^

Hand frequens in fepibus ..d v as: *uden for Ka-
Jldiet; ved Tuborg; OrlMim 8tc.* Flor. Jul Aug.

110. *C 1 c u t a.*

Corollae ful)aeqtiales, f<ertiles. Fructus cor-
<laro gl .t of us, coinpreffus cofl.,tus; cofti*
fubcrenulatis. Involudra .1 univervale mil*
lum: partiale heptaphyllum.

282, C. viri>/fl, iolijs glabris: radicalibus tripin*
natis, p:nnis divarioatis: CaitlinTs bi feu fun'
pi ciUr pinnatis; p:nniulis omnibus longis !aH'
ceolatis ar ate fenv.tis iategtli bi vel tii
1 isve; ramis <Jivaricati«. 1 1 ,r. Dan. Tab
log.

In paludibus; ad margines lacunm s *i Srodsgruv**
ved Öflerport, GitfiU>ft€~\>ot> JLunddius Muft •
Flot- *ul. Aug.

i n . *A n e (b u m .*

Corolla seuales, fertiles. Fructua lenticu*
lare-compriffus, (hiatus; ftriis elevatis, ala
membranacea cinctus. Involucra nulla.

183* *A* graveolens*, i'ructibus ovali-oblongis; fo-
liis bipirmatis, ere^is; foliolis fetaceis di-
triciotomis. Elackw, Herb. Tab. 545.

In culds oleraceis, inter fegetes: *ved Kalkbran-
ieriet udtinfor KaJldUtJ paa Amager 8Cc.* Ilor.
Jul. Aug.

list. *Pajlinaca.*

Corolla* aequales difci fleriles. Fructus ova*
| ^ t piano - corn preffus, ftriatus i ftriis eleva*
tis; ala membranacea cinctus. Juvoiucrum
univerfale fubmonophyllum: partiale nullum.

984* *P> fatTM** foliis pinnatis, glabris: foliolis
ovato - oblongis, incifo-lobatis, exterioriibus
trilobis. *TI01.* Dan. Tab. 1206.

Frequens ad vias, foflas: *Farimags - Vejen;
Ordrup-Vejens ValbyeBakke.* Flor. Jun.—Aug.

i y . *Selinum.*

Corollae aequales fertiles. . Fructus ftriatus:
ftriis elevatis fubinembranceis; ala membra-
nacea cinctus. Involucruin tam partiale quam
univerfale.

Fructibus ovalibus, corIs rotundatis;
ftylis fructu brevioribus dt flex is involu-
cris univerfalibui purHlleuibus lanceo-
lito*ie tois.

285. *S. fyt'pjlre*, foliis glabris tripartitis: pinnulis ovato-lauceolatis u cificis; laciniis Imearibus brc-vibus obtufiufcufib; canle quadriquiuepedali fubfulcato-Hriatoglabro tortili. Flor. Dan. 1 ab. 41*2.

Haud infrequeas in ^uUidofis fylvaticis, lieu-um: *Chartottenlund; Lyngbye-Soz* 8Cc. Hoi-
Jui Aug.

286. 5. *pahtflre*, foliis glabris quadrlpinnatis: pinnulis ovdto-la ctolatis, prwimme incilis vel jjartitls: **laciniis** Imeaiibus, obtufis mucronatis; caule fubL>it>ediil l'jb!l«*xuu|b aueiu lato, ramiti divaicaLib. F»o., Dan. 'IM>. 257.
male.

In palndibus tiirfofis: *Birktrodi Tepii-Mofis* Ved *Btilkrup*. Mor. Jul. — Sept

«. caule humilioie umbell^s rninoribus.

In palude turfrfo: ved *HrjUiob vea B>Jtr od*,

** **Fiucttbus ovato-globes, GoAk acuti'**
nbus iyiis'fructu aeqnahbtis deil xiei
involuciis uuiveriali ;i-s fubdeculuie.

287. *S. Carvifolia*, loliisfi trip n a s: pin nulis ovato-lauceoli is, inrifis, fub.jentis mucrone pallefcente; taule, angul B acutis fubmeant bianaceis; (uni> 1 is confejtis; invnhi-ri' Hiuari fetaceis: univetfaH hand IWJ li>.) F»o.
Dan. Tab. 667.

Haud frt que is in pratis fuJihnmi.lis : t.\d *FiaJ*
kfoen nisi tin veiius. Flor. Jul. Aug.

pinnulis linearibus; caule humiliore;
ramis paucioribus adpressis.

188. *lineare*, pinnis pinnatifido-partitis, laciniis
linearibus.

In aggeribus: *imellem Tømmerpladfen og Fløjke**
krom reptru Flur. Jul. Aug.

Caulis erectus, fuscus, fulcato-furcatus, bi-
tripedalis ramifusus. Folia glabra; radicalia
subtripinnata; pinnis pinnatifido-partitis, la-
ciniis linearibus obtusifuscis; caulina infe-
rioribus bipinnata: Superiora, pinnata; pinnulae
partitae; laciniis lanceolato-linearibus sub-
(asquipedalibus) acutis, mucronatis.
• agiliae bi-tripollicares membraceae, fimbri-
atae, glaucae. Umbellae confertae. Involucra,
fetaceo-capitata: univale di-triphyllum:
parciale polyph) Hum.

114. *Angelica.*

Corollae aequales, fertiles. Fructus alis mar-
ginalibus, duris, dorsalibus quasi abscissis.
Involucra partialia polyphylla fetacea.

189. *A. Archangelica*, foliis subsuperioribus:
pinnulis ovatis, inciso ferratis: lateralibus
auriculatis seu bilobatis: impari trilobo, va-
ginis simplicibus membranaceis. Flor. Danic.
Tab. 106.

In paludibus haud frequens: *ved Aaen fra Fugl**
kvad • Al/c til Papiers - Mollt. Flor. Jun. Jul.

ago. *A. jylveflris*, foliis bipinriatis: pinnulis ovato-obloogis, acute Sc fere aequJutr fenatis, fubtus pubelctntibus.

In pratis SC paludibus turfufis. Flor. Jul. Aug.

115. *Heracleum.*

Corollse radiate fertiles. Fructus cordiformil planus ftriatus: flriis elevatis: alu immbrana* cea cinctns. Involucrum univerlale plerumque niillum: partiale poly.-hvlluin.

agr. *H. Sphondyhum* „ foiiis pinnatis hirtutii fcabris : pinnulis pinnatifidis, tobatis, lubacutis fenNjtis; irnpari rnajore, tripartitafc Jobi intertnedio trifido, BbcW. Herb. Tao. 540[^] Ad vbs, in locis umbrofis, durnetis: *Gialjkov* ; vtd *Lundeliufet* 8Cc. Flor. Jun Jul. 8C Aug.

et- pinnis arigufttoribtrs ac magis incili*,
Vtd *Bnde*, *Orholm* in collinis iruticolis.

ir6» *Laserpitium.*

Corollae fubaequales fertiles. Fructus obloigua: CQHS membranacea-alatis. Involucja polyphylla.

agr. *L* tatifolium*, foliis pinnatis: foliolis b; btiq'ie cordatis incifo ferratis, impari nol raro trilobo.

In locis umbrofis haud copiofe: 1 og ved *Hm* ;
jkowtn Inulltm *BalUtup* ug *JoiuMrup*, *Uiu Boy*
\$CCzthanovsky. Flor. Jul.

TRIGYNIA.

117. *Viburnum.*

Calyx quinquepartitus. ^tolla quinquefida,
Bacca trifperxia.

293. *V. Opulits*, ioliis appoGtii, fubcordatis tri-
lobatis argute dentate: petiolis glandulofis;
corymhisterimtjalibtiss floribuiradiatis. Floe
Dan. Tab. 661.

In fruticetis, fepibus: ved *Fuglehvad-MolUt* ved
Lyngbye - Sbe, 3Cc. Flor. Jun. JuL

118. *Sambticus.*

Calyx quinquepartitus. Corolla quinquefida.
Baffca trifperma,

^94: *o. nigra*, foliis oppofitis pinnatis: pinnis
ovatis acumiatisferidit^; cwnu quiz, quepar-
titis; caule arboreo. *Ilor*, Dan. Tab. 545.

In fepibus frequens. FJor. Jun. tic Jul.

95. *S. £&u/iu*, ioliis oppofitis pixinjtis: rilMU,
ovato.Lnceolaris, femcis, hipulis foliaceis;
cymis tripjrtitw; caule iierbaceo. F/oj-. Dan.
, Tub. rr56.

Harius vcii *J^ersprih.* Flor, Jul, Sc Aug.

119. *A If int.*

Calyx peutnpl yl ... Cqrflla pentapetala.
Stamina tres-decem. Capiuia unilocularis
trivalvis*

9- *A. media*, foliw ovato-cordatis; ptUli^

Pentandria Tetragynla.

la cuitis, ruderatis ubique. FJor. Apr. ad Oct.

«. *pentafitmon*, Horibus pentandris. 11 >r.

Dan. Tab. 335.

p. *decajlemon*, floribus decaudric. Flor.

Dan. Tab. 428.

T E T R A G Y N I A .

130. *Parmaffia*,

Calyx quinquepartitus. Corolla penrapetala.

Nectaria quiuque» coidata, ciliis capitatis.

Stylus uullus. Gafpula uuilocularis, quadri-
valvis. *

857. *P. paluflris*, foliis cordatis, radicalibus pe-
tioljtis; caule folio uuico fffile. Flor. Dan,
Tab. 534.

In pratis humidis. Flor. JuL Aug. Sept*

P E N T A G Y N I A .

.191. *Statice*.

Caly^rx monophyllus, plicatus^ fcariofus, Co*
rolla pentapetala.

191\ S\ *dongaia*> Icapo fimplici elongato capitato
glabro; foliisUnearibus. Flor.Dan.Tal). iogt.
Hoff. DeutfchL Flor. ite Attsg. peg 150**

NIn noaritimis. Flor. Jun. luL Aug.

9. *S\ *Armena*, fcapo fimplici capitaco pu be
cente; Joliis linearibus. *Hoffm.* 1. e.

In uttutumU* Flor. Jun. Jul. Aug.

300.* *S. *Lrmoim*, fcapo paniculato tereti; foliis oblongis obtufis, tubtus mucronatis. Flor. Dan. Tdb. 315.

In in.iritimis raris; *Saltholm*; *Jagerspriia*
Dn. Hulten.

125!• *L i n u m.*

Calyx pentapliyillus. **Corolla** pentapetala, **Ca^fula** quinquevalvis, dfcceuiloculaiiii>: loculamenris monoiptnnis.

301. X* *cathartic urn.*) foiiis ovato-lanceolatis oppofitis; caule dichotomo \ corollis acutis. Flor. D^in. Tao. 851.

In locis humidis, turfosis ubique. Flor. Jun. — Auguft.

302. X. *Radlola*, foliis cordato-oiatis pppofitis; caule dichotomo; floribus tetrandris tetiagnis. **Flor.** Dan*. Tab. 178.

Hand copiofe in ficcis arenosis ac inundatis; *Birktrbd*; *Hhjchholm - Skov*; *Ffojtkrotn* &c. Flor. Jul. — Sept.

i«3. Dro/cra.

Calyx **quinqttefidUf.** **Corolla** pentapebla. **Capfula** unil itularis, tri*quiru|uevalvis apic< df-hlfiens, puly perma.

303. *D, rotndijotia*, ioliis orbiculatis; fcapo racemufo. Flor. Dan. Dab. 102&V

In paludibus turiosis frtquens. Flor. Jul. **Aug.**

304. -*D. longifolia*, foliis ovato-oblongis; fcapo racemolo. Flor. Dan. Tab. 109[^].

In paludibus turfosis rarior: *Ordrup - Mofe; Lyngbye-Mofz; Birkerad.* Flor. Jul. Aug.

P O L Y G Y N I A ,

144, *My of ur us.*

Catyx pentaphylus, supra basin adnatus. Nectaria quinque ligulata, petalotomia. Receptaculum elongatum, feminibus tetra-

31. *minimus*, foliis linearibus crassifolius, compressis, in orbem congestis; fcapo unifloro. Flor. Dan. Tab. 406.

In aggeribus, cuitis oleraceis, turfosis haud frequens: *Birktrødt Ordrup-JVJo/a fcc.* Flor. primo ver.

C L A S S I S VI.
H E X A & D R I A *

M O N O G Y N I A .

⁹ Flores calyculati, calyce corollaque infructi.
Berberis. Corolla hexapetala, petalis basi glau-
dulis nectariferis. Calyx hexaphyllus inferus.
Stylus nullus. Bacca disperma.

* * Flores spatulacei feu ghimacei.

Narcissus. Corolla suprema, hexapetala. Nectari-
um monoplocum campanulatum extra
filamentina.

Allium. Corolla infera hexapetala. Spathamul-
tiflora. Umbrella (implex).

* * * Flores nudi, inferi

Tulipa. Corolla hexapetala campanulata. Stylus
nullus.

Ornithogalum. Corolla hexapetala, patens,
supra medium patens. Filamenta alterna basi
dilatata.

Anthericum. Corolla hexapetala, patens. Cap-
sula ovata.

Asporagus. Flores dioicae. Corolla hexapetala.
campanulata: petalis tribus interioribus apice
reflexis. Bacca trilobata, disperma.

tot

Convallaria. CoTollafe*-vel quadri-fida. Bacca
bi-vr| tnocularis, ante ir.atuittatemmaculofa.
##** Flores incompleti.

Acorns. Spadix lylyndiico-tonirus, tectus flos-
cu is. Stylus nu 1 lu* Capfula triWulaiis.

Junę us. Calyx hexaphyllus. Capfula ovata,
triquetra, unilocularis inonofperma-trifperma,
vel trilocularis po!yipenna«

Pep I is. Peiiiantheum campanulatum, ore duo-
decein fido, Petal.! Tex, calyci inlerta. Cap-
fula bilocularis fupera.

TRIGYNIA,

J&umex. Galy< triphyllus. Petala tria perilften-
tia conniventia. Semen unicinn tiiqiK-rr.im.

Scheuchzeria. Calyx hexa,hyPus. Corolla
nulla. Styli nullu Capulae apice dehtfeentes,

Trichlochin. Calyx nullus, Pttala fex; nn-
gnibus inflexis antherileris. S ylus ablins.
Stigmata phimofa. Capfula tri • vel fexlocula*
laribj bafi dehifcens. Semina folitaiia.

PCLLYGYNIA.

Alisma. ^Caly^c triphyllus. Corolla tripetaia.
Capfulse fex vel plurim» coriaceae compressav
umloculares, pol>fpermsr

MONOGYNIA.

115. *Berberis*.

Corolla hexapetala: petalis basi glandulis nec*
tariferis. Calyx hexaphyllus inferus, Stylus
nullus. Bacca difperma.

106. *B. vulgaris*, pedunculis racemosis; foliis
triplicibus. Flor. Dan. Tab. 904.

In hortis 8C fepibus: *ved Hejlskiøb ved Birhørd**
Flor. Maj. 8c Jun.

116. *Narcissus*,

Corolla infera, hexapetala. Nectarium mono-
phyllum, campanulatum, extra lamina.

107. *N. Pseudo-Narcissus*, spathe uniflora; nec-
tario erecto, crispo aequante petala ovata.

In vallo rarius: *ved Baturiet Quintu**. Flor.
Mart. 8C Apr.

137. *Allium*.

Corolla infera hexapetala. Spatha multiflora
Umbella simplex.

108. *A. Scorodoprasum*, caule planiusculo bulbi-
fero; foliis marginibus 8C carinis deorsum sca-
bris; vaginis arcipitibus; flammibus tricuspida-
tis; spathe brevibus.

In aggeribus Hatnise 8C Cafielli frequens. Flor,
Jun. 8C Jul.

109. *A. oUractum*, caule teretifolio bulbifero fo-
liis scabris femiteretibus subtus fulcatis flami-
nibus simplicibus; spathe longis.

104 *Hexandria Monogynia**

In fruticetis; aggeribus Hafnia?: *imdhm Torbek og Papkrs-Mdle*; 6r/10/m 8C alibi. Flur. Jul. <C Aug.

310. *A. urfinufh*, fcapo qudo triquetro, foliis ovato lanceolatis; unibellis faihgiatis; fpatha monophyila decidua. Flor. Dan. Tab. 757.

Barius in fylvaticis locis: *vtd Klampenborg, <5r-holmj i Skoven tut ved Roe&kilde*. Flur. Maj. Jua.

118. *Tul ip a.*

CorollJ hexapetala csmpanulata. Stylusnullus.

JII. *T.fyk/ftris*, floie nutaute; petalis utrinque attenuatis, onmia apice ^C tria interiora etiam bad hirtutis; foliis lanceolatis. Flov. Dan. Tab. 375.

'In maeniis Hafniae SC Caffeili frequens. Flor. Maj. 8C Jun.

129 *Ornithogalum.*

Corollas hexapetala perfiftens, fupia mrdium patent. Filamenta *alterna*) bafi dilatata.

Florilms luteU.

JXS. 0. *luteum*, fcapo angulofo, folio unico lato-lineari, hafi vaginar.te; unibplla fni>plicif pedunculis ftibaequaribus laevibus; involucro diphylo: fulio!is inaequnhbus lanceolatis ob-'tufiufculis; petal is la>cei>Iatis oi>tufis.

In nemoribfts *tit* fylvis frtquens. Flur. *AprilL SC Maj.

- fylvnticum*, major, fpathis tri-terrapr-vl-
lis peduticulis fubiarn'ofis. Flor. Dan.
Tab. 378.

Habitat 8C floret cum praecedente.

313. 0. *minimum*, fcapo nud > [A forme, furfum
incraftato; **folii*** ex eo ipfebiJbo, angufUffi-
mis linearibus eaulew fuperantibus; corymbo
Jimp-lici; pedunculis ramofis; bracteis line-ari
capillaceis pedunculisque pubefcentibus; in-
volucromonop' yllo lanceoLto acutifTimo ; pe-
talis lanceolatis acutifiimis.

Rarius in nemorofts , fruticetis: *ved Jtigersborg
bug vtd Iloe - Magazinet imod Hunde-Siitn** Flor*
Apr. 8C Maj.

314. 0. *fpathaceum*, fcapo nudo fubtetete* furfum
incrallat:o; iolii', ex eo ipfe buibo^, anguftifii-
mis linearibus erectis; umb lit Qmplici, fu-
tiifloro; invt>lucro tri-penfapliyiJo r (**ottolii**
inH?qiialibus fubciliatis; ftylo hlatnentis ton*
giori. Flor. Dan. Tab. C12. *pete lis obtufis*.

Hand infrequetiis in uemoiffis: *Ftttrichsbtrg-
Havt, Dn. Rafn* invenit. Flor. Apr.

** Floribu* albis.

315. 0. *umbtllatum*, fcapo undo; foliU linearibus;
florittus corymbofis; pedunculis fcapo altiori-
bus fnnplicibus, br*cteis fpathaceo-membra-
naceis.

In vallis Hafnia 8c CaAdli laud frequeru. Flor.

Jun.

316. *O. nutans*, fcapo pedalis* Sc altiori, nudo, ii
raieninm fecundum tenninante; iloribusmag-
nis nutantibus; pediu.culis unifloris; bractei
membranaceo- fpath.ceis. Flor.Dan.Tab.t)!*.
Habitat cum pncedente fatis frequens. Fioi
Maj,

130. *Ant hericum.*

Corolla hexa.petala patens. Capfula ovata.

317, A, *ramofum*, foliis pi an is fubcanaliculatis,
caule ramofo; corollis piauis; pilullo recto*
Flor. Dan. Tab. 1157.

In collinis fructicufis: *imellem Sorgeiifrie* oj
Bredei; ran us in aliis iocis. Flor. Jun. Jul.

131, *Afparagus,*

Flores diaicae* Corolla hexapetala campanu-
Jati, petal is tiibus iuterioribus apice reilexis.
Bacta tnocularis, dirpenna,

318. 4. *ajficialis* % caule herbnceo 'tereti er^tt o
rarnaio; foliis fetacels fuiciculatis uniiloris.
Floi. Dun. Tjb, 508.

~In marittmis iuterdum occurrit; paa *Amager* ;
ved *Tomtnerpladsetu* Fl6r. Jun. Jul, 8c Aug.

Ij2. *Convallaria**

Corolla ftx vel quadrifnia, Bacca bi vel tx'f
locularis, ante rnatmi,atem maculofa.

fig. '- *majalis*, ioliis pltnimque duo, ovato-ob-
longis hji vjgituiitibts in petiolumdecurren*
%ibu&; kapo trecto, nudo, xaccuio fimplic,

fecundo apice funtante, terminate; flores nutantes; corollis campanulatis. Flor, Dan, Tab. 854-

In nemorosis atque humidis fere ubique, Flor. Maj. 8 Jun,

320. *C. verticillata*, caule erecto folioso; foliis lanceolatis quaternisve verticillis; pedunculis bi-tri-quadrifloris axillaribus; floribus oblongis viride-albescentibus, Flor, Dan. Tab. 86,

In fruticetis: circa Birkerød, KyUingi fed frustra quaefivum FIOJ. Jun. 8 Jul.

321, *C. Polygonatum* caule erecto folioso, simplicifloro, ancipiti, anguloso; foliis ovalibus, amplexicaulibus alternis; pedunculis axillaribus umbellatis. Flor. Dan. Tab. 377.

In fruticetis rarius in elevatis ficcis; imelUm, FugUlivad og Brede Bakker. Flor. Jun. 8 Jul

322 *C. multijlora* caule erecto folioso, tereti; foliis ovatis amplexicaulibus; pedunculis axillaribus tri-quadrifloris; filamentis pilosis. Flor. Dan. Tab. 152,

In fruticetis, ferebus haud infrequens: bag ved Ordrup Dyrthavt; Sorgenfri Birkerød. Flor, Jun. 8 Jul

323 *C. bifolia*, caule erecto teretifloro; racemo simplici erecto terminato; foliis cordatis; corollis quadrifidis laciniis revolutissimis. Flor. Dan. Tab. 99r, ^ iylvis frequens. Flor. Jun.

133* *Aca, r u s.*

Synflix cylindrico-conicus, tectus flosculU.

Stylus nullus. *Caplula* trilocularfa*.

324. *A. Calamus* f capi micrnie longifiima folia*
cea. Flor. Dan. Tab 1158. .

Fret[uens in iofys, rivuU, lucubus. Flor. Jun,
& Jul.]

134. *Juncus,*

Calyx hexaphylins. *Corolla* nulla. jLlajpfuli
ovata tiicjietra uiulocul.iris moaofperma-tri'
fperma vtl tril.»cuLi. is polyfperma.

* *Cuhnis* nudis.

325. *J* congtanuratus*, culmo nudo ftricto; capi'
tulo lateral!; bracte^ caly^ulatis duo ^{minutis}
ovato lanceoUti^ . Flor. Dan. Tab. 1094. 3

Freqnens in paiujJofis, Uirfbfis, fofis. Flor. Juii'
& Jul.

t*6. *J. tffitfus*) culmo nudo ftricto; panicula late
rali; ft tribus ovatis obtuftufculis: foliolis ca*
lycinis a?tp.ialibus, ovatis, brevi inucroaatis.
Flor. Dan. T o . 1 196, jj \

Habi&t Sc floret cum praecedenti. *

327. *J gtdUtuf*, culmo nado, Uxo, glauco: apice
membraruceo incurvo; p.inicua laterali; flo-
rib us ovato-lanceolatis: foliolis calycinis
terne minoiibus lanceoljto-fubtilatis; capful^
oblongis. Flor. Dan. Tab. 1159.

Haud^r^quens it) toflis: ikke la>gt fra ^{Flafke}
kroen: i den Griivtt ved Ganiifonskirkigaard, ^{som}
vender imo dKafleUt- Flor. Jun.

328. *J. fliformis*, culmo nudo foliis nudi subn-
tante; panicula terminali pauciflora; cymis
tribus alternis minoribus obtusis.
Flor. Dan, Tab. 1207.

In aquis paludosis fugnantibus, piscinis; *inter
Gladjaxe og Teprimojt; i Ilirichholm-Ækuv.*
Flor. Jun.

339. *J. squarrosus*, culmo nudo; foliis fetaceis;
capitulis involucriatis, aphyllis; florum ovato-
lanceolatis obtusiusculis persistentibus rigidis,
breviter pedicellatis. Flor. Dan. Tab. 430.

In pratis paludosis turibis: *Ordrup, Bagvard*
Birktrind Sc.* Flor. Jun. 8C Jul.

** Culmibus foliosis, teretibus.

330. *J. articulatus*, culmo folioso decumbenti;
foliis articulato nodosis, subcompressis lineari-
bus; panicula terminali conopsea; floribus
racematis sessilibus; foliola callosa obtu-
siusculis. Flor. Dan. Tab. 1097.

Frequens in paludibus. Flor. Jun. Sc Jul.

331. *J.ylvaticus*, culmo folioso erecto; foliis
retibus articulato nodosis; panicula terminali
supra decomposita, diffusa; foliis *callosis*
mucronatis angustioribus acutiusculis tribus in-
terioribus paulo brevioribus,

Rarius in paludibus turfosis: *inter Ordrup*
Skov og Dyrthave.* Flor. Jun* 8C Jul

332. *J. retroflexus*, culmo folioso erecto; foliis
retibus articulatis; panicula terminali supra
decomposita, diffusa; *foliis* **bitrioni** *pe-*

dunculis jartialibus patentifTin.is fubrctre
 * lltxis; folitilis calycmis ovatis obtufis, inse-
 qudlibus, marginfi rnerbranaceo-fcariofe fub-
 licero. ivfl/>? I. c. p. 455.

In paludt turfofo : *imellem Ordrup* Skov og Dy-
 fthave** Flor.Jum (*culmus tri-quadripedalis.*)

633' *J> fabverticillatus*, culmo foliofo repente, ad
 florum glomcrulas prolifero; foliis fetaceis,
 iubarticulato-nodofis; foliolis calycinis in*
 tjualiljus: exterioribus acutis: interioribus
 paulo ttiajoribus, obtufis; conniventibus;
 floribus omnibus in gl-unerulos fe(files, fasci-
 culum folioqum producentes, collectis. Flor-
 Dan. Tab. S17*

In paludibus 8C pi^rcinis exficcat. *Hirfchholms
 Skov; Lyttgbye; Bhvtrbd.* Flor*.Jun. 8C Jul.

34. *l. fnpinuS)* culmo foliofo fubrecto, vtl fnb-
 dtcumbtnti; foliis canaliculato -filitormibus;
 foliolis Cdlyciuis acutis lanceulatis; floribu
 glornerato- verticillatis interditi fasciculur>
 foliorum producentibus. Flor. Dan. Tab. 1099.

In palutiofisSC in aquis ftagnantibus: *Birkeriid
 Bagjvard Si aiiis locis.* Flor, Jun. 8C Jul.

\$35. *J. bulbofuSf* culmo erecto fubfoiiofo, fub-
 compreflti, fimplici; fo'iis linearibus canalicu*
 latis, bafi vaginantil)us, culmo brevioribus¹
 flualibtia duo inaequalibus, altero panicula
 fubaequali; panicula erecia inaeqnalis fructu
 nlaturo corymbufa; capiulis oblongo-globolis

ftificis nitidis calyce longioribus*. Flor. Dan.
Tab. 43x.

In pratis humidis frequens.

culmo folioso erecto striato; foliis radicalibus culmique lineari-caniculatis rigidis subulatis; basi vaginantibus: floribus duo panicula multo brevioribus, subulatis, vaginis subventricosis membranaceis; panicula magis contracta; foliolis calycinis ovatis marginatis scariosis obtusifolius; capsulis subglobosis nitidis calyce aequalibus. An J. Sprengeli Wilden. ?

Jj6. *J. bufonioides* culmo folioso dichotomo; foliis subangulatis; floribus foliariis sessilibus remotis; foliolis calycinis inaequalibus, lanceolate subulatis, acutifloris; capsulis ovato-oblongis obtusifloris subtrigonis calyce brevioribus. Flor. Dan. Tab. 1098.

In locis inundatis fere ubique. Flon Juru Jul.
k Aug.

*** Caule folioso, foliis planis.

Jj7. *J. pilosus* culmo erecto 7 foliis planis pilosis; corymbo subsimplici: pedunculis subsimplicibus; foliolis calycinis ovato-acuminatis, capsula brevioribus* Flor. Lond. Tab* 345^

In umbrosis sylvaticis, Flor. Apr. 8c Maj.

Jj8. *J. maximum* culmo erecto*, foliis planis pilosis; corymbo composito» pedunculis subtri-

U2 *Hexandria Monogynia.*

floris; foliolis calycinis lanceolatis, mucronatis, capfuU sequaUbus. Flor. Dan. Tab* 44c. Haud inhequens n i>lvis tit elevat̄s nemor^fis locis. Flor. M*ij. 8c Jun.

\$39* *J> campestrisi* foliis planis pilosis; fpiculis pedumUdsIubunibcl atis, media feOili; foholās calycinis lanceolatis acuminatis çapŭla Ion* gioribus. Fior. Lond. Tab* 140.

ID prat is frequens. Flor, Apr. 8C Maj.

6* culrno pedali bipedaU graciliori; foliis angustioribus longioribus 8C tenerioribus, fpiculis sex, octo, novem; oblongi^, pedunculis clongatis 8C divaricatis; floibus ante evolutionem argea* teo^fplendidis.

In pain(Hbus; *i Langmofen ved Dronninggaard, i Dyrehavtn.* Flor. Jul

135. *Peplis.*

Periantheum campjnulatum, ore duodecim iido. Petala Tex calyci inferta fugaciflicna. CapTula bilocularis fupera.

\$40* *P* Portula*, caule ratnofo repente fubtetragono foliis oppofitis obovatis obtufis in petio* lurn brevem decurientibus; floribus axil 1 art' bus* parvis, folitariis^ feffilibos. Flew, Dan* * Tab. 64.

Baud frequent in locis innndatis* *i GialJkoQi Jiagfv&rd; Birkerod; JErmtlundlwftt.* Floi. Jul> Jul Aug. 8C Sept.

TRIGYNIA.

136. *Rumex*.

Calyx triphyflus. Petal a. tria perfiftentia con-
niventia. Semen iinicum trLquetrum,

* Fidres bermaphroditi, valvulis granulato
notatis.

[41. JR. *Kydrolapathum*, valvulis integris omni-
bus graniferis; foliis lanceolatis, bipedalibus
& ultra, fubundulatis, acutis, in petiolum
defluentibus; caule bi-tripedali 8c altiori ful-
cato ramofo.

In foffis, aquis ihgnantibus, lacubus: *ved Ka
Jlels-Graven, Ordrup, Gientofte-Soe 8C aliis lo-
cis.* Flor. Jul. 8C Aug.

[t. *R. crispus*, valvulis integris graniferis reti-
culatis; foliis radicalibus cordato lanceolatis,
caulinis lanceolatis, omnibus undulatis acu-
tis; caule erecto bi-tripedali ftriato ramofo
ramis adprt-flis. Flor. Lond. Tab. 104.

In ruderatis, agiis ad via* frequens. Flor, Jul.
1C Aug.

113, JR. *NemBlapathum*, floribus verticillatis: ver-
ticillis remotis patificioris: vlvulis incepti
graniferis: gratiulo unico maxhno. Foliis
infernis cordato lanceolatis, fupremis lanceola-
tis acutis; caule erecto bi-tripedali ramofo:
ramis divaricatis. Fjor. Lond. Tab. 1JJ1.

tn nemorofis humidis: *i Ordrup-Skov; Dyre-
havtj Bagfv&rdtit* alibi. Flox. Jul. Sc Aug,

344. *R. mar'ttirnus*, verticillis approximates, multilobis; valvulis graniferis, -dentate ciliatis; foliis radicalibus oblongo-lanceolatis caulini i SC floralibus majis linearibus, omnibus undulatis crenulatis, floralibus autem integerrimis; caule pedali & ultra ramofo; ramis subdivaricatis. Fior. Dan. Tab. 1208.

In maritimis nec non in piscinis; aq. fossas: *i en Dam i Hirfchholm-Skov \ ved Birkerød; ved Flakke Kroetu* Flor. Jul. SC Aug.

345. *H. obtusifolius*, valvulis dentatis graniferis, acutis; foliis radicalibus cordato oblanceolis, caulinis ovato-oblongis omnibus undulatis obtusis; ramis adpressis. Flor. Lond. Tab. x6g.

In ruderalibus, humidis fylvaticis: *ved Bernstorff-Sjttqvist Bagvard-Skov 8Cc.* Flor. Jul. & C Aug.

346. *R* acutus*, valvulis dentatis, graniferis; granulo unico majori; foliis cordato oblongis acutis; ramis laxis divaricatis. 3

In ruderalibus, fylvis: *i Bagvard-Skov 8Cc.* Flor. Jul. SC Aug.

** Flores diclini.

347. *R. Acetosa*, foliis oblongis cordato fagittatis; caule simpliciter erecto. *Blackw.* Tab. a 30. 35

In pratis, pascuis. Flor. Jun. SC Jul.

348. *R. Acetosella*, foliis hastato-lanceolatis, lobis binis longius productis praeditis. Flor. Dan. Tab. n6r.

In agris iiccis Sc haud fertilibus. Flor. aestate.

X³⁷- 'Scheuchzeria.

Calyx hexaphyll,,,. Corolla nulla. Styli nulli.
 Capfulae apicc- dehilcentes.

349- *S. alujris*, cul, no erecto > ghm > geni culato,
 fltxuof; foliis carnoHs fcmicerecibus; "brae
 te,s monophyllis, fpathaceis. F, or Danic.
 lab. 76. \

In paludibus turfosis haud f_{req},ens.- ved *Dran.*
nmgaard i Lungmofin; ved Zynvbye. Aoe • i
Ma-en ved Jindergaard; ved Htjlekiib ved JiirA,
 rod. Flor. Jun. & Jul.

138- *Trichlochin.*

'Calyx nullTM. Pttala feX; unguibus infle:cii
 antbenfens. Stylus nullus. Stigmata pl_u.
 mofa. Capful, tri-fexlocularis, bafi dehi.
 iceus. Semina folitaria.

50. *T. palufre*, floribus inferioribus peduncula
 tis; capfulig fublineanbus trigoms trilocuJari-
 bus. Fior. Dan. Tab. 49.

In pratis humidis SC paludosis: *i en Mofe ved*
BernHorf 8Cc. Flor. Jun. Jul. gc Aug.

r. *T. maritimum*, floribus omnibus feHilibus
 approximatis; capfulis ovatis, hexagonis f_{ex},
 locularibus. Flor. Dan. Tab. 306.

tnrnaricimis: *ved Fla/tekroem irneliem Kaftllei*
U Conflantia; Amagtr, Flor, Jun. Jul ^
 Aug.

P O L Y G Y N I A .

139. *Alisma.*

Calyx triphyllus. Corolla tripetala. Capful*
fex vel plurimae, coriaceae, compressae, uni-
loculares, polyfermae.

352. *A. Plantago*, foliis ovatis acutis, petiolatis;
caule erecto nudo: ramis verticillatis uni-
floris; capsulis obtuse-trigonis. Flor. Danic.
Tab. 56r.

In fossis, lacubus frequens. Flor. Jul. t̄ Aug*

353. *A. ranunculoides*, foliis in orbem congestis
lineari-lanceolatis in petiolum decurrentibus;
caulibus nudis apice umbelliferis; capsulis
globosis squarrosis. Flor. Dan. Tab. 123.

Rarius in pratis humidis 8C lacubui: *wd Peh
lingefoi*. Flor. Jul. SC Aug.



CLASIS VII
HEPTANDRIA . .

MONOGYNIA .

Trientalis. Calyx heptaphyllus. Corolla **sep-**
tempartita, plana. Bacca exfucca unilocula-
ris, futuris variis dehifcens!

<*Esculus*. Calyx monophyllus quadri-quipe-
dentatus, vratricofus. Corolla tetra-penta-
petala calyce inferta. Capfula trilocularis,
trivalvis.

I j 8 *Heptandrid Monogynia.*

MONOGYNIA.

140. *Trientalis.*

Calyx heptaphyllus. Corolla feptempartita, plana. Bacca exfucca, unilocularis, futuiiff variis dehifcens.

354. *T. europea*, caule erects digital! vel fuh palmari apice foliofo; foliis fubverticillatis, ovato-lanceolati;; floribus folitariis rarius geminis pedunculatis; pedunculis erectis. Flor. Dan. Tab. 84.

In fruticetis 8C fylvis: *i Krattet ved Fuglehvad Mølle; Bagfv&rd-Skov; Gial/kov; Rudergaard Sc alibi.* Flor. Maj. 8C Jun.

141. *jEfculus.*

Calyx xnonopbyllus quadri-quiaquedentatusf venCricofuf. CoroUa tetra-pentapetala*, calyce inferta. Capfula tiilocularis trivalvis.

355. -<E* *Hippocqftanum*, foliis digitatis feptenisj corollis pentapetalis, patulis. Paitim ia hoitis, aiboretis. Flor. Maj. Sc Jun.



C L A S S I S VIII.
O C T A N D R I A .

M O N O G Y N I A .

Othothena. Calyx tubulosus quadrifidus, Petala quatuor. Capsula cylindrica, infera. Semina nuda.

Thalictroides. Calyx tubulosus quadripartitus. Petala quatuor. Capsula oblonga infera. Semina pappiformia.

Thalictrum. Calyx monophyllus superus. Corolla monopetala. Filamenta receptaculo inferta. Sacca quadrilocularis, polyperma.

Thalictrum flavum. Calyx tetraphyllus. Corolla subquadripartita, Filamenta receptaculo inferta. Anthere bifidae. Capsula quadrilocularis.

D I G Y N I A .

Thalictrum flavum. Calyx quadripartitus, superus, coloratus. Corolla nulla. Capsula bifida, bilocularis, polyperma.

T R I G Y N I A .

Polygonum. Calyx nullus. . Corolla monopetala infera, partita. Stamina quinque vel octo» Stylus unicus vel tres. Semen unicum, angulatum*

T E T R A G Y N I A ,

*Paris** Calyx tetraphyllus. PetalaJ quatuor linearia. Antherae dorsales, Eacca globosa tetragona, quadriloculari&

Adoxa. Calyx bi-tripartita infera. Corolla¹ quadri-quinquefida. Stamina octo in flore capitulum terminante, in lateralibus vero deceta. Bacca quadri-quinquelocularis.

Elatine. Calyx Tubtetraphyllus. Petala tres vel quatuor. Capsula subquadrilocularis, subquadriivalvis, depresso.



M O N O G Y N I A.

142. *Oen oihera.*

Calyx tubulofus quadrifidus. Petala quatuor*
 Capfula **cyHndrica** infera. Semina nutia.

- S56.** *Oe, biennis*, foliis ovato-lanceolatis, planis
 caule muricato villofo. Flor. Dan. Tab. 446.
 Atl vias nonnunciuanL vt di: *ved Charloitenlundy*
og Conjlantia. Fior. Jul. Aug. 8c Sept.

143. *JEpil.oltium.*

' Calyx tubulofiiis **qtia dripartitus**, Petala qua*
 tuoi. Capfula oblonga infera. Semina pap-
pofa.

357. *A utiguiifolia*, foliis fparfis, lineari-lanceo^
 latis, **integerrimia** vel repando denticulatis,
 venofis; floribus inae([ualibus, fpicatis: fpicu
 terminalibus. **Flor.** Dan. Tab. 289.

Haud frequens tarn in locis paludofis quam in
fepibus ficcis: i Egnep omiring Birkerlidyimd-
tern llrjkiob- Gaard og Stavns hold; tike tangt fra
ftumpcdats Moth pan en Balkt ,• ved Bernjlorf-
Skovati i Fredensborg- Have. **Flor. Jul. Aug.**
 Sc Sept.

358. *JZ. hJtfuium*, foliis oppofjtis alternisque fe-
 rn iam pi ex tcauli bus. fubdecunrantibus, ovato-
 lanceotatis ferratis villo•fo-hirfutis: "caule
 erecto raniofiffjmo htrfuto. Floribus folitariU
 axillaribus. Flor. Dan. Tab. 3,6.

In littoris lacuum, in rivulis, foflis: *vtd Valbye*,
Bernftorf; Springforbie.

«. floribus albis; foliis ferrato-dentatis
villofioribus; caule hirsutiori.

Ved Springforbie.

359. *JB. pubescens*, foliis lanceolatis plerumque,
oppositis, dentatis, utrinque pubescentibus;
caule erecto simplicifloro; floribus foliariis
axillaribus. Flor. Dan. Tab. 347.

In locis humidis, foflis, ad rivulos: *Ordrup-
Mofe* Tepri'blojt; imellem St. Hans Hofpital
og Rclightd 8Cc.* Flor. Jul. Sc Aug.

«. Foliis villofo-fericeis; *tnule* hirsu-
futo - villofo*

360. *25. montanum*, foliis oppositis, fummis al-
ternis, ovato cordatis, dentatis, feflihus vel
breviflime petiolatis, glabris; caule fimplice
fuperne vix pubescente. Flor. Dan. Tab. 9??.

In locis fylvaticis 8C fepibus ficcis lapideis, ra-
rius in humidis: *Bagfyrd, Hirfchliolm; Char''
lotunlund; Sorgenfrie 8Cc.* Flor. Jun«Jul. Aug.

«. caule ramofifimo.

360. *E. nudum*, foliis ovali-lanceolatis, ferrato
dentatis acutis petiolatis: infimis oppositis:
fummis alternis, glabris; caule erecto ramo*
fifloro, glabro, fuperne pubescente, terete.

In locis humidis, foflis: *bag vtd Lundehufets
wed Frederichsberg.* Flor. Jul 8C Aug.

361. *E. urraganum*, fohis lanceolatis, denfcicula*
tis, feffilibus, fubdecurrentibus, glabiis;
caule erecto fupeine ramofo fubtetragono.
FJor. Dan. Tab. 1029.

In paludofis, foflis: ved *Flajkekroen*; *Bernflorfs**
Veien 8Cc. Flor. Jul. Aug.

362. -*E. palii/tre*, foUis lineari - lanceolaris inferio*
ribus oppofitis fuperioribus alternis, inttger*
rimis; caule eiecto, fimpliciffimo, pubefctnce_f
rubicundo.

In paludofis haud infrequens. Flor. Jul. 8c Aug.

a, foliis ovato-lanceolatis obtufioribus;
infimis ovahbus. *

In declivis inter *Thorbek* 8C *Springforbii*. ~~Flor.~~
3ul/8cAug.

144. *Vaccinium*.

Calyx monoplyllus fuperus. Corolla mono*
petala. Filamenta rceptaculo inferta,

363, *V. Myrtillus*, foliis ovatis, ferratis. acutis,
fubfeffilibus, deciduis; caule palmari lubpe-
dali angulato; iloribus folitariis; coroltis glo*
bofis^o quadridentatis; calycibus truncatis.
Flor. Danic. Tab. 974.

Frequens in eiectofisfylvaticis; *Gialjkov*; *Bir-
Urod*; *Hirfchholm* 8Cc. Flor. Maj. Sc Jun.

fr>l. *V. uliginofum*, foliis offiovatis, integerrimis,
obtufis, glabris, fubtus venofis, deciduis;
caule pedali bipedali que ramoffimo; ilorikiis

folitariie; corollis ovalibus, quadridentatis
calycibus quadrifidis. Flor. Dan. Tab. 231.

In paludosis ericetosis fylvaticis: *Bagfvard;*
Heljingör; Hirfchholm; BirkerödOtc. Flor. Maj.
8C Juiu

565. *V. Vitis idaa*, foliis obovatis, revolutis,
subintegerrimis, apice glandulosis, subtus
punctatis; caule procumbenti demum adscen-
denti palmari SC baud ultra; racemis termi-
nalibus nutantibus; corollis ovatis quadri-
fidis. Flor. Dan. Tab. 40*

In ericetis, turfosis: *Birkeröd; Hirfchholm;*
Friderichsborg; Helfwögör. Flor. Maj, & Jun.

366. *V. Oxycoccus*) foliis ovatis, integerrimis re-
volutis; caule repente filiformi; lobis* sub-
umbellatis terminalibus; corollis quadparti-
tis, levolutis.

In paludibus turfosis obsoletis cum Sphagno pa-
lustris. Flor. Jun. SC Jul.

145. *Erica.*

Calyx tetraplyllus. Corolla subquadrifida.
Filamenta receptaculo inferta. Antheras bifi-
dae. Capsula quadrilocularis.

367, *E. vulgaris*, floribus racemosis terminalibus;
corollis campanulatis subsqualibus; antheris
bifidis; filis exsertis; calycibus duplicatis;
filamentis sessilibus sagittatis. Flor. Dan.
Tab. 677.

Ubique, praefertim incultis locis. Flor. Jul.
Aug. 8C Sept.

36g» *E. Tetralix*, floribus capitatis, terminalibus;
calycis ovatis; antheris aristatis; foliis inclusis;
foliis verticillatis, quaternis, aristatis,
ciliatis, subtus glabris. Flor. Dan. Tab. 81*
In ericetis rarius: *ved. Friderichsvark; Odshantd*
ubi *Dn. Markuffen* invenit.

DIGYNIA.

J46. *Chrysofolium*.

Calyx quadripartitus, luteus, coloratus
Corolla nulla. Capsula bivalvis, bilocularis,
perispermata.

369. 671. *altissimum*, foliis reniformibus, cre-
natis, caulibus alternis pilosis, petiolatis: flo-
ralibus feffilibus. Flor. Dan. Tab. 356.

In humidis umbrosis; *Chartottentuml; Djre**
have; Bagfv&rd; Birkerød 8Cc. Flor. Maj. Jun.

70. *Ch. oppositifolium*, habitu praecedentis; To*
His caulibus oppositis. Flor. Dan. Tab. 365*
Rarius cum antecedente. *Rafn. I, c. t. p. 6ax.*

TBIGYNIAi

147. *Polygonum*.

Calyx nullus. Corolla monopetala, inflexa,
partita* Stamina quinque vel octo. Stylus
unicus vel tres. Semen unicum, angulatum.

* Floribus pentameris.

371. *an%ophibium*, floribus pentandris femidigynis, spicis tetrameralibus ovatis; foliis cordato-lanceolatis petiolatis; vaginis hirsutis muticis. Flor. Dan. Tab. 28*.

In piicinis, Ljebu6, foliis. Flor. Jun. Jul.

«. *urrefre*, foliis scabriusculis, subfimbriatis; vaginis longioribus.

In locis inundatis; ad margines fossiarum.

* * Floribus hexandris.

17*. *P. Icpathifolium*, floribus hexandris, digynis spicis erectis demum mitantibus ovato-cylindricis pedunculis scabris; foliis ovato-lanceolatis subtus punctatis; vaginis glabris muticis. Curt Flor. Lond. Tab. 66.

Incultis, humidis, ad fimetos. Flor. Jul. Aug.

p. caule maculis purpureis. Cuit^Flor.

Lond. Tab. 67.

In humidis: *udtn for Kastels-Porten imod Strandtn.*

«• *incanumj* spicis oblongis; foliis oblongo-lanceolatis subtus incanis.

In locis humidis: *ved Bronshoi og ved St. Ibs Kirkegaard i koeskilde, 8C aliis locis a Dn. Rafn. observatum.*

373. *P. Ptrficaridi* floribus hexandris. femidigynis; spicis ovato cylindricis; pedunculis glabris; foliis lanceolatis vel ovato lanceolatis, breviter petiolatis vaginis ciliatis. Flor. Dan. Tab. 703.

Ad vias, rivulos, in agris humidis &c. Fior,
Jul. Aug. Sc Sept.

«. folds maculatis.

374- i»- *Hydropiper*, floribus hexandris semidigynis; spicis filiformibus subnutantibus; corollis extus glabris; foliis lanceolatis, subundulatis in petiolum desinentibus; vaginis nervosis subciliatis.

In fossis humidis & locis hyeme inundatis. ^{Fi}
Aug. & Sept.

375- *J. minus*, floribus hexandris, subsemidigynis; spicis filiformibus; corollis quinquefidis; foliis lanceolatis; vaginis ciliatis; caule basi repente subprocumbente. Fl. Lond. Tab. 65.

In pratis Lyeme inundatis: ^{Pa} Nörre-Birkeröd. Flor.

Jul. Aug. SC Sept.

*** Floribus octandris.

376. *P. Bistorta*, floribus octandris, trigynis; caule simplicissimo monostachio; foliis ovatis in petiolum decurrentibus, Flo, Dan. Tab. 421.

In pratis humidis: ved Vebek og Roeskilde, Kylling. Nobis autem nunquam visum.

377. *P. wwiare*, floribus octandris, trigynis, axillaribus; foliis ovatis vel ovato lanceolatis; caule procumbente; vaginis dentato-ciliatis. U bique. Flor. seacte. ^Varietates notabiliores sunt.

«• *latifolium*, Retz.

0. *breiifolium*, J. Eletz.

y. *erectum*, Roth vef *aphyllum*, Ketz.

#»** Helxine, foliis cordatis.

378. P. *Convulvulus*, iloribus octandris, trigyr/*
racemis axillaiibus terminalibusque paucilo-
ris; foliis cordatis, acuminatis, petiolatis;
caule volubili angulato. Flor. Dan» Tab. 714.
Inter fegetes; in dumetis. Flor. Jul. Aug.

T E T R A . G Y N I A .

148. *Paris.*

Calyx tetrapliyillus. Fetala quatuor lineaiia
Antherae dorfales. Sacca giobofo-tetragona,
quadrilocubris.

379. Par* *quadrifolia*, foliis ad apicem caulis qua-
tuor, ovalibus, feffilibus. Flor. Dan. Tab.

139-^k

In umbrosis fylvaticis, humidis : *Charlotun-
lund; Fridti ichsdalsveien ved Kongshvik; i Sko*
ven ved Heftkiob vtd Birkerod SCc.* Flor. ultim*
Maj. 8C Jan.

149. *Adoxa.*

Calyx bipartita infera. Corolla''quadri-vel.
quinquefida. Stamioa, octo in flore capituluif
terminante, in lateralibus vero decern. Bacd
quadri - quinquelocularis.

380. A. *Mojchatellina*, Foliis radlcatibus biternati*
foliolis trifidis: caulixiis oppofitis ternati% Li*"

niis bi-tnlobisve: caule eiectò funplicffimòj
radice squamata. Flor, Dan, Tab. 94.

In uernorofis :* *CJuiflo(tenlurul; Jagersborg fa**
Flor, Apr. & Maj.

150, *Elatine,*

Caly^: ftibtetrijpbylliis. Petala tres *vel* qua*
tuor. Cip^ula fubquadulocularis, fubquadri*
valvis, depreiTd,

t0j. J£* *Hydropiper,* foliis ovalibus in petiohim
flecurentibus, oppofitis, glabris, in^egris;
caulibus fub aqua vepentibus, ramofiffimis,
dicbotomis, Flor. *£ten*, -Tab, 156.

In fundo pifcinuin; / *dm melUmJle Fifkz-Dam*
i Fruefkov bag ved Bågfvteri, hbv&nl J?rof% Vahi
invenit, Flor. Junf

 CLASSIS IX.

 ENNEANDRIA *

HEXAGYNIA.

Hummus. Calyx nullus. - Corolla hexapetala
 Capsula; fex, polypermae.

HEXAGYNIA.

 151. *Butumus.*

Calyx nullus. Corolla hexapetala. Capsula
 fex, polypermae.

382. *B. umbellatus*, foliis enfiformibus, triquetri¹
 bipedalibus 8c ultra; fcapo erecto, tereti nrf*
 do foli>s altiori, umbel la fpeciofa terminatch
 Flor, Dan. Tab. 604. * * 1

In foll&s, lacubus: *i Stadtns-Graven**; *i Ldn*
huuM-Mojt; Gimtofu-Siie SCc, Flor. Jun, Jul
 & Aug. #

CHASSIS X..

DE CAND-RiA.

MONOGYNIA.

onotropa. Calyx nullus. Petala octo-
 frorum e?teriora basi excavato - mellifera.
 Capsula quadri . quinquelocularis, quadri
quiiuuevalvis.

Andromeda. Calyx quinquepartitus ^{1/3}J coloratu*.
 Co, ,,
 »**roiu** ovata, quinquedentata. Capsula
 quinquelocularis.

riutus. Calyx quinquepartitus, coloratus.
 Corolla ovata, quinquedentata > basi d iaphana.
 isacca quinquelocularis,

•<*dum.* Calyx quinquedentatus. Corolla pen-
 tapetala, plana. Capsula quinquelocularis basi
 dehiscens.

yrota. Calyx quinquepartitus. Petala quin-
 que. Capsula quinquelocularis, quinqueval-
 vis; angulis dehiscens.

DIGYNIA.

* *if rag**. Calyx quinquepartitus
 pentapetala. Capsula **birost** ^ , ^
 Polyfpenua. »«uar«,

Scleranthus, Calyx monophyllus quinqueli*
 dus, peiTiilens. Corolla nulta. Semen calyce
 inclufum.

Qypfophylla. Calyx campanulatus, monophyllus,
 angulatus. Petala quinque, ovata, fei-
 filia. Capfula globofa unilocularis, quinque-
 valvis,

Saponaria. Calyx monopbyllns bafi nudus.
 Corolla pentapetala. Petala uDguiculata.
 Capfula oblonga unilocularis.

Dianthus, Calyx rylindrkus, monophyllus
 bafi fquamis quatuor cinctus. Petala quiuqu
 unguiculata. Capfula cylindrica uniloculari

• T R I G Y N I A .

Cucubalus. Calyx inflatus. Petala quinque
 uncuiculata: iauce nuda. Capfula triloculari-

Siltne. Calyx ventricofus. Petala quinque un
 guiculata i iauce coronata. Capfula tril
 cularis.

Stellaria. Calyx pentaphyllus patens. Petal
 quinque bipartita. Capfula unilocularis pol
 sperma

Artnaria, Calyx pentaphyllus patens. Petf
 quinque integra. . CapiuU umlocjilaxis.

PENTAYNIA,

3tdurn. Calyx quinquetidus. Corolla pentapatala. Squar naj nectariferg quinque ad bafm germinis extrorfum iufertae. Capfulae quinque.

Qxalis. Calyx quinquepartitus. JPetala quinque baf cohserentia. Filamenta inaequalia, quoniiB quinque longiora, bafi connata. Capfula quintjuelocularis pentagona longiti*-dinaliter dehifcens.

Agrostemma. Calyx Tnonophyllus coriaceus. Petala (juinque unguiculata; limbo obtufQ indi vif«. Capfula unilocularis.

bychnis. Ca'yv iiionophyllus oblongus Ieevis. Petala quiuque unguiculata : limbo faept filTo, Capiula quinquelocularis.

trajlium. Calyx pentaphyilus. Petala bifida. (apfula unilocularis apice dehifcens,

pergula. Calyx pentaphyilus. Petala quinque integra. Capfula •vaU, uniloculari*, quinqueralvis.

M O N O G Y N I A .

152. *Manotropa.m*

Calyx nullus. Petala octo-decem, horum exteriora basi excavato --mellifera. Capsula quadri - (quinquelocularis, quadri - quinquevalvis.

383, *M. Hypoplthysy* fcapo fquamoso; spica terminalinutante; iloribus lateralibus octandis:¹, terminali decandro. *Sowtrby Engl. botan. Tab. 69.*

In fylvis, parasitica fagortim 8C quercuum railicibus: *i Hare/kov ved Bagft'mrd; GMfkov; vt d Rudergdard y Birherod ,• Dronninggaard 8t*.*
Flor, Jul.

153. *Andrameda.*

Calyx quinquepartitus coloratus. Corolla ovata quinquedenta. Capsula quinquelocularis.
lark.

384* *A* poiifolia*, pedunculis aggregatis; foliis alternis, lanceulatis, revolucis. Flor. *Danic.*
Tab 5V

In'p-alu iibus tuvfofts rurins; *i Mofen vtd Vün tappergdardeni i den Jlore Mofe Sag ved Stojgaard i i'Tcpri - Mofe,* **Flor. Maj, Sc Jun.**

154. *Arbutus,*

Calyx quinquepartitus, coloratus.
ovata quinquedentata basi diaphana.
quinquelocularis, pentagona.

Corolla
Bacca

385* *A. Uva urfi*, caulibus prucumbentibus; foliis integerimis. Flor. Dan, Tab, 33.

In ericetis: ved *Thisvilde paa Flyvijaydzt i ved Frtdet iksborg af Kylling.* Flon Jun.

155. *Ledum.*

Calyx quinquedentatus. Corolla pentapetala plana. Capfula quinquelucularis, basi dehiscens.

386. *L. palustre*, foliis linearibus, marginibus revolutis subtus ferrugineo-tomentosis; flaminibus corollis longioribus. Flor. Dan. Tab. 1031. *Vtd Ravnjirup, Loftrup, Steenlille; Kylling.*

156. *Pyrola.*

Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Capfula quinquelocularis quinquevalvis angulis dehiscens.

387. *P. rotundifolia*, flaminibus ascendentibus; pistillo declinato; foliis in orbem congestis rotundatis, petiolatis; capitulo erecto, squamis foliosis, terminate in racemum simplicem. Flor. Dan. Tab. 110.

In palude: ved *Lyngbye-Soë imod Jfriderichsdal* tantum vidi.

388* *P. minor*, flaminibus pistillisque erectis foliis in orbem congestis, rotundato-ovatis, petiolatis, duriusculis; capitulo, squama unica, terminato in racemum simplicem; corollis subcampanulato-globosis. Flor. Dan. Tab. 55.

In fylv'n hand inrV^uens: *Bagfvard; Fndcricht**
dal; RwUrgaard ?Cc. Flor. Jim. 8C Jul.

389. *P.Ctcunda*, pill = l'is erectis, coroliis longiori-
bus; fohis alternis Sc oppositis, rorundato-
ovatis, acutis, ferratis, **duriufculis**; racemis
fecund is. Flor. Dan. Tab. 402.

Ran us i n ; y' v i s: *Gi&Ijliov / Rudergdard; Htrjch*
*holm** Flor. Jun.

D I G I N I A .

157. *Saxifragtu*

Calyx qui'iqiiepardtLis. Corolla pentnpetals.

Capfula biroftris **uailocularis**, polyff>erma,

390. 6V *Hirculus*, ioliis Itiiceolatis, fparfis* mar-
gine Sc pra^cipuc bafi ciliatis, fellilibus: *Me-*
rioribus ovatis petiolii is; cAitJ ftoloniiera,
fuperae to men to ferrugineo, fubbifloru. Ho.
Dan. Tub. 200.

In palmiibus turfosis hand frfquens: *i Lang-*
mojen ved Dronnv•:ggaa • d ; bag vettDnmptdal s-
Moth irttlUm -Rudergcttrd og BirfarmL Flor
Aug. Sept. Sc Oct.

391. *S. gnnvtlata*, **foihl** hirtutis fcabrinfcuJiv
caulinis f^bieniormil)us vel trifldls, [objs in
cifit, fupr&mis lintarfcus: radicalibus re
formibus lobatis crenatis petiolatis; radi
granulata. Flor. Dan. Tab. 51 j.

In pratis irequens. Flor. Maj. 8c Jun.

J92. S. *trih!* <ictytUef, foliis plerumque trifidis pilo-
fo caulinis feffilibus, fupremU lineaiibus in-
tegris; caule ercto pilis glaodulofis. Flor.
Lond. Tab* 1*9.

In locis arenois hãud vulgaris: *paa Amagerpad.*
Interne.

1, >* *ScleranthUs.*

Cuiyx monopVyllus quinquefidus perffiteps.
Corolla mi 11 a. Semen calyce inclurui.

J93« *Scl. animus,* eaiycibus fructus^patulis; cau-
libus dilfufis fubeiectis dichotomis; foliis 1-
ncaribus fubulatLs oppofitis; floribus termina-
li >us fafciculjtis, laciniis acutis vix J')o *mai-
ginatis* Floi. Dan. Tab. 504.

Ubique iu pratis ficcis 8C irgris. Flor. sedate.

394. *ScL pertnnis%* ca^cibaş fructus ciaufis; cau-
libus decumbentibus; *Julis antecedent'* eras-*
Jioribus brevifibus; fioribus fafciculatis, laci-
niis obtufts, margine lalo albo memlranocto-
cinctis.) Ilor. Dan. Tab. 563.

Haud frequens in|pratis iiccis: *imdiem Fugle-*
hvads *''*Molle ag Brede*Bakker** Hoi. Jun. Jul.
0* Aug.

159. *Gypfophylla**

Cal>x campanuldtus, monophy lu^ angulatus*
Petala quinque ovata feffHia, Capfula glo-
bofa, uiniocii!ari5t qninquevalvis.

• *G. mural is,* caule eiecto, digitali, fubpaU
rmaii rainofodichotoiuoj foliis l. u. g. a. t. i. s. s. a.

nis, basi connatis; iloribus axillaribus Wrtünalibusque, longe pedunculatis, folitariis; calycibus subquinquepartitis: laciniis marginibus albido membranaceis cinctis, subconnatis; capsulis globofo-ovatis.

Rarius in agris, arvis, *murijt paa Murene om-Uring Kronborg, ved Hejtekidb Gaard ved Birkerbdpaa en Agtr tige for Gaarden i Skoven** Flor*
"Jul. usque ad Octobr.

IGo« *Saponaria.*

Calyx monophyllus basi nudus. Corolla pentapetala, petala unguiculata. Capsula oblonga unilocularis.

396. *S. officinalis** foliis ovato-lanceolatis, trinerviis, connato-folilibus, glabris; floribus fasciculatis, Flor. Dan: Tab. 543.

Haud infrequens: *ved Lyngdye Kirkegaard; ved Rudtsdal.* Flor. Jul. Aug. Sept,

i6r. *Dianthus**

Calyx cylindricus monophyllus, basi squamam quatuor cinctus- Petala quinque unguiculata. Capsula cylindrica unilocularis.

* Flores fasciculati. "

397. 2[^]. *Arnica*, squamis calycinis lanceolatis villosis tubum aequantibus; (caule recto ramoso* pedali tly ultimi, tereti Jacobriuculo; foliis linearibus appressis foliolibus pilosis: radicalibus oborato-oblongis obtusis.) Flor. Dani* Tab. 230.

Hand fr[^]quens in arenofis; mantimis: *ved Fla» fkekroen; Bnfoi val Bernjlorf; imellem Charlottenlund og Skøvshoved paa Bakkerne.* FLor. Jul. 8C Aug.

** Flores folitarii plures in eodem caule.

398. *D. deltoidts*, floribus folitariis, fquamis calycinis lanceolatis binis; corollis crenatis; (*cault digitally palmari, decumbenti, fupernt rarnofu, fi'opubefcenti; foitis Unearibus, fuUtlatis, marlinibus carinaque fubfcabridis.*) Flor. Danic. Tab. 577.

In pratis fylvaticis; fniticetis: *Charlottenland ; Vyrehave ; ved Lyngbye - Site ; Fridtrichsdal ; Fu&Ulwad-MöLU.* Flor. Jun. Jul. Aug.

399- &• *fuperbu?*, floribus paniculaco-corymbosis; fqainis calycinis brevibus acuminatis; corollis multifido capillaribus, unguibus jpilis ilavis praeditis. Flor. Dan. TaU 57ft.

In pratis & aggeribus marem verfus: *ved Flafkekrotn; rarior in all' is locis: ved NymöLU; <3rholm.* Flor. Jul. 8C Aug.

% *** (Jaule unifloro.

400. *J. arenariuf*, caul 1 bus fubunifloris, fquamis calycjnis ovatk obtufis; corollis multifidis fo« liis llinearibus.

In locis ficcis arenofis. Flor. Jul.

«• caule erecto, fubtrifloro; floribus erectis: fquamis calyciijis ovatis; petalis crenatis fubglabris, crenuhs incifo - dentatis, foliis anguljffirais liuearibus fubulatis ad ~~leg-~~

tern fubciljatis. An Dianthus' fylveftiis
Hoffm. Tafchenb. p. 198?

. In arenos .maricium: *imellem Chai lottmlund*
•g Skovi>hoved. Flor. Jul.

TRJGYNIA.

»

16*. *Cucubalus.*

Calyx infktus. Petala quinque unguiculata :
fauce *nwid.* Capfula triloculaiis.

401. (*k Bthen*, calycibus fuhglobofis glabris reti-
culato - venofis; capfulis fubiotundis. Flor.
Dan. Tab. 914."

In aggeribiib, iepibus, ad vias. Flor. .Tun. Jul.,

402. (*L ufepfus*, ho lib us lateralibus undique *de*
cumbentibus; caule indivifo; foliis bafi re-
llexis. Hor. Dan. Tab. 1209. (*hirfutoMfcofus.*)

Barius: *pan Out Oxlwlm iljejorden Dn.Holterr.*
Fior. Jun. Jul.

163. *Silent.*

Calyx ventiicqfus. Petala quinque unguicu-
lata: Fauce coronafa. Capfula triloculaiis.

403. *S. nutansy* petalk biadis; flmibus lateralibu*
fecundis cernuis; panicula aiitante. ^*Caulibu**
fiibvficidis; foliis rad callbns ovatis in paiolurr
*dicw*refbibus, caulinis lanceolatis.j* Flor. Dan-
Tab, a is.

In locis elevatis ficcis: *ved Bredes CharlottW*
*hind; linelUm Torbek og Papier**Molten** Flor.
Jan. VC Jul.

164. *Stellaria.*

Calyx pentaphyllus. Petala quinque, bipartite. Capsula unilocularis polyperispermica?

404. *S. nemorum*, foliis cordatis petiolatis; panicula pedunculis ramosis. Flor. Dan. Tab. 271.

In locis humidis praecipue nemorosis: *Lundhus-Mose; Charlottlund; Hirschholm Slot-Have.* Flor. Jun.

406. «*S. Holoftea*, foliis lanceolatis ferrulatis petalis bifidis calyce duplo majoribus. Flor. Dan. Tab. 698

Frequens in fepibus, fruticetis, nemoribus. Flor. Maj. Jun.

406. *S. graminea*, foliis linearibus integerrimis; petalis ultra medium bifidis vix calycem minoribus.

In locis nemorosis ficcis, fepibus, ericetis. Flor. Jun. 8 Jul;

a. foliis linearibus lanceolatis basi subciliatis (3 foliis linearibus angustifloris.

Varietas *a.* in fepibus et in paludibus legi.

407. *S. palustris*, foliis linearibus lanceolatis, integerrimis glaucis; petalis bifidis calyce majoribus.

In locis humidis, pratis, ad piscinas haud vulgaris: *Bagvardi ved Fjeldammene i Hirschholm-Skov.* Flor. Jun. Jul

408. *S. uliginosa*, foliis lanceolatis, basi subciliatis angustioribus > petalis bipartitis, calyce peraeque brevioribus. (pedunculis ternis *Jmtarclibiu* .)

*intermedio unifloro ; lateralibus dichotomis f^oci-
ciformis** Flor. Loud. No. 6\$.

In locis pnhidofis baud frequens: *ved Ermtlund-
hujtt imod Fortunm; ved Krattet ved Fughhvad*
Mollz; Dronninggaard, BalhrupsFlor. Jun. Jul.*

409. «*S. bnvifolia*, foliis lanceolatis baud trilmeau-
bus; pedunculis folitasiisa\Slaribus foliis Ion-
gioribus; p[^]talis ultra medium bifidis, calyce
vix longioribus. Flor.Dan. Tab. 415?

In maritimis: *ved Flajkekroen; imellemiKiöben-
havn og X*hek. Flor. Juru Jul,*

265. *Ar-enaria.*

Calyx pentaphyllus patens. Petala quinque
integra. Capfula unilocularis polyfperma*.

410. *A. peploideS)* foliis ovatis acutis apieibue re-
cur vis camofis; f>etalis calyce brevioiibus vel
aequalibus. Flor. Dan. Tab. 6124.

In arenofis maiitimis. Flor. Jun. Jul. , , •

411. *A. trinervia*, foliis ovafis acutis > ~~trinerviis,~~
in petiolum decurrentibus; petalis calyce
brevioribus. Flor. Dan. Tab* 429.

In fyivis, nenloribus frequens. Flor. Jun. Jul.

419. *A. ferpillyfolia'j* foliis fubovatis acutis feflili-
bus (*mucronatis*); petalis integerrinis calyce
brevioribus. Flor. Dan. Tab. 977.

In agris pratisque ficcisSCc. Flor. Jun. Jul. Aug.

413. *A. rubra*, foliis filiformibus, fubcompreflis
mucronatis internodiis brevioribus; ftipulis
jnembranaceisj calycibus caj[^]fulis aequalibus,
vifcofis.

In locis ficcis, aggeribus: *ved Bagfvard; Birforöd* 8C alibi. Flor» Jun. JuK Aug.

414. *A. marina*, foliis linearibus carnofis, longitudine internodorum; stipulis precedentibus multo minoribus; calycibus capsula dimidia brevioribus subpubescentibus. Flor. Dan. Tab. 740. In arenosis maritimis nec nori in aggeribus* Flor, Maj. Jun. Jul.

PENTAGYNIA.

166. *Sedum**

Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala» Squamse nectaritiae quinque ad basin geminis extrorsum infertae. Capsulae quinque.

415. & *Thetephium*, foliis planiusculis ferrugineis fuscis; corymbo folioso; caule erecto.

In locis ficcis dumetis, tectis. Flor. Jul. Aug. IC Sept.

- *. *purpureum*, foliis ovatis, carnofis, dentatis, obtusis, planis floribus purpureis. Flor. Dan. Tab. 686.

maximum corymbis confertioribus; floribus albido flavescens; foliis laeviter dentatis. Plenk. icon, plant, medic. Tab. 350'

In dedivis maritimis inter *Spring/orbit* og *Papiers - Molh.*

416. *S. acre*, foliis subovatis, adnato-ferrugineis gibbis erectiusculis alternis» cyma trifida. Flor. Lond. Tab. st].

In minis pratis ficcis, tectis fere ubique, FL. medio Juu, Jul. Aug.

167. *Oxa Us.*

Calyx q uniquepartitus, Petala quinque bali cohaereitfi-i. Filamenta inaequaJu quorum quiuque longiora, baficonu.ita. Capfula qwnquelocularis, pentagona > longitutiinaUter de liiVe s.

417. O. *AcetoftLla*, fcapo unfloro; foliis ternaMs obcordatis; radice dsatata, Flor. Dan. Tab.

In nemorofis, umbrofis ubiau^ flor, primo vere.

418." O. *Ilricta*, caule erecto ramofo; foliolis ternatis obcordatis, petiolis femiteretibus exrtipuhitis; petalis emari^inatis integris. Flor. Dan. Ta*b. 873.

Ralius in oleraceis cultis: ved *Frcderiksborg i tt Hdet Krat-og i Slotshaven fammejltds. Dn.Rafn.* Flor. Jun. Jul. Aug.

i6g. *Agro'stemma.*

Calyx nionophyllus, coriaeeus, Petala quinque ungmculata: limbo^obtufp indivifo. Capfula imitocularisJ

419. A. G. *ff/flgr*, liirfutajcalycibuscorollain aquapibus pe^aUs incegds nuclis. Flor. Dan, Tat\

576.

Inter fegetti« Flor. Juu, SC Jul.

169. *Lychnis.*

Calyx monophyllus, oblongus laey[^]s. Petala quinque unguiculata: limbo faepe Mb. Cap-fila quinquelocularis.

420* *L. Flos cuculi*, petalis tri-quadiifidis; capfulis fubrotundis; caule fulcato fcabiido. Flor_a Dan. Tab. 590.

In pratis huinidis. Flor. Jun. 8C Jul.

421. *L. Vifcaria*, petalis integris lubundulatis, floribus glomerato - raceme.fis tei minalibus; caule erecto ad genicula vifcido. Flor. DaA. Tab. 1032.

In pratis 8c elevatis ficcis: ved *Fugklwad MòUti*, Charlottenlund 8Cc. Flor. Jun. 8C Jul.

4\$U. *L. fylvejlrís*, petalis bifidis faepius fupra faucem dentatis *rubicundis*; capfulis fubrotundis apicibus recurvatis. Flor. Lond. Tab. So.

In umbroffis, fruticetis, alnetis: *Charlottenlund*; *Dyrthave*; *Ordrup-Mofe*; *Bernfiorf^Mofe*. Flor. Jun. 8c Jul.

4*3. *Xi. pratensis*, petalis fubbi fid is, albis; capfulis conicis quinque den tat is, apicibus rectis. Flor. Dan. Tab. 792.

Ad vias, in arvis fatís frequens. Flor. Jun. Jul,

170, *Cerajlium.*

Calyx pentaphyllus. Petala bifkla. Capfula unUocularis, apice dehifcens.

434. *C. vulgatum*, foliis ovato • oblongis; petalis calyce vix longioribus; caulibus¹ diffusis undique pilosis. Flor. Lond. Tab. J30.

In pratis, ad vias fere ubique. Flor. aestate.

42s* *C. viscosum*, foliis ovatis; caulibus erectis Tillofo - viscosis. Flor. Dan. Tab. nil.

In arvis, arenosis in arboribus: *imellem Charlottenlund og Skovshoved*. Flor. Maj. 7c Jun.

416. *C. ftmidecandrum*, foliis ovatis obtusis; fieribus pentandris; petalis calyce brevioribus emarginatis (*caule plerisque vix pollicari*). Flor. Dan. Tab. 1212.

In locis ficcis: *ved Char lottenlund imod Söen; imellem Gientofte og Jagersborg paadetoftmaat Bakker*. Flor. Apr. Sc Maj,

437- *C. arvense*, foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris vel subpubescentibus; corollis calyce majoribus. Flor. Dan. Tab. 636.

In arvis, fepibus: *ved Lyngbye; Sorgenfm fiCc** Flor. Maj. 8c Jun.

438- *C. aquaticum*, foliis cordatis fessilibus floribus folitariis; fructibus pendulis, caule fuperne villoso-subvilcido, interne glabro; petalis ad basin usque partitis.

Ad fepes, in umbrosis: *Lundthui-Moft; ved Emirup*. Flor. Jul. 8c Aug.

ift. Spergula.

Calyx pentaphyllire. Petala quinque integra.
Cap Tula ovata uiiiloculari* quii quevalvis.

459. 6'. *arvenfis*, foliis verticillatis, linearibus
pubescentibus; floribus decandris paniculatis,
polliniferentiam reclinatis. Flor. Dan. Tab.

In agris inter fegetes ad vias. Flor. Jun. Jul.
fc Aug.

430. *nodosa** foliis oppositis, fimbriatis, laevibus;
caulibus simplicibus. Flor. Dan. Tab. 96.

In pascuis subumidis. Flor. Jul. Aug.

431. *S. fimbriata*, foliis oppositis subsessilibus
linearibus fimbriatis carinatis ciliatis; floribus decan-
dris. Flor. Dan. Tab. & 88*

In pascuis siccis. Flor. Jun. Jul. Aug.



C L A S S I S X I .
D^o 6^o D E C A N D R I A .

M O N O G Y N I A .

Itythrum. Calyx duodecim dentatus, alternii minoribus. Petala sex calyci inferta. Capfula bilocularis polyperma.

D I G Y N I A .

Agrimonia. Calyx duplex: internus quinque-dentatus: externus diphyllus, foliolis trifidis. Petala quinque stellatim patentia. Sernina duo | nuda in fundo calycis.

T R I G Y N I A .

Rafanum. Calyx monophyllus, partitus. Petala quinque laciniata, inaequalia, umco basin mellifero. Capfula ore dehiscens unilocularis.

Euphorbia. Calyx monophyllus yentricofus. Petala quatuor seu quinque, crassa gibba, calyce inferta. Stamina fucellive prorumpentia* Germe Ajedicellatum. Capfula tricocca.

D O D E C A G Y N I A .

Staphyleum. Calyx duodecimpartitus, concavus acutus. Petala duodecim lanceolata concava acuta. Capulae duodecim, eon* preff», breves, polypermae.

MONOGYNIA.

172. *Lythrum.*

Calyx duodecimdentatus, alternis minoribus. Petala sex calyci inferta. Capfula bilocularis» polyfpeima.

43?. *IJ. Salicaria*, foliis oppofitis cordato - lanceo-
ldtis «icutis pubefcentibus; floiibus fpicatis
dodecandris. Flor. Dan. Tab. 671.

In ioflis humidis, ad rivulos. Flor. Jun. Jul,
8C Aug.

D I G Y N I A.

172. *Agrimonia.*

Calyx duplex: intern us quinquedentacus:
extern us diphyllus, foliolis triiidis. Petala
quinque ftellatim patentia. Semina duo nuda
in fundo calycis.

433* *A. Eupatoria*, foliis caulinis pinnatis Im-
pari petiolato villofis i iructibus liifpidis.

(cauie erecto firnplicijjuno hirfuto.) [»] Flor. TDan.
Tab. 5^8.

In dumetJS) in nemoribus: ved *BtrnRorf*; *Klam-
Hnhurg tC* alibi. Flor. Jul. 8C ^A ^u ^g ^g ^A

T R « G V N I A.

174. *Re fed a.*

Calyx monophyllus,, paTtitus. Petsla quin-
que lacioiata inaequalia, unico ad baJGn melli-
fero. Capfula ore tlehifcens, uniloculans.

ty> *Dodecandria Trigynia.*

434. *R. luteola*, foliis lanceolatis infegris, basi utrinque unidentatis, calycibus quadrifidis; (caule recto ramofo.) Flor. Dan. Tab* 864. In ruderalis, ad vias; cœf *BernFlorJvtUm Ordrup* 8cc. Fior. Jun. Jul 8C Aug.

175. *Euphorbia.*

Calyx monoplyllus ventricofus. Petala quatuor feu quinque, era Ha, gibba, Calyce inferta Stamina fuffive prorumpentia. Germinen pedicellatum. Capiula cricocca.

* Umbel a trifida,

435. *E. Peplus*, umbelia bifida: dichotoma, involutellis ova is; foliis ubovatis integerrimis pteroculatis. Fior. Dan. Tab. 100.

In c. dis xleraceis, inter fegetes. Flor. Jul. 8C Aug,

436. *E. txigua*, umbelia tri-quadri-quinquefida, dichotoma; involucri 8C involucellis ovate laaceolatis basi obliquatis; foliis linearibus parvis Flor. Dan. Tab. 593.

Intei fegetes haud frequens: vtd *Flq/kekroeni Valbye*; vid' *Lygien*. Flor. Jul. i: Aug.

** Urn)ella quinquefida.

437. *E. hdiocopia*, umbelia quinquefida, trifida, dichotoma; involucellis obovatis; foliis cœf neitornibus, feiratis. Flor. Dan. Tab. 735. In oleraceis, inter fegetes. Flor. Jul. Aug.

DODECAGYNIA.

176. *Stmptrvivum.*

Calyx duodecim partitus, eoncavus. acutu*.
Pettila duodecim, lanceolata, concava. Cap-
ful^ duodecim comprēflae, breves, poly-
fpertnae.

458- *• *tectoruiij* foliis ciliatis; propaginibus pa-
tuhs; iloribus dodecandris dodtcagynis, nee*
taiiis cuneifurmibus carunculatis. Flor. Dan.
Tab. 601.

Haud frequens in tectis: *Valbyt.* Flor. Jim.
SC Jill.

CL A S S I S XII.
I C O S A N D R I A .

M O N O G Y N I A .

Prunus. Calyx quinquefidus, inferus, laciniis*
concavis obrufuifculis. Corolla pentap-
tala. Drupa, nucleo compresso, bivalvi integro,
futuris prominulis.

D I G Y N I A .

Crataegus. Calyx quinquefidus*, superus, con-
cavus, patens. Petala quinque subrotunda
coilocava. Bacca carnosa.

T R I G Y N I A .

Sorbus. Calyx quinquefidus, superus. Petala
quinque. Eacca triflorata.

P E N T A G Y N I A .

Pyrus. Calyx quinquefidus superus. Petala
quinque. Pericarpium quinqueloculare: loculae*
triflorae.

Spiraea. Calyx quinquefidus, inferus. Petala
quinque. Capsulae* plures, bivalves poly-
florae.

P O L Y G Y N I A .

Rofa. Calyx quinquefidus fuperus, urceolatus, coll > irai'ctatits. Petala qtiinque. Semina plurimi hifpida, calycls interiori lateri affixa.

Rub us. C«i'yx quinquepartitus, inferus. Petala quinque. Bacca compofita '• acipis monofpermis in capitulum collect is.

I'ragaria. Calyx decemfidus: laciniis Stternis angunioiibus. Potala quinque. Receptaculum feminum ovatum pulpofum deciduum.

Pot entilla. Calyx decemfidus: laciniis alternij " minoribus reflexis. Petala quinque. Semi* na fubrotunda, nitda, receptaculo parvo exfucco affixa*

*Tormentilla** Calyx octofidus: laciniis alternis minoribus. Petala quatuor. Semina fubrotunda, receptaculo parvo exfucco affixa.

Geum. Calyx decemfidus: laciniis alternis minimis acutis. Semhia plurim^: arifta ^euiculata.

Coma rum. Calyx d^cemfidus : laciniis alternis minoribus- Petala quinque cfdyce minora. Receptaculum feminum ovatum) fpongiofum_f peifillens.

M O N O G Y N I A .

177« *Primus**

Calyx: quinquefidus inferus. Corolla pentapeUU. Drupa nucleo compressio bivaivi, integio, futuris proininulis.

439. *P. Padits*, iloribus racernofis, racemis pendulis; foliis deciduis duplicato ferratis, fubrugoris; petiohs biglandulofis. Flor. Danic. Taff. 205,

Ad i'pes, in locis bumidis rarius: *i Giardet imod Dronninggaaid's ludkiörfekn.* Flor. Maj\ 8C Jun.

440. *P. Cft.tfus*, u.ubcljis fubpedunculatis; foliis ovato-lancefolats, glabris, contluplicatis. in fepibus: *ved Bt/iijiorfsv^ien hvor 7glovnenn har vant.* Flor. Jun,

441. *P. avium%* umhellis feflilibus; foliis ovato-lanceolatis, fubtus pubefcentibus, conduplicatis. Blackw. Herb. Tab. 425.

In fylvis haud frequens: *i Dyrehavtn ikke langt fra Klamgenborg.*

442. *P. clonie/Hcci*, pedunculift fubfolitariis; foliis lanceolatoi-ovatis, convolutis, ramis muticia. Bhckw. Herb. Tab, 305.

In fepibus: *ved Bernjtorfveien ved de för/ft Gourde fra Lundehufel.* Flor. Apr. 8C Maj.

443. *P. Jpinofd*, pedunculis folitariis"; foliis ovato-lanceolatis glabris; ramis fpinofis. Flor. B Dan. 1'ab 926.

In dtmietis, iepibus. Flor. Apr. 8C Maj.

D I G Y N I A.

178. *Cratagus*

Calyx quinquefidus, fuperus, concavus, patens, Petala quinque fubrotunda. Bacca carnosa.

444. *C. Oxycantha*, foliis obtusis fubtrifidis ferratis glabris; floribus digynis; petaloculis calycibusque fubrotundis; calycinis fegmentis unceolatis acutis baccis difpermis. Flor. Dan., Tab. 634.

In fylvis, fepibus frequens. Flor. Jun.

445* *C. monogyna*, foliis ovatis, acutis, trifidis vel quinquefidis, incilō ferratis, glabris; floribus monogynis; pedunculis calycibusque fubrotundis; calycinis fegmentis lanceolatis acuminatis baccis monofpermis. Flor. Dan. Tab. 1162.

In fepibus haud infrequens. Flor. Jun.

2, *C. denudata*, foliis ovato-oblongis, inferratis, fubquinquelobatis, acutis, petiolisque pubefcentibus; floribus monogynis; pedunculis calycibusque glabriusculis; ramis fubinnatis.

In fepibus, fylvis. Flor. Jun.

T R I G Y N I A .

179. *Sorbus**

Calyx quinquefidus, fuperus, Petala quinque. Bacca trifperma.

15''') *Icofandria Ptntagynia.*

447. *S. aucuparia*, foliis pinnatis utrinque glabris, rorymhis tehnnalibus axillaribusque inagnis. Flor. Dan. Tab. 1034.

P.iffim ad pagos, in nemoribus. Flor. May. Jun

PENTAGYNIA.

180. *Pyrus.*

Calyx quinqufidus, fuperus. Petala quiri- que. Pomum quitiquelocale? loculamentis di-tilfpfrms.

448. -*P. cvmmanis*, foliis ovatis fenatis, pedunculis coiyrnboiib.

In (yhis baud frequens: £ *Ermelunds-Skoven*, Flor. Maj 8cJun.

449. *P. mains*, foliis rotundato ovatis ferratis, pubefcetitibus, uinbellis fcillibus. Flor. j5an. Tab. nor.

In nernore: *Charhtterlund*. Flor, Maj. Jun.

450. *P. Aia*, io)ii,s ovalibus, duplicatoferratis albido-tometjtoft ; coryoibis multifloris planis. Flor. Dan. T>b. 302.

Xn iico :* *ved Fahrungaard*. Flor. Maj. Jun.

Eft *Cratagus Aria* Lin.

^18i. *Spiraa.*

Calyx qiunqufidus inferus. Petala quinque. Capfulaqfpluiee, bivalves, polyfpermae.

451. *S. Filiftndula*, foliis interrupte pinnatjsi foliolis uniforjnibus ferratis; caule herbaceo, pedali; floribus corymbofis. Flor. Dan, Tab.

635.

In prati9 graminoidis, fruticetis: *Brede Baktr;*
ted Lyrii^bye-Soei Bagfvard. Fl .r. Jim. Jul.
 452* & *Uimariq.* ioliis interruptis pinuatis: fo-
 liis ovatis bifenatis, fubtuscanis; caule bi-
 tripedali; iloribus coiyrnbofo cymofi*. Flor.
 Dan. Tab- 547.
 la fofils, pratis uliginofis. Flor. Jun. Jul.

P O L Y G Y N I A .

i§2. *It of a.*

Cylyx quinquefidus, fuperus, urceolatu9,
 eollo coarctatus. Fetala quinque. Semina
 plurima hispida, calycis interiori lateri affixa.

0 Germinibus fubglobofis.

455- JK. *villofa*, germinibus ovato-^lohofis pe-
 dunculisque hispidis; caule aculeis fparfis;
 petiolis aculeatis; foliis tomentofis duplicato
 ferratis : ferraturis glandulofis.

In fepibus haud frequens: *imelhm Tuborg og*
Slukefter; imelltmSpringforbieog Papier Mullen.*
 Flor. Jun. Jul.

0. *molliffima*, germinibus glabris, foliis
 villofis.

** Germinibus ovatis.

454- R* *rubiginofa*, germinibus ovatis peduncu-
 lisque hispidis, petiolis cauleque aculeatis:
 aculeis recurvis; foliis ovatis (ubtus glandu-
 lofo pilatis. Flor. Danic. Tab. 870.

lr* fepibus, fylvis: *oven for Huulvden imelUm*
Springforbit pg JPapUrs - MQIUII. Flor. Jul.

455. JR. *eanina*, germimbiis ovatis, pedun cults-
que glabris; cattle petiolisque aculeatis. Flor.
Dan. Tab. 555.
In fepibus, fylvis, ericetU. Flor, Jun. Jul.

183- *Rubus*.

Calyx quin(ii)epartitus. Petala quinque. Bac-
ca cornpofita; acinis monofpermis m capitu-
lumcollecti3.

* Fruticofi.

456. R. *idcLiis*, foliis quinato-pinnatis, ternatia-
que: fubtus albido tomentofis; caule acu-
leato, erecto; petiolis canaliculaiis. Her.
Dan. Tab. 788.

In nemoribus, fepibus frequens. Flor. Maj. ic
Jun.

457. R. *cajius*, foliis ternatis fuhnudis: lateral-
busbilobis; caule aculeato tereti procumbente*
Flor. Danic. Tab. 1213.

Ad vias, in foflis ficcis: *gamle Kibge Vei; ved
Kongtvæn til Lyngby tj paa Amager SCc** Flor.
Jul. Aug. 8C Sept.

458. R* *fruticofus*, foliisquinato-digitatis, terna-
tibque fubtus tomentofis; caule petiolisqut
aculeaMs. Flor. Dan. Tab. 1163.

In dumetis, ericctis. Flor. Jun. Jul.

** Herbacei.

439. R. *faxatilis*, foliis ternatifi nudis; flagelli'
repUntihus heibaceis. Fltr. Dah; Tab. 134*

Haud frequens in fylvis, fruticetis: *paaenBckU*,
*imellem F'gleh vad-Mötle og Brede; i Hejlikiob**
Skov ved Birkeriid. 1 lor, Maj. Juiu

460. Zi. *Chamamoros*, (*dlcicus*) foliis fnnplicibus, •
lobatis; caule incrimi uniflora, Flor. Dauic,
Tab. 1.

Rariffimus: *imellem Örne, Örshold og Gornę vtd*
*Hetjtngör. Dn. Czdanowsby**

184. *Fragaria.*

Calyx decemfidus : laciniis a I tern is angustio-
ribus. Petala quinque. Receptaculum femi-
num, ovatum, pulpofum d'ciduum.

461. *F. vefca*, calyce fnictus reilexo; pubefcentia
petiolorum patent]'.na, pedunculofum ad-
prefla, Blackw. Herb. Tab. 77-

In ericetis, fylvaticis, aggeribus* Flor. Maj. Jan. ^k

195. *Potentilla.*

Calyxdecejnfidus> aciniis alternis minoribus
teflexis. Petala quinque. Seraina fubrotunda
nuda, receptaculo parvo exfucco affixa.

* Foliis pinnatis.

462. *P. Anferina*, foliis interrupt^jpinnatis ferra*
tis fericeis; caule repente pedunculis uniflo-
ris. Floi\ Dan. Tab. 544.

In pratis fubhurnidi^, ad vias, in littore mari\$
ftequas., Flor. Maj. Jun. JuL

** Fohig digitatifi-

463. *P. argentea*, foliis quinato-incifis lobis cuneiformibus, supra villosis subtus albido tomentosis; caule suberecto. Flor. Dati. Tab. 865.

Ad vias, in pratis, aggeribus. Flor. Jun. Jul.

464. *P. vzma*, foliis radicalibus quinatis, acutis, serratis, retusis; caulinis ternatis; caule declinato. Flor. Dan. Tab. 114.

In apricis nemorosis: *Gharlottenlund*. Flor. Maj. Jun.

465. *P. reptans* foliis quinatis; caule repente; pedunculis elongatis unifloris. Flor. Danic. Tab. 1164.

In aggeribus, ad vias, fossas. Flor. aestate.

*** Foliis ternatis,

466. *P. norvegica*, foliis ternatis: foliolis ovato-lanceolatis profunde fenestratis piloso-hirsutis; caule dichotomo, erecto; pedunculis axillaribus terminalibusque subcorymbosis. Flor. Dan. Tab. 171.

In pratis uliginosis: v. *Bernhorf*, in marginibus piscinae assecatae i *Hirshholm-tihov*. Flor. Jun. Jul. 8C Aug.

J § 6. *Tormtilla**

Calyx octofidus, laciniis alternis minoribus. Petala quatuor. Sexnaria subrotunda receptaculo parvo exfusco affixa.

467. *P. erecta*, caule decumbenti ac erectifloro foliis sessilibus. Flor. Dan. Tab. 589*

In pratis humidis uliginosis. Flor. Jun. Jul. Aug* -

187. *Geum.*

Calyx decemfidus, laciniis alternis minimis acutis. Petala quinque. Semina plurima: arista geniculata.

168' *G. urbanum.*) floribus erectis; aristis uncinatis nudis: foliis caulinis ternatis; radicalibus lyrato - pinnatis. Flor. Dan. Tub. 67?.

In umbrosis, sylvis, ad fepes. Flor. Jan. Jul.

469* *G. rivale*, floribus nutantibus *petalis obcordatis cuneiformibus*) fructu oblongo: aristis plumosis tortis. Flor. Dan. Tab. 722.

In humidis uliginosis turfosis. Flor. Jun. Jul.

*. *hybridum*, calyce lobato: laciniis dentato-incisis; corolla polypetala; caule humiliori subaphyllo. Jac. con. rar. !• tab. 94.

In turfosis: *ved Lhriiansholm le^i.*

188* *Coma ram**

Calyx decemfidus, laciniis alternis minoribus. Petala quinque calyce minora. Receptaculum, femur ovatum, spongiosum, peristens*

470. *C. palustre*, foliis radicalibus pinnatis: floralibus ternatis vel simplicibus; laciniis calycinis coloratis. Flor. Dan. Tab. 636.

In uliginosa turfosis. Flor. Jun. Tul.

C L A S S I S X I I I .
P O L Y A N D R U

M O N O G Y N I A .

Papaver. Calyx['] diphyllus, caducus. Corolla
#

tetrapetala. Capfula uml jculaiis lub ftiginate
peihftente pork dehilcens*

Chelidonium. CJyx diphy'lus gaducus. Co[^]
lolla tetrapetala. Siliqua unilocu'aris hnearis#

Actaa. Caljx tetra! hyllus, ca !ucus. *Coiolla
tetrapetala. Bacca unilocularii. Semina ge*
mino ordine.

Cistus. Calyx pentaphyllus: foliolis duobus mi'
noribus. ^Corolla | entapetala. Capfula' lub*
rotunda apice dthilcenc*

Nymphaea. Ca'yx tetra feu pentaphyl!u<?: folio*
1^ concavis crafts. Corolla prlypetala. Bacca
multilocularis: oculis monofpeimis.

Thia. Calyx•quinquepartitus. Corolla penta*
petala. Capfula coriacea, globofa, quadn
quiquelornlaris, quudxi feu quinquevalvi*
bali debifcens.

Delphinium. Calyx nullus. Petala quinque.
Nectarium monophyllum sessile pollice cornu-
turn. Capsula unilocularis apice dehiscens.

P O L Y G Y N I A.

Thalictrum. Calyx nullus. Petala quatuor
vel quinque. Semina plurima, ecaudata.

Caltha. Calyx nullus. Petala quinque decidua.
Nectaria nulla. Capsulae plures, polyspermae.

Trollius. Calyx nullus. Corolla polypetala.
Nectaria liliaria. Capsulae primae.

Anemone. Corolla hexapetala, nuda vel calyculata
vel involucrata. Semina plurima in
receptaculo elevato.

Ficaria. Calyx triphyllus. Petala octo novem
ungue nectarifero.

Ranunculus. Calyx pentaphyllus. Petala
quinque, ungue nectarifero.



M O N O G Y N I A .

189. *Actaea*.

Calyx tetraphyllus, caducus. Corolla tetrapetala deadua. Race a unilocularis. Sernina gemino ordine, femiorbiculata.

471, *A. fpicata*, racemoovato, fructibus baccatis
 iohis triter'natte feu pinnatis pinnis divaiica-
 tis s' piinulis interriediis inaximis tiilobis tri-
 fidisve. Flor. Danic» Tab. 498.

In fylvis, nemoribus urnbrofis: *Friderichsdalved*.
Slotttl; imellem Ermdundshuus og Fortuqen pan
hoire Haandj omkrhig Jbirkerbd ved Hejlkibb og
E/ktmofe. Flor. Maj. Jun.

190. *Chtlidonium*.

Calyx caducus diphyllus. Corolla tetrapetala*
 Siliqua unilocularis, linearis.

472. 6. *maj us*, peduncus umbellatis, foliis de-
 curfive pinnatis: pinnis incisis obtusis, petalis
 integris. Flut. Dan. Tab. 54a.

In sepibus, ad vias* Flor. Maj. Jun. Jul.

a. *laciniatum*, pinnis finuato - pinnatifido''
 iixis acuris; petalis laciniatis. Flor*
 Dariic* Tab. 676.

*I Rosenborg * Have tantum vidi.*

191. *Papaver*.

Calyx diphyllus caducus. Corolla tetrapetala*
 Capsula unilocularis sub figmate ~~persistente~~
 pennis dehiscentis.

* Capfulis hispida.

473- *P. Argemane*, capfulis clavati? hispida, caul* foliofo multifloro. Flor. Dan. Tab. 867.
Ad vias, inter fegetes in aggeribus. Flor, Jun. Jul. **hui***.

** Capfulis glabris.

474« -*P. Rhoeast* capfulis subglobosis glabris; caule piloso pilis patentibus; foliis pinnatifido incis. Floy. Loud. Tab. 36.

Inter fegetes baud coppfe. Flor. Jun. Jul.

475. *P. dubium*, capfulis obovatis glabris; caule multifloro fittis abruptis; foliis pinnatifida incis. Flor, Dan. Tab. 902.

In aggeribus* ad vias interfegetes. Flor. Jmi^Jul.

476. *P. fominiferum*, capfulis ovato-globosis foliis amplexicaulis incis, Blackw.Heib.482.
In hortis inter oleras, in ruderalis interdum sponte^provenit. Flor. Jun. Jul.

192. *Nymphaea*.

CLy* tetra feu pentaphyllus; foliolis concavis ciliatis. - Corolla polypetala. Bacca multilocularis: loculis monopermis.

477- *N. lutea*, f. liliis cordatis integerrimis; calyce petalis majore pentaphyllo. Flor. Dan. Tab, 603.

In aquis stagnantibus, lacubus. Flor. Jun, Jul.

478. *A. alba*, foliis cordatis orbiculatis integerrimis; calyce petalis brevioribus tetraphyllo. Flor. Dan. Tab. 605.

In stagnantibus, lacubus, Flor. Jun. Jul,

193. *Tilia.*

Calyx quinquepartitus. (Corolla pentapetala. Capfi 1 la coriacea, globofa, quadri feu quinquelocularis, quadri feu quinquevalvis, bafi deMfcens.

479. *T. europaa*, floribus nectario deftitutis. Paffiai. Flor. Jun. Jul.

*. *parvifolia*. Flor. Dan. Tab. 55 5.

Nunqutfm in Selandia, 'copiole autem in Ulvsbale Infulas Monae vidi.

191. *Cistus.*

Calyx pentap; yllus: foholis duobus minoribus. Corollajpeiicapetalu. Capfula fubrotunda apicc dehifcens.

480. *C. Heliantliemum*, fuffruticofum procumbens, ftipulis lanceolatis; fuliis oblongis revolutis fubpilofis. Flor. Dan. Tab. 101.

In apricis, dumetis, trnticeti^: *Charlottenlund; ved Fuglehvad- Molle ; ved Lyngfrye - '600.* Flor* Jun. Jul. Aug.

195. *Delphinium.*

Calyx nullus. Petala quinque. (*Ntctariurti monoplyllumfejfiU, cum petalo fupremo cornutum*). (*Cupfula unilocularis, a pice dehifcens.*)

481* X). *Conjnliddi* foliis inuJtifldis, trifidis biidisque, laciniis linearibus; racemis paucifloris* ' Flor. Dan. Tab. 683,

Inter ff-getes hand infr&quens: *ved Vangehufet .&c.* Flor. JUD. Jul. Aug.

POLYGYNIA.

19G. *Thalictrum*.

Calyx nullus. Petala quatuor feu quinque*
Sernina pluima ecaudata.

483. *T. flavum*, caule foliofo i'ulcato panicula (co-
rymbiforrni) multiplici erecta. Flor. Danic.
Tab. 939,

Haud nequens iip. maritimis: *ved Flafkekrotn*.
Flor. Jun. Jul.

483. *T. dubium?* caule erecto,* timplici, pedali
haud ultia, fulcato-ftnato, foliofo glabro;
{(liis pinnatis; infeioribus fubbipinnatis gla-
bris : ioliolh cuneatis^intermediis t^ifidis, ra-
rius quadri dis, lateralibus bifidis fubtrifidis,
acutis, iubtus venis reticulatis proininenti-
bus? pañicula coarctata erecta; ilonbus par vis
fubnutautibus; ftiguiatibus purpurafcentibus;
feminibus quatuor-quinque vtl lex, ovato*
g^bbofis co Cat is, fefiili')us.

Rarius in pratis 80 ar vis flccis: *forbit FlaJktrQen*
imod Stranden. Flor. Jun. Jul.

19-. *Caltha*.

Calyx nullus. Petala quinque decidua. Neo-
taria nulla. Capfuljp plurimae, polyjpermae.

484. *C patuflris*, caule ciecto, (fuLdzcmnbemi);
ioliis cordat» oroculacis crenatis nitidis. Flor,
Dan. TaJ>. 6b>>.

In pafcuis hurnidis. Flur. Maj. Jun.

ib\$ rolyandria tfolygynia.

198. Trollius.

Calyx nullus. Corolla polypetala. Nectaria linearia. Capsulae plurimae.

485. *T. europaeus*, corollis conniventibus; nectariis longiulne flavinuin. PL Dan. Tab* 133.
In pratis 8C paucis humidis, rarius collitiis ficcis.
Flor. Jun.

199. Anemone.

Corolla hexapetala (*nuda vel calyculata vd In* volucrata*). bernpa pliriina in receptaculo elevato, (*inflata vd e caudal a*).

* Flore caucylato.

496. *A. Hpatica*, foliis trilobis integerrimis; (*in* valuer* triphyllo^ori^approximato*). Flor. Dan. Tab. 610.

In nen^oribus: *Charlottenlund Sc alibi*. Flor. Apr. 8C Maj.

** PuKatillaB. Flore pedunrulo involu-
ciato; petalis extus fericeis; feminibus
caudatis.

- 4^7. *A. Pulfatilla*, petalis rectis; foliis bipinnatU
hirsuto^jilufis. Flor. Dan. Tab. 153.

In apricis iy vatiCis: *Charlottenlund intod Sb'tn*.
Flor. Maj. 8C Jun.

- 4gg. *A. pratnfiSt* petalis apice reflexis, foliis bi-
pinnatis rigidis biritto-fericeis. Flor. Dan.
TabJtfu.

In pratis 8C cpllinis ficcis: *Fuglehvad-MolU**
Brede- Bakker; Bagfv&rd; imdlmFriderichsdal
og Kaninholmen. Flor. Jun.

*** Anemoideae. Flore nudo feminibus ecaudatis.

489. *A. nemorosa*, feminibus acutis; foliis caulinis terms incisis periolatis; caule unifloro. Flor. Dan. Tab. 549.

In nemoribus, fylvis, ericetis. Flor. Apr. Maj. 8C Jun.

490. *A. ramunculoides*, feminibus acutis; foliis caulinis ternis incisis {laciniis pracedenti*angulioribus) subfertilibus; caule iubbifloro. Flor. Dan. Tab. 140. .

In iylvis nemoribus hauil v'ulgatissima: *Charlottenlund*. Flor_v Maj. Jun.

200. *Fie aria*. Roth.

Calyx triphyllus. Petala octo-novem, ungue n^{ct}arifero.

491. *JF. ranunculoides*, radice tuberofa; foliis cordatis, angulatis, petiolatis; caulej unifloro. *F\oi* Dan. Tab. 499.

In umbrosis huinidis. Flor. Apr. Maj. Jun.

301. *Ranunculus*.

Calyx pentaphyllus. Petala quinque ungue nectarifero.

⁴ Foliis simplicibus.

494. *R. Flammula*, luliis ovato-lanceolatis (*integrissimis vd dentatis*) caule decliuato subprostrato. Flor. Dan. Tab. 575.

In pratis huxuidu ac aligooils. Flor. ablate.

493. *R. reptans*, foliis linearibus; caule repente, articulis radicanibus, foliis iloriferis; pedunculis (. lita i!s. Fl. Dan. Tab. 108.

Ad ripas lacuum: *Endrup og luurjbe** Flor. Jun. Jul.

494. *R. Lingua*, foliis lanceolatis, pilis breviflomis adpressis; caule erecto pubescenti. Flor. Dame. Tab. 7.

AM n><is lacuum, in aquis stagnantibus: *i Lun« iehuns-Mojtn; vtd Lyngbye-Soe SCc.* Flor, Jul, 8C Aug.

** FoUis dissectis 8C divisis. '

495. *R. auriculata*, foliis radicalibus reniformibus crenatis incisuris caulibus Uguacis linearibus; caule inulcifloro. Flor. *Ddu.* Tab. 665.

In pratis SC paucis humidis, nemoribus. Flor. Muj. Jun.

496. *R. Jcderatus*, foliis inferioribus palmatis^ fuitis iighau&; in uctibus oblongis. Flor. Dan. Tab. 571.

In paludibus, ad rivulos. Flor. Jun. Jul.

497. *R. bulbosus*, calycibus retroflexis acutis; pedunculis fulcatis; caule erecto multifloro (*radice globofa, bulbiformi*). Flor. Dan. Tab. 551.

In paucis, pratis, aggregatur. Flor. Jun. Jul.

498. *R. Plilonotis*, calycibus retroflexis, acuminatis, papilloso hispido foliis ternatis: folio-
* • lis trilobis, crenato incisuris hispido.

Thuius in paucis humidis: *vid Flajkekroin; fjtterslev*, Flor. Juru 8c Ju4. ~~vid Parsle cupiofiar.~~

tJ9» *B. repairs*, calycibus patulisj pedunculis fulcatis; farmentis repentibus; ioliis compoficis pubefcentibus. Flpr. Dan. Tab. 795.

Ad loffas, in cultis. Flor. aeflate.

Joo* *R. acris*, calytibu* patulis; pedunculis tore-tibus; i. liis tripartito - rnultKklis: fummis liuearibus; caule erecto pilis adpreffis.

In pratis, fafcuis. H6r. aeflate.

501. *R. arvenfi*Sy feminibus aculeatis; foliis fupe*rioribus decoinpoftis lineaiibus; caule erecto diciotorno. Flor. Dan. Tab. 2rg^

Inter fegetes: in Selandia luminum vidi, Infula

Mona autem copiofiiFime. Tlor. Jun. Jul.

502* *R* aquatilis*y ioliis emeris renitbunibus; lobatis, lobis crenulatis; fubmerfis capillaribus.

In lacubus, aquis ftagnantibus. Flor. Jun. Jul.

8C Aug.

u. orbiculatus, foliis omnibus capillaiibus uultindis Liciniis fetaeis acquilibus circumfciiptionerotunda, peduuculiselongatis bilollicaril*us; petalis calyce maioribus.

p. phellandrifolius, foliis omnibus ca^ilLribus multifidis laciisfetaeis inapqualihtrs; pedunculis femiuncialibus unifloris; petalis calyce baud aequulibus, vel brevioribus.

y. peucedanifolius, foliis omnibus multipartite-in u I cifid is; Jaciniis fi-tuceis divaricati\$ inasqualibus longillimis; pi-diuutilN pollicaribus haud ultra; petalis calyce maioribus.

CLASSES XIV.
DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

* Calyces subquinquefidil

Vtrbtna. Calyx (*quadridntatus*) |quinqueden-
tatus: dente Liaico truncate Stigma obtufum,
inferne dente peditum.

LeonuTii&. Corulle labium fuperius integrum,
loinuaLum. An'theraB punctis mtidis adfpeifa.

Gleoma. Corplae labium fuperias bifidura*
Antheiaiurn paria cruciata.

Mentha. Corollas fubsquales. Filamenta difflaa-
tia recta.

Ajuga. Corollae, labium fuperius minimumj
emarginatum, ftaminibus brevius.

Metonica. Corollas labium fuperius adfeendens,
plariurn: tubus incurvus. Stamina longitu*
dine faucis.

Lamium. Corolla? labium fuperius integVum>:
labium mferius ad faucem utiiuque dente
ietarco.

Galeopsis. Corollae labium superius subreversum
turn, labium inferius, jyl iuicem utrumque
denticulo obtusiusculo concavo*

Pollichna. Corolla? labium superius integerrimum:
labium inferius absque denticulis ad faucem.

*Stachys** Corollae labium inferius lateribus re-
flexum. Stamina deflorata ad latera, deilexa*

Nepeta. Corollae labium inferius trifidum laciniis
intermediis venatis. Faux marginibus reflexa.

Ballota. Calyx decemfidus. Corollae labium
superius imbricatum. Labii inferioris laciniis in-
termediis emarginatis.

Matricaria. Calyx decemfidus. Corollae la-
bium superius lineari bifidum.

** Calycibus bilabiatis,

Thalictrum. Calyx fructiferus operculatus.

Thymus. Calyx faucibus villis clausus.

Prunella. Filamenta omnia apice bifurcata.

Origanum. Strobilus calyces colligens.

Clinopodium. Involucrum calyces colligens.

ANGIOSPERMIA.

* Calyces quadrifidi.

Lathraea. Capsula unilocularis. Corolla perfo-
rata. Glandula sub germine.

Euphrasia. Capsula bilocularis. Corolla perfo-
rata. Antherae inferiores altero lobo basi
bifido*.

Rhinanthus. Capfula bilocularis, comprefla.
COIOHJ peifonaṭn.

Melampyrurn. Capfula biloculaiis. Coiolla
perforata. Semina bina gibbola.

** Calyces quinquefidt.

Limofella. Capfula uniloculaiis. Corolla cam-
panulata, reguhiis. Semina pluiima.

Scrophularia. Capfula biloculaiis. Corolla
reiupuuta.

Antii rhinum. Capfula bilocularis. Corolla
perforata, fubtus nectario prominente.

Pedicular is. Capfula biloculaiis mucronata.
, Corolla perforata.



*Didynamia Gymnospermia** \Ji

GYMNOSP.ERMIA.

2051. *Verbena*

C' < \ y x (*quadridentata tetragona*) quinque-
lobata: r. l. > r. c. l. f. u. p. i. e. i. n. t. e. n. d. i. o.
t. n. i. n. t. a. o. Corolla (j) quinquefida; tubo limbo,
Stamina intra tubum in circuitu a. Stigma obtu-
rum inflexione denticulo praeditum.

303, *V. officinalis*, foliis ellipticis paniculatis;
foliis multilobatis laevibus, caule lolitario ra-
mulo. Flor. Dan. Tab. 6*8*

Ad pag. 96 hujus frequens: *ved Friderichsdals**
*Nolle; Frederuborg** Flor. Jun. Jul. Aug.

303. *Leonurus*.

Calyx pentagonus quinque-dentatus. Corolla
labiatis superius bifidus, inferius. An-
therae punctis nitidis adpressis.

304. *L. Cardiaea*, foliis caulibus lanceolatis trifidis.
Flor. Dan. Tab. 727.

In fensibus ad pagos. Flor. Jul. Aug.

904. *Glechoma*.

Calyx cylindricus quinquefidus. Corollae la-
biatis superius bifidus. Antherarum parva
cruciata.

305. *G. hederacea*, foliis reniformibus crenatis;
caule repente radicante. Flor. Dan. Tab. 75}.
In pratis, dumetis, fensibus. Flor. Jul. Jun.

tj ft Didynamia Gymnofpermicr.

905. *Mentha.*

Corolla quadriida fubaoqualis. Filamenta crecta diffl.intia.

506. *M. aquatica*, floribus clfiitatis, foliis ovatis, ferratis, petiolatis; ftaininibus corolla longiori* >us. Icon 673. Fior. Dan. plantain hanc maJe rn on fir at.

In locis humidis, paludofis, ad rivulos. Fior. Jul' Aug.

«• ioliis fubfeffilibus, {laniiribus coiolla brevioribus; calycibus minus hirtutis.

507. *M. hirtuta*, iloibus capiutis ftiliis uvatis fenatis fublclijibus, pubekenÜbus, ftaminibus c >rolla longiojibus.

In locis huuiidis: *ved Birktröd.* Fior. Jul. Aug.

508* *M. Jaiiva*, iloribus verticillatis; fohis ovatis acutis ienatis , ftaminibua coroliis longionbus. Floi. Dan. Tab. 794.

In pratis fubhumidis, paludibus. Fior. Jul» Aug. Sept. •

509.vM. *erven/is*, floribus verticillatis; foliis ovatis 'acutis, ' ferratis ; (lainimbus corollaod ttquantibus. Fior. Dyn* Tab. 512.

In agrib, pratis, ficcis* Fior. Jul. Aug. Sept.

206. *Ajuga.*

Corollae• labiurn luperius minimuui, emargi natuin, ftaminibus brevius.

510. *A. pyramidalis*, tetragono - pyramidalis vil lofa; lohis radicalibus xoaximi*. Fior. Da*¹ Tab. 185*

Bnrius: *imellem Öishold og Gome ved Helsingør**
Dn. Czekanovsky Floiv I* aj. Jul.*

511. *A. reptans*, j^{^^}dp* ftolonibus rpptar\tibus;
 lohis obovatiMffnatis inlcnorihus petiojaci
 fuperionbus feffilibns Flor. Dan. Tab. 925.
 In nernorolis attjue linmidislocis: *vedFrideric/is**
dulsblot; iFridtriehsbtrg'sHave. Flor. Maj. Jun.

207. *Bet on i c a.*

Corollae labium fupeiuis adfcedens, planum:
 tubua c>lindricus incuivus.

512. *B. officinalis'y* fpica intennpfa: corollarum
 labii lacinia intermedia eraaiginata. Flor. Dan.
 Tab. 726.

In fylve: *ved Sophienbag l)n. Holun!* Flor,
 Jun. Jul.

208« *Lomium.*

Corollae labium fupeiu¹- intef>rum fornicahim;
 labium inferius bilobum ad faucem utiinqa«
 d(nte fetaceo.

- 513* l«. *album*, toliis cortlatis, acuminatis, ferra*
 tis, petiolatis; verticillis multiilois. Flor.
 Dan. Tab. 591.

In cultis 8c uideratis, ad faepe^ fere ubique.
 I<lor. Maj. Jun,

514. *L. purpleuirij* foliis cordatis, crenatis^, ob-
 tufts , prtiohttis ; verticillis appioximatis,
 Flor. Dan. Tub. 523.

In cultis, aggeribus, ad vias. Flor. Maj. Jun. Jul,

a, moluccellaefolium, caulibus caetera floribus firriplicitms, iiierne fubramofis, fubpudis: foliis coniatif inrii'o^obutis, obtufjufculis, pubefctntilms, IBPpetiolum decprrrentibu \ (loribus vei ticiilati.s: verticillO/in»-iiiiao valde rernuto; calyibus cainpanulutis: laciniis acurninutis patniis.

In a^g^ribus rarior: *ved Joachirnsdal paa Veientil Lonftantia.* Flor. Jun. Jul. .

209. *G all opjis,*

Corollae labiinn fuperius, fubcrenatum, fornicatuin: labium inicrius act Faucem utriiujue deiitirulo obtui'iii.culo concavo.

515, *G. Ladimum*, internodiis caulinis sqiialibus: verticillis omnibus remotis; calycibus inermibus; (*fyracteis liwaribus in fpinarri nilidam dojinentibus.*)

In arvis, ad margnes agrorum. Flor. Jul.

4t6. *G. Tetrahit*, internodiis caulinis fuperne in crafTutis; verticillis fubcontiguif; calycibus pungentibus.

In rudericis, arvis, agris. Flor. Jun.— Sept.

a, t&vigata, caule raaaisque fuperne pilis rigidis, inferne glaliro; internodiis in crafTatis geoicuUs rarilTirne pilofis.

517. *G. cana&iraj* verticillis fiinmis fubcontigui'K calycibus tubulofis, dentibus paulo brevioribus linearibus, in squalibus **tribUfl** majoribus Flor. Dan. Tab. 929.

Inter fegetes, in arvis, cultis. Flor. Jun.— Sept.

210. *Pollichia**

Corollae labium superius integrum labium inferius absented ti us ad faucem,

518. *P' GaUvbdomfi* calycibus pungentibus, corollae labio inferiore trifido; foliis omnibus dentatis cordatis petiolatis.

In montanorosis, fepibus t ved Kongshvile paa *Vejen til Fridrichsdalf Odshened. Dru Markusfen** I^l lor. Jul. Aug. E(t Galeopfis Gatlodolon Jjin.

519. *P. ampUxicaulis*, calycibus inermibus; corollae labio inferiore bifido; foliis caulinis festilibus rotundatis, incis: radicalibus petiolatis, cordato-lobatis. Flor. Dim. Tab. 753.

In nideratis, **aggeribus**[^] agns, cultis. Flor. Maj. — Aug. *EN Lnm lum amplexicaule* Lin.

an. Stachis.

Corollae labium superius fornicatum: labium inferius lateribus reflex utn: 1 acini a intermedia maiore emarginata. Stamina deorsum later* reflexa,

550. •\$* *fylvatica* 1 verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis* Flor. Dan* Tab. 172.

In nemoribus, fepibus humidis. Flor* Jun. Jul. 8C Aug.

3: *U S. palustris* verticillis sexfloris, foliis linearibus lanceolatis ferni amplexicaulis festilibus* *ML* Dnn. Tab. 103.

^n ax vis ad folias. Flor. Jul. Aug.

52a. *S. arvensis* verticillis tri flexfloris; foliis cordato-ovatis obtusis utriusque villosis; corollae longitudine calycis; caulis herbili. Flor. Dan. Tab. 567. ^{^tm}

In arvis & agris ficcis arenosis: *irrigata Chariot'*
Untumli 0£ Skovshoved. Flor. Jul. Aug.

213. *Nepeta,*

Corollae labium inferius trifidum, lacina intermedia crenata: fauce margine reflexo.

523. *N. Cataria*, floribus simplicatis; verticillis subsessilibus, foliis petiolatis cordatis dentato-ferratis. Flor. Dan. Tab. 580.

In sepibus, ad pagos. Flor. Jul. Aug.*

213. *Bullota,*

Corolla labium superius fornicatum: lobus inferioris lacina intermedia emarginata. Calycis decemfidiatus.

524. *B. nigra*, foliis cordatis incisuris ferratis; calycibus acuminatis. Elackw. Herb. Tab. 136, Ad pagos, via, Flor. Jul, Aug.

514. *Marrubium.*

Corollae labium superius bifidum, lineare recurvum. Calyx decemfidiatus*.

525. *M. vulgare*, dentibus calycinis fetaceis uncinatis; verticillis glebuliferis; foliis rotundato-ovatis, incanis, rugosis. Flor. Dan. Tab. 10) Ad pagos, in rudibus. Fior. Jul Aug,

S15. *Scutellaria.*

Calyx ore intad[^]* post ilorefcentiam 'claufo opertfutato. I-

5[^]6. \langle \$. *galericulafa-* wins cordato-lanceolate, cre-natis; **floribua** axillavibus plenimque geminis, fecuadis, Flor. Dan. Tab 637.

In iocls hutnidis, nemorofis, lotus. Flor. Jul, \langle C Aug.

*. caule rarnofjflimo villofo,

216. *Thymus.*

C[^]ilyK fauce villis claufis.

5J!7. *T. Serpiltum*, iloribus capitatis; caulibus re-pentibus; ioliis planis obtufis, baft ciliatis. Flor. Dan. Tab. 1165.

In apricis aridis, collinis fylvis ericetofis. Flor. æflate.

a. *ciliatUTn.*) folits usque ad apicem ciliatis-
p. *maju&t* caulibus erectts bail clecumben-tibiiS, fere pedalilms; loins oblongo-ovatis longe petiolatisj ilaiainibus **Coroi-**lam fopeiautibus.

y. *hirfumrn*, caule i'oliisque undicjue pilofis; fpicis capitatis hiriutiflirnis.

528. 7¹. *Acinos*, floribus verticiHatis, pedunculis uniflorls; caulibus erectis lubramofis; foliis acutis ferratis. Flor. Dan. Tab. g*4<

In **pratis ficcis: Imellem Froken Browns Gaard**

•> *Ordrup*. Flor. Juu, Jul. Aug.

217. *P runzlla**

Filamenta omnia apicata.

529. *P. vulgar*TM, foliis ovato-oblongis, ferratis petiolatis. Flores albi. Tab. 910, in locis, pratis, pascuis. Flor. Jul. Aug. Sept.

218. *Origanum.*

Strobilus tetragynus, spicatus, calyces colligens.

530. *O. vulgare* spicis subrotundis paniculatis, congestis bracteis calyce longioribus ovatis. Mor. Dan. Tab. 638.

in thymis: *Charlottenland; ved Papiers-Mo lie* 8C aliis locis. Flor. Jul. Aug.

219. *Clinopodiurn.*

Involvcrum in verticillo subjectum. Ciliis superne contractis.

531. *C. vulgare*, capitulis subrotundis hispidis, bracteis intactis. Flor. Dan. Tab. 930.

In silvatis, fruticetis; *vtd liirfarbd &c.* Flor. Jul. Aug.

ANGIOSPERMIA.

220. *Lathraea.*

Corolla perforata. Glandula depressa ad basin futuiae germinis. Stigma truncatum. Capsula unilocularis.

532. *L. squarrosa*, cule simpliciflora corollis pendulis: labio inferiore trifido* (*radice rana*)

*Jijprna, fquamis carnojis denfe tecta.) Flor.
Dan. Tab. 136.*

In nernorofis co^ltttis prapprimis: *CharlotWi*
hind; Jagersbo^{^jj}Dyrehaven. Flor. Maj. 8C
iuitio Jun.*

92 r. *Euphrafia.*

Corolli pe:fo iata. , Anthers inferiores altero
lobo bafi fpinofae. Capfula bilocularis.

5^{^33}. *E. officinalis*, foliis ovatis, lineatis, argute
dentatis. Flor[^]Dan. Tab. ro37.

In prati'; 8C pafcuis humid is. Flor. Juk Aug.

534. jK. *Odon ites*, foliis linearibus, omnibus fer-
ratis. (*fpicis Joliofis JecundU*). f lor. Dan. Tab.
655-

In pratis humidiusculis; inter fegetes. Flor. Jul. ,
ScAug.

***** - *Rhinanthus.***

flalyx[^]ventricosus. CoiulU perforata. Cap-
fula bilocularis comprefTa.

535. -R. *CriJla gulli*, corollarum labio fuperiore
cbmpreflo, brevior; calyoibus glabris (*Jub-
pubefcentibui* >. Flor. Dan. Tab. 581.

In pratis hiimidis, pafcuis; inter fegetes. Flor*
Jun. 8C Jul. ,

«. *parvifioTu&y* corollis parvioribus, .corolla*
rum 1, >>is /unerioribus magis cpmpreflis,
fufTa vel v'obceo llriatis.

In pafcuis humidis cum praecedente.

22*. *Mtlampyrum.*

Corolla¹ perfonata: labio fuperiore compreffb,
maigine replicato. C[^]ttb bilocu'arib obli-
qua liinc ditiifcen*. S[^]PRa bina giblvifa.

536. *M. crijlatum*, fpicis qujdrangularib[^]s: brae*
teis cordatis, compactis, deuticulatis, imbri-
ca[^]is. b^h)\ Dan. Tab. ilo[^].

In frutiretis, durnetis: *pan Brede-Bakker; verf*
Hujkekroen. Flor Jim. Jul. Aug.

537. *AT. arvenfe*, fpicis conicis laxis: braçteis den-
tato fetaceis colordtis. B[^]lor. Da'i Tab. gir.
Inter fegetes: *vedOrdrup, Fridericlisberg; J3ir-*
kctod. Flor J<in. Jul.

538 *M. nernorofurn*, Iloribus fecundis lateralibus:
b actiis dcntdtU, corjato-lanceolatis, fum-
mis coloratis (I[^]riliDus; calycibus lunatic
Flor. Dan. Tab. ^05.

In mtnorofjs, fruticetis: *pea Brede-Bakker,- vei*
Paphrs- Molten, Flou Jul. Aug.

539. *M. pratenje** iloribus fecundis, lateralibus fo-
liorurn conjugationibus remotis \ corollii
claufis.

In pratis, locis nemorofis, fruticetis. Flor.
aefate.

2<l. *Pedicularis.*

Corolla perfonata: labio fuperiore compreffb'.
Capful[^] bilocularis , obliqua , mucienata*
Semijaa⁴ tunicata.

540. *P. pahjlris*, caule ramofo, erecto; calyribut
cndais, <allolo-puuctat'S, coruilis fabio ob«
' liquls/ Buli, Ateb. Tab. 129.

In praxis 8C paftnHKihiqiie. Floi. Jnn. Jul.

541. *P. fokutUa*, caulibus cef)itofis procumben-
til)*is, fubrainoiis; cajlycibus obl'iu^is angu*
latis, laevibus; corolhs labio cordato. LobeU
Icon, pag. 7 48.

In praxis fylvaticis rarior: *i Sloven imellem Ru**
iergaard og Durnpedals Molle. Flor. MJJ. JUU*

325. *Antirrhinum**

CaTyx pentaphyllus. CoioUa perforata fubtu
neclarioprominente. Capfula bitocularis.

542. *A. FJatiue*, foliis liaftatis al tern is; caul i but
procumbentibus; floribus axillaribus; necta-
riis calcaratis fubulatis rectis. Flor. Dan. Tab*
4«6.

In foflis, apgcribus rarius : *vedFlaJkekrom*, Flor.
3ul. Aug.

S13- *A. minus*, foliis plerisque alternis lanceblatis
obtufis; caule ramofoHimo dillufo; iloribus
axillaribus; nectjriis conicis obUifis rectis«
Flor. Dan% Tab. 502.

Incultis, a^ris: *i Hirfchholmshave ved Spring**
vandet; ved Flajltkiofn haul jicqutm. Jul. 8c Aug.

186 *Didynamia Angiofermia,*

544* *A. Linaric*, foliis lanceolato linearibus confer'is caule'ere< to; f_xiicis terminalilms feffilibus, floribus imbricatis^Mctariis conicis fubnlati fubcurvatis IontfisJWor.Dan.Tab.g8s!.

In ageiibus, ad vias frequens. Flor. Jun. Jul. fc Aug.

545* *A. Grantium*, foliis LincoolimS obtufis fubpilofis; cauU^j erecto fibramuio; floribus axilljribus; n^ctariis fcioiiiorinibus obtufis. Flor. Dun. Tab. 941.

In arvis, agris hand frequens: *ved Flajkikroen;*
¹ *paa Amageri omknng Jtutikilde Krut** flor. Jul. SC Aug.

225. *Scrophularia**

Corolla refupinata: tubo fubglobofo labio infer' iore in tus iqiumriLiJa acceffona aucto: labii fuperioris lacii ia intermedia ad tubum reflexa. Capful a bilocularis.

546. *S. nodofa*, foliis cordatis trinervatis; caule obtul'angulo. Flor. Dan. Tab. 1167.

Ad fepes, vias, in nemoribus, fylvis. Flor. Jun. 8C Jul.

547. 6*. *aquatica*, foliis cordatis petiolatis, decurrentibus obtufis; caule membranis angulato; raceniis {erminalibus. Flor. Dan. Tab. 507,

In foflis humidis, ad aquas rarior: *udenfor Ka-JlelUt ved Ciaffens'Have.* Flor. Jul. Aug.

237, *Limofella.*

Corolla¹ campanula, regulaiis. Capfula uniloculans. Scēflpā plurirna.

548# *L. aquatica*, caulibus repentibu*, radicantibus; ūohis lanceolatis in petiolum longum decurrentibus. Jlor» Dan, Tab. 69,

In locib iuuridatis, fabulotis: *ved Char lot tenlund; ved Birforodi vtd Flujkekroe.* Flor. Jul. Aug. Sept. Octobr.



C L A S S I S XV.

 T E T R A D Y N A M I A .

S I L I C U L O S A ,

* Silicula integra, non emarginat?.

Crambe. Silicula unilocularis, monoiperma, de-
 c'tdua: valvis nullis,

Myagrum. Silicula llylo terminata; valvis con-
 ' cavis: loculo submonoipermo*

Draba. Silicula valvis planiufculis. Stylus
 nuUus.

Cochlearia, Silicula turgida: loculis poly-
 fpennis.

** Silicula emarginata.

Isotria, Silicula: loculis monoipermis, Petala
 'duo, exteriora majora,

*Zitpidium** Silicula: valvis acute carinatis: lo-
 culis monoipermis.

Thlaspi L. Silicula: valvis emarginato-carinatis:
 loculis polyipermis,

S I L I Q U O S A .

Cisti U. Siliqua brevisj subtetraedra: loculis sub-
 monoipermis.

Slyfinum. Siliqua tetraedra.

Tiirritis. Siliqua teres angulofa : diflepimerits
Vjalvis fubae(uaK.

Sljymbriunu Siitjia teres: valvis tectiifculis, t
diffepaniento aequalibus.

Rahp anus. Siliqua teres, a[^]ticulata. '•

Sraffica. Silkjua cylindracea: diffepiment*
vuivis longiore. Calyx connivens.

Sinapis. Siliqua roflrata, dtfT&pimeito valvis
longiore. Calyx patens.

Arabis. Siliqua linearis comprefia_s apice capi*
tato.

Hesperis. Siliqua compreffo-plana. Stigma
baft bifurcatam.

Cardamine, Siljqua valvis revoluto-tklrfcen-
tibus: diilV.pimento membranaceo.

•*Dentaria,* Siliqua marginata, valvis revolutt*
ilfelnfcentibus: difiepiineuto fim&olo.

igo *Tetradynamia Siliculoja.*

SILICULOSA.

228. *Crambe.*

Silicula evalvis, ovata rfbtufa, unilorulaiis monofpeima, decidua. Filamenta quatuor longiora apic^bifurcata.

549.* *C\ maritinw*, foliis cordato-ovatis, finuatis incifo-ferratis, cauleque glabris. Flor. Dan. Tab. *i l u*

In maritimis: *vtd Hdjingör; vrf Ods-Htrred. Dn. Markujfen*, Flor. Jun. Jul

339. *Myagrurn.*

Silicula ftylo terminata: valvis concavis loculo fubrnonofpermo.

550* *M* fativum*, fi lieu I is obovatis pedunculatis polyfpermis. Flor. Dan. Tab. T038.

Inter Linum in agris hand frequens. Flor. Jul. 8C Aug.

551. *M. paniculatum*, filiculis lentifoimibvis orbiculatis, punctato vugolis. Flor. Dan. Tab. 204. In oleraceis, inter fegetes pafiin. Flor. Jun. Jul. Aug.

530. *Draba.*

Silicula ovali-oblanga, ilylo dedituta: valvis plarufculis difTepimento parallelis.

552. *D. verna*, fcajlis ramofis nudis; foliis fibferatis ov/ih lanceolatis pubeicenticus* **Flor. Dan*** Tab. 983.

Tetradynamia Siliculosa.

157

In arvis, pratis, agris tempore vernali vulgari-
tiffina.

231. *Cochlearia.*

Silicula'tiuidā, Lylo,corcnata, giabra, vel
muricata: valvis gibbis: Jocularis polyfpeimis.

553- (?• offiinalis) foliis radicalibus coidato-'ub-
rotundis, caullnis oblongis lubfinuatis; filicu-
lis ovatis lubLLigofib. b\ai\ Dan. Tab. 135.

In littore maris: *imellem Kajiellet eg Conjlantid.*
Flor. Jun.

554. *C. danica*, foliis haftato-angulatis: OTfinibu*
deltoidibus; filiculis ovato- lotuneis, glabriu-
fculis. Flor. Dan. Tab 100.

Haud vulgatiiffima in maritimis: *lige over for*
Chariottenlund paa Mulvarpe- Tuerne. Flor, Apr.
«CMaj. ,

555. 6'. *Coronopus*, foliis pinnatifidis; caule de-
preffo; racemis lateralibus, floribus confertis;
filiculis iubcompreflis muricatis* tlor. Dan.
Tab. «02.

In fossis humidifficulis: *uden for Amager- Port;*
i Gti>terne ved 6/ler 03 JSOrt dle 8Cc. Flor.
Jun. Jul.

*3SU *Iberis.*

Corolla irregularis: petalis duobus majoribus*
Silicula comprefla: fepto contraio: loculi^
moiofpermis.

556. *I* nudicaulis* herbacea, foliis finuatis in or*
bern digeftis, depreflis; caule fubnudo fub-
ftmplici. Flor. Dan. Tab. 333.

In apricis, arvis, arenosis ficcis: *paa Veien til Charlottenlund hvor Grantraer Jiaaer; imelhm₄ Fugiehvad Mölle og Breda, liakktr. Jb'lor. Jun, tC* Jul.

233. *Ltpidium.*

Silicula: valvis acute tarinatis; loculis monopfi-TUUS.

557. *L iutifolium_b* foliis ovato-lanceolatis integns, it-iiatis; fi lieu I is ovatis¹vix emar¹inatis, Fl/>r. Dan. Tab* 557.

In litcore iwaris *AmugKia* tantum vidi. Flor. Jun. Jul. 8C Aug.

558. *L. rudtraU)* floribus diar. dis apetalis: ioliis radicalibus deritato-pinnatis ramieris linearibus integerrimis; filiculis compreflis einarginatis. *Floi, Danic. Tab. J84.*

Hn rucleratis, ad via : *uden for Eyem Poru.* Flor. Jun. Jul. &C Aug.

2134. *ThlospL*

Silicula: valvis emarginato-carina¹is vel fun* pliciter cannatis; navicularibus: loculis polyfpeimis.

559. *T. arvenfe,* filiculis orbiculatis comprtffis glarbris. Flor. Dan. Tab. 793.*

In agris, ad vias, in cultis. Flor. Maj. Jun. Jul

560. *T. campeflre,* filiculis fubrotundis, cbrnpresfiufenlis lubpubefcentibus; foliis fagittatis ~~de~~ tatis iucanis. Flor. %Dan. Tab. 1241.

In arvis 8C pratis haud frequens: *ved Bern/for/*.
Flori Jun. Jul.

S6x. T. /Jur/a *pqflorh*, filiculis obcordatis margine
membratissimis; foliis radicalibus pin-[#]
natifidis dentatis: caul in is sagittatis. Flor.
Dan. Tab. 729.

In cultis, ruderalis, ad vias ubique. Flor. aestate.

S I L I Q U O S A ,

935. *C a kite*. Roth.

Siliqua brevis subtetraedra: angulis duobus
interioribus: loculis submonopermis.

563. *C rnaritima*, foliis carnosissimis dentatis obtusis
ferrugineis; caule erecto ramis diffusis. Flor*
Dan. Tab. 1168.

Bunias Cakih filiculis ovatis laevibus ancipiti-
bus Lin.

In montibus haud frequens: *pan Amager, 'imeU*
lem Kastelht 03 FeieA. Flor. Jul.

Variat foliis pinnatifidia laciniis linearibus
obtusis.

S35. *Eryfimum**

Calyx clausus. Siliqua columnaris tetraedra*

S63. *E. ojjicinale*, foliis runcinatis caule ramo
divaricato; filiculis subtetraedris subulatis ad*
pressis. Flor. Dan. Tab. 560.

In ruderalis, ap vias, pagos. Flor. Jul. Aug.

^ 4. *E. Barbarea*, foliis lyratis, extimo subro*
tundo: caule erecto anguloso glabro \ iiliquu

* (*J \ Telr adynamia Silt quo fa**

linearibus, obfolete tetragonis ftrictis acuminatis, Flor. Dan. Tab. <j85-

Hatid frequen's in humidts. I^l or. **Maj.Jun.Jul.**
565. *E. Atlitiria*, foliis cordatis : **caule erecto fub-**
fnnpl cifiirno ; fillquis tetraedris linearibus
longis erectorpateptibuS. Flor. Dan. Tab. **935.**
Inumbrofis, dumetls fubhumidis; *ved Grovten*
i Friderichsberg Altec• *ved Jagersborg.* Flor. **Jan.**
8C Jui.

566. *E. Cheyrantoides*, foliis lanceolatis integerri*
nils; caule erectoratnofifiirno; iiJiquis patulis.
Flor. Dan. Tab. 933.

^v **In ruderatis rarior : paa OJlerfailed ved Salpeter***
v&rket. Flor. Jun. Jul.

237. Turritis.

Siliqua teres angulofa: dilTepimento valvis
fubaequali.

567. *T.glabra*, foliis radicalibus dentatis hifpidis,
caulinis. integernis, amplexicaulibus, gla-
bris. Flor. Dan. Tab. 809.

In fepibus ad vias baud infrequens. Flor. Jun*
8C Jul.

568* T^l- *hirfuta*, roliis omnibus hifpidis, caulin[^]
araplexicaulibus ; **filiquifl** comprefflufcull"
Flor. Dan. Tab. *to\o.*

Rarior in pratis humidijfenlis, necnon in *collinis*
ficcis: ved lltrnjlarfs Mqfti paadefmaae *Bakker*
inullem OiintdfU 05 Jagersborg. Fior. *Maj-*
8cJun.

238* *Sifymbrium.*

Calyx patens. Corolla patens: **utiguibus** mi-
jiimis. **Siliqua** teres **dehiscens: valvulis rec-**
titilcnlis tiiffepimento fere **sequalibus;**

569. **AS.** *Nafturtium*, fdiiuis decliimtis; foliis pin-
natis: folio hs iubcordaris. For. Dan. Tab. 690.

Ad fcaturigines, iollas. Fior. Jun.

570. *S. amptiiOium*, i'lliquis declinatis oblongo*
ovatis; petalis calyce majoribus.

Ad foifas, in pratis humidis. Flor, Jiin.Jul.

*a** *atfuaticum*, foliis omnibus deatatis vel
incifo- ferratis. Flor. Dan. Tab. 981-

p. *terreflre*_o foliis inferioribus fnr.pliribus
fuperinrtbns pinnatifidis vtrl lanceolatis,

y. *paludofurriy* foliis fuperioribus lanc.eolatis,
mediis laciniatis vel tnci(ia, inferioriibus
denticulatis, acutis. I^obel Icon. p. 3ig.

571. *S. palujlre*_a filiquis declinatis oblongo-ovatis
foliis pinnatifidis ferratis; petalis calyce mino-
rib.is vel aequalibus. Flor, Dan. Tab. 409.

Ad folTas in pratis immiriis. Flor. Jun. Jul.

57?. *S. Sophia*, petalis calyce minoribus, foliis
decompofito- pinnatis. Flor. Dan. Tab. 528*

In ruderatis fere ubiqae. Flor. Jun. JuK Aug.

339. *Raphanus.*

Siliqua teres, torofa, fubarticulata.

573. it. *Raphaniftrum*, •fiHquis reretiims articulatis
^ ivb us nmlocularthus-; foliis ovatis denticulatis

obtufis basi plerumque pinnatifidis, hispidi*.
Flor. Dan. Tab. 678,
later fegetes. Flor aestate.

240. *Brassica.*

Siliqua cylindracea: de Tepimenfco valvis longiore.
Calyx connivens.

574. *B. campestris*, radice cauleque tenui; foliis
caulinis uniformibus cordatis aut plexicaulibus*
glaucis glabris; interioribus lyratis rugosis*
pitosis hispidis. Flor. Dan. Tab. 550. male.

Inter fegetes ad vias. Flor. Maj. Jun. Jul.

x. caule foliisque omnibus glabris nec pilosis
nec scabridis; radice cylindrica.

241. *Sinapis.*

Siliqua rostrata: de flepimento valvis longiore.
Calyx patens.

575. **S. arvensis*, filiquis multangulis torosis-turgidis
laevibus, rostro ancipiti longioribus. Flor.
Dan. Tab. 753.

Inter fegetes ad aggeres & C. Flor. aestate.

576. *S. alba*, filiquis hispidis: rostro longifilina
eniformi.

In hortis, cultis oleraceis *Amagria*. Flor. Jun.
Jul. & C. Aug.

577. *S. nigra*, filiquis glabris, racemo adpresso* 5
rostro brevifloro tetragono.

ID ruderalis bine indiv. Flor, Jun. Jul.

Tetradynamia Sifiquofa. U)J

242. *Arabia.*

Siliqua¹ linearis, comprefia, apice integro capitata

578. *A. Thaliana*, foliis radicalibus petiolatis lanceolatis integerrimis in orbem dispositis. Flor. Dan. Tab. 106.

In agris, arvis, aggeribus: *ved Lyngbye; Writ* rōd 8Cc.* Flor. Maj. Jun.

243. *Hesperis.*

Siliqua compressa - plana. Stigma basi bifurcatum, apice connivens.

579. *H. matronalis*, caule simplici erecto, foliis ovato lanceolatis denticulatis; petalis mucrone emarginatis. Flor. Dan. Tab. 921.

In declivis umbrosis *nd Springforbie*, Flor. Jul. SC Aug.

944. *Cyrdamine.*

Siliqua cylindrico - compressa, elastice demum flexa: valvis revolutis: dissepimento membranaceo.

«

*Stigma integrum capitatum.

580. *C. pratensis*, foliis pinnatis: toliolis radicalibus subrotundis, caulinis lanceolatis. Flor. Dan. Tab. 1039.

In paucis Sc pratis ubique. Flor. MJJ. Jun.

§81. Variat pinnulis omnibus linearibus.

C. hirsuta, foliis pinnatis floribus tetrandris; caule erecto flexuoso ramoso piloso supra glabro. Flor. Dan. Tab. 148*

KJ8

Tetradynamia Siliquofa.

In humid is ad rivuios: *ved Rave - Bakken ; i Mo. fen neden fur Krattet bag ved JFugtehvad Molle.*
Flor. Jun.

345. *Dentaria.*

SiHqna teres marginata elastice defiliens: val*
vis u volutis: diffepimento fungofo. Stigma
envarginatum.

582. J). *bulLifera*, foliis inferioribus pinnatis fum-
mis iimplicibub (*midils ttrnis ttifidisve bulbillis*
*in axillls foliorum fejjilibus, demum atropurpu**
rzi\$ deciduis.) Flor. Dan. Tab. 361.

Jnnemoiibusmontofis: *ved Friderichsdal. Mullen*
Plantam hanc rariirunam tiuiupiaia ia Loco ante-
dicto vidi 8C frustra quefivi; in fylveautem pro-
montorii Infulae Moose vulgo *Store Mint* baud
~~frequens~~ legi.



C L A S S I S XVI.
M O N A D E L P H I A .

D E C A N D R I A .

Geranium. Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Stamina quinque ad decent. Stigmata quinque. Receptaculum commune rostratum. Cocculi quinque, cauda longissima tortili.

P O L Y A N D R I A .

Malva. Calyx duplex: exterior biphyllus acutus; interior femiquinque & major.

D E C A N D R I A .

346. *Geranium.*

Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Stamina quinque ad decern. Stigmata quinque. Receptaculum commune rostratum. Cocculi quinque, cauda longissima tortili. *Gartn. defructib. dyfeminib.*

* Staminibus (quinque antheriferis. *Erodium* Theret.

\$00

Monadelphla Decandria.

585. *O. cicuidrlufh*, pedunculis **nuHfflons** (*trifeu quadrijloris*) **radicalibus** fubaxillaribus; **6prol-j** Jis vix talycem fuperantibus, ioliis **plnnatii** Ja?viter obttue inciis; auflis glabris. Lobel. **icoYii** pag. 659.

In a.[^]iis, arvis. Flor. feptate,

584. (** *charophyllurrii pedunculla rtmultiflona* (*fex-fvptemjloris*) axiliaribus;^ corojUs calyce tna-
loribus; foiis pinnatis piotunde ^C acute in-
cifis; anttis villofis,

- In agris Sc aggeribus. Flor. aedate.

a. pedunculis qiiidri*quinque -fexflois ra-
diciilibiis axilbribusque; loliis ' pinnatis ;
pitmnlis laevi(-er incifo-ferratis, **Flor***
Dan. Tab. 986.

** Stanjini!)U8 decern antheriferis.

585. £• *phaum*, pedunculis **folitariis** (*Sifioris*) op-
poiitiloliis; c.i/ycibus fubariftatis; caule er-
ecto; *1 foiis fubfeptemMatis incifts & obtlife den-*
tads); petalis undulatis, Flor. Dan, Tab. 987.

In urnbrofis ; *liofenbttrge* Have** Flur. Jun.

586. *G.fykaticurn*, **pedunculis** biiloris. • **foiis** fub-
peltatis quinc^uelobisa incifo-ferratis; **caul**
erecto; petalis emmginatis. Flor. Dan. Tab
124.

In fruticetis collinis: *imelltm Tughlivad-MM*
og Brede»Bokke. **Flor.** Jun, Jul.

587. *G. palufre*, pedunculis bifloris longifTimi
declitiatis; petalis integrts; foiis quiuquelobis
incifis. Flor. Dan. Tab. 596.

In paludibus: *ved Fughhvad-Molh\ Dyrehavt*
& aliis locis* Flor. aestate.

588- *G. pratense*, pedunculis bifloris; *foliis sub-
peltatis multipartitis rugulis acutis; petalis
integris.

In pratis: *Mullet*. Flor, Jun.

589- *G. robertianum*, pedunculis bifloris; calyci*
bus profusis decemangulatis; foliis ternatis qui-
natisque incisjs, Flor. Dan, Tab, 69 [.

In umbrosis, nemoribus, in fepimentis. Flor*
Jun. Jul. Aug.

590. *G. molke*, pedunculis bifloris foliisque florali-
bus alteris; petalis bifidis;* calycibus mitti*
cis, caule erectifloro, foliisque rotundatis
femiquinque nervis - septemfidia profusis, mollis-
simis; *Quipulis quatuor Jubulatis emanidis*,
Flor. Dan. Tab. 679,

In aggeribus ad vias. Flor, Jun, Jul

591. *G. columbinum*, pedunculis bifloris folio
longioribus; foliis quinquepartito multifidis;
antheris glabris; calycibus aristatis pentangulari-
bus magnis. Flor. Dan. Tab. 1222.

In aquis, agris; *ved Sorgenfrie; imelltm*
Vulbn og tlajkikrotn, Flor. Jun. Jul. Aug.

592. *G. dissectum*, pedunculis bifloris; foliis quin-
quepartito trifidis; petalis marginatis longi-
tudine calycis; antheris villosis. Flor. Dauc.
Tab, 96.

In duabus, foliis baud frequens. Flor. Jun. Jul

593. *G. rotundifolium*, pedunculis bifloris; petalis integris longitudine calycis aristatis; caule prostrato, foliisque reniformibus femiquinquefidis incisis, villosis subvittatis* *folia inferioribus oppositis: superioribus subcuneiformibus, trifolij plerumque alternis.*)

In agris, arvisque inaequalibus. Flor. aestate.

». *malvifolium*, pedunculis bifloris \$ petals emarginatis; calycibus acuminatis; Caudice subvillosulo crassiore ac ramoso flore; foliis ferni sex-septem-octofidis villosis; foliulis ovatis incisif laciniis longe acuminatis. Vail, Paris. Tab. 15. i u?

594. *G. sanguinea* Pif pedunculis unifloris foliis (quinquepartitis trifidis orbiculatis. Flor. Dan. Tab. 1107.

In pratibus, dumetis, ericetis. Flor. Jun. Jul. 8C Aug.

P O L Y A N D R I A .

247. *Malva**

Calyx duplex: exterior bi-triphyllus acutus: interior femiquinquefidus major.

595. *M. rotundifolia*, caule prostrato, foliis cordato orbiculatis, obsolete quinquelobatis; pedunculis fructiferis declinatis. Flor. Danic. Tab*

721.

In rudibus, ad vias, pagos. Flor. aestate.

j6. *M.-fylveflris*, caule crecto Icabrñ; foliis quinque-feptemlobatis crenato - ferratis; pedunculis petiolisque pilolis. Flor. Danic. Tab. 1223.

Ad vias, fepes; in ruderatis. Flo[^]Jun. JuK & Aug.

§97. *M. Alcea*, caule erecto; foliis radicalibus cordatis fublobatis crenatis: caulinis quinquepartitis, lobis protunde incifis. Cavanill. tab. 17. f. 2.

In arenofis: *imellem Charlottenlund 'og Skovshoved.* Flor. JuL Aug.

C L A S S I S XVII.
D I A D E L P H I A .

HEXANDRIA.

Fumaria. Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala, irregularis fepe calcarata* Stamina duo antheris in fingulo tribus, Ovarium fuperum. Stylus iimplex, Capfula unilocularis evalvis, monofperma. Semen panē ti affixum,

Capnoides. Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala irregularis calcarata. Stamina duo, antheris in fingulo tribus. Ovarium fuperum. Stylus fimplex. Capfula filiquofa, bivalvis unilocularis polyipeiina* Semina futuris affixa,

OCTANDRIA.

Polygala. Calyces pentapiylli lacinise dus alae* formes. Stamina connexa. Capfula bilocularis.

DECANDRIA.

Spartium. Calyx bilabiatus 9, deorfum produc* tus. Filamenta germini adhaerentia. S^gu[^] longitudinale fupra villofum.

Vltx. Calyx diphyllus. Legumen inflatum vix calyce longius.

Ononis. Calyx quinquepartitus: laciniis linearibus. Vexillum ftriatum. Filamenta connata absque fiffura. Legumen rhomboideum turgidum feffile.

AnthyHis. Calyx ventricosus quinqueidentatus* Legumen fubrotundum tectum,

Pifum. Calycis denticuli duo fuperiores breviores. Stylus triangularis fupra carinatus pubefcens.

Orobus. Calycis denticuli duo fuperiores profundiores. Stylus linearis teretiufculus fupra villofus.

*Lathyrus** Calycis lacinae fuperiores duo breviores. Stylus planus, a medietate ad apicem antice villofus.

Vicia. Stylus fub ftingate barbatus.

Ervum. Calyx fubaequalis longitudine fere. Corollas.

AJtragalus. Legumen biloculare gibbum vel inflatum,

Trifolium. Legumen vix calyce longius LOU dehifcens.

Lotus. Legumen frictum cylindricum. Corollas alas fuffum longitudinaliter conniventes.

Medicago. Legumen compressum cochleatum. Carina corollas a vexillo deflectens.

H E X A N D R I A .

218. *Fumaria.*

Calyx diphyllus. Corolla tetrapetaia, irregularis faept? calcarata. Stamina duo antheris in fingulo tribus. Ovanum fuperum. Stylus fimplex. Capfula unilocularis evalvis mono* fpcrrna. Semen parieti affix urn. v Ga?rtn. de fructib. 8C feminib. pag. 162. Tab. 115. fig. 2.

598. *F. ojjicinalis*, floribus fpicato-racemufii>; foliis fupradecompo'itis: laciniis bi-trifidisve; caule difidfo. (*pericarpis obcordatis bivalvfa*) Flor. Dan. Tab. 940.

In agris, aggeribus, cultis copiofilima. Flor. Maj. Jun. Sc Jul.

249. *Capnoides.*

Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala irregularis calcarata. Stamina duo antheris fingulo tribus. Ovarium fuperum. Stylus firnplex. Capfula filiquofa bivalvis unilocularis polyfperma. Semioa futuris affixa, nitidiflima atra, compreffa. Gaertn. de fructib. 8C femin. pag. 163. Tab. 115. fig. 3,

- Soo. *C. Halleri*, radico bulbofa, ravo lineari; braeteis digitatis; (*foliis biternatis: petiolis univer* jalibus oppofitis: partialibus fubalternis, folio* Us ovatteyfubovatis, integerrimis vel emarginatit %ofd tricrenatis rarius bifidis; into folio bafi Jli* pula nwmbraacea vaginato; caule fubjimpli'*)

Diadelphii Hexandria. go;

ciffimo trifolio). *Fumaria Hallerii Vahl Flor. Dan. Tab. 1M.*

Rarius in luco: Charlottenlund. Flor. Maj. Jun.

600. C. major, radice bn'bofa inferne exiawata; bracteis lanceolate ovatis 11 >tegfrirnis; foliis biltrnati* rarius pinnatis: petiolis, univerfalibus alternis: partialibus oppofuis; jolinlisbitri qua* drifidis; exjlipulalis; caule fimplicijimo; bifolio). *Fumaria bn'bofa Flor. Dan. Tab. 60j.*

In luco: Charlottenlund baid infrequens. Flor. Maj. Jun,

u. foliis terna'is; fol'olis ovatis obtufis profunde incifis alternis.

p. floribus albis.

601. C. minor, radice folida; bracteis ovatis integerrimis; (foliis biurjiatis Urnaltsqut infimo jlipulato: foliolis cuntatis bl trifdisve rarius purtitis; petiolis oppofuis g caule bifolio fimplicijimo velfubramofo). :

Hawlirequens: Charlottenlund. Flor. Apr. Ma>

O C T A N D R I A .

CjO. *Polygala.*

Calyces penraphylfi laciiiiis dux alaeformes. Stamina connexa. Capfula bilocularis.

>0?. P. vulgaris, floribus ariftatis racemofis; calicibus herbaceis fimplicibus procumbentibus; foliis lineari lanceolalis. Flor. Dan. Tab. 516.

In arvis, pratis. Flor. Maj. Jun. Jul/

Variat fionibus violaceis; coeruleis, albis.

*a. major**

In fylvaticis.

BECAVDRIA.

251* *Spartium.*

Calyx bilabiatus jdeorfum protinetus. FUamenta germini adhaerentia. Stigma longitudinale Tupra villofum.

603. *S* fcvpariurrii* foliis ternatis folitariisque ramis inermibus angulatis. Flor. Dan. Tab. 313.

liarius in vicinis: ved Vejen til Charlottenlund
Copiofior ved Helfintior Dru Holten. Flor. Jun.
Jul.

252. *Ulex.*

Calyx diphyllus. Legumen inflatum vix alyce longitfl.

604. & *eurapaus*, foliis villofis acutis; fpinis fparfis. Flor. Dan. Tab. 608.

'Habit cum praecedente: Flor. Maj. Jun.

453. *Ononis.*

Calyx quinquepartitws: laciniis linearibus Vexillutn ftitatum. FUamenta connata alque ^fifTura. Legumen rhomboideum turidum fertile.

€05. 0. *finnofa*, floribus vacemofas folitariis subniniisquei foliis obovatis, ternatis iolitariij

9^ue, apicein verius ferratis, caule ramisque vil/ofis."

α. glomerata, racemis spinisque conglomeratis; foliis brevibus subglabris. β. mitior, floribus spini solitariis foliis majoribus cauleque villofis. Flor. Dan. Tab. 783.

In pascuis, pratis: α. imod Stranden ved Flaskekroen β. fere ubique. Flor. Jun. Jul.

506. O. arvensis, floribus racemose spicatis; foliis ternatis superioribus ovatis ferratis acutis caule villosis; pediculis inermibus villoso-vilosis.

Stfl

Jacq, Hort. r. T. gj.

In pascuis &c pratis f. SetabiJ. Flor. JUl. Aug. blus circa Flaskekroen.

254-

Calyx ventricofus, <iuinquedentatus. L6gU, men fubroh.ndum tectum.

7. A. viulneraria, herbacea, foliis pinnatis: impari inferiorum majori; capitulo duplicato. Flor. Dan. Tab. 98g.

In pratis, pascuis copiofa. Flor. Jun. Jul. Aug.

255. Pifum.

Calycis denticuli duo superiores breviores. Stylus triangularis supra carinatus pubescens.

108. P. maritimum, petiolis supra planiusculis; caule angulato; stipulis sagittatis; pedunculis multifloris. Flor. Dan. Tab. 338.

In litore mavis: *Odsherrcd. Dn. Marlusfm;*
Norftid Inf. Mona. Flor. Jun. Jul. •

256. *Orobus.*

Calycis denticuli duo fuperiores profundiorei.
 Stylus liueatis teretiufculus fupra villofus.

#09. *O. vernus*, foliis pinnatis ovatis j ftipulis fe-
 mifagittatts inttgerhuiis; caule fira^Uci. Flor
 Dan, Tab. 122ft.

Bariirnnus: *i Dyrehaven paa hbire Side fra For-*
luntn til Kildm ikfa langt fra Indlwgningen.
 Fltu*. Jun/

ii0. *O. tuberojus*, foliis pinnatis lanceolatis Hipu-
 lis feniifagittatis integer rim is; caule funplicii
 Flor. Dan. Tab. 781.

In fylvis, nemoribus, fruticetis, pratis. Flor.
 Maj. Jtin.

fill. *O. Tiiger*, f'olils fexjugis (*quadri-quinquejugis*
 ovato oblongis; caule erecto ramofo. Flor
 Dan. Tab. H70.

IRarius in umbvofis, fruticetis: *paa Brede Bak*
for; imellenj Dyrehavens Gierde og Ordrup-Mofl
*ikke langt fra Jagdporten** Flor. Jun. Jul.

257. *Lathyrus.*

Calycis laciniae fuperiores duo breviortf
 Stylus planus, a medietate ad apicem anti
 villofus*

(J12. *L. tuber'ojus*, pedunculis multiflorls; c'w^
 diphyuU folioli& ovulibus; internodiis nudis

Inter raiyflimas: *paa Kajlels - Volden ud til SHen,*
Flor. Jun. Jul.

613. *L. pratenfiii* pedunculis rmultifloris; cirrhig
diphyllis iinpliciflimis: foliolis lauceolatis.
Flor. Dan. Tab. 527.

In pratis, dumetis? aI frpes. Flor. Juru Jul.

fii^ *IJ. Jylveflrist* 'pedunculis mulrifloris; cirrliis
dip It ioholis enliiormibus; internodiis
mcmi)raiaceis. Flor. Dan. Tab. 325.

In (Iec,Uvis iuticetis; *ved Springjorbit'*, ad via*
tbideocL *Ved L)ngbye- Soe.* Flor. Jun. Jul. Aug.

615. *L. palnjlrisy* peduittulis rmultiiloris; cirrhia
polyphyllis; ftipulis lauceolatis. Flor. Dan.
Tab. 199-

In pjfciti^ humidis rarius: *i Lundehuus-Mofe vtd*
Gruvun. Flor. Jun* Jul.

258. *Vicia.*

Stylus fub fligmatebarbatus.

616. *V.fylvatica*, pedunculis rmultifloris; foliolis
ovalibus; ilipulis deenticulatis. Flor. Danic.
Tab. 277-

Haud irequens in fylvis, fruticetis: *paa holre*
*Haond ved Jirnen til Friderichsdul; i Gelsjkov**
Flor. Jun. Jul. Aug.

617. *V.cajfnbiva*, pedunculis fubfexflori ; foliolii
<lenis (flc *plurikus*) ovatis acufcis; ilipulis in*
tegris. Flor. Dan. Tab. 98. *Vicia militan**
Crantz ft'ip. AuHr. Fafc. V. pag. 3^3. Tab. I.
fig. 2. *Vicia Gerardi Syft, Vegetab. Jacq, Flor.*
Auftr. HI. Tab. 229.

In collinis fruticosis ficcis: *Brede Bekker*, Flor.
Jun. Sc Jul.

618. *V. Cracca*, pedunculis multifloris, floribus
imbricatis: foliolis lanceolatis pubescentibus*
integris. Flor. Dan. Tab. 804.

In fepibus, ad vias, inter fegetes. Flor. Jun,
8c Jul.

Variat foliis latioribus 8c angustioribus cauli*
busque magis minusve pubescentibus.

619. *V. fativa*, leguminibus fevilibus fubbinatis
erectis; foliis retusis stipulis notatis, Flor.
Dan. Tab. 522.

Inter fegetes. Flor. septate.

620. *V. angulifolia*, leguminibus fevilibus, fub-
binatis,, patentibus; foliolis ovatis, re-
tusis marginatis: superioribus linearibus apice
integerrimis (*mucrone fetaceo*); stipulis denta-
tis; femibus globosis nigerrimis. Joh#
Banhin. liliAor. plantar. II. pag. 31s.

Viciajativa *O. nigra* Linn,

Inter fegetes in axvis: *ved Brede Bakker*. Flor*
Jun. Jul.

521. *F. lathyroides*, leguminibus fetribus foliis
erectis glabris; foliolis ovatis, inferioribus o-
cordatis. Flor. Dan. Tab. 58.

In apricis haud frequens: *ved og i Charlotte^*
*lund** Flor, Apr. Maj. t. Jun.

622. *V. fepium*, leguminibus pedicellatis subqua-
ternis erectis; foliolis ovatis obtusis mucrona-
tis

tis: exterioribus decrefcentibus," Flor. Dan.
Tab. 6gg.

In fepibus, nemoribus, pratis.

359. *Ervum.*

Calyx fubfequalis longitudine fere. Corollas.

623. *£. tetrifpermum*, pedunculis fubbifloris; leguminibus fubglabris tri - tetrafermis; feminibus globofis. Flor, Danic. Tab. 95.

In fepibus ad|vias: ved *VeUn til Pupier\$~MolU**
Flor. Jun. Jul.

634. *E* hirtutum*, pedunculis multifloris; leguminibus hirtuto- villofi* difpermls; feminibus globofis. Flor. Dan» Tab. 639.

Inter fegetes, agris. Flor. Jun. Jul.

360. *AJlragalus.*

Ltegumen biloculare gibburn vel inflatum.

635. *A.glyciphyllus*, caulefcens proflratusT leguminibus fubtriquetris arcuatis; ibliis pedunculo Jocgioribus: foliolis ovalibus. Flor. Danic. Tab. 1108.

In nemorofis, fruticetis, fepibus haud infrequens. Flor. Jun. Jul. Aug.

626. *A. Danicus*, caulefcens, decumbens, **hirtus**; capltulis longe pedunculatis; legumiuibus t>revibus inflatis pilofis. Flor. Dan. Tab.674.

In pascuis ad margines agrorum haud **frequentiffimus** : *paa KajUls- Volden; paa Stagier-Van-€«n, ved Veien til Conjlantia.*

2C1. *Trifolium*,

Legumen vix < lyce iongius non H.ehifcenf.

- * Melioli. Leguminibus nudis.

637 X'. *Mvlilotus officinal is*, legm Minibus racemofis nudis, difpermis, rugofis, acutis; caule erecto. Flor. Dan. Tab. 93\$.

Ad vias, in aggeribus r vtd Veien til Boddingei Hiurtefpring; Radergaard; inllttoieimellejnKio-benhavn og PapiersMolk, FJor. Jun. Jul. Aug,
Variat flonbus all>is.

- ** Lotoidea. Leguminibus tectis polyfpermis.

6*8- *T. rtpers*, capitulis umbellaribus; leguminibus tetrafpernis; caule repente. Flor. Dan, Tab. 090.

In pratis, pafcuis frequens. Flor. aestate.

- * * * Lagopoda. (Jdlyciljus villofi3.

629. *T. pratense*, fpicis globofis fubvillofis; cinctis ftipulis oppofitis membranaceis; corollis monopetalis; foliis ex ovato fubi'otundis integerrimis; ftipulis ovatis ariilatis fcuriofis Flor. Dan. Tab. 989.

In pratis, pafcuis, ad vias 8Cc. Flor. Jun. Julj fic Aug.

630. *T. alpejire*, fpicis fubglobofis villofts terminalibus fubbinis; caule erecto; foiis lancet latis ferratis; ftipulia angMAioribu? acuniinati ciliatis viridibus. Flor. Dan. Tab. 662.

In nemorofis. Flor. asftate.

631. *T. jlexuofum*, fpicis fubglobofis, Villefis, terminalibus; caule abfcendente flexuofo ramofiffimo; foliolis ovato-lanceolatis ferrulatis. Jacq. Flor. Aullr. 4. tab. 386.

63*. *T. arvenfe*, fpicis villofis ovalibus; dentibus calycini6 fetaceis villofis aequalibus. Flor. Dan. Tab. 724.

In agris, arvis fertilibus frequens. Flor. Jul, & Aug.

633* ?• *flriatum*, capitulis feffilibus fublatei-alibu* ovatis; calycibus friatis rotundatis. Flor. Dan. Tab. 1171.

In arvis, ad margines agrorum: *ved Børnjlorfs Skov til Gientofte paa de jmaae Baiktr J'amme-Jleds; imellem Chat lotttlund og Skovshoved; paa Amager.* Flor. Jun. Jul.

**** Veficaria. Calycibus inflatis vea* tricofis.

1^34. *T. fragrfrwn* •> capitulis fubrotundis; calycibus inflatis bidenta'is; cauibus repentibu*. Flor. Dan. Tab. 1043,

In pratis littoris mfris frequens. Flor. Jul. Aug.

***** L-upulina. VexHlis corollse inilexis.

15. *T. mamananum*, fpicis fubimbricatis, fubtribus; vexiuis fubulatis emarcescentibus; calycibus nudis; caule erecto. Flor. Dan. Tab.

Haud vulgatifTimum in pmtis aridis marem v«r-
iuafortrie Jflufiekrwu Flor. Jul. Aug.

636. *T. agrarium*, fpicis ovalibus imbricatis, vexillis deik-xis perfiftentibus; culycibus nudis; caule erecto. Flor* Dan. Tab- 558. (*Joliolis oblongo-ovalibus antice ferrulatis, via emarginatisi jliputis glabris.*)

In arvis, ad margines fofTarum,, fruticetis: *vec Fuglthvad-Molle.* 8c alibi. Flor. Jul. Aug.

637. *T. procumbens*, fpicis ovalibus imbricatis; vexillis deflexie perfiftentibus; caulibus procumbentibus. (*Foliis obovatis antice ferrulatis kmarginatis cum jnucrone; Jlipulis ciliatis*)
Flor. Dan. Tab. 796.

In arvis, pafcuis. Flor. Jun. Jul.

638* *T. fdiforme*, fpicis fubimbncatis; vexillis de Jlexis perfiftentibus; calycibus pt dicellatis caulibus procumbentibus. (*Folwiis obcordm ' entice ferrulatis ernarginatis, potius relufis y Jlipulis ciliatis*)>

In pratis 8C pafcuis, ad foflarum margines. Flo Jul. Aug.

962. *Lotus.*

Legumen ftrictum cylindricum. Coxollae al furfum longitudinaliter conniventes.

639. *L. corniculatus*, capitulis depreffis; caulibij decumbentibus; leguminibus cylindricis pj tentibus. Flor, Dan. Tab. ggr.

In pratis, ad vias irequens. Flor. Jun. — Aui

263. *Medicago.*

Legumen cornutum' cochleatum. Carina
corollae a vexillo deflectens.

640. *M. fativa*, pedunculis racemosis; legumini-
bus contortis; caule erecto glabro. Lobel.
Obfervat. pag. 49s*

In pratis, ad vias: *paa Veien til Conjlantia;*
paa Bakken imellem Charlottenlund og Skovshoved.

Flor. Jun* Jul.

641. *M. lupulina*, fpicis ovahbus; leguminibus re-
niformibus monofpermis; caulibus procum-
bentibus. Flor. Dan. Tab. 993.

In arvis, agris, aggeribus frequens. Flor. Jun*
8C Jul,

fi42. *M. polymorpha arabica*, pedunculis tri-qua-
dri-quinqueflo'is; legjuminibus echinatis fo*
liolis obcordatis!

Inruderatis; *uden for Amager-Port.* Flor. JuK
8CAug.

C L A S S I S XVIII.
P O L Y A D E L P H I A .

P O L Y A N D R I A .

Hypcricum. Calyx quinquepartitus inferm.
Corolla pentapetala. Capiula tri-quinquelocularis polyperma.

P O L Y A N D K I A .

364. *Hyp eric urn.*

Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Filamenta in tres ad quinque phalanges basi coalita, Capsula loculis numero stylorum.

• Trigynae.

443. *H. quadrangulare*, floribus trigynis; caule quadrato herbaceo. Flor. Dan. Tab. 640.

In locis humidis passim. Flor. Jul. Aug.

Variat corymbis coarctatioribus, floribus minoribus.

444. *H. perforatum*, floribus trigynis; caule angustifolium; foliis obtusis pellucido-punctatis. Flor. Dan. Tab. 1043.

Ad vias, fepes, fruticetis. Flor. Jul. Aug.

645» *H. humifufum*, floribus trigynis axillaribus foliatis; caulibus ancipitibus prolatis — fornicibus. Flor. Dan. Tab. 141.

In arvis ficcis: *ved Bagfvard; Birkerdd.* Flor. Jun. Jul. Aug.

646. *H. pulchrum*, floribus trigynis; calycibus ferrato - glandulosis; caule tereti; foliis amplexicaulibus cordatis glabris. Flor. Danic. Tab. 75. •

Hariflimum: *ved FrederichsboTgl imellem JPre-dtensborg og Helfmgdr.* Flor. Jul. Aug.

647. *Hs montanam*, floribus trigynis; calycibus ferrato - glandulosis; caule tereti erecto foliis ovatis glabris. Flor. Dan, Tab. 173.

In d'jmetis, fruticetis, nemorosus: *i Kratttt ved Fuglehvad-Möll; imellem Tørbek og Papkr-Mölkj i Ermelunds- 6Aov.* Floi. Juli Aug.



C L A S S I S XIX.
S Y N G E N E S I A . .

POLYGAMIA ^QUALIS.

- * *Seniiflosculofi.* Corollis omnibus ligulatis.
Cichorium. Receptaculum subpaleaceum. Pappus subquinquedentatus. Calyx calyculatus.
- Hypochaeris.* Receptaculum paleaceum. Pappus subplumosus. Calyx imbricatus.
- Tragopogon.* Receptaculum* nudum. Pappus plumosus. Calyx {implex.
- Pieris.* » Receptaculum nudum. Pappus plumosus. Calyx calyculatus.
- Zizantion.* Receptaculum nudum. Pappus plumosus feflilis. Calyx imbricatus.
- Taraxacum.* Receptaculum nudum. Pappus plumosus ftripitatus. Calyx calyculatus.
- Scorzontra.* Receptaculum nudum. Pappus plumosus. Calyx imbricatus: margine fcarioso*
- Crepis.* Receptaculum nudum. Pappus pilosus, Calyx calyculatus: fquamis difformibus.
- Prenanthes.* Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Calyx calyculatus subquinqueflorus*

Lactuca. Receptaculum nudum. Pappus pilosus • imbricatus. Calyx imbricatus: margine membranaceo.

Hieracium. Receptaculum nudum. Pappus pilosus feffiles. Calyx imbricatus ovatus.

Sonchus. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Calyx imbricatus, basi gibbus.

Lappula. Receptaculum nudum. Pappus nullus. Calyx calyculatus.

»• Capitati.

Caruna. Calyx imbricatus radiatus: squamis interioribus coloratis.

Cnicus. Calyx ovatus imbricatus spinosus. Pappus feffilis plumosus.

Carduus. Calyx ovatus imbricatus spinosus. Pappus feffilis pilosus.

Serratula. Calyx subcylindricus imbricatus, muticus. Pappus feffilis.

Onopordon. Calyx ventricosus, imbricatus, spinosus. Receptaculum favosum.

Arctium. Calyx globosus: squamis apice incurvato -hamatis.

Diffoidei.

Eupatorium. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Calyx imbricatus. Piftilla lengiflima.

Bidens. Receptaculum paleaceum. Pappus bifidus. Calyx imbricatus*.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* Difcoidei.

Art em if fa. Reteptaculum fubnudum. Pappus nullus. Corolla; radii nulhe.

Tanacetum. Receptaculum nudum. Pappus fubemarghiatus. Corollulas radii trifidae au nullae.

- *Gnaphalium.* Receptaculum nudum. Pappus plumofus. Calyx fcariofus: fquamis concavis.

** RadiatL

Belli.* Receptaculum nudum. Pappus nullus. Calyx fimpiex: fquamis asqualibus.

Matricaria. Receptaculum nudum. Pappus ntilius. Calyx irnbricatus: fquaznis acutis.

Chrysanthemum. Receptaculum nudum. Pappus nullus. Calyx fq^utamia intimis fcariofis.

Arnica. R^oeptaculum nudum. Pappus pilofus. Stamina radii caflrata.

Inula. Receptaculum nudum. Pappus pilofus.
•Antherae bafi bifets.

Erigeron. Receptaculum nudum. Pappus pilofus. Coroilula? radii rapiilares.

Senecio. Receptaculum nudum. Pappus pilofus. Calyx fqinmis apice fphatelatis.

Solidago. R^oceptaculum nudum. Pappus pilofus. Corollulae radii fubfeni remoti.

Cineraria. Receptaculum nudum. Pappus pilofus. Calyx fimplex aequalis.

Tuffitage. Receptaculum nudum. Pappus pilofus. Ca y\ fquamis fubmembranaceis.

After. Receptaculum nudum. Pappus pilofu^.
Ca'y\ lubrquariofus*

Anthemis. Receptaculiim p^eaceum. Pappus nullus. Ca y\ haemifphaericus.

Achilla a. Rpeptaciiluzn paleaceum. Pappus nullus. Radius fubquinqueflorus.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

Centaurea. Receptaculum fetofum. Pappus pilofus. Radius corollas tubulofus.

POLYGAMIA NECESSARIA.

Milago. Receptaculum nudum. Flosculi foeminei inter fquamas calycis.

*Calendula** Receptaculum nudum. Pappus nullus. Semina fubmembranacea.



POLYGAMIA TEQUALIS.

* Semiflofcufofi: corollis omnibus ligulatis.

865. *Cichorium.*

Calyx caiycuiatus. JReceptaculum fubpaleaceum. Pappus fubquinquedentatus obfolete **pilofus.**

648. *C. Iniybus*, [floribus geminis feffilibus; fo*
- liis runcinatis. Flor. Dan. Tab. 907.

Ad vius iiequentiffimum: *Kongeveien*; jBcrn-
Jlorfveien' \$Cc. Flor. Jun. Jul. Aug.

a 66. *Hypocharis.*

Calyx fubimbricatus. Heceptaculum paleaceum. Pappus plumofus.

649. *H. maculata*, caule fubnudo: ramo folitario; foliis ovato-oblongis integris dentatis. Flor. Dan. Tab. 149.

Haud frequens in pratis graminofis, dumetis: *Battfvard*; *vcd Lyngbye - Soe.* **Fior.** Jun. Jul.

Variat caule rarnofiori: ramis unifloris fulcoiyrnbofis; foliis longe dentatis.

650. *H. radicata*, foliis runcinatis, obtufis, fcabris; caule (/capo) ramofo nudo lsevi; peclun-
culisquamofis incralTatis. Flor. Dan:Tab. 150.

In pa feu is, ad foflas. Flor, Jul. Aug.

65L *JtL glabra*, glabra, calydbus oblongis imbricatis; caule (*Jcapo*) rarnofio nudo (*plures c. uno radice*); foliis dentate-finuatis. Flor. Dan Tab. 434.

In agris, arvis, ad foflas. Flor. Jun. Jul,

m. Foliis pinnatifidis: laciniis linearibus ra*
tins iubdivaricatis.

[3. Foliis pinnatifidis: laciniis linearibus;
caule ramisque ilricito erecto Tub fastigiato*

{3. Hat id iiequens in pificino exiiccuto *i Hirjch**
hulmsfiöv 8c in agijere marem verlus *imod i'la**
Jktrutn, *a.* Ad vias, lolTas, pairun legi.

367. *Tragopogon.*

Calvx funi)lex: **Ucioiil** baft coalitis. Recep-
taculum midurn. Pappus ftipitatus pkunofus.
65a, *T. pratense*, calycibus corollae radium sequan*
ribus; foliis integris ihictis. Flor. Dan. Tab.
60g.

In .iggeribue, ad vias frequens. Flor. Maj. Jun.
& Jul.

Variat: foliis fpiraliter contortis.

2864 *Picris.*

Calyx calyculatus. Receptaculum nudum.
Semina transversim fulcata. Pappus plumo-
fus.

153. *P. Hitracioides*, perianthiis laxis; foliis in-
tegris; pedunculis fquauiat in talyctm.

In agris, pratis, rarior. Flor. Jul. Aug.

269. *Leant odon* Rotli. (*Apargia*) Hoffm,

Calyx imbricatus. Receptaculum planiufcu-
lum. Pappus fevilis plumofus.

* *in*)

654. *Z# ailtumnah*, caule ramofo; pedunculis fquarnofis; foliis lanceolatis dentatis integerimis glabris. J. Bauch. Hifl. pi. II, p. 1031. In p.ifcuis pratis copiofe. Flor. Jul. Aug. Sept.
655. *L. hispidum*, calyce hispido; foliis ftuato-dentatis hispidis; feminibus rugods; fcapo unifloro. Flor. Dan. Tab. 863.
- Iu pratis, fiuticetis frequens. Flor. Jun. Jul.

570. *Taraxatum, Roth,*

Calyx oblongus, calyculatus duplice folioruin ferie< Receptaculuin convexum nudumj Pappus ftipitatus plumofus.

- C56. *T. officinale* (fquarnis calycinis exterioribu , reflexis; foliis runcinatis acute dentatis glabris< Ubique. Flor. Apr. Maj. Jun,
- a. angulijotium,*
fi. latiJoUum. Flor. Dan. Tab. 574*

271. *Scozonera**

Calyx imbricatus: fquamis margine fcariofii Beceptaculurn nudum. Pappus plumofus*

- (J57. «*S. humilis*, caule fubnudo unifloro; foli
* lanceolatis vel linearibus nervofis plains.. Flo
Danic. Tab. 816.

In pratis, pafcuis: *paa Brede Bakker; ved Be florf; Birkerdd.* Flor. Maj. Jun.

Variat caule bi-tuftoio pedunculis elongadj

372. *Crepis.*

Calyx calyculatus: squamis difformibus deciduis. Receptaculum nudum. Pappus pilosus.

658. *C. tectorum*, foliis lanceolato-runcinatis, sessilibus laevibus: inferioribus dentatis. Flor.* Dan. Tab. 501.

In muris, tectis, ad vias, inter tegetes. Flor. aellate.

«. *JegttaliSi* foliis imis parum dentatis, superioribus hnearibus integris; caule altiori ac ramofion.

p. foliis cauleque scabriusculo - hispida.

659* *C. biennis*, foliis runcinato-pinnatifidis scabris, basi superne dentatis; calycibus muricatis.

Haud frequens in aggeribus ad vias: ved Bag* fvard. 1 lor. Jun. Jul.

Difflit a *Crepide tectorum* caule altiore crassiore fulcato interne 'amis delUtuto fed foliofo; foliis omnibus pinnatido-dentatis laciniis lanceolatis scabrido - hii^ di,; floribus majoribus.

373, *grenaſthes.*

Calyx calyculatus. Flosculi simplici serie Receptaculum nudum. Pappus subtipitatus pilosus.

660. *P. muralis*, flosculis quinis; foliis runcinatifli (fitti pappi simplicijimiii articulatis^ in cajU_

tulo fubrotundo Jiipitis infedentibus), Fior. Dan. Tab. 509.

In fylvis, nemoribus. Flor. Jun. Jul. Aug.

274. *Luctuca.*

Calyx cylindricus imbricatus: squamis margine membranaceis. Receptaculum nudum. Pappus stipitatus pilosus. Seujina. Isevia.

661. *Lt- Scariola* foliis runcinatis, dentatis, verticalibus, carina aculeatis. Flor. Dan. Tab. 1227.

In aggeribus, ruderalibus, ad vias frequens circa Hafniaui. Flor. Jul. Aug.

275. *Hieracium,*

Calyx imbricatus ovatus. Receptaculum nudum. Pappus setosus pilosus.

* Scapo nudo unifloro. £/

663. *H. Piloftlla,* foliis integris ovatis subtus tomentosis; caulibus repentibus. Flor. Dan. Tab. 1110.

Ad vias, in aggeribus frequens. Flor. Jun. Jul. EC Aug.

** Scapo nudo multifloro.

663. *H. dubium,* foliis integris ovato-oblongis caulibus repentibus; - scapo glabro superne pubescente, Antheris duabus vel tribus lanceolatis. Flor. Dan. Tab. 1044. 69

Baro dicit Mull. Flor. Maj. Jun. Jul.

664. *H. Auricula,* foliis integerrimis lanceolatis caulibus repentibus; scapo muricato, fet

nigris interne, confertioribus, fupra bafia folio aucto. Fior. Dan. Tab. till.

In aggeribus copiofe. Flor. Maj. Jun. Jul.

665. *H. vyrnofum*, foliis lanceolatis, integris pilofis; ftolonibts repeatibus, apice fenngineo-tomentofa **birfutis**; fcapo fubnudo, muricato-hifpido; umbellis cyruofis multifloris. Flor. Dan. Tab. 810.

In dtclivis niaritimis inter *Springforbie Sc Pa* piers- Molle*. Flor. **Jun.** Jul.

. if. *uurantiacum*, folm ovato-oblongis integris; caule fubnudo fimplici JTnno pilofo corymbii'ero. Fior. Dan. Tab. 1112,

Charlottanlund: in loco uinbrofo arce valde remoto base planta excurfione publica a Dili Block detecta. An vera indigena?

7, *H. pramorfum*, foliis ovatis fubdentatis; fcapo nudo ractmofo; **fioribiu** fuperioribue primoribus, Flor. Dan. Tab. yis.

In pratis paludofis: *i Lunddiuus • Mofen*. Flor, Jun.

.*** Caule foliofo.

. *H. murorum*, caule rauriofo fubnudo; foFiis radicalibus ovatis, dentatis, cauliao minore. Joh. Baub. Hiftor. II. pag. 103[^]. 1

In fylvadcis, ad vias.. Flor. feftati.

. *H. fylvaticum*, caule ramofo foliofo; foliis radicalibus ovatis petiolatis argute d. ntatis caulinisfeffilibus; peduncidismultifloris. Flor.

Dan. Tab. **in** 3.

In fylvis ub'ique. Flor. Jun. Jul.

670 *IL paludofum*, caule paniculato; foliis araplejucaulibus dentatis glabris* calycibus hifpidis. Flor. Dan. Tain 928.

In nemoiibus, fruticetis rpaludofis. Flor. **Juh**
8C Aug.

671. *H. fabavdum*, caule erecto miiltifloro (*fiorU bus uni>ellato~corymbofis*); foliis ovato-lanceolatis (*oblongo - lanceolatis*) denticuhitis, petiolatis, caulnis amplexicaulibus feffiHbus. Flor. Dan, Tab. 873.

Ad vias, in aggenbus, in fruticetis: *vtd Lundehufet og 6'ikhoim*; *i Krattet ved Fut^lehvad** Moite, Flor. Jun. Jul.

672. *H. umbellatum*, folijs tinearibus fubdentatifi fparfis; **florlbua** iubuinbellatis.

In aggeribus; locis ficciselevatis fylvarum: *Gelsfkovi Bugfvard-Skovi ved VtUn tit Coriflanlia*. Flor. Jul. Aug.

a. *ramnfijfim*um, folus linearibus argutodentaus. Flor. Danic. Tub, 680.

p. *hutnite*, caule **Ahmnilubri** mh us foliofi bi-tri-quadri-quinqueiloro; tq'iu Unearibus fubdenticulatis.

In pratis ficcis fylvaficis; ericetis: *1 Skovef imtlUm Kolltkullt og Fahrurn; onikring Bagfvard og Birkwod.*

976. *Sonchus.*

Calyx imbricatus, basi ventricofus. Receptaculum nudum. Pappus pilosus, feffilis.

673. *A¹. arvtnfi* Sy pedunculis calycibusque hispidiis fimbrellatis; foliis runcinatis basi cordatis. Flor. Dan. Tab. 606.

Inter fegetes; ad fossas humidas; in littore maris. Flor. Jun. Jul. Aug.

674. *S. ohractus*; pedunculis tomentosis; calycibus glabris.

ID, ruderalis, cultis, oleraceis. Flor. Jun[^] Jul. fc Aug.

tc. l<avis, foliis tenerioribus glaucis; pedunculis laevibus calycibusque laxo tomento obfefeis.

Variat i» Foliis ovato spatulatis > vel ovato ball angustioribus amplexicaulis argute dentatis obtusis. *Sonchus lsevis tenerior latifolia.* Lobel. observat. pag. ng.

S. Foliis pinnatifido-runcinatis laciniatis. *Sonchus laevis vulgaris, foliis laciniatis.* Lobel. observat. pag. 119.

3. Foliis lyrato-runcinatis Flor. Dan. Tab. 6H2.

¶. *afp&i* foliis pinnatifidis, finuato dentatis rigidioribus* ac viridioribus. Flor. Dan. Tab. 843*

277. *Lap fan a.*

Calyx calyculatus, angulatus; squamis interioribus canaliculatis. Receptaculum nudum.

675. *L. communis*, calycibus fructus angulatis; pedunculis brevibus ramofilis. Flor. Dan. Tab. 500.

In fepibus, hortis, nemoribus, ad vias. Flor. Jun. JuU

** Capitati.

278. *Cajlina.*

Calyx imbricatus radiatus: squamis interioribus longis coloratis nitidis,

676. *C. vulgaris*, caule multifloro corymbofo; floribus terminalibus; calyce radio pallido. Flor. Danic. Tab. 174.

In ericetis, collinis aridis: *imellein Char fat tenlundog Papiers-Molle; ved Bagfv&rd; Birktröd &c.* Flor. Jul. Aug.

278* *Cnicus.*

Calyx ovatus, imbricatus: squamis spinosis. Receptaculum pilosum. Pappus fevilis plumosus.

677. *C. oleraceus*, foliis pinna-tifidis, carinatis nudis; bracteis concavis, integris, subcoloratis Flor. Dan. Tab. 860.

In pratis humidis, fossis. Flor. Jun. Juh Aug.

678* {& *lanceolatus*, in foliis decurrentibus pinuatis: pinnis bilobis spinosis; calycibus nudis

oblongis fpixiofis villofis. Flor. Danic. Tab.
"73-

Carduus lanceotatus Lin.

In ruderatis ad vias ubique. Flnr. Jul. Aug.

679. *C. palustris*, foliis decurrentibus pinnatifidis
margine fpinofis; floribus rectis iafciculatis;
calyibus inermibus.

Carduus palustris Lin.

In pratis paludons, Flor. Jul. Aug.

680. *C. heterophyllus*, foliis ainplexicaulibus, lan-
ceolatis ciliatis integris laciniatisquej caule
fubunifloro; id yce inermi.

Carduus heterophyllus Lin.

In nemore *Charlottenlund* per plures annos ob-
fervavi fed nuncjiain ilorendi vidi.

681. *C. acaulis* foliis pinnatilidis: pinnis incifis
margine fpiuofis; calyce conico gUbio. Flor.
Dan. Tab. *iti*.

Carduus acaulis Lin.

In apncis, pj-atis. Flor. Jul. Aug.

Variat caulefcens.

280. *Carduus.*

Calyx ovatus, imbricatus: fquamis fpinofis.
Kecepiaculum pilofum. Pappus feffilis pi-
lolus.

682. *C. acanthoides*, foliis decurrentibus finuatU
inaigme fpinofis; calycibus pedunculatis foli-
tariis erectis villofis. Jacq. Flor. auftiac. 3.
tab. 349*

231 *Syngencia Polygamia equalis.*

In aggeribus ad vias. Flor. Jul. Aug.

683- *C. crispus* f. foliis decurrentibus, finuatis, margine spinosis, floribus aggregatis, terminalibus; squamis calycinis inernibus, fubaritatis, patois. Flor. Dan. Tab. 621.

In aggeribus; ad fossas; in ruderatis. Flor, Jul. Aug.

2Sr. *Serratula.*

Calyx subcylindricus, imbricatus: squamis muticis, acatiufulis. Receptaculum fetosum. Pappus seffilis.

684- *S. tinctoria*, foliis lyrato pinnatifidis: pinna terminali maxima; flosculis conformibus. Flor. Dan. Tab. 281.

In aggeribus 8C pratis circa *Flajkekroen*. Flor. Jul. Aug.

Variat a. caule altiori ramiflori, ac humiliari simpliciter.

f. foliis superioribus incisim inferioribus integris.

y. foliis omnibus integris, inferioribus longissime petiolatis: petiolis basi laciniato-dentatis.

685. 5. *arvensis*, foliis lanceolatis, pinnatifido-dentatis, spinosis: inferioribus subdecurrentibus. Flor. Dan. Tab. 644.

Ad vias, in agris 8C fere ubique. Flor. Jul. SC Aug.

282. *Onopordon.*

Calyx ^entricofus imbricatus: fquamis mncro-
nafcis. Recep'atulum nuduui i'avoium. I*ap«
pus fe.Tilis pilofus.

686. *O. Acinthium*, calycibus ftjuamofis: fquamis
patentibus; foliis ovato-oblongis finuatis,
fpinoiis. Flor. Dan. Tab. 909.

Inaggeribus ad vias copiofe. Flor. Jul. Aug.

383- *Arctiu'm.*

Calyx globofus : jfquainis apice inflexo-
hamatis.

637. *A. Lappa*, foliis cordatis iuermibui pctiolatis.

XII ruderatis, atl v»as tVequens. Flor. Jul. Aug.

a. caiycibns gla'bris; fquamis divaricacis lon-
gioribus.

I. globofo-depreffis: ftjusmis ciilycinia
lineari lanceolatis albido virefcen*
tibus.

a, globofo - cono'cfeis: fquamis calycinig
tanceol.ito fetac* is **puVpureii***

β. c^iy ibus ara-. bnoideis , fquamis magi«
adpreffis brevioribus.

1. gin bo Qs fubdepreffis : fquamis lanceo-
lato-fetaceis fubarachnoideis, albido-
virefcntibus, «

S. globofis: fquamis lanceolato -fetaceis,
arachnoideis, viritie purpuraiceiitibus.
Flor. Dun, Tab, 643.

236 *Syngnefia Pofygamia aqualis.*

y minoti caiycibus globofis quafi truncatis antecedentmm tñnoribus torñentofiori[^] bus: fquamis calycinis lanceolato-fetaceis adpieflis viridibus; foliis radicalibus cordato oblongis fmuato dentatfs, caulinis oblongis dentatU; caule tenuiori.

Varietatern hanc tantinn vidi ad pagurn *Thor- btk.*

*** Difcoidei.

S84. *Eupatorium.*

Calyx oblongus imbricatus. Sfcyli longiflifni ad flamina ufqne bifidi. Receptaculum nu» ilum. Pappus fcfilis pilofus.

#

688* *E» canahinum* to His oppofitis, ternatis, qui- nati'-quis. Flor. Dan. Tab. 745,

Ad foflas hand infre<[uens, Flor. Jul. Aug.

285- *Hi dens.*

Calyx imbricatus. Corollas radius flofculo uno vel pluiibus radiantibus. Receptaculum paleaceum. Pappus ariAis duabus, rectis fea- bris.

689* *B. tripartite*, foliis trifidis; caiycibus fubfo- liofis; femimbus erectis. Blackw. Tab. 5191

Ad fofla[^] humidas. F'lor. Jul. Aug. Sept*

a pumila> caule firnpliciflirno uniiloro; brae- teis pluribus; foliis ferratis; radice fun* plici.

Syngenefia Polygamia equalis. y \ j

£90. JB. *minima*, foliis tanceolatis subinferriniis
flore recto involucrio basi involucrio bracteis
duabus; radice repente. Flo*. Dan. Tab. 313.
In inuq̄datis ericetolis locis, *litrkträd; Bag''*
fvard. Flor. Jul. Aug.

0gi. *B. cernua*, foliis lanceolatis amplexicaulibus
floribus cernuis; feminibus erectis. Flor. Dan.
Tab. 841.

Ad fossas, piscinas haud infrequens. Flor. Jul.
Aug. Sept.

fi. radiata, flore cernuo radiato, *Coreopjis*
Bidtns Linn.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

Difcoidei,

386. *Artemisia.*

Calyx imbricatus: squamis rotundatis conni-
ventibus. Corollulae radii nulli. Recepta-
culum nudum. Pappus nullus.

(92. *A. campestris*, foliis multifidis linearibus;
caulibus procumbentibus virgatis. Flor. Dan.
Tab. H75.

In aggeribus, ad vias frequens *ved Lyngby;*
Bagfvard 8Cc. Flor. Jul. Aug. Sept.

Variat caulibus albicantibus ac rusticis.

§3. *A. maritime*, foliis multipartitis tomentosis;
racemis cernuis; flocculis foemineis ternis.

In littore roaris: *ved Flufkrokrotn; imdUm Ta-*
**org og Conjlantia.* Flor. Aug» Sept.

694. *AM Abfmiluum*, foliis compofitis multifidis; floribus JTubglnbofis pendulis; receptaculo villofo. Blackw. Herb, tab. \y.

Ad pagos. Skovslwved; TorM,* omtrent tig* for Tuborg ved Sb'ekantz. Flor. Jnl. Aug. Set.

€95. *Vi. vuigaris*, i'oliis pinnatifidis plants incrus, fubtilfl tomentofis; racpmis funplicibus iecurvis; floruin radio quinquefloro. Ilor. Dan. Tab. 1176.

Ad vkis, in ruderatis frequentiflima. Flor. Jul
Variat caule albo, 8C purpureo.

287. *Tanacetum**

Calyx imbricatus haBrnirph^ricus: fquam acutis. Coroirulae radii obfoletae trifidap, (*fa} nullte omnesque htrmaphrodita*). **Keceptaculum** convexum nudmn. Pappus fubmar^natus.

696. *T. vulgare*, foliis bipinnatis incifis ferrati Flor. Dan. Tab. ^71.

Ad fepes, pagos, margines agrorum. Flor. Ju
Aug. Sept.

588. *Gnaphalium*,

Calyx imbricatus: fquamis marginaiibus fundatis, concavis fcariofis, coloratis. **Rece I**
taculum nudum. Pappus pilofus aut plum^or
fus.

; * *Chryfocoma**

lis; ^97' &• *arenarium*, herbacern, foliis lanceo.la.tis:
vi¹- inferio vibus obtufis ; coryrnbo compu/ito; cau-
libus fiiiipliciflhrus. Flor. Dan. Tab. 64 r.

lig
jpt
[js
re
an
In aridis arenofis: *Unellem Charlottenlund og*
Skovshovedi vtd Vebtk et alibi. Flor. Jun. Jul.
Aug.

698. C\ *luteo-album*, foliis femiamplexjcailibus,
enfiformibus, repandis, obtufjs, utrinqu'e
pube/centibus; floribus conglorneratis.

Inter lapides areae nieridionalis Nofotomii Fri-
dericiani per quinque annos hanc fponte pro-
venientem obfervavi. Flor. Jul. Aug. Sept.

* * *Argyrocoma.*

in
ci
699. *G. dicecum*, farmentis pro cum ben tib 113 ;
caule firnpliciflimo; corymbo fimplici; flori-
bus dioicis, Flor. Dan. Tab. 1228.

In ericetis, fylvis. Flor. Jun.

Mas, floribus fubrotundis, plerumque fterili-
bus: germine abortiente.

Fccmina, floribus ovate oblongis, fertilibus;
antberis deftitutis.

* * * *Filaginoidea.*

feo. *C. fylvaticum*, caule herbaceo fimpliciffimo
erecto; floribus fparfis fubfpicatis. Flor. Dan.
Tab. 1229.

In pratis fylvaticis. Flor. Jul. Aug. Sept

>i. *G. uliginofum*, caule lierbaceo ramofo dif-
fufo; floribus terminalibu* confertis. Flor.
Pan. Tab. «59-

2 jo *Syngenefia Polygamia fuperjiua.*

In locis humidis, inuudatis, ad pagos. Hot.
Jul. Aug. St-pt.

** Kadiati.

289. *Bellis.*

Calyx Inmifpharicus: foliolis xquaiibus. Re-
cepta<uluin conicuin. Pappus nulhis.

70a. *B. ptrennis*, fcapo nudo; foliis obovatis,
fpatulatis, fubcrenatis. Flor. Dan. Tab. 503.
In piatis pafcuis ubique. Flor. toto anno.

290. *Matricaria.*

Calyx haernirphaericus imbricatus: fqnamis li-
nearibus fubinaqualibus. Receptaculumcoa-
vexum nudurn. Pappus nullus.

703. *M. Parthenium*, foliis comp.*fitis planis: fo-
liolis ovatis incifis; pedunculis ramofis. FloC
Dan. Tab. 674.

Ad pagos; in declivis inter *Torbek & Papieri-
moth.* Flor. Jul. Aug.

704. *M. maritima.* receptacuUs hemifphaericis; fo-
liis bipinnatis fubcarnofis, fupra convexifl
fubtus carinatis. Ot

In littore maris haud infrequens. Flor, Jtf
Aug. Sept.

705. *M. officinalis*, receptaculis conicis; radiis de
flexis fquamis calycinis inargine aequalib^

***M. fvaveolans* Lin.**

p. radiis patults. *M. Chamomilla* Lin.

Inter fegetes haud infrequens. Fior. Jul. Aug

391. Chryfanthemum*

Calyx hemifphaericus imbricatus: fquarais mar*
gine fcariofis: intimis apite membranaceis.
Keceptaculum convexum nudum. Pappus
millits. >

7)6. *C. Levran themum*, foliis amplexicaulibus ob*
longis: fuperne fetratis: interne dentatis.
Flor. Dan. Tab. 994.

In aggeribus; ad vias; in arvis. Flor. Jun.
Jul.

ro;, *C* inodorum*, foliis pinnatis muldfidis; caul*
ramofo diflufo. Flor. Dan. Tab; 69G.

In ruderatis, agris; ad vias. Flor. Jul. Aug.

08* *C> fegettm*, foliis amplfxicaulibus: fuperne
fublaciniatis: inlerne dentato ierratis. Flor.
Dan. Tab. 995.

V^winter fegetes 1 incultis, aggeribus. Flor* Jun*
Jul. Aug.

292. *Arnica.*

C^lyx imbricatus, radio multo brevior. Sta-
mina radii castrata, Heceptaculum nudum.
Pappus funplexi '

og|. *A* montana*, foliis ovatis integris: caulini*
gerninis oppfitis. Flor. Dan. Tab. 63,

Tn ericetis aridis elevatis: ved Bagfvard Imeltem.
fikoven og TeprhnQJes ved Rudergaard i Skovent
imeltem Fredmsborg og Iletfmgdn Flor* Jun*

Jul.

Variatcaule unifloro, triuoro, ttrior tamofu
ramis uniflorisi

393* Inula.

- Antherae bafi in fetas duas definentes[^] Kt
ceptaculurn nudurn.[^] Pappus (implex.
7x0. *I. HeUnium*, foliis amplexicaulibus ovatis
rugous, fubtus tornentofis; ca/y cutn fquarnij
ovatis. Flor. Dan. Tab. 738.

In fylve-inter *Btotvftntp* & *Friderichsborg s vt*
Sorgenfrie. tlor. Jul. Aug.

- 7XX. *Λ britunnica*, foliis arnplexicaulibiis lan«eo
latis ferratis diftinctis, fubtus villofis; cauJ< *
ramofo erecto corymbofo villofo. Flor, Dan
Tab. 4r[^].

In a'ggeribus, foffis, pratis hiimidts tnaritinriis
ved Flajkekroen. Flor. Jun. Jijl. Aug.

- 71[^]. *J. Pulicafia*, faliis arnptexicaalibus undul
tis; caule proflrato; floribns fubglobofis: ri
dio breviffimo. Flor. Dan. Tab. 613.

Inlocis huinidis, .ad pagos: *paa Amagerj* -
*Bagfvard** Flor. Jul. Aug.

- 713. *T. faliclna*, foliis lanceolatis recurvis fetra
fcabris; ramis-angulatis; floribus inferiorib
altioribus. Flor. Dan. Tab. 786.

In foflis , pafcuis : *ved Flajkekroen*, Flor. J

Aug.

Vaiiat caule uxii'floro Bi-tiifloro vel cor^v
bofo multiHoro,

594. Erigeron.

Calyx oblongus. Corollulae radii lines**
angunilfitnae. Receptaculuin nudum, I'
ms pUofus,

t - i 714. *E. acre*, caule erecto ramofa; pedunculi* altering unifloris.

In apricis, arvis, aggeribus. Flor. Jun. Jul. & Aug.

295. *Salidago*,

Calyc: w fquamae imbricata? conniventes. Co* rollulaj radii pauciores, remotae, Receptacu* lum niulum. Pappus pilosus.

715. *S. Virgaurea*) caule subflexuoso angulato; Tdcmis pinnatis erectis coniectis* Flor» Dan, Tab. 663.

In aggeribus pratis, fylaticis Jaud infrequentB fed Veien til Bagvard* Flor. Jul. Aug.

296. *Cineraria*,

Calyx {implex, aequalis, polyp^yllus. Res ceptaculum nudum. Pappus simplex*

716. *C. palustris*, floribus corymbosis; foliis lanceolatis, dentato-finuatis; caule villoso. Flor, Dan. Tab. 573.

In paludibus turibis*; in Iktore lacuum. Flor, Jul. Aug.

Variat foliis superioribus integris; caule r* r molliore crassiore.

897. *Senteio*,

Ca?yx cylindricus, calyculatus squamis^apic* fphace'atis. Receptaculum nudum, Pappus simplex.

Q44 *Syngnefia Polygamia superflua.*

* Floribus ilosculofis.

717. *S. vulgaris* corollis nudis; folvis pinnato .
finuatisamplexicaulibus; iloribuspaifis. Flor.
Dan. Tab, 513.

Senec. dentitlulata Flor, Dan. Tab. 79 r. forte
variatas hujus fpec,

tn ruderatis, cuiris, tectis ubique. Flor. Apr
— Octobv.

** Floribus radiatis; radio revoluto.

718. *S. vifcofiis* corollis revolutis; foliis pinnati
fidis vifcidis; fquam'is calycinis laxis longitu
dine periantbii. Flor. Dan. Tab. 1230.

Ihlocisglareofo-argiHofifo, aggeiibus; *vedMirke
rod*, Flor. JuK Aug.

719. *S. fylvalicus*, radio revoluto; foliis pinnati
fidis denticulatis; caule corymbofo erecto
Flor. Dan. Tab* gfiq.

Ad vias, iri fylvaticis: *ved Veien til Charloltet
lundi paa GrovtenedCbhjlaiuia. Flor. Jul. Auj*

*** Floribus radiatis; radio patente; foJii
pinnatifidis»

7to. *S. Jacob&a*, corollifl Tadiantibus; foliU pif
nato-lyratiB: laciniis lacinulatis; caule eiectt
Flor* Dan. Tab. 944.

Ad vias, in fepiuus, aggeribus. Flor, Ju
Aug. Sept.

a. aquaticus, foliis radicalibus imisque caijj
linis ovatis dentatis petiolatis: fuperio
bus pinnatifidis. Flor. Dan. Tab. 784.

In pratis humid is: *ved FlaJltekrom**

β. foliis omnibus pinnarifidis nee lyratis.

γ. *laciniatus*, foliis iuierioribus pirinatis: pinnis alternis piruiatilido-laciniatis: laci* nus dentato inciis. anguilis divaricatis.

****. Floribus radiatis; radio patents; foliis indivifis* 11

221. *S. paludofus*, corollis radiantibus; foliis en fiformibus acute ferrati^, fubtus fubvillofis; caule ftrico. Flor., Dan. Tab, 385.

In paludibus amnis: ved Beltringe i Narheden af J^reflo obfervavi. Flor* Jun. Jul.

29^ *Tujfilago.*

Calycis fquaniEe diicum aequantes, fubmembranaceae, Beoeptaculum nudum. Pappus pilofus.

2» *T. Farfara*, fcapo unifloro imbricato; foliis fubcordatis angulatis denticulatis. Flor. Dan. Tab. 595.

Jin rbflis; ad vias. Flor. Apr. Maj. Jun.

3. X. *Petafius*, tlyrfo ovato; flofculjs foemineis nudis paucis, Flor. Dan. Tab, ^12.

thumidis; ved Roflnborg Slots-Graven. Flor. pr. Maj.

agg. *After.*

Calyx imbricatus: ftuarnae inferiores patulfe, Keceptaculuin nudum. Pappus fjmplex.

^4. *Tfiptihum*, foliis lanceolatis integerrimis carnofis glabris; ramis inaequatis; floribus corymbofis. Flor. Dan. Tnb. 61:5.

maritimis vulgaris, Flor. Jul. Aug.

3⁰⁰, Anthemis.

Calyx fiemifpaericus: fquamis **fdbequatibuft:**

Recepracul'iin paleaceum. Pappus null us,

725. *A. arvenjls*, re[^]ptaculis conicis, paleis fetaceis: feminibus coronato-rnarginatis. Flor. Dan. ^rrab. 1178.

In agris , arvis; ad vias. Flor. Jun. Jul.

726. *A. Cotulaj* receptaculis cnnicis; paleis fetaceis; feminibus nudis. Flor, Dan. Tab. 1179, Inruderatis, ad pagos, vias. Floi. Jul. Aug.

727. *A. linctQri-a*, fblii»»bipinnatis, fenatis, fubtu tomento&s; caule corymbofo. Flor, Danic. Tab. 741.

Inaggeribus, ad vias: ved Stolpegaards Ruder' guard* i'lor. Jul. Aug.

301. Achillea*

Calyx ovatus imbricatus. Flosculi radii q-ilrr que ad decem* Receptaculum nudum. Pappus nullus.

728. *A. Ptarmica*, foliis lanceolatis acuminatis* argute ferratis. Flur.I}an.Tab. 6)^.

In locis humidis , ,foflis, pratis. Flor. Jul. Aug*

619. *A. Millejolinm*, foliis bipinnatis nudis: laci niis lineanbus Uentatis; cauibus fuperne ful catis Flor. Dan Tab. 737.

In pratis pafcuis, ad vias aggeres SCc. Flor. rHate,

Variatilore purpureo, ^C carneo.

fyngencfia Polygamia fntjlranna 347*

POLYGAMIA FRUSTRANEA

302. *Centaurea.*

Corolhila radii infundibuiiforme* longiore* irregulares. Receptaculum fetofuxn. Pappus fimplex,

* Cyani: cafcynls fquamis ferrato • ciliatis.

730. *C\ Cyanus*, calycibus fercatis; foliis lincari-
bus integenis, infnnis dentatis. Flor. Dan.
Trib. 993.

Inter iegetes in arvifl. Flor. Jun. JuK Aug.

Vaciat ilore purpureo 8C albido.9

781. *C. fyabiofd*, calycibus ciliatis; foliis pinnati-
fidis: p:nnis lanceolatis. Ftor.Dan.Tab. raji.
Advias, in. aggeribus > pratis. Flor. Jal. Aug.
k, Sept.

K, foliis rddicalibus pinnatifidis; raulinispin-
natis: pinni-> Jternis pinnatifidis.

** Rb i| <ontic i: calycibus £(uarnis aridis fcariofis.

732» *C. Jaiea*, c, ycM)us fcailaiis bceus? foliis
1 nceolatis: ladicahbus finuato - dentatis; ra-
mis angulatis. Flor. Dan. Tab. 5x9.

la aivis, pratis, pafcuis, ad vias. Flor. Jun.
Jul. Aug. •

«. foliis ijlfcrioribus obovato-Iauccol J:is in-
tegerHn^is, bafi auriculato-dentati^: fupe-
rioribus fanceol&H? intvgris.

*18 *Syngenefm Pohgamia Necejfaria**

POLYGAMIA NECESSARIA.

303, *Calendula**

Calyx polyphyllus aequalis. Receptaculum nudum. Semina difci membranacea, Pappus nullus.

733. *C. officinatis*, feminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus.

In cjoemeteriis* Flor, Jul. Aug. Sept.

304, *Fitago..*

Calyx imbricatus. Flosculi feminei' inter squarnas «ulycis. Receptaculum nudum. Pappus pilofus aut nullus.

731* *F. Germanica*, panicula dichotoma; floribus rotuadatis axillulibus hufutis; i'uliis icutis.

Flur. Dan. Tab, 997. (*caule fuptrne dichotum*), *floribus & lam€'uti\$ in dichatorniis fejjilibus*.) \ ^

In arvis, aggtvibus fccis: vtd *Bagjvccrd.* Flor. JuK Ai'g.

735. *F. montana*, cault? fubdichotomo erecto; floribus conicis terminalibus axillaiibusque.

(*caulibus erect is fubjWjunnibus , faliisque fub* adprejfisfubimbricatis, tomwtojis.*)

In apricis ficcis, iggeribu-s: ved*Bagfvardi Lyngbye* 8C aliis locis. Flov. Aug. Sept.

736, JP. *arvenfi*St caule paniculate); floribus co; n- cis lateralibus

In aggeubusj arvis ficcis. Flor. JuU Aug.

 CLASSIS XX.

 GYNANDRIA.

DIASTRIDA.

*Orchis** Nectanmn **corniforme** pone florem.

Satyriut Ji, **Neqfanum fcrotiforme** feu inilato-
didymum pone fforem.

Gphrys. jNectariirm fubtus carinatum.

Ma Iaxis. JVectarinm *mono^hyUmn* ~w*v<*vuxn
cordatiiDi, poflice **acumlnatum**, antice bifi-
diirn; **gfenitalia** in mediQ Ibvens,

> ^-*Tafias** Necrarimn ovaum, IYil>fts gibbumW
Jabio ovato.

POLYANDRIA.

jCf1//4 **9p<tha**. Calyx uuiJus. **Corolla nulls.**
J Stamina rnixta piiUilis.

4 rKfti- 'Jtha/ Cjlyx nuilus. **Corolla nulla,**
Stami-'iafupra **piAiJJa**.

2 :ojiera* I^Iium **feu** fpadix llneans. Calyx nui-
lus. **Corolla nujla**. Semina aictiua nuda.

GYNANDRIA,

DIANDRIA,

305. *Orchis.*

Nectarhim cornifovme pone floreni.

* Bulbis indivifis.

757< *O. bifolia*, bulbis indivifis; nectarii lobo lan-
- ceolato integerrimu: conju longiflhno; petalis patentibus. Flor. Dan. Tab. 535.

In pafcuis 8C pratis fylvaticis, ericetis. Flor, Jun. Jul.

738* *O. Morion* bulbis indivifis; nectarii labioqua-
drifido crenulato: cornu obtufo adfcendente;
petalis obtulis conniveitibus. Flor. Danic.
Tab. *5*.

In pratis 8c pafcuis fabhumidis.' Flor. Maj. Jun.

39. *O. majcula.*) bulbis indivifis; nectarii labio
quadrilobo crer^ulato: cornu obtufo^ petalis
dorfalibus reflexis. Flor. Dan. Tab. 457.

In pratis huinidis. Flor. Maj. Jun. Jul.

J40, *O. uftulata*, bulbis indivifis, nectarii labio
quadrilido puncti's fcabro, cornu obtufo; pe*
tails diilinctis.' Flor. Dan, Tab. 103.

In pafcuis fylviitidis: *i Skoven paa dtn anden Sidt
af Prejlo occ Vandet**

731. *O. militarise* bulbis indivifis; nectarii labio
quinquefido punctis fcabro; cornu obtufo;
petalis confluentitms, Haller, flirp. helv-
Tab. 30.

Plantam bene speciosissimam tantam vidi in proximo
 nontorio, Infulae Monae vulgo *MU KlinU* Flor.
 Maj. Jun.

** **Bulbis palmatis.**

743, *O. latifolium* bulbis subpalmatis rectis; nectarii
 cornu conico, labio trilobo lateribus re-
 flexo; bracteis flore longioribus. Flor. Dan*
 Tab. 266.

In humidis turfosis. Flor. Maj. Jun*

Variat foliis maculatis,

743. *O. maculata*, bulbia palmatis patentibus;
 nectarii cornu germinibus brevioribus: labio
 piano; petalis dorsalibus erectis. Flor. Dan,
 Tab. 933.

In pratis graminosis, nemorosis, Flor. Maj. Jun*
 Variat foliis baud maculatis.

74! • *O. conopsea*, bulbis palmatis; nectarii cornu
 fetaceo germinibus longioribus: labio trifido
 petalis duobus patentissimis. Flor. Dauic.
 Tab. 224.

In prate turfoso : *Lundehuus • Mofm diet* ©.
 Flor. Jun.

Variat foliis lateralibus 8C angustioribus.

306. *Satyrium.*

Nectarium ferretibrme feu inflatb-didymum
 pone florem.

74b- *S. albidum*, bulbis fasciculatis; foliis lanceo-
 latis, nectarii labio trifido acuto: lacinia in-
 termedia obtusa. Flor. Dan, Tab, III.

In pratibus elevatis ac collinis fruticosis: *paa Bakkerne imellem Fuglewad Krat og Brede.* Flor. Jun. initio Jul.

307, *Ophrys.*

Nectani labium dependens, supra riraa longitudinali, Hibtus cjiua divifum.

* JSuluis raniofis.

74G. 0/ *Nidus avis*, bulbis fibrofo-fafciculatis; caule vaginato aphylo; nectani labio biido. Flor. Dan. Tab. i8r.

In fylvis nemoruiis: *Bagfvard Skav; imellem Ordrup-Mofe og Uyrehaven vzd Jagdporten; i Hejihöb Skov ved BirUröd* baud frequens, Flor. Jun. Jul.

747. 0. *ovata*, bulbo fibrofo; caule bifolio; foliis ovatis; nectarii labio bifido. Flor. Dan. Tab.

137-

In pratis humidis, nemorofis: *paa Kajllets Contretjarpe wed Bröaden, imellem Ordrupmofc vg Dyrehavtn.* Flor. Jun. Jul,

Variat I. foliis ovalibus vel ovato-oblongis

obtufis.

si. foliis rotundato - ovatis fubcordatis obtufis mucronatis.

748* 0. *cor data*, bulbo iihrofo; caule bifolio (*an* tecedentis multo humiliori*) foliis cordatis.

Ophrys foliis cordatis. Hall. Ilirp. hel v. Tab. ??•

Oph»ydem hanc rariffhnam' J3n\ Pro/. Vahl in horto regii Friderichsberg legit.^T

* * Bulbis rotundis.

74g. *O. mo'iorchis*, bulbq. globofo; fcapo nudo
nectarii labio trifido cruciato. Flor* Danio.
Tab. 102.

Inturfosis: ved *Lundehuus*; *Betnjlorfi pioni
ninggaard*. Flor. Jun.

308. *Ma Iaxis** *S'vartz Prodrom*.

Nectarium monophyllum concavum, poftice
acuminatum antice bifidum, gei.iulia in me«
dio fovens.

750. *M. paludoja*, fcdpo pejitagono; foliis fpathu-
latis apice fcabris. *Siv, Kongl. Vetenskabs Aca-
demians nya Handlingar, Tom. X pag* 127.*
Tab. VLfg.2.

Ophrys paludofa L' Flor. Dan. Tab. 1234.

In pajuidibus: *Tepringe** og *Lyngbye-Mofe ved
Söen*. Flor. Jun.

75i- *M* > ioe/e/ii, fcapo nudo trigono; foliis ovato
oblongis; petalis linearibus; nectario Qvato
magno.

Ophrys Loefelii L. Flor. Dan. Tab. 877.

In paludibus : *Lyngbye** og *Lundehuus »Mofe*.
Flor. Jun.

Epidendri genere valde rimli8.

309. *Serapias**

Nectarium ovatum gibbum: labio ovato.

75^« *S. latifolia*, bulbis fibrosis; foliis ovatis am-
plexicaulibus; iloribus pendulis. Flor. Dan.
Tab. 811.

Haud copiose in nemorosis: *Ordrup Skov imod Jtfojin; intellem denne Mose og Dyienavtn.* Floi. Jul. Aug.

753. *S. longifolia*, bulbis fibrosis, foliis enfiformibus feffilibus; floribus penduiis. Flor* Dan. Tab. 267.

In paludibus: *i Ordrup - Mose; ved Lyngbye-Sbe.* jflor. JUD. Jul. Aug.

754. *S. tnffolia*, bulbis fibrosis; foliis enfiformibus distichis; bracteis minutiffimis; floribus «rectis; nectarii labio obtuso petalis brevioribus* Flor. Dan. Tab. fo6.

Bariflime in fylvis: *Gelsjkov\ Aldershvile ved Bagfverd.* Flor. Jun.

755. *S. grandijlora*, buftis fibrosis; feliis ovato[#] lanceolatis; bracteis longitudine capfuls; flo[#] ribus erectis: nectario labio obtuso' petals brevioribus.

In fylve Infulae Monae: *paa Jlore Klint folum** mocfo Iegi. Flor. Jun.

756. *S. rubra*, bulbis fibrosis; foliis enfiformibus floribus erectis: nectarii labio acuto* Flor[#] Dan. Tab. 345.

Habitat cum praecedente. Flor. Jun. Jul.

POLYANDRIA,

310. *Arum*,

Calyx fpatha monopbylla cucullata. Spadi[#]
fuperne nuduj> medio (Umineus inferne[#]
(tilliferus* |

757. *A. macututum*, acaule, foliis fagittato-hafta*
tis integerrimis j spadice clavato. Flor. Dan.
Tab. 505.

In nemorosis: *Rofenbarg - Have** Flor. Jun. fo-
tiii« non maculatis.

3tr. Calla.

Calyx Spatha plana. Spadix tectus flosculia.
Stamina mixta pi dill is. Bacae polyfpermae.

753. *Cj. patujlris*, i'olits cordatis; fpatHa"plaiu Cpa-
dice undique Iternaplnodito^ Flor. Dan. Tab.

422.

In paludosis praBprimis turfosis fatis frequent*
Begfv&rdj Birkerod \$C alibi. Flor. Jj.m. Jul.

313. Zojlera,

Spadix linearis altero latere fructifero. Calyx
nullus. Corolla nulla. Stamina alterna. S<-
mina^folitaria alterna.

759- *Z. marina*, pericarpis felTilibus^ Flor. **Dan***
Tab. 15.

lu mare 8c rejicitur in littorev Flor. Jun.

 CLASSIS XXI.

 MONOECIA.

MONANDRIA,

Chara Mnfc. Calyx nullus. Corolla nulla*
 i-bjm. Calyx tetraphyllus. Corolla nulla.
 Stignia triidum* .Semen unicorn.
Zannichellia Mafq.* Calyx nullus. Corolla nulla.
 Jfcm. Calyx monophyllus. Corolla nulla,
 Pillilla quatuor. Setuina quatuor.

DIANDRIA.

Letna, Mafc, Calyx monophyllus. Corolla nulla.
*JFatn** Calyx motiophyllus. Corolla nulla*
 Stylus unicus. Capsula uni feu bilocu*
 lans*

TRIBIANDRIA,

Car ex Mafc** Amentum spicatum* Calyx mono*
 }}lyllus unilorus* Corolla nulla*
 .Fccm. Amentum spicatum. Calyx &c Corolla
 ut in mare. Nectarium trilatum. Semeti'
 cingens*
Sparganiunu Mafc, Calyx triphyllus. Corolla*
 nulh.
Fccm > Calyx triphyllus. Corolla nulla. Stij'
 tnaca duo.

Typ h a. Mate Amentum cylindricum. Calyx tri-
pftyllus. Corolla nulla.

Fam. Amentum cylindricum infra mafculos.
Calyx capillaris. Corolla nulla. Stylus
unicus. Semen pappigerum.

Amaranihus. Mafc. Calyx triphyllus. Corolla
nulla*

Fam. Calyx SC Corolla ut in mare. Styli tres.
Capfula tircumciffa, monofperma.

TETRANDRIA,

Urtica. Mafc. Calyx tetraphyllus. Corollanulla*

F<zm. Calyx bivalvis. Corolla nulla. Stigma
villofum. Semen unicufn.

Situ I a. HJafc. Amentum triflorum. Corolla
quad^ipartita.

Fcem. Amentum biflorum* Corolla nulla*
Styli duo. Semen unicunru ,

Zittorella. Mafc. Calyx tetraphyllus. Corolla
quadrifida, Filamenta longiflima.

Fam. Calyx nullus. Corolla quadriiida. Sty-
lus longiflimus. Semen nux»

POLV ANDRIA .

\$~~4874~~ a . Mafc. Calyx triphyllus. Corolla
tripetala. Stamina chciter viginti qua*
tuoi\

•*Fcem.* Calyx 8c Corolla ut in mare. Piftilla
plurima. Semina numerofa.

Jflyrlophyllum. Mafc. Calyx exterior tetraphyllus. Corolla nulla. Stamina octo.

Fam. Calyx 8c Corolla ut in mare. P/ftilla quatuor. Semina quatuor.

Ceratophyllum. Mafc. Calyx fubfeptempartitus. Corolla nulla. Stamina circiter octodecim.

Fam. Calyx 8C Corolla ut in mare. Piftillum unicum. Semen unicum.

Fagus. Mafc. Calyx quinquefidus. Corollanulla. Stamina circiter duodecim.

Itam. Calyx quacjrifidus. Corolla nulla. Capful a quadriuaivis aculeato - hifpida: valvis deliifcentibus. Semina duo.

QueTcus. Mafc. Calyx quinquefidus. Corolla nulla. Stamina circiter decem.

Fam. Calyx integer. Corolla nulla. Styli quinque. Nux coriacea.

Corylus. Mafc. Amentum imbricatum. Corolto nulla. Stamina octo.

Fam. Calyx diphyllus. Corolla nulla. Styli duo. Nux nuda.

MONADELPHIA.

\anthium. Mafc. Calyx comnaunis imbricatum
Corolla compofita: propria nonopetal^{^*}
Receptaculum paleaceunu

Fam. Calyx nullus. Corolla nulla. **Styli**
v duo. Drypa ficca bilocularis.

*Pinus. Mafc. Calyxtettaphyllus. Corollanulla.
Stamina plurima.*

Fam. Amentum ftrobilaceum. Corolla nulla
Pifillum unicum. Nux alata.*

S Y N G E N E S I A .

Hryonia. Mafc. Calyx quinquentatus. Co
rolla quinquepartita. Filamenta trio.*

*Fam. Calyx 8c Corolla ut ia mare. Stylus
trifidns. Bacca.*

MONANDRIA,

313. Chara*

Mafc. Calyx nullus* Corolla nulla.

*F<zm** Calyx tetraphyllus. Corolla nulla. Stigma bifidum. Semen unicum.

760. *C. tomentosa*, aculeis caulinis ovatis (*caule albido tomentoso*) *hortili; folds Jubinermibus longis.*)

In foveis aquis stagnantibus. Flor. aestate.[^]

761. *C. vulgaris*, caulibus laevibus, frondibus interne dentatis (*foliis plerumque pectatis brevibus, rigidis: foliolis fecundis.*)

In aquis stagnantibus. Flor. Jan. Jul.

762. *C. hispida*, caule aculeis capillaribus confertis
Flor. Dan. Tab. *tftf*

In mare inter Seelandia Sc Amager. Flor. Jul.
Sc Aug.

a. microphylla caule pollicari digitalique erecto ramoso: ramis alternis; foliis densis, brevifloris, capillaribus verticillatis (*verticillis approximatis*) cauleque densifloro

Varietatem hanc in foveis stagnis aqua marina vel infusa repletis haud copiose observavi: *f. Flajkekroen; paa Amager umtrent ved dtnfoey¹*
KrudUaarn*

763. *C. Juncifolia* caule articulis inermibus diaphanissimis superne latioribus*

In stagnis, rivulis, nec non in maribus

Flor. Maj

314, *Zannicinia*.

Mafc. Calyx nuHus. Corolla nulla.

Fam. Calyx monophyllus. Corbila nulla; Piftilla quatuor. Semina quatuor.

764. *Z. paluftis*, caule detyli ramodflimo; foliis binis terais quatemisve capillaceo < linearibus flonbus fevilibus fubglomeratis in axillis foliorum. Flor. Dan. Tab. C7.

Inftagnantibus; foffis; maris locis baud profundis: *paaAmagtr; vedTømmerpladftn; wdChar* lotterilund. Tnou Jun. Jul.*

D I A N D R I A .

315. *Ltmna**

Mafc. Calyx monopbyllus. Corolla nulla.

Pcem. Calyx monophyllus. Corolla nulla. Stylus unicus. Capfula uni feu bilocula*is, mono feu riifperma.

765. *L. trifulca*, foliis lanceolatis petiolatis.

In aquis ftagnantibus, lacubus. Flor. Jun. Jul.

766. JL, minor, **foliis** fevilibus utrinque planiufcu^Us; radicibus folitariis.

In ftagnis. Flor. Jun. Jul.

767- *L. gibba*, foliis fevilibus fubtas hemifphaBricis; radicibus folitariis.

In lacubus, foflis. Flor. Jul. Aug.

768. -*L. jiotyrhizd*) foliis fevilibus; fadicibus confertis.

In ftagnantibus, pifcinis. Flor. Jul. Aug.

T R I A N D R I A .

316. *Carex*.

*Mafc** Amentum spicatum imbricatum glumis.

Calyx monophyllus. Corolla nulla.

lam. Amentum imbricatum glumis. Calyx monophyllus. Corolla nulla. Nectarium inflatum hidentatum. Stigmata tria raro duo. Semen unicorn intra nectarium;

* Spica unica simplicis.

769. *G. dioica* spica simplicis dioica. Flor. Dan. Tab. 3G9.

In paludibus turfosis graminosis: *Qrdrup~Mofe**

¹ *Bernflurf; Birkerod** Flor. Maj. Jun.

770. *C. pulicaris* spica simplicis androgyna: superne macula; capsulis divaricatis retroilexis. Leers Flor. Herborn. Tab. 1 \. fig. 1.

In paludibus turfosis graminosis. Flor. Maj. Jun.

771. *C. jLtycoglochin*, spica simplicis androgyna, superne macula; capsulis reflexis; feminibus triquetris.

C. pauciflora. *Ligt. Flor. Scot.* Tab. VI.

In paludibus: *ved Friderichsdal og Bagvard* ubi* Dn. Prof. Vahl legit.

- >>> * Spica composita androgyna.

772. *C. hirsutata* Good, spiculis ternis subquaternis, ovatis remotis; capsulis cordato-ovatis bimarginatis subacuminatis, integris, divergentibus. Flor. Dan. Tab. 2H4.

C. muricata L. Leers Herb. Tab. 14, fig. g.

In paludosis, pratis graminosis humidis. Flor,
Maj. Jun[^]

Variat spicula terminali mascula, reliquis fo-
mineis subandroginis.

773. *C. curta*, Good., spiculis quibus subfenis, ob-
longiusculis, remotis, sessilibus; squamis ova-
tis, membranaceis, mucronatis, capsulis ova-
tis acutiusculis, brevioribus.

In uliginosis, graminosis humidis rarior: *Lyng**
*bye - Mose ; Bugfvard ; Birkerbd ; Hirjchholm***
«S'Acœ. Flor. Jun.

774* *C. canescens*, spiculis quinque subfenis, ovatis
remotiusculis sessilibus; squamis - ovatis sub-
acutis membranaceis subferrugineis capsulis
ovatis acutis, brevioribus. Flor. Dan. Tab.
[^]85* Leers Herb. Tab. 14. § 7.

In pratis uliginosis, graminosis cum antecedentibus
flor. Jun.

Variat bracteis spiculis longioribus vel brevioribus,
vel subnullis. An eadem cum *C. curta*?

775* *C. remota*, spiculis axillaribus foliariis remo-
ti» sessilibus» bracteis culmum subfupereanti-
bus. Flor. Dan, Tab. 370.

In humidis sylvatibus: *Friderichsdal; Bagfvard;*
Gialjkov 8C aliis locis. Flor. Maj. Jun.

776* « *C. muricata* Good., spica oblonga subdecom-
posita: spiculis subapproximatis sessilibus ova-
tis; squamis ovatis, acutis*, marginibus mem-
branaceis, pallide iufcis, carina virefcente;
capsulis oblongis apice bidentatis vel subbit-

dis squamis longioribus. Michel. Gen. Tab. 33.
f. R. Sc f. 14. Leers Herb. Tab. ò. f. 3.

Haud frequens in pratis hiunidis: *ved Lyngbye**
mofe imod FriderichsdaU Flor. Maj. Jun.

777. *C\ divulfa*, Good., fpica decompofira elongaU
bafi fubrainofa: fpiculis inferioribus remotis
fuperioribus contiguis; fquamis ovalis mem-
branaceis acuti> carina virefcute; capful is
fubcrectis ovatis fqaamis brevionbus, Mich*
Gener. Tab. 33. f. IO.

In paludibus haud frequens: *ved Lyngbye-Søe*.
Flor. Maj. Jun.

778* *6- oval>\$ Good.*, fpiculis fubfenis ovahbus
fubglobulânbus fubapproxirnatis alternis; fqua-
mis lanceoldtis mucronalis capfulam aequanti*
bus. Leers Herb. Tab. 14. f. 6.

In graminofis uliginofis. Flor. Jun.

a. oblonga, fpiculîs fubfenis ovali oblongis
fubapproximatis fubdiftichis omnibus an-
drogynis; fquamis lanceolatis mucronatis
capfulam aequantibus arete coniriveinibus.
Flor. Dan, Tab. 1115. Moris. Sect. 8-
Tab. 13. fig. 29, 8C Mich-*. Gen. Tab. 33-
fig. xg. An C, difticha Betz. Flor. fcand*
p. 317. fynonymo Leerfâ exclufo?

779* *C. brizoides>* fpica compofita diiliha nuda^s
fpiculis androgynis oblongis fubcontigute^t
culmo foliis l6ngiori, tenui, triquetro, nudo,
Michel, Gen. Tab. 33/f. 17. haud bene *plau**
tarn noftram representat.

In paludibus Dn. Prof. Vahl SC ego iegimus, fed ubi, oblifi fumus. FJor. Jun.

(*Squama magruz ferruginee lanceolate rnrn* branacta mucrvnata.*)

780. *C. elongate*, fpica compofita, fubdiftiche nuda: fpiculis oblongis remotiufculis; fquamis ova* tiş aculis fubnuicronatis ferrugineis, margine ineinbranaceo albido; capfulis ovato oblongis, acunnnatis, iiriatis, integris, fquamis longioribus. ^x Flor. Daa. Tab. 1*36*. An ne vera *C. canescens* L»?

In praxis graminofis humidis, nemoiofis: *Charlottenlund*, Flor. Maj. Jun,

Variat r, fpicis brevioribus 8C gracilioribus, fpiculari'in numero fex ad octo.

2. fpicis longioribus 8C craffioribus, fpicularurn numeo quatuordecim ad fedecinu

781. *C. vulpina*) fpica fupradecompdfita, inferua laxiore: fpiculis ovatis arldrogynis glomeratis 9 fuperne mafculis. FIOK Dan, Tai). 308, (*Cap* Jula divergentes*)_m

AdfoiTas, in praxis liumidis, ericetis frequens

Variat r. fpiculis inferioribus pedunculaUs ramrtfis. Leers. Herb. Tab. 14, f. 5,

2. fpiculis inferioribus feffilibus.

783. *C. inurmeha*, fpica oblonga obtufa; fpiculia plurimis; unfimis terminalique foemineis; intermediis mafculis; fquamis lanceolate ferrugi*

*bb

Monoecia Triandria.

nei*, *Carina pallida, fubacuminatis.* Leerfii
Herb. Tabu 14. f. 3. I.

In paludibus hand frequens. Flor. Jan.

733* *C. arenaria, fpica compofita: fpiculis androgynis tj'up&rrie. maJculls) inferioribus remotioribus ioliolo longiore infructis; culmo triquetrotro fubĩncurvo. Michel. Gen. Tab. 33. f. 4. (Squama lanceolate ferruginee, margine pal- f/lo, fubacurninate; capfula ovata acuta Jlrriatefquumte havi breviores.)*

In arenofis maritimis: *inulkmCharlotUnlund,og Skovslwved SC alibi. Flor.. Jim.*

784. *C. paniculata*, < fpica paniculato - racemofa; fquamis lanceolatis ferrugineis marghie apice* que al jidis membranaceis, co(\a ferruginea mucrone defmente; capfulis ovatis acutis glabris fubpedunculatis. Flor. Dan. Tab. 1116.

In paltidibu» 8C ibflis huniidis: *imellem Wangehufet og Lundehufet t Ordrup-Mufe &c. Flor. Jun.*

785. *C. appropinquate, fpica fiibdecompofita: fpiculis elongatis feffilibus approxiinatis, omnibus androg>nis, remotiufculis; fquamis albidis, inembranaceis, medio ferrugineis lanceo- latis mucronatis; capfulis oblongis; bracteta lanceolato- fubulatis fpiculis brevioribus.*

Ad margined lacuum, in paludibus: *ved Lyng* bye Soe; tlirfchholm-fikov. Flon Jun.*

(Culmus triqutur Jlrictus fere crajptudine Cari^m cis vulpine, pedalis vel brevior, haud ultra, folio fus: foliis lato-linearibus culmo fubaquantibus*)*

78C. *C. teretiufcula* Good., spica supra decomposita, coarctato - ramosa acutiufcula; Spiculis glomeratis fasciculatis; foliis linearibus mucronatis acutis; capsulis ovatis patentibus acutis integris; culmo teretiufculo. Good, in Trans act. Linnean. Societ Vol. XL p. 16 j. Tab. 19.

3-

In paludibus: *veit Lyngbye-Soë* SC alibi. Flor. Mai, Jun.

(*Culmus debilis tractus foliosus, Folia angusta linearia.*)

**** Spicis flexu distinctis: femineis femilibus

787< *C. praeox*, spicis approximatis; masculis terminalibus subclavatis: inferioribus ovatis adpressis; subrotundis pubescentibus. Jucq. flor. Auftr. t. 4C.

In apricis, prae frequens. Flor. Maj- Jun.

788- *C. pilulifera*, spicis terminalibus subapproximatis subrotundis; macula lineari oblonga; capsulis subglobosis obsolete trigonis subhiatis. Plukenet Alniag. pag. 178. tab. 91. f. g, *C. filiformis** Flor. Dan. Tab. 104s.

In ericetis apricis: *vid Jirtde. Bakktr; i Char* lotunlund ved Graifloven.* Flor. Maj. Jun*

«. androgyna,

- I. spicis binis, terminalibus, ovato-oblongis: superioribus androgyna, inferioribus ternis,
9. spicis binis terminalibus trifloris; tertia icemata remota.

Bractea Janceolato-fubulata in pitulifera mono-
lea femper adest, *Icone Flor. Dan** Irene exj^res-
fa; in varietate vero androgyna nobis dicta ca-
tens obfervavl.

Nullomodo a *C. montana Lin.* differt- confir-
mavjt *Cd. Goodenough* 1. c. pag. TQC.

780. *C. flava*, fpicis fnerneisfubiotundis: capfu*
Us oblongis rofiratis divaricatis; mafcula li*
nari. Flor.Dan, Tab. 1047.

In paludofis. Flor. Jun.

Variat a. fpicis fcerninis binis 8C ternis remotis.

p. fpicis fubquaternis confertis fubfeffilibus;
capfulisglobofis acutis. *C. Oederi, Hoffm.*
Dtutfchl. Flor. pag 326. Flor, Dan. Tab.,
371. Valde diverfa eft liac varietas a pU-
lulifera; mihi autem videtur eadein effe
cum *C. extenfa* Gooden. 1. c. pag. 175.

(*Spica terminalis fuperne mafcula, infernt*
fczmina.)

Bracteas harum varietatum extenfae funt, plu0
ininusve reflexae.

790. *C. fdiformis*, fpicis raafculis fubduabus lined
ribus : fostnineis ovatis remotis; capfulis hir-
tis vel fubtomentofis. Good. 1. ,c. pug. 172*
tab. 20. f. 5. AClafiocarpa Ehrlu non diverf*

In paludofis valde humidis: ved *Lyngbye Sde.*

791. *C. unu\ay*, fpicis fubquaternis, cylindricO'
filiformibus, fubandrogynis, erectis feffilibu«»
fqnamis ovato oblongis, obtufis, carinati*
ferugineis capfulis ovatis obtufis.

In paludibus, ad fossas: *i Charlottenlund i den mellemjle Mofe ved Sidtn af Broen. Prirno vere.*

(*Culmus erectus, subscaber, triquettr, Folia linearia, subscabrida, culmo brtbiora% Spiaz tres vel quatuor lineares, andronyna, erect a JeJJihs: infima bractea longa erecta subjetacca injlructa, fecunda bractea brtviori. Squama ovato - oblonga, obtufa, acute, carinata capfu- Us hdud breviores. Capfula ovata:, comprejja, gibbet y o9tufa).*

793. *C. cappitosa*, fpicis erectis: iVjeroiueis fubfes- fiilibus: mafcula terininali'; fquamis ovatis capfulis ovatis fubmuironatis brevioribus. Gooden. 1. c. pag. ig5. Tab, ar. f. 3. •

In paludofis, caelpitofis, nemorofis. Flor. Jun. Variat. 1. numero fpicarum ioeminarum, tres quatuor ad quinque.

si figura fpicarum; ovatse, ovatae-oblongae vel cylindrical.

3. fituflorum; fiinma fpica floribus ma* fculis; infimis fcemineis omnibus; vel otiam in fun is fpicis fuperne mafculis inferne fcemineis infructis.

4. colore capt'ularum; viridibnsvel atris capfulis.

a. *pedunculara*, culmo triquetro altiori 8C laxiorij foliis baud angulliotibus; fpiris fubquaternis; fummis binis mafculii lineari- bus terminali maximo; imisfoemineis: "fu« prema feflili; iinfima cylindrivO - clavata

pednriculata floribus inferioribus remotis,
pedunculo filiformi palmari laxo incurvo
a basi culmi prto.

Variatatem bane in fylve: *ved Rudergaard in-
veui.*

793- ^* *fubulaia*, fpicis ternis: ma feu la terminal!
fubobovata: femineis ovatis feffilibus rfemo
ti.; ftju.inis ovato-oblongis mucrone fubu-
lata capfula longiori; capful is obovato- obion-
gis.

In caespitofis circa *Fahrum* ubi Cel: VaM hanc
invenit 8c benignissime mi hi communicavit.
Flor. Jan.

Culmus erectus triqueter fubfeaber. *Folia* li-
nearia culrno breviora* *Spica* ternae: *majcula*
obovata vel o.vata; fquamae oblongae rembra-
naccsc fenugineae, cofla viridi, mucronae fu-
bulata fubtricjuetla: *faminea* duae ovatiE, in-
fima fubpedunculata; fquamae oblongs, mem*
branaceae, fetruginese, tnedio viridae, mucrohe
qfiam in.mafculo longiori, fubulata. *Capful**
fubobovatai oblongifi fubmucronatae: inu-
crone bifida brevi. iBractee duae fohace&t
inferior longitudine culmi, fuperior breviof*

794, C *digitate*, fpicis linearibus erectis; vagini^
aphyllis fubmucronatis; capfulis diitantibu**
(*fpica majcula faminea terminali peduncuW**
atlfixa). Leers. Herbornef. Tab. 16, £ 4*^f

In fylvaticis haud frecjuens: i *Skoven imell*^A

Friderichsdal og Kolltkolh imod Fuurjötn. Flor.

May. r

• * * * Spicis fexu difflinctis: fceinineis pedunculatis,

795* *C. pallescens* fpicis ternis quaternifve: mascula terminali lineari erecta -+ femineis ovatis vel ovato oblongis pedunculatis remotis, floriferis erectis, involucris pendulis; bracteis foliaceis culmo longioribus erectis. Flor. Dan. Tab. 1055.

In pratis 8C nemoribus humidis. Flor. May. Jun.

796. *C. panicea*, fpicis binis, ternis, pedunculatis, erectis remotis oblongis; capsulis inflatis obtusiusculis subsistentibus; bracteis foliaceis spicis subaequantibus erectis, Fl Dan. Tab. 66r. potius depauperata Good.: melior autem fig. n. Tab. 32 Michel, gen. hue quadrat.

In paludibus 8C locis humidis: *i Lyngbye-Mofet pan dejkraa J&akhr imelUm Torbek og Spring/or** *⟨⟩. Flor. May*

797. *C. limosa*, fpicis femininis longe pedunculatis, ovatis, pendulis: macula longiore. erectiore; capsulis ovatis compressis; bracteis linearibus subaequantibus, (*foliis angustilimis*). Flor. Dan. Tab. 646. Cl e⟨s⟨m⟨. Wilden. Prodr. pag. 34. Tab. 1. f. 4.

In paludibus 8C pratis humidis: *Lyngbyemofe 8C alib* L Flor. May. 8C Jun.

variat fpicis femininis folitariis se geminis.

a 7 Q * *Monoecia Triandria**

-\

798< *C. distans*, spicis remotifloris **subsessilibus**
bractea vaginali; capsulis **angulatis** mucronatis.
Flor. Dan. Tab. lujg.

In pratis humidis. Flor, May*. Jun.

Varietas i. spica **infima** subsessilibus 8C intercidit
inter 5 ad basin **culmi** exeunte.

a. **Numerus spicarum**- multo variat, tres
quatuor quinque.

3. **spica-feminea** suprema paniciflora vel
ex folio (libre **pedunculata** conflat.

799. *C. fylvarica* > spicis **pedunculatis** **penicillatis***
macula **erecti**, laciniosis filiformibus **laxis**
pedunculo brevioribus; **capsulis** ovatis aristatis
trifidis. Flor. Dan. Tab. 1 ^04. Leers*
Herbom. Tab. 15. f. 2. inoliis.

In fylvatibus: *Bvgjvard; inullem Ordrupmoft* og
*Dyn.havtn** Fior. May. Jun,

goo. €• *Pseud-Cyperus* spicis femineis cyathiformibus
cylindricis **pedunculatis** pendulis **subgechinatis**; capsulis
aristato-rostratis divaricatis. Flor. Dan. Tab. in 7.

In paludibus; lacubus; pennis: *Isyngbye-Mo*
*Fridejitzberg-Have; ved RavzJkovs** **Bakftv** Flo¹
, 'Maj. Jun,

gor. *Cm rtturva*, spicis confertis pedunculatis
laciniosis subsessilibus: macula terminali 15
capsulis imbricatis **obtusis**. (*Joins culmoque*
glaucis.) Flor, Dan. Tab. 1051.

In paludibus cespitosis *Ordrup- vg Bernstorff*
IVJøe. Flor. Maj. Jun.

Variat I. fpicis mafcuUs binis rarior termis.

2. culino hiiriilioii iC elation.

Obf. eil (..glauca Roth. Scopoj. An·diverfa

a *C. humlli* Ket?.

***** Spicislexu diftinctis: mafculis pluribus.

802. *C. Ilricta*, fpicis fubft-Jlilbus, **cylindrlicfeacu-**
tis: mafculis fubdfiahus; foliis erectisftrictis^
Oood. 1. c. pag. Kj6, Tab. 21. f. g.

(*Squama ma'rum obfaugtr acutiafcula nigrm*
nervo dorfalli viridii femiwarumoblonga acuta,
capful is octofariam Imbru atitt ovatis comprejjis
acutis apice indivifo glabiis cilium daciduisi pauU
breviores.)

Ad margines lacuum. Flor. Mnj.

803. *C. aoita*, fl/icis iihforniibus; icetnineis inflo-
refcx-ntibus nutantibus: fructiieris erectis cap-
fulis atijriuU- lju apice iudiviiio. Goon. I.e.p.
C. gracilis Flov. Lond.

In paludibus ad iacos, Flor. Maj. 903.

(*Squama maium oblonga, tootufei nigra, ner-*
*vo dor fall viridi: inferiorta paulo breviores: fa**
minearum oblonga tcutee nigra nervo dorfall
viridi cupfula paulo breviores-[paulo longio»
ree/.)

804- *C. obtufata*, fpicis cylindrici* erectis; **fqua%**
mis ovato oblongisobtufiffihiics marutn ferru*
gineis: team\nearumni^ris linea dorfalli viridi
apicem verfus oblitterata, capfulis ovatis ciira
^uacrone bievi indivifo.

Ad Margines lacuura. Flor. Maj. Jim.

(*Culmus erectus triqueter f caber*» *Folia angujla linearia apice fubulata. Sp i c a m a f c u. Una du&y terminalis major: faminea diuz remota cylindrico filiformts, fcjples. Brae* tea foliacea infirna maxima/pica haud Ion* gior.)*

An varietas *C. Jlricta* vel *C. acuta*?

805, *C. paludoja*, fpicis oblongis fubobtufis: mas-
cularum fquamis obtiifis: fceminearum lanceo-
latis; captulis ovato • lanceolatis fubbidentatis*
Good. 1. c. pag. 202* *C\acuta Flor, Lond**

In paludofis: ved *Fuglelwad MblU neden Jot Krattet. Flor, Ma}. Jun**

(*Culmus erectus tripedalistir ultra, triqueter* Folia femunciam jere lata, longa culmo bn* viora, bafxn rubra. Spica m a f c la duo, vel tres approximate oblonga obtufa: fa mine 6 totidem oblongaj cylindrical acuta, ft mares in cpice, fubre motiffima* Bractea foliacea: in* ferior culmo longior).*

«. *elongata*, fpicis fcemineis divaricatis recur' vis fubpendulis, longioribus; foeminea* rum iquamis acutioribus vel mucronati**

806» *C. riparian* fpicis oblongis acutis; mafcula' rum fquamis lanceolatis: fceminearum ariftato* acuminatis; capfulis ovato lanceolatis apic^ furcato dentatis. Good. 1. c. pag. 200. Curt* Flor. Lond. Flor, Dan. Tab. 111%.

C. crajja. Retz.

Ad rivulos, lacos, in fossis paludosis. Flor. Maj. Jun.

tog. *C. veficaria*, fpicis masculis linearibus: foemineis oblongis patentibus; capsulis inflatis ovato oblongis acuminatis, apice bifidis; squamis lanceolatis acutis, Flor. Dan. Tab. 647.

In fossis, paludibus. Flor. Maj. Jun.

Culmus triqueter angulis acutissimis. Styli tres villosulae.

Variat X. fpicis foemineis subsessilibus cylindricolongatis, subrectis.

st. fpicis foemineis ovatis pedunculate subpendulis.

3. spica foeminea supra acuta, apice mascula,

808. *C. ampullacea*, Good, fpicis filiformibus: capsulis tenuioribus: foemineis teretibus erectis capsulis inflatis globosis aristato-rostratis divaricatis; squamis ovato lanceolatis acutis, margine scariosis.

In fossis paludosis: *bagved Ordrup; ved Birkerød.*
Flor. Maj.

Culmus triqueter angulis acutis. *Folip.* angustata culmo longiora. *Spica.* filiformes cylindricae » remote. *Squama*, ovato lanceolatae, pallidae: carina subviridi, margine scarioso, tenero albido: *mascularum* acutae vel obtusiusculae: *foeminearum* acutae. *Capsulae* ovato-obovatae, rostratae, rostrato-bifido-divaricatae, *Stylis* villosulae*.

839. t. *obtujatigui*, fpicis mafculis filiformibus
binis remotis: fcemineis tubis «y indricis pe-
tlunculatis fubpendulis; ftjuamis linearibus
nbtufis? caplults* giobofifi; inflatis divaHcatis,
roftro longo bifido.

'lh'fi)iris paludofis : *Birkerbd; Ordrup-Mofe* 8C
alibi. HOT. Maj.

Culoms obfol^te triqueter angulis obtufis.
Style duas vtl nes.

Jto. *iJ. hirtaj* fpicis fcemineis remotis, fubpedun*
culatis ertxtis 5 \$apfulis lurtis. Floi\Dan.Tab.
425-

Tarn in ficcis quam humidis gbieofis. Flor
j. Jun.

Vatit. i. fpicis mafculis binis tribusve, magis
miiiisve remotis i<emineisque ovato
cylindricis.

j. fpicis mafculis avatis; foemineis filifor-
mibus.

3. fpicis omnibus iiliformibus,

4» fpicis fcemHieisfubCediiibus aut longe
pedunculatis.

5. fpicis fummis androgynis, imis fi

6. fquami« omnibus lanceolatis acntfs-
frmis vel mafcularum acutiiFimi.c, f«J
tn4nearurn muorone Ion go fetaceo.

7. .vaginis hirtutiflimis ; foliispubefcen

\$.*<*aginis fubpubefceiitibus; foliie gla-
brie

9. culmo Liumiliori rigidiori crasto*
iof culmo Q^{ti}Qri filiformi laxo.

317. *Sparganium*,

Mfl/c, Amentum fubrotundum. Calyx tripbyllus.
Corolla nulla.

JPcem. Amentum fubrotundum. Calyx tripbyllus.
Corolla nulla. Stigma bifidum.
Drupa exfucca mono feu difperma.

SIX. *S. ramofum*, foliis triquetris canaliculatis
erectis; culmo ramofum. Flor. Lond.

Ad folias; margines lacuum, pifcinum. Flor,
Jun, Jul,

Sis. *S. fimplitx*, foliis enfiformibus, bafi triangu-
Jaribus, fupra planis, erectis; culmo fimplici.
Flor, Dan. Tab. 932.

Ad folias, in paludibus. Flor. Jun. Jul.

8x3. «*S. nqtari*» foliis planis, decumbentibus, fub-
natantibus; culmo erecto humili paucifloro,
Flor. Dan. Tab. 200.

In iofis paludum: *Betnjlorf'' Ordrup og Tepri**
Noje, Flor. Jul. Aug.

3*8- *Typha*.

Majc, Amentum cylindricum. Calyx obfoletus
tripbyllus. Corolla nulla.

tarn. Amentum cylindricum infra mafculos.
Calyx capillaris pappofus. Corolla nulla.
Stylus unicus. Semen unicum, infidens.
pappo capillari.

J14. *T. latifolia*, foliis fubenfiformibus; fpicamafcula fcemineaque approximatis. Flor. Dan, Tab. 645.

In paludibus turfosis, pifcinis. Flor. Jun. Jul.

815« *T. angujifolia*, foliis femicylindricis; fpicamafcula foemineaque remotis. Flor. Danic. Tab. 8J5.

In paludibus; pifcinis: *ved Kaftellet* & alibi. Flor. Jun. Jul.

319. *Amaranthus.*

Jtfa/c. Calyx triphyllus. Corolla nulla Stamina tria.

Fam. Calyx 8C Corolla ut in mare. Styli tres. Capfula unijocularis circumfchTa. Semen unicum.

816. *A. Blitum*, glomerulis lateralibus; floribus trifidis; foliis ovatis retufis; caule diflufo. Inter olera borti Dn. Kollin *i Stege paa Moen* tantum obfervavi.

TETRANDRIA.

3^0. *Urtica.*

Mafc. Calyx tetraphyllus. Corolla nulla. Nee* tarium centrale, cyathiforme.

J^am, Calyx tetraphyljus: foliis duobus oppofitis exiguis. Cotolla nulla. Stigma vil* lofum. Semen unicum ovatum nitidum*

817* *U. urens*, monoica, foliis oppofitis ovalibus. Flor. Danic. Tab. **739.**

In cultis oleraceis, ubique. Flor. Jun. Jul.
Aug.

818. *U. dioica*. dioica, foliis oppositis cordatis;
racemis geminis. Flor. Dan. Tab. 746.

In ruderatis ad fepes, vias. Flor. Jun. **usque**
ad Septembr.

321. *Betula*.

Mafc. Calyx monophyllus tri feu quinquefidus*,
triflorus« Corolla quadripartita.

*Fam** Calyx monr phyllus tri feu quinquefidua
biflorus. Styli duo. Semina duo vel tria.

819» *B. alba*, foliis ovato-fpatulatis, acuminatis
incifo ferratis, glabris. Job. Sauh. Hift[^]
Plant. I. Libr. VIII. pag. 149.

In fylvis: *Birkerbd; Hirfchholm, Fridaichsborg*[^]
Flor. Maj-

Variat ramis erectis flrictis atque flaccidia
pendulis.

820. *B. alnusy* foliis fubrotundis glutinofis glabris,
obtufe crenatis, petiolatis ramofis. Job.
Baub. Hilt Plant. I. Libr. VIII. pag. 15r.

In paludibus; 8c fylvis humidis. Flor. Apr*.
Maj.

821. *JB*» *iricana*, foliis ovatis acntis bUferratis inca*
nis; ftipulis lanceolatis; amentis fpicatis. Joh.,
Sauh. 1. c. pag. 154. fg. fuperior»

Haud frequens: *ved Bagfvard, Alderslwilet vei*
Gels-Balle, Flor. Maj.

322. *Littorella.*

Mafc. Calyx tttalylus. Corolla quadrifida. Stamina longa.

JFoem. Calyx imilus. Corolla subquadrifida. Stylus lorigus. Nucleus monospermus.

§12. X, *lacustris*, in aquis undricis linearibus; capitula brevibus unguiculis infra medium bracteatibus. Flor. Dan. Tab* 170.

In inundatis ericeti: *Odsherred ved Rbrvig* ubi X)r. *Marcuffen* plantam hanc rarissimam legit.

POLYANDHIA.323. *Sagittaria.*

Mafc. Calyx triphyllus. Corolla tripetala. Filamenta fere viginti quatuor.

Fam. Calyx 8c Corolla ut in mare. Petioli plurimi. Sexnina, loriga, nuda.

§§§* *S. sagittifolia*, foliis sagittatis acutis Flor* Dan. Tab. 172.

In piscinis inclementibus: *in Hellem Lyngby* og Pappersmølle.* Flor. Jim. Jul.

Folia juniora linearia graminea.

324. *Myriophyllum.*

Mafc. Calyx monophyllus quadridentatus. Petala quatuor, unguiculata caduca. Stamina octo.

JFoem. Calyx 8c Corolla ut in mare. Stigma quatuor feffilia. Capsulae quatuor, monoperrae, cuneatae.

851. *M. fpicatvm*, caule ramofo fpicis terrninalibus intenuptis nudis; iloiibus foraqteatis* iu-11 is pinnatis capillaiibus. Flor. Dan. Tal. 68 r* In ioffis, pifcinis, lacubu's: ved St* Hans Ho* fpitctl 5 Lyngbyt • Ao« beg ijrngfty^ . ' 1?lor^T Jun. Jul. Aug.

885- *M. verticilkiwm*, ciule fimplici, iloribus verticillatis^ heimaphroditis; folus pinnatis; p nnis linearibus cainofis. Flor. Dan. Tab* 1046.

In fofiis, pifcinis, lacubus: red Papfersmble; Btrnjtorfmoft; Lundehutmofe. Flor. Jun. Jul. Aug.

• Variat foliis vei |pinnulis capillaceis longiort biis ac brevioxibus.

325* *Ciratophyllum.*

Ald/c. Calyx multipartitus. Corolla nulla. Stamina duplo piura quani fegmenta calycis.

JFam. Calyx 8c Corolla ut in mare. Peflillum unnum. Semen nuicum.

S2G. *C. demer/urn*, foliis dichotoipis dentatis: interionbus linearibus; fuperioribus ir\flato tubulofis denfilimis; capfulis voftro longitudiue aequalibus.

In foffis, ftacnis, Flor. Jun.'Jul.

327. f_kjiiAm«r/um, foliis dichotomis dentatis: in* ferioribus fubinflato — tubulofis; fuperioribus capiilanbas approximate; capfulis acuminis brevi obtufot

In ftagnantibus, pifcinis: *paa Norre-Failed tt*
alibi. Flor. Jun. Jul.

326. *Quercus.*

Mafc. Calyx fubfeptemfidus. Corolla nulla. Sta-
mina ad decem. .

Iczm. Calyx monophyllus integer fcaber. Co-
rolla nulla. Styli duo ad quinque. Nux-
ovata coriacea.

%%%. *Q. Robur*, foliis petiolatis oblongis fuperne
laciioribus: finubus acutioribus, angulis obtu-
fis, fructibus fubfeffilibus.

In fylvifc haud frequens. Flor. Maj. Jun.

8*9* *Q*f&mina*, foliis fubpetiolatis oblongis ob-
tufis, piunato - finuatis; fructibus fubfolitariis
longe pedunculatis. Flor. Dan. Tab. 1180.

In fylvis frequentior. Flor. Maj. Jun.

327. *Fagus.*

Mafc. Calyx quadri-feu quinquefidug, campa-
nulatus* Corolla nulla* Stamina ad duo*
decirn.

Fctm. Calyx 8C Corolla ut in mare. Calyx qua-
driiidus. Capfula aculeato-hifpida quadri-
valvis: Valvis dehifcentibus. Semina
duo.

330. *F. Cojlanza*, foliis lancofolatis acuminatis fef-
ratis fubtus nudis.

In plantationibus; *ved, Bagfv<trd; i Dyrdxavi**
Flor, Jun.

831. *F. fylvatica*, foliis ovatis obfolete ferratis.
Flor. Pan. Tab.

In fylvis ubique. Flor. Maj. Jun.

328. *Cqrylus*.

Mafc. Calyx monophyllus, trifidus, squainiformis, uniflorus. Corolla nulla. Stamina plura.

Fctm. Calyx diphyllus, lacerus. Corolla nulla. Styli duo. Nux ovata.

832. *C. Avellana*, stipulis ovatis obtusis (*foliis alternis rotundato-ovalis incisivo ferratis acutis nungofis; amentis masculis in ramulis terminalibus pedunculatis pendulis; floribus femineis in gemmis terminalibus.*)

In fylvis, nemoribus*. Flor* Mart. Apr. Maj.

MbNADELPHIA.

339. *Xanthium*.

Mafc. Calyx communis imbricatus. Corolla connata: propria monopetala infundibuliformis. Filamenta coanata. Receptaculum paleaceum.

Fam. Calyx. Involucrum diphyllum, biflorum. Corolla nulla. Styli duo. Drupa ficca, muricata, bifida: nucleo biloculari.

833. *X. Jrumarium*, caule inerme; foliis cordatis trinervatis. Flor. Dan. Tab. 970.

In ruderalibus inter rarioribus: *videtur Amagerport;*
Ved Salpeurwrkt paa Ojltrftlhd. Flor. Jun. Jul.
Aue.

'330. *Pin its.*

Mafc. Calyx retraj hvllus, " Cōrōllā nřllā. Sta
mina'piufi'rna.

Fam. Strobilus: fquamis Ijifloris. Corolla nulla.
PiiHI 'um unicūm. Nux alamembranācea.

* Foliis plutibus ex eadernbafi vaginali.

S 54. *P. fykejlrīs*, foliis geminis: primordialibus
Toll tar iis glabris.

835, *P. Larix* foliis fasciculatis obtufi^;

** Foliis toHtaiiis 8c bafi 'diftinctis.

836. *P. Abies*, foliis folitarii*, fubuldtis, mucrona-
tis, ilagvihuſ, bifariam verſis.

337. *P. Picea*, foliis folitaiii^ernargihbtis.

Species hie enumeratje minfrnfc indigenae^ fed in
-plantationibus diverſis locis adordmatis inven-
untur. Fiorent grimo vere,

SYNGENESIA.

331, *Bryonia.*

Mafc. Calyx «quinquedentatus. Corolla quinque*
partita. Filamenta tria.

JFcem, Calyx 8C Corolla raaris. Stylus tri feu
quadrifidus. Bacca glo1)ofa polyfperma.

\$38. *B. alba*, foliis palmatis utriqtue callofo-fca-
bris; floribus monoicis. Flor. Dan. Tab. 8*3'
In ſepibus rarior: *lige over for Blaaegaard udei*
for Nørreport. Flor. Jun.

 CLASSIS XXII.

DIACIA.

DIANDRIA,

Styx. Mnfc. Ainep.ti fii.n.i;nse utiiflnrie. Corolla nulla. Nectarium hai'eos. Staipina pie* tumque duo.

Fanu Amenti iquamae uniflorae. Corollanulla. Stylus biiiilus. Capi'ula bivalvis. Seminu pappofa.

TRIANDRIA.

JEmpetrum. Mafc. Calyx tripartifcus. Corollatrt< petiila. St<irmina lon^i.

jFcem. C^lyx SC Corolla mar is. Styli tres ad noveui. Bacca tri-enneafperma.

TETRAND < I A.

Htp&phat. M&fi. Calyx bipartitus*. ^-oroUa nulla.

Fccm. Calyx bifidu*. Corolla nalla. Piilillnm unicum. Jiacca monofperma : arill< truncato.

Myrica, Jtfo/c. Amentum imbricatum* Corolla nulla.

Fcem. Amentum 8c Corolla ut in mare. Styli duo. JL^ericarpia aionofpe'rma.

PENTANDRIA.

C a nab is. Mafc. Calyx quinquepartitus. Corolla nulla.

Fam. Calyx monophyllus. Corolla nulla. Styli duo. Nux.

Humulus. Mafc. Calyx pentaphyllus. Corolla nulla.

Fam. Calyx monophyllus. Corolla nulla Styli tres. Semen unicum intra calycem foliatum*

OCTANDRIA.

Populus. Mafc. Amentum lacerum. Corolla nulla. Nectaria ovata. Stamina ad fedecim.

tarn. Amentum 8C Corolla ut in mare- Stig* ma quadnfidum. Capfula bivalvis. Semina pappofa.

ENNEANDRIA.

Mercurialis. Mafc. Calyx triphyllus. Corolla nulla. Stamina ad duodecim.

Fam. Calyx 8C Corolla ut in mare. Styli duo. Capfula dicocca.

Bydrocharts Mafc.* Calyx triphyllus. Corolla tripetala.

Fam. Calyx 8C Corolla ut in mare. Styli fe** Capfula iofera.

DODECANDRIA.

3-tratiotes. *Mafc.* Calyx spatia diphylla. Petala tria perianthio imposita. Nectaria plura antherseformia. Stamina plerumque duodecim.

Fotm. Calyx Petala 8C Nectaria ut in mare. Styli sex. Stigmata duodecim. Bacca ovalis sexlocularis.

MONADELPHIA,

Juniperus. *Mafc** Amentum. Corollanulla. Stamina tria.

Tarn. Calyx tripartitus. Petala tria Styli tres- Sacca trifperma.



DI'ANDRIA,

342. *Salix*.

*Masc** Amenti (qua. use uniiloiae. Corolla nulla,
GLuduh bafeos nectariiera,

JFoern. Amend fquamae uniflorae. Corolla nulla.
Stylus bifidu^ . Capfula unilocularis, bi-
valvis. Semiaa pappofa.

* Foliis glabns ferratis.

339« &• *peniandra*, fohis ovatis, acutis, ferratis,
i^labris; flnribtis pentandns h^tandrisve.
Llor. Dan. Tab. 914.

Haud irequens in fepibus: *ved Vrien til Fride-
rkltsdal paa venjlre Haand omtrent ved Kongs-
hviie, i Dyrehaven** Flor. Maj. Jun.

|.£0. *S. fragilis*, foliis ovato-lanceolads, ferratis;
petiolis dentato-glandulofis.

In fepibus ad pagos. Flor. Maj.

Variat I. fruticis facie, rainis fragiliflimis;
gemrnis duabus latecalibus. *S. bigemrnis*
Hoffm.

2. Arboris facie, ram is fragilibus; foliis iti-
ferioribus inioribus obovatis reflexis. *S**
decipiens Hoffm. Hilt. Salic. Tab. 31.

341. *S. monandra*, toiiis ferratis, glabris, lineari*
lanceolatis, fuperioribus obliquis; floribu^
monandris, Hoil'm. 1. c. Tab. iig.[%] r. si. Tab. 5*
fig. 1/

Haud frequens in fepibus: *ved Kongevehn tit*
*Lyngbye, hvor VeUngaerop til Burg-Gaarden**
Flor. Maj,

••• Foliis* integerrimis v/llofis.

812. *S. inculfflcea*, foliis int* gen inns lanceoiatis
fubtu's villofis nitidis; lliptilis ovatis acutis.

In paludofis turfofis. L'lor. Maj.

84 j. *S. rtptns*, foliis integerrimis lanceoiatis utrin-
que nudiufulis; caule repente. An eadem
cum *Salix deprtjfa* H of Fin. I.e. p. C3. 1.15. in?

In paludibus turfofis. Flor. Maj.

114. *V. rosmannijolia*, foliis integerrimis, lanceo-
lato - linearibus lhictis feffilibus fubtus tomen-
tofis.

In paludibus turfofis: *Lyngbye-Mofe: Lundehus**
MoJ'e ; i Langmofen ved Dronninggaard. Flor. Maj»

*** Foliis fubferratis villofis.

145. *S. caprea*, foliis ovatis rugofis fubtus to men*
tofis unHatis fupeine denticulatis. Flor. Dan.
Tab. 245.

In fepibus humidis. Flor. Apr. Maj.

846. 5^f. *acuminata*, foliU ovato-oblongis (*obovatis*
turn acumine) fubtus tomentofis fuperioribus
integris inferioribus cr-natib.

In fylvje: *irnellem Rudergaard og Birkerød \$ ved*
tn af Fijke • Uammene. Flor. Jun.

' 17» *S. cinerea*, foliis fubferratis oblongo ovatis,
fubtus fubvillofis; ftipulis din^idiato - tordatis.

In fepibus humidis, paludibus. Flor. Maj.

848 *S. viminalis*, foliis fubintegerrimis lanceolate-
linearibus longiffimis acuminatis, fubtus feri-
ceis raniis virgatis.

a (jo

Dioecia Triandria.

*Ipr fepihirs j ve d Vt'u n til Ch a rlo it en land; ved
JBernJlorf Vtiem imellem Bagfvaru o% Kotleko'.h
Flor. Maj.*

819. *S\ uida*, foliis lanceolatis acuminato-ferratis»
iurint|ue pubcfcentibus : ferrattiris infimii;
glantlulofis. Holfin. I. c. Tab. 7. 8.

In ffcpiibiis. Flor. Maj.

TRIANDRIA.

333- *Empetrum.*

M(afc. Calyx tripartitus. Corolla tripetala. Sta<
niina longa.

Fam. Calyx Sc Corolla ut in mare. Styli no-
vern. Bacca enneafpprrna.

850, *E. n/grum*, procumbens, foliis linearibus,
fupra planiufculis, iubtus convexis, fub verti"
cillatis fubquaternis ; floribus axillaribus fefli-
lilms. Flor. Dan. Tab. 975.

In piiliulibth, infylvis: *Lyngbye-Mofe; i S'ko**
vm vtd-Rudersdat. Flor* Maj«

TETRANDRIA,

334. *Uipophae.*

' *Mafc** 9^ay[^] **bipartitus.** Corolla **niilla.**

Fam. Calyx bifidus. Corolla nulla. Stylus
uriicu[^]. Bacca monofperraa.

85c> *H. RhamnoideS)* FOH16 lanceolatis fupra e ^{vi-}
ridi cunetceatibus > fubtus **argenteo-sericeis**

nervo elevato; floribus, feffilibus lateralibus.
Flor. Dan, Tab. 265.

Tantum vidi in inf. Mouse vulgo *lilU KlinU*

335. *Myrica.*

Mafc. Amentum imbricatum: fqnamis triangu*
laribus. Corolla nulla. Scaniina plerum-
que quatuor.

Fcem. Amentum*irnbricatum: fquamis minori-
bu •. C^jJorollánnulla. Styli duo. ^k Pericarp ia
in ftrobilum congella, triloba monofper-
iria coriacea.

852. Af. *Gale*, ibiis lanceolatis fubferratis; ciule
fructicofo. Flo . Dan. Tab. 327,
Inpaludofis: *ved Heljingör, J)n. Holten,*

P E N T A N D R I A ,

336. *6 a n a b i s.*

Mafc. Calyx quinquepartitus. Corolla nulla.

Fanu Calyx monophyllus integer Jatere hians.
Corolla nulla. Styli duo. Nux bivalvis,
intra calycem claufum.

853- C* *fat'wa%* foliis digitatis; floribus mafrulinis
rauHnofo-terrniuahbus: fcemineis uxillaribus
fubfolitariis.

In ruderatis quafi fponte provenit. Flor. Maj. Jun.

337. *Humulus..*

Mafc. Calyx pentaphyllus. Corolla nulla.'

Fcem. Calyx monophyllus, oblique patens, in-

teger. Corolla nulla. Styli duo. Seme*
umcum intra calycem foliofum.

854. *H. Lupulus*, caule long*flimo volubih; foliis
corda'is tri-quinquepar'ttis vel integris oppo-
fitis floribus inafculinis racernofo panieulatis,
alaribus: foemineis in ftrobilos difpofitis. Flor.

Dd.i. Tab, T3 *u .

Infepibus, *ylvis; j< pagos frevjuens. Flor. Jun. JuK

O G T A N D R I A .

338* *Populus*.

Mdfc. Amentum laxe imbricatum: fquamis lace-
ris. Corolla tiirbinata, obliqua, integra*

F&m. Amentum 8c Corolla ut in mare. Stigma
quadnhdum. Capfula bilocularis. Serni*
namulta, pappofa.

855* *P-* <*tba> f'oiiis fubrotundis, dentato-angulatil
fubtu*k torr.entofis. .

Paftm ad pagos, in fylvis. Flor. Apr.

856. *P. tremuld*, foliis fubrotundis, dentato-an*
gulatis utrinque glabris. .

Paflim ad pai<os. Flo • Mart.

857. *P. nigra*, foliis deltoidibus acuminatis ferr*
ti5f utrinque glabris, coriaceis.

Paflim. Flor. Apr Maj.

E N N E A N D R I A .

339. *Mercurialis*.

Majc. Calyx tripartitus. Corolla nulla. Stamina
novem ad duodecira. Aatlieræ globolæ
didymæ.

Fam. Calyx 8C Corolla maris. Styli duo. Cap-
fula dicocca, bilocularis, inonofp?rma.

853. *M. pereanis*, caule fitnphciflimo; foliis ovatis,
ferratis, acuminatis, fcabris. flor. Danic.
Tab. j.oo,

In nemoribus frequens. Flnr. Maj. Jun.

859. *M. annua*, caule brachi.-to; iohis glabris;
flori^oiis fpicaris. Bull. Tab, 159. 5433.

In cultis oleraceis, hoitis: *Rofenborg-Have* ubi
raiius ofervavi.

340. *Hydrocharis**

Majc. Spatha diphylla. Calyx trifidus. CoroIU
tripetala. FilainenU tria inceriora f*ylifera.

jFccm. Calyx 8C Corolla ut in mare. Styli fex.
CapfuJa fexlocularis, polyfp'-rma, in'era.

860. if. *Morfusrancz*, foliis orbiculatis, integerrimis,
nitidis, glabiis, natantibus. Flor.Dan.

¹ Tab. 878-

Inlacubus, pifcinis, foflis. Flor. JuU Aug.

DODECANDRIA.

341. *Stratiotes.*

Mafc. Spatha diphylla quadri feu fexflora. Peri-
anthium monophyllum. Petala triatubo
perianth'ii impofita. Nectana plura in
peripheria floris. Stamina ~~plerumque~~
duudccia.

Fam. Spatha diphylla uniflora. Pemnithium
Corolla SC Nectaria tit in mare. Stylifex,
bifidi. Bacca ovulis htxa^ona, fex locu-
laris.

§61. *S. Abides*, foliis enfiformi-triangulis, acu-
leatis. Flor. Dan. Tab. 337.

In lacubus, pifcinis, aquis ftagnantibns; *vtd*
Ordrup; imellern Lyngbye og Painenmölles ved
jpriderichsdals Broe, Flor. Jim, JAl.

M O N A D £ L P H I A.

342. *Juniperus.*

Wb/c. Amentus fqnamis decem_f unifloris. Co*
rolla nulla flamina tria.

Tarn. Calyx tripartitus. Petala tria. Styli tres,
Eacca trifperma, tribus tuberculis calycis
inæqualis.

§63. *J. communis*, foliis ternis patentibus mucro*
natis bacca longioiibus, Flor. Dan. Tab.
1110.

In lylvis; ericetis: *ved Friderichsdal, imelUm*
Blovjlrup og Friderichlibi, r_b f ved Birkeöd, Ru-
ivgaard 8C alibi. Flor, April. Maj.

CL A S S I S XXIII.
P O L Y G A M I A .

M O N O E C I A ,

*Holcus. Hermaphrod** Gluma uniflo-a. Corolla bivalvis. Stamina tria. S yli duo. Semen unicum.

Mafc. Gluma uniflora. Corolla bivalvis. Sta* mina tria.

*Parietaria** *Hermaphrod.* Cál>x quadrifidu's* Corolla nulla. Sramina quatuor. Stylus uni« cus. Semen unicum.

Fam. Calyx quadrifidus. Corolla nulla. Sta- mina nulla.

*Acer. Hermaphrod** Calyx quinquefidus* Co- rolla pentapetala. Stamina octo. Styli duo. Samaiae duae unialatae.

Mafc. Calyx, Corolla 8C Stamina ut in herma- phredito.

*-Atriplex** *Hermaphrod** Cjlyx pentaphyllus. Coiolla nulla. Stamina quinque. Stylus bi- partitus. Semen unicum depreffum.

-teem. Calyx diphyllus. Corolla nulla. Stamina nulla Semen unicum comprelTunu

D I O E C I A.

*Fraxinus. Hermaphrod** Calyx nullus feu quadripaititus. Corolla nulla feu tetrapetala. Stamina duo. PilliUrn unicum.

Fani. Calyx 8C Corolla ut in hermaphrodite
PiftiUum SC Semen unicum.



MONOECIA,

343. Helens.

Hennaphrod. Calycis Gluma uni feu biflora
Corolla ariftata. Stamina tria. Styli duo.
Semen unicum.

Jtfo/c. Calycis Gluma bivalvis. Corolla nulla*
Stamina tria.

(63* *H. mot Us*, glumis bifloris midiufulculis; flos*
culo hemaphrodito mutico: mafculo arifta ge*
niculta* Flor. Ban. Tab* 1059.

Ad margined agrorum; an fylvis. Flon Jul.
Aug.

864. *B. lanatus*, glutinis bifloris villofis; flofculo
bermaphrodito mutico.» mafctila arifta genicu«
lata. Flor. Dan. Tab. itgi.

In pratis; pafcuif* Flor. Jun. Jul.

865. *H* xydoratus*, glumis trifloris muticis acumi*
natis; flofculo liermaphrodito diandro. Flor*
Dan. Tab. 963.

In paludolis, pafcuif* Flor. Maj, Jun.

344. Parietaria*

Hermaphrod. Calyx quadriidus. Corolla nulla.
Stamina quatuor. Stylus unicus. Semen
unicutn fuperum ovatum.

~~Fem.~~ Calyx 8c Corolla h imaphroditi. Stamina
nulla. Stylus & femina ut in bermaphror
dito.

866. *P. officinalis*, foliis lanceolato-ovatis; petalunculis dichotomis; calycibus diphylli*
Flor. Dan. Tab. 531.

Haud frequens: *Kajlels Ravelin ved den fbrftt Broe ved Vandet nedenfor Volden.* Floi*. Jul. Aug.

345. *Acer.*

IXermaphrod. Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Stamina octo. Pericarpium unicuique Samarae duae, rarius tres, unilatae.
terminat aetate.

Mafc. Calyx Corolla 8c Stamina ut in hermaphrodito.

867. *A. Pseudo-platanus*, racemis pendulis; foliis quinquelobis obtusis inaequaliter serratis.
Pflanzl.: *paa Volden; ved Kajllet dye.* Floi» Maj.

868. *A. platanoides*, corymbo simpliciter erecto; foliis quinquelobis dentatis: dentibus acuminatis.

Pflanzl. *ved gamle Kongevej uden Vejlerportf i Lunden ved Fahrungaavdi i Plantagerne ved Bagved &c.* Flor. April. Maj.

869. *A. campestre*, corymbo tripartito erecto; foliis quinquelobis integerrimis lobis inferioribus emarginatis.

Infylvis, *i Dyrehavn ikk langt fra & i den*

346. *Atriplex*.

Hermaphrod. Calyx pentaphyllus. Corolla nulla.
Stamina quinque. Stylus bipartitus. Semen
unicum, deperitum.

Fam. Calyx diphyllus. Corolla nulla. Stamina
nulla. Stylus bipartitus. Semen unicum
compressum.

870. *A. hastata*, -caule herbacea; calycinis valvulae*

Jis femineis magnis, deoidibus finuatis.

In maritimis paludosis. Flor. Jul. Aug.

a. microtheca, foliis triangularibus dentatis;
valvularum calycinum marginibus dorso-
que dentatis firmis. Rafn. 1. c. pag. 239.

b. niacrotheca, foliis hastatis, subintegerrimis,
valvulis calycinis magnis, marginibus
dentatis, Rafn. 1. c.

y. calolthedii foliis fastigatis laciniatis; val-
vulis calycinis duplo praecedentium ma-
joribus profunde laciniatis. Rafn., 1. c.
pag. 240.

871. *A. patula*, caule herbaceo patulo; foliis sub-
/ deltoideo lanceolatis; calycibus feminum
difficilis dentatis.

In maritimis ad fossas. Flor. Jul. Aug.

872. *A. littoralis*, caule herbaceo erecto; foliis
omnibus linearibus integerrimis.

In maritimis ad fossas. Flor. Jul. Aug.

873* *An pedunculata*, caule herbaceo divaricato;
foliis lanceolatis obtufis integris; calycibus,
foernlneis pedunculatis.

In jnaritimist *paa Amager ved Krudttaarnene.*
Flor. Jul. Aug.

D I O E C I A .

347. *Fraxinus,*

HtmaphrodiU Calyx nullus. Corolla nulla.
Stamina duo, Piflillum unicum. Semen
unicum lanceolatum,

874. *Fn excelfior*, foliis ferratiss floribus apetalii
Flor. Dan. Tab. 969,
Paffira. Flor. April. Maj,



INDEX GENERUM.

- Acer, pag. 298.
 Achilla a, 346,
 Acoi us, 108,
 Actaea, 164.
 Ad ox a, 128.
 Aeqopodjum, 88*
 J&tculus, 118,
 Aethula, 9*.
Agri-monia, 149.
 Agrostemma, 144*
Agrostis, 99.
 Aira, 34,
 A]uga, M\$%
 Alchemilh* 47.
 AUisma, nfi*
 AUium, 103,
 Alopecurus, 29*
Ailone, 97.
 Ainaranthus, 278.
 Anauahs, 68«
 Anchufa, 63*
Antromeda, 134.
 Anrmone, 168.
 Anctthum, 93*
 Angelica, 95.
 Anthemis* 246.
 Authericum, 106.
 Anthoxanthuni, 10.
 AnihyUis, 909.
 Anturhinum, . 185.
 Amimf 91.
 Arabis, 197.
 Aihutus, 134.
 Arctium, 935.
Arenaria, 149<
Arnica, 941.
 ^ n^ d a , 937,
 Arum, 954.
 Arundo, 35.
 Afclepias, pag. 79.
Asparagus, 106.
Asperugo, 64.
 Afperula, 43,
 AfteT, 945-
 Aftragalus, 913.
 Athamanta 86.
 Atuplex* 599-
 Avena, 33.
 BiUota, 180,
 B Ins, 040,
 pcrbens, 103.
 Betomca, 177.
 Betula, 379,
 Bldcns, 8^6,
 Braiica, 196*
 Bnza, 99,
Bromus, 31,
Bryonia, 984.
 Bupleurum, 91.
 Butomus, 130.
 Calilc, 193*
 Calendula, 34\$t
 CalU. 255*
 Calluriche, %9
 Caltha, 167,
 Campanula, 69.
 Canabis, 991.
 Capnoides, 206.
 Cardamine, 197*
 Carduus, 933«
 Carex, 369*
Carlina, 239.
 Carum, 88*
 Caucalis, 85,
 Centaueia, C47,
 Cemaunum, 68,
 Centun^ulus, 46.
Cerastium, 145.

- OrMophvilum, pag. 581.
 (ilir-rn^hyllum, 57.
 Chara .60.
 Chelidorium, 164.
 (>-ropo^xlium, 81.
 (hry arnhflmum, 241.
 Cbryfo J.l(ajum, 125,
 Cichorium, 224.
 Cicuta, 92.
 Cineraria, 245.
 Circus, 'i.
 Ciftus, 166-
 CliuopotUum, ig },
 Circus, 2.32.
 0<K hl^arn, 1 g 1.
 Comarum." **161**.
 ConLum, *gfl*
 ConvMlaria, **106**[^]
 Convolvulus, 6g.
 Cornt's. 47-
 Corylus, 283.
 Cotub,
 Cram'ir, 150.
 Cratrens. 155.
 Cr^i>i-% 927.
 Cucubalus, **10W**
 Cit'cuta. **48**.
 Cynoeloifnm, 63.
 Cynoluru^, 29.
 Cyperus, 16.
 Dactylis, ag.
 Datura, 75.
 Delj'binium, 16&.
 Dentaria, 19s.
 DiantlAis, 138-
 Diplaus, 45.
 Draba, 190.
 Drofera, 99.
 Echiuro, 65. .
 Ebiinc, 199,
 Elymus, ^7.
 JEmpctrum, 290[^]
 Epilobium, iai.
 Erica, 124-
 ETJaeroij, 2.1?.
 Eriophoriim, 19.
 Krvum, gi^g.
 Eryngium, pag. S[^].
 Eryumum, 193.
 Evonymus, 77.
 Eupatoriuin, 236.
 Euphorbfa, IJ;O.
 Euphratia, **1S3**,
 Fagus, 289.
 Jrcltuca, 29.
 I-icaiaa, 169.
Filago, 248.
 Erngaria, 159,
 IraxiniKs, 300[^]
 Jufnaria, 206.
 Galcobif<, 178,
 Galmra, ^,3.
 Geniuna, 80.
 Geranium, igg.
 Geuni, 161.
 Glaux, 79.
 Glecoma, 175.
 Gnaph.ilium, 93[^]
 Gypforhila, 137,
 Heilera, 78,
 Hcralcum, 96.
 Herniarja, 81.
 Hef peris, 197.
 HiemciuTn, aa8.
 HippophaH, 290,
 j^li^puris, 5.
 Holcus, 997.
 Holoiiium, 39[^]
 Pordcum, 38.
 lloitonia, 66-
 Humuhis, 391.
 Hydrocharis, 295.
 Hy^f!rocotyle, ^4.
 Jlyofeiamus, 76[^]
 Hyoleris,
 Hypericum, 21\$.
 Ilypochaeris, 294.
 Iaftone, 7a.
 Iberi.s 151.
 Impatiens, 74,
 Inula, 242.
 Xris, ir,-
 Juncus, 108.
 Junipcrus, 594[^]

- Lactuca, pag. 228.
 Laimum, 177.
 Lapfana, 232.
 Laserpitimp, 96.
 Lathrsa, 182.
 Lathyrus, 210.
 Ledum, 135.
 Lemna, s6i.
 Leontodon. 225.
 Leonurus* 175.
 Lepidum, 192.
 Ligullrum, 5.
 Liriofella, 187*
 Linum, 99.
 Luhoipernum, 64.
 Littorella, 286.
 Loliuin, 36.
 Lonicera, 72.
 Lotus, ii6.
 Lychnis, 145*
 Lycopus, io.
 Lycopfis, 65.
 Lyfimachia, 67.
 Lvthium, 149.
 Wala-xis, 255.
 Malva, 202.
 Marubium, i\$th
 Matridana, 240*
 Medicago, 217.
 Melampytum, 184.
 Melica, 45.
 Mentha, 176.
 Menyamhey, 66*
 Mevcurialjs, 29-2,
 MiUnm, 32.
 Monotropa, 134*
 Montis, 39.
 ^yagrurn, 190.
 Myofotis, 6a.
 Myolurus, icid.
 Myrica, 291.
 Myriophyllum, 280.
 Narcissus, 103.
 Nardus, 20.
 Nepeta, 180.
 Nymphaea, 165.
 Oenanthe, 87.
 Oenothera, pag\ iai,
 OnoutBf 208.
 Onoportlon, 235.
 Ophrys, 252.
 Orchis* 2^0.
 Origanum, 18a-
 Onuthogalum, 104.
 Orobus, 210,
 O-jitilis, 144-
 Panicum, 21.
 Papaver, 164*
 Paviutavia, 297.
 Paris, 128
 ParnalHa, 9S.
 Paltinnf a, 93.
 Pedicularis, 184.
 Peplis, 112.
 Phalnris, 20.
SPheUaadritikxii 88.
 Phlenm, 21.
 Pic vis, 22,5.
 Pimpinella, 89.
 Pinguicula, 9.
 Pinus» 284-
 Pifuui, 209.
 PUniago, 45/
 Poa, i6.
 Pollichia, 1791
 PolyLab, 207.
 PoWconunr, IQ5.
 Populus, 292.
 Poiamo^cton, 48.
 PoteiuiJla, 159.
 PreruTithtfs, 957.
 Primula, 6.5.
Prunella, 1-2.
 Prunus, 154.
 Pulmouaria, 64.
 Pyrola, 1^5.
 Pyius, 156*
 uercus, 282.
 Ranunculus, 169.
 jKaphanu-s, 195.
 Refeda, 179.
 Hhamnus, 77,
 Khinanthus, 183.
 Ribes# 78.

- Rofa, pag. 157.
 Rotböllia, 37.
 Rubia, 45-
 Rubus, 158-
 Rurm-x, 113.
 Ruppia, 51*
 Sagina, 5a.
 Sayittaiia, 180.
 Saljcoinia, a.
 Salix, 288.
 Satfola, 81.
 Sambm us, 97.
 Samolus 66.
 Sanicula, 85*
 Saponaria, 138*
 Satyrium. »ji*
 Saxifraga, 136.
 Scabioia, 43*
 Scandix, 86.
 Scheraidia, 43.
 Scheuchzeiia, 11,5-
 Schoenus, 16.
 Scirpus, 17.
 Scleranthus, 137.
 Scor2onera, 126.
 Scrophularia, 186.
 Scutellaria, 181.
 Serlum, 143*
 Selinum, 93*
 Sempervivum, 151.
 Sencchio, 243-
 ias, 253.
 Scrratula, 234.
 Silene, 140.
 Sinapis, 196.
 Sifymbrium, 19J.
 Slum, 90,
 Solanutn, 76.
 Solidago, 243.
 Sonchus, 231*
 Sorbus, 155.
 Sjparganium, 277.
 Spartium, pag. 108-
 Spergula, 147.
 Spiraea, 156.
 Stachys, 179.
 Statice, 98.
 St^llaria, 141.
 Stratiotes 293.
 Syrrt^hituin, 64.
 Tanacetum, J38<
 Taraxacum* 116,
 Thalictrumrii 167.
 Thelium, 79*
 Thlas'pl, 191.
 Thymus, 181.
 Tilia, 166.
 Tormrntillaj 160*
 Tra^opogon, 255*
 Tric-ntalls, 118.
 Trifolium, 214.
 Triglochin, 11
 Triticum, 37*
 Trollius, t68<<
 Tulipa, 104*
 Turritis* 194.
 TuTilago, i45.
 Typha, 177.
 Ulex, 2og>
 XJlinus, 84*
 tlrctica, 478*
 UtriculaHa, 9*
 Vaccinium, 1*3,
 Valeriana, 13.
 Verbafeum^ 74*
 Verbena, 175,
 Veronica, 6.
 Viburnum, 97.
 Vicia, sii.
 Viola» 73.
 Xamhium, A83.
 7armichellia, 261.
 Zoitera, %\$\$>

ENUMERATIO
PLANTARUM

IN PARTIBUS

SJELLANDIIS SEPTENTRIONALIS
ET ORIENTALIS

QUAM EDIDIT

CHRIST. FRIEDER. SCHUMACHER,

*Professor tertius in Academia Chirurgorum Regis
Hafniensis, Chirurgus primarius Hofcomitii Frideri-
tiani, Membrum Collegii sanitatis medico - chirur-
gici Reg. y Docens mineralogiam in Societate Hi-
fioria naturalis - Hafniensis, hujus ceteraque ac Regie*
Societatis medicæ Hafniensis, Linneanæ Londinensis,
phytographicæ Goettingensis Sodalitatis, Societatum medi-
cæ Londinensis ac mineralogicæ Jenensis mem-
brum Correspondens.*

PARS POSTERIOR.

HAFNIE 1803.
APUD FRIDERICUM BRUMMER.
XYPIS XKCW BREUM

PARS POSTERIOR.

ADDITAMENTA
PARTIS PRIORIS*



HEX^NDRIA,
MONOGYNIA.

348. *Fritillaria.*

Corolla hexapotaJa campanulata, nuda, fupraun-
gucs cavitate ne&arifera.

875. *F. Meleagris*, caule fubunifloro; foliis omni-
bus lineari - lanceolatis alternis Flor. Dan.
Tab. 972.

In pratis humidis; *i Charhttenlund i Engen paa
venftre Haancl af Broen bag ved Slottet.* Flor.
Apr. Maj & Jun.

var. *Jloribus albido - ochroleucis & purpureis tes-
fulis albuhs.*

**

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA,

349. *Teucnum.*

Calyx quinquefidus. Corolla labiuni fuperius nullum ultra bafin bipditiuni divaricatum. Filamentd cum ftylo inter divifuram adi'cendia, prominentia.

876. T. *Scordium*, villofo-hhiutum, foliis oblongis fesfilibus, dentato - ferratis; flor ib us gemi-
3iis axillaribus, pcdunculatis \ caule diffulo.
Flor. Dan. 593.

In pratis maritirnis; ved *Flqfkehroen*, ubi anno exalto a Celeb. Prof. Vahl deteOluni. Flor. Jul. & Aug, .

ANGIOSPERMIA.

Scrophularia.

877. \$• *vernalis*, foliis coidatis, caulinis plerumque ternatis, pedunculis axillaribus, folitariis₇ dichotomis. Flor* Dan. 411.

In locis fubhumidis, ad lepes; i *Fredctichsberg's Have*. Flor. Apr. & Maj.

550. *Orobanche.*

Calyx bifidus. Corolla ringens. Capfula uni-ocularis, bivalvis, polyfpeima; Glandula fub bail germinis.

878. O- *major*, caule erecto Emplicisfimo, fulca* to, pubefcente, fquamis lanceolatis fubdecurxentibus fp^rfis loco folioruin veftitoj ^{flylo}

exfeito. *MathioL commentar. in Diofcor. Vc
net. 1565 Zibr. 2 pag. 535-556.*

Rarifsimam hanc plant am in colliculis ultra pa
ludem turfofam circa *Bronshoy* invenimus. Flor.
lun. & Jul.

DIADELPHIA.

DECANDRIA.

Pifum.

879. *P. arvenfe*, pctiolis telraphyllis; ftipulis ere*
natis; pedunculis uniflons, *Joh. Eauk. hi/tor,
plant. 2. pug. 297.*

In agris & cultis, fed nobis in palude *Lyng
bye-Mofc* oblervatum. Flor. Jul. & Aug.

POLVADELPIIIA.

POLYANDRIA.

Hypericum.

880. *H. hirjutum*, floribus trigynis; calycibus fer-
rato - glandulofis 5 caule tereti, eredo, villofo;
foliis ovatis fubpubefcentibus. Flor. Dan. 802.

In umbrofis; *i Dyrhaven, fra Klampeiiborg
paa hbjre Haand imod Söen.* Flor. Jul. & Aug.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

Chryja nth emu 17,

881. *C. corymbofum*, foliis pinnatis, incifo-feiTa
tis; caule corymbofo multifloro. Jacq. Flor

*. AuRr. Vol. 4. Tab. 379.

A4 vias: ved Rudergaard. Flor. Jul. Jk AuRr

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

Oph?-ys.

882. *O. Jpirali* Sy bulbis aggregatis, oblongis; caul©
fubfoliofo; floribus Ipirali - fecundis; neditio
labio indivilo crenulalo. Flor. Dan. 387.

In pratis; a Dn. Wallich repextum & xnihi be-
nevole* coiununicatum.



CLASSIS XXIV.
C R Y P T O G A M I A .

A. MISCELLANEA.

a. r a d i e a t e e.

Pilhilaria. Calyx communis globofus, quadrifariam dehifcens, quadrilocularis; loculis in feme Piftillis fuperne Staminibus pluribus repletis. Semina globofa.

JJoetes. Floris mafculi Anthera intra bafin frondis. Floris faeminei Capfula bilocularis intra bafin frondis.

b. peltate.

Equifetum. Capfulae in fpicam difpofitae, peltatae, angulatae, bafi dehifcentes, quadri-ad feptenloculares. Semina numerofa fubrotunda, filamentis quatuor elafticis cin&a, Anthera fpathulata pulverulenta terminatis.

A. MISCELLANEA.

551. *Pillularia.*

Calyx communis globofus, quadrifariam dehi-
*lcens*_j, quadrilocularis; Inculis inferne Pistillis
 fuperne Staminibus pluribus repletis. Sernina
 globofa.

- 883 *P- gltibrilrfera*, caulibus denfis, caespitofis,
 filiformibus, flexuofis, teretibus 7 repentibus,
 geniculatis, ad genicula radicibus protruden-
 tibus fibrofis, fufcis, perpendicularibus; foliis
 ad quodvis geniculum nonnullis, junccis,
 erectis, filiformibus, lobulatis, bi- triunciati-
 bus; calycibus ad fingulum geniculum lesfi-
 libus magnitudine feminis Canabios vel paulo
 majoribus coriaccis villofis. Flor. Ban. 223.
 In pakidibus ac inundatis locis; *i Odsherrtd*
 Dr. Markuffen; *i Mojen ved Fiintappergaarden*
 • *pan Vejcn til Lyngby'e.*, Flor. iEftate.

552. *Ifoetes;*

Floris mafculi Anthera intra bafin frondis.
 Floris **fajminei** Capfula bilocularis intra balin
frondis.

384. *l. laeuftris*, radicibus pluribus longis, fini-
 plicibus fibrofis in aquae fundum perpendi-
 cularites defcendentibus-; foliis pluribus in
 fafciculum colletfis, tres ad fex uncias longis
 erectis, lobulatis, furculrntis, porofis, *iftmis*
intercepts transversalibus & longitudinOTbus

hinc convexis, inde planifculis, basi dilatatis membranaccis, pellucidis, adte fibi incumbentibus & quail bulbum referentibus. Flor. Dan. Tab. 191.

In aquofis fylvm dicStae *Matronalis. Mütter.* Flor. Friederichsdal.

355. *Equisetum.*

Capful® in fpicani digcftae peltatae, angulat^ bafi dehiicentes, quadri ad feptem-loculares. Semina numeroza fubrotunda, filamentis quatuor elafticis cindla, anthera fpatmlata pulverulenta terminatis.

885. & *fylvaticum*, fcapo fruAificanti fub nudo demum elongato in frondem fupra decompositam, raxnis laxis, vaginis aridis, paleaceis^ inordinate fifis. Flor. Dan. Tab. n8»«

In fylvis & pratis nemorosis haud frequens; £ *Krattet ved Fuglevad Mølle, Friederichsdal, Birkerød paa en Mark ved Heftkiob-Gaard,* e. a. 1. Flor. Apr. & Maj.

886. *E. arvenfcy* fcapo frutftificante nudo; fronfle fcreli fulcata, angulata, verticillato-ramofa; vaginis amphs, fubventricofis, incifodentatis, dentibus lanceolate-fubulatis. *Dodcn. Kruydt B. gg J?g. dextr. /cap. frutftificant. & Fuchs. Hi/tor, ftirp. pag. 32a & 325 frond. Jteril.*

la^pratis, arvis, hortis frequenti^imum. Flor. April. Mai,

8 *Cryptogamia. A. Mijcellarum.*

Var. internodiis pollicaribus, & bi-tripollicaribus

887. *E. palujire*, caule anguloso, ramofo, glabro; ramis simplicibus erectis patentibus, quadrifurcatis. Flor. Danic. Tab. 1183.

In pratis paludosis; *ved Fuglevad - Mølle* & a. 1. r. Maj. & Jun.

888. *E. limofum*, caule aequali subramoso, striato, ramis simplicibus quinquefurcatis. Flor. Dan. Tab. 1184.

E. fluviatile L.

β. *aphyllum* caule nudo. *E. limofum* L.

In paludibus, stagnantibus frequens.

ty. Jierele fronde tri-quadripedali apice & basi nudo, medio ramofo; ramis bipedibus, filiformibus laevibus patentibus, internodiis pollicaribus vel sesquipollicaribus.

In palude *ved Ermehinds - Huus*.

889. *K. hiemale*, caule nudo scabro simplicibus; vaginis truncatis.

Ad amnem; *imellem Friedericksdals-Møtte og Lyngbye - Sde.* Müller.

f 'B. FILICES.

a. *exannulatae*.a. *Capulis involucri dehiscentibus*.

Lycopodium. Capulae reniformes, polyspermae, elasticae, bivalves, in axillis vel foliorum vel spicae squamarum imbricarum dispositae? subsessiles & plerumque folitariae.

Osmunda. Capulae distichae vel congestae in racemum dispositae, sessiles, bivalves.

(c. *Capulis involucri pediculis*.

Ophioglossum. Capulae mediante membrana in spicam disticham coadunatae, sessiles > bivalves. Involucrum transversim dehiscenti capulis adglutinatum.

b. *annulatae*.a. *Capulis involucri dehiscentibus*.

Polypodium. Capulae in glomerulos disco frondis subsessiles coadunatae.

(c. *Capulis involucri pediculis*.

Pteris. Capulae in linea marginali continuae. Involucrum e margine ipsius frondis inflexo continuum, introrsum dehiscentis.

**Lechnum*. Capulae in nervis longitudinalibus continuis, costae adjacentibus. Involucrum imperforatum continuum^ costam repleto de-

Scolopendrium. Capulae in lineolis imparibus,* geminis, intervenes. Involucra superficialia, sibi invicem longitudinaliter incumbentia, lura longitudinaliter dehiscencia.

Aplenium. Capulae in lineolis parvis. Thlorum e vena lateraliter ortum ducens, costam verius dehiscentem, margine integer rimatum*

Athyrium, Capulae in punctis ovatis. Involucrum e venula lateraliter ortum ducens, squamae in formam laxius incumbens, margine laciniato-fimbriatum, demum introflexum elevatum femilimare.

Polystichum. Capulae in punctis subrotundis parvis. Involucrum umbilicatum, undique fere liberum, ad punctum centrale vel laterale fixum demum contractum.

Cyathea. Capulae in punctis subrotundis parvis. Involucrum hemisphaericum, vel ovatum calyciforme, vel latere apice, dehiscens absque operculo.

B. FILICES.

354. *Lycopodium.*

Capulae reniformes, polypermae, elasticae, bivalves, in axillis vel foliorum vel fpicre fquamaram imbricatarum disposit®, fubfessiles & plerumque folitariae.

• *floribus fpicatis.*

890. *L. clavatum*, foliis fparfis filamentofis, fpicis tcretibus pedunculatis geminis. Flor. Dan. Tab. 1^6.

In ericetis, fylvis frequens. Flor. Jun. Jul. Aug.
Caulcs peddles bi-tripedales & longiores, dichotorniy cum ramis & ramulis hnge lateque repentes & radicales, teretes, duri, foliis den • Jis aiitrorjum curvatis, tediti. Spiccc rarim terncc.

891. *L. annotinum.*, foliis fparfis quinquafariis Tub* ferjatis; furculis annolinis articulatis; fpitis terminalibas glabris eretlis. Flow Dan. Tab. 127.

In fylvis umbrosis **haud frequans**; *Gadfkoy^ Bagfv&rd Skov.*

Caules bi-tripedales, ramoji, repentes, radicales, cum ramis fimplicibus vel dichotomis eredlis, foliis lanceolatis acuminatis patents ~~bus~~ vel fubfquarrofis verticillatim, vestiti.

•• *fbribusjparsis.*

8g2. *L. SelagQ)* foliis fparfis, oftofaxiis; caule
chotomo, ere&o; floribus axillaribus. Flo
Dan. Tab. 104,

In fylva, inter *Bagjvard & KolU-Kolle*, tanti
vidi. \Flor. Sept. 0<5tohr.

Cuules palmares vel femipedales,, ramisque d
chotomis, foliis lanceolatis mucronatis de'u
te&i.

555. *Osmunda*.

Capfulse diftincilce vel congefse in racemum d
fpofitee , fess lies bivalves.

893< ^ *Lunaria*, fcapo folitario; ramo latera
fronde folitario cam iinpari pinnato, pin
lunato reniformibus fubintegerrimis. Flo
Dan. Tab. 18.

In pafcuis & locis ejatioribus fubficcis rariu
paa *Bakkerne ved Fuglcvad- Molle, Brede Bab*
her, i Skoven ved Rudergaard. Flor. Jun.

894. *O. regaUs*, frondibus b'ipinnatis, pinnis
pexioribus racemoflo-floriferis, inferioribus pi
nulis oblongis. (*caule hipedali*) Flor. Dan
Tab. 217.

Minus frequens in umbrofis &c paiudibus tun
fosis; *i Skoven ved Rudernard, i Tdrvemo*
ved Heftkidb-Guard ved Birkerød imod Pi
tagen. Flor. Jun. Jul.

556. *Ophioglofum*.

Capulae mediantae membrana in fpicara difti
chain coadunatae, fessiles, bivalves. Invelucru
transverfim dehifcens capulis adglutinatum.

*

95. *O. vulgatum*, fcapo folitario digitali — pedali & ultra, fpica difticha gracili unciali vel fequiunciali, terminante; fronde ovali-oblongo-obtufiusculo, integerrimo in medio vel paulo intra medium fcapi. Flor. Dan. Tab. 147.

Haud frequens in pratis graminosis < ved gamhid Far tow; og imod hvor Krattet **begy rider** paa Bakkerne imellern Tor bah og Papiirs - Mollen. Flor. **Jul.** & Aug.

357. *Polypodium*.

Capulae in glomerulos difco frondis fubje&os coacervatae.

96. *P. vulgare*> frondibus pinnatifidis; pinnulis oblongis fubferratis obtufis; radice tuberculofa, fquamis fufcis te<fta. Flor. Dan. Tab. 3060.

In ¹ **fepibus** lapideis, ad truncis arborum haud frequen \$', ved Fuglevad Mb'lle, Dronninggaard, i Hhjchhohns Skov. ' Flor, Jun. Jul.

35g. *Pteris*.

Capula in linea marginali continna. Involu-
Cl^uUm e margine ipfius frondis inflexo conti-
nuum introrfum dehifcens.

97. *P. aquilina*, frondibus fupradecompolatis; pin-
His pinnatifidis, tri-quatuor pollicaribus, **la-**
cinids lanceolatis obtufiufculis. Bulliard. herb.
Tab, 207,

In eLioetis, fylvis frequentiffima. Flor. Jul.

359- *Blechnum*.

Capfulis in lincis longitudinalibus, continuis
costis adjacentibus. Involucrum superficiali
continuum costam versus dehiscens.

\$93- *Spicant*, frondibus simplicibus erectis,
ribus pinatifidis; fructibus pinnatis; pin-
nulis oblongo lanceolatis interstitiis; fructi-
feris angustioribus. Flor. Dan. Tab. 99-
Csmunda Spicant Lin.

Rarius occurrit in ericetis **fylvaticifi**; *Rud-
gaard, Birkerddj Ifriederichsdal*. Flor. Jun.
Aug. Var. fronde bin'da*

360. *Scolopendrium*.

Capfulse in lineolis sparsis, geminis, inter-
stitiis. Involucra superficialia **fibi** invicem
longitudinaliter incumbentia, lutura longitudine
dehiscencia.

399. *S. Phyllitis*) frondibus simplicibus,
lingulatis, integerrimis; stipulis
Bolt, n'lic. Tab. 11.

Apl&uum Scolopendrium Lin.

In fylvalivis *red Dromiinggaard*, ubi a *Kf*
glo olim observatum. Flor. Jul. & Aug.

900. *S. Jseptentrionale*, frondibus bifurcatis,
natis, linearibus. Flor. Dan. Tab. 60.

Acrostichum Jseptentrionale Lin.

In fepimentis lapideis **rarius**; *imellem Sorgenfj*
eg Fuglcvad'M'oile. Flor. **j&ftate**.

361. *Afplenium*.

Capfulis in lineolis **fpatsis**. Involucrum e vena lateraliter ortum ducens₇ costam versus dehiscens, margine integerrimum.

90j. A. *Trichomanes*, frondibus pinnatis, **pinnulis** subrotundis crenulatis; stipite filiformi nigricanti, splendissimo, fragili. Fior. Dan. Tab. 119.

In sepimentis lapideis minus frequensj *ved Fuglcvad - Mblle - Vej* *ved Birkeröd*. Flor. Maj & Jun.

56*2. *Athyrium*.

Capfulis in punctis ovatis. Involucrum e venula lateraliter ortum ducens squamam in for-
tiam laxius incumbens, margine laciniato-fimbriatum,, demum introfuit elevatum, **femilum**.
Hare.

91. A. *molle*, frondibus subbipinnatis, primis horizontalibus_f lanceolatis acuminatis. inferioribus brevioribus magis ovatis & subdeilexis remotis, pinnulis oblongis obtusiusculis apice crenulatis 5 stipite laevi.

In sepimentis haud **frequent**; *Hestkib'b-Caard ved Birkeröd*. Flor. Jun. Jul. Aug.

93- A. *trifidum*, frondibus bipinnatis antecedentioribus; pinnis lanceolatis acuminate? obliquis, inferioribus brevioribus fuddetlexis; pinnulis oblongis obtusis incifo-fenatis, apice conniventi-tridentatii, feiridecurrentibus; stipite subpaleaceo.

Cum antecedent! minus frequens ieperi. Flo?
Jun. — Aug.

904. *A. ovatum*, frondibus bipinnatis, pinnis elongato-lanceolatis, acuminatis, apice frontii versus fenfini fenfimque deerefcntibus; foliis obliquis; pinnulis ovato-oblongis obtufatis incifcylaciniatis; laciniis bi-tri dentatis, apice fubtrifidis denticulis acutis conniventibus; fipite paleaceo. Miiller. Flor. Friederichsdal pag. 193. 841. Fig. II.

In fepiinentij lapideis rarius; *Birkerod*^ *Friederichsdal, Friederichsborg.* Flov. Jun. - Sept.

905. *A. Filix femina*, frondibus bipinnatis elongatis **bi-tripeaalibus**; pinnis lanceolatis acuminatis omnibus alternis, inferioribus minoribus; pinnulis lineari lanceolatis incilb-ratis, acutis, laciniis apice Tub bidentatis ftipite paleaceo. Pluken. phytophylac. Tab. 100 f. 4.

Fere ubique in fepibus, nemoiibusque. Flo
Æstate.

- 90G. *A. laocum*, froiide bipinnato; pinnulis lanceolatis inciso-Terratis subauriculatis, pinnis flipiteque flexuofis laxis; frudliXicationibus fy**
fis.

In humidis paludofis nemorum; ved *Rudersgaard.* Flor. Jul. Axrg. Sept.

Fronde pedales fesquipedales oblonge utrinque attenuates <ebil es gregatim crescentes, j l. a: • • Si' s, b\ i \ atee. pinnis • cmotis -*

*gatts,*atuimnatis, , laxis, inferioribus opposi-
tis superioribus alter nis, subhorizontalibus,
inimis minimis da/lexis, mediis pruefertim fer-
tilibus, Jummis infimisque fterilibus. Pinnu-
lis lanceolatis, incifo-ferratis, acutiufculis:
lacinia iujimia antic a magis product a hi Juh*
tridentata, postica membranula temmijima de-
cwrente, rqliquis brcvioribus Juhbidentatis vel
integcrrimis, interioribus oppojltis^ exteriorU
bus alternis, ajric\$m verjus confluentibus*
Stipes tennis liinc corivcxus\ inde fulcatus^
intra frondem Jflexuofus tri~quadrangulaXus,
hafin ferrugineus paleis lanceolatis pallidio-
ribui tedtus. firu&ificationum`pun ft a, minu-
ta, obi nga, sub unguis lapiniarum folitaria.
Involucro tenuijjimo cum capfulis cinereo.*

907. 4. *depauperatum*, fronde subbipinnato, ovali-
oblongo cum pinnis pinnatifidis lanceolatis
horizontalibus, rigido; pinnulis ovato-oblon-
gis; ferratis, obtufis; fructificationibus paucis
fparCs; ftipite erecto rigido. 1

In fepibus; vcd Birkerud. Flor. ^Eftate*

*Fronde peddles, ovali-oblonga, utrinque a!
tenuatici rigidce, falurate virides, subbipih
natai: pinnis lanceolatis horizontalibus; infi-
mis dcflcx'is oppofitis remotis, rdiquis alternis,
approximatis vel contjguis; pinnulis oblongo-
ovatis, rotizidatis, ferratis, laciniis inferio-*

18 *sCryptogamia. B* Filides.*

*ribus anticis longioribus; posticis (Aeourr-entU
bus ac pinnula proximo, confluentibus. Stipes
' pallidus, hinc convexus, inde Julcatus, intra
frondem angulatus, paleis Jiliformibus ferru-
gineis fie in nervis pinnarum, raris adfperjis
vestitus. Pundta fru&ijicationum minuta, ra-
ra, Jub quovis angulo laciniarum pinnularum
produdta.*

365. *Polystichum.*

Capfulse in pundlis fubrotundis fparfis. Invo-
lucrum uxnbilicatum, undique fore liherum, ad
pundtum centrale vel laterale fixum demum
contradtum.

* *Fronde Jubbipinnata.*

go8. *P- Phegopteris*, frondibus fubbipinhatis tri-
angularibus, pubefcentibus; pinnis oblongo-
lanceolatis furfum decrefcentibus, infimis re-
motis deflexis, reliquis horitontalibus in fti*
pitem decurrentibus & fibi fere contiguis, pro-
funde incilis; laciniis oblongis integerrimi*
obtusis, glomerulis capfulavum dimidiam
ma^ginis partem octipantibus; ftipite ,filifot-
mi, glabro, nitido cum rfichi fubpaleaceo.
Flor. Dan. Tab. 1241.

In fepibus, fylvis; *Birkeröil, Bagjvar* et. a. L
Flor. Jun. Jul. Aug.

Var. 1. Pinnis infimis horizontalibu?.

2. Glomerulis frudlificationum *otan*
maranem oCcnpantibus.

Jog. *P. Thklypteris*, frondibus fubbipinnatis, pedibus, iesquipedalibus, ovato-oblongis; pinnis elon[^]atis, profunde incisiss, fubacuminatis, Xuboppositis, inferioribus horizontalibus remotis, fubsterilibus, fuperioribus obliquis approxi^{*}jnatis fertilibus; laciniis fubovatis, acutis bafin confluentibus; frondorum fertilium vero lanceolatis acutis bafin fere distindlis, marginibus glomerulis uluqne & maturitatis tempore densissime obdudlis, revolutis; ftipite fubpaleaceo, filiformi. Flor. Dan. Tab. 760.

In paludofis, lacubus; ved *Lynghye-Sde[^] Bag-Jvmr* et. a. 1. Flor. Jul. Aug. Sept.

9IO. *P. Oreopteris*, frondibus fubbipinnatis fefquipedalibus bipedalibus & ultra, ovato-oblongis \ pinnis fubaltemis, fupra medium frondic horizontalibus, furfum decelcentibus, approximatis, infra medium remotioribus deflectentibus, infimis paribus verfus radicem fenfim decelcentibus, rernotiffimis, triangularibus fertilibus, omnibus inrifis; laciniis oblongis rotunddtis, integerrimis, fupra medium fructifeciis, apice ftorilibus; ftipite palcis fufcis cirrhosis hinc inde adfpert'o. Flor. Dan. Tab 1121.

Haud frequens in fylvaticis humidis; ved *Birkeröd, Bagfycer*. Flor. Jun. Jul. Aug.

9i 1. -*P. Filix mas*, frondibus fubbipinnatis pedibus bi - fubtripedalibus oblongis; pinnis elongatis inciffis fuperioribus alternis fertilibus >

- furfum obliquatis, inferioribus 'oppolitis re-
motipritms, infimis fterilibus, paientibiis; la-
 • ciniis oblongis alternis apice rotundatis, cre-
 natis, frudtificationum glomerulis orbiculari-
 bus magnis involucro reniformni te(5tis/, infra
apicem obdutStis; **ftipite** paleis **fufcjs** vestito.
 Bull. **herb.** Tab. 183.

In fylvis , fepibus **fere** ubiquo. Flor, Jun.— Odt.
 Q12. P.- *cristatum*, frondibus fubbipinnatis pedali-
]us oblongis; pinnis cordato-oblon^is omni-
bufl alternis obtufiufculis pinnatil'idis; inf. **ri-**
Ojribus fterilibufl brr^ioribns; fupericaipiis lon-
 gioribus auguftioribus fertilibus; pinnalis ob-
 longo-ovatis, incifo-ferratjs: ferratuvis (xi-
 gas acutis convergentibus, apicQ rotnnclatis,
bafi cum ncrvo confluentibus; fiipite hinc
 inde paleis **adfperJos** bafi paleis ovatis pellu-
 cidis circumdudto; friidlificationum puntflis
 duplices ferie intra margiinem & lacinias cos-
 tm difpofitis, **remt)tirifculis** rnajufculis ro-
 tundis depreffis, involncro membranaceo de-
num infundibuliformi teftis. Afzelius in
Kongl. Vetent. Akadem. nya Handingar
 Tom. VIII pag. 8^6 Tab. 9.

la ericetis fylvaticis, ad fepes, humidis locis
 ved **BirkerSd**, Flor. ^ftate.

* * *Fronde bijAnnata.*

9 JJ, P. *Mulleri*, frondi)us **bipinnatis**, pinnisque
 alternis remotis, oblongo-triangularibus; pi-
 nulis oyato - oblongis arntiufculis **profunde**

incis ferrato aculeatis, bafin ttiembranula
tenue conflucnt'ibus; ftipite ri^ido pakis fer-
rugineis brevibus veftito. Mi'ller. Flor. Fri-
devichsddlina pag. 193. 841. Fig. 2. Flor.
Dan. Tab., 707.

In fylvis, humidiufculis locis; ved Bag/far,
Birkerod. Flor. Mutate.

*Frondes Jpithamcce peddles Jesquipedales hi-
pinnatce: pinnis truuigularibus fubacuminatis,
obllquis, inferioribus tribus, quatuor remotis
Juboppoftilis, fuhfterilibus, rcliquis fupriorl-
bus magis approximatis attends, Jertillbus;
pinnulis cordato - ohlongatis, acutiufculis, in-
rifts., inferioribus majoribus, fuperioribus mi-
naribus, membramta tenuc decuirrcnie con-
fluentibus; laciniis rotundatis tri-bluni-dcn-
'tis; dentibus acutis Jpinulafu conniventibus,
Frudttijicationum pun&a orbicularia, magna,
duplice ferie difpojita. Involucrum maturatio-
nis capfularum temppe plane oblitteratum.
Stipes ad bafin trasjior & Jenjim dccrefcens >
Julcatus, intra frondem fubfulcatus, paleis
Jerrugineis veftitus.*

*Var. a. Fronrlibns auguftioribus; pinnis fuperio-
ribus fertilibus injimis tribus ftei Hi bus.*

*Var. B. Frondibus anguftioribus; pinnulis fere
omnibus glomerulis fufco - nigricantibus denfe
obdufiis.*

Var. 9.. Pinnis fuperioribus pinnatifidis; glome.
rulisfrudiificationumfubfolitariiS) fufcis, fub*

*angulis ladniarum; ftipite filifornd bajin pa-
leateo.*

- 514, *P. angustatum*, frondibus elongatis; pinnis angulVis, inequalibus, obliquis, inferior!fm« fvfboffotis fuperioribus alternis; pinnulis cordate-uvatis obtufiui'culis, lubauriculatis; involucro reniformi.

Ad fepes i vcd Birkeröd. Flor. ^Eftate. .

Fronde bipedales & ultra trcs vel quatuo polliccs UiteCy bipinnatce: pinnis nonnullis in mediant & infimam partem frondis fubquadripollicaribus, pleriscjue vero hi - jubtripollicaribus lo/igis, fupra medium Jurfum decrescⁿtibus, fub erecliufculis. Pinnulas cordat^oovatecc, rotiindaL(V) Jimpliciter crenato-dentatw, pinnarum inferiorum vero incifce; laciniis bi - JubtridenUitis, bajilaribus productioribus & quafi auriculatis, & pinnarum fuperionirn confluentibus; dentibus fubacutis, Juhconniventibus. FrutHificationum, glomert^ola' mugnce fitfctB) involucro dilutiori reniformi perfijtente tedlm. Stipes ajigulofus flexuofirigidus, nervlsque pinnarum paleis ferrugis nets cirrhofis fparfim vestitus.*

• * * *Fronde fubtripinnata.*

915. *P. conifolium*, frondibus cordato-trian^uribus; paribus infimis pinnarum fub tripinnatis, reliquis bipinnatis fuboppolitis pat^et*bus; ftipite paleaceo: paleis balilarik

longis lanceolato - subulatis. Pluc, Phyt. Tab. '181 fig. 2 plantain nostram quoad formam baud male innotrat.

In fepibus lapideis circa Birkerdd. Flor. Jul Aug.

Fronde femispithamce — peddles, subtripinna tee.: pinnis infimis horizontalibus subtripinnatis^pinnulis inferioribus maximis, superioribus hiioribus; reliquis pinnatis subobliquis p suboppositis Jurjwn decrefcentibus. Pinnule oblongo profunde incluse vel subpinnatice, alternee, subapproximate) laciniisque ovatis erenatis obtuse, crenulis apice spinulosis, Fructificationum gemerulce rotundas sub angulis laciniarum pinnularum simplici vel duplici serie, ferrugineae. Involucrum concolor naturationis tempore oblitteratum. Stipes ad basin crassus brunneus, paleis ferrugineis lanceolato-subulatis imbricatis femiuncice circiter longitudinis densissime circumductus^ Jenfon femique fursum decrejens & dilutior, parte nudo paleis ferrugineis ovato-lanceolatis vestitus, parte frondoso paleis destitutus.*

916. *P. spinosum*, frondibus bipinnatis; pinnis suboppositis; pinnulis cordato elongatis profunde incis, hinc pinnatifidis laciniis oblongo-ovatis ferrato-crenatis, crenulis spinulosis; stipite basin paleaceo. Miiller. Flor, Fridrichsd. pag. 195. 845. Tab. fig. 4.

In lepibus circa Birkeröd. Flor. Æstate.

Fronde a fuhhipc'loh ovato-oblonga Jubtripinnata; pinnis elongatis, mediis palmailms & ult)a, inferioribus oblunatis, Superioribus magis patentibus, Juhoppofitis, reniotu>, pinnatis: pinnatcc coi'dato-elongatcc, pinnatifidce, interiores majorcs^ exteriorcs Jenfim minorcs & denique conjuentes: laciniis oblongo-ovatis acutiusculis, [errato-crenulatis, crenulis fip-*

nuiosis. Frondifolium puncta rotunda, crassa, fujca, sub fingulU lacinarum pinnularum duplice Jerie disposita^ rarius in infimis laciniis bi vel tripartita. Involucrum fiiU reniforme ferrugineum, membranaceum, Juperfistens. Stipes ad hanc crassus bracteatus paleis fenugineis, lanceolatis apice cinchis, uncice & ultra longitudinis, densissime testis, Juxta Jenfim decrepescens, Jupra hanc paleis Jubca pillaHbw* Idcirco inde vtilis.*

Var. a, Frondibus plane bipinnatis, pinnulis minoribus, aacioribus, glomerulis Jrudtificationum densiusculis.

* * * • *Fronde tripinnata**

- 517. *P. dilatata*, frondibus ovato-oblongis tripinnatis, infimis-erectiusculis reliquis oblique patentibus fuhoppofitis; pinnulis ovate ohloiv " nl lufiusculis crenato-ftruktis, fer-

raturis acutiufculis; ftipit^xpaieaceo, ad pin*
narum exortum parund dilatato.

Habit, cum ju' & cedenlibus. Flor. Jun. Jul. Aug.

*Fronde pedales fcsqnipedales, ovato - oHonga
tripinnatcc: pinnis antecedenti JimiMns; pin-
nulce vero minores & glomerulce in earum
dorfo parihus tribns vel quaternor difpofitce'
Stipes ad hafin paleaceus, infra frondem J. '
nrtus, intra frondem ad exortum pinnamm
ddatus, nervisque paLeis linearibns aculis vcs*
Hias.*

*Var. Fronde inferne tripinnata fuperne hiphmata
elongato - cot data; pinnulis vel latiniis pinnu-
Iccformibus paulo majoiibus remotioribus.*

***** *Fronde fupradecompofita.*

9i3. *P. Dryopteris*, frondibus trifidis, foliolis bi-
pimiatis, pinnis cordato - elongatis pinnulis
ovato-oblongis, fubcxenuddis, rotundatis. Bolt,
filic. 28.

In fylvis, dujnetie frequens. Flor. Jul. Aug.

364. *Cyathea.*

Capfulis in punrtis fubrotundis fparfis. Invo-
lucrum hemifphaericum vel ovatum, calycifor-
me vel latere apico dchifcens absque oper-
culo.

919. *C. fragilis*, frondibus bipinuatis ovato-oblongis; pinnis infimis remotissimis obliquis, reliquis patentibus; pinnuli cordato ovatis obtusis, crenulatis; stipite filiformi, basi perleaceo.

Inter lapides ₇ ad **fepes**. Flor. Jun. Jul. Aug.

Var. 1. Frondibus digitalibus pedibus.

2. Frondibus pinnisque angustioribus.

5. Pinnulis ovato-lanceolatis profundis incisifere pinnatifidis, laciniisque acutis.

C. MUSCI.

J. Sporangio -ajomo.

Phascum. Sporangium ovatum, subglobuliferum, nunquam apice dehiscens, plerumque inaperta decidens. Flos masculinus albus, ferrugineus terminalis.

II Sporangio Jionate injirudle.

A. *aperitomyi* (peritomyo nullo.)

Sphagnum, Sporangium sessile in apophysi orbiculati. Flos masculinus in ramis superiorum extremitate, claviformis: ferrugineus axillaris terminalisve.

Gymnostomum. Sporangium ovatum vel obovatum, pedunculatum. Flos masculinus immixtusque terminalis.

dnictangium Sporangium ovatum, subglobuliferum. Flos masculinus axillaris gemmiferus: immixtusque terminalis.

B. *ochryomyi* (peritomyo infra & o.)a. *peritomyo simplicis.*

- *dentibus integris.*

^ttrypsis. Sporangium oblongum, cretatum; dentibus quatuor pyramidalibus. * Flos masculinus terminatus capituliformis aggregatus fossilis & cyathiformis pedunculatus; ferrugineus terminalis.

Splacinnm. Sporangium cylindracum erectum
Kpophyi conoideae intus cavse infidens; dm
 tibus **V&o gemmatjs.** Flores Eermaphroditi
diniorphi: difciformium genitalia feminea in
foecun&a, elongatorum fert.ilia.

Enc alypta. **Spor**angium cylindraceum ereC;
 turn; dvntibus feducim anguflis, Cal|ptrai
znagaa, campr.nulata. **Flos** mafculus gem
 m aciusliar x is in eodem **Lndividuo;** femi
 neus **terminalis,**

Cy nontodtn m. Sporangium cylindraceo - ova
turn, erectu **im;** vel'nyriforme **cernuurn;** den
 tibus o&o v,l fe decim^s paria, Flos herma
 phvodus **ttrminalis.**

Di dy mo don. Sporangium ovatum vel obloti
 gum **etedtuni;** dentilms linearibus [ede-
 paria. Flos mafculus fe mine usque alaris.

Tortula. Sporangium oblon^o - cylindraceutS
 dentibus **capillaceis fedecim,** pluribusque,
 raliter cun; ortis bafi forma cylindri ful
 haerentibus. Flos mafculus ffemmiformis 1?
 ris; fejnirus terminalis.

Barhnl, Sporangium **oblongum;** dentibus ^{c8}
pillaceis'fedejiim vol tri^iuta duobus, spira-
 liter convoiutis bnf^ diftintfis. Flos mafcu-
 lus rapituliformis in diverfo inrlividuo, femi-
 neu^cjue terminalis.

P o ly trie h inn. Sporangium ovatum, vel te
 gonum, **dentibus** ultra truffinta brevi
 cpipli rag mate **adglutinatis.** Calyptra in g*

risque deorfum villofa. Flos masculus femineusque terminalis.

Wrimihia. Sporangium ovatum dentibus fedecim latiusculis reflexilibus. Flos masculus axillaris gemmaceus, vel capituliformis femineusque terminalis.

Weisfia, Sporangium ovatum vel ovato-oblongum; dentibus IV in cuspidatis. Flos masculus capituliformis in diversis individuis femineusque terminalis.

* • *dentibus Jjls,*

Trichostomum. Sporangium oblongum erectum; dentibus fedecim bipartitis; laciniis fetaceis longis. Flos masculus alaris, femineus terminalis.

Fisfidens. Sporangium ovato-oblongum, dentibus fedecim latiusculis circiter ad nardium usque fubae (in; liter bifidis. Flos masculus gemmaceus axillaris in eadem planta: femineus lateralis terminalis.

Dicranum. Sporangium ovato-oblongum, dentibus fedecim, brevioribus, inflexis ultra medium subinaequaliter bifidis, Flos masculus capituliformis vel gemmiformis terminalis in ditinuo individuo.

1). -peritonvo ditpltti,

¥ fitrculis funplcihus.

Burhamia. Sporangium -Qvatum. obliquum

peristomii externi dentibus fedecim tmnca*
tis: interni membrana plicata. Flos mafcu-
lus difcoi-deus: femineus terminalis.

Bar t r a m i a. Sporangium sphsericum, ftriatum,
peristomii externi dentibus fedecim cunei-
• ^ormibus: interni membrana plicato-carinata
apice lacinulata, Flores mafculi femineie
approximate.

Me efig. Sporangium obovato - oblongum > obli-
quo turbinatum, peristomii externi duitibuM
Tedecim obtnfis **brevibus**: interni ciliis toti
dem acutis diftinciis vel opere 'reticulato con-
nexis, **Flores** mafculi femineis approxiinat*
vel difcoidei in diverfa planta.

Fttndria, **Sporangium** obconicum, oblique fuM
turbinatum; peristomii externi dentibus fedH
cim acutis obliquis, apice cohaerentibus: i^i
terni ciliis totidem membranaccis planis. Fl^{o*} b
mafculus difcoideus in diverfa planta: fem⁴
neus terminalis.

Pohlia. Sporangium ovato * oblongum, apotyp¹
obconica? anguftiori infidens; peristomii ^{e*}
terni d< ntibus fedecim aciuninatis: intei'^
membranaceum fedecim partitu'm luciniis ^{^n}
formibus. Flos mafculus capituliformis fe
mineusque in eodem individuo terminal^.

J'Vebera. Sporangium oblongum vel pyriforme
peristomii externi dentibus fedecim latiuscu-
Us acutis; **interni** membrana tenerrim³ in
Jfcdecim proceffus triangulares? ciliis inter

positis, producta. Flos masculus femineusque terminalis in eadem planta.

Bryum. Sporangium ovato-oblongum \ peristomii externi dentibus fedecim latiusculis acutis reflexilibus: interni ciliis totidem pluribusve latiusculis capillaribusve alternis e membrana plicato-carinata productis. Flos masculus capituliiformis femineusque in diverso individuo terminalis.

Didymum. Sporangium ovato-oblongum; peristomii externi dentibus fedecim latiusculis acutis: interni processibus **difformibus** fedecium pluribusve e membrana plicato-carinata productis. Flos masculus difocidus in eadem vel diversa planta terminalis; femineus terminalis.

* * *furculis ramojis*.

Pleurozium. Sporangium ovato-oblongum; peristomii externi dentibus fedecim **latiusculis** brevibus iureflexilibus et interni ciliis totidem. (*Pectis. internum* *Stepius nullum*). Flos masculus geminaceus in eodem individuo vel capituliiformis terminalis in distincto: femineus terminalis (*Calyptia Jurjum pilosum*).

Didymum. Sporangium fetae brevi perichetio obvolutae infidens; peristomii externi dentibus fedecim latiusculis fubulatis: interni membrana reticulata. Flos masculus geminaceus axillaris: feminea axillarii terminalisve.

Neckera, Sporangium **oblongum**; peristomi
 externi dentibus **fedecim** acutis: interni cili

*

totidem distinctis cum dentibus **alternantibus**
 Flos **mafculus** gemmiformis alaris in distinctis
 vel eadem planta: femineus alaris.

Leskea. Sporangium oblongum; peristomii e:
terni dentibus? fedecim acutis: interni cili
 totidem basi membranula connuxis. Flos
 masculus feminusque alaris gemmiformis
 eodem vel distinctis individuo.

Hypnum. Sporangium oblongum; peristomii ex
 terni dentibus fedecim acutis reflexilibus: in
 terni membranula aequali laciniata: laciniis
 latiusculis cum **interjectis** capillaribus. Flos
 masculus **gemmaceus** feruineusque axillaris
 in profundo **individuo**.

C. MUSCI.

565. *Phascum*.

Sporangium ovatum, subsessile, nunquam apice dehiscentibus, plerumque inapertis decidens. Flo* maiculus alaris, feminis terminalis.

* *acaule*.

920. *P. muticum*, foliis ovatis, muticis, concavis^ furfuribus imbricatis, connatis. Schreb. de Phasco p. 8 Tab. I. fig. 11. 12.

In agris humidis, ad fossas gregatim crevit Flor. Autum. & Vere. Mens. Jan. & Febr. tamen floribus quam sporangiis fere maturis legL

*• *caulescentia*.

921. *P. nitidum*, trunco erecto simplici brevi foliis subultratis carinatis, perichsetibus longe acuminatis, omnibus exaristatis. Hedw. Stirp. cryptog. I. pag. 91. Tab. 3+.

In argillolis & paludibus humidis.

Febr. & Mart, floribus, Jul. cum sporangiis maturis sphaeroidibus lutescentibus subnutantibus* inveni.

922. *P. subulatum*, trunco erecto simplicissimo; foliis lanceolato - linearibus patulis: furfuribus e latiuscula basi subultratis rigidis. Hedw. Stirp. crypt. I. pag. 93. Tab. 35.

In agris agris, hortis vulgaribus.

Flor. Vere & Autumno Mart. & Oclb. fporangiis maturis loiritux.

925. *P. cafpidatum*, trunco ereclo fubdivifo; foliif ovatis, **fubcarinatis***, cufpid.itis, patulisj perichietialibus Innsioribus conniventibus. Schreb. de Ihnsc. Tab/1. fig. 1. 2,

In hortis **agris** &c.

Initio *Miuit.* fuorangiis fubmaturis legi.

566- *Sphagnum*,

Sporangium **fessile in** apophyfi orbiculari. Flo* **mafculus in ramorum faperiorum extremitatfii clav^eformisi** fumineus axiliaris terminalisve.

924. *S. cymbifolium*, trunco erf?Ao, ramosisfimO) debili, Uodranti & ultra longitudinis; **T8rt** mis falciculatis, inferioribus dcflexis; folii' ovatis olnufis concavis imbricatis; fporangii* fpli.i iiois. Flor. Dan. Tab. 474. Dill. hift mufc. Tab. 32. fig. 1. *Sph. palujire* L,

In paludibus turfosis ubique.

Flor. Jun. ad **Septembr.**

925. *S. capillifvlium*, trunco ereclo ramosisfim⁰ debili, **longitudine** praecedentis; ramis fa^{cl} culatis filformibus deflexis; foliis lanceolate^s acutis concaviulculis, apicibus diftntibus ^{sub-} recurvis; fporaugi ^{is} dongo - rotundis, le^{cur} **dum** cauliculorum. longitudinem ^{orientibus.}

mien. hilt, nrnfa Tab. 53. fig. * A. Sph

In paludibus turfufis'

Æftate floret.

567- *Gymnostomum.*

Sporangia; Jm pyriforme, ovatoa wl obovatura pedunculatum. Flos mafculus femiueque terminalis.

* *Sporangiis pyriformibus.*

026. *G. pyrifunnc*, trunco ewaSto fimplici, foliis pl.nis ovatis acutis; operculo convexo, conico, obtafo, fuboUi quo. Fiol, Dan— Tak

537.

f'2- i. *Bryum pyriforme L.*

Ad latera fosfarum, aggwe., in hortis & alibi vulgatisGmum.

Flo^r - Mart. Apr. May; cum fporangiis maturii æftate & autumnno legitur.

927. *G. fascic* } J> trLmco er eaiufculo fimplici; foliis oblon^is lanceolatis fafciculatis clemiculatis, apiculatis; operculo exiguo convexiu. , fculo,

P S,

38. Tab. IV. ff, 5 _ g.

In Præte humidis, agris ad fosfas.

ie» /tjtate iporangia xnaturant.

* • *SporangUs ovntis vel obovatis.*

928 • • *tuncatum*, trunco eredo fimplici; foliis P^ms, ovato - lanceolatis acruinatis; fpo-

56 *Cryptogamia. C Mufti.*

togamic. I. pag. 13, Tab. 5. Flor. Danit
Tab. 537 fig. 2. *Bryum truncatulum* L.

In fepibus, arvis requielcenlibus, hortis &
•ulgaris.

Flor. Vcre & jfifiate; autumnno ipo:angia ina*
turaiit.

Variat *foliis ovatis obtujiujculis, trunco pu-
miliori.*

929. *G. obtufum*, trunco erecto fimplici; foliis lan-
ceolatis acuininatis ductulosis tencr's fubcvi-
fpnhilibus {inferiora minora, pcrigoniaia ma*
jora); fporan^io ovoideo eredlo, operculo con-
vexo, rostroque cylindrico obtufiufculo ruti'
lanti Htdw. fpec. mulè. Tab. II. fig. 1 — 3-

In fepibus arvis hieine inundatis.

Flor. nrlate & autumnno t fcquente verc cum
fporangiis maturis legi.

930. *G. Heinûi*, trunco credito fimplici; foliis fpar-
tuliitu-acuniiiitit ad apicem dentiulalis; fpo*
rangiis oblongis crcc^is, operculo oblique ro*.
tūMto. Hcdw. Stirp. cryptogam. I. pag. 80.
Ta)). 50.

In glaVeof-argiljaCc>is liieme inundate, i Gra-
veil veil Sidcn of Miwcn af dct Jidjt Kalk
bramderie uden for huftellet.

Flor. Febr. Mart. Apr. Sporangia Jun. ad Sep*
tembr. mature inveniuntur.

931. *G. rutitantj* trunco WvifTimo fimplici vel rarius bifido; foliis **lineaxibuf** crii'.miaUbus; Inorangio oblungo erL'rto **circa mafurrtatfem rutii&nte**, linea **profoncHbre crrcumtru&o**, operculo rubello. **Hedw.** fpec. muc. pa£. 57. Tab. III. fig. & — 11. *Gymnostvm. microstomo of-finis.*

In **fabuloQi**, fepibus humidis, ad fosfas; *vcd Jeegersf/org.*

^f **Flor. Fobr.** Mart.; apr. cum fporangiis legi.

S32. *O. misa'ostonHM*, **trunco eTedo** fim]>]i(i; fo-liis lato-lanceolatis ficritite crilpjis; fpo-rangiis ovatis **Jabce** rnuis, ftomato **cpardiato**, **operculo oMique c(nico**. Hedw. Stivp. cvyp-to;am. *HI.* pag. 71. **Tab. 50. f. B.**

In Tabulosis, tumulis talpnuim, ad fosfas.

Flor. Febr. Mart. May Jun. Jul, cum i'poran-giis maturis inveul

933. *G. ovatum*, trunco ertflo fimpMci; **folih** ova-ti^ concavis piliferis; fporanjriis ovalis operculo convexo rostro obliijuo ti nue. Hedw, Stirp. cryptogam. I. pa^ 15. **Tab. 6.**

W In lapidibus cum **Fisfideute** pulvinato *ved J&gersborg imod Su/i der Soen.*

Februariu cum fporangiis jam matuvis legi.

563. *xAnictangium*,

Sporangium ovatum , fun Cosfi! Flos inafculu* adllaris ^emmifonnis: **femineus terminalit.**

954. *A. ciliatum*, trunco erecto rarnos'sfimo rani
 patentibus depresfis; foliis ovato-lanceolatis
 imbricatis: pericheetialibus longe ciliatis*, foliis
 , rangiis ovatis, subeffilibus, perianthiis :
 voiucratis, rutjlantibus; operculo planiuculo
 lludw. Stirp. crypt. I. pag. -104. Tab. 40.
Brj uin apocarpum. l?. L,

In laxis. Line inde adpersum.

Flor. hieme; tere opercula demittit.

569. *Tetraphis.*

Sporangium oblongum subcylindricum erectum
 deijti^us quatuor pyramidalibus ere-ctis. F
 maTcuLus terminalis, capituliformis, a;grega
 Xeslilis, &c **cyathiformis** pedunculatus; femine
 terminalis.

- 935- 3F *vellucida*, trunco erecto simplicissimo;
 foliis ovato-lanceolatis, du'tflulosis; calyptra
 variegata firjatula. Hedvv. spec. mul'c. pi
 45. Tab. VII. fig 1. a. — f.

Mnium pellucidum L.

In paludosis turfosis ved Birkerdd.

Flor. Apr. & May. Sporangia Jun. — Aug. m
 turant.

570. *Splachnum.*

Sporangium cylindraceum erectum, apophi
 conoi(lo3e intus cavce infidens; dentibus otto
 minatis. 1 Li • * hermaphroditi dimorphi. di
 formium gonitalia feminea infaecunda, elon
 torum ferlilia.

35. § *ampullaceum*, trunco **erecto** firmplici vel subdiviloy foliis ovato-lanceolatis **apiculatis**; **sporangio** cylindrico apophyfi ul»v. **ampullaeformi colloque loiigo yirente** Infidenteⁱ; operculo convt-xo. **Hedw. Stirp**, cryjtoga m. II. pag. 41. Tab. 14.. Flov. D.m. **Tab.** 822.

In uliginosis **turfosis**, i *Ordrups M>fe*.

Flor. Apr. May. Jan.? Julio Augusto turn Iporangiis maturis legi.

57- *S. Jphaericum*, trunco erectflo fuhEmplici; foliis oblongo-lanceol.itis acuin'matis; IporaQgio cylindrico apophyfi globoi'a inl'idento; operculo obtufo. Hedw. Stirp. cryptugainic. II. pag. 4G. Tab. 16.

In turfosis circa Hafaiam a Cel. Prof. Vahl Iporangiis maturis aeltate (lutecium.

371. *Encalypta*.

Sporangium 'cylindraceuin vel ovoirlrum erecturn; dentibus fedecim anguftis. Calyptra magna campanulata. Flos mafculus **gemin**aceus⁷ axillaris in eodem individuo: fcmineus tei*minalis.

©38- *E. vulgar is*, trunco erectlo **fUbfimplipi**; foliis Ipatbulato-lanceolatis; calyptra aequali **can>paniformi** margina intsped; rp orangiis cy V_n. dricis; operculo convexo longe acui!iin:ito. Flor. Dan. **Tab.** LOOI. *Bryum extingtorium*: L. Haud frcquens in fepibus; *imcllem Lyiigbye og*

Flor. primo vere. IVay. & Jun. cum fporangiis **maturis** legi.

939. *E. lanceolata*, trunco erecto fimplici divifo* que; fjliis lanceolatis concavis apiculatis; fpo* rangiis ovatis; **operculo** fubwbiique rofteliato; calyptra **dimidiata**. Medw. Stirp. cryptog. II. pas;. 66. Tab. 23.

In **fepibus** fupra lapides; *imelhtn Lyngbye og SorgenfkL*

Ytsre cuin fporangiis maturis inveni.

372. *Cynontodium*.

Sporangium cylindraceum ovatum, erectum; vei pyriforme cernuum; dertibus odo vel fedtixim paria. Flos hermaphroditus terminalis.

940. *C. capiUaceum*, trunco erecto fubfimpliri; foliis **bifariis** femivaginantibus, lineari-fubulatis; fporangio erecto fubcylindrico; operculo oblique conico. Hfdw. **Stirp.** crxptog. I. pag. 72. Tab. 26. fub Swartzia capillacea.

In argillaceis, fofsis hum id is; *ved Birkerod.*

Flor, Apr. — Jun. Autumnno fporangiis maturis legi.

941. *C. cernuum*, trunco brevifimo erecto continuo innovanti; fuliis ovato-lanceolatis apiculatis carinatis; fporangio pyriformi fubprndulo, bail elorigato; operculo convexo fubconoideo, inferne rubello; feta apico arcuata, Swartz muTc. fvec. pag. 38 & S3 Tab. I

Inter lapides Fepium naud frequens obfervari,
vfltate **fpbrangiis maturis.**

573. *Didyrno4on.*

Sporangium ovato - oblumrum eretfura, den-
tium lineurium **fedeeun** paria. Flos mafculus
femijaeusque alaris.

\$42. *D. pusiliim*, trunco evedto **Cmplici; fqliis** ex
ovato - conca-va bafi Tubulatis; l'porangiis **tree***
tisoblhgis; opcrtmlo ohliquo rostrato. Hedw.
Stii-p. *ctyptog.* I. pag: 74. Tab. 28.

In arcnofu-avgillaccis ad **fufas**, *i Ckarlotten-*
lutifl, ved Birkerod, Bagfvar.

Flor. Autumno & hieme. Vere opercula de-
mittit.

574. *Tortu la.*

Sporangium oblongo-cylindricum, dentibus ca-

*

pillaceis fedecim pluribusve, **fpiraliter** contor-
tis bafi forma cylindri fubcohserentibus. Flo»
mafculus geminiformis alaris, femincus termi-
nalis.

943- *T, fuhulata*, trunco Hmplrci brpvi; foliis
ovato lanceolatis brevisfime rnucronatis; fpo-
rangiis ercllis cylindricis; operculo conico-
elongato. Flor. Dan. Tab. 1000 fig. 2. Hedw.
fpec, mufcor. pag. 122. Tab. XXVII.

Bryum Jubulatum Lin

Inter lapides lepiuin, ad foffas, {radices arbo

Flor. Autunujo, hieme & primo vere. jffitate
fporangiis **maturis invenhur.**

Variat i. Foliis linea **ri-lanceolatis** praefortim
perichætialibus **crispabiibus**, nee
nnn' muLicis.

s. Sot is ic-iuiuntialibus vel uncialibu*
& ultra.

5. **Operculis** conicis brevibus obtufii
vel **conico-eli**ngatis acutiufculis.

544. *T. muralis*, trunco **fubramofo; eredlo**; foliis
fpathulato - lanccolatis **longe** piliferis; fpo-
rangiis cre^lis **fubcyiindricis**; operculo coni-
co-acumjuaio. V **till. Botanic.** Paris, pag.
155. Tab. 24. **fig.** 1 j. *Bryum muralc L.*

*. *A''jfliva*, trunco breviffimo lubfimplici; foliis
fpatulato Lanceolatis, pilo brevi terminatis;
feta broviori; **fporangiis** tehuioribus.

In muris, **paiietibuB**, ad faxa, quae caefpitibu*
latis **tumidiufculi**», incanis vestit.

Flor. autumnno & vere. Apr. May. cum £\>o-
rangiis maturis legi. a. floret seftate & autum-
no, initio **hiemifi** inaturat.

*Individua nanmdla ?>ftrietatis a foliis pleris-
qua pilo defütuti s obfer vavt An. T. atumi-
nata BriedeL Muscolog. recent. Tom. II. P-
L pag. 188?*

573. *Barbula.*

Sporangium **oblongum**; donlibus rapillncris fe-
decim vel **non**ta duobus finaliter

oafi cUftinfis. Flos mafculus capituliformis in diverfo individuo, ferriueusque terurinalis.

* *Caule fimplici.*

945. 5. *curta*, trunco liueari fimplirifTimo, erecto; foliis lanceolatis aruminatis; fporangio re<fto cjliulrico; periftonjio breui; operculo ohlonge conico fubobliquo. Hedw. [^]tirjj. cryp- togam. III. pag. 75. Tab. 31.

Argillaccis uxnbrosis losis; vcd den dybe Grövt, fom gaaer neden for Fortwien i Dyrehaven til Ordrups Mofe. Floret Autumno & priino vere. Apr. & May. cum fporangiis nuturis obfervavi.

946. *B. amoena*, trunco fimplici eredto; foliis ex ovata bafi acuminatis carinatis incur vis, imbricatim appveflis; fporangii cyliudiici credti annulo, bafi fetae, operculoque conico-elon- gato obluib fuberetflo, aurantiaco.

In arcnosis argillaceis vcd Birkcröd.

j&ftate floret. Autumni initio fporangii fere xnatura.

Cum Bar. Schreberi Bried. mujc. rcc. Tom. II P. I pag. 207 maxime convenit; diverfe autem, nam in noſtra planta folia non funt undidata nee fporangiwn ohliquum.

947-5. *gracilis*, trunco fimpliciurculo erefto; foliis lanceolato-fubulaſis, fubcarinalis criſpabili* bus, fuperne confertioribus; fpta tcrmindli, fubtoitili, rubenti; fporaugio cylindrico [ib-

eretto, operculoque conico - fubuiato, graciliter
oblique flexuoso, spiritaliter fissato, viride*
flavescente.

In arenosis, ericetis, *ved Bii'kerod.*

in frustate cum sporangiis **fectum** *maturia* invent.

943. *B. incerta* truncato simplici erecto; foliis linearibus
oblongo-fimbriatis, basi latis, caule appressis,
apertis patentibus hinc inde curvatis dilute vi-
rescentibus; **feta** terminali basi rufescenti,
superne pallide viridi; sporangio ovato-ob-
longo erecto fusco antiloco rubro; operculo
oblongo longitudine capsulae, acuto, inferius
subaurantiaco, apice viridifcente; calyptra
angusta pallide viridi. Dill, hist. natur. Tab.
48 % 49- A.

In frustibus, ericetis.

Vere cum sporangiis vidi.

*• *Caule ramoso.*

949. *B. unguiculata*, truncato sub epice ramoso;
foliis linearibus lanceolatis carinatis, **capite** mu-
cronatis: perigonialibus - fasciculo instructis,
obscure viridibus; sporangio erecto (ova-
to - oblongo) subcylindrico; operculo **elonga-
te** conico obliquo: fitta rubenti terminali fe-
- litaria, rarius gemella. Dillen. histor. musc.
Tab. 48 fig. 47.

In locis fici ribus ericetorum, sylvarum circa
Birkerdd.

Febr. & Mart, cum capsulis vigentibus *legi.*

950. *B. lanccolata*, trunrto erecto inferne innovando divilo; foliis lanceolatis imbricatis, Cdrinatis, fub Jiiucronulatis, fiailate criſpa bilfbus; fporans;io ovato - oblongo ore contradiufculo ererto; oporculo conico - fubulato obliquo rubello. Hedw. ſpec. muſc. pag* 119. Tab. 26 fig. 9 —11,

In erictis, ved *Bit kerbtL*

Mart. & Apr. capfulae vi₂ent.

Kami non funt incraſſatce nee Jicllulaaformes in Jurnitate.

05i₄ *B duhiay* trunco ftatim a balidiviCo; rami« erccSlis fubincraſſatis; foliis*ovato-lanceolatis, fummiſ fubftejlatim expansis; fetis ex apice ramoruxn annolarum ramosque non multum fup^rantibus; Iporangiis ovato-oblongis; operculo conico, lubacuto, recfto. Dill. hift. mafcar. Tab. 48. fig. 48.

In muris, *inicllem Lyngbye og Sorgenfru*

Mart, fporangiis jam effoetis legi.

952. *B. /alias*, trunco ramosifimo; foliis lineari-lanceoldtis, recuiTato-patulis; perigonalibus intimis exfaſciculatis; fporangiis oblongis; operculis conico -elongatis gbliquatis, Hedvv# Stirp. crypt, I pag. 6a Tab. 24-

In glarefo-argilloſis, erictis circa *Birkerbd.*

Ifebr. Mart, cum fporangiis fere aiaturis inveni,

953. *B. cirrhata*, trunco eredto ramofo; foliis lineari lanceolatis capillaribus, Uccitate fuino»

46 *Cryptogamia. C. Mufci.*

pere tortililms; fporangiis ere(5lis, ovatis rel|
ovfto - oblougis; operculis c nico-aeuminatis*
Dillen. hifl >r. mufc. Tab. 48 fig- 42. Ic.
Flur Dan. Tab. 558 fig. 4 minus bona.

In glareofa argillaceis ficcis, ericetis circa fyvr*
heröd. Febr - May. fporongia matujrant

954. *Z.* rurally, trunco raitiofo; f iis ovnto-ob*
l^n^is, carinatis, reflexis, pilitrif, ad ram¹¹*
nim cipicem ftellatis; fpnrangiis ereAis fub*
c\lindric-is; operculo oblique conico. Dillen#
hiftop. mufcor. Tab. 4*3 fi^ 12. *Bryum ru**
rale L.

In tfClis Ihuminois, fopilms, campis &c.

Hiume & prhno vere cum fp rangiis legi.

376. *Polytrichum**

Sporanc:i"m tetrag num vel ovatum, dentibus
ultra triginta brevisfimif epij;hraf;mate adgluti-
natis. Calyptra in plerisque deorfum villofa*
Flos mafculus foemiheusque terminalis#

a Caule Jimplici/

a. Sporangio cum apophyji.

955 *P commune*, trunco fimplid; f Iiis linran"
lan^eolatis, frrulatis; fp *rang is bbl« ngis te-
traëdrif; operculo pyramidato. Dilien. ~~hif.~~
xnufc Tab 54 fig 1.

In ulig'rpfis, ericetis, fylvis et a. 1. gregati**1
& vulgatifimum.

Vere fporangia vigent, autumno femina emittunt.

Variat i# magnitudine differentia loci. A digitali tñim ad pabnarem & ultra niapiitudinem ace edit.

3. Joins injei ioribus apprejjs Juperioribus diſtantibus: vel mediis plane d̄waricantibus fuperioribus infimisque appi ejjs: vel omnibus apprejjs.

3. Jet is Jolitariis vel rarius geminis.

4. Jloribus majculinis Jepius proliferis rarijime vero Jetijeris duvenitur.

956. *P. juniperum*, trunco fimplki; foliis lineari-lanceolatis, intc^errimis, carina fcabris, membrana alba reducta inftrutfis; fporangiii tetraedris; operculo e bafi plana breviter & oblique mucronato. Hedw. fpec mufc. pag. 89. Tab. XVIII fig. 6 - 10. Flor. Dan. Tab! 295.

P. commune /3. L.

In pafcuis uliginofis, fylvaticis, ericetis.

Viget vere & autumno.

P. Surculis fterilibus cylindricis, bi Jubtripol Ucaribus; JoliU imbricatim adprejjs pilo Jujco terminatis.

*57. *P. pilijerum*, trunco fubfimplici; foliis lineari-lanceolatis integerrimis pilo cano terminaatis; fporangiis tetraedris. DilL tift, mufc. Tab 54 fig, 3.

P. commune /v. L»

In fi • ioribus locis, fepibus, erioetis.
Vere & autumnno fporangia vigent.

f). *Sporangio ahsque apophyp,*

058. -P- *longifetum*, trunco **fimpRci**; folios lan<reo
lato -lubulatis apicem verfus lejTulatis, bal
carinato adprelBs apice diftantibus; feta tier
iriinali inferne cr 'con fuperiue dilution; fpo
rangio ovato gibbo fuban^ulato baft angufta
umbon•5ta^ operculo **con^ejdultulo** rofielu
conoideo rec5t * ve\ in -urv 1 **Swatc.** 1maufe
fvec. png. 7d & 103 Tab VJII Eg. 16.

In pnudofis turfosis **circa Blrkerod hsud** -infr
qui-ns fine aest.itis cum fporangiis vigentibus ob
fervavi,

j3. *tninco altiori; foliis longioribus angttfth*
ribus a rmedio ad apicem evidentior Jen a
tis laxioribus, fuhreflexis1 Jporangio ovato
oblongo fubgibbo haft ctiam angitjiatv w,
bonato, fab annulo dilute nurmitiaco paulo
coardl&toj operculo convexiufculo bajin au
rantiaco - crocco apice •conica acutinful
ercdlo dilute viridi. An l'olytr. fornofim
Hedw.fpec. mufc. pag. 92 Tab. i'-)Jig I A.?

In turfolis rarius. „£ftate fporongiis fubmaturis
legi

959, *P. pitmilum*, trunco fimpli i brevifixn^: fo
Ills **Line*rib00** phniufculis opici? **fublerruli** tis,
fi.citate canaiitulato - concavis **incuxviuIcuU'j**

fporanSiis turbinatŝ eretfis 5 opcreuTo con-
 vxiulculo obfcure* croceo apice conico obtu-
 1b brevi; fela brevi apice fubbistorta. Swartz.
 mule. fvec. pag. 77 & 103 Tab. IX fig. 19.
 Hedw. fpec. mufc. pag. 97. Tab. XXI. fi*. 7-9.

Haud frequens in ericctis iegi circa *Birkerüd.*

Hieme & primo vere (porangia vigent.

960. *P. nanwn*, trunco limp I ci brevi; foliis li-
 neavi - lanceolatis fubranaliculatis apice fub-
 ferrulatis; fpuranŝiis ovato - turbinatis nutan-
 tibus; operculo convexiufculo margine cro-
 ceo, apice conico acuto; feta, fubllexuofa,
 tortili. Hedw. Sticp. crypt. I pag. 35 Tab.
 XIII.

Mnium polytrichoides L. a.

In fepibus, ericetis.

Ineunte vere maturat.

Variat *Jeta hreviori & longiori; Jporangiis
 plane nutantibus vel Juberediis.*

961. *P. aloides*, trunco fimplid; foliis lineari-
 lanceolatis fubcanaliculatis fub apicem argute
 ferratis; fporangiis ovato-cylindricis obliqua-
 tis; feta eretfta apice tortili. Hedw. Stirp.
 crypt. I. pas;. 57 Tab. XIV.

Mnium polytrichoides ß. L

In ericetis, cunpis fterilibus rarius, veel *Fciem
 imtflem Fuglevad-Molle og Brede.*

Sporangia autumnö & incunte hieme optima
 vigent.

962. *P. undulatum*, trunco subfimpHci; foliis lan-
ceolatis carmatis, ferratis, undulatis, paten-
tibus; **calyptra** ad **apicem** parapbyfiphoraj
fpuranpo **cylinarico** cernuo. Flor. Dan. Tab*
477. Hedw. Slirp. crypt. I. pag. 43. Tab.
XVI. XVII.

^3. *11 unco fmplici, foliis lineari lanceolatis*
car in fit is Jerratis undulatis ere&iufcutis
Sporangio cylhulraceo affurgenti; operculo
rostro longiori hand crasjlori. Dillen. hift.
miifc. Tab, 46, Jig. 19. *Polytrichum con-*
troverfum Bried, pag, 93.

Bryum undulatum L.

In filvis, virgultis, ad fepes. j£ftate floreti
frequente vere fporangia maturant.

b, Caule ramofo.

963. *P. urnigerum* 7 trunco ramofo; foliis lancco*
latis, Jerrulatis, lubcarinatis, acutis, ftrictis;
fporanpio ere(5lo, cylindrico, aequilaterali; oper-
culo ronico - acuminate incurviuiculo. Dille»'
hft. Jiiurr. Tab, 55 fig. 5.

In ericetis; ved Bagfvwr, Birkerdd.

Flor. Apr. & May. j^ftate atque autumnno ma-
turat.

377. *Grim mi a.*

Sporangium ovatum, dentibus fedecim latiu-
fculis reflexilihus. Flos mafculus axillaris gem-
macous, ve] capitulifoxrnis femineusque termi-
nalis. Calyptra laevis.

λ

964. *G. apocarpa*, trunco eredio, ramofo; foliis lanceolato-carinatis imbricatis: perigonalium apice albo; fporangio oblungo in pedunculo brevisfimo; operculo convexo, brevisfime rotellato, amoeno rubonti. Hedw. Stirp. crypt pag. 104. Tab. XXXIX.

Bryum apocarpum L.

Ad arbores, muros, fupra lapides.

Floret autunino. Hieme & prixxio vere fporangia vigent.

378. *Weisfia.*

Sporangium ovatum vel ovato-oblongum dentibus fedecim cupidatis. Flos mafculus capituliformis in diverfo individuo femineusque terminalis.

965. *PF. crispata*, trunco ereAo ramofo, ramis confertisj foliis linearibus, contortis, indulatis fubcarinatis, fubftriatis; fporangiis ovati* erertis operculo acute rostrato. Dikf. Fafc. III. pag. 3 Tab. VII. fig. 4.

In fubhumidis calcareis, ved *Friderichs - Kirke paa Amalimborg*. Mart, fporangiis Jan. effoetis.

379. *Trichostomum.*

Sporangium oblongum eredtum; dentibus fedecim bipartitis, laciniis fetaceis longis. Flos mafculus alaris. femincus terminalis.

966. *T. canescens*, trunco ere&o ramofo, ramis confertis: foliis lanceolato * carinatis, recujvis,

apice decoloro albis; fporangiis ereftis ov longo-ovatis, operculo fubulato-conico. Hedvr. Stirp. crypt. III. pag. 5. Tab. III. *Dillen, hiji, mujc. Tab. 47 Jig, 27 autem melior plant, iwstn nionstmt.*

In arenosis arid is, imod *Stranden imellcm Charlottenlund og Skovshoved.* Jul. ,absque fporangiis legi.

967. *T. heterostichum*, trunco ffbredfco ramofof foliis lanceolatis fubheteromalJis in apiceitt canum denticulatum produ^is; fporangiis oblongis, operculo oblique rostellato. Hed\T. Stirp. crypt. II. pag. 70 Tab. XXV.

In faxis ericetis adfpersis folummodo inveni. Initio aestatis fporangia maturant

38a. *Fisjideris.*

Sporangium ovato - oblongum, dentibus fedecit* latiufulis circiter, ad medium usque fubaequaliter HFidis. Flos mafculus gemmaceus axillaris in cadrm planta: femineus lateratis bifila* ris vel terminalis»

* *jrande simplicissima.*

968. *F. bryoides*, fronde fubdeclinata Emplicisff ma; foliis distichis, patentibus, fcalpellifor Hiibus; peduticulo terminal!; fporangiis ova to-oblongis crec^is, dentibus incurvis; opercul^o o)Jjque rostellato^ Flor. Dan. Tab. 475 fig. *• *ffypnum firyoides L.*

In umbrōsis fylvarum, pomariorum & pratorum.
Floret autumno. Vere Jporangia maturant.

969. *F. taxifolius*, fronde decumbente rimplirisR-
ma ; foliis disiichis ovato - lanceolatis; pedun-
culis fubradicalibus-. Iporangiis oblongis lub-
nutantibus, operculo rostellato* Flor. Dan.
Tab. 473 fig. a.
Hypnum taxifolium L.

In umbrosis fylvarum fubhumidis.
Autumno floret. Sequentē vere fporangia ma-
turat.

*• fronde fimplici vel fubramofa.

970. *F. adianthoides*, fronde fimplici ramofaque
ereda; foliis distichis Jmbriatis, fcalpellifoi-
mibus; pedunculis in medio frondis axilla-
ribus; fporangiis ovatis obliquis; operculo
longirostro. Hedw. Stirp. crypt. III. pag. 62.
Tab XXVI.
Hypnum adianthoides L.

In uliginosis turfosis haud frequens, in humi-
dis argillosis; *i den dybe Grbvt ved* Eortwun*.
Autumno cum fporangiis jam effoetis legi.

• • • *Caulefcentes.*

- \$71. *F. pulvinatus*, trunco eredlo ramofa; foliis
lanceolato-carinatis piliferis; fporangiis ova-
tis pedunculo arcuato immerfis; operculo 10

ftellato. Hedw. fpec. muTc. pag. 158 Tab XL, fig. 1—5. Dillen. liiftor. mulcor. Tab. I 50. fig. 65.

Bryum pulvinatum L.

In fepibus, muris, fupra lapidos.

I loret autunino, ineunte vexe maturat.

972. *F. fciuroides*, furculis repentibus¹ ramofis, ruiiis ereclis fubdivisis, **ficcitate** recurvis r **fbliis** ovato-lanceolatis; fporangiis oblongis, **ereclis**, **aurantiacis** operculo **conico**. Dillen. **hifto**r. **nrufcor**. Tab. 41. fig. 54.

Ilypnum Jciuroides L.

Ad truncos falicum fop;orum([ue,ar]nofarum.

Rarius floret, & numquam cum fporangiis reperi-

581* *Dicranum**

Sporangium ovato - oblongum, dentibus fedecirtx brevioribus inflexis, ultra medium fubinaequa* liter bifidis. Flos mafculus capituliformis vel geramiformis terminalis in diftincllo individuo*

a% *Sporangia fine apophyfi,*

* *foliis Jecundis vel Juhfecundis.*

573. *D. fcoparium*, trunco afcendente ramofa; fU* novationibus elongtis in plerisque **attenua-** tis, apice fubarcuatis; foliis lanceolato-fulⁿ¹ latis, carinatis, recurvis, fecundis ti^{nuisfine} ferrulatis; pedunculis « ramorum annotin⁰ rum apice ereclis; iporangiis fubobliquis **cy-**

lindricis operculi longirostro. Flor. Dan.
Tab. 824. 1. haud bona. Dillen, hilt. mule.
Tab. 46. fig. i6#

Bryum Jacoparium L.

In fylvis, ericetis frequens.

Flor. autumnno. Sporangia hieme vigent.

974- *A fasciulatiun*, trunco ascendente ramo
fo; furculis bi-triuncialibus & ultra, subcli-
chotomis, innovationibus brevissimis; foliis
lanceolato-subulatis, carinatis, apice tennis-
fime serrulatis, furculorum sparsis appressis to-
mento ferrugineo interpositis, innovationum
subulatilongis patentibus; pedunculis
tamen ramorum annuorum quam innova-
tionum apice credis; sporangiis subulatis
cylindricis, operculo rostro longissimo.

In pinetis, ved Bagfver, Birkerdd, autumnno
sporangiis vigentibus leⁱ.

An D. spurio audlorum diversum ?

975- & *undulatum*, trunco erecto ramofo; foliis
confinis lanceolatis subulatis, concavis trans-
verse undulatis subfecundis; fetis subulatis
regatis; sporangiis cylindricis liberis; opercu-
lo longi rostro.

In paludibus, turfosis; £ *Lynghye og Ordnip**
Mofe.

Floret primo vere. ^Estate sporangia vigent.

976. *D. heteromallum*, trunco subflexuoso eredlo
^mofiufulo; foliis basi concavis membrana-
eis, apice subulato - capillaceis fecundis; spo-

rangiis ovatis **fubinclinttis**, deinde aurantis* |
co - fufcis ; operculo rubello conico-Tubulate
rosteilo incurvo. Hedw. Stirp, cryptogam.

Tab. XXVI.

Bi) //// heteromallum L.

Ad f05fas, **in uliginosis** turfosis, ericetis, fyl*
Laud **infrequens**. Per **toturn** annum cum if
rangiis vigeniibus, & effoetis vidi.

977. *D, interruption*, trunco ereclo .fimpliei ra
mofoque; foliis e bafi oblonga latiufoalti lo]ngo
lubulato fakatis heteromallis lubdecidais, pe
dunculis pallidis; oper ulo tenuiter lon^e ro-
ftrato. **Hedw.** fpec. musc. Tab. XXIX. fig.
8 - 12.

In **pirietia** humidis, ad **fosfas**,

Viget feftate •& autumnno.

*Folia ccftate, preecipue ventis aut aliavi ve xa-
tis, copiofe cadentia, wide interruptio. He dw.
L c.*

978. *D flexuqfitm*, trnnco erecTo fubramofo; fo-
liis lineari-fubulatis exfofdculatis fubfecun-
dis; pedunculis fubflexuofis; fpoi*angiis ova-
tis, ficr}t.!ti^ lon*itndinaliter fulcatis', ope;reulo
e bafi conic a **longe** ariftato. Hedw. fpec. **I**
pas 14.5. Tab. XXXVIII fig. 1 - 4.

Bryum jlexuojum L.

In turfosis lulilmmidis circa *Birkerod* del
casfpitibus lee;L, Jun. Jul. Tporangia vigent

J79. *D. crispwn*, trunco flexuose eredto ful Hmplui; foliis e femivaginate bafi cařillacois fubdifficiliis; pedunculo terminali erecto; fporangiis eredtis ovatis, maturis obconuis vel turhinatis fubruffis; operculo convexo, n-stro fubuldro longo credlo vel fuhobliqu \ Ucdw, Stirp. cr)ptog. II. pag. 91. Tab AXXIII.

In humklis, ad margines fosfarutn, in pineto> circa *Birkeröd*. Sporangia fub fineui aftatis vigent.

880. *D. Juhulatum*, trunco bi-tri]ineari firnplici eredo; foliis e ba'i concava membranacca capillaceis, duduIoGs, erecttis, apice divergentibus, fubfecundis; pedunculo terminali fub fporangio t rtili rubro; fporanqjiis cylindricis, maturis ovatis, bafi fubfcrophulosis inclinatis; operculo conico, fubulato, obtufiufulculo afurgenti; calyptra lineari pallide-virenti, lateraliter fifa, apice nigricanti, Hedw. fpec. mule. pag. 128 Tab. XXXIV fig, 1—5.

Minus frequens plantulam hanc elgantem in argillaceis fubhumidis lam fporangiis calyptratis quam ecalyptratis & fere maturis reperi.

S81. -*D. varium*, trunco fuberedlo ramofiufculo; foliis lanceolato - fubulatis carinatis fubfecundis; fporangiis- oblongo - ovatis iurlinatis fubcernis que; operculo rostro conico fuboblique. Hedw. Stirp, cryptogam. II. pag. 95. Tab. XXXIV.

Brrum fimplex L.

In fubhurnidis argillaceis.

Autumno cum iporangiis maturis legi.

•• folds diredlione ecquall

582. *D. pujiUum*, trunco ereflo fimplici; foliij capillaribus, patuiis, bafi concavis, rigidiu- fculis **exafaciculatis**, fommis fustigiatis;° Lfo rangiis ovoideis l'ubcreclis; operculo corJctj longe rostrato. Heiwr. Stirp. crypt. It. pag- 80. Tab. XXL. fig. B.

Ad terram. Autumno cum Iporangiis vigenti- bits rep or i.

983- *U.glaucum*, trunco ererto ramoso; foliil donfe imbrfcatis, ovato- lanceolatis exafacicU- latisjfporangns inclinatia oblongo-ovatis, ope- culo curvirostro acutissimo. Flor. Dan. Ta. **824.** fig. 3. **Dillen. hiftur.** mufc. Tab. 46. fig.^K 20.

Bryum glaucwn. L.

In fylvis, ericetis pasfim, rarfus autem cum Iporangiis, aestate legi.

984. *D. purpureum*, trunco ereclo dichotomo; fo- liis lunceolato-carinatis; pedunculis inter du- plicem- **utplurimum** innovationem locatis ; fo rangiis oblongis, rreclo-cernuis, Oriatis, oper- culo conico acutiulculo. **Hedw.** Ipec. musc. Tab. XXXVI.

Mnium purpureum L.

In tetjlis, muris, n[^]ris, ericetis vul. gaticifimum

Floret autumuo **pximo** vuc **fpoian[^]a v[^]»t**

§85. *D. palustre*, trunco erecto superne diviso; foliis kxe imbricatis, patentibus, lineari-fubulatis; fporangiis fuh yilndricis inclinatis operculo conico acutissimo. Dillen. hiftor. mufc Tab. 4[^] fig. 52.

In f sTis humidii vere cum fporangiis vigentibus inveni.

886. *D. pelhicidum*, trunco erecto, ramofo, tomentofo; foliis lancenlatis patulo - reflexis; fporangiis fabnutantibus ovatis, operculo curviroftro. Dillen. hilt. mafc. Tab. 46 fig. 23. 24.
Bryum pellucidem L.

¹ In paludibus uliginosis, i *Lyngbye og Ordrup** *Mofe*. jfiftate fporangia vigent.

987. *D. Sckreberi*, trunco erecto fmbfimplici; foliis? fparsis ovato-lanccolatis apice capillaceis flexuoſis; fporangiis cernuis ovatis; operculo conico apiculato* Swartz. mafc. fvcc. pag. 57 & 88 Tab. a fig. 6.

In declivis argillosis inter *Torbek & SpringsJorbL* Julio cum fporangiis jam effoetis vidi.

b. Sporqngio apophyji iii/trudto.

,988. -P. *Celsii*, trunco brevissimo fimplici; foliis oblongo lanccolatis obtufiufculis ducluloruna fafciculo instrudis; fporangiis fubcernuis, cylindricalis, bafi fcrophulosis, operculo brevi conico. Hedw. fpec. mufc. pag, 149. Tab. XXXIIL fig. 1 - 4 .

Bryum Celsii L.

In apricis. Vere sporangia videntur initio aestivitate
maturant.

539. *D. cerviculatum*, trunco **erectio** erecto simplici; foliis lanceolato-linearibus, exaristatis; Sporangiiis obovatis **subobliquis**, apophyseis, **sub**exsertatis, operculo oblique **incurvato**. Hedv. Stirp. Crypt. III pag.; 8Q Tab. XXXVII % A
In turfosis tam humidis quam **aridis** gregatim Jun. & Julio cum sporiis optime videntibus frequens legi.

582, *Buxbaumia*.

Sporangium ovatum, obliquum, peristomii externi dentibus ledecinis truncatis: interni membrana plicata. Flos masculinus difcoideus: femineus terminalis.

- ^90. *B. aphylla*, furculis foliisque nullis; Sporangio pedunculato ovato altero latere depresso-marginato; caudice abbreviato, apiculato, rufescenti, ante capsulae plenariam evolutionem decidens; operculo conico, **brevi**, obtuso. Flor. Dan. Tab. 44.

In graminosis, *imellem Granjkoven og Bagstvet Soe, kort for end man hamner til Gierdet imod Frucjkoven* ubi eel. Prof Vahl rarissimam hanc plantulam Octobr. cum sporiis vigentibus invenit.

- 991- **^* f^o t i ^o f^e i** trunco nullo; foliis linearibus obtusis; sporiis ovatis perichaetialibus foliis **subinvolucratis** ? **subsessilibus**; operculo

conico brevi obtuso. Flor. Dan. Tab. 249
figura' Superior.

In fylvis ad terrain; *Bagfver; ved Fortunen.*
Septembr. & Octobr., fporangia vigent.

, 585. *Bartramia.*

Sporangium fpbaericum ftriatum, periftomii ex*
terni dentibus fedecim cuncif rmibus: interni
xmembrana plicato-carinata, apice lacinulata,
Flores mafculi femineis approximati.

892. *B. pomiformis*, caule ere(*lo fubfimplici; fo-
liis lineari-fubulatis fuhorifpabilibus; fporan-
giis obliquatis, fphsericii, maturitate ovatis
fecundum longitudinem ftriatis; operculo con-
vexo piano fubpapillato. Dillen. hift. xnufc*
Tab.'44. fi^ 1.

Bryum pomiforme L.

In umbrosis, fcrobis, ad margines fosfaruxsu
Verc fporangia vigent.

584. *Meesia.*

Sporangium obovat)-obWigum, oblique turbr-
natum, periftomii externi dentibus fedecim ob-
tusis brevibus: interni ciliis totidem acutis di-
ftinAis vel opere rcticulato connexis. Flore*
ftialculi femineis approximati.

893- *M. longifeta*, trunco cre(5to bi-triunciali *
^Itra, fimplex, peradta frudtificatione inno-
vanti; folii9 ovato-lanceolatis patulis; fpo-
xangii^ in pedunculifi.pralongis cernui^pyri^

6a *Cryptogamia. C. MufcL*

formibus operculo conico. Flor. Dan. Tab. ii22. fig; i. **Hedw.** Stirp. cryptog. pag. Tab. XXI. XXII.

Mjiiiun triquetrum L.

In paluclibus; *Lyngbye-Mofe.*

Variat foliis *denjioribus imbricatis*^ appttis; operculis minoribus convexis futypillatis.

In turfosis, ved *Lyngbye-Mofe imod Friderid dal*, ^ftate fporangia vigent,

5fj5. *Fun aria.*

Sporangium obcennicum, oblique fubturbinatuf^lporiJioiiiJi externi dentibus fedecim acutis obliquis, apice cobrrrentibus interni ciliis totidem membranneis planis, Flos mafculus difcoid in **diverfa** planta: femineus terminalis,

994. *F. hygrometrica*, trun&o ere(5lo fimplici **ana** alterave innovatione; foliis oblongis c(.vis **acuminati8** conniventibus; fporangiis liquis pyriformihus in pedunculis arcuatis i^l**tantibus J** operculo exiguo convexiufculo o^otiiiio. Dillon, hiftor. mule. Tab. 5a fig* 75

Mnium hydr01713tricum L.

In terri< huinidis, hortis fere ubique.

Floret autuinno, hieme; vere fporangia vi!

Variat foliis oblongo - lanceolatis concavis *acuminatis reticnlatis patulis.*

586. *Pohlia.*

Sporangium ovato-oblongum apophyfi obconicje angultiori infidens, periftomii externi dentibus fedecim acuminatis: interni membranaceum fedecim partitum laciniis uniformibus. Flos mafculus capituliformis, femineusque in eodem individuo terminalis.

995. *P. inclinata*, trunco ere&o fimpliriufculo, una alterave innovatione ex fumitatibus annotinorum; foliis inferioribus fpars s ovato-lanreolatis palentibus: terminUibus confertis lanceolat > - cavinatis acuminatis integerrimis; fporan|riis pyriformibus initio cernuis demum pendulis} operailo convexo apiculo brevi acutiufculo. Swartz mufc, Ivec. pag. 45 & 96. Tab. V. fig. 11.

In fepibus lapideis, ad qiargines agrorum.
Vere cum fporangiis vigentibus invenL

397. *Webera.*

Sporangium oblongum vel p) riforme periftomii exteaii dentibus fedeLim latiuflmlis acutis: in^erna membrana tenerrima in fedecim proces* &< triangulares, ciliis interpofitis produdla. Floi ^afculus femineusque terminalis in eadem planta.

- 956, Jjr. *nutans*, trunco fimplici erecSlo brevi, in^erne nudiufculo, fuperne foliis lanceolato-acuminatis, nervo dorfali valido notatis, con^wtis vestito: fnoranffis oblonsis. in nedun*

culis **fublongisfimis** debilibus 'apice fubar
tis, **autantibus; opercul'i** rotundato - coav
cum **acuinine brevl** Hedw, Stirp. crypt *
pag. 9 Tab. JV.

In uliginofis turfosis **hand** iufrequens.

Vere **fporangia** optime vigent, & fine **maturaht.**

997- ^- *pyriformi*\$_y\$ trunro fimpli isfimo; **linearibus** fparsis, perihetialibus fastigi
capillaribus longe'sfimis; fp rangiis pi
jn-bus nutantibus; ope\uto convexo pi
to. Hedw. **Slirp.** crypt. J. pag. 5 Tab

In fofis **fnbhumidif**, ved *Veien til Charlott*
hind ved den Stcenbroe forbi Hellerup.

May. & Jun. cum fporangiis vigent^bus *h gi.*

588. *Bryum.*

Sporang'um ovnto - oblon^um vel ovaium, peri
ftoinii externi dentibus Tdecim latiufulis
tis reflexilibus: interni ciliis totidem
ve Jatiufulis capillaribusve alternis e
nula plicato-cnrinata produce's. Flos
capital form is femmeusque in diverfo indivi
term'nal s.

998. *B ccefpiticium*% trunco erecto **Gmptcl**,
florefcentam nn vant;, f 1 s lancenal
m'nito-i'etaceis, crnn **yentibus; fporang**^1
tis **pemiuiJs**; operculo convexo papillato.
hft. inufc. Tab 50 fig. 66.

Ubique vulgaris. Sporangia vere **matura.**

^999. *B. caplllare*, trunco brevifimo erecto, per
a&a fructificatione innovanti; foliis confertis
ovtitis acuminatis apice piliferis patulis; fpo-
rangiis elongatis pendulis; operculo convexo
acumine brevi. Flor. Dan. Tab.

In humidis locis fylvarum, Vere fporangia vi-
gent.

3000, *B. pallens*, txuncis fimplicibtis confertis erec-
tis \ foliis ovatis acuminatis carinatis ereAis ;
fporangiis ovatis bafi attenuatis cernuis; oper-
culo convexo papillato; fetis apice curvis.
Swartz. mule fvec. pag. 47 & 98. Tab, 4,
fig. 12.

Inter lapides. j<ltate fporangiis effoetis.

1001^ *B. carneum*, trunco fimplici erecto; foliis
lanceo latis, remotis tenerrimis ^ fporangiis
ovatis pendulis^ operculo obtufo, Dill liift.
mufc. Tab. 50 fig. 69.

In humidis; ved den Bek, Jam förer Vandet
fra Hunde-Som bag ved Jxgersborg til Or-
drup - Mofen.

Primo vere cum fporangiis vigentibus inveni

1002. *B. annbtinum*, trunco exiguo eTerfto; foliis
teneris lanceolatis du&ulorum fdfeiculo in-
flruclis' fporangiis oblongo-pyriformibus nu-
tantibus pendulisque; operculo convexo api-
culato pallico. (Surculis annotini\$ bulbiferis

hulhulis in foliorum alls), Hedw; fpec. *mufc.*
pag. 185. Tab. XLIII.

Mnium annotinum L,

In locis humidis arenosis, ad aggeres, fosfa^s.
Vere ac ineunte ttftate, etiamfi rarissime fl^o-
rangiis vigentibus fimulque furculis bulbiferis*

2003. *B. argenteurn*, truncis fimplicibus confertJ*
teretibus; foliis ovatis acutis concavis p^{^o}
terminatis, imbricatim conniventibus; ty^{0*}
rangiis ovatis pendulis, operculo convexo, p^{a-}
pillato. Flor. Dan. Tab. 880 fig. s.

In tettis muris fepibus e. a. 1. vu]gare.
Vere fporangia vigent.

1004. *B. julaceum*, truncis fimplicibus *confertis*
teretibus; foliis ovatis concavis obtufiufuU*
imbricatim conniventibus; fporangiis elong^{a,}
tis pendulis, operculo convexo mucrone bi^{*eVI}
fubcurvo. Dillen. hiftor. inufc. Tab. 50. fig. 63.
Brynm argenteum p. L.

In pavimento ?edis Fridericiani vere cam fpo-
rangiis maturis legi.

1005. *B. Jquarofum*, trunco ferrugineo-tomento^{lo}
fimpliciufculo; foliis ovatis acutis *quinque-*
farie imbricatis reflexis; fporangiis oblong^{is}
erecto - cernuis, operculo fubonico, acu^{fl.}
Hedw. fpec. mule. Tab. XLIV. fig. 6 — *^u

In pratis & pafcuis ulipinofis.

Vere fporangiis jam effoetis.

389. *Mnium.*

Sporangium ovato - oblongum; peritormii externi dentibus fedeciuu latiurculis acutis: intemi procesfibus diffonnibus iedecim pluribusve e membranula plicalo - carinata produdis. Flos r̄n̄afculus difcoideus in eadem vel diverfa planta terminalis: femineus terminalis.

1006. *M. paluftre** trunco dichotomo ereclo, fu perne innovationibus elongatis; foliis ovato-lancedolatis acutis carinatis imbric&tis ereAo* patulis; fporangiis oblongis fubcernuis, opercub convexo - conico cum acumine obtufo brevi. Dillen. hiftor. mufc. Tab. 31 fig. 3-

In paludibus turfosis.

Frimo vere uptime viget.

p. truncis bretioribus Jurculisque tenerioribus; foliis lanceolato-Jubulatis, magis appreffis.

1007. *M. hornum*, trunco eredlo fimplici; foliis lanceolatis, acute ferratis -, pedunculis curvatis; fporangiis ovato - oblongis pendulis, operculo convexo. Dillen. liiR. mule. Tab. 51.

fig. 71.

In nemoxoris umbrosis fubhumidis.

Vere fporangia vigent.

1008. *M. crudum*, trunco ereclo Qinplici; foliis ovato-lanceolatis, fummis elongato-linearibus, apice denticulatis; fporangiis oblongis uutantibus, operculo convexo. Hedw. Stirp. crypt. I. pag. 99- Tab. XXXVII.

¶n umbrosis; *Charlotterilund.* V*re viget

1009. *M. bimum*, trunco eretto subramoso rubi-
giuoso: iurculis ferioribus filiformibus proli-
feris; foliis lanceolatis, acuminatis, carinatis,
remotis; sporangiis oblongo ventricosis, sub-
nutiintibiis, antice ferrugineis iub annulo
coardtalis, operulo convexiufculo, papillato*
Dillen. hiftor. mufc. Tab. 51. fig. 73.

In uliginosis turfosis, *i Ordrup-Mofe.*

Ætate cum sporangiis vigentibus legi.

1010. *M. pseudotriquetrum*, trunco subdiviso, in-
fern[^] ferrugineo-tomentoso; foliis lanceola-
tis, acutis, patentibus, rigidulis carina rubra,
ficcitate subcrispabilibus appressis; sporangiis
oblongo - ovatis pendulis, operculo hemiphfle-
xico subapiculato. Hedvv. Stirp. crypt. III.
pag 10. fig. 7.

β. *major* Dillen. Tab. 51 fig. 72 A# B. C.

γ. *injlcxum*, *Jetis baji vel haud infra me**
dium cubituliformi - inflezis. Haud maU
varietas hac representatur Dikfon. fascicul.
*fecund, plant, cryptogamic. britan. Tab. V**
fig. 2.

In uliginosis turfosis.

Viget vere, ætate maturat.

1011. *M. lurbinatum*, trunco simpliciufculo, bre-
viufculo, innovationibus trilinearibus & ultra?
foliis ovato - lanceolatis acuminatis patulisj
sporangiis pyriformibus pendulis, operculo
convexo subpapillato. Hedw, Stirp. crypt.
III paa; 20. Tab. VIII.

In turfosis exficatis, in udis.

Vere viget.

1012. *M. punctatum*, trunco simplici; foliis obovatis, margine subcartilagineis, iunculis integerrimis, mucronulatis, punctato pellucidis; sporangiis oblongo-ovalis pendulis operculo apiculato. Dillen. hist. musc. Tab. 51. fig. 81.

Mnium ferpillifolium a punctatum L.

In paludibus, uliginosis humidis, *Lyngbye-Mose*. Jussate cum sporangiis vigentibus legi.

1013. *M. cuspidatum*, trunco simplici; foliis ovato-lanceatis apiculatis ferratis; sporangiis pendulis ovatis, operculo convexo. Dillen. hist. musc. Tab. 53 fig. 79 A. B. C. K.

Juss. *pedunculis aggregatis* Dill. 1. c. fig. M.

Mnium ferpillifolium [Z cuspidatum L.

In umbrosis, foliis ad radices arborum.

Vere sporangiis vigentibus.

1014. *M. roseum*, caule simplici; foliis lanceolatis, acutis, crenulatis, rosaceo tomentosis; pedunculis subaggregatis; sporangiis ovatis nutantibus, operculo conico. Dillen. hist. musc. Tab. 52 fig. 77.

Mnium ferpillifolium y proliferum L.

In foliis udis Vere & refert, viget.

1015. *M. undulatum*, trunco simplici, innovationibus fastigiatis; foliis oblongis undulatis, nervis serrulatis obtusis; pedunculis subaggregatis

fporangiis ovatis pendulis, operculo obtuso
Dillen. hilt. musc. Tab. 52. fig. 76.

Mnium ferspillifolium % *undulatum* L,

In fylvis umbrosis udis locis. Vere & seftate-
1016. *M. fantanum*, trunco simplici erecto, inn-
vationibus fastigiatis confertis; foliis lanceo-
lato-acuminatis fubfubulatis iiervosis; IporaH'
giis fubfpha?ricis obliquis: operculo conic-
obtufe mucronato. Dillen. hiftor. musc. Tab.
44. fig. 2. Flor. Dan. Tab. 298.

In paludosis ad fcaturigines. jffate optim-
viget.

590. *Orthotrichum*.

Sporangium ovato-oblongum, periftomii exter-
ni dentibus fcedecim latiuiculis brevibus fubre-
flexilibus: interni ciliis totidein erosis. (P&*\
riftoia. intern, fcepius nullum). Flos mafculus
gemmaeus in eodem individuo vel capitulifoi-
„ mis terminates in diftincto: femineus termina-
lis. {*Calyptra furfum pilofa*).

* *Peristomate txterno Jedecies. inferno octies
dentato.*

1017. *O. affine*, trunco erecto ramofo; foliis lan-
ceolatis maxgine revolutis, patulis; fporangii*
oblongis fniatis, dentibus periftomii extern¹
fedecim gcmnatis: interni oculo capillaceis
operculo obtufe acuminato.'

In truncis arbormn. Ilieme & vere fporangi^{1s}
vig«ntibus legi.

An diversa ab O. pumilo Swartz. musc. fvec. pag. 42 & 92 Tab. IV Jig. 9?

1018. *O. obtusifolium*, trunco erecto subramosum; foliis ovatis concavis obtusis; calyptra campanulata subglabra; sporangiis ovatis sessilibus, dentibus peristomii interni octo integris, operculo conico obtusiusculo. Swartz. musc. fvec. Tab. IV. fig. 8-

Habitat & floret cum precedente,

*** Peristomate duplici utroque fedecies dentato.*

1019. *O. crispum*, trunco erecto ramoso; foliis lineari-lanceolatis, fuscitate crispis; sporangiis ovatis e pedunculo continuatis, operculo convexo, acumine obtuso. Hedw. Stirp. crypt. II. pag 96. Tab. XXXV.

Bryum striatum i L.

Ad arborum truncos, in pinetis. '

estate sporangiis vigentibus.

1020. *O. diaphanum*, trunco erecto subramosum; foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis, apice diaphanis; sporangiis oblongis, operculo convexo mucronato.

Ad affres sestate cum sporangiis jam effoetis.

1021. *O. striatum*, trunco erecto ramoso; foliis lanceolatis, margine -,revoluto - patulis fummis apice erosis; limbo calyptrae subaequali; sporangiis ovatis e pedunculo continuatis,

J2 *Cryptogamia. C. MufcL*

operculo obtufe acuminatum. Ilci Stirf
crypt g. II. pag. 99. Tab. XXXVL

Bryum ftriatum L_t

In te<Slis, parietibus, ad arborum truncos e. a. I.
Sporangiis maturis aestate legitur,

*** *Periftomate fimplici Jedecies dentat0.*

1C22. O. *anomalum*, trunco ere(Sto ramofo; *ioliiis*
oblongo-lanceolatis, margine revolutis, pa-
tulis; Tporangiis oblongis, operculo obtufo
acuminato. Hedw. Stirp. crypt. II# pag. ioa»
Tab. XXXVII.

Bryum ftriatum jß. L.

Ad faxa, muvos, in tectis.

Vcre cum iporangiis reperi.

391. *Font inalis.*

Sporang'um fetae brevi peritheetio obvolutae in-
fidens, periftomii externi dentibus fedecim la-
tiufculis fubulatis: interni membranula reticu-
lata* Flos mafculus ge'mmaceus axillaris: fe-
mineus axillaris termfnalisv^

3025. -F. *antipyretica*, trunco ram^sisfimo; foliia-
ovato-acum'nats carinatis trifariam imbrica-
tis; fporangiis obovatis, lateralibus, operculo
sonico < btulisfimo. Dillen. hiftor. mufc. Tab*
55- fifr 1.

Zn lacubus, ftagnis ad palos, *i Lyngbye og Fur**
foë ved Papiirs-Mollen.

j&ftate deflorata legi.

1024. *F. Jquamofa*, trunco filiformi dichotomo vel confertim ramilicato; foliis Iubulato lanceoktis concavis trifaridin imbricatis laxe difpolitis; fporangiis fere cjlinrlricis lateralibus, operculo brevi obtule conico. Hedw* Stirp. crypt. III. pag. 32 Tab. XII.

In lacu *Lyngbyenji*. jEftate deflorata inveni

392. *Neckera.*

Sporangium oblonum, periftomii externi dentibus fedocim acutis: interni ciliis totidem difincStis cum dentibus alternantibus. Flos mafculus gfmiformis alaris in diftindta vel cadcia planta: femineus alaris.

1025. *^ viticulofa*, trunco repenti ramofo, ramia longis gracilibus fubfimplicibus; foliis oblongo-lanceolatis /apice obtufis reflexiufculis; fporangiis eredlis oblongis, operculo acute conicoi Hedw. fpec. nrufc. pag. 209. Tab. XLV[IL

Hypnum viticulofum L,

Ad arborum truncos. Vero fporangia vigent*

1026. *N. curtigendula*, trunco vago ranioio fubpinnato, rarnulis increffatis; fcliis imbricatis patulis uvitu-lubulatis fub apicem ferrulatis: perichaetialibus longiffimis; fporangiis fub maturitatem pendulis, post evacuationem autrm eredlis, operculo conico, rostello obliquo acutis Dillen. hift. mufc. Tab. 43 fig. 69.

Hypnum curtigendtdum^ L.

In truncis arborum. Januar. & Febr. fporangiis vigentibus inveni.

595. *Leslie a.*

Sporangium oblongum, peristomii externi dentibus fedccim acutis: interni ciliis totidem basi xmembranula connexis. Flos mafculus gemmiformis femineusque alaris in eoclem vcl diftin&o individuo.

• *Foliis distichis,*

1027, *L. complanata*, trunco procumbente ramofo; furculis diverfimode pinnatis, apice filiciformibus; foliis imbricatis distichis pterygideis, apice obtuse mucronatis; fporangiis ovatis cre&iuiculis, operculo conico - acuminato sub-obliquo. Dillen. hiftor. musc. Tab. 34 fig. 7« Bried. mule, recent. Tom. II pars II. pag. 34. Tab. 1 fig. 2.

Hypnum complanatum L.

Ad truncos arborum. Sporangia vere maturant.

1028* *L. trichomanoides*, trunco procumbente ramofo; furculis vagis eredltiufulis; foliis distichis pterygoideis obtufis; fporangiis ovatis eredtis, operculo oblique roftellato. Dillen. hiftor. musc. Tab. 34 fig. g#

*Hypnum trichomanoides L**

In nemorosis 4) lvaticis ad truncos & radices arborum. Sporangia vere jam effoeta,

•* *Foliis diredtione cequali.*

3029. £, *Jericea*, trunco repente ramofo. ramia

confertis subdivisis ereAis, foliis lanceolato-acuminatis trinerviis; pedunculo tuberculato znediocri; fporangiis eredlis ovato - oblon^is. operculo conico acurninato. Hedw# Stirp crypt. IV. pag. 43. Tab. 17,

Hypnum Jericeum L.

Ad truncos arborum praefertim falicum. Sero autumno & hienie optimé \igpi

1030. *L. dendroides*, truuco credo, fafciculatin) ramof; ramis teretibus lubfimplicibus erectis; foliis ovato - lanceolatis, concavis fub apicem Terrulatis; fporangiis ovato - oblongis erectis, operculo conico - ariftato. Flor. Dan. Tab. 823 fig. 2.

Ifypnum dendroides L.

In pratis ac pafcuis humidis. Sporangia hieme & initio veris in optime vigore legi.

1031. *L. polyantha*, trunco repente ramofifimo multifloro; ramis confertis, fubfimplicibus, apice incurviufculis; foliis l.mceolatis exfafciculatis; fporangiis cre&is ovatis, operculo e bafi conica acuininato. Hedw. Stirp. crypt IV. pag. 5. Tab. II.

In umbrofo loco pineti circa *Birkeröd* ad radicibus *Ericas vulgaris*, vere cum fporangiis maturis reperi#

1032. *L. polycarpa*, trunco procumbente ramofifino; furculis fimplicibus ramosisque confertis, junioribus ere&is; foliis imbricatis a^>preffis, ovsito-lanceolatis duAulorum fafciculo

7 6 *Cryptógamia. C. Mufcú*

~~in~~fructi*; fporangiis cylindricis erectis, oper*
eulo cunico, Kiipd mufc. rec. Tom. H-
Pars If. pag. 45, Tab. I. fig. 3 & Talx VI.
fig- 5

Ad truncos & radices arborum. jEftate fporan-
gia effoeta crant.

1055. *L.fubtilis*7 trunco repente ramofo; ramu-
lis confertis fimplicibus iilifornibus, eredli-
ufculis; foliis exiguis remotiufculis linear)
lanceolatis exfafculdtis; fporangiis fubincli-
natis cylindricis, operculo acute conico* Hedw*
Stirp. crypt. IV. pag 29. Tab. IX.

Ad truncos & radices arborum. -/Eftate fporan-
giis vigentibus.

5941 *Hyp num.*

Sporangium oblongum ;• periftomii externi den*
tibus fedecim acutis reflexilibus: interni membr-
anula a?quali laciniata: laciniis latiulculis cum
interjcdllis capilldribui Flos mafculus gemma-
ceus femiieusque axillaris in diftindlo individuo*

a. *Surculo JImpHci vel JubJimplicU*

1034 // *denticulatum*, trunco brevi deprrffo fim-
pliciufculo; foliis tblique ex ovato-lanccola-
tis imbricdto-bifariis, ppdunculis fubbdSjia*
ribus; fporangiis inclinatis cylindricis, oper-
culo acute conico. Hedw. Stirp. crypt. IV.
peg. 81 Tab. XXXI.

In umbrosi.% ad radices arborum* Vere ~~viget.~~

1035. *ff. fylvaticum*, trunco brevi depresso furculis subdivisis; foliis simpliciter bifariis, ovato-lanceolatis, acutis; pedunculis lateralibus; sporangiis inclinatis elongatis, sterulo conico longe acuminato. Bried. *jaufc*, xec, Tom. II P. I. pag. 55. Tab. L fig. 5. Dill. *hft. mufc.* Tab. 54 fig. 6.

In umbrosis, humidis, alnetis. Vere viget & aetate maturat.

b. Sterulo pinnatim rarnofa, foliis Jecundis,

1036. *H. ftlicinwn*, furculis decumbentibus, florigeris erediufulis, tomento interfoliario conglomerato obfita; foliis lanceolatis acuminatis, recurvis {exfasciculatis} sporangiis nutantibus fabcylindricis, sterulo conico acutifculo. Dillen. *hftor. mufc.* Tab. 36. fig. 19. *Flor. Dan.* Tab, 1125-1.

In rivulo fcaturigine deducto Aujufto fine ulla veftigo fporangiarum legi. *Fed Ordrups-Mofen.*
In uno eodemque cccfpite Jurculi Jimpliciter piunata v atque compojlta crant, €? optima cum Jiguris Dillen. nee non Flor. Dan conveniunt. Fajciculus in ullo folio (tetegere non potui.

1037. *H. crista casirenfis*, furculis procumbentibus, ramosis, ramis simpliciter pinnatis; pin-
His confertis, decrefcentibus, apicibus.revo-
lutis, crispis; foliis ovato-lanceolatis acumi-
aatis. contoriis, exfasciculatis, concavis; spo-

rangiis obliquis crasfiufculis, operculo conico obtufo. Hedw, fpec. mufc. Tab. LXXVI. fig. 1-4.

[3. *mollufcum*. Hedw. Siirp. crypt. IV. pag. 56. Tab. SXII.

In fylvis, nemorofis; j3 i *Ermelund-Skov paa venjire Haand igiennem Jagtporten opad Bakhen ved en Grdvt.*

1038- *H. comprejfum*, furculis procumbentibus, x4) mofo-pinnatis, compreffis; pinnis laxioribtt⁵ fubinordinatis, apice recurvis; foliis cordate lanceolatis oblique acuminatis fafciculatis pa* tentiufculis; perichsetialibus exterioribus ovato lanceolatis reflexiufculis, caeteris caulinis lon* gioribus lineari lanceolatis acumine pilifor* lui^ alba, nervo ftriisque inftruclis; fporangii* fubcylindricis nutantibus, operculo conico_f acuto. Dillen. liiftor* mufc. Tab. 36. fig. 22. B?

In fylvis udis ad terram, jftate cum fporangiis fubmaturis.

1039. *H. plumofum*, furculis reptantibus ramosis ramulis fubbifaviis inordinate difpofitis inflexiufculis; foliis lanceolatis acumine atte* nuato, ereclis imbricatisj fporangiis in pedunculo fubpollicari laevi rubenti apice pallido virefcenti fubcernuis ovatis, operculo conico acuto. Hedw. crypt IV. pag. 37 Tab. 15.

Ad arborum truncos & radi* es. Primo vere cum fporangiis vigentibus le^i.

e. Surculo pinnato > foliis non fecundis.

1040* // *proliferum*, furculis proliferis duplicato-pinnatis, caule purpureo; foliis imbricatis ovato-lanceolatis apice piliformi; pedunculis aggregatis; fporangiis cylindricis incurvis, operculo e basi conica rostro re&iusculo. Vaill Bot. Par. Tab. 29 fig. 1.

In fylvis, nemoribus. Vere viget.

t04i, *H. parietinum*, furculis divisis fubtriplicato-pinnatis^ caule viridi; foliis imbricatis lan* ceolatis, apice piliformi, longitudinaliter rugofis; pedunculis aggregatis; fporangiis fubcernuis ovato-oblongis, operculo e basi conica corviroftra. Vaill. Bot Par. Tab. 25. fig. !• Dillen. hiftor. mufc. Tab. 35 fig. 14, In fylvis abiegnis, ericetis. Vere cum fporangiis vigentibus.

X042. *H. prcchnum*, furculis decumbentibus fub irregulariter pinnatis, pinnis laxis fubramofis; foliis laxe imbricatis ovato-lanceolatis; fporangiis nutantibus oblongis operculo conico roftro longo curvo. Hedw* Stirp. crypt, pag. 76. Tab. XXIX.

In truncis arborunu Vere cum fporangiis vigentibus nee non effoetis reperi.

1043. *H. cufpidatum*, truncis fubereftis ramolis; ramis fimpliciter pinnatis; pinnis brevibus, luperioribus longe cufpidatis; foliis ovatis acuminatis exafpiculatis; fupreius convolutis lon-

•gloribus obttifiufculis', fporangiis nutantibu
'Ovato cylindricis o.perculo conico obtufo. DM
hifu mule. Tab. 59 fig. 54.

In mufcosis, paludi'bus, pratis uliginosis, Apr.
& May. l'porangia optime v gent.

1044. // *nitens.*, trunco erecto vob ascendenti
limpliciter pinnato, pinnis approximat's bre
Tisfimis apice attonuatis, fuprom's Tub con
voiuto cu'fpidaiis; foliis frnbroato pntulis, lan
-ceolatis apice piliforjni, i'triatis-; penchaetiali'
'bus longisFim's luculentms ftri's obtufis;
fporartgiis mclinatis, ovatis, operculo conico
•acutnilVulo. DiMen. hift, mtrfc. Tab. -59. fig
57, habitum nofirae plantae opt'me va onfirat.

In paluftribus turlbsls, uliginosis; *i Ordrup-Moji*
t)ed Kalkhrcenderiet uden for Kaftellet. Æliate
Xporangia matura.

-P- *fuftigiatwn, trunco altiori & crrrjiori, fin*
nis 'denfifime ohftis, apice innovatioiih
uficialibus fesquiwicialibus filiformibus f'
ftigiat's.

iy, hwnile, t?imco pbllicari fuhhipollicari in
feme pinms rarioribiis, Japerne innovate
Jiibiis fuhpollicaribus fubfafti^iatis,

1045. *IT. Schreberi*, tranco Cubere&o fubdivifo fim
pliciter pnnato p inn is incurvatis compresiJ
Tculis, foliis oblongis autis lax-e imbricate
perichaetialibusque exterioribus brevioribus &

recurvis interioribus longioribus ere&is subapiculatis, pallidis, exfasciatis; sporangiis subcylindricis inclinatis, operculo conico. Dillen. hift. mufc. Tab. 40 fig. 47. Vaill. Bot. Par. Tab. 29 fig. 10.

In locis umbrosis, paucis subhumidis, ericetis. Januario & Febr. capsulis jam effoetis legi.

1046. // *purum*, trunco subere&o ramofo, ramis procumbentibus simpliciter pinnatis, pinnis teretibus incurvatis; foliis imbricatis ovatis concavis mucronulatis subfasciculatis perichetialibus erectis, elongato-lanceolatis; convolutis, apice pilifonni; sporangiis rubrocylindricis cernuis, operculo acute conico subincurvo. Vaill. B<*. Par. Tab. 28 fig. 3. Dillen. hift. mufc. Tab. 40. fig. 45,

In fylvis & paucis. Vere sporangiis effoetis.

1047. *£ *illegitimum*, trunco vago procumbente ramofo, ramis inordinate pinnatis, pinnis teretibus obtusis, foliis dense imbricatis, concavis, ovatis obtusiusculis mucronatis; sporangiis oblongis erectiusculo inclinatis, operculo conico acuminato. Dillen. hift. mufc. Tab. 4^ fig. 46. Hedw. fpec. mufc. pag. 25a Tab. LXVI fig. 1 - 2.

¶ «* folvis paucisque ad terrain. Vere rari (Em) »
fporangiis vigentibus vidi.

1048. *H- erasfum*, trunco erecto laxo flexili spithameo & ultra inferne simpliciter pinnato, superne ramo pinnato; pinnis longitudine inaequali **cy liadricis**, crassis sparsis, hinc inde curvatis obtusifculis; ¹ foliis ramis & pinnis undique circumpositis, ovatis, cum acumine obtuso falcato subreflexo, concavis, supremis fuscis involucri laeviter striatis; **perichastialibus** erectis longis, lanceolatis, acumine piliformi striatis; setis subnuncialibus & ultra, erectis, laevibus, terminalibus, lateralibus; sporangiis primo subinclinatis post evacuationem permanentibus vix cernuis, obscure fuscis, operculo conico acuto*

Specabilem hanc plantulam solummodo in palude semper inundata, vulgo *Lyngbye - Mop* Julio sporangiis vigentibus & effoetis legi.

Cum H. cordifolio Swartz. maxime conveniat cuius figura autem Hedwigii IF Tab. 57. haud bene respondet.

d. Surculo confertim ramofo.

** foliis directione aequali,*

1049. *Il» velutinum*, trunco prostrato repente, ramis confertis erectis, simplicibus foliis confertiusculis patentibus lanceolatis, acumine filiformi; perichastialibus interioribus crinitis*; sporangiis ovatis nutantibus; operculo conico obtusiusculo. Hedw. Stirp. crypt. IV pag. 70 Tab. XXVII.

In aggeribus, pratis, ad arborum truncos & radices. Sporangii vigentibus autumno — initio aestatis.

p. *foliis obtusioribus sporangii vigentibus subventricosis, operculo conico, acutifculo.*

1050. *IL intricatum*, trunco prostrato repente; ramis confertis inaequalibus subfiliformibus eredliufculis; foliis la**i*us imbricatis, patentibus, lanceolatis, filiformi-acuminutis; perichetialibus oblongo-lanceolatis; sporangii multianlibus ventricosiss, operculo conico acuto# Hedw. Stirp. crypt IV. pag. 73 Tab. XXVIII.

In locis umbrosis supra lapides, osfa, in truncis arborum. Autumno in optimo vigore legi.

1051. *II. ferpens*, trunco repente ramoso, ramis confertis subsimplicibus filiformibus subrectis; foliis laxis subulato-lanceolatis, minimis; sporangii e basi angustata sensim dilatatis, cernuis, operculo convexo breviter acuminato. Hedw. Stirp. cryptogam. IV. pag. 45. Tab. XVIII.

a. *repens*, ramis repentibus, subpinnatis, pinnis perbrevis inordinatis; foliis laxepatulis nunc lanceolatis nunc cordato lanceolatis acumine filiformi. Vaill. Bot. Par. Tab. a8 % 2.

b. *excentricum*, ramis pro maxima parte ex centro ad peripheriam radiatim repentibus per tomentum validum rufum coherentibus. denique Dinnatis. pixuis inaequa-

libus simplicibus vel iterum ramosis, filiformibus, ferotinis ferrugineis, annoliuis viridibus & subincrassatis, subadscendentibus; foliis lanceolatis filiformi-acuminatis erecto-patulis imbricatis subduobus. Dill, hiftor. mufc. Tab 42 fig. 64.

c. *crispabUe_x* ramis repentibus, pinnis filiformibus erectiufculis ficitate subcrispabilibus; foliis lanceolatis minus acuminatis imbricatim appreffis; fporangiis omnium minoribus ac fetis brevioribus%

d, *cylindricum*, ramis repentibus pinnatis pinnis perbrevibus inordinatis; foliis erecto-patulis lanceolatis acuminatis; fporangiis cylindricis an/rutis sub annulo coartatis inclinatis, operculo convexo acumine obtusifrufo amoene rubro.

c. *macrocarpon*, pinnis capillaribus erectiufculis; foliis minutissimis lanceolatis apice filiformi patentibus; fporangiis ovato oblongis cprntio-incl'natis omnium maximis.

In humidis umbrosis, ad radices avborum, in asferibus vetuftis, fupra lapides &c. May. & Jun. fporangiis vigentibus legi.

*** foliis fecundis reflexis**

1052. // *pair/fire*, trunco dccumbente, repente; furculis subore(5tis femiuncialibus uncialibusque simplicibus, foliis in feminica pi ant a subheteromalleis in malwula redliufculis, lan

ccolatis, concavis, fubrecurvis, exfasciculatis;
fporangiis oblongis cernuis, operculo conico
mucrone obtusifuculo brevi. // *lur'ulum*
Hedw. Stirp. crypt. IV pag. 99 Tab. XXXV'1H.
In afferibus femiputridis; *veil Fu&levud-Mo'Ue,*
hvor det ftore Valid-Hiul gaaet\ Junio fpo-
xaiigia maturat.

e. Surculo vage ramofo.

• *foliis distichis.*

1053. *IL undulatum*, trunco procumbente parum
ramofo ramis complanatis ruims pinnatis;
foliis bifdriarn irnbricatis, ovatis acutis, rugis
vagus paffim notntis, fubdudltulosis; fporan-
giis fubcernu's fubcylindricis, operculo conico
acuto. Dillen. hlftor. mule. Tab. 36 fig. 11.
In fylvis od ttrram denfis ceefpitibus. -tfi-ftate
fporangiis jam effoetis rceperi,

** *foliis Jecundis reflexisve.*

J054. *H. aduncum*, trunco ercrtto vage ramofo;
rair\§ fimplicibus uncinatis; foliis ovato-lan-
ceolatis apice fetaceis falcatis reflexis fecun-
dis, ftriatis; fporangiis inclinato-cernuis ovato
cylindricis, operculo convexo acuminato. Hedw.
Stirp, crypt, pag. 62. Tab. XXIV.

In paludibus, aquis ftagnantibus, ^Eftate fpo-
rangiis maturis.

¹⁰55. *H. cufftrijiforme*, el'cumiiens, ramis Tub-
/ninnatis incurviufculis foUis ovato-lanceola^

tis acumine falcate, subfecundis concavis ex*
 fasciculatis; sporangiis subcylindricis subcer-
 jiuis, operculo conico - acuminato. Hedw»
 Stirp. [^]crypt. IV pag. 59 Tab. XXIII.

a. *lacunofum*, furculo repente ramisque in*
 crassatis a: brevioribus; foliis ovato acumi*
 natis, subfecundis fusco-rufescentibus, cras-
 sioribus lacunosis.

b. *longifetnm*, pedunculis longioribus; spo*
 rangiis cernuis, operculi rostello longiori
 Jenuisfimo obliquo (foliis lanceolatis acu^
 mine falcato).

C *JiHforme*, ramis pendulis vagis Eliforini-
 bus; foliis patentiusculis retflis; sporangiis
 rebtis operculo acumine acutissimo. Ra-
 rius cum copulis invenitur.

Ad arborum truncos & radices, ad terram in
 fylv^s pratis ericetis 5 a. supra ldpidcs. Autumno
 tc hicme viget.

1056. // *scorpioides*, trunco procumbente vag«
 ram^fo; ramis recurviusculis fragilibus; foliis^s
 inferioribus laxis; superioribus imbricatis lan*
 ceolato-acuminatis subfecundis concavis ftria-
 tis; sporangiis cernuis subcylindricis, operculo
 conico rostello inflexo. Dillen. hiftor. mufc
 Tab. 37 fig. 25.

In paludis tuifosis, Temper autem sporangn^s
 destitutis inveni; i *Ordrups-Mofen*.

1057. *H. hreum*, trunco iTpente, vage ramofo; xamis fubrimplicibus, a[^]ice incurvis; foliis lanceolato - fubulatis, carinatis, patulo-reflexis, fubfecundis, baK liriatis; fporangiis cernuis, ovatis, operculo convexo acutiufculo. Dillen. hiftor. xmufo. Tab. 59 fig. 40.

Ad terram in ericetis fylvaiicis; ved *Birkcro&i* iEftate fporangiis vigentiims legi.

1058. *H. ffjuarrofum*, trunco adfcendente, vagt ramofo; ram:s fuhere&fs, apicem verfus atenuatis increffatisque, incurviufculis; foliis lanceolato-fubulatis quinquefariam recurvis, hofi carinatis; fporahgiis ovatis cernuis vel fubnutantibus, operculo brevi conico obtufo. Flor. Dan. Tab. 53.5 fig. 1. Dillen. hiftor. mufo. Tab. 59 fig. 38.

Ad terram in fylvis, pratis, -pafcuis, in fosGs humidis. Vere cum fporangiis vigentibus floribusque novellis reperi.

a, *minor*; omnibus partibus minoribus ac tenioribus. Flor. Dan. Tab. 64s fig. 3- Varietatem hanc in ericetis circa Birkerod legi.

• *foliis diredtione ccquali*

1059. *//. atrovirens*, trunco repente vage ramofo; xamis filiformibus divaricatis; foliis ovato-acuminatis, laxe difpofitis exfafciculatis; Tporangiis ovatis cernuis, operculo brevioro. Dillen. hiftor. mufo Tab. 48. fig. 67-

Ad arbores. jfiftate fporangiis znaturis#

1060. // *triquetrarif* trunco erecto ramofo; ramis pinnato - fparfis recurvatis, ramulisque fubincrassatis patentiffimis; fporangiis ovatis nutantibus, operculo conico acumino exiguo., Dillen. h'itor. iriufc. Tob. 33 fig. 28.

In fylvis, pratis ericetosis. Vere fporangia matu-
tua vidi.

1061. // *loHgirostrum*, trunco depressiusculo fubrepente ramofo; ramulis apicem versus attenuatis, incurvatis; foliis triquetro - lanceolatis, patentibus ftriatis; fporangiis nutantibus fubcylindricis arcuatis, operculo longe &c obliquostrato. *IL/triatum*. Hedw. Stirp. crypt. IV pag. 32 fig. 13.

In fylvis, pinetis ad terram, *ved Klampenborg i Dyrhaven*. Junio cum fporangiis maturis.

1061. *H. rutabuium*, trunco procumbente vario; ramis tevetiukulis erectiusculis fubramosis; foliis lanceolato-acuminatis concavis patuli magis minusve ftriatis; fporangiis ovatis cerixis e podunculo muriculato, operculo conico acutiufculo, opice fphaceloto. Hedw. Stirp. cryptog IV. pag. 2;. Tab. XII.

{*Folia in innovationibus annotinis nonnunquam acuta nec acuminata* Praeterea species haec polymorpha frequenti modo variat*

a. foliis acutis vel subacuminatis; fporangiis ovatis operculo exacte conico atufusculo.

*b** foliis acuminatis; sporangiis ovato-cylindricis suborbiculis, operculo conico acumina **elongate**

c. foliis acuminatis; sporangiis cylindricis arcuatis, operculo **longirostro acuto.**

* *d.* foliis at'uminalis apice subpiliformibus, sporangiis ovato-cylindricis, operculo conico-acuminae elongate

In arborum truncis rarius, vulgatius ad terram in fronsis, prntis, umbrosis humiculis, furculis, **Ompliciulculis** crectiulculis', nee non ramofis decumbentibus implexis invenitur. Hieme & Vere sporangia vident & maturant.

1065. *II_k piliferum*, trunco decumbente, arnis vagis subpinnatis, ramulis attenuatis declinatis; foliis ovatis concavis acumine piliforme, areffiuIVulis ball ftriatis; sporangiis cernuis arcuato-cylindricis operculo xoftrato. Hedw. Stirp. crypt. IV. pag 35 Tab. XIV.

In umbrofis ad terram. Vere sporangia piane effoeto.

1064. *II. alhicans* trunco adfeendente vage ramofis; ramis ereAiufulis teretibus: foliis ovato-lanceolatis apice fetaceo, arde imbricalis, triUerviis; sporangiis ovatis cernuis, **operculo conico apiculato**, Hedw. Stirp. crypt. IV. pag. 15. Tab. V.

1[^] arenosis ficcis, ved Stranden imcliem Oiar-
• *kttenhtnd og Skovshoved** Julio cum sporangiU

go *Cryptogamia. C. Mufci.*

1065. *H. curvatum*, caule repente vage ramofo, ramis fubfimplicibus fubfafciculatis, ramulii utrinque attenuatis incurvis; foliis denfe imbricatis, ova to lanceolatis acutiufculis concavis fubnerviis; fporangiis erectis, oblongo-ovatis, operculo conico fubincurvo. *Hypru myofuroides*. Hedw. Stirp. crypt. IV. pag. 20 Tab. VIII.

In umbrosis locis ad arborum truncos & radices vel ad terrain. Febr. & Mart, cum fporangiis vigentibus legi.

lobd *H. myofuroides*, trunco repente vage ramofo; ramis erectiufculis pinnato-fafciculatoque ratnofis, ramulis teretibus fubfubulatis fubincurvatis; -foliis imbricatis patentiufculis ovato-lanceolatis apice fetaceis, fupremis fubfecundis; fporangiss ovato - oblongis inclinato-cernuis, operculo conico acuminato. Dillenhiit. mufc. Tab. 41 fig. 51.

Ad truncos arborum, fuper faxa. *JESidXe* fporangiis maturis inveni.

IC67. // *populcum*, trunco repente vage ramofo ramis fubfimplicibus ramulis teretibus fub filiiformibus erectiufculis acutiufculis; foliis fubremotis, caulinis ovatis, rameis lanceolatis, apice fubfetaceis, fasciculo infructis, imbricatis; fporangiis ovato - pyriformibus, ~~erectiufculis~~, operculo convexo mucronulato; ~~seta~~ brrvi, quatuor — fex linearis. Hedw. *Spec-musc j>a&_27Q-* Tab. LXX fig. 1—5

Ad truncos arborum, præfertim Popula albæ & faluuin. Primo vere cum Iporangiis maturis legi.

1068. *H. riparium*, trunco proftrato varie divifo; xamis coniplanatis radicanribus; foliis ovato-lanceolatis, acutis, izucgerrimis, difiichis; fporangiis ovatis cernuis, operculo e ball convexa acuminato. Hedw. Stirp. gryptog. IV. pag. 7. Tab. IIL

Ad palos, lapides in rivulis; ved *Fuglevad-Mülle*; i *Vand-Kanalen* ^ fom leder *Vandet fm Sdeborge-Huus til Falkoneer - Gaarden*. Jun. & Jul. fporangia vigent.

1069. *H-* "toZ/1, trunco filiformi pendulo vel fluitante, vage idfciculatimque ramofo, ramis obtijlufculis; foliis imbricatis, ovatis, acutis concavis fubexfafciculatis pellucidis; fporangiis fubovatis ereclis cernuisque. Hedw. fpec# xnufc. pag. 273. Tab. LXX fig. ?— -10. DikC. fafc II. pag. n. Tab. 5 fig. 8-

Ad marginem fosfe hième aqua ducntis in pineto circa *Birkeröd*. April, cum fporangiif Jam effoetis legi.

- ~*o7o. // *ftellatum*, trunco eredto ramofo, ramit comprelTiufculis fubflfciculatim difpofitis; foliis lanceolatis longislime acuminatis, fafciculo tenuiffimo infiruAis imbricatis parfter P«tentibus; perichaetialibus ereAis in cylindrum convolutis loneioribus apice piliformi ^ ~~linentibus~~ fporangiit ovalo * cylindrüii in*

9* *Cryptogamicu C. Mufci.*

clinato-cernuis, operculo convexo, acumi*
brevi aculo subincurvo. Dillen. histor. musc
Tab. 39. % 55. Bried Tab VL f. ^ ^

In palude inundato (*Lyngbye-Mofej Juho ci*
capfulis **mtturis** legi.

In mafcuiU individuis folia ad ramorum e*
tremaatum fuUatim difpofu, unde fpecifi-
cum nomen, & furculus fuhfimplex. Bried.

1071. // *flmtans*, trunco gracili longo vel lon-
gishmo, vage ramolo, ramii fuhfimplicibus;
folw laxe trifarii. oblongo - lanceolatis acu-
minat,s; pedunculis imerdmn longiffimus;
fporangns oblongis cernuis operculo convexo
acuto Hedw. Stirp. crypt. IV. p_{agi} 94 fig. 36.

In palud.W turfosis ubique. Vere '& «eftat.
fporangia vigent.

D. HEPATIC JL

hungermannia. Flos masculus feffilis nudus.

Flos jwvneus: Sporangium subrotundum fetæ nudas inBdens unikhulare, apice dehUfcens qutdrivalve. Semen minutissimum filis capillaribus adnexum.

Marchantia. Flos masculus peltatus, peduft-
<ulatus. Flos femineus: Sporangiiis obova-
tis, receptaculo comtnuni pedunculato affixis,
unilocuUribus, apice dehifcentibus: dentibus
Tub octnnis. Semina filis in helicem contor-
tiS) clasticis adnala.

Anthocerus. Sporangium lineare fubulatum
ad bafin calyce monophyllo truncato vagi-
natum, femibivalve. Columella libera, a bail
ad apicem extenfa. Semina difepimento ad-
haerentia.

&lana. Flos mafcnlus feffilis fubglobofus frondi
immerfus. Frmineus: Sporangium nudum
frondi iinmerfum, ovato-obliquum, unilo-
culare, tubo hiante, pexfiftente terminatum.

miccia. Sporang um nudum, frondi immerfum,
gl bofuni, uniloculare tubo deciduo teriaai-
atum.

D. HEPATICJE,

595. *Jungerm annia.*

Flos majculus feffilis nudus.

Flos feminent. **Sporangium** fubrotundum fet
nud® infrdens, uniloculare, apke dehifcens
quadrivalve. Semen* minutufiruuni filis capilla
ribus adnexum.

a, *Caidefcen.es.*

* *foliis bifariis,*

1073. I* *viticidofa*^ caulibus adfeendentibus, fup
ba fin **iru**<5**tiferis**; **ftu** ru l i s Tub r a mofis; fo l i i s lu
rotundis, margine integerrimis, planis. Di
hilt. mule. Tab. 69 tig. 7.

In fylvis 8c nemoribus. Vere viget.

*°73» ^ *ifr&gi&Sy* caulibus profratis? dichotom
foliis diftichis alternis, fubrotundis, bafi cu
caule confiuentibus; calycibus lateralibus; feta
fubundali alba; capfula oblonga valvulis li
xiearibus. < Michel, gener. pi. pag. 8- Tab 5
fig. 3. O. O.

In fofsis & cryptis turfosis. May. & Jun. cum
capfulis vigentibus legi.

1074. X *compadla*, caulibus depreffis compaf.i^{S)}
foliis diftichis fubrotundis Iffiviter emargin*^{1,}
tis fubconduplicatis lobulis rotundatis ®qu*^{1,}
libus, integerrimis; calycibus terminalib[^]
Roth. Tent. Flor. German. Tom. III. p. J
pas. 5⁷⁵-

In Immiclis pineti ac ericeti circa *Birkeröd*
*estate fine capfulis vidi.

1075, & *polianthos*, caulibus repentibus, ramofis;
foliis fubrotundis, convexis, integerrimis di-
flichis fubimbricatis; calycibus lateralibus di-
midiatis; feta brevis Candida; capfula glo-
l)ca nigra nitida, valvulis ovalibus. Dillen.
liift. mufc. Tab. 70 fig. g.

In humidis mufcoiis, graminofis. Primo vere
fporangia vigent.

1076. /. *bicufpidata*? caulibus procumbentibus,
diffufis; foliis diftichis fubquadratis, apice acuta
emarginatis, bicufpidatis; calycibus lateralibus.
Sihtnidel. Icon & Analyf. png. 244. Tab. B,
In umbrofis humidis ad orborum radices. Vere

1077- *J* albicans*, caulibus fubraniofis planis; fo-
liis auriculisque oblongis, obtufis, obliquis,
apice Terrulatis; calycibus terminalibus latera-
libusve, oblongis, albidis apice denticulatis;
feta **fabunciaii** albida; **fporangiii** fubglobofis,
valvulis fublineaxibus. Dilkn. liift. raufc. Tab.
71. 6g. -20.

In fubhumidi* ericetorum cespitibus denfis. Vere
cum i'porangas inveni.

•* *foliis imbricatis.*

1078. *J. reptans*, caulibus repentibus medio fructi-
fens; foliis ftipulisque laxis, fubirabricatis quae a-
^^ ***l'atis**, apice fubquadrifidis; calycibus trique-

tris, **tnfalcil** ball imbricatis; feta **femipollicari** alba; **fportngitt** globosis fusco-purpureis, valvulis sublineariibus obtusis. DiH. lrtor. in. ifc. Tab. 71 fig. 24.

In huncurdis **turfosis**, Ve:e sporangia vigent.

1079. /• *Trichomanis*, conilibus prostratis confertis **brevibus** inferne fructiferis; foliis ovatis convexis **fobistegri**, subimbricatis stipulis fere rotundis emarginatis; calycibus cartilagineis; fere subfemipollicari haud ultra; sporangiis oblongo-ovatis, valvulis linearibus tenuibus. DiH. Plant. Aegypt. Fasc. 5 pag. 10. Tab. 8 fig. 5»

In **mucofis**, gromimis. **Viget** Apr. & May.

1080. *J. jmsiua*, **vsculibus** repentibus brevissimis subramosis; foliis distichis **imbricatis** obovatis **obliquis** apice fere venulatis; calycibus terminalibus alternisve, magnis, angustis, apice truncatis, plicatis, basi foliis laxis cernitis; setula brevi; sporangiis subrotundis valvulis orbatis. Schmidel. Icon. & Analyf. pag. 82 Tab. 22.

In alienigenis, ericetis, ad folia. iEstate viget

1081- *J. complanata*, caulibus repentibus, complantibus; foliis stipulisque rotundatis, plenis **iiuegerimis**, densissime imbricatis; calycibus oblongis compressis; feta brevissima; sporangiis subrotundis nigricantibus, valvulis longis **latif-** Flor. Dan. Tab. 1062.

Ad arborum truncos, faxa. Autumno videntur **bus** sporangiis legi.

1082. *J. platyphylla*, caulibus procumbentibus, foliis ovatis imbricatis, stipulis integerrimis margine revolutis, internodiis duplo majoribus, calycibus lateralibus & axillaribus, ovatis, obsolete triquetris; feta brevi; sporangiis subrotundis fuscis, valvulis lauceolatis acutiusculis. Dillen. hilor. musc, Tab. 7» fig. 32.

Ad arborum truncos. Primo vere.

1083. *J. dilatata*, caulibus repentibus, foliis rotundatis, imbricatis adpressis, stipulis lateralibus ovatis intermediis bifidis, marginibus revolutis approximatis; calycibus acute quadrangulis ovatis, superne contradatis, lacinatis; feta brevissima; sporangiis subglobosis, valvulis ovatis. Schmidel. Icon. & Analyf. pag. 356 Tab. 67.

Ad arborum cortices. Vere viget.

*1084. *J. tamariscifolia* caulibus repentibus; foliis rotundatis, imbricatis, laxius fere incumbentibus, stipulis lateralibus rotundatis, intermediis ovatis bifidis, planis remotis.

Ad truncos arborum. Vere.

b. Acaules.

1085. *J. epiphylla*, fronde foliacea, obverse ovata, obtuse lobata, medio fructifera; feta subcompressa nitida, fere ad biunciali; sporangiis globosis fusco nigricantibus nitidis; valvulis

9 8 *Cryptogamicu D. llepaticct.*

ovatts, ob tufts, pnllefceniibus; capillitio -pedi
cellato. 1 **Ldr.** Dan. Tab, 559.

In humidis, fofis fubexficatis, Vere fporafi
giis optime vigentibus legi.

io8t>- *J Pir}r,uls->* **frondibus** carnofis, obloneis, di
chotomis, .lariniatis, latere frudtiferis; feta
crasfiuscula albida fubunciali; **fporangiis** ob
longo-ovatis, nigris, lucidis, valvulis oblon
gis. Schmidel. Icon. & Analyf. pag. 136
Tab. 35.

In udis, / paludibus turfosis; *Ordrup - Moftr*
Vere.

1087* *J. furcata*, frondibus foliaceis, linearibu
dichotomis costatis integerrinis apice ema
ginatis fubtus **fratfliferis**; feta tenuiffima per
brevis; fporangiis exiguis ovato- fubrotundis
fufcis. Dillon, hiftor. mufc. Tab. 74 fig. fJ
Ad truncos Coryli avellaneae. Vere.

396. *Marchantia*,

Flos mafculus, pedunculatus peltatus. Flos *e
jnineus: Sporanpiis oboyatis, receptaculo com
muni pedunculate) affixis, **unilocularibus**: den
tibus i'ubottonis. Somiaa filis in helicem cot
tortis. **elaficis** adnata

1086- *M. polymorpha*, frondibus obtufe lobat'
receptaculo marurn odto vel decernlobato;
bis rotundatis crenulatis: feminearum co
vexiufulculo dcrem vel duodecimfido; lci¹¹
linearibus; concepUcuii* cam panulatis pro

Cryptogamia. D. Hepatica. gg

paginae includentibus in disco frondis. Schmid. Icon. & Analyf pag. 58 Tab. 9 & pag. 106 Tab. 29.

In locis humidis, uliginosis. -/Estate viget.

3⁷. *Anthoceros,*

Sporangium lineare fubulatum ad bafin calycis
jnonoph} llo truncato vaginatum, femibi valve.
Columella libera a bafi ad apicem extenfa. Semina difpimento adhaerentia.

1089. -[^] *P^{un}([^]atHσ%* fronde crispa finuato-lacinia-
ta; Ipordn[^]iis ercdlis, fubuncialibus, linearibus fubuldtis, in disco frondis''difpofitis; valvulis lineaiibus extus convexis. Flor. Dan. Tab. 596. Schmid. Icon &c Analyf. pag. i83-Tab. 47.

In agris post mensem* Viget Sept. OAobr.

398. *Blasia.*

Flos masculus fevilis fubglobolus frondi immerfus.

Flos femineus, Sporangium nudum, frondi immerfum ovato - obliquum, uniloculare, tubo hiantft perficiente terminatum.

1090.. *B. pufilla,* frondibus vel Tolitaiisi & in orbem expands vel in caefyitem tongeftis & imbricatim fibi incumbentibus, obtufe lobatii margine crispatis; fgorangiis in dilco ffoxulii

100 *CryptogamicL D. Hepatkas.*

verfus marginem difpofitis, eredtis. Flor.
Dan. Tab. 45. Hofim. Deutfcht. Fl. Tab. 5.
Ad margines foffarum. Autumno vigot.

39Q. *Riceia.*

Sporangium nudum frondi immerfum globo-
fum, unilocuhre, tubo decidua terminatum.

* *terrejlrria.*

1091. *R. criftallina*₇ frondibus e centro communi
in orbem regulariter expanfis, lobatis (*hi feu
trilobis*') lobis emarginatis obtufiffimis, caver-
nofo-punctatis. Schmidel. Icon. 8c Analyf.
pa[^]. 176 Tab. 45 fig. 5.

In humidis, agris,, ac inundatis locis. ~~Ætate~~
legi.

1092?. *R. glauca*, frondibus in orbem expanfis,
znultipartitis diciotorais, apice bifidis fulca-
tis, obtufis. Fior. Dan. Tab. 898 fig. 1.

In agris, areolis Hortorum e. a. 1. copiofe. *ALtdt**
ac autumno,

1093_f *R. ciliaris*, frondibus in orbem expanfis 1
bipartitis, dichotomis, Jinearibus, apice bifi-
dis, concavis, lanceolatis, obtufiufculis, ratU-
culis fubmarginalibus ciliatis. Schmidel. Icon.
8c Analyf. pag. Tab. 45[^] fig. 4.

In locis hyeme inundatis fubcaepitofis. ~~Ætate.~~

• • *aquatiles.*

1094. *R. flultan*Sy frondibus repetito-dichototoi*
linearibus convexo-planis, l&vibus, teffellatu-

reticulatis apice obtufis bifidis. * Dillen. hilt, mule. Tab. 74 fig. 47.

ŷ. *canaliculata, frondibus canaiculatis lineari-multifidis dichotomis opaefs (niulto brevioribus).*

Tn paluclibus & aquis ftagnantibus ŷ in palud* fubexficcato ved *Lundehufet* legi. iEftate & autumnno.

1095. il. *capillaris*, frondibus elongatis irregulariter expansis, debilibus filiformi-linearibus, planiufculis, pellucidis, dichotomis, apice fubbilobis vèl Inviter retufis, lobis obtul'is, lateribus ciliatis. Flor. Dan. Tab. 275 haud male noftra planta monftrat fed minor.

In ftngnis caefpitis inter Birkerod & Rudergaard Autumnno plantulam hanc aque innatantem legi.

E. A L G Æ.

* *herbacea*..

Ulva. Herbaceo-membranacea, diaphana, fructificationum granules praefertim circa marg⁵-nem innatis.

Conferva. Tubuli vel Filamenta herbacea, in ternis parietibus fructificationum granulis adferta.

** *cartilagineae*.

Ceramium. Capulae submonopermae ad fructificationem parvae in *Filamentis* membranaceo-cartilagineis subgeniculatis.

Fucus. Vesiculae aggregatae in substantia frondis nidulantes, poris mucifluis praeditae.

••• *gelatinosa*•.

Rivularia. Substantia uniformis gelatinosa-cartilaginea, integumento membranaceo destituta.

Linckia. Substantia uniformis, gelatinosa, integumento membranaceo induta.

E. A L G JR.

400. *Ulva*.

Herbacea-membranacea diaphana, fructificationum granulis proferentibus circa marginem innatis.

1096. *U. latissima*, frondibus foliariis, oblongis, latissimis, planis, margine subundulatis:

In fundo maris copiosissima.

1097. *U. mesenteriformis*, frondibus foliariis, oblongis laevibus, plicatis, uncinatis, lacunosus, rugosis.

In fundo maris & non undis cum praecedente littore rejicitur; in fossis aquae marinae repletur etiam observatur.

401. *Conferva*.

Tubuli vel Filamenta herbacea, internis partibus fructificationum granulis adhaerentibus.

a» *Tubuliferae*.

* *continuae*: intermedionibus dejectis.

1098. *intestinalis* tubulis simplicibus, continuis, inflatis anfractuosis & finnohis.

§. *crispa*, tubulis conglomeratis maxime rugosis & crispis.

In littore maris lapidibus adhaerens invenitur, nec non in foris & fontibus submarinis.

Statu juniori filamenta a: filis filiformibus, tenuibus, tubulosis, in rectum magis protenduntur & late viridibus. In adultiore autem magis tubulosa finuosa diversimodis curvata in-

io.-{<

Cryptogamia. E. Algcz.

jlata, Jlavo-vircfcens, dcmioh ad uiharCf
& mdjorem longitzidinem acccdit & ad dia-
met rum non raro uncialem ampliatur. Rotb*
Cat. Fafc. 1. pag. 159.-*

*** Genucatet: interfedtionihus prccditcc.*

**1099. G crtnita, tubulis fi'b'formibn^, teretibus
longiffimis fubgenucatatis, rainons: ratnis *
bafi luberciilofa fparfis, capillLiribus finiplici-
bus, lon^is. Roth. Cat. Fafc. K pag. 162.
Tab. r fig. 3.**

Ab undis in littore rcjetfla.

b. Filmto fo.

** Fills cofii inu u simplicibus.*

**1100. C fontinais, fills dei fillimis, fimplicibus
brerifExnis cequalibus, Flor. Dan. Tab. 6*51-
fi*X. 5^.**

Ad fciluriginis.

** * Filament is continuh rajnosis.*

**1101. C bulhfa, filamentis Bequalihns dihotomis,
rnninliQiniTS denfilime Cfintoxtis, deinum bul-
las aereaa includentibus. Dillen. hift. nufc.
Tab. 5 6g. 11.**

In aquis ftognantibtur.

**1102. • '. an.pii.ihifT, filmmr'ijtis a?c|ualibn8, ramosis,
denliTrime <ompa. tis lateque expa nfis, fi
tntc a pice coeuntibut in acuteos. Dillcn. hift.
TnuV. Tab. 4 Hg. 17- C.**

In foffis, udU & urnbrosis loci?.

'p.- *punguis*, filamentis longioribus.

y. *air a*, fratis **den Gift mis, arris** vcl atro-yio-
la**ceis** nitentibus, in locis **buxnidis** umhw
fis oMervutur. ad foliar um margines
limoros, fubum^rofos.

1103. *C. frigifh*, filamentis **eequalibus**, **dichoto-**
mis, **capillanbtis**, **tenuibus**, **repen**tibus, in-
flexis; exficcati<me a pice diflinctis. Pi lien.
hif. mule. Tab. 4 fig. 17. A.

tn muris? trabibus, dilTepimentis ligncis fepten-
Itionem verfus* Hyemfe **k**, Tere **prsefertim** ob-
fervotur.

1104. *C. velutina*, filnrientis aequalibus, ramofis,
tenuiffimis, breviliirnis, deuriffime **compacti**«
latequ • cypatwis. **Roth.** Catalc(il. Fasc. 1,
pag. 166. Tab. 5 fig. 5.

Iu uoabrosis, margtries rivulorum &c lapides rela-
mino denfo, atropurpureo₇ inucofo, & femili-
neam fere crafro obducit,

1105. *C. ochracea*, filamentis **tequalibvw**, ramosis-
fimU teuun'icais, galatinam **ochracearn** tamt-ri
in FDCC^S fecedentein conftituentibus. **Re th.**
Catale6t. Vni'c, u pa^ 165, Tal>. 5. fig^T. 2.

Ad littorn **lacxrum** pceferthu ved **Furfde** &c art
ejus fcaturigines martiales.

1106. *C. JieUaris*, filamentis cequalibns e *hafi* **orbi-**
culavi parallelis, fuperuc ramosis. Flor. D;tn.
Tab. C>60 fig. 1.

Ad later* vaforum.

10\$ *Cryptogamia. E. Algas.*

1107. *C. fenestralis*, filamentis aequalibus, ramis
filiformibus, adpressis finuatis, gibbis, centrifugis
Ad fenestrarum vitra, vaporis copia Temper fer-
humata, scilicet in Nofodochio nostro, in Va-
porariis & aliis locis, maculis albidis, nitida-
dentatis, orbiculares se representat, cujus filamenta
1/2 nudo oculo observabilia, armato Unto
distinguenda.

** * *Filis simplicibus geniculatis.*

1108. *C. rivularis*, filis simplicibus longissimis
capillaribus, erectis, firmitate evidentius grani-
culatis: geniculis tenuissimis; articulis alter-
natis compressis. Fl.;. D. gi. Tab. 881.

In rivulis, *ved Papiers-Mdlicn.*

1109. *C. fcalaris* filis simplicibus, geniculatis ca-
pillaribus: primis saepe per tubulos trans-
versales ad, articulos conjugatos. Flor. Dan.
Tab. 885-

In lacubus,

1110. *C. fetiformis*, filis graniculatis simplicibus,
vagis; geniculis annularibus tenuissimis; ar-
ticulis brevibus, geniculo crassitie aequalibus,
reticulato fenestratis fructificationum granu-
lis duplicato - spiralibus. Roth. Catalett Fafe
», pag. 203 & Fafc. 1 pag. 171. Tab. 2 fig. 1[#]

1111. *htbrica*, filis tenuioribus, densioribus
bricis atro viridibus. Roth. 1. c. Tab. fig* *'

Flor. Dan. Tab. 819.

Im stagnis puteis.

111. *C. Linum*, filis simplicifris, geniculatis, teretibus rigidis, fere pentibus inflexis: geniculis annularibus, filiformibus pellucidis; articulis cylindricis obscuris. Dillen. hist. musc. Tab. g fig. 25. A.

In fundo maris, in *Sjælland og Amager*,

112. *C. capillaris*, filis simplicibus teretibus, geniculatis; geniculis linearibus tenuissimis, utrinque fere fuscis obvallatis; articulis oblongis sub obscuris.

In aquis dulcibus.

113. *C. fugicijima* filis geniculatis, simplicibus tenuissimis: geniculis obscuris articulis centro diaphanis. Roth. Catal. Fasc. 1. p. 176. Tab. 2. fig. 3.

Sub aqua pura, dulci, Arundinis Phragmitis foliis putrescentibus aliisque corporibus affixa.

114. *C. ferruginea*, filis membranaceis geniculatis, simplicibus, tenuissimis, articulis ovatis, angulosis, reticulato-pellucidis.

In Fucus vespertilio fere observatur.

115. *C. ericetorum*, filis membranaceis geniculatis, tenuissimis: geniculis parum contractis, obscuris violaceis; articulis paullo longioribus, in medio subincrassatis, pellucidis crystallinis.

In ericetis turfosis hiemis terram denudatam violaceo denso & adpressum elamine obducit.

•••• *Filamentis geniculatis ramojis.*

n\6. *C. crispata*, filamentis geniculatis, dichliotomis, capillaribus, densifilims iuflexis: geniculis tenuiflimis; articulis oblongis, linea spirali puleherrime piclis ficitate alternatim comprcJlis.

Arl (uperficiem aquarxim ftagnantium /dulcium casfpitibus magnis densiffimis.

XI17. *C. divaricata*, filamentis geniculatis, ram⁰, firfimis. tenuibus, pellucidis ramis ramulis quo divaricatis: geniculis contrac[^]lis; articul¹¹ oblongis, Utrinque attenuatis. Flor. t)aU« Tab. 946.

Supra fundum fossarunl' ftagnantium aqua pura dulci repletarum. >

xi 18* *G rupejtri* Si nlamentfs geniculatis ramofis fimis fafciculatis: gpntcalis annularibus tenuiffimis lubpellucidis; articulis oblongis utrinque; parum contradis, lice it ate alter[^]iatim coi^{£!} preflis: terminalibus increffatis obtufiffini^{j5} Flor. Dan Tab. <) |§.

In rupibus lubmaianis \ ad lap ides in littor* maris.

xx X9. *C. flavefcens*, filamentis dichliotomis, genic^{c*} latis. pellucidis: ramis fubfecundis: genic^{l15} tenuiflimis rernotis, liccitate contraAis⁷ art¹ culis oblongis tubulosis. Flor. Dan. Tab. Q0'

In lacubus,

11 so. *C. glomerda*[^] filamentis geniculatis inferne

Jrioaffmii*. rauxulis fastigiatis cristatis **bpevi-**
bus: anicuiis oblongis **utrinquill** contract is.
Fior. Dan. Tab. 651. fig. 2.

Ad ripas lacuum.

1121, *C. Jucorum* filamentis geniculatis dichoto-
mis tenuissimis; ramis remotissimis simplici-
bus; geniculis annularibus pallucidis, articu-
lis ovatis utrinque oMcuris. Roth, Catalec51.
Fasc. i. pag. 190. Tab. 4 fig. 1.

Fu-
cis &c lapidibus insidet.

1122. *C. cUespfuzna*, filamentis geniculatis, ramo-
sis dichotomis, fetaceis: **ramulis** a pice forci-
patis: **geniculis** annularibus obscuris glabris
articulis oblongis diaphanis. Flor. Dan. Tab.

In fucis & aliis corporibus marinis,

402. *Ceramium*.

Capfulæ submonospermae ad superficiem sparsae
in Filamentis membranaceo-cartilagineis subge-
niculatis.

* *Filis geniculatis*.

1123* *C. confervoides*, filamentis cartilagineo-mem-
branaceis, ramosissimis, tenuissimis, genicu-
latis; ramis ramulisque **densiftriis** fascicula-
tis: **geniculis** tenuissimis parum contradis;
articulis subrotundis; capfulis ovali **a cumin a-**
^S J lateralibus, pedunculatis. Roth. Catalect.
Fasc. i. pag. 151. Tab. 8- fig. 5.

Lapidibus in fundo maris arae adhaeret.'

no

Cryptogamia. E. Algce.

1124. *C. tomentosum*, filamentis membranaceis
tenuissimis, densissimis, ramosissimis, geniculatis;
ramis rufis; articulis brevissimis; geniculis
oblongis; articulis annularibus; **articulis oblongis**,
bus, pellucidis; ramulis lobosis imparis
libus. Dillen. **histor.** musc. Tab. 3 fig. 18
Fucq. voficulo Jo ac ferrato infidet.

1125. *C. fastigiatum*, filamentis subcartilagineis
capillavibus frondulatis ramulosis;
terminalibus fasciculatis, **brevissimis**, furcatis,
reddis in fenestrulis obtusissimis, incurvis
conglomeratis; capitulis lateralibus sessilibus
foliariis frondulatis. Flor. D.m. Tab. 593
Lapidibus mare submersis adhaerit.

1126. *C. violaceum*, filamentis cartilagineis dichotomis,
ramosis, geniculatis: ramulis fasciculatis:
geniculis annularibus, subelevatis
pellucidis; articulis oblongis striatis capsulis
globosis, lateralibus sessilibus. Roth. Catal.
Fafr. 1. p. 150. Tab. 8- fig- 2.

Lapidibus fucis & aliis corporibus tam in fundo
maris quam ab undis in littore rejeclis.

1127. *C. virgatum*, filamentis cartilagineis dichotomis
ramosis virgatis **geniculatis**: geniculis
annularibus, faturioribus; articulis
subincrassatis; **capitulis** globosis, lateralibus
sessilibus. Roth. Catal. Fasc. 1. p. 150
Tab. 8. fig. 1.

Cum antecedents

- ^{1128.} *C. fibrosum*, filamentis tendinosis, fetaceis, fubramo-'s, tubulosis, comprelfis reprntibus, remotiffime geniculatis, ad genicula contractis; capfulis fpnrnsis feffilibus fubrotundis lacu^nofis. R. th Cat. Fasc. 2 p. \77.

Fucis inhaerens, nee non in littore rejedtuзн inveni.

- ^{1129.} *C. dichotomum*, filamentis membranaceis tubulosis eredlis, dichotomis fubgeniculatis: ramis longis remotis: <*articulis longiffimis geniculis tenuiffimis interfedtis, capfulis J^ubrotundis laterolibus, feffilibus coriaceis. Flor. Dan. Tab. 558.

In fundo m*»ris#

- ^{1130.} *C. longijimum*, filamentis cartilagineis, dichotomis filiformibus longiffimi-*, inaequaliter geniculatis: goniculis oblongis contractis; capfulis laterjlibus feffilibus fpairfif. Gmel. hift. Fu or. Tbb. 13. Flor. Dan. Tab. 650.

In mare.

- ^{1131.} *C. Filum*, filis fimplicibus, teretibus cartilagineis geniculatis, geniculis annularibus, textiuifl'imi^; articulis oblongis; capfula terminali. Flor Dan. Tab. 821.

Corporibus marinis inhaerens.

•• *Filis continuis.*

- ^{1131a.} *C. plicatum*, filamentis cartilagineis teretibus fetiformibus ? diaphanis, ramosflimis, implicatifi^ continuis ^ capfulis lateralibus, remotiTi-

mis iu. h. s. s. i. b. i. \ Guel. liLtor. Fuc. Tab. 14
fig. 2, Flor. Dan. Tib. 40#.

In tiathico.

x 133. *C. lurti'aghieum*, filamentis cartilagineis,
compi?efliS, coniuinis ramosiflimis raraifl ra-
11:11 Usque pirmatis apicem verius decel'feii-ti-
lius^acutiuculis; capsulis — Gmelin. histor.
Vat. Tab. 17. fig. 2.

Ad hpi&ys in inare inter Amagriam Sc Sielan-
diam haud copiofc invenitur.

403. *Fucus*,

.Vefi<?ulae aggregate in fubftantia frondis nidu-
lantes, poris mucifluis præditæ.

• * *Fronde tercti.*

1134. *F. fajugians*, frondibus filiformibus, dich< r
tomis, ramofirfimis, faftig-iatis, fm&ificati* r
nibus terminalibus, gemints, obtulls. Flor.
Dan.' Tab. 595.

In littore mavis haud infrcquens.

J¹ 55' *F. furceUatus*, frondibus filiformibus, di-
cliotomis, rarnofifiimis, rubfaCtigiatis, fruft^l-
ficationilms terrninalibus, bifurcis 7 acumiu^a
tis. Tlor. Dan. Tab, 4 [9.

**' *Fronde plajia, avenia, ecoftata.*

1156. *F. ceranoides*, acnulis, fronds cartilagn^{mea}
pbna, dichotomy, Integerrima, punftata, bi^{ll}
aaguftata, frut5licationibus ternainalibus fc^l

~~fidis~~ tuberculosis. Gmelin. hist. Fuc. Tab.

7. 'fig. ., 2. 3.

Ad lapidibus in fundo maris.

Variat colore flavescente & purpurascete.

**• *At ati feu fronde pi ana caule Jecundum Ion-
gitudinem medium percurrnte.*

^{lx}37- & *ftrratusi* in nde pinna, dii hot ma, mar-
gine ferrato - dentata; fruttificationibus termi-
nalibus pedunculatis tuberculatis. Eiper Icon.
Fucor. p[^]g^o Tab. 5.

In lapidibus mare fulvum mersis.

^l38. *F. vejiculofus*, fronde plana, dichotoma,
integerrima, veficulis aereis frondi innatis,
frudificationibus terminalibus feffilibus tuber-
culosis. Eiper Icon Fucor. p. 33, Tab. 12.
p. divaricatus, *Jrondibus plertimque angujtio-
ribus; ramis ramulisque divaricatis.* Eiper
Icon. Fuc. p. 31, Tab. iu
y. fpiralis, *caule baji fubnudo flezuo/b* Eiper.
Icon. Fuc. p. 36. Tab. 14.

8. *undu'atus*, fronde marline finuata, fub-
undulata. Eiper. Icon. Fuc. p. 35. Tab. 13.

In mare lapidifous inhcenns.

40 f. *Rivularia.*

Subftantia uniformis eelatinofa-cartilaginea; ~~in-~~
tegumento membranaceo deftituta.

^l39. il. *Cornu Damx*, frondibus teretius[^]ulis, ~~ra-~~
~~m-~~ofis papillofis, glabris; ramis divaricatis, ad
diverfuras dilatatis? ramujis abbreviatis. Ruth.

Cat. Bot. Fasc. i. pag. sis No. i#. Tab. 6

In fundo lacus vulgo *Emdrup - Sue* ad lapides femel inveni.

40[^] *Linckia*.

Substantia uniformis, gelatinosa, integumentum membranaceo induta, subpellucida.

X140. *L. pruniformis* subglobosa, folitaria, *superficie* *lucida nitente*, viridis. *Alleg. observat. botan.*, pag. 4c. Tab. 2. fig. 4.

Viva pruniformis L.

In locis ubi aqua dulcis lente fluit nec non in fundo lacuum stagnantibus, ligno & aliis corporibus nunc adhaerens nunc libera invenitur.

1141. *L. hemisphaerica*, hemisphaerica parva, *superficie* *lucida nitente* viridis vel *in lacu viridiflora* feens. *Alleg. observat. botan.* p. 39. Tab. 2. fig. 3.

In fucis, etiam lapidibus mare submersis magnitudine feminis Sinapios — Pisi & paulo majus legitur.

€142. *L. granulata*, sphaerica, aggregata, *superficie* *lucida nitente*, subferruginea, fibris & dicata, flavescens-viridis. *Flor. Dan.* 70.5.

Viva granulata L.

In locis depressis humilis argillaceis, magnitudine Sinapios vel Cannabis.

F. LICHENOS J &

Lichen. Receptacula forma varia in crusta vel in frondibus foliaccis vel in bacillis.

I. *Crustacei.*

a. *receptaculis non manifestis.*

- *Lepraria. s^dusta ^ulverea difflormis effusa.*
Receptacula nulla manifestis.
- ' *Verrucaria. Crusta folida difflormis uniflora.*

Receptacula: Thalami fructu minuti, in ipsa crustae substantia frequenter immergi, Tundrae in rupi eWati, in cavi, 1. pulverulenti & fructificantes, poro supra notati 1. pertusi, rarius vel tantum in cavi clausi.

b. *receptaculis glomeratis.*

Variolaria. Crusta folida, late ut plurimum & indeterminate effusa, suborbicularis.

Receptacula: Glomeruli superficiales farinosi convexiusculi vel pulvere farinosi & hoc elabente parum excavati scutelliformes.

c. *receptaculis scutellatis.*

Urceolaria. Crusta folida crassiuscula, ximosa areolata aut verrucosa.

Receptacula: Scutelli crustae verruci* & areolis immergi in urceola.

- * *Patellaria** Crustae folida cohaerens & aequalis aut rimosa areolata etiam granulata, suborbicularis vel irregulariter expansa.

Receptacula: Scutellae fe/Tiles, superficiales, concavae, planae, & convexiusculae marginatae vel eliatn hemisphaerice & subglobosae immarginatae seu margine tenui & vix manifesto ad basin cindlae.

- *Pezizoma*. Crustae folida irregularis effigurata, foliolis leprosis distinctis squammatim incumbentibus composita aut tota.

Receptacula: Scutellae sphaeratae marginatae planae denique convexae.

II. Foliaceae.

a. foliis depressis plants imbricatis%

- * *Placodia** Crpsta folida orbicularis vix imbricata plana, folii expansi rotundati atque^f compositi formam praese ferens, lobata: 1^o* bis concretis vel tantum in ambitu distincti^l guendis.

Receptacula: Scutellae ut plurimum centrales, marginatas planas aut convexas.

- * *Imbricaria*. Folia membranacea (rarius subcrustacea fragiliora[^]) piano depresso imbricatim centrifuga, rotulam formantia, lacinia^{nia} to-incisa atque pinnata, lobata; subtus i^l* briuosa.

Receptacula: Scutellae primo urceolatae f. ^{coJI}

ire tantum fuo foliis affix®, circumcirca liherae, elevatae marginatae.

Glomeruli in quibusdatn fparfi centrales & marginales pulverulenti,

• *Col lent a.* *Folia* in ficco rigida dura har gilia ut plurimum nigra vel atro-viridia; in humido gelatinofa, diaphana plus minusve laete virefcentia & tumentia, imbricata & vaga lobata fubtus fere nuda.

Receptacula: Scutellae jam conrauae jam fubglobols urceolatae planee &c convexae, faepius marginatae, laterales & raarginalea.

fc. foliis vagis diffusis expanjis vel adfcendentibus

- *Lobaria** > *Folia* membranaceo-fubcoriacea, lato lobata & rot mi data expanfo adlicendentia, vaga laxi fubtus villofa.

Receptacula: Scutellss fparfa?, fubfeffiles, planiufcul* pateriformes &c concave.

- ** *Pelt idea.* *Folia* coriacea evpanfa depreffa rotundato-lobata fubtus nuda aut tomentofovenofa.'

Receptacula: Peltae marginules, in lobis% plerumque elungatis adfcendentibus feffiles, anticae aut poftice; rarius rparfse laterales aut immerfae.

- **• *Platisma.* *Folia* membranacea irregularia vaga, depreffa & adfcendentia, flexuofa, inaequaliter laciniata, margine non raro Tub-

lacero crispato & pulverulento, supra & subtus fere omnino nuda.

Receptacula: Scutella? elevatae peltaeformes. Glomeruli sphaerae marginales.

c. foliis ramosis, divaricatis, fithfruticulojis* fuberedlis,

Phycia. Folia membranacea vel pro maxima parte **Cartilaginea**, glabra rigida angustiora & quasi ramoso-laciniata, interdum paululum latiora & **canaliculata** lobato-crispa ciliatissima & **adscendens**.

Receptacula: Scutellae sphaerae & **terminales** concavae ac piano convexiusculae.

Glomerulae in quibusdam laterales **marginalesque**, nec nun foveulas in aliis **farinosas** pallim **superficiales**;

III *Caulescentes,*

a. *Implicijcti.*

- *Bccomyces.* Oust a mollior, granulosa distans, sphaerae inaequales.

Receptacula: Tubercula rotundata **Imbricata** sequentia fungiformia, in *bacillis* simplicibus in distans mollibus **terminalibus****

** *Scyphophorus.* Folia cartilagineo membranacea rigida fragilia subimbricata, distans & recta, flexuosa inaequaliter **Si** profunde ut plurimum finuata laciniata **ue. vel**

ctiam fublobato - crenata; fupra virefcentia fubtus albida.

Barilla tubulofa fimpli ia (per letatem aliquando rainofa) fuporne increffata, dilatata fcyphiformia claufa difco concavo.

Receptacula: Tubercula convexa & fubglobofa fuugiformia ad margines fcyphorum, rarius in ipfis foliis fubfeffilia, (inque bacillorum, apicibus ramofis[^] terminalia.

b. *ramojiufculi.*

a\ *fruticuloji.*

- * *Cladonia.* *Folia* cartilagineo-membranacea minuU fubimbricata eretfiufcula fublobato-crenata, fupra virefcentia fubtus albida, per aetatem fere evanefcentia.

Barilla fistulofa elongata attenuata, fruticulofo - ramofa.

Receptacula: Tubercula fubglobofa in ramulis bacillorum terminalibus acuminate fefilia, niuuta, fubfolitaria.

- *Stereocaulon.* *Caules* eredi folidi lifi[nob] rigidi ftepe ina3quales & fcabridi, vel laeves, ramofi; ramis inordinate effufis.

Rectptacula: Scutellae fupra planae vel etiam rotundatae, hemisphaericae & fubgloboiie fefliles, fparfe & terminales.

- *** *Cornicularia.* *Caules* folidi rigidi glabri fruticulofo - Ctef[^]itofi ramosiffimi.

Receptacula: Scutellft terminales plane, in-

terdum radiatse, demum convex[®] torulofae #
inaequales xnargine inflexo.

3. jllanientoji.

- *Set aria** *Caules:* Lora cartilaginea filifot-
mi a teretiufcula nuda glabra diffafa & pen*
dula, ramofa, intus tela bombycina fardta.
Receptacula: Scute! Is planiufculx feffiles, do»
mum convex[^] fparfj, marine integrjp.
Glomeruli fparfi pulvcrulenti.
 - *Usnea/ Caules:* Lora cortice cruftacea ob-
du[^]a, filo centrali five medullari hjalino
elaftico, lubarticulata fcabr'ufcula teretia, ai
bafin crjffiora, fenfim attenuata fibrillofa.
Receptacula: Scutellae jam fparfse feffiles mar-
gine integro, demnm convextr fungofse i»[#]
srquales & faturatius colorat.T, jam plans r»
d at majores fubterminales.
Glomeruli pulverulenti fpl»fi.
- Opegrapha. Receptacula?* Lirellse oblongs, li-
nreres & vari* e crustn? rumpentes & super-
ficidles, -nud[^]c vel inpinbrañula interdum tec-
tx, rima longitudinali exarat*, dehifcentes-



F. LICHENOSIFI.

406. *Lick en.*

fleeptaculfi forma varia in crusta vel in fron-
«U)us folidtui vel in bacillis.

I. *Crustacei.*

a. *recptacuiis non manifestis.*

* *Lepraria.*

1143. L_T *flavus*, crustaceus pulverulentus tenuis
flavifliuius. Flor. Dan. Tab. 899 fig. a.

Ad corticem vetustam arborum.

1144. & *albus*, crustaceus pulverulentus albifH-
rauj. Flur. Dan. Tab. 840 fig. 4.

Ad inufcos & arbor am, coxticem.

1145. *JL. or genus*, crustaceus contigmts a:quabili&
fubrimofus pulverulentus candidus. Hoiim..
Enumerat. **Lkb.** Tab. 1 fig, 1.

Ad corticem arborum.

1146 . *L. variegatus*[^] crustaceus pulverulentus ru-
bro & alhu variegatus. Hag, hiftor. Lich» Tab_k
I, fig. 1.

In enidermide Betuli albsr.

1x47. & *Ultejiens*, cruflaceus jiuWeTulentus gra-
nulato verrucofus futjjhureus. Iluiiin. Plant
Lichen. Tab. 25 fig. 12.

In cortice arborum.

1¹49- *L. botryoichs*, crustaceus pulverulentus gra-
nutatus vird's. Flov. Dan. Tnh. %\o fig. 5.

122 *Cryptogamicu F. Lichenofee.*

1149. *L. arcumatus*, crustaceus pulverulentus ^{cro}
ceus arboreus.

Ad corticem Fagi, Quercus &c.

•• *Vexrucaria.*

1150- *L. amileptus*, crustaceus-olivaceus tenuiffi-
mus glaber; thalamis globofo fubconkis ini-
gris. Perfon Uster, Annal.- d. Botan. St. 7'
Tab. 3. fig. 6.

In raniulis arbor urn ad corticem laevem & te-
nerara.

1151. *L. melaleucus*, crustaceus alfcus \xvi\$ in**
qualis; thalamis fubglobosis nigris. Schrad.
Spicileg. Fl. German. Tab. 2. fig. 5. quoa<*
thecas.

In cortice tenera arborum.

1152. *L. Jliclicus*, crustaceus cinereus tenuiffimus
in-jfqualis; thalamis fubglobosis nigris.

In cortice Tiliae, Salicis & Fraxini.

1155. *L. atomarius*, crustaceus glaucefens tenuis-
ilmus nitensj thalamis convexiufculis fui^{co},
atris.

In **cortice** Fraxini.

b. *receptaculis glomeratis.*

Variolaria.

1154. *L. fagi?jeus*, crustaceus rugofus ^{v*}. ^{hicularis}
cinerafcens : glomerulis convexis albidis. ^{*f_i}

Enumerat. Licfe. **Tab.** 2. Rg. 4.

In cortice Fagi Tiliae Fraxini &c.

U55. -k *difcoidcus*, crustaceus rugofus albus; glomerulis post lapsum farina* cone avis iliformibus. Hoffm. Enumerat. Lich. Tab. 7. fig. 5.

Ad truncos arborum vetustos.

«

¹¹56. *L. amphibolus*, crustaceus tenuis albocinereus; glomerulis sparsis minutis fulgido* In saxis, post lapsum farinae scutelliformibus nigris, cortice vetusta Quercus.

c. *receptaculis scutellatis*.

• *Urceolaria*.

¹¹57. *L. fenipofus*, crustaceus granulatus albo-cinereus; scutellis sparsis urceolatis immersis nigris margine renulato turgido involute Hoffm. Plant. Lich, Tab. 11. fig. 2.

In saxis.

^{XI}58. *L. cinereus*, crustaceus verrucoso areolatus, rimosus cinereus nigro limitatus; scutellis impressis urceolatis nigris. Hoffm. Enumerat. Lich. Tab. 14. fig. 3.

Ad lapides.

¹¹59. *L. geographicus*, crustaceus rimosus flavovirens, variegatus areolisque quibusdam immixtus Ruelliferis nigris. Flor. Dan. Tab. 46S fig. 1 & Tdb. 471 fig. 5-

Ad lapides.

•• *Patellaria*.

¹¹60. *L. uvularis** crustaceus tenuissimus levis

subpulverulentus albo glaucescens; scutellis*
 plants pallidis, margine turgido. Hoff. Plan
 Lichen. Tab. 21. fig. 2.

Supra mucos locis campestribus arenosis, ex*
 cetis.

1161. *L. varius*, crustaceus tenuis; scutellis aggre
 gatis luteis variisque, margine pallidiore de
 mum flexuoso involute crenato, Hoffm. Pl
 Lichen Tab. 25. fig. 4.

Ad afferes & parietes ligneos vetustos.

1162. *L. vitellinus*•., crustaceus granulofus vitelli
 nus; scutellis aggregates demum convexis in
 regularibus concoloribus. Hoffm. Pl. Lieb
 Tab. 26 fig. 1. Tab. 27. fig. 2.

In trabibus, aëribus vetustis.

1163. *L. luteolus*, crustaceus granulofus cinereo
 virefcens; scutellis sparsis demum convexis
 totis luteo-ferrugineis. Hoffm. Enumcr*¹
 Lich. Tab. 5. fig. t.

In cortice Saticum.

1164. *L. JaUcinus*₇ crustaceus verrucofo-granule
 tus, fordide flavus; scutellis aurantiis demum
 convexis; margine pallido.

In cortice Salicis, Ulmi

1165. *L. cinereofuscus*, crustaceus tenuis albo c*
 nerou;, scutellis planis rufo-fuf[^]is demum
 convexis confluentibus, margine tenui conco
 lore. Hoffm, Pl. Lich. Tab. 12 %. 1. Tab.

In caudice Fagi Tilise Salicum & Quercus roboris.

JU66. X. *fnhfufcus*, crustaceus albocinerafcens; fcutellis tumidulis fubfufcis variisque, jnar-gine albo fubintegro. Hoffm. Enumerat. Lich. Tag. 4 fig. 5. 4. 5.

Ad arborum cortices & faxa.

[1167, ♣^e *Jf^uJ^{us}*-> crustaceus pulverulentus cine-reus dilute seruginofus; fcutc-llis deinum con-convexis rugofis confertis difformibus *fulco ni*-gris.

In Salicibus.

^{1168.} *L. viridcfens*[^] crustaceus granulofus virir!ⁱs; fcutellis demum convexis rugosis confertis dii'formibus fufco - nigris.

In truncis arborum 1 utridis.

^{1169,} *L. pyrinuSj* crustaceus tenuis granulatus ci-nex*eo - virefcens; fcutellis minutis convexiu* fculis, marginr cineraftente.

In cortice ramorum Pyri coxnmunis & Mali.

^{il70.} *L. Flavovirefcens*[^] crustaceus flavovirefren9 fcutellis fufco aurantiaris margine flavo, Hoff, PL Licb. Tab. 20 Fig. 1.

In faxis.

¹¹⁷¹• *L. rofellus*, crustaceus tenth's pulverulentus tinereo - albidus; fcutellis tumidulis carneis margine albidiore. Jacq. Collet, 3. Tab. 2*

r

126 *Cryptogamia. F. Lichenofas.*

1172. *L. anceps*, crustaceus farinofus granulatus viridis; fcutellis dilute carneis, demum obscure rufis, margine depresso pallidiore.

In cortice arborum.

1173. *L. aruginofus*, crustaceus granulofus cinereus; fcutellis carneis planis demum convexiusculis, margine undulato. Flor. Dan. Tab. 4³ fig. 4.

In locis turfosis, ad margines forestarum.

1174. *L. Ulmi*, crustaceus pulverulentus albidus; fcutellis confertis conjunctis carneo-rubellis? margine albo pulverulento subcrenulato. Hoffm. PI. Li h. Tab. 17 fig. 2.

Ad truncos Ulmi, Fraxini.

1175. *L. glaucoma*, crustaceus rimofus cinereus? fcutellis demum convexis difformibus angustis subcaesiis punctuosis, margine flexuoso cretenuato crusta convolvore, Hoffm. PI. Li h. Tab. 52. 53.

Ad bapides.

1176. *L. Hageni*, crustaceus tenuis cinereus; fcutellis minutis pruinosis nigrescentibus, margine albo. Hag. Hist. Li h. Tab. 1 fig. 5.

Ad cortices arborum juniperis.

1177. *L. corticola* crustaceus tubulofus-rimofus candidus pulverulentus; fcutellis demum globosis confertis minutis marginatis nigrescentibus glauco-pruinosis. Hoffm. PL Lich. Tab. 1TM fig. 2.

In gurgulis vetustarum rimofa Quercus, Fraxini.

1178. *L. cinnijuen* Sy crusticeus rimofus glauco cinerascens; fcutellis marginatis demum convexis confluentibus totis atris. Hoffm. PL Lich Tab. 19 fig. 1.

In fax's.

1179. *L. lapidata*, crustaceus rimofus areolato granulatus tinereo plaucus; fcutellis depresso-planis marginatis totis nigris. Jacq. Colledt, 3. Toh. 6 fig. 2.

Supra lapides*

1180. *L. parafemus*, crustaceus tenuis subgranulofus albicans cinereoque virefcens nigro sublimitatus fcutellis planifculis marginatis totis atris. Jacq. Colledt. 3. Tab. 5 fig. 3, b.

In cortice arborum & faxis.

1181. *L. fanguinarius*, crustaceus rugoso-verrucosus glauco cinerascens; fcutellis hemisphaericis atris intus fanguincis. Hoffm. PL Lichenofæ Tab. 41 fig. 1.

Ad corticem arborum.

1182. *L. Jophodes*, crustaceus granulatus cinereo-virefcens orbicularis; fcutellis nigris margins crusta concolore.

In cortice laeviori Tili* & Betulae.

1183. *L. tephromelas*, crustaceus rugoso-granulatus albicans; fcutellis tumidulis atris margine albo dPTmm flexuoso crenulato. Jacq. ColkcSt. 2. Tab. 14 fig. 5.

In cortice arborum.

1184- **fi** *u£tnofu*\$, cyustaceus grflnulofus ferru-
g nco fur u ; fcutellis infrg'nutisdcmum con-
vex^ confertis t' 1 is **nigcicantibus**.

In locis turfosis uliginofis fupra temm & mu-
ft OS.

1185- *L- mufcorum*, crustaoens prlver'ilen;ns albi-
cans; **fcutellis** morginUis -demvun hemisphæ-
ric'S con tig a is tot is atris. Flor. Dan* Tab.
1003 % i- .

Ad tftrram fi3pra mufros,

jig6. *L. detritus*, crnstaceus albido cineirns; fciiñ
ttillis difiorniibus detritis jon. pallid is demum
eiuerfis ruf[r]centibns tubufcis margine albido.
Hoffm PL Li:h. Tab. 64 fig. 1 - 4.

Ad cortkem nrhomra.

H87- *L- feytropus*, crustfcens rimofus fubfarini'
ceus gvifeo-fufcus; fcutcljis lentiformihus im-
marginatis atris. HofEm. PL Lich. TaK 54

fig

• • • *Pforoma*,

1183- £• *landclarius*, crustaceus imbricatus flfl^{vo}
foliolis congrstis lacininto hceris fcutellis de
mum convexis luteis. Hoffra. Enumerat. Li^{ch}
Tnb. 9 fig. 3.

In fcis **mnria** parielibus nrbonrnqve trinci^s.

1189. *L hypnoram*, crrstife-s imbri etus yi^h
foicus, f<ili)lis linni t 1 in isis raargme^{et o}
gr<nuUtii fcutellis **bf^me** v fis mv gine cru
fta concoiore. Flor. Dun, Tab, 956.

Ad terrain subfratis & intermixtis muscis, in ericetis & turfis lucis

II. *Foliacei.*

a. *foliis depressis fimbriatis.*

Placodium.

*90. *L. murorum*, crustaceus orbicularis rimosus, ambitu rimis plicato, flavovirescens; scutellis demum convexis rufo-luteis. Hoffm. Pl. Lich. Tab. 17 fig. 3.

In muris, tegulis &c.

¹¹91. *L. Jaxicola*, crustaceus orbicularis lobatus fimbriatus pallido virescens; scutellis demum convexis luifcentibus, margine pallido crenulato. Hoffm. Pl. Lich. Tab. 16 fig. 1.
Ad parietes ligneos vetustos.

* * *Imbricaria.*

**92. i. *ccesius*, crustaceo membranaceo fimbriatus cinereo albidus, foliolis laciniato multifidis; glomerulis sparsis pulverulentis caesiis; scutellis *nian's* margine albicante. Hoffm. Pl. Lich. Tab. « fig. 1.

Ad cortices arborum, in favis.

^{1x}93. *L. ftellaris*, membranaceus imbricatus orbicularis cinereus, subtus albidus cinereo fibrillosus; foliolis multifidis, laciniis convexis; scutellis cespicio nigricantibus. Hoffm. ~~Enumerat.~~ Lich. Tab. 13 fig. 1. a.

Ad corticem arborum,

15° *Cryplogamia. F. Lichenofce.*

1194. *L. pulverulentus*, membranaceus irabriaat
viridifufcus cinereo pruinatus fubtus nig^{tl}
toinentofus; foliolis multifidis planis obtu^{ffis}
fcutellis ca^{siis}. Hoffm. PL Lich. Tab, 8 fig. 2
In cortice Tiliee Salicum &c.

H9J- £• *omphalodes*, membranaceus imbricate
grifeo aeruginofus glaber nigro pun&atus sub-
tus niger; foiiolis multifidis anguftatis linea-
ribus planis truncatis; fcutellis fufcis. Dillen.
hift. mufc. Tab. 24 fig. go.
In lapidibus ericetorum.

1196. *L. Jaxatilis*[^] membranaceus imbricatus ci-
nereo "glaucus fcabriufculus lacuntfo reticu-
latus fubtus niger, foliolis finuuto* laciniatis
planis fnbtruncatis; fcutellis badiis. Jacq. Col-
le<5t. 4. Tab. 20. fig 2.

In faxis, fepibus & antiquis arborum truncis*
Var. t. laciniis latioribus finuatis rotundatis &
2. laciniis anguftioribus profunde incisis

1197. *L. phyjodes*, membranaccus fubimbricatu^s
glabtr aibo glaucefens fubtus nigro-fulcU⁵,
foliolis multifidis convexis apice obtufis sub-
inflatis fcutellis rubris. Jacq. Collect. 3 Tab.
8. Flor. Dun. Tab. 1186. fig. 2.

Ad fepimenta lignta &c faxa.

11<8. *L. centrifugus*, membranaceus imbricate^s
albovirelcens fubtus albus; foliolis multifidis
linearilobatis obtufis; fcutellis rufo-fulcis.
In faxis ericetolis locis.

^{1199*} *L. confertus*, membranaceus imbricatus glaucovirefcens nigro punctatus fubius uigro fufcus; foliolis multifidis Jinuatis apice rotundato lobatis creni risque; fcutellis badiis, Hoffm. PL Lich. Tab. 16 fig. a-

Ad lapidea.

^{x*00.} *L. m caperatis*, coraceo membranaceus Imbricatus rugolus pallide flavescens fubtus niger, foliolis finuato lobatis crenatis fcutellis hubris. Hoffm. PL Lich. Tab- 3d % 1. & Tab, 39. fig. 1.

In faxis & truncis arborum.

¹²⁰¹ *L. parietinus*, membranaceus imbricatus fulvus fubtas pallidior, foliolis rotundato-lobatis crispis; fcutellis concoloribus. Hoff. Enumerat. lich. Tab. 18 fig. K

Ad parietos, ligna, faxa, &c

^{1302.} *L. olivaceus*, membranaceus imbricatus olivaceo - fulvus fubtus fufcfcens, foliolis rotundato-lobatis nitidis rusjosis punAatisque; fcutellis concoloribus. Hoffm. Enumerat lich. Tab, 13 fig. 3. 4. 5.

Ad truncos arborum & faxa.

i)

^{a°3-} *L. corrugatus*, membranaceus imbricatus rugosus glaucovirefcens fubtus nigro-fufcus, foliolis rotundato - lobatis; fcutellis amplis barmargin* crenulato. Jacq. *CoU&CL* 3 Tab. 9- fig. j.

i 52 *Cryptogamia. F. !>ichenQJ(z.*

• *Collema.*

1204. *L. timofus*, gelatinofus imbricatus irregularis, foliolis adpi-effis minutis cvenulatis gr^{*1}nulosis; fcutellis fubiramersis rufofulvis.

In locis humidis limosis ericetbrum.

b. *Joliis vagis diffusis expansis vel adjacentihw*

* *Loharia.*

1205. *L. pulmonariusy* fubcartilagineus expanf¹reiiculatus lacunofus finuatus, lobis truncat¹viricastaneus lubtus flavoferrujiineus liirtu¹fcutellis fubmarginalibus tbtis atrorubentib¹Hoffm. Pl. Lich. Tab. j, fig. 2.

Ad truncos arborum in fylvis antiquis.

•* *Peltidea.*

1206. *L. venqfus*, coriaceus cinereus fubtus toro^{el1}tofo-vrtiofus foliis Tubrotundis divergentib¹peltis fnticis marginalibus fubfolitariis rotun¹dis horizontalibus fufcis. lior. Dan. Tab.

1125

In locis umbrosis fubhumidw fylvaticis: *imel-*
Zem Eolle- Kolle og Bacjvwr., ved Feien mellen
Orholm og A > emolle.

1207. *I. Cdmnns*, roriaceus expansus rotundato¹lubatus cinerascens fubtus venoftrs fibrillofus;
peltis in k>bulis elcns;atis adfcendentibus, a-
ticis fubrotundis tufofulcis. 'Flor. Dan. Tab.

767 fig. 2.

Supra terrain ad radices arbor am in fylvaticis ericetis.

¹¹ ^fo & *L. aphtkofus*, coriaceus expanfus rotundato Obatus glaber viridis fubtus l*ubavenius fibrillofus plaga caerulefcence, glomerulis fparsis fulcis; piltis. in locia attenuatis adfcenflentibus, antic is fubrotundis rubris. Flor. Dan. Tab. 767 fig. T.

Supra tei*ram in fylvis acerosis nee non :n eritetosis locis

¹² •09. *L. polydatiylus*, cariaceus expanfus digitatolobatus glaber cinereo glauc'efcens lubtus venol'o fibrillofus; piltis in lobis elon^atis attenuatis adic'eridentibtis anlicis fubrotundis nigrofulcra llofim. PJ. Lick Tab. 4 fig. 1.

In fylvis & dum'etis ad terranj inter mufcos.

•** *Phitimia.*

¹² 10. *£. junipcrimis*, membranaceus pallideflavus, fubtus flaviffimus utrinque lievis, foliis adfcendentibus eomplicatis lacero latiniotis cxi-
fpis; icutellis plains convexis badiis. Flor. Dan. Tab. 1004.

In ramis Pi-ni abietis, Pruni fpinofe & Juniperi communis.

¹² 11. *L. Jepincola*, membranaceus l©vis glaucofufcus, fubtus patHdior fublacunofus, foliis «>dtcendentibus finuato-lobatis marline cri-
fpis cinereo pulvemkntis; frutellis planiufqu-
lis cajptaneis. Hoifm. PI* Lich. Tab 14. fig. 1,

Ad fepimenta lignea.

c. foliis ramosis, divaricatis fuftriculosus,
jubere&is,

Physcia.

1212. *L. tenellus*₇ membranaceus cinerascens decumbens, foliis laciniis apice ciliatis w* fccndentibus tubulosis fornicatis obtusis; fcutellis fccilibus lateralibus nigrocaesiis. Flor.

Ban. Tab. nB[^] fig. r.

In ramis, fepibus & ad corticem arborum.

12 3 *L. citiaris*, membranaceus viridiglaucus, subtus albus, foliis adfcndentibus lineari l^{^cl} nintis ciliatis canaliculatis; fcutellis tcv-mio* libus nigrocaesiis. Flor. Dan. Tab. 7x1*

Ad cortices erborum & lapiri&.

1214. *L. furfuraceus*₇ membranaceus cinereo p^{u^} verulentus fubtus violaceo niger, foliis l^{*cy} niatis canaliculatis decumbentibus' fcutellis fparsis arnpullaceis rubris. Hoffm. PL Lich. Tab. 9 fig. 2.

1215. *L. prunastri* fubcoriaceus mollis albocinereal'cens rugoso lacunolus fubtus albiffim^{lls} fuliis lineari laciniatis planis erectiusculis; Xcutellis lateralibus concavis fulcis. Dillen. hift. muc. Tab. 11. fig. 54. 55. A.

Ad arborum truncis & fepimentis ligneis ve-
tustis.

1216. *L. fraxineus*, fubcartilagineus cinereus *u-
goso - lacunofus, foliis lanceolato lacini^{3tis}
planis eredis; fcutellis fparsis lateralibus mar

ginalibusque pallidis & concoloribus. Flor. Dan Tab 1187.

Ad caudices & ramos Quercus & Fraxini nee **non** aliorum arborum ac fruticum, in fepirmentis ligneis.

¹²¹⁷. *L. fastigiatus*, subcartilagineus cinereo pallidus lacunofus caespitofus laciniato ramofus, *amis fastigiatis teretiufculis, furfum increffatis, ramofiffimisque attenuatis fubineimihus; fcutellis terminalibus feililibus concoloribus* Dillen. hift. muſe' Tab. 25 fig. 62.

Ad ramos & cbrticem arborum. In pineto pro^{Cu}l Birkeröd varietitem tenellam ramis Wni, Lands fubem[^]tuis fere obfucentem obfervavi.

¹²¹⁸* *i. farinaceus*, cartilagineus cinereoglaucus glaber lacunofus convexiufculus l[^]aciniato ramofus, ramis attenuatis; glomerulis convexis lateralibus; fcutellis peduncu^Utis fparsis planis concoloribus. Dillen. hiftor. niufc. Tab. 23. fig. B.

In antiquis arborum corticibus, fepimentis ligneis.

III. *Caulefcen-tes.*

a. *Jimpliciuſculi,*

• *Bceomyces.*

¹²¹⁹. *Ir. ericetorum*, crusteus granulatus albicans; bacillis breviffimis obconicisi tuberculis fubglobosis carneis fimplicibus. Flor. Dan. Tab. 1005 ^{fi}g- 2.

•P fvlvis, ericetis **ad latera viarum** & foffarum

1220. *L. bysfoides*, crustaceus ru^ofus pulverul^e
 tus glauco vjrefct-ns; bacillis pylindrai^{ceis}
 tuberculis **fungiformibus glomeratia** rufufufci*¹
 Hoffm. Enum<*rat. Lich. Tab. 8. fig- 2.

Ad terram in ericetis.

ifti. *L. capitatus*, crustnceus, pulverulentus, vi^{ri}
 diflavus; bacillis **elongatis filifbrmibus** ccⁿ⁻
 coloribus; tuberculis globosis, pruinatis cal,
 cutatis, primo flavescentibus demum fuff^{is}
Mucor ftrjuraceus Lin. *Batfch. EL frⁱ*
Cont. i. pag. 267. 'Tab. 50 Jig. }j% a. h-

Ad terram in locis **umbroL-is** fubhumidis ad l^{ra}
 dices a r bo rum nee non fupra Zap ides in fe^{pi-}
 bus. Mart. & April. #

** *Scrpophorus.*

1221. *L. pyxidatuSj* cartilaginous foliis min[^]^{ti}
 fubimbricatis lobato crenatis; bacillis brt:^{vi-}
 bus obconicis cinereis, icy phis dilatatis fi^{ab-}
integris; tuberculis mar[^]inalibus fufcis. *Dill.*
biftor. mufc. Tab. 14 fig. 6. A. B, D. E- F.
G. n.

In rricetis ad terram, faxis &c.

1225. *L Jimbriatua*, cartilaginous foliis min[^]^{is}
fijbimbricatis lobato **crenatis**: bacill s cin[^]
 rafcentibus **el«»gatis** cylindrace's; fcyphisd^{en-}
 ticulato crenatis; tub[^]rculis minutis fuf[^]^{u.}
Dillcn. h\h. muf\ Tab. 14 Bg. 8. A. B. C,

In locis fterilibus ly'vaticis fupra terram.

1224. *L. cocciferus*, cartilaginens foliis minuti

fiibimbricalis lobato crenatis; bacilli? cinereo pallklis obconicis, fcyphis dilatatts fubinte-gris; tuberculis fungofis coccineis. Flor. Dan. Tali. 118& fig. 1.

In ericctosis locis.

1225. *L. digitatus*, cartilagineus foliis minutis fubitnbricatis, lobato crenatis, bacillis cine-xeopalliclis cylindraccis deraum fubdivifis fey* plis ramofo digitalis; tuberculis coccineis. Dillen, hiftor. mufc. Tab. 15 fig. 19. Flor; Dan. **Tab**_v nS8 fig. 2.

In ericetis, fylvis &c.

1226. *L. turbinatus*, cartilagineus foliis miimti& fubiiribricatis lobato crenatis, bacillis cine-reovirefcentibus elongatis cylindiicis firaplid-^us Tcyphiferis, fcyphis denticulatis turbina* tis deinum expanfo dihitatis planiufculis; tu-berculjs marginal]bus fubfeffilibus glomeratis lubfufcis. Michel. Gener, Tab, 41. fig. 7.

Cum prioribus

1527. ^ *commits*, c'avtilaeineus foliis minutis fub-irabricatis lobato crenats; bat i His cinereo vi, refcentibus elonpitis fimpliciufculis fubven-tvicofis acuminatis **fcyphifcritqte**\ fcyphis cy-lindraccis; tuberculis fufcis. Hoffru. Pl. Lich. Tab. 25. % T.

In fepimentis terreis ericrtorum.

1228. *L. filiformis*, cartilagineus foliis fubimbri-catis incifo lobatis fubcrenntis, bacillis albo cinerofcentibus elongatis fi liformiblls far nli-

feris; fcyphis interns fubobfoletis; tuberculi
coccineis. Dillen. hiftor. mufc. Tab. 14 fig
**.

In ericetis, fylvis, fupra terram & ad truncos
putridos.

b. *ramofiufcull*

#. *fruiiculoji*,

* *Cladonia**

1229. *L. uncialis*, cartilagineus **foliolis** crenulatis
fivanefcentibus, bacillis tubuloHs albopallidis
erectis ramofis axillis perforatis, ramulis fle-
xilibus breviffimis acutis, fertilium tuberculin
minutis fufcis. Dilien. hiftor. mufc. Tab. 1\$
fig. 21. 22.

In ericetis & fylvis humidis.

1230. *L. rangiferinus*, cartil.gmeus foliis crenu-
latis evanefcentibus, bacillis tubulofis albo
cinerafcntibus otefpitofa ramofiffimis axilli*
perforatis, ramulis apice deflexis, fen
tuberculis globolis obfcure fufcis. Flor. ^{ilium} Dan.
Tab. 180 & 559.

In ericetis fyivaticis.

1331. *L. Juhulatm*, cartilagineus foliolis crenaW
lobatis, bacillis cinereo virefcntibus tubulo-
fii dichotomo fubramofis errec^is, ramis ^{lim-}
plicibus fubulatis, fertilium tuberculis ^{badiis.}
Dillen. hiftor. mufc. Tab. 16. fig. 36.

In fylvis mufc is intermixtus.

»^32. *L. furcatus*, cartilaginous foliolis ^{crenula-}
tis bacillis albo cinereoque fufcis t ^{tubulofis}

Cryptogamicu F. Lichenofx. 13 9

ramofis, ramis adfcendentibys dichotomis bifurcatis, fertilium tuberculis rufefcentibus. Dillen. hift. muc. Tab. 16 fig. 17.

In ericetis & fylvis.

¹²33- *L. fpinofus*, cartilagineus foliis crenulatis, baallis viridifufcis tubulofis v<ige rarnoiis tortuofis flexuofis fpinulofis apice dilatato Tubpalmatis, ramulornm fertilium tuberculis fufcis. Dillen. hiftor. muc. Tab. 16. fig. 25.

Cum antecedent bus.

¹²34. *L. vermicuiaris*, cartilagineus fubaphyllus, bdoilfis albis fitulofis fubulato filiformibus profratis fubdivifis; tuberculis? lateralibus dilute fufcis. Hoffm. PL Lich, Tab. 39. fig.

In locis mucofis. & graminofis fylvarum.

*• *Stereocaulon.*

¹²55- *L. pafchalis*, caulefcens folidus erecvlus fuffructuJofus granulofus caefio tinerafcens; fcutellis fparfis fubfesfilibus marginatis demunx convexis rugofis fufco atris. Flor. Dan. Tab,

In ericetis et campis arenolis ar^di*.

••• *Cornicularia.*

¹¹36. *L. aculeatu*⁵, caulefcens folidufcnhw tere* tiufculus capfpitofus nudus flexuofus fufco cafiancus, axillis compreffis, ramis attenuatis ~~vagi~~ apice furcato-fpinulofis; Icutellis termi-

140 *Cryptogamia. F. Lichenofot.*

nalibus demum convexis fuscis.- Dillen. *Hift. Mufc. Tab. 17. fig. 51.* VaitL Bot. *hPar. Tab. 26. fig. 8.*

Tn ericetis et aliis locis aridis.

b. *Jilamentoji.*

* *Setaria.*

JJ37, *L. juhatus*, caulefcens nudus laevis pendulus ramoliffimus albo cinerafcens nigerque loris filiformibus, axillis compreffis; fcutelli* convexis glabris marj;inalibus concoloribu* Dillen. *Hift. Mufc. Tab. 12. % 7.*

Ad ramos arborum in Pinetis ad fepiment* lignea vetufta.

** *Usnea.*

1238. *L. barbatus*, cirereo virens pendulus subdivifus, loris elongatis fubfiliformibus fibrillofis, fibrillis patentibus; fcutellis minutis fparfis integris fubcarneis dcenum convexis fulco Jiigrlicantibus. Dillen. *hft. mule. Tab. 12. fig. 6.*

Ad arborum ramos, fepimenta.

1259. *L. floridus*, cinex*eo virens ere(5tus, loris divaricatis brevioribus cylindraeeis fibnllolis; fcutellis fubterminalibus planis radiatis albo virefcantibus. Flor. Dan. Tab. ngg.

In fepimentis ligneis vetuftis.

407. *Op egr apka.*

Receptacula? Lirellae Oblonfirae Jineares et varie

^e *crufta?* rumpentes et fuperticiales et nud»
^v «l membranula interdum tecte, rima. longitu-
dinal! exarato, dehifcentes.

* *LirelUs Jimplicibus.*

¹240. *O. lihcnoids*, *crufta?* pulverulenia, leprofa,
albida; lire His nudis, fimplicibus, latiuſculis.
Flor. Dan. Tab. 1242 *fig.* 2.

In cortice truncoruni exaridorum Fagi &c.

¹³4¹ - *O. ? gerrinu*, *crufta?* — lirellis linearibus,
longis tranſverfalibus, geminatim approxi-
xnatis, prominulis, pellicula duplici vel tri-
plici dilute ferrugini clauſis.

In ramis Coryli avellanae ac Betulae Alni.

¹H2. *O. quercina*, *crufta?* - lirellis Jubrotundifl
conafctis, maculam nigram referentibus.

In ramis junioribus quercinis.

¹²⁴3. *O. fag'nea*, *crufta?* - lirellis oblongis con-
fertiffimic i_n[%] macul.iin latam nigram aggreg-
gatis. *Lichen, rugofus.* Hoffm. Enumerat.
Lichen, pag. i₀. Tab 11. *fig.* 5-

Iri ramuKs Fagi fylvati^i.

^{1a}44- *O. betulina*, *irufta?* albida tenuiffima, line-
oUs ferpentinis limitata; lirellis fimplicibus
rectis ſubparallelis. Perfon. liſter. Anal, der
Botan. St. 7. pag# 3t. Tab. 3- ^{fi}g- 5- A, a.

•* *Lirglils ramofis.*

¹²45- *O. rufefcens.* *crufta?* rufefcente; lirellis
^{10ar} prominulis. ut plurimum tri-quadxi-

fidis, fimplicibusque, Perfon. 1. c. pag. 29
Tab. 2 fig. 5. A, a.

Ad ramos et truncos arborum.

1246. *O. radiata*, irufta? — **lirellis** planiufud
ftellatim fiffis pedat'sque. Perfon. *L* c pag
39. Tab. *i* fig. 3. B. b.

In ramis fagint'is.

1247. *O. macrocarpa*[^] crufta? albida; lirellis lon-
giffimis pai4llelis {*Jwbjlexuojis*} apice furca-
tts. Peribn. 1. c. pag. 29* Tab, x. fig. 1.
a, b

In ramis Coryli avellanac

E248. *O. pulverulenta*, crufta? albida; lirellis
immerfis pulverulentis ramofis; ramis di-
ricatis. Perfon. 1. c. pag. 29. Tab. i. [^]fig
a. B. b. Flor. Dan. Tab. 1=43 fig. 1. *Li*[^]
*fcriptus Lin**

In ramis & truncis arborum.

1249, *O. litterella*, crufta? Candida; lirellis radi-
ato ramoffimis caefio nigris, Achar. *Licheno-*
graph, pag. 25. No. 58.

In truncis arboruin praefertim **Populi tremulae.**

G. FUNGI.

i# *Angiocarpi**«. *Sclerocarpi.*

Hysterium, Perithecium oblongum, rima longitudinali dehiscens.

Sphaeria. Perithecium rotundum coriaceum, humectatum substantia gelatinosa repletum.

Nectria & *Sporax* Perithecium orbiculare membranaceo-coriaceum subrotundum. Gelatina fluxilis, in cirros vel globulus prominens, sub lente amorpha.

Xyloma. Perithecium applanatum suborbiculare inaequale dehiscens, intus furtum.

Sclerobolus. Massa nigra cohaerentem sub lente ex thecis aut sporulis constantem lixens»

|3. *Sarcocarpi,*

Corticium. Perithecium curvaceum scyphiforme, ut plurimum stipitatum, discus intus furcatus prominens pulverulentus (*junioribus Jcyphulimembranula inclusus*)

Trichothecium **reticularia*. Perithecium abrotum. Gelatina compacta capitata.

Sclerotium Perithecium nullum. Forma, forma varium intus laeve limulare.

Pilobolus. Vescicula capituliformis, receptaculo stipitiformi hydrophoro impolium.

Sphaerobolus, Vescicula globosa, receptaculo globoso radialiter fissis **primo** uacuata ac maturans elidice protrusa,

y. *Dermatocarpi*.

• *Trichospenni*.

Bovista. Peridium leve fertile, apice deliis cortice exteriori per partes evanescente.

Lycoperdon. Peridium caulescens, apicem ruptum verrucis subdeciduis obsitum.

Lycogala. Peridium membranaceum sublaevissimum clausum, interne primo pulposum deinde pulvere filis raris intertextis repletum,

Fuligo. Primo pulposa ut plurimum effusa W difformis Peridium membranaceum vel coriaceum, varie ruptum & subevanescenter

Spumaria. Primo pulposa **granulata**. Peridium duplex: externum furfuraceum deciduum: internum ramoso-cornutum aut subrotundum oblongumque, persistens,

Diderma. Peridiura leve duplex: externum fragile: internum pellucens, subdilatatum. lumella magna, Fila parca latentia.

Physarium. **Peridium** simplex, subfarinaceum planamque inaequaliter rumpens, Fila adnata latentia.

Trichia. Peridium simplex, **subglabrum***¹ aequaliter **rumpens**, per maxima parte necens» Capimima compactum, elasticum

expandens, baB poculi peridii perfiftentis in-
aafcens.

^{4r}*cyria*. Peridium fimplex, fere totum, evane-
fcens, Capillitium donudatum, compadlum
caliculo peridii remain ntis impofitum.

^{Ste}*monitis*. Peridium fimple\ totum evane-
fcens. Capillitium elongatum eredum %^r
luzn ambiens.

#* *Gymnojperml*

^{Cri}*l>raria*. Peridium fimplex membranaceo-
nervorum, pulverem inclndens: maturationiJ
tempore membranacea pars aut pro parts
«ut tota evani*fcit, ncrvi anaftomofantps per-
fiftentes cribrum formant per cujus foramina
pulvis affunditur.

^{Lic}[^]*a*. Peridium feffile fubrotundum, aut fnb-
effufum fragile. Membrana fubjacens nuUa.
/Pulvis feminalis filis deftitutis.

^{Tu}^{*}*>ulina*. Peridia tubuliformia in crfpitulum
connata. Pulvis nudus farinaceus

^{*Pk}^{*}*rocarpa*. Peridium fubovatum Venice de*
hifcenti operculo claufum. Pulvis feminalis
filis deftitutus.

^{Ony}^g^eⁿ^a. Peridium ftipitatum fubrotundum
Eccum perEaens claufum. Pulvis compadus,
~~rob~~arens. filis nullis intertextus.

Piligena. Peridium ftripitatum orbiculare dup
IJX: externum memb.anaceum basi rupt
furfum reflexum deciduum. Pulvis compao
tus cohaarens.

Aeciditim. Peridla aggregata ut plurimum r
cnliformia membranacea acaulia, ore dent**
demum rupta. Pulvis farinaceus nudus.

Uredo, Peridium membranaceum tenuifiitn^
rima longitudinali dehifcens ac deinde c**
nefcens. Pulvis nudus detergil>ilis. Spor
lae unifcirmes, plerimqve glob:sa.

Puccinia. Peridium nullum. SporuJae in ca
fpitulum conglomerate e t«reti subturbinate,
caudatae *Jeptulis* difimfta?.

Trichoderma Peridium tomentofum f. villosum
pulverem copiofum farinaceum involvens.

Mucor. Peridium membranaceum, globofum
ftipitatum, primo fubaquofa-^pellucidum dein
opacum. Sporulae nud^e fubcohaerentss,

Botrytis. Sporulae in racemum conglomet'^
Stipes eredtus, fruticuloCus fubdichotoni^{5*}

Monitia. Sporul© in iilis moniliformibus ^ll!
plicibus digitatisque ercllis aut effufis b)^oi
dfcis terminales

Periconia. Stipes ri^idus fimplex, capitulo
rinaceo ficco terminatus.

Stilbum, cap^ulum fubrotundum folidum, P
mo fubaquotUm aut fubgelatinofum, mature-
Teens ut plurimum opacum turbidum.

•*• *Sarcofermi.*

C7athus. Peridiura irifundibuliformw veficulis
lentiformibus repletum.

3. *Gymnncarpi.*a. *Lytothecii.*

Ph^aUu\$. Volld ampla fucculenta. Pileus ova-
tus ftipiti infidens, integer, latice diffluent*
obtectus.

β. *Hymenothecu.*• *Jgaricoidei.*

4^agaricus. Pileus figura & fuhftantia varia.
Hymenium lamellofum diftintfum membra*
naceum vel fubcarnofum aequale vel plerum-
que in<equale, fuperficie inferiore pilei di-
fpoftum.

Merulius. Pileus figura & fubftantia varia.
Hjmenium fublamellofum ānaftomofans in-
feriore fuperficie pilei difpoftum: lamellae vel
venae turaidiufculae, anguftae.

** *Boletoidei.*

Daedalea. Pileus fub fuberofus, fubdimidiatus,
feffilis Hymenium lamellofum: lamellae re-
ticuldt®, fubftantia pilei. Pori vel finus in-
*qualrs & ifregulares.

*ol*tus.* Pileus fi?URA & fubftantia varia. Hy-
^ ep pua tibu m : tubuli, textetes, connexe?
ohiolis integri>t

Sisiostrtiha. Pileus variui. Hjrmenium tubulofum: tubuli, connexae; primo oflo equali, demnm autem praefertim ad batin et in medio fungi, lacerae & q[ua]fi dentiformes.

•** *HyrlnoirhL*

Hyd num. Pileus figura & fubftantia varia. Hfmenium echinatum feu in dentes tubuliformes iategrbs prominens.

•*•*•* ' *Gymnodei*mafa.*

Thclephbra. Pileus fubcoriaceus feffiis. Hyttxenium «x papillis inaequalibus clevatis diftinc[^]lis.

Aiiricularia, Pileus inembranaceo - coriaceus feffilis. Hymenium lseve

Merisrfia. Ramolum coriaceum compreffum laeve: apice utplurienum pilofum.

***** *Clavcejorrnts**

*Clavarin** Clavula fimplex ramosaque, cum ftipite brevi (Tarias manifefto) aut caule era⁵, fiufculo confluens. Hymenium in clavula fupcrficiale, lseve.

Gaoglos furn. Clavula fimplex carndfa utplimum compr^{*};rfa hrevi margine prominente ftipite c[^]nti[^]Qa. Hymenium in clavula, fupcrficiale, vifcofo - glutinofwn.

Spatkularid. Clavula compreffa membrana^{^0} carn[^]Ta , 1; tere 'itrirque inftipi¹ emdecurte & Hymenium in clavula luperficiale laeve.

Micrura, Clavula ovalis compressiflora subcaespitosa*
 non* ad stipitem contracta. Uzynneun fu-
 periciale, Kve.

*..... *Hehuellorfu*

H^elveLla. Pileus membranaceus subdifformis,
 utrinque deflexus, H}iQenium la;ve i}pferuin.

H^el^otiun\ Pileus subcarnosus convexo *hexui-
 sphericus stipitatus. Hyra,um l»ve info-
 rnm.

e^ziza. Pileus utplurimum hemisphaericus con-
 cavus fessilis aut stipitatus Ilymenium l*vc
 superum. (TAc<e jollicuUtz nudo ocub in-
 cor,spicua, JparulU o&Q, Jupzi ad instar avo-
 lantibus, foetce\

A^rJ^obolus. Pileus hwnifph«ricus subcupulaefDi-
 m;is carnosus. Thee* m.uixfestai, in ditto
 prominentes.

rAmelia. Pileus? gelatinosus utplurimum pli-
 cato gjrofui. Thecae granulaeformts iumer-
 f; lubobfoletat,

j *Kctmalothecii*.

I^saria. Subbyffoidea, firaplast ramofaque, pul-
 vere farinaceo Juhfilato* ohterta. Subtan-
 lia molliufcula. Color utplurimum albidus.

D^o-^mQ>tium_m g[^]s_{us} f[^]yr[^]a i[^]deUrminata, ereda
 aut deprefa, fuhf. iculata nut effufa. Fila
 laevia nee conte\ta

Eriniu_m. Filci ligida, grunrnf, in caespitulum,
 foliis subcupuliforme irnpieslum ccngloxae-
 rata, rarius eituJnin (*Erinoph. Utem* .

Racodium. Expanfum mollo filis dense ^{inter}
textis pannum (*expanjum*) referens.

Himantia. Repens, villosa* pleruraque ^{10*}
fo-fibrosa mollis.

Bysjus. Extensum, filis plerumque ^{brevisim}
subintertexti? grumolis vel globuliferis.

Rhizomorpha. Repens? rigida glabra (^{inter}
medulla villosa Jar da?)

G. FUNGI.

408 *Hyterium*.

Peritheciura ut plurimum oblongum rima longitudinali dehiscens.

* *involucrata* (epidermide manifeste cincta).

1250. *H. quercinum*, peritheciis elongatis subflexuosis, subventricosis, una altera extremitate epidermide in quo in statu juniore plane obtusa sunt, perforantibus, nigris vel nigrescentibus.

Ad ratnos juniores Quercus,

β- peritheciis ovato oblongis, labiis prominentibus, l&vibus, epidermide laxa, crispata, cinctis.

Variolaria corrugata Bull. Tab* 432. fig. 4
V anetatem? hanc frequentior in ramis dejetis
Cor^r yli avellanas observavi.

x 25[^] if. *arachnoideum*, peritheciis ovatis vel ovato-oblongis, subprominentibus l&vibus, atris, epidermide filisque cinereo albicantibus arachnoideis, cinctis.

^ Iⁿ cortica Betul® Alni.

52. *H. acutum*, peritheciis parvis elliptico-oblongis haud prominentibus: labiis laevibus, nigrescentibus, intus umbrino-nigris, epidermide utriusque acutissima, arte cinctis.

Iⁿ c. Sambuci nigri.

1x55. // *Populi*, peritheciis fparfis fuborbiculibus prominentibus: labiis fubtumiuulis bncis, intus umbrinis.

In trunco Populi trenaulas.

1154. H'. *album*, peritheciis ovatis fransverfal[^] pruminulis intusque **albid'S**; epidrrmide ppcndiculariter fisfa, **utriaque** acuta, adpi[^]

In cortice ramorum Butulse Alni.

1255 II. *Mali*, **peritheciis** fparfis fubconfli^{ie} bus orbituaribus vel ovalibus vel irregulariter diatatis plauiufulis **teuuiffimis**, long'tudinali fubfl.vuota vel angulata fisfis, pulvere fperraatico cinerco repletis.

In caudice Pyri Mali.

1256. // *coTVgcnun*, perithcciiis fparfis orbi^{ufl} bus vel ovatis, prominulis, rugofis, rima epidermidis patula, lubdilacerata.

In fquamis ftrobilorum Fini abiotis.

1257. H. *affiulinum*, perithc:ciis • oblongo - l^{n(?)} bus fparfis fubconfluentibus prominulis bus atro **nitentibitf** : labii[^] tumidiufculisj terne fufcisj rima epidermidis patula.

In ftipite emortuo Pteridis aquilnae.

** *nuda in vohicro epidermidis destituta*.

125S. // *Phil*, perithcciiis ovatis vel ovatoobgis, fparfis, prominulis, atris: labiis l^{#v1} pulvere fpermaticeo atropurpureo.

In foliis dejed, is Pini abietis & fylveftris

I Cryptogamia. G. Funct r 5 5

259- // *artemijlw*, peritheciis ovalibus, f_{par}Es,
^bprominentibus, atris: liibiis l«vibu».
^ « raule **A*temifia** vuirfaris emortuo.

26 0. tf, ^//_c^r6% peritluciiis ovatis vel ovato-ob-
;^gis pWnemibus, iparfis extremitatihut
Tubcon uentibus: labiis tumidis striatulis, atris,
fubnitentibus.

Lichen **fcriptafi** ^ pulicare L. Michel, HOT
gen er plant. w 102. No. 5. Tab. 54, Ord.
57* ng a.

In con ^ rugulofo Quercuiun, Coryli avellan*
126 VI- // *Stmbtth*, peritheciis ovatis vel fubro-
jundis. prominentibus, atris, Tubconfluenti-
jus: labiis tumidis fubfralis., rugulofis.

In covtice *rurruloh* trunci Sambnci nigrl (ved
***** til *Hundejoen* bag vcd *Jagcrnes*
Magazin i J gg.

1262. « *pedicellatum*, peritheoiis ovaris vel ova-
to-oblougU ventricofis prominentibus: labile
tunndis itriatis; deoifum augufiatis fubpedi-
cellatit

In cortice *Betulae* a)ba& rarius.
1263. H.? *tubercuhfum*, peritheciis oblongs, rrr-
rallal is, aggr«-gatis, prominontibus, cinereis:
labiis tu/niduiis rugulofis.

In **ruacM** *Betul*» a ln*.
1264. *H. mytilinum*, peritheciis oblongiufculii
compressis rubventricofis, labiisque tenuibus'
laevibus ! deorfum an^uftatis fubpedic«llatifi.'
In ligno *cauretao Pini abietis*

Obj. Perithecia apice dehifcentia, & intt
gelatinam albido-pallefcentem rrepleta, obfca
vavi,

* 409. *Spliceria.*

Perithecium rotundum (*humedatum*) fū>.stantia
gelatinofa repletum.

I. *Sphcerulis nudis, ffromate destitutis,*

A. *Jolitariis.*

a. *Juperficialibus.*

* *ostioh fimplicu*

1^65. & *atrostoma*,* fpheerulis orbicularibus &
conicis, fparfis, atris, tegmine caefio-al^l(c
obdutflis; ostiolo **regulari**: in vigentibus
terne a:elatina albida rej)letis. *An variet.*
Sph. conicce Tod Fung. Mecklenb. & pag. 43
Tab. 15. Jig, i§?

In cortice ligni dejedli fubputridi.

13 66. *S. alba*, fphaerulis orinculai*ibus, fparfis J^u
aggregatis, cinereo- albidis : oftiolo irregul^{ar}
gelatin.1 vegetaritium pirno flava deinuii
gra-

in ligno putrido dejeelo,

1267, *S. crinita*, fphrerulis fpliaericis, fparfis, *
aggregatis, atris?, pilis nigris, longis, ftri^
undique veftitis; gelatina in vigentibus ^{cli}
reo - caefia.

In ligno dejeAo Coryli avellanae autumnno
fe vavi.

•* *ostiolo elongato.*

1268. *S. congener*, sphaerulis sphaericis, sphaeris sub-
aggregatis, atris; ostiolo cylindrico perithecii
haud breviori, apice annulo subincrassato
ostio impreso.

In ligno putrido.

1269. *S. rostrata*, sphaerulis? subglobosis, depressis
sphaerulis atris, tenuibus: primo subira-
meris aetate vero superficialibus; ostiola lon-
gissimo subflexuoso acutiusculo. *Tod. Fungi*
Mecklenb. 1 pag. H- ^a* 10- *fis** 8°*

In ligno subputrido Pini Abietis,

13 cortice vel ligno immerjis.

• *ostiolo simplici.*

1270. *S. hystriformis*, sphaerulis orbicularibus,
sphaeris, atris, sub epidermide hystriformium more
Empliciter vel angulatim fissis, latentibus:
gelatina nigricante.

In ligno Pyvi Mali.

1271 & *Papaveris*, sphaerulis globosis, sphaeris, laevi-
bus, atris, subnitentibus; ostiolo minuto sub-
depresso: gelatina albida.

In caulibus & pedunculis *Papaveris somniferi*

utilam hanc sphaeriam observavi.

1272 *Cassiahem, epiphylla*; sphaerulis orbiculari-
bus, sphaeris, atris subnitentibus, ostiolo an-
gulari depresso: **gelatina atra.**

In superficie prona foliorum dejedlorum *Fagi*
Castaneae.

1373. *S. gubularis*, fph<vrulis glubularibus, fp^{ar}-
Us_T atris, fubnttni^{ibus}; ostiolo minuto, de-
inde magis aperto, deraum autem decidU^o:
gelatina nigra

in trunco cavo Salicis fragilii.

- M ostiolo papVdcto*

1»74» **S. nitida*, fphserulU globularibus *sparsis*,
Iubcoi3geTus rari/Ttme coufluentilJus, ai ris ni-
tidis cutimla tenwiffirma fubolivacea te*^{aisi}
ostiolo obfoh^{te} papiiato minuto, annuto de*
prefTo. Weigel. obfervat pag. 45[^] Tab, It
fig. 14.

In coitire *Fagi fylvati*'y»,

1275. *S. claw fa** fphsevulis orbicularibus, fpaiH
fubcongrfiis, atris, e. ulrrraide cint^{is}; ciff-
cio oAioli obfolrte pnpilJati atque epidermi-
dis, iubfuntia tinereo-aibida villofa, c\aulo:
gelatina nip*efcnnti.

In cortice *Fagi fylvatic*«e.

p villo cinereo-fufco[^] papilla puntflulo *atro*
vix prominente.

In Curtice *Botulae Alni* d«»je<fto.

xt-'*S. S. pundtiformis*, **epfphylla**; fpnaeruUs orbi-
cularibus, {parlis, fubc<nges'is, atris; ostiol*
papiiato fubpiomim-nti: gelat.na uipra.

In prona AipCrhcie **fbliormn** dcje[^]oruni *Querci*

Cryptogatria. G. Fungi. agy

1277. *S. mammillaris*, fphaerulis orbicularibus, depressis: cortice exterior! umbrino, interiori papillaque manifesto; prominente atro: gelatina nisra.

In ligno radice Betule ambo subputridi.

1278. *S. R(lfa)*, fphxruis fubconicis fpa*res fub fgregatis, atris, q>idermide ore inaequali fubdenticulato ad dimidiam circulis; papilla obtusa.

In fructibus fulvarum Rulae Canina?

1279. *S. acuta*, fphsralis orbicularibus fubconicis atris; papilla fune lindrica prominente, nonnullarum basi dilatati ac fpha?rula inpresta, in albis decidua & fphaerulae inferiori ore parte patellae infar remanent.

Ad basin cauium Urticae dioici vere inveni.

, * * * *oftidlo elongato.*

1280. *S. Gnomon*, epiphyta, fphicrulu rotundum, ruboggr^jzitis atris nitidis; ostioli cylindrici* re<5lis longitudine fphrullis, apice annulo incrassato lavi, basi annulo toruloso ac interdum impresso. Tod. Fung. MecXlenb. pag. 50 Tab. 16 fig. 115; bina bona.

In foliis adhuc viridibus Coryli avellanitestate vidi.

**81. & *incurva*, fph^rulis globosis fparfis, rarius geminis, rarissime ternis, atris; ostiolo fubconico longitudine fphzrulx, obtusiusculo fubinflexo: gelatina alba.

158 *Cryptogamia. G. Fungi,*

In ramis dejectis Coryli avellansc libere ~~im~~
inerta.

*B. confluentibus**

* *q/iolo Jimplici.*

115a. *S. macuiciformis*, epiphylla, immerfa, ~~spha~~
rulis subrotundis, atris, 2-5-4 vel plures in
maculam inquam, nigram confluentibus
ostio manifesto: gelatina nigra.

' *Sphocria corylea* var *fi conglomerata* Peers,
in *Uster. Anal d. Bot.* 11 St. pag. 26 Tab.
II. fig. b. c. d. g.

In foliis dejectis Ulmi campestris.

1283* [^] *& sculi*, epiphylla, immatura, ~~spha~~
orbicularibus depresso-convexis, nigris, 10-16-20
& plures in maculam subdentatam nigram
subconfluentibus, ostio manifesto: gelatin
mgra.

An eadem cum Xyphmate punctato Peers. *Syn-*
opsis. Method pag. 104?

In prona superficie foliorum autumno deflo-
rum ~~is~~ sculi HypocastanL

1284 *& granum*, superficialis, ~~spha~~
rulis subobovatis, atris, livibus, ostio manifesto non
infructibus: gelatina nigra.

In ligno subputrido.

1285. *S. Atomus*, superficialis, ~~spha~~
rulis rotundis, livibus, minutissimis, atris ostio ~~manifesto~~
non infructibus: gelatina nigra.

In ligno subputrido.

1286. *S. obducens*, superficialis, crustacea, fphs-
rulis rotundato-ovatis, subvibus minutis,
atris, ostiolo manifesto angulato: gelatina ro-
sea, cirrhato glomerata protrudens.

Ad truncos caeos, radices arborum.

Var. /5 fphutruis paullo liinoribus ob densita-
tern subangulatis.

1287. *S. Pulvis* superficialis, subcrustacea, fphar-
rulis ovato-rotundatis, tuberculoso-rugosis,
medio subfulcatis, nigris, minutis, ostiolo
subrimoso: gelatina uigra. *Sph. Pulvis Py-
rites Peers Synopf. pag. 86.*

In ligno Fagi & aliorum.

***1288.** *S. moriformis*, lubricrustacea, fphatrulis ovatis,
rugulosis, nigris, minutis, sub epidermide
latentibus vel glomeratis & cespitiformi fa-
cie epidermidem perforantibus, ostiolo rotun-
do, margine involuto: gelatina nigra. *Sph,
moriformis Peers.- Synopf. pag 86.*

In ramo dejecto subputrido Coryli avellan?

1289 *S. mucoja*, superficialis, glomerata, fphae-
rulis orbicularibus, subvibus, olivaceis, mi-
nutis, 8-10 vel plures glomerulis compositis,
ostiole rotundo: gelatina alba.
*An Sph. mammiformis Flon Dan. Tab. 1075
diindla?*

In cortice Salicis fragilis.

1290. *S. hujata*, subcrustacea, fphTulis orbicu-
laribus depressifimbriatis subtuberculosis fparfim
pilosis, ostiolo manifesto regulari subangu-

r lato) margine involuto: gelatina nigra. *Peers I c. pag. 75**

In ligno putrida

1*91. *S. Pezha*, fubanftacea, fphæruilis globolis xmembranaceis, aurantaco-minntis, exficcatif collabefcendo- concavis, oftio; lo inaniffto? regulari: gelatina concolor. *Tod. Jung. Mesr klenb*, 2. pa[^]. 46 t [^]. f. 123.

In truncis & ligno fubputrida.

ISQa[>] [^]. *miniata* fubcruftacca, fph'rulis ovatis aurantiaco-miniatis, oftio, maniffto, regulari, permanente? gelatina in[^] cii-rhis fimplicibus geminisque pulveraceis albis flexuofis expellens *Hoffm_t botan. Tafchenb.* a. Tab. is fif- 1.

In ligno pulrido.

Obf. Cirrhi gelatines numquem in 5". Peziza objervavi.

1293# *S. aurantia*, fphirulis ovatis, furfum aurantiacis, deorfum albidis fubaftomis, tomento flavo aurantiaco cinctis.

An diver fa ab S. aurantia Peers. Synopf. pag. 68. & Icon. & dej'cript. Fung, a_t pag. 45. Tab.II. fig. 4. & 5?

In fupern'lce prona Boleti verficoloris.

•* *oftiolo papillato**

1294. [>]. *quatemata*, fphsrulis fubrotundis, ternis quaterhis quini[^]que & c[^]fpitem formantibus, aliisque lub cortice latitantibus lublolutiuiis[^]

nigris, papillis brevissimis acutiusculis subconvergentibus. *Sph. quaternyta*, Pers. Syn.
 °Pf- pfg 45 Tab. *-fig 1. 2.

In cortice leproso Fagi sylvaticae.

1295. *S. uda*, sphaerulis rotundis, rugosis, subimmersis, caespitulis oblongis vel linearibus flexuosis formantibus atris, ostiolo subglobato papillato: gelatina albida.

Sph. uda § *Jalicia* Pars. Synopf. pag. 53.

In libere trunci Pini sylvestris ac Abietis.

1296. *S. mobilis*, sphaerulis rotundis laevibus, ultra dimidiam immersis, ostiolo **papillato** brevi obtusiusculo subdeciduo: gelatina nigra. An *Sph. mobilis* Tod. Fung. Mecklenb. pag. *ii*
Tab. 9 % 71?

In ligno Fagi sylvaticae.

197. *S. papillata*, sphaerulis orbicularibus laevibus ad limitem ligno immersis confluentibus foliisque atro • **fuscis**, ostiolo papillato obtuso basi. imprecis: gelatina albida.

In ligno Salicis fragilis.

1298. *S. pubescens*, sphaerulis subovatis vel ovatoconicis, basi immersis, **nigris**, furfuribus pubescentibus, ostiolo papillato manifeste obtusiusculo, apice atro subnitenti cum superiori parte capsulae subdeciduo: gelatina nigra.

In ligno arido Fagi.

*** *oftiofo elongato*

1299. *S. fpitwfat* inrruftans, Iphaerulis oralis, arfte connafcentibus, oftiolisque conico cylindricis craffis obtufis apice perforato-impreffis, rugulofis, atris: gelatina nigra.

Sph Jpinofa Pers, fynopf. pag. 54. Tab. fig 9- i°- II- is.*

In trunco ceefo fubputvido Coryli avellani.

1300. *S. Jetaja*, fphaerulis toto immersis, connafcentibus, ofuolis cyiindraceo - fetaceis laulcuiis, perforatis, prominentibus.

In ligno f&bputrido IHni Abietis.

II. *Sphmridis Jiromati fiibjedentlbui vel immtrsfat*A. *Stromati piano effufo.*

1301. *S. typhina*, fphtherulis fubrotundis, JalliHiv ftvomati teniiij elato-ambienti, primo albid* deiimm flavefcenti, ob oftiolis fubpapillati* prominentibus citrino-puntflato ^& fubaipera' to frrve B'mptici Jfnbimin^rsis. Prrs. Synop^ 29 & Iron. 8c Defcript. Fung. Fafc. |.

s\ Tab. 7 fig. 1 a b. paijj¹

Vere & ^Erftat^ in culmis graminum in loc umbrofo- humidis. loci'

1302L 5. *undulata*, fphserulis ovato- rotundis la- vibus nigus, oftiolis papillatis obtufis pronii' nuiis, ftromati tenui e maculis ovato- oblon- gis folhariis vel conflueiitibus, hinc elatis, fufcis, iititibus albidis, Terie limplici immerfis

gelatina albido - rofacea. *An Sph. undulata*
Peers. SynopJ. p#g. 21.

Sub cortice Betulte albae.

1303- *S. Jiigma*, ftromate ambiente-effufo, tenui,
pundtulato, ferrugeneo - fufco, intus albido;
fphaerulis ovatis, lsvibus, nfgri's, ferie fim-
plici immersis minutis, oftiolis conicis obtu-
fiul'culis fubprominulis. Hoffm. veg. crypt.
I. pag. 7, Tab, 2. *fig. 2.*

In ramulis deje&is fubputridis Coryli avelianse,
qui fphaeria hac figurese geographicae instar ob-
dutfse funt.

Obf. *Sph Jiigma*, *Sph. macula Tod. Fung. Meek-*
lenb. 2. pag. 53 Tab. 15. Jig. 106 & ejus-
1 *dem Sph, atro-purpurea pag. 33 Tab. 13.*
Jig. 105. haud pro diverjm fpecies, ha-
bendtz.

1304. *S. tuberculata*, ftromate craflb late-effulb
glomerato atro, intus albido; glomerulis ju-
ventute connexis, aetate iubdiftirKilis, tuber-
culis apheris obfifisj fpheerulis ovatis vel ova-
to - oblongis, nigris, aftomis vel fubpapillatis,
Aromati fine ordine itnmersis,

Hypoxylum Icabrofum Bull. Tom. 5. T^b,
468 % 5--

In trunco emortuo Coryli avellanae.

1305. *S. deusta*, ftromate craiTo late-effufo, bul-
lato undulato, cinerro intus albidu, aetat>
uigro & fragili, pun<5tis apheris undique fpar-
fio . fr>i.HPrillic nvatn.Tntninfllis oftiolo C0H1W

fubprominente, ferie fimplici peripherica »
mersis

Sph. verJipeMmTiO&. Fung. Mecklenb. 2 pag¹-
55» Tab. 17. fig iag

Ad radices truncorum fubputridorum in fylvis*
Varietas fub nomihe *Sph. Platyceps* a Pers.
in Obfervat. M\col I. pag 19. Tab 1 ff^r. 4-
dcfcripta & delineata, hisce in regionibus
uunquam obfervdvi.

B. *Stromate* ^ghmèrato fejjilt

a. fungofo.

* *fphasrulis periphericis fuperjicialibus.*

1506. 5 cinereo fufca, ftroinate ovato vel ovato-
oblongo hemifphtfTico epidermide fuhdcnu-
dato intus nigro fubftriato; Iphaerulis ro-
tundis 'nigris, divergentibus, velamento ci-
nereo-fufco circumdudis ac adglutinatis, ofti-
olo papillato acutiufculo atro, materia fubfa-
xinaea citrina indutis. Inter maximas hujus
feAionis pertinet.

In lihiTf Betul© alba.

1307. \$. *Pruni*, ftromate vario fubconflue»ti piano
conv xiulVulo epidermule dilacerato cin^o,
nigro -. fphaerulis r tundis rugulosis »:tris, fub-
an^ulatis, oftiolo fimplici depreffo. Equidem
int-r niximas numer^nda.

Tn ramis deje^tis fubputridis *Pruni* fpinofae.

Obf. Quoad formam & fiturn fphcendarum nipturunique epidermidis S^fkcucurbitula Tod. Fung. Mecklenb, 2. pdg 58 Tab, 14 fig. lie. *fimilis*.

13081. *S. anguistata*, ftroipale elevato furfum dilatato convexiufculo deorfum angultato, u^di^{*}us cinereo fuico; fphaerulis ovatis, «etate orbicularihfes depreffis, nigris, villoFiulrulis diverffentibus, oftiolo papillato obtunul'culo.

In libere & ligno denudato Pini fylveftns.

309. *S. obdudta*, ftromate tenuiffimo nigricante; fphfprulis obovatis ni[^]ris Cubdivergentibus, oftiolis ininutis fubpapillatis epidermidem byffo miniati coloris obductam perforantibus Bolt. Fung. pag. 55. Tab. 133.

In dejectis r-miulis Fagi fylvatip*,

310. *S. decolorans*, ftornate eleyato, convexiufculo, intus rubro epidermide dilacerato cindo; fphserulis priino ovritis coccineis lsevibus oftiolo papillato albido obtufiustulo, gelatina albida, demum cavis pezizarum more, gelatin aque obfeurioribus. Pers Icon. & defcript

In Fung, a pag. 47 Tab. .1 fig. s a. b. c.

311 caudice & ramis Fagi fylvaticae,

. *S. appendiculata*, ftromate elevato, fubplano, furlum villofiufculo, deorfum baud anguftnto, epidernnide dilacerato cin(5lo, intus pallide rubenti; fpba?rulis purpureo rubris tfotundis, l vibus, deciduis; oftiolo fubpapil-

An *Sph. appendiculata* Pers, *JynopJ. petg-*
i 50? ^g|

In ramis Ribis **yRbri.**

1312. *S. repens*, ftromate fubobfoleto lineari, in-
terrupto - repenti, cinereo - carneo; fpheerulis
globosis laevibus, copiofiffim s, coccineis, **pet***
fiftentibus, ofliolo fubpapillato.

In rimis trunci Sambuci nigtae.

13^3. & *mixta*, firomate elevato, cylindrico, *coXL**
voxiufculo, rubvillofo cinereo-umbrino, epi'
dcrmide dilacerato cinAo; fphaerulis .id mat'
ginem ftroinatis circinnatis, ovatis, atris, ofti'
olo papillato brevi obtufo, alliis fub ftromate
in libere fparsim latitantibus fubrotundis, ofti'
olo elongato cyiindrico obtufiufculo: gelatin!
nigra.

In cortice Betulae Alni linoatis feriebus longitU'
dinalibus, attamen diftintfis.

Obf. *Sph. Talus Tod. Fung, Mecklenb. pag. 15*
Tab. 11. fig. 92 -93 valde jimiUs.

** *fphxrulis periphecricis immerjis,*

1314. *S. Samhuci*, ftromate hemifpheprio conveXJ'
ufculo fubgranulato, nigro, bafi coarAato,
epidermide cin^o, intus cinereo; fph3eruH*|
xninutiffimis ofti lis peTbrevibus **prominen-**
tibus.

Sph natans Tod. Fung. Mecklenb. J. **pag. »?.**
Tab. 1;. %. 98.

In ramis aridis Sambuci nigrap.

13*5. *S. Cerasi*, ffromate hemifphaerico, ccqivexo, exafpeiato, denudato, **jri|go** fphamilig jni-nutifiimis ovatis oftioIisgJPfubpapillutis, pro*minentibus, concolorihus

In libere ramorum emoituorum ac deje&oium Pruni Cerafi.

1316. *S. Populi*, ffromate hemifphaerico, convexo, laeviufulculo, denudato, ferrugipeo-fufco, intuf cinereo, centro atro, exficcato vero atro, centro-atro cinereo; fphaerujis rotundis uitiolis fimplicibus, atris: gelatina nigra.

In cortice Populse trenmla;.

13.7. *S. fufca*, ffromate hemifphaerico deprefliufculo, rugulofo, fubpundulato, fubconfluenti, fufco, intus fufco-atro, denudato; f h&> rulis ovato rotundis atris oftioIi? fimpliribus fubimpreffis: gelatinu' albida. *Sph. tnb\$ r<, u- lofa Bolt. Fung.). pag. 51 Tab. 123 fig. r*

In trunco 8c ramis Cor)li avellans.

Obf. *Certe nofira Spharia eadem eft cum Sph. fufca Perfon. Synopf. 1 pa&. it & in Ufar. Anal der hot ites St. pag. 22. Tab. a. fig. 3. exclufo vero fynonimo Hoflm,*

1318. *S. coharens*, ffromate ovato vel ovato-oblongo conVexiufulculo, rugulofo, pustulis fub-elevatis fparsis Tubconfluenti, purpureo ferruginpo intus atro, dcnudatp; fphsrulis ovatis atris fubnitentibus, oftiolis fubpapilUtis lub-

prominulis: gelatina albida. An eadem ~~cum~~
 Sph. cohaerente Pers. fynopf. i. pag. n?

In ligno arido ^{^kii} fylveftris.

1319. *S. Rebejla*, ftromate plerumque oblongs
 convexiufculo longitudinaliter fub canalicula*
 to fubpundtulato-granulofo atro-fulco lumini
 tenti, interne negro, epidermide cin&o; fphae-
 julis rotundatis minutis oftiolis fubpapillati*
 fubprominentibus atris: gelatina albida.

Erumpit transverfim e cortice ramorum eicfic¹
 catorum Uibis rubri hyerne & vere.*

1320 *S. fragrformis*, ftromate hemifphaerico, fub-
 granulofo fubconflucnti, atro-fufco intus caf-
 bonario-atro radiatim ftriato: involucro £ liB*
 craff. villofiufculo, aetate juniore aurantiaco-
 flavo, deinde umbrino fufco, vertice dilace-
 rato aperto, intus concolore, obdu&o; fphae-
 rulis minutis rotundis atris; oftiolis papilla
 brevi fubperforatis. Pers Synopf. pag. 9 &
 in Anal. der. Botan, 11 St. pag. 21. Tab. 0
 fig. 5.

Ad truncos fagineos.

1321. *S. luteo-umbrina*, ftromate hemifphaerico vel
 ovato, fubconfluenti: setate juniore flavefcenti,
 punc'LS obfcursoribus, intus albido pallefcen-
 ti, veteriori fubtuberculofo, granulofo, extus
 intusque umbrino; fphaerulis rotundis, oftio-
 lis fubpapillatis pre[^]minulis.

In fubputrido ligno Querc,

¹³¹²# 5. *radiata*, ftromate hemifphajrico tuberculofo, f ubpundtulato, ial[^]nfluenti, ferrugineo-atro, intus carboni[^]Mkftro-p[^]ceo radia*to; fphcerulis fubovatis concoloribus, oftiolit fimi'licibus.

In l'gno caib Fagi fylvaticae.

An. fph. radians Tod. Fung. Mecklenb. a# pag. 29. Tcib. 12 fig. 101?

*** *fpharulis in Jubjiantia Jit omatis feriatim vel Jine ordine /par/is.*

¹³²¹. 5¹. *nivea*_y ftromate truncato villo cinereo obfito, atro pundlato, epidermide cin&o; fphserulis periphcericis ad dimidiam imraerfis, Ctfteris in fubftantia ferruginea ftromatis f \ arfis, atris; joftiolis fimplicibus ?

Hojfm. veg. crypt. I. pag. 28. Tab. 6. Jig. 3.

Flor Dan Tdb. 8[^]5- fig. i.

In ramis dejedlis Betulæ albae.

¹³²⁴. *S. ferruginea*, ftromate oblongo, convexiufculo, e\tus intusque ferrugineo, exafperato, epidermide cindlo; fphrcrulis fubperiphaericis, & ftromate fine ordine immerfis ovatis atris, oftiolis papillatis fubcylindricis longitudine inaequnli prominentibus.

Pers. SynopJ pag. 35 & in Objerv. Mjrcolog, I. pag. 66. Tab. 5. Jig. 1-3.

In cortice Populae tremula?.

¹³²⁵; 5, *caudata*, ftromate henaifphaerico convexiufculo ball coardlato, yillo cinereo obdudto

170 *Cryptogamia. G. FungL*

fubpunrtulato, epidermide denudato; fphfl*
 jrulis obovatis, gerduda tenuilTima a bafi ftro*
 jnatis incipinKus, ultra medium ferie fina*
 plici immersis, dudulis t^nuisfimis perfura*
 tis.

In libere dejedlorum. ramorum Fagi fylvatica?*

1326 *S. difciformis*, ftromate orbiculari planiufca*
 Jo, atro, punrtis aterrimis fubnitidis fubele-
 vatis, intus albido cinereo, epidermide dilfl-
 cerato cindo; fphaerulis ovatis atris ferie
 fiimplici in medio ftromatis, ducSlulis tenui\$%
 fimis perforatis. *Hoffm. veget. crypt I pag,*
15 Tab. 4 fig. 1

In trunco & ramis deje&is Goryli avellan^e.

13:7. *S. pcriufa*, ftromate glomerato tuberculob*
 rugofo fparfim impreffo - punc^ato bafi con-
 fluenti, extus cinereo virefcens intus albid '\$
 fphaerulis obovatis ferie fimplici in medio
 ftromatis, diftintiis, gelatinam nigram in-
 quintntem, per dudulos tenuisfimos glome*
 ratim propellentibus. *Weig. Obfervat. Bo-*
tanic, pag. 46 Tab. a. fig. 15. figura haud
bona.

Lichen pertufus £.

In cortice Fagi fylvatic*.

13*8 *S. verructrformisi* ftromate iüborbiculari ccp~
 vexiufculo, afpero, atro, epidermide 3 - 5 fida
 cm(5to & partim obtedio • fpliaerulis ovatis tint
 crdme iatit<mtibus, oftiolis elongatis conicfi.

cylindricis prominentibus. Pr. % Synopf. 1.
pag. 26 Tab. 1. fig. 5. tffe. a.

In caudice Fagi nee non ~~finamis~~ dejedis *Coryli*.

1129. 51 *angulata*, ftromate hemifphaerico, convexo, ruguloso, atro, epidermiks rima lineari vel t-4 fida cirwfo & ohducfto; fphceruli* fuhovatis copiofis fine ordine immerfis, nigris, oftiolis perbrevibus fubperforatis: gelatina cinerea.

An Sph. verruciformis j3 icllata Pers L. a?

In libere *Betular albar*.

1330. *S. Betulcc*, ftromate fubturbinato, convexi-wfculo, ruguloso, fitro, epidermide transver-Rm fiffa fubdilacerata cindlo obtecJloque; fphaerulis oblongo.-ovatis copiofis fine ordyie, oftiolis brevibus perforatis: gelatina albido-csfia.

In cortice *Betulae albae*.

1351. *S. coardtata*, ftromate oblongo, convexo, fubtuberculol'o medio coardtato atro, intus cinereo, epidermide ardle cinAo; fphsevulig rotundis atris fparsis, oftiolis dudlulosis?

In cortice *dejedo*.

1352. 51 *difformis*, ftromate hemifphaerico-turbinato nonnullorum convexo aspero, aliorum roncavo, fublaevi, nigro fufco, bafin verfiis coartflata, per rimam epidormidis aut lijua-xem, aut angulatim fiffam erumpenti, fphx-rulis fubovati* fparsis nigris^ oftiolis ~~ductu-~~lofis?

In parte fibrofa liberis ramorum dejecStoruiH
Betulf Alni.

1533. S *radula*, f^Rnate hemifphsrico fubplano
afpero nifl[r intus ferrugineo - umbrino, epi-
derinide puftulatim, elevata margine squali
involute, cinfto; (plwrijli* ovato oblongis
siigro cinereis, fparsis, oftiolis elon^atis Tub*
flexuofis promirh'imbus apice increaffatis.

In libere corticis Cor)li ayellan*.

1334. *S. ceratafperma*, ftrornate fubturbinato con-
vex ufculo afpero umbrino, epidormjrle pustu-
latim elevata r^argine fubaquali re(5lo, cinc-
to; rphsrulis ovptis bafi ftromatis fubferiatixn
immerfis, oftiol'S elonpatis cylindricis obtu-
fiufculis apicc pyominentibus. *Told. Fung.*
Mecklenh. 2 pag. 55 Tab. .7. Jig. 131.

In libere corticis Coryli, avellanae.

1335 *S. diala*, ft ornatè orbiculari convexo ni^ro
cinereo, epidermide dilacerato bafi cinrto;
fphaerulis ovatis periphericis fubimmerfis, aliis
ftmmati fparsis, nigris, oftiolis tenuiflimis cy-
lindricis flexuofis obtufis longe prominenti-
bus, g^latina alba. *Pers. Synopf, pag. 35,*
& in *Obferv. Mycolog. 2. pag. 67. Tab. 5.*
fig. 2. %.

In Corylo avellano.

Obf. *Sphyrria hacce ciliata* & *Sph. Hystrix Tod.,*
Fung Mecklenb. 2 pag. 5^. *Tab, 16. Jig.*
127, Jorte una eademque planta.

j8. *stromate carnojo.*

1336. *S. pallida*, stromate hemisphaerico convexifuculo pallido, punctis laterifrontibus sparsis, intus albido-pallidifcenti, basi fufco, epidermide denudato; **phrrulii** rotundis lufis periphericis immersis, oitiulis breviffime papillatis perforantibus.

In ramis dejetis femiputridis Pini Laricis*

An eadem cum *Sph. pallida Pers. Synopf. pag it?*

1337. *S. tremelloides*, stromate fuborbiculato, convexo, tuberculof T, basi coarctata, epidermide denudata, rubeunte-umbrino, intus in centra obruciori peripheriam verfus dilutiori; fpharulis peripheries rotundis fparfim inmersis concoloribus, otiolis lubpapillatis perforantibus.

In caudice putrido Fagi fylvatic*_{fc}

1338. *S. fcarlatina*, stromate hemisphaerico convexo, fubgeminatim confluenti, granulofa aetate juniore fcarlatina, adultiore umbrino, intus pallido radiatim fubftriato, fphirulis rotundis periphericis ad dimidiam immersis, otiolis fimplicibus*

In ligno fubputrido Pini abietis.

C. *Stromate fipitato.*

«. *carnojo.*

drico convexiufculo centro depreſto perforate
tomento ferrugineo fufco, byſto? ſurantiaco
intertexto, obdu&o, baſi ſubangulati, dema-
tio? nigro-fufco cin<ſto, intus albido rnfaceoj
fph^rula unica terzniaali centrali orbicula*¹
JTubdeprerTa, atra oftiolo ſimplici.

In uliginosis &c turfosis ad ramuium dejectura
putridum,

1340. & *punctata*, ſtromate turbinato, diſco trun-
cato albido nigro punctato, in ſtipite brevi
obconico deſinente, eſtus villo denſo, atro-
veſtito, intus albido; ſphsruſis periph:vrice
immersis atris oftiolis ſubpapillatis prominU-
lis. Flor. Dan. Tab. 288.

Peziza punctata £..

Sphceria Poronia Peers. Synopf. pag. 15.

In ſimeto equino ac raccino autumnno.

1341. *S. entomorphiza*, ſtromate globoſo-
capitate granulato-tuberculato; ſphxrulis ovatis peri-
pVumcis baſi immersis, atro-purpureis, ofti-
olis ſubpapillatis obtuſiufculis, tipice atro-fu-
fcis; ſtipite ſimplici, longitudine 3-4-5 line-
arum, ſexuſo, baſi craſſiori incurvo, put-
pureo, byſto albido cintflo furfum ſenſim ſen-
ſimque attenuato tereti, ſubſukat^, d lutiori
apice globiformi ſubturgido in ſubſtantia fir-
mutis terminato.

Sph. entomorphiza Dikf, Plant, crypt, brit^ Fnfi
1. pax* 22. Tab, *. fie. 3.

Solitarie vel geminatim e parte farinacea feminum dejecturum fuliginosorum graminum oritur. Junio vigentem inveni.

342. *S. militarise* formate ovato-cylindrico clavato, granulato-exasperato, in stipite elongato basin versus attenuate, tereti paullo tenuiori subflexuoso, lavi perfractis copiosissimis ac densissimis superficie formatis subimbricatis, rotundis. ostiis papillatis, obtusiusculis. Tota planta auriaco crocea stipite paulo dilutione, intus carno centrali albida. Flor. Dan. Tab. 137. Hilmlk. Beatruot. Vol. I. pag. 42. Tab. 15. sub Clavaria militaris.

Clavaria militaris L,

Sphceria militaris Peers. Jynopf. \ pag. 1.

In locis fylvatici9, ericetosis gaminosis muscosis in ermicis aut chrysalidibus phalxnam. Autumno viget

Variat. clavis a-3-4 fidis, fed rarius.

*\$43- & *alutacea*, formate cylindrico vel ovato, rarius bi-trilobo subtrilobato, primo albido subvillosiusculo, demum pallido-alutaceo griseo* stipite tereti subelongato lavi basi flexuoso subfulcato albido; perfractis copiosissimis ac densissimis periphericis, rotundis ultra dimidiam irameis, obfucis alutaceis, ostiis subpapillatis: gelatina in cirhis filliformibus flexuosis lateo-albidis propellitur.

Pers Synopf 1 pag. 2. & in *Obj. mycolog.* i*,
pag. 66. *Tab. § fig. j.* «. b c.

In pinetis foiiiis dejestis locis humidis adhæren* <
Mens. Septemb. & OAubr. legi

1344. *S. polymorpha*, ilromate ovato vel obovato
•obtufo> fubafpero, ftipiteque nigro brevi vel
Tubnullo fubfl«xubro, intus albido 7 centro
n'Spehente^perpendiculariter diffedto radiatirt
Jiriato); fphsmlis 01b culaiibus peiipharrici*
im)nevsis atris, oftiolis conice pa^illatis obtu*
s's' i'ub|>raminul'9 ^v

Clavarui digital a L.

Flor, Dan. Tab. 900. & Holnifk. I. c. pag,
64. Tah. 16,

Specim'na mea ad caudices c^fos & fubemor*
tuns </£fcul')ium Hypncaftanorum in horto *Ro**
Jenborg^Have di(5to plerumque gregatim autum-
no legi.

j3. *ftipite coriaceo.*

1345» *S. carpophila*, ftromate cylindrfco-vel ovato
fubulato, primo villo cinereo-albido obdu&o,
tttate glabro fubtubeiculofo nigro vel nigto-
furco, ftipite fubfil'formi toitili concolori, lon-
gitudine Fere ftromatis, intus albido; fphsrul-
lis periphtfiic's rotundis fubimmersis atiis,
oftiolis breviffime papillatis prominulis: gela-
tina nigra, *Pers. JynopJ,* pa^ 6 & in *Ob-*
fervat.. mycol. ». pag. G^, *Tab. 1 fig. 3 a-d*

Ad pericarpia Fagi fylvatic® in-locis humidis & umbrosis.

¹³⁴⁶. *S. Hypoxylon*, ftromate vel limplici primo C}Jindrico demum oblungo acuto, vel ramofo cornuto, compreffo: astate juniori pulvere albo obdudto, glabro & I'pluerulis deftituto; veteriori autern poft evanefcentiam pulveris, atro, tuberculofo; ftipite vel fimpl'ci vel gemiao compreffiufulculo primo hirtuto demum tomentofo atro-fufco; fphaerulis periphericis fabimmersis rotundis, oftiolis minutidimis pa* pillatis acutis prominulis: gelatina nigra. *Clavaria Hypoxylon L. Holmjk. L c. pag. 71 Tab. 17.*

In truncis, &c ramis dejedtis putridis,

D. Stromate celluloso.

¹
H347. ^ *eoncentrica*, ftromate ovato vel fubrotundo magno, tuberculofo atro fubnitido, intus teliulis in ftratis concentricis difpofitis orna* to, feffili vel fubpedunculato; fphaerulis pe-xiphaericis. Pers. Synopt pag. 8* Tab. 1 fig, . 3-4.

Sph. tunicata Tod. Fung. Meclclenb. 8. pag, 59 Tab. 17 ft'?. 130.

Ad caudicem Tilia europae®.

410. Naemaspora.

Perithecium orbiculaxe znexnbranaceo-coxiace-

CM)

urn fubocGttHum. Gelatina flimilis in cirros
vel elol/iilds pKunin^ns/ fub lente aniorpba.

1348- *N. fagih.* L*fcrithecio ? orbiculato, epid er
miHe cintto bullatitri elevato; gelatina nigri
e.mte inquinaute primo Tub fcpidprvide lati
tanta, derriurh per oreficium forma globo
vel conica perietrante.

In caudice Fagi fylvaticas fubpttrido.

1349. *N' JuglandiS)* perith6Lio? orbiculato, l epi
dermide cinf^b bullatim elevato; gelatiria ni
gricante fubinquiaahte globuliforme vel ci?
to craffo flexuofa propelknte.

Vere in ramis fubtmortui3 Juglandis vegi*

1350. A^r. *crocea*, peritbecio ? piano t, epidermid^
cin^o; gelatiria crocea, primo acute co;
fili^ormi quafi epidermide perforante & tuii*
incraTfata furfiim iterubi attenuata ramific*
ta crifnata, globulis rpetmatkis? rotundis al
/bis conCpersa.

Autuoino ill trunco caefo Fagi lylvatica* vidi.

411. *Xyloma.*

PeritTiecium applanatum fuborbiculare in; equale
debifcpns, intus Krcl.uin \ *Epiphyllwn*^

1351. *X. faticinwn*^ perithociis confluH^tilms crasi
fis, v'iculnibus, tubenulofus, 3-4 Hn. 1atis
nigris marline fubflt'xuofis, intus bafi card*
lagineis albis. Pers. S^n^pf. pa£. fO^ & Dis
pof. mrtb. fung. pag. 5 Tab 2 fig. 4.

Autumno in foliis Salicis capreep.

¹³⁵². *X. acerinum*^ peritheciis confluentibus planis, tenuis, orbicularibus^ rugulosis, 3-6 iia, latis, auis, nitentibus.

Autumno in foliis Aceris Pseudo-Platani.

¹³⁵³. *r. rubrum*, peritheciis confluentibus planis^ orbicularibus, subtuberculosis, 3-4 iin. latis, rubris.

Autumno in foliis Pruni spinose,

¹³⁵⁴^ *X. populina*, peritheciis minutis tuberculatis^ orbicularibus rugulosis nigricantibus, 1 * XI Ha. latis.

In foliis de Pruni Populae albae.

¹³⁵⁵- *X. punctiformis*, peritheciis subfoliariis punctiformibus planis subtuberculosis atris.

In foliis ilex (Folium) Populae tremulae.

¹³⁵⁶. *X. faginea*^ peritheciis foliariis confertis^ orbicularibus minutissimis^ foveolatis <limbo> impr^atis atro-nitentibus.

In foliis de Fagi *Sylvaticae*.

41a. *Stilbofpora*.

Maculae nigrae Cylindricae Tub lente ex theciis aut sporulis orientem fitens.

¹³⁵⁷- 5¹. *t. Stereomyces*^ sporulis It-latis, radiis tetradiis vel quatuor. Hoffm. Deutchl. Flor, a.

Tab n 1

In arborum truncis

¹³⁵⁸. & *pyriformis* sporulis obovatis. Hoffm. X; c. Tab. n fig 3,

In senecio fagineo

1359. *S. microperna* sp. sporulis subrotundis
 f. vatis [sublingulatis. Pexs. Observat. mycol.
 p. 51 Tab. 1 fig. 5.

In truncis, variis.

1360. *S. Jphmroperma*, sporulis minutis globosis
 Pets. 1 c. pag. 51 Tab. t fig. 6.

In ruinis Arundinis Phragmitis

An species in Umerandse cetera cives regni ve-
 getabilis?

415- *Calicium*.

perithecium coriaceum scyphiforme imbricatum
 stipitatum: discus intus fissus prominens puber-
 ulentus (*junioribus scyphuli membranula in-
 clusus*)

1361. *C. Uzenoides*, scyphulo orbiculari, margine
 subrepando, cinereo, subtus tuberculato centro
 umbilicato: disco elevato convexo fimbriato
 subtus hercutofo 7 atro; stipite erecto filiformi
 subfulcato, lufum cinereum, deorsum ni-
 grum, utrinque dilatato n. b. f. membranula
 cincto.

Mucor lichenoides L.

Calicium quercinum Pers. Disposit. meth. p. 59.

In caudicibus annorum Quercuum e eo ipso li-
 bore ortum suum habet. *Crusta leprosa a ct*
Achar. in Lichenograph. fvec. & ab aliis Anti-
rihus memorata, huius speciei tam & sequentibus
bus forte alicui esse iudico.

1562. *C. albidum*, fcyphulo cupuliformi fubtiis heraiſphctrico, einereo - albido; difco fubconvexiufculo junioribus cinereo, adultioribus uigro - olivaceo, ftipite cylindrico filiformi fubfulcato apice fubdilatato, fcyphulo concolori.

In caudice aAnoCo Quercus.

An varietas antecedentis?

^J36|, *C. adſperſum*, fcyphulo primo cupuliformi deinde dilatato fubhemifphaerico atro; difco fubelevato demum piano, nigro-olivaceo; ftipite brevi, criffo, glabro, apice (ubdilatato, fcyphulo concolori. Pers. Icon. & deſcript. Fung. 2. pag. 59. Tab. 14 fig. 6.

In cortice Quercuum annoforum.

¹364. *G. arcylceforme*, fcyphulo cupuliformi, aetate fere explanato margine foluto, cinereo fufco; difco elevato convexo demum globuliforme cinereo; ftipite gracili filiformi colore fcyphuli.

In cortice rimofa Quercuum.

¹365. *C. abietinum*, fcyphulo fubcujniliformi demum explanato albido farinaceo; difco initio conico valde prominenti aetate fubhemifphaerico depreſſiufculo atrq; ftipite gracili longo fubflexuofa, fuperſe colore fcyphuli inferne nigro utrinque fubdilatato.

In ligno arido Pini abietis.

¹366. *C. fagineum*, fcyphulo minutiffimo purpureo-atro; difco globuliformi viridi cinereo; ftipite elongate, tenui, furfum fenſim fen-

i(\$a *Cryptogamia. & Fungi.*

ISmque attenuato, apice Tubdilato colo*⁸
fcyphuli.

In ligno lubarida Fagi fylvat}ca&.

- 1367**, *C. ccaylinum*, fcyphulo cupuliforⁱ ore fub*
conniventi, fubtus hemirpbaevico, cinero-M'
rugineo-i diCco fubeleyato, canvexiufculo fer
ruginco viruUicenti, fubni^{ro}; ftipile iul cy
lindrica ftiperne dibtato fcyphulo concolori.
In ligno mxido Coxyl avellanæ.

414, *Tubercularia.*

Perithecium obfoletunt. Receptacuhira fubb**
roifplj^{ricum} fubftipitifarine, Gelatin a com
pa<ila utplurimum ruber fubperftitens (æat
pulvcracea .

1563. *T. vulgaris*%, difco hemifpheerico convexo
fulcato-rug fo, rubro-incarnate; ftipite cras
fo, brevi, pallido intus rubro -fervn^{ineo}, fir*
perne dilatato. *Tod, Fun§, MQcklenb. 1 pag**
18 Tab. 4 %, 50.

Tremella purpurea £,

In ramis & caulibus emortuis pr^{ertim} Ribis
rubri.

1369. *T fasciculata*> difco fubbemifphrnco con*
voxiufculo, drpreffiufculo, fublaevi rubro-coO
cineo, ftipite craffo, cylmdrico, apice fubdi
1-itr^o, **extus intwque pallide** - rul.ro, -5-4-
fasciculatim jundo & epideimide dilacera
cin<5lo.

T. fasciculata Tod Fung. Meclenb. 1 pag.
20. i'ab ^ Jig. 32.

An a *T. confluence* Pen. Synopf. pag. n j #
diverJa?

In caudice -/Efculi H pccdfstni.

177^G. *T. Pini*, difco juniorihus COLJVPYO umbilicato l«vi titrino, demurn fuhplano rul roaurantiaco, folUario vel gfmno in ftiplte craffo, carnafo, utrinq[^]ie dilatato iubvillulb albido, intus fubpallido.

In ligno arido Pini fylveftris.

1371. *T. Artemijice*, difco* fubhemifphaerico convexo laevi miniato - incarnato; ltipite breviffimo, crafftufculo, fubobconico, fuperne dilatato extus intusque pallide rubro.

In fibris inter cort'ffem & lignum ramorum emortuorum Arteniiaae Abrotani. Inter mmores militdt.

1372 *T. minnta*, dilco convexo fubtuberculofo, fubtililime pundlato, minjato, collo iangicino-violaceo; ftipite craffo brevi obconico, c\tus albido-violaceo intus albido rubenti.

In caule fubputrido Brafficae ojerace*. Ad mmtiffim s p[^]rtmet.

*573- *T. Pruni*, difco hemifph«rJco dedreflo punctulato purpureo ft-rrugineo, intus carne rofea ftiriata; ftipite e libere orto craffo brevi, perforalo ppidermide autem mox & valde Hilatato. latitudine difci, plerumque ab *fphccria*

repente vestito & cinco, externe ferrucin^{eo}
fufco, interne dilute cinereo - ochraceo.

In ramis dejectis Pruni Cerasi.

1374. r. *Cerasi*, difco hemifphaerico convexo, puno
tulato, n>argine> fublibero repando, ferrug*
neo - fufco intus concolori ftriato; ftipite per
brevi, mox diatuto fufco **rufo**, intus fordid
virefcenti peripheriain & bafin vcrfus fuli
ginofa.

In caudice Pruni Cernei. Decembv viget.

1375. *T. Populi*, difco fuborbiculari, tuberculoM
laevi, ciivreo paulo rubcfcenti; ftipite bCM
craXfo, fuJ)fulcato, fujerne diatato, extus fe[^]
xugineo fufco intus dilution.

In caudice Popu)* tromulse. Vi». Novembr

1376. *T. fulcata*, difco hemifphscrico fubdeprelJ
rugulofo ciuereo - fufco; ftipite fubelonga*
dylandrico cralfo, longitudinalUer reticulati
fulcato fufco-atro.

In ligno dejeclo putrido.

1377. *T. nigra*, difco orbiculnri fubplano, laevi
ftipiteque fuliginofa - atro inferne cylindrico
fuperne valde diatato, intus cinereo fulig
nofa incedenti, fubgclatinofa.

In ligno putrido.

1373. *T. hirfuta*, difo globulari depreffiufulculo hir
fnto; ftipite brevi, craffo, tereti, glabro; tot
extus⁽ intusfjue fuli[^]ineo-atro.

In caule Coryli avellana.

415. *Sclerotium**

Perithecium nullum. Farum, forma varium,
intus laeve fimularc.

1379- *S. durum*, ovatum vel ovato - oblongum, fub*
confluens, convexum, laeve, nigrum fubni-
tens, intus album; substantia tenax.

In caule Sii latifolii hyeme legi.

*380. *S. ovatum*, ovatum subdistindtum, convexum
laeve nigrum, intus pallidum fubvirescens;
substantia tenax.

In caule & ramis Brassicae oleraceae jam exsic-
catae & subputridae. Scro uturano inveni.

*381. & *quercinum*, hemisphaericum, convexum,
laeve, fubtus concavum, fusco - nigrum, intus
flavum; substantia tenax duriuscula.

Foliis dejectis subputridis nec nun in frustulis
li^ni dejecti Quercus roboris, autumnno.

1382. *S. Hypnorunij* subrotundum, tuberculofum,
punctis elevatis minutissimis subfarinosis, coc-
cineum, intus pallidior; substantia carnosa,
mollis.

In locis humidis pinetorum furculis intertextis
decumbentibus & subdepressis Hypnorum punc-
tiforme sparsim inhaerens. Septembr. & Odlob.
vipet.

1383. *S. Fagi*, subglobosum, rugulosum, subpunc-
tatum miniato-incarnatum, intus concolor;
substantia mollis subcarnosa.

In ligno subputrido Fagi sylvaticae, Junio legi.

1384* *S. album*, ova turn^x convexum, Iseve, ville-
fiufculum albidum, intus concolor, lubftaU"
tia carrola duriufcula.

Hymenio Agarici cujusdain putridi adnafcenJ
vidi Julio.

1335. \$? *peziz&forme*, epiphyllum orbiculatuiU
planuin, deinde paUllatam marg-ne pJ-tuf"
pezizarum more, fubtus convexum, laev* i-
ridefrente • album, intus coi^color; J ubftantia
carnofa duriufcula.

In foliis deje^is fubputridis Fagi fylvaticae. Oct.

1386. *S. gramdatum*, globnfum, congefium, fub-
lsEve, pallide rofeum fublateritiurn, intus pal*
lidior, fubftantia Cfrnofa jnotliufcula.

Cum malTa leprofa roTAcia-lateritia amorpho
lente autem confiderata globulofa, in Lichtni-
bus variis, ftellato, iaxatilique arborea preefe-
tim, arde adhasrens

An TubercuLaria rofea Pers, Synopf. pag.
114?

1386. \ *S. perficolor*, glohofum vel pvatum fub-
hemifp];2?ricum florum Amigdali perfici ob*
fcursor; globulis minutiulmis rotundis en-
fertis compadlis. *Lichen rafeus*. Flpr, Dan*
Tab. 124^ fig, }.

In caudiee Pruni Cerasi, & in ramis Vaccinii
uliginofi. liyemc viget.

1397. 5 *flfivum*, ovatum ye] fuWotundi^m con-
vexum fubtuberculolum fubconfluens. luteo-

pallidum, intus dilute fuscum; substantia tuberculata subduriuscula.

In ligno dejecto subputrido.

588- *S. hirsutum*, subconicum, subturbinatum, nitidum, ochroleucum, intus pallidum basin versus umbrinum; substantia carnofo-gelatinosa. In vasis exsiccatas subcorneis trunci caesi Fagi Syrdiceni. Septembris.

589- *S. fasciculatum*, epiphyllum orbiculatum, corripplanatum, convexiusculum, vitescens, pilis ferrugineis, nitentibus, fasciculatum. Coccis; obduatum, fungus planum glabrum, inanis concolor substantia duriuscula carnofo subfragilis.

Autumno in foliis dejectis quercini? levis adherens, etc.

590.. *S. Eryiphe*, epiphyllum globulosum, initio laeve lutescens subdiaphanum, deinde fusco-purpureum, & demum rugulosum, nigrum, nitidum, subinhiaculum, opacum, tomento (utilissimo, farinae instar, alio modo infidens, intus cuicous; substantia subcarofo.
Mucor Eryiphe L.

In parte foliorum Cervi avellanensis Betulae, etc. Auumno.

591. *S. truncatum* obovatum, subturbinatum, convexiusculum, laeve, virpureo-atrum, subnitens, imus fusca; substantia carnofo duriuscula.

In averfa parte foliorum *Circese lutetianct.* Au-
fcumno»

416. *Piloboius.*

Veficula capituliformis, receptaculo ftipitifor[^]
fydrophoro impofita.

3392. *P. ciyftallinus* \ receptaculo ovato[^] ventrico-
fo diaphano fubftipitato: veficula orbicular*?
complanata conyexiulcula fubtus (ubexcavat3;[
Flor. Dan. Tab. logo.

In locis umbrosis humidis, fupra rnateriam circ?
domos nee non in fimeta equina aut bubuliuaJ
JMethamorphosis hujus plantuL-B memorabilis[^]
jiitidae fequens eft. Receptaculum incipit cum
puncto minutiffimo orbiculato, poft raa[^]is ma'
gisque elongaturn, cylindricum, fubfiexuofunii
tune ex apice globulum hemifphcericum evol'
vitur &c in hisce ftadiis diaphanum aurantia[^]
cum nitidiflimum appareat. Nunc recep-
taculum paul ul um fuperne ventri cosum A,
pallidum, &* ^lobulus fupra planus colore
ferrupaeo - fufcus; deinde receptaculum p[^]ane
ventricofuna aquula repletum fubpcellucidum
albidum, inferne ftipite brevi fubluteo, ore
contracto.: ve/icula mngis complanata & Icn-
tiformis, inferne fubexcavata fufco nigrefcens,
demum a guttula membranula tenuilnma uj-
clufa elafiice protrufa dejicitur.

S353. *P. rotys*, receptarulo glob9fo diapkano*
peliucido Tup erne lutefcete, inferne ftipite-

t que elongato, filifbrpii cylindrico incurvo, pellucido, fubpallido, undique guttulis aqueis obfito; veficula hemilphaerica complanata, convexa, nigra, fubtus cdvo feirugineo.

In ftercore humano fpeciem hanc praecedenti fafcs diftin&am bbfexvavi, Autumna provenit,

4*7* *Sphcerobolus**

Vefiaila globofa, receptafiulo globofo radiatim firfo primo inclufa ac inatUrans elaftke protrufa.

¹39+. *. *Jtellatus*, veficula ovata, levi alb4 baG crocea; receptdculo totundo - ovato, carnofo demum lacinr̄s qumqae lev lanceolatis ācutis, patentibus, croceis, fiffo, bafi pallido* fduc annulo fubelevdto. Flor. Dan. Tab* 865.

In truncis putrefcentibus nee aon in acervulis ferraginis. Autumno viget.

4¹8* *Lycoperdon.*

Peridium Tubfcaulefcens, apice demum rupium, verrucis fquamulosis aut fpmulosis obfitum (*Pulvis feminahs viridis vel biride -ftifcus*).

⁴395. *L faccatum*, peridio fubglobofo, verrucis minutis obfito, collo contrado plicato, cauleque longo teieti albido - pallefcenti ore fubrotundo, fublaciniato. Flor. Dan. Tab. 1139.

In fylvis pr«fertim pinctis autumao obfervatur,

1396. *L. gemmatum*, cespitosurri, peridio obovato
 acuto, cauliculis longiurculo subcylindrico
 albido-pallidiflorescenti, verrucis conicis in
 nervis porrectis deciduis. Flor. Dun. Tab.
 114[^]-

In pinetis fere frequens. Fine aestatis &
 autumno.

1397. *L. Bovistae* peridio raris obconico tuberculato
 pallidiflorescente albido, tuberculiflorescente, fu-
 tus pericarpio, squamulis minutis, demum
 dimidium aperto & in laciniis inaequalibus
 orbatis ferebilibus; pulvere umbrino. Schet-
 Fung. 2 Tab. 151.

In ericetosis circa Birkerød & Bn[^]Tvaerd,

1398- *L. pyriforme*, cespitosum, peridio obovato
 subcylindrico cinereo-pallido squamulis
 minutis; radiculis raris fibrosis longis
 subterrestribus; 010. Votivado fere
 ciliato. *L. ovoideum* Bull. 5. 455, It^g 17

In fylvis ad radi es arborum.

Etate primo fere cylindricum cineris-
 fulvum ac obtusum, deinde medi) coarctatum
 & peridi) jani ovato umbellato, cinereo-
 pallidum, demum in figura fupradicta in-
 fe manftrat.

1599. *L. cchinatum*, peridio obovato vel tuberculato
 pallido-umbrino; verrucis validis
 ferebilibus apice fuliginosis; radit-
 pulvere pallido - viridiflorescenti.

In fa gi net is haud copi ^fe invent ubi fine sefta-
*is & autumnno folitarie provenit

^{1400.} *L. pujiUunt*, peridio magnitudine Pisi ma*
joris fubrotiLxdo prlmo albido, dein d'lute
fufco, verru is fquârnuhs m'inutis demuia
umbrinis ore miti'.to f^bla iniato; caüle fare-
vi, radicuLis copi si\$ ramifi atft' repentibus.

In CQIUCUI* Æis encetosis circa *Bugfvard* ferè
ftutumno f htar^fe les;i.

¹⁴⁰¹» *L. pratense*, peridio hem spii&nco, candido,
mollis ldp\insculo; verr iis cLintttilSmii, or©
mediocn laciniato; caule breViffimo pli;ato.

Æft.ue & autunifto 'p ft pluvias in pratis, ad
dimidiam fete terrae itnmersum.

^{1402.} *L. tpfellatum*, peridio hemisphserico, me*
d'wjdj albo deinde fusco coridceo-membra-
naceo, teffellatim rimoso telfulis magnis ir-
reg laribus, plani^.; vertucis ^defiit^tis; ore
amplo laiinidto, caule bie\llfio; radiculis. era*-
hs oarnosis ramosis l»ngis

Haud frequens in lagmetis & quercetis folita-
rie inveni,

^{1403.} *Z. papillatum*» peridio obovato, subtirbinato
tnediocri subcandido, cotiaceo - membranaceo
teffulatim rimoso, teffulis minoribus papilla-
tis elevatis, verrucia miilutis, ore amplo; ra«
diculis breviffimis. Schff. Fung. a. TaK
'89.

In pratis aestate ft autumnno «olitarie prorenif

1404. *L. unguinum*, peridio depreiib lentic magnitudine, glabro membranaceo - coriacea, pallido, demum tmibrino, laciniis inaequalibus lanceolatis depreffis fillo; pulvere fusco - olivato.

In unguibus tfeje&is subputridis aequorum.

4*9. *Lycogala*.

JPeridium membranaceum subclausnm interne primo maffa p'lposa subliquescente deinde pulvere fil's rar's intertexto repletum.

1405. *Lycog. miniata*, ut plurimum cespitosa, subconfluens, peridio globoso amoene rniat' **sobtiffime** granulato: granulis subsquamosi paullo obscurioribus, demum fusco, laeviusculis. **IO** maffa pulposa viidescenti subfnsca; pulvere roseo. Flor. Dan. Tab. 720 & Holmsk. ot. rur. beat. 2. pag. 58 Tab. 31 sub *Lycog. perdon* Epidendrum,

In truncis subputridis aestate & autumnno.

Obs, *Color viridescens Juijus fungilli immaturus uti Holrnfk. 1. c. monet numqicarn mild Obvius JuiU*

1406 *Lycog. ferruginea*, subgregaria, libbra, peridio globoso seffili vel subftipitato, purpureo ferrugineo: granulis minutifimis fuscis **O** dudlo, demum pallido-roseo, ore minuto] **l** ciniato; pulvere antece4emi obscuriori & ferrubio-violaceo.

In lisao putrido.

407. *Lycog. cinerea*, gregaria subfolitaria, peritlio globofo feffili cinereo-, granulis rminuti» atro-fufcis; pulvere pallido, v

***• ramis putridis dejectis.

408. *Lycog. plumbed*, gregaria, confluens, major, peridio forma varia, depresso, laevi, primo plumbeo, dein cinereo, ore nondum observato; massâ pulposa fusco-purpurea; pulvere paulo dilutiori.

Cum *Lycoperdo Ardofiaco* Bull, a Tab. 197. baud male congruit.

In trunco putrido quercino autumnno legi.

420. *Fuligo*.

**rimo pulposa ut plurimum effusa subdifformi⁹.
Peridium membranaceum vel subcoriaceum, varie ruptum & subvancens intus, fibroso-cellul^ofuni & pilosum.

409. *F. Lycoperdon*, peritlio sublipmifphserico cinereo-pallido depresso, laevi, tenui, varie rupto; pulvere umbrino.

Reticiilaria Lycoperdon Bull. 5. 446 fig. 4 & 5. 476. 1. 2. 3.

V In trunco Cor}li avellanse.

An diversa a *Ful* leevi Pers. Synopr. pag. 160 si colorem excipies?

4^o. *F. phimbea*, peridio oblongo, plano, laevi, tenui, cinereo-plumbeo varie rupto, mem-

brana fubjacenti tenuiffima cinerea; pulvere dilute umbrinu.

In trunco caefo Fapi fylvaticae. Sub finⁿⁱ aetatis vr^{et}antem inveni

Vaviat *peridio globuliforme.*

141-1 • *F. ruf&t* figura varia, peridip convexo, gofo, fragiis, rufo, fubcoriaceo; pulvere ligineo-xrigro. Flor. Dan. Tab. 773.

Æstate & autumnno ad trunc^s arborum.

1412. *F. carnea*, ovato-oblonga, confluent; peritlio pKterno? fubplano cinereo carneo membranuceo fubdeciduo: interno? fibrofo-reculuto, griseo-fufco, varie rupto; pulvere atro.

Rariffimam hanc in caule marcefcente A: mifise vulgaris Mens. Novembr. legi.

1415. *F. flavescens*, effufa, fubrotundaque; peridio exttrno? convexo_b fubrugulofo, tenuiffimo, fubdfciduo, citrino: interno tellulof* fibrofo pallidiori; pulvere fufco-atro. Schwaef Fung. 2 192. Bull champ. 4 380 fig. 1.

Ad truncos fuper folia decidua baud infrequens
Æstate & Autumnno viget.

421. *Spumaria**

Primo pulpofa granulata. Peridium duplex d^{ternuni} furfuraceum deciduum: internum moforo-rornatUm, aut fimplex fubrotundum longuxnque; persifiens.

1414. & *alba*, primo spuma alba referens: ficca tuberculoſa glomerata; peridiis inter ſe cohaerentibus, oblongis, rotundisque cinereis; pulvere ſubtiliſſimo atro. *Bull champ.* 5. 424. *ſub Reticularia hortensis.*

Super muſcos & alias plantas in pinetis cricetiſque Mens. Jul. & Aug. legi.

1415- *S. cornuta*, primo alba granulofa ſpumofa; peridiis ramosis, tuberculatis, comprefſis, cicercio - cteſiis, congestis, hinc inde in tuberculorum vel ramo'um apicibus aut latevibus ore minutiſſimo atro rotundo, dehiſcentibus; pulvere purpureo atro. *Reticularia alba Bull, Champ.* 4. 526.

In famis deſectis Pini abietis obſervavi. Viget Jul. & Aug.

1416, 5. *flava*, primo granuloſa, plana, ſubconfluenti, aurantiaca flava: aetate magis confluentis glomerata tuberculofa ſufco-furfuracea; peridiis ſubrotundis, angulatis, fuligineis; pulvere molliſſimo atro purpureo.

In tu'ncu Fungi putrido Mens Novemb. legi,

1417. & *pallida*, primo granulofa plau" confluentis citrina; peridiis ſubdiſtinctiſſimis oblongis turbidissimisque, pallidissimis; pulvere concolore.

Super muſcos & ramos deſectos eſtate vidi.

1418. *S. ramofa*, primo granulofa ramofa: ramulis complanatis, baſi confluentibus, citrina:

globularibus inter se conaerentibus mgris; pulvere purpureo-f. co.

In trunco caeso subputrido Quercus robori* Septentr.

1419. *S. minuta*, primo glomerata fufsbhemifbf^e rica v\ x 7 lin. lata miriutim granulofa, citrina; peridiis subreniformibus: externis flavis subduis fragilibus: internis atris, durioribus; nucleo ex pulvere conglutinato atJo, ovato, compaAo.

In squamis ftrobilorum dejeAorum Pini abiel femel fine aetatis obfervavi.

1420. *S. granulata*, primo glomerata granuloi¹ citrina; peridiis globosis 3-4 cohserentibus¹ externo citrino laevi subcoriaceo: interno tffij nuicri, fragili_t pallididri; pulvere atro.

Foliis dejecStis Piai Abietis adhaerens. Autumn[^]

422. *Didermii*,

Peridium l»ve duplex: externum fragile: internum pellucens, subdistans. Columella magna. Fila pauca lateniia.

K41X« *D. crajjipes*, peridio fphaerico subdeprefft, primo fusco plumlieo deinde cinereo ac dif* mum cinereo-rofaceo, subnitehti, rugulof*¹ quadri-quinquefido perfiftenti, fubtus umbilicato; ftipite ! reviufulculo craffo albido in columella convexa albida definenti, pulvere remiiali- purpureo - atris.

Am diverfa a *D. umbilicato* Pers, Synopf.
pag. ,65?

Supra mufcos, ftipites dejtftos fparfixn. Otftbf
viget.

1422. *D. fpuriwn*, peridio hemifphaerico umbili-
cato nigro, demum cinereo albido laciniis
vairiis patentibus inaequalibus, interne fubro-
faceis, fiffo; columella minuta fubobfoleia al-
bida; ftipite fubelongato apice attenuato, balS
craflb fubfulcato albido - fufcefcenti; pulvere
aigro.

In ligno putrido Fagi Junio.

Metamorphosis hujus fungilli per varies fta-
dias fequens: >mo, fluuilis albidus ftipitatus;
ado. pcridium rubro-coccineum rotundum
laeve nitons, ftipes albus, mollis cylindncus;
3dio peridium carneum hemilphsricum de-
preffum, ftipes furfum attenuatus fubfalcaitus
albidus; 4to. peridium nigrum intee;rum sto
Peridium nigrocine^eujn vertice fiffum, fti
peſ albido fulcefcentis ac demum 6to. peri-
dium dSere^o albidum, laciniis¹ patentibus.

1423. *D. oblongfim*, peridiis congestis obJongo-ob-
ovatis: externo tenuidimo albido - cinereo,
laciniatim deciduo: interno coriaceo¹ duro
atro; ftipite albido fubmcmbranaceo, xnera-
brana fubjacente; pulvore aterrimo.

Super ftramina fterquilinio dejtfta. ~~AEdate~~
legi

ffitate primo, uti in *Spwnaria*, . cffufa i¹
 qua)is gpr&jaulata, flavo ferrugijoea; de>)
 granulae diftintftae mox putem in fis
 fupradidliiin oblongam vel ohovalam rrutata
 tur qua ftipitibus primo coileicentibus de
 de diftintfis i'ubmembranaceis albidis, mem
 brana fubiaceati cuuaatis. infertac*

14 ^4. *D. acumin&tum*, peridio fphervico ntro d
 riduo; laciriis in«qualibas capiKitio fubtilf*
 fimo - difmfo adbaeren tibus; columBa coo*
 acuta fubobfoleta; ftipite fubulato medio
 nigro.

In ligno abietino fubputrido, Septemb. leg¹]

425. *Phyfarum*.

Peridium fiinpl.-.v, r'giduril, Tubfarinaccum p
 Turtiqur ina?qiiHlilPT rumpens. Fila utpl^
 mum adnata, latentia.

* *acaulla*.

1425. *P. ovoideum*, congestum, perVdvJ'ovato, W_A
 tenuirfimo membranucto, albo, hyalij) o,
 pra medium dehifcentt; fiiamentis capillit
 reticulatis albis, loto adnatis; pulvere Pabt
 li.Timo iigro. *Flor. Dan. l'ab. 655 j.g.*
Sphccrocarpus utricltlaris Bull, champ. 5. 41
fig. 1 quoad Jigurani peridii, Jlipis auto
in nofiro plane deefi.

In ramulo dejetto Betula\$ aim menf. Decemb.
obfervavi.

426. p. *cinerascens*, fubcongftuurr, periclio glo-
Wo vel fubovoto, c, nere>, **furfure** fquamu-
lofo fubalbido, vertice irregulariter rupto,
deinde "ad* medmYn deciduo; filament is ca-
pillitii la.vis pulve'reque' fufcis.

In Boleto verficolare feftate lei.

427. *P. Oxyacanthkcc*, rparfum, ravins 2-3 con-
naium, peridio fubhenufpbceTico, depveffi^s-
culo, fufcQ cinereo; capillitio compac5lo pul-
"ereque purpureo- fufco,

***• trunco vetusto Crata-gi Oxj-acanthse. Octb.

428. *P. violaceum*, prhno Fiuxili, granulatum
congestum vialaceo-Ulacinum dcmuia uigro-
tufcum, dcniqne, peridio coefio, all>>do **fqua-**
wiu!olo, inaequaliter vui'ta, capillitio pulve-
teque atvo-fufco compafto.

In foliis Myosotb Tcor^ioidis initio Novembr.
legi.

429. *P. villafum^* fparfum peridio fubhemifphæ-
rice, fubl CQli, rugulofoido, pilis bre*i-
W; molliffimis v-cftit cap-illitio compaflo pul-
Yeveque purpureo fufco.

In ligao putridu. Æftaie.

430. *P. hiteo - album*, prim fluvile, ^ranu?atum,
Co ns:cstum album in pitatur n, dfmum pendio
l^tefcanti globofo, fubfufco fqudmiii^lo pinæ

sessilibus capillitio compacto, pulvereque flavo
citrino.

In ligno putrido.* Auguisc.

* • *stipitatae*.

1431 *P. falicinum*, sporum, primo citrinum
nigrescens, turbinatum,
subumbelliforme depressum, sub-
tatum; capillitio compacto pulvereque
cinereo.

In foliis Orthotrichi. Septemb.

1433. *P. bulbiforme*, sporum, primo flexile
obovato vel subturbinato
brevi caelo; peridium hemisphaerico
subtus umbilicato atro-purpureo
tincto; ore terminali subaequali; capillitio
villoso pulvereque subprotruso purpureo
atro; stipite elongato sursum attenuato
sulcato alludo.

In ligno dejecto putrido. Octob.

1453. *P. albo-punctatum*, peridium globo-
neo-atro squamulis minutissimis albido-
punctato; capillitio compacto pulvereque
brunneo; stipite elongato laxo subflexile
sursum subattenuato flavo. *An diversa a*

P. tigrino Pers. pag. 174. ? Didymio tigrino

Schrad. nov. gener. pag. 22 Tab. 6 fig. 2. 3.

In truncis Fagi sylvaticae in Hypni foliis. Ju-

uWervavi.

*454- *P. aureum*, subcongestum, peridio prim© albido fufcefeenti globofo, cteinde luteo, hemifph&rico depreffiufulculo umbilicato, in laciniiis 4-5-6 inaequalibus fubreflexis, parti to; capiliilio compaCfto pulvereque atro purpureo; ftipite elongato laxo fulcato furlum attenuato apice fiavefcente, medio albido> bafi unibrino. iubpeliucido. Pers. Synopf. pag. 175 & Di* pof. meth. Fung. pag. 8. Tab. 1. fig. 6.

In ligno putrido Betula al)>». Octob,

•435. *P. aurantium*, peridio hemifphaerico, Tub umbilicato, fubfciuarculo pallicUv citriiio; capillitio c6mpa(^lo pulverpqu^ pal.Udo; fiipite elongato laxo furlum att^nuato fuico:-nigri^ cante. An una eademque c, Ph% aurant. Pers. Synopf. pag. 175?

In foliis Ojcthotricfei ftrijati, Aug.

¹4i6. *B. citrinum*, peridio hemifphoerica fubumbilicato, citrino, fquamulis ohfeurioribus obfito partim dchifcenti; capillitio compadta pulverequ© atro-fufco; ftipitefubelong.7to.cylindrico ful>ncuryo pro ratione craflb peridio concnlre.

In foliis Mnii fepillifblii ad radices arboruxa. Octob.

*437- *P. fuhulatum*, fparfum, peridio primo flu« xili ovato coccineo eredto deinde globofo luteo ac demum fubcernuo, umbririo-fufco; canillitio compacto Dulvereauc j>ajpureo atro;

Ap^{ite} elpngaio Uo rubflexuofu fuhulato, ba
dio fufcg, apke lutefcente.

In Betula alba puiida Otfob, vi^{et}.

1438. ft *connatum*, ^{con} ^{stulij} ^{t.} ^{espitiforme} ^{p.} ^{ri}
mo miniato cuccin' inn p^xjulii globosis fi
pitibus albidis pellucidis elu»gatis; d-inde
peridiis pyriformibus Jielvolis, ac d-^{an} ^{ru} [—]
bro-badiis laevibus; capUlutio conapatflo pul
vereque badiis; ftipitrus in ultimo studio
Jubflexuofis iurlum atte ^{nuati} ferru^{ineo} -fa
fcis, ball faiciculatim connatis niembr
fubjocenti.

In trunco putrido Fagi fylvaticae. Semptembr
obfervavi.

1459. P. *ieprtffum*, fparrum, ppridio orLiculari
deprefTo ful)tus umbilicato, excavato duplex:
externo albido fuhtilititno: interno a^{fco}; ca
pillitio pi ^{ilverequ} te purpureo-feimpoeo; fi
pitem brevi c ^{rafio} ere<flo alba, apicem verius
contra<5lo & iterum lurfuin fubdilato, bail
latiori.

In virgultis deje^{is} femiputridis. Au^{et}. legi.

Retiitaria ken *ijphxrica* Mull 5. tab. 446.

Jig. 1. haufl *dijjimilts*,

1440. P. *mai&inufum*, jjeridio hemifph*rico con
vexo caeuo farinaceo umbilicato, nunc mar
gine obtufu nunc acuto fubnutan: ^{i:} ^{tpUU-}
ticl compact pulvereque airo; ftipite elon
gato fuhfulcato furfum attenuate albido-
nereo, bafi fulco.

Inter cortio-m & liberum in parte fibroid Fagi fylvaticae, Viget Septemb.

1441. *P. didym-tin*, fubcunserum, peridio plerumque Tub didym.0 vcl tuberculoso, Umbilicato, cinereo, Iquamulis aibidis; capiLUtio compact pulvcrequ[^] airo; Itipito 1ubelc-neato laxo furfum attenuato albido, bafi fuico bi-tripartito quad radioulis diviCo.

In lisno Tubputrido Fagi fy]vaticP. Septemb, inveni.

1442. *P. gfohofum** r[^]arfum, peridio piimo atrofusco denuun rinereo, fquamnlis albis, glo-»oCo, umbilicato; CApillitio compado putve-reque atro; ftipite brevi Tubes lint-rico nig:ro.

In vircultis dtjedis & foliis Iagi fylvdticaj. Autumno.

1443- *P- nut an s[^] Jibcongescu>n*, peridio 1uble;itulari umbiticato nutanti albidu tiat'reo, pfi- mc- gl<ibr> deinde ruguloso & vane rupto (7«a/I ;:igro-maculato Je monstraf); capillitio comp 1^o pulvereque atro; ftipife elongato fuiTum attenuato fulfubulato albido, Laⁱ ventricosu -bulbofo fulco. Bull, champ. 5 4[^]. fig. 3-

In ligno putrido, Autumno vic;et.

1444- *P- Pim_o* fubcongestum, peridio oblongo fuMnemispherico, depressi, umbilicato glabro, vertice varie vupto, cafio; capillitio compacto pulvereque atro; fupite elongato nigro-

fusco furfurn attenuate, deorfura fubinerato.

In foliis & ftyobilis Pin-i fylveftris deje&is. Autumnno.

1445. *P. furfuracewn*, fparsum, peridio henri' fphserico umbilicato cinereo, fquamulis albidis obteclo; capilUtio compa&o pulvereqU* purpureo-fusco; ftipite mediocri, fursum atteiiuato albido, deorsum increflato fusco.

In li^no putrido Fagti fylvaticae. OAb.

1^4v-, *P. folutum*, fparsuna, fubcongestum, peridio Xphaeripo caesjo > plerumque in duabus partibus quafi valvulis perpendiculariter <^iviso; capillitio cornpa(5to., a per^dio fere plane fo* I luto, pulvereque atro - fusco; ftipite elougato laxo cylindricu^ peridii colore«

In li^no. putrido. Autumnu.

X447. *P. hyalinum*, congestum, peridio globofo, albido, tenuiffimo, fubhyalino, vertice denutm rupto; capillitio reticulato atbo adnatoj pulvere fubtiliffimo atro; ftipite elongatq, **capillare, flexuofe.** *Pers. Synqpf. pag. JJQ, & ej. Difpof meth?d. fung. pag. 8* & pag. 51. Tab 2. fig. 2-3. excites, Syrian. Bull,*

Ail atTeres, Juli > legi.

1448, *P* pyriforme* 7 enngrstum, pfimo fluxilis miniatum turbxnatum, ftipite craflb albo: demum peridio obovato fubturbinato vertice aperto fusco - olivaceo; capillitio reticulato pulvercaue dilute olivaceo: fipite mediocri

crassiusculo Xubfulcato apice fusco olivaceo
basi albedo.

In trunco putrido. Novemb. inveni.

Ob Jt̄guram ' turbinatam Jluxili Jiatu, cappitli-
umq̄Ue inclusum, dt̄verfa^ejse credo a Trick.
fallacL

449. P. *Jimetarium*, fparsum, primo {luxile album
deinde fubaiuUceum pyriforme lubftipitatufn,
demum peridio obovato vertice iacero dilute
parpurafcenti -umbrino^ capillitio corapacflo
pulverequae fusco, ftipite bfeve fubflcxu 'fo
fuperne paululo increffato colore peridii.

In fimeto bulmlino. Anguft. vigct.

A430. JP *turbinatum*7 fparsum, primo molle, tur-
bitiatuta, vertice lsevi vel tuberculato, mi-
niatum; demum peridio ovato-turbihato du
lute umbrino7 vertice quali operculo con-
vexo fubumbonato, fusco, dehifcente, claufo;
capiliitio compidlo pulverequae purpureo-fii-
fco Ad genus Craterium Roth. Catdl. i> paj.
324. pertinet.

In virguhis fterquiliniis dejectis* OAb. legu
Peridia funt, ubi in vertice tuberculato pri-
mo globuli aquei pellucidi geruntur, quae po-
ftea in peridiis fupradictis fed minoribus &
quafi ex calice orientibus mutantur.

451. P. *nitidum*, primo fluxile glomeratum, ra-
mofa - tubercillosum citrinum: demum peri-
Aid ev*to, ba4io-rufo aitUo, wxter^e luteo^

capillitio? pulvereque atro-fufco; ftipite bre-
vitlimo badio.

In ramis dejectis Pini abietis. jŕftate & Au-
tumno.

1452. -P. *vernicoŕum*, congestum, peridio obovato* j
vertice ad medium usque dtiliii'cente: cortice
extevno badio vufi nitenti: interne luteoi
capillitio? pulvercqr.c ntro-fufco; ŕn pite ŕub-
elongato laxo fursum ŕubattenuato, membra»*j
ŕubjaceratique fl-tveJcente. *Didcrma verrdco**
fum Pers Synopf, pag. 16\$. & ef. Opŕervat.
Myeolog. I. pag. 89. Tab. 5. -fig. 7. a-g.

In ramis xlejefiis Pini Abietis, Laricis, ŕylve-
Jtris. Autumno.

Vanrta;- peridiis purpureo- fufcis in foliis de-
jecŕtis Frtgi ŕylvatic« inverⁱ.

1453- -P' *pedunculatwny* perido nvato, glabro ŕpa-
•diceo, vertice opevculo quafi, hemifr^{hærico}
dehifcenti "Clauŕo; capillitio reticulato albo»
pulvere ŕubtiliffimo atro; ftipite brevi r\lin'
dtico apice tantum in peridio dilatato, um-
brino.

An CrateriurH pedunculatum Roth. Catal. bo-
tan. 1, pag, 224, & Cyatkus rrdnutus Hoffm-
veg. crypt. 2. pag, 6., Tab. 2. fig. -3 ?

In Hypno parietino in Pineto ad terram leg¹
OcUr.

424. *Tr ickia,*

Peridi«m (implex ŕubfla"brum inæqualiter rum

*08 *Cryptogamia. G. Fungi.*

obovato subpyriformi, luteo - ferrugineo; Capillitio subdiffuso pulvereque concolore; Aspergite brevisculis, nigrescente.

Ad truncos, in ligno putrido. Autumno legi.

*458« *T. arcyriceformis*, gregaria, peridium subturbinato cinereo-flavescenti vertice fusco; capillitio diffusum pulvereque violaceo, Aspergite brevisculis peridii colore.

In ligno dejedlo subputrido, Autumno.

1459. *T. virgescens*, sparsa subgregaria, peridio pyriformi subturbinato, primo cinereo dilute umbrino, demum cinereo virescenti; capillitio compacto subdiffuso, pulvereque flavo; Aspergite brevis, crassa, subfulcata, fursum attenuato, colore peridii.

In ligno putrido Betulae albae. Oedem. inveni.

1460. *T. crassa*, /par/a, peridium primo ovato viridide atro, demum, ovato - conico olivaceo; capillitio compacto subdiffuso, pulvereque haud dilutiore; Aspergite brevis cylindrico crasso fusco cinereo.

In ligno dejedto putrido. Novemb. viget

1461^ *T. aurcdy* sparsa peridium primo subrotundo deinde turbinato aureo, substriato; capillitio diffuso flavo; pulvere subtilissimo, ^fo; Aspergite brevis subsulcata cylindrica colore peridii/

In foliis dejedtis Pini sylvestris. August, provenit.

1462 • *I**. *fallax*, fubgregaria, primo globulo fph; B-
roideo miniato-rubro ftipite longo cylindrico
albo diaphano, deinde fubovato ftipiteque ci-
nereo-fufco, ac demum peridio plane pyri-
formi olivaceo in ftipite breve, gracile, fub-
concolore definente; capillitio compaclo fub-
difiufo, peridii colore. *Pers. Synopf pag.*
177. *Sphwrocarpus ficoidcus Bull, champ**

417- fig- 3-

In trunco putrido Fagi. Autumno viget.

1463 • *T, citrina*, fparsa, peridio turbinato flavo,
maturationis tempore minutiffime fquamulo-
fo; capillitio diffufo pulvereque concolore;
ftipite fubelongato, fuperne flavo, dcorfum
^ttenuato ferrugineo. *An T* clavata Pers,*
Synopf pag. 178?

In trunco putrido. April, viget

1464 • *T. elongata*, fubceipitosa, peridio clongato-
obovato, glabro, luteo; capillitio diffufo fub-
cylindrico, pulvereque concolore; ftipite bre-
vittimo luteo-fufco.

^n ligno dejedto putrido. Autumno.

1465 • *T. flexuofa*, fubcefpitofa, peridio ovato - elon-
gato, flexuofa, ftipite hreviffimo tenuiffimo,
> ^pillitia difiufo, pulvereque violaceo

In ligno dejedto putrido. Autumno inveni,

* ^iat peridio obovato elongate flexuofa Jii-
pile paido craffiore.

1466. *T. hotfyii* cepitofa, peridiis obovatis sub-
 pyiif miibus glabris, rnaturatiunis tempore
 fubiiiiifinu¹ iquamUtoſis, badio - rubentibi^{Sf}
 oapillitio elongato cylindrico fubflexuſo, pul-
 verequr ruſro - croſceo; ftipitibus fubelongatis,
 tenuibiW, fubflexuoſis baſi metri))rana tubja-
 center fafcictlatim juttc[^]is_t rubro ferrugineis
Trichia pynformis Hoffrn. veg. crypt. 2. pag.
 1. Tab. 1. fig. t.

In mmco putrido. ApriL legi.

1467. *T. rtibifornis* s cepitofa, peridiis e longato-
 tUrbinateſ, vettice delapſo infundibulifoi mi-
 bus, chalybeato-ferrugineis; capillitio diffuſo
 pulyefeque ferruſtineo; Ripitibus brrviffimis,
 fafciculatim connatis, peridiis concoloril^{lll?}
Pers. Synopf. pag 176 & ej. Diſpoſit. mtir
fting, pag > 9 & 54. Tab. 4. fig. 3. Tub. ⁽¹

Jig* 3-

In ligno putrido Coryli aveltanae. Septemb.
 Itgi.

Variat peridiis airo-rubris feffilibus capift^{lii}
 violaceo demum dilute feffugineo, Sp^{ha}
rocarpus fragiformis Bull 4. 384.

* * * ftipitatas, peridiis fphteroideis,

1468- *T. pkyfaroides*, ſparſa, fubgregaria; petft
 giMSolo ca[^]Ho, albo fquamuloſo, vortice de
 hifcenti; capillitio diffuſo, pulverequr fu
 atro; ftinitp lon[^]iffimo, eracile, fubflexuoſo

In ramis de jrtis Pini Abietis. Septembr. vidi.
1469. *T. mucoriformis*, fparu, fubgregaria. peridio primo gluboso aquo, dilute purpurascemi, deijum fubovato nigro-purpureo, **fubbivalvi**, Capillitio fubeffuso pulvereque concolore; ftipite Jougi. Timo fubuluto **primo** ftriclo deinda flexuoso, **nigro**.

In ligno putrido. August Septembr.

1470. *T. cernuu*, fparfa, peridio **orbiculati** depreffo fubumbilicato, fubbivalvi, fufco-atro; capillitio compa(5lo fubHiffuso pulvereque fu* ligineo; ftipite bafi craffo, fufum attenuato incurvo) albido cinereo.

In ligno putrido. Autumno.

1471. *T. notata*.) fparfa, fubgregaria, peridio fphterico depreffo, l'ubbivalvi, atro, vert ice nitente notato j capillitio compacfo fubdifTuso pulvereque umbrino; ftipite fubelongato eras* fiufculo, ereclo fufum fubattenuato nigro-fufco.

In **ligno** putrido de jeclo. August

1472. *T. jpurpurea*, gregaria, purpurea, peridio fpharico fubovato, poculo iniequaliter laci-
iaiato: laciniis erertis demum patentibus; ca-
pillitio diffuso; ftipite breve bafi craffior*
erecto.

In ligno putrido de jecto. Autumno.

peridium denudatum, compactum, caliculo peridii remanentis impositum.

- *peridium elongato cylindricu.*

1473. *A. jlava*, cepitofa, peridio alba flexilis, demum peridiis ovato-oblongis subflexuosis interfilinis, lamina basi subcurrentis vertice subacuto umbilico; capillitio flexuoso subdecumbentibus pulvereque concolore,

Trichia nutans Bull champ. 6. 502. fig. 3-

Ad truncos femputridos Pini Abietis. Jul. legi.

1474. *A. alutacea*, cepitofa tota alutacea, peridium* cylindricis flexuosis stipitatis, vertice obtuso paulo obsecuriore elevato; capillitio tenue foliis flexuoso; stipitibus filiformibus longis basi connatis.

Sub corticem trunci emortui Fagi sylvaticae August, inveni.

1475. *A. vermicularis*, cepitofa peridium* cylindricis flexuosis obtusis, purpureo - ferrugineis stipitatis; capillitio longissimo, flexuoso, rufo; stipitibus elongatis filiformibus flexuosis decumbentibus umbrinis basi dilatatis luteis subdistindis.

In ligno putrido putei. Octob. vidi.

- * *capillitio ovato aut subrotundo,*

1476. *A. lUacina*, dispersa subgregata, tota lilicina peridio ovato-globofo, capillitio subelongato*

stipite breve.

In Hypno & cortice Fagi fylvatice. Jul. viget.

¹477- *sJ. carnea*, fparsa, primo fluxilis carnea ovato - oblonga: demum peridia fuhglobofo **vertice** annulo notato ltipitcque elongato cylindrico. flexile ciaereo cameo ; capilKtio ovato globofo tenuirfimo pulvereque concolore.

In ligtto putrido Pini Abietis. Jun provenit,

M~S- [^]. *deniata*, fparsa, peridio [^]lobofo-ovato, calyculo primo cupuliformi fubdenticulato deinde patellato cinereo-fufco ; puivereque cinereo - carneo; ftipite elongato Oliforme peridii colons. {*Antecednti major*).

In ligno putrido dejetfto Pini. Autumno.

³479- *d. umhriihi*, fparsa, tota umbrina primo fubovata deinde peridio ovato, calycuio cupuliformi margiue eequali; capilHtio ovato; ftipite elonsato filifurme obfcuriore.

In ligno deje&o putrido *ixx* fylvis. April, legi.

H8o. *A; minor*, fparsa, primo niero-purpurea fluxilis ftipituta, deinde fubconica nigrefcens, ac demum peridio conico albido - cinereo, fubarneo vertice fufco; capilHtio globofo fubcompaclo, pulvere, ftipiteque brevi cyliadrico fui>carneo.

In dejecto ligno Pini. August*

¹48 *• *A, cinerea*, fparsa tota albido - cinerea, peridio elongate conico, ciliculo primo pocu-

lifovmi dcinde patellato; capillitio ovato elongato; ftipite elongato bafi fubincrassato, *Trichia cinerea* Bull. 5. 477. fig. 3.

In trunco lubputrido. August.

1482. *A. rufa* congesta, tota rufa, peridio ovato-conico; capillitio compacto ovato vertice peridii nutato; ftipite elongato filiformi fubi flexile.

In ligno subputrido Fagi fylvaticae. Xftatis fine.

1485- *A. punicea*, conestata, primo alba elongata conica fluxilis ftipiuta: dein ovata, nigro viucea, tunc dilute violacea, ftipes ruber; ac demum peridio conico, crocato-rubro, capillitio ovato obfeuriore; ftipite elongato cylindrico peridii colore.

Trichia cinnabarina Bull Champ, 6. 502.

fe «

Ad truncos putridas. Autumno.

Variat ftipite crassiore brevioribus subtriangulatis deorsum dilatato.

1484- *A. melanoccephala* sparsa subgregaria, primo elongato-ovata ad calyculum rubrum, nigra demum peridio elongate conico, rubro, vertice nigro; capillitio primo ovato verticem peridii elevato demum cylindrico eredo nudato cum pulvere ftipiteque longo filiformi, calyculo concoloro.

In ligno subputrido. Autumno.

1485 > *A. conjugate* sparsa, fungregaria fanguinea, peridio ovato simplici vel conjugate, cal)culo subpoculiformi; capillitio ovato, dilute purpurco; stipite simpliciter elongato cylindrico crasso.

In truncis putridis. Autumno vrgi

Præcedentibus affinis sed major, nec non figura 6? colore peridii, Stipiteque diversis

1486. *A. rindta*, congesta, minuta, nrimò a I hi da, tunc fidefcens ovata, dicitur dilute croice> ruf<i, demum peridio ovato conico, rufo, margine calculi dilutione luhHlevc^t' notd-tp; capillitio ov.*.to, concolor(*, deciduo; stipite longo dilute rubro, deorsum aibido incrassato.

In truncis quercino submurtuo. Novemb. in-veai.

1487 < *d- atra*, sparsa, peridio globofo vertice promi nento acuto *ran us COIUCQ* atro; capillitio globofo fulco filis nonnullis diffusis & globulos pulveris spermatici nigri, ovales utrinque acutos ferentibus; stipite breve crasso deorsum dilatato rügro.

In truncis ernortuo Fagi fylvaticae. iEftate.

Omnium fere minimus.

1488. *A. cylindrical* sparsa fungregaria, ereda, tota violacea peridio elongato ovato cum cal)culo deciduo; capillitio forma peridii subcylindrico; stipite elongato filiforme.

In Quercu putrido. Aftate vidi.

426. *Stemonitis,*

Peridium simplex totum evanescens. Capillitium plerumque elongatum erectum stylium cingens eique adfixum.

1489. *S. fasciculata*, cepitofa, peridiis elongatis cylindrico-filiformibus nigro-cinnamomeis; capillitio forma peridii fusco; sterigmatibus longis subulatis styloque nigris fasciculatim junctis, per membranam subjacentem connatis.

Trichia axiferq Bull. 5. 477. fig. i.

In truncis arborum, ad ligna putrida. Sub octobrem & autumno.

Provenit cum massa albida fluxilis granulata. glomerata & subeffusa, deinde flavescens & demum fuscescens.

1490. *S. typhina*, subcepitofa, antecedenti multo minor, peridiis elongatis cylindricis atro-fuscis; capillitio tenuissimo filiformi obtusum fusco*, sterigmatibus subulatis capillaribus nigris.

Trichia typhoides Bull, 5. 477. fig. 2.

Ad ligna putrida. Autumno legi.

1491. *S. violacea*, cepitofa, magnitudine antecedentis, peridiis elongatis cylindricis subincurvis fordide violaceis: capillitio compadto erecto acuto violaceo; sterigmatibus subulatis capillaribus styloque nigro-fuscis.

In truncis putridis Pini Abietis. Autumno inveni-

1492. 5. *ovata*, fparsa, fubgregaria, peridio ovato vel oblongo - ovato atro-fufco; capillitio forma peidii, tenuilEmo rufo-fufco, ftylo infra apicem evanefcente, ftipiteque longo ca* pillare fubflexuofa nigro.

Ill ligno fubputrido dejedto. Autumno viget.

¹493* & «jgr*, fparsa, fubgregaria, peridio oblongo - ovato vel obovato nigro; capillitio figura peridii compado ferrugineo fufco; ftylo toto penetrante, ftipiteque elongato basi dilatato, atro.

In ligno quercino putrido. Septemb. provenit

¹494- & *g^obofa*, gregaria, peridio avato - plobofa, atro; capillitio figura peridii Iubfufco- atro fubcompado; ftylo toto penetrante nee prominenc, ftipiteque nigro elongato capillare, basi dilatato, membrana fubjacente.

In ligno dejedto putrido Fagi fylvaticae. Odb.

427. *Cribraria.*

Peridium (implex membranaceum, nervofum, pulverem includens: maturationis tempore membranacea pars aut pro parte aut tota evanefcit, Hervi anaftomofantes perfiftentes cribrum forttiant per cujus foramina pulvis effunditur.

¹495. C, *cernua*, gregaria, purpureo - fufca peridio fphaerico cernuo umbilicato; reticulo integro; ¹ipite longo fursum attenuato incurvo

Didymium umucatum Schrad. nov. gener.

i. pag 1 . Tab. 4 fig. 1.

Ad afferes, truncos putridos. Julio legi,

1496. *C. awantiaia*, Ipersa, lubgrtgaria, peridio fphaerico tybcernuo, primo flavo, fquamulis aurantiacis, mox obfcur ori, ac demum ferrugineo - aurdntidco, fu erne evanefcentq, hinc reticulo mdreine fil)rillofo inaequali; pulvere aurantiaco, fti^ite lcnpo flexuoso dilute ferrugineo, fursuin, attenuato, bafi membrdua fubjacentc.

An Cnbraria aurantiaca Schrad, 1. c. pag 5. Tah i.fig. 3 4?*

In trunco putridc Fagi fylvatic©. Septembr viget.

1497- *C. Jiellqta*, gregaria, peridio globofo fubcernuo primo fufco deinde cum pulvere, feru^ineoi reticuli intc^ri anoftomofibus ftellulato - glomeratis, ftipitcque dilute fufco Tubclongato c^lindrico apice incurviufculo hdud, attenuate

Schrad. 1. c. Tab. 5 fig. 1. quoad figliram reticuli.

In humo turf^fo. August. Septembx. inveni.

1498. *C. didermoides*, fparsa, fubgregaria, peridioi, globofo dilute bruneo, primo eredto deinde cernuo; reticulo pi ivno intrpro 4emum vertice perforate, marline integro; pulvere umbrino; col um el la conira pallida; ftipite fubu* id to nigrefcente bdfi dilatato.

In foliis dejectis Fagi Castaneae. Obs. legi.
 1499, ^C- *Onygia* W, gregaria, subhyarsa, peridio
 sphaerico primo, cinereo deinde nigrescenti;
 reticuli fiammularum subpapillatis; pulvere atro
 bruno, filis? albis intertextis; Itipite brevi
 crailb cyifreo.

Onyngi? decorticata Pers. observat. vtyco-
logic. 2, pag. 7;. Tab. 6 Jig. 9 haud bona.
 In trunco cavo emortuo Fagi fylvaticge. No-
 vembh viget.

428. *Licea*.

Peridium feffile subrotundum aut subeffufum,
 fragile, membrana subjacens nulla. Pulvis ie-
 minalis filis destitutus.

1500. *L. c&sia*, sparsa, peridio subrotundo, <le-
 preflb, inaequaliter vertice rupto cinereo - cae-
 fio; pulvere atro.

In caule emortuo Cardui. Autumno.

1501. *L. macrospora*, gregaria, peridio globofo
 primo violaceo, tunc albido ac dnum oli-
 vaceo urnbrino punctis f. squamulis minutis-
 fimis albidis; sporulis pro ratione reliquorum
 hujus divisionis magnis atro-fuscis.

Sub corticem Fagi Ilyvaticse subemortui Sep-
 tember, viget.

419. *Tubulina*,

Peridia tubuliformia in cepitulum connate- Pul-
 vhus farinaceus.

1302. *T. fragiformis*, fuborbicularis fupcrficie
 quafi granulata mollis rubro-aurantiaca, de-
 inde ferrugiwa fufca^ peridiis elongato-tu-
 bulosis vertice iuaequaliter ruptis diffindlis.
Tuhulifara Crtmor Flor. Dan, Tab. 659.
 / g. 1.

In trnnco putrido Fagi fylvaticie. Initio ad
 finem Odtob. viget.

430. *Sphcarocarpa.*

Peridium fimplex, fubovatum, verticis dehifceH-
 tia operculo claufum. Pulvis feminajis Slis
 de ft i tatus

1503. *S. operculata*, fparsa, peridio inclinato, lu^
 tco ferrugineo margine ^Bq^ali; operculo con-
 vexiufculo flavo; pulvere nigro; ftipite fifii
 forme deorsum attenuato colore peridii.
 An Sphaerocarpus turbinatus Bull, 5, 434,
 fig. 1?

In litheije ciliari ad terrain dejedlo. Julio.

431. *Onygzna.*

Peridium ftipitatum fubrotundum ficcum perfi-
 fiens clausLim. Pulvis compadui cohaerens.

- 15<4' *O equina*, gregaria, peridio orbiculari, fob-
 tuberculofo furfuraceo; pulvere unguinofo
 primo purpureo-fufco deinde fubcarneo com-
 paj^o; ftipite cylindrico, craffo, IquamuloK
 fibrillofo, albido bafi peridii eolumelle in-

ftar hemifphsericae prominente. Pers, Obf. mycol. 2. pag. 71. Tab. d. fig. 3. a-b.
In unguibus vetuftis equarum. Octob. & Novemb. vigct.

452. *Piligena.*

Peridium ftipitatum globosum, duplex: externum membranaceum bafi ruptum deciduuffl. Puivis compactus coheerens.

1505. *P. lycofjerdoides*, gregaria, peridio globofo, fubtus excavator externo primo candido demum fubcarneo albido pundulato, membranaceo bafi rupto dentato, demum laciniis inaequalibus fittis furium revolutis, deciduo: interno tenuiffimo a vertice rupto perfiftenti pulvereque dilute purpurafcente-cameo; ftipite longo adfcendente cylindrico candido ftriatulo fibroso in bafi peridii columellae hemifphatrica dilatato.

In pilis ovinis intricate dejedis in locis liumidus utnbrofis. Odlob. legi.

433. *jEcidium.*

Peridia fubcefpitofa ut plurimum poculiformia membranacea acaulia, ore orbiculato plerumque dentato demum rupta. Puivis farinaceus nudis. (*In foliis parajiticum*).

* *tefpitofum p&idiis fine ordine congrftis.*

1506. *J&. cornutum*, peridiis e tuberculis flavis,

elonsratis subflexuolis cinereis vel olivaceo-griseis, apice dehifcentibus Iaciniis inaequalibus bre'vibus; pulvere umbrirto *Lycoperdon corniferum* Flor. Dan. Tab. ^53.

In averfa parte foliorum Sorbi aucuparii, Auguft, 8c. Septexnb.

4507. >£. *Mali*, peridiiS e tuberculis flavis, obcoiicis cinereis, bafi badiis, in Iaciniis lanceolatis, anguftiffimis, diftindlis, ereclis, fubpartitis; pulvere purpureo badio. *<

An Lycoperdon penicillatum Flor. Dan, Tab, 829?

In aver fa parte foliorum Pyri Mali. Septemb. 1508. & *craifum*^ fubeffufum elevatum flavo-aurantiacum,• v^{er}i^{lii}s poculifermibus flavis, ore acute dentato; pulvere cbfcure aurantiaco.

Per*. Icon. & Defcript. Fung. Fasc. 2. pag. 27* Tab. 10 fig. 1 — 2. ubi vero peridia ore integro delineatie.

In foliis Rhamni cathartici Jun,

1509. *M. Afpcrifolii*) orbiculare vel ovatum elevatum, fordide aurantiacum; peridiis fubtubulosis pa'llidis, ore laciniato: laciniis 4-jj latiufulis obtufiusculis fubcrenatis; pulvere aurantiaco.

. In averfa parte foliorum, caulium^ ramorum L)xopfis arvenfis^ Echii vulgaris. ^Eftate.

1510. &> *Urticm*, orbiculare jeffufumque, elcvf-
tum nnnnen rrrntm * peridiis cupulz

formibus flavis, ore laciniato: laciniis cre-
nulato - dentatis, obtufiulculis; pulvere citrino.

In foliis & petiollis Urticie dioicae. May, &
Junio.

151U *M. Grosjularice.*, orbiculare, elevatum, fla-
vum cfoceo pun[^]atum; pevidiis urceolati-
flavis ore laciniato: laciniis r;tundatis Tub-
crenulatis; pulvere citriho.

In averfa partt[^] f'.lioru'm, } eti lorum > bacca-
um Ribis *Gr flu la Has &c* riibri. [^]ftate.

1512. *M BerberidUy* orbiculare, ~el^vatum, flavirh,
pur¹ ureo- crbceo- 'pun&utum; peridiis pocu-
laeformibus flavis ore laciriiata; pulvertf croceo.

[^] In foliis Befberidis'vulg,irife. *MfoSfa.*

1513. /£. *H'uracii*, iublineare-effusum, fubeleva-
tum, luteo- ferrugineum; peridi is cupulcefor-
mibus fubluttis; oi'e lubdenticulato > pulvere
citrino.

In foliis petiolisque Hieracii fylvatici. Vere &c
Æftate.

1514, *AL Ranunculi*, ovato- oblon[^]um fubelevatum
luteum; peridiis cupulaeformibus dilute fer-
rugineis ore fubdenticulato pulvere obfcure
ferrugineo.

In foiiis petiolisque Ranunculi repentis. A^rere.

1515- &* *Ficarii*, orbiculare vel oblongum fub-
effufum fuhelevatuin flavum; peridiis cu^su-
laribus flavis_y ore trenulato pulvere aurati-
tiaco.

In foliis Ficariae ranunculoides. Vere & æftate.

1516. *M. Fiola*, orbiculare vel oblongum vel folitarie fparsum flavum, peridiis cupularibu* flavis, ore dentato evetfo pulvere uurantiaco, Coiigelum in foliis, folitarie & fparsum in petiolis *Violae cairnae*. jfiitate.

1517. *JE. Mercurialise* fubeffufum planum pallidum; peridiis fubcupulaiibus cineveis, ore fubcrenulato; pulvere fenugineo.

In foliis *Mercurialis perennis*. jffitate.

1518. *JE Majanthce*, macula orbiculan's pallid^ viridis centro flava; peridiis diftant bus deprecis primo flavis, demum fubfertug'neis, ore laciniato: laciniis fubrotundis obtufis; pulvere primo aurantiaco demum cinereo fenugineo.

In foliis *Convalariae bifolim*. jffitate.

1519. *M. Convalari&y* macula pallida virefcens orbiculan's; peridiis depreffis approximatis pallidis, ore laciniato: laciniis obtufis crenula* tis; pulvere aurantiaco.

In foliis *Convalariae majalis*. jffitate.

* * *peridiis circinnatis.*

1520. *M. Rumicis*, macula orbicularis putpurea rubra; peridiis depreffis confeitis fubconfluentibus pulvereque albidis, ore obtufe dentato. Hoffm. Flor. german. 2. Tab. ir. fig. 2.

In foliis fpecierum *Ruxnicis*. Ardtii Lapps. vEftate.

¹⁵²i. *M*_o *Periclymeni*, macula orbicularis vel oblonga albida pallefcens; peridiis depreffis albedo cinereo ferrugineis, ore crenulato; pulvere luteo - ferrugineo.

In foliis Lonicerae Ppriclymeni. jfiftate.

In ramulis junioribus interduni effufum provenit.

¹⁵²2. *Æ*_o *Frangulce*, macula orbicularis luteo-ferruginea peridiis fuhcupulaeformibus, ore integro, pulvereque aurantiaco - ferrugineis.

In foliis Rhdmi Frangulre. --fiftate.

¹⁵²3. *AL. cathartic*[^] macula orbicularis luteo-ferruginea, peridii⁹ cupulaeformibus luteo-ferrugineis, ore crenulato, pulvere aurantiaco.

In foliis Rham:ii cathartici. .dEftate.

¹⁵²4. *M. Tusjltaginis*, macula cinerea fubobfoleta, in fupina parte purpuroa, peridiis cupulaeformibus fubimmersis 7-8-9vīn orhiculo Emplici confertis pallefcenli-viridefcenlibus, ore laciniato: laciniis fubrotuncfis obtufis; pulvere aurantiaco.

In foliis Tuffilaginis Fafarae. jEftate.

**• *folitarium; peridiis fparsis.*

¹⁵²5. *j£, Tragopogi*, pevidiis primo ellipticis obtusis fublucis, demum ore laciniato: laciniis inaequalibus obtufis crenulatis albidis; pulvere fl_dvo

In caule & foliis Tragopogi pratensis. jfiftate.

1526. *M. Anemones*, peridiis pallidis primo fubh-mifpaericis, ore integro, demum fubcylicis dricis ore crenulato, pulvere concolore.

In foliis Anemonia nemorofce. Vere & initaeJutis.

1527. *M. punctatum*, peridiis fubhemifphæricis fubemerlis futo - purpureis, ore integro conivente; pulvere atro purpureo. Hoffm. Flo* german. 2. Tab. 11. fig. 1?

In foliis & pedunculis Anemonis nemorofce. Ver*

1527. b, *M. fufcum*, peridiis hemifphæricis fubemerfis e macula viride pallida, primo acutis demum ore laciniato dilatato; pulvere purpureo - futo.

In foliis Ribis rubri. Jul.

1528. *M. columeltatum*, peridiis flavo-aurantiacaCJ* bafi pallidis primo convexis deinde truncatis memhranula tenuiffima vel partim vel tota evanefcente, tetflis; columella compadla, cylindrica, truncata, aurantiaca: interftio inter hanc & peridium pulvere grumoso fubcitrinorepieto.

In foliis Rubi Idaei. ^Eftate.

1529. /E*. *Pint*, peridiis ovato-oblongis fubrofacei⁵ demum pallidis, bivalvis: valvulis membranaceis margine tenuiffimo albefcente: luprema dehifcente; pulvere aurantiaco.

Wilden. in Mag. fir d. Botan. 2. B. pag. 16
Tab. .4 fig. 12,

In foliis & ramis junioribus Pini sylvestris.
Vere.

^{1530.} *AL?* *Myrtilli*, macula purpurea peridio?
centrali immerfo albo.

In foliis Vaccinii Myrtilli. **Jul.**

434, *Uredo.*

Peridium membranaceum tenuiflimum rima
longitudinale ut plurimum dehiscens ac deinde
evanescent. Pulvis nudus detergibilis. Sporulae
Uniformed plerumque globosae.

* *Epiphyllae: pulvere flavescente (Rubigo).*

^{1531.} *£l. mycophila*, effusa, nuda, pulvere flavescente per fungum putrescentem ubique parasitice disperso, tomento albo subjacente.

Reticularia chrysoferma Bull. 5. 476. fig. 4,

In fungis putridis praesertim Boletis. Sub finem
Aetatis.

^{1532.} *U. confluens*, peridiis orbicularibus subovatis planiusculae circinnatim confluentibus pallide flavis; pulvere luteo.

In foliis Mercurialis perennis. Vere & senescente*

¹⁵³³⁻ *U. Ulmarice*, magna effusa, peridio oblongo vel lineari, viridipallente; pulvere grumoso aurantiaco.

In foliis petiolisque Spiraeae Ulmariae. Jun.

^{1534*} *XI. Alchemilla* peridiis suboblongis viridipallentibus margine pallidioribus subcrenulatis, confluentibus; pulvere aurantiaco.

In averfa parte foliorum Alchemillae vulgaris.
May. & Jun.

1535. *U- Potentilla*, peridiis orbicularibus pallidis*
folitariis confluentibusque; pulvere aurantiaco.
In fupina parte foliorum, petiolisque Potentillae
argenteae. Vere.

1556. *U. farinosa*, peridiis pallidis fubvirescenti-
bus, confluentibus, pulvere ochraeo-flave-
fcente.

jt, *Salicis Capree* peridiis orbiculatis.

j3. *Salicis fragilis* peridiis ovatis,

In averfa parte foliorum. vEstate & Autumn.

15*7* ^{Ar}- ^c*ircece*, peridii* orbicularibus pallidi-
fubconfluentibus; pulvere ochraeo-carreo.

In averfa parte foliorum Circe® alpinæ. Jul,
Septembr.

1538. *U. Betula*, peridiis oblongis fubelevatis la-
ciniis inaequalibus ruptis pallidis; pulvere
flaveicante.

In foliis Betulae albae. Septembr.

1559* & *populina*, peridiis orbicularibus bullatis
elevatis flavescens gregariis lublparis; pul-
vere obfeuve flavo.

Jacq. Cnllerftan* fupplem. Tab. g fig. a 8c 3

In foliis Populi nigrae. ^

X540. *U. Feronia*, peridiis fuborbicularibus de-
p/effis fubconfluentibus minutis pallide sulphu-

"A.-xaifi: pulvere concinnre.

In fuis Vi-nirm oftitinrtis. Estate.

1541. *IT. Scorzonerca*, peridiis oblongis cinereo-alutaceis gregariis foliariis; pulvere concolore.

In foliis Scorzonere hispanice. Sub fine aestatis.

1542. *U. tiiherculja*, peridiis ovatis subtuberculosis, subconnatis, ore dentato laciniato flavo aurantiaco; pulvere concolore.

In foliis Sonchi oleraceae var. p asperis. jfiftate.

1543. *U. Sonchi*, peridiis orbiculatis laevibus subconnatis fordide ochraceis; pulvere concolore.

In foliis Sonchi oleraceae var. a laevis. jfiftate

1544. *U. fulva*, peridiis orbiculatis elevatis lievibus subfoliariis fulvis; pulvere concolore,

In foliis Sonchi arvensis. Aug. Septembr.

1545. *U. Senecionisi* peridiis ovatis pallidis confluentibus, pulvere flavo.

In foliis Senecionis vulgaris, Septemb.

1546. *U. Helioscopice*, peridiis oblongis elevatis foliariis nonnullis confluentibus minutis croceo-fulvis; pulvere concolore*

In caule & foliis Euphorbia Helioscopice. Novembr.

1547. *U. TuJJlaginis*, peritheciis oblongis, confluentibus etiam foliariis miniato-rubris \ pulvere concolore.

In foliis TuJJlaginis Farfarae. Sub finem aestatis. 4 auturano.

1548. *V. elevata* peridiis orbicularibus elevatis subfoliariis sparsis pallidis pulvere flavo-

23° *Cryptogamia. ' G. Fungi.*

ininiato. *An V. miniata Pers.* Sj'nopf, p~~85~~
Q 6?

In fuis Rofae ruhiginofae Jul.

X5^9# *U. R»fa>* peridiis minutis globulosis cleva*
tis foitariis fpavis fulvis ore rotundo intc
gro primo fubconivente; pulvere concolore.

In foliis Eofe centifolise. Jul,

X550. *U. Lint,* peridiis minutis ovatis elevatis di-
ftindlis fpavis virefcente - pallidis; pulvere au-
rantiaco - flavo.

In caule fulisque Lini cathartici. jfiftate.

1551. *U. Eupkrajice,* peridiis lineari oblongis Tub*
elevatis folitariis fpavis pallidis; pulvere a<
rantiaco.

In averfa parte ad nervos foliorum Euphrasi^
officinalis more. Blechnorum. Sub finem iefia
tis, autumnno,

1552. *U. linearisy* peridiis linearibus, fubconfluefl
tibus, fubelevatis pallidis; pulvere flavo au
rantiaco.

In foliis Bromi xnollis & arvenfis. j&ftate.

• • *EpiphylUe: pulvere brunneo, badio, fpadice^o*
fufco, ferruginco^

ij5j. 17. *ferruginea,* peridiis ovato-oblongis ^{vel}
lin<>aribus bullatim elevntis fubconfluentibi^
viridefcrtihus; pulvere ferrugineo. '

In culmis Tritici aestivalis, Lolii perrcnnis *
aliorura graxninum. -&ftate.

¹554- *U. Phragmitis*, peridiis oblongo-ovatis, bullatis, ut plurimum distinctis fubnigris; pulvere ipudiceo.

In foliis aridis Arundinis Phragmitis. Novemb.

¹555- *U. Caricis*, peridiis oblongis, pallido-cinereis, distinctis rarius confluentibus paullulum elevatis; pulvere ferruginea-badio.

In foliis, Caricum; Septemb,

¹556). *U. Serratulce*, peridiis fubrotundis, dilute ferrugineis, distinctis confluentibusque; pulvere fpadiceo, fubbadio. Odor nullus.

In foliis languentibus nee non in caule Serratulae arvenlis. jEftate.

¹557. *U. Centumnodii*, peridiis ovalibus pallide fufcis, bullatim elevatis, distinctis; pulvere fufco-bruneo

In ramulis Polygoni avicularis. Septemb,

^a558. *U. Rumicis*, peridiis ovatis, badiis, distinctis fubelevatis, fparsis; pulvere badio-purpureo.

In foliis Rumicis acuti. ififlate.

¹559- *U. Acetosm*[^] peridiis orbicularibus dilute bruneis fubelevatis, distinctis, fparsis; pulvere obfeure ferrugineo.

In foliis Rumicis Acetosae. vEfute.

¹56^{to}- *U. Anemones*, peridiis orbicularibus, folitariis, gr-gariis lubfufcis, fubelevatis, ore fubrotundo integro; pulvere bruneo-ferrugineo.

*5² *Cryptogamia. G. Fungi*

Ayah Vredine Anemonide Pcrs% SynopJ. pag
525 diverfa?*

In foliis Anemon's nomorofe. Vere.

156. U. *Vicia Faba*, peridiis orbicularibus vex
oblongis, diffinis gregariis fubelevatis dilute
umbrinis; pulvere obfcuore.

In foliis pctiolisque *Viciae Fabae*. ' Auguft.

1562. U. *Orobis* peridiis orbicularibus, folitariis
fparsis, elevatis, fubnigrisj pulvere umbrinis»

In foliis *Orobi tuberosi* Septemb

156?. U. *Hieracii* peridiis orbicularibus, fparsa
fubelevatis pallidis; pulvere ferrugineo-badio.

In foliis *Hieracii folvatici*. Vere.

1564. U. *Ficaria*, macula pallida virefcens^ peridiis
orbicularibus gregariis fubelevatis dilute
umbrinis: pulvere obfcuore fulibadio.

In foliis petiolisque *Ficariae ranunculoidis*. Ve&

1565. U. *Prenanthi* peridiis orbicularibus, albido*
virefcens, fparsis fubelevatis; pulvere ba*
dio - purpurfcens. •

In foliis *Prenanthis muralis*. Vere.

1566. U. *Arenaria* peridiis fubrotundis elevate
gregariis fubconfluentibus folitariisque dilute
umbrinis, fubclausis pulvere purpureo - badio.

In foliis *Arenariae trimæ*. Septemb.

1567. U. *Alfines*, peridiis rotundis elevatis fparsis
clausis fubnigris nitentibus; pulvere umbrinis
nigrefcente.

In foliis *Alfinis mediae*. yEftate.

*558. ^{^T} Polygonij peridiis orbicularibus subelevatis circinnatim congestis, centrali maximo, nigris; pulvere obscure fulco

In foliis Polygoni amphibii. Septemb.

1569. V. Valerianae peridiis orbicularibus elevatis sparsis subgregariis nigro-umbrinis; pulvere cunco

In foliis Valerianae foliosae. Aestate.

**• Epiphyllum pulvere nigro. vel purpureo-
viridibus.

*570. U. Violae peridiis orbicularibus, elevatis, gregariis distinctis dilute umbrinis, ore laciniato; pulvere nigro.

In foliis Violae odoratae. Septemb.

1571. U. Angelicae peridiis cubovatis, elevatis congestis subconfluentibus pallidis; pulvere nigro.

In foliis Angelicae foliosae. aestate.

1572. V. Albuginis, macula orbicularis pallida, peridiis orbicularibus, elevatis, dilute viridibus, gregariis; pulvere purpureo-nigro.

In foliis Albuginis Podagrariae. Junio.

*573. U. Menthae, peridiis cubovatis, depressis, gregariis viridibus; pulvere nigrescente.

In foliis Menthae agrorum. Autumno.

1574. U. Hyoscyami, peridiis ovatis, elevatis, sparsis, nigrescentibus; pulvere corusco.

In foliis Hyoscyami radiceae. Jul.

1575. U. cucurbitariae peridiis linearibus longissimis,

fubdepreffis confluentibus, nigrefcentibus pulvere atro.

In culmis, foliisque graminum, fero. autumno.

****^ pulvere albo.

1576. V. *Candida*, peridiis, ovato oblongis. elevatis confluentibus candidis; pulvere albo.

In caulibus, ramulis, foliisque *Thlaspi Bursa-pastoris*. Ætate.

##... Pulvere nigrefcente. In fufco in plantarum fru&ificationibus parajitico (*Ustilago*).

*577» ^ *Segetum*, pulvere primo peridiis incluso demum cupiofo in fpiculis graminum a, d, f, perfo.

a. *Averim*, pulvere purpurafcente atro.

p. *Hordei*, pulvere atro.

Reticularia Segetum. Bull 5. 471. Jig 3.

In *Avenae fativae*, *Hordei aeftivi* fru&ificationibus, & aliorum graminum. Ætate.

1578. U. *carpophyla*, pulvere nigro capfulos fubnude ambiente. Ured. Caricis Fers. Synopf. pag. * ^ .

In capfulis Caricis ea&pitofte. Julio.

1570. 17, *Tragopogon* pulvere fufco - purpureo, nudo?

In Receptaculis, floribus imperfectis *Tragopogon pratensis*, calicibus inclusa.

ij80. 17. *Hydropiperis*, pulvere fufco-atro, nudo?

In feminibus *Polygoni Hydropiperis*, calycibus includ.

435. *Puccinia.*

- Peridium nullum. Sporulae in cepitulum conglomeratae e tereti fubturbinat*, caMddVs feptu-
Us dirixi(5tae. {In foliis plerumque purajitica\
1581. *P. Rojce*, fporulis craffiusculis obtufis in
Uredine Rofae parafiticis.
In foliis Rofae canine ubi in Uredine Rofe
receptaculi inftar infident. jfiftate.
1582, *P. Rubi*, congpfra, villo nigro fimilis; fpo^
rulis fubattenuatjs.
In foliis Rubi Idae^ Autumno.
^583. *Convallarice*, fparsa, fubcongefta, fporulis
ovatis fubrotundis breviffime ftipitatis.
In foliis Convallarie multiflone, Septemb,

456. *Trichoderma**

- Peridium tomentofum f. villofum pulverem co-
piofum farinaceum involvens.
H84. *T. Pyrenium*, granulare, fubrotundum, gre-
garium; tomenta pulvereque flavo.
In ligno quercino putrido., April.
*58s. *T. BraJJicce*, fubhemirphvricum, 1-2-g \n_t
& ultra lutura plerumque diftinctum, pulve*
reque olivaceo - fufcum.
In foliis fubputridis Brasficz oleraces capitate
Vere.
11 \$86. *T. viridej* fubrotundum vel bemifphsericum,
fuhconfluens; villo albico fubfugaci; pulver*
obfcure viridi.

25® *Cryptogamia, ft Fungi**

Pyrenium lignorum Toth- Fung, Mecklenh. 1

peg- 33 ^{Tab}- V fS- 29.

Bull 6. 504. 7?g. G.

In ramulis putridis dejectis, nec non ad caulem
herbarum. Autumno.

1587' *T. lve*, subheinflicum, subconfluen-
tibus, superficie sevisculo, albido-pal-
lescentibus, margine nonnullorum bylaceo albido
pallido flavo,

Ad terrain liti in locis. liuidis post pluvias.
3ul.

1588' *T. camely* minutum, subrotundum $\frac{1}{2}$ -
lin. h. tum gregarium distinctum, pulvereque
subcarneum.

In ramis dejectis subputridis Crathgei Oxyacanthae.
Autumno.

1589. *T. fufum*, primo hemisphaerico, deinde
globosum ac demum confluens effusum cine-
reo fuscum \ pulvere inter se coherente flavo.

In ramis dejectis subputridis Umi campestris.
Mart.

X590. *T. pedunculatum* minutum globosum sub-
turbinatum stipitatum villo albido, deinde
subcinereo cespiti substantia conformi fixabili;
suspense subbreve ferrugineo.

In ericetis locis liuidis ad terrain. Verum &c
autumno.

457. *Mucor.*

Peridium membranaceum lobosum stipitatum,
primo subaquoso - nullo deinde opacum

* *Stipite racerfiofo.*

¹⁵⁹¹. *M. flavidus*, caule ramofo peridiis latefcefc-
tibus dein gerifeis. Pers. Obf. mycolog. j.
pap. 95. Tab. 6. fig. 5.

In fungis putrefcentibus. Autumno

* * *Stipite Jimptlci.*

M92. *M. Mueedo*, gregarius, ftipite fimplici peri-
di inflato nigrefcente grifeo, ore rotundo
circa ftipitem dehifcente.

Afcophora Mucedo Tod Fung. Mecklenb. i.
pag. 13. Tab. 3-^{fi?}-²²»

In corporibus fucculentis putridis.

Stipes fimplex ere(5tus albidus diaphanus;
peridium globofnm primo diaphanum albi-
dum, mox nigrefcens.

^{159J}. *M ? nigrefcens*, cepitofus, intPrtextus, de-
mum ftipitibus ereAis peridiisque giobosis[^]
fufco-cinereis diaphanis.

In averfa parte foliorum atque in ramulis juni-
oribus Rhamni Frangul*. Sub finem aestati?.

¹⁵⁹⁴ *M. caninus*, eongestns bylloideus albus, pe-
ridiis minutis lufcentibus. Pers. Obfervat.
Mycol. 1. p[^]g. 66 Tab. -6 fig. V4-

In mufcerda caniu. Hyeme leni &c pluviofa.

¹⁵⁹⁵. *M. tenellus*, gregarias, pe-ridiis globo[^]is fti*
pitibusque tenuiffimis flexuofis, albis diapha-
nis.

In culmis graminum. Novembr.

An idem cum M. tenello Pers. Synopf. pag-
202.

1596. *M** *Herbariorum*^ acaulis, flavescens, perfi-
/tens; perkliis globosis in tomento inn'denti-
bus

In plantis exsiccatas locis humidis depositis.

438. *Botrytis*.

Sporulae in racemum conglomerate. Stipes ere-
tus, fruticulofus, subdichotomus.

1597. *B. cinerea*, congesta late effusa cinerea, It-
pitibus dichotomis subracemosis; sporulis glo-
meratis parvis. Pers. Disposit. fung. pag. 46
Tab 5 fig 9. Bull. 5. 480. fig. 3.

In caule emortuo Urticae. Septemb.

1598. *B. ceruginosa*, cepitosa aeruginosa; stipitibus
dichotomis simplicibusque subracemosis; spo-
rulis glomeratis parvis. Flor. Dan. Tab. 77
fig. 1. quoad figuram.

In Fuligine Lycoperdinis vidi.

1599- & *carnea*, cepitosa, stipitibus brevissimis,
dichotomis, ramplissimis, albidis; peridiis vel
sporulis congestis s picatis carnis.

In ligno putrido Betulae albae. Septemb.

439. *Monilia*.

Sporul* in filis moniliformibus simplicibus digi-
tatisque erectis aut effusis bythoideis terminatas.

1600. *M. glauca*, cepitosa cinereo - glauca stipitibus

ere&is fimplicibus fporul s capi»lam 'formanti*
bus, Flor. Dan Tab. 777 fig. 2.

In fruftibus punidis byeme atifeivatis,

1601. *M. Candida*, congesta, Candida; ftipite fim-
plici erefto iporulis capituium globolum con*
fiituentibus. Michel nov. gen. pag. 212. Tab#
91. fig 2. fub AfpergiJlo.

Fungillus nofter in cortice Pini fylveftris fubpu-
tridi vert ledus.

1602# *M. PenicilluS)* giegaria, p̄mo obovata mox
fubfpisrica flava, 'denium ftipite elongato vil-
loio (imp I ice pa lide virefcente, fporu'is viridi-
bus capituium globoium formanihus. Pers#
Obf. My col. 2. pag 35 Tab. 4. fig. 8 9. io.

In ftercore murino invēni. Novembr, an hujus
Tribus?

1603# *M. digitata*, gregaria, fubcefpitofa, cinerea,
glauca; ftipite (imphce digitato.

Mucor cefpitosus Bull. 6- 504. fig. ii-

In 1 gno putrido. Aurumno & hy«me.

1604# *M. frudtigena*, acaulis, filis longis dfoplianis
indeterminans effufis ciner«o albidis demum
fporulisque nigrefcentibus«

In fruftibus putiidis, in Lycoperdine ctiam legi,
Oclobr.

440. *Periconia.*

Stipes rigidus fimplex, capitulo farinaceo ficco
terminatus.

1605. -*P. byjfoides*, folitari* aut fafcicularim con-
gesta, capitulo p̄mo capillari deraum oblongo

•ovato, Tufeo cinereo; ftipite, fubulato rigido nigro.

In ramulis dejejhs putridis. Autumno.

1606. *P. Scemonitis*, gregaria, capitulo elongato fubconico cinereo, ftipite fe'aceo rigido concolore, Airfare deciduo cin&o.

Byffus conoidea. Flov. Dao. Tab. 397. fig. 2.

In lamulis dejejclis 6c caulibus plautarum, Autumno,

44?. *Stilbum*.

Yungilli mucor^iforme* fiipitfln. Capitolum fob* roinndum folidum, primo iubaquofum eut fubglat nofum, maturefcen^ utpluvimum opacura turbidum,

1607. *S. rigidum* gregarium, cspitulo fubrotundo primo aquoib lacV^o, demum fufco-ctnereoj ftipite fubulato rigido nigro. Pers. in Uftef* Anal. d4 Botan. utes Sr. pog. jf. Tab. 2. fig. 2-

In ligno pntrido deje&o. Autumno,

x608. *L. gelatinofum*, lubgregarium, capitulo vlobaib, primo acjuofo lafteo, demum pallide refcenic; ftipite fubelongato cyliudiico, ufculo albido diaphano.

An btllbum geiatiootum Pers Synopf peg. 681?

In tigno purrido Seprembr.

T509. 5 *ventric>fum*, gpegarium, copftnlo ovato; (uligiabolo albido primo diaphano; ftipite apice

fubulato albo, in fterilibus bi-trifido, deorfum ventricofu fubfulcu diaphano, in itercore bovino. Autumnno.

442. *Cyathas.*

Peridium infundibuliforme aut cupulare, coriacoum, primo velo f. epiphragmate claufum veficuliis kntiformibus reuletum.

^{1610.} *C. Jcutellaris*, cupultfurmis; peridio primo lubglobolb, dcinde hemifpl[^]aerico, villo fufcocinereo obdufto, cipiphr<igmcite flavo ferrugineo claufu ore iübintegro ere&o; veficulis albidis demum nigrefcentibus.

Peziza lentifera Flor. Dan. Tab. 105 & Tab. 780 fig. a.

Ad terrain, alTeres, in ramulis dejedtis in fyl^vis. Sub finem aestatis, autumnno.

^{1611.} *C. Cnicihullum*, Tubcylindricus; peridio primo fubturbinato demum elongato, obovato-cylindrico, undique tomento ochraceo-ferrugineo vefcito; epiphragmate margine tumido convexo purtulato; ore intgro ererto; veficulis albedo plurhbeis.

Peziza crwibulifot mis Schaeff. Fung. 2. Tab, 170.

Midularia Icevis Holmflc. Beat. rur. ot. 2 pag. 1 Tab. i.

^{A.} peridio paulo majori infundibuliformi **baft** contractiori fere fiipiuto, ore fublumbato.

In ramulis ^caulis plantarura fterquilinio de
jetfis. Odob.

1613. *C. ftriatus*, infundibuliformis, peridio pr
fubliemirpherico demum infundibuliformi ft
goso-tomentoso fusco-umbrino, intus nitido
plumbeo frriato; epiphragmate albo memV
n a ceo clauso ; veGculis albicantibus.

Nididaria firiata HolmSt. !. c, pag, 5 Tab

An Peziza lentifcva L. £. ?

Ad terrain, Tadices ai'borum. Sub finem a¹ta
tis post pluvias & autumnno.

1615. *C. Olta*, campanulatus, peridio primo fi
turbinato demum campanulato cinereo a
fusco-tomentoso, intrinf laevr plumbeo-1ivido
epiphrapnate membranaceo cine:eo clauso
ore patulo txplanato, marline into^ro' rev
luto: v(Hculis albidis d^in nigrescentib'us
nuclco ovato nlbido.

Pcziza lentijera L. Hor. Dan. Tab. 780
fi?. 1.

Unhnjk. I. c. pag, 8- Tab, 3. Jub Niulaf¹
campanulata.

Ad ttrram legL Novemb.

1614. *C nitidus*, campanulatus, peridio pri
globoso. mov elou^tto turbinato, drn:uu ven
trirofo campanuiato fusco cinereo vil!
phragmate membranaceo cinereo, or* paten
tissimo: limbo interne nitidu dilute plumbeo
fulcato foidto, cxtdnQ Tulcato. raar^iuc cre

nato, umbrino ferrugineo; velkulis albidis, nucleo lineari atro.

Ad afleres vidi. Sub *hmem* «Itat

443. Phalli.

Volva ampla **fucculeau**. Pileus ovatus, *stipite* infidens, integer, latice defluente obtetus.

H⁵. *P. unpudicus*, *stipite* eredlo subobliquo *ceV* luloso - *cri* iroso, cavo, utrinque attenuat, *pi* Ieo que distindo prndulo lacunoso, per-do.

^ . *Impudicus* L. **Flor.** Dan. 175.

In *sy* illis umbrasis 11 ec non in ejus viciniratf in ericetis inveni. Aug. — Odo.

Volva ante evolutionem giuhofa, *glabra* m- f[^]rne tuberculoi'a e membranis **dnaba** con- ftaus, **cum** gelatina subflavescente *loch* xea di;ipUana, interstitiale, intus latice obfcur© olivaceo fun[^]illuru juniorein inchtib_t **reple-** ta; in basin liujus ubi ladiculas gerct, *mem-* brana tenuja alba quali volva altera par *tem* mfriorem *stipis* tircuindtins, in cujus medio [^]nfuadibulum marline plicato ubi orificiura inforiua *stipitis* infertum,- obfervatur; mot 'urnpit & *stipes* cum uileo latice olivaceo ob* ducto cum celeritate crefcit, & tune odorem fortem¹ ingratum exhalat. Latice devorato pileufi albus lacunofus apparet.

1616. *P. canius*, minor, *stipite* lubalbido, cellu- lofo, cavo, deonum attenuate inferne **pervio**; pileo collicu,lofo ai[^]iti contiguo poll devora-

tionem latins olivacei fusco aurantiaco, im-
pervio. Flor. Dan. Tab. 1159.

In truncis putrelc^ntibus pcefertitn Coryli av-
lanae (i Charfottenluthd) legi. Autumno.

fi. *P. felina* valva ovata fubtruncata; ftipite fu-
cellulofo, cavo fubalbido \ pileo olivaceo
Ttipiti fubcontiguo.

In iisdem locis Una vice inveni. Autumno cti-
viget.

444. *Agaricus.*

Pileus figura & fubftantia varia. Hymeni-
lamellofum diftinttum membranaceum vel
carnofum equals vel pletumque inutquale,
perficie infexiore pilei difpofitum.

I. *Lamella longitudine mquales (Rttjjula),*

• *Pileo rubro out yntrpunafcentt.*

1617. A. (R.) *fanguinarius*, pileo carnofo prii-
convexo, dein explanato fubexcavato, rubro
fanguineo, margine laevi; lamelli* ftipiteq
fubcylindrico breviufculo caxnofo albidis. \$^\wedge
champ. 1. Tab. 42.

Agar. integer. Flor. Dan. Tab 1009.

In fagnetis ad terram. Sub finem aest-
autumno.

1618. A. (A.) *ahitaceiis*, pileo carnofo plan-
cavato rubro - purpurafcf*T!te; lamellis
pilei latioribui pallide flavefcentibus;

Bull. 6. Tab. 509. inter Agaricos pectinaceos.

In fylvis ad terrain. Aug. Septemb.

1619. A. (*t.j emeticii* Sy pileo carnosio, piano, excavato, purpurafcente; lamellis pilei came latioribus, albico - pallefcei Utbus; ftipite craifo breviufeulo, carnofo, fuperne paullo dilatato, extus rofaceo intus albo. Sdueff. Fung. I. Tab. 15.

In fylvis ad terrain. Viget autumnno.

1620. A. *KR*, *fragilis*, pileo carnosio, piano margine fubtubertuloso purpuralcente; laraeilis latiufulis Bipiteque brevi craifo candidis.

In fylvis ad terram. Autumnno.

• • *Pileo flavefcenit.*

1621. A. (7?.) *ochroleucus*, pileo cawtfo primo convexo dcinde explanato fuhumbilicato flavefcenit; lamellis came pilei fubaequalibus ftipiteque fubcylindrico breviufculo carnofo, nlbidis! Bull, champ. 6. 509 fig- 6^{fub A} 6^{ar} pectinaceos.

In fylvis a4 terram. Autuinno.

1622. A. (H.) *ochraccus*, pileo carnofo primo fubglobofo dcinde convexo vertice vitellino margine paiiido; lamellis came pilei fubaequalibus pallide-ochraceis. ftipite fubelongato fuffum paullulum attenuato, carnofo, albo.

In faginetis ad trrram, omnium hajus divifionis rariffimus. OAob.

- ** *Pileo viridescente*^ *olivaceo, ant umbrino.*

1623. A. C-^0 *aruginofus*, pileo cr. mofo plano
leevi sruginoso; lamellis carne pilei subaequa-
libus, ftipiteque brevifculo cylindrico a-
nulo, albidis.

In fylvis ad terrain. Autumno.

1614. A. {K.} *cynoxantlius*, pileo carr, oso plano
excavato, margine fubtuberculofo, oliva*
pluuabeo dilco puq>ur*icante; lamelli* 1
pilei aequalibus allido-pallefcen-
tibus; ftipiteque brevifculo cy-
lindrico carnoso allido ir-
fultido flavefcente. Schurffc Fun^r. 1. Tab. 95

In fylvis ad terrain liHud frequent. Augi-
Odor & fapor nullus.

16*5. A. (R.) (*oliva<eus*, manus, pileo carnoso
explanato, excavato, laevi, univ-
rino - olivaceo; lamellis carne pilei fere duplo latioribus
laxit ftipiteque elongato deorfum atten-
to curvo, carnofo, albidis.

Bavus in Faginetis ad terram occunit. V
Njvemb.

II, Lamellae longitudinaline incc<junles.

A. orbiculares, ftipite in caitro pilei infertt.

a. fticc<c.

a. ftipite volvato (Amanita),

f annulo dtjtuto.

- cavo,

1626. A. (A.) *Uvldits*, pileo fubcarnofo, caj

panulato dein exj lanato, umbonato, xnarein*
ftriato-fukatophimbeo-li vilamellis carne
pilei latioribus, ftipiteque longo furfum att-
uato, candidis; volva vaginali fubchfplici,
alba; fubfusca maculata. Flor. Dan. Tab,
1014.

In pinetis, faginelis-ad terrain. Auguft — Sep-
temb-

Vatit prleo pallcfrente & fufcefcente.

[^]iT. A. {A.[^]fuhms, pileo fubcamofo, fubcam»
panulato, umbilicato, fubvifcido, marline ftria-
to-fulcato, ochraceo-fulvo; lamellis carne
pilei latioribus camiidis; ftipite longo furYim
lubattenuato flavefcente fquamulis fertugineo-
fufcis veftito; volva duplici: externa majori
alba intu[^] Qavefcenti: interiori minori annu-
l«formi fubforrueinea.

Haud frequens in pineto vicinitatft *Birl*eröd
ed terrain inter mufcos k gi. Septem^{or}*

• • *Jolido.*

162 v A. (A.) *pubefcens*, pileo fiAcarnofo, ?rimo
globoso dein campanulato viicido, f[^]re Bcco,
deriium piano fordide albo, difco dilute urn-
brino; lamellis carae pilei ? pi. ldtioribus
ver.tricosis 1-3 leriatis, rofeo incarnatis; Ft-
pite longo bulhofo furfum attenuato, a{rice
in carne pilei dilatato, aetate villofufculo
volvaque magna albo.

Rarius in loc-is humiflis, ad foffam quendam
(ved Farimags - Fejen imellem Ndrra - og
fter-Port) invent. Jui.

Pileus 4-5 poll, latus. Stipes 7 poll. altus

Sapor fubacriuculua, Odor nullus.

1629. A. (A.) medlus, pileo fubcamofo, pri
glandcEformi deindo fubcampanulato fu!)U
bonato vifcido candido; lamellis carne pi
la,tioribus venUicufis 2- 3 fcr. dilute role
Tiipite bulboJo furfum cylindricj fubbreve v
vaque ampla 4-5 fida albo.

In pineto in fuliis dejedis Pini Abietis pro
nit. No ve ml jr.

l^Ious fub ij poll, latus. Stipes 2 poll, alt*¹

Cuni Ag. volvac\o niinori Bull. 4.350 quoa
formaia convenit.

ti annulo cinclo.

1630. A. (A.) viri ,iieo carnofo. primo ov-
globoib deiii convexo viridi - olivaceo ftrik
terruptis obfeu >lerurnqae nuil"*
mellia albis: longioribus , ccf
pilei paullo latiori brevioribus fubJ
deis a?qualibus; ftiptte longo, bulbofo,
fcente, apice fubcavo; annulo laxo, 1
volvaque magna, albo/ Ag. phalloides \$^a
1. Tab 2, k 6. 577, D.

In fagnetis ad terram. Spptembr.

163 I. A. (A.) virirhfeens, pileo carnofo, p
ovato globoso demum convexo, lubvifcid

bido-viridefcenti, ftriis interruptis oWcurio-
ribus, m&culis magnis planis albis obdu&o;
lameliis came pilei isqualibus fubventricosis
4- plic. ferie pallidis; ftipite longo, bulbofo,
folido> cortina virefcente veftito; annulo laxo
reflexo, volvaque ampla externe albida,interne
ilavo.

In fylvis ad terram. Odtob.

1632. A. (*A. Jinuatus*, pileo fubcamofo, primo
globofo demum explanato, utnbonato, ficcc^
nudo, umbrino; lamellis tame pilci fere'' 2 pi.
latioribus pallidis: latioribus venlricolis: bre*
vioribus poftice truncato-finuatis; ftipite loa-
go bulhofo, cavo fufco bulbum *vertas* ēvanc*
Icento, annuloque reflexo, albo-/ufco Ariato;
volva magna alba. Bull. 6. 577. fig. E.

In graminofis mufcofis pineti. Septembr.
Odor & fapor, uullus.

¹⁶33. A. (*J. citrinusy* pileo carnofo, primo glo-
bofo-hcmifph.rrico dcinde pkno centra fub-
elevato flavo -citnno xnaculis mf-mbranaceis
magnis fufcis; lamellis came pilei fere- 3 ph.
latioribus ventricofis, albis; ftipite longo but
bofo, cavo, annuloque laxo eredlo-patulo,
ftriato, pallide ilavefcente; volva ajtate fub-
oblitterata alba. Schaeff. Fung. Tab. 20. iig.
3 & 7.

In faginetis ad terram. Aug. & Septemb,

1634. A. {A.} *irroratus*, pileo carnofo,, piano, centro fubelevato, nudo, albino - pallecentx
tis ftriisque interrupts fufcis irrorato;
lis fublinearibus carne pilei angufiior
ftipiteque longo fubbulbofo, cavo verfus- bafii
evaneicente, unnuto. *laxe* Itriato reflexo, vol*
vaque fuboblitterata, albidis.

In faginetis ad terrain. OtSob*

1655- A. (A.) *Mappa*[^] pileo carnofo, plar[^]o
fubelevato fufco- ahitaceo, maculis
Uaceis planis irrregularibus obfcursoribus; *It*⁴
me His carne pilei. fers [^] pi. latioribus yentri'
cofis pallidis; ftipite lpngo bulbofo, apic*
globofo[^] cavo cyhndrlco, annuloque laxo, re*
flexo, albo; volva. fubobliuerata alba. Bull.
6. 577 fig. F.?

In taginrtis ad tefr'am. Odlobr.

1636. A. {A.} *mufcaria*, pifco carnofo, primo glo-
bofo albo verrucolb (tiffin convexo demum
piano aurantiaco- rubro: verrucis irrregulari-
bus fubconfluentibus albidis; lamelhs
Intioribus, ftipifeequ« longo bulbofo iofern*
cortin.ito, interne f-pongiofb, nee non annul"
xeflexo albo, volva oblitterata alba. Bull. 2

Tab. i22,

Ag. *mufcarius* L.

Ag. *mufcarius* Flor(Dan. Tab. nag. ob li-
pitem flavefcntem cavum diverfus videtur.

In pinetis, rarius fagiaetis. Auguft. Septenx^b.

Octobr.

Va*. [3J pileo verrucis Jubot&ciilaribus *subtu-*
brculosis Jparsis albis,

y. *piUo. verrucis dtftiuitis.*

1637. A. {A) *pufudaius*, pileo fubcarnoso, primo
globoso dein convexo demum fubexplanxito
convexiufculo obfcure olivaceo verrucis mi-
nutis albidis te&o; lamellia fubobovatis came
lotioribus, splic, reriej brerioribus truncatij,
crnnulatis, JHpite fubbulbofo cylindrico, *cavo
conina plicis obiiquis w>l transveri'alibus ele-
vato obducio, annulo lubdcciduo patulo. obli-
quo, volvaque oblitterata, fordide dilute alu-
taceis;

In faginetis. Septembr. OAobr.

1638. A. (A) *circinnatus*, piieo carnoro primo
globoso d'eiu explanato murino, verrucia cir-
cinnatis : centralibus majoribus periph^xicis
minoribus utnbriiio-badiis; lamellis latitudine
carnis, albidis; ftipite brevi crai'fo bylbofo
ferruginea rubente, lolido, intm cum tarn©
pilei, annuloque- dilacerato patu-lo, cswraeo;
voiva oblitterata ferrugineo umbnuo.

In faginetis ad terram. Auguft. Septemb

1639. A. {A,) *veiTucofus*, pileo carnoro, primo
globoso, demde convexo, centra fubdepreffo
pallide erubefcenti fubrimoso, verrucis? an-
gulatis duris urabrinis; lamellis carne latio-
tibus ventricosis albis; ftipito fubbulbofo Tub-
brevis cavo furfum anguftiore, infra annulum
carneo -albido, fvifco cortinato; anuulo pa-

tulo flavescente; volva oblitterata. fufco-utfl'
brina.

Ag. berrucofiis quoad formam. Bull. 4. 3* 6

In faginetis ad terram in ericetis. Aug. Se
tembr.

Caro totius alba.

164a. A, (X) *gracilis*, pileo carne tenue, primo
campanulato demtim piano centro paululuttf
elevato, nudo uxnbrino fubvifcofo; lamellis
carne 3 pi. latioribus pallefcantibus: longiori-
bus fubventricofis ftipite adnatis: brevioribi⁵
oblique truncatU; ftipite longo, fmbulbofo,
fjracile, cavo vel fubftantia fpongiofo - cellu-
lofa far<5lo, fibrofo, annuloque membrane
ceo arde reflexo albo; volva oblitterata.

In graminosis mufc'isis pineti, Septerobx.

2641, A. (A) *umbonatus*, pileo carnofo, expl.Tn8<^{fl}
umbonc fubacnto, pallido punctis umbiii^{lls}
periphiriam verfus evanelcemibus; lamellis *
fttudina'carnis centralis, ftipitcqu* longo, tf
lindrico gracile bulbofb per toram longitudt'
netn cavo, fubcarneis; annulo remoto parulo
slbido; volva oblitterata.

In pinetis baud frequens, Auguft.

Pilcus 3 pol!. latus. Stipes 4 poll, akus» 3
lin. ciniT. Dulbus y lin. craflus,

1642. A. (A.) *campeftris*, piho carnofo, primo
globofo aut glandiformi dein convexo etate
explanato fubsvi cndido centro dilute umbri-
no; lamellii latitudme CXXdiJ primo rofeis de-

mum cinnamomeo - pu:ptir3fcentjbu«; HipjUe
fubbreve bullofb annuloque tugaci albino; I
bo ob volvam obli:teraram rugofo fquorafo.
Flor« Dan, Tab, 714, :\g. campefh'Js L
& pileo Jquamis fuscis obtefio. SchsfF. Fung.

Tab. 3?.

y pileo rimojo.

Ad f, pes in agris poff: ineiTem, in pratis & p
<uis. Auguft. ad Octobr.

b. ftipite volva deftituto, (*Agaricus*).

t annulate

* cavo,

'643. A, *tandidus*, folitarius pileo primo glan-
diformi conico dein convexo l^vi candido; 'U-
mellis 3-4 plw, ferie carne anguftioribus di-
iute cinereo-violaceis attin^entibus; ftpirc i'ub-
Ion go era (To fubbulhofo iurfufn haud strenuaro
l«vi, annuloque fubla^to roeihforanaceo ere&o-
patulo stbo.

^nter folia decidua fagineti *Birierod 5c Bagfvterd*,
Septemb. Oclob.

Annul us interdutn fubreflexus invenitur.

*4» A. *procems*, folitarius inagnus, rufefceare-ci-
ftcreus; pileo carnofo, primo ovcroy deinde ex-
panfo, umbonato, fquamolb mergine fubfim.
tftiato; latnellis c4me ldtioribu*, pnrti pilei fub.
cartilagine* fiavefewni adnatis, albido-pallefceu-
ribus 2-3 plis. farit] ftipite longifimo bul-

bofo tomento coirtinato; cnnulo dqpHcj: externe
e cortyia ftipitis orto, rvoluto; interne -ine
branaceo patulo fubveflexo albido. Fior. DJ
Tab. 772.

In agiis port mefTem, in fylvis,

1645* *d. incrustatus*[^] folitarius, magnns, piJeo car-
nofo primo globofo deinde csmpanulato luteo-
ferrugineo, vertice crusta farinaceo - squamulo-
lofa albido-gvifea obtuſto, margine λ riato - ſul-
cato; iamellis iigmoideis, anguftis, a **piic#-flj**
tie acute admit is dilute flaro f:rrugiiuis.; ft i pit*
longo craflb fubbulbofo, fufccfcenre-ailiido, cot-
rina umbrina in fquomuhs lanceoJatit *fibrosis*
eveftis occumulatii veftrtb, fupia aniiulum pa-
ten tern membranaceum albo lave*

Rarins ad terram in fagineto circa Jtagfvcrcl legi*
Septemb. \S Oflob.

1645. [^]. *Beryllus*, foitarius, glutinofus, pileo fub*
membranaceo primo g'andifouni -dein campa-
nulato-conico, demum explanato centro *paul-
iuluin conveyedo ſenigineo- fmaiagdi-tio; *Jamellis*
carne pilei 4-5 plic. fatioribus, iubventrtco^{^5}
iubadnatis lilacims; (tipite iongo > tenue -cyUn-
diico iubfq»in«Ioso anuuloque pHmo *membra*
aaceo eicfto dein reflexo fibvilloſo exfus *pileo*
concoctore, intus fuico nigro. Barfch, El, *Cont.*
I- pag. 83. Tab. gg. %. 215.

In pinero Bagfvaerd ad terrain, Qctobr,
Var, vertice umbri[^]o.

Pileus hawl ultra 2½ poll. lotus. Stipes 4 poll. .lorrgus, & 4 lin. viajfus. Sapor & odor Ropl.

64.7. A. *Jpiialeromorphus*, foitarius, pileo membranteco - carnofo pviino hemilphacnco <tcind< explanato fubreftexo obtufe umbonato lotco-ochraceo, mtdio umbiino; lamellis 4 pi. carne pilei Istioribus venrrfcojrrs adnato decurrentibus iufco-tuliginosis; ftipite iongo adjc<idente cy-Jindrico fibrofo dilute fpadiceo cortina fufco-timbrna maculato, infenu: fubinciaflato totnento fiibftrigofa fpadiceo obda&o; annnla \>rimo "letnbranaceo integro demam laciniato, ereclo[^]
Bull 6. 540. fig \. d. e f.? ubi torrx?itum ftipitis caret. Ah A%. jphaleromorpho Pars, fynopf. pag. 268. diverfa.

I'' pinetc circa Birlteiod ad ten-atn. Septembr.

26 48* A. *fubcernuus*, folrarius, pileo fubcarnofa convexo fubuenbonato I[^]vi fubceriiuo, cinnamonic; lamellis came pilei 2 pi. larionbns adnatis atro 'fufers, rriarginibus albido hvinosit; ftipire longo fubbulbofo cylindrico fribHcxuo* fo: infra annulum membranaceum pnrn!o-erectum, fubfpadiceo, fquamis erefttJ, fibrillosis Uttibrinis obdufto; fupra annulum tentiure ftrito albido-fericeo.

Infrequens in fylvis a3 terrnfn. O&obr.

An *Varictas A%. cdudicird Pers. Synopf. pag.*

271. *Pileus hand ultra unciam wiam iutus.*

*Stipes quatuor pollices longus & Jub 3 lin
craifus.*

1649. *A. fquarrosus, eefpirosus, p Ico priino glo
bofo, demum hemifphrrrico carnoio tivo ferru
£iiu*o, (quflmis copious fibrof'i - membvat
Juteo-umbrinis, revolutia obdnOo: centra I i
minoribufi* perrpbxricis maioribus, ietate jun
ore jnargine cortina |>all;ia fimbriato; lamelli
carne pilei 1 pi. anguftioDhus. 4 plic. serie
8dnatis, dilute olivaceis; fripi'ibus longis, c)
lindiicis, crasfis, bafi connotis, cortina tom^e
tofo-villofa fufco-umbrinf, infra annulum iff^{ti}
muHs fibrillofis lartceolntis fpaisis vtftitis, fup
«nnu!uiTi levibus albkio-fulcis; antmlo mem
branaceo- fibroso fifib pnllido. Pea. fynop
pag' a68» exclusis fynonym.*

Ad cauiicem caefum fubputridum Fegi fylvfti
'Oclobr. Novembr.

**Caro tarn pilei quam Jiipitis turn cavo an
plo dilute ochracea. Pileus 5* poll. latus
Stipes 7J poll lo?igus fuperne 7 lin, infern
10-11 tin. craifus.*

1650) *A. fascicularis, ccfpitofus, pileo fubcarnofu
piitno globofo dein explanato, umbone depreffu
luteo vcl luteo - ochraceo verfus marginem p^{flu}
dilution; lamellis carne pilei 2 pi. latioribus c
nereo-virefcntibus fubnebulosis liberii; ftipit
bus longis cylindr[^]cis luteis bafi fascicu[^]
ennnatis; annulo filameniofo eixclo uftulato *
fuic*

Ad latera truncorum lubputridorum post plu-
vias. August. ad O&ob,

Caro pallide citrintju

Figura Flor. Dan. Tab. \$9Q cpthne convent,

Ji excipies ftipes folldus.

951. A, *pompoms*, cepitosus, pileo carnosio visco-
so primo globofo-hemisphaerico demum con-
vexo flavo medio obscure aurantiaco; lamel-
lis carne pilei angustioribus subfigmoideis, li-
beris cinereo-subvirescentibus nebulosis; sti-
pitiibus sublongis cylindricis ruberxugineis
kevis apice albidis, basi fasciculatim con-
natis; annulo cortinato albido fugaci. Scha;f.
Kuns; i. Tab. 49.

^ truncos putridos & in eorum vicinitate.

August. ad Octob.

Caro fungi lutea.

952. // *acutus*, cepitosus, pileo membrum-
carnoso, explanato, ^centro depresso, fufco
umbrino, margine dilutiore; lamellis carne
pilei 5 pi. latioribus, subfigmoideis, stiptic
natis, angulo acuto vero li^jris, umbrinis;
stipitiibus brevibus cylindricis tenuibus, basin
incrassatis ferebus fusco-fuligineis, connato
v^i annuloque fibroso - fillo reflexo dilution-
bus.

In caudice Tubputrido Fagi fylvaticae. Oclob.

*Caro pilei albai stiptis umbrina superius di-
lutior.*

165;. *A. fptendens*, cepitofus ? folitariusque, didus, glutinosus, pileo membranaceo-ca* j uotb, diaphano, fubhemifphaerico, glabro a Julcato aut marline Ifcriato-fulceto; lamell 4-5 pi. carne pilei latiuribus, fublberis; pitibus brevibus bafi increffatis, fibrosis flip annulum ftriatis; annulo membranaceo va nante patulo fubreflexo. Flor. Dan. Tab **mo.**

In Fago fyWatico putrido aut putredine proxi
Sub iium a?ftatis & autunmo.

* * *folido.*

1654. *A. maculatus*, folitarius, magnus, pileo canofo explanato, laeviufrulc* umboiiato, ba xnacuiis fparsis lubcruftaceis fordide -carr lamellis carne pilei aequalibus figmoideis, xiatis, pallide-fiavefcantibus; ftipite longo crurfum lubattenuato albido-rubelc^nte, tina: fquamulis fibrosis erectis, obfcurioHb veftito; nnnulo membranaceo reflexo, exte fufco interu^ albo.

jRarius in fa^inetis circa Bagfvicrd ad terr occurrit. OAobr. ^^

Caro fungi albido - ruhefcens. Pileus -4I- pol latus. Stipes %£ poll, longus & it>| lin. craff¹

L 1655. *A. Fahlii*, folitarius, ma^nus ferrugineo rantiacus; pileo carnofo hemifphaerico, 1^ev lflm^lli^ carne pilei anguftioribus, figmoid intus ovatis liberis. ^ pi: c. ferie. dilution

bus; ftipite longo craffo laevi bafi fuhhuibofo; annulo magno plicato erecto albido punctato.

frungum hunc elfgantifllinum a Cel. V.hl in fcigineto circa Bagfvxrd ad terrain inventus.

Octobr.

Caro fungi albida. Pileus ultra 5 pcJl. latus & 2 poll, alt us. Stipes 8 poll, longus & fere 1 poll, crajfus.*

656. *A. glutinofus*, folitarius, glutinofus, pileo carnofo primo fubhemifphierico, demum explanato, fubdepreffo, dilute lateritio vel fublivido; lamellis carne anguftioribus fubfiginoideis adnato - decurrentibus cinereo - fulcis a-3 plic. ferie; ftipite elongato craffo, villofiufculo inferne extus intusque flavo, fupeme cum annulo membranaceo reilexo albo. Flor. Dan. Tab. 1247.

In pinetis ad terram, inter muscos, in ericetis rarior. Septembr. ^itubr.

Caro pilei & fuperioris partis ftipitis alba. Pileus fete 5 poll latus. Stipes 4^ poll, longus & ad r unc. crajfus

657. *A. ccftiualis*, f<»iunius, fubgre^tius, pileo primo henrrfph<erico demum cxplanato con*^vex;ufculo utnbcne lff^viut'culo alutaceo me^io flavefcenti; lameliis carne 5 pi. latioribus, rep and is fubadnatis, 4 plic ferie, paullo obfcursoribus ac demum cinnamomeis; frpите brevifculo. adfcen dente. bail .pJcaSiuIcui^lux-

fum iubattenu&to; annulonue jreflexo ftri>^f
pileo concolore.

In locis glureofo - argillaceis ericeti circa **Bit***
rod. Jun.

Caro fungi cinereo ~ aluracea. Pileus 2J p^{oi}
latus. Stipes haud ultra a£ longus & 3J li
in medio, bafi auteni £ poll crajjus.

1658- «4 *adnatus*%, folitarius, fubvilcolus, pileo fub
carnofo, . piano, umbrino-olivaceo, macul
fubcraftaceis albidis fparsis; lamellis carm
pilei Tub 5 pi. latiotibus attingentibus alb
dis; ftipite fublongo cylindrico fubbulbofo r
befcente • fufco ftriato, fibrofo carnofo; an
nulo adnato -furfum deoi'fumque dilacerat
libero albo.

In pinetis inter muicos haud frequens. Octob

Caro fungi dilute rofacea. Pileus fub 3 p^{oi}
latus. Stipes 3J poll longus 4 lin. crajj^

1659. A. *grdnulofus*, fulitarius, fubgregariui, pile
fubcarnofo explanato Abumbonato ferrugine
granulis minutis obfcursoribus obduAo; l
mrilis came pitei Jub 2 pi. latioribus alb
fubliberis; ftipite fubelongato cylindrico fufc
albido fquamis minutis, annuloque fib^{1*1}
fuicis, fupra annulum leeve. Bull. 6. Tab 6

55o fig- 3-

In pinetis in foliis dejeclis Pini frequens o^{oc}
xit per totum autumnum.

Var. *P>leo ftipiteque fufco umbrino,*

Caro dilute albido umbrina.

166

3- *A. albo-marginatus*, folitarius; pileo Tub-
carnufo, pfimo conico campanujato, denaurn
piano, lffivi, lateritio-incarnato, margine ma-
culis membranaceo-farfnosis albis; lamellis
c*vne pilei -ah 3 p]. latioribus attingentibus,
, *Ibidis, ftipite laminis concolore fubelongato
'ubbulbofo apice. fubdilatato, fquamulis fibro-
sis ereclo - patulis; fufcis veftito j annulo parvo
iaciniato fufco.

I ^ foliis dejedlis Pini abietis rarius. Otflobr.

Caro fungi alba. Pileus ultra a poll latus.

Stipes > o. \ poll longus & 3 Hn. craffus.

166

. *A. fimbriatus*, folitarius, pileo. fubcarnofo
pri mo, fubcampanulato dein- explanato um-
konato ftriato flavo - vitellino, margine cor-
ona albida n'mfaiataj lamellis came fubla-
tioribus liberis pallide flavefcantibus; ftipite
fubelongato, tenue, fubcylindrico, tortile, fi-
brofo fufco-Juteo^ annulo membranaceo mi-
nuto patulo, concolore. *Agaric frang\$ Bull,*

j 6* 563. fig. 2?

n Pmetis ad terrain baud frequens. Oclobr.

c < *roflaua. *Pileus. 10 tin, latus. Stipes ultra*

li *poll longus & 1 Un. craffus.*

166

>a. *A. viride-marginatus*, folitarius, pileo car-
nofo, vifcofo explanato, fubumbonato fordide
aerug meo. medio dilute uinbrino; lamellis car-
ne Pilei fublatis kxis repandis toto ad-

...ulis violaceo-cinnamomeis; ftipite fubelon-
gato, cylindrico, fubcra: fo, albido-aerugineo;

annulo¹ fibroso - laciniato apertissimo fusco
 subfusci.

Ag. cyaneus Bull, 6- 530. fig. 1. f. minor.

In foliis dejectis fagineis, Autumnno.

Caro fungi alba linea dilute virginea
 cinerata. Pileus sub 5 poll, latus. Stipes
 ultra 5 poll longus, 4 lin .t.jj'us,

1663. A. Jubcavus, foliarius, f. xtus inmsque
 l'as, utiho um}riiis, p'leo primo
 fihrerico d«in tunvexo exj»j tnato u
 fu((-ito, iuhciirnoTo - menjbranaceo ; lamell
 earn 4 pi. **lterioribiw**, adntito- subdecurren
 tius; ftipite longo cylindrico Ari(5lo
 h«ud dilatato, fulxavo, infra anulum p^u
 tulato, fupra annuum laeve; annulo
 eresclo patulo.

In foliis dojetftis Pini Abietis rarius. Septem

Pileus sub 2 poll, latus. Stipes ultra 5[^]
 longus & 5! lin crajfus.

1664. A. Jalicinus, folitarius, ferruginous, P¹
 convcxo -expanfo, umbonato, vifcido,
 interrupts fquamisque lads ^bf cure
 fparsis; lamellis latisfimis laxis repa
 natis, 4 plic. ferie difpofitis dilute ci:
 meis; ftipite longo, cylindrico, craffo,
 ofo fuperne carnofo inf me duro, fquam
 fibrosis lanceolatis eredis ferrugineo-
 nis obduAo; annulo membranaceo medio
 laciniato, patulo. An congener Ag. aurium

Batfch Elench Cora, v V^a & 'H Tai. ****

Jig. US.

Iu caudicityw Salicum vèteruin. Odtob- —No-
vembr.

Caro pilei & partis fuperioris ftipitis fluva, inferioris umbrino -ftriata. Pileus ad 6 poll, kitus i& altus. Stipes Jub 5 poll longus & 8-9 lin. crajfus. .

1655. A *PolymyceSy* celpitqw, folitariusque, pileo carnofo, primo hemiipharico umbonato demum explanato, fufco umbrino, fquamulis echinatis obfcursoribus veftito; lamellis carne pilei anguftioribus fubdecurrentibus alido pallidis; itiyitibus longis craois lurium tenuioribus paulo dilutionibus bad fubbul- tofo connatis; annulo membranaceo fubcras- Ib, patulo fubreflexo albo.

Agaricus melkus Flor. Dan. Tab. 1013 quoad formam.

Ad arborum truncos vel in eorum vicinitate interclum densus agminibus proveuit. Per totum ^utumnum viget.

β. *bamhycinus*, ftipite villo fufco umbrino obdudo, annulo craffo bombycino albo.

Bolt. fung. pag 76 Tab. 136. 4g- M^{co}~ pallidus, fed ftipite cum cortina albida.

γ. *elatus*, pifeo maxixno, lavi difco maculis obfcursoribus, margine cortina albo-roa- culata; lamellis luteo-cinnamomeis, carne

«

latioribus, stipite longo crasso, cortina f
denfa; annulo bombycino.

Varietatem franc y folitarie invcni.
omnium alba vel albida-pallefcens.

1666. *A. macrocephala*, cepitibus, cinnamoin
ferrugineus, iuhvifcirlus, piieo primo
mifpbserk-o demurn explauato, carnofo, ftr[^].
abbrevintis obfcursoribus mtirgine fubinvol
to; iameijis carne pilei latioribus attir)ge^J
tibus; ftipitibus, fublongis, la?vibus fubcyli
dncis, fuperne flavis, bulbofis, bulbis
fiffis, connatis; annulo membranaco
ferrugineo reflexo. An Ag annularis
6. 543. Q?

In caudice Fajsi fylvatjc® nuperrime caefo. *
Car0 fungi luteo fenuginea. Pliens 4-5 -
poll, latus. Stipes 4-6 poll, longus, 6-10
in media & hulhm 1 - 3 poll, crajjus.

1667. *A. Jiuamofus*, eefpitofus, luteo - vitellifl
vifcidus, jrleo carnofo primo glandiformi
mum explanato, umbonato, fquamis
lis ferrugineis Iparsis, margine involuto;
mellis carne "pilei fubaequalibns figmoi
poftice rotundatis Hberis; ftipite pro ratio*¹
pilei fublongo, bullofo: bulbis connatis,
fum attenuato, infra annulum parrum
niatum credtum, fquamis **fibrois** ferrugin
feadiis denfe veftitus, fupra annulum

Fig. Bull, 3. 266. haud male quadrat

Ad caudices arborum circa Bagfvaerd.

Caro fungi compadia flava. Pileus, f. pott
latus & 4 - 5 1/2 Un. a tus. Stipes sub 2 poll. Ion.
gus, superne 3 inferne 5 - 6 Un. traffics,*

1668. [^]/_% *chrysopei mus, cepitofus, albus, viscidus,
pileo fuliginoso-brunneo, diaphano, primo he-
miphaprico striato demum explanato glabro;
lamellis carne tenui pilei fore 6 pi. laticius
la vis repandis, portice fissuris, pro-
luc-
tione lineari decurrentibus, aetate pulvere fe-
rrugineo luteo evoluto hinc inde maculatis;
stipitibus longis, apice subdilatatis balliu-
crassatis subulbosis coriatis, subadscenden-
tibus, subflexuatis; atinuja, membranaceo re-
flexo.*

In trunco putrido. Fagi fyltaticie Navemb. &
Decembr.

*Cat 0 totius fungi compn&a stipitis subdura
alba, Pileus 5/2 pal. latus. Stipes 3 poll long.r
I bn. in modio & bcdibus 5 1/2 Un. crassus.*

1669. *A. venosum, conopitum pileo subcamoso pri-
mo convexo demum explanato subdiaphano
•lute fulco marline albescente venoso striato;
lamellis. carne per 4 pi. laticius di-
anti-
bus laxis. fulcris albis; stipitibus medio
cylindricis apiceque dilatato albido, basi in-
crassato fuliginoso umbrino sublignoso; annu-
lo parvo truncato erecto albo.*

In caudice putrido' Fagi fylvatica# Novembr.
Decembr.

366 *Cryptogamia. G. Fungi.*

Caro pilei & partis Juperioris Jiipitis alba, partis inferioris Jujca. Pileus ultra 2 poll tatus. Stipes i $\frac{1}{2}$ poll longus; medio 2 lin. spice & ba*i Jub 4 lin. craJJ'us**

tt Jiipite volva & aanulo dejtituto.

• *cavo Jolitarii gregariique).*

Color pilei albus vel pallidtzs.

1*70. *A. ericeus, folitarius, fuhgregarius, albo pallefcens pileo fuhrarnofo, acute convexo, deinde explanato fubumbonato demum mar- gine ereAo fub revoluto, concavo-umbilici to & utpiurimum dirformi, fubvifcido; lamfl* lis^carne pilei 2 pi lafioribus laxis diftafl¹¹, bus decurrentibus; ftipite furfum incratt**⁰ lubflexufo fubelongalo, fuperne pileoque eſ' cavato inferne compacfto. Bull. 6. 551. fig*^{1#}*

In ericetis haud infrequens. Odlob.

Caro alba. Pileus explanatus | poll. ~~cavus~~ \ poll, lotus. Stipes 1-1 $\frac{1}{2}$ poll, longu

1671. *A. Jubulatus%* *folitarius, albus, pileo •sub- camofo infundibuhformi vifcido margine W •oluto; lamellis came pilri latioribus, lifl^{ea}, ribus, confertis, adnato-fubdecurrentibus; ^{A''} ~~compac~~ pite inferne fubulato apice umbrino to fuperne dilatato pileoque cavo.*

In foliis dejtitis fagineis. Odob.

Caro alba. Bikus fuh aI poll latus. Stipes 2 poll, hngus,

1672 > *A. coHocephutus.*, folitarius, subgregarius, pileo fubcaraofo primo hsmU'ph-jevia;-- conico dria eXj.iunato umbone obtuio dilute rofaceo dcmura piano; lamellis-came pilei 2 pi. latioribu^ fubdisiamibus df currentibus; *Ripite elongato* cyiindtico inferne fufet>>

In- ericetis. Septerab. O^ob.

C«ro alba. Pikus fub \ poll, latus. Stipes \$. poll: longus, e tin. crajfus.*

1673 ". *A. fubradius*, foliranus, pileo fubmembrantMH>, vtC'do, prjmo convex^ dein expnato fubu-mbonato demuno concavo paiHdo-albefcenti margine radiU umbrino-olivaceij, fubcrifpa^o; lameihs pro ratioac fungi latisfimis concolorilms iMavgiuibus **Qmbriaii**, acute arcaatim decurentibus; ftipite fubeiongsto inferne fubukto fuperr.e dilarato ratius folido albido. *Sc, haff. Fung. 3 Tab. 232 quoad figuram.*

In **prfitti** ttiwr gramina Oftob. Novemb*

%i arc ulhldu. Pileus i-i£ poll, ilalus. Stipes 1^-2 poll longiis.*

74 -^ *ftylohates*, folitarius, ftibgreo:arius, albi-dcl - **cantdfecfts, pileo primo fubcampnr.ularo, dein exp anato, conv«\o, membranaceo ;' iarnellis iinearibus fubsttingenbus; ftipite er«Vo fm-fum attenuato, bafi membranula orbiculari fubcrifpata fuf:a impoiita, Pers. Synopf. pag.

fefoliis dejeslis Pini nee noa in frustulii rame*
arum. Oftrob

*Caro concolor. Pileus | poll latus. Stipes Jub
a poll. longus, ij lin. craffus.*

1675* A. ^{tener}7 folitnrius, gregariusque, albido pal-
lefcens, pileo'membranaceo. piimo conico dein
cnmpanularo, dcmuni explanato fubumbonntcr
fnargine Izvisfiine ftriato; lamellis latis adnato-
decumentibus ftipite cylindrico filiformi ball
bulbqfo.

In tol'is dejeslis/ac fjustulis ligncis, Pini fylves-
tu's ^ug **epreimb.

*Suhstantia concolor^ Pileus Jub | poll, latus.
Stipes i-i¹ poll. long. $\frac{x}{2}$ lin. craffus*

167\$. A. *capdlaris*, foluai'us, gregariusque minu-
fisiimns albus, pileo primo conico dein cylin-
drico-campinulflto, uinbilitato, ftriato; lamel-
lis diftan'ibus ceine pilei spl. latioiibus, attin-
gentibus; ftipite Unuisfimo capillon apice fub-
dilatato, fufco.

In foliis dejeslis fagne!s# Ofttob.

*Suhstantia alba. Pileu^jin^ latits. Stipes fui
i£ poll, longus.*

j677. A *Amanita*.) folitarius, ^ileo fubcarnofo ex*
pUnato pallide-aluraceo cunbrino fparfim ma*
cntato, umbone obtufb> fufco umbrino lamellis
carne pilei 4 pi. latiouoribus ovntis liberis al-
bis; ftipite longo fcbbiilbofo fuffum angufta'Of
pileo concolore, inferne fquamulis fufcis ~~ves~~
tito#

In ffiginetis ad terrain, O&ob# Novemb.

Habitus Amanitgrwn Jed fine ullo vefiigi
volvm: Caro alba. Pileus 5X poll latus. Sti-
pes ultra 4 poll, lo/tgus, juperne %± lin. in-
ftm fub. jf; Un. crajjus.

* * *Color pilei cinercojufcus vel cinereo umbrinii*

1678. *A. cucullatus*, folitarius, Cubgregarius, p_tti-
vus; pileo fubcarnofo, oampnnuiato, obtufo
umbonato, albnio ciaereo; lamellis carne]
lei -paulo latioribus .ircuaiim decurrentihua
albis; ftipife filifonne longo apice rubHilata-
to laevi inferne piiis refiexis vestito, pileo
concolore. *An varietas A. cucullati. Pers.*
Synopf. pap. 371 ?

In mufcofis humidis Pineti. Septemb.

Caro alba, Pileus 3 tin, latus. Stipes 2 V
poll, longus.

1679. *A. filopes*, folitarias, fabparvus; pileo mem-
branaceo, conico, Ifevi cinereo-livido, vcr-
tice umbrino; lamelHs linearibus carne an-
gultioribus libevis albis; ftipite Tubfiliforme
lonfitisfimo flexnofo, lave, pileo concolore, in-
ferne paulo craftiore umbrino pilis retroflexis
fufcis. Bull 4. Tab, 520.

In mufcosis Pineti. Septembr.

Caro alba. Pileus juh \ pol. latus. Stipes
*fub 5£ poll longus, % lin, crajfus**

1680. *A. alliaceus*, folirarius, pileo submembranaceo primo conico canij[^]muiato dein explanato fufcescente ftriato, umbone p Serum que obfcuriorie> Imneilis fubconfertis carne pilei 5 pi. la*
tioribus ovaris, Iberis, athiriis; "ftipite **iongU**
fiino, tenue, .glauco, fubredicato, pubefcente
Flor Dan» Tab. 1251*

Haud fiequens in fylvis ail tsrram in IGCIS um-
brosis fnbliumidis. **Sub** finem sftatis & **autumno.**
Caro fubalbida. Pileus ij poll, U&us. Sti-
pes 5-6 poll lo?igus, fub 2 Ivi. craffits. Odo
alliaceus.

Vai\ ftipite deorsum incraffato fubpremorfo dr
lute umhrino,

1681 • -[^]. *allicinus*, folifarms, gregariusque, pi[^]
fubmembvanacco primo campannato, dein «*
pianato fubtimbonoto cinereo - palliio ftrinto
difco umbviho; lamellis came pilei a pi latio
iibus fubdiftantibus, fub ovaris, Ifbevis, pailidis
ftipife longo fuhbulbofo villofiufculo, fupen
pallido inferne fufco nigro, Uull. \$. Tab. 524
fig 1 & **Tom.** 2. Tah. **158,**

In foiis def flis qtiercinis Novemhr.

Caro pilei fubalbida, ftipitis fufca. Pileus
1-2 poll, hifus. Stipes 3 pnfl. hand 1 ultra
longus 3-4¹ Hn, craffus. OdoY fort is allic-
ceus.

1682. *A. inodorus*, folirarius, pileo membranaceo
fubdiapbano, explanato umbone cbtufio ftria^r
plicato, ruguloso, cinereo, fufco: lamellis

ftaneibus ktis, lexis, libm̄s, alb̄rd̄fc; flipirc longisfimo glonco ftriato, tortile, interns in* craffeto, fubliviefo.

In umbrosis lots fylvQitom. O&obr.

Subftantia pilei alba; ftipitis dilute utobrina. Pileus Jub 2 poll, latus. Stipes Jub fi poll, iongus fuperne 5 lin. inferne 4-6 lin. eras- /us. Odor nullus.

1683. A *l&vi\$* folitarius, pileo (bbcarnoso, cam- puiulato, vertice acutiufcuio, lxvi> dilute fufco umbrino; lamelli^ came pilei baud iation'bw, poftice anguftioribus diftartibusfovdide roseis; ftipite longisGmo tenue inferne incraffatx) cine- reo glInco; tubulo membranaceo albido vermi- cular! in ciivo ftipitis dcpoffo.

In fylvis ad ttrram non fiequens in folia dtjefta,

Aummo

Caro pilei albiia - rofacea, Jiipitis fufca. Pi leus Jub 1 poll latus. Stipes ad 6 poll, lorn gus, fuperne Jub i£ lin inferne Jub 3 tin* craffus. Odor Juballiacèus.*

1684* A. *porreus*, folitarius gregariusque, pileo fab* membranaceo hemifpbffrico fubexplanato pallU de-cinereo, vertice umbrino-olivaceo vel fenu* gineo-eroceo, margin em verfus ftriato; lamellif <:ame latior^us, poftice attenuatis, liber is, el- bis; ftipite longifimo cylindrico, inferne fub- attenuato tomentolb fubflexu©f», albida vel **croced.**

Inter folia dejecta fagine. Sub finem æstatis, autumno.

Substantia crocea, & Juxta radio fucus
•crotus effluit. Pileus ultra 1 poll. latus
Stipes fere 4[^] poll, longus, sicut On. crassus.
'Odor alliaceus.*

1685» *d. crocatus, foliaris, pileo submembranoso
campanulato, tuberculato, obsolete striato;
•inereo-umbrino; lamellis parvis; stipite lon-
go cylindrico, superne fuso, inferne cinereo,
flexuoso.*

Inter folia dejecta fage. Autumno.

*Pileo vel stipite fratio aut lacco equidem, suc-
cum croceum propelitur.' Pileus ultra 1 pol.
latus & fere 1 poll, altus. Stipes 3-4
longus in crassus.*

1686* *↳. hirtipes, foliaris, subgregarius, pileo
submembranoso, primo convexo demum eplanato
nato convexifurcato subumbonato striato cinereo
vertice fuso; lamellis carne laticius ovif^{is}
subattinentibus dilute purpureis; stipite 1^o n-
gissimo deorsum incrassato fuso infra medianam
birtu subtrigoso, Tada ice acuto.*

Inter folia dejecta Pini Abietis. Autumno,

*"Substantia cornea. Pileus fere 1 poll latus,
Stipes 4 pol. longus, superne 11 inferne 1/2
crassus*

1687. *J. rigofus, foliaris, gregariusque, cine-
reus, pileo submembranoso convexo explanato*

ftriato, centro obfcuriori, fuhvifcido; lamellis came & pi latioribus late adnatis albidis; ftipite longo deorfum fubincrallato, inferno pilis rigidis albidis veftito, fubdiaphano.

Inter mufcos in pinetis. Septembv.

Substantia Jubgelatinofa comohr. Pileus fuh
£ poll, latus. Stipes Jub a| poll, longus, if
Ifn. craffits.

¹⁶⁸⁸. A. *Iceingatus*, folitanus, gtcgariusque, pileo fubmembrana.ceo campanulato, l«vi? cinereo fufco, vertice obituiiori, vifcido; lainfilis came fublterioribus, arcuatim adnatis. cinereo-rofeis; ftipito longo cylindrico albido fubdiaphano, glabro. An variet. Ag. Adonidis. Bull. 6. 560. fig. 3?

Inter mufcos in pinetis. Autumno.

Substantia Jubgelatinja fubalbida. Pileus
¼ poll, latus, Jub I poll, altus. Stipes Jub
4 poll. longUo, if»f Un. craffus.*

¹⁶⁸⁹. A. *corticola*, minutus, folitarius, fparfus, cinereo fufcefcens^ pilco hemifphaerico campanulato depreffo, ftriato fubplicatulo, membranaceo; lamellis raris latisfimis fubadnatis albidis, primo rofeis; ftipite breve tenue. Bull. fi. 519. fig. i.

In rimis corticis arborum: Hypocauftani Salicis

&c. Autumito & hyeme.

Substantia concolor. Pileus sf-4 Un. latus
& ~~alt~~St Stipes 7-8 lin longu^*

ttfgo. *A. unduhitu* Sy folitarius, coeruleo• cinereus, pileo membranacco, explanato convexiufculo fubumbilicato, ftriato, margine repnndo; lamellis carne latioribus figmoideis decurren* tibus; ftipite elongato cylindrico hinc inde impreffo quafi fubfra&o carnofo. Bull. 6. 535 fig. a?

Inter mufcos in pineto circa *Birkcrdd.* Jul.

Caro concolor Pileus ultra i poll, latus**

*Stipes Jub ai poll, longus, Jub 5 lin crajjus**

***• Color pilei alutaceus vel ochraceus vel fucus.*

1691. *A. comprejjus*, folitarius, gregarius, fufco* argillaceus, pileo fubcarnofo primo conico* globofo demum explanato convexiufculo me- dio depreffo; lamellis carne fublterioribus fig- moideis decurrentibus; ftipite elongato fulca' to-compreffo tortili fubflexuofa.

Inter folia faginea. Septembr.

Caro concolor Pileus Jub 2 poll. latus. Sti- pes Jub 3-3^ poll, longus, 4-5 lin. crajjus, Var. Colore albo, ftipite brevior.

1692. *A. copriniformis*, folitarius, fubgregarius pileo membranaceo - carnofo primo glandi- h furmi deinde fuhcampanulato vertice depre* Gusr.ulo fuhalutaceo7 margine inaequali; la- mellis carne pilei 3 p). latioribus clareo fubviolacHs adnatis; ftipite fuMongo cylin- drico, luuuulbolo, cr^iul'culo albo, cav o fu

perne interfecto. *An Ag. cernuus Flor. Dan. Tab, 1008* fig- 1?*

In locia huraiflis fylvarum (Charlottenlund).

Octobr.

*Caro albicla. Pileus ultra 2 poll, latus. Stipes 5 pol. long, * In/Z. crajfus.*

3. ^ *flavipes, folitarius, greffariusque, vifcidus* ^ pileo merabrynaceo, primo conico demum explanato campanulato marline friato argillacco **fiiliaIntacco**, vertice **nmBrinoF**, deprefib, lamellis carne piM fublterioribus, adnatis fubalbidis; ftipite lotigo cylindrico flavo diaphano bafi dilute umbrino, Iffivi. Schasf. Fung. Tab. 31.

l**i mufcosis in pinetis & ericetis. Autumno.

Suhftantia albida, Jiipitis gelatingfa. Pileus haud ultra 4 poll, latus. Stipes 3J poll Ion gus Jub 3 lin. crajfus.*

Var. ftipite xubefcente.

94 *A. longicaudus, folitarius, cinereo-argilla-ceus, pileo lubcarnofo fuplano ficco; lamellis came pilei 2 pi. latoribus, ovatis fubattin-gentibus, albidis; ftipite longo tenue, cauda ^ubtenuiori repenti villoBufcula.*

Intra folia dejetila fubputrirta Pini fylveftris.

Octobr.

Caro albida. Pileus T poll, latus. Stipes a pice ad caudam 2^ poll. £? cauda Jub X poll, long,; 1 lin, crajfus.

1695. *A. flexuosus*, folitarius, subgregarius, pileo submembranaceo, primo convexo demum explanato inaequaliter flexuoso subinvoluta cinereo-alutaceo lamellis carne multo latioribus laxis subpandis adnatis decurrentibus primo dilutis demum fordide purpurascens; stipite elongato cylindrico crassiusculo albo-fericeo, fibroso, fuperne cavo.

Intra folia dejecta faginea. Octobr. Novemb.

Caro alba. Pileus 3-4-5 poll, latus. Stipes 4-5 poll, longus j i poll. & ultra crassus,

1696. *A. tuherosus* folitarius, subcespitosus, luteo-alutaceus; pileo carnofo: carne ten^a primo convexo demum explanato, subreflexo umbone obtuso umbrino; lamellis carne angustioribus postice fmuatis, lineatim decurrentibus albidis; stipite elongato tuberoso fers albo tomentoso medio umbrino. 99.

In foliis dejectis fagineis putridis. Jun.

Caro pilei alba, stipitis fujca. Pileus 2 poll, latus. Stipes 4 poll, longus, fup 3 lin. crassus,

1697. *A. rubiginosus*, folitarius, pileo carnofo primo hemisphaerico margine involuto, demum explanato convexo subviscido pallide ^j 3 ceo; lamellis carne pilei multo angustioribus postice rotundatis liberis, 4 plic. ferie, P dis; stipite elongate cylindrico crasso, inf

Cryptogctmia. G, Fungi.

tjf

obconico obtuso subflexuoso, albo, fibroso,
medio rubigineo maculato, cavo ample
In. mucosis humidis pineti vicinitate *Birkeröd.*

Caro alba, pilei subfuscescente. Pileus cf - 3
poll, latus. Stipes 4-5 *poll. Longis, 1 poll,*
crassus. Odor, ingratus,

98- *A. grains, folitaxius. subvilcidus, cinere-*
alutaceus, pileo subcarneo explanato mech
depresso; lamellis carne pilei 1 pi. latioribus
acute adnatis subdecurrentibus; stipite sub-
elongato utrinque incrassato subflexuoso, intus
fuperne cavo.

In *graminosis subhumidis (Söndennarkeri).* De-
cembr.

Caro unicolor. Pileus Job \ *poll, latus.*
Stipes Jub 5 *poll, longus & ii-4 tin, crassus.*
Odor anifatus, gratus.

99. *A. unicolor\ folitarius, llavo - alutaceus, pileo*
bemisphaerico, convexo obsolete striato, car-
nofo; lamellis carne pilei sub 4 pi. latiori-
bus postice finuatis decurrentibus; stipite sub-
elongato cylindrico subflexuoso, inferne cur-
vo, pileoque cavo.

** *pitieto ved Birkeröd. Autumno.*

Caro concolor. Pileus a *poll, latus. Stipes*
3f poll, longus, 3 tin, crassus,

10- *A. clavatus, folitarius, pileo submembra-*
aceo primo hemisphaerico dein explanato
i^humbonato laevi obscure alutaceo; lamellis

came pilei sub 4 pi. latioribus, ovatis libris albis; stipite longo nigro-fusco, inferne clavato umbrino.

Inter folia d^hesta faginea (*Bhkeröd*). Autumn
*Caro albida. Pileus ii latus. Stipes sub
 poll, longus, Juperne ½ lin. & inferne 4 lin
 crassus.*

1701- *A. ventricosus*, gregarius, subfolitarius, pileo subcarnoso stipe juniore glandiformi dein explanato convexifusco umbrino, dein v. taceo l^{vij} lamellis carne sub 4 pi. latioribus ellipticis attingentibus pallide umbrinis stipite subbreve alutaceo inferne ventricoradice lobulata concolori apice alba comp. perpendiculariter terrain intranti. Bull* 411. fig. 1.

In terra fimicaria. Jun. Tul.

*Caro albedo-umbrina. Pileus sub ½ poll. i
 tus. Stipes ad ventrem ½ poll, radix ultra
 1 poll longus.*

1702. *A. Xylophilus*, folitarius, subgregarius, pileo subcarnoso primo hemisphaerico dein explanato convexifusco ochraceo * alutaceo inferne obsolete striato, subcrenulato, subcurvato; lamellis carne pilei 3 pi. latioribus postice finuatis subdecurrentibus dilute umbrinis; stipite subbreve cylindrico striato Jeo concolore basi tomento albo cincto. Bull* 6. 5^o. fig. i.

In trunco caelo fagi & fructulis ligneis ad terram dejectis. Novemb.

Caro alba. Pileus 3 poll, latus. Stipes ultra 2 poll, longus 3-4 lin. crassus,

703. *A. obscurus*, Tolitarius, pileo membranaceo piano fstellatim Itriato dilute ochraceo margine crenulato obscuriori; lamellis latitTmis ovatis laxis fubadnexis umbrino - cinnaroxneis; ftipite fubl^reve fubbulbofo albidu7 apicem versus fubventricofo umbrino.

In humidis fylvarum. OAobr.

Caro alba. Pileus tj latus. Stipes 2 poll longus i| lin. crassus.

704. *A. muscorum*, foitarius, pileo membranaceo conico - campanuiato, fufco, umbrino Ttriato; lamellis carne pilei latioribus poftice anguftioiubus arcuatim adnato-decurrentibus, cinereo-albidis; ftipite furfum attenuato incurvo, fibrofo fuperne albedo, inferne fufco.

Inter mulcos. OAobr.

Caro pilei albida, fnpitis fufca. Pileus 6f-Q lin. latus & equidern altus Stipes i£ poll, longus inferne Juh 3 lin. craiffus.

705- *A. conoideus*, foitarius, pileo fubcarnofo conico-campanuiato cinereo - fubochraceo fufco ftriato; Imellis carne fub 9 pi latioribus ovatis liberis dilute rofaceis; ftipite fubelongato, craffo, deorfum fubincraffdto7 laeve PUeo dilutiore; cavo amplo.

In ericetis. Septembr.

Caro alba. Pileus i poll. & ultra lotus, sub
1 poll, altus Stipes 3 poll. longus, 4J - 6 lin.*
crassus.

1706. *A. collinuSy* folitarius, gregariusque, pileo
 membranaceo-carnofo primo conico deinde
 campanulato demura explanato subreflexo um-
 bonato pallefcente - fufco, ftriato; lamellis ()
 lie pilei 2 pi, latioribus postke rotundatis
 beris albis; ftipite elongato colore pilei, in-
 feme ^ubbulbofw albido pilofo. *An Ag. at un-*
dinaceus. Bull 5. 405 fig. a. ?

In graminofis. Autumno.

Caro alba Pileus 11 - 2 poll. latu\$, Stipes
4 poll, longus, 3-4 I'm. crassus.

- 170^ . *A. fufcus*, folitarius, pileo subcarofo pri-
 mo campanulato demum explanato convexiufcu*
 vortice umbrino margineni versus fufco, sub
 ftriato; lamellis carno pilei 5 pi. latioribus
 postice lato adnatis subangulatis; ftipite sub
 longo cylindrico bafi curvato albido feri-
 ceo
 cavo amplo.

In fructulis de je (5) ligni putridi. Jul.

Caro pilei umbrino alhida, ftipitis alba,
leus 2 poll, latus. Stipes fuh 3 poll, long¹¹
3 lin. crassus.

5708. *A. Alnttiy* folitaiius, subgregatius, pileo W
 membranaceo campanulato-conico obtuto
 didf alutaceo margine subftriato crenu^{1^}
 paliidori; lamellw carne 2-3 pi. latioribus
 leaxibus postice angustioribus distantibus

bis; ftipite fublongo craffiufculo fubbulbofo, albido - fericeo, ftriatulo, cavo amplo.

In humidis Aineti (*Bagvoerd*). Septemb.

Caro alba. Pileus ƒ poll lotus & haud ultra alius. Stipes 3 poll longus₃ fupernp ƒ lin. in feme 5 craffus.

***• *Color pilei umbrinus, cinnamomeus, vel badius.*

1709. *A. pundlulatus*, lolitarius, gregariusque, pileo fubcarnofo, primo heiufphjBrico, demum explfinato dilute umbrino punrtis obfeurioribu.?. lamellis came pilei multo latioribus antice ansuftis poftice rotundatis fubliferis cinnamomeis; ftipite fubbreve fubflexufo fubbulbulb pileo concolore.

In mufcofis humidis pineti (*Birkervd*), Septembr.

Caro alhida-umbrina. Pileus \ poll. & ultra latus. Stipes fub 2 poll longus, a - 5 lin, craffus.

1710. *A. umbrinus*, folitarius, obfeure umbrinui, pileo fubmembranaceo, explanato, concavo, obfolcte ftriato fubvifcido; lamellis came pilei fub 5 pi. latioribus fublinearibus late adiiatls dilutioribus; ftipite breviufculo deursum °lavato bulbofo, carnofo.

In gramiuofis vicinitate Salicis vetuftae. No-
vembr.

*Caro albida-Umhrina Pi Jens fuh i poll la-
tus. Stipes 2 poll, longus, apice if tin. ibasi
-> poll crajjus.*

1711. [^]. *pilojus*, iolitarius, pileo fubcarnofo, co-
nico, obtufo, laevi, urabrino cinnamomeo;
lamellis carne 2 pi. latioribus concoloribu*
fttbelpticis attingentibus; ftipite elongato,
liforme[^] fubraduiato fnfco, fibrofo, *superne*
glabro, inferne pilis l<-ngis fufcis obfctis.

later ioJia putrida in iylvis. Autumno.

*Caro pilei alba, Jlipiis fufca, Pileus Jut
ultra 1 poll, latus & alt us. Stipes 5[^] p o&
loiigus, 1 lin. crajjus.*

1712. *A. foraminulojus*, folitarius, pileo fubcarrio*
fo, conico- campanutato ohtufo Izivi umbrinot
lamellis carne 2 pi. latioribus fublinearibus
fuhattinojeutibus dilute rofeo - cinnamomeisj
flipite 1< ngo tcnue deorfum fubincraffato di-
lute umbrino, fibrofo inferne albido - tomeri'
tofo. Bull. 5. 405. fig. B. C.

la faginetis ad terram. SeptemK

*Caro alba. Pilots J poll latus & -J poll, at'
tus. Stipes 4[^] poll, longus, i£ lin. crajjus.*

1713. *A. mclinoides*, iolitarius, grpgariusque, *pileo*
carnofo - merabranaceo, fubhemifphserico *la- 17*
viufcule umbonato albido-umbrino ftriis ob'
fcursoribus; lamellis latiffimis fubtriquetris*
liberis, dilute cinnamomeis; ftipite elongate
c\ lindrico fibrofo pileo concolore. Bull. 6.
560. fig. »- an id. c. Pers. Synopf, 387?

In turfosis ericetosis. Octobr.

Caro alba. Pileus ¹ *poll. latus, f. poll, ah tus. Siipes* 5[^] *poll, & ultra long, i[^]--[^] I'm. craffus.*

1714. *A. brunneus*, folitarius, umbvinus, pileo hemi fphterico, **fubumbonato**, obfulete ftriato, vifcido; lamellis latiffimis, repandis, late adnatis fubdecurrentibus; ftipite fublongo fubbulbofo bulbo : fubni[^]refct nte.

In paludibus turfosis. Septembjr. Octofiv.

Caro concolor. Pileus [^]-1 *poll, latus. Stiipes* *ultra* 2^v *l?«ll. lorigus, j| in medio & huh bus* 4[^] *I'm. craffus,*

1715. *A. Hypnorum*, folitarius, fubgregarius, luteo-umbvinus, pileo membranaceo-carnofo prinio hemifphoerico, derno convexo, margine fulcato crenulato; lamellis carne latioribus adnatis; ftipite fublongo tenue deorfum fubincrassato.

Inter mufcos in humidis & paludosis locis. w£ftate.

Caro paulo dilutior. Pileus *hand* *ultra* | *poll latus. Sti]u:s* *af* *poll. & ultra longus, Juh* 1 *lin, craffus.*

1716. *A. radicans*, folitarius, pileo fubcarnofo, primo hexnifphtRico, deinde explanato, rugofo, vifcofo flavo vel fufco-umbrino, umbone fubdepreffa; lamellis latis, laxis, fubrepandis, latere plicato- vcriofis, poftice finuat^{is}, lin«atim Aecurrentibus candidis: ftipite

longifTimo, ubi terram intrat ventricoso, cui
radice longiffirma fufiformi toitiK, fibroso, ci-
nereo - fufco, fuperne albido.

In fyJvis ad terram vicinitate arborum caefm
haud infrequens **3uL** Aug. Septembr.

Caro alba. Pileus 3-4-5 poll, latus. Sti-
*pes 8-1 a poll. & ultra cum radice longus, *
β. liber, la nu-U is portjce rotu datis libeiis, ftipite
pileo concotore glabro.

Ag longipes Bull. 6-515 quoad Jiguram bent
quadrat, Jed Jtipes Jolidus dcUieatus,

1717 *K A. dentatu\$* folitarius, pileo carnofo-meni'
branaceo pn'mo hemifphaeiico deinde exp'snato
dilute fervugineo- umbrino, margine dtntato pal-
lidiore; lam>.*llis laiis fubtriquerris poftice finua-
tis adnato-i'ubdcurrentibus rofaceis demum cin-
nam meis; ftipite lublongo deorfum increafTarol
fubbulbofo **tortiii**, fibroso, fuperne rofaceo»um-
brino pulvtiato, inferne coiore pilei, bulb"
flbido.

In mutcosis humidis pincti circa *Birkeröd.* **No-**
vembr,

Caro rojea. Pileus ftatu hemifph&rico sub
s poll, explanato Jub af poll, latus. Stipe^s
*5-4 poll, iongus, 3 * 45 lin. craffus,*

1718- *A, tortilis*, folitarius, pileo fubmembranace^o
explanato, convexiufculo, fubumbonato, um-
brino, (Iriato, margine dilutiore; lamellis *latis*
ovatis fubattinentibus dilute rofaceis; *ftipite*

fublongo deorfum increflato flexuofa tortile zU
bido rofaceo.

In mufcosis humidis phieti *Birkeröd*, Autumno.
Caro albida. Pileus 1 poll, lotus. Stipes 3,
4 poll longus, Juperne i\ lin. inferne 3-4^
tin. crajfus.

1719, *A. atropes*, folitavius, pileo carnofo, expla-
nato depreffo, vifcido, ferrugineo-umbrino, mor-
gine repando, fubplicatulo; lamellis carne pilei
fub 4 pi. latioribus, laxis, poftice rotundatis,
iubadnotis, dilutioribus; ftipite breve, erasius-
culo iübbulbofo nigro fuligineo.

In vicinitate Salicis vetuftg ad terrain* Novemb,
Caro dilute cinnamomea. Pileus i\ latus.
Stipes 1} poll longus, Juperne 4J lin. inferne
i poll, crajfus.

1720. *A. co?npadius*, folitarius, pileo carnofo primo
glandifonni dein hemifphsrico deinum expla-
nato convexo umbonato vifcido obfeure badio;
lamellis carne pilei 4 pi. lorioribus adnatis ba-
dio - purpureis dein cinnamomeis; ftipite elou-
gato deorfum fubattenuato villoflufculo fericeo
primo badio apice flavo deinde albido fufce-
fcente apice alho inferne folido carnofo - fibro*
fo, fuperne cavo.

Inter mufcos pineti (*Jirkeröd*). O&obr. No-
vemb;

Caro albido - badia, ftipitis fubrofea. Pileus
2-2f poll latus. Stipes 5 poll longus, 35
lin. crajfus.

172 r, *A. albipes*, folitanus, pileo primo hemispherico deuium explanato, depreflb, membranoso, incarnato, medio ftriili irrorftis badiis, margine fuligineo bndio; lamellis latisfnnis, repandis, 4 plic. fcric, pod ice ro'Undatis liberis; ftipite utvinque increaftato, fubbulbofo, fuligineo-atro in feme a! bo.

Ad rerram in faginetjs (*Bagjvccrd*). Septemb,
Caro albida. Pileus 1J poll latus. Stipes
Juh 2 poll, longus, 2 lin. crajfus.

****••*** *Color pilei fiavefcens vel ferntgineus,*

1722. *A. diaphanus*, folitarius gregariusque, pileo caniofo-membranaceo, primo hemifplisrico, de-
nium campanularo, ficco, dilute flavefcanti die-
pbano. margine fubftriato; lamellis enrne *hau*
lterioribus linearibus, liberis ftipiteque breuius-
culo fubbulbofo fuperne pallidis, inferne *to?*
mento albo cinclo.

Inter folia de>efla Pini Abietis. O«Sobr.

*Caro pallide - fiavefcens. Pileus J poll latus**
Stipes i& poll, longus, 1^5 lin. crajfus.

1723 *A. ftercorarius*, folirarius, gregariusque; pi-
leo fubcarnofo, bemifpbsprico, glutinofo, demuiH
explanato, Isviufcule urnbonato, flavefcante mar-
gine pallidiori; lamella latisfimis, fubtriquet-
tris, liberis, fufco-nigrefcente nebulosis, **albido**
marginatis; ftipite elongato, cylindrico, **palli-**
do, villofiufculo, fibrofo, fuperne **atro-punc-**
tulato i cavo_ amDlo.

In stercore bubulin. i, in p»atis fylvaticis. JEstart
Autumno,

*Caro pilei alba ftipitis flavescens. Films j-i
poll, latas. Stipes 2[^]-4- poll, longus, i| lin_m
crassus.*

&cfeditis annuli, ftipes cavns, totus cyUndri-
cus discrimina Junt notabiiiora quoin dijjert
ab A. Jemiglobato.

1724. *A dryophilus, foliorius, fubgregforius, pileo
carnob primo hemifphcrico demuii explenoro
depreffb, ferrngineo vtl .alutact-o - flavescenc;
lamellis carne p-lei baud "latioribus **rediJmeis**,
poftice fubi'otundstis, iubnt-tingenribus, dilure
^u-ugincis; ftipirc iubbrevis cyiindrico adcen-
dente colore pilei inferne by fib albicio veftito,
cavo amplo fufco ferrugiuo. Bull. 5. 434.
An idem cum Ag. diyophylo Peis, 'Synopil
pag. 452?*

Inter fohe dejefta ftiginea. Autumno.

*Caro alba. Pileus a-l poll, longus. Stipes a-
2¹/₂ poll, longus, 3 lin. crassus.*

1725. *A. foenicu acezts, foli'aiius, gregniius, pileo
c&vnoto-memb aracto, pr ino ca-npa'i^la'o, deirde
expla nato» fubiefiexo . obruie unsbonaro, mar-
gine ftria^o fulcato fubcrenulato, frrdide fl/ive*
*cente; lamellis carne pilei 2 pi IauoiiW,
P°ftice anguftaris arcuan'm atlnatis fubdecuvren-
*bus pallids marline croceo-auran'iacis; fljn're
longo uuinque fubincrassato Tupeme albido-pal-*

hfcente glabro, inferne fufco umbrino pilis lon-
gis ftrigOJ's auantiacis cinfto.

Inter folia dejefta Pini Abietis in umbrosis. N°1
vembr,

*Caro alba, Pileus J-1 poll, latus. Stipes
poll. longuSy X-1« lin. craffus. Odor foenitf
li, gratus.*

1726. *A. congener*, folitarms, gregariusque, pileo
membranaceo campanulato, ftriato, flavo > vertice
fubumbrino; lanicillis came **pile]** baud latiorib
lineavibui crasfiusculis fubattinentibus cinereo
virefcntibus margine crasfiore luteo; ftipite
breviufculo fnperne fufco umbrino glabro i
feme fubincratiato flavefcenti toraento flavo-fer
rugineo cinfto.

In foliis dejeftis Pini Abietis 1 in umbrosis, J^{ul}
Aug. Septcmb*

*Caro flavefzens. Pileus f-1 poll latus. Stip
pes 1J poll, longus %• i\ lin. craffus. O
foenicull*

1717* *A. rufocephalus*, folitarus, vifcidus, diapha
nus, pileo carnofo - membranaceo, campanu^
pauido-flavelcenti, vetticc **dilute** rufo, margina
ftriato crenulato dentato; lameUis came haud
latioribus linearibus arcuatim adnatis, albis
ftipite longo fubBliformi glabro fuperne
fcnte inferne albido, cavo obfoleto.

In mucofis ericctosis Pineti (*Birkeröd*). Septemb

Caro pallescens. Pileus sub 1 poll, latus & £ altus. Stipes }£ poll, longus, if lin. crassus.

1728. *A ferrugineus, gregarius, circinnatus, pileo subcarneo primo subinfundibuliformi demum explanato concavo luteo ferrugineo subvifcido ttiargine repando flexuoso; lamellis carne pilei a p]. v. 3. pi. latioribus figmoideis decurrentibus alutaceis; stipite primo clavato, astate fasciformi, subcarneo, intusque unacum carne pilei fusco umbrino; cavo amplo usque ad epidermidem pilci.*

Inter folia dejedld Pini Abietis. Octobr. No-
vembr.

*Pileus a -4 pollic. latus. Stipes 2*4 poll. Longus 7 Juperne £ pql. apice if lin. crassus.*

1729. *A, pjittacinus, folitarius gregariusque, viscosus, flavus, piko submembranaceo prinio campanulato virefcente, dein piano umborte obtuso viridefcente, margine subreflexo fulvo ftriato; lamellis latiffimis crassis margine luteo aureis, distantibus, postice viridefcentibus Bnuatis late adnatis, decurrentibus; stipite subbrevis subcylindrico, subflexuoso, apice viride. Schaeff. Fung. 101. Bull. 6. 545. 1.*

In graminosis, in pralis (i Ei melunclfkov). Octobr. Novemb.

Caro alba Pileus 1 poll, latus. Stipes 1 1/2 poll, longus; 3-4 lin, crassus.*

••• *Color pilei aurantiacus, vel coccineus-*
 .1730 *d. coccineus, subgregarius, subviscidus, pileo*
carnoso - membranaceo primo hemisphaerico
convexo, lateri coccineo, deinde explanato
subumbonato expallenscenti margine
foleto striato; lamellis latis subdistantibus
curvatis, dentatim subconnatis, postice sinuatis
subdecurrentibus aurantiaco JTcarlatinis aetate
pallidis margine coccineis; stipite subbrevis
**lorsum attenuato superne coccineo inferne*
flavo, cavo amplo. Bull. 570 fig. 2.

In graminosis in pratis. Septembr. Octobr.

Caro flava. Pileus 1 1/2 poll, latus. Stipes 1 1/2

• *I[^] P^oM- longus superne sub 3 lin. crassus.*

p. major, pileo explanato ficco flavo ferrugineo
umbone obtuso coccineo, margine dilute co
cineo - striato sulcato; lamellis Jatiffimis ctf
is laxis flavis margine coccineis repandis
stipite sinuatis decurrentibus; stipite subl[^]
craiso cylindrico totili fibroso, cavo an¹
Caro hujus varietatis vel subspeciei alba.
leis 3 poll, latus. Stipes ultra 4 poll. lon*
gus, ultra 1/2 poll, crassus.

1731 » *^ . conicus, folitarius, viscidus, pileo*
*carnoso conico campanulato, aurantiaco **
viridi nigrescenti, margine plus minus
lo; lamellis caene multo latioribus

angullatis attingentibus, primo flavescens demum cinereis subnebulosis; Aipite sublongo cylindrico apice subattenuato striato fibrofo-carnofo flavo - virescente, state ball fuso nigrescente. Schaeff. Fung. 1 fig. 2«

In pratis graminosis. Autumno.

Caro pilei flava, stipitis albida. Pileus 1-3 25 poll, latus, Jub 1/2 altus. Stipes 3-4 poll fungus. 4^ lin. crassus.

1732. *A. aurantiaco - crocatus*, pileo carnofo, viscido primo conico hemisphaerico, demum explanato, integro, aurantiaco - crocato vertice crocato flavescente; lamellis latissimis crassis postice rotundatis liberis dilute coccineis; stipite sublongo crasso, crocato - aurantiaco basi flavo, subflexuoso interdum medio fuso. Bull. 3. 202.

In pratis graminosis. Autumno.

Caro pilei & stipitis crocea, cavum pallidum flavum. Pileus 1-2-3 poll latus. Stipes 2-3 P¹¹ fungus, Jub 1 poll crassus.

minor, pileo acute conico demum explanato umbonato fuso; lamellis flavis; stipite furfum attenuato, superne aurantiaco fusco, inferne flavo viride. Schaeff. Fung. 4. Tab. 302.

***** *Cotorm pilei, ruber, rufaceus vel purpureus,*

1733. *A. rufaceus*, folitarius subaggregatus, rufaceus. > 2>ileo membranaceo primo hemisphaer-

xico demum explanato umbonato vcl planiusculo, rufo-rubro ftriato, margine crenulatoj lamellis latioribus poftice fubfinuatis adnato-decurrentibus; ftipite fublosgo tenue fibrofo; fubbulbolb.

In ericetis. Octobr.

Caro concolor. Pileus | poll hand ultra U^s tus. Stipes ultra i| poll. lo?igus> 1J lin. Jub craffus,*

1754. *A. rofeuSy* folitarius, gregariusque, ~~pileo~~ membranaceo primo hemifphaerico ~~deinde~~ explanato obfolete ftriato incarnato - rofeo J lamellis latioribus 2 plic ferie, poftice Tub' finuatis decurrentibus; ftipite breviufculo, & nue fibrofo fragili fuperne albido infers⁰ fufo.

Inter folia dejedta Pini Abietis. Novemb.

Caro alba. Pileus Juh -J poll latus. Stipt. 1 poll, hauid ultra longius, J lin. craffus.*

1735, *A* purus*, folitarius rofeo - lilacinus pileo fu[^] carnofo campanulato demum fubexplan^{^0} margine ftriato; lamellis latiffimis laxis fubr^r repandis poftice fubdnuatis fubadnato - ~~decur~~ jentibus*, ftipite clavato, longo, fibrofo, ~~cav~~ ampliffimo, tubo membranaceo vermifor[^] flexuofa usque ad apicem repleto. Bull* '1 507. fub Agar. rofeo quoad figuram.

In faffinetis ad terram. Autumno.

Caro concolor, Pileus 2-5 poll latus, 2 pol. fub altus. Stipes fub 4[^]- poll, longus, apicc 4[^] lin, basi X poll crajjus,

1736. A > *lilaoinus*, folitarius dilute lilacintis, pileo carnofo membranaceo fubhemifphaerico urn* bonato margine ftriato; larnellis latis poftice rotundatis liberis; ftipite breviufculo lubclavato ftriato, cavo fimplici.

In fag'netis ad terram. Odlobr.

Caro concolor. Pileus 1 poll, haud ultra latus, 1 & ultra altus. Stipes 2, poll. & a lin, longiis, apice 3 I'm. ban 4} lin. crajjus,

1737* ^* *purpurafcns*, folitarius, fordide purpureus, pileo campanulato, fubexplanato, fubnmbonato, Ia;vi, fubcarnofo; laxnellis ci.rne s pi, latioribus fubrebandis poftice fubfinuatij adnato decurrentibus; ftipite longo, cylindrico, fibrofo, tortilf?.

Infrequens a4 terram in fagineto circa *Birkeröd.* OAob.

Caro concolor. Pileus \ poll, latus, fub 1 poll, altus. Stipes fub 4 poll, longus, \~z lin. craffus.

1738. A. *crenulatus*, folitarius, fubvifcidus, badiopurpurafcens, pileo carnofo, fubdiaphano, liemirpbeerico campanulato, umbonato, margine ftriato - fulcato crenato; lamellis latiUimis, triquetris, adnatis, angulo obtufo libellis, fubtililTime crenulatis dilutioxibus; ftipite

acuto fubflexuoso. *Batjch. Blench, fang** *Cont.*
**da. Tab. \$8 fig. 109 quoad figuram.*

In mufcosis pineti (ved Birkerod}. O&ob.

Caro dilute purpurascens. Pileus 1 - 1\ - •
 $\frac{1}{2}$. *ZafMJ, 1-tv lwZZ. altus. Stipes 5-4 po&*
longius, 3-4 ^"n. crassus.

(1759. ^4. *variegatus, folitarius, flavo-rubro-p^{ur},*
pureo maculatus pun&atusque, pileo herni'
fphaerico demum magis explanato convex^o
fubumbonato, carnofo; lamellis carne pil^{el}
*paulo ktiuribus figmoideis utrinque acutis ad**
natis flavis; ftipite Tublongo furfum fubattc
nuato flexuoso apice albido, inferne vero ^{c0,}
lore pilei ftriato pun(5tato, fubcavo. An Ag.
, rutilans Pers. Synopf. pag. 520 ? fig autem*
Schceff. fung. 5, Tab, 318 minime noftro q^{u{t,}
drat.

In pinetis baud frequens. OAob.

Caro alba, Pileus if-5^ poll, latus. Stif^e
3 poll. & ultra torigus, fuperne ~ poll' ⁱⁿ⁻
feme ~ $\frac{1}{2}$ poll, crassus,

•*•••* *Color pilei violaceus, coentleus v&*
lividus.

1740. *A. i-npolitus\ folitarius, fubgregarius, V^{l-}*
mox explanato fuburabilicato fubcarnoro ^{tu m-}
caefio - violaceo fubochraceo, margine invo^{tu}
rependo iubcrenato fquamulis albidis ob^u
to; lamellis diftantibus carne pilei 3 pl. la^u

veraceis; ftipite longo furfum fubdilatato flexu-
 ofo, fibrofo, fufco ilriato, velamento violaceo-
 caefio veftito, cavo amplo usque ad centrúm
 pilei. *Bull.* 5. 570. *Jig*_o 1. *M*_o *An diverfa*
ah A. polilo Pers. Synopf. pag. 465 ?

In locis huinidis fylvarum. Autumno.

Caro concolor, Pileus ultra 2 poll, lotus.
Stipes 3J poll. longuSy fuperne 5-6 Un. in-
feme 5.4 lin, craJJ'us

¹⁷⁴« *A. quadrifarius, folitarius, pileo fubcarnofo*
explanato fubumbilicato dilute ochraceo-vio-
laceo, margine violaceo ftriato lamellis carne
3 pi. latioribus poftice rotundatis fu^liberis,
4 plic. feriatís, violaceis; ftipite longo cylin-
drico colore pilei, fubcortinato, fibrofo.

In humidis fylvarum. Autumno.

Caro pilei cinereo - violacea, ftipitis fufca.
Pileus 1 \ poll \ atus. Stipes 3I poll, longus,
2 Hn. crajfus.

^{x7i2}. *A. dilutus*₇ *folitatus; pileo carnofo, primo*
hemifphaerico demum explanato umbonato
violaceo margine fubftriato; lamellis latiffi-
mis laxis, poftice rotundatis fubarquatim at-
tingentibus dilute violaceis; ftipite brevi, cl»-
vato, fub apice dilátato anguftiflimo obfeure
vitateo fibrofo, cavo utrinque amptiori.

In fylvis haud frequens in humidis locis. Oc-
 tobr, Noveinbr.

Caro pilei dilute violacea, fiipitis fujco vio lacca, Pileus 1 poll, latus. Stipes Jub i§*

- *longus, loco angitfto ij lin. basi 4J lin. craffus**
1743. *A. globofus, folitarius, pileo carnofo hemi-
fphserico conico umbonato leevi fufco-viola-
teo; lamellis carne fublterioribus poftice fub-
rotunclatis fubattin gent i bus violaceis; ftipite
fubtongo deorfum fubincralTato coeruleo, bail
xadiciformi teimi albo Lncurvo.*

Inter folia dejecta f[^]ginea {Bagjv&rd). Octob.
*Caro violacea. Pileus haud ultra f poll l&~
tus & altus. Stipes Jub 2 poll. Io7igus, Jtf>"
perne i£ lin. injerne 5 lin. craffus,*

- 1744, *A. cczruleus, friitarius, fubgregarius, pile*
membranaceo primo convexo dein explanato
umbilicato demum fubreflexo concavo nigre-
fcente - ceerulco fubfericeo; lamellis latis po-
ftice rotundatis fubadnatis, margine fubcre-
nulatis, cinereo - ca?ruleis; ftipite fublong*⁷
deorfum increaffato, fubcomplauato, utriusq[^]
fulcato, fuperne colore pilei inferne albi<*^o
viliofo, fibrofo, cavo fuboblitterato.*

In pratis fylvaticis (Bagfvcerd). Septembr.

Caro alba. Pileus l-1 poll, latus. Stipes i
poll, longus, 1 * - 5 - 4 lin. craffus.*

- J745.** *A. fufcipes, fubgregarius, pileo fubcarn^{01o}
primo cylindrico-cbnico dein campanula^{t0}|
vertice obtufo, firiato, livido-coerulefcen*¹,
lamellis latis poftice anguftatis liberis s[^]is;
ftipite loago cvlindrico caerulefcente albido*

fericeo ftriato, infer ne tomento denfo nigrefcente fufco veftito.

Ad radices putridos arborum. Aug. Septemb.

Caro alba, Pileus if poll, latus & altus. Stipes 4J poll longus, 2 lin. craffus,

1746, A. *Phiala*, fubgregarius, minutus pileo membranaceo campanulato umbilicato ftriato, fufconigvelcenti, margine diluti©ri₇ vertice fubluceni; lamellis latis fubagqualibus diftantibus craffiufculis triquetris toto adnatis pallidis; ftipite lublongo, filiformi, fuperne phialaeformi dilatato, fufco - umbrino, caro gelatin* pallida repleto.

In trunco putrido fagi. Auguft.

Caro pallida. Pileus vix tj-a lin. latus & altus. Stipes 6 lin. longus, ^-J lin. craffus,

*747- A. *iafundibuliformis*[^] folitarius, fubvifcidus, livido - cinereus, pileo fubcarnofo, primo infundibuliformi limbs patulo demum cyathiformi, margine fubinvoluta fubtiliUima ftriatoj lamellis caro pilei 1 pi. latioribus linearibus decurrentibus; ftipite deorfum fubattenuato, fibrofo- carnofo, fubeavo. Bull. 6. 575 K. L.

In pinetis intra folia dejcfta. O&ob.

Caro concolor_t, Pileus prune hand ultra % poll, deinde ii poll, latus. Stipes fub 3 poll, longus_y 3[^] lin. fuperne latus.

***** *Color pilei viridis vel viridefcens.*

leo carnofo primo hemifphserico, umbonato demum explanato cavo ceruginofa setate centro umbrino; lamellis latis laxis fubrepandis, poftice fubrotundatis fubadnatis purpureis; ftipite longo **fabcylindrico** carnofo fibrofo carneo, cavo amplo.

In pinetis rarius occurrit. Septemb. Octob,
Caro tarn pilei quant ftipitis in duabus partibus divija: extcrna alba, interna coined, Pileus 2-4 poll, latus. Stipes Jiib 4 poll, loftgus, 5, - 7 J tin. crajfus.

1749. *A. aerugineus*, folitarius, pileo fubcarnosus_f explanatus, convexiufculus caeruleo-aeruginofus; lamellis carne pilei fub latioribus utrinque acutis fubadnatis albis; Itipite fubbreve[©] inferne arcuato fubbulbofo, albo, bafi tomento fufco, cavo aniplo tam ftipitis quam pilei.

Inter folia dejecta faginea. Autumno.

Caro alba. Pileus a poll laius. Stipes fubaipoll. longuSj fuperne 3 litu basi \ poll. crajfus.

1750. *A. marginatus*, folitarius, gregariusque, pileo carnofo primo campanulato, demum explanato umbonato levi dilute fufco-olivaceo* lamellis carne fublterioribus ellipticis liberi* viridefcenti-albidis margine aurantiacis; ft¹ipite breviufculo deorfum increffato fubveH¹tricofo, radtento₇ albido, inferne pilis umbrinis frigosis.

*Caro alba. Pileus ultra 1 poll. Jatut, Sti-
pes 11 poll, longus, 3 - 4 fi». ^{cra} Jf^{us} **

1751 - *A funiculofus, Iblitarius, pileo membrana
ceo, campanulato umbonato albido - virelcenti
umbrino-ftriato mavgine crenulato; lamellis
lineari ellipticis utrinque acutis liberis viri-
defcentibus; Itipite longo deorfum fubincras-
fato flexuofa fibrofo, fufco viridefcente fibrofo
fericeo.*

*In foliis dejecStis Pini Abietis infrequens. Sep-
tembr.*

*Caro Jubalbida. Pileus fub 1 poll, latus.
Stipes 3 poll longus, J-1 tin. craffus.*

175^a > *A, cellulofus, folitarius, major, pileo car-
nofo, primo glandiformi, dein convexo pia-
no, demutn eyplnnato cinereo fubolivaceo
margine dilution fubftriato; lamellis cam©
lterioribus fubfigmoideis: brevioribus finuato-
truncatis longioribus acutis adnatis pallefcen-
tibus; ftipite craffo fublongo lubbulbofo car-
nofo - fibrofo albido cinereo, fuperne compatto
inferne cavo amplo fubcellulofo.*

*In umbrosis pineti cix*ca Birkerbd. Octob.*

*Caro alba. Pileus junior 1 - a^ poll adultior
51 poll latus. Stipes adultioris fiatu 5 poll.
£? ultra longus, fuperne fub 1 poll. Inferne
ultra 1 poll, craffus.*

• *cavo (cefpitofa).*

fcidus, pileo carnofo, primo fubconice, dein convexo umbonato, tuberculofo, nurgine inaequali repando; lamellis carne pilei fublatioidibus, figmoideis, decurrentibus; ftipitibus pluribus, longis, craffis cylindricis e tubere xmagno craffo carnofo radicofo orientibus, hinc inde flexuofis furfum fubattenuatis, carnofo-fibrosis, cavo amplo.

Ad foſſam fylvæ (*Ga'ljJcov*) rariffimum liune fungum inveni. Auguſt

*Caro alba. Pileo 2f-3j poll. \at> Stipites 3-4-5 P⁰^' t^{on}g> i^{ll} P^oH' & "b-^{cra} Jf**

5754. *A. nigripeS*) cepitofus, minor, albus, pileo mcmnnflceo, convexo. umbilicaro profunde fill* coto; lamellis (implicibus tubo ftipitem am* bienti adnexis; ftipire filiformi, (implici, rarius ramosi, nigrefcente. Flor. Don. Tab. 1x34 fig. I.

In fagnetis 6c pinetis in foliis ramulisque dejectis. Fere per totum annum.

1755. *A. hydrogrammuSy* cepitofus, folitoriusque, albo-pallefcens, pileo carnofo convexo lsviuf* cule umbonato, demum explanato fubdepreſſo lzvi; lamellis carne fubzqualibus figmoideis adnato-fubdecurrentibus pallidis, 4 plic. ferie; ftipite fublongo cra^fiufculo plerumque curvato* interdum fubbulboſo Bull. 6. 564. A.?

Inter folia decidua faginea (*vcd Rudergaard*)* Oaobr.

Caro pallida. Pileus 2 - 3 poll iatis & Jti, pes totidem hmgus, 4J tin, £? ultra craffus.

1756. A. *quercinus*, fubcefpitofus, cinereo-albidus, pileo carnofo - membranaceo₅ conico-campanulato, veitice deprefTo₇ ftriato; lamellis laris, laxisj ellipticis, liberis, dilute rofaceis, latcre venofo - ftriatts; ftipite fublongo, cvasliusculo» Istvi, fibrofo, iubbulboib, cavo in eo ipfo ver* tice pilei*

Ad palos quercinns» Oftob»

Caro alba^nedlo ftipitis jujca. Pileus ultra a poll, longus, &¹ haucl 2 p'oll. altus. Stipes 3 poll, longjus Juperne 3 tin. inferne f poll, craffus.

- 1757, A. *fiffus*, fubcefpitofus, pHeo carnofo - membranaceo, piimo glotidiformi, lavi, albido-circ~~reo~~, dein campanulnto, Venice umbrino ftriato, margine incifo flLiis clitutoribus, demum explanato fere usque ad verticem partito; lamellis¹ latis ovatis, poftice finuatis, adnatis, decurrentibus, cinereo- albidis; ftipite fublongo, fubcylindrico fibrofo» apice dilatato fubincurvo albido inferne umbrino.

In trunco Salicis vetufls, Novemb.

Caro albida. Pileus a poll latus | poll, altus. Stipes 2 - 2^ pol. longus, fere 5 Un. craffus.

- ¹75Q. A. *incarnatus*, eefpitofus, albido- incarnotuj, pileo fubcarnofo explanato convexiufculo, marginein verl'us ftriato - fulcato; lamellis carne pi-

lei latioribus, postice fabaneustatis liberis; stipitibus longis cylindricis utrinque subdilatis fibrosis.

In trabibus femiputridis quercinis. Septembri
Caro concolor. Pileus ultra 1 poll. latus
*Stipes 2.-1 poll. longus, sub 1*₂ lin. crassus.*

1759. *A. tenellus*, cepitofus, cinereo incarnatusi pileo carnofo membranaceo, hemisphaerico, vertice depressifuculo, margine subftriato, ~~cren-~~ulato; lamellis carne pilei 3 ph latioribus figmoideis late adnatis albido roseis; ~~stipitibus~~ longis tenuissimis utrinque subdilatis ~~carnosis~~ fibrosis, basi conglutinaris.

In trynco cavo Salicis yetufts% Novemb.
Caro alba. Pileus hand ultra 1 poll latus
4 lin. altus. Stipes sub 3 poll. longus, $\frac{3}{4}$ -1
lin. crassus.*

1760* *A. appendiculatus*, cepitofus, altitudus, pileo cainoio, lsvi, primo glandiformi dein ~~subcam-~~panulato demum explanato convexifuculo, ~~albi-~~do, vertice dilute ochraceo, margine ~~acutim~~vmbrino-badia tenuissima ac elegantissima ~~fi~~^{fi}briata ornate; lamellis carne 3 pi. latiori[^] postice rotundaris subadnatis, 4 plic. ferie, p^{ri}ncipalibus violaceis demum cinnamomeo-bodis; ~~stip-~~itibus sublongiuculis, furfum attenuatis, junioribus subbulbosis lavibus albis carnosissⁱ Buiⁱ

Ad terrain in faguieto circa (Birkerød). Oach

*Caro alba. Pileus expansus ultra 2 poll, latus. Stipes 3 poll, longus 3f *4j lin* craff.*

1761* *A. Jpadceogrifeus, cepitofus, folitariusqua; pileo carnofo inembranaceo, campanulato albido cimreo, fufco-ftriato, vertice fpadiceo; lamellis carne fub 9 pl# latioribus, fublinearibus, fubrepandis, liberis, dilute violaceis; ftipite fub» longo fubcylindrico fibrofo Isvi fubfericeo-albido. Schfff. Fung. 3. 237.*

In terra humofa ad radicem Betulc Alni (*Bag-Jvcerdy* Septemb.

Caro albida. Pileus i& polU latus, J poll altus. Stipes fub 3 poll, longus, i& lin. eras-Jus.

1762. *A. galericulatus, cepitofus, *pileo carnofo-membranaceo, primo conico dfemum campanulato umbone magno ls\i fufco cinereo vel livido, margine dilution' (hiato; lamellis carne fub 4 pi latioribus ellipticis liberis albis; ftipitibus e radice fufiformi longo fubcompreffo fufco ortis, afcendentibus vel ereftis fuifum fub. attenuatis, ftriatis, fericeis, albido - cinereis, fuperne glabris inferne cum tadice pilis ftrigosis fufcis veftitis. Bull. 6. 518. D. noftro maxime quadrat,*

Ad truncos arborum fubputridura* JEftate & Autumno.

Cato alba. Pileus a poll, latus, 1 - ij poll, altus. Stipes 3 - 6 poll, longus, Jup&ne 2 inferne 3-4-5 tin craffus.*

1763. *A. villa/us*, cepitofus, pileo caniofo - membranaceo, primo conico Hvido, demum campanularo, umbonato, Jxvi, villosifuculo, cinereo-fubpurpmafcenti; lamellis came *qualibus linearibus arcuatim sdnaro-dstui Tenribus paHdis; ftipitibus bosi cradnatis, totnenro fusco cinflis, demum diftin&is fublongis cylindiici* fufco - purpures.

Inter folia dejecta Piiti Abietis OOobr.

*Caro pilei albo - purpurajcens, ftipitis dicit**
Pileus haud ~ 2 poll, tatus, 3 lin. altus. Sti-
pes 2 poll. 1 longus, \ - i lin. crajjs.

*7<4> *A, matutimis*, cepitofus, pileo carnofo-membranaceo hemifptizrico - campaimiato, umbonato lacvi, umbiino alutaceo, veitice obfcnrriori, margine ftriis diftantibus; lamellis latis poftice nuatis adnato-dccunenribus albido-ciiiereis; ftipitibus fublongis cylindricis fubconnatis vio^{fti}ceo badiis flpice albis basi totnento rufo cin&is.

In trunco fabpufrido Fagi lylvaticis. Jun.

Caro alba, Pileus ^ poll, latits f poll. altus
.Stipes 1^3 poll, longus, x Hn. crajjs.

1765. *A, ingratus*, cepitofus, fufufco-alutflc* pileo carnofo-membranaceo pvimo glandifor demum fubcampanu^ato convexo fubtubercul^o umbonato, lavi; lamellis came orqualibus, confertis, liberis; ftipitibus fubconnatis, longis, longis fltnisque fubflexuofis, compresGusculis, fibro

fis, fortilibns, fnperne rnlvere albo confpersh,
ftdultioribus inferi e umbrinis,

In pinetis denfis cefpitihus provenit. Aug.

Caro fubalbida Pileus 1J-1* poll, latus**
Stipes 3-5£ poll, longus, 4^-6 liii. crasfous.
Odor fubingratus.

Obf, Fungus nondum evolufu9 primo intuitu Me*
ruliis (liptatis valde fimilis.

766. *A. humofus, cefpirofns, fubferrugintuff, pilco*
membraiiaceo, conico-campanulato verrice lTVI,
marginē ftriato; lamellis carne lft'ioribus poftice
*anguftatis liberis; ftipitibus filiformilms loa**
giufculis fibrosis, lxvibus, bad fubeonnatii»

In humo turfofo. Septembr.

Caro concolor. Pileus 5 Jub 4J Kn. latus, %
lin. altus. Stipes i£ poll, longus, £ lin, eras-
Jus.

767. *A. turfofuSy cefpitofifTS, pileo cerno^ro, fuh**
vifcido primo fubglobofo tlemuin fubbemlfphac-
rico, coi^texiufculo> lsvi luteo cenro umbrino
marginē repando ftiiato dilucjori; lamellis caiv
ne pilei lan'oribus iigmoideis, fubrepanđr po-
ftice rotundatis, liberis cinereo-rofaceis; (lipi-
tibus fubconnatis, breviufculis, crasfiufculis deor-
fum increaftatis, uinbrnis, opice co.iina junio
*ribus alba sta*e fabfufca fubevanefcehte, veftito#*

In turfosis paludosis, Septbr,

506 *Cryptogamia. G. Fungi.*

Caro [uhalutacea. Pileus i-j poll. & ultra latus. Stipes 2 poll, longus, fuperne 5 tin inferne sub 6 tin. crajfus.*

1768* *A. jefculi*, cepitofus, pileo fubcarnofa fub*
 vWcido primo hemifphsrico dein explanato con-
 vexiufculo lxxvi ferrugineo-Juteo margine fub',
 repando dilution; lamellis latis confetti's laxis
 poftce'rotundatis liberis, luteis; flipitibus con-
 natis,. longitudine crasfitudmeque variis, cylin*
 dricis fuperne luteis vel fordide ferrugincis, in-
 ferne nigro badiis fubtomentosis* *Jig. nigripes*
*Bull. 6. 51*9. jig. 2.*

In trunco JEfculi Hypocaftani. Novemb*

Caro pilei alba, ftipitis dilute umbrina. Pi' leus &-\\ poll, latus. Stipes 1-1^-3 po& longusy 4 tin. \ poll, crajfus

17G9. *A%* *velutipes*₇ cepitofui, fubvifcidus, pileo car-
 nofo, exp anato convexiufcu o veitice ~~depresso~~
 ferrugineo-umbrino mrgine involuto dilu:iores;
 lamellis carne-pilei fublntioribu#poftice ~~subro~~
 tundatis fubadnatis pallido • albid's; ~~ftipitibus~~
 confertis, connatis, fubligncs, obfcure ~~badiis~~
 villoib-tomentosis, apice albidis iu^ra ~~bulbu~~
 angularis fur Cum iterum dilatatis. *Ag%* *nifi**
pes Bull. 4. 544

In truncis Salicuiu veuiftis. Novembr.

*Caro albida. Piltus 2 poll. lat. Stipes 11 a poll, longus, medio 3 lin% fuperne & infer-
 ne 4^-6 tin. crajfus.*

* * *ftipite folido (folitarii gregariique).*

• *Color pilei albidus vel pallefcens.*

1770. *A. epiphyllus*, folitarius, gregariusq̄tie minutus, albus, pileo membranaceo, primo globofo dein convexo fubumbilicato, fubfulcatn, margine crenulato; lamellis raris fubacqaalibus, liberis; ftipite fublongo capillari, apice fufco. *An varictas Ag. epiphylli Pers. Synopf. pag. 468^J*

Supra & inter folia decidua faginea. Autumno, *Caro concolor. Pileus i| lin_o latus> Stipe* Jub 1 poll hngits.*

177K *A. mujcigenus*, folitarius, gregariusque, mU nutus, candidus, pileo membranaceo primo glob<^fo, dein hemifphsrico demum explanato convexiulculo lsvi; lamellis, fuiiconfertis, 3 plic# feiie, ltnearibus adnatis^ ftipite fubbreuiufculo, flexuofa, filiformi,

Inter mufco9 ad truncos arborum. Autumno*

Caro alba. Pileus haud ultra 1 liiu I at us. Stipes \ poll hngus,

1772. *A. bulbojus*, folitarius, gregariusque, minutus, albus, pileo membranaceo, primo hemifpliae* rico demum explanato fubumbonato margine ftriatulo; lamellis latis, ellipticis, 2 plic. ferie, poftice iinuatis adnato • decurrentibus; ftipite breviufculo apice tenui deorfum increflato albo ac demum clavato, fubbufbofo, curvato umbrinofufco. *Ag. bulbofus Bull. 3, 556.*

Specimina mea in putrido ligna bulbis Ittitanti-
bus inveni. Octobr.

Caro alba, bulbi fubumbrina. Pileus i| fl
latus.*

- 1 1775. *A. cirratus** folitarius T P^{ieo} camofo-
branaceo explanato, convexiufculo, albo vet*
tice depr&ffo umbrino; lamellis confertis li-
nearibus fubfinuatis adnato decuTrentibus al-
fcis; ftipite longo filifarmi, radiculis capilla-
ribus vagis, cinereo albido.

later folia decidua Pini Abietis. Autumrto.

*Caro alba. Pileus f poll, latus. Stipe: 3
poll, longus.*

1774. *A** parafiticus, gregarius, minutus, albus
pileo primo globofo, demum campanula[^]
hemifphsrico, fubftriato - Tulcato; lamellis .[^]
xis adnatis; ftipite Tubulate deorfum inorit[^]
pilofo.

In fungis putridis femel inveni. Autumna

Pileus if Hn. latus. Stipes f pol fublong

1775. *A.* prunulus, folitarius, gregariusque,
carnolo primo convexo demum explafl
GonvexauTculo lubdcpreffo tuberculoso ma'
ne insquali albido Tubpallido; lamellis caf
lterioribus, rub 4 plic ferie, adnato-de^{^1}
xentibusrofaceo-incamatis; ftipite brevi c

¹ To, fuperne anguftato, fubbulbofo villolo-

In graminosis Tylvaticis. Septerabr.

Caro alba. Pileus i[^]-a poll, latus. 5
j[^] pott longus, utferne f poll, era'^{us}.*

X776. *A. albus*, folitarius, albus, pileo carnolo-
 jnembranaceo convexo fubumbonato j lamel-
 lis latis fublinearibus poftice fubfinuatis ad-
 xiato - decurrentibus albido - umbrinis; ftipite
 longo cylindrico fuqflexuofa fibrofo - cameo.
 Inter folia decidua fagineo (*Bagfy&rd*). O(5tob.
Caro alba, Pileus i poll, latus. Stipes sj
poll, longus, 1^ lin. crajfus.

^777. *A. eburncuSy* folitarius, candidus, pileo fiib-
 carnofo, hemifphaerico₄ depreffiufulo, fub-
 glutinofo, laevi; lamellis came pilei Tub \$
 pi. latioribus, figmoideis, adnato-fubdecur-
 rentibus, fubdifantibus ; ftipite breviufculo,
 craffiufculo, deorfum attenuato, fuperne fur-
 furaceo - fquamulofo^ intus fpongiofo*

In fagnetis ad terrain haud infrequens. Sep-
 •tembr. Oftob.

*Caro alba. Pileus Jub 2 poll, latus. Stipe**
*fl-af poll, longus fuperne f polt% inferne *
lin. crajfus.

1778. *A. aduftus*, folitarius, albus•fubpallidus,
 estate magis magisque nigrefcens; pileo car-
 nofo, depreffo, tuberculofo; lamellis carno
 pilei multo anguftioribus attamen latis, eras-
 % *Us* fragilibus, poftice rotunddtis liben's palli-
 disj ftipite brevi craffo. *Agarius rlgrejcem*
Bull. 5. J7Q & A. nigricans ejusd ^. a n.

iil fagnetis ad ttrrain luud infresjuens. Sep
 mbr.

510 *Cryptogamia. G. Fungi.*

*Caro alba, diffedfo fungo & aere expoſito autem breve tempore purpuraſcit. Pili 4 poll. & ultra latus. Stipes 2*aj poll. Ion* gits, 1£-ij poll, craſſis.*

1779. *A. Chryſodoji.* folitarius, fibvifcofus, albus, pileo convexiufculo fubtub'erculofo fubdepreſſo carnofo, difco cum margine fubinvoluto fla* vefcenti; lamellis came pilei fubcsqualibu[^] fubfigmoideis adnato-fubdecurrentibus; ~~ſtipite~~ breviufculo craſſo deorfum fubattenuato fubbulbofo fquamulofo hinc inde flavo, *Batſch. EL fung. Cont. 2 pag^o 79. Tab. 38 fig* 219.*

In pinetis rarius vidi. Autumno.

Caro pallide incarnita, Pileus haud ~~ultra~~ \ poll, lotus. Stipes Jub 2 poll, longus, 5-6 lin. craſſus.

1760. *A. paliduSy* folitarius, ochraceo-albidu⁵ⁱ pileo carnofo explanato primo convexiufcul^{fl} dpreffiufculo demum explanato tavo; lamel^l lis came pilei baud latioribus figmoideis fub^r decurrentibus paulo obfeurioribus; flipite fud^{*} longo cylindrico apice dilatato.

In ericetis faginetis ad terrain. Autumno.

Caro albida. Pileus if poll, latus > Stipes a-5 poll, longus, 2 lin. craſſus.

1781. *A. elongatus,* folitarius, albidus, pileo ^{c*1^r} nofo explanato convexo vifcido Tub ochrat^o albido; lamellis latis figmoideis decurrentibi^{fi} ftipite longo cylindrico flexufo ball fub [^] craſſato carnofo - fibxofo.

In muscosis pineti Birkerödl Odtob. Novemb.

Caro alba. Pileus aj poll latus. Stipes 6 poll, longus, fuperne 3J I'm. inferne 4-6 lin. crassus.

Variat pilco cinereo - ochraceo; ftipite breviori crassiori fuperne sub incrassato.

** *Color pilei ochraceus vel alutaceus.*

¹782. *A. pallescens*, folitarius subvittidus; pileo carnoso explanato concavo margine convexifuto, cinereo - ochraceo; lamellis carne pilei sub 3 pi. latioribus figmoideis decurrentibus altitudinis; ftipite longo fuperne dilatato basi arigutato, carnois fibroso pileo concolorato.

In muscosis pineti (*Birkeröd*). Novemb.

Caro alba. Pileus if latus. Stipes 4 poll, longus sub 4J lin, crassus.

¹783. *A. spongiosus*, folitarius, gregariusque, subvittidus pallide- ochraceus, pileo carnoso primo hemisphaerico convexo demum explanato late & obtuse umbrino umbonato, margine striatofulcato; lamellis carne pilei latioribus subfigmoideis postice truncatis attingentibus; ftipite brevifuto, inferne umbrino fusco, subbulboso.

In faginetis, pinetis frequens. Septemb. Octob.

Caro concolor spongiosa cellulosa. Pileus 1j-2 poll latus. Stipes 2J poll longus, fuperne 3 Kn inferne 6-3 lin. crassus.

var. pileo fusco umbrino.

1784- <&- rimofuSy folitarius, fubgregarius, pileo
 carnofo * explanato obtufo - umbonato, pall*
 do-ochraceo> dilute purpureo collinito, ver
 tice obfcure badio pun&ato, margine sæW
 incifo fubfiffo; lamellis carne pilei 3 pi. la
 tioribus ovatis, poflice rotundatis liberis in
 carnatis; **Etipite** breviufculo cylindrico fubbul
 bofo fibrofo colore piLei, fquamulis fufcis vel
 fufto-umbrinis villofis obtedlo.

In, fagnetis ad terrain. Septemb. Odtob.

*Caro alba. Pileus Jub 3 poll, latus. &^lP
 tot idem longus, Juperne 4^l injerne Jub 1^l
 crajfus.*

Vor, |3. pileo umbrino-fufco laxe k inæqua **i**
 ter explanato umbone magno obfcure puno
 tato margine integro; lamellis incarnat
 xofeis magis ftipite diftantibus; ftipite Squa
 -> xnulis majoribus nigro fuftis fibrillos is.

*Caro ccmadlior alba. Pileus 4-5 P⁰^: •
 tus. Stipes 5 poll, haud ultra longus, 5
 tin, crajfus,*

1784[. A. obejus, folitarius, fubcefpitofus, P
 carndfo primo hernifphaerico globofo umbrino
 ferrugimo margine fullo: ato, deniutn expla
 jiato convexo dilute ochraceo centro obfcu
 riori; lamellis carne pilei anguftiorib
 figuideis poflice fubtruncatis fubadnati⁵ ^
 lute tinereo ochraceis, ftipite breve, cX
 fubbulbofo, Squamulofo albo.

In faginetis ad terrain, i Ermelundjkov, baud frequens. O&ob.

Caro alba compacta. Pileus 3 - 4 poll, latus.*

Stipes Jub \ po I. long., 1 poll & ultra eras f 15.*

- *786. *A. ramealis*, gregarius, parvus, perfiftens, pileo fubcarnofo hemifphaerico depreffo, albedo-ochraceo aifco rufefcente, margine ftriatulo; lamellis linearibus figmoideis adnato decurrentibus, fubcarneis; ftipite brevi in* curvo pulveraceo fufco. *Bull 4. 536.*

In ramulis aridis dejedtis in faginetis pinetisque. j&ftate & Autumno.

Caro albida. Pileus 3-4] liti. lotus. Stipes totidem longusy f Jin. crajfus.

1787. *A. lignatUisy* folitarius, pileo fubmembranaceo explanato concavo fubinfundibuliformi, margine inaequali, pallide-ochraceo, lamellis latis fubrepandis longioribus poftic* figmoidoo-anguftatis decurrentibus albidis; ftipite breviufculo cylindrico apice dilatato, flexufo carnofo - fibrofo pileo paulo pallidiori.

In cavo trunci femiputridi Salicis. Kovemb.

Caro alba. Pileus 1 poll, latus. Stipes 1? poll, longus Jub \ tin. crajfus.

- *788. *A. ti&ruius*, folitarius, fubcefpitnsusque, pallide ochraceus, pileo carnofu, primo oblongo complanato demum evplanato obliquo depreffo, fquaxnulis fibrosis nmbrinis, centrahbus amfertiflimis, obfitus; lamellis came pi

514 *Qryptogamia. G. FungL*

lei eequalibus, fubovatis, crenulato - dentatis, fubdecurrentibus; ftipite breve craffo magi⁵ minusve complanato fquamulis punctatim con* fertiflimis veftito. *Schceff. Fung. 1. Tab. 29 & 50.*

In pratis & in ramis fubputridis vidi *Augult Caro pallidQ albida. Pileus jj poll, latus. Stipes 1 poll haud ultra longus & equiderfi crajfus.*

X789* *Jl-tomentelhiSy folitarius, cinereo-oclxraceus, pileo fubcarnofo prizno convexo fubhemifph^rico, demum explanato obtufe umbonato; la* jnellis carne latioribus poftice rotundatis H* beris; ftipite longo deorfum increaffato, fufco-luteo, bail tomento tenue albo obdu<fto.*

In faginetis infrequens circa *Bagfvcerd. Oclob Caro alba. Pileus haud ultra. 1 poll. latuS* Stipes 3 poll, longus, fuperne ij lin. infernt 3 lin. crajfus.*

1790. *A. Ladtifluus, folitarius, fubcefpitofus, fub* vifciilus pileo carnofo primo cenvexiufcul^ demum explanato concave margine fubflexU- ofo, obfeure cinereo- ochrdceo; lamellis car- ne fubaequalibus linearibus adnatis pallido luteis; ftipite breve craffiufculo carnofo l& xnellis concolore.*

In fagineto *{Bagjvard}*. *Octobr.*

Caro alba. Pileus i£-a poll, latus. Stip& haud ultra 2 poll longus fere £ poll, crafy |iabitus ladtifluorum.

1791. *A. limbatus*, fiftitarius, fubvifcidus, cinereo-ochraceus, pileo umbilico magno, limbo convexo, c?quali fubcarnofo; lamellis carne 2 p], latioribus linearibus us fubdecurrentibus flavis; ftipite breve tenue cylindrico fuperne fubdilato, fubflavescente, carnofo*

In faginetis. Octobr.

Caro alba. Pileus 2 poll, latus. Stipes i₂^s poll, longus, Jub 5 tin. crajjus.

1792. *A. fubcyathus*, folitarjus, cinereo. alutaceus, pileo carnofo infundibuliformi umbonato marginè convexo; lamellis carne pilei fublatis figmoideis linearibus decurrentibus; ftipite longo, craffiufculo, primo caefio-villofo, demum colore piloi fubglabro, cylindrico, ball anguftiore obtufo, carnofo.

In pinetis rarius occurrit. Autumno.

Carp fubconcolor haud pallidior. Pileus ii₂-Sb poll. & ultra lotus. Stipes '4 poll, longus f poll latus.

1793. *A. praecox*, folitarius fubgregariusque, primo vifcofus demum ficcus, pileo hemifphaerico albido - alutaceo vertice umbrino, carnofo, fubnitente; lamellis latis fubtriangularibus, poftice rotundatis fubadnatis primo purpureo violaceis demum nebuloso-fufcis; ftipite fublongo deorfum incraffato fubbulbofo fupja cortina - filamentofam farina atra pundtato. *Schaff. Fung. ^ Tab. 217,*

i

In pratis, ad verfuras agrorum, in fimeto ^{bul}
tulino ac equino ^{jffate}.

*Caro alba, pilci compa&a, fiipitis in centro
fpongiofo. Films fub \ poll lotus. Stipes t
poll longus, apic&x lin. baji 3 lin. craffui**
**7<?4* -^ valgus, folitarius, gregariusque, pil^
membranaceo primo globofo hemifphsericol
demum explanato umbilicato margine fulca-
to, crenuto, luteo alutaceo; laraellis latiffi-
mis decurrentibus concoloribus; Aipite breve
cylindrico fubcutvo albido. Holmlk. Se^{ct.}
rur. 6t. a pag. 62. Tab, 34.*

In paludibus turfosis fatis frequens. ^{Augu&}
ad OClobr.

*Caro pallida. Pilots t poll, fcf ultra latus.
Stipes fub 1 poll loHgus, 1 lin. craffus.*

1795* A- *pil^eol&ris_t*, folitarius, pileo carnofo primo
convexo umbonato, demum explanato ^{con-}
cavo, margine involuto, alutaceo; lam ^{ellis}
carne fub<equalibus figmoideis linearibus ^{de-}
curretitAusi-ftipitc lon^o, craffo, ^{cylindrico,}
bulbofo, carnofo. *Bull* 4. 400.

Inter mufcos in pineto circa *Birkeröd.* ^{Au-}
turn no.

*Caro albida-pallefcens. Pileus primo s V^{oll},
demum 3! poll latus. Stipes 4-4^ poll ^{lon-}
gus, ^r₂ - ~ - 1 poll craffus,*

^lZ9^r*^m [^]* *convexus, folitarius, gregariusque, £
fubcarno-lo hemif[jh;fcrico convexo, aluta^c 1
ujob jlico umbrinu; Unitilis cajjie pilei 3 ph*

latioribus figmoideis decurrentibus pallidis; fiipite breve furfum maxime dilatato albido pallefcente.

In pinetis (Charlottenhind). OAobr.

Caro albido pallefcens. Pileus \frac{1}{2} poll, lotus. Stipes 1 poll longus, fuperne 3\frac{1}{2} lin. infern I li?i> craffus.*

1797» *A. infundibulum*, folitarius, pileo fubcaF-
Ziofo primo convexo, COACSLVO, demum plan®
infundibuliformi margine eredlo, alutaceo;
lamellis linearibus anguftiQimis decurrenti*
tus paliidis; fiipite breviufculo bulbofo la-
ttiellis concolore. *Bull 6. 575. Jig, f. g. h.*

In ericetis haud infrequens. Autuinno.

*Caro paliicla, Pileus primo >£ poll demum
haud \ lotus. Stipes x± poll longus, in
medio 2 lin. baji fub 4% lin. crajjus.*

***798.** *A. turbinatus*, folitarius, pileo carnofo mem''
branaceo explanato, concaviufculo, ferrugi-
neo-alutaceo margine fubftriato; lamellis la*
tis, latere plicato - venosis, decurrentibus, fub-
incarnatisj ftipite breviufculo cjindrito fu-
perne maxime dilatato, inferne fubfubulato,
albido pallido ^fhroio).

In fagineto *ved Rudergaara* xarius vidi. Sep-
tembr.

*Caro dilute alutacea\ Pileus i^-i\j)oll la-
tus. Stipes iJ-i^T poll longus; i lin. craffus.*

***799.** *A. tegularh*, prep:arius, dilute alutaceus,
pileo pnrfto glandifocxni demum campajiuiato

plerumque Y^{ert}J^c* tegulatim rimoso submeiff' branaceo; lamellis latissimis postice subarcua* tim angustalis attingentibus, dilute fufco n& bulosis; stipite sublongo, deorsum incrassato, Xubbulbofo fibroso.

In graminosis faginei (ved Birkerdd). Septb* Odoabr.

- • *Caro alba.* Pileus A poll, latus & £ poll, al-*
- *tus. Stipes fere gj poll, longus, Juperne 1*
- tin. iT^ferne 3 lin. crassus.*

• *Color pilei luteus, ferrugineus, umbrinus,*
igoo. *A. fujiformis, subgregarius, pileo carno*
primo subhemisphaerico subtuberculoso Ux
umbonato villosifuculo fericeo alutaceo-luteo
vertice rufo deinde campaniato subglabro
fusco striato irrorato saepe vertice rufo m
culato & uno latere rufo maculate & ven
To-striato, margine dilution; lamellis la
postice subfinuatis, adnatis, pallidis; stipJ
sublongo, crasso, fusiforme albo carnofo-
brofo.

In fagineo ad terram nudam (i ErmelUnd/JcoA
OAobr.

Caro alba, diffecto fungo vero max rubesc¹
Pileus i~%¹ poll, latus, Jub a poll. ali^{li}
Stipes 4-44 poll' Ibngus, apice 1 poll, cra
1801. *A. luteus^ folitarius, subcespitosus, luteo*
phureus pileo carnofo, primo globofo, demum
ex)lanato leviufcule umbonato disco subur

brino, margine repando subinciso; lamellis latis laxis repandis, sub 4 plic. ferie postict* subarcuatim aagustatis subdecurrentibus; stipite sublongo ^raffo ere<fto? rufo striato, junioribus flexuoso, interdum geminatiui basi connato. 1 t

In faginetis haud frequens occurrit (*Rudergaard, Bagfucerd* . Septembr.

Caro paulo pallidior, Pileus 2^ - 4^0//. latus \$m
Stipes 5-4 poll. Io7tgus, 4 poll, crassus.

1802. *A. curvatus?* folitarius, subviscidus, pileo carnofo, primo subhemisphaerico Umbonato, demum convexo disco Isviufcule elevato. Iuteo-umbrino, striato; lamellis carne pilei multo latoribus, postice finuatis, angulis rotundatis liberis obscure ciniram meis; stipite longo crasso sursum subattenuato, basi incurvo fordide alutaceo fusco umbrino striato, junioribus cortina albida dein subviolacea fibroso -reti^uleta obfite.

In graminibus mucosis encetosis^ue pineti (*Birker*od*). Auguft. Septbr.

Caro alba. Pileus t₃ poll latus. Stipes 5J poll, longus, i - | poll, crassus.

1803. *A. araneofus*, foliravius, pileo carnofo, primo glandiformi demum convexo subexplanato subumbonato, spadiceo - umbrino, lavi; lamellis carne pilei duplo latoribus linearibus subfigmoideis postice subrotundatis attingentibus cinnamomeis; stipite longo crasso sursum attenuato: junioribus csfio iubalutaceo apice cortina

araneofa violacea: veterioribus dilute nlutaceo
umbrino ftriario. Ag. araneofa Bull, 6. 544*
Jig, z* haud dijjimilis.

In muscoMS er ice to sis pineti (Birkerod), Orob.
Caro Juh dilute ochracea. Pileus af & ul-
tra lams, & fub i£ poll, alms. Stipes 5\$
poll hngus, fupenie fub i poll, inferne ^ poll
crajfus.

1804* A. pygmeus, folitariut-, greganus, fubcefpii'
tosus, minutus, pileo carnofo hemifphaetic
convexo rufo-umbrino margine ftriario dilution
laraellis came 3 pi. latioribus, poftice rotu-
datis, fuljadnatis, luteo - pallidis.; ftipite breva
tenue apice dilatato fufco'albiilo* Bull. Q. 5*
fg. 1 B.

Ad truncos putridos. Autumno.

Caro palhda. Pileus Jub i£ lin_t latus,
pes ^-5 tin. longus.

1805 « A. anguftaluSy folitarius, pileo carnofo & *
vexo obl'cure fpadiceo umbrino ; lamellis car-
pilei latioribus 4 plic, ff? 1 ie t brevioribus poftiq 8c
rotundatisj longiovtbus acutis attingentibu* un
biino cinnamomets; ftipite breviufculo fuper
dilatato inferne increaffato bulbo tuberofo med
anguftiore fufco alutaceo.

In graminosis pineti (Bitkerod). Autumno*

Caro alba. Pileus %\ poll, latus. Stipe*
poll haud ultra longus, fuperne Juh \ P
medio Jub % lin, inferne £ pollL craffuf,

*806. *A. pyxidatus*, folitanus, pileo fubcarnofo, explanato concavo inargine npando - flexuofu fui'eo umbi'ino vifeoso; Umeliis came pilei 3 pi. latioribus, decurrentibus luteo - aurantiacis; ftipite longo fubcylindrico, glutinofu, inferne curvat o fubradicato iuteo-pailido carnot'o-libiofo, &ull. 6. 568. fig- ?. noftro valde Jimiis.

Inter gramina pii.cci (*Birkerod*). Novenibr,
Caro alhido oohrac.ea. Pileus 1^ poll, latus. Stipes ultra 1 poll, longus, 2 - 5 £». crajjus.

807, *A. ftriatulus*, iulitarius, vifcidus, pileo fubcarnSib primo fubconvexo dein explanato demum margine ereclo infundibulifonni utnbonato fordide umbrino, fufco fh'iato; lamellis came a pi. latioriLus fublinearibus adnatis palliclis; ftipite longo fubcylindrico fupcnie dilatato, fubflexuofu fubftriato fibrofo-carnofo lamellis concolore.

Intra folia dcje3a Pini fylveftris (*Bagf ward*) O^b.
Caro pallide - lutea. Pileus fub i£ latus. Stipes 2-5 poll, longus, 5 lin. craffus.

808. *A. j-epandus*, folitarius, fubv;leciis, pileo carnoto convexo luteo-alutaceo, vertice ferrugineo, margine fulcato tuberculofo repando incifo lobato ohfeuriore; lamellis came pilei spquat*ⁿ*^{xu} laxis repandis; longioribus arcuatim adnax^ fubde^urrentibus, ochiaceo cinnamomeis; (liP'te longo craffu utrinque fubdilatato fubftriato ^bido-Uvido carnolo-fibrofo. *An idem cum*

Ag. **Jubrepando* Pers. Syn. pag. 300? Ag. *cruftuliniformis* Bull. 4. 308 quoad forma/n pilet.

In graminosis pineti (Q*Birkeriid*). Septembr,
Caro pilei dilute ochracea, ftipitis alba. Pi-
leus 5-3[^] poll, latus, 2 unc. alms. Stipes
4f poll longus, 1 poll. E? ultra craffus.

X809. A, *Fachypus*, folitaviuSj gregarius[^]u«, vifco-
fus, pileo carnofo: primo hemifphxi ico fubtus
cortina araneofa alba inuoiucrato, demuin ex-
panfo, convexiufculo, deprcsfiuiculo terrugitief
hitco, ftriis comertisfimis in difco o bleu riot i bus,
interrupt is; lameliis* primo caine pilei angu-
ftiovibus fubviolaceis: dcimim came equalibus,
police rotundatis liberis albido umbrinis; fti-
pите breuiufcalo cylindrico bnlboib tuberculofo-
primo, ob cortinam atbido, demuin albido-
argillaceo, **fericeo**, cainoio. *Hohn/k*, beat. ni-
of. ». pag. 67. Tab. 59. fquamulee pilei rero
ttundum objcrvavi, & lamella in no/tto j
lumtywdo 3 Jerialcs.

Atl terrain nudam in fagineto (*Birkerod*). Sep-
tembr.

Caro pallido - alutacea. Pileus Jeminevolttttf[^]
31 plane evolutus 31 poll, lates* Stipes Jw
3 poll, longus, £ poll, in modio, tuber auto
1 poll, & ultra craffus.

1310. A. *crucibuliformis*, **iblrarius**, **fabvifcidus**, pileo
inembianacco-carnofo, primo turbn?ato demuin
infuiidibuliformi margine flexuofa repando, rufo-

ochraceo; lamellis carne baud latioribus lineari-
bus decurrentibus flipiteque fubbulbofo fmfum
attenuate fubftriao, pallido-albidis.

In alentis & in pinetis (*Bagfvard*). Septembr.

*Caro alba, Pileus 24 poll, latus. Stipes 2%
poll, longus, Juperne 2 lin. inferne 5 6 ll».*
craffus.

IK *A. circirans*, gregnrius foljtaiiusque, pileo
lubcarnofo pr)nio pinho dcmum e\ pi ana to ex-
cavnto fubūifundibulitormi" margine convexo de-
flexo, fulvo - ferrupfnco ; lamellis carne pilei
fublterioribus lincaibus (igmoideis ilecurrentibus
dilute aibido cinnaniomcis; fl{p.tt lūlibreve cy-
lindrico utrinque iibdilatatato lānicili.s. concolore,
lubrufo* ftiiato. *Bull. G 555. A". A *J? Ap.*
giluuo Pers. Synopf. pag. 448 diverfns.

In m̄neio (*Ragfvccrd*). Oclobr,

Caro lamellis concohr. Pileus 3 poll Intus.
Stipes 2^ poll, fere longus, 3-4 ll«. *craff.*

12. *A. adfcendens*, folitan'ns, vifcofus, pilco car-
nofo, cxplanato, cncavo, Inargine ftriato iul-
cato, repando umlirino ferrugineo; laineli'S cam?
Tubsqualibus repaudis decurrentibus umbr»[#]is;
ftipite brere adfcendente apice dilatato, fafco
umbrino.

Inter mufcos pineti (*Birkeröd*). Autumno.

Caro pallide lutea ftipkis Jub umbrina. Pi-
leus 4 poll latus. Stipes 2 poll, lorigus, fu-
perne | poll, inferne f poll, crāffus,

*••• *Color pilei ruber, purpureus, badius vel fuscus.*

1312. *clavus*, folitarius, gregariusque, minutus; pileo globofo-conico dein hemisphaerico demum explanato convexifuculo fuhdepreffo aurantiaco-rubro, fubcarnofo; lamellis came latioribus, diftantibus, 2 plic. ferie, adnatis pallidis; ftipite bievifuculo Hiforrai iuperne dilatato albidoi *Bull. 2. i^g.*

Inter gramina, inufcos. Septembr. Odtobr.

Caro alba. Pileus 2 Jub ai liu latus. Stipes Jub \ poll, longus.

Var. j3. pileo ftriato, aurantiaco; lamellis albidis fubdecurrentibus; ftipite colore pilei
Caro lutea. An diftincta fpecies?

1314. *A. ftrohiinus*, folitarius, gregariustjue, totus ruber, pileo fubcarnofo primop globofo demum hemisphaerico leevi; lamellis diftantibus fubiequalibus decurrentibus; ftipite fublongo filiforme undique pills albis brevibus obfito. *An idem c. Ag. Jtrobiliuo Pets* S) nopj pag, 395.*

Specimina mea inter mufcos in gramino *Chariottenlund* inveni. Auguft.

(Viro alhido-rubejens. PiUus haud iX liu latus. Stipes % poll, longus, haud ultra.

1815. *A. JanguineuSj* folitarius tctus croceo-rubropileo carnofo primo glandiformi, coitina fufca aurantiaca claufo, demum explanato convexifuculo fubftixatoj lamellis fubdiftantibus

postice submutatis decurrentibus; stipite sublongo utrinque incrassato subclavato striatulo fibroso. *Jatfu. Mijcdlan. 3. pag. 107. Tab.*

Jo- fig. 3.

Inter folia faginea dejesla rarissime legi (i *Gucl-skov*). Jul.

Caro pallidior. Pileus 2 poll, latus. Stipes sub 2 poll, longius, 5-5 lin. crassus.

- 1816. *A. venustus*, folitarius, parvus, rosaceus, pileo primo convexo, dein turbinato, demum concavo, margine subrepando, subcarneo; lamellis latis subdistantibus adnatis subdecurrentibus; stipite breviusculo cylindrico subbulbofo, fibroso.

In fructulis dejeslis Hgni subputridi in pineto circa (*Birkerbd*). August,

Caro subalbida. Pileus 1 poll, latus. Stipes equidem longius 1 Vn, crassus,

- 817^r. *A. purpureus*, folitarius, viscosus, nigrescente-purpureus, pileo subcarneo, primo subhemisphaerico umbilicato, demum explanato erecto infundibuliformi, margine repando involuto; lamellis carne pilei subsequalibus, linearibus, postice rotundatis subadnatis, 4 plic. fe^e pallidis; stipite longo crassiusculo deorsum incrassato subflexuoso, carneo, pileo Paulo pallidiori. *Bull 6. 575. M. ?*

In pineto (*Bagfymd*), Octobr. No^e emb.

Caro pileo & ftipite corwolor. Pileus 1½ poll. latus. Stipes 5[^] poll & ultra longus, Jupeffi6\ 5 lin. inferne [^] poll fere craffus,

1818. *A. cyatkifor'vtis*, folitarius, viscidus, pileo carnofo - membranaceo, infundibuliformis, minuto & acuto umbonato, margine involuto regulari, violaceo-purpureo; lamellis carne pilei duplo latioribus linearibus postice subangustatis adnatis, 4 plic. ferig, albidis; ftipite longo, deorsum increflato, carnofo - fibrof[^] pileo concolore basi albido. *An Ag. tardif Pers. Synopf pag. 461 ?*

In graminosis mucosis pineti (*Birkerdd*). Octobr Novembr.

Caro fusco-albida. Pileus 1½ poll latus. Stipes 3 poll longus, superne sub 3 lin. Inferne 4[^] Uik & ultra craffus.

- 1819- *A. castaneus*, folitarius, glutinosus; pileo carnofo: primo glandiformi demum explanat^o, convexo late & obtuse umbonato obscure badio \ lamellis carne 2 pi. latioribus laxis subrrpandis, postice rotundatis liberis; ftipite longo cylindrico craffo, junioribus superne valde cortinato, albo basi rufefcente, earn^o, fo- fpongiofo.

Inter mucos in ericetosis pineti *Birkerod*. O&»'
Caro pilei rufefcens, ftipitis alba, Pileus V 31 poll latus. Stiffes 5-6 poll longus, j poll. fere craffus.*

1820, *A. bacliuSy* folitarius, vifcidus, pileo convexo, badio carnofo; lamellis 4 pi. latioribus poftice truncatis fubfinuatis fubadnatis cinoaxnomeis; ftipite fublongiufculo tenue cylindrico apice dilatato, pallido-rufo cortinato, firiato, bafi rufo, carnofo fibrofo.

Inter mufcos in ericetis pineti (*Birkerifd*). Aug. *Caro pilei albido-rubefcens, Jiipitis pallide umbrina. Pileus haud ultra a poll, latus. Stipes 3 poll, longus, 5 lin. craffus.*

1821. *A. denticulatus*, folitarius, Tub vifcidus, pileo fubcarofo primo convexo dein explanato fubdepreffo umbrino - badio; lamellis latiffimis laxis denticulatis poftice rotundatis adnatis umbrinis; ftipite longo, cylindrico, fufco, fibrofo.

Inter mufcos pineti (*Birkerdd*). Septemb. *Caro fufca. Pileus 1 \ poll latus haud ultra: Stipes 3\A poll, longus, 2 lin. craffus.*

1822. *A. lanatus*, folitarius, pileo carnofo-membraceo fubhemifphxrico difco paullulim elevato badio margine fubumbrino; lamellis carne fubtriplo latioribus linearibus fubfigmoideis poftice fubrotundatis apice ftipitis dilatato-adnatis fufco-umbrinis margine pallidioribus; ftipite breviufculo fubclavato dilute umbrino ball lana albido - pallido cinrfto, carnofo - fibrofo. *At variety ab Ag. peronato Pers. Synopf. P"g. 33*.* Bolt.fung. Tab. 58**

Inter **folia** de je&a faginea, in faginetis (Bag-
fycerd, Birkerdd. Auguft & O&obr. v

*Caro fufco - albida. Pileus s poll, latus, fub
i poll, altus. Stipes <z£ poll, longus, 2 lin.
fere craffus.*

1823* *A. fuliginofus* 9 folitarius, pileo membranofa
tampanulato fufco, fuligineo ftriato, fubcre-
nulatoj lamellis latis laxis fubrebandis fub-
ellipticis liberis f lin. fere ftipite diftantibus
purpureis; ftipite longo, deorfum fubmicras-[^]
fata, fibrofo, fufco. <

Inter folia de jedla pini Abietis (Birkerod). Au-
turano.

*Caro fufca. Pileus 1 poll, haud ultra latus.
J poll altus. Stipes 3^ poll_k longus₇ ^-1 Hit.
craffus.*

1824- *A. cervinus*, folitarius, pileo carnofo expla-
nato, umbonato, fufco umbrino, fuligineo
ftriato difco obfeuriuri fubfericeo; lamellis
latis fub 3 pi. carne **pilei** latioribus fubi e-
pandis poftice rotundatis liberis primo albido
pallidis demum fub purpurafcentibus; ftipite
fubicngo, clavato tortili umbrino ftriato, pal-
lido, fibrofo. Schceff. Fung. 1 Tab. 10. "bi
vcre Jiipes tortilis non exprej'us.

In ligno putrido fabrefatfo \Charlottenlw; d).
Novembr.

*Caro alba. Pileus :| poll latus. Stipes 5
poll, longus_y Juperne 2 - 5 lin. in/erne \pott*
craffus.*

1825. *A. obcampanulatus*, folitarius, fubvifcidus, pileo fubmembranaceo: prim® fubhemifpha?, rico umbilicato demum explanato infundibuliformi margine fubinvoluto, l*vi cinerafcen- te fufco; lamellis came pilei duplo latiori- bus linearibus poftice rotundatis fubadnatis cinereo albidis; ftipite longo deorfum incre- fato fubbulbofo, fubflexuofa, carnofa - fibrofa pileo dilutiore. Bull. 6. 575. I.

- **In** graininosis mufcofis pineti (*Bagjvard*). O<ftb
Caro cinereo-albida. Pileus 11 poll, latus
Stipes ^i poll bngus, fuperne 11 poll, inferne
4^ lin. craffus.

***** *Color pilei cinereus, lividus, violaceus,*
vel ccerukus nee non viridis.

1826. *A. obconicus*, fubvifcidus, pileo carnofa membranaceo explanato fubdepreffo fufco - daereo; lamellis came aequalibus linearibus Egmoideis acute decurrentibus, luteis; ftipite breviufculo apice dilatato deorfum davato colore pilei, carnofa.

In mufcofis pineti (*Birkeriid*) A uturn no.

Cat'o alba. Pilots 11 poll, circiter latus. Sti-
pes 11 poll, longus, fuperne 11 poll, inferne
totidem craffus.

1827. *A. ericetorum*, folitarius fubgregarius, cine-
*» - coerulefcens, pileo carnofa - membrana-
ceo primo gⁱobofOj demum explanato fub-
»rab₁licato margine ftriato fulcato hinc tu-

bevculofo; lamelUs carne pilei latioribus figmpideifl late adnatis fubdiftantibus; ftipite bioviufculo cylindrico apice dilatato, bulbo minuto albido, ftriatulo, fragili. *An idem cum Ag. ericetorum Pers, Synopf. pag. 472.* Inter mufcos in ericetis in locis humid is fungilluin noftum invenimus, Jul.

Caro concolor. Pileus Jitb 1 poll, lotus. Stipes 1 poll, haud ultra longus, \ lin. crajjus,

1828. *A. hamatus, folitarius, vifcofus magnus, pileo carnofo pritno hernifphaerico globofo, demiiim evplanato centro cavo magno, purpureo, vel obfcure badio-livido; lamellis carne pilei fublterioribus figmoideis fublaxis rep«\n-dis 4 plic fcric, poftice rotundatis adnatis primo fubviolaceo - coeruleis demum dilute lividis; ftipite longo, craffo, cylindrico, fuperne fubdilatato inferne paulo craffiori interdum bulbofo, quafi hamatus incurvo, colore lamellarum, fibrofo - cameo.*

Inter folia dejedta Pini Abietis. Auguft. Sept.

Caro alba. Pileus 4 poll, latus. Stipes 6-7 . poll, lortgus, 1 poll., bulbus vero ji adeft fcj-e 2 poll, craffus,

1829- *A. fagineus, foitarius, mediocris; pileo carnofo fubhemifphaerico convexiufculo purpureo-livido naargine involuto dilutiore; lamel* lis carne pilei anguftioribus, linearibus figmaideis acute adnatis, pallidis; ftipite breva*

crasso deorsum Tub incrassato, albido - fusco
 cortinato, carneo.

Inter folia faginea dejecta (*Bagvard*). Octob.
 Caro alba. Pileus 3 poll. sub ultra latus.
 Stipes sub 2[^] poll. longus, superne 1[^] poll, in-
 ferne sub 1 poll, ciliatus.

- 1830.** *A. nebularis*, foliarius, pileo carneo he-
 miphærico convexo (*pulvinato*) cinereo - livi-
 do, margine evoluto; lamellis carne pilei
 multo angustioribus linearibus figmoideis acute
 subdecurrentibus pallidis; stipite breve deor-
 sum incrassato subbulbo arcuato, pallido,
 carneo. *BatJcK El, Jung% Cont. zda. pag.*
B5. Tab. 53. fig. 19j nostro haud dissimilis
sed parvior.

In pinetis locis mucosis ericetosis (*Birkerød*).
 Sept. Octob.

Caro alba. Pileus 1[^] poll, latus. Stipes a[^]
 poll, longus, superne 1[^] poll, inferne sub 1
 poll, longus.

- 1831.** *A. canaliculatus*, foliarius, subcapitatus,
 pileo carneo hemiphærico convexo obscure
 cinereo livido; primo globo; lamellis an-
 gustissimis linearibus figmoideis, 4 plic. ferie,
 confertissimis: longioribus recte truncatis, hinc
 canaliculus circa stipitem formantibus, luteis
 stipite breve crasso inferne crassiori basi na-
 piformi subincurvo albo striis cineritiis, car-
 neo.

In faginetis haud frequent (*Birkerød*). Octob.

33² *Cryptogamia. G. Fungi.*


*Caro alba. Pileus ^ poll, lotus. Stipes fere equidem longus, Juperne sub x polk inferne ad cubitum i& poll, craffus**

1852. *A. vuduSj* folitarius, subgregarius, pileo carnofo, primo globofo cortina alba involucrato, demum cortina evanelcente explanato convexiufculo, dilute violaceo - livido difco umbrino; latnellis came pilei anguftioribus linearibus acute adnatis albido violaceis; ftipite longiufculo, apice dilatato, fubbulbofo[^] l*vi, nudo, carnofo-fibrofo, pileo concolore. *Bull 5. 439. haud diji7nilis.*

In pinetis inter folia dejecta Pini Abietis haud frequens. A uiumno.'

Caro albido violacea. Pileus Jub 4 poll, latus. Stipes equidem longus, fuperne ultra 1 poll, inferne haud 1 poll, crajffus.

1833. -*A violaceus_y* folitarius, pileo carnofo primo hemifphasrico - globofo, uinbonato, demum ex_zplanato convexo obfcure coeruleo - violaceo, vertice minus magisque umbrino tinctus; lamellis came pilei multo anguftioribus fublinearibus fubfigmoidois acute adnatis, pileo fere obfeurioribus; ftipite breve craffiufculo albido violaceo, cortina ferruginea fubftriato,, deorfuru increaffato carnofo fibrofo* *Flor. Dan**
Tab. 11[^]/_y

In faginelis inter folia decidua. Septemb. 
toobr. etiam Augufto legi.

Caro alba. Pileus 3-3? poll, latius Stipes 2 - 2½ poll longus, superne § - £ poll, inferne 1 poll & ultra crassus.

1834- ^- *Lacmus*, folitarius, viscosus, colore lacmus di&us, pileo submembranaceo diaphano primo Tub hemisphaerico mox quasi campanulato dein explanato ac deorsum infundibuliformi margine striato erecto inaequali inciso-lobato discoque umbonato in adultioribus dilutione; lamellis carne pilei multo latioribus figmoideis postice angustatis longe decurrentibus; stipite brevipedunculo crassiusculo, furfum incrassato & apice dilatato inflexo carno-fibroso, albo.

In ericetis circa *Birkerød*. Octobr.

Caro albido c&rulea, haec stipitis alba. Pileus 1 - 1½ poll, latus. Stipes fere 3 poll. Longus, superne sub 3 lin. inferne 1 - a lin. crassus.

^835. *A. incurvus*, folitarius, subcaespitosus; pileo carno-membranaceo, campanulato, deorsum subexplanato subumbonato, fusco-coeruleo, striis abbreviatis; lamellis carne pilei Tub 4 pi. latioribus subellipticis subattinentibus rubido caeruleis; stipite brevipedunculo, crassiusculo, incurvo, deorsum sensim incrassato, bulbosum albo, supra bulbum coeruleo-striato, fibrato. In trunco putrido cavo rarius vixit (*JFriderichs. det*). Septbr.

534 *Cryptogamia. G. Fungi.*

*Caro alba, pilei cmrulefcens. PVcus fere \\
poll, latus i& altus. Stipes if poll, longus,
Juperne 2 lin. inferne & poll, cmffus.*

1336. *A. luridus*, folitarius, pileo carnofo, campanulajo obtufo umbonato plumbeo - coeruleo, ftriis copiofiffimis abbi'eviatif albedo cinereis, margine involuto; lam[^]llis cnrne latioribui poftice rotundatis liberis aihidis; ftipite brevifculo fubcylindrico crailiufculo lamellis concolore, carnofo - fibrofo.

In fagineto ad terram nudam (*Rudprgaard*)[^] Septembr.

Caro alba. Pilous fab 2 poll latus, \\\jert altUs. Stipes 2[^] poll, loüigus,]- poll, crajf.

1857. *A. nigricans*, folitarius violaceo - nigrefcens, pileo fuhmeibrannceo campanulato margine deflexo; lamellis latis ellipticis poftice anguftilGmis arcuatim & lineatim decurrentibus fubviolaceis; ftipite fublongo deorfum incrafato ball fubbulbofo albedo.

In pratis. Septembr.

*Caro concolor paulo dilutior. Pileus fub f poll, latus & paulo altior. Stipes 2 poll. Ion-
£us, £-[~] Un. crajfus.*

18)8. *A. amethijjeus*, folitarius, gregarius, fub* cepitofus, amoene violaceus aetate fubcanefcens pulveraceus, pileo fubcarnnfo hemifphaerico umbilicato; lamellis came pilei fublterioribus fublinearibus fi[^]moideis acute udnatis[^]ubdecurrentibus; ftipite lr[^]eo eylindrico

flexuoso, cortina fuliginosa obfusa, carno-
fo-fibrosa. Flor. Dan. Tab. 1*50.

In fylvis, locis umbrosis iūbhumidis Autumno.
*Caro fubalbida, Jubjtania Jpongiosa pilei v: o~
lacea. Pileus 1 poll. & ultra lotus. Stipes
a i'' 5 P°M- longus, 2-1 tin- crassus.*

1839. -^* ^nifatus. loiidrius, gregariusque, cine-
reo-aeruginosus, viscidus, pileo primo iūbbi-
mifphajrico umbonato demum explanato con-
cavo margine convexo, carnoso, disco iūh-
fusco; lamellis carne pilei subtriplo latioribus₁
laxis repandis subducurrentibus dilutiuribus;
Aipite brevi furl'um inerassato vel etiam lū-
pra balli intumefcente.

In faginetis (*Bagfycerct*) pineto & alneto (*Bir-
keröd*). Autumno.

Caro alba. Pileus 2-1J poll latus. Stipe
sub 2 poll, longus, superne 1/2 poll, inferue 4 1/2
lin. crassus.*

• • folido {capitosa}.

\ Color pilei albidus vel pallidus.

¹840. A. *diformis*, cepitofus, subfoliarius sub
viscosus, albus, pileo carnofo primo hemisphse-
rico convexo dein explanato convexo, vel pia-
no convexiufculo, margine repando involuero,
vel etiam insqualiter incifo, lobato, lobis de-
flexis vel reflexis; lamellis carne sub latioribus
linearibus confertis acute aduatis iūbJecunea-

tibus; ftipire brevi craffo spice inaxiine dilata-
to, inferne fubbulbofo, to:mento oibo.

la pinetis haud intiequens iherdum densis ferie-
bus {Bagfyverd). Oclob.

Caro alba. Pileus 2-5 poll, lalus. Stipes
i£-3 poll longus, £-1 poll, craffus.*

1841* *d. cairns*, ccfpitofiu, fubfoiitarius, pllco fub-
carnoib, primo fabheinifphnrrico convexo cano
vel csiio demum hemifphauico fuhunihonato
tlbo fericeo, margine evoluto; lamellis lotis
carnc pilei ? pi. latioribns, confertis, 4 pHC>.
ferie, figmoideis, lubrepandis, brevinribtis p^o
ftice rotandtttis, longisfimis Utc atlnnti?, palli-
dis; (tipire breve fubtenue, cylindnoo interne
flexuofa, carnofa. Ag> *Mouceron Bull. 2. 142*^

In faginetto, ved *Ordrup. Ncvemb.*

Caro alba. Pileus 2-1J poll latits. Stipes
equidem longus, 4J tin. craffus.

184²* ^ *integrellus*, cefpitofus, fubfafcicularis, mi-
nutus, albus, pileo raambranseeo primo hemi
fphsrico demum explanato fubumbilicato, mar-
gine ftriatulo; lamellis came pilei latioribus
diftntibus fubsqualibus decurrentibus; ftipifa
filiforme fublango. *An. Ag. integrellus Pers.*
Synopf. pag. 395. & ej. Ic. G? Defer, fung.
2. pag. 54- Tab 13- fig* 5²*

Supra folia putrida in fylvis. /Eftnte.

Caro alba. Pileus £ tin. latus. Stipes § poll'
haud ultra longus.

1&43« *A. fvaveolejis*, cepitofus, fubfoiitan'us, albi, pileo fubcarnofo, primo convexo dein piano demum fubinfundibuliformi, difco dilute umbrino; lamellis carne pilei 2 pi. latioribus fublinearibus poftice fubrotundatis adnatis; ftipite fub Ion go cylindrico apice paulo dilatator adfcendente bail acutiufculo, lūbuinbrino - ftriato. Inter raufcos in turfob (yed *Ordrup*). Auguft. Septembr,

Caro Juhjpongioja alba. Pileus Juh ij poll latus/ Piltu 2£ poll lengus, 2 tin. eras- Jus. Odor fvaveolens. Sapor gratus.*

*844. *A. mustelinus*, ceipitoiūs, iūbgregarius, **pallidus**, iūbvifcidus, pUeo carnoib primo convexo demum explauato fubconcavo marline convexo fubrependo; lamellis came-pilci fub^unlibus fubellipticis attingentibus pallido-albidis; ftipite fūblongo deciTutn increfl'ato lūbLulbofo fub» ftantia fpongiqfa farclo.

Inter folia dejecta Pini Abictis. Autumno.

*Caro albido-pallida. Pileus £-1 poll latus. Stipes *i polt longusy fuperne ij, in/erne 2\ lin. crafjus.*

[84S* *A% albido-wnbrinus*, cepitofus folitariusque, pileo caniofo convexo demum explannto fubtu* terculofo albido pallido, difco fufco umbrino waculata; lamellis carne fublterioribus, poftice rotundatis fubliberis pallide luteis-, ftipite bre-

visfime craflb cylindrico, colo/e pilei, bffi vw
befcente, carnofo.

Ad terratn nudam in fagineto (vcd Birkerod)
Jul. Apguft.

*Caro alba, dijfe&ione fungi vero iota purpi
rafcit, Pileus a poll, latus* Stipes Jub 1
poll. longuSy i poll crajfus. Odor Rapha
niftvi Juharotiaaiictis. Sapor haud ingratus.*

184[^]# -A- cornucopioides, celpitofus, folitariusque
piteo carnofo infundibuliformi, pvimo margi
piano, deumm ere[^]lo, pallide-alutaceo; lam
lis came pile! scqualibus, linearibus, poflice fu
anguftatis attingentibus, pallido albidis; ftipi
brevis deorfum incran'ato Tubbulbofo lamellis c
colore, fpongiofo- carnoCo,

Inter folia decidua Pini (JBirkerod). OSobr.

*Caro albd. Pilens 2 - a£ poll, lotus% cavu
infandibuli ultra ij poll, profund. Stip
Jub 3 poll, longzts, apice ubi earne pilei
Jertus 3 tin, baft fere ~ poll, crajfus. J*

** *Color pilei flavidus[^] ferrugineus vel urn
brinus.*

1847. [^] cer*^{nus} > celpitofus, cerino-flavefcens, p*
cninofo primo piano demum concavo marg
Undulato convexo fubrependo fubinvolutO,
fco obfcuriori; iaiiellis carjie piki latiorib
lineanbus* figmoitleis angufto-decui'rentibUSj I
lidior'bas; ftipite breve cylindrifo fubbulb
pileo oblique inferto bali byflb albido cine

Inter folia dejecta Pini Abietis pineti (Birkerdd),
O&tobr,

Caro diute ochracea. P Ueus 2-2 poll, latus.*
Stipes i£ hand ultra longus, fub 3-4- tin,*
*craffus**

Ig4g. *A. velatus*, cepitofus, viscosus, pileo sub-
carneo, primo hemisphaerico margine v lo sub-
tilissimo fimbriato fusco, demum explanato pal-
lide flovo, disco concavo ferrugineo-aurantio,
aetate ferrugineo umbrino; lamellis carne pilei
frib 3 pi, latioribus, postice **latioribus** rotun-
datis adnatis primo dilute violaceo - umbrinis
aetate cinnamomeo-ferrugineis; stipitibus sub-
longis (subcylindricis basi conglutinatis; in fo-
litiis deorsum attenuates, acutis, umbrinis, apice
luteis, fibrosis.

In trunco putrido. Ncfvembr,

Caro in junioribus lutea, inferius Jiipitis
umbrina, in adultioribus autem tota ferrugi-
nea umbrina. P Ueus 1^-i-aj poll, latus.
Stipes 2v-3 poll. hngu\$, fitperne 5-4][tin. in-
feme 1 lin, craffus, .*

'849 *A. arcuatus*, cepitofus, viscosus, luteo-ferrugineus, pileo explanato convexifculo vel sub-
piano, squamis fibrillosis subtriangularibus ob-
fiteo, carneo; lamellis subtilissimis subcrenula-
tis: longioribus postice rotundatis (Inuatis ad-
natis, lineatim decurrentibus, umbrino-fuscis;

Gabbrius cylindricis squamulis um-

brinis transversim vestitis, apicem versus nudi
arcuam curvit, lignoso-fibrosis.

In truncis Fagi Sylvaticae (in KvmeluuSjkoven)
Kovembr.

*Caro pilei & superioris stipitis^ pallida, reliqua
lutea umbrino-friata. Pileus 3 poll. f\$ ult)
lotus. Stipes sub 3 poll. longus, 1 poll f\$
crassus.*

1350. *A. frustulinus* cepitofus, folitariusque, um-
brinus, pileo subcarnoso, primo hemisphae-
rico, demum explanato convexo; lamellis c; r-
ne pilei 3 pi. latioribus: brevioribus rotun-
datis subnullis; longioribus adnatis; stipi-
bus subbrevibus fursum attenuatis subflexuo-
sis pallidioribus.

In lamulis & frustulis ligneis dejetilis femi-
tridis. Decembr.

*Caix > concolor? Pileus 1 - 1 1/2 poll, latus. St-
pes 1 - 2 poll* longus, a lin, crassus,*

M Color pilei badius, violaceus roseus vel
fuscus.*

1851- -*A monstrosus*, cepitofus, pileo subcarnoso
primo convexo demum explanato tuberculo^
laciniato: laciniis hinc inde flexis, subproli-
fero badio; lamellis latis postice angustatis
decurrentibus fusco roseis; stipitibus loi-
cylindricis flexuosis laevibus nudis dilute
dio violaceis, carnosiss.

In fagineto ad terram nudam (*Birkeröd*). Autumno.

Caro rofacea, Pileus i-2 poll latus. Stipes 4!-5 poll longus I poll craffus,*

¹⁸52. *A. mutabilis*, cepitofus, pileo fubcarnofo, primo convexiufculo integro fordide violaceo, demum explanato fubconcavo umbonato fufco umbrino: xnargine zona violacea lata, incifo lobato; lamellis came pilei 5 pi. latioribus tepandis laxis poftice fubanguftatis attingentibus, coeruleo - violaceis; ftipitibus fubbrevis tenuibus friatis tortilibus primo color© lamellarum aetatp fufcis.

Inter ftramina fubputrida densis agminis (*Birkerdd*). Auguft. Septembr.

Caro dilute violacea-fufco. Pileus 2-3 poll, latus. Stipes a-2j poll, longus, a-3 Hn craffus.*

¹⁸53- *A. fordidus*, cepitofus, pileo carnofo primo convexo, demum explanato convexiufculo late & obtufe umbonato, umbrino - fufco margineque fubrependo fubinvoluta obfcuriori; lamellis carne aequalibus, 4 plic. ferie, poftice ^otundatis liberis dilute violaceis; ftipitibus fubbrevis fubbulbosis apicc fubdilatis lce-
vibus pileo concoloribus carnofo -fibrosis.

In fterquilino (*ved Vejen ved TwJorg*). Jul. Augu .

Caro dilute violacea. Pileus 1|-2 poll. Iatus. Stipes 2 poll. & ultra longus, Juperni 3 inferne 41 lin crajfus.

- 1854 *A. carneus*, fubcefpitofus, gregarius, pileo membranaceo- carnofo primo fubcampanulato, demum expianato umbonato carneo-rofeo : margine fubflexuofa fubinvoluta dilution; lamellis carne pilei 2 pi. latioribus fubfigmoideis p'ftice fubanguftis adnatis fubdecurrentibus fubalbidis; ftipite fubbreve cylindric© apice dilatato, fubflexuofa pileo paulb dilutiore, fibrofo. *Bull* 6. 555. *Jig.* 1.

Inter Jfolia decidua Abietina in piueti* (*ved Gælfkov, Birkerbd*). Autumno.

Caro alba. Pileus 1-2 poll, latus. Stipti x^ poll. longitSy 1 - 1' - lin. crajfus.

β. *ladlescentes* (*A. porreus & crocatus*).

* *Color pilei albus vel cinereus.*

- 1855- *d, piperatuSy* gregarius, folitarjusque, palH* do-albidus, pileo carnofo primo hemifphecrico convexo, dein fubconcavo demum fubinfundibuliformi, margine fubflexuofa, junilibus involuto; lamellis anguftiffimis **linear!** bus: brevioribus fuboblique truncatis: longioribus poftice anguftatis decurrentibus; ftipite breve, craffo apice dilatato, carnofo *solido*. *Flor. Dan. Tab.* 1153.

In fylvis frequens. Septembr. Odlobr.

5 - 5 poll $\frac{1}{2}$ ultra latus. Stipes 2 poll longus, $\frac{1}{2}$ poll crassus. Sapor acris pipere Jimilis.

1856. *A. urens*, folitarius, subgregarius, albido* pallidus, pileo carnofo, primo hemisphaerico dein concavo demum explanato, margine involuto; lamellis angustissimis linearibus Tub 4 plic. ferie, postice subangustatis vix attingentibus; stipite breve, subcrasso, subcylindrico apice coarctato, carnoso badio. Batfch. El. fung. Cout. 1 pag. 34. Tab. 15. fig. 59?

In fagineo (ved Ordrup) haud frequens legi, August.

Caro alba. Pileus $\frac{1}{2}$ poll, latus. Stipes 2 poll. longus sub $\frac{1}{2}$ poll crassus. Odor Jubnullus. Sapor valde acris Jubaromaticus Pimento Jimilis.

1857. *A. acris* folitarius, sub[^]eminatus, dilate fuligineo-cinereus, pileo carnofo primo hemisphaerico depresso demum explanato concavo margine involuto; lamellis angustissimis linearibus: longioribus postice angustatis decurrentibus, albidis; stipite breve cylindrico apice dilatato basi anustiore obtuso, albido fuligineo striato, carnofo folido. An idem c. Ag. acr. Pers% Synopf. pag. 457 ?

Inter folia faginea (harvard). O&obr.

Caro alba. Pileus $2\frac{1}{2}$ poll latus. Stipes 2 poll, longus sub $\frac{1}{2}$ poll crassus

I

1858. *A. Azonites*, folitarius, fuligineo - cinereus. pileo carnofo primo hemisphaerico depresso demum explanato concavo margine evoluto lamellis carne pilei sublatioribus sub 4 plicis: brevioribus postice rotundatis: longioribus subfinuatis ad natis pallidis; stipite breve cylindrico apice coarctato basi premorfo, colore lamellarum, carnofo folido. *Bull.* 6. 367. 3.

In pinetis haud frequens occurrit (*Bagfucerd*).
Odobr.

Caro pallida. Pileus 3 poll lotus. Stipes 1 1/2 poll longus, \ poll, craffus.

1859« *A. affinis* Sy gregarius, subfolitarius, viscosus, pileo carnofo primo hemisphaerico umbonato dein explanato concaviusculo in margine involuto demum infundibuliformi margine evoluto, albido-virescente-cinereo; lamellis carne pilei equalibus linearibus 4 plicis ferie: brevioribus postice oblique truncatis: longioribus angustatis, adnato-subdecurrentibus, albidis subpallidis; stipite breve cylindrico superne dilatato inferne premorfo, albo nitente, subcarnofo, cavo magno, ipse in pileo. *An diversa ab Ag. lurido Pers. Synopf. pag. 436?*

Inter folia decidua faginea (*Birkeröd*). Odobr.

Caro alba Pileus ultra 5 poll, latus Stipes 1 1/2 poll, longus, Jub \ poll, craffus.

•• *Color pilei viridejens vel olivaceus.*

*860. *A. curtipes*, folitarius, pileo carnofo, primo liemifphaerico depreHo demum explanato Tub* concavo margine evoluto, viride-olivaceo difco cameo; lamellis, mguftis linearibus 4 plic. ferie poftice rotundatis, longioribus anguftioribus acute ad n at is (interdum fubfinuatis), pallidiffimis; ftipite breviffimo furfum fenfim increffato demum dilatato ball obtufo incurvo, lamellis concolore folido.

Rarius in pineto-(v^ GcelJTcov) legi Novbr.

Caro alba. Pileus 3J Jub 4 poll, latus. Stipes i& poll longus, fuperne | poll craffus.

1861. *A. plumbeus*, fubgregarius, pileo carnofo,, primo hemifphaerico depreffo, demum explanato concavo margine involuto fubtomentofa, umbrino-olivaceo; lamellis anguftis linearibus poftice obtufatis attingentibus, pallidis > ftipite breve craffo furfum increffato dilatato, curvo bafi fubbulbofo pileo dilutiore, carnofo folido. *Bull. 3. 282. & 6. 559. Jig. 2.*

Raud infrequens in plantariis ad *Bagfvazrd.* Septembr. CJdlobr.

Caro alba, bulbi Jiipitis umbrina, Fileus 4? - 6 poll. & ultra latus. Stipes Jub 2 poll longus, Juperne ultra 1 poll. & bulbus equU dent craffus.

Var. minor & fubumbrinus, pileo fubvifcofo.

*** * *Color pilei Jerrugineus, umbrir\us, Jubjulvus.*

JK2. *A. JublaGeJcens*, folitarius, fubvifcidus, urn-

brino- ferrugineus pileo fubcarnofo explanato, concavo, umbonato, marline evoluto fquamulis fubverrucosis difcoideis eonfertioribus obfito; lamellis carne pilei latioribus, laesione fublattocentibus poftice rotundatis longioribus anguftatis fubdcurrentibus; ftipite breve, furfum fubincruffato dilatato, fubbulbco, glabro, carnofo fibrofo fubcavo.

In pineto (*yed Bagfvcerd*) una vice Jiunc *xtiliffimum* fungum vidi. OcStobr,

Caro concolor. Pileus ai - \$J poll latus. Stipes 11 - 2 poll, longus fuperne & inferne fert \ poll crajfus in medio anguftior%

1863. *A. planus*, folitarius, umbrinus, pileo carnolb expanfo, piano, difco fubelevato, margine involuto tomentofo; lamellis anguftii ligearibus; brevioribus poftice rotundatis: longioribus anguftatis adnatis, umbrino luteis; ftipite breviufculo cylindrico apice fubdilata- to, undulato flexuofa carnofo folido.

Equidem inter rarifGmis in pineto (*yed Bag- jvmrd*) legi. Oc5tob.

Caro lamellis concolor. Pileus 4J poll, latus Stipes fere i± poll, longus, ^ poll, crajfus.*

1864. *A. Jubdulcis*, gregarius, rufo umbrinus, pileo carnofo primo hemifphaerico fubplano, demum eyplanato fubinfundibuliformi acute umbonato margina convexiufculo evoluto, difco obfci¹ riore; lamellis carne pilei latioribus: long^{*0}

lute purpurafcentibus fubincarnatis; ftipite fubelongato cylindrico apice dilatato, basi fubattenuato incurvo, carnofo, folido. *Bull* 3. 224. *haud dljunilis.*

In pinetis ftvquens obfervatus. Auguft —O&b. *Caro albido - rubefcens. Pilots 3 poll latus. Stipes 3 § poU. longus, 3 Hn. J poll crajjus Lac hujus fungi primo fere infipidum fubdulce demutn vero acre & urens.*

1865. A *griseus*, folitarius, piUo carnofo-membranaceo, explanato fubconcavo, obture & late umbonato, margine convexo evoluto, dilute umbrino; lamellis latis Inxis, poftice rotundatis adnatis, 4 plic ferie, grifeo umbrinis, fubnebulosis; ftipite fubelongato apice **P**. valde dilatato, basi bulbofo umbrino, carnofo folido.

In fagnetis rarius provenit (*Ordrup*). Novbr, *Caro alba. Pileus fub 3 \ poll latus. Stipes equidem longus, apice 1 poll basi £ poll medio 3 lin. crajfus*

t *.*.* *Color pilei rufus, aurantiacus, lateritius vel fubincarnatus.*

*866. X *Tliejogalusj* rolitarius, rufus, pileo carnofo primo fubhemifphcerico depreflb umbonato, deinde explanato fubiufundibuliformi umbone evanefcente, paulo obfcuriore zonato; lamellis came pilei fubduplo, latioribus,

548 *Cryplogamia. G. Fungi.*

ribus postice angustatis, subadnatis, primo lateritio-incarnatis, demum violaceo-incarnatis; stipite breviusculo cylindrico apice dilatato, basi obtuso, junioribus dilutiore, carnoso folido. *Bull.* 6. 567. *Fig.* 2.

In Tylvaticis jieroorosis locis (*Charhttenlund*).
O&obr.

Caro alba. Pileus a poll, latus. Stipes Jub equidem longus, 3J lin. craffus.

1867. *A. rufus*, folitarius, subgeminatus, rufocrocatus, viscosus, pileo convexiusculo subzonato, margine involuto, demum evoluto deflexo; lamellis distantibus angustissimis, linearibus, 4 plic. ferie, adnato-decurrentibus; stipite elongato furfum subattenuato subundulato > apice dilatato, carnoso concavo.

In graminosis ericetosis pineti (*Birkerod*) haufi frequens observavi. Odlobr.

Care- Jubflava - ochrpcea margine stipitis sub-
, crocata.- Pileus if poll, haud ultra latus.
Stipes Jub 5 poll, longusy apice & basi Jub
£ poll in medio 3 liiu craffus.

1868* *A. deliciosus*, folitarius^ subviscidium, ochraceo-aurantiacus, pilco carnoso, explanato depresso, subleviter umbonato magis minusve zonato; lamellis carne pilei angustioribus: brevioribus rotundatis subfinuatis: lon^ioribus angustatis adnato-decurrentibus; stipite breviusculo, craffo, curvo, apice dilatato, carnoso folido, cavogue. Flor Dan. Tab -

In graminosis pineti (*Bagfvcerd* 6f *Rirkerbd*)
haud frequens vidL O&obr. Novembr.

Caro alba pilei JiipitUquc margine crocata
Piltuss ultra 5 poll, latus. Stipes 2-5 poV_f
longus, £ poll, aaffus.

'869. *A. torminofusy* Mitarius, pileo carnofo, primo
hemifphaerico, deprellb, demum fubexplanato
toncavo margine involute, tomentofo, ocbra-
ceo-lateritio; lamellis carne anguftioribus po-
ftice anguftatis attingentibus, acutis; Itipite
fuperne fubventricofo pileo dilutiore, carnofo,
cavo. Flor. Dan. Tab. 1068.

In fagineto & pineto (*ad Bagfvcerd*) haud fre-
quens. OAobr.

Caro alba. Pileus fub 3 poll, latus. Stipes
2-2½ poll tougus, | - £ poll, crnffus.

y. defluentes,
momentanece.

'870. *A. picaceus*, folitarius, pileo carnofo-mem-
branaceo, vifcido, primo ovato dein campa-
nulato, umbrino - olivaceo, ftriato, maculii
fubmembranaceis albis fubtransverfalibus con-
confluentibus obfito, demum expanfo profunde
dilacerato; lamellis caerulefcence - cinereis la-
tis poftice angultatis liberis; ftipite longitEmo
bulbofo furfum attenuato, albo, fuperne pul-
vere atro confperfo, iibrofo cavo. Bull. 5,

550 *Cryrtogamia. G. Fungi.*

Inter folia faginea putrida, in fagineto circa
Birkeröd haud frequens legi. Septemb. Octob.
Caro alba Pileus carnpamdatus* si poll. *fer*
*latus & *£ poll, altus, plane evolutus & ex*
pan/us 4 poll, latus. Stipes 7 - 8 poll, longus,
bulbus i£ poll, crajjiis.

1871. *A. comatusy folitarius, gregariusque, pileo*
carnoso - membranaceo, primo ovato dein cy-
lindrico-conico albido, vertice mnbrino, squa-
mis filamentosis fufcis obfiteo demum margine
fiffo; lamellis latis poftice anguftatis liberis,
primo albido purpurafcentibus demum nigro-
fcentibus guttatim deliquefcentibus; ftipite lon-
giffimo fubclavato furfuni attenuato albo, baf
fquamis ereAis fubfufcis cortinatis, fibrofo c>#
vo; annuo remotiffimo mobili. Flor. Dan.
Tab. 854-

In graminosis, in hortis (*paa Dronning-Gaard*
i Ncejfet omkring Hoved-Bygningen). Auguft.
 Septembr.

Caro alba. Pileus 2\ poll. latm, 5-5? 1/4
poll, altus. Stipes 6-7- g poll, longus, baf
J poll, crajfus.

^{1872*} ^ *cinereusj cepitofus, pileo membranaceo*
primo oblongo, ftipite lulcato, albido cinereo,
dein campanulato, demum revoluta fiffo; T&v
mellis linearibus nebulosis liberis; ftipite long^o
furfum anguftato albo, fibrofo, cavo. Flor.
Dan. Tab. 1195.

In fylvis ad truncos arborum haud fr. equens.
Septembr.

Caro alba. Pileus campaniformis ½ *Jub i|*
poll, latus. Stipes 5 poll. & ultra longus,
inferne 3 lin. crajjus.

1873* *A. niveus*, gregarius, squamuloso-farinaceus
albus, pileo submembranaceo primo globu-
loso ovato minutissimo, mox ovato glandiformi
dein campanulato demum revoluta, umboni-
nata; lamellis linearibus adnatis primo cinereis
albido-cinereis demum nigrescentibus liquet-
centibusque; stipite sublongo furfum attenuato
fibroso, cavo.

In fimo equino in fylvaticis humidis, OAb.
Caro alba. Pileus *Jub 1 poll latus. Stipes*
3| poll, longus, basi Jub 5 lin crajjus.

1874. (*A. alternates*) cepitofus, cinereo-pallidus,
pileo carnoso-membranaceo, hemiglobofo, striato
fulcato: striis alternatim abbreviatis, glabro, ver-
tice membranoso, demum rufescente revoluta; lamel-
lis latis, adnatis cinereo nigrescentibus: stipi-
tibus longis bulbosis: bulbis connatis, furfum
attenuatis pileo dilutioribus, fibrosis, cavis.

Ad fepes rarius, observavi. Novembr.

Caro alba. Pileus i|-ia poll latus, ½ al-
tus. Stipes 3-4 poll, longus, basi Jub 4|
lin. crajjus.

*875. *A. hemiglobosus*, solitarius, gregariusque, pileo
submembranaceo, globofo-campanulato, demum
fillo ex dilatato subflexo striato, pollijo, ^{vult. ce} i

umbrino; lamellis carne latioribus, lineamentis dilute roseo-cinnamomeis demum nigrescentibus; (tipite longiusculo fufum attentimo fibroso, cavo, albo.

Ad terram nudam in fylvis pnesertim faginetis {veA Birkerdd). Septembr. Oftobr.

Caro alba. PUEus *[\ lin latus sub 6 Un. altus, explanatus i~ poll, V*fv.*. Stipes 2-3 poll. & ultra lo?igus, hafi a lin. craffus.

1876. A. femistriatus % fubcepirofus, pileo fubcar-
nofo, femiglobofo ftmto dilute umbrino difco
obfcuro laevi, demum campanulato cinereo
difco nigrescente margine deflexo, filis; Jamel-
lis ansuttilimis lineamentis a^tingentibus cinereo
nebulosis demum nigrescentibus defluentibusque
ftipite longissimo, bulbofo, fufum attenuato
tonili, albo, fibroso cavo.

In fylvis ad terrain hunc rarissime vidi, Oatob.

Caro pilei umbrina, ftipitis alba. PUEus fu-
nior* % poll, lotus f poll, altus; adultior. Jib
\ poll, latus A poll, altus. Stipes if poll-
demum 4f - 5 poll, longus, baji 2-5 Vffi*
craffus.

1877* A- bubulinus, fubgregarius, pileo membra-
naceo, fub verticem eminentia femiglobosa car-
nosa prominenti, primo fubconico demum ca-
panulato margine cinereo* Ixvisime frriato, difco
laevi albo, vertice fubumbrino; lamellis an-
{lis fimis linearibus eminentin pilei adnatis fl.*

ftipite longo fubbulbofo fubcylindrico, albo
ftriato, fibroib, cavo*

In fimeto bubulino. Septembr.

*Caro alba. Pileus in primo ftadio 2 lin. lo-
tus, Jub 5 lin. altus, in Jecundo 1 poll, la-
tus > 5s^r Hn. altus. Stipes i\ poll, longus de-
mum 5\ poll, longus basi 1 - 2 lin. craffus.*

1878, A Jorinti'Sj fubfolitarius, pileo membranaceo
primo campanulato conico deinum plane expla-
nato fiffo fubrevoluto, ftriato-fulcato, fubqua-
niulofo, cinereo, difco cum umbilico parvo urn-
brino; lomellis nngulifimis lin r.iibus, ftipite
annulatim adnexis, cinereo - nebulosis demuin
nigiis dcliquefcntibus; ftipite cylindrico, fub-
longo glabro albo fibrofo cavo#

Ad inuros humidos. iEftate#

*Caro alba. Pileus campanulatus Jub \ poll.
latus, & equidem altus, explanatus £ poll
latus. Stipes a poll, longus, 1 lin. craffus.*

1879- A_o dijans, cepitofus, fafcularis, pileo mem-
branaceo, primo hemifphsrico demum explanato
convexiufculo fulcato cinereo, vertice umbrino;
l&mellis diftantibus fubplicatulis fubsqualibus
a''guftifimis fubattinentibus concoloribus; fti-
pitibus fubelongatis cylindricis fafculatim con-
t'atis albidis fibrosis, cavis.

In fterquilinio e radicibus Rubis tinctorum con-
cisis & elixiviatis. Septembr#

554 *Cryptogamia. G. Fungi.*

Caro alba. Piteus hemifphasricus 1j lin. fo' tus £ lin. fere altus, explanatus i poll, latuS. Stipes x poll demum 1j poll, longus, £- 1 lin. crajfus.

1880* 4- *radiatuSy* gregarius, minutisfimus, pileo membrnaceo, primo globofo fubcylindrico-campanulato, ftriato fubfufco, vertice umbrino, dein hemifphzrico grifeo caefio, demum explanato fulcato; lamellis diftantibus plicatulis fere g fub-squalibus adnatis; ftipite filiforme, glouco, ni* tente, diaphano, fragile, cavo.

In flercore equino in umbrosis humidis fylvaruffl* Auguft. Septembr.

Pileus ½ lin. latus, fub 1 lin. altus, demufr \ lin. latus. *Stipes* |* 2 - 2 | poll, longus.

1881- *A. diffeminatus*, gregarius, pileo membrane ceo primo ovato dein cam panulato demum &* planato margine revoluto, ftriato -plicato luteo ochraceo demum grifeo, umbone vel vertice lsvi umbrino; lamellis anguftisfimis linearibuS liberis albido cinereis demum nigrefcentibus de- fluentibus; ftipite breuiufculo fubclavato furfum attenuato utplurimum incurvo, albo, fibrofo, cavo. *Ag. congregates Bull. i. Tab. 94.*

Ad radices truncorum 6c in caudicibus cavis fol. Fopuli albs & Salicis. Oclobr. Novembr.

Caro alba. Pileus campanulatus J poll fir* latus \ poll altus; explanatus fere 1 poll 1 >^a tus. *Stipes* i | poll & ultra longusf \ ^n. iasi era (Tin -

** *diffolutce.*

1882. *A. prominens*, cepitofus, pileo fubcarnofo, campanula to ftriaco ; ft r it's diftantibus, u m bone protubeiante., truncuo, depreflb, carnofo, cavo, Umbrino; mavgine fiflb fubrecurvo, paliido; lamellis anguflis lublinearibus adnatis cinereo-albidis demum nigrefceutibus; ftipite longo furium fub*itrem:aro lsvi, albido-pallido, fibrofo, cavo in ipfe umbone continuato. *An congener Ag. Boltonii Pers. Synopf pag, 414?*
Ad fepes haud frequens vidi (yed Bitkerdd). Novembr.

Caro alba. Pileus i£-» poll latus, if poll, altus. Stipes 3 - 4^ poll, longus, 5 tot basi craffus.*

1883 • *A. oblittaratus*) fubcepitofus, pileo fubmembranaceo primo ovato dein campanulato pallido vertice obtufo umbrino - maculato, fubfquamulofo, margine inaequali ftriato fubplicato, demum incifo & profunde fiffo revoluto \ lamellis latis lubellipticis liberis albido-ro&ii, dein nigrefcentibus folutis & quafi fibrillis nigris libere dependentibus; ftipite longo cylindrico ftriato, albo, basi fubfquammofo oblitterato volvato, fibrofo cavo.

*Ad *adicem i£fcuLi Hypocauftani (i Rofenborg-Have). Novembr.*

Caro alba. Pileus eampanulatus i poll, latus & equidem altus, expanfus 3J poll. Stipes fub - £ poll loft&u\$^_ha&i_[ub ~ poll craffus.

1884* *A atramentarius*, cepitofus, pileo fubmembranaceo, primo conico dein campanulato ftriato fubplicato verticem verfus fquamulofō, fufco urnbrino, margine inaequali in cifo dilutionē, demum profunde fiffo: lacinii* inflexis; lamellis latis: longioribus in ftatt primo ftipitem recumbentibus albis margine convexo dilute purpureis, setate fubliberis obfcurinribus; ftipitibus longis, fubcylindricis, bafi paulo ^xcratatis connatis, laevibus fibrofis cavis. *Ag. atramentarius Bull. a. 164.*

In terra humofa in hwrtis, in vicinitate radicium putridarum. Sub finem aeftatis & autumnō.

Caro alba. Pilots i| poll, latus, 2-2% poll alt us. Stipes 5-6 poll, longus, 35 lin. crajf**

1885* [^]. *tuberculofus*, fubcepitofus folitariusqae* pileo fubmembranofō, primo cylindrico craffo fubbrevis utrinque fubtruncato fimili, dein ovato fubcampanulato pallido-fubochraceo ftriato vertice tuberculis lūbrumbrinis, margine i&' cequali incilo fubinvolutō, demum radiatii*¹ horizontaliter explanato, fere usque ad verticem fiffo; lamellis latis poftice fubangufi^{a'} tis Cuhadnatis cinereo - purpurafcentibus, ~~de~~ demum nigrefcentibus fubdeliquefcentibus; ~~fi~~ fipite fu¹ longo furfum fubattenuato laevi ~~albo~~ fibrofp, Ctivo. *An diver/us ab Ag_m lacuna}*⁰
Pers. Synopf, 401 ?

In fvlvis, iocis nemoiosis (*Birkerod\ Charlotte?**
lund_{d9} O&obr.

Caro alba. Pileus Jecundo Jiadlo 2 poll la
tus \ poll. altus, ultimo 5 poll latus. Stipes
4 poll, longus, basi Jub & poll crajfus.*

- *886. *A. extintorius*, cepitofus, pileo fubmem-
branaceo, primo ovato, dein campanulato
fubftriato vertice laevi margine inaequali, in-
cīto, pallide umbrino demum margine lacero
filfo revoluto; lamellis anguftis fublinearibus
liberis fufco - nigrefcentibus demum nigris fo-
lutis; ftipite poft evolutimiixi pilei longo te-
Hue, furfum fubattenuato, albo basi umbrino
rubefcente, fibrofo, cavo. *Agaricus extiii(%)o-
rius Bull 5. 457. fig- 2.*

Ad radices arborum haud infrequens. Auftimuo.
*Caro alba. Pileus campanulatus \ poll la-
tus & altiSy explanatus ob revolutam mar-
ginem equidem. Stipet Jub 5I poll, longus
2 lin, hvjerne crajfus.*

1887. *A. micaceus*, cepitofus, pileo fubraembra-
»aceo,' primo ovato dein campanulato um-
brino ferrugineo ftriato fubfalcato fqi^amulis
^urfuraceis albidis obftip, margine fubiquali,
domum incifo explanato laciniis fubhorizon-
talibus, obtufe umbonato; lamellis cinereo
fufcis latis repandis poftice anguftatis liberis,
dein nigrelcentibus deliquefcentibusque; Ri-
pite longo craffiustulo furfum attenuato, albo,
fquamulofa, fibrofo cavo.

Ad radices arborum. Autumno#

Caro alba. Pileus campanulatus 1½ poll. l&^m
*tus, r& poll altus: explanatus 3 poll, latus**
Stipes sub 5 poll, longus, basi 4-6 lin. crassus
 1888- *A ferruginofus, cepitofus, pileo submeiss*
 branaceo primo ovato dein campanulato ba-
 dio umbrino, laevi, glabro, margine dilution
 subaequali subinciso, demum explanato: laciniis
 subhorizontalibus pallidioribus, late & obtuse
 umbonato; lamellis latis, repandis, primo si-
 pitem relinquentibus, luteo-pallidis, demum
 nigrescentibus deliquescentibusque; stipite
 breviusculo furfum attenuato glabro umbrino
 albido, fibroso cavo.

Ad truncos & radices arborum. Septembr. Octob.
Caro pallida. Pileus campanulatus sub 1 poll.
latus & altus, explanatus 2 poll, lotus. Sti-
pes 1-2, poll longus 5 lin. in femore crassus*^{ss}

* * * *integrus. {A. fuscicornis & praecox}.*

1889* *A. sublitigescens, folitarius, gregariusque, pi-*
leo subcarnoso subviscido, primo conico pal-
lido, demum horizontaliter explanato striis
centralibus confertioribus abbreviatis fuscis
punctatis, margine integro; lamellis latis ellip-
ticis sublaevibus primo albidis demum
fuscis cinereis subdeliquescentibus; stipite lon-
go furfum subattenuato, fusco - pallido, fibroso
 cavo.

In fimo bubulino in fylvis (ved Birkeröd).
 Novembr.

Cdro albida. Pileus campanulatus 1 poll. altus, J poll, latus, explanatus Jub & poll, latus. Stipes ultra 5 poll. longus > i\ tin. inferne craffus.

W90. *A. cinnamomeus*, folitarius, pileo fubmembranoso, primo oblongo conico, dein campanulato, pallido, fubochraceo^ laevi; lamellis anguftis, linearibus, liberis, fulvo - cinnamomitis, haud deliquescantibus; ftipite longo, clavato, furfum attenuato, laevi, glabro, fubalbido, fibroso, cavo.

In fimeto equino rarius occurrit. Jul.

Caro alba. Pileus J poll, latus & Jub 1 poll, altus. Stipes ultra §\ poll, longus & Jub 5 tin. basi craffus.

1891. *A. Joenificiit lubgregarius*, pileo¹ fubxmembranoso, campanulato, fufcescente fulgineo. Itrialulo, vertice umhrino; lamellis fublatis nebulosis liberis^{*} demum nigrescentibus, Tub^{*} deliquescantibus; ftipite fublongo xenue basi fubincrassato pileo concolore fibroso cavo. *An idem c. Pers. SynopJ. pag. 411 & ejusd. Ic. & decript. Jung. Jajc. 2 p*g. 4* > ^aft. n. Jig. 1?*

In pratis, fimo vaccino. Septembr.

Pileus Jub § poll, latus & altus. Stipes u. tra 2j- poll, longus, f Un. craffus.

1892. *A. Jemiovatus*, gr[^]garius, fubfolitarius*, pileofubcarnoso, feimovato campanulato fuhvifc: do laevi fufco-flavescente; laraellis latis cin^f

560 *Cryptogamicu G. Fungi.*

reo fuliginosis ellipticis, poftice anguftatis, fu'attingentibus, demum nigrefcentibus Tub' defluentibus; ftipite longo cylindrico cinereo-giricante apice albido maculis & pu'ndis pulveraceis atris 'fitfrofo, cavo lineari. *Ag fimi-putris Bull. 1. Tab. 66. etji ftipes filiforrnis delineatus.*

In ftercore equino & vacdno legi. Auguft. Septembr.

Caro pilei fubalhida Jiipitis umbrino, Pileus if latus & fub equidem altus. Stipes 5 $\frac{1}{2}$ poll, longus, 2 lin $\frac{1}{6}$ crajjus.

p. pileo conico - caxnpnnulato; lamellis latiori* but, fuligineis, attingentibus; ftipite fublongo basi fubcraffiore incurvo. *Ag. papilionaceu* Bull r. 5 $\frac{1}{2}$ & fi. 561. f\$. 2.*

In iisdem locis Jul. reperi.

1895- *d* ciliaris*, folitarius, pileo carnofo, femio* vato-campanulato prirao pulvere niveo te&o dein vifcido, leevj, dilute argillaceo fubalutaceo, xnargine ultra lamellis prominenti; lamelli* latiffimis poftice anguftatis attingentibus cinereo-fufcis fubdeliquefcentibus; ftipite longo» bulbofo, furfum attenuate Lxve, colore pi' lei, fupra annulum pulvere atro pun(Stulato fibxofo, cavo lineari; annulo in medio ftipi* tis, reflexo, perfiftente, membranaceo. *Ag. ciliaris Bolt. Fung, 2 pag. 11. Tab. 53. Cart^o di/tindtus ab Ag. femiovato.*

Haud frequens hunc fungum hujus subdivisionis elegantissimum in fimo equino reperi. August.

Curo dilute umbrina. Pileus sub 1% poll. latus & altus. Stipes 5 $\frac{1}{2}$ poll, longus, bulbus sub 1 poll, crassus.

B. dimidiata.

a. Jtipitatae.

1894. *A. excentricus*, folitarius, pileo carnofo reniformi, globofo umbonato, piano, subvillosulo dilute umbrino striis obscurioribus variegato; lamellis latis, 4 plic. ferie, albis: brevioribus pollice rotundatis longioribus angustatis decurrentibus; stipite excentrico sub laterate, breviusculo furfum subattenuato ascendente bulbo valido tuberculoso compresso albido umbrino, carnofo, compacto.

Rarissimum hunc fungum inter lapides sepiaarii (ved Sorgenfrij inveni. Jun.

Caro alba. Pileus sub 23 poll, latus. Stipes a poll longus superne ad lin., bulbus ix poll, crassus

1895. *A. intermedius*, cepitofus, pileo subcarnofo reniformi infundibulo usque infra medium fissuris, badio umbrino, rargine flexuoso, undulato subinvoluta; lamellis latis, 5 plic. ferie, fissurato-plicatulis, rargine crenulatis, subochraceis: brevioribus rotundatis: longioribus angustatis decurrentibus; stipite breve, super-

net dilatato lamellis concolore excentrico submarginale, pervio: inferne subtuberoso fusco sublignoso folido. An varietas Ag. inconstans Pers Synopf. pag. 475? vel ejusd. Ag» dentati? quid?*

Ad radicem Betulae alb© una vice legi (*Bag' Jvccrd*). Odtobr.

*Caro dilute umbrino-ochracea. Pileus 5-4 poll, lotus. Stipes ij poll, longus, supernt 6? inferno 7/8 poll. crassus, in medio angustior**
 1896* *A. palmatus*, cepitofus, pileo camoso, Tub* fericeo, albido, inaequaliter finuato lobato lamellis carne pilei aequalibus 5 plic. feris linearibus postice angustatis decurrentibus pallidis; stipite laterale, Jepreffo brevissimo nigro-fusco, carnosum folido.

In palo Abietino equidem rarissimum hunc fungum vidi in horto quadam (*Jcegersborg*). Aug.
Caro alba. Pileus 3X poll, latus, Stipes Jub 1 poll, longus,

1897- *-d* oftreatus*, cepitofus, imbricatus, pileo carnosum subovato convexo, viscido umbrino fusco, margine subrepando subinvolutum; lamellis latis, pallidis, 5-4 plic. feris subdecurrentibus; stipite brevissimo, laterale carnosum folido. *Bull. 6. 508 quoad f01 mam.*

In trunco subputrido fagi. O&obr.

β. glaucum umbrinum, pileo coerulesco-glaucum, aetate difco flavescens-umbrinum; lamellis latissimis laxis repandis Tub 5 plic. feris brevioribus

rotundatis: longissimis poftice fubfinuatis fubdecurrentibus albidis. *Ag. nigricans Flor. Dan. Tab. 892 quoad formam pilei & lamellarum*>

In truncis nuperrime caesis Coryli & Crataegi Oxyacanthae frequens occurrit (i Charlottenlund).
Novembr.

Caro alba. Pileus 4-5 poll, latus. Stipes Jub 1. A poll, longus, ij poll craffus.

1898. *A. crispatus*, foliarius, pileo carnofo fubreniformi piano fubvifcofo glauco nigricante, margine lobato, lobis parvis crispatis crenulatis fubftriatis; lamellis latis laxis albis Tubdecurrentibus; ftipite breviffimo craffo albido fufco carnolo Tolido.

In trunco ceefo querdno. Decembr.

Caro alba. Pileus s| poll> latus. Stipes 1 poll, longus & craffus.

An varietas antecedentis ?

1899. *A. reticulatus*, cepitofus, fasciculato-imbri-
catus, fubvjfcidus, pileo carnofo, primo fubglobofo caefio - glauco demum explanato conv^{xo} nigro-plumbeo, margine fubrepando, involuto, albido; lamellis carne pilei aequalibus, 4 plic. ferie, fubrotundatis, fubdecur*
rentibus, dilute fufco-violaceis; Aipitibus breviffimis cralEs albido fufcis, firiis venofo-reticulatis elevatis obfcursoribus, carnofo folido.

In caudice Juglandis regie haud frequens vidi
rⁱ ~~Rosenborg~~ - *Have*. Noveinbr,

564 *Cryptogamia. G. Fungi.*

*Caro alba. Pileus 1j-s-af poll, latus. Sti-
pcs 1 poll, longus & equidem fere craffus.*

1900. *A. lateralis* cespitosus, imbricatus, folitariu*
que, pileo carnofo fubreniformi convexiufculo
levi ochraceo margine involute; lamellis aff*
guftis poftice' anguftatis adnatis pallidis; Ji'
pile brevifimo later ale, lamellis concolor6r
carnofo, compa&o. *Jacq. Miscellan. 2 pag-
no Tab 16. fig. 2. quoad defcriptionem 8
lamellas.*

Ad truncos arborum haud frequens {circa Bif'
Jcerod). Autumno.

*Caro alba. Pileus i& poll latus. Stipes fub
2 lin. fangus, 3 lin. craffus.*

(3. pileo fubobcordato, paulo majori; lamellis
ochraceis. *Jacq. I. c. quoad formam pilei,
y. pileo reniformi pallide albido; lamellis ochro''
levcis. Bolt. Fung 2. pag. 37. Tab. figig* *•*

1901. *Jl. fubfcs/ilis*, ccl'pitofus, imbricatus, pilo°
carnofo fubreniformi convexiufculo leevi, ob'
feu re umbrino, margine evoluto; lamelli'
usque ad infertionem fungi percurrentibu⁵
ochraceis; ftipite obfoleto.

Ad caudices arborum rarius. Autumno.

Caro alba. Pileus 2 poll, latus.

1902. *A. ftypticus*^ cespitosus, pileo carnofo, Tub*
coriaceo, orbiculari-reniformi, alutaceo, difc0
concaviufculo fubumbrino, margine involutor
lamellis carne anguftioribus linearibus venis⁹
convexis fubliberis cinnamomeis; ftipite, bre-

ve, laterale subexcentrico vel subcentrale, crasso compresso apice dilatato, **colore** pilei, carnofo, subduro, **folido**. *Bull 1 140 6? 6 557. 1. Flor. Dan. Tab. W*. Jig. I. C[^]rtc idem, etfi inter gramina inventus.*

Ad truncos arborum specimen mea legi. Autumno.

Caro pilei umbrina, stipitis pallida. Pilus sub 1/2 poll lotus & ultra. Stipes f poll & ultra longus, 5 lin, crassus.

1903. *A. farijiaceus*, cepitolas, pileo subcarnofo, difformi flexuoso plicato cinnamomeo-umbrino, pulvere farinaceo albo-caesio confuso, margine acuto; lamellis carne pilei subaequalibus, nee anatomofantibus, nee vasis[^]connexis, porrice rotundatis, liberis, pileo paulo dilutioribus; stipite brevissimo vel etiam subobsoleto, pileo concolore carnofo duricululo folido.

In truncis caesis subputridis. Autumno.

Caro umbrina. Pilus 1-a poll, latus.

1904. *A. mitis*, gregarius, subcephitofus, candidus, pileo rubcarnofo suborbiculatoneniformi, convexifculo subfericeo disco dilute umbrino, margine involute; lamellis angustis subaequalibus attingentibus; stipite brevissimo laterale apice dilatato, *Pers. Obj. Mycol 1. pag. 54 Tab. 5, Jig. k*

Ad ramulos dejectos Pini Laricis. Septembr.

368 *Cryptogamia. G. Fungi.*

Caro alba. Pileus 5 lin. & ultra lotus. Stripes Jub I lin. ad 1 lin, longus.

p. JeJfiles.

1905. *A. feifilis*, gregarius, acaulis fubrefupinatus; pileo fubmembranaceo, fubreniformi vel orbiculato, repando - finuato, fubtomentoso albedo; lamellis anguftiffimis fubsqualibus in puncto excentrico concurrentibus antice albidis postice fubrubentibus. *An Ag. pubefcen* Vahl Flor. Dan. Tab. 1073. fig. 2?*

In ramis putridis dejedtis. Autumno,

1906. *A. Epyxylon*, gregarius acaulis vel fubfessilis state refupinatus, pileo primo fuborbiculari convexiufculo znargine involuto, lemmum expanfo oblongo cinereo-glaucos; lamellis anguftiffimis fubaequalibus in puncto fubexcentrico concurrentibus. *Bull. 5^1. figs? Ag. applicatus Batjch. El. Fungorurfi Cont. 1 pag. 171. Tab. 24 Jig. 125.*

In ligno putrido dejedto. Autumno.

Caro albida. Pileus 3-4 lin. lotus.

1907. *A. fubverfusy* gregarius acaulis latere adnatus, pallidus, pileo carnofo obcampanulato refupinato laevi glabro; lamellis carne pilifublatioribus ovate - ellipticis, in puncto excentrico fubconcurrentibus.

In caudice Salicis, Novembr.

Caro concolor. Pileus ultra J poll, lotus cquidcm altus.

445. *Merulius*.

Pileus fTgura & fubftantia varia. Hymeniura fublamellofum anaftomofans, inferior? fuperficie pilei difpofitum; lamella: vel venæ tumidiufcula:, an-

I guftx.

* *centrales (pileo orhiculari)*.

I 903, *M. Cantharellus*, gregarius, folitanusque, pileo carnofo piimo fubglobofo depreflb demum explanato excavato fubinfundibulifoimi luteo ocliraceo margine repando, fublobato; lamellis anguftifimis decurrentibus, ftipiteque brevi craflb carnofo incurvo vjteilino. Flor. Dan. Tab. 264 Bull. 6. 505. fig- 1./«* ^A- *Canthardlo*.

In fyUis **frequent**, Autumno,

Caro pallida. PiLus 2- 3? poll latus. Stipes i-2§ poll longus, fuperne 1 poll inferne -J poll craffus.

J

1909

1. *M. undulatus*, gregarius, folitaiiusque, livido-pallidus pileo meaibranaceo-coriaceo priiao depreflb umbilicato, demum fubinfundibuliformi margitie ereao lobato vel incifo, crifpo; venis rugulosis; ftipite breve furfum fubincraflato. *Helvetia crifpa Bull 5, 465. fig- *•*

ll» fflginetis, **coryletii**, baud frequens (*ved Birker^d_y i Dyrehaveny O&obr.*

Pileus ix poll, latus. Stipes haud ultra i poll longus, if lin. fubcraffus.

^

*9io. *M. aurantiacus*, cepitulus, vifcoftis, auran-

B

" n; u nrimo convexo> deiu deprefto,

fubumbilicato flavo - virefcente margine repando deflexo, demuni explanato late umbilicato margine repando involuto aurantiaco, & nunc venis fubobibleris fubtus obfito; ftipite longo deorfum attenuate flexuofa, carnofa, cavo gelatina lutea repleto* *An. variet. Phal. marli*
Flor. Dan. Tab. 654. fig. 1.

In locis umbrosis humidis in pineto (ved *Fortunen i Dyrekavert*). OcVobr.

Caro concolor. Pileus femievolutus § poll, latus, plane evolutus i§ poll, latuq. Stipes 3r af poll, longus, fuperne 3 lin. craffus.

ipil. *M. lubricus*, fufcepitofus, glutinofus, flavovirens, pileo convexo, tuberculofo-repando, margine inflexo flavo; vents obfoletis; ftipite longo, fubcylindrico, flavo curvo, cavo, cum pileo gelatina olivacea repleto. *Helvetia gelatinoftt*
Bull. 5. 473. fig. 2.

An idem cum Phallo lubrico, Flor. Dan. Tab. fig? Pers. Synopf pag. 613 fub Leotia.

Inter folia tteje&a faginea in humidis locis fylvftorum (*i Dyrehaven vted J?ortunen, hvor Vandet lober af Fifkeparken ned til Ordrups Mofey*
 Novemhr.

*Caro ftipitis flavefce?is. Pileus $\frac{x}{2}$ poll, latus. Stipes .2j J>oll> longus, % lin. craffus**

1912. *M. cantharelloides*, cepitofus, iiccus, pileo carnofo - membranaceo prilao globofo demum explanato umbilicato, glabro, margine repando, fufco umbrino, zonis obfcori

inaneftis crasfiufculis fubdecurentibiw, luteis; ftipite lüblongo apice iübdilatato deorl̄mn in-
era (la to basi fubveimicofo, crasfiufculo, carnofo,
folido, lamellis concolore. *Helvetia cantha-*
ralloides Bull. 5. 473. fig. 3.

Ad radices Betulæ Alni (‰ *Basfvard Skov ved*
Söerü). **Jui.**

Caro pallida. Pileus f̄ poll, lalus. Stipes
1k P°l^z longus, basi \ \ lin. craffus.

1913. *M. tortilis*, folitaius, fubvifcidur, p.'jo car-
nof., exylfit^o, fubconvexiufculo, tnargine re-
pandd viref^ente-flavo, difco ftriisque fufco;
venis manifeftis crasfiufculis liberis pailidis;
ftipite breviufculo crasfiufculo deorfum incias-
fato, tortuofo ftriatOi carofo-fibrofo, fubcavo,
fufco.

In horto ad muros rarius, Oólobr.

Caro jlavo-virefcens. Pileus fub 1 poll la-
tus Stipes 1j poll longus, in/erne 3! lin.*
craffus.

1914» *M. conicus*, folitarlaş, vifcofus, **pile©** carnofo,
conico - campanulato, badio - ütbrino, margin*
fubæquali; venis obroletis, FerrUHineis liberis;
ftipite breviufculo deorfutn increflbto, lamellis
concolore, carnofo, foiido. *Phallus conicus*
Flor. Dan. Tab. 654. 1?

^{ll*} trunco putrido Betulle alba (ftagfv&rd). Oflb.

37° *Cryptogknuu. G. fuugi.*

*Caro pallide ochracea. Pileus fab \ potL la
tus & equidem aUus, Stipes i^ poll. longus
3 lin. injerne ccaffus.*

* * *later ales (jpileo dhnidiato).*

1915. *M. Alneus, gregarius, pi^o fubcoriaceo t
mentofu convexiufculo fub!obato isepe roulrin*
crenulnto, albido grifeo; vein's manifestis &¹
natis fubpurpurafcentibus; fripitebrevisinno
piano, duro, fublignofo pileo concolore.*

Alneus L. Bull. 4. 346. & 6. 581. fig. 1.

*Ad truncos Fagi fylvatico, Betulae Alni. Auruim¹
Perennis.*

Pileus 1J-3 poll, latus. Stipes if- 3 tin, long

1916. *M. mufcigenus, folitarius, fubgregarius,
carnofo - membrnaceo, fubreniformi, glabro, fub
cinereo-glaucio; venis manifestis aJnais, ftipi
teque breve, crasfiufculo, carnofo foliJo p^{lt}
concoloribus* Agaricus mufcigenus Ball. 3*

283.

In raufcis vivis parasitat (Bagfrcerft-Skot).*

Caro concolor. Pileus ± poll, latus.

15~5 ^z longus, i-| lin. craffus.*

1917. *flæ retrirugus, fubgregarius, folitariusque
pileo ineaibranaceo, tenui, fubrotundo,
bato, glabro, fesfili cinereo - glaucio; venis c^o
coloribus. Helvetia dimidiata Bull. 498- /*

*1. An fungus nofier idem cum He\vell& ^{1h}
branacea Holmfk. beat₇ rw\ P 2. pt*3 53*

Tab. 28?

In ramulis dejes, & tnufcis rarius reperi, 00b.

Pileus \-% poll, *lulus*,

- 19*8. *M. galeatus*, gregarius, feffilis, cinereo-pallidus, pileo membranaceo tenui galeato portice porredlo & adfixo, pilis raris breviffimis, appreffis, obfite, murgine fubcrenulato; venis obfoletis.

In mufcis, in fylvis (*Bagjvcerd-Skov*). Odob.

Pileus 4§ lin. \ poll *latus*.

1919. *M. aruginosus*, cepitofus, serugineus, pileo cochleato, membranoso - coriaceo, fubftipitato; venis fuboblitteratis; fiipite breviffimo. *

In trunco fubputrido (*Charlottenlund*), Odob.

Pileus 3 tin, *latus*, ultra 4^ lin. *longus*. *Stipes* 1¹ Un% *lojigus*.

*** *refupinata* {pileo toto adnato, cetate Juh-reflexo.}

1920. *M. lacrymans*, folitarius, aggregatus, pileo fubfifufj ovato obiongo vel orbiculari, margme tuberculofo, intus varicofo, lubtomentofo, albo; plicis paralleliter connexis, inaequalibus, lacrymantibus, flavo-ferrugineis vel rubefcentibus. *Boletus lacrymans* Wulf. in *Jacqu. Mifcel.* 3 pag. 111. Tab. g.

Ad afferes, trabes in locis humidis. iEftate &c

Autumno.

Caro alba. *Pileus* 4 - 5 poll, *longus*, £? *equidem* *latus*.

- 19*r- *M. vajiator*, fubfolitarius, orbicularis plaus pileo margine livliideo attenuato albo;

y

venis gyrosis subcrispis luteo aurantiacis, p[^]j
ripberiam versus subgranulatis.

Equidem in trabibus, afferibus, subputridis vidi¹
jstitate & Autumno.

Pileus i-if-2 poll. €? ultra latus.

1922. *M. tremellofus*, gregarius, imbricatus, &^s
filis, pileo cartilagineo membranaceo, pr^{imo}
piano effuso disco fere granuloso flavo, ina
gine tomento b)Tiformi albo, demum ref^{lexo}
lobato, imbricato, aurantiaco - rofeo raarp^{ine}
que repando albo tenui tomentoso vil 1[^]
fubtus venis crastiusculis, postice confert^J^{nl}
bus, antice distantioribus aurantiaco- erot^{eis}
Ffor. Dan. Tab. 776?

In fago putrido {Gcelfkov). Novembr,
Pileus I-1 - 2I- & ultra latus.

445. *Daedale* 1.

Pileus sububerofus, subdimidiatus, fessilis. Hy-
menium lamellosum: lamellae reticulatee sub-
stantia pilei. Pori vel finus inaequales & irre-
gulares.

1925. *D. quercina*, gregarius, subcespitosus imbri-
catus, pileo suberbo dimidiato, ligneo-p[&]
lenti, zonis obr^{ur}ioibus subelevatis, margine
repando; lamellis concoloribus anastomosan-
tibus; poris amplis elongatis ansulatis diffar-
nibusque. *Agaricus Quercinus* Lin.
Ag. labyrinthiformis Bull Tab. 442. 352

*Substantia fere concolor. Pileus 3 • 6 - 8 poll.
& ultra latus 3-3 poll', crustus.*

1924 > -O *gibbosa*, subgregarius, pallidus, pileo sub-
dimidiato, villoso portice gibboso angustiori
subporre, zonis elevatis margineque pallide
umbrinis; lamellis tenuis anastomofantibus;
poris minutis elongatis subdifformibus, sub
Hiarginem evanescentibus.

Ad truncos arborum. Autumno,

*Caro alba. Pileus a-JJ latus, a poll, fere
portice crustus.*

*925- *D. ferruginea*, gregarius, imbricato-conna-
tus, flavo - ferrugineo pileo primo subadnato,
albido, dilute xofaceo incarnato margine sub-
byffideo, demum reflexo horizontali portice
tuberculofo antice zonis obfcursoribus, mar-
gine flexuoso tumido albo villoso; lamellis
angustis flexuosis anastomofantibus antice ob-
foletis; poris fatis amplis difformibus.

J*1 Hgno casto subputrido Fagi fylvaticae. No-
vembr. Decembr.

*Substantia coriacea carnea. Pileus 5 polh
latus 1J lin, & ultra crustus.*

447, *Boletus*.

A. ftipkatm.

a. centrales,

a, carnoftB,

• *ftipite annulate,*

I rtR* -S. *annulatus. foHtarius*, subgregarius, vifc<<-

574 *Cryptogamia. G. Fungi.*

fus, pileo prhno pulvinateo demum-explanat' iubconvexiufculo, luteo, maculis & ftriis ^{ru-} *ru-* *fis* virgato; fubtus convexus luteus poris ^{ro-} *ro-* *tundis*; ftipite breviufculo fuperne dilatator basi fubiucraffito, fupra annulum flavo, *punc-* *tato*; infra cumque annulo dilacerato *patulo,* *fufco-umbrino.* *Bull. Tab. 552. An idem* *cum B. annulato Hor. Dan. Tab. 135?*

In muftosis, ericptosis, in pinetis haud frequent Septembr. Odlobr.

*Caro albida flavefcens. Pileus 5J poll ^ latitf**
Stipes 2z poM longus, i poll, basi crajjus,*

1927. *B. decurrens*, folitarius, vifcosus, pileo p. ul-
vinateo vix umbilicato maxgine fubflexuofoi
ferrugincj-luteo; fubtus concaviufculus, po-
xis pallefcntibus luteis, rotundis fubdcut'
rentibus; ftipite longo craffiufculo, fupra an*
nulum coarAato, primo luteo demum *fufco*
badio ftriato *punc5tato*; annulo parvo bail *ru-*
befcenti.

In muftosis pineti ^f*ved BirJieröd*) rarius. *Jul.*

Caro lutea. Pileus 5-4 poll, lalus. Stipes
ad 5 poll, longus, baf | poll & ultra era⁵
Jus.

1928. -5- *elegans*, folitarius greg&riusque vifcofa⁵,
pileo pulvinateo acute umbonato ferugi^{ac}*CI-*
aurantiaco ftriis obfcuiioribus virgato; *fubtus*
concaviufculus fubplanus poris *pallide-luteis*
ratundis minutis; ftipite lonso *deorfum fub*

¹ *incrassato, apice dilatato fubilriato anxmloque dilacerato erecto luteo.*

In locis humidis pineti (ved Birkeröd). Octobr.

Caro pallide lutea. Pileus sub 4½ poll, latus. Stipes 4! ad g poll, longus, basi sub 1 poll crassus.

*** ftipite annulo dejütuto.*

^{1929.} *B, floccopus, gregarius, folitariusque { pileo pulvinate subhemisphaerico griseo, tomento fasciculatim in conos congesto obfiteo, xnar-gine tumido lanato; subtus planus: poris al-bidis; cortina linata primo tedis; ftipite lon-go, crasso, primo cinereo dein fuligineo ni-grescente apice albido, tomento denso covti-östto. Flor. Dan. Tab_n 1252. y4n diversa a B\cinereo Pers. Synopf pag. ^04?*

In faginetis haud frequens (ved Birkerdd, Char-lott<mlu\l). Septemb. Octobr.

Caro qlbida, fedfa max cum tubulis ruhefcu Pileus 4½- 5 poll, latusy Stipes 6 poll, lon-gus, i& poll, fere crassus, basi haud angu-ftior. Totns fungus mate nigrescit.

^{1930.} *A Jcaber, gregarius fcilitariusque, pileo pulvinate hpmifyhaerico cinereo-umbrino; sub-tus convexiufculus: poris mUutis retundis Pallefciente-albidis; ftipite longo crasso rurfum attenuate basi subincurvo, albido, villo ftriato r⁹ticulato ni^rescente ' obfiteo. Bull. 2. 132-*

In faginetis haud infrequens. Septembr, ^{Octob}
*Caro alba. Pileus fere 6 poll, lotus. Slip
 5-7 poll, longus, basi **18-3** poll era/Jus*

1931. *B. bovinus*, gregarius, folitariusque, ^{pileo}
 pulvinato, hemisphaerico demum subplanO
 flavo-umbrino glabro; subtus convexus luteus
 peris amplis, angulatis; stipite brevitercul*
 deorsum subattenuato flavo, medio rubescens*
 vel rubro reticulato striato. *Boletus h* ^{bovinus}
L. fp. pL pag. 16/tf. Sc^{ff}- Fung, 3 ^{Tab.}
112. J%, a. *Boletus co?nvnis* Bull. 4. 395.

In pratis fylvaticis. Sub fmem feRatis.

Caro pallide rubescens, Pifeus 5-5 poll, la-*
tus. Stipes 1 poll & ultra longus, ^{superne}
 v"1 poll, *erarius.*

Var, p. stipite cylindrico, luteo. Flor. Dan.
 Tab. 1074,

y* pileo subtomentoso stipite luteo *B. subt^r*
mentofus L. spec. pi. pag. 1647.

1932. *B. chrysmtherinus*, . gregarius, pileo priiti^{tf}
 hem[^]sphaerico demum piano subdepresso gla-
 bro badio rubroj subtus convexus luteus: po-
 ris majusculis subrotundis; stipite brevitercul¹⁾
 subcylindrico apice dilatato, pileo concolo
 superne dilute flavescens. Bull. 5, 490.^{^^}. 5'

In faginetis. Autumno,

Caro pallide flavescens immutabilis. Pileus
haud ultra 2 poll, lotus cum stipite ^{equidem}
alto. Stipes medio \ poll, fere crassus.

1933; *B. cinnamomeus*, fparsus, gregarius, pileo pulvinato bemirphcrico ad ta(5tum rnolli, fu> fco* umbriuo; fubtus convexus, rubro-cinnamomeus poris rotundis; ftipite longiufculo cylmdrico rubefcente apicem verfus flavefcente. *An B, rubeolaris Bull, 5, 4^0, 1.*

In pinttis haud iijlrequens, Autumno.

Caro pa Hide flavejens immutahVis, Pileus 1~^a poll, latus. Stipes 2-3 poll. Ion gut, 3 tin, crajjus,

1934 f. *B. tuberosi* fparfus, pileo pulvinato fubhemilphocvico, rubro badio glabro, margine liinc uide fiffo; fubtus planus badio-cinnamomeus: poris rotundis: tubulis a ftipite diftantibus; ftipite breve ventricofa apice coarctato purpureo rubro, basi pallido.

In fail i net is haud frequens. Autumno,

Caro lutea fedta mox rubefcit, Pileus a-a1 poll, latus. Stipes 1J poll bngus, ij poll traffus.

1935 i- *B. caftaneus*, gregarius, fubcefpitofus, pileo primo pulvinato, deraum piano villofiufculo; **fubtus** convexus primo albidus, demum luteus poris minutis: ftipite longiufculo fub**bulholo** furfurn attenuato, pileo concolqre basi crocato fulvo fublacunofo* *Bull, 4. 32S*

In faginetis minus frequens. Autumno.

Garo *alba immutabitis. Pileus 4^-5 poll latus. Stipes 5 - 4f poll longus, mferne 1 - i J*

poll crallus.

1936. *B. crajjipes*, fparfus, piTeo primo pulvinat
 fubvillofo umbrino, demum piano flavo-ochra-
 cep difco maculis obfcurionbus, fubrimofo,
 margine umbrino, incifo; fubtus primo pla-
 nus albus, demum convexiufculus carneus:
 poris minutis fqtundis, tubulis flavis ftipite
 diftantibus; ftipite breve craffiffimo fordide
 carneo fubreticulato.

In faginetis rarius. Septembr.

Caro alba irnmutabitis. Tileus pulvinatus 4
poll, tot us explanatus vero 6 poll, latus. Sti-
pes 2℥- 3 poll, longus, 2℥ poll, craffus.

b. coriaceee.

1937- & *perennis*, fparfus, fubgregarius, pileo fub-
 cyathiformi demum fubplano cinnamomeo,
 7onis ftriatis cum margine obfcuriorij fubtus
 dilute fufco - ochraceus: poris minusis integris
 vel laceris; Aipite breve, poris concolore, basi
 craffiore fubnigricante. *Bolet. perennis L.*
Spec, plant, pag. 1646. Flor, Dan. Tab. 1075
fig. 2.

In fylvaticis rarius. Septembr.

Subjiantia fiifca. Pileus ij - a poll latus.
Stipes ii poll, longus, fub- 3 lin. craffus.

IS53- *B. confluens*, gregarius, circinnatus, fubce-
 fpitofus, pileo primo fubcyathiformi, demuit¹
 explanato, ferrugineo-badio, zonis Ctriatis ob-
 fcurioribuS, margine indfo fublobato; fubtus
 albido - lubochraceus: Doris minutie tam in

tegris quam fublaceris; ftipitibus lungiufculis.
 tomento fiurrugineo denfo veftitis, angulatis,
 fubtortilibus deorum incrdfutis & uti pilei
 feptius connatis. *B. leycoporus Holmjk. b₇, r*
Qt, 2. pag. 57. Tab. 50. An. diver/a a Si-
ftofiremate confluyente Pers. Synopf. pag. 551?
 In alnetis, faginetis ad terrain rariifimus [*Bag-*
fv&r&s. OAubr.

Pileus \-i poll. & ultra latus. Stipes fub
2 poll longm, 2 Hn. crajfus.

β. exccentricx vel later ales,

** Jirnplices.*

1939. & *Bugbsfum*, folitarius, fubcerpitofus, pilco
 carnofo, primo globulofo, fubtuberculofo au-
 rantiaco, pundis elevatis fanguineis, dein
 lingusformi, hinc inde tubulos gerenti, de-
 mum explanato, convexo, fublobate, fubafpero,
 vifcofo, fanguineo - badio; fubtus concaviufcu-
 lus lutefcens: poris minutis; tubulis inter fe
 liberis, orificiis globulis coronatis; Aipite bre-
 virfimo craffo, tuberculofo - lacunofo colore
 pilei vel carneo maculato. Flor. Dan. Tab.
 1136 & H37«

• Ad truncos quercinos & fagineos haud infre-
 tjuens. Septemb. Odlob.

Caro gelalinoja₇ fucculenta, rubro Janguinea
maculata & firiata. Pileus 4-5 poll. Iatus.
*Stipes 1-3 poll. bngus, ij*2 poll eraffus.*

580 *Cryptogamia. G. Fungi.*

1940. *B. lucithis*, fubaggregatus, pileo coriaceo, fuborbiculato - reniforrai, convexiufculo nitido coucentrice fulcato; lubtus planus poftice convexus albus: poris minutiffimis: tubuli* fatiſ lungis connexis carne pilei znulto longioribus umbrinis; ftipite breve crasfiufculo fubilexuofa. Flor. Dan. Tab. 1*53.

In trunco fubputrido alneti (j Charlottenlund) jar i us: Autumno, (*Perennis*).

«
Caro albida, Pileus 5-5 poll, latus. Stipes I-a poll, longu&y £-1 poll, craffus.*

J941- ^ *CalceoluSy* fubcefpitofus, folitariusque pi* leo coriaceo, irregulari, lublobato, flexuofa, piano, luteo-ferrugineo, antice ftviis obfcurioribus virgato; fubtus fubplanus pallidus: poris minutiflimis: tubulis breviffimis; ftipite breviffimo vel fubnullo, cra/fo nigricante, lateralc, vel fubexcentrico. Bull. 5. 445. fig 52
vi truncos fubmortuos cjuercinos. Septembr^ Odlobv. (*Perennisu*

Suhftantia pallida. Pilots 3-4 poll latus. Stipes' £,£ poll. longus, fub 1 poll, craffus.

1942. -*B. lateralis*, fubcefpitofus folitariusque, pileo coriaceo-carnoTo, irregulari fublobato nonnumquam orbiculari vel obovato, luteo ochraceo, ldevi, margine fubflexuofa; fubtus fubcotf, caviufculus albido-pallidus: poris minutiffimis' tubulis breviffimis; ftipite breviffimo craffi* ulculo basi fubnigricante, laterale vel ~~1023. fig. 1.~~ xcentrico. Flor. Dan. Tab,

Ad truncos prsefertim fagineos legi. Ortobr
(*Peremiis*).

Subftnnlia pailida preccedenti multo crdjior.
Pileus 2-3-5! P⁰^ to''- Stipes J-if poll,*
longus, 2 tin. vel ± poll, craffus.

¹943* A *fquamofus*, folitarius fubcefpitofus, pileo,
ca/nofo cordato fubovato, fubplano, luteo fer-
rugineo, fquamis verfus marginem Tubevane-
fceptibus obfcursoribus obfito; fubtus autice
concaviufculus poftice convexus, pallidus: po-
ris minutis fubangulatis: tubulis brevLTimifi
in flipite dccurrentibus; ftipite breve craffo
laterale, tubulis umcolore. *Flór. Dan, Tab.*
irg6.

In truncis Fagi fylvatic©. Julio & Auguft.

Caro alba. ^ Pileus ultra 5-6 poll, longus.
Stipes i-i& poll, lojigus, 1 poll & ultra
craffus

*944- *S. maximis*, cefpitofus, pileo carnofo cor-
dato -rehiformi cohvaxiufculo, poftice conca-
vo, pallid.: fquamis numerofiffimis, poftice
minoribus denfioribus, nigrefcente - fuligi-
neis, adpreffis, obfito; fubtus concaviufcu-
lus concolor: poris niinutis angulatis in fti-
pite majoribus evanefcentibus hinc quasi re-
ticulum formantibus: tubulis brevisGmis in
ftipite decurrentibus; ftipite brcvi, craffiffiino
fubcompreflb, fub nigricante fuligineo.

In caudict Aceris ffeudo-Platani, Ortob No-

Caro pallida > *Pilcus* 4-8 poll & ultra t
tus, *Stipes* a poll, longus, if-a poll, *cras*
*fus**

1945- & *pl&typonis*, *cephitofus*^ *imbricatus*, *ful*
folitarius, *pileo* *carnofo* *fubfuberofo*, *renifo*^
mi, *convexiufculo* *pallido*, *estate* *fuhochraci*
fquamis *numerous* *umbriiio* *fuligineis* *ad* *pres*
Hsobfito; *fubtus* *planus*, *aatice* *concaviufci*
lus *albido* *pallitus*: *poris* *inagnis*, *lacuna&i*
mibus, *angulosis*, *diformibus*: *tubulis* *brei*
bus; *ftipite* *breve* *vel* *iiullo*, *crailiufculo*, *bt*
fufcefcete, *laterale*. *Quoad* *deferiptiomi*
idem *c. B. platyporo* *Pers. Synopf* *pag. 52 r*
quoad *citationes* *autem* *certe* *dijiindlus*.

In *trunco* *Salicis* (*ved* *Lundehufet*) *fub* *finei*
aestatis & *autumno*. *QPerennis*).

Caro *alba*, *I*ileus* 4-5^ *poll*, *latus*. *Stipt*
fub *ii* *poll*, *longusy* *1* *poll*, *fere* *crayjus*.

** *ramosæ*.

1946. 3.. *imbricatus*, *frondofus*: *frondibus* *imbi*
catis *lobatis*, *difco* *ochraceis*, *inargine* *Ulm*
brino *ftriatis*, *fubplicatis*; *fubtus* *albiilus*: *po*
ris *minutis* *fubangulatis*: *tubis* *brevissimis*
fiipitite *ramofiffimo*, *craffo*, *albido*, *lacve*. *Bui*
4. 566.

la *truncis* *fubputridis* *arborum*. *Septemb.* *OdU*.

Caro *alba*. *Fungus* *totus* *y-g* *poll*. & *ultf**
Iatus.

¹⁹⁴⁷« *A giganteus*, cepitofus, primo ex conjunct
 basi stipitibus plurimis, erectis, albido - palli-
 dis compressis subporiferis, carnosis, pileis ob-
 longis flexuosis convexis basiis; deram stipi-
 tibus elongatis planis xhagis magisque latio-
 ribus marginibus involutis subinfundibulifor-
 mibus in pileo cephaleato, explanato, erecti*
 ufculo, umbrino-badio, zdato, xnargine re-
 voluto, repando vel etiam sublobato, pallido,
 dilatatis: ppris mi nut is pallidis. *B. acanthoi-
 deus Bull. 5- 486 ? Clavaria ccquivoca Hohnjk.
 beat, rur. ot. 1. pag. 51 Tab. 15. fine dubio
 nil aliud, quam fungus nqster in ftatu juni-
 ori, quod Japius obfeivavi.*

Ad radices truncorum putridorum aut in ejus
 vicinitate. Septembr. Octobr.

(7rex hujus fungi ad lalitud. 3 ped. & ultra
 altitudin 1 - if ped. crejciu Singulus pileus
 3-5-6 poll, latus.

¹⁹⁴⁸» *B* ramofus*, cepitofus cQrnofus, pileis sub.
 orbiculatis depressis, concavis vel umbilicati"?,
 margine flQxuoso-repandis convexis, fufco-oc'ra-
 ceis; stipitibus ramoiislimis superne inci aflat is
 poriferis cum poris pilci pniididis, Flor. Don#
 Tab. 1x97.

Ad terram nudam in fagineto circa (*Birkerödy*
 una quadam vice invent, Octob, Novembr.

Caro alba. Cesper 6-7 poll, latus & equi
 dem altus. SingulU Pileus if poll, latus.*

B. feffilei.

a, dimidialai,

1949. £• *caudicinuS*) cepitofus, imbricatusj pilei*
fublobato-repandis convextullulis, **fiavis**: jum-
oribus basl rubro-aurantiacis; veterioribus um-
brino • lUbzonutis; fubtus fulphurco-luteus: po-
lis minutis: tubulis brevisiimis. *B. Julphureu*
Bull. 5. 429. Mor. Dan. Tab. 1019P

Ad fagos fubenioreuos. Septembr. Oſtoabr,

*Caro alba Juperficiem Juperiorem verſus di-
lute rubefcens* Fungus tolas 8 poll. & uliri
latus.*

iEtate marcefct albido-pallidus fit 6c friabilis

1950# l?. *pubefcens*, cepitofusj imbricatus, pileo con-
iiofo-fuberofe, pulvinate, pubefcenti, feiceoj
al^o, undulato-tuberculofo, margineque acuro
luteo fubfeirugineo fubionato; fubtus plaims
albido - pallefcens*. poris minutis mavginem ver-
fus evaiifceentibus: tubulis brevibus.

In trunco Betul« albs (*Bagvield* . **Juk**«,

*Caro alba. Pileus ij*af poll, latus, 3-3
tin. craffu\$¥*

1951. *B. populiniiS*) cepitofus, iinbricatus fubftan-
tia ftipiriformi fubdecurrens, albus, pileo car-
nofo - fubeiofo* convexiufculo, villofiufculo mar-
gine obtufo, tumido, rep^ndo; poris fubminU'
tis marginem verſus evaneſcentibus.

In candice Populi alb.? *QJctgersbor^*. Novbr,

Cora alba. Pileu 1^5 poll, latus, | - | poll.*

chaffis.

195** #. *fvaveolens*, folitarius, fubgregarius odoratus albus, pileo cainofo - fuberofo, craftb, fublericeo, fubtus piano; poris fubmajufculis; tubuiis fubinsqualibus, magis minusve prominentibus, *Enslin tJdjferiat, de Bolel fvaveo-Lente c. Icon. .Bull. 510. A,*

Ad coudices Salicum minus frcquens, Autumno. Hyeme. (*Perennis*X

Caro alba. fileus 5-4 poll, latus, i| poll, & ultra trajfus, AUtate jufcefcit.

1953. *B. betulinus*, folitarius fubgregarius> pileo cainofo fubeivlo, fubreniformi poftice fubumbonnto, fuligineo-fufco, pubefcenti margine tumido, fubtus antice concaviufculo, albido: poris minutis: tubulis brevisfimis, *æqualibus.* Flor. Dan. Tab. 1254,

Ad truncos prefertim Betulse (*Bagfucerd*). Autumn no.

Caro alba. Pileus fub 6 poll, latus.

1954. *B. igniarius*, cepitofus* fubimbricatus, pileo fuberofo, reniformi, convexo, badio-nigrefcente: tuberculis concentricis, maigine rumido cinnabarino -rubro; fubrus planus, ochroleucus; porii minutis rotundis: tubulis longis. Flor, Dan. Tnb. 953.

Ad truncos flrborum. Autumno. (*Ferennis**).

Subftantia umbrino ferruginea. Pileus 4-5 poll, latus, fub 2 poll, poftice craifus,

1955* & *jbmentarius*, cepitofus, fubimbricatus, pileo fuherofo, fubreniformi - pedatp : tuberculis¹ concentricis cinereo vel fuligineo zonato, margine ODtufo, fubtumido, interdum luteo ferrugineo vel fpa'dtceo; fubtus planus primo csefioglaucus deorsum umbrino - cinnamomeus : poris minutis rotundis: tubulis longis. Bull, Tab. 401. 491. fig. 2 & 434,

Ad truncos arborum in fylvis frequens* iEflatc autumno.

Substantia umbrino ferruginea. Pileus 4-9 poll & ultra longus, 3-5-6 poll postice craff.
Provenit tuberculolus, lobatus, levis, ad tactum mollis, rore csefioglaucobdus, lacrymans
Odor panis nuper coeli baud disflmilis.

1956* *B. velutinus* fubcepitofus, pileo fuherofo* fubreniformi convexiufculo villoso flovo ferrugineo; fubtus planus pallide unibrinus, margine tumido ravescente: poris minutissimis: tubulis brevibus, dilute umbrinis.

Ad truncos Salicmn (ved Frederichsberg). Oab. Novembr.

Suhtatitia umbrina cirinamomea. Pileus 3 - 5 poll. latus, fub 1 poll, craffus.

0. pileo badio zonato, poris fubalbidis. Flor. Dan. Tab. 1158.

1957* & *Ribi*, cepitofus, imbricatus, pileo fuherofo reniformi villofiufculo umbrino • junioribus interdum virefcenti antice umbrino s

planus luteo ferrugineus: poris minutiffimis rotundis: tubulis brevibus.

Ad radices vetustos Ribis rubri (paa J&gersborg"). Septembr. Octobr. (Perennis).

Substantia ferrugineo - aurantiaca. Pileus 1 1/2 poll, latus sub 5-4^ lin. crassus.*

1958- ¹B. *coeruleus*, subgregarius, Cubimbricatu*, pileo carnofo, subreniformi, postice subcontracto levi, glabro, ad tactum molli caeruleo-glaucos margine flexuoso acuto; subtus planus, cinereo - pallidus: poris minutis rotundis vel fittongulatis.

Ad truncos caesos quercinos. Decemb.

Cat^o ochracea. Pileus 2-3 poll, latus, 1 1/2 poll, crassus.

¹1959- *B* concentricus*, cepitofus, hmbricatus, pileo carnofo - subferofo, reniformi, convexiusculo, postice tuberuloso granuloso, villis pilulifertis, dilute fulco, margine acuto, subfusco jii^ricante zonato; subtus convexiusculus **zona marginali** concolore, margine caelato: poris minutifertis rotundis: tubulis breviffimis.

In trunco putrido Fagi fylvaticae. Oblob.

Substantia dilute fusca fasciis concentricis {perpendicularibus} obfcurioribus. Pileus 1 1/2-3 poll, latus, 2-2 1/2-4 lin. crassus.

1960. *B Placenta*, cepitofus, subgregarius, pileo coriaceo, femiorbiculato, piano, annulis concentricis elevatis, tomentoso - villosis, disco ci-

388 *Cryptogamia. G. Fungi.*

flavo subferrugineo zona*o tumido; subtus planus disco fusco - pallido, versus marginem fusco-cinereus, margine albidus: poris minutis subangulatis: tubulis subbrevibus griseo albidis.

Ad radicem trunci Fagi sylvaticae (r *Ermelund-Jioveii*)_m Jul.

Substantia pallido - albida. Pileus 5-4 poll. latus 3~4£ Hn. craffus.

1961. *B. varjicolor*, cepitofus, imbricatus, villosus fericeus, coriaceus pileis orbiculato - reniformibus plerumque postice coarctatis, elevatis, annulis concentricis antice planis subundulatis fusco cinereis, zonis ferrugineis, vel umbriatis vel purpureo-badiis; subtus planis albidis eetate subochraceis: poris minutis rotundis: tubulis brevissimis. Bull. 1. Tab. 86. Bolt. fung. Tab. 81. Schaeff. 3. Tab. 268.

In truncis & radicibus fumaridii. Autumno & hyeme. (*Perennis*'').

Substantia albida. Pileus magnitudine varia. p. pileis postice tuberculis ochraceis, margins concolore, badiozonato.

Hanc varietatem mensib. Mart. & April, inveni.

1962. *B. angulatus*, cepitofus, imbricatus, coriaceus villosus fericeus, pileis orbiculato reniformibus postice coarctatis, cinereis, zonis angustis fuscis; subtus albis planis: poris minoribus angulatis: tubis brevissimis*

In iisdem Jocis cum antecedent! *nee* eodem tempore legi.

Caro alba, Pileus magnitudine varia.

3963, *B. plicatus*, cepitofus imbricatus, coriaceus villofus fericeus, pileis planis, postice subcon-
caviufculis coarctatis disco badio umbrino^
margine albo flexuoso subplicato j subtus pla-
nus, albus: poris minutis rotundis: tubulis
brevissimis.

In caudicibus & **radicibus** c. ortuis/ Autumno,
*Caro alba, Pileus magnitudine variat**

1964, *B. cefcius*; Iolitarius, gregariusque, pileo car-
nofo subfuberofo, plerumque orbiculato disco
conve. vufculo ut plurimum adnato, albido-cae-
lio; subtus tonvexus albus: poris minutis ro-
tundis tubulis f«blongis. An idem c. *B. cse-*
fio Pers. Synopf. pag. 526^

In ramis aridis & ti-uucis Pini Abietis fylve-
flris & Laricis* Autumno (*Jub perennis*).

Caro alba, Pileus 4-i polL latus? 2 lin.
crassus.

j3. *refupitiae* e.

1965, *B. cryptarum*, gregarius, pileo coriaceo-fp^n-
giofo fnborbiculari, tomentofo-fericeo, sub-
zonatoj subexcentrice adnato, vel etiam ernico,
margine repando, subflexuoso, subtumido; sub-
tus primo albido - cefius dein fuscus, refplen-
dens, iarymans, demum dilute umbrini;
poris minutis rotundis: tubulis brevissimis.

59° *Cryptogamia. G. Fungi.*

In trunco cavo Fagi fylvatira. Sceptb. O&br.
Substantia umbrina Jubjiriata. Pileus & poll.
& ultra lotus, 1 poll, subcraffus

1966. *B. cinereus*, gregarius, pileo coriaceo, tenuis ovato, fubeffufo, fufco - umbrino fub ia centro ajlnato; fubtus Tub concaviufculus Tubrimofus grifeo - cinereus margine ftriatulo fubincifo: poris minutiffimis rotundis: tubulif breviffimis.

In palo fubputrido Pmi Abietis. April.
Suhftantia badio umbrina. Pileus 1-2 latus,
ji₂ lin. crajjits.

1967. *B. Medulla Panis*, gregarius pileo coriaceo, tenui, oblongo effufo, fufco zonato adnato, demum margine foluto flexuofu; fubtus albi-
au[^] concaviufculus inaequalis: pori[^] minutis
fubrotundis: tubulis breviffimis fubobliquis.
Jacq. Mifc. 1 pag. 141. Tab 11.

Ad truncos aridos, ad ligna fabrefa&a. /Eftate
& autumnu. (*Perennis*).

Suhftantia albido- umbrina, Pileus 2-4 poll
& ultra lotus , 1-2-4 ^n- craSf^{uS} ^

1968. & *nigricans*, folitarius, pileo coriaceo, tenui, ovato effufo, adnato, margine libero; fubtus planus fufco nigricans verfus marginem diutior: poris minutiffimis aequalibus: tubulis bnjviffimis. *B. pelleporus* Bull. 501 fig. s.

Ad alferes in locis humidis dejeAos haud frequens. Eftate.

»
Cryptogamic L. G. Fungi. 59)

Car a fufca. Pileus Jub 2\ poll latus, if lin. craffus.

1969. *B. Mollufcus*, Iblitarius, gregariusque, pileo fpongiofo, molli, tenui, albido, effufo, margine byflino, venofim repando, fterili; poris minoribus, angulatis: tubulis fublongis reddis. Ad palos, afferes ad terram in humidis dejectos. Auguft. Septemb.

Caro pallido-albida tenuiffima. Pileus 3-6 poll, vcl ultra lotus, 2-4 lin. craffus.

1970* *B. tunicatus* gregarius, pileo fubcarneo ovato-oblongo effufo tenui, albido, xnargine fublato fierili, tenuiori candido; poris minutis rotundis: tubulis breviffimis obliquis.

Ad trabes, palos & afferes fubputridos. Vere. {*Perennis*).

Caro alba. Pileus 2-4-6 poll longus, 1 lin. Jiaud craffus.

0. xnargine fubbyffino irregulari, difco albido-luteo xnaculato.

1971. *B. incarnatus*, gregarius, pileo fubcoriaceo difformi eftufo, margine fublibero fublobato: labis albidis poftice viridefcentibus, antice fufco Tub rubra zonatis^ fubflexuosis; fubtus purpureo diffo pallido fubincarnato: poris minutis, angulatis, tubulis breviffimis.

In trunco putrido abietino (*Bagfvard*). Septb
Caro dilute purpurea. Pileus 2-3 poll & ultra latui. 1 lin. fere craffus

39 2 *Cryptogamia. G. Fungi.*

448 *Sis toft re ma.*

Pileus figura varia. Hymenium tubulofum: tubuli conne\? primo oftoli eequali, demum auj tern prrcfertim ad bafin & in medio fungi la^ ceræ & quafi, dentiform^s.

1972, *S cinercum*, grt'garius^ imhricatus, pileo fu berolo, dimuii.ito-dcturrenti, villofo tomeu tolo, cinereo - ochracea umbvino zonato, in feme < merco; poris rnajuiculis^ Boletus uni color BuK i. ficr, 3 & 408..

^d truncos, aridos. minus freqwens. Autumno. (*Perennis*).

Subftantia Juhalhida, Pileus vel tot us fun gus 1½ - 2 - 3 poll, latus, 1 lin. haud ultra craffus.

449 *Hy dnum.*

Pileua figura & fubftantia varia. Hymenium echinatum leu *in* dented fubuliformes integros. prominens.

1973. *H. imhricatum* % fubgregarium % ftipitatum pileo carnofo orbicuiari, umbilico infundibu liformi, ochraceo: Tqivamis in difeo confer tiovibus, craffis, fubrevolutis, pbfeurioribus; dentibus fublongis copruleo- fufcis; ftipite fub longo, craffo, pileo, concolore, apice dilatato, // *cervinum Schccjf. 2. Tab. 140.*

in dumeus ad terrain (inter Lyngbye €? Fri- dericksdal') ubi rariffima lifficce fpecies a *Cel Fahl* detecta. Octob.

Oaro alhida ochracea basi ftipitis paulo obfcurior. Pilots ultra 5 poll, latus Stipes equidem altus, basi 1 poll, crajjus.*

1974. // *rcpandum*, gregatium, ftipitatwm, incarnato pallidum, pileo pulvinateo tuberculoso flexuoso sublobato, glabro, fuUus concaviufculo; dentibus craffiufculis brevibus subcomprefsis; ftipite breviufculo craffo subbulbofo; subexcentrico. Flor. Dⁿ. Tab. 510. Bull. *. 172.

in fylvis frequens. Autumno. •

K

Caro albido-pallida. Pileus 2-4 poll, lajus Stipes 2-2J poll, longus, t-if poll, basi crajfu?*

1975' &• *aurifcalpium*, gregarium, coriaceum, ftipitatum pileo lemiorbiculari hirsuto tomentoso, subradio: zonis concentricis obfcurioribus, subplano, subtus convexiufculo, albido-caefio demum fusco umbrino dentibus brevibus; ftipite sublongo, apice ajugustato villo subferrugineo obfeto, excentrico vel plurimis laterale. F/or. Dan. Tab. 1020 fig. 1.

In ftrobilis Pini fylvestris. ^utumno. {Perennis'}

1976 *Substantia urtbrina%* Pileus sub £ poll, latus, Stipes ij poll, & ultra longus, 1[^] lin. basi craffus.

tum, cinnabarinum, gregarium, subglobosum, subimbricatum

594 I *Cryptogamia. G. Fungi.*

piliferis fparCis^ obfita, fubtus piano i dentibus
fublongis tenuibus.

In trunco putrido Fagi fylvalkae (*i Chariot I en
lund*). Septemb.

*Caro alba. Pileus 2J-2J poll, latus, 1-1
poll craffiis.*

1977. *H. crujiolum*, feffile, effufura, albidum te-
nue, pileo oblongo; de'n'tibus breviffimis era-
fiufculis obtufis fubobliquis. *An Hydnum
monbrtmaceum Bull. 5. 481. Jig, 1?*

In ligno putrido autumnmo. (Perennis').

*Subftantia Jubcoriacea albida, Pileus 2-23]
tatus.*

1978. i? *minutum*, feffile, carnofum, minutum,
pileo planiufculo, iilbido-ochraceo; dentibus
ratiune fungi longis, inaequalibus eoncoloribus.

*In palo abietino iUbutrido (i Lfyrehaven ved
Gicrdct omkri?ig Blantttgen ved Fortwicn). Odlb.*

Caro albida. Pileus fub \ lin latus.

1979⁽ •K *mufcoides*, feffile, ramolum, carnofum
pallidum, pileo mox ramofirrimo : ramis fub-
longis Hexuoiis, ramofis fubfaftigiatis: ramu-
lis inferne dentibus longis, curvis obfitis.

In ligno quercino. Novemb.

Sub ft ant i a concolor Fungus tot us 1 - 2 poll,
& ultra latus.*

450. *The leph or a.*

Pileus coriaceus vcl ceriaceo - membranaceus fes-
filis. Hymenium ex papillis inaequalibus el*:va-
tis difthidtis.

* *dimidiatm.*

1980. *T. mfifenteriformis*, cepitofa, imbricata, pileo coriaceo - raembranaceo fubreniformi, piano fufco - umbrino, fibrofo - ftrigofa, margine repando, fubincifo albido; fubtus primo glauco dein ochraceo fuligineo, Flor. Dan. Tab, 1198.

In cepitibus in locis humidis pineti *Birkerdd* & *Baefvferd*. Autumno. (*Perennis*).

Subftantia concolor. Fungus totus interdum 4 poll, latins.

*98i- *T. ferruginea*, cepitofa imbricata, pileo coriaceo fubreniformi convexiufculo velutina concentric[^] ftiiato ferrugineo luteo fubzonato aintice dilutiori margine repando; fubtus cinerco umbrino; papillis majufculis fparfis. Bull. 4. 578-

Ad truncos fagineos mufcofus. Autumno.

Substantia paulo dUutior. Pileus vet totus Fungus .3-4 poll, latus.

1982 \ *T. ciliata*, cepitofa, imbricata, **orbiculata**, pileo fubcoriaceo alutaceo poftice concaviufcuius zonaque marginali umbrino, margine flexuofa-repando ciliato pilisque undique fparfis, fubtus albido pallido, papillis inaequatibus fparfis zona marginali dilute umbrinis.

In truncis arborum. Autumno.

Subfifmlia albido -pallida Totus fungus aj tMoU €9 ultra latus.*

•• *refitpinatat,*

1983. *T. fufcdy* fubcoriacea fublobata: lobis i flexis hirtutis nigro - fufcis, fubtus ferrugia papillis magnis obfcursoribus.

In ramulis deieclis. (Mobr_t

Substantia concolor. Fungus, i - i poll, lata

198[^] -1 • *camea*_{7t} coriaceo-membranacea, effu fubtus rugulofa, carnea, margine. fubinvoluta fufco umbrijo vel nigricante. *Auricularia corticalis Bull, 4[^]6 Jrq. 1.*

In ramii fagineis, quercuis & aliis, Autumn

P'ileus ad J-a-4-& poll & ultra expansi

1985. 'i\ *Pruni*_t coriaceo - membranacea effu primo iubaurantiaca deum umbrino-ferruginea rugulula, margine byffino pallidiore.

In ramulis deiaclis fuhputridis 1/runi fpinof
Decembr.

P ileus 1-6 poll, lat us.

1986. *T. Betulaz*, membranacea, effufa, umbri;no badia, flavo - umbrina maculata, rugofo- tuberculofa margine flexuofa luteo: papillis in sequialibus, fuligineis fubnigr[^]cantil>us.

In cortice Betul-e albae. Odob, Novemb.

Pileus 1 - 2 poll, latus.

1987. *T, cruftiacedy* fubcarnofa effufa glomerat* fufco - umbrina fUbtuberculofa: papillis miix' tis fparsis oblcursoribus.

¹ In locis umbrosis ad, terram. Oclobr.

Caro nigricam. Fungus x - 3 - 4 poll, latai>

98g. *T. viscosa*, gelatinosa, late effusa, tuberculosa subgyrofa, cinereo-caefio, margine byfyno albido: papillis adfperfis minutis concoloribus.

In trunco subputrido Ulmi campeftris. Novbr.
Subftantia alba. Pileus 3-7 poll, latus.

98g. *T. puteana*, gelatinosa-carnosa, effusa, suborbicularis, olivaceo-virefcens, papillis ovalibus majoribus, oblcursoribus; hinc inde umbrino maculatn, maculis ex numerosis pun&is elevatis; marline leuuiffimo, bydiib, candido.

In puteo quodam ad alien⁹. O&obr
Subftantia dilute fufco-ochracea. Fungus 5 poll, latus, 1-2 tin. craffus.

99^f. *T. byffoides*, carnosa, ochroleuca, effusa, priino subvillo Gulculo demum compar^lo margine byffino tenuiffimoque; papillis difcoideifi minutis lutpis.

In fagnetis ad terram, foliis dejetflis mufcis & aliis corporibus artflo adnata. Septemb. O<5lob.
Subftantia pallida. Fungus 2-5-6 pol. latus.

451. *Auricular la.*

Pileus tmembranaceo-coriaceus feffilis, Jlymenium leve.

- ^ . *crifpata*, effusa, subadnata, lobata: . lobis liberis, aut obliquis aut sub horizon talibus, plicatisj torrentofo hirtutis cif>ro>> alhidjs,
1J. iiiigine undulato-flevuofa crifpo fubluteo
J" monio EueziunfeQ zona inarginali obicu*

riori, margine pallidiori, demum fufco \xt
brino.

Ad palos aridos, ad truncos arborum. Autu
no. (*Perennis*).

Subjtantia palliile Iutea, a-5-4 poll. & u
tra effuja.

1992. *A. pallida*_y imbricata, pileo reniformi pl
cato, hirsuto, pallido, zonis fubimpreffis paull
obfcursoribus, raargine fublobato; hymeni¹
ochraceo. *Bull*, 402 *Jub A*, *papyrina*.

In fepibus ad truncos arborum, Autumno.

Subjtantia pileo concolor. *Pileus* 2-2± *pofti*
latus.

1993. *A aurantiacr* imbricata, pileo fubrenifur
antice fubpliculo, villofo, albido, zonato: po
fticis fubobfoletis: anticis ferrugineo-umbri
nis margine repando, fublobato; hymeni¹
aurantiaco - lutett.

In trunco putrido Coryli avellanae. NovembJ

Subjtantia alba. *Pileus* 1-1[^] *latus*.

19P4. *A. lilacina*, imbricata, villofa, pallida o
folete fufco zonara, margine fubiepando hyme
nioque dilute purpureo.

Ad trnncos Pini fylveftris (*Bagjvcerd*). Oft oh

Subjtantia purpureo - albida, *Pileus* \-ipo
latus.

1997* [^] *P^{ur}P^{urea}* [^] imbricate, fuborbicularis *pofti*
hirsuta antice villofa ftriata, fubochracea, ion

bato: lous fubretusis; tnmelio ftariatulo, po-
ftice fubpurpureo, antice fubalntnceo.

In trun-co putrido Faei fyivaticie (*Bagfv&rth.*
Novembr.

Subftantia paltida, Pileus A-i ?fl^f.

1996. -^ *fagin&a*, primo tie in el I o fa , applanata, **totn**
adnata, fuborbiculara, inorgine fubbysfino, fub-
conflueus; hymenio alliido pnrpureo, centro 6c
zonii obfcursoribus; state vero margine foluto
fabrepnndo: ftatu recenti fufco purpureo, obfo-
lete zonoto, veteriori **fordfdo**, *Aiuicularia ^e-*
flexa Btdl. 5. 483. fig- 1.

Ad truncos caefos fagi-ieos. Auturano.

Subftantia fubalbida. Pileus i±i±& ultra
lotus,

|3, imbricata convexa fubinvohuo.

452. *Merisma.*

Ramofum fubcoriaceum coinpieflum laye: Ipice
Utpluriinum pilofum,

1997\ *crijiatum*, basi uniForme, tuberculofum, fub-
tffufum, corporibus vicinis coucrefcens, palli-
dum, dernuii ramofmn: *ramis* concoloribus;
foperne planis dilatatis fimbriato-criftatis. Bull,
Tab. 415 fig. 1.

In fflginetis & pinetts minus frequens. Septbr,

453. *Clavaria**

Clavula (implex raitiofaque cum ftipite brevi (ra-
vius manifeflo) aur e caule crasfiufculo confluens*

1998* -G *Wif^dJ^e^a7 P^{fl}iva* Fubramofa compresfiufcula: rnmis brevibus divaricatis fub bifurcatis obtufiufculis, albido pnllula fubrufefcens basi albido-byflToidea. *Ramaria fimkriata Holmfk. beat. rur. Ot. pag. 9s. c. Icon. Bull 5. 415*

Ad .truncos mufcofos Fagincis, quercinos. All-
tumno.:

1999. *C. mufcigena*, parva, ramofa fufco-paUida, ftipite brevifimo mox parti to; rainis divaricatis : ttim&tis longiufculis fubuliformibus acutis. *An (7. mujcoides Bull 4. 558 P*

Inter niucos ad truncos¹ arborum, Ociobr.

a000. *C. pyxldata* ? mediocvis, ramofifina fufco* albida, ftipite brevi crasfiufculo, ramis erectis, ramulis fubverticillatis; fupremis brevifimis co-
<r&tacis acutis. Pers, Comment* Tab. 1 h'g. j. a. b. 'c.

In fylvis ad terrain ntidam nofra fpecimina lecla* Septemb. Oftobr.

3001* *C. rugofa*. majufcula> albido-pollida; ftipite elongaro, crasdufculo fubiulcato fimplici, vel utplurimUm fupernc ram0(0; ramis erecHs fubconniventibus apice obtufis^ umbrino-ferrup'neis. Bull 5 44g. fig. 2.

Inter folia dejecla faginea (*Dyrehaveri*). Oclob.

0. *tuberculofa*^ minor, ftlpite brevior vel Ion-
giore racnisque iugofa tubereulofo.

*

002- *C digitata*, media fusco pilulo stipite angustiore subdigitatim ramoso; ramis incrassatis lobato-palmatis, obtusis, concoloribus.

In pratis fylvaticis gaminosis. Octobr.

003. *C palmata*, media, subfusca, stipite furfum inciatato palmacim rarofo; ramis erectis apice acutis.

In tricetis ratios. Octobr, Novembr.

004, *C. cristatay* polymorpha, ramosa vel ramosissima albida aut fuliginea-cinerefcens, stipite breviusculo vel brevissimo subcrasso; ramis vix flexuosis: ramulis compertis fimbriaris: fimbriis ut plurimum connatis. *HobnJ'h, pag. 92 c. Icon.*

In graminosis humidis fylvaticis (ved *Bapfvard*).

Octobr.

005, *Q botrytis*, albido-pallefcens, major, stipite crasso breve ramosisimo: ramis subrectis teretiufculis; ramulis brevibus apice subaeniatis obtusifuculis purpurefcens. *llolmfk. pag. 117. c. Icon, quoad colorem.*

In graminosis fylvaticis (ved *Birkeröd*). Septb#

Octobr.

006. *C. firi&a*, fusco-flavefcens, media, ramosis. fiina; stipite subcrasso, decumbente; ramis ramosis erectis crassiusculis teretiufculis: ramulis lubbifurcatis, acutis. *Schceff. Fung. 3, Tab. 286,*

Inter folia dejecta faginea (*ved Birkerod*). Septembr, Octobr.

2007. *C. ahietina* > ochraceo-alutacea, media, corticifraga, ramosissima; stipite breve subadscendente; ramis erectis longis teretibus tenuibus ramis * simplicibus intertextis, ramulis ultimis bifurcatis acutis.

Inter folia dejecta Pini Abietis (*Bagfverdy Bitkerod*) > Autumno.

3008» *Q. muscoides*, lutea in subcorticifera, media, stipite breve ramoso: ramis teretibus divergentibus subflexuosis apicibus bifurcatis acutis* *Flor. Dan. Tab. 856* Fig. 2.*

In pratibus inter muscos. Septembris. Octobr.

2005. *C. fastigiata* lutea vel luteo-ferruginea, subfusca, media; stipite breviusculo ramoso: ramis subcompressis subdichotomis: ramulis brevissimis obtusis, *Flor. Dan. Tab. 775, fig. 3.*

Inter muscos in pascuis, pratibus. Septbr. Octobr.

2010. *C. cornea*, gregaria, minor, aurantiaco-favosiformis ramosa: ramis ut plurimum laxis basi connatis, acutis, *C. aculeiformis Bull 463 fig. 1.*

Ad truncos praefertim fagineos, Octobr,
Substantia in Jactu Ilcco cornea.

2011, *C. viscosa*, luteo-vitellina, viscosa, stipite fursum incrassato subsimplici vel ramoso, vel etiam quasi denticulatum truncato. *Schoff Fung, Tab. 174.*

In eritosis in *CBitkaad* Septemb

•* *Jlmplices.*

2012. *C. pitillaris*, folitaria, fubgregaria, magnu primo fabcylindrica inferne fufco albida, fu perne ilavo ferruginea, dein clavula terminali ovatu. vei obovata, fimplici vel interdum 5 partita, obtufe vel *etlim* trcfncuto turbinata, umbrino ferruginea. Flor. Dan. Tab. 1255. In fcigmati*, minus fiequens. Odobr. Novbr.

2013. *C. J^{tl}^oI^a"* folitaria, fubgregaria, fiftulofa, ftipite u[^]lurimum longirfiino, C}lindrico luteo-alutateo vel fufco-lutco inferne pilis frigosis fparsis fufcis oV.fto, basi ni[^]ricante-fuliginco obtufo; 0Uvula clongata increiTata obtufa vel etiam retufa, fubincurva glabra, pallidiori. *Clavariu Jiftulofa Flor. Dan. Tab 1156.*

In pinctis & alnetis circa (*Bagfvcerd, Ualjuov*) haud frequens ramulis deje&is adnatd. 0(5tbr. Novembr.

Obf. *Fungus nofter certe diver/us a C. fiftulofa Holmfk. pag. 15 c. Icon.*

Fungus 4- n poll, longus. Stipes undique J-1 -1£- lin. crajjus.

2014. *C. Ugula*, fubcefpitofa vel ut plurimura folitaria, fufco - flavescens: longa, radiculis »e •nicillatis, fenfim furfum increffata, obtufa, teres, vel fubcomplanata rariffime eanalicu lata. *Schccff. Fung, 2- Tab. 171 haud male auadrat.*

In pratis graminosis ericetosis iubhumidis (vet Birheröd). Novembr.

Fungus 23-6 poll, longus, i£~a tin* apict
craffus.

2015. *C. cock tearefonnis* 7 ceipitofa, fufco-flave' fcens, basi & in parte convexa clavulae dilu-
tior, radiculis penicilliformibus e tubei-e or-
tis, fenfim furfuii incraITat«: clavula com*
planata excavata apice rotundata iubretula.

In ericetosis aridis (circa Birkerod). Novemb.

3016. *C. hirta*, gregaria, elongata, cylindracea te-
res vel complanata utrinque fulcra iubtorti-
lis, basi anguftior pilis longis fulcis fpar&h
©bfita. Flor. Dan. Tab. 1257.

Ad radices arburum inter folia faginea decidui
{pyrehaven). Odobr.

Fungus 3 - jub 4 poll, longus.

2017. *C fragilis*, cepitola, nivea, ftipile breve,
tenue, fubflavo; clavula oblonga obtufiufcul;
apice flavo-ferruginea. *Flor. Dan, Tab. 775*
fig. 2, Holmjk. pag, 7. c. Icon.

In pratis palcuis inter gramina. Septb. Odlb.
j3. *lutea*, ftipite tenairfimo fubfioxuofa clavula-
que luteo, apice ferrugineo. Holmflc. pag.
ir. c. Fcon.

aoi8- *C flavipes*, cepitofa, fragilis, cinereo-pal-
lida, **Fubpeliacida**, ftipitibus breviffimis albi*
dis vel dilate **flavefcantibus** appi*oximatis ful-
rnnnatis; clavulis **elostatis**, erectis fubeyiiu-
dris, itiperne **attenuatv** inc.urv.is apice fufco

umbrinis acutis. *Pers. Commentar. Tab. 1.*

fig 4*

Rariffimam hanc fpeciem in graminosis humidis in ericelis {circa Birkerod) legi. Novemb. P019. *C. hulboja*, fubgregana, minor, f[^]exuofa ferrugineo-aurantiaca; ftipite medio anguftato basi bulbofo albido tomeatofo, fuperne fubincraffdto; clavula elungata obtufiufcula ftipite paulo craffiori & dilutiori.

Inter mufcos in fylvaticis huinidis (*jmellem Rudergaard og Bitkeröd*). Odob.

Fungus 1 - haud 2 poll bngus. Bulbus 1 tin. fubcraffns. Subftantia gelatinofa-carnea concolor.

Obf. *An diverfa ah C. aurantia Pers. Synopf. pag. 598 **

202a *C. diaphana*, epiphylla, fparfa, minutiffima, basi bulbo ovato flavefcenti pellucido; clavula furfum fenfim attenuata incurva, *Candida diaphana*.

Supra folia decidua faginea haud infrequens. Odtobr.

Fung, fere iX₂-a lin. longus.

2021. *C. Mucerdce*, fparfa, carnofa, minutiffima, mucoriformis, ftipite fubbreve fubcylindrico albido, clavula globofa vcl Juboirato vel tu[^]erculata rubra - carnea.

Pu^ungillum rariffimum hunc in mucerdis in p^uhide vulgo (*Langemofe ved Dronninggaard*) ob-

2022. *C. pallida*, gregaria, minuta, diaplana fupil
 fubelongato, albido-otfio cylindricp fle.xu<
 fuo, utrinque incrafTnto fubbulbofc; clavu]
 ovato-oblonga, obtufiufulca pallida-fubrofe<
 In terra humofa pineti {circa Bagjvcvrd). Se]
 tembr.

Fongus z - 5 lin, longus.

S025. *C. Erythropus*, gregaria, minutiffima, ftipit
 elongato, capillare, atro-rnbente, apicem v<r
 fus fubatienuato, albo, villolb; clavula ol
 longa fubcylindrica vel ovata glabra albiilo
 pallefcente. *An idem c. C Erythropo^Ptrs*
SynopJ. pag, 606? C. gyrans Bolt. Jung.
pag. 35. Tab. 112 Jig. 1 quoad Jiguram
coloram.

In trunco putrido Pini fylveftris ad terram de
 jedlo (*Bagjvasrd*). Otflobr.

Suhjiantia pilei carnoja albajtipitisjubcornt

2024. *C. villoja*, gregaria, minutiffima, ftipite el
 gato, basi crasfiufculo furfum attenuato,
 bente-badio, glabro, apice clavulaque oblo
 go .ovata vel obovata, albido-pallida, vill
 fiufculo. *An C. capillaris Holrnfk. \ pag- J*
c Icon, ?

1

In locis liumidis intra folia Betula? Alni dej'
 fubputrida {*Bagjvmrd*). Septembr,

Subftantia pilei carnoja alba, Jiipitis Jui

*** *dcmatiiform.es.*

2025. *C. penicillata*, epiphylla, gregaria, fimplex, capillaris, atro - fuia, basi fubbulbofa, apice pilis longis, penicilliformi congeftis, albis.
f C. penicillata Bull. 5. 448 fi§. 5 quoad figuram,

Intra folia dejecta quercina. Ocilobr.

Fung^llus Jub % poll, longus.

2026. *pilifem*, epiphylla, gregaria, fimplex y *minuta*, albido-umbrina, primo pilis longiffimis albido - ferice;s, fafciculatim congeftis quail
 lefCilibus, dein ftipite furfum anguftato pilis veftito, ac demum inferne glabro fuperne pilis radiatim expanfis; clavula obovata glabra.
 In foliis dejectis Betulae alb®, Fagi Caftaneae {*Bagfucerd*). Odobr.

2027. ^ *fi^jormis*, epiphylla, gregaria, fimplex, ramofaque, capillaris, elongata, flexuofa, albido umbrina, undique villo tenuiffimo albido fericeo veftita; clavula oblonga obovata villofa.

Intra folia dejecta Betulae albae (*Bagfvcerd*). (Mb.

An *C. fiiiformis Bull. 5. 443 fig. 1?*

454. *Geoglofum.*

Clavula fimplex carnofa ut plurimum compreffa breviuscirca *TCLarspne* prominente ftipiti contigua. Hymenium in clavula fuperficiale, *vifcofo-glutinofum.*

G. elabrum, gregarium, fparfum, purpvra

fcens atrum, viscidum; stipite elongato subcylindrico subterre subflexuoso superne incrassato, squamuloso, dilutiore vel basi albicante; clavula forma varia, oblonga, vel ovato-oblonga, vel obovato, breviori vel longiori, apice obtusa vel acutiuscula incurva glabra. *Flor. Dan. Tab. 1076 fig. a sub Clavaria ophioglossoides.*

In pratis graminosis fere ubique. Autumno.

Caro albido-pallida.

S029. *Glutidocybe subfasciculata*, sparsa, viscoso-glutinosa; stipite elongato, crassiusculo, terete, subflexuoso, squamuloso dilute viride-aeruginoso; clavula oblonga, rugulosa vel calliculata, apice obtusa rarius bifida, vel tuberculata, obscure olivacea. *Cl. mitrata* var. p. vidiis Holmsk., p. 24 c. *Icon.*

In umbrosis locis inter folia dejecta faginea (ved Foriunen i Dyrehaven ved den dybe Grøft i Jbm Vandet Ibbek i giennem fra Fi/Jcedammeft til Ordrup - Mose). Novembr.

Caro stipites ceruginea, clavula dilute olivacea. Stipes 1-1½ poll. longus, 1-2 lin. crassus. Clavula 1-1½ poll. longa, 2-3 lin. crassa p. acuminata clavula acuta. Flor. Dan. Tab* 1258 Fig. 1 sub Clavaria viride.*

455. *Spathularia.*

Clavula compressa membranacea - carnosa latero-utrinque in stipitem decurrens, Hymenium in clavula superficiale, Iseve*

2030, *S. flavida*, gregaria, primo pallida denium flava - fubferruginea, ftipite breviufculo, fubventricofa, rugulofo, apice anguftato pallido vel fubalbido umbrino; .clavula fpathulata, rugofa, fpongiofa. *Scha>ff. Fwig. 1. Tab. 149**

In pinetis frequeos- Sub finem aeftatis & autumno. *Caro albido pallida. Stipes Jub 2 poll. Ion- gus. Clavula £-t poll, lata & alba I-iJ lin. era [fa.*

β. *elongata*, Itipite elongato fubcylindrico fubflexuofa albido. Flor. Dan. Tab. 658 Clavaria fpathulata.

γ. *cava*, alutacea, ftipite erecto, craCTo, cavo, fuperne fiffura elongata pervio; clavula craffa fubrugofa ia ftipitem plane evanefcente.

Caro pallida. Stipes 5 poll, longus, | poll craffus. Clavula 2 poll. lata.

λ. *Iwvijlma* > flavo - pallida, ftipite erecto cylin- drico utrinque attenuato flexuofa, clavulaque wiagna plana Ifleviffima, obovata.

Caro alba. Stipes Jub 3 poll, longus, Jub % lin. craffus. Clavula i£ poll, lata & 2 poll. alba.

456. *Mitrula*,

Clavula ovalis compreffiufcula fubcarnofa ad ftipitem contra<fta. Hymenium fuperficiale la?veT

30 } i. 7£ *Heyderi*, gregaria, minuta, fubru^ulofa/ flavo - umbrina ftipite fubfubulato, tortile . ^axuefo* badie. *Pers. Dijpojit, meth. Jung.*

'410 *Cryptogamia. G. Fungi**

s

*pag. 36 Tab. 3. fig, 11 a. b, figura medti
cris. Lcotia Mjtrula ej. Synopf. p. 61 r.*

*In foliis deje&is Pini Abietis. Oclobr. Novbr
Fungillus £ poll, longus- haud ultra.*

457. *Helvella.*

*Pileus membianaceus lohatus fubditfbrmis utrin-
que deflexus. Hymenium. Iseve inferum.*

* *ftipite fulcato.*

2052. *H. Mitra*, fparfa, pileo bi-trilobato libero
l fubinflato? nigrefcente-livido, hymenio coe-
ruleo-nigrefcente; ftipite coftato lacunofa basi
fubventricofa, dilutiore. *Schazff, Fung. Tab
154. & ej. Tab. 162, etiam hue pertinet, H.
lacunofa Holmfk. z pag. 45 Tab. 24.*

*In fylvis fagineis ad terram (i Skovert imellem
Rudersdal og Rudersgaard; Birkerd'd), Septbr.
Orftobr.*

*Subftantia ftipitis cellulofa. Stipes 3-2J poll
longus, 3-4 lin. basi craffus. Pilous i_z poll
latus.*

- 4053. // *levcophaea*[^] folitaria, fubgregaria, pileo
bi - trilobato, libero, rugofa - crifpato albido-
pallefcenti: hymenio albido-fufco, fubumbri-
no ; Aipite utplurimum elongato craffo basi
veniricofa coftato - lacunofa albido. // *Mi
tra Bull 46[^]. & 190. Hi pallida Schceff 3.*

282.

*In fagnetis ad terram minus frequens,, Sep-
temlr. Odlobr.*

Substantia ftipitis spongiosa lacunosa alba.
Stipes 5-4 poll, longus, i poll, fere crassus.
Pilcus ultra i-J poll, latus.

~f * * ftipite Icevi.

[S034. & *dbida*, folitaria, albedo pallens, pileo libero bilobato: lobis suborbiculatis deflexis applanatis. laevibus luperne emarginatis; ftipite longo, basi subventricofo, apice attenuate), carnofo fibroso, "cavo substantia spongiosa farcto; radice? subtuberofo. II, *elastica* Bull. 242.

In pincto (ved *Fortunen i Dyrehavcri*) hanc speciem rarissimam legi, 'Odlobn

Substantia alba ± *Stipes 4 poll, longus, 3 Zwi,*
inferne crassus. Pilcus ^ poll, latus.

2055. *H. pulla*, folitaria subgrogaria, cinereo-fulginea, pileo libero bilobato, lobis subremi-lunaribus deflexis distantibus sublavibus submarginatis; ftipite breviusculo subunduiato iurfum attenuato, fistuloso. *Holmfli. a. p. 49.*

*Tab. *6.*

Ad radices putridos arborum vel in vicinitate eorum in fylvis; (1 *Ckarlottshtnd*), led rarius. August.

Substantia cavoque alba. Stipes ultra 2 poll, longus, 11 lin. crassus. Pilcus 1 poll, latus.

C056. *H. esculenta*, folitaria, pileo difformi, lobato, plicato - gyrofo, badio - cinnamomeo; ftipite crasso, brevi, subleevi, alba, intus caluloso. *Flor. Dan. Tab. ti6- job Heh*

Quoque rariffimum huncce fungum in lur;<
(Charlottenlund) mveni. Maj. & JIJX
Substantia alba. Stipes Jub. 2 poll, longi
& craffiis. Pileus Jub 3 poll, latus.

45\$. *Helotium.*

Pileus fubcarnofus convexo - hemifphaericus ftipitatus. Hymenium leeve, *inferum?*

2037. *H. elongatum*, gregarium, minutum > pileo priruo piano pallefcenti, demum eonvexo fub-hemiiphasrico glabro dilute wnbrino; ftipite elongato tenue deorfum fubincraffato flexuof<
diaphano basi byffoideo, hymenioque cgn cavo
albo.

In ligno purido Pini Abietis (*QBagfvmrd*). Sept.
Subfianxia albida. Stipes 1 lin, longu\$, £ *tin**
craffus, Pileus -| lin. latus.

2038. *H. album*, gregarium, album, minutum pileo primo piano, dein umbonato demum convexo - hemifphamco margine acuto fubrepan-do; ftipite breve cylindrico craffiufculo apice dilatato, basi anguftato.

In foliis fubputridis graminum. Odlob.

Fungus totus 1 lin. tongus. Substantia alba Ƴ
2039. &• *nigripes*, fparfum minutum, pileo primo piano, demum convexiufculo margine fubrepan-do obtufiufculo, hymenioque convexiufculo fiavo; ftipite brevi cylindrico, apice Xubdila-tuto, fuligineo - nigricante.

Ad afferes putrido^ . Novemb

*Substantia albido - pallida. Stipes 1 lin. long.
i lin. crassus PiUus fab 1 &* ****.*

20. *H. subeffik, cepitofum, minutiflimimi.
pallidum, pUeo primo piano demum con-
vexiufculo difco dilute umbrino; Bipite bre-
viffimo, apice dilatato basi umbrino - badio.
In ramulo dejecto subputrido {Birkerod. Aug.
Substantia concolor. PiUms \ lin. haud latius.*

459. *Peziza.*

*Pileus ut plurimum hemisphaericus, concavus,
fertilis aut stipitatus. Hyraenium 1^{ve} Luperum
{Thyce folliculifera nudo oculo inconspicua, spo-
rulis oculo fumid in/tae volantibus foeta).*

A. Tremelloidea.

30. 11. *P. inquinans, gvegaria, magna, turbinata
fertilis. primo obconica truncata concaviufcu-
la, demum pinna, vel explanata rugoso-fli-
cata, umbrinafuliginea, squamulola - ragosa,
difco atro-fumiginoso nitente, margine acuto.
Sckceff. Fuv«. Tab. 158.*

Lycoperdon truncatura L.

*Tam ad fagineos quam ad quercinos truncos
legi. ALhaia autumno & im» hyeme.*

- W₄*. *P. pdlacens, ^regaria, media, turbinata, fh-
pitata, nigro-fulvieinea, primo obconica r.0Q-
demum turbinata difco concavumtulo
Jfidi plano j^nte, matgJJ e le vato tumido,
extus fcabriurcula; f, ijiite ijibbrevillino ad-*

In ligno putrido Bctulae. Septembr. (i Bag] j'vccrd Skov). ,

Suhftantta aquoja gelatinofa dilute fuliginet
Fung. I poll, latus & altus. Stipes i£-
lin. loj/gus.

2043- *P- metamorpha*, fubcefpitofa, carnofo-tre-] niello fa, purpurea - **rubra**.

a. *Jarcoides*, magna, fubftipitata ftipite craffo iuperne dilatato **fubvenofo rogofo**, dilute fu-**fco** purpureo; dil'co explanato concavo ful-**infundibuliformi** purpureo, rnargine acuto in-1 cifo, **fublobato**: lobis ohiufis. *Peziza trcmel-*
hides Bull 5, Tab, 4^0 Jig, T. B C,
Subflantia cum reliquis dilute purpurea. Fun'
gus 1-2 poll, latus, & Jub 1 v poll, altus.

b. *obconica*, minus, fubftipitata, pileo obconico. difco concaviufculo, **daargine** acuto, undulatt
 * crenato CLediufculo; extus fubvenofo. *Fl@r*
Dan. Tab. 1017. fig. 1.

Pileus ^ poll tat, £ poll, altus.

t. *lobatay* fubfeffilis, pileo lobato: lobis oblongo-ovatis rotundatis vel retusis, fubtus Tul-
 venosis ere&is vel deturnl)entibus; magnitu-
 dine varia. *Schczff. Fung, 4, 525. Jig 1.5-6.*
Tremclla dubia Pers, Synopf. p. fao,

d. *turbinata*, fubftipitata turbinata glabra mar-
 gine denticulato. Bull, 1. c.

An Peziza denticulata Flor. Dan., Tab. i 017
Jig 3. hujm loci?*

e. *cylindrical* cepitofa, minus, fubcylindrica glabra, difco concaviufculo margine tumido elevato. *Batfch. El. fang. Tab. 12. fig. 53* fub *Peziza porphyria*.

1 *labyrinthiformisj* lamellofa cellulofa, cellulis: vel lacunis inrequalibus.

Omnes ha? varietates in truncis caesis Fagi fylvaticae rarius in ligno fubputrido Coryli proveniunt. Autumno.

B. *Membranacaz -carnofce.*

a. *glabr&*.

* *fejilles, vel obfoleteftipitat.ee.*

3044. jp. *leporindy* fubmagna folitaria, fubgregaria, auriformis basi coar(5tata convolute fub**hipitata**, pa Hide umbrina extus dilutior. Flor. Dan. Tab. 1078- fig. 2 quoad figuram.

Inter folia dejecta faginea. Septemb.

2045. P. *granulofa*, folitaria fubmagna primo hemi fphasrico- concava, demum explanata fubrugofa felTilis, intus umbrixia, **cxtas** dilutior, margine granulofa - crenata.

Rarius in fagnetis ad terram (*Jtirkerocl*). Septembr.

2046. P. *umbrina 1* fubgi*egaria, fubmagna, concava contorta (*auriculara*) intus rugis obtusis elevatis extus impreffis; umbrina, *Schasff.* 2. Tab. iy5.

In **lifinq** putrido fpecimina mea legi. Septbr.

2047. *P. veficularis*, magna, greeaia[^] fubcyatln
formis margine laciniato: laciniis erectis
reflexis, inaequalibus; intus umbrina extus di-
lutior; fubftipitata. Bull. 5. 457- x. hauC²
dilTimilis.

Ad terram in fagnetis prasiertn in vicinate
arborum caefum. Sub finem eeftaUs, autumnno.

5048- *P. pedunculata*, inagna fubcefpitofa, con-
cava fubauriformis dein fubplana, br>si rugis
elevatis, intus badio - umbrina extus albid(
pallida margine repando; ftipite fubobfolet(
ciaffiufctdo, albido.

Minus frquens in locis umbrosis (*Blrkerod*),
Novembr.

2049. *P. rofea*, fubmagna, Tubcelpitofa, aurifonni
convoluta b«rcbar(5lata fubftipitata, intus an
•nea-rofea, extus pallida.

Inter folia deje&a faginea rarum Imnc funguin
inveni. Sptembr.

2050. *P. aurantia*, fubmagna⁷ cefpitofa, vel gre-
garia, primo hemitphcerica margine fubin*
voluta, deraum explanata fubcochleata ve]
auriformis⁷ margine repando fublacero: inti
miniata aurantia extus albida iubcarnea. Flo:
,^rDan. Tab. G57 fig, 2. Schaeff. 148*

In vicinitate radicium putridorum praefertin/
quercinorum; nee non in pratis inter gramin
Autumno,

3051. *P<> fubplana*, minuta cefpicioTa feffilis priru
globofa demum depreHa fubplana orbiculari

marginae fubinvoluto: intus aurantia extus
fusco ptillida.

In ligno putrido Pini Abietis. Octobri

2053. *P. piana*, minuta fparfa, fubgrpgaria, fes-
lilis, primo **hemisphaerica demum** lota e.vpla-
nata depreffa margine acuto **cinereo - caesia**.

In trunco putrida Fagi fylvaticae. Novembr.

2053. *P. granulata*, minor, gregaria, fefniis, pri-
mo **globosa**, demum explanata fubconvexiuf-
cula, aurantiaca-cinnabarina, fubtus pallidior,
rufulitia. *P. granulata* Bull'. 5. 45[^]. Jig. 3.

In Rercore vaccine Jul.

2054. *P. callina*, minuta gregaria > fefilis primo
globosa depreffa, demum tola plana margine
tumidiufculo, . cinereo- caesia. Bull. 5, 416.
fig. I.

In ligno putrido* Octobr.

2055. *P. Alni* • exigua, fparfa, fefilisj primo pa-
tellata, demum plana, margine obtufiufculo,
fubretto, cinereo- caesia.

In squamis ftrobilorum dejedtorum Betulae Al-
ni (*Bazfucrrd & Birkerdd*). Octobr.

"6. *P. atrata*, fubexigua, gregaria, orbicularis,
concaviufcula, margine fubinvoluto,, intus
fusco- pallida, extus olivaceo-nigricans. Oc-
tospora atrata Hedw. mufe. frondos, a pag.
61. Tab. 2i A.

In ligno putrido. Octobr.

2056. *P. purpurea*, cepitofa, minor, fefilis or-

418 *Cryptogamia. G. Fungi,*

bicularis, fubhemifphasrica, concava, m argil involuto: intus rubro - purpurea, extus pi pureo - badia. G&ofjjora purpurea Uedw: . muc, frond. 2 pag. 63 Tab. 22, fig. 1.

Ad terram nudam fubhumofnm. Jul.

2057. *P- fcybalorum*, exigua, l'parfa, feffilis dif fonnis fuboblona, concava margine involuto fubtuberculato, intus fufca extus niv-ea.

Orr.nium mihi notum minutiifima in fcybal[^] cervinis punclulatiin adfperfa. April.

* • *Jiipiatm (Jiipite manifejio).*

1058. *P. amentatis*, minor, fparfa, hemi'fphaericf margine fubinvoluta, intus dilute fufco-uifl' brina extus pallidior¹ basi fu-bplicata; ftipite breve cylindrico fubflexuofa pileo concolore.

In amentis dejetilis Populae albae (*Ch-arlottenlund*). April.

Pileus a lin. latus. Stipes 1 % lin. fere long.

205Q. -*P. fiava*, minor, fparfa, orbicularis,]plana lubdepreffa, concaviufcula, margine xepandt acuto: intus flava, extus pallida; ftipite bre-j viffimo concolore apice dilatatp.

In **ftrobilii** dejedis Pini Abietis. Sept err br. Oclbbr.

eo6o. *P. fubulata*, minuta, fparfa, albida-fufca, primo turbinata demum cyathiforniis mar- gine tumido, Fauce dentibus fubu[^]atis prim< conniventibus delude eredlis coronata; ftipitt breviuiculo uirique crafdufculo incurvo. A) *P. coronata* Bull. 5. Tab. 41\$. fig. IF?

Fungillum hunc rariffimum in ftipitibus loco umbrofo humido deje&is {i Rudergaard's-Skov henimod, Dumpedal-Mdlh) legi. Ocftobr.

- ^a61. *P. Jphacelatay* fubmagna, folitaria, fubgregaria, fulco - pallida hemifphaerica fubventricofa^ basi plicata, retufa, margine ere&o fubpatulo duplicate* crenulato crenulis fphacelatis; ftipite breve fubbulbofo, apice dilatato. *Bull* 4 396. fig- 3- ^f. *Catinus HolmJlc.* 2 pag. 22 *Tab.* H

Rarijs in graminosis in vicinitate liuncorura (i *bondermarken* iiveni. Scptembr.

Cupula t poll' haud ultra lata, Jub I poll, alba Stipes f poll. Jub longus, ij I'm. basi craffus. ' ,

- [^]062. *P. Integra*, fubmagna fubcefpilofa, cyathiformis margine integerrimo acuto: interne badia externe dilute umhrina; ftipite brevius[rulo cyiindrico con col ore

In pineto (*ved Birkeröd*) inter folia dejeda Fini Abictis. OAobr.

B. confluens, cupula contluenta fubeffili.

Cupula 1 poll, lata, f poll. alta. Stipes & lin. longus, 1 lin. craffus.

- [^]064. *P. cornucopioides*, cepitoca, magna infundibulifonnis: limbo lobato laciniato umbrino fubquamulofo, in ftipitem cavum, longum, fubfulcatum fepfim decrefcens, extus fulgineo nigricans. *Flor. Dan. Tab.* 126c.

Ia fagetis **baud** in frequens. Septemb. Ocflor.

420 *Cryptogamia. G. Fungi.*

Cupula 2-2*_z *poll. lata*_n *Stipes* i|-2 *poll*
& *ultrp longus.*

\$064. *P* Phiate** folitaria, media, C)athiformis,
margin© integerrimo: intus fufco umbrina,
extus fordide flavescens; ftipite breviufculo
cylindrico apice fubdilato curvo. *Flor. Dan.*
Tub. 1078. *fig.* 2.

Fungum meum in ligno putrido Betulae albs
(fiagfuwrd) legi. Gel. Vahl in ramis putridi's
Betulae Alni in Novegia, fuum reperit. Ocflor.

Cupula 2f *lin. lata*, 1 *lin. haud ultra alta*_m
Stipes 1^ *lin*_o *longus*, † *lin. fere craffus.*

2065. *P. globofa*, folitaria, fubmagna, globofe-cya-
lhiformis margine integerrimo, ftipiteque elon-
gato cylindrico adfcendente pallido-flavescente.
In luco (ved *Friderichshvile ved, Birkerdd*) **inter**
folia dejetfa quercina, rarius. Oc5toabr.

S066. ^J- *Man-opus*^ foliaria, fubmagna, fwbhemi-
iphierica intus znurina extus cinerea; ftipite
longo laevi vel lacunofa furfum attenuate
Flor. Dan. Tab. 1200 *Jig.* 2.

In fagetis ad terram nudam (*i Charlottenlund*)
in vicinitate radicium putridorum (*i Bagfvcerd*
Plantage\ minus frequens. Septemb. OAob.

13. var. *villoja*, Holmfk. a. pag» a6 *Tab.* 10
tub *P. fibblica.*

2067. *P. frudligena*, minor; fparfa **aut** gregaria
primo fubinfundibuliformis demum explanata
concaviulcula, margine obtufo: intus flavescens
extus pallida; ftipite elongato fubfle*unl>i ~~Cur.~~

fum increflato apice dilatato concolore. *Dull*,
3- 228.

In pericarpis dejes Fagi fylvatitts. yEftate
& Autumno.

068. *P. cernua*, mimita, fparfa, albida pallida,
cyathiformis cernua, margine integerrimo ut
plurimum laciniato.: laciuis inaequalibus fub-
involutis; ftipite breviulculo tenue apice di-
latato diaphano eestate basi uznbrino. *P. ca-*
pula Hobnfk, 3. pag. 41. Tab. 22,

In ligno putrido Sambuci nigrse (*i>ed Jcegers-*
borg). Oclobr.

069. *P. inccquilatera*, miuuta, fparfa, fubaggre-
gata, fubcyatbiformis obliqua fubcurva mar-
gine integerrimu fubrependo, infcus albida
extus cinerea; **ftipite** fuhobfoleto.

Ad radices fibrofas mufcarum nec non in mu-
Icis aridis (*Birkerod*) rarius. Oc^obr.

j9. *hirfutCB*, vVlofcc vel *granulatas**

* *feffiles* vel *obfolete ftiuitatcc*.

P *P. gemmata*, fubmedia, iubgregaria, fphse-
ricajjdeprerfiufculaj ore repando fubinvoluta,
fordide pallida; extus, granulis umbrinis ob-
lita. *P. micropus Pe>fon*, *Syn.* pag. 641 &
ej Ic. & DefcripU fung. 1 pag. 3©. Tab. 3
J&' 5- ffW>ad cupulam; Jiipitem autem in meis*
fpeciminibus numquam objhrvavi^

In truiico putrido Fagi fylvatictu (*Charlotten-*
lund). April. Sc Maj.

0071. *P. hemisphaerica*, submagna, gregaria sphaerica globulosa, ore plerumque jequali: intus albido - glauca, extus umbrina pilis frigidis concoloribus setate subnigricantibus vestiti. *Fhr. Dan. Tub. 656 Jig. 1 etfi dilution tamen non diversa ab P. hirsuta Holmjh. % pag. 57. Tab. 19.*

Ad radices arborum in locis subhumidis frigidarum. Autumno.

5072. *P. hirta*, submedia folitaria, sphaerica-globosa, ore saepe margine subtumido subconiventi, miniata extus fusco hirta.

Ad terram nudam in luco (vet Friderichshvilt ved Birkoröd) rarissima, O&obr.

2075. *P. nigra*, gregaria, subcaespitosa, submagna, primo subhemisphaerica subdepressa dein explanata concavifucula, margine integerrime acutifuculo; iatus laevis extusque fuliginosa, villis tomentosa. *P. nigra Bull % 116. haud diffimilis.*

Inter folia dejedla Pini Abietis in Pineto (vet Birkoröd). April. Maj.

2074- *P. livida*, gregaria, subconfluens, minor, suborbicularis, primo hemisphaerica dein explanata concavifucula medio subelevata: intus glauco-livida: extus fuliginea, pilis longis frigidis concoloribus. *Batfch, El. Jung.*

Contin. t, pag, in. Tab, 28 Jig. 154, quoad figuram

In trunco putrido Fagi **fylvatioe** (Charlottenlund). April,

2075. *P. Polytrich*, gregaria, minor, orbicularis primipubhemisphaerica demum explanata concaviuscula margine acuto ciliato intus cinnabarina-coccinea extus flavo pilis fasciculatis subtrigosis viridescens obfita; stipite obsoleto dilatato.

In fepibus turfosis circa *Birkefod* inter *Polytrich* haud infrequens. Septembr. Octobr.

2076. *P. merginata*, cepitosa, subconfluens, minuta, hemisphaerica dein plana subconcaviuscula intus flavo aurantiaca margine tumido luteo, extus pallida pilis trigosis sparsis. An *P. ciliata* Bull. Tab. 453 fig: a?

Super folia dejecta Pini Abietis (fiamm. Gml. sk0^). Octobr,

** *Jiipitatce.*

2077. *P. anomala*, conferta incrustans, exigua, turbinata cinereo »fuliginea pilis brevissimis crispatis obfita, ore parvo margine involuto connivente; stipite breve superne dilatato.

Ligna putrida incrustans, haud infrequens. Per totum annum fere invenitur. (Pefennis^).

5 2078. *P. clandestina*, sparsa, exigua, turbinata vixime primo connivente dein ercdliusculo suburoideo, albida, tomentosa - hirta, utplurimum lacrymans; stipite breve apice dilatato.

^n ligno putrido Fagi **fylvatica?**. Autumno legi.

2079. *P. calycina*, parva, minutissima, turbina-
 primo margine cotinivntc duufa, demum fu-
 infunriibuliformis, vel puma, margine tnin-
 do, interne ochracea flava, externe albida J
 tomentofa-hirta; ftipite breve furfum dila-
 tato. *OdloJ'pora calyciformis* ILodw. *Musc*
frond. 2. f.-ag. 78. Tab. 22. fig. B.

Fungilli meae in ftrobyio Pini Abietis inveni
 Septembr.

ftofio. *P. cruet'buliformis*, folitaria, fubmedia, **tur***
 hinata primo epiphragmate. alba tenuissima
 membranacea claufa, deinura pervia margine
 tumido involuto, albido pallida villofa; fti-
 site breve craflifculo fublulcato fuperne di-
 latato,

EarHEma in ligno putrido Fagi fylvaticae (*Char-*
lottenlund). Jul.

Cupula 5 lin. lata, & totus fungus 6^ A<- altus.

*081. *P. patiddi* gr'egaria, exigua, primo clavata
 dein iurburbinata, demum cupula fubplana
 fubcont;aviu(V;Dla margine tumido, difco ochra-
 cea, extus albida ftipiteque fublongo basi um-
 brino furfum dilatato, **hirta**.

In lie^no fubputrido Pini Abietis» Ma}.

^082. *P* ciUaris*, epiphylla, Tparva, exigua, alba,
 primo clavata dein turbinata, demurn e\pla-
 nata concava margine integerrimiiu ciliis lon-
 gis globulifprtg ornata, extus ftipitcque bre-
 viufculo cylindrico, 'villofa.

In foliis dejeclis fagineis, Otitobr.

2083. *P. vivginca*, fubconferta, exiguua, Candida, **primp** globofa dein explanata concaviufcula, margine fubrelando flexuofa, fubcrenolato ciliato, extus ftipiteque perbr^{ve} tenue apice dilatato, villofiuicula. *Pezlza parvula t?lor. Dan. Tab, lot6. fig* 4. P. virginea Hohnfk, 2. pag. 3 f. Tab. 14.*

In ligno putido jfiftate & autumnno.

2084. *P. calyculiformis*, fubfolitaria, minor, fufco-umbrinu, fubinfundibuliformis marline erecto, extus ftipiteque breviffimo craffiilculo i'u perne dilatato, villofa.

In ligno **dcjedto** putrido. O(5lobr.

H085. *P. hicolor?* **fubconferta**, exigua, primo globofa demum explanata concaviivrcula intus flavo aurantiaca, margine tumido, extus, ftipiteque breve, apice dilatato, **fufco,*** olivacea. *An, Pez, bicolor Bull. 5. \$10. Jig. 5?*

In ligno putrido (*Ragjvccrd*)^o Otilobr.

^a086. *P. vernalis*, fubfolitaria, i'uboinor, cinereo-pallida, cupula hemiplierica primo margine fubirivoluta, demum patulo-eredlo, extus ftipiteque elongaio filiforme flexuofa, villofa.

In ftipiti'bus dejtftis .(*Charlotlenhmd*)* April.

Cupula jub a UiL lata. Stipes Jub £ poll. longus.

ⁱ087. *P. capillaris*, folitaria, minor, dilute fufco pallido-viveCcens, cupula primo clavata de-

• Mipnifnha arica con'java margine ob

tufiufculo extus ftipiteque longo capillari flexu-
oib basi umbrino, villofa.

In foliis dejedlis fagineis (GCBITEOV), Ottobr.

Citpula i lin *latai* *Stipes* fub* 4 lin, hn(5

2088. *P. tomentofa*, gregaria, fubmedia, olivacea-
umbrina, cupula orbicular! plana difco fub-
concaviufcula extus paHidiori piiis brevib(^s
fafciculatim Ipurfis obfita; Aipite fublongo
furfum increffato-liilatato, tomentofo.

In ligno dejecHO putrido (*Dyrehaveri*)% Odlob.

Cupula 4 Hn. *lata*. *Stipes* 3-4 lin. *rarius* 1
poll. & *ultra longus*, *Juperne* 1 lin. vel $t \frac{1}{2}$
lin. crajfus,

C. Carnojaz - coriacce.

a. glabrte.

•* *JeJJilcs vel obfolcte jiiipitatw**

2089. *P. fulva*, minor, gregaria, conferta, prim©
fubglobola, depreffa, dein hemifphserica con-
cava margine tumido, flava, diTco fulva: dc-
muni plana margine acuto, fulvu, extus
dilutior.

In fterquiliniir infupcr plantas putridas (£ *Ro**
fenborg Have). Novembr. Decembr.

Caro dilute miniata fulva.

2090. *P. fimetaria*, minor, gregaria, conferta,
lutco - alutacea, fubdiffbrmis prlmo globofa de-
preffa dein hemifphserica marginata, demum
plana margine acuto; ftipite fubpapillato.

Iniimeto vciucino. Sub *Inem aestatic & autu*

3°9U *P. fubcarnea*, exigua, conferta fubconfluens, fordide carnea, primo globofa dein hemifphce-
*ica pTana margine acuto.¹

* ligno putendo Betuta; albse. Novembr.

5°92. *P. compreffa*, fribicnmuta, fparfa₇ umbrina, primo, fubtuberculata .fubtremcllofa demunx planii utrinque concava, margine rotundato. Ad ufferes femiputridos. Septembr.

Caro pallida 'duriufcula.*

ao9"j. *P. lutea*, minuta, conferta, fubconfluens, lutea - ochroleuca primo globofa dein iiem> fphterica concava, margine tumido, la ligno putrido.

Caro albido pallida.

2094, *P. fuliginea*, fubmagna, fubgregaria, Tiab- orbicularis, explanata, fuperne fubtuberculata, nigro-fuliginea, margine repando fubflexuofa acuto; fubtus obfcure cinerea fubPurpurafceus, ftipite obfoleto.

Inter mulcos ad terram in pineto (*Bagfværdid*).

Oa obr.

Caro fordide virefcens. Fungus \- i-i pott.

. liim. "

*»95. *P. mewbranacea*, media, rubgrr-avia, fordid, ltuea fubvirercens, primo tfrbicularii de-
preffi, dernum concava, margine fubmem-
branao eo ctenulato patulo.

L la **Rmeto** vactino **raxius** in fylvis locis umbro-

2105» *P- udeata*, minor, cespitosa dilata fusco umbrina albhemisphaerica concavifurcata marginibus tumido; stipite brevissimo crassifurculo superius dilatato.

In fibrillis aridis graminum, ad margines agrorum (ved *Emdrup*). Jul.

2106. *P- & ruginosa* minor subnuda, gregaria, verruculosa, primo turbinata truncata dein hemisphaerica demum plana disco concavo, margine integerrimo subrepando; extus dilutior; stipite breve apice dilatato. *Flor. Dan, Tab. 1200 Fig, 1, clipeo disco numquam albido oh-Jervavi.*

In ligno dejecto subputrido atque viride tincto quercino. Septbr. Ovobr.

2107« *P* citrina*, minor, conferta subconfluens, citrina subtus pallida, plana interdum convexifurcata in argine aut lubricuosa, stipite brevissimo superius dilatato, *Odlopora citrina* Hodw. Musc. frond, 2. pag. aS. Tab. g. fig B.

Ad radices subputridas arborum «que in ligno dejecto. Sub finem aestatis & autumno.

Cupula i - a Un, lata. majoribus minoribus intermixtis.

2108. *P. vaccinea*, minor, subcespitosa, pallida* primo pinna convexifurcata subfessilis dein fusca cyathiformis: margine acuto repando, stipitata stipite longifurculo cylindrico, apice dilatato.

In stercore vaccino. aestate in locis umbrosis raris.

Cupula i - a Un. lata. Stipes i - \ lin, long.

2109. *P. rniniata*, minor, subfolitaiid, primo elongata subturbinata, dein subcylindrica demum plana margine acuto, supra rubro-minieua, subtus stipiteque elongato perispermio crassiusculo distichis filiforme apice subdilatato, albida subrofea.

Fungillum hunc speciosum in luco (ved *Friedrichshvile ved Birheröd*) inter muscos in graminibus legi. Augusti. Septembris,

Cupula 1-2 lin. lata. Stipes sub 2 lin. longus.

²*tlo*, *P. alutacea*, folitaiia, fulvicornia, alutacca convexo plana, margine acuto fuscus oblongus, in stipitem longum cylindricum, basi lignosum fuscum umbrinum desinens.

In ramis defloratis rariss. Novembris.

Cupula 3 lin. lata. Stipes 4, sub 5 lin. longus, \ lin. crassus.

^aH1. *P. stipitum*, gregaria, subcylindrica, media, primo alba globofo substipitata demum superius plana, pallida, disco paululum elevato, margine acuto, subtus paulo dilucior obconica sensim in stipitem longum tenuem flexuosum, deorsum attenuatum basi lignosum & umbrinum fuscum desinens. *Pez. ochroleuca Bolt. fung. 3 pag. 23. Tab. 105. fig. 1 affinis.*

Ad caules plantarum majorum, ad stipites & radios deorsum laudat insequens. Octobris

Caro alba. Cupula 1 sub 2 lin. lata. Stipes 5 lin. longus, \ lin. crassus,

⁵¹12. *P. ochracea*, gregaria, subcylindrica, subminor, primo elongata clavata turbinata, demum disco

piano ochraceo, inarginato rumiio clevato sub-
tusque pallido in Hpiteni fullongnm uiuam
flexuosum pallidum desines

In »mo dejecto subputrido Sambuei nigr*. OAb.
Caro pallida. Cunuht Jub i I in. it.ta. Sti-
p t 7 I If/, 1\$) gus.

13, hi r fur a.

* sessiles.

2113. P- *cirwabarina* **conferti** subconflens, sub-
minuta, prim0 jlnna demutn **bcmlfphirrica** pint
marginie •euro **rabro** abarinn, **fuUui** flav<
io!li(ia vetfui mnrfinem lubfcens, hirfo.

InCuptr **mtfcltw riridem** in iocit **hnmidii** cii ca
domof. >«y Jnn.

discum versus obscurior.

2114* *Julphurea* **conferti**, **conferta** subconfluens,
Icn-ispaxic0 dt|refla, (iico albo>c2fia_t (ul'fu*
pallila **pill** lungii (ulpburcis ohlin, basi um-
brina, *Pfz. fulphurea β. all>o-lutea Pers.*
Synopf. pag. t>9. & ej. Ic. & (Iescript. fung.
*0 p**g. 31 TaR g. Jig. 4^5**

In ramulu iicjeUo. O6tob,

Caxo alba.

3115* P. *Jittllata*, conferfn subconfluens, subine-
dia, lit **hrsp** »**rica deprella**, j-lana, nisiifinc **acuto**,
auranrio- rubra, fubtus pallidior fed's divcigen*
batlio nigricaotibtu longis vcllita. P.
siurantiaca Bull. 1 Tab. io«

In **tm**dl diborum putriilArum, in ligno fubpu-
tri do **dcjcd**, Æstate & auuiinio,

Caro subalutac.

¹u 6, *P. j.ercor<a, grJgatj, m.inor, heraifphan<<*
con vexiuscula m'u'gine Inljtiuuido i'lavato, su-
pra ftiha. subtus dilutior, setis badiu lon-
giulmli* **fubtre&if.** *Bolt fung. 5, ^ag, 27.*
Tab. 108 fig. 1. sub P. fcu>ilhi a.

In fimo equi:io. Jul. \u^uft.

Car' <albido titfi hi in a hymrnfium ve <bfcurior.

²117. *P. subhirsuta, gregaria fubconflue ui, full-*
num:lj, licrnil phæric:a deprolfa plaiu marciuc
a<uto, aurantino lutca, lubtus luteo-pailida
p **Hit** bi evis fuKis fparfa.

Infuper materiam viridim in hu mill is **locii** circa
do'noi. May, A Jun.

Caro alba, Hymenii Juhftantia aitraritio- In'ea.

²¹18- *P. pilofa, folitaria* minutiufcuU, **fubhemi-**
fphærica deprefsa, difto convexiufculo carnea,
i'ubtus **pallidior**, pilis **longii** ercdliufculis fu-
fcit r^lenfe veftita.

Jⁱⁱe1 ..ttiures in liguo ubictino fubputrido, Sept.

Caro carnea.

^{2119.} *P. tn'rc/,zen, s, j) via, mmuta, hemifphtt]ica*
difco plimo albido carneo, marline **tumid**o
elevato fubtuiqua dilute fuin> oli\aceo, 1o-
mentofa.

W 'aulibus herbarutn majorum aridum. Vere
& Autumno.

Caro albida.

3150 *P. fusca*, conferta, exigua, hemisphaerica, disco subconcauiusculo fulco-coeruleo-purpureo, margine tumido elevato subtusque tomento fulco obdito.

In ligno putrido Betulae albae. Octobr.

Caro sordide carnea.

2121. *P. coerulefcent*, conferta, subsparfa, minuta, hemisphaerica, disco plano coeruleo, margine tumido elevato subtusque tomento fulco obdito.

Ad afferes semiputridos. Autumnno.

Caro albida.

2122. *P. squamosa*, fr***,*.*, mtui, hemisphaerica, margineque tumido elevato subtus pallide lutea, basin versus villis squamulosis caeruleo-vestitis.

In materia viridi circa locis humidis. May. & Jun.

4 domo. m 1

Caro pallida.

2123. *P. strigosa*, minutissima viridis subobconica, disco convexo, margine acutiusculo, extus setis fulco umbrinis strigosis.

In fimo vaccino sub finem aestatis.

Caro viridis.

2124. *P. papillata*, gregaria, minutissima, lutes subferruginea, obconica, disco convexo, margine acutiusculo, extus setis longis fulco-luteis subdiaphanis strigulii, erv (*tis vestitis).

In fimo cervino. Jya«

Caro pallida.

2125. *P. viridis*, gregaria, minutissima, viridis, obconica disco plano margine acuto, extus tomento albido obsita.

In fimo vaccino. Jun.

Caro concolor.

□□ *stipitata.*

2126. *p granulaformis*, gregaria, minutissima, nivea dein subfusco-pallida, subreticulata, globosa: ore primo epiphragma t« nrml» anacea clauso, demum aperto; obsolete stipitata; stipite crassiusculo **algnfeatt.**

In ligno subputrido. Septembr.

tn 2127. *P. nigro-castia*, gregaria, sparsa **it »** minuta explanata depressa cast. margine acuto repando subflexuoso; subtus atra villosiuscula; stipite brevissimo crassiusculo **Old *tro**, lignoso.

la ligno putrido **ml »** sseres. Jun.

Caro albida inferne & stipitis atra.

2128. *r. nivea*, gregaria, exigua, disco a-cola, primo tuberculata, dein hemisphaerica, margine involuto, stipite breviusculo crasso lignoso.

lu trunco Ulmi campestris. Novemb.

Caro pilei hymenium versus albida, margine & stipitis nigra.

2129. *P. pithya*, gregaria, minor, primo turbinata, 4i*niuiu di sco pUruilul.i ortcaviulcul«» u
i4:uto luteo ferrugineo; subtus stipiteque breve crasso apice subdilato, pallida, villosiuscula.

Peru. *Synopf peg* .52 f\$ tj. *Ic. t³ descripti*
fung. a pag. 45 Tab. 11 fig. 2.

In ramulis dejettis Pini Abietis. av. <S. Jun.

Caro alutacea.

4130. *P. alhomarginata*, gregatia, fparfa, rainuti
 fufco dilute urnbrina villoia, primo eiongato-
 clavata dein cupula fubhernifphasrica concava
 inargine tumido fubinvoluta ajbido, *dennita*
 convexa; ftipite 'brev[^] cylindrico[^] *P. cy<u*
ihoides Bull. 5. 416 J#g. 5 noftro vaide Jimilis.

In caulibus plantar urn xnajorum arid is. **Jun.**

Caro fufco - umbrina,

450, *AJcobolus.*

Pileus hemifphffiricus fubcupulaeformis caruoius,
 / leffilis. Thecee manifeftae in difco *prominentes*
 nigrse.

II31. *A. furfuraceus.* gregarius, mi/j or, hemi-
fphflericus planus vel fubconcavus, margine
 acuto vel lubturnido, virefcens, externn ful-
 furfuraceus. *Pers> Synoyf- pag. G76 & fy-*
Qbferv. mycolog, 1 pag. 33. Tab. 4 fig- 3.
a, 4. 5. 6.

Super ftercus vaccinum. Autumno.

Caro concolor.

2132. *A. glaber*, gregarius, minutus, hemisphae-
 lius convexiuTculus margine acuto cinnaba-
 •ino - ruber. *Pers Synopf. pag. 677 & ej.*
ObP mycobg. 1 pag, 34 Tab, 4 fig, 5. b.

7. a. b. c.

Haud infrequent in fimo vaccino. Autumno.
(-aro concotor,

^a33- *A. marginatus*, congestus subconfluens, major
subhemisphaericus, convexus, ruargine acuto
piano thecis destituto, virefeens.

In Aevcore vulpina. August,

Caro concolqr.

²¹³⁴[, *A. coronatus*, gregarus vel sparsus, minu-
tilus, primo hemisphaeritus depresso fuligi-
neo nigricans demura vertice rupto lacinia-
tus hinc margine crenatus: crenulae vel la-
oni* (*epidennidis*) acutte patulae subreflexae;
diisco subplano, **pallido** fulvissimo atro-punc-
tulato. *Xyloia jectoides* Pers. Syn, p. 1⁵.
P. conxitis Baifch. *EL Fung. Cont.* 1 p. 217
Tab. *₇ fig. 15-.

In foliis dejectis Fagi Castaneae & sylvaticae (*Bag-
fyerd*), *Oaohx*, Novembr,
Caro pallida.

4(St) *Tr em ell a.*

Pileus gelatinosus ut plurimum plicato gyrosus
subsessilis. Theca? granuliformes immerse, lub-
obsoletae.

* *gyrosc, effuse v magne.*

•¹³⁵* *T. glandulosa*, appanata vel turbinata, crassa,
sessilis vel stipitata iusculosa supra atro ni-
tens ^laber subtus fuliginea punctis elevatis
evarperata. *T. glandulosa* Bull. *ry* ^*Q* fig. 1.

... fatic frequens. Autumno.

2136. *T. atrovirens*, applanata gyrofa, cradiufcul^t
fuliginea olivacea mbatra. *Bull* 2. 134. *Flor*[\]
Dan. Tab. **K83** *Jig.* 1.

In ramis fcmimitridis deje&is, Autumno,

2137. *T. wnbrina*_o applanata fubgyvofa lobata cras-1
fiufcula umbvino oiivacea, glaber niteiis.

In caudice Betul® albae fnbputrido. Decemb.

2138. *T. glauca*, applanata, gregaria gyrofa cras-|
fiufcula caifio glauca, glaber, nittns,

In ramulis deje<Stis fubputridis. Octob, Novbr.

- 2159- 2I. *mefenterica*, fubapplauata, gregaria fub-
gyrofa vel plicato iindulata pallida vsl au-
rantiaca-lutea **glaber** nitens, *T. chryjocoina*
Bull 2. 174. *Fhr. Dan. Tab.* 885 *Jig.* 3.

In ramulis dejetftis. Autumno.

3140. 7. *Jerpentina*, gyrofa inteftiniformis, fubte-|
res, **crafts**, longa, longitudinaliter fubfulca-
ta: fulcis abbreviatis confluentibus, nitens,
virens fubolivacea diaphana.

Ad terrain inter gramina. OAobr. Novethb,

- ai4i. *T. fcarlatina*, applanata, convex[^] tubercu-
loff>, fcarlatina-purpurafcens, compa&a.

In trunco putrido Salicum (*ved Rudersdal*). **Jui**

- 2142* *T. Cerasi*, gregaria gyrofo-lobata fubftipitata
dilute purpurafcens diaphana.

Inter corticem & lignum Pruni Cerasi. Decemb.

An potius Varietas PCZIZEE metamorpliie?

** *fubgyrofie, tubercutaritcformes.*

nosa, oblonga vel rotunda, majuscula, plicato-gyrofa pallida f ubumbi ina, ftipitata; ftipite brevirfimo nasi diktato libere affixo. *fPilden. in Botan. Mag. \. pa§. 17 Tab. 4 fig. 14?*

In ramis fra<flis Pini fylveftris (*.BirJierdd*)> Jul. *Caro centralis alba marginem verfus pallida. Specimen fingulum & poll, laturu J poll, eras-fum.*

5144. *T. encephalodes*, gregaria diftinda, carnofo gelatind'a, fuborbiculata vel difformis fublobata, depreffiufula, minutila, plicato-gyrofa, lutea-fubferruginea, ftipitata; ftipite breviffimo basi dilatato libere affixo.

In trunco Fagi fylvatica (*/ Dyrehaven*). Jun. *Caro pallida. Fungillus Jinguus^i Jub 2 lin. lotus, & lin. craffus. **

2145. ^ *alutacea*, gregaria (ubconfluens carnofo-gelatinofa, fuborbiculata, minutila, fubgyrofo-tuberculofa, alutacea, ftipitata, ftipite bre«viffimo cylindrico.

In ramulo dejedto fubputrido. Septembr. *Carp concolor fed dilutior. Fungillus i-*f tin. latus, 1 lin craffus. t*

2146. *T. virefcens*, gregaria, fubconfluens, gelatinofa, fuborbitulata, depreffiufula, gyrofo-tuberculofa, minutila, virefcens, diaphana reffilis. "

In trabibus fubputridis. Jun.

2147. *T. cinereo - viridis*, gregaria fubconfluen*selatinofa primo orbiculata pezizaeformis fu-

1 - ij poll, longus, 3 ramuli i - % lin. & ultra crass.

3156 *T. subclavata*, media subfolitaria, funginosa clavata apice subtuberculosa fordidelutea, compressiufcula, basi teres.

In ligno subputrido quercino. Novembr.

£ poll, hngus, Juperne 1 - 1J tin. crassus.

3. *applanata*, j'ubxnagna applanata elevata tuberculola subgyrofa + lutea.

2157. *T. palmata*₇ submedia, folitaria, carnosa subbocotiacea, lalco-aurantia, basi angusta deinriilatata cuxifipreria, apice ramofa: ramuli; firapliciffimis subteretibus subcylindricis obtufis, divaricatis.

In ijgno quercino. O(5tohr,

io8- *T. ligulata*₇ subminuta, gregaria, gelatinosa, clavata, cornpreffa, subrugulofa, obtufa basi nnguftata, palHda, diaphana.

In ftipitibus Pteridis aquilinte_t in pineto (veiz Birkeröd). Odobr.

t[- lin_t longa, f lin_y Jubcraffa*

462. *Ijaria*.

Subbyfibidea limplex rarnosaque pulvere farinaceo (subfilato) obdudta. (Subftantia molliuscula. Color utplurimum albidus),

2159. *I. musida*, minuta alba, cefpitofa, effufa, subdepreffa, bifurcata, inollis, ramulis fulvilib>aricatis subclavatis obtufiufculis. Byjffui frulicvloja Flor. Dan. 'Jab. 718yifr

Ad ligna putrefcentia Pini, Fagi Sec. Jul. —
etiam autumno vidi,

2i6o. *L. brachriata*, minuta alba, conferta credli-
ufcula fubrigida ramofa, ramis fubulatis' acu-
tis fl. 1bbori7.onn.Hbus. *Baifch. El Fung. Cont.*
I- fOg\ 254 Tab. 1\$ fig. 165.

Ad radices putridos plantarum & in aliis cor-
poriLus. Autumno.

2i6t. *I. Juh[implex7* minuta alba, cepitofa fub-
I intertexta, inferne fimpliciffima fuperne fub-
ramofa; ramulis breviffimis fubulatis acutis
creAiufculis.

In corporw quodam putrido. Autumno.

3i6a. *I.? tremellofa*, fubexigua, citrina, fubtre-
znellofa, eifufa, deprefa, ramofa ramis bi^-
viffimis planis rotundatis, furfuraceis.

In ligno quercino fubputrido rara. Novemb.

46}. *Himantia.*

Repens, villofa plerumque ramofo - fibrofa, mollis.

. 163. // *dome/tica** maxima fordid© violacea>el
fufca in membranam fubcoha*rens.

In domibus inter ligna fabrefacJla, quee deftruit.

ai6/j,. // *Candida*, media, tenera, Candida, effufa

B deprefa vcnofSm ramofa: ramulis brevibus
apice dilatatis fubtiliifime plumosis.

hx foliis &c lignis dejtattis. Vere & fere per to-
lum annum.

2i65. // *plumofa*, magna tenera, Candida, effufa,

Elle lanceis fubargenteis, fasciculatim

Cryptogamia, G. Fungi.

basi congestis, plumosim apicibus diffusis a planalis.

Inter corticem & lignum arborum subputridorum nee non in truncis cavis pnrirlis ha* elegans species nascitur. Per totum annum

8165. // *globalijha*, Media vel major, alba filiformis, ramoliflora, flexuosa submiculata ramulu tenuiffimis subcapillaribus, aliis globulis ovatis subdiaphanis albidis terminatis aliis nudis.

Hutao vegetabile in truncis cavis arborum inmixta. Per totum annum.

484. *Dematium.*

- Byffus forma indeterminata, erecta aut depressa fasciculata aut affusa. Filamentaria, via nee contexta, -
- 167. *D. cihare*, minutum, gregarium, -conferturn, fili. simplicissimi., rigidis, fetaceis vel subclavatis aterrimis. *Hypoxylum ciliave Bull 468. fig, 1.*

la U-uncio decorticato subputrido. *M&ate.*

3168. *D. aureum*, gregarium, fasciculatum, fobeffusum, fili, fetaceis, longis fimi) HeciffirniSj (ubrigidis, subflexuosis, subdepressis. aurantiaco-fulvis.

Inter lignum & folia dejecta. Per totum annum.

>fl. *O. fujcum*, sparsum fasciculatum Bjjautam Blit firapliciffiinu capularibus mollibus, erectis, basi fasciculatim congestis, fusco fuliginosis.

»: amine subputrido. Antimv.,>

2170. *D. slivaceum*, fparfum, fuba[^]gregatuxn, fafciculatum niinutiflunum, fiis fimplicibus val apice **xamosis**, fetacco-capillaribus naollibus, ere&is, basi falciculatim congeftis, primo dilute olivaceis deinde olivaceo-nigricantibus. In cliarta loco humido claufo depofita. Autumno.

2171. *D. conicum*, a£gregatrm confluens minutiffimum (*Juhpu'veraceUm*) filis fimpliciflimis. fetaceis, iubraollibus, basi diftmdtis, apic* approximtis, conum acuium formantibus_f nigro - olivaceis.

Ad capita Papaveris fonnifcri & in aliis plantis obfervavi. *Se:u* autumno.

465. *Erineum*.

Fila rigida grumofa in ccfpitulum foliis capituliforme iraprerfum conglomeratum, rarius effurum.' {*Epiphyllwii*).

2172. *E. acerinum*, fubeiTufum in angulis nervorum rarius in difco depreffum info-fufcum. In foliis acerinis delaplis. Autumno.

³¹73- & *alneum*, fubeffuJfum fubconfiuens projprimis in angulis foliorum rarius in difco, puK vinr₄tujii, fiilvo-fenugineum.

In foliis rtejefStis Batula' Alni. Autumno **viget**

2174. *E. betulinurn*, fubpulvinatuxn orbicnlare vel oblongum in diloo folii difpofitum vufo fufcum, •hi foliis delapris BetuItC albie. Autumno.

2175. *E. liliaceum*, pulvinatum orbiculare subconfluens in auto iuYu, unereo-pallidum.

In foliis de Jediis *Tiite* europea*. Autumno.

si76. *E. populinum*, cupulare subimmerfura orbi-

Pculare, vel oblongum in disco foii, luteo au
In foliis ad huc viridibus Populi nigrae. Julia
& August.

2x17, *E. aureum*, subpulvinatum orbiculare spar-
Ham minutum in disco foliorum, aurantiaco-
fulvura.

In foliis adhuc viridibus Populi tramulx. aestate

446. *Racodium.*

Expanfum molle, fells dense intertextis pancum
{*expanjum*} referens.

»J78- *R. cellars*, late expanfum molliffimum oli-
vaceo - nigrescens,

Dolia in cellis vinariis *extns* oblegens,

3179. *R. carneum*, expanfum effufum molle car-
neum,

In cortice Pini fylvestris emefrtui, in pineto
{*circa Birkerod*}.

21 *oc. H. cincrsum*, subexpanfum molle chiereum
hibglaucum.

In cortice Fagi fylvaticae subputrid*.

2181. *R. alutaceum*⁷ tenue expansum molle luteo
• alutaceum.

In trunco putrido quercino.

2182. it *pallidum*] tenue expansum molle fufco-
pallidum.

In trunco putrido Fagi fylvatic®.

2183. *R. umbrinum*, tenue expansum molle cine-
reo - uinbxinum.

In trunco subputrido tjuercino.

2184* *II. fuligineum*, denfe expansum molle ba-
(lio-fuligineum.

In fitfuris trunci csell Coryli Avellanae.

2185. *R. nigrum*, denfe expansum¹ molliffunum
fuligineo - nigrum subatrum.

In igno tlecorticato Jictulae albro, foliis dejectis
& ajiis corporibus fupernafcens.

2186. *R. album*, e.Kpajisum, densissime intertextum,
tuberculofujn album.

Hadibus Fagi fylvaticae arcle veftiens *Qi Ska*
in imellem Rudergaard og Birkerød). Jul.

467. *Byffus*.

Extensa, fills plerumque breviflimis subintertexti*
g. • umosis vel globuliferis.

2187- *B. {rfobuh^} . * . oblonga iube<fusa cinereo-*

subviolacea, filis dense intertextis, apice glo*
 Jmlis **fph»ricii** concoloribus.

In ligno quercino **fulrpttrido**. Novemb.

»188. *B. rufa*, **fubglomerata** confluens rufo-fer
 ruginea, fiils i'uliintertextis gruinosis.

In cortice Pyri Mali.

368. *Rhizomorpha*.

, Repens? rigida glabra (*intus Medulla villofd
 fardia?*) t

»189. **-A. fetiformis**, tenerrima, capilloris, **subfim-
 plex**, fiexuosa badio **nigricans**.

In pinelis ad terram **in ramulis** pini ac **foliis**
 ejusdem dejtftis.

INDEX UNIVERSALIS.

i *Generum Specierum Synonymorumque.*

| | | | | | |
|-------------------------|----|-------|--------------------|----|------|
| Acer * | I. | 298. | GroTularui | 2. | 225. |
| est re | i. | 298. | Uieracii | 2. | 223. |
| Plata;:ioides | i- | 298. | Majanthtt | 2. | 224. |
| N LuilatanUS | I. | 298. | May | 2. | 212. |
| A hi s | I. | 246, | Mercurialis | 2. | 224- |
| Mi Hefolium | 1. | 246. | Myrtilli | 2. | 227. |
| * * ntiica | I. | *4& | Periclymeni | 3. | 22^. |
| f<t'or us | 1. | ic8- | Pini | 2. | 226. |
| Celarnus | 1. | io8. | pundatum | 2. | 226. |
| A ci wa . | 1. | 164- | Ranunculi | 2. | *55- |
| fpicai a | I. | 164. | Rumicia | 2. | 224. |
| A crospermurn. | | | Tra^opogi | 2. | 225. |
| cylindf ieu&i | 2. | 441. | Tuffilaginia | 2. | 225. |
| A crostichum, | | | Urticae | 2- | 222. |
| fepte ntrioTial? | 2. | 14. | Viola | 2- | 424- |
| A doza | 1. | 123. | Egopodium | 1. | 88. |
| Wioic hatell'ina | 1. | 118. | Pr. &a graria | I* | 88* |
| A ecidium | 2. | 2^ I- | ^£/*c r / << ^ | I. | 118. |
| Anemones | a. | 226; | Ih - o caftanum | I. | 118. |
| 1 A"perifolii | 2. | sao. | JSt h 11 fa | I. | 91* |
| Berheridis | a. | 223. | Cynapium | I* | 9*. |
| C athartici | 2. | 225. | Ag a ricus | 2- | 244- |
| nellvtUEa | 2. | 226. | acrls | % | 545* |
| Con v r allaris9 | 2* | 2M> | acutis | 2. | 257- |
| corjn irtuxa | 2. | 1.1. | edm.tus | 2- | 260. |
| craff am | 2. | 222-t | adonidis | 2. | 273. |
| Ekm iæ | 2< | 221- | atUcendens | 2- | 323. |
| Fran guUi | a. | 285* | xiduftus | 2- | 5°9- |
| fulcum | 2. | 220* | j£fculi | 2- | 506. |

| | | | | | |
|----------------------------|----|-------------------|---------------------|----|------|
| aerugmeus | a. | 298. | bubulinus | 2. | 352. |
| aeruginofus | 2. | 24G. | bulbofus | 2. | 307. |
| seftivalis | 2. | \$59* | <i>bulbofus</i> | 2. | 307. |
| affinis | a» | 344» | campeftris | 2. | 252. |
| <i>Agaric Jrangi</i> | 2. | 261. | <i>campefiris</i> | 2. | 253. |
| ambido-umbrinus | 2. | 337. | canaliculatus | 2. | 351. |
| albipes | 2. | 286. | candidus | 2. | 253. |
| albo-marginatus | 2. | 261. | <i>Cantharcllus</i> | 2. | 367. |
| albus | 2. | 509. | canus | 2. | 336. |
| alliaceus | 2. | 270. | capillaris | 2. | 268. |
| allicinus | 5. | 270. | carneus | 2. | 342. |
| <i>Aleus</i> | a. | 570. | caftaneus | 2. | 326. |
| alneti | 2. | 28c | caudicinus | 2. | 255. |
| alternatus | *. | 35 ¹ - | cellulofus | 2. | 299. |
| alutaceus | 2. | 244. | cerinus | 2. | 338. |
| Amanita | 2. | 268- | <i>cernuus</i> | 2. | 275. |
| amethyfteus | 2. | 354- | cervinus | 2. | 328. |
| anguftatus | 2. | 520. | Chryfodon | 2. | 310. |
| anifatus | a. | 3? 5. | chryfofpermus | 2. | 265. |
| annularis | 2. | 264. | ciliaris | 2. | 360. |
| appendiculatus | 2. | 502. | <i>ciliaris</i> | 2. | 360. |
| applicatus | 2. | 266. | cinnamomeus | 2. | 359. |
| araneofus | 2. | 319, | cinereus | 2. | 350. |
| <i>araneofus</i> | a- | 320. | circinnans | 2. | 323. |
| arcuatus | 2< | 539. | circinnatus | 2. | 251. |
| <i>or tit I dinaceus</i> | 2. | 280. | cirratus | 2. | 308. |
| atramentarius | 2. | 356. | citrinus | 2. | 249. |
| <i>atramentarius</i> | 2, | j/56. | clavatus | 2. | 277. |
| atropes | 2. | 285. | clavus | 2. | 324. |
| 'aurantiaco-cro- | | | cocoineus | 2. | 290. |
| catus | 2. | 291- | coeruleus | 2. | 296. |
| <i>aurivellus</i> | | | collinus | 2. | 280. |
| Azonites | 2. | 544. | comatus | 2. | 350. |
| badius | 2. | 527- | compatftus | 2. | 285. |
| Beryllus | a. | 254. | compreffus | 2. | 274. |
| bicarnofut | 3. | 297. | congener | 2. | 288. |
| Boltonii | 3. | 356. | <i>congregatus</i> | 2. | 354. |
| b runneue | s. | 28*. | • nnirno | | |

| | | | | | |
|-------------------|----|-------|---------------|-----|-------------------|
| connatus | 2. | 299. | excentvicus | 2. | 36r. |
| j conocephalus | 2. | 267. | extinctorius | 2. | 357- |
| c onoideus | 2- | 272* | extmdlorius | = • | 357- |
| *convexus | 2- | 316* | fagineus | a. | 330. |
| c oprinifotmis | 2> | 274- | farinaceus | 2. | 265. |
| cornucopioides | 2. | 338. | fasticularis | 2. | 256. |
| 'orticola | 2. | 273. | ferruginens | 2- | 289. |
| crenulatus | 3. | fc9*. | ferruginoius | 2« | 358- |
| crispatus | 2. | 363. | fimbriatus | 3. | 261. |
| Cr ocalus | 2. | 272. | jlmiputris | 2. | 360. |
| c*ucibuHFormis | 2. | 32?. | filopes | 2- | 269- |
| crustuliniiformis | 2. | 322. | fi'ffus | a- | 301* |
| curtipes | 2. | 345- | flavipes | 2. | 275. |
| cuculatus | 2. | 269. | Mtxuofus | a. | 276. |
| cuculatus | 2. | 269- | foeniculaceus | 2. | 287- |
| curvatus | 2. | 3rg. | foenificii | 2. | 35 ^l > |
| c Y&neus | 2- | 262. | foraminulofus | 2. | 282. |
| cyathiformis | | 326. | fragilis | 2. | 245. |
| cynoxanthus | 2- | 246. | fruftulinus | 2. | 340. |
| deliciosus | 2. | 348. | fuliginofus | 2. | 328- |
| dentatus | 2. | 284- | fulvus | 2- | 247- |
| der tticulatus | 2. | 327. | funiculofus | *• | 299- |
| japhanus | a. | 285. | fufcipes | 2. | 296. |
| diliformis | 2. | 335- | fufcus | 2. | a go. |
| dilutus | 2. | 295- | fusiformis | 9. | g ^ - |
| diffeminatus | 2. | 354- | galericulatus | 3. | 303.. |
| distans | 2. | 353- | Gilvus | 2. | 313* |
| dryophilus | 2- | 287* | globofus | 2. | 296. |
| dryophylus | 2. | 287- | glutinofus | 2. | 259. |
| eburneus | 2. | 309. | gracilis | 2. | 252. |
| elongatus | 2. | 310. | granulofus | 2, | 250* |
| emeticus | 2. | 245. | gratus | ^ | 277. |
| epiphyllus | 2. | 307. | griseus | *> | 347- |
| epiphyllus | 2. | 307. | hamatus | 2. | 330. |
| Epyxylon | 2. | 266- | hirtipes | 2. | 273. |
| ericetorum | 2. | 329. | humofus | 2. | 3°6. |
| ericetorum | 2. | 330. | Hydrogrammus | 2. | 3°®» |
| | | 266 | hypnorum | 2. | 2«v 3. |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| impolitus | 2, 294* | meliooides | 2. |
| incarnatus | 3. 3 ^{OI} « | melleus | 3* 263. |
| inconjians | 2. 3 ^{^t} * | micaceus | 3. 357. |
| inoruftatus | a. 254- | imtis | 3. 265- |
| incurvus | 3. 33?. | monftrofus | 3. 340. |
| infundibulifor- | | <i>Mouceron</i> | 3. 336. |
| mis | 2. 297. | laufcarius | 2» 250. |
| infumlibulum | a. 317. | mujcarius | 2. 250. |
| ingratus | 3. 304, | mufcigenus | 2. 370- |
| inodurus | 2. 370. | mufcigenus | 2, 370. |
| integer | 2. 244. | mufcorum | 2. 279- |
| intvgrellus | 3. 336. | muftelinus | 2. 337. |
| integreUus | 3. 33 ⁶ * | muta bills | 3. 34 ^{t#} |
| interraedxus | 3. 361* | nebular is | 3* 33 ^{f*} |
| irroratua | 2 250. | nigrefcens | 2. 309. |
| labyrinth ijorm. | 2, 37J. | nigricans | 2, 334. |
| La cm us | c 3 ^{^3} * | nigricans | z. 309. |
| lacftiFluus | 2 3 4- | nitric ans | 2. 336. |
| lacuu fts | 2. 35 ^ | nigvi;>es | 3. 500# |
| lacvigdtus | 3- 273. | nig* ipes | ft. 306J |
| laevis | 2. ^7*. | nivt-us | 2. 351 |
| Ian at us | 2. 327* | nudus | 2. 33« |
| lateralii | 3. 264. | obcampanulatus | 2. 32I |
| Jignatilis | 2. 3*3* | obconicus | 2* 3-1 |
| lilacinus | 2- 293- | OfPSUS | 2. ^T'''I |
| Iimbatus | 2. 3i5. | oblitteratai | 3. 355' |
| Jividus | 2- 24 [^] * | obi'curus | 2. 279* |
| longicandus | 2. 275* | ochraceus | 2. 245. |
| longipes | 3» 2<J4» | ochvolevcus | 2. 245* |
| luridus | Ct* ?s4* | olivaceus | 3, -246' |
| lui'idus | 2. 34t'' | oftreatus | 3. 362* |
| luteus | 2. 318. | Pdchypus | 3, 322. |
| macro cepHalus | 2* 264* | pnllefcens | 3. 31 tr |
| isiaculatus | 2. 258* | pallidus | 3. 310, |
| Mappa | 2. 25°' | palmatus | 2. 3(?2» |
| marginatus | 2. J98. | papilionaceus | 2* 360. |
| xaatutinui | 2* 304* | parafiticus | 2. 308. |

| | | | | | |
|-----------------------|----|-------------------|------------------------|-----|------|
| <i>peronatus</i> | 2. | 3 ² 7. | <i>rofeus</i> | 2. | 292. |
| <i>phalloides</i> | 3. | 248* | <i>xubiginofus</i> | 2. | 276. |
| <i>Phiala</i> | 2. | 297' | <i>rufocephalus</i> | 2. | 288. |
| <i>picaceus</i> | 2. | 3<19> | <i>rufus</i> | 2. | 348. |
| <i>pileolaris</i> | *. | 3*6- | <i>rutilans</i> | 2. | 294. |
| <i>pilofus</i> | 3> | 282, | <i>fanguinarius</i> | 2. | 244. |
| <i>piperatus</i> | 2. | 342. | <i>fanguineus</i> | 2. | 324. |
| <i>plauus</i> | a. | 34 ^ | <i>falicinus</i> | 2. | 262. |
| <i>plumb eua</i> | 2. | 345. | <i>lemiglobofua</i> | 2. | 351. |
| <i>politus</i> | 2. | 295. | <i>femiovatus</i> | 2. | 359. |
| <i>Polymices</i> | 2. | 263. | <i>femiftriatus</i> | 2. | 352. |
| <i>pomposus</i> | 2* | 257- | <i>lellus</i> | 2. | 266. |
| <i>porreus</i> | 2* | 7,7U | <i>finuatus</i> | 2. | 249. |
| <i>praecox</i> | 2. | 3*5' | <i>fbciaius</i> | 2. | 353. |
| <i>procerus</i> | 2. | 253. | <i>ibrdidus</i> | 2. | 341. |
| <i>pronrinens</i> | 2. | 355. | <i>fpadiceogrifeus</i> | 2. | 303. |
| <i>prunulus</i> | 2. | 308* | <i>fphaleromor-</i> | | |
| pftttacinui | 2. | 2S9- | <i>phus</i> | 3* | 255. |
| <i>pubefcens</i> | 2. | 247* | <i>fplendens</i> | 2. | 258. |
| <i>pubefcens</i> | 2. | 306. | <i>fpongiofus</i> | 3* | 311. |
| <i>pun&ulatus</i> | 2. | 281. | <i>fquamofus</i> | 3- | 264. |
| <i>purpuvafcens</i> | 2. | 293. | <i>fquarrofus</i> | S* | 256. |
| <i>purpureus</i> | 2. | 325. | <i>ftercorarius</i> | 3, | 286. |
| <i>purus</i> | 2. | 392> | <i>Uriatulus</i> | 3> | 321. |
| <i>puftulatus</i> | a* | 251* | <i>Rrigofus</i> | 3. | 272. |
| <i>pygmeus</i> | 2. | 320. | <i>ftrobiinus</i> | 3, | 324. |
| <i>pyxidatus</i> | 3. | 321. | <i>Jirobilinus</i> | 3. | 324. |
| <i>quadrifarius</i> | 2* | 295* | <i>Aylobates</i> | 3> | 367. |
| <i>quercinus</i> | 3* | 301* | <i>ftypticus .</i> | ft. | 364. |
| <i>quercinus</i> | 3. | 372. | <i>fubcavus</i> | 3, | 362. |
| <i>radiatus</i> | 3. | 354- | <i>fubcernuus</i> | *. | 255. |
| <i>radicatus</i> | 3. | 383. | <i>fubcyathus</i> | 3> | 31S. |
| <i>ramealis</i> | 3* | 313. | <i>fubdulcis</i> | 2. | 346. |
| <i>repandus</i> | 3. | 321. | <i>fublactefcens</i> | 2. | 345- |
| <i>reticulatus</i> | 3. | 333. | <i>fubliquefcens</i> | 3* | 35S. |
| <i>rimofus</i> | 3* | 313. | <i>fubrapiatus</i> | 3, | 3^7* |
| <i>rofaceous</i> | 2. | 191* | <i>Jubrebandus</i> | 2. | 3>3> |
| | 2. | 292. | <i>fublellus</i> | 2. | 364* |

| | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|
| fubuiatus | i. aC6. | <i>A grimoni*</i> | j. 149. |
| fubverl'us | 2. 366. | Eupatoria | 1. 149. |
| fvaveolens | a. 337. | <i>Agroftetnma</i> | 1. 144. |
| tardus | 2. 327. | Githago | 1. 144* |
| tegrularis | a. 317. | <i>Agroftis</i> | j. 22. |
| tenellus | s. 302. | alba | 1. 23. |
| tener | 2. 263. | canina | 1. 23. |
| Thejogalu* | <<; 347- | capiUaris | j. 23. |
| tigrinus | 2. 313. | coardtata | j. 24. |
| tomentellus | *. 314* | rubra | 3. 23- |
| tcMnmulus | a. 349- | Spioa renti | 1. *3« |
| tortilis | »». 384- | ftolonifera | j]. 23. |
| tuherculofus | a. 3S6. | tenella |] . 24. |
| tuber ofus | a. 276. | <i>Air a</i> | j:.. 24. |
| tuvbinatus | 3. 317. | aquatica |] :. 24. |
| turfol'us | 2. 305. | <i>aquatica</i> | \ . 27. |
| umbonatus | »• 25*. | caiipitofa | 1 • 24. |
| umbruius | a. 2gi. | canefcens | jt. 25. |
| undulatus | »• ^a 74* | caryophyllea | jh 25. |
| unicolor | a. 177. | flexuo Ca | jL. 25. |
| urens | *• 343. | preecox | I- ,»5» |
| Vahlii | a. 158. | <i>Ajuga</i> | 1. 176. |
| val^us | 3. 316. | pyrumidalis |] [. 176. |
| variegatus | 2. 294. | xeptans | \ ; . 477. * |
| Telatus | a. 339* | <i>Alehemilla</i> |] [. 47* |
| velutipea | 2. 306, | Apbanes |] U 4H. |
| venofus | 2. 165. | vulgaris | 1 • 47^ |
| ventricofus | 2. 278. | <i>Alisma</i> | \ [. 116* |
| venuftus | s. 3=5. | Plantago | I* 116. |
| yerrucofus | a. 251. | ranunculoides | \ 1. 116. |
| verrucojut | »• 151. | <i>A Ilium</i> | :1. 103. |
| villofus | 2. 904. | oleraceum | I. 105. |
| violaceu9 | a. 33a. | Scorodoprasum | 1. 103* |
| >iride margina- | | urfinum | 1. 104. J |
| lus | a. if»K | <i>Alopecurus</i> | x, 22. J |
| virideicem | 2. 248. | geniculatus | I* 22. J |
| viridis | ft. 24a. | pratensis | I. 21. J |
| xylophilus | a. 27** | <i>A Is 1710</i> | 1. 07. |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|------|-------------------|----------------|
| media | I. | 97* | vulneraria | 1. 209. |
| <i>Amaranthus i</i> | 27 s* | | <i>Aphanes</i> | |
| Blitum | 1. | 278. | <i>arvensis</i> | 1* 48* |
| <i>Anagallis</i> | j. | 63* | <i>apium</i> | 1. |
| arvensis | I. | 6g. | graveolens | 1* 9*. |
| <i>Anchusa</i> | i« | 63* | Arab is | I* 197. |
| officinalis | I: | 65. | ThaLiana | 1. 197. |
| <i>Andromeda</i> | 1. | 134. | <i>Arbutus</i> | 1. 134. |
| polifolia | I. | 134. | Uva urfi | 1. 135. |
| <i>Anemone</i> | I. | 168. | <i>Ardium</i> | »- 235* |
| Hepatica | I. | 168. | Lappa | 1. 235. |
| memorofa | I* | 169* | <i>Arcyria</i> | 2. 211. |
| <i>Prateafis</i> | 1 | 16s. | alutacea | 2. 214. |
| <i>Pullatilla</i> | !.. | 168. | atra | 2. 215. |
| ranunculoides | I* | 169. | carnea | 2. 215. |
| <i>vetkum</i> | I. | 93. | <i>cincta</i> | 2. 215. |
| graveoiens | I. | 93. | cinerea | a. 213* |
| <i>Anglica</i> | I* | 95. | conjugata | 3.. 215. |
| Archangelia | 1. | 95. | cylindrica | 2. 215. |
| fylvefris | I. | 961 | dentata | 2. 213. |
| <i>AniEtangium</i> %* | 37< | | flava | 3. 212, |
| clia turn | 2, | 38. | lilacina | 2. 212, |
| <i>Antirrhinum</i> i* ig\$. | | | inelauocephala ». | 2 14- |
| Elaline | i _k | 185. | minor | 2. 213. |
| Linaria | I, | 186. | punicea | 2. 214. |
| minus | 1 • | 185. | rufa | 2. 214. |
| Orontium | I. | 186. | umbrina | 2, 213. |
| <i>Anthemis</i> | 1. | 246. | verinicularia | 2. 312. |
| arvensis | I. | 246* | Ar enaria | 1. 142. |
| Cotula | I» | 246* | jnariaa | 1. 143. |
| tintaoria | 1. | 246* | peploides | i. 142. |
| <i>Anthericum</i> | i- | 106. | rubra | i, 142. |
| ramofura | 1. | 106, | ferpillifolia | 142. |
| <i>Anthoceros</i> | 2. | 99. | trinervia | 1. 142, |
| pun(Status) | 2. | 5/9» | Arnica | 1. 241. |
| <i>Inthoxantum</i> | 1. | to. | montana | i. 241. |
| [Odoratum] | 1. | 10, | Artemija | 1. 237. |
| <i>Anthyllis</i> | x. | 209. | AbJiKthmm | 1. *3*. |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|--------------------|----|-------------------|
| carapeftria | i. | 237. | I.ibanotia | I* | 86. |
| maritima | i. | 237. | <i>Athyrium</i> | 2. | 15* |
| vulgaris | X ₄ | 138- | depauperatum | 2, | X ₇ - |
| <i>Arum</i> | i. | 254. | Filix foemina | 2» | 16. |
| niacuUitum | X* | 255* | lax urn | 3* | 16. |
| <i>Arundo</i> | I. | 34- | molle | 2. | IS- |
| arenaria | I. | 35- | ovutum | 2. | 16. |
| Calaruagroftis | I. | 35* | trifidum | 3* | 15. |
| <i>canejcens</i> | I. | 35, | <i>Atriplex</i> | X. | »99» |
| Epigejos | X* | 3«. | haftata | 1. | 399. |
| gracilis | I. | 35- | littoralis | I. | 99* |
| Phtagtnitis | X* | 35- | patula | X. | 299. |
| Itridla | I. | 36. | pedunculata | I» | 3 ⁰⁰ » |
| <i>AJclep ias</i> | 2. | 79. | <i>Auricularia</i> | # | 2. |
| Vincetoxicum | X. | 79. | Zturantica | 2. | 398. |
| <i>Ajco holies t</i> | a. | 436* | crifpata | 2. | 397- |
| coronatus | 2. | 437- | <i>corticalis</i> | 2* | 296* |
| furfuraceus | 2, | 436. | faginea | 3. | 399* |
| glaber | 2. | 4 ^ . | Illicina | 2, | 398* |
| marpinatus | 2. | 437. | pallida | 2. | 398* |
| <i>AJcophara.</i> | | | <i>papyrina</i> | 1. | 398. |
| <i>muccdo</i> | 2. | 137. | puipurea | 2. | 598. |
| <i>Afp aragus</i> | X* | ic5. | re flexa | 2. | 399. |
| ot.:r;inalis | I. | 106. | <i>Avcna</i> | » | X* |
| <i>Afp trgiltus</i> | 2. | 259. | elatior | I. | 34. |
| <i>AJp erugo</i> | I. | 64. | fatua | X* | 34* |
| pro cum bens | I. | *5. | flavefcens | I. | 34* |
| <i>AJp em la</i> | I. | 43- | pratenfis | I. | 34. |
| odorata | X. | 43- | pubefceos | I. | 34- |
| <i>AJp len ium</i> | 2. | M. | Jftrigofa | I. | 34. |
| <i>Scolopendriim</i> | t. | 14. | <i>Ballota</i> | I. | 180. |
| Trichoirunnes | 2. | i\$. | nigra | I. | 180. |
| <i>Aster</i> | £. | 345. | <i>Barbula</i> | » | 2* |
| • Tripolium | T» | *45- | amoeni | 2. | 43. |
| <i>Aft rag a his</i> | I* | 213. | cirrhata | 2, | 45« |
| danicus | I. | 213. | curta | 2. | 43. |
| glyciphyllus | i. | 213. | dubia | ^ | 45- |
| <i>At ham ant ha</i> | X. | 86. | fallav | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|----|-------|
| gracilis | 2. | 43- | <i>castaneus</i> | •• | 377- |
| incerta | 2. | 44- | caudicinus | 2. | 374. |
| lanceolata | 2. | | chryltherinus | 2. | 376. |
| ruralis | 2. | 46. | cineros | 2. | 290. |
| Schreberi | 2. | 43. | cinereus | 2, | 375, |
| unguit ulata | 2. | 44. | cinn. itriomeus | 2. | 377. |
| Bart r a m i a | 2. | o r . | coeruleus | 1. | 387. |
| p• aliformis | a, | 6u | communis | 2. | 376. |
| Bsllis | i. | 240. | concentricm | 2. | 387. |
| perennis | t. | 240 | conitueos | J. | 37J}, |
| Berberis | 1. | 103. | craftipes | 2. | 375;. |
| vnlgaris | 1. | 103- | cry: tarum | 2. | 389. |
| Betonica | 1. | 177- | decuriens | 2. | 374, |
| otFicinalis | 1. | 177. | elegans | 2. | 374 |
| Betula | 1- | 279- | floccopus | a. | 375 |
| alba | I- | 270- | foui^ntanus | *» | 356 |
| Alnus | 1. | 279. | giganteus | 2. | 333 |
| incana | I- | 279* | igniarius | j. | 385 |
| Bidens | 1. | 336. | irabricatus | 2. | 332 |
| cernua | 1. | 237. | incarnatus. | % | 391 |
| minima | I. | 237. | lacrymans | 2. | 571 |
| tripartita | X. | 236. | lateral** | 2. | 38c |
| Blasia | 2. | 99- | leycoporus | 2, | 375 |
| pusilla | 2. | 99. | cucidus | 2- | 3f.c |
| Blechnum | s. | 14- | maxinius | 2. | \$:, |
| Spicant | a. | 14- | Medulla panis | a# | 39 |
| Bolctus | a. | 375- | Muilufcus | 2. | 39 |
| acanthoideus | 2. | 383. | nigricans | 2. | 391 |
| angulatus | 2. | 388. | pelUporus | 2, | 39 |
| annulatus | 2. | 373. | perennis | i» | 37 |
| annulatus | 2. | 374- | perennis | 2. | 37 |
| hetulinus | 2. | 33y. | Placenta | 2. | 387. |
| hoviaus | 2. | 276. | platyporus | 2. | 382. |
| bovinus | 2^ | 376. | platyporus | * | 382. |
| BugloDTum | a. | 379* | plicatus | 2. | 389. |
| •aefius | 2. | 3K9- | <i>opulinus</i> | 2. | 384. |
| cttftus | 2. | 389. | p | 2. | 384. |
| | | | pubci'cens | 2. | 383. |
| | | | ramofus | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----|------------------|-------------------------------|-----|----|------------------|
| Ribi | 2. | 385. | <i>argensum</i> | j9. | %> | 66. |
| <i>rubcolaris</i> | 3. | 377* | <i>caepititium</i> | 3. | | 64* |
| <i>fcaber</i> | 3. | 375. | <i>capillare</i> | 2. | | 65. |
| <i>lquamofus.</i> | 3. | 381. | <i>carneum</i> | 5. | | 65. |
| <i>fubtomentofus</i> | 2. | 376. | <i>Celfd</i> | 3. | | 59. |
| <i>Julpiureus</i> | 3. | 384* | <i>exlin&orium</i> | 3. | | 39. |
| <i>i'vaveolens</i> | 3. | 3*5- | <i>jlexuojum</i> | 1. | | 56. |
| <i>tuberufus</i> | 3. | 377. | <i>glaucum</i> | 3. | | 58. |
| <i>tunicatus</i> | 3* | 391. | <i>heteromallum</i> | 3* | | 5 ⁶ - |
| <i>ttnicotor</i> | 3. | 392. | <i>julaccum</i> | 2. | | 66. |
| <i>velutinus</i> | 3. | 386- | <i>morale</i> | 3. | | 4 ¹ * |
| <i>verG color</i> | a* | 388* | <i>pallens</i> | a. | | 65. |
| <i>Botrytis</i> | 3. | 358. | <i>pelucidum</i> | 3* | | 59. |
| <i>ajru^inofa</i> | 3. | 238. | <i>pomiforme</i> | 3. | | 61. |
| <i>carnea</i> | 3. | 338. | <i>pulvinatum</i> | 3* | | 54<< |
| <i>cinerea</i> | 3. | 258. | <i>pyriforme</i> | 2. | | 35* |
| <i>Bra sji ca</i> | 1. | 196* | <i>rurale</i> | ft. | | 46. |
| <i>campeftris</i> | X. | 196. | <i>Jcoparium</i> | 3. | | 54. |
| <i>Briza</i> | I. | 9. | <i>Jimplex</i> | 3. | | 57* |
| <i>media</i> | 1* | 29, | <i>fquarruf^im</i> | 3. | | 66. |
| <i>Br omus</i> | I. | 41. | <i>Jtriatum</i> | 2. | | 73. |
| <i>arvenfis</i> | I. | 3*. | <i>Jtriatum fi.</i> | 3. | | 72. |
| <i>aCperⁱ</i> | I* | 3- | <i>Jtriatum S</i> | 2. | | 7 ¹ - |
| <i>giganteus</i> | X* | 33- | <i>Jubulatum</i> | 3. | | 41. |
| <i>mollis</i> | 1. | 3 ¹ * | <i>truncatuhwi</i> | 3. | | 36, |
| <i>pauciflorus</i> | I. | 32. | <i>undulatum</i> | 3. | | 5 ⁰ * |
| <i>pinnatus</i> | X. | 3*' | <i>Bum as.</i> | | | |
| <i>iecalinus</i> | U | !* | <i>Cakile</i> | I. | | 193. |
| <i>ftexilis</i> | X, | 3 ¹ * | <i>Bup Ie u rum</i> | I. | | 91. |
| <i>IV1 various</i> | K. | 33. | <i>tenuiffimurn</i> | J. | | 91. |
| <i>teCtorum</i> | 1. | 33. | <i>But Omus</i> | I. | | 130. |
| <i>Bryonia</i> | 1. | 2X4. | <i>umbellatus</i> | X. | | 130. |
| <i>alba</i> | X. | 2S4. | <i>Buxbaumia</i> | 3. | | 60* |
| <i>*? ry u rn</i> | 3. | 64. | <i>aphylla</i> | 2. | | 60. |
| <i>annotinum</i> | a. | 65* | <i>folio fa</i> | 2. | | 60* |
| <i>apocarpiitn</i> | 3. | 50. | - <i>ftyff^{tl} s</i> | 2. | | 447. |
| <i>apftcarpum ft.</i> | 2. | 3S. | <i>conoidea</i> | 2. | | 240. |
| <i>jtxgL'iitetun</i> | !? | <6. | <i>fruticulofa</i> | | | s ^i -1 |

| | | | | | |
|----------------------|----|-------|----------------------|------|------|
| <i>globulifera</i> | 2. | 447- | <i>Carduus</i> | I. | »33* |
| <i>rufa</i> | 2. | 448. | <i>acanthoides</i> | I. | 233» |
| <i>Cakile</i> | I* | 193. | <i>acaulis</i> | I. | 233. |
| <i>maritima</i> | I. | 193. | <i>crilpus</i> | & ** | 34* |
| <i>Calendula</i> | I. | 248. | <i>heterophyllus</i> | I. | 233. |
| <i>officinale</i> | 1. | 248. | <i>lanceolatus</i> | I. | 233» |
| <i>Calicium</i> | 2. | I gO, | <i>palustris</i> | x* | 233, |
| <i>abietinum</i> | 2. | 181. | <i>Car ex</i> | i# | a6t. |
| <i>adrperTum</i> | 1. | 181. | <i>acuta</i> | x» | *73» |
| <i>albidum</i> | 2. | 181. | <i>acuta</i> | I. | 274. |
| <i>arcyriseforme</i> | 2. | 181. | <i>ampullacea</i> | I. | 275. |
| <i>coryleura</i> | 2. | 182. | <i>appropinquata</i> | x* | 266. |
| <i>fagineum</i> | 2. | 181. | <i>arenaria</i> | I* | 266* |
| <i>lichnoides</i> | 2. | 180. | <i>bmoides</i> | x. | 264. |
| <i>quercinum</i> | 2. | 180. | <i>caespitosa</i> | i. | 269. |
| <i>Call a</i> | i. | 255. | <i>canescens</i> | x* | 263. |
| <i>palustris</i> | | 255. | <i>canescens</i> | x. | 265. |
| <i>Calii trie he</i> | i. | 2. | <i>catjfa</i> | i. | 274* |
| <i>androgyna</i> | I. | 3. | <i>curta</i> | x* | 263. |
| <i>hermaphrodita</i> | t. | 3. | <i>*digitata</i> | I. | 270. |
| <i>Calt ha</i> | x. | 167. | <i>dioica</i> | x* | 26a. |
| <i>palustris</i> | i* | 167. | <i>diffans</i> | xi. | 272. |
| <i>Camp anula</i> | I. | | <i>diffusa</i> | * | 164, |
| <i>glomerata</i> | I. | 7x, | <i>divulfa</i> | x. | 264. |
| <i>latifolia</i> | I. | 70. | <i>elegans</i> | I. | 271. |
| <i>perficifolia</i> | I. | 70. | <i>elongata</i> | ! | 265. |
| <i>rapunculoides</i> | I. | 71. | <i>extensa</i> | I. | 268. |
| <i>rotundifolia</i> | I* | 69* | <i>filiforrais</i> | I. | 268. |
| <i>Trachelium</i> | I. | 71" | <i>filiformis</i> | I. | 267. |
| <i>Ca nab is</i> | I* | 291* | <i>flava</i> | | 268. |
| <i>fativa</i> | I. | 29r. | <i>glauca</i> | I. | 273. |
| <i>Capnoides</i> | I. | 206* | <i>gracilis</i> | I. | 273. |
| <i>Halleri</i> | I. | ao6» | <i>hirta</i> | I. | 276. |
| <i>majør</i> | 11 | 307. | <i>huttis</i> | I. | 273. |
| <i>minor</i> | x. | 207. | <i>intermedia</i> | I. | 265. |
| <i>Cardamins</i> | x. | 197- | <i>lasiocarpa</i> | I. | 268. |
| <i>liirfuta</i> | I. | 197- | <i>Levcoglochin</i> | I. | 263. |
| <i>...tonfia</i> | I. | 197. | <i>limosa</i> | It | 271- |

| | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| <i>montana</i> | 1. 263. | <i>Scabiofa</i> | 1. *47. |
| muricata | 1. 263. | <i>Centaurium</i> » | l. 68. |
| <i>mw icata</i> | 1. sG*. | <i>inapertuua</i> | i _l 69, 1 |
| <i>bltuiangula</i> | i. 275. | <i>vul[^]tre</i> | l. 68. |
| obtufata | I* *7>t | <i>Centunculus</i> » | lt. 45. |
| Oederi | 1. 268. | minimus ^r | lt. 46. |
| <i>ovalis</i> | 1. 264, | <i>Ceramium</i> , | j1. TC9» |
| <i>p?!e Teens</i> | 1. 271. | <i>cartilagineum</i> | 2. 1 2* 1 |
| <i>ptllUtOfa</i> | I. 274, | conferfoides | j. 109. |
| panicea | I. 27U | "dichotomum | 2. III. |
| paniculate | I* a6<5. | <i>faliig[^]atura</i> | 2u 1 IO» |
| <i>paudjlora</i> | x- 262* | <i>fibrol'um</i> | li, XII. |
| <i>pilulifrra</i> | x. 267. | <i>filum</i> | ju, I II. |
| <i>praecox</i> | I, 267. | <i>lon[^]iffirnum</i> | 5. III. |
| <i>Pfeud-Cyperus</i> | T. 27s. | <i>plicatum</i> | 2•• Uu |
| <i>pulicaris</i> | I. 262. | <i>tomentorum</i> | a* no. |
| <i>recurva</i> | I. 272. | <i>viulaceum</i> | au IIO _r |
| <i>xemota</i> | x» 261* | <i>vira;atum</i> | ; HO. |
| <i>xiparia</i> | I* 274. | <i>Corafium</i> , | 3. I45» |
| <i>ftellulata</i> | x. 161* | <i>aquati'cum</i> | 1. 146'. |
| <i>ftirta</i> | I. 273. | <i>arvenTe</i> | 1. 146. |
| <i>Xabulata</i> | I. 270, | <i>femidecandrum</i> i* | 146. |
| <i>fylvatica</i> | I. 171. | vifcofum | i. 146. i |
| <i>tennis</i> | I. 268. | <i>vulgatum</i> | 3. 146. |
| <i>teretiufcula</i> | r. 567. | <i>CeratophyUum</i> \ | 2S1. |
| <i>veficuria</i> | 1. 275* | <i>demf-rium</i> | 1. 2gl. |
| <i>vtilpina</i> | I. 265. | <i>fulimerfurri</i> |] 2gl» |
| <i>Car Una</i> | !• 2J2* | <i>Char a</i> . | j. 260, . |
| <i>vnlgaris</i> | x. 132. | <i>flexilis</i> |] 2^0. |
| <i>Carum</i> | I. 88- | <i>hilpida</i> | 1. 26<9. |
| Carvi | i. 88. | <i>tornentofa</i> | 1. 260. |
| <i>Cane a Us</i> | 1. 85- | <i>vul[^]aris</i> | 1. 260* |
| <i>Anthrifcus</i> | x. 85- | <i>Chcerophyllunz</i> j. | S7- |
| <i>Carota</i> | I. 85. | <i>Cerefolium</i> j. | 87. |
| <i>Scarmicina</i> | 1. 86. | <i>fylveftre</i> j. | S7- |
| <i>Cant aurea</i> | i» 247. | <i>temuhim</i> i. | 87* |
| <i>Cyanus</i> | x. 347. | <i>ChelidfiTtium</i> , | 1. 164. |
| <i>Jacea</i> | I. 347. | jnaju*] | 164^^ |

| | | | |
|-----------------------------------|------|---------------------------|------------|
| <i>C^henopodiujnx.</i> | 81. | <i>abietina</i> | 2. 402. |
| album l« | 82. | <i>acuteiformis</i> | 2. 402. |
| Bonus Henricus u | 81. | <i>æquivoca</i> | 2. 383. |
| glaucuni I. | 82. | <i>uuvantid</i> | 2. 405. |
| hy! ridum 1. | 8'- | <i>botrytis</i> | 2. 401. |
| Inacitimum I- | 83. | <i>bulbofa</i> | 2. 405. |
| murale 1. | %*- | <i>byllifcda</i> | 2. 400. |
| polylpermum 1. | 83* | <i>capillaris</i> | 2. 406. |
| rubruin 1. | 81. | TCriftata | 2. 401. |
| tarbicum I. | 8t. | <i>cochleareFormis</i> | 2. 404™ |
| viride i. | 82. | <i>cornea</i> | 2. 402. |
| Vulvaria *• | B3. | <i>diaphfina</i> | 2. '40\$.- |
| <i>Chryfant he-</i> | | <i>digitata</i> | 2. 40 r. |
| <i>mum</i> i« | 241. | <i>digitata</i> | 2. 170. |
| toryrnhrofum 2. | 3. | <i>Erythropos</i> | 2. 406. |
| in-, durum *• | 241. | <i>Erytkropos</i> | 1. 406. |
| Levt anthemum I. | 241. | <i>fuit'igiata</i> | 2. 402. |
| Kgeturn I* | 241. | <i>filifurmis</i> | 2. 407. |
| <i>Chryfofle-</i> | | <i>filifornns</i> | 3. 40.7 |
| <i>niu m</i> 1 | 125. | <i>ffiulofa</i> | 2. 403. |
| alternifolium I* | 125. | <i>ilavipes</i> | 2. 404. |
| oppofitifitlium 1- | 125. | <i>fragilis</i> | 2. 404. |
| <i>dchorium</i> 1. | 224. | <i>gyrans</i> | 2. 406. |
| Intybus I. | 224. | <i>hirta</i> | 2. 404. |
| <i>Cicuta</i> 1. | 92. | <i>Hypoxylon</i> | 2. |
| virofa 1. | 9. | <i>ligula</i> | 2. 405. |
| <i>C^hineraria</i> 1. | 243. | <i>militaris</i> | 2. 175. |
| paluftris i. | 243. | <i>mitrata\$viridi\$%</i> | 40S. |
| <i>Circaea</i> 1. | 5* | <i>Mucerdæ</i> | 2. 405. |
| alpina I- | 5* | <i>mulcieinea</i> | 2- 400- |
| intermedia I- | 5- | <i>mulcoides</i> | 2- 401. |
| lutetiana I. | 5- | <i>mufcoides</i> | 2. 400. |
| <i>Cistus</i> 1. | 166. | <i>ophioglosfoida</i> | 2. 408. |
| Helianthemum i- | 166. | <i>paUida</i> | 2. 406. |
| <i>C^hui'binatus</i> 2. | 207. | <i>palmata</i> | 2. 4*01* |
| <i>Clavaria</i> 2, | 399. | <i>peniciilata</i> | 2- 407. |
| | | <i>penicillata</i> | a. 407. |

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------|
| pi lifer* | j2* 407* ' 1 | fur.orum | 3. 101 |
| piftillaris | a. 40V | fuf;>-ci(Tim« | l. icj |
| pyxidata | a. 400. | glomerata | 1. loflj |
| rugofa | 2. 400* | inteftinaiu | t. 101 |
| <i>Jpathulata</i> | ;>. 4«9- | Linum | «2. 101 |
| Jfcritta | 2. 401- | ochracea | 2. 101 |
| ftrigofa | s2. 403* | rivularis | j* ifl |
| villoTa | 1. 406. | rupeftris | ;2* icB |
| viridis | <1. 403. | Icalaris | ;2. 1cm |
| vifcofa | 3. 40:. | ffctiformit | v2* ial |
| <i>Clinopo dium</i> | j. ig:. | heiktris | 1 3 |
| vulgare | l. Ig?. | velutina | ;2. 101 |
| <i>Cnicus</i> | lc. 23J. | <i>Con turn</i> | 1. *. |
| a caul is | lu 23 ^ | iziaculatum | 1. A |
| heterophyllus | l. 233, | <i>Convalaria</i> | 1. 106 |
| lanceolatus | j. 232. | bifolia | x. :07 |
| oleraceus | ;l. 232* | majalis | l. 106 |
| paluftris | [• >t3t | multiftora | l. 107 |
| <i>Cockle art a</i> | 1. 191. | Poly^onatum | i1. iojk |
| Coronopus | I- 191. | vertirillata | 1. 107 |
| danica | 1. 191. | <i>Convulvulus</i> | j. 61 |
| ofRcinalis | I- 19 ¹ - | arvenfis | i. 69 |
| <i>Comarum</i> | lr. 161. | fepium | j., 6ai |
| paluftre | jr. 161. | <i>Cornnts</i> | lv * 47 |
| <i>Conferva</i> | *2' I?3. | faneuinea | v • 4. " |
| amphibia | :la 104. | fvecica | I. 4 ^ |
| bullola | a . 104. | <i>Cvryliis</i> | v. 28« |
| capillaris | i' 107. | avellana | 1. 38H |
| crinita | :t. J04. | <i>Cr a mbe</i> | ;>• 194 |
| crifpata | *U 108. | maritima | i. 190 |
| diaphana | a . 109. | <i>Crat ccgus</i> | 1. 1 S 1 |
| divaricata | a. 108. | <i>Aria</i> | 1. 156 |
| ericetorum | zu 107. | monogyna | 1. 155 |
| ffneftralis | :t 108. | Oxvacantha | j> * 155 |
| f - v ryflniea | i . IC7. | <i>Craterium.</i> | |
| flavelceris | 3. log. | <i>pedunculatum</i> | 3. 106 |
| fonttnalis | 2. 104. | <i>Crepis</i> | 1. 327 |
| frigida | ;I- 105. | biennis | • |

| | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| te&orum | 1. 227. | ferruginea | |
| Cri braAia | 2. 217. | gibboia | *. 373- |
| aurantiaca | 2. 21g. | quircina | a. 37-2. |
| aurantiaca | 2. 21(5. | De Iphinium | x« 166. |
| cernua | 2. 217. | Conioida | «• 16^, |
| di derm loidei | 2. 21g. | Detnatium | 2. 444> |
| Or i> fena | 2-2»S. | aiuvura | 2. 444* |
| stellata | 2. 218. | ciliare | a. 444. |
| Cucuhalus | I. 143* | conicum | 2. 445. |
| B: be a | I. 14 ^C - | fuiciun | •• 444- |
| viTcofus | I. 140. | olivaceum | 2- 445- |
| Cuscuta | 1. 48. | Dent aria | 1. 198. |
| europea | 1. 4S- | bulbifera | 1. 198. |
| Cyatkea | 2. 35- | Di ant hits | I. 133. |
| fra ilis | 2. 25* | Armcila | 1. na. |
| Cyathus | 2. 241. | arenarius | 1. 1 ^ 9 , |
| Crucibulum | 2. 24U | deltoide* | i . i ? 9 . |
| minutus | 2. 206. | fuperbus | 1. 139. |
| nititlus | 2. 241. | Jylveftris | 1. 140. |
| Olla | ∴ 14V. | Dicranum | 2. 54. |
| fcut^llaris | 2. 241. | Celsii | 2. 59- |
| ft ri atus | 2. 242. | cerviculatum | 2. 60. |
| Crnoglosum | 1. 65. | crilpum | 2. 57- |
| ** Offici aale | 1. 63. | fasciculatum | 2. 55- |
| Cynontadia | 2. 4... | ilexuofum | 2. 56. |
| capilla<eum | 2. 40. | glautum | 2. 58- |
| cernuum | 2. 40* | heteromullum | 2. 55. |
| Cyn oju rus | 1. 29. | paluftre | *. 59- |
| criftatus | 1. 29. | pellucidum | *• 59. |
| Cyperus | 1. | purpureum | 2. 58. |
| fufcus | 1. | pusillum | a* 58. |
| Dactylis | 1. 29. | Schreberi | 3* 59. |
| plomerata | 1. 29. | fcopariura | 2. 54- |
| Datura | 1. 75. | Jpurium | 2. 55- |
| •Stramonium | 1. 75. | fubulatum | 7. |
| Dautus. | | undulatum | a. 55. |
| Carota | 1. 85. | variuin | 2. 57. |
| Dædalea | a* 37 ^{a<} | DiCtydium* | |

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| <i>umhiticatum</i> | 2* 2tg. | tetragonum | »][. ia>- |
| <i>F)iderma</i> | 2. 190' | <i>Eruifctum</i> | z\$. 7-1 |
| acuminatum | 2. 198* | arvenfe | i. 7* |
| crasnpes | 2. 196. | <i>gluviatile</i> | a.. 84 |
| oblongum | 2. 197. | hiemale | a. 87 |
| fpurium | 2, 197, | limofum | jt. g.j |
| <i>umbilicatum</i> | *. 197- | <i>limofum</i> | *2. \$j |
| <i>vernicojum</i> | 2* 206. | paluftre | :!• 8' |
| <i>Didytnium*</i> | | fylviiticum | j. 7. |
| <i>tigrinum</i> | 2. 200. | <i>Erica</i> | r* 124J |
| <i>Didymodum</i> i. | 4,1 «, | Tetralix |]u 125* |
| pufilliim | 2. 41. | vulgavis |]fa 124* |
| <i>Dipfacus</i> | I. 42, | <i>Erigeron</i> | \. 24J' |
| fylveftris | I. 42* | acre | :t. 243' |
| <i>Draba</i> | I* 190. | <i>Erineum</i> | ;t. 44; |
| verna | I, I^O* | acerinum | jJ. 4451 |
| <i>Drojera</i> | I. 99. | alneum | 2 ^45'1 |
| longi folia | I. 100. | aureum | :2. 44 ^{6'} |
| rotundi folia | !• 99. | betulinum | 2. 445*1 |
| <i>Echium</i> | t* 65. | populinum | ;t. 44^ |
| vulgara | 1. 6\$. | tiliaceura | :?. 44^1 |
| <i>Matme</i> | 1. 129- | <i>Eriophorum</i> | f. 19' |
| Hydropipes | I. 12v; - | alpinum | j. 19' |
| <i>Elymus</i> | I. 37. | anguftifolium | \. 20' |
| arenarius | i- 37- | polyftachyora | j'a 2°' |
| caninus | 1. 37. | vaginutum | jt. x9' |
| <i>Empdtrum</i> | j. 290. | <i>Erodium</i> | j• 109* |
| nigrum | I, 290* | <i>Eryngium</i> | um |
| <i>Encalypta</i> | 2. 39. | maritimum | t. 84' |
| lanceolata | 2. 40. | <i>Eryfimurn</i> |]i. 193' |
| vulgaris | 2. 39. | Alliaria |]• iw |
| <i>Epilohium</i> | x. nr. | Barharea | \. 1931 |
| an^ruftifolium | 1. 121. | Cheyranthoides | t. 19* |
| hirrutum | 1. 121. | officinale | ;t. 193 |
| moatanum | I* J22, | <i>Ervum</i> | i]. a»H |
| nudum | t. 122. | hirfutum | jr. 21H |
| paluftre | I. 123. | tetrafermum |]i. 213' |

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|----------|
| canabinum | I. 236. | vesca | I. 159. |
| <i>Euphorbia</i> | I. 150. | <i>Fraxinus</i> | I. 300. |
| <i>exigua</i> | I. 150. | <i>excelsior</i> | I. 300. |
| <i>helioscopia</i> | I. 150. | <i>Fritillaria</i> | 2. 1. |
| <i>Peplus</i> | I. 150. | <i>Melcagris</i> | 2. 1. |
| <i>Euphrasia</i> | I. 183. | <i>Fucus</i> | 2. 112. |
| <i>Odontites</i> | I. 183. | <i>ceranoides</i> | 2. 112. |
| <i>officinalis</i> | I. 183. | <i>fattigiatus</i> | 2. 112. |
| j <i>Rhynchospora</i> | I. 77. | <i>furcellatus</i> | 2. 112. |
| <i>europaeus</i> | I. 77. | <i>ferratus</i> | 2. 113. |
| <i>&agus</i> | I. 282. | <i>vesiculofus</i> | 2. 113. |
| <i>Castanea</i> | I. 282. | <i>Fuligo</i> | 2. 193. |
| <i>fylvatica.</i> | I. 283. | <i>earnea</i> | 2. 194. |
| <i>Festuca</i> | I. 29. | <i>flavescens</i> | 2. 194. |
| <i>bromoides</i> | I. 30. | <i>Ircvis.</i> | 2. 193. |
| <i>decumbens</i> | I. 31. | <i>Lycoperdon</i> | 2. 193. |
| <i>dumetorum</i> | I. 30. | <i>plumbea</i> | 2. 193. |
| <i>duriuscula</i> | I. 30. | <i>rufa</i> | 2. 194. |
| <i>elatior</i> | I. 31. | <i>Fumarica</i> | I. 206. |
| <i>fluitans</i> | I. 31. | <i>bulbosa</i> | I. 207. |
| <i>ovina</i> | I. 30*. | <i>Hauseri</i> | I. 207. |
| <i>irubra</i> | I. 30. | <i>officinalis</i> | I. 206. |
| <i>Juncus</i> | I* 1^9< | <i>Funaria</i> | 2. 62. |
| <i>tanuncoides</i> | I. 169*. | <i>byrroraetica</i> | 2. 62. |
| <i>&ilago</i> | I. 248. | <i>Galeopsis</i> | I. 178. |
| <i>arvensis</i> | I. M%*. | <i>canabina</i> | I. 178*. |
| <i>germanica</i> | I. 248. | <i>Galeobdolon</i> | I. 179*. |
| <i>montana</i> | I. 248. | <i>Ladanum</i> | I. 178- |
| <i>Fisifidens</i> | 2* 52. | <i>Tetrahit</i> | I* 178. |
| <i>adianthoides</i> | 2. 53- | <i>Galiurn</i> | I* 43' |
| <i>bryoides</i> | 2. | <i>Aparine</i> | U' 44- |
| <i>pulvinatus</i> | 2. 53- | <i>boreale</i> | 44- |
| <i>Iciuroides</i> | 2. 54. | <i>Mollugo</i> | I* 44- |
| <i>taxifolium</i> | 2. 52. | <i>palustre</i> | I. 43. |
| <i>Liontina</i> | 2. 72- | <i>fylvaticum</i> | I. 44. |
| <i>antipyretica</i> | 2. 7* > | <i>uliginosum</i> | I* 43- |
| <i>sqnarrosa</i> | 2. 7?. | <i>verum</i> | I. 44. |
| <i>Ranunculus</i> | I. x\$9. | <i>Gentiana</i> | I* 80. |

| | | | |
|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| campestris | 1. 80. | microtomum | 2. 37. |
| lancifolia | 1> 80. | obtusum | 2. 36*1 |
| Pneuinonanth | 4tt gO. | ovatum | 1. 37. |
| pratensis | 1. 80. | pyri forme | 2. j 5. |
| <i>Gt o :loffum</i> | 5t. 407. | rutilans | 1. 37. |
| glabram | 3 • 4°7- | truncatum | 2. 35' |
| viride | a.. 40S. | <i>Gypfophylla</i> | I* 137. |
| <i>Geranium</i> | 1. 199. | muralis | l _m 137. |
| cha»rophyllum | jt. 300. | <i>Hedera</i> | 1. 78. |
| cicutarium | 1. 200. | Helix | 1. 78' |
| columbinum | iE 201. | <i>He lotium</i> | 1. 412. |
| difTe&um | 1. 201. | album | a. 412. |
| molle | 1. 20*. | elongitum | 3. 412. |
| pal w ft re | 1. 200. | ni^rip-s | 2. 412. |
| phuum | 1. 20C» | fuhreflile | 1. 41V |
| pratense | 3. 201. | <i>Helvetia</i> | 2. 410> |
| xobertinum | 1. 201. | albida | 2. 4' 11' |
| rotund i folium | 1. 202, | <i>cantharelloides</i> | 2. 368. |
| fanguiueum | 1. 202. | <i>crifpa</i> | 1. 367. |
| fylvaticum | 1E 200. | <i>dim 1 dint a</i> | 2. 370. |
| <i>Geum</i> | 1. 161. | elaficd | 2. 4' 11' |
| rivale | 1. 16t* | elculenta | 2. 4. t 1 |
| nrbanum | jt. 16 f. | <i>lacungfa</i> | 2. 4. 0. |
| <i>Glaux</i> | L 79- | levcophaea | 2. 410. |
| maritiina | 1. 79- | <i>mernbranacea</i> | 2. 3' 0. |
| <i>G lecoma</i> | 1. 175. | Mitra | t. 410. |
| hederacea | i- 175- | <i>Mitra</i> | 3. 410» |
| <i>Gnaph alium</i> | 1. 238* | <i>pallida</i> | 2. 4. 0» |
| arenarium | I* 2)9* | pulla | 3. 411. |
| dioicmn | *. 539- | <i>Hera cleum</i> | j. 96. |
| luteo-alhum | 1- *39' | Sphondylium | 1. 96. |
| fylvaticum | 1. *39« | <i>Hernia ria</i> | 1. 81. |
| uli^inofum | 1. 839. | glabra | 1. 81. |
| (. r i m m i a | *u 50- | hirfuta | 1. 81. |
| apocarpa | 2. 51. | <i>He/peris</i> | 1. ip7' |
| <i>Gymnoftomum</i> | 1. 35- | matronalis | j. 197. |
| falcicu *X9 | 7. 35. | <i>Hi t r acium</i> | 1. 228. |
| Hvitti i | a. 36. | | |

| | | | | | |
|-------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|-----|-------------------|
| Auricula | 1. | 228. | mufcoides | a. | 394* |
| cymoiūm | 1- | 229. | repfindum | 2. | 393. |
| dubiūni | 1. | 228. | <i>Hydrocharis</i> | 1, | 393. |
| njurorum | 1. | 229. | Morfus Ran® | 1. | £ |
| paludosum | I* | 23c. | <i>Hydrocotylei.</i> | | £ |
| Pilofella | 1. | 228- | vuls^{ar}i^s | 1* | 84- |
| prsmorfum | i» | 229» | <i>HyoJcyamus</i> | j. | 76, |
| fabaudum | 1. | 230. | niger | 1* | 76. |
| ISlvaticum | 1. | 229- | <i>Hypericum</i> | 1. | 218. |
| umbeliatum | 1. | 230. | hirfutuiū | 2. | 3 [^] |
| <i>Himantia</i> | a. | 443- | humifufum | I. | 219- |
| cmdida | 2. | 443* | montanuin | 1. | 219* |
| domeftica | 2. | 443- | ptrfi[^]ratum | j. | 219- |
| £lobulifera | 2. | 44.4. | pulchrum | 1. | CI9. |
| plumoia | 3. | 443. | quadrangulare | 1. | 3 [^] 8. |
| <i>liipnuris</i> | 1. | 2. | <i>Hypnum</i> | 2. | 76. |
| vulgaris | 1. | 2. | <i>adianthoides</i> | 2. | 53- |
| <i>Holcus</i> | 1. | *97- | aduncum | 2. | 85. |
| lanatus | 1. | 297. | albicans | 2. | 89- |
| molUs | 1. | »97- | atrovirens | 2. | 87* |
| odoratus | 1. | 297- | <i>bryoides</i> | 2. | 5«- |
| <i>Holojteum</i> | 1. | 39. | <i>complanatum</i> | 2. | 74. |
| umbeliatum | 1. | 39- | compreiTum | 2. | 78. |
| <i>HOT deum</i> | i- | 3«. | <i>cordifolium</i> | 2* | 82. |
| murinum | j. | 3«. | craQum | 2. | 82* |
| lecalinum | 1. | 39. | crifta caftrenfis | 2. | 77. |
| <i>Hottonia</i> | 1. | 60. | cupreffi forme | 2. | 85- |
| paluftris | 1. | 66. | <i>curtipendulum</i> | a- | 73. |
| <i>iumulus</i> | i, | 291. | curvatum | 2. | 90. |
| Lu;ulus | 1. | [^] 92. | cupidatum | 2- | 7 [^] 9. |
| <i>ilydnum</i> | a. | 392- | <i>dendroides</i> | 2- | 7 [^] 9. |
| auritcaluium | 2, | 3 [^] 3. | denti; uLatum | 2 | 7 [^] 9. |
| cerrinitm | 2. | 39 [^] - | filicinum | 2 | 7 [^] 9. |
| * | 1. | 392. | fluitans | 2, | 92. |
| circitum | • | 394- | illecebrum | 2. | 8t. |
| imbricaturō | 1. | 39** | intricatum | 2. | (M. |
| membranaceum | 2. | 394. | longiroTtrum | s • | 88* |
| minutum | 2. | 394* | Joreuui | a • | *7- |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|----------------------|----|-------------------|
| <i>molle</i> | 2* | 91. | <i>aetum</i> | 2* | JSt. |
| <i>jnyofuroidet</i> | 2. | 90. | <i>album</i> | 2. | 152. |
| <i>nitens</i> | 2. | 80. | <i>aquiiinum</i> | 2. | 152. |
| <i>paluftre</i> | 2. | | <i>arac hnoideum</i> | 2. | 251. |
| <i>parietinum</i> | 2- | 79- | <i>Artemi T-TB</i> | 2. | 153. |
| <i>piliferum</i> | a. | 89. | <i>conigenum</i> | 2. | 152. |
| <i>plumofum</i> | 2- | 78. | <i>Mali</i> | 2. | f52. |
| <i>populeum</i> | 2. | 9a. | <i>Mytilinum</i> | 2. | 153. |
| <i>praeJongum</i> | 2, | | <i>pedicellatum</i> | 2. | M3- |
| <i>proliferum.</i> | 2. | 8f. | <i>Pini</i> | 2. | if9. |
| <i>purum</i> | 2* | 91. | <i>Populi</i> | 2. | 152. |
| <i>riparium</i> | 2. | 91. | <i>pulicare</i> | 2. | *55- |
| <i>rutabulum</i> | 2* | 88. | <i>qutrcinum</i> | 2. | 151. |
| <i>Schreberi</i> | 3. | | <i>fambuci</i> | 2. | M1. |
| <i>Jciuroirles.</i> | 2. | 54- | <i>tuberculofum</i> | 2. | 155. |
| <i>fcorpoidet</i> | 2, | 86. | <i>Jasi one</i> | I. | 72. |
| <i>Jericeum</i> | % _t | 75- | <i>montana</i> | I. | 72. |
| <i>ferpens</i> | 3, | 85. | <i>Iberia</i> | 1. | 19 ¹ - |
| <i>fquavrofum</i> | 2. | 87. | <i>nudicaulis</i> | 1, | r\$.i- |
| <i>ftelJatum</i> | 2. | 88. | <i>Imp at tens</i> | 1. | 74- |
| <i>ftnatiun</i> | 2*' | 77- | <i>Noli tasgere</i> | 1. | 74. |
| <i>fylvatteum</i> | 2. | 5?- | | 1. | 243. |
| <i>laxifoliutn</i> | 3* | 74- | <i>britannica</i> | 1. | 242.- |
| <i>trichomanoides</i> | 2. | 88. | <i>Helenium</i> | 1. | 242. |
| triquetrum | 2. | 85- | <i>Puiicaris</i> | 1. | 242. |
| <i>undulatum</i> | a, | 82. | <i>i'aliciaa</i> | 1. | 342. |
| <i>volatimitn</i> | 2. | 75- | <i>Iris</i> | j. | 15. |
| <i>viticuhfum</i> | 2, | 2 24, | <i>Pfcud Acorus</i> | 1. | 16* |
| <i>Hypochaeris</i> | 1. | 224. | <i>fpuria</i> | i» | 16, |
| <i>macuUta</i> | 1. | 224. | <i>Is aria</i> | I* | 442* |
| <i>radicaia</i> | 1. | 224. | <i>brachiata</i> | 2. | 443* |
| <i>Hypophae</i> | 1. | 290, | <i>mucida</i> | 2. | 442. |
| <i>Hhaiinoides</i> | 1. | 290. | <i>subsimplex</i> | 3. | 44?* |
| <i>Ilypoxylum,</i> | | | <i>tremellofa</i> | 2. | 443- |
| <i>ciliare</i> | 2. | 444- | <i>T foeti»</i> | 2. | 6. |
| <i>fcahrofum</i> | 2. | | <i>Jacuftrii</i> | 5, | 6- |
| <i>My fitriu</i> | 2. | 151. | <i>Juncus</i> | 1- | 108. |
| | | | <i>articulatus</i> | 1. | 100 |

| | | | |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Iufonius | I. III. | <i>amplexicaule</i> | I. 179. |
| bulbofus | I. no. | <i>purpureum</i> | 1. 177* |
| cam eftris | i. 112. | <i>Lapfana</i> | I* 232. |
| conslozueratusi | i. 108. | <i>communis</i> | x, 237. |
| effu UA | . 108. | <i>Laserpitiumi.</i> | 96. |
| fiiiiformis | i. 109. | <i>latifolium</i> | I- 96. |
| glaucus | i. 108. | <i>L at firm a</i> | I. 182. |
| maximus. | I. 111. | <i>fquammaria</i> | 1. 182. |
| piloi'us | I. 11 U | <i>La thyrus</i> | I. 210. |
| retro flexus | I. 109. | <i>paluftris</i> | I. |
| <i>Sprengelii</i> | I. III. | <i>pralenfis</i> | I. an. |
| fquarrofus | 1. 109. | <i>lylveftris</i> | I. |
| fubverticillatus | i. I ic. | <i>tuberofus</i> | I. 2(0. |
| fupinu& | I. nc. | <i>Ledum -</i> | I. 135. |
| fylvaticus | I. IC9. | <i>palu ftre</i> | I. 135. |
| <i>Jungermannia</i> | 2, 94- | <i>Le mna</i> | I. 261. |
| albieans | 2. 95- | <i>gibba</i> | I. 26 . |
| bicufpidata | 2. 95* | <i>minor</i> | I. 261. |
| compa&a | 2* 94" | <i>polyrhiza</i> | I. 261. |
| roinplanata | 2. 95. | <i>tri fulca</i> | I. 261. |
| dilatata | 2. 97. | <i>Lepidium</i> | I. 192. |
| e piphylla | 2. 97- | <i>lati folium</i> | I. 192* |
| fragilis | 2. 94, | <i>rudérale</i> | I. 191. |
| furcata | 2. 98. | <i>Leontodon</i> | I. %*%> |
| pin,-uis | 2. 98. | <i>autumnale</i> | I. 226. , |
| platyghylla | 2. 97- | <i>hifpidum</i> | I. 22 |
| po•lyanthos | 2. 9V | <i>Leonurus</i> | I. 175. |
| pufilla | 2. 96. | <i>Cardiaca</i> | I. 175. |
| rept _t ,hs | 2. 95. | <i>Leotia.</i> | |
| Trichomanii | 2. 96. | <i>luhrica</i> | |
| tamanfcifolia | 2. 97- | <i>mitrhJa</i> | 3. 410, |
| viticuloffi | 2. 94. | <i>Leshe a</i> | *. 74- |
| <i>Juniperus.</i> | i. | <i>'complanata</i> | 2. 74. |
| com munis | 1. ^94. | <i>dendroidea</i> | a- 75.J |
| <i>La t i uca</i> | j. 228. | <i>poly anth a</i> | 2. 75.i |
| lca.riula _a | I. 228. | <i>polycarpa</i> | 2- 75,' |
| <i>Lamiu m</i> | I. 177. | <i>i eric eft</i> | 2. 75.< |
| <i>album</i> | I. 177. | <i>i'ubtilis</i> | 2, 76. |

| | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------|
| trichomanoides a. | 74- | fapneus | 2- 12?. |
| <i>Lie ea</i> | 2- 219. | ffirinaceus | 2. 135. |
| caesia | 2. 2ic>. | fastigiatw | 2. 135. |
| /nacroferma | 2, 219. | filiformis | 2. 137. |
| <i>Lie hen</i> | 2. iai- | fimbriatus | 2. 136. |
| aculeatus | 2. 139. | fldvovirens | 2. 125. |
| rerugiufus | 2. 125. | flavu« | 2* 121. |
| albus | 2. 121. | floridas | 2- 140. |
| amphibolus | 2. (23. | fi-axineus | 2. 134- |
| analeptus | 2. 122. | furcatus | 2, 138- |
| anceps | 2» 126. | furfuiviceus | 2- H4- |
| aphthofus | 2. 133- | gpos^raphicus | 2. 123- |
| arcuruatus | 2- 122, | glauc ma | 2- 126. |
| ergenur | 2. 121* | Ilft^oni | 3. 126. |
| atomarius | 2. 122* | hypnorum | 2. i^8» |
| barbatus | 2. 140. | juhatus | 2. 140. |
| fcotryoides | 2. 111* | junipftrinus | 2. 133. |
| Vsyffoides | 2. *3 ⁶ - | lapidida | 2« 127. |
| eaperatus | 2. 131. | limbJus | 2. 13^* |
| capitatus | 2. 13 ⁶ * | luteolus | 2. 124* |
| ofofius | 2. 129. | Juto Teens | 2. 121. |
| candelarius | 2. 128. | mela!evru9 | 2* 122. |
| caninus | 2. 152- | murorum | 3. 129. |
| centrifugus | 2. 130. | mufcorum | ft. 1»8. |
| ciliaris | 2. 134* | olivaceus | S. 131. |
| cinereo-fufcus | 2- 124- | omphalodes | 2. 13c |
| cinereus | 2. 123* | parafrmus | 2. 127. |
| • cocci ferus | 2. 136. | pavietinus | 2. 131. |
| eonfluens | 2. 117- | pafchalis | a. 139. |
| confperfus | 2. 131* | <i>pertufus</i> | 2. 170. |
| «ornutus | 2. 137- | phy lodes | 2. 130. |
| J corticcla | 2* 126, | polydactylus | 2. '33- |
| corrugatus | 2- 131- | prunaftri | 2. 134. |
| i detritus | 2- 128. | pulmonarius | a* 137. |
| tligitatus | 2. 137- | pulverulentus | 2. 130. |
| difcoideus | 2. 133. | pyrinus | 2. 1=5. |
| i effufus , | 2- 125. | pyxidatus | 2. 136. |
| itricetorum | 2. 135. | xaneiferinm | 2. 136. |

| | | | | | |
|----------------------|----|---------------------|----------------------|-----|-------------------|
| ro fellas | 2. | t2J. | catljarticum | I. | 99. |
| rojeus | 2. | Ig6 _r | radio te | 1. | 99. |
| lalicinus | 2. | 124. | <i>Lit hofpermum</i> | 1. | 67. |
| fanguiuarius | 1. | **7, | arvenle | 1. | 63, |
| faxatilis | 2. | 13,-\ | oB'irinaie | 1. | 63. |
| faxicola | 2. | ICQ. | <i>Littorella</i> | I. | a8<v. |
| <i>Jcriptotsfi,</i> | 2. | 153. | lacuftri^ | 1. | 280* |
| fi i K)fuS | 2, | 123. | lo Ham | 1. | 36* |
| feytropu* | 2. | I2g. | pcrenue | I. | 36. |
| femula | 2. | 133. | temuk ntutn | r. | 30>. |
| fophodes | 2. | 127. | <i>Lonicer a</i> | T. | 73* |
| fjnoIS | 3. | 139. | Periclymenum | I* | 72 |
| ftcuaria | 3. | 129. | Xylofteum | *. | 7. |
| Aitflius | 2. | I2Z. | <i>Lotus</i> | i- | 216. |
| fubfulcus | 2. | 121. | corniculatus | I. | 216. |
| fubuhitof | 2. | t)». | <i>Lychnis</i> | I* | U5- |
| tenellus | 2. | 1J4- | Flos cuculi | 1* | 145- |
| trepliomela* | 2. | 127. | pratensis | 1. | 14> |
| tUrbينات | 2. | 137. | ly Ivestris | I. | 145* |
| varicpattu | >. | 121. | vifcaria | I- | 14^. |
| varios | a. | 134. | <i>Lycogala</i> | 2. | 192. |
| venofus | a. | 130. | cinerea | 2. | 193. |
| vermicularis | 2 | 139- | ferruginea | 2. | 191. |
| viridefcens | 3. | 125. | mini at a | 2. | 192, |
| vitelHnus | 2. | 124. | pluitvbea | a* | >>9T. |
| uliginofus | 2. | 128. | <i>Ly coperdum</i> | 2. | 189. |
| "Ilmi | 2. | 126. | ardopacum | *. | 193v |
| uncialis | 2* | 138. | Bovil'ta | >>. | 190. |
| upfali^nfis | *. | 123. | corniferum | 1. | 222.. |
| <i>Lieu ft rum</i> | I. | 5- | ecb't-natum | 2. | 190. |
| v ¹ 'gare | I- | 5' | Epidendrum | 3. | 19s. |
| Lime f\$11 a | I. | 187. | favogineurn | 2* | 207. |
| nqualica | I. | 1 S ^v 7» | gemmatuia | 2. | H 02 |
| <i>Lin ckia</i> | \. | 114. | lumhricale | 2. | 007^ |
| granulata | 1* | 114. | ovoideum | 2. | 190. |
| hemilphajrica | 2. | 114. | papiilatam | 2. | 19U |
| prunif>rTAi>> | ^> | IU. | penivrfUitum | 5. | 112. |
| | I. | 99. | pratense | >>. | 19 ¹ * |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| pufiHum | 2. | 191. | <i>Medicag9</i> | 1. | 217. |
| pyriforme | 2. | 190. | lupulina | 1. | 217. |
| laccituin | 2. | | polymorpha ara- | | |
| tellatum | 2- | x* 1. | bica | r. | 217. |
| iruncatwn | 2. | 413- | fativa | 1. | 217. |
| "ngulinum. | 2. | | <i>MUampyrum</i> | j. | 184. |
| <i>Lycopodium</i> | 2. | 11. | arvenJe | 1, | 184. |
| annotinum | 2^ | 11. | criftatum | 1, | i84. |
| clavatum | 2. | 11. | nemorofum | 1. | »84- |
| SeJaga | 2. | 12. | pratense | 1« | '84- |
| <i>lycopfis</i> | 1t | 65. | <i>Mqlie a</i> | 1. | 25. |
| arven'is | 1. | 65. | coerulea | 1. | 26. |
| <i>Lycopus</i> | 1. | ,0. | nutans. | 1. | 26. |
| euroæus | 1 | | uni flora | i. | 2(T. |
| P | | | <i>Mentha</i> | 1. | 175. |
| <i>Lyfimachia</i> | 1. | 67. | aqu-itica | 1* | 176. |
| nemororum | 1. | 67. | ar vends | 1. | 176. |
| numularia | 1. | | hirfuta | 1* | 176. |
| thyrfiflora | j. | 67. | fativa | | 176. |
| vul aris | 1. | 67. | <i>Menyanthes</i> | 1. | |
| <i>Lythrum</i> | 1. | 149. | trifoliata | u | 66. |
| Salicaria | 1. | 149. | <i>Mercurialis</i> | j. | |
| <i>Malaxis</i> | | 253, | annua | j. | 292. |
| Loeselii | 1, | 253. | perennis | 1, | 293. |
| paludofa | i _t | 253. | <i>Merisma</i> | a. | 399. |
| <i>Malva</i> | 1, | 20*. | criftatum | 2. | 399* |
| Alcea | 1. | 203. | <i>Meru lius</i> | 2. | 367. |
| xotundifolia | j, | 205. | j\neus. | 2- | 370. |
| fylveftris | %. | 203. | seruginofus | 2. | 371. |
| <i>Marchantia</i> | 2* | 08. | aurantiacus | 2. | 367. |
| polymorpha | 2. | 98^ | canthureHoides | 2* | 368. |
| <i>Marrubium</i> | 1, | igo, | Cantharellus | 2. | 368. |
| vulgare | i. | !g04 | conicus | 2r | 369. |
| <i>Ma trie aria</i> | 1, | 240, | galeatu* | 2. | 371. |
| <i>Chamomilla</i> | i ₄ | 240. | lacrjznans | 2- | 371. |
| imritima | r. | 240. | lubricus | 2. | 368. |
| officinalis | 1. | 240. | <i>muscigenus</i> | 2. | 370. |
| Partheniur _n | 1. | 240, | retrirugus | 2. | 370. |
| > aveolens | 1. | 240, | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------------------|---------------------|-----|------------------|
| tortilis | 2. | 369- | Penicillus | '2. | 239. |
| tremellofus | 2. | 372- | Tf 0 <i>notropa</i> | I. | 134* |
| undulatus | 2, | 367. | Hypopithys | I. | 134. |
| vastator | 2. | 371. | <i>Montia</i> | 1» | 39* |
| <i>Me sia</i> | o, | 61. | fontana | *• | 3&» |
| lon^ifeta | 2. | 6r. | <i>Mu cor</i> | 2. | 256. |
| <i>Mi Hum</i> | I. | 22* | caninus | 2, | '*17> |
| effufum | I. | 22. | <i>Eryfiphe</i> | 2. | 187. |
| <i>Ml trula</i> | a. | 409. | flavidus | 2» | 237. |
| Heyderi | 2, | 409. | Herbariorum | a- | 23 ^ |
| <i>Mn ium</i> | 2. | 67, | <i>lichcnoides</i> | 2. | 180. |
| <i>annotinum</i> | a, | 66. | Mucedo | 2. | 2*7* |
| hiinum | a. | 68. | nigrelcens | 2. | 237. |
| crudum | 2* | 67^ | tenellus | 2. | 237» |
| cufpidatum | 2* | 69. | <i>My agr urn</i> | !• | 190. |
| fontanum | 2. | 7°* | paniculatuui | I. | 190. |
| hornum | a. | 67. | fativum | I. | 190* |
| <i>hygrometricwn</i> | 2. | 62. | <i>My ofoth</i> | I, | 62. |
| paluftre | 2. | 67. | arvenfis | 1. | 6*. |
| <i>pellucidum</i> | 2. | 38. | Lappula | I. | 62, |
| <i>polytrichoides</i> | 1. | 49. | paluftris | 1* | 62. |
| <i>polytrichoides ft</i> | 2. | 49* | fylvatica | I. | 61. |
| pfeudotriquetr. | 2<> | 6g. | <i>Myofu rus</i> | I. | 100. |
| punftatum | 2. | 69. | minimus | I, | 100 _k |
| <i>purpureum</i> | a. | 58- | <i>Myrica</i> | I. | 291. |
| roleum | 2. | 69. | * Gale | 1- | 591. |
| <i>Jerpillifolium a.</i> | 2. | 69. | <i>Myriophyllum</i> | I» | 48°! |
| <i>ft</i> | 2* | 69- | fpicatum | 1, | 2fir, |
| i | 2. | 69. | verticillatum | 1. | 281 |
| - . . i | 2. | 70. | <i>Narciifus</i> | J. | 103 |
| <i>Iriquetrum</i> | a. | 62. | PJeudo-Narciiff. | 1. | 10? |
| turbinatum | 2' | 63* | <i>Nur dus</i> | 1. | 20 |
| undulatum | 2. | 69. | ftviffa | 1. | 20 |
| <i>Mo nilia</i> | 2. | ³ 3S» | <i>Nek era</i> | a. | 7! |
| Candida | 2. | 239. | curtipendula | 2. | 73 |
| diffitata | a. | 239. | viticulofa | 2. | 71 |
| fruftieena | a. | 239. | <i>Nemaspora</i> | 2* | 177 |
| | 2 | «««• | crocea | a. | 175 |

- | | | | | | |
|--|----|-------------------|--|----|-------------------|
| faginea | 2. | 17 ⁹ . | quercina | 2. | 141- |
| Juglandis | 2. | 178. | radiata | 2. | 142. |
| o | 1. | 180. | xufcfcen9 | 2. | i4r- |
| Nepeta | 1. | 180. | O[^]kiogloJJu^{TO} | 2. | 12- |
| Nidularia* | | | vulgatum | 2. | 12. |
| <i>campanalata</i> | 2* | 242. | Opkrys | 1. | 252. |
| <i>laevis</i> | 2* | 241. | <i>cordata</i> | 1. | 252. |
| <i>striata</i> | 2. | 242. | Nidus avis | 1. | 252. |
| <i>strigata</i> | 1. | 165. | <i>Loefelii</i> | 1. | ^53- |
| Nrmp hcea | 1. | 165, | KK nuvchiS | 1. | 253- |
| <i>alba</i> | 1* | i65» | ov ^{ata} | 1- | 253. |
| <i>lutea</i> | - | - | <i>patudnfa</i> | X« | 253* |
| O&ofpora. | | | <i>lpiraiis</i> | 2. | 4' |
| <i>applanata</i> | 2* | 4*8- | Or chis | 1. | 250* |
| <i>atrata</i> | 2* | 4i7. | <i>bifolia</i> | 1. | 250, |
| <i>calyciformis</i> | 2. | 424. | <i>conopsea</i> | 1. | 351. |
| <i>citrina</i> | 2. | 430, | <i>latifolia</i> | 1. | 25t» |
| <i>purpurea</i> | 2. | 418. | <i>maoulaU</i> | Z. | 25 ¹ . |
| O en ant he | 1. | 87* | <i>mKicula</i> | I. | 2\$0. |
| <i>fistulosa</i> | 1. | 87. | <i>militaris</i> | I* | 250. |
| Oenothera | 1. | 121. | <i>Morio</i> | I. | 250» |
| <i>biennis</i> | 1. | 121. | <i>uftulata</i> | I. | 250. |
| Ononis | 1. | ao8". | Origanum | 1. | 182. |
| <i>arvenfU</i> | 1. | a©9. | <i>vulsare</i> | I. | 182. |
| <i>hircina</i> | 1. | 209. | Orobancnc | 2. | 2. |
| <i>spinola^N_k</i> | 1. | 203. | <i>major</i> | 2* | 2* |
| Onopordon | 1. | n5« | Oro bus | I. | 210* |
| <i>Acanthi urn</i> | 1. | 235* | <i>niger</i> | I* | 210. |
| O nygen a | 2. | 220. | <i>tuberofus</i> | I* | 210. |
| <i>decorticata</i> | 2. | 219. | <i>vernus</i> | 1. | 210« |
| <i>equina</i> | 3. | a2o. | Ornithogalum | 1. | 104. |
| Opegrapha | 2. | 140* | <i>luteum</i> | I- | 104. |
| <i>betulma</i> | 2. | 141* | <i>minimum</i> | 1. | 105. |
| <i>fnai nea</i> | 2. | 14*- | <i>nutan9</i> | X. | 105» |
| <i>gemina</i> | 2. | 14I* | <i>fpathaceum</i> | I. | 105» |
| <i>lichenoides</i> | 2. | 14 ^ | <i>umbellatum</i> | I. | 105* |
| <i>litterella</i> | a. | 14-- | Orthotnchum | 2, | 70. |
| <i>macrocarpa</i> | 2. | 14 ² * | <i>aiine</i> | 2. | 70. |
| <i>puiverulenta</i> | 2, | X42. | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|-----------------|------------------------|----|-------|
| <i>anomalum</i> | 2. | 72, | <i>albomarginata</i> | 2. | 436, |
| <i>crispum</i> | 2. | 71, | <i>Alni</i> | 2. | 417. |
| <i>diaphanum</i> | | 71. | <i>alutacea</i> | 2. | 431. |
| <i>obtusifolium</i> | 2. | 71. | <i>axncntalis</i> | 2. | 418. |
| <i>pumilum</i> | 2* | 71. | <i>anomala</i> | 2. | 423. |
| <i>ftriatum</i> | 2» | 71. | <i>applanata</i> | 2. | 42^. |
| <i>Osmunda</i> | 2. | 12. | <i>atrata</i> | 2# | 417, |
| <i>Lunaria</i> | 2. | 12. | <i>auraniia</i> | 2. | 416, |
| <i>regalis</i> | 2. | 12. | <i>aurantiaca</i> | 2. | 432* |
| <i>Spicant</i> | 2. | 14. | <i>bicolor</i> | »• | 425* |
| <i>Oxalis</i> | 1. | 144- | <i>bicolow</i> | 2. | 425. |
| <i>Acetofella</i> | 1. | 144- | <i>callofa</i> | «• | 417* |
| <i>ftritta</i> | 1. | 144. | <i>calycula</i> | 2» | 429. |
| <i>Panicum</i> | 1. | 21. | <i>calyculaeformis</i> | 2« | 425. |
| <i>viride</i> | 1. | 21. | <i>calycina</i> | 2. | 424* |
| <i>Paparver</i> | 1. | 164. | <i>catycuhis</i> | 2. | 429» |
| <i>Argemone</i> | 1. | 165. | <i>cn^illaris</i> | 2. | 425* |
| <i>dubiuih</i> | 1. | 165. | <i>copula</i> | a. | 421* |
| <i>Rhoeas</i> | 1. | | <i>Catinus</i> | 2. | 419. |
| <i>fomniferum</i> | 1. | 165. | <i>cernua</i> | 2. | 421. |
| <i>Parietaria</i> | 1. | 197. | <i>ciliaris</i> | 2. | 424. |
| <i>officinalis</i> | 1. | 197. | <i>ciliata</i> | 2* | 423« |
| <i>Paris</i> | 1. | 128. | <i>cinnabarina</i> | 2. | 432, |
| <i>quadrifolia</i> | 1. | 128* | <i>citiina</i> | 2. | 436. |
| <i>Parnasfia</i> | 1. | 98- | <i>clandeftina</i> | 2. | 423. |
| <i>paluftris</i> | 1. | 98* | <i>cocrulefcens</i> | 2. | 434. |
| <i>Pafinaca</i> | 1. | | <i>comitalis</i> | 2. | 437. |
| <i>fativa</i> | 1. | 93- | <i>compreffa</i> | 2* | 427, |
| <i>Pedicularis</i> | 1. | 184* | <i>cornucopioides</i> | 2. | 419. |
| <i>paluftris</i> | 1. | 185* | <i>coronata</i> | z. | 41^ |
| <i>lylvatica</i> | 1. | 185» | <i>crucibuliformis</i> | 2. | 424. |
| <i>Pep Us</i> | 1. | «*• | <i>crucibuliformis</i> | 2. | 241. |
| <i>Poriula</i> | 1. | II*. | <i>cyathoides</i> | 2. | 436. |
| <i>Periconia</i> | 2. | 239. | <i>denticulata</i> | 2. | 414. |
| <i>byfToides</i> | 2. | 239* | <i>elevata</i> | 2, | 429. |
| <i>Stemonitis</i> | 2. | 239. | <i>elongata</i> | 2. | 419. |
| <i>Peziza</i> | 2. | 413. | <i>epiphylla</i> | 2. | 42\$. |
| <i>«ruginofa</i> | 2. | 430, | <i>ferruginea</i> | z. | 429^ |

| | | | | | |
|---------------------|----|-------|----------------------|----|------|
| fimetaria | 2. | 426. | papiliata | 2. | 434. |
| flava | 2. | 418. | parvula | 2. | 425. |
| fructigena | 2. | 420. | patula | 2. | 424. |
| fuliginea | 2. | 427. | pedunculata | 2. | 416. |
| fulva | 2. | 426. | pellucens | 2. | 413. |
| fufca | 2. | 434. | Phaia | 2. | 420. |
| gemmata | 2. | 421. | piJofa | 2. | 433. |
| globofa | 2. | 420. | Pithya | 2. | 435. |
| granulata | 2. | 417. | plana | 2. | 417. |
| <i>granulata</i> | 2. | 417. | Polytrichii | 2. | 423. |
| granulaeformis | 2. | 435. | psathyria | 2. | 415. |
| granulifera | 2. | 415. | puberula | 2. | 174. |
| hemisphaerica | 2. | 422. | purpurea | 2. | 417. |
| <i>hirjuda</i> | 2. | 423. | rosea | 2. | 416. |
| hirta | 2. | 412. | reticulata | 2. | 432. |
| inequilatera | 2. | 421. | <i>reticulata</i> | 2. | 433. |
| inquinans | 2. | | reticulorura | 2. | 418. |
| integra | 2. | 419. | reticulata | 2. | 419. |
| hirsuta | 3. | 242, | reticulosa | 2. | 434. |
| <i>lentifera</i> | 2. | 241. | reticulosa | 2. | 433. |
| <i>lentifera</i> Bx | 2. | 242. | reticulosa | 2. | 431. |
| leporina | 2. | 415. | reticulosa | 2. | 434. |
| livida | 2. | 422. | reticulosa | 2. | 427. |
| lutoa | 2. | 427. | reticulosa | 2. | 433. |
| Macropus | 2. | 420. | <i>reticulosa</i> | 2. | 420. |
| marginata | 2. | 423, | reticulosa | 2. | 416. |
| membranacea | 2. | 427. | reticulosa | 2. | 418. |
| metamorphosa | 4. | 414. | reticulosa | 2. | 428. |
| <i>microspora</i> | 2, | 4H. | <i>reticulosa</i> β. | 2. | 432. |
| miniata | a. | 431- | reticulosa caesia | 2. | 432. |
| nigra | 2. | 42a. | reticulosa | 2. | 426. |
| <i>nigra</i> | 2. | 42 ». | <i>reticulosa</i> | 2. | 414. |
| nivosa caesia | 2. | 43?. | reticulosa | 2. | 415. |
| ovata | 2. | 435. | reticulosa | 2. | 430. |
| obconica | 2. | 428. | reticulosa | 2. | 430. |
| ochracea | 2. | 431. | reticulosa | 2. | 425. |
| <i>ochroleuca</i> | 2. | 431. | reticulosa | 2. | 416. |
| opulenta | 2. | 428. | virescens | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|------|----------------------|----|-------|
| 1 ^virginea | 2. | 4^5- | luteoalbum | 2. | 199* |
| <i>wvirgwea</i> | 3' | 4'5- | marginatum | 2. | 30J. |
| <i>Ivindiš</i> | 3, | 435- | nitidum | 2. | 205. |
| <i>Wn,a laris</i> | I. | ^0. | nutans | 2. | 303. |
| [arundinacea | I, | 21. | ovoideum | 2* | |
| 1 candriensis | I. | 20. | Oxyacantha* | 2. | 199. |
| <i>pnieuides</i> | 1* | 21. | pedunculatum | 2, | 206. |
| <i>it</i> | | | Pini | 2. | 20J. |
| > *fra!lu | 2, | 243. | pyiiformc | 2. | 204, |
| cAninus | fl- | 243. | falicinum | 2« | 200. |
| <i>conicus</i> | 2- | 369. | iclutum | 2. | 304. |
| <i>mipudicus</i> | 2. | 24;. | ubulatum | 2. | 20 r. |
| <i>lubricus</i> | 2. | 568. | <i>tigrijium</i> | 2. | 200. |
| <i>marcitius</i> | 2* | 368. | turbinatuin | 2. | 205. |
| <i>Phase m</i> | 2. | 33. | vernicofum | 2. | 206. |
| curpidatum | 9. | 34* | villofum | 2« | i99. |
| <i>Jnutimiu</i> | 2- | 33- | violaceum | 2. | 199* |
| <i>ttitidum</i> | 2. | 33. | Pier is | I. | 225c |
| ubulatum | 2. | 33. | <i>Hieracioidei</i> | I. | 225. |
| Phellandriu m i. | 88* | | Piligena | a. | 221* |
| aquaticum | I. | 83. | <i>lycoperdoides</i> | 2. | 221* |
| ^hleum | I* | 21» | Pillularia | 2. | 6. |
| <i>nodofuai</i> | i* | 22. | <i>globulifera</i> | 2. | 6. |
| fc pratenfe | X. | 21- | Pilobolus | 2* | 188. |
| Arnyfarum | 2. | 108. | criftallinus | 3. | 188. |
| P*^bopuncflfttura | 2. | 200, | <i>roridus</i> | 2. | 188* |
| <i>aurantium</i> | 3» | 20f. | Pimpintlta | I* | 39- |
| Bnft'u/n | 2* | 20I. | difftfla | I. | S9- |
| Bum | t. | 201. | <i>mngna.</i> | I* | 89- |
| P>iforme | 2. | 3G0. | a axifraga | I. | 8s>- |
| <inerafcnt | 2* | 199* | Pinguicula | I* | 9* |
| ci triaum | 2* | 201« | vul^ari* | I. | 9^ |
| sonnatum | 2* | 302. | Pinus | r. | 284* |
| depreffum | fl. | 203* | Abies | 1* | 284- |
| didymum | 2. | 20?» | Larix | 1* | 284* |
| <i>*****</i> | 2. | 305. | Picea | 1. | H*r |
| nmetarium | 2. | 305. | fylveftrU | 1. | 284- |
| furfuraceum | 2. | 104. | | | |
| globofum | 2. | 205* | | | |
| ^yaiinvun | a. | a«4. | | | |

| | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------|
| <i>Pifum</i> | I. 209» | <i>lapathifolius</i> | I. 126. |
| <i>arvenfe</i> | 3. \$. | <i>minus</i> | 1. 127. |
| <i>maritimum</i> | I. 30<i. | <i>Perficaria</i> | 1. 126. |
| <i>Plantago</i> | I. 45. | <i>Polypodium</i> | 2. 13. |
| <i>Coronopu*</i> | I. 46. | <i>vulgare</i> | 3, 13. |
| <i>lanceolata</i> | I. 45. | <i>PolyftichuniL</i> | 18. |
| <i>major</i> | I. 45. | <i>angaftatum</i> | 2. 22. |
| <i>muritima</i> | X. 46. | <i>convfolium</i> | 2. 22. |
| <i>media</i> | I. 45. | <i>criftatum</i> | 10. |
| <i>Voa</i> | I. 26. | <i>dilatatum</i> | ^, 24. |
| <i>angufti folia</i> | I. 36* | <i>Dr^opteria</i> | 2. 25. |
| <i>annua</i> | I. 37. | <i>Filix mas</i> | 3^ 19. |
| <i>aquatica</i> | I. 26. | <i>Mulleri</i> | 2, 20. |
| <i>arenaria</i> | I. 27. | <i>Oreopteris</i> | a. 19. |
| <i>com pretty</i> | I. 38. | <i>Phegopteri\$</i> | 2. 18. |
| <i>coftata</i> | I. 38. | <i>fpinofum</i> | 3. 23. |
| <i>criftata</i> | I. 27. | <i>ThelipterU</i> | a. 19. |
| <i>diftans</i> | I. 27. | <i>Polytrichum</i> ^ | 46, |
| <i>marilimfl</i> | I. 27. | <i>aloides</i> | %,, 4, |
| <i>nemoralis</i> | I. | <i>commune</i> | 2* A6. |
| <i>paluftris</i> | I. 27. | <i>commune β</i> | 2. 47. |
| <i>pratensis</i> | I. 37* | <i>commune y</i> | % 47. |
| <i>retroflexa</i> | I. 37. | <i>controverfum</i> | a, 50. |
| <i>Jalina</i> | I. 37. | <i>forma/urn</i> | a. 48- |
| <i>trivialii</i> | I. 26. | <i>juniperinum</i> | 2i 47- |
| <i>fohlia</i> | 2. 63. | <i>long ife turn</i> | s, 48. |
| <i>inclinata</i> | 2. 65. | <i>nanuin</i> | 1, 49. |
| <i>Pollichia</i> | I. 179. | <i>piliferum</i> | a |
| <i>amplexicaulis</i> | I. 179. | <i>pumilum</i> | a* |
| <i>Galeobdolon</i> | 1. 179. | <i>unduiatum</i> | a. 50. |
| <i>Folyga la</i> | I. 307, | <i>urnigorum</i> | 2. 50. |
| <i>vulgarU</i> | I. 207, | <i>P opulus</i> | i, 292. |
| <i>Polygonum</i> | I. 135. | <i>alba</i> | 1. 292. |
| <i>amphihiiun</i> | I. 126, | <i>nigra</i> | 1. 292. |
| <i>avicular«</i> | I. 137. | <i>tremula</i> | 1. 292. |
| <i>Biftorta</i> | 1. 127. | <i>Potamogeton i,</i> | 48. |
| <i>Convulvulus</i> | 1. 128. | <i>a-cuminatum</i> | 1. 49. |
| <i>Hydropiper</i> | 1. 127. | <i>comppeiXum</i> | 1, 50. |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|---------|-----------------------------|-----|------|
| Jtrifpura i | J. | 50- | Rubi | 2. | 335- |
| Buitans | i. | 48* | <i>Pulmonaria</i> | I. | 64. |
| framiDeum | l. | 50. | angustifolia | X. | 64. |
| Kterophyllum | i. | 49. | offlcinalis | If | 64. |
| •cens | i. | 49- | <i>Pyrcnium_t</i> | | |
| fc Aarinum | i _w | 51. | <i>lignorum</i> | 3* | 536. |
| f* natans | j. | 48* | <i>Pyro la</i> | I. | 135. |
| pe&inatum | i. | 51* | minor | X, | 135* |
| i perfoliatum | i. | 50. | rotundifolia | I* | 135. |
| pufilK;n | i. | 51. | fecund* | I' | 136. |
| fen-atum | x. | 49. | <i>Pyrus</i> | X. | 156. |
| fetateutn | l. | 51. | Aria | I. | 15. |
| 2 ⁿ fterffifolium | i* | 5c. | cominunis | X. | 156, |
| <i>l&otentilla</i> | l. | X59. | Mai us | I, | 156* |
| \nlW-ina | J,» | 159. | <i>Quercus</i> | I. | 282. |
| *rgentea | !l» | 160. | foemina | X. | 282. |
| norvegica | l. | 160. | Rob us | X. | 282. |
| ' reptans | l ^r . | I So. | <i>Racod ium</i> | 3. | 446. |
| verna | Γ. | 160. | ulbun | 3* | 447. |
| <i>Prenanthes</i> | E» | 317. | aiutaceum | 2. | 447. |
| muralis | JL t | 337. | carneuna | 4. | 446. |
| <i>Primula</i> | i. | 65, | cellare | 3. | 44 ^ |
| •latior | iL | 66. | cinereum | >3. | 446* |
| farinofa | L | 66. | fuli ^iaeum | 3, | 447* |
| officinalii | I. | 6\$. | nigrum | 3. | 447. |
| <i>Vrun ella</i> | I. | 182. | pallidum | a. | 447- |
| vulgaris | I* | 182. | umbrinuin | a* | 447* |
| <i>Frunus</i> | I. | 154* | <i>Ramaria*</i> | | |
| avium | I* | J54- | <i>jhnbriata</i> | 3. | 40c» |
| Cerasus | X. | 154* | <i>Ranunculus</i> | 1. | 169- |
| domeftica | X. | X54» | acris | X* | 171* |
| Padus | I. | 154. | aquatllis | i* | 171. |
| fpinofa | X. | 154- | arvenfis | X, | 171. |
| Vleris | % | 13. | auricomu\$ | Xp | 170. |
| oquilina | 3. | 13. | bulhofus | I. | 170. |
| <i>I'uccinia</i> | 2. | 3 > 5 « | Flamnula | X, | 169. |
| Convaliari* | %, | 335. | Lingua | X. | 170. |
| Rofa | 2* | 335* | Philonotii | X. | 170. |

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------|-----------|
| repens | I. 171. | Rubin | J. 49. |
| reptani | \u 170. | tinAoruia | t» 45-1 |
| fccleratui | \<< 170. | Rubus | I. 15.8* |
| Raphanus | \> 195* | Cffiflus | J. 158. |
| Raphaniftrum | \u 195. | Chamaemorus | J. 158. |
| Refeda | r. 149- | fruticofu* | I. 158. |
| luteola | l:* X49. | idieus | r* 15 |
| Rcticularia* | | faxatilis | ;L* 158-/ |
| alba | a- 195. | Rumex | I. 113. |
| chryfofperma | 2. 227. | Acetolia | 3. iuf |
| hemifphcerica | 3. 302. | Acetofeila | jr. Ii44 |
| hortenjis | a. 195- | acutus | ;r. U4I' |
| Ijycoperdon | a» 193. | crifpus | r<< H3I |
| Rhamnus | 1. 77- | Hydrolapathuxn | I. 113 |
| catharticui | 1. 77. | maritimus | :. f 14? |
| Frangula | I- 77- | Nemolap<ithum | I. 113 |
| Rhinanthus | 1. 183. | obtufofolius | \r. 114 |
| Criſta galli | I. 18?. | Ruppia | K<< 51 |
| Rhizomorph | 42. 448. | maritima | :u 51 |
| letiformis | 3. 44K- | Sagina | I. 52 |
| Ribe s | I. 78. | procumbent | X. 52 |
| Groffiftaria | I. 78. | Sagitt aria | \u 280 |
| nigrum | 1* 78. | fa^ittifolia | I. 280 |
| Uvacrifpa | 1. 78. | Salicornia | 3. |
| Ric \$ia | 1. 100. | herbacea | I. |
| capillarit | a. 101. | falix | I# 28S |
| ciliaris | 2. 100. | alba | jr. 290 |
| c rift alii na | 3. 100. | acuminata | I. 289 |
| fluitans | 3. 100. | bigemmis | ;r<< 288 |
| glauca | a. 100* | caprea | X. 289 |
| Rivulana | 3. 113. | cinerea | jl 289 |
| Cornu dama | 3. 11g. | decipiens | I. 285* |
| Rofa | I. 157. | depreffa | I. 289. |
| eaaina | I. 158. | fragilis | I. 288 |
| rubiginofa | 1. 157. | incubacea | 1, ^? 9 |
| viilcfa | I- 157. | xnonandfa | I* 288; |
| Rottbolli* | r<< 37- | pentandra | I. 288. |
| iuaurra | x. 37. | itpen* | J. 289. |

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| rasmarmifolia | f. «89- | fyl vatic us | I. 19» |
| pimmalis | j« »89. | <i>S cheuchzeri</i> | a 1. 115. |
| *lfola | /ft 83* | paluftria | x* 115- |
| X« ^u *'uta | I. 83. | <i>Schoenus</i> | x* 16. |
| iiil | 3:• 83, | albue | I. 16- |
| r&mbucus | \. 97* | Marifcus | I. itf- |
| I Ebulus | ju 97- | <i>Scler anthus</i> | I- 157- |
| ttigta | it» 97- | annuus | 1. 157* |
| 'amolus | -i. 66. | perennis | 1. 137. |
| ^w alerandi |]» 67. | <i>Slerotiuu</i> | 2. 1^5- |
| \\$anicula | 1. 85* | alburn | a. i8«* |
| europasa | 1. 85* | Circeae | a. 187- |
| iponaria | \. 138. | durum | 2. 185. |
| officinalis | 3[. 138. | Erifyphe | »• 187. |
| J^atyriu?n | ii. 251, | fagi | 2. i8S» |
| f 'albidum | c. 251. | fasciculatum | 2. 187* |
| \fi ^a xifraga | 1. i3<5- | flavum | 2. 186, |
| graiiulata |] [. 136. | granulatum | a. 186. |
| Hirculus | (• n(>. | hurfutum | *. 187' |
| tridatJtylites | ;1- 137- | hypnorum | a. 185- |
| *cabiofa | [. 42. | ovatum | '2. 185- |
| arvenlis | i. 42. | perfi color | 2* i8(?. |
| columbaria | 11, 42. | pezizaeformis | 2. xft6» |
| iuccifa ^{mm} | iu 42. | quercinum | 2. 185. |
| \°candix | 1. 86. | <i>Scolopendri</i> | urns, 14 |
| -Anihrifcus | j. 86. | Phyllitis | 2. 14* |
| f» Cerefolium | 1u 87- | feptentrionale | 2* 14* |
| ternula | 1. 86. | <i>Scorzoner a</i> | 1. 216- |
| I*cirpus | 1. iy. | humilis | 1. 226. |
| L?^*«lari« | 1. 17. | <i>Scrophulari</i> | ai. i86» |
| ^{v5} s*othrioa | :1. 17* | aquatica | 1. »8<5. |
| E&ricis | 1; i!t. | no do fa | x. i85. |
| r ⁱ pitofus | 1. »7* | vernalis | 2. 2. |
| ? ^u itans | U 18- | <i>Scutellaria</i> | 1. I8 ¹ * |
| Hf ^c uTtris | I. 18* | galericulata | 1. 181. |
| T**itimu« | I. 19- | <i>Sedum</i> | 1- 14s- |
| /^P^uftris | 1. 17. | acre | 1* 143. |
| Mi | | Thelephium | 1. 143. |

| | | | | | |
|--|----|-------|-----------------------|----|------|
| <i>Se linu m</i> | I. | 93. | <i>palufstre</i> | I. | 195. |
| <i>Carvi folia</i> | I* | 94- | <i>Sophia</i> | I. | 195. |
| <i>lineare</i> | X. | 95- | <i>Sium</i> | I. | 90 |
| <i>palufstre</i> | i. | 94- | <i>angustifoliura</i> | I. | 90 |
| <i>fylveftra</i> | I. | 94* | <i>inundatum</i> | I. | 90 |
| <i>Senecio</i> | I. | 243- | <i>latifolium</i> | I. | 90 |
| <i>Jacobssa</i> | Z. | 244- | <i>Solanum</i> | I. | 76. |
| <i>paludofus</i> | I. | 245. | <i>Dulcamara</i> | I. | 76 |
| <i>fylvaticu*</i> | X. | 244- | <i>nigrum</i> | I. | 76 |
| <i>vifcofus</i> | I. | 244. | <i>Solidago</i> | I. | 243 |
| <i>vulgaris</i> | I. | 244* | <i>Virgaurea</i> | I. | 341 |
| <i>Serapias</i> | I. | 253. | <i>So,nc hus</i> | I. | 231 |
| <i>enfifolia</i> | I. | 35* | <i>arvenfis'</i> | I. | 231 |
| <i>grandiflora</i> | I. | 254. | <i>oleracous</i> | I. | 231 |
| <i>lalif >lia</i> | X. | 253, | <i>Sor bus</i> | I. | 155 |
| <i>longifolia</i> | X. | 254. | <i>aucuparia</i> | I. | 15" |
| <i>rubra</i> | I. | 254^ | <i>Sp athularia</i> | 2. | 4c! |
| <i>Semperviv^{umt%}</i> | | 151. | <i>flavida</i> | | 40! |
| <i>te&orum</i> | 1. | | <i>Sparganiurn</i> | I | 27! |
| <i>Serratula</i> | X. | 334- | <i>ntam</i> | I | 277 |
| <i>arvenfis</i> | 2* | 234. | <i>rauiouimt</i> | I* | 277 |
| <i>tin&oria</i> | U | 234. | <i>simplex</i> | I | 277 |
| <i>Sheratdia</i> | 1. | 4?. | <i>Sp art iunt</i> | I | 108 |
| <i>arvenfis</i> | I. | 43. | <i>i'coparium</i> | I | 208 |
| <i>Silene</i> | 1. | 140. | <i>Spergula</i> | I | 147 |
| <i>nutans</i> | 1. | 140. | <i>arvenfis</i> | I | 147 |
| <i>Sin apis</i> | X* | 196. | <i>nodofa</i> | I | 14! |
| <i>alba</i> | I, | | <i>fubulata</i> | I | 147 |
| <i>arvenfis</i> | X. | | <i>Spagnum</i> | 2. | 34 |
| <i>nigra</i> | I. | 196. | <i>capilJifolium</i> | 2. | 34 |
| <i>Sison.</i> | | | <i>cymbifolium</i> | 2. | 34 |
| <i>inundatum</i> | X* | 90. | <i>palufstre</i> | 2. | 34 |
| <i>Sift oft rent^a</i> | 2* | 392. | <i>pnlufstre</i> | 2. | 35 |
| <i>cinereum,</i> | 2. | 392. | <i>Sphatria</i> | 2. | 154 |
| <i>confluens</i> | 2. | 379. | <i>acuta</i> | 2. | 157 |
| <i>Sify^{mhriu^{rn}}</i> | r. | it,5, | <i>^Efculi</i> | 2. | 158 |
| <i>amphibi</i> | 1. | 195. | <i>alba</i> | 2. | 154 |

| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------|---------|
| i angulata | 2. 171. | globularia | 2. 156% |
| angustata | 2. 165. | Gnomon | 3* 157- |
| appendiculata | 2. 165. | graminum | 3. 158* |
| <i>ppendiculata</i> | a, 165. | hirtuta | *. 159- |
| Atomiis | 2. 158. | Hy poxy Ion | 2. 177- |
| <i>atropurpurea</i> | 2- i6\. | hyfteriformis | 2. 15^* |
| atroftoma | »>. 154. | Hyftryx | 3. 171. |
| aurantia | 2» 160. | inc6rva | a. 157- |
| <i>aurantia</i> | 3. 160. | Inteo-umbrina | 2* 168. |
| Betulae | 2. 171. | <i>macula</i> | 2. 163* |
| carpophila | 3. 175» | maculaeformis | 2. 158. |
| Caftane» | 3. 155. | <i>mammiformis</i> | 3* 159- |
| caudata | 3. 169. | mammillaris | 2, 157. |
| Cerasi | 2- 167. | militaris | 3. 175- |
| i ceratofpexma | 2. 173. | <i>militaris</i> | a. 175- |
| ciliata | 3. 172. | miniata | 3. 160, |
| <i>dliata</i> | 3. 17a. | mixta | |
| cinereo-fufca | 2. 164. | mobilis | 3. 161* |
| claula | *• 155. | <i>mohilis</i> | 3. 161. |
| coar&ata | 3. 171- | xnonocarpa | a. 173- |
| oohaerens | 2- 167. | moriformis | 2. 159- |
| <i>cohcerens</i> | 2. i68» | <i>morifornis</i> | a. 159. |
| concent rica | 3. 177- | mucofa | a, 159- |
| congener | 3. 155- | <i>natans</i> | a. 166. |
| <i>conica</i> | »• 154- | nitida | 3. 116. |
| corylea | »>. 158. | nivea | 2. 169. |
| crinita | 3., 154- | obducen* | 3. 159- |
| <i>cucurbitula</i> | 3. 155. | obdufta | 2- 165. |
| decolorans | a. 165. | pallida | i. 173* |
| <i>uetu^ta</i> | a. i6?« | <i>pallida</i> | 3. 173* |
| riiformis | *. 171. | Papavcrit | 2. 155. |
| <tificiformis | 3. 170. | papillata | 2» 161. |
| «ntomorhiza | 3. 174- | pertufa | 3« 170. |
| <i>eyitomorhiza</i> | 3. 174. | Peziza | 3. 160. |
| fccrrnginea | 3* 169* | <i>Platiceps</i> | 3. 164. |
| fraffiformi* | 3. i6g. | polymorpha | 3. 176. |
| fufca | 2. 167» | Populi | 3. 167. |
| | | Poronia | *• *74» |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Pruni | 3. 164. | operculata | •1. 220. |
| pu be icent | a. 161. | <i>Sphcurocarpus.</i> | |
| Pulvis | 2. 159* | <i>Jicoideus</i> | *I. 209* |
| <i>Fulvis Pyrius</i> | 1. 159. | <i>turbinatus</i> | a _{tt} n o |
| pun&ata | 3. 174. | <i>utricularis</i> | *. 198. |
| pun&iformis | 2. 156. | <i>Sp ir < ea</i> | j. 156. |
| quaternata | 2. 160. | Filipendula | jL. 156. |
| <i>quaternata</i> | i« i61* | I I maria | jL. 157. |
| <i>Tadlans</i> | 2. 169* | <i>Sp lacknum</i> | 3 • 38* |
| radiata | 3, 1*9. | ampullaceum | 2.. 39* |
| radula | 2. 172. | fphaericum | 3^ 39* |
| Rebesia | 2. i6g. | <i>6f? umaria</i> | :1 194* |
| repens | 2. 166. | alba | 3. 195. |
| Roia? | *• 157* | cornuta | ;. 195. |
| ro ft rata | a- 155- | fiava 3. | f 05* ii |
| Sambuci | 2. 166. | granulata | at. 196. |
| fcarlatina | a. 175* | minuta | a1 • iqu. |
| fetofa | »• 161. | pallida | 3. 195. |
| J'pinoCa | 2. 16^. | ramofa | 3I. 195. |
| <i>fpinofa</i> | 3. 162. | <i>Stachys</i> | ∩. 179* |
| Aigma | 3. 163- | arvenfis | lc. 1 go* |
| <i>Jiigma</i> | 3. 16^. | paluftrit | :. 179. |
| <i>Talus</i> | 3. 166. | fylvatica | lI. 179* |
| tremelloide* | 2. 173. | <i>St atice</i> | l1. 9K-j |
| tuberculata | 2. 163» | Armeria | jr. 98* |
| <i>tuberculofa</i> | 3. 167. | eloDgata |]•. gH- |
| <i>tunicata</i> | 2. 177- | Limonium |]•. 98. |
| typhina | »• 162. | <i>Stellaria</i> | 1I. 141. |
| uda | 3- 161. | brevifolia | Jr. 142. |
| <i>uda 3 fuMcaria</i> | a. » 6 i. | granr'nea |]•. 141. |
| <i>iridula u</i> | 2. 162. | Holoftea |]•. 14F. |
| <i>uridulata</i> | 2. 161. | nemovum | l•. 141* |
| verrucifnrmis | 2. 170. | palnfths | j* 141. |
| <i>verrucl fonnls 0</i> | 2. i7 ^{fi} | uliginofa | 1I. 141* |
| <i>verjipellis</i> | 1. 164- | <i>Stemonit is</i> | ∩« 21C* |
| <i>Sp hccr o bolus</i> | 2. J89* | fasciculata | 2t. 216. |
| <i>ftellatai</i> | 2, 189- | globofa | 2t. 21 |
| <i>Sph&roearpa</i> | 2. 220. | nigra | 2. 217 |

| | | | | | |
|------------------------------|----|-------|------------------------|----|-------|
| t) ^r phina | 2. | 216. | puteana | 2. | 397. |
| violacea | 2. | 216. | vifcofa | 2. | 597- |
| <i>Stilbofpor</i> * | 2. | 179. | <i>Thesium</i> | I- | 79. |
| afterolperma | 2. | | pratenfe | I. | 79' |
| glycrofperma | 2. | Igo. | <i>Tilia</i> | X. | 166. |
| gyrifformis | a* | 179- | europtea | 1. | 166. |
| rphaerofperma | 2. | igo. | <i>Thlajpi</i> | i« | 192. |
| <i>Stilbum</i> | 2. | 240. | arvenfe | | 192. |
| gelatinofum | 2' | 240. | <i>Bulia pallor is</i> | I. | 193- |
| rigidum | 2. | 24c, | campeftre | j. | 192. |
| ventricofum | 2. | 240* | <i>Thymus</i> | X | 181. |
| <i>Stratiotis</i> | 1. | 293. | acinus | 1, | 18 r. |
| <i>Aloides</i> | I. | 294. | <i>Serpjllum</i> | 1. | 181* |
| <i>Swartzia</i> , | | | <i>Tordylmm</i> * | | |
| <i>capillacea</i> | 2* | 40. | <i>Anthrifcus</i> | 1. | 85. |
| <i>Sy r n p hy turn</i> | 1. | 64. | <i>Tormentilla</i> | t* | 160. |
| <i>officinale</i> | 1. | 64. | ere(fta | E. | 160. |
| <i>Tanacetum</i> | 1. | 233* | <i>Tortula</i> | 2* | |
| <i>vulgare</i> | 1. | *38- | <i>muralis</i> | s« | 41. |
| <i>Taraxacum</i> | 1. | | <i>fubulata</i> | 2. | 41. |
| <i>officinale</i> | 1. | 326* | <i>Tragopogon</i> | u | 225. |
| <i>Tetraphii</i> | 2. | 38. | <i>pratenfe</i> | 1. | 225. |
| <i>pellucida</i> | 2. | 38- | <i>Tremella</i> | S. | 4*7- |
| <i>Teucrium</i> | 2. | 2. | <i>abietina</i> | 2. | 440. |
| <i>Scordium</i> | 2. | 2. | <i>alutacea</i> | 2. | 439. |
| <i>T'kalidlrurn</i> | | 167. | <i>atrovirens</i> | 2. | 43*. |
| <i>dubium</i> | | 167. | <i>Cerasi</i> | 2. | 4*8- |
| <i>flavurn</i> | 1. | 167. | <i>cinerea-viridis</i> | 2. | 439. |
| <i>The^Jephora</i> | », | 394- | <i>chryjocoma</i> | 2. | 43*. |
| <i>Re...</i> | 2. | | <i>cylindrica</i> | 2. | 441. |
| b>'Ttoide« | a. | 397. | <i>Encephala</i> | 2. | 438. |
| <i>atmai</i> | 3. | 596. | <i>Encephalodes</i> | 2. | 439. |
| <i>t iliata</i> | 2- | *9S- | <i>forruginea</i> | 2. | 441. |
| <i>cruftacea</i> | | | <i>fimetaria</i> | 2. | 440. |
| <i>ferruginea</i> | .. | 59S- | <i>g'andulofa</i> | a. | 437. |
| <i>fillca</i> | 2. | 395. | <i>glandulofa</i> | 2. | 437. |
| <i>jnerenteriformis</i> | 2. | 395. | <i>glauca</i> | 2. | 438- |
| | | 3J*£» | <i>ligulata</i> | 2. | 442. |

| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------|------------|
| <i>mefenterica</i> | 2 • 43\$* | <i>favoginea</i> | 2. 207. |
| <i>palmata</i> | a., 442. | <i>flexuofa</i> | » 209. |
| <i>purpurea</i> | 3. 18». | <i>mucoriformis</i> | 2, 211. |
| <i>scarlatina</i> | 2<> 438* | <i>nigripes</i> | 2- 307. |
| <i>serpentina</i> | a. 438- | <i>notata</i> | a. 2U. |
| <i>squamofa</i> | a. 440, | <i>nutans</i> | a. 312- |
| <i>subclavata</i> | a. 44- | <i>ovata</i> | 2. 207. |
| <i>Syringas</i> | 2- 440. | <i>phyfaroides</i> | 2. 210. |
| <i>turbinata</i> | 2* 441* | <i>purpurea</i> | 2. 2II» |
| <i>umbrina</i> | 2* 458* | <i>pyriformis</i> | 3* 210* |
| <i>Urticae</i> | 2. 44c | <i>rubiformis</i> | 2. 210- |
| <i>virescens</i> | 2. 439» | <i>typhoides</i> | 2. ai6. |
| <i>Trifolium</i> | I. 214. | <i>venofa</i> | 3. 207. |
| <i>agrarium</i> | I. fl T u- | <i>virescens</i> | 2. 20S. |
| <i>alpestre</i> | I. ai«{» | <i>Trichochirid</i> | I* 215* |
| <i>arvense</i> | I. 215. | <i>maritimum</i> | I- 115* |
| <i>filiforme</i> | I. lit- | <i>palustre</i> | I. 115. |
| <i>flexuofum</i> | 2- 215. | <i>Trichoderma</i> | 235. |
| <i>fragiferum</i> | I. ai5. | <i>Brassicis</i> | a. 235. |
| <i>Melilotus offic.</i> | i. 314. | <i>carneum</i> | a. 1 > 6. |
| <i>montanum</i> | I. ai5» | <i>fulcum</i> | 2. 355. |
| <i>pratense</i> | I. 214* | <i>lave</i> | 2. 236. |
| <i>procumbens</i> | I. 2id- | <i>pedunculatum</i> | 2. 236. |
| <i>repens</i> | I. sr4- | <i>Pyrenium</i> | 2. 235- |
| <i>striatum</i> | I* 215* | <i>viride</i> | a. 235* |
| <i>Trichia</i> | a. 206» | <i>Trichostomum</i> | • 51- |
| <i>arcyriiformis</i> | a. 208. | <i>cannescens</i> | a. 51. |
| <i>aurea</i> | 2* 208. | <i>heterosticum</i> | 2.. 51. |
| <i>axifera</i> | 3. 316- | <i>Trienu-li*</i> | 118. |
| <i>botrytis</i> | 2- 11C | <i>europaea</i> | I. 118. «% |
| <i>oernua</i> | ft. an* | <i>2nticum</i> | I* 37- |
| <i>cinerea</i> | 2. a 14. | <i>junceum</i> | X« 38. |
| <i>cinnabarina</i> | a. 314* | <i>littoreum</i> | 1. 38. |
| <i>oitrina</i> | 2- 209. | <i>repens</i> | I. 98. |
| <i>stlavata</i> | a. 209. | <i>Trollius</i> | I* |
| <i>•raffa</i> | 2. 208. | <i>europaeus</i> | I' 168. |
| <i>elongat*</i> | 2. aog. | <i>Tubercularia</i> | 3. |

| | | | |
|-----------------------|---------|---------------------|---------|
| <i>Cerasi</i> | 2. 184. | <i>Uredo</i> | 2. 227. |
| <i>confixens</i> | 2. 183. | <i>Acetofce</i> | 2. 231. |
| <i>faUiculnta</i> | 2. 182. | <i>Ægopodii</i> | 2. 233. |
| <i>fajciculata</i> | 2. 183. | <i>Alchemilla</i> | 1. 227. |
| <i>hirfuta</i> | 2. 184. | <i>Alfines</i> | 2. 232. |
| <i>minuta</i> | 2. 183. | <i>Anemones</i> | 2. 231. |
| <i>nigra</i> | 2. 184. | <i>Angeticco</i> | 2. 233. |
| <i>Pirn</i> | 2. 183. | <i>Arenariæ</i> | 2. 232. |
| <i>Po^uli</i> | 2. 184. | <i>Betul«</i> | 3. 128* |
| <i>Pruni</i> | 2. 183. | <i>Candida</i> | 2. 234. |
| <i>rqfea</i> | 2. 186. | <i>Ca ricis</i> | 2. 231. |
| <i>fulcata</i> | 2. 184. | <i>Caricis</i> | 2. 234. |
| <i>vulgaris</i> | 2. 182. | <i>carpophila</i> | 2. 234. |
| <i>Tubulifera*</i> | | <i>Qentuxnnodii</i> | 2. 231. |
| <i>C vent or</i> | 3* 220. | <i>C^rceae</i> | 2. 228. |
| <i>Tu bulina</i> | 2. 219. | <i>cotifiuens</i> | 2. 227. |
| <i>fragiformis</i> | 2. 220. | <i>cukiiorum</i> | 2. 233. |
| <i>Tulipa</i> | 1. 104. | <i>eleWa</i> | 2. 229. |
| <i>fylveftris</i> | 1. 104. | <i>Euphrasiae</i> | 2. 230. |
| t <i>Tusfilago</i> | 1. *45. | <i>farinofa</i> | 2. 228. |
| <i>Farfara</i> | 1. 245* | <i>ferruginea</i> | 2. 230. |
| <i>Petafites</i> | 1. 245. | <i>Ficariee</i> | 2. 232. |
| <i>Turri tis</i> | 1. 194- | <i>fulva</i> | 2. 229. |
| <i>glabra</i> | 1. 194. | <i>Heliofcopi»</i> | 2. 229. |
| <i>hirfuta</i> | 1. 194- | <i>Hieracii</i> | 2. 232. |
| <i>Typ h a</i> | 1. 277* | <i>Hydvopipeiii</i> | 2. 234. |
| <i>angntifolia</i> | 1. 278- | <i>Hyoferidis</i> | 2. 233. |
| <i>latifolia</i> | 1. 278. | <i>lineaxi*</i> | 2. 230. |
| <i>U l *</i> | 1. 308. | | 2. 230. |
| <i>europaeus</i> | 1. 208. | <i>Menthae</i> | 2. 233. |
| <i>fJImu s</i> | 1. 34» | <i>micophilft</i> | 2. 227. |
| <i>campefiris</i> | 1. 84. | <i>miniata</i> | 2. 230. |
| <i>l'uberoia</i> | 1. 84- | <i>Ovobi</i> | 2. 232. |
| <i>Viva</i> | a. 103. | <i>Pbxagmitii</i> | 2. 231. |
| <i>granulata</i> | a. 114. | <i>Polygoni</i> | 2. 233. |
| <i>i«iHima</i> | 2. 103. | <i>Populina</i> | 2. 228. |
| <i>alenteriformis</i> | 2. 103. | <i>Potantillae</i> | 2. 228. |
| | | | 2. 233. |

Index universalis.

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------|----------------------|--------------|------|
| <i>Rosa</i> | a. | 230. | <i>Veronica</i> | i. | 6. |
| Rumicis | 3. | 231. | agrestis | U | 7* |
| Scorzoner» | 3. | 239. | Anagallis | i. | 7. |
| fegetum | 3. | 234, | arvensis | I. | 8. |
| Senecionis | 3. | 22Q- | Beccabunga | 1. | 6- |
| Serratulae | 2. | 231* | Chamasdrys | lt* | 7* |
| Sonchi | 2. | 229* | hedertefolia | i. | 8. |
| Tragopogi | 3. | 234* | xnontana | 1:• | 7. |
| tub*-rculofa | 3. | 229. | officinalis |]U | 6* |
| Tuffilaginis | 3. | 229» | peregrina | 3U | 8- |
| Ulmariae | J2. | 227* | fcutellata | 1. | 7, |
| Valerian® | 3. | 233* | ferpillifolia |]L | 6. |
| Veronic® | 2. | 228. | fpicata | 1. | 6. |
| Viciae FabJB | 2' | 232. | verna | ;1. | \$• |
| Violee | 2- | 233- | <i>Viburnum</i> | I! | 97*' |
| <i>Z7r t i c a</i> | i* | *78- | Opulus | il. | 97. |
| dioica | II. | 279. | <i>Vicia</i> | U | 211 |
| urens | T. | 378. | angustifolia | 1. 2 1 2 . | |
| <i>Utriculari</i> ^A | II• | 9. | calTubica | 1. 2 ir. | |
| media | 3r* | 9- | Cracca |] . 212. | |
| minor |]U | 9- | <i>Gcgardi</i> | j. 2 U, | |
| yulgaris | I. | 9. | lathyroides | j'. SI*. | |
| <i>Y*acciniitm</i> | II• | 123. | <i>militaris</i> | 1; . J it. \ | |
| Myrtillus |]l* | 123. | fativa | j. 212. | |
| Oxyovccus | I. | 124. | sepium | 1» 312. | |
| uligionofum | L | i»3« | lylvatica | j• 311. | |
| Vitis idtea | I ^a | 124. | <i>Viola</i> | 1•73* | |
| <i>Valeriana</i> | I. | 15. | arvensia | 3N 74. | |
| dentata | I. | 15. | canina | i' 73- | |
| dioica | I. | 15. | hirVa | i | |
| officinali* | I. | 15. * | odorata | jr. 7?. | |
| olitvria | I. | M. | naluftn* | 1. 73- | |
| <i>Verbajlum</i> | I ₄ | 74. | tricolor | 1• 74* | |
| Lychnitis | I ₄ | 75- | <i>W tbera</i> | 'il. 65. | |
| nie;rum | I. | 75- | n'ita.is | zt. ^3.. | |
| Thapfus | I. | 7v | p.y,rjformi» | 3.. 64, | |
| <i>Ver* b e n a</i> | I. | 17^'! | <i>W e i s f i a</i> | 3 5I. | |
| •formates | I. | | | | |

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|---------|
| <i>Kanthium</i> | I. 233. | <i>pezizoides</i> | 2. 437. |
| <i>frumarium</i> | I* 383. | <i>rubrum</i> | 2. 179. |
| <i>Xyloma</i> | 2. 178. | <i>salicinum</i> | 2. 178. |
| <i>Iacerinum</i> | 2. 179. | <i>Zannichellia</i> | 1. 261. |
| <i>lagineum</i> | 1. 179. | <i>palustris</i> | 1. 161. |
| <i>populinum</i> | 2. 179* | <i>Zostera</i> | 1. 255. |
| <i>pui&atum</i> | 2. 158. | <i>marina</i> | 1. 255. |
| <i>punctiforme</i> | 2. 179. | | |

