

Indian Botanic Garden Library
BOTANICAL SURVEY OF INDIA

CLASS NO.....581...4162

BOOK NO.....FOR-f.....

ACC. NO.....B2540'.....

MORT. BOT. REG.
S CALCUTTA. 66

TABULA

ARABIAE FELICIS

Geographico-Botanica
ad illustranda

Itinera

Cel Dr. FORSKÁL

Profes Havn




FLORA
ÆGYPTIACO -ARABICA.
SIVE
DESCRIPTIONES
PLANTARUM,
QUAS
PER
ÆGYPTUM INFERIOREM
ET
ARABIAM FELICEM
DETEXIT, ILLUSTRAVIT
PETRUS FORSKÁL*
PROF. HAUN.

POST MORTEM AUCTORIS
EDIDIT
CARSTEN NIEBUHR.

ACCREDIT

TABULA ARABIÆ FELICIS GEOGRAPHICO-BOTANICA.

HAUNIAE, 1775
EX OFFICINA MÖLLERI, AULE



29/7/64

Durum iter —

*———ferpens, fitis, ardor, arena,
Dulcia uirtuti: gazIBet patientia duris.*

Jantus amor florum!

George Leal

SERENISSIMO CELSISSIMOQUE
PRINCIPI AC DOMINO
F R I D E R I C O,
PRINCIPI HÆREDITARIO
DANIÆ, NORVEGIÆ, VANDALORUM,
GOTHORUM &c.



DOMINO MEO CLEMENTISSIMO.

Sereniffime & Cclfiffime Princeps,
Domine Clementiffime!



Quem *fifa* femper memoria veneratur Dania: Quern
Cives fine adulatione, *Exteri* fine invidia Opti-
mum **celebrant REGEM F R I D E R I C U M V:**
Quern Scientia immortalitati transcripferunt; Maxi-
mum **bunc GENITOREM TUUM, SERENIS-**
S1ME PRINCE PS, cuius imaginem refers,
bonitatem exprimis, rebus gloriofe geftis undique
circumfufum, egregia laudum amulatione, **TIBI**
ad imitandmn propofuifti. Non e peregrina domo bac
magna mentis incitamina petuntur: Paterna effigies in
fublimi pofita loco adftant. Principi bono datum eft,
animare ekes, extraneos, doBos, artifices, mimes ad
grandia conamina ingenio manuque promovenda. **IB**
Pactis artes, delkia generis b'umani, inter felicitates
(*4) 3 pub-

*piiblkas & gratianim atliones enafcmitur. In illuftri
hoc exemplo dum deleftarts, CELSISSIME PRIN-
CEPS: inter facia praclara bareditaria TUE
cur a tradita, ut communi ufui Arabia recognita lege-
retitr defcripta, generofo fif tut elan̄ mmitu maturafti.
TE gratiffime adſpirante> Cel. FORSKALII, Hiftorki
Naturalis indefefft, iktetta rediviva Topographiam Ara-
bia supplent, induunt, ornant. Toto ergo Botanices
defiderh, T1BI, SEREN1SSIME PRIN-
CEPS, devotijjime adfero Fafckulum bunc Plantarum
in Hortis noftris batlenus ignotarum. Jam de-
tecla, defcripta, partimque introduda, perennia in
bonorem Gentis, REGIS &* PRINCIPIS fiorc-
bunt monument a. Sic vovet, opt at*

Regias Tu[^]e Celfitudini

fubmiflii fide addiftiflimus cultor
Carjen Webuhr.




PR;E FATIO.

Si FAUNA ORIENTALIS Cl. FORSKALII, quam nuper publici juris fecimns, gratum, ut optamus, Eruditorum affentim obtinuit, pari benevolentia FLORAM iEGYPTiACO-ARABiCAMnunc prodeuntem excipi fperamus. Protinus feiplam commcndat Specierum agmine non mediocri; novis vero Regni *Yemen* de-te&is cnrioium Le&orem incitat & allicic. Prolegomena Faunae praemiflā ftatum Mfc. commemorarunt & methodum , qua in obfervandis uhus eft Au∨ quunque eccdem animadverfiones praefens fimul fpedlant opus, iiis repetendis fuperfedimus. Reftat tantum, ut rationes caufasque Florae exponamus proximas.

Societas ad ^gyptum & Arabiam mittenda, quo com-modius deftinacam attingeret terram, icineri marino fe commit Sed in primo egreflu tarn obftinate diuque fibi reluftantcs ha-buit ventos undasque, ut conftantiam fere fufflaminatam t&diis indoluerit. Verfa demum hyeme, melior fpirare coepit aura, & ad portum viribus refciendis opportunum ducebat. ESTAC prope *Maffiliam* primitias herbarum Orbis Meridionalis dedit Cl. *Fcrjktlto*; qui occafione favente *Horturn Monfpelienfem* vidi& doftiffunum DN. SAUVAGES alloquutus eft.

Paucis interjeſlis diebus vela ventis data & *Infnla* MALTA petita. Horri pauci & inopes; nee prſeftantior qui *Bofchetto* adjacet, Villas recreationis campeſtris Magiftri Equitum, totus in Citriceta divifus; columnis ingrate ornatus calcareis juxta ambu-



ambulacra erefcis & Vite vinifera circumdu&is, viisque lapide
ftratis* Hxo Horcorum Architeffcura Orientis spirat mores*
Flora Infilae adeo male in faxo Melitenfi habitat, & parvam
plantarum progeniem educat. CL Forjidlms invenit Botanices
Socium & ducem *Medicum* pcritiffimum, qui Parifiis quondam
cornmorans, veriora Scientia Naturalis fundamenta lucratus eft,
cuique debemus exhibitum in Fauna *Catalogum Fifcitun Me-*
litenfium.

SMIRNA breviffimo temppris intervallo occafionem her-
bationibus liberis aperuit nullam; nee fatiabant animum curio-
fum parvula, quac aderant Mulea, vel Colleffaneorum refidua
inlyti Dofloris *HajJ'elquiftiū*

CONSTANTINOPOLI per aliquot fēptimanas requiefcere li-
cuit; fed in menfem Auguftum tranfiens melior anni pars fera &
parca dedit fpicilegia. Hortorum cultura negletfciflma ; nee
felicior fub Europeorum tuçela; fcmpre Climate injufte accufato.
Struçtura eorum & ornatus, ut in Malta obfervatum erat, &
vise lapillulis littoralibus variorum colorum perquam artificiofē
fternunenn Quod urbs non potuit, BELGRAD Pagus augmemis
herbarum fupplevit.


Trajefto Mari iEgao ALEXANDRIA hofpitem Botanicum
novo implevit plantarum fpe&aculo. Extra Europam regio nulla
eft, qua: prafentiam doflri Viatoris meretur iEgypto potius,
Scientiae Naturalis cultor, in rudi Septentrionis terra plantis in-
digenis nimium affietus, eas ut fimplices refpicit, & quas videt
exoticas, coafta Horticulture educatione progignuntur; (I ille ,
ut *Forfk&lio* noftro contigit, fine fucceflivo tranfitu per Latitu-
dines Flora diverfas, poft longam, vacuam & inquietam navi-
gationem,

gationem , in littus exponitur a Boreali orbe difftantia viarum & indole regionis divtfum: hie certe rerum novarum vim & prorfus fenfationem experitur verbis non enunciandam. Populus, urbs, terra, vegetabilia, monumenta, ruinae augent praefentia famam. Cl. *Forfkcdius* eodem defcenfus die primos intrans hortos , in Palmarum architeftura vegetativa incredibili obftupuit admiratione. Campos circumjacentes diligenti herbatione, temper tamen Tub timoris caucela luftravit; donee Peiiinfulam *BJs-ettin* fitu tutam, plantis opulentam detexit.

Per ROSETTAM deinde Nilum afcendens KAHIRJE ftationem fere annuam fixit, minime vero otiis tranfeuntem. Plantae cultae cito indagatas: poftea quse in campis ad pagum *Caid Bey* crefcerenc obfervatse una vice vel altera; periculis tandem monitus hos intermittere excurfus coaf tus eft. Deinceps *Alexandriam* terreftri itinere petens, ut plantas Vernales afficeret, latronum manu obfeffus & iōpoliatus, effrenam eorum licentiam vehementius horrere docuic

Sedatis Arabum difcordiis inteftinis, quibus viarum diu impedita fecuritas , Káhine valediflum eft. Vix autem SUES ingrediebatur, quum Piftor *Bamenfeind* grayiter aegrotus *Forfkhlmm* precibus evicit, ut a propofito *Montevi SINAI* adeundi abftineret; & hie, officia humanitatis prsetulit herbilegii lucro e locis hucusque a Botanico non perveftigatis. In plantarum manipulo, quem indeattuli, JEgyptiacas agnovit: aliasque Arabiae proprias felegit. De caetero ipfē inanem Herbationem ad GHO-BEIBE protendebat.

Itinere ulterius per TÔR, Djiddamque promoto, LOHAJA primum in ARABIAM FELICEM dedit introitum, Cl. *Forjk&lius*



to ties in *JF,gypto* ab Arabibus caftigatus, nunc ipfa in Arabia, uncle effufo gentes indomitann licentiam longe lateque circumferunt, renovatum fentiebat timorem, iile, cui campus, deferta & *fylvTS* muneris provincial effe deberent. Aft studiis botanicas promifit & prsefttit Yemen fecuricatem non creditam, quaque meliorem in regione Europxa bene adminiftrata, fibi optare nemo poftet Documento liint Herbationes *Forjk&lii* tutse, vagantes & prorfus audaces.

Ergo prsetentans populi & locorum fidem, agrumLo-hajenfem percurrebat,, mox longius egredi aufus fblus ad loca herbifera Pagi *Kudmie* & vici *M6r*. Exfpe&atione inferior legebatur horbaram nuraerus , attamen raritate & novis Ipecicbus, aufpiciorum inftar Botanicum incitabat ad extendendas heibationes ad Vallem SURD{II>, montibus altis cinctam , refrigerio & aquis fovencem plantarum copiam Iocupitem.

Yemen Septentrionali exhaufta, Mediae Regioni BEIT EL FAKIH pro centro confituta* Gemini hinc fa6H excufus. *Montes Hadienfes*. Helvetia Arabics imaginem fiftentes, ftruftura, akitudine atque plantationum arte memorabiles, Botanico plantis hortenfibus & femi-alpinis grati erant


Altera excurfione verfiis DJOBLAM & *Taas* Socii ambo per regni areas properavimus diverfas, ubi totidem diverfa tulit florilegia. Decus eorum eft detefla hoc tempore arbor matrix *Oprobalfa7ni*, ki cujus nomine CL *ForJiMius* plus una vice in jEgypto delufus, hac vel **ilia** arbore pro genuina venditata.

Beit el fakih terrio exitu junfta Societate reliSla^ MOCHHA non faufte advenis patuit. Propofitum erat Soeiis Sandm metropolim regianx videre, fed ftudio botanico colophonem impofuit

pofuit TAIES. Nam SAEBER Montem herbis celebratum non licuit CL "Forfkcdio fine comite & duftore àfcendere; neqne Montem SORECK ni(i primo tangere clivo; ruricolis omnibus dudum elapfis. Iter deinde continuans corpore aeger viribusque defieiens, JERIM intravit metam laborum, viarum & v^kx ultimam*

[is in regionibus, in varia hac planicie, in his gradibus montium, his denique excurzionum modis Plants acquifitae sunt, quas Floram utramque ingrediuntur. Ius non unius fundi cflē, vel fola Geographica infpeſio docet. Alter igitur & al- tior exfurgit fcopus, in SITUM PLANTARUM inquirens, & carum ftationes, variasque habitatioiūm provincias diftinguens. Solent quidem Botanici Loca natalia ſpeciebus adferibere; fepe tamen longe ultra parvulum territorium diffusa, quod irunco & radice occupat planta. Hx adumbrationes (dum certe funt) inter fc comparatas *Geographiavi vegetabilium parallelism* fintunt: in eadem regione fibi ubique non similem; in remotis multo manifeftiorem; in terris ionge oppofitis prorfus di[^]arem» Datis plantarum (pecirainibus, regionum Latitudines dijudicantur, alritudines fbli, aut montium tabulate e radice ad fumma usque cacumina. Neque fuo deftituuntur fruſhi hæ obfervatio- nes in regimine Horticulture domefticae vel botanies. Hinc conftituuntur leges indigenatus & coloniarum, five hiftoria Mi- grationum, quibus per orbem fe diffuderant nationes vegetan- tcs; utbarbarae, vagabundae, infefts: vel cults, innoxiae, fplen- didse, domifeds.

Hoc eorum ob caufam prxmonere voluimus, qui non moderni judicio cum CL *Forjh&lio* neceſtitatem fentiunt, qua in-
(B 2) duſlus



du&us cuique plantse fuam adscripsit patriam, cujus habitum ilia gerit, cujnsque quafi dialeffco Botanicum alloquitur*. Haec non fortuita, sed magni ponderis vocabula legitimis adfixa locis fervavimus. Praeterea, ut Lc&orRegiminis formam Flora perficiat, unde orta & quo jure fundata fit in ipfa natura orbis hujus ultramarini, delineationem univerfalem *Gcographko-phyficam* subftravimus.


Zonae temperate vel frigidae regiones, quid *Aquarm/i copia* ad Floram fpeftet, raro cognoscunt. Dignis earum tueruntur curam Terras Meridionales, flagranti fble calentes^ Hcrti agrique vitam & gentis falutem in iis ponunt. Oeconomia primum omnium verfat in *fluviis*, *puteis*[^] *fontibus* quaerendis, adducendis, muniendis & hydraulica arte hauriendis. Irrigationes iftae humanae induftriae concefae sunt, dnm ceftant vel tardant *Fluvia*> quae longe blandiore influxu terra faciem refaturare valent, herbas languentes refocillare, vel latentes provocare; quod *Cl Forjdlzus* in jEgypto; plus vero in Tehâma Arabiae expertus eft, quam ingrediebatur toto anno fccitate torrentem & exaridam; quum convales & aquofa montium lastiffime florebant,

TevYitorium BYZANTINUM miscelam utriusque Florae Septentrionalis & Meridionalis monfrat, ilia deficiente, hac incipiente, an prasvalente? Ex inito calculo patet, Borealem Floram non paupcriorem effe iEgyptiaca aut Arabica; fed in mundo Africano vel Afriatico quis ejus requireret cives? Sunt paucae, irreptirias & patriae formam nomine & genere renegances. At nee Septentrio illas appellare fuas potest, quum ex frigoris impatientia advenas agnoscit, limites regni tenentes &!quafi climatis experientiam ineuntes*

./ECYPTUM fine *TSIilo* nominarc non vacat: ille fundum argillaceo-humofium genuit; Lithogonia calcareum. His parentibus nata regio annuo fedimento hortum supra hortum fternit* Planities niniis aequabilis extenditur & fere (implex, fine Terras verrucis, quas fuis areolis fcqui fblet Flora. Ilia in orclines *Cultarutn* & *Defertorwn* fe dividit; & daas pneterea fubit metamorphofes pragrandes *Immdationis* diurnas & *Siccitatis* intolerandx. His vicibus agitur vita & mors plantarum, Phiiologte Botanicae non indigna confideratio. Extra vias Nature eft, dum *Arundines* ad *Ghobeibe* in mediis Thermis prodigiofe crefcere pofllint.

FLORA ARABICA ad regionis fuse fitum adaptata Vegetabilia cujuscunque fundi alit* *Tehdma* hofpites in littore vel *planitic* fiiftinet, fi annuant pluviae. *Loca intermontana* urnbris & aquis funt propitia. Tandem Yemen *Tlantis montico-Us* gaudet, fponte vel arte in fublime eveftis. Agricultura haec penfis eodem Naturae monitu adornatur, quo illam inftituit Prifca *Falajlina*> & adhuc *Sinenfes* populi colunt* *Mgyptus* fuperbit cultis & nobilibus: Arabia maximam partem fpontaneas habet & plebejas, inter quas prافتantes diftingui-
mus & quad patricias in rure habitantes; quibus ad dignita-
tem uetus ceconomici nihil nifi cultura reftat Utraque Terra
ad extremam abit Legem vegetativam: iEgyptus arenarias ad
fitim & exilium damnat: Djabbalia fuas Alpinas in brevi terras
ftrato & in ipfo nubium finu fovet.

Catalogi praefentes Plantarum iEgypti & Arabian fida induftria confignati, cuique regno vere aborigines conftituere non audentj nam hoc ex vafta comparatione dependet Florae



Univerfalis Regnorum circumjeſtorum Abiffinte, Perfife, Aſiac ſi perioris. iEgyptus hortenſes fere omnes dono recepit, & campeſtres nefcio unde illapſas, vix agnoſcit. Nee Yemen fine Flora hoſpita eft. *Banjam* ex antiquiffimis jam feculis regionem frequentantes, rariſſimas, & omnes fere Indicas, primo proprios in uſiis invexerunt, mox publico emolumento dilatarunt.


Nihilominus Botanices cultura artificioſa tarn lente enata videtur, ut Hortorum non fblum numerus brevis iniri, verum & ambitus anguftus circumſcribi poffit. Si vero non omnes nos fallant cauſe, Horticulcrae datum femper defblatnm jacuifle, vix putamus. Illius viciffitudines Imperiſ fata comitantur*. In hac analogia,. Speciei vel Generis interitum comparare fblet Flora vaftationi urbis vel provinci^e* Has Regni Vegetabilis ruinas variae inferunt clades. *Siccitatem* non uno folum anno, verum & akeſo perdurare audivimus. Quid, (i aliquot annorum concinuaret lerie, plantarum lemina vel radices fine fpe revireſcentias penitus suffocaret; prſefertim in. Te-Mma, fuapte ad fterilitatem promt? *Loctift*[^][^] barbare gentes fata hortosque immani voracitac deftruunt; illasque miferabili & vana arte abigere tentant coloni* In Horticulture negleſtu ipfi *Gives* culpa non vacant, qui parvo ceconomiae apparatu nimium & ad inertiam usque contend; plantas teneroris curac fpernunt, aut rcferere & propagare nefciunt. Indolentiam objiciunt plants & arbores utiliſſime a Banjtinis cult[^], ab Arabitibus otioſe in(pecl[«]). His Flora querelis adjungi debent *Bella* in teftina & vaftationes ex trifti talionis jure & eftrenſe contumacie licentia orta:, qux[^] univerſali pace nunquam filent. Augēt mife-

fnlfér fam *Juris publici admznistratio* violenta, qua: poftquam Tributorum onere populum nimis aggravavit> deinde exaftionibus torquet> poftremo rura & paternas fedes linquère cogit & permittit.

HaQenus ignota plane erat Flora Yemen; ucque fieri fbletj majorem e longinquo & ex obfcuro de fē habuit opinionem. Jam fubira veritacis luce, quas fit apparel Vel hoc fblo nomine aeftimanda haec indagatio, tarn bene efffl:a ad genium fēculi noftri, quo felici fucceflli Praejudiciis omnium formarum acre indiximus bellum. Arabiae felicitas in Anriorum Scriptis celebrata Aromatum & fyivis Thurifenc prafhuitia ad novi Rotanici adventum evanuic^ Vegetabilium prctiofas merces dum ex India & Africa ad fe tranftulit, ita tranfirc non permifit, quin plurimas Species defigeret cuka& Exenrplum eft *Amyridis*. arbor in toto itinere botanico folitaria unico individuo; nifi ftatuere velis,. Hortum hoc in loco quondam viguiflē fub tutela Domini, herbarum & arborum prافتantioris Yirtutis non incuriofi*

Origines Florae dedimus, jam *Formam* ejus brevi verborum conipendio exponamus*

Littora *Gallie Navbonnenjis* accuratiflimis illuftrium Botanicorum obfervationibus perquifita innotuerunt^ FLORAE ergo ESTACIENSEM completam fiftere tanto minus potuit Viator nofter, cum dies vix unus huic negotio fuperfuit* Et quid novi locus anguftus proferret? Cl. vero Auftorem fibi non defuiflē plantarum vis eximia, & obfervationum ftriſlurae, tentamina ifta ingenii ad majora fe prasparantis, monftrant. Hæc igitur



igitur prima Herbarii incunabula & incipientes Descriptionum pagellas, tanquam non perituras offerimus.

PLANTAS MELITENSES e Flora paupercula decerptas, eandem ob rationem fervavimus. like ad Orientem proprius accedentes, aliquot ejus inter fe advenas receperunt.


CONSTANTINOPOLITANA FLORA non fblum in lsEtiore campo locavit CL Auftorem, verum & moram his curis invigilandis conceflit. Largior inde meffis collefta, quam autumnalis dies fpondere vidcretun Et ne vacuo nominum indice fatigetur Leftor, animadverfiones frequentius infperfäs legit; quum plantas tam acute infpexit CL *Forfkålins*[^] ut novas Species inter illas detexerit. *Nomina Graca* fepe adjecta, incertae auſcultationis non funt. Partem eorum a rufticis habuit: partem aliam a Viro Grseco Rei Pharmaceutics perito. In Urbe Sacerdotum quorandam eminentioris ordinis fccietatem & hortos frequentavit* In fpem & favoreni Flora hujus traſtus falva optamus quae collegit Herbaria Clai\ Dn. HÖCKERT; Legationis Svecanae a Sacro ordine; quem Botanices amantiflimum laudavit CL Auſton

Hi Prodromi Floras nunciant infrequentes. Harum prior iEGYPTiACA, Regni Inferior?* certain aream percurrit. Ad Superiorem JEgyptum procedere negavit itineris (copus Arabiam afpeſtans* At in Flora Alexaiidrina & Kahirenfi tanto major adeft, ut illas exhaufias affirmare audeamus. Plures enumerat & defcribit Species quam vidiit Alpinus, mnkorum annorum hofpes Káhira, & amicorum auxiliis adjutus* *Haffel-quiftius*, eximius ille Botanicus cum *For/kálio* certare non valet* Excurfiones late extendere non permittunt Arabum vagantium

rium infultus; & notitia lierbarum liberi fundi vitae periculo emenda eric* Quum ideo 'Caxnpeftres' fere omnes herbario suo Intulit Nofter, illas mimiftro Botanico Arabi & annux manfionis beneficio debet. In tanto otio -defcriptioes revolve _mpotuic & cavere, ne *Deficientes* (iiperefſent: de quo habicu integro fibi gratulari paucae poſſimt Flora exoticae,

ARABICA FLORA quinque menfium intervallo & viatorio transcurlii colle&a, poſterioris *Semeſtris* florentem &-adhuc ignotum mundum futuris Botanicis detegendum ceffit. Alia herbationum ratio in iEgypto, alia in Arabia «ft:[#]ibi plantae, ^ut cultx in Lords habitant, aut eadem hsec loca, quaſi conſcise, quaerunt incultſe; adeoque brevi indaginc clauſe omnes, facile capiuntur: & ne terra Jateant, Nilus refocillatas €xci*at. Arabia plants diftribuuntur (parfe per campos, valles, montes. Tehamām ^ardor adſtringk, fterilitas tlefolat*

Specierum eertitudimm difquifirioni Botanicorum ſubmittimus. Noftrum non «ft fundamenta Generum, longe minus Claflium con^ellere, aut quoçunque modo Iabefare» Cl. *For-Jkkltum*^ per vias & fylvas vagando, fuffidenter determinare valuifl̄c omnia, quis affirmabit? Confulto tamen errores non obtrudit, & feipfum fiibcifivis emendationibus fepe caſtigat^ Stylus defcriptorius, ut eſt̄ debet, brevis, fenu plenus & tamen dilucidus, defectus ifponte & ingenue dctegit* Cl Auſtor in priñis herbadonum veftigiis plantas notiffimas in vivis'relegit (peciminibus; & ftatim mentem attentam figna fubtiliffima tetigere, novaque dederunt monita; verecunde tamen abſtinuit a totidem Speciebus ftabiliendis. Tantum iherea his obſervatio-ribus cffeQ:um eft, ut Species ab illo taſlae, de ftatione ft noii



mobs fint> tamen inquietae separatam dignitatem optent, aut
ftri&tiorem chara&terum nodum> quo immotius in p̄iftina fede
defigantur.

VARIETATES hie immifceri naanifeftas & multas, CL
Au&ori vitia non vertendum erit,, quin potius fubitaneas de-
criptiones eo usque accuratas ingenio, dexteritati & experientise
laudem conciliare. Non levis intercedit differentia in arte de-
fcribeqdi Zoographica & Botanica: Animalia chara&eres. speci-
ficos univerfali obtuim & quafi in pelle gerunt. Infe&a, licet
triplici mutatione fibi diffiinita, in quovis tamen ftatu di-
ftin&as admittunt defcriptiones,. genuinum animal arguent<<
Plantarura cognitio longe alia regitur lege* Ante florefcentise
tepius caulis & folia nihil Q)ecifici enunciant. Floris periodus
& fuas properando habet rnoras. Quam follicitus vero eft la-
bor in fubtiliffimo floris difco fine errore legereJ FruGu tan-
dem maturo defcriptio fuis numeris abfbluta habetur. Hoc
vitae curriculo transafta exspirat planta,. & raultis demum *m^ti-*
iibus transaftis radice aut femine refurgit. Hinc non aliter
eyenire poteft, quam quod Botanicus, dum has regenerationum
aeras ad finem non perfequitur, multas colligat *Indeter-*
viinatas Syftemati non aptas. Ad fidem vero opens> ad
ambitum & fupplentum pertinet,, juveniles has> aut fe-
nefcentes non fpeinere herbas, quas ille vel alter, alio in
tempore_y alio in loco vigentes recuperat. Idcirco *nomina*,
qualicunque charaftere ftipata^ ne exirent, deriftuiraus ; iffe
enim fignis quafi femi • reperta futuras perquifitiones accele-
rant. Alia vero omittenda erat farrago caulum, fbliorum
&c. ex quibus defcripcionis forma coalefcere potuit nulla:

harura

harum Anonymae tres vel quinque nobis invitis irrepferrunc. (•)

Flacids mentis Le&ores *Forjk&lhim*noftrum transverfe non intuentur, dum denfb fpecierum occurfa obrutus & prae-peditus, omnes lineas non pari gravitate pingit. (•*). In tanta mole confusio eo minus evitatur, quo ardencior tendit Indagator in florilegiis *feftinandis*: tempeftatis aridae probe memor vitam plaruarum ocyus exhaustientis. In Meddionali orbe nulla permktitur in craftinum prolongata herbatio. Specierum determinata extricatio non perficitur nifi quieta & Ienta collatione in medio (inu Horti Botanici, ubi vivae', perfekte & Ibciato genere ftant. Quid ? quod, Botanici, quibus haec comoda adipirarunt, Genera numeroſa ad vivum refecare non potuerint*

GENERALA NOVA conftituere Hiftorico Naturali magnificum eft, & in niagno fpecificrum agmine lucem & ordinem pracfert. An vero omnia Genera a CL *Forfk&lio* enunciata Crifeos legem fuftineant, judicet Orbis Botanicus* Quicquid tandem erit, fi fpecies quaedam novae ad humilcm varietacum ordinem dejiciantur, aut Tub fueto figno militare cogantur : fi denique

(Q 2)

Genera

C*) Aliquot Varietats, tunquam fpecies retinendx funt, quos uifiis aut confuetudo multiplicavit: ut *Citrus*: *HtUfiutx* *Cucurbitacea*.

D*) *Nommius Trhialiltus* nulla nobiscum erit controveftia; quum haſlcnuſ admodam fluxa fucaunt, & dum cheraftercm plants defigiarent, fappe animum Denominatoris & iaryram exprefſcrunt. Ne ergo fiivola aut aceiba effent, potius *Arabkum* adjecimus nomen, dum planta non obtiillt (igia fatis manifeſta)*

(•*) In Geneiibus: *Fanici*: *StilfoIa* | *dfctepindis*: *Solani*: *Suada*: *Aha*: *Coffis*: *j&fborbkti* *Ocjmi*: *Seticcionis*: *Mimoja*: *Cucurbitaaorunu* &c.



Genera nonnulla recedere jubeantur; contra, plures Species antiquo nomine hie designatae Generis factigium jure ambiunt. Ifte operis hujus est status, ut mutationem & jaſturam levi fine detrimentum fenfii toleret,

Scientia Naturalis suam formam PbBticam, *Syftema* vocat: robur & munimenta sunt Descriptiones: falutem & dignitatem in frequentia civium quaerit: quo plures vero familias in Ordinum provinces nunciem, quoque diftinctius vitae & cecnomiae rationes in domo cuiusque species intuetur, eo majori cum facilitate & deleftarionia gubernatorias curas agit*. Quo latius h^{ec} pomoeria extendit Scientia alumnus, tanto acceptior est. CL *ForJMlium* plantarum numerum ultra *Otto Centurias* evehere potuifle, quem exsuperavit nostram, dum ita peritis bpeve tempus & herbariorum arcta fpatia reputavimus. Nimia in Auctorem veneratio, minime hanc suafit analētorum fiblicitudinem,.. quae species praeter modum multiplicaret & factum Auctori adderet, a quo ipse alienifirnus eratj prscvaluuit enim. semper debita veritati reverentia: fed quae duro labore collegit Viator, ea,, quid-ni tranquilli nos exhiberemus? Nee ea est operis hujus indoles, - ut Syftematis auctoritate imperemus, fed Syftematis legibus obtemperantes, collectam materiam, qualem ab Inventore accepimus, forma tantum diſſcam exhibemus* Hie res non agitur, fit-ne Species nova & mox Syftemati Botanico inferenda; fbla descriptio ab Auctore & editore requiritur,

Msc* fehedulae mobiles & conjectae, jam Pofleibri impedimento erant, ne species commode inter se conferre, charateres autis fulcire (ignis, varietates vagas eliminare, generum

rum au&orkatem ftabiEre, defcriptionis ilneas abfolvere, vitae: curriculum piantae fequi. & phytologicas. animadverftones ad- fpergere*. Ne LeQrori confufim & iidigpffam molcm obtmde- rerrus, confukius duximus. defcriptions porrefffa firontcr exten- dere, quo diftin&kius, lucerent*. Hint fimul CenturfarwM. fēclia- nes onx funt^ libera quidem digeftionis, & formam: viatopiāra: ferentis: Claflium. tamen integratce & Generum homagcneis: membris, quantum fieri< potuit, fervatis: Flbram j\$Ea&icam. ab- /Egyptiae separatafn fiftere minus, necfcf&ri'um videbatiir in hac* Colle&lione, ubi utilius eft, (pecies fub fuo genera uniiras. legprc Catalogi praeeuntes, Florx divkias,. omnes- plantas, ab. Au&tore: inventas, uno cenfti numerandas offerunt;

NOMINA Generwn nova Criticis- materia. expetita,, qui. ni- hil inta&um relinquere,, fed nominibus alterius fbni, aut: defcrip- tionurn verbis aliter revolutis. fupernatare ftudent:. ab. hac: lite- nos abftinemus. Yocabula funt., quas* abjici. vel innavari^ poftlunt; modo fēnfus rei in fecuro maneat*. Ex gemino fonte. haec: oritur Nomenclature* Metuoria Loci ubi primū inventa; eft plānta: nova, fi cum ilia perenni. nomine. legitur;, gratitudinis offi'cium; eft erga patriam,. qux Plants genus. non fblum hoc anno,, fed mulcorum fēculorum, plusquam nucritia. cura educavit*. Èapropter Kdhkiaviy Caidbejäftiy Melbdnia?n, Eracliff'am tanquam: toti- dem materna nomina. ftatuimus. Jam plures ante: annos: Illuffr; DE LINN6 Cl. For/Mliò confecravk ForMkmn> nobis Cajdbej'a?ir, Ipfe vero Au&tor aliam fibi defignavk, quae Mneviofillcc: tkulo: de- fideria praefert. Botanicorum. arbitria dirimant quasnam: ex his- plantis Candidatis Invencori. flio. celebrando ferviat.

Rerum naturalium nomina ARABICO *idioviate* expreflaV
 quantum labiis noftris confbna & levia fluunt in Syftcmatis ge-
 nealogiam adoptanda eflē & defcriptionibus prafigenda, noftro
 non egeiu patrocinio, quum Lingua haec fenili auſcoritate longe
 tranſcenditGtvraiw & *Romatiam*[^] quarum vocabula fepe obſcura
 injicimus fpciebus Romano aut Graeco nunquam audkis* Nee
 omnia ifta nomina Arabica denominationis funt vag[^]. In Ye-
 .nien, ut in Europa, proviricia quaequ[^] *trivialibzis* utitur, quibus
 faperemineilt *generica* per totam regionem recepta; heſternue ne-
 quaquam inventionis, fed ex antiquo profe9:a labio, in *Scriptis*
Dotloruf/i vel *in Traditionis* memoria refidua* (•) Haec differen-
 tia magnopere Botanico commendanda, ne in eadem fpcie vario
 fe decipiat fbno, unamque rem toties multiplicet; utque fciat qua
 lingua cum *Vulgo*> qua cum *Libris* loquatur. (**)

CL AuEfcorem frequentius nunc audimus Arabica Lingua
 Ioquentem, ipfa in Arabia rufticantem. Diurno cum ruricolis
 conviftru, prſefertim in Montibus Hadienfibus, Botanicam nomen-
 claturam excuffit pleioius, quam ipfi AuQ:ores Arabes qni extra
 patriam fcrip&runt[^] Horum enim plurimi, ex toto Oriente re-
 l[^]iones coinpilantes, varias linguas, variasque dialeO:np mifcue-
 runt,

(•) *QIMk* in Slg>'pto Scandentibui additur. *Rcdif*: Ciflb & Copparidi compttſt. *Kojfijf*: JufHciüs & Ruelliis. *Laaja*: Ariftolochix, Opbiorrhiza:, forte quo-
 que aliis antivenenatif. *Bnntia*: Hibifco. *Q~~ttt~~* & *Betticb* Cirrullis. *Turundj*:
 Citro. *Myrreir*: Scoizonera*, fimilibusque. *Rnud*: Arteiuifif, TagetC Ambs
 Coricap & congeneribus. *Auv'ii*: graiiiinibus Andropogoniformibus. *Tol-
 lol**; Mnio, Bryo. *Mafchit*: Filicibus.


(**) Pro cxemplo funt: *Laaja*: (Cent. II. 39.) *Ekoja*: (C. IV. 100.) *Delft*, Fi-
 cus: (C. Vi: 93.) *Gcnift** *Rattui*: (C. VIII. 66.) *Rubus*% *Nofa*: (Flor_f
 Arab. 3280

rant, unde quid Arabia genuinum fit in rebus & nomimificus extricatu difficile erat haffcenus. Nunc Cl. *Fqffidlio* pramoftrante hacc Lingua fibi verisque fpeciebus redditur: tantoque certiusr, quo lender ibat progreflūs per varias Arabian Felicis provincias.

Quo minus hsec failerec rnanuduQio, maninr* dirigen-dam prabuit Erudito. *iFaklh*) Beitelfakfli habitant! r qui Alchemix secreta ftudebac, fed & herbos fij orbis non uifelicker cognovit, & CL *ForJl&Ho* Montes Hadien&s adeunti (beium fe jungebat: H&c cautio fummx neceffitaris in Lingua &tti tain peregrini, cujus arcicuktiones infueta auris.diiRciHime excipir, nee manus charaefceribus pingere poteft aliis, quam ex prima origine linguae quafi adnatis*

MERITA CL *Forfkdlu* in Hiftoriam Naturalem Orientfs Scriptis his Zoologico-Botanicis abunde conftant* Ipfe adverfarria confignavit fubitaneo.ftylo & fepe defatigato,. nee ultimam iis adinovere limain licuit; nos poft huma & iirmiutata edimos: ergo fine nacvis_y lacunis & erroribus effe non poftint*. Quis vero partes. Auftoris fufcipit,, quis Crifin acute cernentcm avertit aut temperat? Laudem juftam & poft funera. viventena mri* nuere, atrocis effet injuriae. Jubet tamen veritatis amor & in Literatum orbem reverentia, ne excufatione male locata defeftus obveleHiuSy ubi (ponte in propatulo jacenc

Qui Orientem a noftro orbe plurima ratione diverfiim & difRciies herbationum modos perp^ndit, iHe admirabundus iufpicit rapidas indagationes, quibus Botanici recentiorum anno* rum inclaruerunt* Verum in arva non antea fcrutata immifiūs Obfervator, c[uid-ni nova deteget? Primariam laudem ipfe *Sci-entiae*



entia forma aufert, qua; ingenio architeffconico unius Botanici ad incredibilem evofta facilitateTM in ediicendo, examinando, defcribendo, charaffcerum compendiofā ichniographia ptantam prius nominat, quam examine attimgit. Juvenis Botanicus promptitudine vincic Senes iftos Botanicos fuperioris aevi, quantumvis aflluos, late circurhfpientes & iminenfā licerarum cognārione graviflimos. Ex aperto hoc vericads intuitu maxima <orkur voluptas & fciendi alacritas. Invaluit hinc mira ^viditas Naturxt provincias fiibjugandi, loca incognita detegeiidi, & limites ultiinos radio & numerato pa(j« dimetiendi* Hoc eodem ardore aut prijudicio occupatiis Q. *Forjidlius* nimium quantum floriiegiis inhiat, de comitatu plantarum au&ifluna fbllicitus, in uodus & virtutes minus attenden^ *Yhytologhe* & *Oeconomitc* defiderata tion iatuerunc Vktorem eruditiffimum. Verum Adver/āria ejus sepius vrtendo, meras Ipecierum corifrucciones exmlimus* ObfeiVadones ad praxin dirigendas.rarius adjicere licuit. Paucifimi LeQ:orjes^ Syftcmamm fcilicet ardfices, ficas defcriptionum oiiācurse cum voluptate acquie/cunt.

Forfitan iEgyptus, quam totics legimus in Itinerariis cauflām Cl. *FoyJkMH* dicat. At quantum eft, quod nefcimus! Quantum eft, quod nunquam läds fcire volumust Quot.indagationes fixfpeQiandse fuiflètit ab Obfcrvstore ftrenuo, ingeniofo, prxjudiciis vacuo, fciendis auxiliaticibus fufFulto? Ai^abia tota facie nova Au&orem perftrinxit; ut eundem novitaris fenfum in nos transtuliflēt, optamus. Quam copiofe & curiofe fcribere potuiflēt de Oeconomia hortenfi& paftorali; de Agricukura campeftri & montana; de Infe&LsFlorae infeftis; de Plantarum propagatione & limitibus; de Venenatarum effeftibus j de pabulis Animalium fylvaticorum & graniphagorum?

Pari

Pari oblivione inscribere fuperfedit Obfervationas *Mine-ralGgico-Pbyficas*, quas si paucas dedic .ZEgyptus, eo illuftriorcs redditit Arabia. Haec Geogonte defiderata peregrina non erant viro e patria rnontofe & metallifera egredienti* Ad hanc Theoriam perficiendam fero nimis attentionem- defle&ere inceperunt eruditū In hoc problematum confefſti feculares experienrias audienda^ & obfervationes ex omni regione convocanda% Scripta deficiunt teftimonia, fed Annales Telluris in Monce, Terra, Mari proftant.

Non omnis in CL *Forfk&lium* culpa volvenda, si tot operis hujus membra deficiunt; plurima enim *depetdita* eflè manifeftis vidimus indicis. Quantum potuimus, obfervationes reparabiles produximus locisque aptis ftatuimus* Tandem, plantas militate quadam memorandas, in una *Tabula* per lineas, dum defcriptio non sufficit, difpofuimus*

Plantarum *Ufus medicos* in *Mgypto* poft *Alpini* curas non contemnendas, alii Viatores ulterius collcgerunt; adeoque Cl. *Forfk&lius* ab accufatione fe liberat, dum *Materiam Medicam Ráhirinam* inventis prioribus addit.

Arabia Felix aliam medendi artem & quafi primaevam monfrat, ex herbis fpontaneis petitam. *Populus* ignorat arris inftituta & praceptis domefticis fatis habet. Ideo diffufa non eft pharmacopcea ruralis & formula fumme fimplices; fepe tamiei audaces, & ftomacho teneriori non fuadendse. Quantilla praxis eft, inter arcana non abfconditur, fed viatori quacrenti fine invidia aperitur. Sunt quidein in hac vel ilia urbe Medici Chemicam praxin, & quod pefimum Alchemiam colentes; fed Gens, quce noftris moribus fanitatem non corrupt, illano-

(JD) ftrorum •



ftrorum. morborum numerum quoad magnam partenl feliciter nefcic Climatis fervor Symptomatum ftatum acuit. *Vulnera* cujuscunque generis fortiter arrodunt. Incolis Morenibus crura *ulceribus* fcedahtur. *Hamorrhoides* & *Scirrhus (Total)* frequentes flint* *Hypochondria* communis auditur querela, adfcri-benda *Pani* ex Holco male co&to & dune · digeftionis: auget *Vita iners* & *Polygamia fuperflua*, qua: in frufraneam tandem definit. Hanc Gynaecei claufi fequelam triftius conqneruntur, quain morbos a Gynaeceis liberis indu&os. Evidenti fanitatis praerogativa gaudent *Monticola* aerem liberum & sub-frigidum spirantes. Per totum Orientem *Vegetabilia* dapibus ex Animali Regno praeferuntur. Hunc viclum continuata dia&ta confitutio-ni corporis humani nocere, ut Schola Medica* perhibet; id maxime *Banjanorum* refellitur exemplo, qui prsester Mel & Lac, omnia ex Regno Animali rejiciunt alimenta, & tamen lani ve-gerique vivunt.


Q U A M difficultis & fufpeffca inter Arabes male mora-tos eft itinerandi libertas, opinio teftatur, qua Europseos *bifcri-ptiones* defcribendo thefauros latentes • provocare poflē putant canto Magise Scriptoriae dominio , ut vel ^procul inde , dum chartas potentes evolvunt thefauros per fixa, per ignes advo-cent. Ea eft haec invidia & ignorantia, ut botanicis quoque obftent annotationibus, ne Scriptor aliquando iratus literarum pharmacis plantas enecet. • Non facile fibi perfuadere poftiint Europaeos longinqua fufcipere itinera, nifi Commerciis quxrant opes apertas, aut Scriptura venefica excitent opes fepultas. j^Vliramnr tamen, neminem hunc errorera prudencer ad obfequia fibique fervientein subjcclē,

Heroi-

Heroicus ergo amor Scicntiarum alcām tot periculis tremendam inibit; temeritate vix laudanda, quas vitam & salutem exponit unius akerius - ve plantae gratia* Junēfca Societas armata manu tutius vadit; *fed .ot'amicos in herbationes confidentes, quis hie inveniet?* CL *Forfkdlms* ad vitam botanicam inter Arabes agendam prorfiis effi&us, pericula" patienter tulit, & fortissimo .animo per medias ivit infidias* " Interea, non fibi fed timori debet augmenta Floraē fīiae ditionis, arte herbatum inventa, aliis Viatoribus mukum commendanda.

Quum enim excurfioneſ ad Pagnm *Cqjd Bey* primas intitueret, Hradm omnia formidine plena agnovit. Rurfus tamen eadem veftigia repetens, ab Arabe violonta manu aggreditur, & comitibus ad auxilium properantibus acgre liberatur. Quod confilia non valuerunt, pericula ilium deduxerunt ad recipiendam conditionem. a Cajd Beyenfibus multoties propofitam, ut Arabcm conduſtitum reciperet, qui plantas illi in domo quiete cubanti afferret. Quid ad rem Botanicam promovendam rudis homo valeret, dum fibi fingere non potuit CL *ForfkMius*[^] has inducias primuni rejicit, poftea frigide annuit, demum uffi praeftantes laudavit. Arabes quippe ruris incolae' plantas, quas nutrit campus paucas, a juvenilibus annis nominatim edifcunt; accedente intituzione herbarii artes & capfularum colle&ioncm cito capiunt. Parvo. ergo pretio orium & ftcuritatem emit, atque rei literariae nuncium ex iatrone fecit, qui inter flios tuto vagans, rariores Defertorum (pecies attuiit, quas alioquin nunquam vidifTet Extraneus.

Hsec 'ane taedia CL Auftori expreflerunt votum pro Horto Botanico Alexandrian intituenda: (imul fervens in Scien-




tiam fiam amor & loci benigna fedcs hanc ideam adornavit, qua convenientior alia non potuit animum Botanici illabi in tot hortorum magnifice florentium afpe&u, Pulchra ftat in voto, langvida in remoto; interje&tis praclari facinoris impedimentis, qua? ex voluntate averfa, vel voluntate bona fed non excitata, aut male* dire&a oriri folent. Si fieri poteft! plantarum infititio pcculiariſ requiritur, & ipſe Boreales noya obfervandi phenomena % miniftrant, dum in pingui fblo obefe & luxuriantes fe transformarent* Hortus hie, tantisper imaginarius, plantas nonnifi depreffioris foli patitur; vafta tarnen earum ef?et copia, fi ex India per Mochham & Sués, ex ^Ethiopia per Karvanam *Djallabe*^ ex Barbaria nave vel Karvanis introducerentur. Hie conventus herbarizm .quafi Portus earum Francus ef fet, unde ad.Hortos Enropaeos exirent.

Arabia Jfelix Provincia Literaria Cl. *Forfldlw* defignata, in qua ingenium ftudiumque laudando exercebat fucceſſu. Quod vero ipfis dete&is botanicis pra!ftat, illām in dignitatem fecuritatis vindicavit & ticulum Felicitatis, alio refpeQin, fed toto noftro applaufu prolorigavit. Campi ejus Elyfii in obfeuritatem receflerunt," quam illis haftenns circumpoſuit tempus & incurioſitas. Amcenum quidem eft in terram defcendere nova Vegetabilium facie fpeltablem; longe vero gratius ex prajudicata opinione de gente barbara transgredi in familiaritatem gends (implicit nee tamen impolite j inter, fe rebellis, fed exteris manuetae; fcientiarum rudis, fed non refervatae mentis; pauperis, tamen holpitse. Confuetudo ifta popularis non ex fe nata eft, fed ex publica fan&tione, quxinfultus in extraneos graviter prohibet. Sic Arabs Yemen ab Arabe iEgypti differt, ubi pro-

cul ab aula, propal a lege vivunt diflblati domini, diffoludor plebs/ Incofee Arabia Felicis forte angulta, fed toleranda contend peregrina & injulta nonavent fpolia.

• Teftes fiimus CL Ycrflteliw & ego, qui falutein plus una- vice commifimus genti ignotae; falucem Temper reportavimus incolumem. Loca adibst Ille ab Europseo vix pede ta&a, certe a -Botanico nunquam. Homo venicbat vere novus & fere fabularis, cui non mercatoriae opeSj fed plantar urn nomina & uſus unica cura. His initii animofior, tandem interfuos Arabes vitam pafloralem vixit. Minim in modam ad proveherida Flora incrementa proni erant & fenex Arabs, & juvenis, & puella*. Quum fingulo die pabulares legit herbas? junior plebs> Botanicam fui agri exaſtiffime perfcrutatur; quamque primū puerilem inter lufus traſtat, cum ilia a!quuxva fenefcit. Haec eft caufa, cur Flora paucas botanico ore vocat herbas, quas Arabs fiio idiomate nominare nefciret.

Varia arte tentarunt Viatores, ut 'gratam exterm Gen- tibus fuam redderent prſefendam^ Non hujus loci eft requifita ingenii, mentis & fortune exponere; aut ad parientiam, ford- tudinem & morum amabilem fuavitatem exhorrai; ipfa Scien- tia, in qua res noſtra verfat, Viatorem fuum juvatt Saepe Cl Forfk&lhmt offendebant ignoranriae contemnentis ftupores, qui pra:fraſta infitia illuſtratſe mentis excellentiam a fe remo- vebant. Sa:pe iterum ignoranriam fimplicem fpeſtaculis fub Microfcopii difco patentibus perculit, mox ratiocinationis duſtili fcrie proprius luci admovit. Bjidda primus fuafbr Horti fuit, cujus antea ne veftigium pofuit Ienta inerda.



Tarn auda&er exfpatiari nunquam licjiflet illi, qui fe-
ros Turcarum & Arabum mores in iEgypto perfeſlis erat,
nifi improvifa, tantoque magis dele&abili humanitate exceptus
fuſTct *Lohajrt* a Praetore urbis *Emir FARHAN*, qui fecuricatem
& liberum egreffium fpondens fide fanciebat, & commendatio-
nibus praemiffis extendebat. Nunquam illi innotuerunt icinera.
propter herbas, aut earum fub pnetextu inftituta; nee ideam
hominis Florilegi fub alia forma expifcari potuit, quapropter
ab innocentifimo ifto agendi modo fuſpcionem politicam ex-
primere nefas fuſflet. Hunc igitur virum Botanico noſtro Ix-
tum jngreflum aperientem, & conamina ejus quantum potuit
promoventem, ceu dete&orum in Yemen motorem prium,
cum honoris memoria nominamus^


Hunc Arabian Felicis ftatum toties inculcavimus: nempc
quo ce^tius veritas rei animum haefitantibus adderet ad veſtigia
Fqrfkdlii imitanda & protinus transgredienda. Omni jam vacat
Yemen culpa. Viator unus ad omnium mores fe componat,
omniumque lingua communi utatur, non totam gentem (ibi
obſecundantein poſtulet

Quum hxc tentamina fortiter incitant adArabiam Feli-
cem diligentius vifendam, ne futuri Viatores errore (educantnr
in Terra haftenus Geographica manu non delineata, ideo Vias
& Stationes herbiferas regere tentavimus *Tabula Geographico-
Botanica*^ ad compendium reda&a ex majori ilia in noſtro Ici-
nerario confpicua; iis tantum locis expreffis, quos CL *For/Id-
Bus* celebres fecit* Recurrunt ſimul in memoriam excurfiones
Geographies, quae in transcurfu femper faſciculos Plantarum prac-
buerc, quos pro Socio non inutiliter me legiflē, laetus animadverti.

TEMPUS adeiat, quo Seienriain Naturalem fab favilla diu jacencem in Dania, ad lucem fufcitabat magnanima cura Regis immortalis memoriae FRIDERICI V. Nemo cam alienus ab hoc studio haerebac, quin amabili Scientiarum via Regi placere vellec. Iisdem temporibus Quaeftio agitari ccepit de *Arabia Felici* recognofcenda, quae haQrenus haud alicer ac eluferae voca eruditorum. Miniftri incimas admiffionis, Illuftriffimi Cornices DE BEKNSTORFJ? & DE MOLTKE, Bonarum arrium & virtatum apud Principem Interpretes> nullam confenfus moram habuerunc conamini Regia munificencia digno.

Cl. *For/kcdius* Celfiffimorum Msecenacum bcfnevolencia Sociecaci Icineranci adfcripcus> nunc demum incellexic fe longe ancea. Orienci defignatum & praeparacum^ Hie enim Vir Juvenis a prima ascace prseeellences ingenii doces exferens, fob inficucionē Paa'is do&iffimi annos & fpem ancevertebat. Linguae Lacinae vix copiam habnit, qunm libros Philofbphias modernse compendiarios, fine fibrmidine afcenfiis ad vericaces fubliiniors meditari aiifiis eft- Simul Scientia; Nacuralis praeguftamina cencavk, Aves defcribens & Infectorum metamorphofes obfervans; in quibus ftacim Leges univerfeles infpoxic & formavik

Totam vicse & ftudiorum racionem adTheologiam verterat* Accidie> uc Cel. Profeffor AURIVILLIUS Parifiis redux Arabic* Lingua nociciam (blidam fecum acculerfc^ quam prxcer Olaum Celfium, jam Senem, aecace & mericis venerabilem, pauci calluerunc. Hanc Linguam Sacris incelfigendis utilem, uc Sacrae inferviunc Theologize, primis fundamencis familiarem fibi reddidic CL *Forfidilzis*. Brevi poft Acadcmiam *Güttinge'rifevi* frequeritans, in vortices Philofbphia? excenti'icos incidit & regiones



rciones trancendentales auferebatur, dum jufto tempore Scien-
tiae Naturalis voce revocatus defcendebat. .

Itineris Orientalis fpartam inire, tueri, implere non cujuSvis
genii & ingenii eft. His virtutibus inftru&us Nofter, magno
indies exercitio ardentior, muneris fcopum intuens, nee lentus,
neque mediocriter aflluus , nihil ob formidinem recufans
provinciam perpetuis adveriāriis illuftravit* Saluti Msc*
confilio non pcenitendo fubvenſum eft* In procinſlu
fcrypta, jam communi Eruditorum tutelx traduntun Hac
cynofura accuratiſ revolvuntur *Herbaria* fervata. Plurimac
funt plantſe hodie non noviK, fed dudum defcriptae & delineate,
omnes CL *Forfk&lio* primo auſl:ore, qui illiſ ingreffium in
Hortos Botanicos dedit, Seminibus rariorū transmiflis* Dum
ille fine invidia arcanas iftas Specierum origines communica-
vit, morem fimul geffit mandato Regis provido, qui publica
hacc munera Scientiae Naturali largitus eft»

Floram Arabicam radices agentetn videmus, folia ra-
mosque emittentem, Tanta incrementa pauci producere po-
tuerunt menfes. Lſetiores fbles illam ad flores explicandoſ Ibl-
licitent* Dum vivit, dum increfcit, dum frnQrus aliquando
rnaturos dabit, primo fuo Botanico felix inventa eric



FLO-

F L O R U L A

LITTORIS GALLIC

AD

E S T A C

PROPE MASSILIAM.

ACCREDIT

F L O R U L A

INSULT

M A L T J E.



OBSERVATIO.

ESTAC, locus baud procid ab urbe MASSILIA, Terra gaudet albo-brunefcente & pingui. Fertilitatem ilia conciliat regioni, quam externa fades non promiU teret, Montes vieini conjlant maximam partem Lapide Calcareo albo & compaffio; qui hi fruftatas divijus & folis calor i altquamdin expoftus fu- perficiem tividam indait. Lapis Arenarius adejl albo - bruneus, mollis & eum Aqua forti ejfervefcens. Inter Strata montium solidiora Stratum Aren jacet.*

MALTA Infuta tot a petra eft Lapide Calcareo conflata molli & ufibus dome- Jlicis aptijjimo. Conchyliorum exuvice inherent varicc. Humus vix hinc & inde areotas occupat tenues & angtiftas; fed tanto impenfus cult as. Excnrjio botanica primipalis (••Salinas proximas littori famofo divi Pauli naufragio.

Plantce quaedam Catalogi hujns notata figno () defcribuntur in Cent. PL VIII.*

FLORULA

E S T A C I E N S I S .



D I A N D R I A.

- I. **C**RATIOLA *oficinalis*.
2. OLEA *et/ropaa*: in rinetis cuha.
3* VERBENA *aficinalis*.
4. LYCOPUS *europsm*.
5. ROSMARINUS *officin*. ad radices montium paffim.
6. SALVIA *vcrbcnac** in collibus apricis.



T R I A N D R I A .

7. VALERIANA /OCK^J-
8. V. *rubrax* in collibus apricis frequens; flore pulchro.
9. GLADIOLUS *cowmumis**
JO. PANICUM *dattyhn*.
II P. *viride*.
12» AGROSTIS *ftolonifera* ? non Tepens. Solo huinido.
J3. AIR A? panicula ^icato, calyce 2, 3 flore, .longitudine fpicute.
14. MELICA *ciliata*.
15. POA *filicina*.
16. BRIZA *maxima*, calyce fulco.
17. D-VCTYLIS *ghmrata* glumis calycinis & corollinis exterioribus dorfo villofis.
JS. CYNOSURUS *cclmatus*. In vallibus.
19- C. *paniceus**
no. BROMUS *pinnatus*; glumis vix ciliatis , ariftis corolla brevioribus; foliis lincaribus, non ciliatis.
21* B. *diftacbyor*, a priore differt foliis lanceolato - ciliatis; glumis vilde ciliatis; ariftis floribm duplo longioribus; fpicula fcpe in caule unicaf
22. B. *rubens*: in arvis frequens.
23. B. *fquarrofus*: in arvis. (*)
24' B. *te&orum* : in fccis paffim.
25. AVENA *jLivifieur*.
36. A, /i/ttw: inter fegetes paffimi.

27. A VENA *fragilisi* l[^]pica fipe plus quarn 4-flora.
 28. ARUNDO *donaxi* parcius.
 29. LOLIUM *perenne*.
 30. HORDEUM *juhatum*.
 31. H. *hexaflichon* in agris cultum.
 32. H. *murinunu* Char, specif. in Syft. N_# & Sp. Pl. transpositus, ita reftituendus erit; *flojculis ariflatist later alihu wafculis*.



T E T R A N D R I A .

33. GLOBULARIA *vulgaris*.
 34 SCABIOSA *columlj.* foliis r.idicalibus faepe oblongis. In pratis.
 35. SC. capitulo globofo, foliis divisis laciniis profundis.
 36. ASPERULA *cymnehka*.
 37. ASP. *arveufisi* foliis 8-nis; brafteis longe ciliatis; floribus rubris.
 38. GALL M *pujilhiw*.
 39. G. foliis fenis; floribus a Ibis, paniculatis, fruclu glabro; an G. *verum*.?
 40* G *apnrine*.
 41. CRUCIANELLA *angnftifolia*; copiofe ad radices montium.
 42. RUBIA *tinctor*; foliis faepe quaternif.
 43. PLANTAGO *hmceolata*.
 44. P. *corotwpuf*, foliorum dentibus longis.
 45. P_# *pJjUium*; fpicis non aphyllis, "fed foliofis; braftea fub fingulo flore; caule ramofo. In ruderatis, copiofe,
 46. SANGUISORBA *officinnlis*; ftaminibus 2-10. In arvis paffim.
 47. CAMPHOUOSMA *monfpelunfis*.
 48. POTAMOGETON *ytiixmtum*.



P E N T A N D R I A ,

49. LITHOSPERMUM *tinctorium*.
 50. L_# *frutkafutih*
 51. E< HIUM *vulgne**
 52. AN(HUSA fulfil; fauce villofiflma. In ruderatis_#
 53. ANAGALLIS *arvenfis*,
 54. PLLMBAGO *europaa*.
 55. CONVOLVULUS *nrv<>/!>_#* In montofis.


56. CAM-

56. CAMPANULA *ranunculus*; radice esculenta,
57. C. *Jucculum*; pratenfis.
58. C. *minor*; orvenfis; feu Viola pentagonia.
59. VERBASCUM *finuatum*.
60. COKIS *moufpelienf*. fligmate fimplici, non 5-fido. (cfr. Syft. N.)
61. SOLANUM *nigrum*.
62. LYC1UM *europ*. filamentis non pilofis. Ad littora.
- 63 RHAMNUS *palturits*.
64. VITIS *vinif*. & *labrufca* floribus *bexandris'*, adeoque ad ilkm claffem referenda.
In Vinetis culta.
65. THESIUM *linophyll*. In montibusj
66. ASCLEPIAS *vincetoxicum*.
67. SALSOLA *foda*.
68. ULMUS *campestris*; foliis non Temper duplicate-Ferraris. Vidi in foliis *Gallas* fragi formeSj frequenter.
69. GENTIANA *perfoliata*.
70. ERYNGIUM *cawpeftra*; foliis glabris. In collibus.
71. BUPLEURUM *rigidum*.
72. B. *rotundifolium* involucro fepe monophyllo.
73. CAUCALIS *leptopylla*; feminibus non verticillatira hifpidis.
74. PEUCEDANUM *officinale*.
75. CHRITHMUM *mantin*. Gull. Brtci/^ vel *Percepierre*. Ad littora copiofe. Folia aceto per oaiduum fubaaa, adhibentur inter aceraria.
76. SESELI *tortii'fum*.
77. TAMARIX *gallica*; ramis fquamatisj fquamis alternis, feffilibus, hnceolatis; ramulis brcvibus, imbiicatisj foliolis lanceolatis, confetti's. In collibus. (*)
78. LINUM *narbon*. potius L. *ftrićtum*; flore luteo.
79. DAUCUS *carota*. In arvis.



H E X A N D R I A .

80. APHYLLANTES *monfpelicnf*. Ad bafin caulis folio gaudet linearri, femipollicari, filiformi, ex apice vaginæ long*, membranacear. Si vero planta fine radice evellitur, fecedunt caules e vaginis foliumque relinquunt, & ilia Aphylli nomen per errorein obtinet.
81. ORNITHOGALUM *narbonmfe*.
82. ASPARAGUS *aaifif.ihus*.
83. HYACINTHUS



54. JUNCUS *effusiu-*
 85. RUMEX *pukber.*
 86* R. *acutus.*
 87. R* *acetocelfo.* Valde grandis cxcrefcit.



O C T A N D R I A .

- g». ERICA *fiofarii* U
 89. E_# *viridi-purpurea.*



D E C A N D R I A .

90. RUTA *grnveohns~*, major} spontanea, gciminis punfHs 20.
 91. R. *fylvyftrii* foiiis fublinearibus.
 92. MELIA *atadin* foiiis magnis pollicaribns»
 93. SAPONARIA *vaccaria.* In arris.
 94» DIANTHUS *arenarius*; fquamis calyculi fenfim elongatis,
 95. CUCUBALUS £etoi. In arvif.
 96. SILENE *conica* caule non dichotomo.
 97. ARENARIA r«Arrt.
 98. COTYLEDON *umbilicus'*, cairie non ramofo.
 <^g. SEDUM *album.*
 100» AGROSTEMMA *gitbago.*



D O D E C A N D R I A ,

101. AS ARUM *bypocift.*
 102. RESEDA /««/*.
 103* R. nfttfi; 3-gyna*
 104* R. *sepimoides.*
 105. EUPHORBIA ypitto/fc
 106. E. *beliofcopia**
 107. E. *ferrraa*; trvenfis, umbella fsepe trifidi.
 108- E. *peplisi* caule vix procumbente.
 109- E. *cbaracias**, frqticofa. In montibus.
 HO. E. *cyparijpas* foiiis pini.
 i n . E. *fegetalif*, foiiis linearibus, integris; umbella termfnali, y - fida; pedunculw axil-jaiibus fubtus plurimis ; involucello cordato - acuto.

I C O S A N D R I A *

- xi2. AMYGDALUS *communis*-
 113. CRAT^AEGUS *oxyac.*
 114. PYRU9 *cyonia*.
 1^A15. ROSA *cnnina*; petiolis glabris. *Variat* > petiolis acutis parvis^A maiginibus calycis
 giandiferis | foliis obfcuris.
 116. RUBUS *fruticofus*.
 J17. R» *acukatus'*, frudo nigra

P O L Y A N D R I

- XI8. CAPPARIS *ffittoJK* In fccis paflinu
 119. CHELIDO^ATIUM *ghucwiu*
 120. CH. *bhyridum*. In collibus.
 121. PAP AVER *hybridum*. In arvis-
 122. P* *dulnuvity* fetis caulis patentibus*
 153. CISTUS *monpelienfis*.
 124. C. *yji/vñ /u/*.
 125. C. *fitmatia'*, fruticofu9; foliis folitariis, linearibus, fparn*9#
 126. C» *tbymifolius*; foliis congeftis vel fafciculatis > linearibus^A non vero oppoGtis> nee
 ovato - linearibus*
 127. NIGELLA *dnmafi*.
 128. CLEMATIS *vitMa*.
 129. CL, *flammula*.

D I D Y N A M I A,

130. TEUCRIUM *poliunr*, vertkillis pedunculatk>
 131. T. *pJeudocbwApit**
 132. SIDER1TI5 *hirfuta*.
 133. THYMUS *acinos*.
 134* TH. *vulgarism*
 135. LAVANDULA yþVlf
 136. STACHYS *germanic***
 137. MENTHA *spicata*.
 138. M. *rotundifolia*.
 139. PHLOMIS *lychnitis*.

140. FHLO-

vin

^ ^ MSKSMfr

140. PHLOMIS *berba* *vcnti*.
141. MARiiUBIUM *vulgar**.
142. M. *fupinum*.
143. M. *perigrīnum*.
144. M. *candidiJJ*. *parcius*.
145. BALLOT A *mgra* ; labio superiore farpe reflexo.
146. ANTIRRHINUM *oronnium*.
- J47. A. *ma jus**
- 148* A. *tripbyllutn*.
149. MELISSA *nepeta*.
150. OROBANCHE MA/or.
151. SCROPHULARIA ca»ifi«.



T E T R A D Y N A M U

152. MYAGRUM *perenne* | monofperm. frequens in arvis.
153. DRABA Vienna | cum ftylo,
154. LEPIDIUM *procumbens*; capula connata, dentata.
155. L. *iheris*; feu graminifol.
156. ALYSSUM? filicula a-loc. a-fperma*
157. BISCUTELLA *didytina*. In collibus.
158. IBERIS *pinnata'y* foliis farpe trifidis.
159. SISYMBRIUM *altiffl* caule non hifrido. Gall. *Roquettes fanvnges'*, edulis.
160. BUNIAS *erucago*.
161. RAPHANUS *raphaniffr*.



M O N A D E L P H I A ,

162. GERANIUM *mott**
163. G. *malacoides*.
164. MALVA *ftIvejlris*. In collibus.



D I A D E L P H I A .

155. POLYGALA *vutg.*

166* SFARTIUM *junceum* | ramis alternis.

1-67. SP. foehs nullis; fpinis trifido - patentibus, confertis ; ftipula mucronata subjefta.
Calyx bivalvis, perfifiens. Siliquia convexa, villo(a_t) monopenna. An *Gcutfa Jufitan?*

168. ONONIS *tninutiJJ.* rario.

169. CX *ttntrix*; floe-luteo.; iifcofa; fine fpinis.

170. LUPINUS *hirfutus.*

171. LATHYRUS *fativ.* GsXL fwV fuuvto; cultus.

172. L, *prate*)fis~*

173. L. *fiheftris'*, luteus.

174. ASTRAGALUS *wonfpejp*

175. LOTUS *dorycnimm.*

276. L. *lArfkta*; ftoe -glomTato.

I77« L. *frtiticul)fr*₀ leguminibus vilbfis, cotnprefis.

J78. CICER *arietin.* Gall. FoV *pouitues.* cultum.

J79. CYTISUS *iiigricans;* villoTut, non tatneu tomeiitofia&

J8c« HIPPOCREPIS *multifiliqua.* cojpiofe ad xoontes.

j 81 •SCOLTPIURUS *fubvillafa.*

182. SC. *Julcatn.*

183. VIGIA *peregr** filiqufs fepe 5«ipainis.

184- ORNITHOPUS *scorpoid.*

185« Or. *zoiHprcJfus**

186. CORONILLA *junceiu* Ad montes frequens.

187* PSORALEA *bituminofi.* Variot flore albo,

188- ROBINIA *pfindo-acacia** Arbor urbana ^{culta}.

189. TRIROLIUM/rag^r*

190. T. *ftellitum.*

J\$u T_A *mtlihtb.* capfulis concentr. circliatis.

193. MEDICAGO *filcatth*

193. M. *palymorpba, orbicuhris** (*) cf« Cent; V. 43.

194. M, *inurtexta;* non eft dicarpos*

195. M. *frti&u wuricatOt ghbofo; foMis *hcora*tis% hafi tntegris ; c&erum ftrrato-dth-ticulatis.*

P O L Y A D E L P H I A .

196. CITRUS *aurant.* Sineiis. in horto privato, Monpel.



S Y N G E N E S I A .

197. TRA60P0G0N *prntetifi*; purpureum.
198. TR. *picroid*. foliis pinnatis, haftatis. In vallibus.
199. TR. *porrifol*. calyce bipollic. feminib. fefquipoll. In arvis rarius.
200. TR. *dahcL* foliis radicalibus & caulinis interioribus lyrato-finuaris; fed caulinis fu-premis ternatis, ovato-lanceolatis, integiis, fubdentatis ; fcminibus hil],idis# Ad littora & in arvis.
201. SCORZONERA *orient*, non caule, fed fcapo fub-unifloro. (•)
202. SC. *humilis* ; foliis non nervofis, nee pappo plumofo.
- 203* SC. *pkr*ide<*| pappo fimplici, vix pilofo, longe minus plumofo.
- 204* HIEKACIUM *perform um*>
205. H. *glutitiofunn*
206. H. *tnu orum*>
207. SONCHUS *alpinus'y* in arvis.
208. S. *nrven/is*.
209. S. *oleraceus* & S. *tenerr*. uterque tomento fub calyce , & pappo non plumofo.
210. LACTUCA *vhofi*.
311. LE0NT0D0N *tnaritim*. o&angulure, calyce 8-g>"0.
- 21 ft. CRFPIS *tečior*. In arvis paffim.
213. HYOSERIS *hedypnais*| calyce calyculato-imbricato; pappo feffik, pilofo; feminibus punčlato - ftriatis. *Variafi* glaber; pilofus; acuJeato-inuricatus; tatnen ejus-dem fptciei.
- 214* H *cretidu*
215. H *rhngadiol*.
216. LAPSANA *zacmtha*; calyce laxe imbricato ; floris fructu cnlyculato, oflagono; pappo fubpilofo, fructu fenugineo, g-angulO) pifl magnitudine; caule fpitham.
217. CICHORIUM *endiviai* in declivibus.
218. CARDUUS *ferraruloides*.
219. CATANANCHE *taruha*.
220. CNICUS *bentdift*.
221. C *acarm?* foliis tomentofis, decurrentibus3 (pinis flavis.
222. CARTHAMUS *lanntus**
223. EUPATORIUM *tannabim*.
224. ARTEMISIA *camp'eftris*.
225. GNAPHALIUM *fordtdurth*
- 226* GN. *ftceibas**
227. SENECIO *jacobttn*.
- 228> S. *paludof*. Ad aquas *Caftefoaud*.
- 229* ANTHEMIS *arvms'p* receptac. paleaceo.

230. BUPHTALMUM *ftinofum* & *maritim** Utrumque ftylo florū hermhp. bifido.
Frequenter in collibus apricis; quos veftiunt perquam pulchre, florēs viciflii
exornantur hofpīte *Melue cichorii*, infedo eligaiitifimo
231. CENTAUREA *collinn?* floribus flavis; calyce ciliato-fpinofo; foiiis bipinnatifidis.
232. C. *a/fern*; fōiiis valde dtntatis.
233. C. *crupina*.
234. C. *pnuiculata*; foiiis caulinis non lanceolatis,fed pinnatis; calycis ciliis longis; flori*
bus flavis.
235. C. *con if era*.
236. C. *calcitrapa*.
237. C. *folifitalis*.

G Y N A N D R I A .

- 238- ARTSTOLOCHIA *rotunda*.
239. SERAPIAS *MUbor*.

M O N O E C I A .

240. THELIGONUM *cynvcrnmhe**
241. POTERIUM *fangviforb** foliolis pollicarib. flnguftis,
242. QUERCUS *robur*; an *cervis?* foiiis fiibtus tomentoiiis.
243. QU. *Hex** a) foiiis fubintegris, acutis.
b) integris obtufis.
c) oculeatis margine undique. Communi nota convenient; foJiis fub-
tus toinentofisi & diflinguuntur a *Q. coccif* cuius folia urrinque
glahra.
244. MORUS *nlba* domeftica, culta.
245. MOMOKDICA *elater*. in collibus pācius.
246. PINUS *jyiveftr*. in montib. parcus.

D I O E C I A .

247. SMTLAX *nfpera*; non frequens.
248. JUNIPERUS *communist* mrior.
249. PISTACIA *terebinth*, foliolis obtufis.
250. SALIX *viminalis**
251. MER-



151 • MERCURIALIS *tomentofi*.

252. OSYRIS *alba?* frutex; foliis oviflo• mucroiiiftis.

253. CORIARIA *myrtifoh*



P O L Y G A M I A .

254. VALANTIA *eruciata*; pedunculis non diphyllis.

255. PARIETARIA *offic*.

356' iEGILOPS ov^i; oriftis calyds femper quaternis# His in oris gramen frequentiffknum.



C R Y P T O G A M I A .

257. BRYUM *pomiforme*,

358. FUCUS *pavonic*.

259 F. *dichotom*. planus, aphyllus.

260. SPONGIA *tuLuhfi'*, intei'dum fine ramis.

261* CONFERVA *inarticnlata*; ramofa, villofa , dichotomo; tamen nen femper.

262* C« *corallitu* Variis Fucis aliisquc Confer vis adhzrens.

263. C. *albida'y* ramofa, inarticnlata, ncrviformis«

364. C. *olbidah* ramofa 3 articukta, confluens. An Coratlin?

• * *

265 CHAMJEROPS *bumil* in horto Monfpelienli botanico.



FLORULA

MELITENSIS.



1. **S**ALICORNIA *europaea*. Ad Sal.
a» SALVIA veriewic,
3. ROSMARINUS. offic.
4. PHALARIS* *canarim*. Ad Sal,
5. POA *filicina*.
6. PANICUM *dacilyloth*
7* P. *glaucum**
8. POLYCARPON rw/ipi. in cukfe,
9* LAGURUS ovamf. Ad SaL
XO* AVENA //ijtt^
XI. HORDEUM *murinttm*.
12. AGROSTIS. In horto.
13. CYNOSURUS *pankeus*.
14* SCABIOSA *atropurp*. hort;
15. CRUCIANELLA *mnrif*.
16. PLANTAGO *fimria*; foliis knceef-
lato- dent&tis. Ad SaL
37* PL. *coronopus**
ig.. GALIUM *aparine*. An Vtlan*tui?*
fiudu tuberculato. Ad SaL
19. SHERARDIA? in cultis. (*).
20. SAMOLUS *valerandi*. Ad SaL &
in ruderatis.
ax. CONVOLVULUS *arvem*.
22. ERYNGIUM *albo-villosum*.
33, CHENOPODIUM *frutkos*. Facie
Sals vctmk* Ad SaL

34. CRITHMUM *mark*. Ad SaL
35. SOLANUM *Ij'copers*. h| horris cult.
a6. HYOSCYAMUS *aureus*. Ad vias.
27. CRESSA *cretica**
a8* DAUCUS caroM,
39. HEDERA Mix.
30. BETA *vulg*. capfula mnlti-anfata.
31. FRANKENIA *pulverul* In ruderat.
32. ALLIUM ad margines agitorum.
33. ARENARIA *pephides*.
34. OXALIS *cornic*. in cultis.
35. RESEDA *alba*, tetragna. In ruder.
36* R* *undata*; Caiycis dcnte fupremo
non miiore. Spontanea in horto
D*Locano*
37. PUNICA *granat** hortens.
38. MESEMBR. *nodifi*. Ad Sal.
39. CHELIDONIUM *glaucum*.
40. CAPPARIS *fphiofa*.
41. PAP AVER *byhr*. In arvis.
42. P. copfulis globoiis > bifpidis»
43. DELPHINIUM f«x»w.
44. THYMUS *ftrpyllum*.
45.. THYMUS zygis.
46. MENTHA nrvev;
47. M. *exigua*. Ad Sal.
48* M# p»/fg.culta> incolis vocata P&/fg.
49. SA-

(6 3)

(*) Siccurn specimen intuens, video *Sbcrardiam* hanc a (jhara&ere generico discre-
pantem; genus tamen determinare jam nequeo. *Caulis* dichoromus, pilofus.
Folia od dkhotomias bina, oppoica , tridentam. *Flares* subbefllles, Iblitarii,
in dichotooi. *Calyx* 5-fidus, ciliatus, magnus, perfiftens. *Corolla* tubulofa,
data, ball angufto - 6liformi»



49. SATU²EIX *fartens.* incolis Sariettt.
 50. ANTIRRHINUM *majus.*
 51. A. *urotium;* floribus ecalcaratis; foliis oppofiris.
 52. LEPIDIUM *fattv.* in liortis.
 53. ALYSSUM *alyffoil* ftaminib_# non dentatis Ad vias.
 54. MALVA *fylveflr.*
 55..ALCEA *rofea;* hortens.
 56. TRIFOLIUM *ftellatum.*
 57. HEDYSARUM *onohr.*
 58. TRAGOPOGON *fkroid.* foliis Ian- ceolato - haftnris , dentaris.
 59. SCORZONERA *pcroid.*
 60. SONCUS *olerac.* Ad Sal.
 61. HYOSERIS *cretka.* Ad SaL
 62. HYPOCHOERIS *urens.* Ad \ias_#
 63. CICHORIUM *fpinof.* Ad. SaL
 Ufus ad purganda & tevigauda
 navigia & fcaphas.
 64. CARDUUS *lanctolat.* Ad Sal.
 <5j. C. *fyrtacus;* foliis feffilibus amplexic.
 66. C, *cyanrides;* an *Cyuara?* Incolis artickots fauvnges[^] capitulo grandi
 csruleo; carterum fimilis *Cnico den- tao.* Cent. VIIIL 83.
 67. SENECIO *vulg.* Ad via_#.
 68. St *jacobaa.* Ad Sal.
69. S. *incan.* ad muros & in rupibus.
 70. CHRYSANTHEMUM *yegewiii;* ubique frequens.
 71. ACHILL[^]IA o^or/iM. Ad Sal.
 72. BUPHTALMUM *ypi;;o/-*
 73. B. *meliteuje.*
 74. CENTAUREA g*</i;ic?*
 75_# C, *calcitr**
 76. C. *mtlitenc.*
 77. C. />/?/. Ad vias.
 78* C. *mofcara.* culra: fafciculatim (bou- quettes) venditur.
 79. PICRIS *tcbxmiUu* Ad SaL
 80. OTHONNA *cineraria.*
 81. ARUM *coUcofiu*
 82. URTICA *pilulifera.*
 83. ZANNICHELLIA flor. umbellatis.
 Ad SaL
 84. CERATONIA/fywri: foliis abrupte pinnatis.
 85. VALANTIA fruftu globofo, kcu- nofo.
 86. ADIANTHUM *Mpilh ven.* frequens ad aquxdu^ct.
 87. OBSCURA; articulata; equifcti - for- mis ; foliis fafciculato - vrticillatis.
 Sicca fragilidima, intenfe viridis. Ad Salii\as in fonte aqux dulcis.



F L O R A
CONSTANTINOPOLITANA,
L I T T O R I S
A D
DARDANELLOS
E T
I N S U L A R U M
T E N E D O S ,
I M R O S ,
R H O D I .

FLORAE CONSTANTINOPOLITANIE

IDEA.



Itineris noftri Orientalis fcopus erat iEgyptus 6c Arabia Felix ; iltuc tcndebant defideria noftra; Flora ergo *Regionis Gonflantp.* & *Infulerum Tenedos*, *hires* & *Rodi* iinperfeciffima eft, fubitanea & curforia ramu collefta, e fpicilcgifs tnenfis Augufli, plurimis jam plantis emortuis vel defloratis. Eam vero minime fterilem eft, vel hicce fafcicuhis probat, Hoitenfium copia hie, ut in toto Oriente exigua eft; nee arifit mihi excufatio, qua culpain transferebant incols in frigora liyemalia, tarn fortker fspe dominantia, ut plant arum mitionis ibli culture obfent:

Priiidpio, extra Urlxem obveniunt AGRI; rémotius Inde COTXES deferti , ' *Cifto* (ladan.) veftiti , *Erica* (umbell.) *Carlma* (corymb.) ike Ad vias paflim pltntata *Piftacia* (tereb.) Deim SYLV-E magis magisque exfurgunt, *Fago* (caftan. *xecfdvect*) *Ariuto* (uned.) *Acere* (cainpeftr.), *Mefpilo* (pyrac.) *Hyperi-turn* (*Tc.) inira copia laxuriot inter arbores*, •& *Smilax* (afp-) illas fcandens, ioca hsec reddit perplexa ultra quam dici poteft.

BELGRAD pagus urbi Acinus jaxta AQU^DUCTUM antique artis & induftrix monumen-tum illfflum; obumbratum fylvula *Carpin* pergratiffima. Adherent CaTali plantar hunridi fundi; *Andropogon* (ifch.), *Rtta* (muř.), *Phyfalis* (alkek.)

BUIUCHTARI, ORTACUJ, BALTALIMAN proximi futit pagi vel fuburbia. THE-RAFL?£ littora fcatent Schiflc cineieo, atque nigro^ venis alb».

TMRDE , ERACLTSSA , M^ERAFTE Craccorum run ab Europaa pa-te Maris Mar-more, folo infiftunt arenofo agris occupato^

SORGHAS Fons Natolix 20 mill, a Dardanellis veifus uvbetn. Circumjecla regio or-natur agris *Cucumeris* (citrull.) & agellis *Sefami* (orient.) bene cultis & fbllcite purgatis» Longius diftant moncofa Ioca. fruticibus raris vcflita: *Rbamno* (pařiur.) *Quercu*. *cerv.*i *Ptjtacia* (tereb.) *Pyro* (fpin.)

DARDANELLI terra ambiuntur littorea , arenaceo - petrofe , rudeiatis mixra, Uno in loco *Terra Cretacea* & *Argilla foreckua** *St/mum*, *GoJJffium* & *ZQA* tnajs in cultis liabitant.

TENEDOS

TENEDOS tota referebat colles fteriles, agn's exceptis, hoc tempore demeflis. *Montes Infulae Saxo* conftant duriflimo, rubicundo, particulis fubtilibus. *AHui Snxum* magis rafile 6c mixtum, non fcintillat cbalybe percufflum; cum Aqua forri parum effervefcit. Montes confituit procul coerulefces inter priorēS qui rubii coiipiciuntur.

NATOLIA E REGIOKE TENEDOS *littus offert* arenofum, in quo *Salfila fk'ali*, *ScJfitis* (ffg.) hete rigent. *Superior* area *Santolinam* nutrit, *Sertntulm* (centaur.) & *Euphorbiaw* (polygonif,) Ulterius progrediendo plants occurrunt *Gvxclx* vulgares.

IMROS incolas nlit pauperrimos, ipfa tenuioris fundi 6c folo aquap dulcis Fonte Inudanda. Areolse paucse terra: melioris aj.ros plantasqne geftant. Conftat regio PETRA. CAICAREA, qua? mira latitudine fubfternitur Infulis Archipelagi 6c Maris Mediterranei fere omnibus*

SMIRNAM 6c RHODUM in tranfitu, paucis horulis viiiitavimus.

NOTARUM EXPUCATIO,

- 3If. Tenedos.
- Jmr. Imros.
- Brg. Borgfiās fons.
- Eel Eracliffe: pagus.
- Dd. Dardanelli.
- Cph. Conftp. hortenfes,
- B%. Belgrad, pagus,
- Bj. Bujuchtari j pagus,
- Sm. Smirna.
- Rk. Rhodus.

(*) Denotat *Species* aut novas, aut illuftratas, & in Century VXU, dafcriptas.

Cryptegam* in Cent. VII exfr\$nt#

(**) Defignat novum. *Genus* in Cent, VIII, 35, (kfcriptum.

M O N A N D R I A .

1. **S**ALICORNIA *europaea*. Dd. Tc *XgiSpov.* *fruticosa*. cfr. Cent. I. r.
Sm. *Aceto fuba&a edulis.*

DIANDRIA.

- a. (#) OLEA europaea. - - Archipel. ubique. *Ehiss, fylveftris.
 3 SYKINGA vulgaris. - - Cph.
 4. JASMINUM a) frutkans. - - Cph.
 5, - - • fr) officin* - - Cph. variat: flore albo, rubro, fla

Multum colitur ob *flores* & ex iis paratum unguentura (*Pomade*); verum & propter ipsum *Caulem*, qui arte fulcitur, ut rectus excrefacit; dumque longus evafit, plurimo venditur pretio, & fiftu-
III tabacarisc vices minifrat; quae, his in terris, quo longiores habentur, tanto magis sedimentur3 accedit, quod lignum, quo abundantius oleo tabaci saturatur, eo lentius (it &. flexilius.

- | | | | | |
|---------|------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| f. | VERONICA | a) <i>anaga</i> <i>Uit.</i> | - | Sm. |
| 7* | - | - | V) <i>latifolia</i> . | - Sm. |
| 8- | VERBENA | <i>officinal</i> . | - | Sm. Brg. Caules plures ex una radicc. |
| 9. | LYCOPUS | <i>europxus</i> . | - | Sm. Eel. Hortis infecta herba. |
| 10. | ROSMARINUS | <i>uffic</i> . | - | Cph. Δευδο? JI3ccvo. |
| 11. | SALVIA | a) <i>verbenas</i> | - | Imr. Brg. ^a [Aygto@et<rt?uyJ. |
| 12. | - | b) <i>viriciis</i> . | - | Eel. Calycibus totis reflexis. |
| *3. (•) | 0 | b)fida. | - | Bg. |
| 14. | - | d) <i>officin</i> . | - | % Φασιομίλα. |
| | | | | Foliis incanis, ternatis, extremo maxiino. |
| | | | | Decorum laudatur ut Stomachicum excellent. |
| | | | | Copiofe crefcere ajunt prope urbem in <i>Ifola de Prime</i> * |
| 15. | CIRGfLEA | <i>htetian</i> . | - | Bg. In arvis. |

TRIANDRIA.

- | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|--|
| <i>jō» IRIS german.</i> | * | Rh. | In ruderatis copiofe. |
| 17. CYPERUS <i>a) efiuent.</i> | - | Bg. | <i>Klmgos.</i> todix magna", edulis, ft̄pore avomat. |
| 23* (*) <i>V) Minimus*</i> | • | Dd. | |
| 19. SCI ȐPUS <i>romanus.</i> | • | Dd. Brg. | <i>KbQ0 fySfa.</i> copiofe. |
| 20. PANICUM <i>a) fangu.</i> | - | Bg. | Sm. |
| si. - <i>t) cms galli.</i> | - | Bg | Sin. <i>Kex&</i> |

a* PANI-

22.	PANICUM	0 <i>ghucum</i>	-	Imr. Sin.
23*	-	d) <i>cms corvi</i>	-	Sm. radii 3-gona.
24*	•	0 <i>daftylon.</i>	-	Td. parce. AyfJa yd Αγράδος.
35»	•	/) <i>repens.</i>	-	Bg. Λυλώσσο.
				Deco&um ptifana ex radice, frequens in ufu epud Turctfi.
26.		g) <i>tnuricatum.</i>	-	Eel. totum hispidum,
27.	PHALARIS	a) <i>crinla.</i>	-	Sm.
2g»	-	b) <i>utrkulata.</i>		Brg.
29.	-	e) <i>cannrievfis*</i>		Inir. Big. Ανεμόχορτο.
30.	(#)	* d) <i>muricata.</i>		Dd.
31.	•	• e) <i>phleoid.</i>		Imr.
32.	-	- /) <i>hulbofa.</i>		Bj.
33.	DACTYLIS	<i>glomerata.</i>		Imr.
34.	LAGUKUS	<i>oviirwi.</i>	-	Dd,
35.	MELICA	c <i>Wtata*</i>	-	Imr»
36.	BROMUS	A) <i>rubenr.</i>	-	Imr.
37.	-	- i) <i>tcctorum.</i>		Brg.
38.	-	- 0 <i>divaricatus*</i>		Imr. Brg. varitit: ariftis. reftis.
39.	AVENA	a) <i>fatuas.</i>	-	Imr. Brg. Ay^/o yivv/xx.
40.	-	• b) <i>elata.</i>	-	Bj. Parva, fubfpicata; cauk & foliis villofis.
41.	ARUNDO	/1) <i>donax</i>	-	Dd. }Q(f)o καλαμό.
42.	-	- b) <i>vitloffifima.</i>		Dd.
43.	-	- c) <i>epigejos,</i>		Ed.
44.	LOLIUM	<i>ferenue*</i>	-	Imr. Sm,
45.	SECALE	cm/'f.	-	Bj.
46.	ELYMUS	a) <i>maritim,</i>		Dd.
47.	-	* b) <i>arenar*</i>	-	Eel. rarior.
48.	HORDEUM	a) <i>juhatum.</i>		Eel.
49.	-	- i) <i>bexaflicbf</i>		Imr. K^ Θέριο.
50.	-	- c) <i>nmrinum.</i>		Imr. Dd. Sm.
51.	•	«<i) <i>peruerfnm,</i>		Brg. Κοφόχορτο.
				Flore medio mafculo, ariftato
52.	•	• e) <i>imrinutn.</i>	-	Imr. In collibus, parcius.
				Flofculo medio hermaplu*. ariftato; lateralibus mafculis muticis; ariftii longis; culmo pedali. Fades //. <i>murini'</i> , forte ttmen nova species.
53.	TRITICUM	a) <i>repens.</i>	-	Brg.
54.	-	• J>) <i>fithum.</i>	-	Imr. Σίλαρι.



55. TRITICHM *c) juncenm.* - Dd. Sm. Big. foliis involutis.
 56. CYNOSURUS *tcbin.* . Bg.
 57. MOLLUGO *polycarp.* - Cp. in plateis.
-


T E T R A N D R I A .

58. SCABIOSA *<1) trven/ts.* - - Brg. Dd.
 Corolla 4-fida, radiance, rubra; caule diftufo; ramis magnis, patentibus.
 59. (#) - £) */>rar».* - Bj. Eel.
 60. - - 0 *tranfyhan** - Eel. In collibus parce.
 Corolhr 4-fids; involuceila ovato-fetifera.
 61. • - <0 *mnritimn.* - Dd. *TaXXδclffix.*
 a) *Fiore albo;* caule & foliis glabris; pedunculis folis apice pilofis.
 /3) *Flore violaceo;* caule & foliis pilofis. Dum (iccantur, flores al-
 befcunt.
 62. VLANTAGO *a) pjyllium.* - Big. In agris parcus.
 63. - * - *h) lanceolata** Bj Sm#
 64. - - c) *coronopus** - Imr.
 65. - - <0 w > ^ - Brg. *Ilevloivevfov.*
 66. - - e) *aquaticii»* - Sm.
 67. SANGUISORBA 07V. - Bg. Tota hirfuta.
 68. RUBIA *ijiitfor.* - Bg. In fylvis.
 Stamina 5, 11011 4. Piftill. 2.
 69. GALIUM *a) album,* - Sm.
 Fručlu hifrido; foliis 6-nis, 7-nis, vix 8-nis#
 70. - - l) *tinclor.* - Dd.
 71. (*) - 0 *pnftbale.* - Cp. *Picāgi.*
 72. ASPERULA *<tf>ii/tfj.* - Dd.
 73. CORNUS *a) »i/p.* - Cph.
 74. - - £) *fuecicn,* ^ - Cph.
 75 ELIAGNUS *nngufüfol.* % - Td. EcU IU Turc.
 Folia fubtus quafi argentata. Fruttus drupa, eolore flavo, magnitudine
 olivae, edulis. Flores non vidi; fortiffimi effe odoris, ajunt. Arbor
 liortenfis.
-

P E N T A N D R I A .

76. MIRABILIS *jalapa.* - Cph. Variat flore varior, color.
 77. PLUMBAGO.*europaea.* - Dd Rh
 78. ECHIUM *.1) italic.* - Bj. I lore fubzquali; tota planta villofa, afpera,

- 79 ECHIUM *) *ereticnm.* * Dd. Brg. Td.
Caule procumbente; ftaminibus longioribni labio corolte breviore.
80. - - c) *cauk erecto.* - Dd. Imr. VO\$Q%OSTO.
Floribus fpicatis, albis, sub-regularibus,, calyce duplo longioribus.
81. CEniNTHE *minor.* - Dd. Bg. FruSu Ibliterio.
82. BORAGO *offic.* .. - Cph. Jtigift*.
83. ANCHUSA *bughjj.* - Big. HifpidiTima; flore flavo.
84. HELIOTROPIUM *europ.* - Dd.Ecl..Rh.
85. CORTUSA? - - - Sm.
Monopet. infera; capfula 1 * locul. Folia lanceolnta , subdentata.
86. ANAGALLIS *arvens.* - Brg. Variat colon rubro> cxruleo.
87. CY'LAMEN ". - Dd.
- ^8- CONVOLVULUS a) *Uncut us.* Dd.
- 89- - - h) *Jepiu»h* Sm.
- SO. (#) - - c) *feticeus.* Eel.
91. - - d) *arvetifts.* Imr. Big. Dd. Yl\$f»7r|o%o&ct* Turc. Sarmasjít.
Sminia caule proflrato.
92. DATURA *firnm.* - - Bj. Flore fcrrugineo.
93. HYOSGYAMUS a) *aureus.* Td. Me A o%o^o.
Foliis petiolatis, (inuatis, villofis, triangularibus; floribus subAs-
(ilbus*)
94. - - h) *albus.* - Td. Rh. Sm. Caule knuglnofo.
95. VERBASCUM a) *pblovtoti.* - Td. Dd. Brg. Φλέμο.
96. * - b) *finuatum** - Dd.
97. - - c) *tbn(fus.* - Eel.
98. - - d) *blattatia.* Bj.
59. NERIUM o/t/iuir. - - Imr. Ad rivulos. Πικρά
Νευρό Αφύλλαθο.
- Vartat flore albo & rubro. Cph ibi vocatnr Αροδάφνη.
- 100 LY'IMACHIA *uumuUr.* - Bg Ad aquas.
101. CAPMCUM *tittuum.* - Eel. Cph. Umtyes. Fructus crudus edulii.
102. SOLANUM d) *melong.* - Cph. MM/cravfl6. Turc. Patlifana.
Copiofe cultum.
103. - - b) *duhamnr.* - Cph. ?m.
Flaribus aprukis; foliis fupiemis non hnftatis, fed omnibus cordatis; ad basm (liiguls lacinis corollae, font macula? 2 albs.
104. - - 0 *nigrum.* - Imr. Brg. SwAw^iA o.
105. THYSALIS a) *alksktugi.* - Bg. Ad aquadućtum,



106. PHYSALIS *I) curnjav:* - Rh.
 107. - - *c) fomnifir.* • Ibid. Copiofe.
 108. CAMPANULA *perficari* folio. B}.*
 xop. LONICERA *caprifol.* . * Bg. Cph. *Aγιόκληνος.*
 n o. RHAMNUS *a) pnliur.* • Imr. Dd. £aÅA), In apricis.
 XII. - * *ti) fpinofus.* - Cph.
 X12. VITIS *vinifera.* - - Bg. *Ygevgleha.*
 Spontanea, farmentofa, fummas arbore? scandens, mire eas implieando.
 Erūctus ovato -globofus*
 XI3. RIBRS *) *ruhra.* - - Cpb.
 114. • *b) grojful.* Cph.
 XI5. HEDERA /r) *helix.* « - Imr. Rh. *Jkfjz,*
 Folia recentia fonticulis imponuntur.
 XI6. * * £) *quinqefolia.*
 Floribus masculis non diftin̄ctis; petalis reflexis; feminibus 4. (cfr.
 Linn. Spec. PI.)
 Exoticus frntex; latte tamen increvit tetppore brcvi in pago *Baku**
 limatr, ubi p^rquam pulchre exornac gradu; vestibuli \$di(im ru^u
 ralium Legati Boruflki,
 XI7# LAGOECIA? • - Imr#
 Calyce, foliis & pappo dentatis,
 118. CELOSIA *criftata.* * Cph. JaJcf/.
 119. CYNANCHUM *acutum.* - Imr. Sm. S^sr/p^/. Turc. *Snrmnjtji,*
 X20. APOCYNUM *tndrofi* - Dd. Foliis fctidis.
 isxi GENTIANA *centaur.* - Eel. Stylo 1.
 122. (#) SAT-SOLA *a) kali.* - Dd Pig. Cent.. II. 83. 84.
 Foliis tavibus; caule nervis rubris, elatis; foliorutn ltervo fubtU9 <k
 fupra pellucido.
 123. • • *b) lifpida.* * Eel. Ad littora.
 124. - - *O fodn.* • - Sm.
 J35. CHENOPOPIUM *a) Mum.* Td. *Sirijam* Turc copiofe in ruder^tis, racemis
 albentibus: piftillum non nifi 1. An *Atrijtiex laciniatal*
 126. • . 0 V) *vh'ule.* Dd, Bg,
 127. r * 0 *Jcoparia.* Cph. *Belvedere hortuianiy.*
 128. • ^ /i; amiros. Big.
 129. * « \$) *faliis anguittis.*
 J30 BETA v///(flr_f • Cph.
 131. HERNIARIA *birfusa.* + Dd,

132. GOMPHRJENA *ghbofh.* - Cph. Me'yJeva.
133. ULMUS *campestr.* - • Ed. Bg. *toiu'QQ.*
134. ERYNGIUM /j) *rflwpf/7r.* - Td. Imr. Dd. *AyyaGia.*
- 135* • • b) *fmidum.* - Td. Imr.
Foliis glabris, spinofis, radicalibus pinnatis, pinnis tripartitis.
136. - <• c) *waritimuw.* Brg. Foliis albis, tomentofis.
137. - - d) *ntnctbyft:* Dd.
138. CAUCALIS *kptophyll.* Dd.
- 139* 00 ARTEDIA *muricata.* Td. Dd. Bj. A\$yyavo₉ •
(3) *Variatz abortiens»*
140. DAUCUS «) *carota.* - Dd. Sm, Laciniis calycis non revolutis.
141. - b) *involucro extimo 3-fido.* Sm.
Pedicelli umbelkt extimar maturi & indurati ad deniTcaipia adhibentur; ut & pedicelli *Amml mnj.*
- 14^* " 0 £™£J" a " Bj.
Radix acerrima. Iuvolucrum utrumque pinnatum, fuitum curvatum. Foliorum lacinhr lanceolate, mucronatuf. Folia liifpida ut .& Caulis feminaque. Flores abortientes pauci in disco.
143. TORDYLIUM *antberifc.* - Dd. Imr.
144. AMMI ma jus, - - Td, A<77r^o*<kpaA<tf.
Involucro univerfali ramofo; partiali (implicit foliorum lacinlis linearis multifidis.
145. BUPLEURUM 0) *maritim.* Dd.
246. («) - /;) *flavum.* • Dd. In arvl.
*Caulis dichotomus, pedalis, ereclus. Folia radicalia linearia, adeo ut caulis fere nudus appaveat; folia caulina lanceolato-linearia, fes filia. hvolmcLi univtrfalia 5-phyllo, lanceolato-mucronata, 3*carnata.. Involucra partialia 5-phyllo, umbella duplo longiora,*
147. SIUM *nodijlor.* - - - Sin.
Foliolis ferratis, tribus ultimis conuatis in ununi palmatum ; at viꝝ Involucrum univers.
148. CHRITHMUM *mat him.* . Dd. Bj.
349. BUBON . . Cph. *Pctrofdlnum mactdwu* hortulajnil.
150. SCANDIX *carcfoh* - Bg.
151. CHIE.vOPHYLLUM *Jyh.* • Bj.
152. ANETHUM a) *gruveolens* - Big. spontan,
- 153- - - l> *fienicul.* - Dd.
- 154- VIBURNUM *opul.* * . Bj.



155, SAMBUCUS a) *duhs* - Sm, *Anocpōv.* Cp. *Aβγξια.*

5⁶ - - 4) *rticemofas.* Cph, *KxCpogvAtx.*

Ex fru&u ^a/i & *Acetum* prirparatur.

157- 00 TAMARIX g*/^T̄M. - Dd. Sm, Parcius. cfr. Flor. Eftac. 77.

158. STATICE 0 *tntar?* - Dd. Sm. Florib. diftantibw, at non aitornfe,

'59* - - t) *fpeciofn.* •< - Imr. Dd. Sm.

Caule angulatq, parvo, fere profrato. *Vanat x* «) floribus remotit.

0) confrrtii, cymofis. In terra fertili mire luxuriat cuule fruricofoi
foliis radiialibus maximis.

160. , . . . i) *Folih raduahlus ollongis,* Sm. U^divsvPov. Frequens in medic.

I6r. (mm) ERACU^A . - Eel.

H E X A N D R I A,

162. ALUUM a) *ohmceum.* . Dd, Sm. A_y</9 *Καρομιλόσπορος.*

3 " - 1 A) *w/irir,* , Dd, Foliis tubtilofis

164. - - 0 *cnuh faiiis vnginata.* Bg Umbella capfulifera

165. * . ~ d) *victor,* - . Bj. Cnulis, non fcapus bafi folfat.

166. - . . f) *foiisiis fuhulatu** Bj. Stq.nina fiinplicia; petala obtusa.
An *AIL tenutffl* fed grnndis.

167. POLIANTHES r</^ro/^ . Cpb. Copiofe in areis horc. humiibus,

168. CONVALLARIA *majaU* - Cph, *Μαργατφάρια.*

1S9. ASPHODELUS . - Td t *Ασπαδέλο.*

170* (•) ANTHERICUM *) *npftyllum,* Rh,

J7«' (*) - - - *) *ljl^W^* Ibid,

J72, ULIUM *album.* , , Cph, ItyW vε*τα* yM^.

171* JUNCUS a) *fpinofus,* - - Sm₄ Imr Dd, Copiofe, BfSAd. Cent. III. 38.
Ponicula; infime involucris pungitiibus j funerioies fetiferis,

'74' " → b) *emighmetatus** Bj,

75 - " c) *eff<f,4t%* , . Bg, B2?A#.

^7⁵' . - <t) *pantwh lateralii.* Sm. Tc *Βεξλαν.*

177* RUMEX ↩ ^ro/i. - - Cph, S#K/*Ιρα.*

178- - , «) *obtiififohu!,* . Bg. *Λαίπαθο.*

'79* - - c) <?, *finguimū* - Bg, Foliis bafi non cordatclanceolatis,

180. (*) - <◊ *liQhnnusi* . Bg. . *Aoc^ocvo.*

18 r. ASPARAGUS fl,«,^/, . , i_{mr}, Brg, S^Ufdyyu^

I8a« ALIKMA *t'lautagi.* - ^ Ujr,

183' NARCISSUS i_MfiM_v , . c_Ph; E Cypro JutroduSm, ubi cop?ofe circa
urbein larnek fireftit, OCTAN-



O C T A N D R I A .

184. TROPiEOLUM *minus*. - Cph.
185. EPILOBIUM *tctragonum*. - Bj. foliis 11011 oppofiris, fed alteniis.
186. ERICA *)*Jbop*ri**. • Bg.
Foliis ternis acerofis; caule hirto, farpe 3 uln. longo,
187. (#) - b) *venicillita*. Bj. <*bkv|u*>
188. DAPHNE, - - - - Bg ^'Ayfia Káma.
Foliis feffilibus, ovato-acutis, ternis; gemma fubulato -curva exeunte c centro fummitatis.
- 189* I'OLYGONUM a) *orient*. - Cph. Stam. fepe 8- folia velutina, non hirta.
- I9°« - - li) *mnritim*. - Dd. Eel. ftijulis membranaccis.
- *9'» - - c) *aviculare*. Dd. ftipulis iititeris.
- ²92. (*) - d) *perficaria** Bj. A ^ « 7Tt7r&gioi. cfr. Cent. HI. 52.
-

E N N E A N D R I A .

193. LAURUS n) «O*/M. - Cph. Bj, AocCpvF.
194. - - b) *indica*. - Bg. A^yfto\$cc/pV£. Bacca bifperma.
-

D E C A N D R I A .

- J95. ANAGYRIS *fatida*. - Cph. Sm. Avfyv *Bæve*.
- 196* RUTA /l) /inr/b/M. - Dd. Brg.
197. - - I) *graeohm*. - Bj. Cph. km^lyuvog. Turc &>A ^
Anguftifolia; fpicis geminatis; cnpAilis punflis excavatfe.
198. ARBUTUS *unedo*. - Cph. Kopocfiot. Gall/ Arboufcr.
Iiuflus quideni edulis; tamen folum ad Phafianos pafcendos adhibetur.
199. TRIBULUS /l) *tcrefr*. - Dd. T^/3PA/».
200. - - A) *lannginof*. - Dd. totus pvofttratus.
201. SAPONARIA *) ^V. - Dd, in Jioito fpoi^.
202. - - /;) *ocymoidj* Imr. Calyce 5rangulatQ₁ vix villofc.
203. DIANTHUS a) *prolifer*. - Pd
Squamis calycis ariftatis, tubum fupei-antibus
- 204* «* - h) *coryophll*. - Imr. Cph. flore albo.
205. - - c) *barbatus*. - Cph. Ov<ra£l\$icc.
206. ARENARIA j) r</r». - Sm. maritime
207. - - *) *fuliis catHofis, subuhtis*. Sm.



208. CUCUBALUS *a) belcn.* - Imr.
 209. - - - *ft) foliis cr/iffis** Td. ad rupej.
 210. SLLENE *a) cretica.* - Brg. rarissime.
 21K - - • *ft) buphurum.* - Bg.
 Foliis cordatis, amplexic. racemis terminalib, *erectis*.
 212. (#) - 0 *villoft.* - Bg.
 313. (#) - *0 *involuta.* - Dd. in arra.
 314. (#) CERASTIUM *procumbens.* Dd. Bg.
 515. OXALIS *corniculata.* • Bg. Mo(r%6(p/Aδ.
 216* PHYTOLACCA *amrtiana.* - Cph» fpont» frequent
-

D O D E C A N D R I A .

317. FEGANUM *Zlirwfif* - Td. ad littora. B^o%of7«ga. I7«rfirf# Turc.
 218» PORTULACA *oltraca.* - Eel. TKi\$\$6b. Cruda edulis Sm.
 219. LYTHRUM /fl/fcflr- - Dd. Ed.
 Flores omnes vidi *decandros;* m species diverfaj vd numerus ftammum ht.
 confans.
 220. AGRIMONIA *eupator.* - Bg.
 221* RESEDA 0) *luteola.* - Dd.
 222. - - *ft) M<> trigyna, undntnl* Td. Ay~~grxapGapo~~
 223. EUPHORBIA *a) polygouifol.* Imr. Dd. Sm.
 Caule profiato, dichotoino; florilius axillaribus; foliis tenifor-
 wiibus oblique petiolatis; capulis glabris.
 224. - - - i) *fuffrutcofa.* Rh. Eel.
 Foliis lanceolatis, fparfis, feffilibus, pungentibus, pollic. invo-
 lucellis fenii-orbiculatis, cum acumiiie.
 225. (*) - e) *leogradica** Bg.
 226* - - d) *pinifotia.* Dd.
-

I C O S A N D R I A .

327. MYRTUS - - - Cph. Beprlv*M.*
 328- PUNICA *grmat.* - - - Cph. ?o}t*. Turc. *Nar.*
 329. AMYGDALUS *p<r/V<* . Cpb. fdchuv*.
 Varittatm diftam Amygl Angtitam, fructu gfebeFrimo, fid
 ibidem in boxto Grxi cujusdwn.

230. PRUNUS *txyacattb.* - - Td. Inw. parcius, A%o\$c6.

231. SORBUS *domeft.* - - Cph. Dj.

Fiuftus in urborc maturitatem non affequitur, antequam hiems iiicidit: colligitur ergo & vettibufi bene velatur; ficque fenfim maturefcit.

232* MESPILUS *pyrccantL* - Bg. In fylvis frequens.

Baccis rubiis; calyce ftnfluque vix obtufo.

233. PYRUS «) *cydonh.* - - Cp. Kv&^{yia}_{ie}.

234. (*) - * *fpinofi.* - - Imr. Dd. Αγγειξα.

235* ROSA a) *gallka.* - - Cp. B<K;SA. Turc. Amīm firinl

Flos duplex, albus. *Foliola* lanceolata,acuta. iEdesalcirudineex*q<ai:.

236. - - b) *ephemera.* - - Cph. Turc. *Symbntijul:* id. nomen Grscis.

Poliolis obovatis, obtufis. Semel quovis onno floret: flos explicitus ante meridiem ruber; p. m. pallidus; altero die albus.

237. - - c) *cauina;* foliis acutis. I3g. A'ygtipccvSotCplhia.

238. RUBUS <) *fnticofus.* - - Dd. Imr. Sm. Bcflo. Fruaus vocatur Μέρις.

239. - - ^) r<6<ff iWiff - - Cpli.

240* FRAGARTA *vefca.* - - Bg. Φραγάτα.

241. P0TENT1LLA ffpr<x. - - Sm.

242. GEUM *urbauwiu* - * Bg.

P O L Y A N D R I A .

243. PAPAVER. - - - Imr. llwn&!>hoL

244. CHELIDONIUM *ghucum.* - Td. AoAAI. Turc. *Hawat dt.*

Caulis pilofus, vix hifpidus. An ergo *Cbel comic.**

245. CAPPARIS *fpinofa.* - - Td.. Imr. Rln YtfAOVix(>icc.

246. CISTUS «) *fahiifil.* - - Bg. "Ayf/o (pountofJuKux.

247. - - A) *bdUntb.* - - Dd. Bg.

Foliis superne piiofis; margine ciliatis.

248 ACONITUM *wonogytt.* - - Dd.

i-capfulare; neftario unko; caule foliisque multifidis, viliofisj flore pallide-violaceo.

249- DELPHINIUM a) *ajne.* - - Cph. KBM*I\$VOS.

250. - - - 4) *coufilid.* Dd. Foliis ternis, teretibus, fubcarnofif.

251- (*) - - 0 *grandiflorum-* Dd. "Ayf/o ^ ^ ,

252. AQUILEGIA. - - - Cph, KccvSihi \$7£«. Nomcna Turc. mutuatum_#
(^) 2 253. NI.



253. NIGELLA *arvenjis*. - Imr. Dd. AawefoAcAASy* vel Μελανοχόριαρο.
254. CLEMATIS <i> vfffft. - Eel.
255. - - *i> dioica*. - Cph. Ad fornices vivos (Berceaux) adhibetur.
256. RANUNCULUS *fedtr at us*. Sin.
-

D I D Y N A M I A .

257. MENTHA /*picat**. - Dd. rario. *'Ay %to\$tGσμος.
258. SIDERITIS twofir. - Dd.
- a 59. TEUCRIUM *a) fiord.* - Dd. Σκορδόχορτο.
- *60. - ' b> *Torr...m-* , Imr. Dd ^ Sm. AyotTīyicr&ołocyii vel ασπερο
%of]o. Capitarum, tomentofum.
261. BETONICA *offic.* - BJ.
262. STACHYS *) *tomentofa*. - Td. Mo<r%o Βολο ó%Qo.
263. - - £) *fylvefris*. - Brg. Rario. Flava, foliis farpe oblongis.
264. - - 0 *cretica*. - Dd.
Verticillis multifloris, fl, flavis; calycibns pungsntibus.
265. BALLOTA *nigra*. - - Bg. in ruder, Sm.
266. MARRUBIUM *candid*. - Dd. Calycis denribus duobus longForibus.
267. MOLLUCCELLA *frmicofa*. Td. frequens. Xocepç&ð. In Imr. Αλιφάτχια.
valde tomentofa, cinerea^
268. THYMUS «) «rg/V. • Tdr Z/Aocgt.
269. - - £) ^*Hiatus*. - Eel Foliis ciliatis, lanceolate*-Ifnearibus.
270. OCYBUM /^i/ir- - Cph. Variat multum.
271. ORIGANUM <i> #;w/«j. - Cph. Maŵfaw.
272. - - £) *yulgare?* Imr. Td. Strobilo calyces colligente.
Orig. ttnedkum scriptis antiquor. jam celebratuin.
273. - - 0 *beracleot*. Imr. Cp. in foro Sultan Bajazid.
Spicis brevibus»
274. CLINOPODIUM *incanuiK* Imr.
275. MELISSA I#JV. r • Cph. Bj. Μελισσόχορτο.
276. SATUREJA «) - - Cph. Αθρίμβα.
277. (*) - £) grtfca - Bg. in ruder. Φλασκάνι.
278. ACANTHUS. - - Dd. H/AAfleJfoW. Foliis finuato - pinnatifidis.
279. SCROPHULARIA *fcorod*. Bg.
280. ANTIRRHINUM «) ov/ir»w. Dd.
281. - ' V) *Jpuriuw-* Big. Vifcofunv

a82. (#) ANTIRRHINUM c) ywp;««jii. Bj.

28J. (*) VITEX «gM cljftt/, Ubique copiofe. *Λυγαφα.*

284- SESAMUM or««r. - Td. *Surci/At.* In obris enla.

T E T R A D Y N A M I A .

285. MYAGRUM mono/if. - Bg, "Ayριστιβλυνέρ.

286. IBERIS. - - - Imr.

287. LEPIDIUM grnminifof. - Dd.

288- ERYSIMUM offic. - - Dd. Imr, *Λυριπάπερχο.*

289. CHEIRANTHUS «) mnrit. Dd. foliis omnibus (inuatis.

290. - - - V) gliLrifolius. Cph. B/cA«' cW^ge/Jiw.

291. HESPERIS. - - Sm. Siliquis retro hiipidis,

292. BRASSICA caulifol. - Cph. Koqvx&flt.

293. (#) ISATIS p'm-inta. Foliis carnofis, pinnatiffdis, denratfs, rank profrata,
Isvi. Siliqua inonofperma, delabente. cfr« Cent. IV, 73.

294. SINAPIS arvens. - - Ej, Siliquis Isrvibus

295. SISYMBRIUM folycerat* Td» Parce. *Λυριπέρχα.*

Siliquis obtufe tetragonif#

M O M A D E L P H I A .

296- MELOCHIA iepreffh. - Brg#

Corolla flava, 5-petak; flore folitr.rfo, terminali.

297. GERANIUM cicon. . Eel.

298- GOSsYPIUM hertaceum. - Td. Bcfc/Sósx/. Cultum. CopfuKs 3-Ioc.

299- MALVA toumef. - - Td. Dd# . M(?)AAc%a. Tnrc. *Mhedjumez.*

300. ALCEA roffff. - - Imr. Dd. Calyce exter. fope 8-fao.

301. ALTHEA cannab. - Brg.

302. HIBICUS *) fyriui. - Cph- Hortnl. *Mnlva arbor en,*
Colitur arbor tota reflare florens, floribus splendidissimis.

Variat: a) *Corolla violacea*, bafi rubra.

(3) *Corolla alfja*; bafi rubra. Calyx exterior 6 - 8 fidus.

303* - - *) lamia. - Sm. Copiofe cultus & expetitus a Turcis. 'e-t»
ditur fiuftus g p^ra 1 OK h. e 400 tdiachm. vel 2 ff Danki
ponderis.



D I A D E L P H I A .


304. SPARTIUM *junceum*. - Dd. Rh.
Foliis rarissimis, filiformibus in ramulis ultimis.
305. ONONIS *ahemifolia*. - Dd. In orvis frequens.
Cnule 6c ramis spinosus; foliis alternis, fitnpllicibus.
306. PHASEOLUS *carac.* - Bg. Σαλαχίγγυα, i. e. *Cochlea?* propter formam fioris.
307. LATHYRUS *pratens*. * Bj.
308. TRIFOLIUM *a) pratense*. Bg. Τριφύλιον.
309. - - &) *miens*. - Big.
310. - - c) *stellatum*. Imr.
311. - - d) *melilot*. Sm. flore albo vel creruleo*
- g12. HEDYSARUM *virgin.* - Bg. Dd.
313. MEDICAGO *a) falcata*. - Brg.
314. • - 6) *mar him*. - Big. Dd.
215. ROBINIA *pseudac.* - Cph. Bjafarkum Turc.
316. CICER *trict.* - Brg. Pc/3\$».
317. CYTISUS *laburn.* - Cph. Sm.
318. (•) LOTUS *a) btlgradica*. Td.
319. - - K) *corniculat.* Imr. Eel. Sm. Legumine feta terminata.
-

P O L Y A D E L P H I A .

320. HYPERICUM 4) /?/• - Bg. Copiose in fylvis. Foliis diftichis, lancolatifs.
321. - - i> olymp. - Td. Dd. TzSSfcc vel Ay8\$\$\$u vel Αγεθαδέρα.
322. - - c) *foliis linear thus*, marginc revolutis. Dd.
-

S Y N G E N E S I A .

323. SCOLYMUS *lifpanic.* - Big. KetpuAccyyv. So.
Similis *Catau. luted;* fed feminib. non pappoii.
324. CICHORIUM ^) *intyb.* - Td. Dd. Ko&ot. Florib. feffilihus.
325. - - I) *tndivia.* - Td. Big. Bj. "foifxij. Turc. Hiddiba.
Tolia Lacluca loco eduntur. Decoclum foliorum radijal. febrifugum eft.
326. CATANANCHE *lutea?* - Td. Imr. Dd. Rh. Ubique frequens. ZafA»Afloé vel Kjflpydyyo&So.
Pappus 2-arifflatus: flos fere capitatus: folia denfa, cilinto-ferrflta. An di< verfa a *Scolymo bifp** cui acleo fimilis?

357. SANTOLINA *c) ambigna.* Eel.

Flava; recept. nado; pappo nullo; polygamia squali, discoidea. Hac not! discedit a *Ctrpefio*: recept. non paleaceo abit a *Santol. chritbmi-folia*.

358. CARDUUS *a) acamh.* - - Big.

359* - " *h) ferratuloides.* Ibid, **Aypo £c%0£.*

360. - " *c) lanatus;* spinofus. Big. RarhT. an *Car Una?*

3^1. - - *d) Jyriacus** - Rh.

362* SERRATULA *a) centaur old.* Big.

Floribus rubris; foliis fubtus tom:ntoiis.

363. (*) - * *fpiuofa.* - Td. Dd. *luXx ?v@iØL.* Turc. *Djevnnn.*

364. (#) ECHINOPS *fl) flrigofus.* Td. K ^ «? dfyy»&«.

365. - - *li) vitro.* ~ Dd. Caule multifloro.

366. f#) - r *p) fpUrocepB?* Td,

367. E^r.TATORIUM <flr<w*. - Bj.

368. ARTEMISIA - - - Eel'. Odore abrotani.

369. TANACKTUM *bnlfim** * Cph. KcVa. Co/?w ior/M/ Hortulau.

Foliis tenuiter ft&b. JLefluesr, ad cicam paratae infternuntur hare folia , pro ornatnento.

370. MATRICARIA *chntnom,* - Dd. Af/AFV.

371. CHRYSANTHEMUM JSgewm. Pj.

375. INULA ^{^1)} *hritann.* * - Eel.

373, - - V) *falkina ?* «- Bg. In pratenf. & aquofis.

Caulis teres, vix angulatiis; (quare dubito fit-ne fallc?) erectus. Rnml patentcs, ramofi. Fo;/fl haftato^lanceoiata, deuticulata amplexic. Tota planta villosa.*

374, SENECD *jacoUa,* *]Brg..

375, TUS.SLAGO *farfara,* . EcJ.

376, ASTUR *finens.* - - Cph.

377, TAGETES *erea-a,* - . Cpb,

378* ANTHSMIS ii) *cot a.* - Brg. Recept. pungentc,

379. - - t) *valenu* - Eel. }Acfl#/lvco.

380. - - c) *flwmom.* - Sm. Xx/JtofJLlhoc. Recept. paleaceo.

381. - - d) *maritime* - Bfg. In arena marit. IS^JJL^IKKVVC. vei διλ-
Α^VoCp Foliis aon gapofis, punclatis^ fed tomentofis,

3? 2. BUPHTALMUM *ti) filmf,* Jmr.

385- ' • /) *moritory.* Tdf lrar, Dd. XØ7o καθφε.

384. ACHftUEA ii) o^ora. - Rh.

jgj. - - A) *tomentofa.* Eel. Itedio ppn distin^o,

- 38*. HELIANTHUS *a) carduus.* Imr.
 3^7. - - - **) annuus.* Cph. **Hλιος.**
 388. CENTAUREA *o) calcitrap.* Brg. **Κατερίνης.**
 Pinnata, flore rubro; spinis bafi palmatis.
 389. - - *b) centaur hid.* Big. *T,ai|diyya&o.*
 Foliis pinnatis; capite imagno, flavo.
 390» - - *c) coiltna.* - Dd. Flava, spinosa, foliis pinnatifidis.
 391. - - *d) tomentofih* Td. Imr. Dd. **A]goyif«**
 Flore tomentoso; caule alatp. An *Svljlitialis*? Edulis tenera, Sm.
 392. ARTEMISIA *abfimbium.* - Cph. **A\J// ζ if.**
 393 CALENDULA *offic.* - Cph. **Xcc/Jkcdvō^flu^**
 394. JASIONE *montana.* - Dd. Eel.
 Foliis lanceolatis, fuperne liipidis, non subfebratis; (Hort. Cliff.) pedunculis
 giabris, longis; caule inforne hilpi'io.
 395. VIOLA *odora.* - Cph. **Meñtſe.**
 396. IMPATIENS *halfam.* - Cph. **KVCOJ\$\$SK.** nomen Turc.

G Y N A N D R I A .

- 397 PAS-IFLORA foliis palmatis. Cph.
 398. ARISTOLOCHIA. - Imr.

M O N O E C I A .

399. ZEA *majs.* - • Dd. **Kcchupctvixgo.**
 400. TYPHA *augyfltfol.* - • Sm. Ed. **To?xeff.** Pabulum equorum.
 Spicis fcmineis 2 distinclus
 401. URTICA *a) filulif.* - Td. Dd. **jQfou!&o\$.**
 402. a. - - *b) dioua.* • Sm. Imr. **Tffcxj/j<>.**
 403. MORUS *•) nigra.y* Cph< ob f.u.fhim cults; Bombycum enhn hie
 404. - - **) alba.* I nulla eft cura
 Ambar arbores foliis cordanV, fed "Si^ra minoribus & flavefcentibus f
 Alba majoribus, & oblure- vh-idibus. Stolones Hioculnntur, un-
 de frnclus mitior: fed Mori nigne acidior evadit. Albse flores
 frequenrant apes gregatim.
 405. - - *c) filveftris.* Fru&u parum fuccofo; fed feminibus diciore ; contra:
 M. cult a frudu gaudet fucculentiore, verum feminibus gaupeiiore*
 406. BUXUS *minor.* - - Cph.
 407. BETULA *ahiut.* . Bg. **Zuhfyo.**
 Exct cfcevt'us quasdam vidi in amentis filiformes, veficofas, lanceolatas, COKI-
 preffas, flavidas, vacuas. An Infeſloium artificial

(e)

408. XAN-



408. XANTHIUM *ftrum.* Eel.
409. AMARANTHUS *a) blhum ? Sm. B\fov.* Edulis, coftus,
Foliis acutis; vix retufis.
- 41c.** - *b) hypocbondr.* - Bj.
411. - *c) tricolor.* . - Cph.
- 4x2.** - *d) ruber.* - Bg. BA/7« KÓMVO.
Foliis fubtus rubris; fpicis erectis*
413. QJERCUS *d) aculeata.* - Imr. Spontan.
414. - *b) robin:* - Bg. Turc. *Me fit* vei Afy/)>.
- ^{41j #} . " - *c) Ccrvw.* - Eel. Erg. *Mfocre.*
Foliis fimilibns ^frci rob. fed fubtus toinentofis, Vidi earn
prope Belgrad inquinatam *Gallis* in foliis habitantibus, & gla-
bris (*k* tuberculofis).
- ⁴16. CARPINUS. - - Bg.
- 417.** CORYLUS *avelh* - Bg. Φυλλιά.
418. PLAT ANUS* one//*. - Dd. hortens. Sm.
419. PINUS piww. - - Cph. hortulanis *Cedrus*.
420. CROTON *tinaor.* - Td. Dd. In arvis. Σκλαρόχορτο.
Grscis Natoliac "Αγριο Φασελιά".
- 41K MOMORDICA e/flrer. - Brg, Rh. Πικ^ αγγύθω.
Miro, nee adhuc inveftigato' mechanifmo propelluntor Semina jaftu eo lon-
giori, quo maturiora: 6c fortius per vulnus in commiffura caulis & fru-
clus, quam in latere hujus.
422. CUCUMIS *a) fativ.* - Cph. Gall. *Concombre.* Fruftu longo.
Edulis: varia arte prapparatur.
- [^]23. - - *) «g»^l«* ". Cph. KohonvSicc. Turc. *To bunch cbappneb**
Floribus albis, magnis ; fructu adhuc juvēne villofo - lanatoj
adulto, glabro.
- 424.** CUCURBITA *a) hgenaria.* - Cph. Turc. *TAtH-cbappacL*
- 425.** - - *b) citrullus.* - Cph. Turc. *Carp&s. XI/AOVMO.*
- 42J.** - - *c) pepo.* - Cph. Turc. *Pnl-chappacb.* i. e. *Pepo tnelleur.*
Ignotus in Europa fruflus ; non edulis , nifi diu fepofitus in
cavea, feque ipfum maturant.
- Caulis hifpidus; poma teretin, lsvia, bafi attenuate.
- 427.** - - :: *d) pepol* - Cph. Turc. *Sofos-cbappac!*: fie difta aSAKis, loco
Archipel. unde primum intioduftus in hortos Conflantp.
Caulis aculeatus; poma 8-angula.

D I O E C I A.

428. SALIX *a) balyIon.* - - Q?h. R^{amis}. p<ndentibui.
 429. - - *b) fraylis.* - - Cph. Ramis eretis.
 430. - - *f) alia.* - - Cph. *Telijytoc.*
 Foliis supra parum villosis, pubes albidis.
 431. - - *d) glatra** - - Dd. Foliis ferrato - kmceolatis, glabria.
 432. OSYRIS *a) alba.* - - Dd.
 433. - - *i) caafia.* - - Imr.
 434. HUMULUS *lupnl.* - - Bj.
 435. (*) PISTACIA *a) terebinth.* Dd, Cph. Sm. 2%/v[^]. (lege *Stjinos.*)
 436. - - *li) hntifius,* - - Cph. *2m8dia.*
 437. SMILAX *afpera.* - - Bg. *Σμιλάγγα.*
 Scandit arbores, fylvascuae reddit intricatilimas. Turiones edules
 primo vere, grato faporc. Ad depurandufa faiiguinem utiles pu-
 tantur; hinc multum in ufo.
 438. MERCURIALIS *annua.* - Ed. Foliis glabris.
 439. JUNIPERUS *oxycedr.* - Linr. "Ayftoffilfoi.
 Foliis ternis, baccis rubiis.
 440. (#) EPHEDRA *fauinea.* Imr.
-

P O L Y G A M I A .

441. HOLCUS *balep.* - - Td. Eel. Bj. Sm. KccA«jU'yf[^]»
 442. 2EGILOPS *ovatus.* - - Dd.
 443. (**) ANDROPOGON *ifcham.* Bg#]
 444. VALANTIA *cruciata.* - Bg, Frequens.
 445. ACER *a) fhitonus.* - - *Ilhcfloivos.*
 446. - - *b) cawpeftris** - Brg.
 447. MIMOSA *arborea.* - - Cph. Turc. *Djul ilrzitn.* t. e. *floret Jirkta*
 Quavis node obdormiunt folia, (cfr. Cent. VI. gp.)
 448. - - *b) fcorpioides.* - Rh. Turc. *Mijferjice.*
 Multum colitur ob flolum fonnam fphamcam, unde falciculi (bouquettes)
 pulcherrimi. Capful* veftiuntur fucco tenaci, tfmaro, brnneo.
 449. PARIETARIA *offic* - - Imr. Rh. Sm. *Avepijfflo.*
 450. ATRIPLEX *glauc.* - - Dd.
 Foliis subfelfilibtis, farinofis, dentatis, deltoideo-triang,
 451. FICUS *carica.* - - Cph. Dd. Sm. Mas caprificus. Fruflu nigre
 vel flavo.
-

C R Y P T O G A M I A .

- 45*. EQUISETUM *arvenfi.* - Big.
- 453- (#) POLYPOD1UM *foifcr.* Bg.
454. ASPLENIUM *fiolop.* - Cp. Ad plateas urbis.
- 455- PTERIS *aquilitia.* • Bg. <*Jflifi_m* 3 ulnar. altit. excrefcit.
- 45*- BRYUM *bjpu.* - Imr.
- 457 HYPNUM *firiceum.* - Imr.
- 458- LICHEN a) *rangif.* - Bg. Rarior.
- 459- - - t) *farietiu* "I - Imr. In faxis.
460. - - 0 *olhnc.* J - Imr.
461. - - d) *fubulatus.* - Bg. Obfcuras; non perforarus.
462. ULVA a) *inrefstinnl.* - Imr.
463. - - If) *compreffh.* Rubra. - Imr.
464. - - c) *flava.* - Cp. In portn,
465. - - d) *viridis.* - Imr.
466. FUCUS a) *pavonicus.* • Vix dichot.
467. - - b) *tioJoJus.* -
468. - - c) *botryoid.* -
469. (*) - d) *uvifer.* -> Cp. In porru.
470. (#) " 0 *divaricatus** -
471. (*) - /) *vlfddus.* -
- 472- (") " g) *wufcofus.* -
473. SPONGIA a) *ramofa.* - Imr.
474. - - b) *vulgaris.* - Brg. ΣΦεγγαρί.
475. CONFERVA a) *viridis.* - Td. Confluens.
476. - - b) *genicuiata.* - Cp. Ramofa, viridis. In porru; & fequ.
477. (•) - 0 *irregularis.* - ibid.
478. - - d) *coralHna.* - ibid. Articulis albis, geniculis craflis, **fuscis.**
- 479" (•) - e) *dicbotoma.* • Mare Mediterr. in Fucis.
480. BOLETUS *mnr%iuialis.* - Bg. In cortice Carpini.
Perennis, ftipite morgini affixo Margo darus, insequalis, inflexus, bruneuf,
Juniores fubtus 6c iupra margine albi. Diameter 4 poll. Dun I fun us.
481. DACTYLUS *trapezuntin.* - Cph. non frequens. Turc *T*eb?J6n chormaR%*
i. e. *Dactyl* tmpez.* quia arbor inde allata.
Arbor magna. F0/1 glabra, oblonga alt.rna, inte ra, mngna Flores non
vidi Calyx magnus, pcdiftens, 4 fidus. Frtirtt* a.jil!aris, i'ubfeffin's, 4o io-
cularis, pomum nueis nugnitudine, flavus, dulcis.

F L O R A

E G Y P T I A C A:

SIVE

C A T A L O G U S.

P L A N T A R U M

S Y S T E M A T I C U S

iEGYPTI INFERIORIS:

ALEXANDRIA, ROSETTE, KAHIRJE, SUES.

NOVA GENERA.

DIAND. I. GYN. PENTAGLOSSUM.

TRIAND. *f* I. GYN. ALTERNANTHERA. HAMBL.
f 2. GYN. TRISETARIA.

TETRAND. i. OYN. { RORIDULA.
PTERANTHUS.

PENTAND. { I. GYN. { ARNE6IA. SASJARET EL ARNEB. سجرة الارنب.
GYMNOCARPOS. SYRR. J* > DJARAD. جرد.
3. GYN_# 'SUEDA. SUJED. MULLffIAH. ملاح

HEXAND. 1. GYN. SILIQUARIA.

OCTAND. 4. GYN. CAIDBEJA. LUSSAQ;. لصاق

DECAND. 2. GYN. ROKEJEKA. ROKJEJBKA. رقيقة

TETRAD. { SILICUL. ZILLA. ZILLJE. «JA
SILIQ. MNEMOSILLA.

SYNGEN. { POL.JEqU. { POLYCEPHALOS. HABAGBAG.
KAHIRIA.
SUPERFL. { CERUANA. KJERUAN.
MICRELIUM.

GYNAND. 4. AND. MOSCHARIA. MISSJEKA.

DIOEC. { I. AND. ^JRVA. SADJARET ENNADTE. سجرة النبات.
^ I. GYN.]
6. AND. LE./EBA. LBBACH EL DJEBBEL.



FLORÆ

F L O R M
I G Y P T I A C I
I D E A
GEOGRAPHICO- PHYSIC A.



T

Jndolcm JEayti Geographico - phyficam faepe descriptam legimns in libris Grarcorum, Arabum & Viatorum recentioris arvi. Quia vero Flora fundum rariffime refpexerunt AuftorcsJ hinc non inepte a&um judicamus, fi quasdam animadverfiones Phythographiam regionis illuftrantes praemirtimus.

JEGYPTI INFERIORIS ea pars fub difquifitionc venit, qua? *a Mart' Mediterraneo Kdhiram, & hide verfus Sue's & Rubrum Mare extenditur.*

I. Nilo utrinque adjacet SOLUM PLANUM , fuperficie magis magisque fubfidente quo propius ad Septentrionem vergir. *Campi Alexandriam ambicentes non prorfus sequo fternuntur difco; ftd Collibus Fallibusque diftinguuntur. Catacombs vocantur Fodina Lapidarice,* quarum materia *Alexandria prisca* sedificata fuit tota. In libero campo nemo iūfpicaretur montem hie laterc, quum vix eminct fupra terram; in laticudinera excurric jugo fubterraneo. Fundus cryptarum cum mari adjacentc ejusdem menfurae lineam fcrvat; hoc autem quid valeat Equilibrium in famofa difceptione ck Aquarium decrementis in Septentrione perfpciont alii,

Quo longius a littore verfus Meridiem progredimur, co altior furgit terra & fluvio suo fupereminet; simul vcro fpatia utrinque contrahic & circa Kāhiram vix 3 vel 4 milliar. planitiem habet. Area tarn an[^]ufta /Egyptus vera vocari meretur: ilia ett Annonae mater & fertilitatis prodigium: ilia tot urbes olim tenuit, tantam hominum mukitudinem aluit & etiamnum fuftentat; quamvis nulla in Globo terraquco fir Rcgio, quae tot vaftationis & fertitii querelas praferre poteft. Inquirere ergo juvat in Terra naturam, quae tot f[^]culorum fluxu inexhauftis fufficit meflibus, Duas & valdc diverias offcrt Species.

A) Prior, TERRA NILOTIC A nobis difta, *cirvillaceo - humofa, Jubfitis, nigro - cinerea, in aqua facile Jolubilis[^] cum aqua jorti haud effervejiens. Sedimentum*



*mutum ilia eft Nil! effufi, qui prioris anni ftratum novo ftrato auget & im-
prxgnat. Ex hac terra cum arena mixta *Lapides lateritios* conficiunt incolae
& *Vixfa fiSiilm^* quse uftulando colorem obtiqent ferrugineum.*

Nilus toto alveo limum hunc g^rit, fluirque turbidus & brunefcens,
pro more fluviorum impigre labentium Qjum longo curfu littora alluit
denfe habitata, omni inquin.uur immunditie. -dEgyptii tamen fluvium bibunt
& fapidum laudant. Europaei ejusdem creduliratis non funt. Aquam teltis
iiftihbus hauftam in frigido & ventis pervio loco fcponunt & depurationem in-
je&is amygdalis quaflatis accelerantj fie pura grataqne evadit. In Canali Alcx-
andriam dedufto Nilus it inamcenus & Jaftei colorisj in Cifternis autern quie-
tus fordes & terrain prcecipitat.

Sedimentum hoc in littoribus proximis ftrata fibi familia deprehendit;
remotius inde in terram difparem & naturae beneficio prarpuratam incidit, cui-
quc ad ferriliiateni exferendam nullo opus eft adjumento alio, quam irrigatio-
nis largittima copia. Fruftra hie quxritur virtus arcana aut alchemica, vel M-
tmn% quod effervescendo inundationem fluvii maturarct. Hac fomnia dudutn
difpirujrunr. Aqua vchiculum eft Limi argillacci in quounque fluvio repe-
riuadi. Simplicem ejus indolem experimenra abunde probant (*).

Antiquissime Hiftorise tcftimgnia suffulra ipfius Nature confenfu, *Mgy*
ptum in principio *Paiudetn* describunr, Evidentius ftatuitur, Nilum ivifle dif-
furLim usque ad Terram clivofam, totamque planitem, de qua fermo jam eft,
inundatam fuisse. Hie *JEgypti* Inferioris genitor folum argillaceo - humofum
annuis fundavit ftratis, & e lacuſtn origine in folidam elevavit terram. Af-
fluxus fedimenti continilus falus eft regionis, dum illam fecundat, auget &
munir; nam fluvius vim in fundum vertens, ne femper altius ilium excavet>
limus vuln^ra & fulcos rcplet. Hinc sufficit Inundatio; licet aquae colum-
jia longe fuperior requiritur hodie, quam feculis furpebat piifcis. Uhiqueple-
nus eft Nilus vadis & brcvibus, in quibus haerent navigia cum taedio, non
dimnoj moilia enim & humofa funt ifta dorfa.

Ex

(•) *Aqua Ni/f' mixta cum Aq. /• now mutatur.*

Spir. falls amm. fUveicit paruin.

Sp. V. fulca non redditur.

mPulvere gall, fusco brunea.

*Solurione faux piimum albefcit, turbida & deinde carrulea evadit; poft princi-
pitntionein clara. Sedimentnm ad fundum & margines vaſculi remanet co-
piofum & crtruleum, l116l110 flrato cinereo*

*Saccharo fat. lhitim mrbida & albo-cincrea; mox prsreipitatio peragit. Poft
24 hor. aqua depurata maiiet, dejecto fedimento albidiore quam ex folut*
lung.*

Ex Africa Superiore Limi maflam advehi univerfam, verofimile noa videtur, quum magna ejus pars in *CataraEtis* diflipatur. Sed eodcm lapfu nova? proturbantur fupperise. In ftatu Inundationis perfeQsc, Nilus extern* fuperficie fere ftagnans, curfum continuat folitum & fubfluviale adfcrt fedimenrum. Otium intrea habet terram aquis faturandi, & ad Caniles rivulosque clandeftinos penetrandi. DELTA utiliflimo bcneficio /Egypto fubvenit, undas retardaudo earumque onera excipiendo, ne in mare dcfluant omnia. Eft quidem ille terra? trافتus ^Egypto longe fertilior, fed remunerationis non invidendae jure, hanc felicitatem obtinuit & poftidet.

B) Alter a Terra Jpecies eft ALEXANDRINA, *ctlbo-cinerea* & *fubtilit* fere ut campi arcnacei procul fpeftantur. Potior ejus pars *materia Calcarea*, cum aqua forti effervefcens, & aquam fluviale folutione turbidam & cinerarafcentem reddens. Indoles tamen *Calcis* hujus naturalis, a faciltiae multurn differt (*).

Terra

- *) a) *Calx ftiictitia* aqua Nili faturata per 11 horas & poftea (iccata, faturat Aqf. Jijj, cum gr. 53. & folutio depurata erat *viendi-caruhicms*.
Calx urrdt Alex, folutionem in Aqf, depuratam dar *flavam**
- b) *Terra Alex*, ficca gr. 60. faturabant Aqf. ^ijj. Huic folutioni iterum affuft tantum Aquae fortis, denuo effervefcet terra. Ad novam faturatiouem opus erat terrac gr. 46. Tei-tia vice offufa Aqf. ^ijj. faturabatur terrat gr. 46. Maxima ergo terra hujus pars *Cake naturali* con flat. In fun do vafculi perquam pauca remanebant *Areas granule*; quam mifcclam fortiorem non effe, miramur, in regione humili & mari vicina.
- c) Terra? Alex. 1. fi{ aqua faturata? & deinde ficcata?, reliquit fere 111. unc. Hoc refiduum aquam non turbidam fecit, & (iccatum vehementer effervefcet cum Aqf.
Aqua hinc remanens, poft | horap quietem, per filtriūm lintenm tranfib&t pura. Ad fundum vafculi mitcebat *Sedimeutum* cinereum; quod ficcum dedic pon. dus 4. unc. effervefcens cum Aqf. Adeoque plus quam £. unc. tous erat fubtilitatis, ut fimul cum aqua percolata ibat.
- d) *Diluta* hujns terra pars *crajpor* faturabat Aqf. Jijj. cum gr. 55. & effervefcientia promte agebatur.
Subtilior pars faturabat Aqf* ^ijj. cum gr. 67. fed lente & bullulas emitendo vifciJns.
- e) *Calcinntit* ii|x terr* (quamvis non perfefte) cum Aqf. non fermebant; fed durante calcinatione ejiciebant cum ftrepitu giānula minuta. *Rudior* ilia deve niebat nigro - cinerea, & Aqf. *Xn*). cum gr. 51. adeo promte faturabat.
Tennis altera, primum nigricans facia elt calcinatione, poftea incana. Saturabat lente Aqf. 3»j. cum gr. 61. Solutio ad depurationem eundo non erat flavefcens, fed opalina, vel potius in virocm incidens.

(f)



Terra Alexandria quantumvis praefantiflīma nihil valet arida & exulta, nīfī aqua saturata mitefcat. Illam ex quadnīplici fonte recipit -fīEgyptus. Plūvia prima eft irrigatio; deindc Nilns effufusj tandem Artis veniunt adjumenta Canalibus, Puteis & Machinis hydrauiicis. His commodis inferiores non fūt Nehulce rorifer&i; quarum denitas fine mentis Januarii tanta circa Kahiram fope videtur, ut ante horam 10 a, m, non dispartant, arboribus plantisqū tanquam pluvia madentibus.

Clima Alexandrinum tres numerat Menes pluviofos Nov. Dec. & Januarium. Hanc tempeftatem frigidiusculam vocat Hiemem. Ante illam epochām & poftea parum intefdum pluit. Ex Caelo & Nilo fatiatur terra, usque ad Aprilem humeQatn. Plants annun jam virent omnes & pemmes refocilhintur. Fluviae iEgypti inferioris ad societatem pertinent Pluvia magnos Nilum fecundant. Incipit ille accrefcere ineunte Solftitio aeftivali menfe Junio, pluviis auflus continuis, hoc tempore cadentibus in Africa fuperiore, ubijftigia montofa excipiunt & fiftunt Nubes e feptentrionali & ultramarino ceelo ^gyptum fupernavigantes. Quo frequcntiores illi tranfeunt, eo grandiore refluxu cum Nilo exfpeftantur. Commune ejus augmentum eft 22 uln. Conjlantinop. (1 ulna facit Danicjc menfurae 1 uln. if dig.) Non invifa eft altitudo uln. 23 > ii vero usque ad 24 afcendit, campum immodice inundat & pagos diruir.

Sponte diluvio huic patent Loca depreffa, & redificia arboresque aquis exftanr. Qūra vero Solum, quo remotius a litorc* co alrius furgit; hinc arris ope deducitur fluvius per Canales, alios apertos, alios fubterraneos. Alexandriam adit Canalis e Rofettenfi regione veniens & ad Portum veterem in mare fe exonerans. Ex hoc trunco alijs exit Duflus in Cifternas fe dividens innumeris, fi verum eft quod perhibent incolae, Alexandriam veterem, vaftiflimam urbem, his infitiffe totam. Tempori & barbariei non omne jus in illis diruendis vel obftruendis conceflum eft, quia falus totius regni in iis Putcisqū fervandis, purgandis & aqua replendis verfatur. Quae cum Nilo communicant facilem MU exhibent aditum; reliqus artificiis onerandse erunt. Aborigines jEgyptii magna nepotum cura totam terrain fecuerunt quaſi Syftema Arteriarum & Venarum, quod Nilus fyftole & diaftole replet & coutinuat. Veftigia xnonfram & conjeQurae non incertac evincunt loca nunc inculta & fterilia > olim Rivulis arte duftis fcatuiflē, unde terra aquam, quam folam defiderat, in promtu hubuit ad fertiles gignendos autumnos; ilia enim noltram immenfe exfuperat agriculturam eo, quod fine quicte & nunquam defatigata vi iegctum vices minifrat & alimentorum proventus incxhausto fundit copise cornu, fi modo aqua? annonā adfir. Quapropter decantata in Hiftoriis habitantium multitudo ad figmenta rejicienda nequaquam erit; quis enim ignorat, agelluni noſtrae quoque telluris, quo impenfius colitur, eo ^lumeroſiorem familiam fuſtentarc?

Meals


Menfe Ofiobri finiente, fenfim *exficcatur* terra; humiliora vero fpatia Cxeunte Novembri. Quam primum areolx emergunt, *aratrum* patiuntur; & 12 vel 15 diebus elapfis finduntur lulcis transverfis. Turn *Cerealia* feruntur, *Triticum* fcilicet & *Hordeum*; nam *Secale* & *Avena* nomine prorfus ignorantur. *Hordeum* cum menie Februario maturatur; *Triticum* ad finem Martii perfiftit. *Sementi mixti*, five Hordei & Tritici, quod *Chalit k*Aa>* vocant, rarifimus eft uhus Si quid hujus generis fit, *Triticum* & *Trijolium Alex*, vel *Hordeum* & *Cicer ariet.* in eodem arvo fimul coluntur. Port Cereris vindemias *Plantce tnonotrophea* & *Oleracece* proveniunt. His fuccedunt *Oucwneres 6c* *Hibiscus bamia* eodem in agro non male fociati; illi quippe rependo locum quaerunr, hie in alcum excrefcit, *Laffiuccz* locum cedunc *Sinctpi harre|* & hocagmine claufo Nilus redit.

Sicut nulla agro conceditur mora, ita locus relinquitur nullus, quern in agrum non verterec induftria, Ipfos Canales, aqua effluxa in agellos & horrulos transformat. Aft jam Nilus fubfedir, & inexfpeſlaro cafu pluvioU aliquando circa Káhiram cadit. Martio & Aprili terra ardori expofita rimas &c ruinas incipit findere, Cerealia tamen fubfiftunt humore fervato, culmo denfo & fcrc fruticofo radices tuenre & obumbrante. *Hordeum* prxfertim fe magnopere diffundit. Junio meniç adeo exaeluat folum, ut plants collcfi: illico evanefcant in manu. Ideoque terra demefla futuras recipere plantationes nequit, nifi aqua bene emolliatur, ut aratro verti poffit.

Sic neccflitas fcientiae & diligentiae opem invocat. Nunc manu & ~~ma-~~ china aqua hauritur, & ne defluat> agri *aggeribus* circumvallantur: variis quoque canaliculis, imprimis in *LaBucetis* circa omncs areolas dividitur. Hoc autcm obrinet in littoribus Nilo & Canalibus proximis, quae ketiffma hortorum agrorumquc femper virenſtate. In traſtu Káhirenfi littus fluvium fuperat 4 vel 6 ulnis, attamen *Zea mnjs* feliciter crefcit, aqua totis infufa undis. Ruricolec Europi triftni hanc vocant agriculturatn > fed iEgyptii opulentas fegetes pretium indefeffi laboris ferunt.

Quam prona ad fertilitatem eft Terra Alexandrina ex eo conftat, quod Beduini rufticantes five fixi, vitam *agricolce nomadis* agere poffunt & agriculturam circumferre migratoriam; inauditam in Europa?o arvo. Quum ènira violentia Magnatum nimis vexantur, locum deferunt, & in prima area agrurn quaerunt & inveniunt. Una vel altera meffe ibi perafta, rura iterum mutant.

Falfa eorum eft opinio, qui aquam plenam fedimento Nili fertilitatem hanc prolongare putant. Extra fluvii alveum jam nulla eft aqua, nifi in putcis, iua vero pura & limi cxpers deprehenditur. Terra fecundandi artificia refputit,



Fimum non folum inutilem, fed prorfus noxiūm damnant terricola\ Foco utilius refervatur. Palecp, Tebn <jj± ex trituratione comminuts, eundem in usum vertuntur; rarius enim miscentur hqrbis pabularibus. Soli Cucumeres llercoratione fimi Columbini juvantur.*

Quoniam terne utriusque virtus non confenuit, hodiernam statuimus fertilitatem a prifca haud degenerantem. Communi lege ad gradum *septimn** rarissime ad 24 ascendit. Triticum decks & Hordcum 15:*/ reddit. Venditatas ergo Cereris divitias re&ius querendas esse putamus in *continue** & variata JEfculentorum ubertate, quam in Segetum enormi multiplicatione. Sciunt & hi Coloni credulitatcm fabulis ruralibus faturarc.

Infima /*Egyptus* fiducior fita, fluvio commode irrigatur: ex alluente mari uberrimos attrahit vapores, qui fervorem caftigant & roris augent imbræ: pluviofo denique tempore haud mediocrem imbibit aquam, quam infequens ardor non diffipar omnem. Minim ergo non est, (i *Delta*, & regio circa *Hofettam Damiatam*<|||z splendide viret, plantasque præxber vegeta facie & quad luxuriofe viventes. *Oryza fativa* fundum palultrem amans, hie potissimum colitur.

2) Ubi plana JEgypti area definit , ibi Altior & montosa inchoar. Kâhira in-Deferti hujus confinio jacet. Inde ferie perpetua usque ad Mare Rubrum miscentur *Colles* & *Valles*. Illi non alti, conflant *Lapide Calcareo*, *Petrefaciis* frequenter habitato. Crufta exterior solvit in terram, ob defectum aquæ inutilem, praeftantia vero Alexadrinse non cedentem, Plantæ paucæ sparsæ in clivis foli obverfis habent, nullis obumbratac arboribus, diurno fervori expofitae, rore folo, misera diaeta viventes.

Valles arsa? & profundac, plantis non multis virent in folo arenaceo, interdum argilla temperato. Prope pagum *Caid Bey* est *Liblab* (*Puteus Miosis*) in fundo vallis, quam cingunt colles in amphiteatri formam abrupre inclinantes. Quin regio ha-c optime culta olim fuerit, nemo dubitabit, & Canales, licet oppletos supereffej nam Orientalis hacc provincia valde frequentata crat tranfitu in Afiam & ad Httora Maris Rubri; & urbium rudera florentem aliquando statum loquunturj fed & eadem haec terra hostiles invafiones experta til primas & graviflimas.

ARHNA mobilis hinc inde a Nilo exponitur vel a Mari Mediterraneo projicitur; & circa *Turrim Canope* ab undis & ventis in *Colium* molem cumulatur. Circa *Pyramides Djijenfes* frequens jacet, & in Dellerio Orientali, remotius a *Caid Bey* in solidam *Montis Cotatei rubri* compagem coaluit, unde *Lapides Molares* exciduntur.

Inter rarifl̄mos Lithogonise proventus *Arena minerce ferri* confpicitur in littore Nili, ubi e naviis descendunt Kāhiram ituri. Alexandria? quoque unico in loco ad *Portum novum* reperitur. Colligunt earn homines pauperes & in vafculis latis diluunt, in quorum fundo *Argentum viuitm* vena neicio qua illatum, inveniunt.

Lapis arenarius solidus prope Alexandriam monrem subterfrem constituit, *Catacomb arum* concamerationibus famolum. a) *Aibus* > partkulis rudioribus & calcarcis infperfis conflat; parum scintillat & cum Aqf. effervefcir. b) *Lapis mafcutuS*) Arabibus diftus, albidior pncedente; fed durus & ad Calccm uftulandam ineptus. *Lapis j&mineus* itidem albus & mollis > calcinationem facile subiens (*).

SALE *muriatico* paffim impragnata reperitur terra, maxime in locis Mare olim aut hodie inundatis. Ejus prxfentia fertilirari fumme inimica e(K Exemplum preebent loca juxta Lacum *Madīe* hirer Rofettam & Alexandriam, ubi Sal evaporatione paracum in accrvos congeritur. Contingit interea, antequam dividiiur, ut rore vel pluvia fortuita folvatur parum & diffluatj verum rou hue area arrofa & nuda eft, dum loca ultra hunc attaftum viorem & plantas fervant immunes.

Alexandria *Sat nativum* ter quovis anno colligit c *Fontibus falinis quatuor*, in Valle ad Portum veterem a mari separata jugo arenacco alto.

ATRUN CJJJ/^\ ^eu *Natrxtn t^jjyki* prope pagum *Terrdnc* inter Kāhiram & Rofcttam abuncie colligitur ex fundo Lacus ingentis> aqua fervore a?(tivo quovis anno evaporata. Pars ejus *rubicundi* color is > cum aceto effervefcit,

(/ 3) vchc,,

(*) In Defertis Orientalibus Lapedes Monuules diverforum [generum colliguntur. *Petrifueltn* non lara fuit in Collibus Calcereis, vel in Arena mobili: *Lithoxylon* inter raiiora sfHinatur.


Gypfum stellare. Arab. *Mar/is*, O ^ ft ^ ° lapides calcareos fparfe jacentes veftit* & foramina eorum replet.

Cbryftntifpntofi plurimapfpecies: nonnullae Arab. *voczntur Ain elfchems* عين الشمس alias *Djochus*. (joyina*)

Cbryftnllus Quirtzi vittatis appellatur hie *Radix Smaragdi*; & *Quartzum violaceum*, *Radix Ametbyfti*.

Sihx fructuofus in arena frequens. a^ Cum nucleo vilis & nullius uetus.

b) *Sine ntueoy* requiritur a Jud^is Kāhirenibus, in tabulis pl-umbeis politur Sc ad varia ornamenta & uis mnndi doineftici vertirur; pretioius fane, eoque ma^is, fi venis Dendriticis ornatus reperitur.



vehementius cum Aqf. Non omnis origo Salis alcaii mineralis adscribi debet calori folis, acidum e fale muriatico terreftri volatilifmtis, Alcali remanente. Natron hoc Kahira venditur I para i Roil. Ufus Sapone praeftantior ad Loturam. Vestimentorum linteorum 4 Rod, additur Natron 1 K. & aā Calcis vivx: affunditur aqua frigida: 8 vel 10 Wis clafpis coquuntur linteae & in gelido abluuntur. Magna olim copia Natron defercbatur ad Galliam, Piftoribus gratum ad angendam fermentarionem panis. Sanitati periculum, nefcio quod, ex hoc artificio ominantes Medici, Sal profcrip:runt JEgypt'ii parva fatis dofi juvant macerationem carnis coquendse. In Palafifa ignotum non erat prifcis Judaris, qui illud Natar vocabant. Ufus in ^Egypto loiorius diflum confirmat Jer. 2, v. 22. & indeoles effervescendi explicat Prov. 2?, v. 20. An vero Graci e Pateftina deduxerunt nomen, illud suo labio in folum TSirgov fleflentes & deinde Arabibus communicarunt, qui vocem transfundebant in i^JfM* posito b loco O, ea primo geniturae Us non hujus est fori.

Ampliorem ignorat inferior ^gyptus in hoc circulo Minerographiam nativam. InveQos vero prsebet montes arte & ordine digeftos Obelijcorum &c Columnarum forma. Vul^aris tantorum operum materia GRANITUS, Saxnm fparo rubro praevalenre, minus Quartzo albo, Mica nigra miniue, Alius rubro -fufcus: alias totus niger: columna qusedam tota alba.

Jafpidis & Porphyrii innumerae varietates: frequentiffimae sunt: a) «t-grefcens, albis maculis. b) obfcure - vtridis, venis albis. Montes matrices non ad hanc ^Egypti plagam pertinent, sed superiorem. Capitaneus NORDEN, qui eousque penetravir, ad locum Djabbel EJJtl/hle cis primam Cataractam Montem indigitat Graniti olim effrafti, prope' p-jgum Edfti, ubi quoque Templum ApoUlinis erat. Saxy jugum subfiftit non longe ab Insula Elheift (*). Ex rot montibus Africse, Afia? & Archipelagi ingenio & fervirio protraftas lapidum moles, jam tempore & barbarie minutim fraftas, in ruinarum trifti compendio inventit Mineralogiae cupidus.

• • •

Hac icbniographia judice flatus Flora Inferioris examinandus erit. Quisquis illam cum Flora quacunque Europxa confert, pauperimam exclamat & herbationum fegnitatem vel fundi inopiam accufat. Ait fteriliratis culpa ^gypto non fine injuria objicitur. Verum & Botanica colleflio transcurforia non est fed diligentiac affiduse adferibenda, quae annua mora novis de die in diem increvit rcpertis, & plantas omnium a-tatum tranfire dedit. Si ergo thefaurus hie exiguo tantum deficit numero, penuria plantarutn nullo mo-
ob

do conciliator cum fcecundirate rcgionis 'immenfa & fitu inter trcs orbes felici>
qui nditum plantis undique adveftis aperir,

[^]Egyptus cum aliis terris parum habet commune. Admiranda hie
Comnia fpelantur, aër, terra, fluvius; opera hominum & Naturae. Nefclt Al-
pes montesque eminemesj adeoque rotse exulant Plantarum Alpinaruij) greges.
Abfcntia fylveftris Florae iufigncm fecuin aufcrt copiam; nee vigent genuinse
Fluviatiles & Lacuſtres. Borealis mundi frigora excludunt advenas teneriores:
/Egyptus contrario prorfus modo ardentifimo illas opprimit calore. Idem fa-
vor cadi & foli, qui juvat indigenas, arcet finibus exotica* Non cujusvis
generis Vegeubilium eft, fine pluvia vivere pofTe: fine fontium, fluviorum,
paludum vaporibus: fine refrigerio umbrae montans & fylvaticse: noflurnorore
latis habcre ad tolcrandam fervcntiflTmi diei fitim. In fundo exarido germiaa
peregina & infueta mox peribunr. Icerum: terram inundatam & longo tern-
pore paluftrem scgre fcrrunt plants ficcioris foli. iEgyptiacje planrse pecuKari
ceconomia vegetativa vivunt. Laxidima quippe tctxtura & quaſi plethorica
conftant, ut venis Temper aqua diftentis refrigerium habeanr paratum. Orificia
Ydfculorum parentifiimc excipiunt roiiſ pluviolam & folia totidem funt radices*
Hinc transfpiratio fumma excitatur, utilis plantis arborum umbras fubcuntibus.
Sohm igitur xlHvi diei perferre pollunt, radice inundataj & tranfire ab aridi-
tare menfium rftivalium extrema, ad humiditatem diluvii trimeftrem. Prxterea
tempeftatis ordo inverfus quietem hyemalem plantis inducit regionum fcpre-
trion.illium, dum in iEgypto campus viret & narat omnis. Dcferta aquis vacua,
arcnis horrida plantas Africx incerioris vetanc fuas transmittere families. Semina
rerrse caſu illapiu, fi nimio obruuantur fluvii fedimento, non facile transluQari
valenr. Haec fine dubio caufa e(l, cur *Eatomologia* tam brevem hie referr
cenūm. Ova Infe&orum, Chryfalides & Eruca? aquis longo tempore Aagnan-
tibus fuſſlocantur. Paucs familiae in arbores & frutkes ereſtioris ftaturſe fc
fubducunr. Sicciam deinde temperiem ut evitent, fylvas & umbracula non
inveniunr. Similiter Aves monticolae & nemora amantes, patenrcs & fitibundos
fugiunt campos.

Plants ergo Boreales, quorum plurimae funt montofe vel kcuſfrtSi rotis
hinc abfunt generibus. Paucae hie reperrx, tanquam peregrinantes, fparfe &
facie fere murata? vix agnoscuntur. -ffigyprus Colutcam Carduumque fpinis
armat: Suecia Juniperum & Pinum foliis acnir. Ilia Sycomoricetris & Phccni-
cetis abundatj haec Saficetis. NiTus Arun.iine luxuriante veftitur: Siiech Caricis
longam prolem tenet, Una Regio altcraque fuas fervat Semperfurentes:
in Septentrione frigoris fuſtinent violenriam & duritiem terra gelu adftriſſfce: *in*
Ægypto folis ignes experiuntur & folum exfuccum. Mirus eft Fungornm de-
fectus in terra humida: rariffimus & fere extraneus rcperitur Mufcus aut Lichen.

In



In duof ergo Ordines univerfales abeunt Plants -ffigyptiaca; in quas aquae defeftus vel annonā fumnum habet imperium.


a) PLANTS IRRIGILK vel *culta*, omnes exotica, indigenatus jura atque propagationem induftriae humane debenr. *Arborum fruc̄iferarum* numerus minime respondet cultune & fertilitati; fed eminent prſtantia Palms & Sycomori. Credibile eft, arborcs radices folico profundius demittere> ut humores latentes inveftigent.

Hue pertinent *Plantce fpontanece* vel femi - cults, qui commodam fibi fedem quxfivcrunt ad viciniam aquarum, ut quafi *littorales* vigeant, five Mari Mediterraneo propinqux, vel circa Nili ripas & Infulas habitent, auc agrorum & hortorum pcrpetuo irrigatorum margines occupent#

Qusque regio & fingtila fere provincia fuum fibi separat Hortum Botanicum, in quo plants fpontanes terrs favore alle&s, fub ipfius Nature in* ftitutione vivunt. Peninſula RAS-ETTIN Alexandria diftincta eft littore, collibus, agris, ficutis, foſlis, falinis, umbrofis, apricis; quapropter in exiguo circulo plantas coegit generum diverfiflimorum, quarum qua^que congruum fibi fundum & parvam patriam obtinuit. Quodque gratiflimum omnium eft, locus ipfe Botanicum fervat immunem ab iniidiis & infultibus latronum. Margo Peninſula! tcrce adhxrens urbe occupatur, reliquus linibus htus eftj aquas trare, urbem pervadere timet Arabs.

Plantce noxice & inutiles aut nulls, aut extra oleas & furtim manent. Caufa in promtu eft. Eximia nobilium plantarum cultura gregarias prorfus avcrtit, Agris opportune fitis nulla datur requies; meſle fingula perafta vomcre vertuntur, & ad ultimam tandem progeniem hofpites eradicantur. Plantac cultce trunco fruticofo irrcptitas & parafticas obumbrant, fuffocant. Si una vel altera ftirps fuperviveret, in agro non denuo fato, fervore exufta interibit.

b) PLANT/E ARENAniE ftvc Defertorum, ordinem conſtituunt toto cpclo diverfum, prioribus tanquam paupercs & tabcicenres oppofitsj miferatione noſtra dignar. Nc trifitia haec loca fine Vegetabilibus eflent, Species fere 50 ibi jedem fixerunt) ut grebes Beduinorum errantium inveniant pabula, quibus vitam fiiftent, non delicate vi&itent. Plants ad tolerandam novercantis terrae inclemiam fiQac & armats, textura arida & prope cruftacea, indolem loci imitannir. Foliis ventricofis fuccum fervant & propriis impenfis vivunt. Fatendum erit, campeſtrcm arcnam non omnino dellirui humoribus occultisj vera aurem folatia fuit fi-igora nocturna, nebula? & rores menfium hiemalium. His refufcitantur herbic; vivunt usque ad fincm Martii; femina eftundunt Aprili, Majo & principio Junii. Solftitio inerucnte decidunt emortus fere omnes.



A D D E N D A .

1. PALMA <&*%///. prscipua hortorum cura in /Egypto eft. Plantantur arbores 8. ulnar. interfttiis. *Sexto* xtatis anno fru&um ferunt. Tenene veftiuntur ftoreis, ut in rruncum coalefcant frondes. Quovis anno duo *Jlrata* ramorum circumcirca arbores abicinduntur; hinc *atas* earum facile computatur. *Sexus* Palmæ junioris & adhuc non floriferae dignofcitur ex *foliis laterilibus* oc) *femdfai* ad bafin frondis triquerris, canali fupra usque ad bafin perringente; non vero ad apicem. /3) *Mafculi* folia lateribus comprehessa* canali incipiente remotius a bad, apicem folii affequente.

Spadices fructu vacui, fortiter contufi feparantur in filament*_y qux in *flints'* torquentur.

RJHH SCHOKI uTy^ F?f mrrbns in /Egypto & Syria non infrequens; fppurario cūm dolore intenso, diurno, faepe lethali. Pro medicina funt Palmae folia p3rva % tenera ex fummitate dccrpta, cočla cum oleo ad fubftantiam rubicundam, cut adjicitur *Cerujfa* (*Sbidadj*) ^IJAMA. & hoc unguento locus dolens femel quovis die fovecur.

2. STIGMA ALEPPENSE extraneis *Sigitto d'Aleppo* ; indigenis *Habbet effefia* > «Aj»J)oCAafc id eft: *vnlus unhts anni*; tanto enim ftadio perduiar morbus. Cicatricem imprimit fimilem ex variolis. Extranei raro hoc vulnere fodantur in facieJ & Aleppenes illud ut plurimum in juventute patiuntur; non recidivum. Si unicum infedit locum vocatur *Dakar*, 5& id eft *mas I* fi plura funr vulncra nominantur *Entaje* UxiJ f<zarella| quafi morbus progeniem extendiflet.
3. FARTIT OOL^S morbus in *Mgfflti Superioris* Provincia *Afjut*. Certo anni tempore (vernali noftro) incidit, & hominem plus una vice non vexat, verum tanto vehementius, diebus 15 vel 30: faepe lethalis. Tumor eft albus, e quo parvus ftylus furgit fub cute; incifio funefto effeftu inftituitur: palliatur foliis recentibus Vitis vinif. Bets alba: &c. impofitis.
4. HABHAB v^aaii-a. an *Ximenia* ? Seminum decoflum obftipans.



j. SEJMAK <*&+£*> (obfcur.) Oleum in ufu contra dolorcs artuum#

6, SCHISCHM. *p&ji>* (Mater. Med. VIII. 33.) Turcis *Tfchefchm.* Scmrna nigra, dura. Ophtalmicum mcdicamen TEgyptiis cclebre; imprimis in ifta morbi* fpecic ^pKhi ^pf*i* f*i* f*f* i f*i* quum *R^d J^y* vocant. Pulvis oculis infperfus, fummc exxduans.

NOTARUM EXPLICATIO.

<i>Cd.</i>	Cairi vel Káhirar loca deferta.
<i>Oh</i>	- - plantar hortenfes.
<i>Cs.</i>	- - fponraneoe.
<i>Ah,</i>	Alexandria hortenfes.
<i>As.</i>	- - ipontaneac,
<i>Rlh</i>	Rofctae hortenfes.
<i>I?/. .</i>	- - fponrancr.

Plant! in Centurii I —VIII. descriptae, distinguuntur %no (#).



PLANTARUM DISTRIBUTIO PRACTICA.

I. FOLIATIO.

A) F^EGENERATIO FOLIORUM.

D. 22. Martii 1762. vidi omnes arbores in hortis Káhirinis vestitus foliis, exceptis MORO nigra, & FAGO jugh lisdem diebus prodibant folia UHAMNI zityfb* Geterum hunc ordinem fcquuntur: (ex rdatione hortulani.)

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. <i>Mortis alba</i> . | II. <i>Glycyrrhiza</i> . |
| 2. <i>Fit is</i> vinit | 12. <i>Platanus orient</i> . |
| 3. <i>Uranus armen</i> . | 13. <i>Mimosa acacia</i> . |
| 4. <i>Ai/ijgdalus cbminun*</i> | 14. <i>Rhamnus</i> . |
| 5. <i>Pyiis domeft</i> . | 35. <i>Melia azeder</i> . |
| 6. <i>Snllx bnbilon</i> . | 16. <i>Pjrus malus</i> . |
| 7. <i>Punica granat</i> . | 27. <i>Fngus juglans</i> , |
| 8. <i>Pntus domeft</i> . | 18. <i>Moms nigra</i> . |
| % <i>Salix ban</i> . | 19. <i>Mimojh lebbek</i> . |
| 10. <i>Ficus carica</i> . | |

B) DEFOLIATIO arborum totalis, verbus finem Decembr. Káhiric obfervstft, ordine quo exuuntur.

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Melia azed.</i> omnium prima defol- | 10. <i>Amygdalus perfica</i> . |
| lintur. | 11. <i>Fagus juglans</i> . |
| 2. <i>Vitis vinif</i> . | 12. <i>Platanus orient</i> . |
| 3. <i>Moms alba</i> : fine Dec. tota defo- | 13. <i>Ficus carica</i> . |
| liata. | 14. <i>Rbamnus</i> . |
| 4. <i>Pyrns domeft</i> . | 15. <i>Salix babil</i> . |
| 5. <i>Pruuns armen</i> . d. 33. Dec. incep- | 16. <i>Gtocyrrbiza</i> . |
| pit folia demittere. | 17. <i>Primus domeft</i> . |
| 6. <i>Pyrns malus</i> . | 1g. <i>Mimosa nilot.</i> vel acacia vera, |
| 7. <i>Moms nigra</i> . | 19. - - lebbek: bane ramen inter- |
| 8* <i>Amygdalus commmi</i> . | chim sempervirentem vidi. |
| 9. <i>Punica granat</i> , | 20. <i>Salix ban</i> . |

C) SEMPERVIRENTES.

- | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| 1. <i>Citrus</i> , omnesque ejus varietates, | 5. <i>Annom glabro</i> . | 9. <i>Rlamnns nab</i> . |
| 2. <i>Ricinns arbor</i> . | 6. <i>Pbvcnix daclylif</i> . | 10* <i>Tamarix atle</i> . |
| 5. <i>Cordia*</i> | 7. -F/a-f fycomor. | If. C?^7A fiftula. |
| 4. <i>CuprcJJus*</i> | 8- Ofel europ. | 12. *MW/J paradiT |



II. ARBORES UMBRATILES.

Sylva in JEgypto null*. *Pbanketn Cdaçfylif.)* Iiinc hide in terra fterili & aienofa ; aquis tamen vicina; e. g. ad *Birket el badji*, qui Lacus est prope *Matarenm*. *Ti- mariceta (atle)* huinana induftria plantantur. Arbores fequentes habitant ad vias vel in umbraculis.

<i>Ficus</i> fycom. ubique copiofe.		<i>Melia</i> azed. pafilm.
<i>Mimosa</i> nilot. fiequens.	<i>Flat</i>	<i>orient,</i> raro.
- - <i>lebbek*</i> parce*		<i>Populus</i> aiba & nigra.
<i>Rhamnus</i> nab. frequent		<i>Cupreaffus</i> sempervir.
<i>Tamarix</i> atl. pafiltru		<i>Glycyrrhiza.</i> rariug.
<i>Cnijja</i> sophera, paffTm.		<i>GoJyapiuvt</i> arbor, parce,
- - <i>fiftula.</i> padim.		<i>Cordia</i> myxa. parcus,
<i>Ricinur</i> comm. freqp.		<i>Myrtus</i> brafilian?
<i>Salix</i> babyl. paffim.		<i>Bornfus</i> flabellif. in uno loco <i>Kahirx</i>
- -	ffgypt.	veteris vifus.
- - <i>ban.</i> pifITtn*		


DOUCHOS *fesban* % Sepes circa monotrophaca *Colocafe &c»*

- - *tablab;* frequens in hortis *fie* fupra teflo ffdium deduſtus»

VITIS. *vittifera;* plateas & te6U obumbrans* Supra murum horti erigitur ad planum inctinatum altitudine 3 Dinar- fepes badllorum cruciatim pofitorum , quibus inititur Vitis; had aite fruchis citius maturatur> hortus altiori munitur muro & afpe- Qus conciliatur gratiflimus^

PASSIFIORA *carulea'y* ad umbracula domeftica-

HELIANTHUS *annuus.* Ad oram agrorum feritum cum Cucumeribus, & fepem prabet temporiam, prout Cucurbitaceis convenit.



III ARBORES POMONiE, FRUGIFERJE.

<i>Flmix</i> daayiiC frequ.	
<i>Vitis</i> vinif. frequ.	
<i>Moms</i> alba. Tariat: rubra.	
- - <i>nigra.</i>	
<i>Pyrus</i> commun.	
- - <i>malus.</i> raro.	
<i>Cerofus.</i> Karajta «^> <i>Jyf</i> vel <i>Flam-</i>	
<i>da.</i> &A^uolsw parce- ego nou vidi.	
<i>Vifacia</i> vera. xariff.	

<i>Fofioq alajmi</i> ^ x J b <i>uitZ** ignota</i> ar-
bor, foliis Fici, ex paga <i>AUimi</i> pro-
pe <i>Aleppo</i> transveaa.
<i>Fofi•f f**rgi</i> o ** / ^ <i>UbuMS</i> fimillter
<i>fructus Aleppensis</i> ^7 <i>Ambar</i> forte ex
genere p ifstacie.
<i>Fic•y carica*</i>
<i>Qeratonia filiqua.</i>
<i>Mufa</i> paradit ftcquens.

Citrus j

Citrus; vtrlx aut species aut Varietates*
Ctfc? ej cochenillif.

Annona glabra.

Oka europ.

Tunica granat.

Kbamnus zizyph. Infum frigidum ex
fruflu muitura in ufu; purg&ns & re-
fiigerans.

AmygiUhis peril paflim.
Prunus domeft.

- . armen.. variat:

- a) *nueUo dulci*; Afeppenibus vo-
cats *Mijcbmifcb fauzi*.
- b) *nucUo amaro*. dicls *Kchilh*
vel *Murr.*

IV, HERBiE ODORiE ET COKONARiE.

Iris, paflim.

[^]4/c*a ficioL

*Narcissus tazett**.

MirabHis jalapa.

Qbeiranthus.

Comprana glob, raro-

Centaurea mofch. Vat or

Tagetes patula.

*Dianthus**

*Viola odorata**

Mentha gentiU

*Ocymutn bafilic**

Tanacerum balfam.

*Pancratium carotin**

, *Delphinium afncfs*.

, *Euphorbia mauritaiT*.

Antirrhinum lamaria j in raifco hortov

*Infminum offHc** paflim.

Origanum majorana.

Roftnarinns. freqnensv

a Veilingii?

, ^/be variegat.

Cucnmis dudaInr.

Zamr effultan, u e. *tula Snhani* AFep-
penibus (Te dicta; plants obfcura.

Eupatwium odorat. Propterfragranriamfo*
lent JEgyptii illam copiofe injicere in fe-
pulcrum fimul cum corpore fepellendo.

V. CEREALIA.

SECALE & *Avenn* his in ten-i'y non colantur, & prorfus fgnorantur,

TRITICUM ubique cuhum; ex illo panis & poms conficitnr.

HORDEUM parcius. Maturum 2? Martii. E quavfs radice ut pliiriminn 5c fpfc*; fere
spitham. diftantia inter quamque plantain, Colitur pra alendis equis, gailinks, See,
In defelta annonse panis. eft fuccedaneu* *Potus* ex ea vulgaiis paracur nomine
Buza. KfS/y*

HOLCUS; *Durra balledi*y paffiin, Ruffici panem ex ea parani.

[^]MAIS3 dura; parce. Spicse afiata: edules> fapidae.



KABK EL BARR (obfcura). & Barbaia advehuntur grana, e quibus paills quidam conficitur.

MESEMBRVAKTHEMUM genicul. Beduinis in ufu. (vide Cent. IV. I.)

ORYZA SATIVA. In iEgypto supra Deltam & Rofettam minus minus-ve colitur; quo aitius increfcunt littora, & impediunt aquae continuum affluxum. In depreffa regeione hete proveuit. Agri margine cminent cinguntur, ne defluat aqua. Seritur Oryza ante Nili incrementa: ille deinde fuffmanit humorēm. Subfidente fluvio, arte 6c labore invehitur aqua, tanta copia, ut radices femper inundatae lenti.

VI. PABULARES.

TRIFOLIUM *alexandr.* primaria 6c optima planta pabularis. Totis agris colitur. Venditur recens 6c ficca. Depafcitur a pecoribus alligatis, 6c pastore prsfente.

FADA: jumentis 6c Ovibusj prsefertim in itinere navalí, quum Trifolii onera non commode vehi poffunt. Fabae ad farinam rediguntur 6c cum paleis mifcentur, qua: jam fub trituratione comminute font; Floret Faba fine menfis Junuar, denfe 6c alte inffor Secalis in noftris arvis.

TRIBULUS <i>pentandr.</i>	{ SINAPIS <i>harm*</i> SUADA <i>vera.</i> SALSOLO <i>inerm.</i> COLUTEA <i>pith</i> HEDYSARUM <i>alhag.</i> HESPERIS <i>acris*</i>	Bov ₄ Ovib.	CONVOT.VUIUS <i>cneor.]</i>
SUADA <i>vera.</i>		Capris,	GERANIUM <i>malac_m</i> ▶ Camel. Ovib _# .Capr.
SALSOLO <i>inerm.</i>			CENTAUREA <i>eriopb.</i> J
COLUTEA <i>pith</i>			FASTIDIT-E: <i>Zygophyllum defert.</i>
HEDYSARUM <i>alhag.</i>			Mefembr. <i>geniculifl.</i>
HESPERIS <i>acris*</i>			Scotzonera <i>twggd.</i>

VII. MONOTROPH EJE.

ESCOLENTÆ, TINCTORI-fl&) MEDICO: de his cfr. MATBR, MED. KAHIR,

Saccharum.

AU'tum fativ.

Solatium melong.

- - "P°»

TrigomttM fcenugr.

- - porrum.

Portulaca olernc.

Ervufu lens,

Beta alba.

Aptum petrofel.

• " *Tubra>*

Scandix cerefol

Brnffica cauliflora.

Hibifius efculent.

• - eruca.

Malva rotundif.

^ . Arab. *Sjami.* Ital. *Brocoli.*

Leftdmm hortenle*

*. - Arab. *Malfiif*

Capficuq frutefc>

Corcborus olitor.

Sinapis

Sinnpis nigra. Caulis & petioli juniores
efculenti, fapidi.

Conyza odora. frequ.

Lupinus..

Linum ufitat. Arab. *Kit tan.* Floret fine
Januar. tamen non ubique, quia feri-
tur prout exficcantur agri.

Jtiil'tgofera.

%*Refe<h* lur, Arab. *Buba.* Cum alu-
mine mixta, ad colorem flavum & ru-
brum.

Cartbanws tinfl. Arab. *Cbartam.* Se-
mina Or/ar. Incipit florere medio Maji:
maturns initio Junii Seminibtis oleum
exprimitur. Putant Arabes colorem
non comimpi, (i flores decerpantur a
Virginibus adhuc vere caftis, & ne
romen faliat, puerlinis hanc mefcm con-
credunt.

Cichot 'mm endivia.

- - - Arab. *Sjiknri.* Viridls, hifp.

Tbnfiolus; *|ub|a fraudju*

- - - *hib'm habbnfcbu*

Papaver. Semina efculenta.

*Spiuacin**

Ale en ficifoh Folia cdnlia; obvoluta fru-
tulis carnis & fimul cof^a.

Arum eoloenf. Radix cočla edulis^ ejus-
dem faporis cum Soteno tuber.

Dolicbos lubia.

Lawsonh inetmis. (*jamrnbeni*) Folia ficcantnr, in pulverem rcdiguntur, fēd arena ad-
mifcenda, ut melius minuantur. Haec maffa ad ufnis tinelorios fervatur, & venalis
transfertur. Hujus ope tinguntur Ungues rubri; manus lure*; capilli retuhrnm
fulvh Senes nonnulli (fed ex plebe tanrum) barbam fucant. Quscdam fa?min:r
pedes luteis afpergunt maculis. Pulvis aqua huroécfetus, capiri imponitur, nnius
horulac tempore, in balneo* Manibus vero tingendis, nocte applicatur path; qua
abltta cutis oleo ungitur, ut color obfcuior evadai* Si bruneo-fufcus erit, paftx
adjicitur pulpa *Jnglandū* immaturar.

Dolicbos gra?ca. Flore claufo*

*Cicer attain**

Vicia faba.

- - fttiva. Non vidf.

Lactuca fatira.

- - rubra. Viiidis-

Dattcus carota. Ruber*

Anetbum graveol.

Cannabis. Arab. *Sjarantk.* Colitur paf-
liin. Floret fine April. Folia ad ufps
medicos. Semina inebriantia. Ufus
textorius ignoratur.

Kerium olcand. rariffTme. Ufus medi-
cus, alexipharm. interne; externe folia
cočla in unguentum contra Pfoiaian.

Coriandrnm ofic.

Ranunculus fcelerat. folia conrnfa contra
Pforam.

Ambrofia feror. Decocti vapor oeulff
ffgris utilis*

Acbillaa falc. Arab. *Baatran.* Extraclum
rīorum, folioram & caulis in Vño>
aduflo, medicamen contra *Hypocbon-
drlam.*

Stdnm teretifol. puerperis cibus medxcs
eft, mixtus atiis efculentis.

Motnordica halfim. Fručlus matus &
jam fponte fiffus Oleo amygdalino im-
miflus per 40. dies, in *Balfiwum* re-
olvitar prxffantifliimnn.



VIII. LIGNA FABRILIA.

Maxima pars adfertur ex Attakia & Karamania; indigena ex hortis, aur c
*sac*f, (JEgypto fuper.)

A) FABRCI IA»

<i>Djnuz.</i>	Juglans*
<i>Sds.</i>	Platanut.
<i>ScbiSrbiti.</i>	Cupreflus. Ad AfTeres , quibus cymbae vefHuntur.
<i>Gfija.</i>	Lignum Sanct.
<i>Garru vel Durraka.</i>	Quercus.
<i>Snoubar*</i>	Pinus odora.
<i>Gbargbafti.</i>	Ulmus.
<i>Gutran.</i>	Pinus.
<i>Karrub.</i>	Ceratonia filiq.

Nafbaur. Tilia**Sanfaiu* Fagus.

Mimofa acacia; ex iEgypto Superiore
Sués defertur, & potissima pars eft
Lignorum ad naves *ftruendas.* *Pi-**
nus ex Archipelago Alexandriam ad-
vehitur, inde Káhiram & Sués. Ca-
rina navis fundatur Ligno *Sadj* *luu*
ex India allato; pretiofo quidem, fed
forti & corrumpi nefcio.


Horfi. Arbor ignota*B) LIGNA FOCARIA: paucis -exceptis, ill-
digene.

<i>Ballut.</i>	Fraxinus excels.
<i>Zajtun*</i>	Olea.
<i>Sndininn.</i>	<i>Grxc.</i> <i>Beggouc*</i> Quercus.
<i>Lous*</i>	Amygdalus.
<i>Tut*</i>	Morus.
<i>filifcb.</i>	Prunus*

Djumez. Sycomorus,*Mcbajit.* Cordia inyxa.*Nabb.* Rhamnus,*Ath* Tamarix.*Tin.* Ficus.*Nncbl.* Palma**Uzeq.* Lycium europ.*Metmn** Paflerina.

C) LIGNA CARBONARIA.

<i>Sijjh</i> IJ^»A'	Optimi carbones.	- - - - -]
<i>Scbiah</i> ^ u i vel^«fl^:boui.	Arbor foliis parvis, fragrant.	Ex	<i>Hedjas.</i>
<i>Baahuni.</i> o3%A: <a>	Boni.	- - - - -	J
<i>Makfar.</i> ^Sy9	"J		
<i>Agrnm.</i> ^	E regione urbis T6l%		
<i>Ertaa aghuz.</i> ^rj^y^)	Carbones boni.		
<i>Ratdiih</i> *3% <i>b</i>	Spartium. Boni E defertis.		
<i>Adir.</i>	Boni. E Suénfi regione.		
<i>Tuff.</i> aJ-b	Tamarix gall, viles, indigena.		
<i>GLargadd.</i> OjyS	Indigen. vile*.		
<i>Baqqum.</i> **&	E defertis; Beduini vendunt*		
<i>Ttrmis'.</i>	Lupinusj pro pulvere pyrio carbones optimi.		



IX. SPONTANEiE.

A) HORTENSES; in plantationibus, hortis & agris.

<i>Pbulavis</i> femiveitic _v	<i>Scandix</i> infcta.
<i>Fanicum</i> glaucum.	<i>Pbytolacca</i> americ* parce.
- - - fanguin.	<i>Ox a Us</i> cornic. ubique*
<i>Plantago</i> major.	<i>Euphorbia</i> peplus.
<i>Jl'ou&a</i> palmata.	<i>Stewart</i> in corchoroid.
<i>Solatium</i> quin. fr. rubro.	<i>Soncbus</i> olerac.
- - - nigrum, fr. nigro.	<i>Lap/ana</i> capillan,
<i>Stuula.</i>	<i>Gnapbalium</i> margar.
<i>Acbyrnntbes</i> afpera.	<i>Urtica</i> pilulif.
<i>At fine</i> fegetal.	<i>Parietaria</i> offic-
- - media. Rarior, ex Europa al-	<i>Awarnntbus</i> blitum.
lata, & in horto Jefuicar.	<i>Airiple</i> *. patu la.
Kâhirar vifa.	<i>Cjix</i> lacrym. In humidiufculis, femel
<i>Cbowpodium</i> rubr. paflim.	tantum ^perra.
- - viride. frequ.	<i>Adianthum.</i> Capill ven. Ad canales
<i>Phfal</i> is formif. Semina gallinis fu-	fluentes, parce.
nefta,	

B) AQUATICS.

<i>Aruudo</i> donax.	<i>Scirpus</i> . paluftiis.
- - maxima.	<i>Eupatorium</i> odorat. Parce in infulis in*
<i>SncbiiTum</i> ganifch.	undatis.
- . qafab. Ufus pro bacillis ,	<i>Stum</i> aquatic. Ad pontem verfus Py-
cancclis, &c.	ramides.


C) RUDERZCOLA:

<i>Hedyfarum</i> alhagi.	<i>Arundo</i> epigejos.
<i>Cynofurus</i> durus.	<i>Carduus</i> fyriac.
<i>Ed'ium.</i>	- - marier.

D) PRATENSES. Prata id noftrx (economise formam instituta , perquam rtrt in iEgypto font.

<i>his</i> fifyrinch.	<i>Scirpus</i> bis-umbellat.
<i>Cyperus</i> fen u gin.	<i>Alopecurus</i> genicul.
- - efculcnt,	<i>PentagloJJum</i> rubrum.
<i>Fftuca</i> fufca.	<i>Cynofurus</i> durus, Parce.
<i>Phalaris</i> canarienC	<i>Poa</i> amabil.
<i>LQHUM</i> annuu»i»	<i>Verbena</i> procumbens.

Lvrn



Cent tana centaur.
Tamarix gall.
Beta vulgaris,
Alftne proftrata.
Catailis daucoides,
Rwnex aegypt,
 • - obtufifol,
ffuncus bufon»
Potentilla fupina»
Sikne villofa.
*Polygonum maritimum**
Ranunculus federate
Glinus lotoid.
Lepidium fativum.
Rapbanus lyrarus.
Lotus rofea,
Trigonella hamofa.
Latbyrus protend
Medkngo poiymorpba.

Srorpiurus fubvilloi. rairo,
Inula pulicar,
Cichorium endiv.
Laćtuca faligna^
*Picris bicraciooid**
Senecio hieraciooid.
Crepis radicata.
Cuapbalium obtufifol.
rffter crilpus.
Anthcmis arvenfis.
Ccruana.
Erigeron jflmaicenfe?
Cehtaztrea calciu-apa«
Tanacctnm humile.
Holcus exiguus.
Carex arcnar.
Ambrofia fcrotina.
AudfOfogon annulatum.

E) AREUXKIE; Defcrtoruiip **aridorum.**

Pankum dichotom,
Ariflida lanata.
Fefuta ealycina.
Agroftis virgirv
Planing) tilpina.*
Uthoffermim tinftor.
Ech'tum vulgarc.
Hyofiyamus dator.
*Corrigioln albella**
Siliquari.i glandulola.
Rumex fpinoC
*Frankcnia i*evoluta»*
hhrniaria lentic.
Afplotldus fiflulofus.
Tribulus pentand.
*Hcurada procumbens**

Zjgopbyllum portulac.
Euphorbia retuffifolia.
Glinus cbryftallin.
Mcfimbryautb. nodifl.
 - - geniculifL
Antirrhinum linariooid.
Zilla myagrum.
Trigouella ftellata.
Cbeirautbvs triftis.
Senecio fqualidu»»
Cbryfocoma fpicata.
Ceutaurea calcitrapa.
Leontodou mucronatum.
Cakndula officin.
Iuula pulicaria.




F L O R A

i E G Y P T I A C A -




M O N A N D R I A .

- I. **C**ANNA *indict.* Rh. Ch.
 2. (#) SALICORNIA *ti* *europsa*. As. *Chrafi* vei *Hattab badâde*.
*cc) fifitllis exfertis**
B) pist. inclusis.
 3. (#) - *b) virginko*, farinofa. • As.
 4. (*) - 0 *crucktn.* - - As. *Salt a.* VernaB temporc inwnta, in rt-
 mis latralibus ac fuper floium ipicain aiticulis vctita, brachiatim uttin-
 que emfrginatis apice.



D I A N D R I A .

5. NYCTANTHES *fimbac.* - Ch.
 6. JASMINUM *officin.* - - Ch. *Jafmw.* ^ ^ ^ vel *Kyan-* o ^
 7. OLEA *europsa*. - - - Ch. *Sejtun.* نیتون
 8- (*) UTRICULARIA *inflexa* - Rs. *Hamûl.*
 9. (*) VERBENA *a) procumbcns.* Rs.
 10. (*) - *b) en pit at a*, - - Cs.
 11. («*) PENTAGLOSSUM *linifolium** As. Cs.
 12. ROSMARINUS *officin.* - Ch. KB/.
 13. SALVIE *ceratopbjt.* - - As. *Merjamh.* مرجیہ



T R I A N D R I A .

14. TAMARINDUS *if^frfr.* - Ch. *Tawmer htnii.* ^ JJJkA ^ Rami ultimi
 & folia alterna.
 15. IRIS *a) famine.* - • Ch. *Zambak.* نریق
 16. (e) • *) *fifyrlhchium.* - Cd, idnomen.
 17. C*«) ALTERNANTHERA *ubyrantb.* Rs. *ffimh*
 18. (*>) CYPERUS */i) fitftigaius.* Rs. Wr. *rfabbus.*



			Rs.	Saad.
19.	(•) CYPERUS b) <i>cowphnnius</i> .	-		
20.	(*) • c) <i>ferrugineuf*</i>	-	Cs., Rs.	Aft/, J^JUW <i>NgliL</i>
	- - rf) <i>efcuUntus</i> . Hah <ج aziz.			
22.	(#) - «) <i>nilosicus</i> .	-	Rs.	
	(*) - /) <i>hteralis</i> .	-	Rs.	
24.	SCIRPUS /l) <i>paluftrh</i> .	-	Cs.	
25*	(#) - A) <i>his-umbtliatuu</i>	-	a.	
26.	(*) - 0 <i>fiftulofus</i> .	-	Rs.	
	(#) - <i) <i>corymhofus</i> .	-	Cs.	Depsje.
28.	(•) - «) /Tf/i 3 ^o <i>Alpin</i> .	-	As.	
29.	SACCHARUM «) <i>officin</i> .	-	Ch.	غاب GUh قصب سكر
30.	(#) - b) <i>hiflorum*</i>	-	Rs.	Ganifib vel Buzfdffi.
SI-	(#) - c) <i>hirfutum</i> .	-	Cd.	
	(*) PHALARIS *) <i>canariens</i> .	-	Cs.	
35.	(*) " ^) <i>fenrivertic'dlata</i> .	-	Cs.	Nasjm. ناصم
34.	(#) - 0 <i>disticba</i> .	-	As.	
35.	(•) - d) <i>criftata</i> .	-	Cs.	Bel tl fir.
36.	(*) " 0 <i>felacea</i> .	-	Cd.	Ratam. راتم
37:	(ft) - /) <i>vaginiflora</i> .	-	As	
38.	ALOPECURUS <i>geniculat</i> .	-	Cs.	
39.	(*) AGROSTIS <i>vlrgtnicai</i>	-	Cd.	Sfiwma.
40.	PANICUM a) <i>gUucuin*</i>	-	Cs.	Sfyfc vel Sir afar, i. «. <i>cauda muriu</i> <i+
41.	(*) - F) <i>cms gntiu</i>	-	Rs.	
42.	- - c) <i>fangumilt</i> .	-	Cs.	
43.	- * A) <i>da'tylon</i> .	-	Cs.	Nisjil vel Nedjil.
44.	(*) - 0 <i>nffrtffum</i> .	-	Rs.	
45*	(*) ' f) <i>muthutn</i> .	-	Rs.	
46.	(*) - j) <i>tetrptfkb</i> .	-	Rs.	
47.	(*) - I) <i>turgidum</i> .	-	Cd.	Bwhir*
*8.	(ft) - 0 <i>dichotomum</i> .	-	Cd _#	
49.	(*) * ^) <i>geminatum</i> .	-	Rs.	
50.	(•) - 0 <i>groffarium</i> .	-	Rs.	<i>Ngil</i> rel <i>Nefi</i> .
51.	• - a*) <i>miliauum*</i>	-	Cs.	'CaJycina valvula interior* minima ; ffac «xteriori e iiwfculo; interiore liennaphi\
52.	(#*) TRISETARIA <i>liuearis</i> .	-	As.	
53.	DACTYLI&. Calyx floris bivalvis, unHorns, filiformis, coxolJa anguftior. Co- rolla 2-valvis. Piftilla 2.			
54.	CYNOSURUS *) <i>lima</i> .	-	As.	
55.	(•) - t) <i>durus</i> .	-	Cs.	Chalji. خلفي

58. CYNOSURUS c) <i>egypius.</i>	-	Rs. Mi/fm <i>tifl'ih.</i> AlpSni. Folia non oppofira,
57. POA a) <i>amabilis?</i>	-	Cs. Profbata, fpiculis ia-flois , IUiefribus*
58* (#) - ft) <i>multiflo'ra.</i>	-	Cs.
59. FESTUCA a) <i>fusca.</i>	-	Cs. <i>Aburagh'u</i>
60. (#•) - ft) <i>lanceolata.</i>	-	As*
61. («) - c) <i>dichotomtt.</i>	-	As.
62. (•) - d) <i>fafikulata.</i>	-	•As.
63. - - f) <i>calcina*</i>	-	As. Cd»
64. BROMUS /I) <i>rubens.</i>	-	As.
65. (#) - £) <i>villofuf.</i>	-	As.
66. - - c) <i>diftacbyos*</i>	-	As.
67. (*) - //) <i>porfbrmif.</i>	-	As. <i>Siwtwf.</i>
68. (#) - e) <i>pobftaqbio.s.</i>	-	As.
69. (*) AVENA n) <i>penfylvan.</i>	-	Cd. <i>Sndjnrc eddjammel.</i> J^ a.r J شعير
70. - . b) <i>fatua.</i>	-	Cs. <i>Summ<ejr e Cbafur.</i> Tota una "cum flori- bus hirfuta; fpitlininalis. Copioë in flgris.
71. - . r) <i>fatua.</i>	-	Cs. Id nom. Ad ba(m florig primi 4 pili intra calyccm , glmnar corollins iot< glabnr.
72. LAGURUS o<<<J.	-	As.
73. (*) ARUNDO A) <i>donax*</i>	-	Cs. J5/k <i>hflggni.</i> Panicula patents
74. - - ft) <i>Wonrix.</i>	-	Cs. Id; noin. Panicula arcta.
75. (*) " c) ^OUAX <i>maxima*</i>	-	Ca.
76. (*) * ^) epi&eJ^s*	-	Cs. Wnife.
77* (*) - ft <i>pbragmit?</i>	-	Ghobeibe prape سعس.
78. .(*) - g) <i>calamagr.</i>	-	ib.
79* (#) ARISTIDA <i>lanata.</i>	-	Rs. CA. <i>Dhrajra.</i> oA ضفاف SJ<f<j'f سفوف
80. LOLIUM a) <i>perenne.</i>	-	"Cs. <i>Hafihifbtlfarras.</i> حشيش الفرس
Sc - - A) <i>temulentum*</i>	-	Cs-
82. (#) ELYMUS <i>fubulatus.</i>	-	As.
83. HORDEUM rt) <i>hexaflich.</i>	-	CL <i>Sjair.</i> شعير
84. - - ft) <i>mwiuum*</i>	-	As. <i>Abu j?ir.</i> Invoincris omnibus bftfi <i>ciliaria.</i>
85. (*) TRITICUM «) y^&fl*	-	Ch. قبص <i>Flura. abia.</i>
86. (*) - ft) <i>biCorue.</i>	-	A&.
87. (#) - c) <tai!opoides+	-	As.
28. (#) GRAMEN <i>indeterminat.</i>	-	As-

T E T R A N D R I A

- J9. ^CAT31OSA *armnrin.* - Rs. Floi'e albo;. calyce loDgkwe,
90. CRUOANELLA a) *mnnnm.* - As.



91. (*) CRUCIANELLA *b) bcrbacea.* As.
92. PLANTAGO *a) major.* - - Cs. *Lijfân el bamal* لسان البامال
95. - - *b) lanceolata,* - - Cs. Capitulo globofo, hirfuto; foliis lanceolatis.
94. - - *c) coronopus** - - Cs.
95. - - *d) Laflingi?* - - As. Bracteis vix carinatis.
96. (#) - 0 *decumbent.* • - Cd. *Seiueme.*
97. (*) " *f) cylindrica.* - - Cd..
- J>8« 0 0 • *g) ovata** . . . As. *Lokmt eniüadji.* لغمة النعاجي
99. (#) - *b) crajjifolia.* - - As.
100. (*#) PTERANTHUS *dicbotomus.* Cd.
101. (#*) RORIDULA *droferifolia.* Su&.
- 102* CUSCUTA *euroyan,* - - Cs.



P E N T A N D R I A .

- J03. (*) HELIOTROPIUM *europ.* - *Sackeran.*
- JC4. LITHOSPERMUM *a) frutic.* • As* Folia lanceolata, hispida. Radix fuci vicem prxftac puicherriini.
105. (#) - £) *clUatum.* - - Cd.
106. (#) - c) *hifpidum.* - - Cd.
107. (#) - <0 *anguifolium.* - - Cd. *Hahma** & *) l^ فشن
- ic8- (*) - 0 *digynnsm.* - - Cd. *Rogbla.* *ls_r *Natdjj** فشن
109. (#) - /) *heliotropoid.* - - Cd.
110. (*#) ARNEBIA *tetrnftigtna.* Cd. *Sndjaretclarmb.* c^J^ill ፩/ac^U
111. (*) ANCHUSA *fl)ava.* - As. *Sjubbsjta vel Dabbum.*
112. (*) - £) *tuhercul&ta.* - - As.*
113. - - 0 *undnlata.* - - As.
114. (*) - d) *bispida.* - - Cd.
115. (*) - 0 *J|inocarfos.* - - Cd.
116. BORAGO n) o#V. - - Ch. *Liffaiettor** ^yJJI ^jjLuJ
117. (#) - V) *vetffucofa.* - - Cd. *Luffeq.* OÜMAJ *HorrtCfo.* Ü b A
118. ECHIUM *a) fruticofum'i* - - As. *Sakbawnm vft\ Lefael'afal* Procumbciw villofifima, foliis parvis.
119. (*) - *) *rtibrnm** - - Cs. *Llkahsh.* iJJUarJJJ
120. ANAGALLIS *larifolia.* - - Cs. Procumbens; caule 4-angulo; foliis cordatis, fefilibus, oppofitis, obtufis; floie rubro & carruko.
121. (#) CONVOLVULUS *a)l,fiqitts.* Cs. OHM.
122. (*) - v, vgnvns. - - -


123. CONVOLVULUS <i>c) hederactus.</i>	Ch.	<i>Senbak.</i> سنبك .
124, - - if) <i>cneorum.</i>	- -	<i>Bajâd.</i> بلياض Tomentofus , gennine 4-angulo; ftylo i; ftigm. 2.
125. (#) IPOMOEA <i>palmata.</i>	- -	Cs. <i>Settelhdft.</i>
J26. Jtf IRABILIS/ikp*.	- -	Ch. <i>Ytmanû Sjibb ellejL</i> J*JUJ شب
327. DATURA <i>mettl.</i>	- -	Ch.
128. (#) HYOSCYAMUS <i>datura.</i>	-	Cd. <i>Datora.</i> g/Y&t' Saatran. ci- سيدرا
129. NICOTIANA <i>tnbacum.</i>	- -	C <i>Dacchan*</i> i. e. <i>fumus*</i>
130. PHYSALIS <i>a)fomnifera.</i>	- -	Cs. <i>SakarSn.</i>
331. - - £) <i>curajjav.</i>	- -	As. <i>Foliis villofis.</i>
132. (#) SOLANUM <i>a) nigrum.</i>	- -	Cs. <i>EnabeddiL</i>
133. - - V) <i>fuelongeua.</i>	- -	Ch. <i>Baiittdjâiu</i> بيدنجار
334. - - c) <i>diphyllum*</i>	-	
135. CAPSICUM <i>frutefcens.</i>	-	Ch. <i>Tsiftl acbmar.</i>
136. CORDIA > <i>myxa.</i>	- -	Ch. <i>Mocbajet.</i> خطيط i. «. <i>berba</i> ft cr nut at. Foliis ferratis, vel fubcrenatis. Staminib 4.
137. - - b) <i>febfftena*</i>	- -	Rs. Foliis fubrotundis.
138. LYCIUM <i>europeuni.</i>	- -	As. <i>Aufidj.</i> Filamentis bafi nudis ; bacct biloculari, pglyfpermo.
139. (#7 RHAMNUS <) <i>abecc.</i>	-	Ch. <i>Sîdr.</i> vel N/iM. OÜS Edulis.
140. - - /;) <i>zizyphus.</i>	- -	Ch. <i>Önnab.</i>
141. VITIS <i>vinifera.</i>	- -	Ch. /Eiub. عناب vel خنفه
142. ACHYRANTHES <i>aspera.</i>	-	Cs. <i>Nanjam.</i> ذعيم
143. NERIUM <i>oleander.</i>	- -	Ch. <i>Tijla</i> تجلة
144. (#*) GYMNOCARPOS A/er».	Cd.	<i>Sîrr.</i> جرد JUW <i>Djarad.</i>
145. CORRIGIOLA <i>a) rcptis.</i>	-	Cd.
146. (#) - b) <i>albella.</i>	-	Cd. <i>Likbajt.</i>
147. ASCLEPIAS <i>a) gigantea.</i>	-	<i>Bejd ehfchnr.</i> Nobis non obvia in JEgypto; vifa tanien <i>Alpino</i> & <i>Kardtu.</i>
148. (•) - b) <i>cordata.</i>	- -	Cd.
149. («) HERNIARIA <i>kntieuh</i>	-	Cd. jWfl^r. yLp
X50. CHENOPODIUM <i>a) tubrum.</i>	Cs.	
151* - - *) <i>album.</i>	- -	Cs.
152. - - c) <i>ftnvuw.</i>	- -	Cs.
153. - - *d) <i>vtride.</i>	- -	Cd. <i>Fifaelkjâb.</i> فسحة الكلاب
154* BETA /i) <i>vulganh.</i>	- -	Cs. Cb. 5tfft vel SWg. سلق
155. - - b) <i>subra.</i>	- -	Ch. <i>Bandjjar.</i>
156. (*) SALSOLO <i>a) kali polygam.</i>	As.	

?

57 GO SALSOLA b) <i>inerwis.</i>	-	As.	<i>Nadsva vel Gummali</i>
J58* (#) - 0 <i>Mucronata.</i>	-	As.	
59 (*) • <0 <i>longifolia.</i>	-	As.	
j60. (#) - f) <i>artkulata.</i>	-	Cd.	<i>Tartir.</i> ترتير
J<JL. (#) - /) <i>mouobraQea.</i>	-	Cd.	<i>JErajam.</i> عرجام
j6s. - - g) <i>vermkulata.</i>	-	As.	
163. (*) - £) <i>tetrandrn.</i> • -	-	As.	
164^ GOMPHRENA <i>globofa.</i>	-	Ch.	^ریغیر عنبر
165. GENTIANA <i>centaur.</i>	-	Cs.	<i>Kant arī'an:</i> nomen a Lat. derivatum.
			Monandra : flore rubro & albo : ftylo fligmate longiore ', licet <ligyna putatur. Ufus. medic, vulgaris.
J 66.. CRESS A <i>cretica.</i>	-	Nxdavn.	Foliis lanceolatis , incurvis fligmate globofo i non (implie:)
J67. ERYNGIUM <i>campestre.</i>	-	As.	<i>SchaUkeh JJiUui</i>
168. (*) CAUCALIS n) <i>pumilal</i>	-	As.	
J69. (#) - *) gWr <i>i,</i>	-	As.	
170. DAUCUS <i>carota.</i>	-	Ch.	<i>Djnzar.</i> جزر
171- (ft) AMMI <i>majus.</i>	-	Rs.	<i>Cbaillc.</i>
172. CHRITHMUJtf j>yrenaic.	-	Cd.	<i>Sjabet el djebbel</i> شبه الجبل
			Involucro dupli; aphyllum, teres, dichotomum.
173. CORIANDRUM <i>fativum.</i>	-	Ch.	<i>Kurbara.</i>
174. SCANDIX /i) <i>cerefilium.</i>	.	Ch.	<i>Maqduuis franiju</i> مقدونس
175. (#) - //) <i>jnfjla.</i> » -		Cs.	<i>Cbellf</i> vel <i>Gazar Sjaitauū</i>
J76. SMYRNIUM.	Seminib.	coippreffis,	fuborbiculatis.
177. ANETHUM <i>graveolens.</i>	-	Ch.	5>*Z*r. C^AJ^ Sjamar. شمر
178. CARUM tfrtrv/.	-	Ch,	
179. APIUM a) <i>graveolens.</i>	-	Ch.	<i>Kerofs.</i> كرفس
180. - - b) <i>petrofelw.</i>	-	Ch.	<i>Baqdunis.</i> بقدونس
131. TAMARIX <) <i>gallic</i> a.	-	Cs.	<i>Tat fa.</i> Kntab aebmar.
182- (*) - /0 <i>oritfua/.</i>	-	Ch.	<i>Atl</i> J.5I
183. (*) ALSINE a) <i>fegetahs.</i>	-	Cs.	
184. (#) - b) <i>profrata.</i>	-	Cs.	<i>Robbajrs.</i>
185. (***) SU2EDA a) <i>vera.</i>	-	As.	<i>Sntfrf.</i> Himmtm.
186. (*) - £) <i>baccata.</i>	-	Cs.	<i>Mnllsah.</i>
J87- (*) - 0 <i>vermkulata.</i>	-	As.	
188- (•) • <0 <i>bortenfis.</i>	-	Ch.	<i>Mulhb.</i>
1R9. (*) - 0 <i>monckn.</i>	-	As.	4/W-
19c. (*) STATICE fl) <i>monopctala.</i>	-	As.	<i>Stfy.</i> 2/lr«.

19 T. (#) STATICE /;) *dfhytia*. - ^ As.

192. - - c) *fpeciofa*. Caule fubnudo, dichot, inferne sub-ancipiū, fupenie fepe triangulari.

193. LINUM *ufim'iffinmm*. - . Ch. *Kittan*. 

H E X A N D R I A.

194. (*«) SILIQUARIA *glandukfa*. Cd.

195. NARCISSUS *tazetta*. - . Ch. *NardjU*. (ju^a^r*) Nomen a Lat. de fu·in turn. Foliis spiralitef contortuplicatis, līlbus oblougus, magnus.

196. (#) PANCRATIUM *Mjric*. - . Ah. *Sufinn*.

197. ALLIUM a) *fativunu* - . Ch. *Tom*.

- - b) *ccpa** - . Ch. *BtifāL* 

199. - - c) *formm*. - * Ch. *Korrāt*. 

200. (#) • d) *defer toy um*. - . Cd. *Zaetemān*. 

SOI, ASPHQDELUS *fifiuhfuu* • Cd. *Burak*. 

202. (*) ASPARAGUŚ a) *ftipularis*. As.

203. - : b) *agtil* Sine fripulis adexitum ramor.

204. POLYANTHES *tuberofa*. - . Zymhyl

205. (*) HYACINTHUS *ferotinl* Cd. *Ziatman*. *Borrqt.* t 341

206. (#) ALOE *varugata*. Ch. *SMdre*, 

207. (•) JUNCUS a) *fpbiofus*. As. *Samudr*.  Cr. Flor. ConfUnt 173.

208. (#) - b) *fubulatus*. - . As. *HalUn**

209. - - c) *acutus*-

210. (*) FRANKENIA *rcvolutn*. - . As. *Hajfibeb*, *Nemdje*. 

211. (a) RUMEX «) *tfgypj.vel comofus*. Cs.

212. - - b) *obtufifolius*. - . Cs. /ftw/iA O ^ a - ,

213. (*) • c) *fpiuofas** - . Cd. *ftdjJeldjebbel.jKx?)* Jos? vel *Hanjab*.

214. - - d) *veficarius*. - . Cd. *hū * >*

215. (•) • o *pietus*. - . As.

O C T A N D R I A .

216. LAWSONIA «) *spinoſa*. - . Ch.

217* " * h) *inermis*. - . Tamrabettne. 

218. (•) PASSERINA *mernān*. As. Met u ān.

219. POLYGONUM a) *marix*. ? Cs. *Gaddaba*. Caule fruticofo, prostrato *, foliū cuneifonnibus.

^30. («) - ^) *pvrjicarto*. - . R\$.

221. (*#) CAIDBEJA *adbarens*. Cd* Lvjbj. t i ' - ^ (For/kaUa* Linn.)
(f) DECAN-



D E C A N D R I A ,

222. CA SSIA <i>a) finna.</i>	Cd.	<i>Sauna tticcli</i> , »Joo Uuu vel <i>Hedjazh</i> حجازي
223. - - <i>b) fistula.</i>	-	Ch. <i>Cb'tj&r Jthambar.</i> خيابر شنبه
224. - - <i>c) Jophera.</i>	-	Ch. <i>Suffer.</i> صفير
225. RUTA <i>a) graveolens.</i>	-	Ch. ئەرمىت/ل. سنداب Petalis lacerate-ciliatis.
226. (\$) - <i>b) tubercuiata.</i>	-	Cd. <i>Meddjennhif</i> , مجنحة
S27, MELIA <i>azeder.</i>	+	Ch. <i>Zanzahcbt*</i> فنخ لخت Folia bipinnata; diupa 5 - locularis!
228. (*) ZYGOPHYLLUM <i>a) prolifmim.</i> As. Cs. <i>ChraJL</i>		
229. (#) - <i>i) defertoruw.</i> Cd. <i>Kamtn Karam&ni.</i> <ji L*yJ' (jj %• Rotrajt. طریط		
230. (*) - <i>o portulacoides.</i>	-	Cd. <i>Djurinal.</i> ^}^A
231. (*) FAGONIA <i>yfafrl»</i>	-	Cd. <i>Djamde.</i> tft>>a.
232. (*) TRIBULUS <i>pentandrus.</i>	-	Cd# <i>Ga/4-i</i> vel <i>Eddrjejfi.</i>
233. - . /;) <i>terreftris;</i> petalis emarginatis.		
234. - - <i>c) lanugiuofiis'</i> ; petalis iutegris.		
235. (*) JUSSIiEA <i>diffusa.</i>	-	Rs. <i>Förgfirt</i> vel <i>Frakabl.</i>
236. («•) ROKEJEKA <i>capillaris.</i>	Cd.	5>i-r vel <i>Rokajcka.</i> عقیقه رحیفه
37- DIANTHUS <i>caryophyllus.</i>	-	Ch. <i>GurumfiL</i> ^JA>3
238. (*) SILENE <i>a) fuccuknta.</i>	-	As. ^
239. (*) - <i>b) villosa.</i>	-	Cs. JT/iM/ʃ#
240. ARENARIA <i>pephides.</i>	-	As. Suffruticofa, foliis carno(is#
241. CHERLERIA <i>fedotics.</i>	-	Cd. <i>Sefiu.</i> Foliis obovato - fucculenr.
242. (#) COTYLEDON <i>deficiens.</i>	Ch.	<i>Vudnc.</i> **>&*
243. SEDUM.	-	Ch. <i>Haj áalam.</i> jJLfi ^s^. Foliis fubulatxs, ipariis, confertis.*
244. OXALIS <i>comicuhta.</i>	-	Cs.
245. (#) NEURADA <i>procumbent.</i>	Cd.	سندان
246. PHYTOLACCA <i>america.</i>	-	Cs.

D O D E C A N D R I A .

247. PEGANUM 0) <i>barmaU.</i>	Cd.	<i>HarmaL</i> (J- ^ ^ <i>Gbalgeteddib</i> , علقت الدبب
248. (*) - /;) <i>rctvfum.</i>	-	Cd. <i>Gbatgb<edd.</i>
249. PORIULACA <i>oteracea.</i>	-	Cs. Ch. <i>Ui#/t' aA^y</i> , <i>flijfc.</i> بقلة
250. RESEDA /i) <i>Jicurfiwa.</i>	-	As. Foliis decurfive-piunatisj foliolis fubapqualibus; floribus trigynis.
251. - - <i>b) luscola.</i>	Ch.	1/rfiA
		252. RE-

252. RESEDA c) <i>phyttuma</i> ,	*	Cd.
253. (») - d) <i>bexagyna</i> .	-	Cd. <i>Dbeudba</i> . فَنَابَا
254. (*) - e) <i>tttragyna</i> .	•	As. <i>Rometjbb</i> . رَمِيْجَبْ
355. EUPHORBIA a) <i>pehft</i> *	-	Cs. <i>MtUh</i> . FoUis integr, oboratis, petiolatis.
356. - - h) <i>ferpyllifilia</i> .	-	Cd. As. •
^57. (*) - 0 <i>retufa</i> .	.	Cd. <i>Mtlhtjn</i> . <i>Ntonwiie</i> , ذَعَانِيَّة
258. (*) • d) <i>obliqnnta</i> .	-	As.
^59. - - 0 <i>polgonifilia</i> .	-	Cd. <i>Sargahtjr</i> ,
260. («) - /) <i>dichotomy</i>	.	As. "
261. (#) GLINUS a) <i>lotoides</i> .	-	Cs. <i>Gbolbajre</i> .
262. (*) - t) <i>cbrypllin</i> .	-	Cd. <i>Ktifjet elbellM</i> . كَشْهَةُ الْبَلَدِ

I C O S A N D R I A .

263. CACTUS <i>cocbeuillif</i> .	-	Ch. <i>Tin fraudj</i> . ^j. ^ i, e. F/Vw «ro*.
a64. MYRTUS <i>brafill</i>	.	Ch. A mnfla. ^ ^
265. PUNICA <i>granatum</i> .	-	Ch. <i>Kwrnnw/j</i> .
266. AMYGDALUS n) f«/V«.	-	Ch. <i>Cbocb</i> . خُوخ
267. - - b) <i>communis</i> .	-	Ch. <i>Lauz</i> .
268. PRUNUS «) «r«Mg.	-	Ch. <i>Mifjmifj</i> . مشمش
269. - - b) <i>domeftic</i> ,	-	Ch. <i>Barqutj</i> . <J* ^
270. PYRUS a) <i>cotmnun</i> .	•	Ch. <i>Kummhri</i> . كمبرى
271. - - /,) Mfl/n;	«	Ch. T>JnM. تفاح
272. (») MESEMBR. «) <i>nodiflor</i> .	Cd.	<i>GAd«/.</i> غاسوؤل
=73. (*) - b) <i>gcnkuliftor</i> .	-	Cd. <i>Samhb</i> .
274. ROSA . . -	-	Ch. <i>Vard</i> . ورن
275. POTENTILLA <i>fupina</i> .	•	Cs.

P O L Y A N D R I A .

376. (*) CAPPARIS <i>Jpimfi</i> .	-	As. <i>Kabbar</i> . ^S („om. latin.)
277. (*) CHELIDONIUM <i>dodtcandr</i> .	Cd.	As. <i>RUjlet tl gbrab</i> . t)JJJI & J
278. PAPAVER <i>bybridum</i> .	-	As. Caule fetis furfum apprTffis. Anb
		tl num. f,y} \ o)
379. (*) NYMPHAEA <i>hint</i> ,	-	Rs. <i>Naufar</i> . >< XJ J,
380. 00 CISTUS <i>ttywifbl</i> *	.	Cd. As. <i>Ctitfta</i> . ^ ^ <i>Surrutim</i> تَتِيفَة




281. (#) CORCHORUS <i>oliiorius</i> .	-	Ch. <i>MtJocMa.</i> مأوخيه
282. DELPHINIUM <i>ajncis</i> .	-	Ch. <i>Ajukabūb.</i>
283. NIGELLA.	-	Cd. <i>Habba.</i>
284- (#) REAUMURIA <i>vermic</i>	-	Cd. <i>MuUich.</i> ملبح Adbbe. عصبه
285. (#) STRATIOTES <i>alijmoid</i> .	-	Rs.
286. (*) ANNONA <i>glnbra</i> .	-	cu <i>fiejcifi.</i>
287. ADONIS <i>nntta</i> .	-	As.
288- RANUNCULUS <i>filler at.</i>	-	Cs. <i>ZagbUI.</i>



D I D Y N A M I A.

289- MENTHA <i>a) longifolia</i> .	-	Rs.
290. (#) - <i>b) gentilu</i> .	-	Ch. نجع
291. (*) - 0 <i>Lwa»</i> vel <i>Nymam</i> .	-	ذمنام vel 8/ol+i
292. TEUCRIUM <i>folium</i> .	-	As. Caulc profratd, tomentofo, albo; flore flavicange.
293. STACHYS <i>oriental?</i>	-	Cd. <i>Roghnt* i-XSj*</i> Verticilli bifloii. Folia fcfillla.. Flores rubii. Frutex.
294. (*) MARRUBIUM <i>plicatum</i> .	-	As. <i>Fraffun.</i> ^J**UU)J3
295 ORIGANUM <i>major ana</i> .	-	Ch. <i>Mardakvff</i> Foliis oppofitis, ovalibus, petiolatis, fubvillois, 5 - nerviis.
296, (#) MELISSA <i>pirennis</i> .	Cd.	Rank. «Jls^ SaJJaret elgabatl. ^LjuJ] tyx**
297. OCYMUM <i>bajilic</i>	-	Ch. <i>Ribluin.</i> ^l a c ^ Orienralibus deliciofa planta ob odorem quam follicite & copiofe in hortis colunt. Rofettse vidi illamq altitudine fequicubitali.
298. (•) LATHMEA <i>a) pbelypea</i> .	-	As. <i>Halûk ribû</i>
299- (*) " *) <i>quinquefida</i> .	-	Rs. <i>Haluk.</i>
300. ANTIRRHINUM «) <i>Ariff</i> .	-	Ch. JK̄M; «/ »A
301. (•) - <i>agyptincum</i> .	Cd.	<i>Dortjfe.</i> a^y^o Afjib ed dib. V^UJJCAJUJM
302. (*) - O ^/ni;fl. *	-	Cd. <i>Halava.</i> vj^s^
303. OROBANCHE <i>a) major</i> .	-	-
304. (#) - <i>b) crenata</i> .	-	Cs. <i>Haluk metabû</i>
305- SESAMUM A) <i>orientate</i> .	-	Ch.
306. - - Q) <i>indicttw</i> .	-	Ch. <i>Semjem.</i> AMAIAV
307» (*) VITEX <i>fig</i> '''<*?• " All-	-	Kaf-marjnm> i. e. OT/iM»f Maria.



T E T R A D Y N A W I A .

308* (#*) ZILLA <i>myagrum</i> .	-	Cd.	Zilla. زilla;
309. (*) ANASTATICA <i>htirkh.</i>	-	Cd.	Rarior. Kuf Marjam, كف مريم
310. (*) LEPIDIUM <i>a) fquamatum</i> .	-	Cs. Ch.	
311. - - <i>b) bonenfe.</i>	-	-	Hnbrayyat. حبر شاض
312. BISCUTELLA <i>didymn.</i>	-	As.	Parva; foliis hiriutis.
313. (*) LUNARIA <i>feabra.</i>	-	Cd.	Vjarba. لـ A
314. (« «) MNEMOSILLA~.	-	As.	(Forjkilea nova)
315. ERYSIMUM <i>barbar.</i>	-	Rs.	Siliqua tereti.
316. CHEIRANTHUS <i>a) cbius?</i>	-	Ch.	Mantur. منتوه Foliis dentitls; fillquis iubuntis.
317. (•) - *) <i>triftit.</i>	-	Cd.	Ntffgrf//. تكيسدة Sjudjara. jjylac**
318. (•) - 0 <i>villofis.</i>	-	As.	
319. SISYMBRIUM AMfitf.	-	Cd.	
320. (*) HESPERIS <i>acris.</i>	-	Cd.	Sphtfri. صفيري C ^{CX} Latin.)
321. BRASSICA <i>a) ohracea.</i>	-	Ch.	Krumb, قربيط كـ (ex Lat. Crombe) vel Kjumb ff.mi.
322. - - <i>b) crncfl.</i>	-	Ch#	Djardjir. Acris, edulis.
323. (•) - <i>c) crajjifolia.</i>	-	Cd.	Krumb bijfahi n.
324. SINAPIS <i>a) nigra.</i>	-	Ch.	Kafar. سـ Semina vocantur Charbat. Siliquif ifthmis Jivifx 6c veluc articular?.
325. - - <i>b) arvcnjis.</i>	-	As.	Knrijli vel Chardel. خردل
326. (*) - <i>c) /j/rr/i.</i>	-	Cd.	Harm- حـ
327. RAPHANUS <i>a) fitivus.</i>	-	.Ch.	Fidjtl
328. (#) - <i>b) lyratus.</i>	-	Cs.	Rffadelbarr. رشاد البار
329. (#) ISATIS fl) <i>egypsin.</i>	-	As.	
33°. C*) - <i>b) pinnata.</i>	-	As.	


M O N A D E L P H I A .

33T. (#) GERANIUM <i>a) malacoides.</i>	Cd.	جـنا
332. (#) - <i>b) crnffifolium.</i>	Cd.	Tuwtnajr." Kabfji*.
333. - - <i>c) maritimum*</i>	Cd.	Fqliis laciniatis.
334. (*) - <i>d) bivtum.</i>	Cd.	
335» " 0 <i>uconmm.</i>	Cs.	
336» (•) " /) <i>trtnngulare.</i>	Cd.	

337. AL-



- 337* ALTHEA *cannabiua*. - Cd.
338. ALCEA *ficifoliat* - Ch. *Cbatmit*. سفافر. Calyx exterior g-fidus'j
quapropter ifte charach confans eft^
339. MALVA *rotundifolia?* - Ch. *Cd. *Chobbcize*, ^rij^Q^ Sativa, edulifc
340. GOSSYPIUM *a) berbaceum*. - jCh.
- 34 [. - - b) *arbor cum*. - Ch. *Com el fadjar*.
342. («) HIBISCUS *a) ficalneus*. - Ch. *Bami*.
- 343 (#) * ^) *eftuUutus*. B) *Banna*. sjyoU Fruclu hispido.
344. (*) - " B) *Bf*. Kf*i. vel BWfcA Fr. glahro.
345. (*) • 0 *Jyrteus*. - Ch.
346. - - d) *trionum*. - As. Rarioiv
- 347* (*) STEWARTIA *corcloroides*. Cs.



D I A D E L P H I A,

348. FUMARIA *a) officiu*. - Cs. *Sjabtaredj* شہترج
349. - - If) *capreolata*. * Cs.
350. PHASEOLUS *a) Lubia frandju* لوبیہ
351. - - b) *Lubia babbefibù*
352. - - 0 *Lubia ballcdù*
353. (#) GENISTA *fpartiuml* - Suès. *Ratam*.
354. (0) ONONIS /1) *cberleri*. - As.
355. (*) * b) *Jlrrata*. - As.
356. LUPINUS *a) lugufifolius*. Cs. *Termiseljjaitatt*. i.e. *Lnp. diaboli*; quia
fe misct Lup. vero. Non cdulis. Appendix Calycis magna, ovata.
357. (*) - b) *termis*. - Ch. T^فfw; قرمص
358. (*) - 0 *digitatus*. - Rs.
359. (#) COLUTEA ^inefa. - Cd. *Ksdiâd*. كنڈ
360. DOLICHOS <i>*lablab*>. - Ch. *Liblab*. لبلاب
361. (#) - b) *fitunfa*. - Rs. *Öllaab'*, commune nomen fcandardiuiH,
362. (*) - c) *sesban*. - Ch. *Seifebdu*. ^LOUWAXA*
363. ^#) - d) *lubia*. - Ch. I<4/fi balledù
364. LATHYRUS *nruicuhtus?* - Cs. *Dobridj*. دهربی سلیکس glabris.
365. Vicia fl) /i;/r. - Ch. Fil. ف
366. - • ^) *fitiva*. - Rs. *Faurûm*, i. e. *Faba Graca*.
367. - - 0 *lutea*. - Bacbra.

368. CICER ariminunu		Ch» Homos Q&4&* vocantur pife vel fru- chis: plaiita *dum fiiqnas habet Melān.
369. ERVUM Uns.		Ch. Ads. عدس
370. GLYCYRRHIZA		Ch. Örkfis. عرق سوس
371. HIPPOCREPIS bifiliqua.	-	As. Rarior. Leguminibus effilibus, geminatis-
372. SCORPIURUS fuhvilhfus.	-	Cs.
373. HHDYSARUM n) cnput gallu	-	As. Repens. Stamen X:mum liberum , ftig. ma supra barbatum. Fru&us monofperm. ebinatus.
374» (*) - & nlbngu	-	Rs. Cs. Agub.
375 (#) INDIGOFERA tmfarha.	-	Ch. Mile. ميل
376. O) ASTRAGALUS a) tritneflr.	Cd.	Cbamf.irat elarnfe. خنثرة الـروين Legumina femiovata , lubeus plana.
377* - - b) cicer.	-	As.
378* C*) - 0 annulari*.	+	As.
379. (*) - *0 frut'tctthfus.	•	Rs.
380. TRIFOLIUM n) melil. hid.	-	Rs. Frequens. Rekrak. قرافق Legumina oblonge circinata.
381- CO - *) «rf- & ff*f* vel	bicornis, Cd# Gurt. Djulhān.	
382. (*) - c) akxnndrinum fativum > ubique.	Berfim. (<***/* vel	Berzān.
383. (#) - d) fragiferum.	-	Cs.
384. LOTUS ») cornicuhta.	-	Cs.
385- c*) - *0 crezica.	-	As. Efjba.
33^ - - 0 villosa.	-	As. Knrn elgihah Leguminibus fub - biiati*, teretibus, fubcurvis; cauiibus prostra- tis; foliis quinatis, fttofis.
387. (*) - a) rojen.	-	..
388- TRIGONELLA n) /«». gr.	-	Ch. Ifofle. KAI^.
389- (*) - ^ bamofi.	-	Cd. Adjehnalek. Daragrag. بارگ
390. (#) - 0 ficUata.	-	Cd. Ḡrgw.
391. (#) MEDICAGO polymorph.	Cs.	Nrsc

POLYADELPHIA.

CITRUS. Species & Variat. plures in hortis Kihirion;

A.) AUR^NTIA.


392. - - n) Htrindj hgfo حلو نارنج & Nar. makeb.

393- - - h) Nnr# Bortffghal, برتو غال

W) MEDICA.

B.) MEDICA.

394. - - 0 *Limūn mnlcbb.* لموں ملے
 395. - - *) *Lim. Haiti,* d.a. لموں
 396. - - 0 *Idalia hxlu.* C/JL* لموں کایہ
 397. - - d) *Idalia rnnlelb.*
 398. - . Limūn [jsW'u]
 399. - . Kabħadd. tjL>J==>
 400. - - g) *Ntffafcb.*
 401. * - *) *Turundi balledi.* JB*J» vel قمرنی
 402*. - - i) T<r. mfabbfl*




S Y N G E N E-S I A.

- | | | |
|--|-----|--|
| 403. TRAGOPOGON <i>picroid.</i> | - | Rs. Foliis liaftato-finiatis, |
| 404* (*) SCORZONERA <i>a) tingit.</i> | Cd. | Nuggd. jX> |
| 405. (*) - i) ci//i/r# | - | Cd. Nuar. Sjadtjd. Hauve. jj^Ck |
| 406. PICRIS <i>a) bkrncoid.</i> | - | • Cs. |
| 407* - - b) <i>ecbioder*</i> | - | Lit&djii. |
| 408. CATANANCHE <i>flore flavo.</i> | - | !**/*/>• |
| 409. (#) PRENANTHESyjino/i. | | Suès, Ghobeibe. J b ^ A |
| 410. (*) CREPIS <i>radicata.</i> | - | Cs. Sragba. Hauddu. ^dy* |
| 4CT. SONCHUS <i>a) oleraceus*</i> | - | Cs. |
| 412. - - b) <i>arvenſit?</i> | - | Rs. Pedunculi non hifpidi, fed fubtomentofi.
Calyces glabri. |
| 413. LACTUCA <i>a)fativa.</i> | - | Ch. Cbajf (^ a* acbdar vel affar. viridis*
£) rubra : Cbnjfnhmar vel tamrobeudū |
| 4T4. - - b) <i>faligfn.</i> | - | Cs. IiW*> /jfnejwi. |
| 415. (#) LEONTODON <i>u) wucronar.</i> | Cd. | Jamrur* |
| 416- (#) £) <i>fifpcrum.</i> | - | A*. |
| 417. HYOSERIS- <i>bedjipnois.</i> | - | As. |
| 418. LAPSANA <i>l) capillaris?</i> | - | Cs. Caule non prorfus filiformi. |
| 419. (*) - £) <i>rarnxacoides*</i> | - | As. |
| 42c* CICHQRIUM <i>n) intybus.</i> | - | Ch. Sjikurie. S3 ^%3QW hifpidum, viridi-fufuui.
Hendeb. <-ijkXsb |
| A H. - " ^) <i>wdivia.</i> | - | Cs. Ilendibe* &}>*& |
| 422, (*#) POLYCfel HALOSyitf»fcim. Rs. | | Habtgbag. ^ |

423. ECHINOPS *ftbarocepib.* - Cd. *Cbafjir.* *Aurā vel Sjtk ejfjemmel'*, i. e. *Cnrduu Qumeli*; planta Camelio non ingrata, licet acutiflora. Capitulo albo.
424. (#) CNICUS *fpi noſſimus.* - Cd.
425. EUPATORIUM *odoratum.* - As. *Barnūf** Folia lanceolata, non deltoidea. Pappus non plumosus.
426. («) SCOLYMUS *bifpamcus.* - Cs. *luthUb**
427. CARDUUS a) *mari**. - Cs. Folii variegatis.
- 4²8. - - /;) *Jyriacus.* - C^h. *Lahlab* £ifa[^] Folii albo - maculat.
- 4²9« • - 0 foliis decurrentibus. - As. *Libd,* *Flore rubro.*
430. CYNARA *fiolymus.* - Ch. *Cbnr/juf:* nomen ab *Articbot* mutuatum.
431. CARTHAMUS *tinctor.* - Ch. 6/far. yf.vig *Qortom.* JbJ^{*}
432. (*) CHRYSOCOMA a) *mucron.* Cd. *Dfifra.* CJ[^]Xō
- 433* * " b) *ftiçatn** - Cd. Herbacea, caulis diffusis. *Folia* linearia circa capitula. *Flores* per totum caulem capitati.
- #
434. (*#) KAHIRIA. - Rs.
435. (*) SANTOLINA a) *terrefiris.* As.
436. (#) - b) *fragramiffimn.* - Cd. *Kdjfum.*
437. TANACETUM a) *balfamita.* - Ch. *Bel/ama* vel *Mclfene.* aJLuJLo
438. (*) - b) *bumile.* - Cs.
439. ARTEMISIA a) - Ch. *Sjabe** 8/Auu denotat *capillos incanos*; nomen aliis quoque additum plantis foliis villosi-cinerascens & *Licheni*. Similitudinem habet cum *Hebr.* plD[^]U^{*}
440. - - h) *abrotan?* - Ch. *Semfak* vel *M/aka7*
441. GNAPHALIUM «) *marqarit.* - Cs.
442. - - /;) *obtufifolium.* - Cs. Caulibus profhatis.
443. (#) CONYZA *odora.* - Ch. *Barnuf* C[^]%iy.i
444. (#) - A) *tomcmofa.* - As. *Tom erncb.* vel *Motto).* ^Ja*
445. (*) ERIGERON */erratum.* - Cs.
446. SENECIO a) *bieraci/olius.* - Cs. *Kus.* Flores sub - umbellati; coriandriformes ; folia pinnato - (inuatt.
- 1 447. (#) - ^) *fyualidus.* - Cd. Frequentifl. *Korreis.* O[^] ^ J^{*}
448. (*) - 0 *fuccuUntus** - As.
449. (#) ASTER *crtffus.* - Cd. *Sabat.*
450. (*) INULA *dyfenterica** - Cs. *Rarha ejub.* O[^] o l[^] y[^] r^{*}
- 4SI. TAGETES «?/!. - Ch. *Gatife** fciuJaJ



452. CHRYSANTHEMUM *figet.* - As* *Gahvaih*
453. (•) CERUANA *pratcnfis.* - *Karunn**
454. ANTHEMIS *a) Erbsjan.* دیار جیا Cs. Flore albo; foliis linearibus.
455. - - *h) arvenfis?* - Cd. *Aingou Jaif[^]AC vel O * & £ Frac^b imanligb.*
Folia linearia, bipinnatifida, bafi pinnis confertis, dentatis; radio albo; rcept. paleaceo.
456. - - c) Ni/ggA نجد Cd. Folia amplexic. dentato - lacerata, villofa,
Recept. paleaceum; pappus nullus.
457. - - d) *Fracbomall* - Flore albo; foliis multifidis, linearibus,
fubvillofis.
458. ACHILLJEA *a) fakata.* - As[#] *Bsstran.* بعینتر J Kajfitn قيسون
459. - - b) *lobat filia.* - As. Parcius.
460. (#) MICRELIUM /i) *ajleroides.* Rs.
461. (*) BUPHTALMUM *graveolens.* Cd. *Rabd.* ربد
462. HELIANTHUS *annnus.* Ch.
463. CENTAUREA *a) mofchatn.* - Cb. Amhar.
464. - - b) *Uppiū* - Cd. *Cbaifarān.* خینر اپ
465. - - c) *eriopbora?* - Cd. *Jaturtr** جابر vel فلک Folia vix
femi - decurrentia ; flores albi ; Anthers interdum rubrae; & pe albs.
466. (#) - d) *calcitrapa.* - Cs. Morrejr.
467. (#) - 0 *cnrduus.* - As. Akaffj.
468. (*) - /) *mucronuhta.* - As.
469. (») - g) *acwlis.* - As. Serrtit enaghñ
470. CAENDULA *officiv** - Cd. *Tubb ajnh* vel *Kabbli.* سبله Semi-
na difci vix bicornia; potius falcata, vel hamata.
- 471* VIOLA *odora.* - Ch. Benaffidj, بعنان



G Y N A N D R I A .

- 472* C##) MOSCHARIA *afierifoHa.* As. Mlffkka.
473. PASSIFLORA c ^ ^ . cb. *Sjtrktlfikk.* flip, falcate
- 474- ARUM *vhc.fi.* . cb. jr.ttfc ^ v U U Prope Rofcttam tot^o
agris colitur.

M 0 N 0 E C I A.

475-	CYNOMORIUM <i>coccineum</i> .	As.
47^.	LEMNA <i>folyrrhiza?</i>	Rs.
477-	ZEA <i>mnej*</i>	Ch. Durra. ضری
478.	COIX <i>lacryma Johū</i>	Ch. Dimmā ajab. دمع ایوب
479-	CAREX <i>arenaria.</i>	Cs _#
480.	URTICA <i>pilulifera.</i>	Ch. KttrrcSt قریص
481.	MORUS <i>a) alba.</i>	Ch. <i>Tilt,</i> o y * Foliis palmatis,
482*	<i>I) nigra.</i>	Ch. Foliis cōdatis.
483.	XANTHIUM <i>fstrutnar.</i>	R. Ch. Chnrtca elbähr.
484.	(#) AMBROSIA <i>villojifima.</i>	Ch. Dəmfise. دمفسی
485.	AMARANTHUS <i>Wzrw.</i>	Ch. F//?i klbd.
486.	<i>b) arift at us.</i>	Rh. Parvus, cuin ariftis.
487-	PLATANUS <i>oriental</i>	Ch. Sdlnar.
488.	PINUS.	Ch. Snobar. صنوار
489.	CUPRESSUS <i>fempervir.</i>	Ch. Saru. سارو
490.	(#) CROTON <i>n) fwflor.</i>	Ch. Gbobajre*
491-	<i>IS) argent aim</i>	Ch.
492.	(#) RICINUS <i>wrficiK.</i>	Ch. Cbarua. خروع
493-	MOMORDICA <i>fl) bnlfamina.</i>	Ch. BaUeJhn.
494-	<i>h) luffa.</i>	Ch. Luff* لف فوفع Confiftentia interna Til-lofa; a fcēminis utitur in balneis.

C U C U R B I T A C E A
i E G Y P T I E T A R A B I J E F E L I C I S .
Maximam partem descripta Cent. VI. 40—62*

A) CUCURBITA.

495'	- «) IAGENARIA. <i>Qnrd m'daucr,</i> j ^ d * * p / * Ch.	
49^«	- - /;) <i>Uubba dybbe.</i>	Ch. M6r & Ch.
497*	" " 0 <i>Q2' & tMvil,</i> <i>Jlaid c ji</i> Ch,	
	B) CITRULLUS.	
498-	- • <0 <i>Dnbba farakis,</i> MOR. Ch. -ffigyptiis <i>Battich.</i> £Ja* Distinguunt hunc Arabcs a <i>Barticb trulli) vero,</i>	جربیخ
499.	- - e) <i>'Scburredj.</i> شربیج Hadie.	
500.	- - f) <i>Knfch.</i> قاش ibid.	

(2)

C) PEPO.



C) PEPO.

501. - - g) P» *longn** - Ch. *Kara* vel *Gartia*.

502. - - h) *Qara' ftamb&lu* - Ch#

D) CUCUMIS.

503. - - fl) COLOCYNTH. - Cd# *HamdaU* هندل

504* - - b) ANGURIA. - *Mufa'y Jetnen*.-

505. - - 0 TRILOBATCJS. - *Taas*.

506. - - d) *Mhalmta*. - *SurdM*.

507* - - 0 MELO- *Dummajri*. ضمیری Ch.

508. - - /) CHATE. *Abdellav'u* الْأَوْي d*fx feu *Adjur*. *Jr^sp* Ch.

509. - - g) *Mebanavi*. - Ch. priori affinis. *Frūccus* globofo-ovalig.

510. - - b) ANGULATUS. *KduUH*. قاوجب Ch.

511. - - i) SATIVUS. *Fak&s** قنوص Ch.

512. - - ft) *Smillu* - Mör.

513. - - l) *Cbiar*. لـ - Ch. An idem cum priore ?

514. - - w) *Qatte*. قـة vel sSS Ch.

515. - - ») *Battlc b Djabbeli*. Ad *Birke*, cultus ab Arab, monticolis*

516. - - 0) B *brylloju* Cultns ad *Bryllōs* promontoriuin *Delsa*.

517. - - p) ^B » *bdlhdni* Mediae magnitudinis.

518* - - fl) B- ennemes. (JJU**) ^ Ja? Ch. Rarior.

519* - - y) B. *adjrub*. C^r^I - Ch. Cortice albo.

520. - - -0 *ArnkU*. U&*\$j£ Mir. Non eduh's.

521. - - /^A *Divzar hcndi* < C\A& /.^Ab. i.e. *Daucus indicus*; radice edull Incfa
vocatus *Gadjer* veT *Schekarkatid*. Cucumis ex India paucis hortis
illatus *Zebid* & B<> </i^/A.

522. - - u) *Schemmām*. ^ I ^ i - Ch# (Dudaim LINN. Sp. PI.)

D I O E C I A.

523. (*) SALIX a) *sgyptiaca*. - Ch. *Ban*. ^U CW#: خلاف

524* - - b) *btibylonica*. - Ch. &iffaf, oLwajLo

525. - - 0 *fmpjlis*. Petiolis non glandiferis.

526. - - ^) *cbalaf*. - Ch.

527. - - O /l/fa/balledi. i. e. *indigena Salix*. /Egyptiaca. Frigoris impatiens,

528. PISTACIA a) *vera*. - Ch.

52\$. - - £) /tf"/f* Alepens* Fy/?«^ QI^A * ^ vel <JUNU5

530. CERATONIA	<i>filiqua.</i>	•	Ch. <i>Qbarftb. yj A-</i> <i>Quq Alpino & Offlc.</i> <i>Siliqua dtthis, non eft/io;Vii; prout Ceratoniin defignot LINN fed hermaphr. hexandra, uionogyna;. raro heptandra. Semel florentem vidi Alexandria?.</i>
531. SPINACIA	<i>okracea.</i>	-	Ch. <i>Esbanatb.</i> <i>سبانخ</i>
532. CANNABIS	<i>fativa.</i>	-	Ch. <i>Sjnrnek.</i>
533. POPULUS a)	<i>alba.</i>	-	Ch. <i>Hour abjM*</i>
534. - - V)	<i>nigra.</i>	-	Rs. <i>Baksi nomen i?tfj'.</i>
535. EPHEDRA a)	<i>diftacbya.</i>	-	Cd. <i>Oqqdit. O ^i i vel Alde.</i> <i>علد</i>
536. - - b)	<i>aphylla.</i>	-	Rs. (cfr. Cent. VIII. 96.)
537. RUSCUS.		-	Ch.
538* (#*) - ffiRUA.		-	Cd. <i>Rarior. Sadjnret enntidji «arūJi g/F</i>
539. (#*) UiiEBA		-	Cd. <i>Ldbacbeldjabbel.</i>

P O L Y G A M I A .

540. MUSA	<i>pnradifiaca*</i>	-	Ch. <i>A/owz. j.yo</i> Alexandria non colirur; Rofetca? primuin mihi vilā fponte & fub dio ciefcens.
541. («) ANDROPOGON	<i>annuhtum.</i>	Rs.	
542. (#) HOLCUS n)	<i>facbarat.</i>	-	7 TM W. Cereals
543. (#) - b)	<i>durraballedū</i>	-	Ch. Ccreale.
544. (#) - 0	<i>docbna.</i>	-	Rh. <i>Dochn.</i>
545. (#) - d)	<i>exiguus.</i>	•	Rs.
546. VALANTIA	/J)FM.	-	Aff. Seminibns afperis, 4-fariam imbricatis. Confr. F/. <i>Malt.</i> 85.
547. PARIETARIA	«) <i>oflicin.</i>	-	Cs. <i>Haffijjet trribb.</i> <i>الحبيشة</i>
548. - - /')	<i>judaica.</i>	-	Cd. Cs. <i>Roqrek.</i> <i>فريق</i>
549. ATRIPLEX /i)	<i>gflwcl.</i>	-	Cd. <i>Gatnf vel R.^/MJ. u-XCy,</i> Folia pkna angilata; pifillum bifidum, longmn.
550. (#) - /?)	<i>portuhcoides.</i>	-	Rs.
551. (#) - c)	<i>corhcen.</i>		As. <i>Ratam.</i>
552. (#) MIMOSA /)	<i>fcWei.</i>	-	Ch. <i>laha'ch.</i>
553. - - b)	<i>fcсрpioidcs.</i>	-	Ch. <i>Fstne. &XB</i>
554. - - 0	<i>nilotica.</i>	-	Ch. 5V»»r. UÜJO <i>Qnrad.</i> <i>فرض</i>
555. FICUS a)	<i>c/iric/i; bertnapb.</i>	-	Ch. T/«.
556. (#) - V)	<i>ficomoruu</i>	-	Ch. <i>Djnmmciz.</i> >**3±



C R Y P T O G A M I A .


557. ADIANTHUM <i>capill. veii.</i>	-	Cs. <i>Kuzbarct elhir,</i> A*JJ %**،
558. MNIUM <i>bydrometr.</i>	-	Cs.
559. LICHEN <i>fcypbifer.</i>	-	Cd. <i>SjdbetldjMel Juçsr J ساجوں Sjadjarat en neda.</i>
560. («) FUCUS <i><i>prolifer.</i>	-	As.
561. - - <i>l></i> <i>mufeoides?</i>	-	As. <i>Húffifetetioöbán.</i> ^JJIA
562. - - c) <i>callo-pilophorus*</i>	-	Sues. Concbis affixus. <i>Cabal.</i>
563. (#) - d) <i>atticnlatus.</i>	•	Sues.
564. (#) - e) <i>denticulatus*</i>	•	ib.
565. («*) - /) <i>ffrj/J»x.</i>	-	ib.
566. (#) - g) <i>racemofus*</i>	-	ib.
567. CONFERUA <i>agagropila.</i>	•	As. Brunea. Et ad Eftac reperta.
568. LYCOPERDON n) <i>n//;er.</i>	-	Cd. <i>Kamxh.</i> 543
569. - - b) <i>pcdunculntum.</i>	-	Cd [«] <i>Barnūk.</i>
570. (#) SPONGIA a) <i>offic.</i>	•	<i>Snis.</i>
57F. (*) - b) <i>rubra.</i>	•	ib.
572. (*) • 0 <i>nigra.</i>	•	ib.
573* (*) " * <i>flahcliformiu.</i>	-	ib.
574» (*) ULVA <i>oryziformis*</i>	-	As.



575, PAJLMA PHOENIX <i>dnctyl.</i>	-	Ch. Nflci/. Jsfc ⁵
575. ~ - I3ORASSUS <i>flabell.</i>	-	Ch. <i>Down.</i>



F L O R A
ARABICO - YEMEN.
SIVE
C A T A L O G U S
P L A N T A R U M
ARABIA FELICIS
S Y S T E M A T I C U a



NOVA GENERA.

TETRAND. i. GYN.	SCEURA.	-	SCHURA.	
	SiELANTHUS.	-	S.ELA. سلع <i>JiMLXS,</i>	حلص
	r MESA.	-	MAAS. منص	
	ANTURA.	-	"ANTHUR.	
	CADABA.	-	KADHAB.	قطب
PENTAND. I.GYN.	DIGERA.	-	DIDJER.	
	CATHA.	-	KATH. قاذ	
	MELHANIA.			
	HYPERANTHERA.			
	GERUMA.	-	DJERRUM, جرم	
2. GYN.	PAPULARIA.			
	ROCAMA.	-	ROKAMA.	رقمه
3. GYN.	SU^SDA.			
HEXAND. 1. GYN.	ADENIA.	-	ADEN. عدن	
OCTAND. 1. GYN.	BINECTARIA.			
	SODADA.	-	SODAD.	
ENNEAND. I.GYN.	VOLUTELLA.	-	"HADEG MÖDEG.	
f I.GYN.	CADI A.	-	KADI. قضي	
DECAND. 3. GYJJ.	CAUCANTHUS.	-	KAUKA. قوع	كعك
DODECAND. I.GYN.	CULHAMIA.	-	KULHAM.	كلح
	f MERUA.	-	MJERU.. مرو	
	ONCOBA.	-	ONKOB. عنقب	
POLYAND. I.GYN.	j CHADARA.	-	CHADAR.	خدا
	I ORYGIA.	-	HÖRUDJRUD.	هرج
	f CHARACHERA.	-	FREFRAN. ^ J.J b, J	
DIDYN.	ANGIOSP.	SIMBULETA.	-	SYMBULENNISEM سنبلة النسم
MONAD. io. AND.	ELCAJA.	-	ELKAJAJ ROKA,	قع
MONOEC.	{ 2. AND.	KOSARIA.	-	KOSAR. jaOʒ
	5. AND.	TURIÀ	-	TURI^E.
DIOEC.	5.AND	{ CEBATHA.	-	KEBATH.
		JERVA.	-	iERUA. ijja
		KEURA.	-	KADI. KEURA,
POLYGAM. 1.oic.	{ THEMEDA.	-	TH1:MFD.	
	SEHIMA.	-	SEHIM.	سيم

NOVA GENERA.

TETRAND. I. GYN.	SCEURA, S.&LANTHUS.	-	SCHURA. SELÄ. سلع HX.tKS, حلس
PENTAND. i.o. <	r MESA. ANTURA. CADABA. DIGERA. CATHA.	-	MAAS. ماس ANTHÜR. KADHAB. قطب DIDJER. KATH. قان
	MELHANIA. HYPERANTHERA. GERUMA.	-	DJERRUM. جرم
	PAPULARIA. ROCAMA.	-	ROKAMA. رقمه
	3. GYN. SU^SDA.	-	
HEXAND. 1. GYN.	ADENIA.	-	ADEN. عدن
OCTAND. 1. GYN.	BINECTARIA. SODADA.	-	SODAO.
ENNEAND. I.GYN.	VOLUTELLA.	-	"HADEG MÖDEG.
DECAND. { 1. GYN. CADI A. 3. GYN. CAUCANTHUS.	-	KADI. قضي KAUKA. قوع	
DODECAND. I.GYN.	CULHAMIA.	-	KULHAM. كلهم
	f M^RUA.	-	MJERU.. مرو
POLYAND. I.GYN.	ONCOBA. CHADARA. [ORYGIA.	-	ONKOB. عنقب CHADAR. خدار HÖRUDJRUD. هرجمج
	f CHARACHERA.	-	FREFRAN. <i>ilj A*j</i>
DIDYN. ANGIOSP.J	SIMBULETA.	-	SYMBULETENNISEM سنبلاه النسم
MONAD. 10. AND.	ELCAJA.	-	ELKAJA; ROKA. قفع
MONOEC.J,	f 2.AND. KOSARIA. <i>rj.j.j...</i>	-	KOSAR. قصر TURIJE.
DIOEC.	f CEBATHA.	-	KEBATH.
5-AND j	^ERVA.	-	iERUA. اروا
	/ KEURA.	-	KADI. KEURA,
	f THEMEDA.	-	THI:MFD.
POLYGAM. — ^w	i. oic. SEHIMA i	-	SEHIM. سهيم

F L O R Æ
A R A B I A F E L I C I S
IDEA

GEOGRAPHICO - PHYSICA.

KAHIRJE ab oriente *Planifies* adiacet arenis inundata, qws venri in cumulos & longa juga congerunt, muwm, minuunt. Plants hie paucissimae & vi- lioris ordinis : *Zyophyllum defert.* *Santolina fragrant.* *Mrjhmr, geniculifl.* inrerendum *JUtmofa nilot.* Foutes aquae viva non defunc: MAT AREA, & adhuc unus alrcrque irineranribus notissimi.


COLLES CALCAREI deinde obveniunr, continuari ad Mare Rubrum, ejusque littora occidentalia feuenres. Superficies apparet *nigraf* fole quad uftulara lapide maculis albencibus perlucente. Alii cernuntur Colles, forte *cvtatti*, rubro nigroque variegad In *terram* nigram refolvitur crufa; ipfe ver lapis in terram feu pulverem album & calcareum* plantis quibusdam recipiendis aptum. Clivus *gradibus* descendit; an vero caufa fit materise adefarruptio, vcl vis maris olim alluentis, hanc litem noſtram non facimus*

SUES in fundo lira eft, quern horret Flora tam horrenſis quani fpontanea. Pifces & Conchylia abunde proft.mr; aft Vegetabilia efcultanta aliunde adferuntur. *Tōr* fruttus varios & daftylos mitrit: *Gaza* melones fipidiflimos. Aqua dulcis putei *Nabce* in deferto & Arabum territorio, ex eorunt* dependet gratia,

DGIRR & MOSBEIHA Valles propinqux aqua pluviali & ftagnante plau- tas quasdam nutriunr.

GHOBEIBE prope collem calcareum *Thermas* effundit, & in littore pa- luftri tepidoque *Jlrundines* (Cent. I. 83- 84.) ^{N & O} ignotas copiofe fovet. Magno commerciorum reditu longe lateque transferuntur.

HAMMAMFARAUN e regionc Ghobeibe *Fontem aqtw calidce.z* crypris emittit montis calcarei. Canaliculi *arenam ferro* impraegnatam ferunr; qua- lem quoque in littus undae marinx ejiciunt. Lapilluli incrustantur *Sals*, gufti *nitrof*, cum Aqf non cfFervfcente.



MARE RUBRUM ia Sučnfi Sinu proiiinditatem !*• orgyar. habet. Loci fòrma anguftata: brevia longc excurrentia: defeflus planiaruta marinaram; & iūper omnia > abfcntia Corallioruro indicia non contemneoda exhibitent priscae *fatitudinify* e qua propriis areois fe xpulit mare. Fluxurn & refluxum inter Sués & Djiddam reciprocambus peragt vicibus, ajunt Nautae. (*) Fundus eft arena albo-cinerafeens, particulis rotundis, fubinde magis nigro-cinerea, nuiuum in inaduin mixta ConchyKi* (Nautrl.) minutiiSmis.

TOR ptantis tenerioritius haud felicbr trātu Suēnf?, *ariorcr pomonas* utilius colit, adeo ut Djiddac Suēsque fr<£tuum ubcrtatem dividere poſlit. *Palmarwn* fylvute gloria loci fum. Monasterii Graeci Horras *Raithn* ad ftp-tenrrionem procul di urbe *Thermits* includit, & *JtJontes calcareos* crjrptis plenos> forte *Lipicidinis*> praxime habet. Adjacet Va!Jis> quam ELIM putant, celebrem migranfmrn Ifraetitariim ftationern. Cerrc ilia & traQus circa urbem meridioualis Pabnicetis abundant & puteis atpuc> non folurn falfe, verurn & dulcis. *LXX. palmarurn* (Exod. C. 15. v. 27.) numerum totidem defignare Hortos paUnifei-os> vcritati canfcmire videtur magis> quam paucas, nee dim raraa ilatuere arbores, quje nun>erata brevitate famam loco conciliaffentj quern porra, fterilem idiaum n^at *XII. pute&rwn* frequemia.

MONS ZEITIJE (i. e. *Mons olet*) in oppoflta JEgypti Hrtore nomen ob-<nuſt ab *Oleo* (amb. Zsii) an *P*troko?* aqie putcorum innatante: incolis in ufu contra dokwes artuuin.

DJ/EBBEJL SUMRUD (I c. *Mons Smaragdi*) ab ilia remotior> *Smaragdos* pracfantifimos prsebct; ut perhibem Arabes.

DJIDDA plantas tantum Bttoreas nutrif- Arbor Arabiae fylvatica *Sceura* infutis veltire incipi*. Terra provincia? *Hedjas* optima & Alexandrina videtur, fed paſlim vacua propter aquam deficiemem > aut non invetligatato.

GHOMFUDE iiKiririfna urbs termitufis Syrtium CoralKferarom, jnn£lo ,pg© coh<renrium (**). Phntae aliquot marinae in littus arenofa - argiBacQum projiciuntur;

GHORAB

C) *Tefrifit. ArabU* Editoris pv 421.

<**) Inter *Hammam faratin* & Tdr prim* incipiunt Syrar. Incfe ad Provñciam nsque *Almarifch* fe extendmt, InfeUs quoque ambiente*; qocTque magis cfl, procul in mare excorant, & ad faperffein aqaae evedse confpieuntur. Rarius adherent provincia: Yemen. QUITV vane crquarura fedknenta & arens inter hos aggeres 8c littus deponuntur, Goiitinens tanto artiffcia scdificata au<getur. Aft exclufum hoc arte mare> mTupex alia & adhuc non detecla pati- tur

GHO TIAB Infula non procnifoia? terra gaudet calcareo - alexandriiM, are-
iws intermixta. Ltaus .ConchyHis prctiofb afpergitur.

IL YEMEN.

ARABIA FELIX, quam YEMEN nominatvt, longò fe «tendit» trafta-
a Septentrione ad Meridiem. LOHAJA urbs in ifto limits MOCH-HA in altcre-
rcgnum plaudit. Man Rmbro litms dbverm arenofuni vcl argiUaceum. Inde
rcgio ad Orientem diktata cjuamdiu planiriem fervat TEH AM A appellatur. La-
titudincm in area Lobajenfi & Beit el faldenii a man ad montes habet itine-
ris 2 dicrurn. Ftmdtis «ft fttroreus, fev argiHaceo-ffrennfus, ficcus & aqua-
xum fe<<e egenvs; in quo *Pmikum dkhot.* frutioofa vigor ftarura. Circa Lo-
hajiKti & Môr aqua dulcis hortoriwn juvat florem. Campi fecaocur *Fhv*
.pluvia gemiris (UADI) & arte foftematis, quos Arabia fuos Nites vocac; fed ca-
lore tiiuturno exikcanrur totl *Rcgio Mochheufit* quovis anno inond&cur aqua
pluviali e xnontibus descendent; *qax in campo tetercime Sale inquinatui:* (*).

(/ a)

DJJEBBAL

tur deci-ementa, *Tehānn* omnem fcrt rndolcm prfcī fundi, *film* ~~fīrespīcīas~~
urgillaceo -menofum, & *faurn* rfevexum, maxims Mochlia Murāra verfiis. Re-
cedemis vefligia maris monihmnt *Condijtui* & Cor<</ioi>w fragmina in tenant
longe pTOjefla* (cfir. Defer. Arab. || 403.) Nee itiediode effeit arguven-
tum nrniata <civittitutn in Telidnm Facies. Urbs *Zdfid* tempore *Abulfal** GHA-
IEFKAM habuit portum limttum frequentatum^ quem itatic fcopuli Cowllini obt
fidione invida dai&rane. Idem Auflor SCHEUDJE defcvlbit *flnttomm naviuin*,
quam liodie 5 vd i| niill, t5erm. a mari diftantem lnvenimus. *Lolmja, Ho**
dada, Mochba urbe<<recentiois originis funt ignote Abulfed* & Geography
KubienG. (Editor.)

(*) to *Djftbhdt* quovs f<< die ptavia xradit poll ingi^effutn medii menfis Jvftiii, & ad
finein Septembr. coiitinuat. Hinc, non folutn Uadi increfcunt, verum *qu*
in terra remonent humili & montilure cinflo, unde evaportjione 11011 facile
<3iffptlntur; fed toto anno iufficiunt fiiftcntandis fiuviis majoribos; e. g. *ZcMd*
<k Suradj. DjSbbSt. aquam iiab* vel *fontnuauij* vel *phvkUm* &te fervat&m.
Arva enim ad liorizontiem fublata fitum, declivore fetere mnro &(Hncntiir,
in quo *tr^er* taTeus a uln, altus aquatn recipit, fie data poita in fubfellia dc-
mittit inferiora. Inter *Damdr* d: *Sanā'* ad radices moitram fmrgnit *Ciflertu*
aquam pluviale colligunt {k in *tgios* 9 dum poseit .neceflitts; efTmidunt.
Quuin veto in Djabbāl iimlto pluviarmn affluxu lktra U&di.luibaiitur , hinc
non cdluntur.

Omm̄s h<c aqua ad Trfiamam Jefluit & foHicite exc̄pitū; • net nifi sup^flttac
paiti exitus ad mare conceditur. Regio igitui- mpntibus vicma, ftecundior eft
tra&u fittoreo; verum & Tchāma Septentiionalis, quac minus declivis, aqrs
cnitiori lapfu effundit; Mochhenfis regio rapide illasadmare devolvit^ (Edi:oi|)



DI35BBAL *montofa regio* limites ponit Tehāmte sūperficīm fēnfim cle-vanti. 3^{U%}• vallibus divifo tranfit Arabise Penifulam[^] Altitndine prodigiofa & pracrupta eminent Montes haud pauci, fublimem Atmofphaera regioncm attingentes. Vulgnre & quotidianum eft, fumma cacumina nubibus involute videre, & ex hoc apice vallem fubje&am defpicere puram & nube vacuam. Hanc ob caufam liceat montes iftos *Alpts* nominare vel cum Alpibus conferre.

MONTES HADIENSFS *flratis* oblique currunt vel perpendicularirirer abfcinduntur. Mirabili & architeQonica forma effinxit Lithogonia molem eorum *Pentagonis* (Arab. *Saf a eldjcebbel*) diverfae magnicudinis, & montium dorla *Gratibus* arte quafi exfculpfit.

MET ALL A variorum generum in montibus laterei plurima docent signa> quamvis Gens Merallurgiae rudis thefauros effodere nefcit. *Ferrum* (*HddidO^ . O^*) arenx infperfum apparel in canaliculis aqua ptuviali exfeflis. Intcrea adfertur peregrina mercatura, tam prerofum, ut illud per Suès conftet i. Kantar i o. usque ad 12 Patak. Alise gentes, quae montium fuorum venas felicius fecanr, lucrofa hie habebunt negotia quamdiu Arabes sua bona ignorant. (*)

(*) *Carneotus* (*Jkik O^U &*) optimus venic e regione *Damdr* & monte *Hirrdn* inter Jerim & Sanam. Hie quoque fabula, de illius vi fanguinem iiftendi narratur.

Onyx (*Sorjvan* [^]) mira copia per vias & campos diffeminatur, inprimis inter M'harras & Tass_#

Spatum ferrugineum, granulatum, nitens, sūperficie vel undata, vel thryftallos obtufas exierente. In collibus calcareis circa Lohajam frullulis varia magnitudinis immifetur simul cum fequentibus.

Setenites fufca, fub-opaca. *Alia:* alba, pellucida.

Lapis Calcareur rudis, cinereus, mollis, *Iriabilifflmus*; argilte per ftrata tdmixtus.

Gipjiim hyalinum, femipellucidum, particulis incertae figure; sūperficie aculeos emittente obtufos, denuo ramificatos. Stratis cum Argilla alternis jacet' lamellis *Gipfi* i vel 2 lin. craffisj argilta multo tenuioribus.

Cox friabilis _f cinerea, cum Aqf. effervefcens. Ad orientem Lohaic montem conftituit. -ffidibus urbis ftruendis infervit.

Schifius friabilis, cinereus, venis albanticibus, interdum rubentibus, ftratis perpendicularibus abfeindens ftrata Lapidis cotacei.

Mareafita sphsericae vel XIMaterales, c centro radiantes.

KOSCHAA Coilis Lohaja i. mill diffam* *Sale Gemma* gravidus, angustus, in Icngum exiens; torus compofitus *argillm ferruginea*, aqu.t folubilr, mixta arena rubicundi coloris | fait incubente & ex ea faporem contrahcm?. Crufta montis lapidibus calcareis oneratur disjeclis, vel per ftrata dtgeftis. Salis suprema fuperficies idem plamtn borizontale cum terra vidna habcr. Propter praefentem hanc copiarn jion effaditur du&ibus in profundum defceftdemibus: Maflse majores cubicar; mioores fine ordine coagul^tat., partkulis tamen regulribus, albis & pellucidis. Phirimx antiquiraris *Salina^ amkjuior* taracn *alia* in Colle aliquancum remotiore, jam deferta* illapla quondam fornice.

*Men** *Salts Gemma* prope Hodeidam „ major LohajenT; mercaroribus non ignotus> qui Infutam Kamerdn incerdum adeunt & naves Side onerant*

TEMPERIES AERIS mutationes dhrerifftmas fubir in rcbgne ram nræ qualiter divifa. *Tehdma* magno vexatur ardore & toto faepe anno nulfis (olatur pluviis. *Mont of a* regio aerern fpirat puram Hberumque; & quamvis tama altitudo frigorem noftturnum inducit, nullas ramen hyernes novir tarn fortes, ut nives coagnletvt permanenres. Nix quaccunque dcroum fir, fcvis & rara refrigerii vices pne(kt, & fofo oriente cito fotvirur. Menie Manio pkntse florent omnes, inter quas plurimx ex Indicia defcendunr proavis, Hinc extrema patet differentia *Clhnatis Alpni B&realis & Arabid%* (*)

(*) Offfetvationet Thermometricj regionis aprica & montojk:

		h. 7. a. mv	h. r* p. m.	fi^	i.c. p. m.	
<i>Belt elfakib.</i>	Mart. d. 16.	Reaum. 19½.	Fabrenh. 76.	Reaum. 28.	Fahrenh» 95.	Reaum. 21¾.
	d. 18.	20.	77.	28.	95.	21¼.
<i>HadU*</i>	Mortd. ig. I	17%.	7*-	I ^7>	9* »	g o1H 78-
<i>Bul^fi</i> ^ hor. altfor.	Mart d. 20.	16J.	69^	I^	&5J-	i8j> 73*

MokojM, if.hor. itin. supra Bulgofi Mart. i. 21. >. 2.p»n». Reaum. 17^, FaTir. 71.

April. 2. <i>Taas</i>	h. a. til.	5: 45»ibleor» 9^.	Reaum.
- - - - -	6: 15*	• to f	-
- 3* Ro^Mi	• 5: 40.	- I&.	-
- * 4. Öhi/f	5 : 45*	- 16.	-
Jvm# 12. <i>Dorebat</i>	5: 30.	- 14*	-
- 30* <i>M'barras</i>	6. -	- io1.	-
• - - - -	2. p. m.	- 19 .	:



III. STATUS FLORAE ARABLE YEMEN.

Brevis hsec delineatio Arabia? Yemen ipfas simuT Flora defignat provincias, quas inter fc diverfiffinas obiervamus, & a Mappa* Geographico-phyfict *jf Egypti* fitu & civibus diftinctas. Hxtc enim regio Hortus vere aconomicus, herbaruni arborumque utilium numero & infstitutione Arabiam longe fuperat. Valet fativis & spontaneis apricamibus, limofis, fluvialibus. Contra, Yemea vincit plantis llatus liberi & folo Naturae arbitrio adminiftraris, Nemorofis[^] Monticolis, Scandentibus, quibus immixtae vigent hofpites rarioris odventus ex India, Africa & Syria. Geogoniae favor terrain varia pofuit altitudine hujug Zonse plantis apta. Moiues produQi jugis, vel divifi vallibus magis minusve declivibus, totidem adornant Floraftationes. Ec quod omni admiratione dignum eft, plants non inimicam vitse fux inveniunt tempcrieo aeris ipfis in Alpibus, ubi foventur tepore aequali Orbis Borealis sftivo, & nubibus incumbentibus refrigerantur.

Ex praefenti tamen Catalogo divitias Floraefupputare non licebit: ?viaatoria enim eft indagatio & transcurfu femeftri perafta, Herbationum itinera ingreffia Lohaja; fine menfis Decembr. A. 1762. & circa Taxs prsecifa initio menfis Junii A. 1763. Quapropter defideratur planrarum numerus dimidi adhuc anni. Quamvis enim Arabia fempervirens eft, Vegetabilia tamen ordinem xrat3 & mortis Iequuntur, & brcvi floris juvenrute fzitinanr. Botanico fcarius fupervenienti reclinuant nonnifi exuvias, quas inutiliter coiligit & regenerates optat. Memoriam, non vero vitam narrant plantarum defunftarum. Hrc supplementa fi reftituantur, annuam moram poftulant, vel fortuitum adventum in ipfo florefcentiae feftp.

Praeterea, magnopere juvat herbarum incrementa aer phtviajiir, latentia germina provocans. Siccitas enim diurna & ccelum nimis fereuum graviffime Arabiam premit & optimos terra: traflus incultos reddit. Huic malocladem addunt *Grylli* caloris filii, qui mifcre herbas devaftant. Aves granworce agorum rapaces funt hoftes. *Inundationes marina* campos Sale impriaegnant & fertilitatem exftinguunt. Ex alia vero caud & libero Naturae mandato dependct abfentia *Cryptogamarum*; fi *Pterides* Bulgofienfcs, & *Marinas* excipias Mochhenfes. *Graminum* genera triandra cum Septentrionalium non cenar: numera. *Juncus* & *Carex* facie fere ignoramus.

PLANTS LITTORE[^] primam occupant frontem in folo argillaceo vel arcnofo » vel utroque mixto. *Mochha* Oceano propinquaque libero portu recipit plantas ncptiinks. Syrtes coralliferas brevis fundi & littori propinquai, ut

Djiddsc

1) Jidda! & Lobajae, Fucrs ad fuperficiem aqua? extends, diftinctas non habet. Pau&e> quse adfunt Syrtes > procul a littorc diftanc & perquam profunds , ia quibus. varkc haerent herbc marine.

CAMPESTRBS TLANT^f quo prop̄os ad monte*, eo uberiora inveniunt refrigeria fuh umbra arborum, quse jam plures faciantur* *Pajcua* Jibcra patent & rota anno virentia. Vefpertina pabula fuggerunt *ffolcur* & folia *Patfieei dithot*. Solus hie pubukris ieritur *Phafiotus*, ut ia ^gypto *Trifolium alex*. Camchis, dam fjlvias intrat> luxuriofe vivil plantis Cucurbicaccis & Scandentibus, quas ille procerus attingcre potefh

CEREAUA * non folum ī campo, verum & ia īpfis montibus feJcm obtinuerunt, ipGi Narura arte prxeuiue clivum veftigiatis premendo; fequuntur fnonticolx & hortos agrosque formam penfiks, diim gradus incrcptis muris per imervaffa horizontabcer fabkvant & mmkmi adjeBis Fapidi- bus : illata dcindc hutno feruat Coffearw » cfculcmas & Ccealia, *Friticium* im- primis. ArnpbireatraHa ifta airva iDcredibili voluptate nfKciunt fpeftatorem no* vurr>> sec adbuc ninio ufo bebeteiiK Hie aqua e Gfterros (bllicite īāftis im- mitritur. In phimtre vcro, quoqusquc Uadf arre & natura duSi aquam ferunt, agrorum, *Holcum dwrra* feFentium eura valet*, cscteroquin enim temporar̄y e(t & annonam ex cceli favovc cx(pcfiat. Diffiruulan HOD debet, gentera valdc fimplicera & kicrdem iwcurioē iEgyptum infpicere vitinam. & ceconomis rura- lis magiAjranc, qua? rot execnplis doccr, quanxi fit pretii a&duam irrigarionis pluviam arvu infundere.

SvLViG īn Tebāiuti mFE* > *Surdud* ī exdpās» Patrw carn̄ Montcs funt & Valies proximo adjacentes. Arborcs Alpine, venti< Kcct agitato: forris- fimiſ, alts excreſcunt & Fe3se. Sylvas virorcm defoliationc generah nunquam exuerc, opu-s now eft* ui multis cvincatnus. Sylvarics nomūianrur prx crseris: 5^«ra , TSw^ r OiMa , *Cyanclmm*, #for«0 y JV«/ varior, & indetei?minarje īacka_x Afm>. *Habdj* &c. *Pahna* Tchaīruim inhabitat arenoCin*.

HOSRTFWSCM fforam in Arabia Fclici odeo angi>ffe habirwc, crectibik vix vrderetur, nifi Botanico judice numerati faiflcnt borti. *Ejsiileiita*_y odarifercr & tkStorics numenam brevifilmum abfolvunc, Populns fpfendkiac nvcnfac appa- ratum neftit, & fnecedansai in campa & lylva quxiīr. *Banjani* pet rcgn̄um difflpati negociatorcs, ut fmit herbipiwi gi ipfi, ex Indra cludum muſcrunr Flora rudimenta, ^ua: fuccelJu temporis magna progenk Arabiam* ditant & oniunr^

COFFEAM: admirando guftus irritari patroc̄mio tot populis necclāriam fecit Yemen. Mukam licet palFa fit nionopolii hu;us jafturom> prſeft^t t^irxa iēmer



femper nativa ex 'Montibus Hadienibus Coffca. Nomen genuinum *Bunna* fonar; quodque *Gahve LJJ\$* vocam vel communius *Gejhr.* -^{*£j*} *Capfulasfo*, incolis ipso fructu pralata, c qua potum omnium horarum praparant, guftu & colore similetn infuso herbae Thear. Fructus menfe Februario incipit marurefcere. Multa irrigationis cura fovetur Coffeain arcolis, i vel if pedisfundo. Varuefpon-taneae arbores paſſim in fcrie tucntur intafbe, ut umbram inducant. *Beiteljakih* primos recipit provenrus, & partem Mochham mittit, quam naves per Oceanian eunt auferunt. Alia pars Hodcidam & Lohajam rrunfit, inde Djiddam, Suès & tandem per Turciam & Europam diftribuitur. E montibus adfertur menfura 2 *Fark*, onus Cameli; quod vis Fark 3J *Kantar*, fiue 100 Rod conftituir. Navigiis infertur volumen 13 *Fark*, vocatum *Kalam*. Beitefakih jam confitar 1 *Fark* 45-50 Imperial & deinde impenfa vario (lib titulo ag-gravantur. (*)

IV. ORDO ITINERIS BOTANICI.

I« LOHAIA urbs Arabia? Felicis mari vicina: primus ingeffus provinciae Boranicac. Littus calcareum , argil la cinerea vel arena tempratum. Proximi *Colles calearei*. Hortuli pauci & pauperrimi.

N^EA^MAVallis | mill, ^burbe, puteis aquam pluvialcm & ftagnantcm fervans, falledine fedatam maris , qui rerram humilem quovis anno°ituindat tempore ortns aquiloe parvce; y**-*¹ y ^ ' hoc enim figno uti fciunt incohe. Campin uhiverfus argillaceo - calcareus: prope littora magis arenofus ; caeterum defertusi nudus, vix *Panico dichot.* virefcens.

KUDMIE

(•) Coffcam in plnnitie cultam non vidi, & *Spontunea* fruclus fine dubio nullius eft pretii. Montoia regio lalubris, teinperata & a^{qua} gnudens pluvial!, fbntium & Cifteirarum In locis magis orientalibus, ad radices montium viget Coffca, eadem tamen fcrypta altitudine horizontali, regione verfus illam plagam fenfim furgente Ex *Ahipnia* illatas priinas orbores putant Arabcs; ilia regio similem terra? feciem liabet, fuam TehSmam & Djabbal. Dum florent arbores, odorein fpai-gunt fragrantiflimuin, miniine ingratum nut noxium, quum iiKolac iis immixti habitant. *Simiis* vehementer vexantur horti, ut vigilis iis opponendi fint, fed Coffeam non appetunt, verum reliquias arbores pomonas iis interpoftas.

Ad numeium Arborum exoticarum pertinet quoque Cocos, quam Banjani introduxernnt, & baud ultra Mochham floret; Arnbes arborem prirftantiffimam adhuc quafi ignorant; Banjani pulpam nucis milccre folent fao Pilau, quern A»i ^ocant. (Editgr.)

KUDMIE (*Herbatio primci*) pagus totus monotrophis dicatus. Horti in valle magno mturse beneficio irrigui, finguli suo puto. *Holcus durra* altitudinem fere 12 uhi. exaequat j annis cultus nonnifi pluviosis *, licet aquae foli filis adfic annona.

MOR (*Herbatio fecunda*) Vicus hortifer, 2 horarum itinere Lohaja, Plantar 73 spontancae & 13 cultse indagata?; fere omnes in /Egypto non vifac.

2. SURDUD (*Herbatio tertia*) Rcgia fedes Florae Yemen. Vallis i. mill. Lua, ad pagum *Moglafy* vifitata initio menfis Febr. Extra Lohajam campi denies : inde fruticeta *Indigo/era oblongif.* Paflim *Corypha umbrae*, in arcnofis.

MELHAN (*Herbatio quart a*) Mons excelfi faftigii. Vallis *Schakr* adiacet. Montes *Hödfsch* & *Ennebijud* procul confpicui. -Sfl/T/divesSalis Gemmae.

Via verfus Beitelfakih: Pagi: *Okém*: *Dffdlie*: *Shbea*: *Meveyra*: *Dahhi* vicus , ufrina vaforum fifthilium notiflma. *Ghannemiz* vicus. Sequitur terra puteis & cuhra melior.

BEIT EL FAKIH urbs. Unicus , idemque pcrexiguus hortus, auflore *Elmds* , quondam Pnnore. Terra argillaceo-arcnofa tam jufte temperate, ut Lapidibus lateritiis (*Jadjur* /^{skU} & *Kaleb* Caju) coquendis parau reperiatur.

3» MONTES HADIENSES *coffees-trophu* (*Herbatio quinta*) Irinere 6 horar. ab urbe Beitelfakih: luftrati inirio menfis Martii. Principio circa pagum *flnmra* terra calcarea , fcpe arenofa, Jimque diurna ficcitatem flerilis. *Slfclepias %igant*. fola viguit. In vallibus Flanrx eaedem qua ad Surdud; pra-fvrim poft Bulgofe Convallis planiufula, nemorofa, fri^ida, in qua *Coffea fpmit*. varioequa *Pterides* & *Orcfiides* haftenus non repertae. *Plantoe mltce* in hortulis clivofisj *Coffea* principalis cura.

Circumjacent: urbs HADIE; pagi vel diverforia *Bufoafe* : *Jl^okaja* altior, in media via ad Örs: haec inter Hadie & Kurma: ab (jrs ad *Aludje** inde Beitelfakih.

MONTES HADIENSES: *Djabbelafuad*: *Barak*: *Boka*, Schiftocinereocoftans. *Majpidli* totus prifmaticus, pentagonis perpendicularibus. (*)

Kurma

(*) His adnumernri potest *DjtibbelKochne* fimilibus compofitus pentagonis, mons parvus prope Beitelfakih, & unus Hadienium. Ad *Mbtaken* multi pentngoni
(yi) decidcrunt



Kurma superior reliquis, calcareus, arboribus fere deftitutus, fed plantationibus herbarum & cerealium occupatus; Holco excepro, cujus maturitati obftare tcmperiem nimis frigidam credunt ruflici. *Acanthus arbor.* & *Hypericum kalm.* plants proceroris ftatura dura in planicie crefcunt, hie in fundo brevi pjgmcae ftanr.

4* DJÖBLA urbs, exurfione petita fine mends Martii. *Arbaein* pagus extM Beitel&kih * in folo argillaceo - calcareo, plantas fovens Morenfcs. *Roboa*, *IWachfa*, pagi.

ElUahfad {*Herbath sexta.*) diverforium, locus aquofus, herbifer. *Mafchwdra*, pagus. *Djöbla*, urbs.

Kedicus: Montes: *Choddra*, alriffimus, frigidii climan's: *M'harras*. Tota rcgio usque *Taces* patria qiuifi *Euphurbiarum*, fruticeta conltuentium in clivis monrium incultis.

Gude [*amyridis*) boſpirium, memorabile *Amyride qopobalfamo* ibi defta & fub umbra arboris viva? defcripta.


Has urbs. *Uadi Zebfd* fluvius pluviigenus, littore herbifero.

5* MOCHHA. Beitelakih egreflb, primum *Zebid* urbs. *Scherdje* pagus; terra vacua & paſſim arena gravara. *Maufchid* pagus. Inde Palmiceta.

Mochha (*Herfiatio septima*) urbs littorea : plantae marine ad Infulam *Djabbelarie*.


6. TAJES. *Sfafa* vicus Mochhse proximus. *Dorebit* urbs. Jam regio montofa fenſim adfeendens, abrupta vallibus & Uadi hoc tempore (iccis vel parum aqui ferentibus. Aer cemperatior & purior quam Mochhse. Planrse vel Surduodenſes vel Hadienſes. Mira luxuria *Enphorbice ojjic* mixtje cum *Euph. Kert* & *Kajfar*. *Mimofa nilot.* parcior. *Taws* finem pofuit *Euphorbia fpiv.* fuccedente *Euph.fchörur.* Verum brevi poſt plantis Hadienfibus locum cedcns! defiit *ipfa*—&—*Botanicus*—*ipfe!*

deciderunt ex Monte alto & praedpiti. Quo glutine cobaprent fraſura obfervatum non eft: *calcareum* puto. Materiam inontiuin ignoro: *Cotaceium* vidi iapidem; id vero certum eft, Saxum Granitum hie non doininare. *Lapides manualcs* uljenime diffeminatos per arva reperi inter Hars & Tass. (Editor*)



PLANTARUM

DISTRIBUTIO PRACTICA-



I. PLANTS HORTENSES.

KUDMIE ET LOHAJJE.

MOMORDICA *balfamiua**
CITRULLUS *bnttich.*
OCVMUM *bajilkum**
TAMARIND, *indie**.
LAWSONIA *incrnis**
DOLICHOS *didjer.*
HAPHANUS *Jhtivus**
PORTULACA *ohracea**
AVETHUM *graveolens.*


HIBISCUS *efculcnu*
TAGETIS *erecta.*
SOLANUM *melongeiM.*
RICINUS *vulgar is.*
TRIFOLXUM *reman**
GOSSYTIUM. *arborenM.*
AMARANTH, *b lit urn**
• • *okrac.*

BEITELFAKIH,

IMPATIENS *baifhtnhin.*
GOMPHRANA *globofa.*
MIR^BIUS *jalaffi**
LEPIDIUM *fat k/.*
NVCTANTHES *famine,*
PHYSALIS *fomnjfera**
VERBENA *mdiflora.*
TAMARINDUS *indict**
CYTISUS *finnatus.*
COKNUS *gbaraf.*
KICINUS *communū**
CELOSIA *criftata.*
ARTEMISIA *pontica.*
CLEOME *orniubvp.*
AMARANTHUS *bypocbondr.* ?
PUNICA *granatwn.*
TAGETES *erecta.*
• • *bcneffidj.*

CAPSICUM *frutefctm.*
HYACXNTHUS-
ORIGANUM *majornM,*
OCYMUM *tnidaiu*
- - *bnfilk.*
Cocos *nncifeifo*
PHOENIX *da8ylifer**.
BORASSUS *flabellif.*
MUSA *paradififlCA**
MIMOSA *Lebbck.*
ANNONA *MIMMS.*
AMB *dj'dbbelu*
CARICA *Wfijī.*
CUCURBITA *djyzar.*
KEURA *Kadi.*
AMYRIS *Katuf.*]
BINECTARIA. , i Ad plateas urbis.
HYPERANTIIERA. j

MOR



MOR IN AGRIS.

DOLICHOS *cult rat us.*
 RTHANUS *fativ**
 SHSAMUM *indicunu*
 CUCURB.
 - - - *farakis.*
 - - - *Dubba dybbe**
 GOSSYPIUM *arbor eum+*

KONAB.

MIMOSA *fejaK*
 HOLCUS *durra.*
 PHASEOLUS *palmatus.*
 - - - *radiatus.*

HADIE.

SACCIARUM *efficin**
 GLYCYRRHIZA.
 AMYGDALUS *perflea.*
 PRUNUS *domeftica.*
 - - - *armcn**
 PUNICA *gnmatum**
 PYRD* *cydonia**
 - - - *malus.*
 PHOENIX *dactyl if.*
 KOSARIA»
 MUSA *paradifiaca.*

LILIUUM *album.*
 VICIA *fata.*
 ARTEMISIA *pontica**
 CITRUS: *var'nc fpec.*
 CATHA.
 CALENDULA *offic.*
 ORIGANUM *myorana**
 TRIFOLIUM *tnclilotb.*
 DiANfTHus *catyophjlU*
 MATRICARIA *par then.*
 COFFEA *culta & fponianea.*

ZEBID IN MORTIS A BANJANIS CULTIS.

MIMOSA *hbbek.*
 AMARANTHUS *bybridts**
 - - race mis viridibus*
 CYTISUS *pinnat**
 ANN ON A aninas*
 GLYCYRRHIZA.
 CAAICA *papaya.*

DOLICHOS *feftan**
 MELIA *aztder.*
 SISON *Ammū*
 CUCURB. *Djyzar.*
 TURIA.
 Ficus *barefcK*
 SATUREJA *thywifol* Scbader. شانس

PASSIM CULTJE.

AMOMUM *Zingib.*
 CURCUMA *rotunda.*
 HORDEUM *bexaflich**
 TRITICUM, roriflimum.
 RUBIA *tincí** ad lias potidiinum cults*
 NICOTIANA..

VITIS.
 ANETHUM *fcenjcul.*
 RUTA *graveoUns**
 AMBARUR.
 ÜDĐ J ^ [in montibus remotiorib^
 VAALA *Ocymum. J*

LAVAN.

LAVANDULA /pica.	1 in montibus J reinotioribus*	CL-CURBITA. <i>Kafcb.</i>
THYMUS doufcb.		- - <i>pepo.</i>
MEDICAGO falcata.		- - <i>bahbab*</i>
Hoi.cus docbn.		SPINACM. Arab. <i>Taktera.</i> Mochha.
INDIGOFERA tintiorin.		P/PAVER <i>opifernw*</i>
TRIGONELLA fan. gr.		CORCHORUS olitorius.
LACTUCA Jativa.		- - <i>afluans*</i>
ZEA tnajs.		

II. ESCULENTS.

Fl. *folia.* Fr. *fructus** Cl. *canlis.* Rd, *radix.*

TRITICUM cereale.		PORTULACA <i>Hnifvlitii</i> renera, cruda»
HORDEUM bexafiticb. <i>cereale*</i>		PUNICA <i>granatum*</i> fr.
CORN us gbaraf. fr.		AMYGDALUS <i>perfica.</i> fr.
Cissus redif* fr.		PRUNUS dowejf. fr.
TOMEK glibra. fr.		- <i>armenica.</i> fr.
SCLANTHIS rotundifoh fl. cofl <i>ii</i>		PYRUS cydonia* fr.
- - glandulos. fiv		- fw/i/wf. fr.
- - ternatus. fl.		ORYGIA. - - fl.
CAMPANULA edulis. id.		ONCOBA. - - fr. vix.
ASCLEPIAS fphalis. fr.		ANNONA kefccta. fr.
- - ftipitacea*. cl. crBduff.		MJERUA - - fr. vix.
ANTURA. - - fr#		CORCHORUS ajtuans* totus.
STAPELIA gholak. cL crudus.		- - <i>olitorius*</i>
- - draetelkelb. foliiculi crudi: cL		CHADARA - - fiv
infipidus.		SIDA cordifolia. flores crudi eduntur.
- - djadmeU tota, cntda.		XANTHIUM: ftrumar.
RHAMNUS naheca. fr#		OCYBUM zararbendi.
SOLANUM : bacca hujus generis IafH		ACANTHUS crepitans* fl-
coagulando infervit.		SESAMUM j//r/c. oleum efculenr.
CATHA. . . n#		CLEOME gynandra. tora, coč!a.
Duicus carota. rd.		SISYMBRIUM moneufi. fl. faporis Crtfli*
J-AUSONIA inermis.		LEPIDIUM fiitivum.
VCIUTELL. - fi vlc.		RAPHAIAKUS fattvus* fl non radix.
JUSSI/EA edulis. to to, cočta.		GERANIUM zonale* fl* cl. iniiti & peti-
ORTULACA oleracea.		oli: addiuſculi.
		HIBISCUS ejculzmus*



CITRUS : varii fpec.	fr.	TURIA.		
LACTUCA <i>fativa</i> .		MUSA <i>paradisiaca</i> *	fr.	
ARUM <i>colocafia</i> . rd.	cocta.	Fxcut <i>fycomorus</i> .		j
AMARANTHUS <i>blitum</i> . tener.	cochis.	- <i>bales</i> .		J
- - <i>oleraceus</i> .		- <i>fur</i> .		J
CIBATHA» - *	fr. ex eo <i>Viuum aduſtum</i>	HOLCUS <i>durra</i> .	1	
paratur fortimmuni.		ZEA <i>majs</i> .	cereale.	
SPINACIA <i>oleracea</i> ,		MIMOSA <i>tirfota</i> * fl.	ad coagulationeni	
CUCURDITACEA :		laſlis Camclini	iinpediendam.	
<i>fmilli.</i>	1	PHOENIX	dn	
<i>far aids.</i>			By	
<i>duhba dybbe.</i>	j		<i>lifer</i>	
<i>battich</i> *	j		a.	
		BORASSUS <i>flabellif.</i>		
		Cocos <i>uucifera</i> .		

ESCULENTS OBSCURI GENERIS.

NACKAS.	3	-	fr.	OKASCH.	} <i>Asclepias?</i> <i>paſtoreibus edulis</i> .
HALEDJ.	.	-	fr.	DAGABUSCH.	
RESCHTA AMRAI,				BYSA.	<i>\$j</i> Arbor foliis dulcissimis; ni-
TAHAF*					nio tamen efu ventri noxiis.
KONAB.				ÖDJA.	Exſtillat Gummi album, dulce;
SCHOHAT.	fr#	tricoccus.			adhuc recens & molle edule; in'du-
MOSA DOLAR.	AA 6	5tAff^o	Arbor vaftis-		ratum venditur nomine Gummi Arab.
			fima. Arbor <i>Dober</i> ; fr. <i>Mofa</i>		Planta aphylla. Gummi hoc lumme
			edulis nucleus; ex quo in annonac		tenax*
			caritate panis conficitur.		

BENJANIS ESCULENTiE. (Arabibiis non.)

ACALTPHA <i>decidua</i> .	cofta.	SODADA.	fr.
MOMORDICA <i>balfamim</i> .	fr. eoSus.	CVNANCHUM <i>kerenna</i> .	
TURIA.	fr.	ARICA.	fr. <i>Faufel</i> ; affeitetur ex India: hinc
CUCURBITA <i>djyzar</i> .			maſticatorium <i>Betel</i> .
BUNIAS <i>oriental</i> , fr*			



III, DELICIOS^.

A) UMBRIFERJE.

TAMMENDUS <i>indie</i> .			
T- i L „*&»		(tot* aaibus obumbrandi* pwntantur.	
Ficws <i>touſflki</i> vſlja*	j		

SCHAD-

SCHABJARET ETTAA. «L JJ ^ *Mimofa finfinv**? Frequens in montibus circa *Aim nrifcL* Si quis sub arbore venit, ilia ramos demittit, hoipitem quafi *Incoh*s ergo facra & honorata est, quauis Isdere facrikgij *salutans.* *2&T Viatorez* umbram eius, potius quam aliam petunt.

B) FESTIVE.

Thnt frftgrtmtes vet flare splendidis coronis ornant cnpha sefiuvis occaftonibns. Ignora imis confuetudm hujus origoii uiffi Floralia piffa recognoscere velimus.*

CARDIOSPERMUM *halicae.*

INULA *odora.*

THVMUS *doufcK*

TRIFOLIUM *reman.*

^IANTHERA *odora.*

CHOSN : SJTIAM: *Miwofn* ? Frequens in montibus ad *Abu nrifib.* Flores ruberrimi • ob ffSwiTS t ^ r flor es muto s poemna cxeanc - ^ an-

C) ODOR7E.

RUTA *graveokns**

BIKECTARIA.

TAGETES *erecta.*

ORIGANUM

major ana.

- - *btneffitlj.*

LAVANDULA *fyk^ A.T. /fewfl//. ^ j U ^*

midan.

ARTEMISIA *poutica.*

OCYMUM *basilica.*

LILIMUM *albūm.*

- - *Vanla.*

MATRICARIA *parten.*

AMYRIS.] *Katnf.*

CACAMA *edebera.*

- - *abu-schām.*

ELCAJA *roka.*

- - *Kafah* ligno infumailtm. *vafa*

HYPERANTHERA.

KEURA *kadi.* hydrophora.

IV. PYROPHORiE.

a) OBICES: figna dura ignem fricione emittentui.

CORNUS *gbaraf.*

SODADA /*nio/S.*

b) FOMITES: folia Ccca ?el medulla spongeofe ignem excipenres.

A *SCLEPIAS* *gigautea.*

CYNANCHUM *march.*

- - *MaritiIM**

RICINUS *communism*

SIDA *cordifolia.*


SESAMUM. /*K^V.*

c) FOMITES INCENDIARII; figne fimicuC pyrotechriC ad fclopeta manualia (ut his in tern's mos est) incendenda, Sxlicis loco. Cortices arborum tufi, aqua macerati,*& in funiculi foimam conterri.

DHARAF, C JJ ^ Arbor obrenra, Kurmac,

Ficus *thaab:* <Sc mudah.

V. TINCTORiE.



V. TJNCTORLE.

I^DIGOFERA multum culta, ob colorem escruleum genti gratum.

PoLVGAfA ejus fuccedaneum?

OROBANCHE ; tingit nigro colore funes e *Corypha umhraeulif. ftri3osy*

RUBIA n̄w̄fonVi, Arab. *Fua* Radices ficcae vencunt ao» *frafcle* (a 20. Rotli. e. onusCameli,

Ar. *Hsmly*) 50 Imperial. Fafele una i| vel 3 Imper. Spec. Mochhas
& Beit el faklh.

SUJEDA *afah* Ex ilia paratur *Höt am.* *L^> feu *Doluk*, i. e. *Sal alkali*. An BORITM
Fullonum apud Hjebraros hue speclat, vel hinc aliquam feneratur lucem?

MIMOSA *nil otic a.* Ad coria (ubigenda hie prat ceteris eligitur cortex ; quo & citius Sc
melius peragitur maceratio.

HASCHISCHET ED DAHAB. (Cent. VII. XLV.) Ail firma qualiscunque hujus rei Romanis
audita; quam quoque VIRGILIUS mediis interferit (ignis fi non aui*ef> certe
tinctoris felicitatis ?



VI. LIGNA FABRILIA.

A) DENSA & PIJLCHRA.

RIHAMNUS *nnbeca*. Ligno rubro & albo.

CORNUS *gbnrafi*

TAMARIX *atl.* Ad clavos ligneos.

T-fcNAB.

FJESSI. *فسي*

BSASS. *بسس*

METI. *مُويو*

DAHI, *chafcbnb.* *خشب ضبي*

HAMRUR ad paxillos.

generis. AK^{IR}. y ^ " 1 durissima ,
DJANDAL. iJjJLcw J quafficerrea.

VARAF. *LJpj* Ad bacilos
fclopetarum ftipatorios.

DARAHH. ?* & Ad lanceas.
£ regione *Sana**.

HALED j. Lignum tenax, durum,
ufitati Tunum ad utenfilm do-
meftica.

PANICUM *dicbotomum* 5c fetigerum. Ad domos & tefta obducendt*

B) TEXTURA LAXIORI^t; VIL1A.

CADADA*

SCEURA,

GATAF»

KAFAL,

TAFI. } *corypha umhraeulif*

NACIIL. } *Palm a daciyUf*,

Ambz ligno fibrof9, putredini diu
refiftentc. In adibus ftruendis lapi-
dibus interjiciuntur ad muros fir-
niandos.

SADJ. *لخاج*

ABNUS. *أبا* vel *Ebenus*) } *fchijebam.* *شجبا* Ex India
allata.

BASCHkIL.

DHAN vel ZAN t *KAhirertfi*; ad lan-
ceas.

SCIRPVVS *trigaerrus*, Hall ill | tuguriis confhuendis infervit toto territorio a Beitelafaklk
veil us D jōb lam.

CORVPHA *Doum* vel *Tafi*; ad ftoreas vel tegetes flectendas , quibus merces involvuntur,
navigiis mittend-x.

CUCURBITA *lagenaria* vafcoloruin vices prffftat: fruchis planus, fscpc i§. ped. diametr.

* VII. PABULARES.

E. *Equus*. C. *Camelus*. A. *Afinus*. B. *Bos** O *Ovis*. Cp. GI>M.

I.) SrONTANEiE.

<i>Boetbavia</i> fcandens.	C. B. O.Cp.	<i>Qadaha</i> rotundifol.%	- C. - . -
<i>Diantbera</i> panicul.	- C. - O. -	- - glandulofa.	- C. - . -
<i>ffujlicia</i> viridis.	- - B, - -	- - farinofa.	- C. - . O.Cp.
<i>Altcrnantbera</i> .	.	<i>S.iljohi</i> imbricate.	- C. - - -
<i>Panicum</i> glaucum.	E, C. A. B. O. Cp.	<i>Sceura</i>	- C. A. - O. -
- - appreflum.	E. C. A. B. O. Cp.	<i>Cajjk</i> fenna.	- C. - B. 0# Cp.
- - daftyl.	E. C. A. B. O. Cp.	<i>Fazvnin</i> cretica.	- C. - - O. Cp.
- - dichotom.	- C, - B. O. Cp.	<i>Tribulus</i> pentandr.	E. C. A. B. 0. Cp.
- - tummām.	- - A. B. 0. Cp.	<i>Glinns</i> lotoid.	- C. - B. (X Cp.
<i>Cynofurus</i> ternatus	E. C. - B, 0. Cp.	<i>Portulnca</i> linifol,	- C. - B. O. Cp.
<i>Tamarind</i> , ind..	.	<i>Conhorus</i> sfluans.	= G. A, B. 0# Cp.
<i>C;/<j</i> redif.	- C. - - 0. Cp.	<i>Euphotbia</i> antiquor.	• C.
<i>Cornus</i> gharaf.	- C. - B. O Cp.	<i>Zygophyllum</i> portulac.	- - - O. Cp.
<i>Salanrbus</i> glandulo?	- - - O. Cp.	<i>ÖUMc</i> cucurbit, ovibus pabularis & me-	
<i>Solanum</i> beigham.	- C. - B. O. Cp.	dicina, foliis fale afperfis.	
- - baham.	. C. - - O. Cp.	<i>Acanthus</i> crepit.	. C. - B. O. Cp.
<i>Astlepins</i> gigantea.	- - - O. Cp.	<i>Cleome</i> gynandr.	- G A. B. O. Cp.
- - ghafchve.	- C. - - O. Cp.	<i>Bumas</i> orient.	. G - B.O.Cp.
- - aphylla.	- - B. - -	<i>Sulularia</i> arvenf.	- C. - - -
<i>Achyranthes</i> afpera.	- C. - B. O Cp.	<i>Lathyrus</i> terniflor.	- G - B. 0. Cp.
<i>Tawnrix</i> title.	- C. - B, O, Cp.	<i>Hedyfarutn</i> oblongif,	- C. - B. O Cp.
<i>Htliotrop</i> . europ.	- C. - B O. Cp.	<i>Dolicbos</i> polyftach.	- G - - O.Cp.
<i>Cynancbum</i> kercnna.	- C. - - O. Cp.	<i>Sida</i> cordifol.	- C. - B. - Cp.
- - march.	- C. - - -	- - panicul.	- C. - B. O. Cp.
<i>Digera</i> *	- - • C A B . O. Cp.	<i>Amaranth</i> , blituin.	E. C. A. B. O. Cp.
<i>Rocama</i> .	- - C. A. B. 0. Cp.	<i>Xantbium</i> ftrum. O Cp?
<i>Rlamnus</i> nobcca.	- C. - - O. Cp.	<i>Ricinus</i> commun. O.Cp.
<i>Ipomcn</i> triiflora.	- C. - - , -		



<i>Croton lobat.</i>	- C. - - 0. Cp.	<i>Cucumis ftnilli.</i>	E, C. A. B. 0. Cp.
<i>Momordica balf.</i>	- C. - - O. Cp.	<i>JErvä</i>	- C. - B. 0. Cp.
<i>Ttnia.</i>	- C. - - O. Cp.	<i>Cebatba efcul.</i>	- C. - - O. Cp.
<i>Cucnwis arakis.</i>	- C. - - O. Cp,	<i>jtriftoloclia.</i>	- C. - - O. Cp,
- - colocynth,	- C, A. - O ¹ Cp.	<i>Mimofa firiam.</i>	- C, - - O. Cp _t

2.) CULT*.


<i>Pbafiolus radiat.</i>	-	<i>Cucurbita lagen.</i>	- C. - B. O. Cp.
- - palmat.	-	. - farakis.	- C. - B. O, Cp.
<i>Zea majs.</i>	-	- - kara _#	- C. - - 0. Cp.
<i>Holcus durrn.</i>	-	- . battich.	- C. - - O. Cp.
- - dochn.	-	<i>Gojjypium arbor.</i>	- C. - 13. O. Cp.
<i>Dolicbos lubia.</i>	-	<i>Medicngo falc.</i>	E. C. A. B. O. Cp.
<i>Scjhmmum indie.</i>	-	<i>Xantbium ftrum.</i>	- C. - B. O. Cp.

3.) SIMILIS GAATIE.

<i>Dolicbos polyftacb.</i>	<i>Ocywum zataatlcnin</i>
<i>Tenab</i>	<i>Mofn. Dobar</i> fr. obfe. appetitus a Siinia
<i>Nomum }</i>	<i>Rababb,</i>

4.) FASTIDIT^E & NOCIV-E.

<i>Solatium incanum.</i>	- <i>MvJd J£JO</i> Arbor obfeur. fruflu Ca- mclus evadic furiofus.
<i>Datura metel.</i> Semina Gallinis exitiofa.	<i>Croton lobatum.</i>
<i>Ruta gi-aveoleris.</i>	<i>Allo maculata.</i>
<i>Aloe maculata.</i>	<i>Pbyjalis fomnrf.</i>
<i>Pbyjalis variegat_r</i>	<i>Stnpelia variegat_r</i>
<i>Volutella.</i>	<i>Tttri/i fativa.</i>
<i>Capporh redif.</i>	« , , " " rth ; ne coctam quidem edunt
<i>Sodada fpinoft.</i>	<i>Cornell.</i>
<i>Thjmus doufch.</i>	<i>BrfJ'i arbor obfi;</i> venenata; baccc ovi- bus funestæ.
<i>Orolancht tincior.</i>	<i>Z^opiy//. defertor.</i> ne Camelo quidem gratutn.
<i>Dolicbos cuneifol.</i>	<i>Oefe/ j^äic gramen obsc. feno mixtum equis lethale.</i>



VIII. MEDICO.

SAL VIA Marti; Mercatores Batavi Mochham veiiientes emunt: ufuiti ncfcio.

JUSTICIA trifora* C. I 10. ophtalinica. Tuflim medetur, ii flores frequence". rfaftu tentantur.

DIANTHERA trifika. C. I. 20. Tunaoribus.

VERBENA capitata. C.I. «3» I" Strnngiiria.

COMMELINA tuberofa. C. I. 33. Folia fpinam impreclam expeUunt?..

CISSUS r^W; C, II. 8- Amidotiim celebre.

CORNUS gtara, C. II. 10. In cephalalgia.

SiELANTHUS diktat. C. IL 13* Folia febrifuga.

- - Salt. Bacca dicuntur oculis nocivx & ceciratem inferre, fi cduntur. GuRn cerre cauflico funt;

OPHIGRRHI2A C. II. 39. Ukeribw.

DATURA tntrel. fiporifera.

PHYSALIS fomnifera. Herba contrita tumoribus imponitur. Folia cinplaAii loco vulneribus. Hujtis & Solani incani foliis aqua cocVis lavntur homo hypocliondvia vehementi laborans.

CATHA C. III. 4. Contra peftera.

RHAMNUS naheca. Foliis (iccatis, contufis, aqua tepida niiftis capit is iordes abfter-guntur# Corpora d:funflorum hujus Rhmmni infufo frigido laviintur. Mnr.

SOLANUM nigrttm. C II. 49. Foliorura recentiuin iiiccs in vulncre ex uftione & in morbo Arabibus diclo Bui.^ cLL^

ASCLEPIAS. C. IL 72. Contra fcabiem.

- - schuntoh. C. II. 66. Semiuia carminativa.

CYNANCHUM march. C. II. 79. I» Variolia.

CAUCALIS J&Hcbifbl. radix madicata contra odontalgiam.

CAD ABA farimfa. C. III. 12. Antidotum.

VOLUTELLA. C. III. \$6. In vulnere tendinofo.

ZYGOPHYLLUM portulac. C. III. 67. Maculis ocularibus.

CADIA. C III. 76. In hypochondria,

PORTULACA C. III. 79. In cephalalgia.

CAPPARIS fpwofa. C. IV. 5. 6. Antivenenata.

EUPHORBIA thyvrifolia. C III. 93. Pnrgans validnm.

CASSIA. C. HI. 58.

GLINUS. C. III. 99. Vtilneraria.

CLEOME gynandra. Folioram rccentium fuccus cum oko Sefrai mixtus ungventuiw in prurigine ; (non exanthematica.)

GERANIUM cbdda: in cephalalgia^



FATHAH. 83TL̄ (Obfcura Syng.) Folia contufa externe in fraSnra ofliuin.

MALVA *moutana* : vulncaria.

ELCAJA, C. IV_# 100. Vomitoria. Contra Scabicm.

DOLICHOS *folyflacb.* C. V. 17. Purgans.

CACALIA C. V. 66. In variolis.

ARTEMISIA *bdatrnn;* ab Hollandis Mochhse mercantibus requiritnr : illis vocatur *Ales.*

SENECIO *firacen.* In morbo *Sukf.*

INDIG0FEKA. C> V. 26. In colica.

KOSARIA. C. VI. 34. ExanthenuftL-a.

ACALYPHA. C. VI. 21. Purtulis infantum.

OCYMUM *tenuiflorum** Folia cum pipere aflumta in tertiana & quartana.

RUTA *graveolenr,* contufa capiti applicatur, in cephalalg. Ventri obligatur, in colica*

INULA *odor a.* C. V. 84* Contra hsmorrhoides.

CKOTON *viliofim , 6bab.* C. VI. 30. In morbo *Satifur.* ^yJ+o vel *Roha.* vs±j *

MIMOSA *fohm;* vulneraria. Folia recentia cum cortice arboris (non lignum, nec fpinae,) fubito igne comburuntur , & cim's vulneri afpergitur , qued statim ftipatuin, pofl aliquot dies fanatur, repetita quotidie cinei is afperfione. Hinc noinen \$a-(am. Retulit inihi alias , ramorum carhones contulbs, non cineres folioruin infterni. Florum giobulis, matutino rore madidis exprimitur fuccus ; oculis dolentibus utilissimus. *Apes* mel e floribus colligunt nigrurn , *Afalalam* diectum, utilc laborantibus Schirrho lienis *Tobål* ^larvjb vocato.

MIMOSA *Örfot.* C. VI. 8^ I" morbo *Sora,*

ARISTOLOCHIA *laja.* C VI. 4. Heroica contra morfus ferpentum.

ORCHIS. C VI. 1. Vulneraria.

ACROSTICHUM. C, VII. 2. Vnlneraria.

OBSCURE.

EKLIF; pulvis radicis oculis inflntus, vifum acuit.

HÖMMED? caules recentes contufi obligantur vulneri; quotidie novi impofiti.

NÖMUM- pulvis ftipitum antidotum.

NASAF pulvis ftipitum afpergitur vulneri morfus ferpentis & fimul forti dofi recipitur, interne.

SIBBI^I recens co3a cum butyro, unguentum vulncarium.

B^CKA vere venenata. Tamen Arabes ramulum frangendo guttulas excipiunc duas lafte & purgans habent.

EGLIT; cXJ£J ftipites recentes mafticatorium expelors optimum.

DARU; jj*b Decorum hertee carminativum.

GHJEJLE. iJU^ An *Cthatbat* bacca: dulces ftoiachics.

ÖDjE %•% refinam exftiilat dulcem , dum recens eft: cito vero adharret incre-dibjii tenacitate» Ejus ope Dentes dolentes poffe extrahi, referunt Arabes.

EXPLICATION OTARUM,

- Pm.* Planitics argillola, maritima.
Pu. - - inundara.
Ps. - argillacea, ficca.
Ph. - argillacea humida, menribus propior.
Pa. - arcnofa,
Pr. - rivis vicina.
Mi. Montium regio inferior.
Mm. - - media.
Ms. - - fuperior.
Ma. - - aquofa.
Mma. . - - media, aquofe.
Mia. - - inferior aquofii.
Mfa. - - fumma, aquoia,
d. P. Culrse in planitic.
CM. • in monribus.
C.M.M. - in montium media rgione.
Lhj. Lohajj.
Btf. Bcirelfaldh.
Srd. UaJi Surdūd.
Mlh. Mons Melhān.
Z7A: Uahfai
Blg. Bulgofe, Gve Hadie*

(#) Denotat Species aur novas aut illufhatas, in Centuriis defcriptas*
(*) Nova Genera ab Auftore conditura.

F L O R A

A R A B I A ? F L I C I S.

M O N A N D R U

1. (*) BOERHAVIA <i>a) ftandens.</i>	Ph. <i>Öikos*</i> Mfir.
2* (#) <i>b) diandra.</i>	Ph. Ps. <i>Vnddijcf.</i> MSr. <i>Rokāma.</i> Surdūd. <i>Chnddir.</i> J-* ^h i> vel /f>*&- ^B f ^{uhf} -
3. (fc) - <i>c) diffusiu</i>	Ps. - - Dahhi.
4. AMOMUM <i>zingiber*</i>	CP. <i>Ztnjtbih</i> Modirat.
5. CURCUMA <i>rotunda.</i>	CM. <i>Kurkum.</i> Has.
6. (#) SALICORNIA <i>a) europaa.</i>	Pm. - - Mochha.
7- (*) - <i>b) perfaliata.</i>	Pen. - - Ghoinfud^
8. (e) CINNA.	Mm. - - Barab.

D I A N D R I A,

9. NYCTANTHES <i>fambne.</i>	- CP. CM. F</> vel F;7. فل
10. JASMINUM <i>tffcin.</i>	- Mm. ff,yfl«, ^j^i 5u*j. (JL^AJUU Big.
11. VERONICA <i>'anagall</i>	- Ma. - " Uhf.
12. (*) JUSTICIA <i>\} lanceata.</i>	- Mm. <i>Sokajt*</i> &f*> Srd.
J3< (*0 f b) <i>trirpinofa*</i> .	- Ph. Mi. <i>Schcchar.</i> JSA Hadie. Vuzal Sri. Knlliba Uhf. Uufir. Mill.
!4» " " 1# ^ 0 <i>bifpinofiu</i>	- Mi. <i>Sdcdadl</i> {ja±^ Hadie. Kuhbe.sdS
15. (*) <i>\} d) apprefia.</i>	- Mm. Id. nom. Tajrs.
16. (*) <i>I e) viridis.</i>	- Mi. JCo^pjf. Srd. Ci#r. y ^ a.
17- - - <i>\} f) fixangularif*</i>	- Mm. <i>Sovudvud,</i> Big.
18- (•) <i>\} g) triflora.</i>	- Mm. <i>Chodie.</i> oyotc^ Big.
19. (•) <i>A) fectida.</i>	- Mm. Mi. Taw. WAL Hadie.
ao. (*) <i>\} i) panienhta*</i>	- Ph. l#/3r. ^ . j Srd. Mlh.
21. (*t) <i>\} k) carutca.</i>	- Ph. Id. nom. Mlh.
22. <i>\} I) refupinatti*</i>	- Ph. Id. nom. ib. Corolla alba, parva, re- fupinata.
33- - - <i>\} m) dubia.</i>	- Mm. Spicis terminalibus ; brafcis Hnearibus J foliorum ciliis nullis. Mlh.

24. (#) DIANTHERA a)	<i>amric.</i>	<i>Jlnva.</i>	Ph. Mi. Hādie.
35. (*) - b)	<i>amer. ft, albo.</i>	-	Mm. ibid.
26. (#) - c)	<i>paniculata*</i>	-	Mi. Pb* <i>Mdhtfaa.</i> M6r. Ti>tfw. ^ A S Sid.
27. (») - d)	<i>verticillata.</i>	-	Ma. - Uhf.
28. (#) - 0	<i>trifulca.</i>	-	Ph. Mi. <i>Madh.</i> O^rf^k* Srd. Hadle. Uhf.
29. (*) - f)	<i>odora.</i>	-	Ph. Mi# Mm. <i>Kdjfamdit.</i> ^UASAS Srd.
30* (\$) - g)	<i>debilis.</i>	-	Mm. TQXS.
31. VERBENA <0	<i>tjpcin.</i>	-	Mo.
32. - - b)	<i>nndiflora*</i>	-	Ma.
33. (#) SALVIA <i>merjatnie*</i>	-	-	<i>Dbūru.</i> fy ^ Kurnia.

T R I A N D R I A.

34* (*) VALERIANA <i>fcnndens.</i>	-	Ph. Mi. <i>Charad.</i>	Hadte. Sid. CW- ddrtu %JXLZ± Uhf.
35. TAMARINDUS <i>inika.</i>	-	Mi. Mm* <i>Homdr.</i>	A*S ubique.
36. IRIS.	-	Mm. <i>B<zneffidJ. fsXMjJtA*</i>	Dهق Djobla <i>Dabag.</i>
37. COMMELINA a) <i>commutu</i>	-	Ph. Mm. D/I/2.	جلیف Srd. U..- Mff CL>^J nomen huic generi com- mune. Florc 2 - petalo > cxruleo.
38« O) - *) <i>bengnlcm*</i>	-	Mm. Bolg.	
39* (*) - 0 <i>tubcrnfa.</i>	-	Mm. ib. idem	nomen.
40. (*) - rf) <i>comwclinoldes*</i>	-	Mm. Kunan.	
41* • " 0 <i>duh'tat</i>	-	Ph. Rodma.	&+*c>p Srd.
42*. (•) SCHOENUS 0) <i>ificanus.</i>	-	Mm. JEjn el bagar.	Môr.
43* - - *) *r <i>kiJ?</i>	-	Mm. Big.	fpicar. copit. terminal.
44- («) CYPERUS n) <i>grndatns.</i>	-	Ma. Uadi Zdid.	
45" - - i) <i>aruudinacens ?</i>	-	Pm#	Caule tereti , aú bafin foliofo , inarti- culnto; fub panicuh in duas partes Hflb.
46* (*) - c) <i>ghhofir.</i>	-	Mi. Mm.	Zir.77, Hacñe.
47- (#) SCIRPUS a) <i>hteralis.</i>	-	Pr.	Halldl J>Jb> Zebld.
48- - - b) <i>hcuflrhi</i>	-	Ma.	Uhf. Culmo fpith. fpicis ereftis, longe pedicellatis, ungue brevioriliv.5,
49. (^*) ALTERNANTHERA	-	Ph.	Kávar elnbid. Môr.
50. SACCHARUM <i>offic.</i>	-	Mm.	Muddanjend (nomen Indicum :>
Si- (*) PHALARIS <i>vtlniuia.</i>	-	Mm.	Big,
52. (*) PANICUM a) <i>compretfum.</i>	-	Mm.	Big.



53. (#) PANICUM A)	<i>apprepw.</i>	-	Ph.	<i>Fsfok.</i>	<i>Efi'tk*</i>	Mflr.
54. (#) - 0	<i>glaucum.</i>	-	Ph.	<i>mad.</i>	Srd.	Mflr.
55 (*) - <0	<i>adbtrems.</i>	-	Mi.	Mm.	<i>Sara erra.</i>	Hadie.
56. - - 0	<i>adhfir. fiinile glattco.</i>	-	Mm.	<i>Hofal.</i>	Big.	
57, - - f)	<i>adbsr. foliis fulcatis*</i>	-	Ph.	<i>ÖJdjer.</i>	^A:E?	Mlh. paniculatum.
58. - - g)	<i>panicula coarctata.</i>	-	Mm.	<i>Kttrma.</i>	Spicula foliis multifulcatig>	
		.			flofculo mofc. & hermaph.	
59. (#) - /J)	<i>dicbotomum.</i>	-	Ps.	<i>Boikdr.</i>	/>l£>	Ubique.
60. - - i)	<i>fitiqerum.</i>	-	Ps.	<i>Thummanu</i>	Frequens.	
6r. - - #)	<i>daftylon.</i>	-	Ph.	<i>Sabafa</i>	Mflr	<i>VbaL</i> f+%
62. - - 0	<i>miliaceum.</i>	-	Ph.	<i>KoJJjb.</i>	<i>Mi lab.</i>	v-AJL^O Srd.
63. (*) - tw)	<i>polygamum.</i>	-	Ps.	-	-	Tairs.
64 BROMUS *)	<i>asvens.</i>	-	Ps.	-	-	Boka.
65. - - /;)	<i>teciorum.</i>	-	Mm.	<i>Tberri.</i>	^3..	Barah.
66. AGKOSTIS a)	<i>iudical</i>	-	Mi.	Mm.	<i>Sorak.</i>	CJ>JUU Hadie. Big, Panicula cylindrica, fubpedali.
67. - - h)	<i>repent, fpknta.</i>	-	Ph.	/Enm*	Ghordb.	
68. (*) - 0	<i>virginica?</i>	-	Ps.	-	Lhj.	
69. (*) POA <i)	<i>multiflora.</i>	-	Mi.	Mm.	Hadie.	
70. - A)	<i>fpicuUs 3 - /for7-</i>	-	Mm.	-	Barah.	
71. - c)	<i>fpinofi.</i>	-	Ps.	-	Btf.	
72. (*) CYNOSURUS /?)	<i>urnatut.</i>	-	Ph.	<i>Saber.</i>	Mflr.	Ghomfude.
73. - - b)	<i>lima.</i>	-	Ps.	Pm.	Ghorab.	Mochha.
74* («) - 0	<i>durus.</i>	-	Ph.	(Hhlfe.	iEgypt.)	Ghomfude.
75. - - d)	<i>agyptiacut.</i>	-	Ph.	-	-	ibid.
76. (#) - e)	<i>fl&ccifohus*</i>	-	Ph.	-	Taaes.	
77. FESTUCA	<i>viucronata.</i>	-	Pa.	<i>Schcbam.</i>	Btf.	Lhj Mochha.
78. (#) ARUNDO	<i>flowrt^.</i>	-	Pu.	<i>KnIJah.</i>	CÄ^OÖ	frequens.
79. (•) ARISTIDA a)	<i>lanata.</i>	-	ML	(Dfayra.	iEgypt.)	Sinai.
80. - - ti)	<i>adjcenfiouis?</i>	-	Ps.	<i>Dtkn effchsba*</i>	SÄÄJUJ	^j i j Dbenncb ct t&r* ,•;ij J v^AJ<i
81- (*) • 0	<i>pankulata.</i>					
82. ELYMUS cap.	<i>medufi.</i>	-	Ph.	<i>Hobbeladjau.</i>	Meneyre.	
83. HORDEUM	<i>bexafitkb.</i>	-	CMS.	Mm.	<i>Sc/jair.</i>	
84. TRITICUNL		-	CMS.		<i>Burr.</i>	




T E T R A N D R I A.

- 85» (*«•) SCEURA *marina*. - Pi". *Sebum*, *tfy*y£ Lhj*, (*Germ.* *>^l Mafcat.)
86. SCABIOSA *columbaria?* - Mm. *Djuffhr er raaja*. *sxcJJJ ~f:x* Boka. Foliis non fetofis,
87. (#-) GALIUM *{ipar'uwldes}** - Mm. *Schbbodb bodba*. vel *Scbebette*. *LA*Ü *M* • *Jcbarrtba*. Big.
- 88- HEDYOTIS *bcrbacea* ? - Vs. Btf.
89. RUBIA *fjnSor*. - CMM. F«.t. **^g
- JO, IXORA *occirfewrnii* ? - Mm. *Schuaf*. O'y i> Ta*s. *Gborajeh*. غربیب Baccis iiigris: 2-locukrib. i-fpermis.
91. PLANT AGO n) *lanceohta*. - Mm, Kurmo.
92. - - ^) *media* ? - Mm. /r'sr bslhd'u Big,
93. (*) SCOPARIA a) *ternata*. - Ph. Dj^ir. Ghanifude.
94. - - /) *dubia*? - - Môr. Staminibus hirfutis.
95. (#) CISSUS «riorM. - Ph. Mi. forfz/- ^ ^ y , Srd. *Rak*. & *J* Dahlii.
96. (*) CORNUS *fanguinea*. - CP. Ph. Mi. G/^ni/: O-C Muř. Srd. *Onneb*. Btf. *Efchall & b*li*. Hadie.
97. (#) TOMEX ^/flJr/i. - Ph. *Dobeu* Srd.
98. (*) SiELANI^HUSfl)^«^fflgo«.Ph,MiMm. &r& A^ Srfl.
99. (#) - /0 *ghndnlofus** - Ph. Kudmie.
- ico* (*) - -c) *rotundifolius*. - Ph. Mi. Mm. Hfto. O^ala. MIKA. wJla* Srd.
- Ioi« (*) - ^) *ternatus*. - Ph. *Hauka** sjjOk. *Hnukaj*. حنکا هس.
102. - - *) *digitatns** - Mi. Mm. *Haluak*. Hadie.
103. ALCHEMILLA *vulgaris*. - Ms. Kurma.
- I ©4. POTAMOGETON fwr/i/i- Ma.
-

P E N T A N D R I A .

- J05. LITKOSPERMUM *hispidum*. Vs. *Sgaa*. (Sinai.)
106. O) HELIOTROPIUM/i)^m/cr«/i.Ps. « i i ^ Llij.
107. (*,). h) *fruticofum*. - Ph. Mi/W/f. MSr.
108. (*) - c) *curoptum*. - Ph. ftrir. ittitfr. Môr.
- 1Q9- (#) - d) *curajfav*. - Ph. Idem nomen,
- HO. (#) . f) *ovnlifohum*. - Mi. Hadie.
- Hi. (#) CYNOGLOSSUM a) *fonceolat*. Mi. &4<fl/. OÜxi Hadie.
112. (^) - /;) *Iwifolmm*. - Ms. *Hanfebeb*. s^Avuj^, Kurma.
113. - . c) *dnbium* ? - Mm. Barah. Antheris corolla brevioribus.
114. (#) ECHIUM *mticum*? - Mm. Taas.



111. (*) PRIMULA *virticillata*. Mma. - - - Boka.
116. ANAGALLIS *Litifolia*, - Mm. CAML i b j i Boka. fl. rubro, vel violaceo.
117. (#) OPHIORRHIZA *lauceol*. Mm. 1 ^ . Lībicjue.
118. PLUMBAGO *ceyanica*. - Ph. Mi. Hamfchad. حمادج Hadie.
119. (•) CONVOLVULUS «) projlw. Ps. - Llij.
120. - - b) *cneorum*. - - - (Sinni.)
121. - - 0 *spinofus*. - Ph. - Dahhi. Stigmatibus 2; Nećterio fquamis 5 circa germen.
122. (#) IPOMQEA 0) *fiabra*. - Mi. S.berdqedjn. Hadie.
123. (*) - i) *'/*[•] - - - Mia. Sokar. Zdiid.
124. (*) - 0 *aquatica*. - Mia. - . Ibid.
125. (#) - 0 *triflora*. - Ph. Sotar. Jtvo Hadie. Gafcbue. Srd.
126. (◎) - 0 *verticillata*. - Ph. Torrid. Kudinie. SeleM. Mflr.
127. (6) CAMPANULA *edulis*. - Mm. Cbobseloknb* c/JwJr^à* Kurma.
128. COFFEA *arabica*. - CMM. CML JBüttt. ^
129. (*)*) MiESA *lanceolate* Mm. Aišty. O^Jko ubique.
130. MIRABILIS *jalapa** CP. Mm" Zuhrellajl: t}XH j&f Big. Ufly*i*
e//^7. JUJJ (j^j Btf.
131. DATURA m/eL - Ph. Mi. Bendj. gi* Mfir. Mj//^', *ع*
vel <IXto Btf. Floribui albis; *fructu*
erefto, fpinofo, feu verrucis fubulatis: ad
Djöblam: alibi vcro verrucS obtufis.
132. NICOTIANA. - CM. Ttirtliün nomen Turc.
133. PHYSALIS a)fomnifera. Ph. Mi. Barde. Mor. "Obah/^A^ Srd. Hadie.
Várak cjjebtfa. Btf. ''
134. (#) - b) *ramosa*. - Ma. Uabfat.
135. CAPSICUM *fructiensi** CP. Darfelfd. Btf.
136. LYCIUM *europium*. Mm. Aafidj. j.s " ^ Taies.
137. (***) ANTURA *edulis*. Mi. Mm. Antbur. Hadie. ^ r a . ^ ^ Djøbla.
138. (•#) C^DABA a) *rotundifolia*. Ps. AM uJa'i Lhj. ^ ^
139. (#) - i) *glandulofn*, - Ps. Tanaim* Lhj.
140. (*) - c) *farinofi*. - Ph. mi. &TM&. gyuu Srd. TomZr. E / ^ d
^4/i/. Korrab. M6r.
141. (##) DIGERA Arvñi/lift Ph. Dyddjer. Mor. ^ w ^ 6r. jct^ Srd.
142. RHAMNUS a) *mbeca*: r̄cclus. Ph. Mi. Ard̄Orredj. Mflr. /E/^ . ^ ^ Djøbla.
143. (*) - *) *divaricatus** - Ps. Ph. Mi. Atdj. Mflr. JMr. Llij. G7J/J7,
Variat: rAM» undatis. Hars.
144. (#) SIDEROXYLON. Mi. Mm. Kini/. Hadie. Er/cb.

145. (*) SOLANUM a) *nigruw.* Mi. Mm. *MefMihe.* ~~سَلَانِي~~ Hadie.
146. (*) - S'f h) *termināte.* Mm. Hadie,
147. - - ١٠ *melongena.* CP. *BndwdjfitK*
- 148- (*) - C₁ d) *iucamtm.* Ph. Mi. *JEjn et bagar.* JUJ] ^j/p i. e. Ocnlus vaceff. Môr. *JErcmu* * >*o£ Hadie-Ennama. **iJ Djöbla. Än idem?
149. (*) f) *coagulant** Ph. *Eejkaman** Môr. *SwajfMiu* Mufe.
150. (*) - /) *armarium** Ph. *B oka me** t_s*f* Bonkouu Ifcä Hi?s. Zebid.
151. (*) - g) *vtliojum.* Ph. *Bokamt.* Srd.
152. (*) - /;) *babawenfe** Ph* *Melihsmü* Môr. *HabaL* O'to^ Ubf» *Hommafch,* Q ~~ه~~ i~~م~~ Srd.
153. - - ٥ *Mum** Boka* Flore albo, caule aculeato,
154. (*) - ٤ ٤) *tor datum.* Ph. / & M. Robqa. Congulandi proprietas tot; liuic generi vulgaris.
155. (<;>) CATHA a) *edulit** CM. Jui*/>. Big.
- IS5. (&) - b) *fpinofi.* Mi. - Kurma.
157. (*) EVONYMUS *inetmis.* Mm. Öynnennncmr. y*jJJ (jjAJ~~S~~ Ulif. elBenâr, Blg.
- 158- (++) MELHANIA ve/winif. Ph. Mlh.
159. (*e) HYPERANTHERA *fercgrina.* CP. Btf,
- 16c. V i m - - - CMS. li//?/;
161. (#*) GERUMA *alba.* Mi. Djerrum. p/^ Hadie.
162. (*) ACHYRANTHES «) *afiera.* Ph. Mi. l/ofej. Mflr. /7j/tfw. حليم Srd, • Hamfchcd* Hadie. Mal'm. L*ar⁰ Big.
163. - - I) *lappacea** - Ph. Mi. Hobb el adjais حب الْجَعَافِيَّةَ ii'd. Sivdic.
164. (ft) " ٥ *poljftncfia** - Ph. Susd* &K].U Srd.
165. (&)- //) *pauiculata** - Ph. idem nomeii. Mlh.
166. (*) - f) *fprrata.* - Ph. - Srd.
- 167- (•) - /) *papposa.* - Mi. Stei'am. j^Juuu Zebid.
- 1^8. (ft) - .g) *decumhens** - Ph. Mi. Mm. M:hn abjad* خطاب يَبْصُ Blg.
169. (*) - b) *villofa.* - Ph. Scbadjaret el aihlch شجرة الْأَتْلَبَ Hadie.
- 17^ («) MANGIFERA *ambia.* CP. Amb> C^*Af Hadie.
- 17 r. CELOSIA n) *argentca..* CP.
- 172* - - />) *ariflata.*
173. ٠٠ NERIUM «) *ubefum.* Ph. Mi. Mm. Öddeht. عَدَيْنَ Srd. i**«. ^ J ^ Piadie.
174. (*) - b) *foliis ternatis.* Mi. Mm. DrfilZ. ^ j Hadie.




- 175* NERIUM 0 *foliis intcgatis.* Mm. *Dbarnf.* Kurma.
- J76. (*) CYNANCHUM a) *pyiotechi.* Ps. *Mncb.* Môr.
- 177, (#) - i) *arboreum.* - Ph. *Keranna.* Lhj. *Kefcb.* Tor<>. Srd.
- 178- (*) ASCLEPIAS a) *cordata.* Mm. D*MM. **ةَّاَوَّل** Taaw.
- 179- (*) " b) *spiralis.* Ps. *ScbautoL* Lhj.
180. (#) - c) *h.uflora.* Ma. *Kanab.* **كَنْبَعْ** Djöbla.
181. (*) - 0 d) *fa (fa.* Mm. *Sabia.* **سَبِيعْ** Hadie. Dbrahn. **دَبَرْيَهْ** Zebid.
182. (*) - e) *radians.* Ps. Btf.
183. (*) - f) *nivea,* Ph. *Gbafcvbc.* Lhj.
184. - - g) *gigantta.* Ps. ÖJi'bar. Ubique,
185. (*) - b*) *glabra,* Ps. Taccs.
186. (*) - i) *apbylla** Mi. *Miltb.* Mlh.
187. (*) - k) *flipitacca.* Ph. *Rideff.* **رِيْدَفْ** Ubique.
188. - - I) *contort a?* Ph. *Hdmwed.* (j^u*£k. Srd. Ockas. عَقِصْ
Dagabb. *Rodiia.* £>*&£ Hadie. J'eres,
tlichorama, aphyliu, Ja&efcens; edulis.
Au eadeni cum ij>6. i)?
- 189* . C*) STAPELIA /J) *variegata.* Ph. *Draat dkilbe.* <JIXJJ ٰffL^ Môr.
190. (*) - If) *quadrangula** - Ph. Gio/r/. Oiš GboU*. Gbokk. Srd.
191. - - 0 *dent ata.* - Ph. *Difldmel.* J L * ^ Hadie. Draat elkeLL Srd.
Exigua, longicudine digiti
- 192^ (#) - d) *muhanguh.* - Mi. *Snkclgbovâb.* c^I^AJJ Cjilw Uhf. repens.
- 193; - - 0 *fubuUta.* - Mm. Qiiadrangula, Ipithamalis.
194. - - /) 4-^m*AnguU ratfiofa.* - Mm.
195. CHENOPODIUM a) *botrys.* Ms. *Scbokrelbomar** j|. *s! Ji&, Chadra.
196. (*) - b) *ferotinum?* • Ps. Taaes.
197. (#) - 0 *triangulare.* - Ps. Ib.
198. (*) • ^) virUe. - - Ps. *Rocket el djâmmel.* Ubique.
199. (•) PAPULARIA *cbryftallina.* Ps. Dahhi.
200. (#*) ROCAMA *proftrata.* Ps. Rôkama. **رُوكَمَا** Lhj. Srd. M8r.
201. (*) SALSOLO a) *imbrkata.* Pm. //nrw. **نَرْوَهْ** Lhj.
202. (*) - b) *inermis** • - Ps. (Sinai.)
203. (*) - 0 *verthiculata>* - . Djidda.
204. (#) - <i>*micronato.* - Ps. Djidda.
205. CRESSA «) *creatica.* - Ps. Pm. *Gborara,* Lhj. Ghomfude.
206. (*) - /') «rf*fc<>. - Pi. Taw.

207. GOMPHRiENA *ghbofu* - Ps. *Zauz HaUefebu* <^&jp>» k*^ Btf. 4/*cbek*
um.ifcbuk. "(i.e. Avians & amat us.) vel
Sirr habbefcbu ^*JMAS**^ Lhj# **Dam el**
asbek. *Mosul.*"
208. CAUCALIS *angvifolia*. • Mm. Big. HadJe.
- 209* DAUCUS *carota*. - Ms. *Djiffar.*
210. SIUM *latifolium*. - Ma.
211. SISON *ammu* - CP. *Nacbu.*
212. •ANETHUM a) *graveoletn* * - b") *famentum*. - CP. *Stbibt.*
214. PIMPINELLA *faxifraga*. - Mm.
- 2*5- (*) TAMAKIX *orienttUs*. Ph. A/. MSr. Ghomfude.
216. U) RHUS *finch* - Mm* *Saneb.* سنب بـ بـ جـ؟ Big. Barah.
217. (#) PHARNACEUM a)<*umbdlat*. Ps. Lhj.
218. (#) • b) *occuhum*. - Ps. Ibid.
219. (##) SU^EDA /1) *vera*. - Pm» ^«^ Ghorab. *Ho mim am.*
220. (*0 • b) *monuica*. - Ps. Pm. 4/fl/. Lhj. Kudmie.
221. («) - c) *bnccüttu* - Pl11. *Mullaab.* Ghomf
222. (*) - d) *bottenjii*. - Ps. *Mullah.* Taacs.
223. (*) - «) *frutkoja*. - Ps. D6/«i. Djiddar.
224. PARNA `SIA *pofytuSaria*. - Ms. Hadie*
225. (*) STATICE a) *axilhris*. Pm. Lhj.
226. (#) - . b) *cylindrifolia*. - Pm. Mocliha.
- 227^ LINUM *tenuifolium*. - Mm. Boka. Flore flavo; foliis alternis.
228. (#) CRASSULA *alba*. - Mm. Boka. Barah.

H E X A N D R I A ,

229. (*) TILLANDSIA. - Ps. Taoes.
230. BERBERIS. - Ps. *TaraL* ^*Je Mcfuk.* Kurma.
231. PANCRATIUM *maximum*. - Ta*s.
232. AMARYLLIS *alba*. - Ms Son/. Kurma.
233. LILIMUM *album*. - CMM. Zambak.
234. (•) ORNITHOGALUM *ftavum*. - *Cbofar errobah.* Bcka. *Bajfal cddj'mn.* Srđ.
Bojfilerrobab. Hadie.
235. ASPARAGUS *retrofracttis*. - Mm. *Scbad/ai et enuemr.* شجرة النمر
Henut eunemr. حنقة لـ زـ نـ مـ



236. O5JC0NVALLARIA *race?nofa*. Vh. Mi. Drfwag. Uii[^] Sid. Hadie.
237. HYACINTHUS <ifow. - Ph. Mm. Sdlab. v[^]>Lu Srd. Membaſcb. Btf.
238. (*) ALOE «) wi-fl: officin.* Ph. Mi. fiiAr. Môr.
239. (•) - '0 MrifgiM. - Mm. BfifiL J[^]a[^]aA fl/j/i/. J i [^] a j Big. Fi/
asfar. فل أصفر
240. (#) - 0 *inermis*. - Mm. ^/J/I>. «A).AS Koba. Taits.
241. - - d) *nrborea*. - Mm, Kohal. V[^]A[^] Djōbla. rario. Pedunculo
racemolo. Venenum c fucco paratur.
- 242* (*) - 0 *vacillanr** - Ms. Charcbara., Kuriuu
243. (*) HYPOXIS. - Vs. Tas-s.
244. (#) HiEMANTHUS *cocaicus*. Mi. Hoimhömet el bnnnnjch (ji»A3rJ & حـ وقیض
- Hadie. Vokct el bannafcb. (^jj»Jc حـ
245. (*») ADENIA *vtuettata*. Ph. Mi. ^<r//, ^^J[^] Hadie,
- 24& (») RUMEX a) *ferficarioid*. Mm. Öfiro/-; q[^]to Big,
247. - - /0 flc«/«r. • - Ms. Tlcbiil. JA[^] Kurma.
248. (*) COLCHICUM *montnum*. M«. Kurma.

HEPTANDRIA,

249. (#) LIMEUM /J<W/7[^] - Ps. Lhj.

OCTANDRIA,

- 25c EPILCBIUM a) *angrtftifolium* ? Mi. NVrfif. Hadie.
251. - - 1) Petalis rubrisi emarginatis; foliis suboppofitis, amplexicau:
Voriat: filih firruhtu[^] fimifuitbam.
252. (e») BINECTARIA *UurlfoUa*. CP. Btf.
253. (e») SODADA ^CIVJM. - Ps. Sodad. Kurma. Môr. Btf.
254. 00 AMYRIS «) *opobalfimum*. 'Mxn* Abufcbām. -%F[^]i[^] qJ Öudc.
255. (») - *) *«*«/• Fhi Mi. Kttaf' <-*t* Btf*
256. /*) : 0 *«/«/• *fl/fl/. Jiif Ib.
257. - - d) *fcbadjaret el'murri*
258. - - 0 *tbadafcbi* - Mi. Gbadnfch. (jiji.
259. LAWSONIA *incrnis*. - CP. Henna. Lhj.
260. ERICA *scoparh*. - Mm. Scbaudnf. iJkXiZ, Antheris inclufis ; floribus albis.
261. POLYGONUM *lydropiper?* Ma.
262. CARDIOSPERMUM *falicac*. Ph. Hadl. (Ji<yA> Dhara efutd. ظرو اسود

E N N E A N D R I A .

263. (**) VOLETTELLA *apbylla*. Ph. *Hndeg Môdeg*. M3r. *Dj&ka.* جوڈہ Hadie.

D E C A N D R I A ,

264. (*) BAUHINIA *iaermis*. Mi. *Hennel bagar.* JLJ] i t ^ *TumSr.* J*S
Athbtr. J+JS) Mlh.
265. (•) CASSIA *a)* *ofcbrek*. - Ps. *Afibrek.* CJ/M'SJ Lhj. MOR.
266. (a) - (b) *ror/7.* - Ph. Mi. *Kulkul.* J Å & I ladle. *Didjerd*
tikhar. jj^/^ty Uhf.
267. - - 0 *fifula.* - - Mi. *CMnr Jcbawbiür.* Ibid.
268. (*) - ^0 *ligufrinn** - Ph. Djöbla.
269. (*) " 0 *sunfub.* - - Mi. *Sunfuh.* Taa?ff
270. C*) " 1) *lanceolata.* - Mi. Ph. *Sunn.* LUAJ Srd. *Kolkol.* Hacft.
271. - - g) *tnedica** - Ph. Mi. Petiolis non glandalofis.
272. - - h) *procumSeus?* - Ph. *Houmer.* vcyä* Srd. Caule *erecto.*
273. SEDUM *florib. corymbojtr.* - Mm. Boka.
274. (#) POINCIANA *elata.* - Ph. *Rauf.* Uli Mfcbill'cch ^JJUVO Mlh.
275. RUTA *graveolcns** - CP. *Scbedab.* شداب Petalis ciliatis: gennine an-nulo punctorum.
276. (**) CADIA. - - CP. *Kadi.* ^AS3 Big.
277. MELIA *azeder.* - - CP. Foliis tripinn. {Mella azadir foliis bipinnatO
278. (#) ZYGOPHYLLUM/i)pro/i/éni/n. Pm. *lUmd.* Cj*i+a* Ghorab.
279. (*) • 10 *portnlacoid.* - Pm. *Kernel.* Djirmel Môr. Ghoralx
280. (#) FAGONIA *a)* *cretica.* Ph. *Scboeka.* Scbouki. Lhj. Môr.
- 28r. - - - Ejdatt. (Sinai..)
282. TRIBULUS *bcxandrm.* - Ph. *Kotaba.* Lhj. Kurma.
283. (*O JUSSIffiA e^</x. Ps. Ph. *Uahû* Lhj.
284. DIANTHUS *uniflorus.* - Ms. *Zabreszirr.* jyñySt^ Knrmtr. Scapobre-viflmo, unifloro; foliis linearibus*
285. SILENE *nutans-* - Ps. Big. Pedunc. foitariiis.
286. (-*) ARENARIA *a)* *fafikuhta.* Ms. Kurma.
287. (•) - *0 *fihfolia-* - Mm. - Boka,
288. - - c)'firpj>llifoUa? Mm. - ibid. Petalis albis, parvis.
- 289* 1# «) CAUCANTHUS *edulis.* Mm. *Konks.* Ilas.
290. (#) COTYLEDON *n)* *deficient.* Mi. Ödejn.
291. (a) - b) *lanceolata** - Mm. *Homed errobat-* Kurma.



DODECANDRIA.

- | | |
|---|--|
| 295. (** CULHAMIA. - | Mm. <i>KulUhn.</i> ***£=* Hadie. |
| 296. TRIUMFETTA /1) <i>hppula.</i> - | Mi. Mm. <i>Akmeda.</i> Big. <i>Hamfcbed.</i> Hadie.
Scigmate simplici, non bifido. |
| 297. - - b) <i>glandulofa.</i> - | Mm. <i>Foliorum {erratum iiiRmis glajidulofis.</i> |
| 298. PORTULACA a) <i>okracta*</i> | CP. MI. MM. <i>Brabra.</i> ^ 1 ^ Btf. <i>Cbamile.</i>
<i>Danntb elforras.</i> (JUIJU J V^AJO Srd. Hadic.
<i>Ridjlet el farms.</i> Kunna. |
| ² P9- (*) - ^) <i>linifolia.</i> - | Mi. <i>Mortal).</i> *^xo Hadie. <i>Koraaterrai.</i> Srd. |
| 300. (#) - r) <i>iwbricata.</i> - | Ps. /?oasi. Btf. 6<<</rt. »Aiy»I |
| 301* (*) - d) <i>barefchta.</i> - | Ps. <i>Hartfcbtam mi.</i> Môr. |
| 302. EUPHORBIA a) <i>tntiqu.</i> | Ph. Mi. <i>Gbolak.</i> <i>Ktlab.</i> Môr. |
| | ^) <i>aruculata major.</i> (Migr. Abu&rifsch.) ITfi/: Oddein. |
| 303. - - /3) <i>innrtic minor.</i> | Ph. Mi. <i>Cborrtfcb.</i> Hadte. |
| 304. - - £) officin.x) <i>arborca.</i> | Mm. ^wi. ci»g Barah. |
| 305. (*) - /3) £*fpit*fi* | Mm. <i>Scbôrur.</i> Djöbla. Pedalis. |
| 306. (#) - y) <i>frutkofa.</i> - | Mm. <i>Scbôrur.</i> Chadra. Subpedalis. |
| 307. - - c) <i>canariens.</i> - | Mm. <i>Kaffa's.</i> (joL*aJ* Djöbla. Taars. |
| 308- - - <0 <i>tirucall. u)/implex.</i> | Mm. <i>Dahan.</i> i^j&£ Djöbla. |
| ² 00. - - 5) <i>tiruc* dkbot.</i> | Mm. <i>RummhL</i> ^jo _r |
| 310. - - 0 <i>tbymifolia.</i> - | Mm. <i>RummU.</i> An diverfa? Ghomfude. |
| 311. (•) - /) <i>triaculeata.</i> - | Ph. Mtifa. |
| 312. (#) - g) a) <i>grannhta.</i> | Vs. Pli. <i>Lcbbajde.</i> LhJ. Mor. |
| 313. - - • /3) <i>decumbent.</i> | <i>MeUbeue.</i> &*AA1*> Srd. An eadem? foliis ferrotis;
floribus axillaribus. |
| 314. (#)~ A) <i>peplus:</i> limb. 3.2. | Mm. Ph. <i>Subbejb.</i> <i>Sabia*</i> %*juu Big. |
| 315. (•) - 0 */</rt, multifida. | Ms. <i>Suba/ib.</i> V^WAAXAJ Big. <i>Saufib.</i>  Kurma. |
| 316. - - A) <i>abortiva.</i> - | Ph. Btf. Spontanea : vulneraria. |
| 317* (*) " 0 <i>Mukn*o'</i> | Mm. /vn/i. Cjjj Kenitb, &) \$Sill. JLuu TQJTS. |

- 318.** RESEDA foliis ovatis, feffilib. - *Bdtrnn.* (Sinai.)
319. (*) GLINUS *a) fetiflorus.* Ph. Dahhi. Polypetalus.
320. (*) - *b) lotoides.* - Hi. *Hajcbfe.* Mflr. Mlh.

ICOSANDRIA.

- | | | |
|--------------------------------------|-----|---|
| 321. PUNIC A granatum. | - | CP, CM. i?w; w̄. Btf. |
| 322. AMYGDALUS prr/ic*. | - | CMM, Ftrfik. (£JJUJ) UðcL Hadie. |
| 323. PRUNUS a) dvweftica. | - | CM. Barquq. |
| 324. - - b) armeniaca* | - | CM. Afifcbmifcb. |
| 315. (*) PYRUS /i) badiensis. | - | CM. Sftrdjtt. Hadie. |
| 326. - - If) vial us* | - | CM%. 7>/i)/'. |
| 327, ROSA indica* | - - | Mm, مَرْسَقَةَ زَوْفِلَبْنَةَ Hand-
jam. Big. Flore olbo; petiolis
fubinermibus. |
| 328. KUBUS fruticofus* | - | Mm. نَفْصَ حَمْدَنْصَ Nafṣ Hāmm<ts> حَمْدَنْصَ
Örs. Hunc Rubum in libiis Arabum
dici Ölleik UūSs affirmobat quidam Litera-
tus, quod nomen in £gypto tribuitur ge-
neri Convolvuli. Vocem Exod. C3.V.2,
transtulerunt LXX Inrpretes Bcfloc]
& ex his verfiones Arabics fequaces, ut
Copto-Arabica oliarque fecerunt Oūi^ un-
de hoc olim fuiflē Rubi nomen Arabicum*.
probabile videtur. |

3*9. (e) POTENTILLA *dcmatn.* Mm. Uhf.

POLYANDRIA.

330. (•*) M^RUA *craJPfoVm.* Vs. *Marv. jyo*
 331. (*) CAPPARIS *a) mitbridatica.* Ph. *Schsgar.* *J.u i* *Oudefymnu* Sri Hadie.
 332- (*) *-h)fpimfa.* ————— **p_s**, **Ufaf.** **Ta«.**
 333» (*) " *c) itwwis.* * *Ps#* • ibid.
334- O) • *J) oblongifolia.* - Ph. *Redif.* Mflr. **Afsl.**
335- (•) - 0 *dabū* - Mm. *▷◁◁i.* **ظهی** Mlh.
 336. PAPAVER *opiiferum.* CM.
 337- (•*) ONCOBA *fpinofa%* Mi. *Oukob.* **عَقْبَ** Big. li:_{or}J_{or} **فَرْقَر** Srd.
(p) 338-




- 338- (#*) CHADARA *a) tcnax.* Ph. Mm. *Cbadar.* Srd. *SabU.* *xi
- 339* (#) " * *nrborca.* • Mm. ,fo;flf# Uhf.
340. (*) - c) *vclutina.* - Mm. *Kefibamnn* Jú i Hadie*
- 341- (*) MESUA *glabra.* - Ph. *Cl-ndar.*
342. (*\$) ORYGIA *↔ fortulacijolia.* Ph. Mi. *Horudj.* *Horudjrudj.* ??/.*/& Srd. Hadfc.
343. - - £) vi/Aj/Jf. - - id. nom. Boka. Flor. fulvis; foliis villofo- fericcis.
344. (•) - 0 *decumbent.* - Mm. Mufa.
345. CORCHORUS *n) olitorins.* CP. Ph. *MehcMa.* Srd. Spontan.
346. (*) - b) *aftuans.* - CP. Idem nomen. Mür.
347. ANNONA *gbii-tf.* - CP. *S'fcrtijel hhuli.* ^JJAA J^kJtw (Annona j; Indis)
343. (#) CLEMATIS *v̄fAffr.* Mm. *Schcradj.* ^yi» Kurina. Big.
349. CO RANUNCULUS *a) cbaropb.* Mia. Kurma.
350. (??) - i) *multifidus.* - • - Taais.

D I D Y N A M I A .

351. NEPETA *a) violacea.* - Ms. Kurma. Foliis crenatis.
352. (#) - b) *nepetells.* • Ph. Tares.
353. MENTHA *longifiHa.* - Ps. ibid.
354. MARRUBIUM. - - Ms.
355. (#) PHLOMIS *alba.* - Mi. *Scbokab.* K*ASJZ> Hadic.
356. MOLUCCELLA? - - - (Sinai.)
357. (*) CLINOPODIUM/,«r/čo/: Mi. Mm. Big.
358. ORIGANUM *major ana.* CP. *Mardahnfib.* Etf.
359. (*) THYMUS *a) ftrpjllum.* Ms. *Statar.* /&>* Mafchwara. Chadrn.
360. (^) - b) *imbricntus.* - Ms. Kurma.
361. - - 0 *fuUgmidl* - Ph. *Dfifb.* t>jc3 Mflr. Srd.
362. OCYBUM *a) bajilicmih* CP. . *Habah.* Lhj. *Riban,* nomen ufitatfff.
363. (#) • b) *gratijjum.* - Ph. Mi. *Höbokbuk.* OÜJUa, Hadie. Srd.
- 364.. - - 0 *wwiflwum.* - - - F</fl#. Mdr. Srd. Scbadjnret eszirr. ^ J) g ^ 0 i. e. planta charyophylla:a.
365. - - *Q *filametttofum** - Mill.
- 366, (•) - 0 *ftrpUfil-* - Ms, 4/5/# J^flC Mharras.

- 3^7- (e) OCYMUM/ *hnilUnfi.* Mia. ilfatfif. Öucle. Big.
368. W ^Njf S) *tgypiM** CP. *A'lcdañ** <jjJ>/o ئىف (A⁷.gyptis Zatarhendi.)
- 3%-. (ft> 3 |Jt b) *villofhm** Vs. Tass.
370. (*> p N 0 »»»'»» CP* Btf *Vaale.* ئىلە.
- 371 • SCUTiLLARIA *galeric.* - Mm. Ms. • Kurma.j Foliis ovato-lanceolatis, crenatis.
372. PHRYMA?. . . . *Ilamfclal* Hadie. Mufa. Scminibus 2 cchinatis, connatis. An. *Rticllhrt*
- 373* CELSIA *racemfa.* - - Mm. - Bnrah. Flor. flavis, racemofis,
- 374* W BROVALLIA *humifufa.* Ms. - Boko.
- 37J- (e) LIMOSSELLA *caiyctn**. Ma# - Uadi Zebld.
- 37^ C#) OROBANCHE/i)n'/iffori?. • HsAr. Mflr. Srd. Zybi clka زرب الْقَعْ
- 377- • - h) major? - - - Taas.
- 378- (e) CHARACHERA *a)tctrogona.* Mi. Frf/řto. Hadle. Mekatkata. BJg.
379. (*) A) - *vlhitrnoides.* - Mm. - Barah.
380. (») SESAMUM fWicm. - CP. *Djyldjyhñ.* Ubique.
- 38r. (#) RUELLIA «) *imhticata.* Ms. - Boka.
382. (<*) - i) *hnrvfi.* - - Mm. *Svudvud.* Qjjyuу Big.
- 383- (<) - 0 *finftns.* - - Ms, *GbobSt.* Ju& Kojjeif. صييف *Mtaktkta.* &A&vo Srd.
384. - - d) *jl^f- ttruha.* - Mi. - Srd. Flore caruleo, parvo.
385. («) - 0 *guttata.* - - Ms. *Gbobire.* ^ A⁵ Kwr. Djöbl'a. Chadra.
- 386# - - y*) *flttj.* . . . - Aludje. Flore albo, parvo ; foliis ncuris.
387. - - g) *lijpida.* - - - *ClommSb.* £U>a» Ul^f. Canle hifpidi perpendiculari.
- 338- (#) - /) adUrens. - - Mi. *Hamfcld.* 0 ^ * *. I ladle.
- 389« (***) SIMBULETA. - - Ms. *Sywbulet cnnefim.* A*«JJ ŠJUÅW Djöbla ساپل.
390. ACANTHUS fl) *madertfp?* Mm. Mi. Ph. *Safak.* ^>JO Srd. Fforihos albis; brafteis, (non calyce) dliatfc.
391. (•) - *) *tduhs.* - - Ps. Ph. Zo^fl/. Mflr. Lhj.
392. (#) - c) *arboreus.* - - Mm. &//»/. <£**» 13lg. Barah.



T E T R A D Y N A M I A .

393. (*) SUBULARIA *purpurea*. Ph. *Bbkel.* Mflr.
394. LEPIDIUM *<ij/rt/iv<<w.* - CP. *Half.* o Ua. Btf.
395. - - b) *filpinum?* - - Ms.
396. (*) SISYMBRIUM */i) pinnatifid.* Mm. - Big.
397. - - /;) *monenfe.* - - - *Bockekl.* <JJU& Kurma.
398. (*) CHEIRANTHUS/iMwrij.Ph. - Mufa.
399. RAPHANUS *fitivut.* - CP. *EiikeL IWyl* Môr. Lhj.
400. (#) BUNIAS *orientalise* - Ps. Ph. *Dorama. Chodejva.* Lhj. M6r#
Fw^i* LuuJ Btf.
401. CLEOME a) *gynandra.* - Ph. *Gleifnkau.* Ubique.
402. - - If) *omicbopod.* • CP. Fh* *Cbozd/n.* f 5;^ Sokajka. &JUKAO Lhj.
Fragrans, fed cephalolg. efBcir.
403. (#) - 0 *digitata.* - - Ph. *Bijf** (^uu^ Srd.
404. (#) - *0 *angulfifolitu* - Ph. - Taa*.


M O N A D E L P H I A .

405. GERANIUM«) *§tam*ftrtiL* 7. Mm. *Ho'modwod** Oo+xi+ak Boka tantum
repertum#
- 406* - - b) *St. feru* 5* - Mm. - Kurma. Flore pallide-rubro; pedunculis mulcifloris; foliis multifid.
407. - - 0 *St. feru* I o. - Mm. Ms. *GbasI Ju**2* Kurma. *Cbada.* Boka.
Variat: a) *fiore albo.* @) *ftQre r^ ro#*
- 408* - - «) *rohertianum** - Mw. *Tahb.* „Had?e.
409. (***) ELCAJA. - - Mi. *Roka.* ^3^ Hadie.
410. (#),SIDA a) *cordifoha** - Ph. *Rén.* Môr.
411. - - b) *porva, flore albo** Mm. *Scbadjaret el uak.* Big.
412. (#) - 0 *paniculata?* - Ph. Mm. *Rén.* ^ ^ *Ghohdri,* U^/AAS Uhf.
- 4»3*(*) - *0 *ovata.* - - Ph. - Surdfid.
414. - - 0 *ciliata.* - - Ph. Mi. *Vuzar. Tfcbaba.* Srd. *Sockda.* سکع
Stipulis filiformibus, non ciliatis.
415. (#) MALVA «) *montana.* - Mm. //ororf. *O^>.^ H&bfin.* Big.
416. - - A) *rotundifolia:* - Mm. Idem nomen. Ibid.
417. (*) GOSSYPIUM a) *arboreum.C?* Oth. Zajt. Qdjaz. (j olcj Môr.
- 418- (*) *^{r&rum}» - - - Mi. Idem nomen. Hadie.
- 419* (•) URENA *ovalifolin.* - - - Taas.

420. (*) HIBISCUS.? *flavo-ferrugheus*. Ph. Mm. - "hide. Big. Has.
421. (#) - b) *purpureus** - Mm. StcL JfYJU C>oA*. **حبيس** Mai St Hadfc.
IIotouttoM. Big.
422. (#) - c) *tripartite*. - Ma. - Uhf*
423. (*) - ^) *pabnatus**. - Ps. - Mufa*
424. (#) - 0 *trionunu*
425. (#) - l) *flavus** - Ps. - Lhj.
426. - - g) *efculentus*. - CP. *Bamia** Capfulis liifpidii.
427. (#) CAMELLIA *grandiflora*. Ps* » Tairs.

D I A D E L P H I A.

428. FUMARIA *ofuitu* - - Ms. *Summina*. **سمينا**
429. POLYGALA a) *pnniulata*. Mm. - Ijoka.
430. (*) - h) *bracfcolata*. - Mm. ML *Schbadjaretel hauet*. **الجوار** حجر ac^Hadie.
431. - - c) *ciliata*? - - Ph. ~ Srd.
432. (#) ONONIS l) *flava** - Mm* . Djöbla.
433. (#) - l;) *quinata** - - Mm. - Chadra.
434. (#) PHASEOLUS « rflrfiflw. CP. *Kojbar'u* M6r.
- 435^a (*) " 0 *palmntu!** - CP- G<>r» Mor.
436. OROBUS *volubilis*. - - - Kurma* Stylo apice piano.
437. (#) DOLICHOS a) *polyfinch*. Ph. Mi. \$£/*/• Mor. Syjefrolacb. ^liJI **سيف** سيف
Srd.
- 438- (#) - h) *cuneifolius*. - Ph. Mi. Jfo/&/. M6r. *Kalakel*, J3 ^ff Hadie.
- 439- (•) - c) *culnatus** - CP. *Kefcbd*. fturma.
- 440 (#) - d) *labin*. - CP* *Didjve*. tf/^J- Lhj*
441. (#) - 0 *jifla uigrita*. - CP. - Djidda.
442. (#) - f) *fabaindica*. - CP. - Ibid.
- 443* (*) • &) *fetban** a) *annum*. Ph. Kuutud. <>AA£= Srd* Flore flavo.
444. (*) - l) - /S) *rforcif/CP. Sejeban. Zebid. Flore bruneo.
445. (*) LATHYRUS a) *specatabilis*. VK Mi* Srd.
446. (#) - A) *tomentofut*. - Ph. Sb<<fi. M6r.
447. CYTISUS *pinnatm*? - CP. *Schnnfcdzik*. (^ajj I OU*i, Sadie. Zebidr
448. (*) GLYCYRRHIZAtt»7rn_M.GP. ML (Siw. Indi<.) Hadie. 7cbJJ.
449. (*) HEDYSARUM fl) *fio/dieiiw*. - Srd.
450. (#) - b) *vinmaculntuuK* - Mi. Mm. Hadie.
451. (#) - c) *lappaceum*. * Ph. Hu?>h d adjais. Lhj.



459. (*) INDIGOFERA *a) tviclor'm.* CP.Ph.Mi. *Mile.* »Jxi Ubique."
 453. (#) - *b) honer,* - • Ph. *Houcr.* /{* }^ Srd.
 454- (*) - *0 fewitrijuga.* - Ps. - Lhj.
 455- (&) • *4) oblongifolin.* - Ps.Fh.Mi* /fe/Jr. ^L" M* Lhj. Mdr. Hadie.
 456. (#) - *e) fpicata.* • • Mm. *Mfchetc.* XAXWO Big.
 457- (*) - */) fl'Mofi** • " Ps.Mi. /fa//. JC* Srd. Hadie.
 458. (•) GLYCINE *abrus.* - Mi. Mm. ^y//ifl. n/JU Hadie.
 459. (0) TRIFOLIUM *a) meliloth.* Ma. ^yjfl/; ^ I ^ Reindm. Kudmie.
 460* (#) - *V) unifotium.* - Ma. *Lbbabdabid.* <JUSJJ v ^ J Taaes.
 461. (ft) - *c) refn/y.* - Ms. - Hadie.
 462. (#) LOTUS «) ^</t<<. - Mm. . Big.
 463. - - *V) fruticofm* . . - Mufa»
 464. TRIGONELLA *fonumgr.* - CP.CM. II Me.
 465. MEDICAGO /%cflrf. - CM. Jfmtf. Djöbla.

P O L Y A D E L P H I A .

- 466* CITRUS /1) *medica.* - CP.CM.Ph. Spontanea parce. *Vim'.* *JJ Lim&n* Petrolis leviter alatis.
 467. - • *I) auramin.* - CM. *Cbommafclu*
 468- - • 0 *M**r* Ccdro dicta.* - CM. *Tunnulj.*
 469. HYPERICUM *kalmiu* - Ms. *Ebts.* {j**\$} Arboris ftatura.

S Y N G E N E S I A .

470. SCORZONERArt) foW*<i?* - Ma. *Myrr** j-
 471. - - *li) orient** • - Mm. *Myrrejr.* Big. Caule ramofo*
 472. (•) PICRIS *fcnhra.* - - Ms. *Myrrejr.* Chadra.
 473. («) SONCHUS *olerac.* - Mini. Idem nomen. Uhf.
 474. LACTUCA *a) fativa.* - CM.
 475* (*) - £) *iucrmit.* - - Ms. *Kat tmjSn.* ^ j l x ^ l o l * Kurma-
 476. (*) - O^v/'. - • Fh* Hindik. **<*>*& Srd.
 477. HIERACIUM *a) muhiflorum.* - Big. Foliis denticulatis.
 478* - - ^) *uniflorum.* - MirryV. y^y° Kurma. Scapo dcccumbente, Iquamato, uniflovo.
 47J, CREPIS *radieata'i* • - Mm. Idem nomen. Bolg. Foliis pctiolatis.



480. ECHINOPS. - - - Ms. *DjirJSma.* a * ! ^ vel *CJJ<3^.* Chadra.
Capitulo bipullicari, albo.
481. BIDENS *apifolia;* - - Mi. *Sis.* Hadie. Foliis laciniis late-ovatis, incisis,
ferratis ; Floribns velut ham* coacervatis in capitua*
482. (t) CACALIA *a) fenduhu* Mi. *Kaad.* Q >^ Hadie.
483. (#) *Ø odora.* - - Mi. Mm. *ErfMer.* y ^ j J Hadie.
484. (*) *c) fewperviva.* - - Mm. *T;^?oA.* Boka.
485. - - *d) fonchifolia.* - Mi. Mm. *Ond el ktirak £ JU 5 ^ ^ 5 vel ^ /,7.* xlxw
Hadie. Foliis iubrocundo-ang'ulatis.
486. (#) CHRYSOCOMA <i) OU/I/J. Ph. Sïd.
- 487* (#) - ^ *fpatnlata.* - Mm. Tarts.
- 488* - - *c) corymBofí.* - Mi. Hadie. Keceptaculo nudo;, fcminibus pap-
pofis; floribus flavis. Foliis &odo-
refimilis *Enpnturio barnuf.* /E"y>t.
489. ARTEMISIA *ponrica.* - CP. M. *Rand.* <Xy *BttraiL ^jX^Glo^xjre.* ^ KA£
Fnlticofa, utriuque nlba.
490. (*) GNAPHALIUM /i) *orientate.* Mi. Mm. *Adbaundktlb.* v^sIDJ i^%)^]
Hadie.
- 49U W - V) *fruticofum fiavum.* Mm. 5>W<r. Barah. Scberarat. U Q S ji Karma.
492. (&) - Ø *calycibus albis.* - Mm. Kurma. " ^
- 493* W ^ d) *calyc.ciner.\ fol. linear.* Mm. Ibid#
- 494» (*) Ø *cal* cin. fol.cuneatis.* Mm. Ibid.
- 495- CONYZA a) *ffix/e n/i/o.* Ms. Big.
- 495« (*) b) *tomentofa.* - - Mm. Blg»
- 497* (*) SENECIO a) *lyratus.* - Mm. *Mekatknt.* Big. Hörimrbn. Barali.
498. (•) - 4) *hadienlis.* - - Mm. *Salaaljnd.(jf&)* £^xA>|e|Chodrab. ijJ^a^±
Sxhelbakar. 1%. Didtur efVe>erus
Oudelkarah, ^ JJJ I j * ^
- 499« - - c") *foh linear ibtts.* - Mm. Big. Foliis linearis - lanceolatis, intcgris,
joo. - - d) *rotundifolius.* - Mm. Ibid. Foliis petiolatis, rotundatis, den.
tato - incisis.
- 50!• (*) . e) *liuifolws.* - . Mm. Ibid.
502. - - /) *n_nif9 radio nullo.* Ms. Djobla. Foliis linearib. subdentatis, am-
plexicaulibus.
503. - - g) *foliis lanceohto-dentatis.* Amfatul JkUis
504. (#) ASTER *ericsfoliuu* - Ms. Aufif. Uu***te Kurma.
505. (#) INUM *jfora.* . Ph. Münis. Alflr. NcjZ^ci. (^ ^ i a Lhj.
Cbla. srd.

506. (#) ARNICA *lirfita.* - Ms. Barah. Bolca.
507. (#) BELLIS *jfatvi.* - Ps. Taars.
508. TAGETES *) *em̄to.* - CP. *Raudjes.* (ju[^]a:[^] NVia/[^]r. -5*i Btf.
Sponte Big.
509. - - //) *dubia?* - CM. *Benefidj.* جَنْفِيدْ بـig.
510. (#) SIEGESI3ECKIA *oririwi/.* Mm. Uhf.
511. (*#) MICREL1UM /oW. Ph. *TolaL* U[^]UJ[^]D Big.
512. (*) CENTAUREA *maxima.* Mm. *Mohař** *&\$-* BojdcL B&ruad* Barah.
513. CALENDULA o[^]žn̄w. - CM_# *Zotyde** eO[^]j[^];
514. MATRICARIA *parthtn?* - Mm. *Mdnidt.* O[^] Kurma. Ramofa , fub-
cubital is.
515. YIOLA *ft) arlnrzn.* - Mm. *Sidr.* سـدر Uhf. R<Ma. *[^]Ayx Barah.
516. - • If) *reptns.* - Mm. Foliis par vis, reniform,
517. IMPATIENS *Inifiminn.* - CP.
-

G Y N A N D R I A .

- 518- (*) ORCHIS a) *ftava.* . Mm. *Vjiffat.* يـفـفـات Barah,
- 519- (#) - i) *opbylla** - - M* Kürma-
- 520* («) - 0 *vitMis.* - - Mm. Ttss.
521. EPIDENDRUM. - - Mm. *KurtdtlaiuL* u[^]UxJJ A[^] T J Taas. Foliis
ternatis , carnoiis, cuneatis, plauis.
- \$27. (#) ARISTOLOCHIA 4) *fempervir** Ph. L6Vf/L WJJ Gha[^]ba. Mōr,
523. - - b) *dubia 1* - - Eft/*.'OQJiJ Foliis altemis , ciliaris,
reniform.
524. ARUM a) *cohcifta.* - • Ma. *Kurr.* J£=D Keur. jfy£=> Hadle,
- 525* (#) - V) *fiavum.* - - Dcc/jAf[^]i <>Ak<3 Taars.
526. (#) - 0 *pentapbylluw.* - Mm. Idem nomen. Barah.
527. (*) ZOSTER A n) *numerviV.* P«. Mochha. Djczavi.
528. (#) - *) *rf/fir/i.* - - Pu. Kannfi Kofcbar. Ibid,
529. (*) - c) *stipulncea.* - - Pu. U»^d<>
- 530- - - d) *dubia?* - - Ölyf. Djöbla. Foliis vertkillatis, filifonnibus,
pollicaribus.
-

M O N O E C I A ,

531. LEMNA, . . . Ma. *Blcfiwu.ān.* ^UxwJU Uhf.
532. (***) KOSARIA yañVA?. - Km. *Kojto; j+ai* Hadie.
533. ZEA wjy'r. - - CM *Rumi.* Uhf
- 534- (*) PHYLLANTHUSa)nU'uri.Mi.Mm. *M*kathaia.* AUncckete. Jllg.
535. (*) - b) mndcrafo - Mi. Hadie.
- 53^* (*O - *) ovrf'rfolius* - Mm. *H'tnamcr.* .^MSU I!?.
537. (** - d) b.'wtnr* - Mm. *Himrūr.* y^ . Mcihān.
- S38' (<) BUXUS <*<? Mm. *K&taiiK* Kurma. Baiah.
- 539 (*) UKTICA /?) palwnti. Mm. *Scbadjaretclmebn/tbr.* Horokrvh. cJ^i^3k Big.
- 540* (#) - £) iiierj. - Mm. *Hximfcbed** JuiuČk. Dig.
- 54'* (*) - 0 pamfircM. - Mm. *Ka'tjw.* B!g.
542. (jt) - #) drvii'iiciitA* • Mi. *Afibwrckti** Had?e.
543. - - e) Htns? - Mm. RoMM*. Big. Capitulis HM? -JxiUaribus.
544. . ^ /) Jifjfii? - Mm. Foliis oppofitis, iongirudine petoli, ovato-acutis, profunde ferratis. Borah.
- J45. XANTHIUM flruwRr* - Ma, *Alandjelmd-* ^i gru* Ktivarela lild AJlif. M&Y.
546. AMARANTHUS //) blitum. Ph. *Scbedacb.* Ghomfucle. Mflr.
547. - - /) oltraccus* - CP. *Scktdncb bindi.* Kudmle.
548. - - 0 hyfoidut. - *Scbfidjarettrraof.* C^I^JJ i^F** Zebid,
- 549* • - <0 racei/iis viridibus. CP* *djibclfirrar.* (juujUJ e^wwP Zcbld.
- 550- (i^*) TURIA nj/flfiM. - CP. T<rī.i. Mōr.
- 551• (*) - ^) foliit cor dads. - CP, Idtin nomen.
552. (*r) - c) kloja. - Ph. I</i c i! Lhj.
- 553* (*, - <0 gj/i/. • Ph. Mōr. Sid. Gijtf.
- 554- (*) - <) motftndd. - Ph. Mōr. Mcgbadd
- 555- (#) JATROPHA p<>ge>f. Mi. *Mdsrhka* Hadie. Autfraliorib. Hitmejn.
- 5\$6. RICINUS communis* - Ph. Mm. *Tehfcla-* ALUAX Hadie. ZrfV. Kuclmic. Lj.r. Kicr.
- 557- (*) ACALYPHA a)frutkof<. Ph. ML ftfww. ^b,? Sid. D^a<. HadJc.
- 558- U) - *) dc cidua. - . Ph. Mi. *Bortow figi><jar.* Ibid.
559. (*0 • 0 fpkat*. - Ph. Sid.
560. (#) • ^) fnpera. - ph. Ibid.
- 56*. (*) - 0 alum. - Mi. Tans.
562. (#) CBOTON a) iolatum. Ph. ÖW//< CAA5 Srd. Medjcrfih. M5r.
- 56j. . - /) nnēiorium ? - Ps. H*:dak. Lhj.
- 5^4- (*) - ^) wrirftiiw. . Mm. D<>i/. JO^O ZeLld.



\$69- (*) CUCURBITA a) Ugenarla. Cl¹. Dubba dybbe. Mflr.

- | | | | | | | | | |
|------|----------|-----|---------------------------------|---|------|------------------------|------------------------------|------------|
| 570. | (#) | - | b) <i>citrullus</i> . | - | Min. | <i>Scbtrredj.</i> | LA | Uhfc |
| 571. | (*) | ••• | 0 <i>cür*</i> <i>kafcK</i> | - | CM, | <i>KafcL</i> | Hadfe. | |
| 572. | (*) | - | d) <i>citr.</i> <i>battieb.</i> | - | CP. | <i>Dubba farakir.</i> | M6r. | |
| 573» | (*) | "• | 0 <i>pepa tonga.</i> | - | CP. | <i>Kara*</i> | Lhj. | |
| 574. | - | - | /) <i>dubia?</i> | - | CP. | <i>Habhab*</i> | | |
| 575. | CUCUMIS1 | If) | <i>cohcyntb.</i> | - | Ph. | <i>Hamdal.</i> | <i>Dabak.</i> | Mftt. |
| 576. | (*) | • | <i>by atiskria.</i> | - | - | - | Mufa. | |
| 577* | (•) | " | 0 <i>trilobatus.</i> | - | - | - | Ibid. | |
| 573. | (*) | • | <0 <i>uthtimta*</i> | - | - | <i>Mhaimta.</i> | *Is4A(j/o Srd. | |
| 579. | (>) | " | 0 <i>orientalist</i> | • | - | P ^ | <i>Smllk</i> | Môr. |
| 580. | (*) | - | /) <i>inedutis*</i> | - | Ph. | <i>Arahts.</i> | (j ^ iLc- | Môr. |
| 581. | • | • | g) <i>daucus indkui.</i> | - | CP. | <i>Djttffar bendi.</i> | هندی جن | Btf. Zebl. |
| | | | | | | (Indis. | <i>Gadj.r. ScbXit'kand.)</i> | |
| 58a- | - | - | b) <i>tuberculatuu</i> | - | CP. | <i>Dabaq.</i> | <Jia.<3 | MGr Srd. |
| 583- | - | - | i) <i>ölid' Lie.</i> | - | Ph. | <i>Ölhthh.</i> | 8A3rU | Uhf. |

D I L O E C I A.

P O L Y G A M I A .


591. MUSA *paradijtacn[^]* - - CMI.CMM, *Mouz** ^{✓/y} Sola fcemina hatetur
in Yemen; <& arbor propagatur ftipitibus*
592. (») ANDROPOGON ») *ravwfum.* Mi. Hadte. -£«wf 0[^] 90 Eft nomen
gTaniinibus plurimis p etiana Andropo-
goni commune.
- 593- (*) - &) *I>icorne.* - - Mi. *Mhah.* Hadie.
- 5S/4- (») - 0 *tontortum.* - Ps. Lhj.
- 595- (*) HOLCUS a) *durratativus.QX.* Tatwu fio Ihbb. (purra iEgyptiis.)
a) *Tanm fchebh Jiucdk* ghimis viridibus.
^3) T. *yir/JWr flA//7^* gi. fufcis | femhiibui dbls.
7) *T. filter abmar.* gl. fufcis; fern, fulvis.
- 59C C*) • £) *wcetuofus.* - Vs. Ubique.
597. (*) - 0 *dovbyfl.* - - CP. *Dochn.* ^y[^] 6 Ubique»
598. (*) ») THEMEDA *triandra.* Mm* *Tbemcd.* Big. *Alnf.*
599. (««) SEHIMA *ijcbamunu* - Mi. 5c?i?7L ~~hadie~~ Hadie.
- €co. (*) ATRIPLEX fl) *hajttn.* Pm. Djidda.
601. - - V) *vfficin.* - - Pm» Lhj.
- €02. - - c) *ftiriuo/ii,* - Pm. Foliis corolato - ovalibre , retufis, craffufculis,
farinofis* *Qffiiü* <^LiAQC
603. MIMOSA a) *Ubhch* - - CP. (Serifcb Indis.) Btf. (Scifdan: falfo.) .
604. - - /;) *nilvtica.* - - Vs. Mi, SWfro p[^] I[^] vel ^JAM Lhj. M6r. SQ\$U
Btf. JSTrim^ (j i jf
605. (0) - 0 *fimgnkns.* - Vs. *Kciat.* O t # Ha>s.
606. (^-) - <i) *tortilis.* - - Ps. Mir». حرس ^{Hars}
607. (d) - 0 *tf'/o[^]7.* - - llh. Örfota. عرقفة Srđ.
- 608» - - /) *legumiuibis tnartcuhtiš.* Dahhi.
609. (*) - g) *ftcIlati.* - - Mm. Kurma.
- €o, (#) - /) *glowcrnta.*
611. (\$0 - i) *fruticofi', afah* - Ps. ityifc J U ^ Hadle.
612. (t) - k) *ftiiva.* • - Mm. A//»• *A!U# Melhān.
- 613- (•) " 0 ««5<M'c/i.i. - Ph. Diui^ »AU Hadle, Dobb* w<Ji Smurr*****
Srd.

614. (*) MIMOSA - *ni* *fijiih* Mm. &*y7i* Hadfc.
 615. - - ») *gummiftra** - Ps. TaW. Gummi defillat, quod coiligunt Arabes.
 616. (#) FICUS fl) *ficomorus*. - Ph. Mm. *Chanas** *lJJUSJS** *OLre.* * ^ J *Sokam.* ^
 617. (*) - b) *fycomor aides*. - - Idem nomen. Srd.
 618» (#^ • 0 *to kfl** ' ' ' *Toka.* *oxi* Melhan.
 619. (*) - d) *fur*. - - - *Sur.* *jjw* Djibla.
 620. - - 0 *carica** - - CP. *Tin**
 621. (#) • /) *wj/i^* - - Mi. Mm. Tlll u *UJb Literatis Delb.* HadJe.
Tink. Tears.
 622. (#) - g) *tnorifilia*. - - Mi.Ms. *Bales.* JUMA Hadie. Kurma.
 623. - - I) *palwata*. - - Idem noiner.. Ulf.
 624. (*) - i)/errata? - - Mi. Mm. *Haftbref.* Cjyfaa. Hadie.
 625. (*) - it) *Mica** - - Mm. TllWA v^.*S Uhf. Zebid.
 626. (*) - /) *relighfi** - - Mm# *Mudnb.* p^llVo Vudah. l&J Ztbid.
(Bare/d; Indis: varietas.)
-

C R Y P T O G A M I A .

627. (#) ACROSTICHUM «) *c;/w. Mi. *Mtjabc/e.* JUMAyo Hadie. Big.
 628* (#) - *) /[^]'''^ - - • Mm. Filices communi nomine vocantur *Me/chat.* Lfjuvo vel *Me/chat elgorab.*
629. PTERIS fl) *obliqua*.
630. - - ^) *fubciliata*.
631. - - 0 *ITM*'ipinnata*.
- 63 a. - - <0 *regular is.*
625. - - 0 *dccurhvt.*
654. - - f) *[cwmtrata.*
- 035* " " S) *virtats**
- 6\$C» - - b) *dent at a.*
637. - - i) *ftrrulata.*
- 638- * - ^) */arinofa.*
- 639- - - 0 *aquilma.*
640. («) LONCHITIS *bipinnata.* Mm. Big.
641. ASt'LENIUM fl) *ceteracb.* - Mm.
642. .. - 0 *tricbomanej.* - Ms. Kurma.
- } Omnes lilll ptendes montium Hadlenfium media
inhabitant, Oc fope idem nomen cun *agu-*
cibus gerunt. Defer. Cent. VII.

643. ASPLENIUM c) *rntn murarfa*. Ms. Kumitt»
- ⁶⁴⁴⁻ («) - d) *lavceolnturn*. - Mm. Ibid.
645. («) POLYPODIUM a) *peći inn turn*. Mm. Big*
646. (#) - b) *crmatutiK* - Mm. Ibkl.
647. (#) - c) *dtntntum*. - Mi. Mm MM*. مَعْصَمٌ Hndie.
- ⁶⁴⁸⁻ (#) ADIANTHUM a) *wcf/wra*. Mi. *Mefcfifo elgborāb*. مشان الغراب Hacke.
649. - - b) *capill. vencr.* - Ma_# *Scbccfjwnbdj.tr.* Rurnia.
- 65a (#) LYCOPODIUM /i) *imbricatuL* Mi. Mm. RnfJw. ^ ^ Hadle. Scbaker
651. - - h) *fanguin* ? - - Mm. Mock/i. Strthat. I fg\
652. MNIUM } *Hakok* حَكُوب Boks vocantur ; fed commune noinen & ufftanum est *Tolbab*. طَلْبَب vel *Roba*.
653. BRYUM J
654. LICHEN, a) *centrifugus*. Mm.
655. - - b) *citiaris* ? - - Mmv Big.
656. - - c) *floridus*. - - Mm. Knrma.
- 657* - - d) *leprofus*. - - M». ftMM. كَعْجَاح Uhf. Pallide-viridis..
658. - - e) *foliaceus*. - - Mm. Big, Supra virefcens, fubtus albidui.
659. • " /) *fifowentofus*. - Min> *Tbshva*. j j i Big. Virefceni.
660. FUCUS a) *fu&repandus** 1 Pu. T6r. Cent. VII. 51-53.
661. - - b) *triuodis*. |
662. - - c) *conoides*. |
663. - - <0 *ferruhtus** |
664. - - e) *acerofus*. |
665. " - /J *ptipHlofur*. |
666. - - g) *littearis*. |
667. - - ^) *csfpitofm*. |
668. - - i) *feticuhfus** |
669. - - k) *fragilis*. |
670. - - l) *plumarit*. |
671. - - 01) *debilis*. |
672. - - ») *fominofus*. |
673. - - 0) *foliifer*. |
674. - - p) *uvifer*. |
675. - - ^) *pavonicus*. |
676. - - r) *acmarius** |
- PH. Mochha. Cent. VII. 36-46 & 54.
- Arab. *Katiaf*.
- Froندibus fubtus hirfatis.
Fox Ssff^{8ngutifl}: سرپه curvis, pollicari



677. ULVA a) *htjjfnna*.
 678. - - b) *gwiulata*.
 \$79* (*) - c) *vtpcuhis ovatis*. } Pu. Mochha,
 6go» (#) - d) *reticulate*
 68 r. (*) - e) *cavernoifi*. }
 682. CONFERVA /i) *ca^illaris*.]
 683. (#) • 0 *platM** I Pu. Ibid.
 634. (*) • 0 *fit'tculofa** J
 635. (#) SPONGIA «) *flabclifurm*. Pu. T6r.
 686. (#) - t) *officinal*, *violacea** - Ubiqwe.
 687. (#) - c) *rubra*.
 688. PE2IZA *tunHata*. - Ps. *Fusib*. فس Ps.
-

P A L M ^ .

689. BORASSUS *flalell'f*. - Cp. Dōw. *paj* vel *Tafi*. طافی
 690. CORYPHA *umbraculiftra*. - CP. Idem nomen. Kudmīe. Caule dichotomo.
 6^1. COCOS *nuciferti*. - - CP. *Kardjih* Mocclia.
 692. PHOENIX a) *daetylif*. - CP. *hJathl*. Ja:-*
 693. " " V) *fnUhnāni* - CP. Eff. *Nncbl Stthim&ui*

**DESCRIPTIONES
PLANTARUM
FLORAE
&GYPTIACO -ARABICS.**




**DESCRIPTIONES
PLANTARUM**


**CENTURIA
PRIMA.**

CLASSES I. II III.

MONANDRIA. DIANDRIA. TRIANDRIA,



CLASSIS L MONANDRIA.



SALICOKNIA,

I. ^ALICORNTA BUKOPJBA ; frutitof*. Arab ChrajL

oc) *PffiiUis inclufif.* Capitufe floram ternaforum faepe fforibiw duo* bus lateraiibus, *Jiamine une;* medio flore/rwn. 3mir/. In«erdum, fed r»rius: medius flos monandrus j laterales diandr. Itwerdum *onmcs* monandri. In eadem (pica fie variabar.

£) Pj^!7.& f^/tif. Rarior; magis cylindrical caterum priori fiiwillima; *Artituliinfetivorescylindrici,integrii^^ri>r^fiurfurti incrafl&ti,emarginari** *Utrique:* *Spica articulis cylindricis, integrisi ad bafia ucrinqiM tnbus floribua.* Artkuk florifcri *aUernantes:* ita ut inferior later* mida.ee> vertat, ubi iuperior flores geffar. Singulus aniculus *qvadriiatcrus.* duobus nudis oppofitis, & duobus floriferis* *Caulis.* & *jotia glabra,* non farinofa. *Calyx triphyllus.*

Alexandria ad Has ittfn. Init. Octobr.

2. SALICORNIA VIILGINICA. Arab. Chrrf.

DESCR. Fruticofa^ viridi-caerufefcens, farina- renui otduSav qua abfferla; color viridis illuftFior cernituT. *Articuli minorum ramorum apice compreffla- feuli, emarginita- bifidi: rinnimus utrinque camTans :* reliquorum ramorum terercs: omnes cylindrici, iruegri r fingulu* *fioribus utrinque tribus, quadrifariani teFwatis, ad apicem articuli fitis; in Sal. eur. ad Safin.) Stigmata exferta**

5, SALTGORNIA ^vcihTK|frutieefa;peiknculorttm artfcalis midair*: taufo globofit.

DESCR. *Caulis* fiuricofus, procumfcaw, teres, Kgnofus, bruneus. *Sam?* conferni, ereai, virides, articulati. *Artihuli inisrhns* ftcnles, fubglobi- bofi, anoores, tubercuhui sextupfid ordtne Iquamiro; geniculis pallf- dis, iquamatis, arftaris. *Snperforet majorcs, ftoriferi, transverfe- cy Judna, i^uamaii, Joribus fpsufis, nudis ad apicra Squamarum,, qua* iudeu ente,

fucculente, facile rurrlpuorur, fi dilatace vjelis? tjuare difficile ftatuen-
<um, iUjr ftamina cuique flori infinc.

JHexandria ad Salinas copiule; fed tantiim a parte meridional. Aral) Sdbta.

4. SALICORNIA PERTOLIATA.; Jrtivofa; foliis tarm/iT, ureeolato - orbizulatis', taule perjoliath.

DESCR Frutex diffus, pedalis. *Ctmtis* non articulatus; peiins anfermec fradinc. *PeduntuH* Jpicse terminalcs^ axitlarc, femipollicares, fxpc feiquipoll. tercres, flonbus ternatim pofitisj (ut in *Sal.tnrop.*) *Folia* carnul'a, trontigua: in frugiferis orViculata, verfus peripheriam c^ulc *perjvrata* > alxrnafim poilia: in junioribus ioti frugiferis *vagina* ^crafia urccolata: circa caulem decurrenria j adeo ut articnlati formam habeant.

Djiddct & Ghomfodcp cqpiofe ad lutaraj aliis in locis jnihi nunyuara obviaj guafi huic rc^iom dicata eiet.

BOERHAVIA.

f. BOERHAVIA SCAVIXEHS; glandulofii. Lohaja & IHSr. Arab. Örkos.

DfisCR. Con// fubtrichororauis, durus, glaber^ tenuis. *FoHa* ovato - retufa, glabra. *Fbres* diandri; verticillaii, in .fummitate ramorum ; pedicell* involucris l^ugiore. *iitantiula* 5 ad apicem gorminis fob 'flore. *St-fnina* obconica , viridia, Itiiita, p^ndula , rriphci annul j glandularuni purpurcarum, feflihum; ad apjecin iCoronata glandulis guingue xnajocibus., palhctianbus^ .pedtcdldH&.

«. BOERHAVIA DIA-NDRA- Arab. I-«ha» Fuddjef. Beh d fakli CW- det\ /**> u/* ^ ^**

DESCR. -*Cauies* proltrari, <arno li, fiibvillofi, dichoromi, *FoRa* cordato- obtu- fa, craffiufcula. *Fioris* fedlles in capitulis conge'ftis, terminalibus ger- mine ^lobdfo, hifrido, loAgitudinc involucri. *Scm'ina* ovalia, ^ngulata.

7. BOERHAVIA DIFFUSA.

DESCR. *Cauies* pufiDi, cliffufi. Fo7?a oppotira, ovaria, bbrufa. *PeduntuH* axil I ares; folrtariL *Flares* monandri, monogyni, fuperi, fine calyce: capitati, (ut)lc(Tiks, terni, terminales pcdunculorum« *Semina* oblon^a 4* i-angula, lulcis totidenu vfltofa.

CINNA.

f. CTVNA ARUKBTKAC6A. In inonte Barak.

DESCR. Dcfloratam vidi. Gramen panicuTatum. *Sphufa* uniAorar? *Calyx* duplex; exterior, brevior; interior, corolla longior* *Corolla* feivalvis. *Antwra* unica,

CLASSIS II.

DIANDRIA.

JUSTICIA.

α) INERMES*

9» JUSTICIA PANICULATA ; *panicidis axillaribus > petiole fangioribus, foliis ovato-lanceolatis.*

DESCR. Fruticuli modo crescit aliis immixta fruticibus. *Petiolas* pilosus, femipollucaris. *Folia* oppoita, bipollucaria, submers & margine pilosa. *Integra*. *Panicula* oppofitx., axillares, pollucares, ramulose, quoarifatasc. *Flores* feffiles, albi, conferri, refupinati, bafi utrinque fquamula bra&ali fuffult. *Capula* ventricoso-fubulata, bilocularis, monisperma[^] ungue elatice sub lemmiiie-

Frope mitem. *Melhdn* frequens* Arab* *Vtifar.* *j*j*y* nomen familia Juiliciarum*

IO. JUSTICIA TRIFLORAJ *axillaribus foliis tongioribus, apice trifloris.*

DESCR. *Caulis* cubitalis, annuus, diffuso-decumbens, villosum, articulatus, brachiatus. *Articuli* tripollucares, sexfulcaci, saepe bafi incrassari, tenues. *Folia* oppofita: *petioli* unguem longi, connati, villosum, subciliati, caniculati. *Lamina* patens ovato-lanceolata, denticulata, pubescens, felijuplicaris. *Stipule* nullx. *Pedunculi* axillares, foliarii, crefti, bipollucares, apice gefantes *Flores* 3 vel 4 feffiles, in eodem piano fitos, utrinque parvo folio periolato munitos. *Flores* albi: labia corollae eretla, superius integrum, inferius tridentatum > in fauce violaceo-punilarum. *BraBece* cunusque floris bin»» eretiae, apice refexae, apprelfe, calyx exeriorem menticentes, longe-lanccolata?, villosum, exteriori majori, ambae calyc longiores* *Autherce* albae, foliariae.

In Montibus *Hadienibus*. Arab. *Chodte* * ^ وَحْدَةٌ

Ufus r Succus expreflus foliis recentibus intillatur oculi[^] dolentibus. (puero quodam ita referentc.)

II. JUSTICIA C/BRULEAJ *Jloribus verthitlatis fejfilibus; foliir avato-obhnoii, ciliatis.*

DESCR. *Petioli* villofi, femipollares. *Folia* ovaro- oblonga* acura, integra, leviter pilosa & ciliata. *Flores* exrulei, feffiles in axillis supremis, verticillati, utrinque term: foliis mutatis in bratteas parvas, lanceolatas. Ad monrem *Melhān*, rarius. Arab. *Vufar**

12. JUSTICIA FOETID A. Arab. *Tuna*. w[^]L In monte *Badfenfi**

DESCR. *Folia* oppofira: ovato - buncolata, inregra^ glabra, 3 - pollaria j petiola femipoll Spins vel (lipuls aullx. Variat flore viridi vel exruleo,

Dum vaccae plantam edunt, lac inficitur adore alltacea.

13. JUSTICIA SEXANCULARIS. Arab. *Sētudvud. Radh.*

DESCR. *Folia* fabriofula, *Flores* axillares, capirati, subqaarerni. *BraetecB* cujusvis floris quaternsej vclut calyx quidam exterior: *extiores* duce, tnplo latiorcs, planx, cunciformes; *intiores* oppofirae, angultar, lancolaca?, camplicattt, brcviorcs. *Calix* infundo inter bracxeas, s - phyllus , eretus^ linear i lanceolatus, hyalinus. *Corolla* titbits filiform is, albidus Jongitudine braQearum: *limbus* bilabiatus, violaceus: *labkitn* fuperius ovamm, obtufum; *injerhis* obtufe tridentatum, fundo futco_y punia_{ro}. ' *Antlwrc* folitaria?. *Stigma* aptce incurvum,, duplex, acnum.. *Capfula* bilocularis, difperma^ unguibus elaficis: sub iingulo Temine.

Ad loca aequo: *Uadi Zebid**

js) SPINOS^T.

14. JUSTICIA VIRIDIS; *foliis oblongis, integris, Jpicir termindibus imbricatis braffeis ovata- anitis; galea linear[^] reflexa* bidentata.*

DESCR. *Folia* oppofua. *Spiccr* ramorum terminals, bipoilares, digitum crassW. *BraSteaa* latx_y ovata_r acutae, imbricatse. _x *Corolla* tuhts albidus, villofus, pollaris, cylindrīcus, fuperne angullior curvatus: *Limbus* viridis: rarus in flore color. *Galea* angulta, linearis, reflcxa, apice bifida: *icMum* inferius latum> trilobum, patens, Ibbis ovato-acutis, media ktiore: *Antherce* Iblitarue paulo ultra fauces eminentes: *Stylus* antheris proveftior. *Capula* İpatuhto-acuta, bilocularis, mono-(perma, ungue clavico).

Surdiid, in fruticetis. Arab. *Kojfojf*. vel *Chaffer* j***** Variat flore caruleo & viridi- csrulco. *Folia* sepe exefa ab Eruca spinola,

- X 5. JUSTTCIA TRistrNOSA | foliis lanceolate - ovatis; Jⁱptis fermbtalibtis im* bricatis*, labio corolla.fuptriori brtvi.

I)£scu. Frutieulas. *Folia op.poftha*: pctlolo unguem longo: lamina ovali-Janceolata, bipollcari, integra, reurgine fcabra, *ciliaffa Sfiincr* in finguU axilla, mire pofitae inter IbUurei & ramulurn folitiirix, iemu4if.ua6 fpa* tio, fimplices; dcin dfviGc in 3 vel 4 fpinas prentes, fubalAs-, femipollcaresi ^inercas. *Spiccr t^rniinales* iindiq c circa pedunculos imbricarx traclois. *BraBfter* late ovato-acute, digitum transverfum longa?, virides. *Flos fulvo-flavus*, braSea daplo longiw, rcfiipiuras-: <*nlea jpice ovaiis, tingulb, refla, la'bio & srntberis brevior *Lakhim* (uperins proiundius: inferius tribus Jobis ova;is, inibrlicantibus. *Ant litres sagittate*.

Hadie & in fyhis monus Melhin. Arab. *Vtfar*.

16. JUSTICIA BISPINOSA; *Jpinir axiUaribuf t>tfi&t. corollcr hbñs aequilibus.*

DJSSCR. A priori paucis diftinguirar nom⁴ in f^rc varieratem dicas. *Spintp* luin palroitx vel irtuitifidx; fed 'bifida*', *Labium fuperius* lobos inferions labii sequar, qui J^nmfim iaticrres: & 4im1)uni alujuanriam irrgultrem Teddantc eftque labium hoc ftammrbus muko iongius: quurn in *Triffnuq/à* illis kmgii-s non eft, & kterrbus fiflune tlefcednit ad me-<dmn labi<m 'Color flor's albas; tamen variat flutre pailide-caruleo; •& in hiinc colorem tranfit^ dum intra diartas fkeatue

Arab. *Scfothadh.* شخص

17. JUSTICfA AT»PRESSA J *jpinis axillariijs jcompapis|jfart fnlvo> lain fnp+ riori breviore.*

DfisCR. Prspcedemibus perfamilis. *Frufex difTufo-^cepfrofus*, vix pedafifis, *Labium inferius* quatuor lobis cuneatis, dbtulis% marginc n^)n imbricantibus, fed parailclo interviHo <dift<nribus.⁴ S^ ira axJlrtris iiiplex, fiepQ quadruplex, femper uno ramo ereclo & cauli appreffea; ^uud in reli* ^uis non obtiner. *Labium fuperius* ftapiimbus brcvius.

In monribus ad *Has* frequem. Arab. *Sckee'adh*

18. JUSTICIA LANCE AT A; *foSis innrmibus; fpinisfipuforitms bra ft tuque /oliam's mcfrñim Jpinofs.*

DESCR. *Ffores fe(Tiles, erefti, braft is laris, ovatis. Stamina ?^ antheris iimplicibus. Spina axitlares» fuliacc<> mtugine ipmoJa^.* Flores lub* fcylitarij.

Surdu'd. Arab, *Sokajt-* ئەجۇم

DIANTHERA.

19. DIANTHERA FANICULATA; *panitulis axHlaribus oppofitis trichotomy*
DISCR. *Caulis annuus, fruricibus vicint innixus tumque ere&us, bkubiro-*
*lis, fexaogularus** brachiarus, articulatus; *articulis* polficularibus, bafi
incrallaris. *Folia oppofita; petfal** fcniipolllicari, villofo, fuperne piano:
lamina ovata, plana, iiuegra, leviter ciliata. *Pedunculi* per totum cau-
lem & rarnos axfflares oppofiri, paremes, bis terve trifidi; anicub
prima pollicari> relrquis. kcviobiirs. Pedicelli ultimi florura filtfbr-
mes,. unifbri, *Calyx* peruntbium duplex (contra char, generis):
*utrumque ereflum, pcrfiftens: txterius: \$ - phylfum, laciniis lincari**
lanceolatis; quatuor infcrioribus unguem longis :: omnes virides, tmr-
gine raeinbraiiaceu *Interius* s-phylfum, laciniis brevioi-ibus % ajaguftis^
Eneari- acutis, a^quanbus. *Corolla* pallide-purpui?ea; plus duplo Ion^
gior catyce, bilabiara, obtufa, plana: labio inferiore angufto, Ibearf,
Obtufe tridentato: fuperiori ovali> marginato. *Filamnta* fnlerta corolla
infra labium fuperius. *Antherce* (ingulis bins. *Siliqna* Lmccolara, vi-
fofa: ia q.uovis locub *Semina* 2* lcatieulata, CQrmicub libero incurvo
ad baGn appendiculato^

Sub fiuticibus in Tamaricetis Morenfibus fforens: imda metxfia Januar.
 Arab. *Medhafaa. Towjjin ftji Surdud*

20i DIANTHERA TRKULCA, Arab. *Maddh.* *Ucw* vel &* Plant* Ipedofi, &
 charaBere novi generis*

DESCR. *Frutex ramis brachianis, teretiBus.* *Folfa* oppo(Tra: y oon^effra,' infe-
 riors decidendo, cicatricem relinqimnr. *Petiolus* brevis, fuperne pla-
 nus. *Lamina* ovaria:, obru(a> imgra, glabra, marginc utroque incurva,
 venis fimplicibus oppofitis. *Peduneuli* ex axiflis fuperioribus ramulo-
 rum foirarii> cylindrici, biflori> termioari urrinque bra&a:, pro fin-
 gulo ftore, ianceolara, pedanculi longitudine, flavo^ parenre. *Flores*
 &{3ik3> gemini, in a pice pedunculi. *Calyx* perkflthiurrr duplex. JEIC-
 terms diphyliam, laciniis oppofitis rriangularibus, dorfo acuno, intra
 bratcam coltatis 1 adeo ut inter braflieas utrin<|uc duo h<Tc foliola
 duorum. florum fita? finr. *Interius* rripllo longiu§r raonophyllum, j •
 iidum, eref.tum> Janceolarum, peduncub longtus, villolum, viride,
 laciniis (ub corolla: labio latiori fenfinv longionbusv *Corolla* monope-
 tala, irregukris, infra villofa, calyce decupio longior> flavo- rubefcens.
Tabus calyce plus duplo longior: extus cr-affior; fuk labio' mmori in-
 trufus in plicarn profundam. *Limius*, rubo qwimuplo. longior,, rm-
 jens, *Labium* fuperius multo latiu&> lanceolaco - cymbiforme, carinis
 cxtus

extus quinque msrginaibus, dorfali majoribus, interne in fiiico longitutiinali duo filamcnu ad fingulum marginem & ftylum unkum foven-tibus. Labium inferius triple) angurtius: vcrfus balin artenuatum, apicc rriobum, lobis hncaribus, fornicaris, inargine involutum, divergens a fuperion. *Stamina* filamenta duo filiformia, corolla breviora, bad cjs adnata; dcin in fulco Ubii fuperioris marginali recon lira. *Anthz** rce in quovis filim nro bina;, oblongae, firaplices, dorfo adnata.¹, ex-terbr paulo altior : papillis chryftaflinis hifpidae. *Ptfilium* "9, *germen* fu-perius oblongum, compreHum , calyce brevms: *fijlus* longirudine co-rolla*, reconditus in Jabii fuperioris luJco medio Jongitudinali. *Stigma* Acutum.

In *Surdiid* frequens.

Ujus: folia inrc^ra, simul cum ramo obligantur tumoribus ad dolorcm lenicndum.

2I, DIANTHERA ODORA. Arab. *Kejfemdn.* ViyU***^{5**} Cum priori ejusdem iaciei.

DESCR. *Frutex*: rami conferti, articuhti, fulco utrinque « intervallo petiolorum ad geniculm proxinie jnfenus. *koiia* oppofita pcriolo fu-perne piano. *Lamina* vix pollicaris, avato- oblonga, obtula, Integra, nirida, margine fubciliata fetis vix manifeitis. *Flos* in ramulis minimis axillaribus, feffilis, iblitarius, flavus. *Calyx*: perianrhium 5- partitum, creclum, Jincare[>] viride[^] *Corolla* monopctala, ring ens, extus villoilu *Tubiis* calyce fefquilonigior, sub utrorjue labio gibbum inter duis foveolds exferens. *Labium fitperins* fornicatum, intcriori duplo unguftius, emarginatum: carina dorlali convexa, iniis (lylum recondre, apice fUvum, cieterum flavo virefcens, venis violaceis. *Inftrius* planum, flavum, patens, fuperiori larius, longius, trifidum, lobis ova-tis, medio majori. *Stamina*, filamenta dun, coroll.v tubo adnata & ejas orje peculiarij fulco vaginata, dein libera, comprefla, incurva, alba, ftyle breviora *Anthera** bina? dorfo adnatse, micriur paulo inferior, viridis *Pifiillum*: *Germsn* oblongurn, compreilum, viride, calyce duplo brcvius, bafi cinitum annulo netlarifero ilavicantc, pone bicorni. *Stylus* filiformis, adi'urgens , longi[<]udme labii lupenoris, & in ejus fulco medio totus reconditus. *Ptrharpium* capfula bafi att:nuata, dcin <juadrangulo - fubulataj binis oppofitis lateribus carinata: binis reliquis uniiülcara longitudinnliter: bilocularis, difperma *Stmiua* in quovis loculo bina, fubrotunda, comprcifa, ungue elaitico ad balin alterno ordine pofito.

Stirdud in lylvis frequens. Vix olet nifi marcida, odore *Avthoxanthi* ; Grata rn&cis Arabix, feftivis diebus florali diademate capita ornantibus,

22. DIANTHERA VERTIRILLATA.

DESCR. *Folia lanceoato-ovata, Integra. Flares* (cfTles, «apitati, violacei, verrieillati, bratteis obovato - Unceolatis, ciUaris, mucromtis, calyce majonbus. Vsrtiali pedunculati.

23. DIANTHERA BEBILIS; *filth oblongis; fpicis vxillaribut imbricalis; bra-Sim late ovatis, ciliatis, quaternis.*

DESCR. *GauJts cubitaies, tcrccts, villofi, villis deflexis albts; articulati, ar-ficulis rripallicaiibus, bjfi venrrkofis» ftriatis Jineis aliquot obia.rioribus, ion^itudinahbus, nudis. Folia oppofita. Petiokis pbniufculus, fcndni dilatarus in folium. Lamina pollicaiis, oblonga, intcgra, obiufa, fub-villofa, ciliis nullis. Stipuls nulls. Spkce axillarcs. fecjuipolliticorcs, <juadraj;onje, bracleis rnibricatic, BraBea infimae fscpe Terntc; dein Temper qu-aterna*, luc ovatx, fcdiles, ciliata?; dus oppofixse Iongiorcs; rchquae duae oppofitat minores, magis ciliats. Fiures ad singulum fcrattearum verticillum nonnid bini, fcdiJes, Temper ad idem iarus, finguli inrra luum bractcam. Calyx s-phjllus, bra&ea brevior, li* neari-lanceolatus, ereius. Corolla tubus albidus, fulcatus longhudine bra^cse- IJmbiis perfonatus: labium Jup. rcila proieailnn, ovato-ob-tufum» ivpice violaccum. Labium infer, patens, iubquadranguiuiYii cri< dentarum., fupernc violafccns, venis obfeurioribus. Filamttita infena in futuris labiorum^ deflorata extra florcm divergunt. Anihrce duplices> flivce; interior, qua? & inferior bafi caudata. CapjbUA bilocularis# monisperma, ungue elaflico.*

In tnontibus humilioribus props *Taas_x* fruticibus fulcita.

24. DIANTHERA a) AMERICANA ; *Jjava, fpieis ttrmalibus, imbrlcatis, bratftif lanceolatis; jolris JiatrrufinSs; Jlortbus flavis% labio inferiore Jatiore I ant her a inferiore caudata^ eauRbus [ftriatis.**S. DIANTHERA]3) AMERICANA; *alba, fore & antheris nlbis: labio inferiore in jattce vialaceo-puntifato; verticillis remoti/, Jpicatis; braGteit tan* ceolatisy calijce duplo brevioribus.*

Hadie. Priori* an varietas, vel species diverfa?

UTRICULARIA,

26. UTRICULARIA INFLEKA; *foliss drthntomh; pedunculo raumofo% bafi utri-cults verticulato; neQariis ivfexis, tiuncatis.*

DBSCR. *Folia* dichotoma, filiformia, utriculis fubrotundis, compress, varie intermixsa. *Verticillus* ad ba-fin. pcdunculi. j. vel y *Vejiculus* nognis, teretibus* oblongis,, utrinque acuminatis, tuberculofis, albidis, feffibbus, conftaaribus veficulis minoribus;. quaram ope'natat fcapus. *Flos* albus, ftriis vioraccis, neftario furfum flcxo, apicc truncatOi vi!!ofo. *Ptdnn-culns* mukiftorus, raccmofus_t *BraStm* fub fingulo flore ovato-lan-ceolata.

Rofettce copiofe ia fodis inter agros Oryztc. Arab. *Hamut**

VERBENA.

27, VERBENA PROCUMBETJS, *tetrandra*; *Jpids jilifarmibiüs*; *folih multifido- toy ciuiatir*; *cuttle jprocumBente..*

DESCR. *Calyx* dentibus quamor aeqikilibus; nuJta rruncata. *SpVr* non ra* mofi Tota planta vHlofo-hifpidn, procimibens,. Sub* fiagula flor in fpica *BraSea* JanceoJata,, calyce brevior.

Ad margines agrorum *JEgyptfc* Eorens fine DccemBn.

28, VERBENA CAPITATAi *folih /erratis*; *fioribn** *capitata-ghSofir*; *cahjet glumato*,

DBSCR. *Cautis* rcpnsj-ftriatos. *Folia* rigidia, obovata, vcrfus apicem ferrara. *Peduneuli* axillarcs, folitarii, htc nifi ex altera axilla pradlunres. -*Flos* albido-violaceus, 5-fidus', inxquaKs, fubtus fquama- acuta-ovara! Florcs Ciipitati in gfobuna » dcindc exrefceiwera ovaro - oblo«guim *Calyx* diphyllus, glumacformis; non vera \$-dencarus^ *Stmina* 2. for- titer connata,

Rofetta ad lirtora Nili. Succus cypreflus, muTunis in ufu in *Strangurfa**

Tots clurafler hujus plants cxaä Geuus eft, An *FkrK nodü flora*. LIMN.?

SALVIA.

2\$. SALVIA MERjAMiE;jfonA<x verticitlatis, fejjtti6ns> earuleis; caute fubmido} folits oblongis, rugojis* Jübrenatis.

Alexandria. Arab* *Merjamie*. **2/» Kurma; Dharu. 

◆ ◆ ◆

PENTAGLOSSUM-


30. PENTAGLOSSUM. *Novum genm. Bicmdria> Shnogynin.*

CHARACTER GENE&ICUS: *Calyx* 1 -phyllus, infundihuliformisi 4 vel 5 - genus: denribus 4 vel 5 fiiiformibus* parenribiw; perfiftaps. *Corolla:* petala 4 vcl f, calycis limlbo iiifcrtta, oblongs, oinufa, ere&o- *patentra, calyce brcvfora. *Stamina* jtlammta duo, .filiformia t -calyci infcrtta, ejus Jongitudinc. *Anthrtp* gfobofo-didjcinac, incumbcntcs. *Pijlillvm^ germen* oblongum-, teres. *Stylus* Eliformis, curvatus., germitic brcvior. *Sii%ma* :fimpfex, x-ipitatum. *Perkatphim** CapfulJ cal)^e recondita* cylindrica, .untlocularis, polylperma. *Stmina* .nuracrofi, giobofa.

SPECIES LVNIFOMUW; foHis lanceolate- limafitnt.

Cautis tetragomis, vk pedalic. *JZami* & *Jolia* alterna. *Flat* violaceo- niber.

jilexav&ri'a locis cultis, humiiorrb'us^ umbrolis prope Canalem, *Kahrrc?* ad Wrket el hadj locis .humidiufudis.



C L A S S I S I I I
T R I A N D R I A .
V A L E R I A N A .

31. VALERIANA SCAKDENS.

DESCR. *Caules dichotomi, fcandenres fine cirrhis.. ffores albi. Semen apice cinctum glindulis, ut in Boerhav. fcand+ cui valde similis, & genere nou divettenda, licet faciem ferae Vakr. eeltica:*

*Sutdūd** Arab.. *Charad.* 0^ *Chodddra.* a^Uāah
IRIS.

52. IRIS SISYRINCHIUM. Arab. JZhmfur. <Ji*iy;

DESCR. -Fo/a canalicularo-complicata, caule longiora. *Caulis teres, multi-florus^ fpithamalis.* i^tar vioJaccus, medio petalorum croceo.

Qrca Pyramide copioe in campis. Flurim? dignicatis flos.

COMMELINA^

33. COMMELINA TUBEROSA. AT. Vaatan. Hadie.

Flos pallide caeruleus, tripe talus. Caulis dichotomus, debilis. Folia ovato-acuta, vifcidula, subciliau, planiffima. Caulis in aquofo folo repens.

*U/its: ajunt, folia contufa, vulneri impofita ubi fpina ingrefla eft, ill am expellere**

34. COMMELINA BENGALENSISJ Hadit.

Caulis dichotomus, decumbens. Folia oblongs, obtufa, ficca, fxpe complicata. flos dipecalusj. flavus. Variati flore tripetalo, caeruleo.

[^] COMMELINA COMMEI-IKOIDESJ. *ramis pawēula fpkatis, lateralibus^ arifta cahjeisfioribas lovgiorejfoliis ovato-lanceolatis.*

Flores non vidi >. fed ex veftigiis videbantnr fcffiles, ariftati,

Arab., *Kunan.* c±a ^

SCHOENUS.

36. SCHOENUS INCANUR Arab, Mpt el bagar. Mr.

DESCR. *Caulis & folia vllfofo-tomentofa, aculeata. FoRa tripollaria, coftis j^pra & infra aculeatis, baft obliqua, margine finuato-repando-bbtufa. Taly.x fpinofus. FruStus globofug) flavus, fefquipoll. diametri.*

CYPERUS.

¶ CULMO TEKETL

37. CYPERUS NILOTICUS; *tutmo tereti_x nudo_T aquali> non articulate;*, *umbetta compofitai Jpicis globofis.*

DESCR. *Culmus* fefqui-cubittaiis; baft digits minimi cratfrie; verfiis apicem anguftatus, laevis> interne fpongiosus* ifthmis transverfiff. *UmhtUa* in apice: *Tub* quolibec pedicello fquama Luiceolata, brevis* In mcdioumbellar brevis peduncuhiis ge(bns fpicam fu&rotundam. Lacerates pdunculi mulra bngiores, terminari interdtm^ (pica fimili furorundi; inrerdum nova umbelk; cui. iccrurn fpica ceturaiis in. brevi pedicel to J, taterales in bngioiibus. Spica. quarvis- tubet fpkas minorcs ab omni parte alrernas, lineares, longas, compreiras, ceitaceas, i o - vd2O- floras..

Ad ripam Nili occidentaleni limoGm Rofetta; inicia Nov.

38. CYPERUS LATERALIS.; *ciilma tereti*, *bafi vaginata -folio/a;*. *capitulo laterali.*

DUSCR. *Culmus* (pithamalis, fiibalatus. *Fagiñor* ad bairn pibres- claufo, iivterdum termiiati fquama lanceohta: interdum exeuntk in. folium; pfus quani bipollcare. Supra, capitulum culmus ohfolctc canakcukuu^ *Capituhm* pollicis diaAntia ab apice, bractcis feu fquamis. duabus> virkibus, lanceolatis, furbrus capixula appreffis, breviores (pica diniidia: *Spicidce* cipifuli pauca?, ab 1. ad 12. pullide-viridcs, avato-bnccohrac., tucnidxrplus. quam 10- florae. Spicula media major: incedum. brevi> ter pedunculate In quibusdanx evadit altera. brafk.v tubulaia, parens. fpicula longior.

Eadem loca cum priori eolith An; *Cypertu minimus** vel. *fctrpm ultimus*, LINN.?

39. CYPERUS GHAUATUS; *tutma tereti an%*ifato> ad bafin folmtoz BraSeis ad apicem pedunrulrs duplo Jongioribus,. JpiralHer nmotrs^*

DESGR. *Culmi* bicubirales, bafi foliofi, fu/fuiu verfus fcabrr, *Spitufa* lan- ceolatje, compreflW, virides.. *BraBea* gradarim, reraotaf.

Ad Uadi ZebicL

(§) CULMA TIR ~~IPRO~~

40. CYPERUS GLOBOSUS; *culmo triquattro; bafi folio/a; Jpicis congtomeratis, Jubalobop; Jpiculis convertis, viridibus, nitidrs.*

Culmus fpithamalis. Spicse umbellatae. Spiculat congcfbe>, lanceolate utrinque convexse.

Habd. Arab. Zarda..

t^B) %

4*. CY"

41. CYPERUS FASTICHATUS; *tüimo triqvetro, cubitati, bofi foliofa; wnMla folio/a; dcnuo umbtUifxra; JjAcis .cylindricis; JpicuJis utrir/qne jouvexls, Jlavidiſ.*

Arab. *Samdr dalrbih. Rofetta.*

- 42, CYPERUS COMPLANATIJS ; *culmo triquetro, fefqmfpřth. baji foliofa^ wn-iella folhfn; Jjpīcis Jùbrotundisj fpiculu tomprejjis., planijjiṁs, ovato- ob-lairrif > bruneis.*

liojittcp., in agxis oryzse humidis; copiofe. Arab. Szæd.

43. CYPERUS FERRUGINEUSJ *culmo triquetro> ptdali; hofi foKofa| timlclta joliofa; fpkulis faJcUulatis, livearibus, cornp&rjjb - eonvtxis, ferruqxineis, mnrytynt vkidihuſ, raro pedtcellcritis, Jimper Jrxi3bw% coaurvath ad epiccm pedunadorum^ brt&itis pedkeifu Jtmjriorifus^*

Arab. *Screed vcl N'ghil. Cramen omnium copioſſimum & fere unicum pratoxum humidoxum juxta AJilum.*

SCIRPUS.

- 44* SCTRPUŠ coRYinBosus; *xulmo triquetvo fo1hjb\$ torijmbo tertmīati foliaxeo% Jpiculis fejfilibus xonfrtis.*

DESCR. *Otlmnf whites, triqnete, vfoliofus^ GoryinLo terminali, fiabjefto iblio fub fiugulo pedunculo. Padunaili non ex aino centro^ f:d unus supra akerum alccrnatiai: nee ranialU fed apice gclantjes 1. usque ad 4 fpkulias feilic6, olrcrnas, ovaras^ tcrctes, digitutn transverium Ion-gas, ferugincas *, braQca Unceolara. In medio u:orymhi fpicula? 4 vcl ply res, i:eſtiles Spicular undique imbricate. Anther a 5. flavac. Pi-JlMvm utum; Jiyma trifidum, marcidum, fufcclens. Sqnama calycina ad finguluni ſlorem una» apie'e rruncataj dcniata, medio arittata! arijl* T)revi, ^urva, fufca, fpicuhs ,pilofis.*

Kdhirw in locis inundatis ad agres. Arab. Dtpffjcs. D'ecembr. florens, Scirpo fylvatico LINN, convenit: cujus tamen compopi tantum funt pedunculii nec prorfus umbcilati.

45. SCIUPUS nsTULosu*^ *ciümo fibutato, mtto; befi vagituxta; capHufa latcrali.*

DESCR. *Culmi ex uno cefpire fnu'ri, (hi&i, fubulati, fefquipedalcs, obfeure-virides, obfolcTe - itriañ, longtores apke Tnnrcfc:ntcs, omnes l»fi vaginati, vaginis aliquot alternis, bbtirfis, in cylindrum x:onnaris. Radix fere butbofa. Folia nuila Coprtuhm laterale non procul a bafi fupra vaginam fupremanij globofum, diainecro fere pollicari, compoGto ipi-xulis*

culis feHilibu9> ovata- pentagonis, imbricatis (quam iyi acuris, dorlb* virii-dibits, lareribus ferrugineis, apie: albidis, *Medulla fpongiola*, ifthmi* transverfis dimidii pollicis diftanua; confpicuis eriam extus, coarfibuion* cvlmi; qui mde articuhrtus apparel, prorius figura *AIB jrftulovj*

Sofettce in agro* humido Trifoliis' confito. Ink. Nov.

46. SCIRPUS Bis-uMBEiLATusj *culmo bcjj, vagtnata^ spicis pedunculatis, terminalibus y bh-umbellatis.* •

CI&SCR. Ex minoribus. *Cutmtts dlfFjius*, raro fpithatnalis;. «rtlcu!» nuHs: bafi viginis foliorura. teflus; compreffus, (Iriarus- *Folia* plana, cut ma longiora, fubtns yltofa. *Folia* ad umbellam univcrfalera niu foiW-for-in b, bipolfictrrar exrcrnc inter pediffdlos* alia minora. *Spmv* qu8edim-folitariic pedicellate in media umbellie univer&Jis:. una in medio kffili8v Kadii pedkelli' novas confiruutK anibellas folioias, foliis exiguie, *Spy* etila? ovaj^e, parvx.

Habir.u m Locis litcoreis inuudads- *Tiafiilarum Nilorkrairum-* Junlo iieunce fb're'n.

- 47, SC1RPUS5 tATERAEIS j *Jpi eh ovatr, pednncul'atis} Jijfdi5ttjr> tatertilifim.*

DESCR. *Cnlmiis rriqucter?* pedalis & fxpe cubiralis, nu.dus, bafi folioCu *Pedmcidi* laterales fafciculati, fiiiformes-, inscquals, pollicars. ' *Spice?* tovatae, fquamis" ovati»₃ ferrugineis, margine membranaccis.

Ad *Uadi Zebid* uberrima copi*. Arab. *Haltdl.* J^fc^ Arahes ternYorii inter D)tlblam & Hss- hoc Scirpo *fhhiiit ru^uria fu^ vdlirc.* (vide infra *Panic. dichoC*)

- 48- SGIRPUS KAXLr 3.. ALPINI. *Culmo-tereti, foliofa, fpiciilb tenninsdilhu % conjerth, sefilibufy invokeris longitudine foliorum.*

Culmus inarticulate *Folia* fubulata, supcrne canaliculata, camolo- coriacea. *Radices* bulbofa?, farmentis fub terra repentibus, f^uaniato- iubricatis. *Stigma* triplex, ftylo lbngius..

Alexandria. Arab. *Saai.*'

SACCHARUM.

- 49^ SACCHARUM OFFICINAK. Arab. *Qvafah* سفه

Obs. Siiccharum tautat bonitaris ac in ofli^inis Europsicis now parsftur in iCgypCD, lievtr matifiia* proftat ditKfima.. VCKUIV cuhni v, enafe^ circunifeiuntur & evudi eduntur, Knhiva potiflimum. Vernsli ttmpore glamantur culrai terra hovilontaliter compofiri E nodis nonnutlis culmi propullulant,, exalfis radices* Pott bknnium utilis& edulis evadit planted

50. SACCHARUM BIFLORUMJ *panicula Janata, fecundaj cahjcibus uniflarii**
geminatis, extus hnatis.

DESCR. *Culmus* homine altior aquis exftat; interdum ramofus. *Folia* ncr-vofa ; ball fiiperne Janaro-hifpida; ftibrus obtufe carinara, rota viridiaj in medio fuperiori cinalicufara linea alba longitudinali. *Fores* ^eminari; alter icCILs, alter pedunculamsj uterque, hermaphr. *Calyx* bivalvis, glivbor₄ rubens, fubtus annaalo lanaro. *Corolla* ima giuma, parva, al-bida ; ntfi mavis calyceni univalvem, corolJam bivalvem dicrc; in (ingulo cnim flare tres funt valvuc.

la iittore *Nili* liinofo tama crefcit ^copia (iroul cum *JJrundiite donate*, uc penetrari non poflc luec fylva ^rundinacea, iiifi incolx parvos exicindrent rramices

Oum Nilus exundat^ arundo *haec radicer* prorrudit ex arriculis infimis vagns, filiforres. Rclapfo fltivio^ nunct culn>us]. uhv£ alrirudine his radicibus ficcis veftfrus, <omencofus. Unliffimi hac arundo ad *Serpes* vivas, quibus borti .& Fldmationes muniuntur locis humihoribui> & icp-tentriotii objeflis.

Rojetta in lods campe(bibas« areno'fis iinveniebacur foRis .anfrxtfiorihs.

Conrra: Rorerrenfe Ganifch in locis humidis foliis gaudet IIUICQ lati-
 ' vriSus cjuivm in rcgione Kahirenfi.

Arab. *Gatujkh* vel *Buzfarfu* [Buz «iomen Arundinura general^.)

51. SACCHARUM HIRSUTCJM* /*pica hirjuta; fpkuligeminif, alttra feffili, at-tera pediellata.*

DESCR. *Culmus* fimplex, pedalis. *Fofiorum* vai*mc longar, ghbra?; inrrt folhim barba terminarsc. FoKa plapa, glabra. *Spica* qaidripolL hiiTu-cie alba: fpicuJis appreiUs, germinatis, afcera ledih, alr:ra pcdiceLM, pauto minori, pedicello hirfuro: urriusque flos, alrcr 4nafculus# alter hermaphroditus; uterque muticus. *Calyx* ball lana Hindus, bivalvis, biflorus, ipicuia alter a lidili, altera pedtcetlara. *V^lvula* lanccolatse, hirfuts, acuminata?, nuuicar, flores includemes, exterior longii>r, hir* futior. *Corolla* bivalvis, sequatis, gUbria, ianc:olata, murica. *Flos* mafculus exrerior, acqualis hermaphrodit. *Starnitrt*, filamenta ^ bre< viflima in flore mafc. & herm. Anthcre ereclac, 1>jngv« *Prfiilhnn* t| flor_c malè, nullum: in hcrm. german parvum. Stli duo, atuhurif long mrcs, bad nudi; deinde plumofi. *Per tearpium* nullum.

In dejirtis Kdhirinis,

PHALARIS-

52. PHALARIS SEMIVERTICILLATA; *panicula ramis femwertkillatis, patenti" bus > fpkulis muticis ciliatis ; foliis glabris.*

DESCR. *Ctilmut-zvtdius, fcfquipcdalis, glaber. Folia plana, lincaria, glabra, fpithamalia. Panimla ramis per articulos culmo circumfiris, nee tamen plenum vrticillum confituenribus: alcernatim tres partes caulis ambientibus: hi rarni irerum paniculati. Corolla mutica, calyce duplo brevioi\ Antherje flavae. Styli duo, Rofetta & Kahira frequens, Aprile ineunte florens. Nactjm* 

53. PHALARIS DISTICHA ; *panicula mutica, ovata; foliis diflicits, involutis; culmo ratnofii repente.* *

DESCR. *Cidnnis repens, admodum ramofus; pars ere&a fpithamalis. Folia conferta , difticha, involuta, subpungentia: bail urrinque barbua, tota viridia. Sraffea panicula? folium magnum) pallidum. Panicula patens, ovata, diffusa. Calyx, gluma bivalvis; uniflorus: alrcra valvula ininorc, pallidiore, divergentes, altera indudenre corollam, eaque longiorc. Corolla bivalvis.*

Alexandria copiofe in arena lirtorea ad Catacombas.

54, PHALARIS CRISTATA ; *panicula fpicijormi, oblonga> valvula catycina utrin-qne crista calyce duplo longiore.*

DESCR. *Spica pilosa ariftis. Vaginae & folia glabra. Ad bafin foliorum membrana alba, cauli apprcda, crqQa. Folia plana, adeo ftriara. Panicula fpiuniformis , fcfquipollicaris, varic ramofa. Calycis* valvce 2 corolla duplo longiores. Corolla parva, bivalvis valvula alrera minori alba, mutica: alcera major! viridi, arifta brevi. Gramen ere&um, fpithamale.*

*Circa Kdhiram frequens**

SS» PHALARIS VELUTINA, *fpicis alternis filiformibus\$ culmo foliisque villo-Jiffimis.*

DESCR. *Gramen t>edale. Folia linear - lanceolata, angulta, tripollrcaria j villis mollissima & velurina. Spkcp multx ad apicem culmi lineares, tripollicares , ereflo - patentes, fparfar, filiformes. In Spicula nonnifi una corolla bivalvis, hermaphrodite, calyce minor. Spiculae geminae.*

56. PHALARIS SET ACE A ; *folitaria,fpicata; Jpiculii folitariis, invohcris fetaceis, flore fefqnilongioribus.*

DESCR. *Culmtis fimplex , pedalis. Folia plana. glabra, bipollicaria f involute Folium suprennum latius ante Horefcentiam ipicam includit ut (C) ipatha.*

fpatha. *Spica tripollicaris*, cylindrica, alba *fetls* spiculoe Ivaſin circumdantibus. *Sphnle feſſiles*. *Calyx bivalvis*, glaber, valvula exteriori r̄jimedio minori, biflorus: flore exeriori masculo, interiorc hermaphrodito utroque bivalvi, calycina valvula majori inclufo. *Stigmata hermaphroditi duo*: masculi nulla.

In defcrtis *Kdhirinis*. *Ratam.*

57. PHALARIS VAGINIFLORAj *cuttnis repenſibus*; *fpicarum capitulis feſſilibm*, *axi liar i bus*, *yaquia folii circumdatiſ j calyce corollis aqvu/liore*, *jere fill** *for mi*; *bivalvi, uwjloro*; *valvis comprefſis, angujtis*, *alter a tongiore*.

Folia fuprema oppofira, (in graminibus perrarum.) *Alexandria*.

PANICUM.

- jg. PANICUM COMPRESSUM; *fpicis digitatis*; *fecundis compreſſis*; *fpitnlis joluſ tariis, bifariam imbricatis*.

DESCR. *Culmus* diffufus, vix pedalis, ramofus, compreffus. *Foliorutn vagincc glabrae*, ftriara:, compreira?, bafi clauſe. *Lamina linear! - lanceata*, pkna, *vagina longior*, glubra, margine ciliato-fcabra, bad pilofa. *SpiccB digitate*,.terminals, ternic felcjuipollīcāres. *Spicnfo valde comprefſae*, rachi apprefſae, lanccolatar. *Calyx biglumis*, carinatus, valvula interior minor; biflorus. *Flos interior bivalvis*; masculus brevior; exterior hermaphrodirus, bivalvis: utraeque valvulae acuree, carinatce, muticæ.

In montibus *Hadienfibns*.

55. PANICUM GEMINATUM ; *fpicis tintaribus> alternis, appreſſis*; *Jpiculis bifariam imbricatisy tnuticis*.

DESCR. *Culmus* pedalis, teres. *Spices & Spiculce fcſſilcs*: hie ovatse, bifariam alrcmae ita, ut duas feries conſtituant, confertx, mucronatse. *Calyx glaber*, bivalvis, biflorus, flore altcro masculo; altero hermaphrodito: quod florefcentije tempore obfervandum. *Corolla hermaphroditi*, fc* mini arfe adnafcitur & propior rachi arcue valvula? calycina? majori adjieet. *Flos Mafculus collabitur* in unam glumam, inter femen & valvulam calycinam minorem, qux extrorium cil. *Folia plana, nuda> ftriata, barbata ad bafin*.

SofittcB in pratis ad littora *Nili*.

- 60, PANICUM TURGIDUM. (Panicula parata erat ad explicandoſ flores fine Martii: fed ante explicationem videnda erunt (lamina.)

DESCR^ *Frutex fific Junci*. *Fo'ia plana, involuta, fefquipollīcāria*; *vaqka longs* : ad dichotomias ventricofa:, niembranace<, albsc. *Pcdimtuhs panich a*

panicula, *Spiculce* obefe *Calyx* bivalvis, extciori valvula minima, biflorus, flos alrcr mafculus, alter hermaphroditus; uterque *corolla* bivalvi. *Stigmata* incraflata, implumia.

In defertis *Kdhirinis*. Arab *Bockar*. بوكار

61. PANICUM GROSSARIUM? eaule ramofo; panicula patente; fpiculis ovatis.

DESCR. *Folia* plana, longa, glabra, *Panicula* fpicis obefis : in fingula panicula gluma calycina bivalvis, biflora, valvula altcra minore. In hoc calycc flos alccr mafculus, alter herm. Mafculi gluma univalvis, uc mihi videbatur.

Rofetts in ripa Nili. Arab, *N'gfl*: aliis *Ncfi*.

62. PANICUM TETRASTICHON; fpicis alternis; fecundis quadrifariatn imbricatis, jfiofiulii fecundis hinc plants, info gibbofts, villofis[^] muthis.

DESCR. *Ctllmus* pedalis, ftriatus, compreffus, ramofus. *Folia* plana, gUbra. *Spicce* fcffiles, fecundit; dum florent parenres, alioquin apprefife, lincarcs, ordinibus quatuor flofcnlorum imbricarae, *Flores* plani ad rachinj ab altcra parte convexo- gibbofij undique pallide - virides, ftriis clatis, obfeuris. *Calyx* diphyllus : inrra cum flos mafculus juxta glumam parvam & flos herm. cujus glunue corollins fcmini arfc adhairent.

In pratis Nili littoreis.

63. PANICUM CRUS GALLI.

OBS, *Rfldis* 5 - gona; in qualibet fpicula. *Calyx* bivolis, hifpidus; valvula altcra malto minore, altera longitudine corolla'. Intro Calycem F/fculi duo: Mafculus juxta valvulam calycinam niinorem: henn. juxta majorcm, uterque fefilis. *Mafcvli* valvula exterior mogna, verfus maiginera ciliato - hilpida, dorfo glabro, fufcefcente, carinato: apice breviter aiiftato, mordinibus invo^Tra_# Valvula interior minor, plana, hyalina» *Stamina* 3 videnda ante explicationem florum. Piftijlum nulluin. *Herm.* valvula utraque viridis, glabra, nitida, fcmini arfte adharrens, acuminata: exterior, ovato-convexo; interior plana. *Foliorum* vagina! bafi viUofi, hifpidap. *Culmut* fepe ramofus: folia maxima porte alba fuperiore pagina : vagiva? inferiorum villofe, fuperiorum glabrse. Ergo *Calyx* non ell trivalvis, nec uniflorus; ex chaiaclere generis: Rachis quoque faepe trigono. Hinc: aut notse non confstantes, aut hec planta fub alio genere militabit.

RofettiT atl Uttora Nili; faepe bicubitalc excrcfcit, ima partc femper procumbente.

64. PANICUM DICHOTOMUM. Arab. *Tummdm.* Ubique in campis Arabia: simul cum *Panico Bockdr.*

DESCR. *Caules* crēcto-diffu fi, dichotomi, ramofiffimi, ad altitudinem ulnae furgunt. *Spicce* articulorum bafi & calyce extrorfum hirfutae. *Spiculce* geminatae, feffiles, fetis cinch?. In fingula fpicula flos mafc, & her-maphr. *Folia* plana, linearia, glabra,

Gramen hoc vulgatissimum *pabulum* Camelis & Afinis, Ad *Tuguria vestienda* communi ufu adhibetur. Parietes & tcftum tenerioribus bacillis eriguntur, aliisque lignis transverfc folidantur. Poftea, circum circa extus apponitur indumentum e gramine Tummām & Bockār pcdis denfitate, & arfte apprimitur, funiculisque undique circa dcdu&is adstringitur. Vera haec mapalia pluvix tamen refiftum; & annos durant 5 vel 6: ornantur quoque intus > calce vel gypfo dealbata.

65. PANICUM APPRESSUMJ caute ramofo} antheris purpureis.

Caulis longe repens in arena? fuperficie,
Arab. *Fivlek.* *Alexandria & Lokaja.*

66. PANICUM MUTICUM; *Jpicis alternis, fecivndit\ fpiculis remotis, geminatis, mitticis; alt era pedice/lata; rachi trigona, flexuosa.*

Rofettce. Affine *P. colonnm.*

67. PANICUM ADHIERENS. Arab. *Sara end.* *Hadie.*

Involacra retrorfum aculeata, fetacea. Floris aculei arfte adherent vefti- mentis*, quod in *Panico glauco* non obtinet.

68- PANICUM GLAUCUM. Arab. *JEbcd.* *Surdiid.*

- u) Simile *Pan. glauco*; fed intra involucrum unum fpiculae geminse. In alio gramine numeravi fpiculas ienas.
- B) Aliud Panicum facie *glauci* fed involucris fub - pilofis, nee fiabris, neque retrorfum aculeatis.

AGROSTIS.

69. AGROSTIS VIRGINICA; *Sarmentis repentibus, foliis convolutis ciliatis; panicula fpicata.*

DESCR. Culmus parte erefla fpithamalisi reliqua parte ramofus, repens fub arena. *Spica* bipollcaris, diabens in lobos, quando infleſſit. *Calyx* corolla minor, bivalvis, valvula extcriore triplo minore. *Corolla* bivalvis, *Stamina* 3. *Jligmata* 2. hirfuta. *Folia* brevia, vaginis 1.ngis, ciliau

ciliata leviter, glabrn, utroque margine involute, terminata mucrone forti. In dferro arcnofo verfus Sueſ, parcus florens fine Mart, menfis. Ab Agr% virg. LINN, differt panicula fpicata% adeoque & fpecie differr.

Varietatem inveni prope *Lof/njam* huic fimilemj nifi quod Spica? bipollitcares: rami in geniculis coacervati: folia inferiora vaginis fuis longiora; quae tamen vaginis prsecedenris minores.

POA.

70. POA MULTIFLORA; culmis Jimplicibus, ereffis, fpiculis limaribus, multiſtortis. Hadle.

Communiter gerit flores XIII: verum & ij usque ad 24 in una ſpicula, Alia erat> fpiculis fufceſcentibus IX- floribus.

CYNOSURUS.

- 7r. CYNOSURUS DURUS; Spieis fparfts, fc/Jilibus, patentibns) fpiculis fecndis_K fubfloris.

DESCR. *Ctlimus* cubitalis, tenui9, reftidimus. *Spicce* pedali (patio ad npicem; alternate, | poll, longse. *Rachis* flexuosa. *Spiculce* ovars, comprefſoe, fecundx, duarum ferierum divergentium, ferrugines, quadriſlorx, murica?, *Folia* planiufcula, glabra.

In hortis Kdhirinis fpontancus. Arab. *Hndlfe*.

72. CYNOSURUS TERNATUSJ flipulis ternatis, quaternis- ve> patentiflimix, lanceolatif. Arab. *Sahér*. MOT.

DESCR. *Culmns* filiformis, fcpe fimplex, interdum ramofus," folioſus, glaber. *Folia* lanceolata, canaliculata, vagina foliis triplo longiore. *Spices* terminals, (Itpc ternary, horizontales, pollicares; fupra & infra pJannerse, lanceolate, pJlide rubentes, *Spiculs* 4-florae; glumis carinacis, muticis,

73. CYNOSURUS FLOCCIFOLIUS; Spieis Bmaribus, inferioribus alternis, fupremis geminif, foliis attemis, margine alt erne flocciferis.

DESCR *Culmus* pedalis, reticularis, faepe (Implex, interdum ramofus; foliorum vaginis teftus ; nee nifi fuperius nudus. *Folia* vaginis 4 pollicaribus, ftrijris, glabris, ciliaris. *Lamina* pedalis , linearis, | poll, lata, plana, vel complicata? glabra, vcl hinc inde pilofa: margine fiocculis pjrvis, denfis, albis, fubglobofis. *Spkce* ad cuhr.i apiccm lineares, ere&ae, fecunde, tripoll. bafi pilofaej inferiores fſepe trcs, alrcrnaj,

•J poll, remotic; fup'rems dux geminatx, interdum, fed raro ternatse, intermedia turn pedicellata. *Spkuloe* fecundac duarum fericrum, feffiles, alternae, glabra?, muticac. *Calyx* bivalvis, triflorus. *Corolla* bivalvis. *Flocculi* onmes herm. triandri/digyni. Speciofa planta; vel c longinquo confpicua foliis variegatis flocculis marginalibus, albis.

In pratis humiuis circa *Taas* frecjuens,

FESTUCA,

74. FESTUCA MUCRONATA; *p annul a glomerata} fpiculls muttjflotis; flort glandiilijero.* Arab, ^{^yi*}

DBSCR. *Culmi* teretes, glabri, repentes; ramis ercQiSj ramofis, cubitalibus. *Folia* iubdifticha, patentiffima, unguem fere remota, glabra, rigida, vagina fiffa, margine ciliataj lamina canaliculata, triflora, mucronata. *Paniculcs* terminales, pollicares, ovatae, conglomera. iSpiculce oblongs, lanceolate, mulriflorae. *Calyx* communis fpicuk bivalvis, 4- 6- floras; valvulis hyalinis, dorfo viridibus, glabris, obtufis altera breviori. *Corolla* propria bivalvis, calyce major, villofa, acutifcula, byalina; valvula exteriore convexa, carinata, antcriori plana. *Glanduto* in flore sponte expanfo vidends?: una, magna, didyma, iub filamento extero: Alia: minores sub reliquis? *Stamina*; *filamenta* 3, capillaria, corolla longiora, alba, jinthtrev incumbentes, lineares> ttzvx, didymje. *Ptftillum*: *germen* oblongum, coroprcflum, album. *Styli* 2> capillares, divergentes, albi, glabri. *Stigma* filiforme, villofum, longitudine Styli, ad latcra corolla: exsertum.

Cirea *Beit el fah'h* copiofe in collibus arenofis. Ad FeAucam retuli hanc planum dubius.. Arab. *Schoucham*.

75 # FESTUCA DICHOTOMA ; *panieula dichotoma; fpiculis fejjitibus, patentiffimis, linearibus, trifloris, muticis,*

Alexandria, init. Apr,

76. FESTUCA LANCEOLATA } *panieula cequali', caute decumbntneJ fpiculis 7-JI0**
rh, muticif, lanc\$olatis.

Ibidem,

77. FESTUCA TASCICULATA ; *paiieulafafckulata>feennda; Jpieulis quadriforti, longe criptatū j calycis valvitla exteriore' arijlata | alter a minuta, mutica.*

CJalyx bivalvis, multiflorus. Gramen triandrum, digynum. An *F bromoides*
•Jbidem,

BROMUS.

BROMUS.

78. BROMUS VOLHSTACHIQS ; *miculij patentibns*, • *ramis fp|catis| fpkulis *-/temis, appreffis, linetxribxis | arijlis brevijfimis,*

Culmus cubitalis. *Alexandria;* In humidis ad foosas.

79- BROMUS VILLOSUS; *panhula fafciculata*; *fpiculis fexfloris, glabris, tinearibus, pedkellatis.*

DESCR. *Culms p^dalis villofus & rachis paniculoe. Folia lanceolata, bipolllicariiy villofa. Farina:* longiffimae, glabrae, vcrfus apicem villofie; tettminitae inrra folium membrana hyalim, amplexicauli, *Spicula pollicares; ariftae duplo longiores, ereclie.*

Alexandria. Apr.

80. BROMUS POI- FORMIS J *panicnta Jpicata* > ovato - oblonga, *fpicnlis com-prejils, horizontalibus, 5 - fioris_m*

Alexandria. Arab. Samme.

AVENA.

81. AVENA PENSYLVANICA. Arab. *Sngarat edjcnnal. <Jp*2sr' *JrF^{wu}*

DESCR. *Spknlw 3 - fl>rar. Ffafculi medio hirfuti, apice bifidij fiflura ari-Itati. i^//ei pollicaria a rigida, bad barbata. Vagina ciliatse.*

In dcfenis *Kdhirinis.*

ARUNDO.

82. ARUNDO EPIGEJOS; *pcmlculis coarffctitis in formam Jpka; fotiis ereflis| mar(rine retrorfwn jcabris, fere cotnplkatis^ tinea alba media in pagina fu-periore | apke rigiduujcula, jiibpungenti.*

Alexandria: Arab. *Halfa.*

83. ARUNDO PHRAGMIT. *pankuta fub- ovali| fpkulis mnltj/toris.*

In locis paluftribus *Ghobeibe prope Sués.*

84. ARUNDO CALAMAGROSTIS; *pcmkulis linearibus, perlongis| fpkulis tmi-fioris^ bafi villo ci|Ms| cidmo ramofo, alto.*

Ibidem

8j ARUNDO DON AX; *Foliis longe- tanceolatis| ba/i ptabris| tana infra calycem.*

DESCR. *Culmw altirudine fepe H vel (4. uln. inrcrdum ramofus. Pamcula twminalis, patens, vcmo faſb fecundaj fladbens. Folia fepc fxundaj viridia,*

viridia, fubtus n:rvo mcdio bafi albido; plana, bafi alba, non ciliata
marginē, fed bad fupernej medio longidima, culm urn dimidium am-
biente: juxta vaginam arifta membranacea ciliata. Folia ultima bafeos
apice hirfuta. *Calyses* 3 - vel 4 - flori: panicula diffusa: corollae valvula
altera ariftata

Ad rivos Temenis frequens. Arab. *Kafab.* s⁺⁺*ci* *Rofetta* in foflis.
jEgyptis vocatur conununi Arundinis nomine *Biiz.* hacc spciatim
Buz Haggni.

86. ARUNDO MAXIMA; *foliis margine ciliatis, bajl albis, hirfntie ciliatis,* *Jlrialis, plants, totis viridibtts.*

Folia juniora tota margine ciliaco - fcabra; que fcabrities state evanefcit.
Bad vero cmnia folia Temper margine hirfuto * ciliata.

Crcfcit tetc. A Donace Haggni diverfa.

OBS. Donax & Saccharum Ganefj ripas Nili non folum vettiūt, fed prorfus
impediuit, ut *Alnus* in Septentiione, ik *Mingle* in Indiis. iEgyptii has
arundines utiliter ad fepes vivas vertur.t, qua? non folum gratiflxino virent
colore, fed .& altitudine infigni 6. vel g. ulnar. exrefcunt. Foffa ambit
hoc vallum arundinaceum.. In ufu etiam eft Arundines exterioics conftrin-
gere duplii ieiie ligamentorum e foliis Palms fa&is. In Feniniila *Bds-ettin*
ttliam vidi ortem muniendi hoitos, laborofam non minus quam ftultam; (ingulx
quippe arbores ciigebantur fepibus cancellatis fa&ctis e foliis Palms vivac
tortis invicem. Hoc fepimentum ultra annum non perdurat. Id non minus
nbfurdum* mihi videbatur, agrum & hortum in uno milcere flrvo*

#HOBEBS SAA^A Palus eft diftans g. horarum fpatio ab urbe Sués meridiem
verfus. Hie quoque fontes aquae vivae & calidae fcaturiunt. Immenfa & 13
uln. alta crefcit fylva Arundinum *jibragn.* & *calamagr.* quas Nilus non
gignit. Culmi transvehuntar ^er ptflin JEgyptum & Arabiam. ^Edium
pavimenta fuperioiis contignationis gnuidine ft<rnuntur, cui deinde humus
injicitur.

Tradic'o poftulat MOSEN ex ftatioHe Ghobeibe divifum permeafle mare. Qiiic-
quid veto fit, id faltem probabile videtur Arundinis vaftom regionem no-
men dediTe *Mari rubro*, quod iis tempovibus illam non folam alluebat, fed
in quo tota natabat. Jam *Sny* eft *Mare arund'wifeium*: quumque Arabes
& unam Arundinis spciem atque alteram generico nomine *Buz* denotant,
addito fubindi cognomine; eandem quoque Aucldr hiftoricus & facer Mofes
(ecutus denominationetn prifirara, fld minutiae non attendtns specificas botan-
ologiie. Idem dux populi, prima pericula \itue in cunis arundinaceis c
Ponace vei HagJiii faftis (Exod. Cap. 2. v. 3,) expertus eft. Arundines
non crefcunt ad litrora Maris Rubri, niii ubi fontes & lacuſtria funt ioca,
v duf (jhobeibe; qujc rariifima inve^iiuitur.

ARISTIDA.

87« ARISTIDA LANATA; *panicula ramosa] corolla arista media lanata,*

DESCR, *Foim* convoluta ad futuram reflam, figura filiformi; bafi rima loage dehifcente in foliis antiquis[^] in junioribus tantum ad bafin. */Iriftoc* lareralos in mcdio villofsej in defloratis patentes; media arista valde lanata, bafi nuda. *Culmi* ad genicula infima supra folium villofifflmi.

Rojeftcr in arena niobili circa turrim Canope. In deferris quoque *Kahirinis* habhart. Arab. *Dhrmrce.* »/^r^> vcl *Sjarfsjuf.* 'C^JUĀW Initi* Martu floret.

Quum *Artfidcp* *tidfeertjivn.* arista eft glabra, (quantum ego fcio*) haec noftra diftinGa ab ilia erit fpecies ; quamvis forma conveniat.

8Q. ARISTIDA PANICULATAJ *fpiculis linearibus, oblongis^ arista cujusvis Jloculi triglici) glabra.*

In Arabia ftlicL

ELYMUS.

89. ELYMUS CAPUT MEDUSJE.

DESCR. *Culmi* repemes, ramt>fi. *Spittitce* alternse, pedunculata?, (blirariae, lion geminar, biflorac ; aut fi mavis fai -fpiculs. *Invofucrum* circa flores, vel receptaculum orbiculatum, pedicellarum, margine triplici ferie fetarum: altera cretla, altera paiente, tertia parva, deflexa; feris *erefli\$ patentibus, undique retrorfum aculeatis, aculeis vix ocdis confpkuis ; tarn n adhcersnt vcftimentis. *Flores* duo, f:flTlcs, icquiles, h^maph. in fundo involuci, caly^e & corolla propria iuftrafli: quod a charaGere Elymi omnino diftat. *Calyx*, gluma^bivalvis, <carollaE a?qualis, mutica, convexa. *Corolla*, gluma bivalvis, -convexa, mutica. *Stamina* 3. *Pijllilla* 2 villofa. *Semen* unum, <ui corolla adha^ret, non ^dnatt. Gramen fpicatum; rachis undulata.

Videtur novum Genus poiTe conftituere , cujus tharafter erit: *Spiculis multifloris; receptatuli elongati dentibus injidentibus j wvolucro fnonopkyllo) citiato, hifloro; tahice proprio bigltni, unijloro; corolla biglutnū llienejra.* Arab. *Hölb el adjais:* quod nomen imponitur Lappaceis rantunt noil omnibus.

90. ELYMUS SUBULATUS; *fpicitlis miforis, d'fikhis y alternis, apprejjis, jfricam Jubulatam formantibus.*

Calyx corolla major; unilateral[^] Csterum totus ckara&er novitatk cum prsecedente commiinis.

Alexandria ad margines agrorum. Init. April

TRITICUM,

51. TRITICUM HICORNE; *eatycibns flrhtis , bkornitbuS) trijtorii; fofntlis later alibus jertilibiis, ariftatis, medio Jlerili,*

Alexandria Apr. init..

52. TRITICUM SPELTA ; »)viltotum. *Alexandria fine Apr. maturum. Qamh. && Hurvta. vioks* Sa?pc in codcra arvo fcritur cum Trijotio altx.*

In qu:ujs fpicula urrinque flos bcrm[^]ph. fertilise ariftatus: in medio 1 vel 2 aboiknres mai'culi, vcl neurL •

Variat a) Gtumis villaſis[^] (picis ovato - obtongis > fefquipollicaribus. Arab. Qamh n&ajghe.

h) Gl. fubvillofij, fpicis Linearibas, bipoll. fcrmgincfcntibus, ariftis fubciliatis; fspe ball inrrorfum nigris,

Arab. Qpmh nfghajir.

93# TRITICUM SPELTA IS) *glabrwn* y gtnmis gtaberrimis J fpr̄cis linearibus, a/ £r, bipolticaribus & ultra.*

*Arab. Qamh Jlajri, An varictas prioris, vcl nova fpecies> dterminare non fuihneo**

94. TRITICUM EGILOPOIDES.

OB*. GriHiēn hoc área Alexandriam non fnfrequens fine meiids Martif. Florcs maſculos nnnquam indagare valuj. Fades Sc fhuelua iEgilopis: nee multuni ahudit a Tritico; quamvis fub-ejus nomine vfx len[^]re poteft. Neque inter species Triticeas habirnt. Ab iEgilope dirimitur, qaud Cnlyee gaudct bivalvi, non bipnrtito | quodque latera i'picula? ambiac, nee corolla contran'ns.

Aliquando Radices ridi, hujus, ut puto plants, qxiiF propaguiibns bifariam iinbricflis 6c enffifoimibus; tain perfede ficas ierpeius rfercbant, ut nihil fimiūuis

GRA-

GRAMINA AMBIGUA.

9J. FANICUM POLYGAMUM; novum Genus? Si ideflcnt ftyli duo & Calyx i»valvis, sub gene-re Panici militarcr.

DESCR. *Culmns* digici longimidine, enodis, gialber, ftriatus, fili crassifne. *Calyx univalvis* pUanus, corolla duplo treviori muticas; biflorus. *Flares* feffiles, inutri. *Majb.* corollii biglumi: glum* exteriore magno-re, convolnta. "Stamina 3. *H&rm.* corolla bigluinij starn. £. *Stylus uniculus*, albus, iincari-fubulatus, compreffus, viHofus, corolla longior; intra corollam ^cniculo inflexus. *Stigma* (implex, acuturn. *Foliorum* vagina: laxs, glabrx: laminne planx, glabrce, baſf barbatx, *Involverum* Tub fpicula fetk pollicaribus 1 § 9 b& hirfutis.

In pratis verfus *Tacts* parcius.

96. ANDROPOGONOTDES.; Arab. *EsUm fS** vel *JJuviS tjuoa noraea* jell plurib^u graminum (pecibus commune. *Haiti%* *Sphit* fecundae terminales. *Spiciijo* Obcordatle. *Calyx triflorns*, gluma bivalvi. *Corolla* bivalvisj altera ariltata, majore, obcufidiu. *Culmi tamofii*.

97. GHAMEN; *fpkis* digiratis, lincarfbus 4, 5. *Spicilarum* arifta: fcmipolliares. *Calyx* bivalvis, insequalis, corolla brevior. Unicura tantum vidi *Jiofctdnm* intra calycem. *Cuhni* ramofi. *Vaghics* comprefile. *Folia* plant. Ad Hadie.

98. GRAMEN; *panknla* Ipiciformi. *Spicula* patent - deflexe; multiflorse, m^{tic3e}, inancs ? interperfe fpiculis aliis unifloris, fenibus. *Calyx* bivalvis. *Corolla* bivalvis^u bi- ariibta. *Styli* duo. *Alexandria**

• * •

NOVA GENERA.

TRISETARIA,

S9. TRISETARTA. *Digyma.* *Calyx bivalvis.* *Corolla tri - ari/lata.*

CHARACTER GENERICCS. *Calyx* gluma bivalvis, "biflora, valvulis lincari-acuminatis, rnuticis, glabris, corolla longioribus; altera breviore. *Corolla* bivalvis, linear - acura ; valvuh *interior* planiuscula, hyalina> brevior, niutica: *exterior* convexo - compreffa , margine membranaceo, arifta ex apice biparrira, duplo longiori; alia ex dorfo intra apicin fimplici; *TVQ|O* longiori, *Stamina* filamenta tria, filiformia; *Aatherce* incuin-

bifurcata. *Piflilhim* germen jftrvum; JlyR duo nudi |Jligmata simplicia. *Pericardium* nullum. *Semen* unicum.

SPECIES. *Outran** pedalis, erexitus, bafi ramofus, teres. *Folia* plana, rripollaria, linearia, villofa ur & *Vagina*. *Panicula* contrácla, fpi-thamalis. *Radix* annia, Unicum. tantura fpecimen vidi culmis pluribus.


Alexandria in penbfula Rds - ettn. Flcrens'poft initium April.

ALTERNANTHÈRA.

10Q. ALTERNANTHERA; entile repente; ramis oppojltis; capitulis axilla* ribus fejfilibus; calycibus gl'abri's.

DESCR. *Folia* oppofita, subfeffilia, lanceolata. *Florum* capitula albo- rufe* fcentia; magnirudine pifi. *Capfnla* comprefTa, obcordata^ leu cmarginata_# Facies & floris parres oenncs congruunt cum *Achyranthe*: tēd a) loco *Jlam'mim* 5 fertilium, vidi. in omnibus floribus filamenta fex; & eorum alrerna fine antheris. Unde planta evadir triandra; *Polycnetno* proxima. b) *NeSHaria* achyranthi propria, horum ne veftigia quidem. dctegere potui, Quare praeftar, me judice, infociabiles separare,

*Rojetta** Arab. *Ham\$h*



DE-

DESCRIPTIONES PLANTARUM.

**"CENTURIA
SECUNDA.**

CLASSES IF. V.

TETRANDRIA. PENTANDRIA,



CLASSIS IV.

TETRANDRIA.



GALIUM.

! • **GALIUM** APAKTNOIDES; *foliis finir₉, custeifarmibus, oUnJis tur_n aca-*
mine, rvtrorjhm aculeaīts; geniculis aquilibns.

DESCR. *Folia fcabra; 4 vel 6-n-a, non oQona. Gemīvla non viilufa.*
Anthercs 4, in cjuovis flore propcndentes. FruEtus hifpidus. Facies
*Galii aparin**

Jiad_h, in uiubrofis, Arab. Schelette. da[^]i vel Schobodh budha.

CRUCIANELLA,

2. CRUCIANELLA *mKBhCEAifoInⁱ fenis qitaternisve, Knearllras? fiberis; flo**
ribus broMeisque cequaHbns.

DSSCR. Charātcr convnit cum *Crucianilla mnrit*. Seel haec eft ftmico-
fj; nojlra hcT[^]acea. Hit us folia lmccokra, connara, conferta; %mfr<*
libcra, bncariā. Maritime? flores braQeis duplo longiores; in twflro
flores oppofit';- braftcie coofcrrar*, urriusque vete flores quinque-fidi.

AkxanArics| intio April.

PLANTAGO.

3. PLANTAGO DECUMBENS; *foliis tincaribus* fpverne hirfutis; /caps decum-*
bsntibus vil/ofir.; Jpitis ovatis_y ereBiis.*

DESCR. *Folia tripollicaria; unguetn dimidium lata, fupra liirfuta, fubtu^*
villofa. Seapi filifonncs, dcumbcntcs, bipollicarc, foliis breviores,
fubvillofi. Spkcc ovato- oblongae, ercQte, glabra:. Peta/orutn lacinia:
fubroTunda?. Calyx glaber,

Tn defcrtis *Kāhirinis frequens, Arab. Lokmet en n&gi, ^sp-^XJ] a^iiJ*
i. c, pabulum ovium.

4. PLAN-

4. PL ANT AGO CYLINDKICA ; *foliis Unearius utrinque hhfutis | fphis ajlindri-
cis Jubctirvis; corollis lanceolatis**

DJESCR. *Folia* Ipitamalia* wtrinque hirfuta. *Stapi* teretes, diffufi, hirfiirie albicantes, foliis breviores. *Spices* cylindrical, tripnlicaFes, là?pe fcapi longitudine ; fa?pc incurvarae, vcl furgentes. *Calyces* apic* hirfutL *Corolla* hernia: lanceolarae,

5. PLANTAGO' OVATA; *foliis Tmmribus> utrinque hirfntis; fcapis ereSlis, hir-
futis Jp̄ies ovata - oblongis.; corollis ovatis.*

DESCR. Priori perfimilis praefertim quoad folij, *Scapi* magts ere£li, fofiis iongiores. **Spica* vix pollicares, ovaro-obfongaf. *Hores* conferti. *Calyces* apice hkiutk *Corolla* lati/TTma, cordato-acuta; qua nora ma-timvi dit-
fcrc a priori (pecic.

Hse trcs Ptmtaginis fpccies Scapa g^udent nudo. Chara&ere vid?nrur *PI. alpinw* cum qua facile confundentur? ni£ adxquata deiciiptio liitii-
tes confiruar.

Alexandria inir, Aprilis,

- G PLANTAGO GRASSLFOLIA; *foliis eamojis, femiteretibus, tfaearibtiS) ciliatis>
haft nudis.*

A *Plant, tnaritima* vix differt, nil? foliis, bafi nudis, *Scaipi* tcictes* villis appreffiff. *Spicce* cylindrical, bipollcaries.

Alexandria^

SCOPARIA.

7. SCOP ARIA TERNATA | *foliis fanceolatis, apice ferratis; ramis ternatfs; net-
taria v Utf*

DESCR. *Cavles* annui, bipedales, a radice ramofr, crsSi,, fexcarinaft, gla-
bri. *Rami* ranati, axillare*; (cfquipojlicari. fpatio remoti. *Folia* ver-
titillara, lanceoUta, bafi drrenuata (nee alio pctiolo) obrufj, vix poll-
caria, bafi- integra, apice ferraro >ncifv, plai)a, ferC3:a, nod*. *Pidnn-
tuli* per omnes ramulorum axillas, tcrni eum foliis., capillapes, crefti,
nn.flori; *Calyx*, perianhiunx fsepe 4-phyllunr, perfiitens » glabrum.
Corolla mouopeiaJa, rotata, quadifida, alba, bciniis. ovata - obcuflis.
NeEfarfam, feu tubu« *Corolla*" nd bafin intus vestirur hirfuri^ velue an-
rulo villoib. *Stamina* 4 erefla. *Pijillum* unum: grrmen fuhglabofum»
Stylus filiformis, gerrnine felquilongror. *Stigma* acqtmle; n ,n jrcumina-
tum, nee dihratum. *Capjnta* uniloculariS> polyfperma, ovata : m.iru-
ram noa vidi; an bivalvis? *Synonymu* ixi Spec, Pi, LINN. *Siopnr?un
Amtriu*

Amerk. in multls similem huic noſtræ dicunt: fed *Gen. PL* filent.
Neftarii formatn.

Prope Goinfodam. Arab. *Dfar.*

CISSUS.

8. CISSUS ARBOREA; *foliis vblongis, integris, crajjis.*

DESCR. *. Arbor ramis debilibas, rccurvis, terenbus. Folia oppofira; petio-
lo tcreti, fuperne planiore; lamina craffa, oblonga, acura, glabra, in*
tegra. Pcdunculi ramorum terminates, brachiatim panicuhui. Floret
Jcffffilcs, feu fpkari. Psrianihinm - phyllwm, 'carnp^nuhrum, 4-den-
tarum, ercclum, perfiftens. Corolla monopctala, quadripartita, prorlus
revolura, viridis, kciniis ovalibus, Yemirfiarcida, adhacrens bafi fructus.
PiJlHfam: Germen globofum, ad medium undique claufum corolla ca-
lyceque. Stylus nullus. Styma planum, orbiculatum, membranaccum.
Stamina filamenta 4, fubulua, crefto- parenria, inferra junfturae corollas
& germims. Antherae fimplices, incumbcincs. Pvricnrpium, bacca,
mono'fpcrema, feflilis, pifo major; vei flava, vel nigra: bafi ciniU caly-
ce & corolla mxrcida. Semen unicum in medio.*

Surdud. Arab, 'committinter -vocatur Redif. <-*?.&/* AADahhi^ Rak رک
Ad Uahfod. árbor dicirur Ork سجس fruftus Kebattu گباتو. i^

In mngno eft prelio. Fm&us matus edulis. Folia contiifa imponun-
tur tumoribus Uarm difHs i& bubonibus BiahU Sed vis antitoxica
ddco famofd, ut carmine quoque cckbretur. *)

TOMEX.

9. TOMEX GLABKAJ *foliis watts,-gUxbris; Jlaminibus iafi connatis.*

DUSCR. Arbor maxima. *Rarii teretes. FoSa oppafita, petiolo tereti, ver-
fu< bafin crailTori, flavefcnte: lamina faepe bipollcari, plana, ovata,
cariacea , titraque extremitate acuminata, inregra, glabra. Peduvatli
ramulorum terminales, ex ulrimis axillis prodcuntes, brachiat, conferri,
paniculari, nudi, floribus Cl spicatis. Calyx perijirh. tuonophyHum > qua-
dridenratum, fubvenrricofum, urceolatum, viridi - albcfcens, dentibus
parentibus. Corolla 4-petala, alba, lincari- lanceolata, bail erefla, lim-
bo paremc, calyce duplo longiori Neffarium: fquamae quituor erc9:ap|
carnofoe,*

*) اراق البنات يطلع نبات مدومن
يبيع ثبات من الرجال الدهلي

carnofac, fuborhiculauc, roruta, extus unifulcatac, fingute inter petalurn & ftamiiu, rripllo breviores filamenris, virides. *Stamina*: *filamenta* 4, erefta, fubuhra, alba, ball connara in tubum quadrangularem, (quod *Monadclphi*T proprium eft.)* *Anther a* creffae, lanceolata;, albido-flavae, longirudine filamenrorum. *Pifillnm*: *Germen* fuperum, cylindrico-ventricofum, viride; calycc dupio brevius. *Stylus* albidus, germine anguitior & duplo brevior. *Stigma* bilobum, capitarum. *Perkarpm*^m, ovalc, cuberculufum 1 carnofum, viride, pollicare, intus referrum fucco vifcido, infipido, violaceo, femcn continenre. *Semen* unicum ovato-oblongum, carnofum, viride, corylcodonibus refertum uc faba. *FruEtus* edulis.

Surdtid; frequens. Arab. *Doher*. An novuni * genus ?

CORNUS.

10. CORNUS SANGUINEA.

DESCR. *Caulis* aiboreus. *Pedunculi* paniculati, terminales, fubcorymbofi. *Folia* oblonga, rripollicaña, oppofin, plans 1 *Integra*, obtufaj periolo tereti, femipollicari. *Petala* alba, revoluta. *Stylus* bis bifidus. *Frm-tus* infer us, ruber; *Drupa*, nuce bilocularij fere pollcaris.

Ubique per *Temen*. LOHAJ^E *Gharaf* u ^ i SORDUD, OnneK HADIE *EfcheU* vel *Sehali*.

Ufts varius. In *Cepbatalgia* folia hujus arboris fimul cum foliis *Datura metel*. concufa, fronti applicanrur.

Gluten e baccis paratur Beirelfakih.

Lignum tenax & folidum eft; ideoque ad opera *fairilia* mile.

In *arte pyrophora*, qua ignis friſUone elicitor, obicis vicem prافتat.

FruSIus pucris edulisj tamen nimis *ftuans, quod & ipfc aliquoties expercus fum.



NOVA GENERA.

SJELANTHUS*

1. SiELANTHUS QUADRAGONUS; *tavje articulate, dhotomo, tetragono; joliis carnofis, cordatis, ferratis, femieomplicatis*.

DESGK. *Conks* perennes, terragoni, carnofi gkbri, virides, articulari, dichoromi> farti. *Articuli* bipollicares, re&iflmi; per genicula undulatim difraricati, geniculis anguftatis. *Folia* ad genicula alrerna.

(E)

Petiolus

Petiotuf qind-ragonus. *Lamina* cor data, tripoll'icaris, carnofo, rigida, femicomplícara, Icviter revolura, ferrata, acumioata > glabra, fub-ve-wola. Grr/t» filiformes, fripoHicares, oppofiti foliis. *Pediinculi* oppofiri folii> terminates, terctes, glatri, bis terve umbellati, involucro nullou *Flares* pedieUath *Calyx* germifii impofitus, quadtiphyllus > apicc cwuS) decidutis* *Corolla-* nulla. *Stamina;* *fifamenta* cju;tuor> crcfla.> filiformw , brcvio, calyci op'pofira. *Anthcrce* oblongs, incum- bcnres. *Neftarinm* j mwuhis elcvjrii* cxrra pifliilumj cjsqm nurgini exteriort filamenta tnfwna. *Pfftrllimi* *Germen* urccoUrum tūb calycc. *Stylus* filiformtS) filamentis dhnrđiro brcvior. *Stigma* acuruna. *Peri-B(irphim)* bacca ovalis, tubercular*; mririna rubra; nuce. minor. *Semen* unicurn, aigrunu corricc mcrabranacco*

Itt sylvis *Arabia fellas* vulgaris*, fccvndcs fruticcs> & cirrhis fc affigcns, Novum hoc Genus conltituo, denominarione fumta a nomine Arab. Scrla A^ Facics in raulrw conveair cum *Elaagno*, in pluribus di- feeddir. Vencnatuni puraac irncox MorcnfesJ linguam manusq[ue] urence dotorc- aificu. Scclas cauUs., aquam copio-fe emittu.

Variat a), angulrs Jitb hrfpidis. Aa-ab, *Dakarf*^ id eft: mas.

#) *angulis nudts, glabris.* Arab. *Entail* id eft; f<zmelta.

Solent Arabes fpinn dorfi dolorc kborontes> hulu& Salmtbi'caulcs no&te fibL iubilerncre.

32. S^ LANTHUS ciJkNDULOS.us^/ofi?/ fgrrato-dentathy *pidiccGis & talycis bafi gtanchilojis.

DESCR. Facics prseccdentis. *Caiths* teretes. *Folia* oppoGta, fefquipollica- xh, ovato-acuta» ferraro-demata, fubfpinofa: lareribus incurva, carnofa, rigida: petiolo femipollcari, fubrus tereti, fu-pra pkno. *Stipule* fub fiiigulo folio deflexse, bnceolata, cavnofo, marginc mcmbranacex. *Grrhi* vcl oppofiti folii, vcl lateraks inter folia oppofira ex geniculo cxeunre *Pedunculi* cymoft. *Flores* alba-viridcs. *Bacca* ovalis, rubra, mollis, edulis. *Pedieelfi* & calycis bafis gknduRs hiipidi: cjuod in priori non: & hujps *Stamina* appreffa Sryla Ne filar mm in 4. lobos divifum ad inferriones fibmentorum.

Simul cum priore iion infrequens. Radices tuberofej vocantur Arab. *Mimic?* crudx guftauv dulces in principio, poltea ardcmcin iu lingua faporem relin^uunt*

13. S/ELANTHUS DI-GITATUS ; *folis ivferioribus pahnatis qnfaatis; Jüperioribus Urnatisi omnibus petiolo communi Jitflentatis.*

FruSus capfula 4-valvis, 4-fulcata, globofa, villofa.

Cum prseedente "habitat, ^cui ialfo adscribirur nomen *TJethak O Ucw* quod huic competit. Folia cofta acida evadunt, febricirantibus utilia,

14. S/ELANTHUS ROTUND SOLIDS[^] *foliis cordate • orbuulatis., Jerrntis.*

DESCR. *Cades* terctes. Geniculorum bafis iincralFara. *Panictkr* oblongx, dichotomic. *Folia* curnofa, incurva> obtuGi, fubrotunda. *FruEtus* drupa. *Semen* unutn.

Surdiid, frequens. Arab. *Hatces Q Q I ^* vel *Halkn.* Folia cofla edulia ? led valde acefcunr. .Nee ftipites* neque radices efculenta:.

15. S^iLANTHUS TEUNATUS; *b/jfir/ tcrnatis, xomplfcatii, ferrato- dent at is,*

DESCR. *Cauler* -fcanaxkntcs, penna anferina xrafflores, *ramofi, terctes, Tuds hyalinis, longinidinalibus, glabris, acticularis. *Artknti* bipoilicares[^] geniculis crassis. *JFoKa* akerna[^]tcitiara'j periak) <commurū nulio; pro* prii ex codem loco exeunt femspollicares > caule enguftiores; fupernc plani, fubtus longitudinsUter fulcati. *FolioJa* fubicqualia, tripollicaria[^] ovato-acuu, bad xordata, gxoHe larrata> xnargiūbus inflcxa, won plana, cratia, rigida, glabra. *Stipufo* ad (ingulam foliolorum rrigonitinae[^] patenri - recurvce, 'ovaro- acutcc-, marrgine jntcriore reiiiorc-, fcimpoHicarcs, glabi[^]e. .^Cirr/H oppofiti. foliis, bifidi, .CIKII ible torū. Flores <non vidi[^] led tota iacies eft *Swlcmti* digitati, prxter firum foliorum.

Prape *Has* in arvis, Arab. *Hanka * & st vcl' Hunitaja *JL5jd** > Folia -cofta edulia.

RORIDULA.

16. 5RORTDULA. *Tetrandra, monogyna\$ foliis ortneulafts, fetofo-ilavalis; fiamiuibus inaquatibus.*

DESCR. *Cavlis* fructicultis -diffufus ^ teres. *Ramufi* virides. Pctioli, folia & cdyc\$ hifyiifetis albidis, apicc capitulo flivo; ut in *Drofera rotundifol.* *Folia* vix remora, 'alicma, pctiolo tercri[^] lamina fubrorunda, patentee periolo breviore, utrinqwe fetis aciculi-formibus bifpidaf nervis tribus profondis. *Peduneali*, axillarcs, petido paub longiopres. filiformes, rufcfeentes, hifpidi, uniflori. *Calyx*; pporiamhium 4- pliyllimi, JanceoUtum, creftum, viridc, hilidara. *Cdrolla* n>onopetala, quadri-partita, flava, lactniis lanccolaris, .pateiuibus, calycc longioribus. 5*-rnina: filament a quatuor filifarnwa, rubia, coroKafefijui longiora, inaequa-lia: primurn longius lccundo: 'hoc duobus reliquies. *Attthen** oblooga:, ftnpllices,

fimpliccs, ereftae> flav<e. *Pifflhim*: *Germen cylindicum*, calyce brevius, rubrum. *Stylus* inverlo fubularus, ruber, ftaminibus longior. *Stigma* (implex, craflum. *Pericarpium*, capfula oblong a, polyfperma. Prope Suds in valle *Mofbceha* verfus fbntem Bfr. Inter exempla perturima, quae chara&cres Claffium Didyna'mie & Tctradynamia; ex Situ *Stamwum* labefaSant, ctiam ha?c planta eft; nihil enim magis fortuitum effe poteft, quam diverfa filamentorum excretfeentia. Fades floris a Didynamia prorfus abludir.

PTERANTHUS.

17. PTERANTHUS. *Monoqt/mai cahjee nnllo; pet alts oppofitis atatis.*

DESCR. *Catties* decumbenes, inrerdum peddles: arriculis pollicanbus: geniculis incravatis: inferne trichoromi; terercs; dein dichoroni, quadragoni carinis quaruoF errulatis, bififi crafrifcult. *Folia*, verticilliua, 5, 7. & plura ina'qualia: maxima pollicaria: linearia, obtufi, craffa, plana, glabra. *Pedunculi* terminales, dichotomi> verticillatim foliari ad genicula. In media cujusvis dichotomise rcepraculum florum fertile: ultima? dichot. receptacula lateralia nbtorta> quorum medium fcfile, pedicellatum* *Receptacula* florum ovau> comprefla, villofa > firiata, ad utrumque marginem tricarimra, apice flottfera: inrus aperta, vacua. *Rons* tetrapetali, inferij in apice receptaculi (efJTICs: unus in medio* ad utrumque latus terni. *JHos medhis*, compreffus cordatus, recepraculo contrarius> vel crucis forma ei oppofitus. *Calyx* nullus. *Petala* 4, villofa, conniventia, periiftentia: duo oppofita exteriora balb inrrorfum excavata, dein furfum dilatata in *atam* verricalcm, duplo longiorcm, ovalem > medio viridem, margine hyalino atbam: apice emarginatam cum hamo curvo. Petala duo reliqua oppofita > interiors minora, lanceolata; quoque germen claudunr intus excavata: dein terminata corniculo compresio > viridi, apice hamo curvo. Corolfae longitudo rccptaculo minor. *Stamina*: *Jilamenta* 4, ad medium petalorum furgentia, erecla, fctiformia, longtrudine cahiratis corolla?> bad connata in vaginam brevem, vix confpicuam. *Jlntherce* parvse; dJdyma?> erefta*, alba?. *Ptfillum*: *Germen* fuperum, globofum, compreflum » filamenris triplo brcvius. *Stylus* filifoimis. *Stigma* bifidum, divergens infra antheras. *Pericarphm* germine enato, albido, ovaro. *Semen* nudum, flore perfiftente cinftum. *Florum* latcrafium m.dius (bfus frugifer, recepraculo parallelus, cordarus » cum flore oppofiro larerali cor inverfum faciens : flori medio fimilis; ran turn unico pctalo exrrorium fpcQanre alato: reliquis tribal lanceohnis: *flos* hermaphrodirus, frugifer. Ad latera florum lar. rudimenta novi fforis & dichoromia?, conice imbrtcata, brevia.

An Terrandria, monogynia, incompleta, inferaj vel *Monadelphias** tetrandria?

In defertis *Kdhirmis* fiorens; inicio Marr,

18. SCE-

SCEURA.

Ig. SCEURA, *Tetrandria, monogynia, monopetafa, in/era, monopernm.*

CHARACTER GENERICUS. *Calyx* > perianth, corolke fere longitudine, urceolaturn, imbricatum, rigidum, perfiftens : lacinis g rigidis» cenvexis, viridibus, tribus infimis brevioribus, rotundis, velut calycem peculiarem confitiri enribus : 5 innerioribus* longioribus, citbeis. *Corolla* infera monopetiila, ampanulata > rigida, limbo quadrifido> patenre> ovato, tubo latera germinis cingente. *Stamina*; *Jilament a* 4> b re via, fififormia, crecta, inferra corolla sub fifulis limbi. *Anthirm* ad apicis larus interius subrotundae, enrnpreffo, didymae > filamcnrorum longirudine. *PifiHtum*: *Gertnen* ovato• oblongum > villofum j bafin tubi corollas implens. *Stylus* germine anguitior, duplo brevior> flavus, latvis, filifbrniis. *Stigmata* 2, curva 1 longirudine ftyli, filifbrmia, obrufa. *Pvri-carpium* nullum. Ad bafin feminis parva *coromth* ex ctFyce perf/tonje ; supremis 5 laciniris fructui incumbencibus; relicuis •, cafyeem fnrmanrtbus urceolatum. *Semen* unicum, magnum > comprelatum, ovaromucron. irum, margifie convexum, romentofum: cute carnofo - cori-icca'; imerne cocylcdouibus duobus, carnofrs> rigidis, verfus cund^m marginem complicatis, uno extrj alterum ; punftarts > reiiifonniWus: ad bal'm plumula cylindrica ; bad hirfutie > alba, longa: corculo bifilio, linearis - lanceolate*, bad hirfuta.

SPECIES. SCEURA MARINA | foliis lanceolatis, integris; floribus fttlvh.

DESCR. *Caulis* fope arboreus» corrice |xvi, oliviceo; inrerdum frutex alitudine fex ulnarum, cradirie brachii. *Rami* brachiratim oppafiti, foliis articulis bipollicaribus, verfus npicem brevioribus*, reretes, quadrangu*kres, geniculis craffioribus. *Folia* ad genicula oppofita: petiolo viridi-flavo, utrinque convexo, lateribus marginaro: lamina lanceolata, integra, acuta, plana, nitida, rigida, viridi. *Peduncuti* terminals, ex ultimis ramorurt axiHis, tomentofi: articulati. *Floret* ieffiles, folitarii, oppofiti; brafllea lanccolata, flava, calyce longtori, *Corolla* fulva: poft florecsentiam nigra > deddua. *Fruftus* viridi - flavefcens, amygdalo immaturo fimilis.

Arab. *Schura*. tfy* Mafcarenibus Germ, fyi Pratea paucis accedit notis; non vero ad perfe&am fimilitudincm.

Frequens in Infulis & litroribus Mart's rubri> denfa crefirir fylva, ur alneta borealis orbis. Frufius non edufis. Lignum in foci uifi& Folia pabulum prarbenr Camelis, a finis, ovibus. Arabes narrarunr> Semen in arborc dehifcere & cotyledones nudos emit cere: quod vix credibik mihi videtur^

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

HELIOTROPIUM.

19. HELIOTROPIUM EUROPIUM.

DESCR. *Folia* vix tomentofa. *Florir* faux non claufa. *Stigma* medio in-
crafatu&n & annulo velut cin&um. *Caulis* fere diffusus.

MOT. Arab. *Kerir** In JEgypto vocatur *Satkrdn* J id eft: *vbris* 5 putant
enim hominem folia hujus plants edenrem vertigine corri|ii#

30. HELTOTROPIUM FRU-rrcosuM. Arab. *Hcifihfe*.

Spica piurinra. *Folia* bifpida.

21. HELIOTROPIUM CHRASSAVICUM.

Folia lincari-knceolata^ glabra.

22. HELIOTROPIUM BACCITERUM^ *caub fruUjeentt, prqflrtfo; foRis ollon-*
*gis, fiijpidift margins reflexis**

DESCR. *Corolla* cubus flavus, caiyce dupio longior^ limbus albus ; faux
nuda. *Stylus* tnctio incratiis & aniuilo lato cimundatus rub ftigmatic,
quod tifidum eft. *Semina* intra baccarn quadriangulacaai, umbonatam.

Loliafa Arab. *Hafihfa**

53. HELIOTROPIUM OVALIFOLIUH; *cattluats decumbentibiis; foliis obnigo-*
4)valibiiif' i inttgris petiolatu. Hadic.

Srylus annulatus. Denres nuBi in faiace.

LITHOSPERMUM.

34. LrrHOSPERMUM HISPII>U>H *tank prvewnbente > fotiis lanceolatis, Jiffiti-*
bus, undato-dtntatis ; fpicis Urmmxxlibus^ JbcundU.

DESGR. *Radix* pereimis, lignofa. *Vaitks* annul, proftrati, pedales, fetis
hifpidi, veiiis apfcem dichotomi, ad bafin ramnlofi. *Folia* alterna ,
polhcaria, ieffilia, lanceolara, Imearia-, righia^ margine tmdulara, dentaw.
Pcdunculi dichotomi, fpicari, caulis & ramorum terminales, ante flarefcen-
riara revoluti. *Floras* fscundi, conferti. *Calyx* hifpidus. *Corolla* alba,
calycc

calyce lowgior, plkara, obtufa. *Germina* 4. *Stylus* conicus. *Stigma* conicum, album, bafi dilatatum; apice bidentatum.

In dcfeitis *Kdkirinis*. An *L. tinctorium*? Scd folia non tomentofi, nee florcs punicei, cfr. *Spec. PI*

2\$. LTTHOSFEUMUM HELIOTROPHHDES; canle proenmiente \$ foliis petivlatls ovaiituts > [ubrrpandis, Jpicis ttiwiualibus & laUvalbut. ,

DESCB.: Priori proxime iiiEnis. Uccrque ftylo incraffato & facie *Htliotropn*> fed huic fauces apcFtL *Caulis* ptG>cumbns> ramis alcernis, hum proioi'ibus. *Folia* pciioto brevi; lamina oval>> obtuft, utrinqus viilos, venis fimplicibus, remotis. *Pedunculh* bipolhcaFes, fpicari> terminals, laterales, kiferti supra axilfam (cmipoll. & indc ad axillam dcurrntcs. *Calyx* hifpidus: noil 5-partitus., uc in aliis Lull, fed qiiinque-dentarus. *Corolla* alba, asumrnara, vix calyce kngior. *Antkera* filiformes. *Clvr-m'ma* 4. *Stylus* flavefeens; medb incraffarus. & vclut Snnulo viridi cinfus. *Stigma* conicum: forte bifidum. *Semma* laevia, obloags.

Kdhirce florens inhio Junii, inter Cucunicres^

26. LITHOSPERMUM ciLiA.TUM;/oi;7x ovato-lanceolatis, tatwnto/is, aaileato- cilicitis^

DESCK. *Corolla* violacea, calycc longior, tuba cylindrica, fauce apcta. *Calyx* \$-partitus, deciduus. *CauUs* aciilcis hifpidus. *Semma* parva, skua, bad calycis circumnata forma cyacbl *Folia* breviflmKh

Ad *Canales Kahirenfes*^

27. LITHOSPERMUM ANGUSTIFOLIUM ; feminisms fawbur; eoroSfs catyce tripl& longwribus;. cauls* diffujb jfoliis lauceolatis+

DESCR. *Radix* perennis, Kgnofa. *Caules* phirim, .5. {pith, diffuff, albo-rufefecmes, undique hifpidi, (etis rigidis, fragilibus, magnis y albis, patentibusj apice parum ramofT. *Folia* erefta, patentia, fuperiora pol-Jicaria, lancolara, fcflilia, alrcrrra, unditjuc fcrrs rigidis hrspida, maxime fubtus ad margijiem. *Pcdimeuli* fpics terminalcs fecunda?: ante ftorfczentiam revokitae,, floribiis alternis, fin;;ulis ad latus e-exterius brxlea folii-formf luffultis., parum remoris. *Calyx* fongitudine unguis, fero-fus. *Corolla* incarnata, calyce triplo longior, tubo fflifornii, villofa, apice inflAfo, limbo patente, viofciceo,, laciniis ovatis> obtufis, rncdio albw: deflorata coroJla caerulea. *Antherw* virefcentes, tres ultra niburo prominenres *Stmina* ovato - acuta y txvi-j.

In dcfeitis *Kdhirinis*. Arab. *Balama* RJIA. CharaQere *Litiojp*. *Pnrp.* tar. led nee repens, nequc latifolium.

28. LTTHOSPERMUM DIGYNUMJ foliis ovatisi margine reflexis, Jiminibus vilhfit.

DESCR. *Frutkulus* pedalis, diffusus: ligno tenaci; unde evanescit, ut ramuli exmortui spinas mentiantur. *Rami* teretes bad keves, medio fructuari, apicem hispidi-tonvemofii. *Folia* alterna, fcfilia, ovaria, laterali marline reflexa, nutantia, villofa, fructuaria, superne profunda venosa, fimbriae iisdem venis valde elongatis. *Stipulae* duse lanceolate, patentes, fructuose, foliola aliquot faeculata in quavis axilla foventes. *Pedulevli* ramorum terminates, conjugati, secundae spicati, aphylli; ante florefcentiam involuci. *Calyx* periflonth. monophyllum, -partitum, Ericum, hispidum, laciniis lacinia-lanceolatis, corolla? dimidio paribus. *Flos* viridis > apice albido-flavus. *Corolla* monop. bafi cylindrica, angusta; superne oblongo-urceolata, terminata laciniis lanceolatis > glabris, supra finguens antheras inflexis. *Filamenta* corollae adnata. *Antherae* sessiles in corolla, faucem totam ciliata. *Germina* 4 in globum connata[^] *Stylus* filiformis. fibramemis brevior. *Stigma* capitatum, bipartitum, bafi callosum, apice villosum: an ergo Digna? *Pericarpium* nullum. *Semina* 4, nuda, intus plana[^] cerasus <rostrata, hirsuta.

In deferris mantofis *K&hirinis** Tarius. Initio Mart, Ixtidime florens, laciniis corollae expandit, patentibus. An Roghfa. *Afr. Nataff U^Oa

ANCHUSA.

29. ANCHUSA HISPIDA; pedumfii axillaribus brevibus | caule ntrorjum hispido | foliis inferioribus petiolatis.

DESCR. Annua; *Caulis* *Kffuso*, spinosus, rambos; villis retroflexis hispido. *Folia* petiolata hispida- *Tirana?* ad florum exorrum, sessiles, ovato-lanceolata; hirsuta - hispidissima, marginem feris longioribus cilicatae. *Calyx* exrus hirsutus. *Flos* violacei, infundibuliformes, vix calyce longiores; fauce clausa 5 fibraribus: lachrymata ovali - obtusa: quo signo differt a *Myosotide*. *Semina* lacvia[#]

In defertis *Kdhiris*.

30. ANCHUSA FLAVAJ taidibus pr&utnbentibus | pedunculis tatalibus decurrentibus ad axillas.

DESCR. *Radix* perennis. *Caulis* profundi, cubitales, reres, ramis axillaribus, fetis rigidis parentibus hispidi. *Folia* lanceolata, hispida, feris tenuis rigidis remote-ciliata, fcfilia, bafi attenuata. *Pedulevli* laterales, folio oppoliti, flos affixi lateri paulo inferius, decurrentes ad axillam in&teriorum: superne leviter incrassati, hilisidi: incerdum breviores 1

ut appareant axillares. *Floret* foliarum. *Calyx* quinquepartitus, hifpidus; dum fruticum cingit, tuberculis muricatus. *Corolla* pallide-flava, tubo cylindrico, limbi laciniis rotundis, obtusis. Faux claula dentibus 5 virecentibus, crenulatis, apice refractis, intar proboscidis mucie. *Anthra** caeruleae. *Semina* comprefla, longitudinaliter rugoso-denrata, ball constricta, erecta.

Akxandrice ad fegentes. Arab. *Sjnbbctja* vel *Dabbiinci*.

31. ANCHUSA SPINOCARPOS; *floribus parvis, albis; fornicibus 5 fnpra an-*
theras.

DESCR. *Caules diffusi, secundarii. Folia* vix pollicaria, linearia, villosa, mollia. *Corolla* lacinia? non emarginata. *Stigma* capitatum. *Semina* ex his muricato-pinoia; usque ad apicem cum rachi coherentia.

Alexandria.

32. ANCHUSA TUBERCULATA; *feminibus tubercutatis.*

DESCR. *Caulis prostratus.* *Folia* lanceolata, hispida, *Spicir foliofa?*. *Corolla* lacinia obtusiflava, non emarginata ex rulcata. *Fornices* 5. *Alexandria.*

CYNOGLOSSUM.

33. CYNOGLOSSUM LANCEOLATUM; *foliis lameolatis, baji attenuatis, pubes-*
centibus, Jiabris; Jlamiibus corolla brevibribus,
Hadi. Arab. *Schenaf.* <~X*Z>

34. CYNOGLOSSUM LINIFOLIUM. Arab. *H&itscheb.* *K*yi>y*>* *Kurmcr.*
Caulis spithamealis. *Flores* c&Tulei, staminibus inclusis,

BORAGO.

- 3S. BORAGO VERRUCOSA; *foliis verrticojs; verrticarum fetis rigidis, jnngentibus.*

DESCR. *Calyx* prismatus. *Anthera* longis fetis terminate. *Semina* extus plana, emarginata, ferrata.

Kdhira. Arab. *Lujj'eq* <J*J vel *Horeig.* ob y^ An *Borago Afric.*

ECHIUM.

- 3^ ECHIUM RUBRUIWJON? *ruSro*; *joliis tulmextlato-fetops.*

Flares pale*rubri, calyx fefquilocores. *Catties* & *Folia* valde muricata tuberculis confertis, albis; *feta* alba, rigida terminatis.

(F)

Alexan-

Alexandria. Arab. *El kahoeli.* الْكَاهُولِيٌّ

Radix & Cortex nirent colorc intenfe rubro, qui cutem pulchre tamque tenaciter tingic, ut non fine difficultatc abluarur, quapropter Cofmdticum prsebet excellens.

37. ECHIUM GRETICUM?

Caules herbacei, furgentes. *Flores* rubro - violacei. Tota plant! valde huiopida.

Prope *Tciccs.* An *Echium cret.* lisefito; vcl idem cum *Echio* in *JEgyp-* to mihi obhto nomine *Kibdet èl ardT*

PRIMULA.

38. PRIMULA VERTICILLATAJ fioribus verticillatis; foliis lanceolato - ovatis , ferratis, petiolatis, fubtus farinojis.

DESCR. *Folia* tantum radicalia, una cum petiolo fere pedalia: petiolo ver* fus bafin latiori , urrinquc alato folio cenrinuato. *Lamina* hnceoKito- ovata, 'ipithamalis 1 bafi integm, dein insqualiter fcrato - dentata, supra viridis, fubtus. farina alba. *Scapus* bipechlis, teres , firinufus, fefqui- pedali (patio a bafi nudns, dcin florifcrus, verticillo uno flores 4, 6^ dcinde umbella terminali florum plurimorum. *BraEtece* sub fingulo floris pedicello, feffiles, firmofiu, in vrcieillo infimo majorcs, lanceolatae, apice ferrate. In Venicillo superiori & in umbella terminali minores, linear-lanceolatae, intcgrae. *Pedicelli* floris filiformes, crctii farinofi, braflea fuffalti. *Calyx* campanulatus, ereftus> j-partitus> ta- ciniis lanceolatis, utrinque farinofus. *Corolla* flava* tubo ftriato, apics " arftato, "fauce pervia: limbis planus: lacinise 5 ovatae, emarginatte.

In monte *Kurma* ad rivulos aquarum. Odor *Primulce veris.*

OPHIORRHIZA.

39. OPHIORRHIZA LANCEOLATAJ foliis lanceolatis.

DESCR. *Catties* nnui, pedales> villofi, brachiati, erefti." *Folia* poll, remota, oppofita, patcnriQima. *Petiolns* brevi, villofus, supra planus,, apice alatus ex continuato folio, cum quo ad bafin connatus. *Lamina* tipollcaris, lanceolacj, Integra, pubefcens, rachi utrinque & venis fubtus villofis. *Pedimculi* ex axillis fuperioribus folitarii, erefto - patenres , mn^uffK 1 villofi, primum fimplices, dein dichotomi, ramulis fquamis filiformibus fuffultis *Stipula* inter folia utrinque 3, filiformes, eretior, breves. *Floras* fcffiles, capitati. *Calyx* bafi urceohrus, apice 5 -fidus; laciinis linear - lanceolatis, ereflisj 'exurioribus duabus latioribu^^ Iongioribus,

gioribus, tribus fuprioribus minoribus. *Corolla* infundibuliformis, iupeca, longa, *Tubui* furfum craffior, pilofus, cinercus, creftus. *Limbus* 5-partirus, patens, laciniis lanceolatis, planis, fubtus villofis, violaceis, fuperne albis, glabris. Faux apertir, intus villofa. *Filamenta* <orollae adnata, fummo apice liberā. *Anther*® lateri exteriorf affixa, erefi:e, lineares, vix ad faucem perringentes, virefcntes. *Gmnē* tubo calycis adnatum, fupernc planum, albidum, annulo' & umbilico notatum. *Stylus* filiformis, tubo corollas minor. *Stigma* duplex, filiforme. *Pericarphim*: calyx perfiftens, tubo adnatus. *Ccpula* bilocu-Jarisi quadrivalvis, polyfperma, fupra plana, umbilico gibbo, brido conniventc. *Semina* parva, compreffa, affxa reccpxaculo globoib in quavis capfula.

In montibus alrioribus *Hcidie** alibique.

- Ufus radicis contra E77rmi, dum contufa applicatur. Aliquot Arabes vocabant cam *Laaja*, B^C^J quod genuinum & per toram regionem iiotiffimum nomen *AriJlolocBce sempervir*. x|u& panacea gentis eft contra morfus ferpentum. An igitur paucis olim innotuit Ophiorrhizx virtus antiroxica; unde idem nomen ob candenTproprieracnj atnbabus plantis impofuerunt? Hodie enim Ophiorrhiza: & nomen & vis, inter nos ram famofa, his in oris plane ignota ell,

IPOMOEAE.

40. IPOMOEAE VALMATA; *foliis patmatis, lobis j - lanceolatis, cxtimis bifidis; pedumiilis dichotomis.* . <

DESCR. *Catilis* volubilis. *Folia* alterna: petiolus longimidine folii, tripollis., **Sttpuk** binsc, foliiformes, palmaricj lobis feptenis infimis bifidis; brevitcr pctiolatac; diametro medii pollicis, & ultra. *Pedwmij* axillires, fpithamales, 1 - 2 - 3 - ^ o " : u A autem ^ ee excrefcum dichotomic ter divifi, relifto femper in dichotomise meijo callo caulinormi, truncato: interdum,. raro tamen, in pedunculum uniflorum excrefcenc. *Bra-Btea*^ feu Squama parva ovato-acuta, cuique pedunculo iubjefta ad Hngulam dichotomiam. Extremi pedunculi uniflori, infra dimidium ntrinque gemmula, velut rudimentum novae dichotomic: impedita forte callo nftdio. *Calyx* 5-phylIus. *Corolla* 2. poll, longa & lata; violacea, opaca. *Tubus* nitidus, cylindricus: bafi coarftatus ugque ad ca-Jycis longitudinc: inde ad limbi oram 5 carinis fubulatis, fubrus canaliculati marginē ehuis, albis. *Stamina* inaxjualia, tubo breviora. *Stigma* album, globo dupli, feffili, ovato, transverlē ftriato.

Jtofetta in hortis fcandens & simul pulchre floribus fuis violaceis illuftrans arundines arboresque altiflimas. Arab. *Sett el hö/ch.* Aliis *dllacL* vel *Ölcea*) commune fcandardium nomen

JTefliqvius hanc pinxit nomine *Convolvnli JEyypfiaci*; '& LINN, eandem non mutavit ftationem. An hsuc: *Ipoitu tuber ofa?*

41# IPOMOEAE VERTICILLATA.

Mores .terni, axillares, non conferti, nee nuaierofi. *Capfuta* 4-locularis, Tota planta villofa.

Mör. Arab. *Shelli* vel *Toraha*.

42. IPOMOEAE BILOBA; *foliis fnbroUmdo-bUobis^ integris.*

Caulis fcandens. *Pedunculi* fub-uniflori.

Ad *Zbtid.* Arab *Sokar.*

43. IPOMOEAE. SCABRA; *caute volubili; floribur axillaribuf folitariis, tccru-kis; joliis ^-lobatis, utrwque Jcabris.*

Calyses fcabro-hirfuri ; brátteis duabus oppofitis , linearibus fuffulti. *Stigma* capitatum ; ergo non *Convolv.* *keder.* cuius faciem fiaiulac.

Hadle. Arab. *Schedjedja.*

44. IPOMOEAE AQUATICA *J foliis cordato - aeutis.*

DESCR. *Caulis* in rivulis repens. *Folia* cordato-acuminata; bafi fubdenrira. *Flores* magni, violacei. *Pedunculi* biflori. ' *Petioli* tripolligar^, folio duplo longiores; interdum xqualcs.

Ad *Zebid,*

45. IPOMOEAE TRIFLORA ; *foliis cordatis, acuminatis, glabris; pednneulis in-flow's.*

DESCR. *Pedunculi* folitarii, axillares, fefquipollicares , medio divisi in trcs pcdiccllos, quorum flores larciales farpe marcefmr. *Folia* intgra, icf(|uipllicana; petiolo vix pollicari. *Corolla* palJide- flava, limbo in-divifo, pollicis cüiam^tro.

Hadie. Arab. *Sotar.* *Ja**> vel *Gafchve.*

CAMPANULA.

46. CAMPANULA EDULIS ; *foliis ovato-acutis, ferratis, fi'ffilibns.*

DESCR. *Caulis* ramofus, hifpidus. *Calyx* fru&us patens, ciliatus , (inibus inter lacinias reflexis, in (lore & fru9:u. *Cqpfafa* obteflac, terminales, pedun-

pedunculate *Flores* pallide- cacrulci, venis violaccis; variant interdum colore albo. *Radix* crafla, fapidaj pueris edulis.

KURM/E dicitur *Chobselokab.* CAŠLJU \hat{A} . HADIÈ Ridm*

MYOSCYAMLJS.

47. HYOSCYAMUS PATORA; *cchnle villofo; fulils petiolatis> ovato-lanceolatis, Jbdentatis Jfioribus fpkatis,*

DESCR. *Radix* perennis. *Caules* furgentes, parte erepta cubitali: leviter villofi, ramofi, angulati. *Folia* infra femispithamati remota*, fed per paria propiora magis magisque, adco ut rami suprcmi fere oppofiti, una cum caule rrichotomi, vel umbella fpicarum trifida flore aborrienre parvo in medio: folia villo(a, petiolo bipollcari, iupra piano: lamina ovato-lanceolata, crafla, venis utrinque elatis; dentibus antrorfum verfis, tribus, fepe nullis, carina obfoleta. *Ptdiinculi* (piece ramorum terminalcs, pedales, fecundne. *Flores* alterni, pedicello breviffimoj bracteis foliis minoribus ovato- acuris, intcgri, breviter pctiobtis. *Calyx* pollicaris, j - dentatus, inxqualis, utrinque leviter villofus. *Corolla* calyce fere fefquilonigior, extrorfum villofr*. flavefcens, interne violacea, inrer dentes infinios alba. *Filamenta* baTipftfa.

In defcrtis K&hmnis arenofis, apricis, copiofe. Arab. *Datura*, ^rj^ aliis Sekardn ^J^X^AI Si pnvis plants hujus a maligna manu propinarur alicui, cum quafi infanum reddit | & nonnifi elapfis aliquot diebus rationis ufum recuperat.

Autocft *Hyofc. albns* LINN, aut illius chal*leri addendum: *Caulis* & *folia* hirfuta; vel *folia* cordato - triangularia> tnultidental, dentibus patentibus, feu perpendiciilarer e margine exeuntibus*

SOLANUM.

48. SOLANUM TERMINALE; *caule inermi frutefcente; foliis ovalibus, acutis; umbellis terminalibus.*

DESCR. *Caules* frutefcentcs, decumbentes, inermes, verrucofi; funimi pubelcentes. Semel caulem vidi apice volubilcm. *Folia* alterna, patentia, pubefcentia. *Petiolas* apicQ levirer alatus. *Lamina* bipollcans, ovato-acuminara, villofa, fubciliata, intgra. *Pednnmli* terminalcs filiformes, apice umbellifcri. *Pedicelli* fubulati, villofi. *Corolla* pawns, alba. *Anthrac* flavsc. SVlpiris dulcamarus.

Temen in niontibus altioribus. Ad *Mochhatn* in umbrbfis.

49. SOLANUM NIGRUM. Arab. *Mefotteha*. «oeLwo *Hadfe*.

Ptlioli apice alati. *Folia* sub-villofa, leviter ciliata; raro hinc inde margine angulata. *Batce* parvse, rubne.

Foliorum recentium iuccus expressus in vulnus ex uftione.

Bulcs a^{*} morbus Arabum Europis ignotus. Vulnus corrodens fine dolore, quo levato, reftat cicatrix » ut ex Variolis. Folia Sol. nigri contusa applicanrur per dies, cerra medela.

50. SOLANUM iEGYPTiAcuM. Duas vidi *VorutaUs*, tamen confantes, ut pro fpecificibus diversis poffint fifti.

a) *FruSiu rnbrv; fotiis glabris, subangulatis.*

Ab hac differt *Solarium FruStn rubro*; foliis subrotundo-ovatis, fsepe angulatis, simul cum caule villosis petiolis non alatis, peduaculis lateribus filiformibus, termiiatis umbella nutanre.

j i. SOLANUM b) *Frn&u nigro j foliis integris, villojijlmh.*

Huic oppofitum: *Solatium FniSiu nigro*; foliis ovato - lanceolatis, glabris, integris, subciliaris, petiolis alatis, pedunculis lateralibus umbella nurant.

Utriusque namen Arab.- *Enab eddib.* id eft: *Ifva lopi.* In cultis hortis tjuie JEgypti paflim." Baccae crudae edules. Maturse Majo & Novembri. In Cephalalgia fironti illinitur Succus expressus foliis; ctiam iuungicur pedibus xgris,

J2, SOLANUM INCANUM.

CauleSi pedunculi, petoli & coda foliorum supra ac infra valid⁵ aculeati. *Calyces* subinermes. *stlores* racernofi, albidi. *liaeca** pulpo, rubrc, «on <oriacea:; magnitudine pifl Ad *Udtfdd* inveni fructuflavum, coriaceiyai, pollicarem.

Djöbla. Arab. *Ennama* a**ij* vel *JEjn elbagar.* y*iJI* ^y*p Ad UAH-FAD: *Erf&n.. c^0/5*

Folia recentia vulneribus imponuntur. In Odontaigia fumus feminum ope fiftulx cabacarise hauritur.

Folia hujus plants & *Phyfal fomniferse* aqua coquuntur, qua lavant hominem vehementi *hypochondria* (ignaris decmoniacismo) laborantem.

53, SOLANUM BAHAMENSIS?

CauTis aculeams, fruticofua. *folia* aculeata, oblonga, dentato-finuata, glabra. *Calyx* glaber. *Corolla* violacea, rcflexa. *Baccce* globofac.

Surtid. Arab. *MeRhami* vel *Homccjih*, kfa&z* UAITAD: *Habak*, حبّك S4. SO-

54. SOLANUM ARMATUM. Arab. *Bockeme* CJ***J vel *Bonkom.* Jtu
Ad Has.

DESCR. Prioris forte varietas: Folia & Corolla ejusdem forma & coloris. *Caules* procumbentes, annm. *Pedunculi* oppofiti, folii racemofii. *jfcn-lei* albi, glabri, recti, patens, femipollicares in caulis, pectiolis rachi & venis foliorum utrinque, in pedunculis & calycibus. *FruEfum* videtur immaturum, icmipoll. diametro, albidis rivulis, oblique-viridibus, iutus carnoium. Flanca horride armata.

- J.J. SOLANUM COAGULANS. ArJ). *Beikaman.* Freqvencs in Temen,

DESCR. *Caiitis* fa:pc aculeatus. *Folia* ovaro - oblonga, obrufa, finuara* ex parte incrassata; fope copta & pectio lo iphiofa. *Calyx* hifpidus. *FniBtus* globulus, nubis magnitudine: bacae immunitae calyce ipinofo testae*, maturaee nuda¹, flavae, coriacea?.

Acini h&i recenti immittuntur, ut tubero coagulet.

56. SOLANUM CORDATUM; *caule* jnticqfo/ub'amleato; *faith* cordate -fubrotwidis, integris, inermilnts.

DESCR. *Folia* femipoU. gtabraj pectio lo paulo longiora. *PeAmcuR* laterales, folitarii; uniflori, femipall. *Corolla* violacea deflexa. *Anthera* a flavar. *Bacca* pulposa, rubra, per magnitudinem,

Arab. *Ha dak..*

- S7« SOLANUM VILLOSUM; *foliif* vittojisy ovalibus, bafi obliquis, marghi? re-pmidis. Surdiid. Arab. *Bockame.* Cr*£A*

ACHYRANTHES.

58. ACHYRANTHES DECUMBENS; *caule* decumbente, paniceo terminalibus, axillaribus*

DESCR *Caules* decumbenti-diffusi, rubentes, angulati, *JRami* eretiliusculi> spithamalcs, anguhti, glabri. *Folia* alterna, remora. *Petiolus* pollicaris, canalicularis. *Lamina* fefquipoilicaris, ovaro - lancolata, Integra, glabra. *Pedunculi* paniculae axillares & terminales, fere bipollicares, conflantes ramulis parvis, alernis paniculatis, in quibus flores conglobati, squamulis bracteatis, albido - membranacei, gibrati. *Neffaria* nulla: sed *Jtlameuta* bafi dilatantur in laminas triangulares, rubras, connatas, ut fit moiudelpha. *Germen* globofo¹ ova turn. *Stylus* filiformis, *Stigma* mujrifidnm, pilosum.

Iq vallis umbrosis. Surditd> Hadie &c. Arab. *Mthat abjad*, Oa& J ^

59. ACHYRANTHES POLYSTACHIA; *fphulis axilhribus conferiis, brevibus, aU bis\ cattle decumbent e.*

DESCR. *Spknp* axillares & terminalcs alrerns. *Flores capirari. Calyx 5-phyllo. Corolla nulla. Stamina rubro-violacca; glandulis, feu punclis nigris inrerjctis.*

Surd' ltd. Arab. Snard. سود

60. ACHYRANTHES PAPPOSA; *foliis altcniiis\ crnjjinfscutis, linearī - cuneatis, obtujis.*

DESCR. *Caulis fruticofus; fpicis axillaribus. Calyx exterior 3-phyllo; inicior 5 - phyllo. Inter calycis exerioris Iacinias & calycem intcriorem est rudimentum in flore exiguum, Cjiod in fructu excrefcit in Floccos duos laneos, Calyce longteres. Germen fubulatum; glandula ad bafin inter fingulas antheras. Semen 1. nudum, calyce claufum. E longinquo fpeciem habet papporum, ob florum fafciculos utrinque lanatos.*

*Zebid. Arab. Scrmiaiin * & * > vel Salaam.*

61. ACHYRANTHES CAPITATAJ *foliis oppojitis^ petiolatis^ ovato - oblongh, capitulir terminalibus, con/erfis* ihetmibus.*

*Surdiid**

62. ACHYRANTHES PANICULATAJ *capituBs hternlibns paniculatis.*

Folia alterna, petiolata. Stipules binse, lunatae. Pedunculi terminates, longiflimi. Filamenta bafi lata.

Mdhdiu Arab. Sliced.

63. ACHYRANTHES ASPERA? *M6r_m* Arab. *Uokkes vcl HSllem fJ^ vcl Mahot.)ey**

DESCR* *Folia ovali-acuta, tripollicaria, integra. NeSlaria palmata intni ftamina. Germen obconicum, viride, annulo rubro, lato. Stipma fimplcx, fubcapicitum. Nondum florbatj tamen Spiculce vel ereftx, vel patentes^ at Spicae frutiferae reflexar, appreffae.*

64. ACHYRANTHES VILLOSA ; *fpicis axillaribus congejlis, villofis, linearibus, albis,joliis ovatis, integris.*

Hadfe. Arab. Schadjaret el athleb. v^Ui^JI ^ x 4

ASCLEPIAS.

65. ASCLEPIAS CQRDATA; *foliis petio/atis, cordatis, renrformibusj taide ramojhy apice volubhi.*

DESCR. *Fratex* cubicalis, valde lafldiens. *Cctiles* diffufi, r.imofi, cincreco-virides, villofi: apice fpithamali ramis ramo circumvolurus fpirj foli obverfa; refto pcfiftenrc; altero cmoricntc. *Folia* infra poll, supra 2. poll, remota, oppolitaj *petioh* rerci, horizonrali; /afni/j/ft'pollictri, cordata, acura, interdum renifonni, obtufa, ilrpe pendula, craffa, vil-lal'o - tomentofa, lobis bafi hnbricatis. Vnse fubrus elatar * *plana*% Sci-pulx nulke. *Pedunculi* axilla canrum altcra per totum caulem, nc dcin terminates, pollicares, bryiores, nudi, villofi, terminari umhella, vcl torymbo fpimlircr contra folet glomcrato> iiibjc̄is aliquot fcjuamulis, *Umbellff* pedicelli crcclo - patents, fempipollcates, bifuci, uniflori. *Calyx* hiriūtus, viridis. *Corolla* livida, feu ferruginco - virefcens, calycc 4-plo longior: ante explicarionem conrorta foli conrraria. *NtSfn-via* nivca, corniformia, verfus bafin gibbo dcpndcnrc, transverfim carinao. *Fru&us*: folliculi bini erctti, ex peduiKulo pendulo, ovato-fubulati> muicari. *Semina* plana_a pappofa.

In defertis *Kāhirinis*. Arab. *Damia* دميا

CC. ASCLEPIAS SPJRALISJ *caule fruticofo; foliis petiolatis, ovali-oblongis; Jloribus fotitariis, ax%Uarihus| pet alts linearibus-, fpiralibus, introrfum .hirjutis.*

DESCR. *Folia* brcvia, obtufa, petiohta, oppoflta, inrerdom ftcellata. *Pediunculi* axillares; vel juxta pctiolum ad latus pofiti; foitarii, uniflori. *Catjx* 5-fidus, linear-lanceolatus. *Corolfo* bafi connivens, dcin parens; pctalis viridi• flavis, lincaribus, cum 'fole fpiralibus, introrfum medio longitudinaliter hirfutię alba. *Stamina* adnata receptaculo. *Neftaria* 5, ovata, ercta, extra ftamina, alba. *Stigma* opcrculatum. *FruStns* folliculus, edulis.-Frutex non lachfeit.

Ad viam inter *Djafia** & *Jlfeueira*, pages *Arabia** ftikis_y inter *Panicnm dichot*, florens medio Fcbr. Arab. *Schuntob*. Semina dufcia, mediamen laudatum contra tormina ventris.

67. ASCLEPIAS RADIANI; *foliis petiohth, cordatis> actitis, w?dulatis, umbel-Us terminalibus; corollcr*limbo ereffio, fpirali.*

DESCR. *Cwlis* annuus, ereftus, fjjithamnlis, villofus, teres: ramofum non vidi. *Folia* brachiatim oppolita, patentia. *Petiolus* tercs, villofus, (Gf) caule

laule angufror. *Lamina* fate cordata, vix pollicaris* acura> marginc kvixer undulata, villofa, obfeure-viridis, venis albidis, fubtus inagis villofa, *Pednnculi* termkialcs, intcrtoHacei, fblitarii, umbelliferi. *Urn-bellce* pedicelli filiformesj fingulae braftea ad bafin parva, linear*, exrus villoilu Cfl/y#[#]ferriigineus>. erctus, 5 - partirus, villofus. *Corolla* tutus fusco- viofcucus, calyce duplo longior, cylindricus, apice inter lacinias limbi quincjuc foveis. *Limit* ladnix tubo. brevioics,. ereftap, bad comprefli , apice fpxalitesr cum fole torrx>. linear- JanceolatJC, glabrcEj cxtus violacea, intas obfcure-fiarvar. *NeSarmm* album, cylindricum, calyce longius: apice denribus 5, lincari -obuifis, pl-anis, horizontalibus, e centro radianibus jccllaru iupra fructificationcm. *Folii-culi* ovati, villoid.

In apricis circa *Beit elfakfh* rarius.

68. ASCLEPIAS APHYLLAJ entile aphjlto% vohJbiliy racemls conjitgcttu + gto* bojis.

DESCR. *Caules* virides, GJrnofi, articufatf, arricuijs fpithain. fcandpntes, volubilcs. *Rami* od genicula oppofitù *Pednnculi* ramulis brcvibus, geminaiis; ad genicula corymbofi. *Floret* pedicellati, confem in corymbum globofmn, albi: nc&arls ut in *AfcL gig**

IB fylvis propc monrcm *MuUidn%* Arab. *Mil&h.* Eaves vefeuuir planta.

69. ASCLEPIAS STIBITAGEAj ctiulibus fruticofif, articulatis, aphjlUs^ diffuff* umbellis ramulorum terminalibus.

DESCR. *Frutex* bicubkafis, ereftardifftrfusr ramofiflimns* *Cavles* obfirure-cacrulc*, farina tenui albelcentc, HOH adha?rcme; nrricnlarij ramofi^ non volubilcs. *Rmni* oppofiti: alter fepe mas?cefci. *Artknli* caulin tripollicares, geniculis coarthwis^ *Peduneuli* raniuli breves, appofiti vel ad genicula, vel ad apiccm cauliura, undkjue florifcri ex apice & foteribus. *PedictUi* in uno ramulo 12, filiformes, patentes, uniflorL *Calyx* 5-partkus, parvus. *Corolla* 5 -partita, pateds, laciñis imrgine rc^ flexis, viridibus, pedicello bcevioribus. *NeStarhm* album: cyathus membranaccus, pentagonusy iota- corollam, ex angulis emittens cornua 5 crafla, alba, incurva, fruftificatione longiora, *Follicvli* 2, tripollicares^ fubulati, bine plani, unifukati, •indc convcxij glabri, virides- *Semina* pappofa, Tota planra laftefcit,

*fame** in fylvis. Aráb. *Rideh* £#?f Summitates caulum crudas edimr paftorcs puerique inftar oleracear: adeoque vsrofimile noa dft, ilipiics cflb itimulantes; quod rectulic •quidam.

70. ASCLEPIAS SETOSA; *foliis margins revolutis.*

* DESCR. *Ca'tlif* creflus. *Folia linear-ia, oppofita, Umbella latcrales, terxiinalcs. Flares vridcs. Folliculi irifiati, fetiferi.*
f/ad'e. Arab. *Su&ia.*; *XAKX** aliis *Dhra&a,* » ^ 3 ^

71 ASCLEPIAS ©JEM-IA., vulgo.; ad Zekld vocata *Bhrceba* an a pdore di- veriä ipecies?

Caul/V valumKs, fcnidens. 'jRijb appofira, cordaro-acuta, *Fottkuli* terctes, fululari, bipolljicares., sub-incurvi, virides, ieris iJexilibus hifpidi.

7^ ASCLEPIAS LA-NIFLORA; /a'lw limari-ianceolatit.

DESCJU i^Afl qppofira, .pbna, .nirida. *Peduncnli* axfflares, 'rteraiies, 'apice umbdiatt. *Corolla* inras hirfuta. *Follicnli* ncciaflftii «equc hiipidij fed ftriati, ftfbrugofi, Valde ^£tefcns.

Bfiblce difla *Kaimkh.* ^ ^ = Succus plantae laftaus, tutyxo mifctur is uEiguentum contra iiabiem.

73. ASCLEPIAS VYSEA; v^tfe volubili* fcandMftt; .corolla tampanutata^ viridi, toriili; petalos Jinearibus*

*Lohajcr** Arab. *Ghafihvc.*

74- ASCLEPIAS CLATOA; fcrfl/* ftnndente; foliis vvato-uumnnitis, oppo'ttit, plants, glaberrimis; umbellis Miterfolmctis ,*&bis.

Taær. An «divcrfa ab Jfcl. Dtmia ?*

STAPELIA.

75-STAPELIA VA«CGATA. Arab, Drdet elketbe, *جذب العصا* ^ا

DESCR. Planw farmcntofa. *Caulis* tercti-quadragonusj fufcus, nebulis al-Ws, carnofis> farinofis. *FoBa* nulla. *Dentmdi* fparfi, patemiftTmi, fubulati, triquetri, flexilcs, breves. 2?flr/w/f paffim breves, truocari, tribus dunriculis niargine coronaci. *Catgx* albo - virefcens, punftis ferrugineis; perianth. infundibuliTorcne^ tubo germea ciogente, apicc arc- (G) a tat*

tato, dein fifTo in lacinias ijuinque fubuhtas, erecto • patentcs, tubi Ion-
gitudine. *Corolla* albida, pututis ferrugincis, in articulo luperiori fr-
quentioribus: lacinix lin.bi totae femigincse, pundis albis. *Corolla* fu-
pera tubulofi, biarrijulata; *articulns inferior calycis* rubo triplo longior,
bad inftaius, apice cylindricua, ingrediens *articiitnm fecwidum* fcfcuilon-
giorem, bafi dilatato-globofum, dein cylindricum, apice diviso in laci-
nias quinque patentes, (ingJlas marline conniventes in tuhum reretem
fubulatum, rcclum. In medio difco floris fuperne elcvatur in hcmi-
fphseriam daufum f-fulciruiri, ex ccnrro filum crefluni breve emit-
tens. *FruStiJicntia* flava: in imo fundo corollae: similis capfuhc apertse
5-tocukri; nurgine exteruoio filis erec̄tis: in centro fibs 5 connaris,
ereftis. In medio cujusvis loculi *glcwdnla*: an anthera? Sub filis me-
diis operculum pianum, fuper ftylos geminos. *Gtrmen* duplex: inferius
cylindricum,. *Stigmata* limplicia, acuta, approximata. *Pericarphm*
folliculus duplex, compreHus, bafi craffior, apice incraflatus, emargi-
natus: viridis, macutis Iongitudinalibus> fulco - ferrugineis.

Sub fruticibus crecit. *Surduſt.*

76* STAPELIA QUADRANGULAR *follhulU JuBulatif, conjngatis.*

DESCR. *Canlif* quadrangulus j nngulis fubdentaris; obfeure viridis, cubitalis,
ramofiis, iateribus femipoUicaribus. *Flores* eonferti, parvi, terminalcs,
{effilcs}, pentandri, digyni? viridi-flavefcentes. *Calyx* 5 -dentatus, per-
fiftens. *Folliculi* bipollares, (Wpe fpithamaks. *Semi?ia* pappofa. *Sue-
cur* non laſteus> fed aqueus.

Surddd. Arab. *Gholef Utlc vcl Gholces^ aut Gholak.*

77. STAPELIA. *Sdk ttghorab. o ^ 3* ساق ا

An hujus generis? Flores noii vidi. *Grnlis* ramofus, irtultum repens;
6 - vel 9 - angulus > tocidelnqAe fulcatus > angulis dentatis/ *Folliculi*
fubuiati.

Non e&ul-nt.i Pcrhibent incoh?, earn port longum tempus revirefcerc,
huknctbta terra v licet plane emortua apparuir,

HERNIARIA.

78. HERNIARIA LENTICOIATA. Arab. *Makr. ^ 1 **

DESCR. *Radix* pcrennis. *Cautes* filiformes, repente^ fcabri, fpithamales, anicu-
hi, articulis-exterioribus gradatim longioribus: geniculis non remotis. *Fo-
lia*

fa ad genicuk oppofira, ovaro - Linceofara > mucronuto tcrminata, contigua; culem quadrifariam imbiicantia. *Stipvfa* inter utrumque folium utrinque bin*, hyaKnx, laiccbrc, magnitudlne folii; irftcrduin in imam latiorem connrtse. *Rannli* ad genicula folirarii, braves > ftoriferi. *Fiores* capitari ad genicula ramulorum, prjeferrim exreriora, (sepe 5, fe/Tiles, dittinfli Iquamis aliquot ftipuh-formibus, intcrdum 8c foKofis caulinis ilmilibus. *Calyx* 5-phyHus, patens, laciiniis apice inrrorfum fornicaris, extus mucronulo infra .apiccm. *Ftlamenta* f erefta anthcrifera: alia 5 patenria, ftcrilia. *Pijlillum* ftylo vix ullo: *Stigmatt* bifido.

In dcfertis circa *Kdhram**

CYNANCHUM-

79. CYNANCHUM PVROTECHNICUM; *caule fruticofv** *mtdo\ pedtmculhjblieriis, axillaribus, tubercntojis\fioribus pedicetlatis, cnpitatis-**

DESCR. *Cauhs* in altos frutcss furgunt; bnchwros* virides, rareres^ gh-bros, articiifjtos> prorfus aphyltos. *Pedunculi* ad balin articuli fere fcm-per fofitarii, inrcrdum bini > tenii-ve> fcmipollicars; cicatriculis ehtis, tubcrculofis > albidisj in apice *Floribnr* capitatis> fubdenis, pcdiceHis filifbrmibus, villofis, flavicantibus. *Perrantfwm* parvum, lùbcimpaularum, 5-fidum, viride. *Corolla* 5-partita, laciiniis lbpra flavis, bafi & fubtus viridibus, lanceohtts, parentibus, margine reftexis. *FruRiJicatto*: globus fufeus in medio, cui extus admra f filamenta & amlte-ne. *NctJarinm* campanubrum» viride, ambit bafin fjlobi hujus, & circa bafin filamentorum dilatatur in cyarhlum. Sub gfoba teguntar *Gntmñci* & *Styli* duo> exrefcenres in duos folficulos teretes, curvos, bafi attenuates

Arab. *March.* Frequens ubique. Medulla hujus fruticis pra fomite ufurpatur ad ignem excipiindum, qui friftione lignorum folidorum excitatur.

Refina vel fucco unguunt *Variolis* laboramem; miro fuccellfu vires rc-ftiruendk Ruftici caulcs recentes mi(Hcant^ ad dentes purgandos.

80. CYNANCHUM ARBOREwi *caule volu6if t corolla rotata.*

Procer aarbor. *Folia* variant in eodem fubjett j ; fappe ovata ^ vel li-neari-lanceolata> vel fub-haftata, *Florex* virides. Non hftcfeir*

Arab. *Kerevua.* Aliis *Kefeh.* *Banjani* vocant ZM//'; & illi foli fruftuni , cdunt coftum; Arabes refpuunr,

CRESSA-

81. CRESSA AH ABIC A } *fotis wato-oblongis, ftflibus, vtthjis; tank frnticojh.*

DESCEU *Cavils fruticulofusji diffusus,, glaber, tress, fili crassiflie, spirhamalis.* *Folia alterna, fefilia, fsmi-unguim remota, ovali-oblonga, obtusa cuni mucronulo, plana, patentia, villofa, femipallicaria.* *Pedwi-cult axillares, filiformes, folitarii, patefiteSj uniBori, longitrdinc folii.* *Calyx 5-pliillus[^] viridis f ovalis lanceolatus , erctilis , corolla triplo brevior.* *Corolla monopetala, campanulata, limbo 5-^entato, explanato, femipoH. diametro.* *Stamina creta j corolla* fundo id*ernu Germeii oblongum.* *Syli 2 filiformes, diycrgcares, ulbi[^] Stigmat* capimta.* *Fru&um non vidi.*

In iocis montofis ad *Taas* fcmel lcflt.

AMML

g2. AMML IKAJUS. Arab. *Chalk. Rofetta.*

DESCIU *Folia trichotomo-Kncaria, ferrarii. Utridelta parva. Invnicrvm virhtrfhlc pinnanmi, mi-hicpic terramofum, rcflixura J garticularz, fimples. Fhn*s ierries, noia radiati SBWIIVM Isavia.*

SALSOLA.

S3« SALSOLA KALT, a) GLABRA.

Varieras adeo confitans & nunifepta, ur confitinaat Tpecim fliverflim. *CcmSs* ncrvis rubris clatis. *Fvlionun* ncrvus fubtus & supra pettuoidus,.

84. SALSOLA KALI, b) HISPIDA ; fetofa ; priori (millima : ^ciwe intermixtt crefcens[^] diverfa tamcn Temper radicc: adcqcjix xvxxr indoles, cauffa di* verfiratis non cii. *Marghies Calycis {Sijft. N.)* fleribus fitintncis vel catfratis competcre, r.cni hermaphroditis putaverimj quuni hoc cbtiner quoquc in reliquis fppciebus Salfola:.

Copiofe in *Natolia* lirtore c rcgione *Tenedos** glabra ilia: tjuae dcinde invenra hifpidx mixta ad krtara *Moris Marmora* inter pagos *Eradiffam* & *MerafU.*

84. SALSOLA KALI, c) HISPID* FOLYGAMA; flotibus fornrab viridibus, her-
«yhrōd», non corona,*: rolkjuis rofcccis, fch p^enubus rubenibus,
majoribus, corona claufis., caftntis, pariter fi-ugi&ris.

\$y. SALSOLA IWNOBRACTBA J/wfrjfcw, diffufaifoliu linearihu, pilot* fe.
etmibus; ealyce feta in fpinam. tvaiifeunte,

DESCR. Tow hirfiira, diffufi, fefquiped. ramofa. CW « terctes, ansukr, bgnofi, viridit-furcefcerHes. F0/0 inferiora majdraj vix polBcjT, K-ncim, alterna, fcffiKa, incrnia, hirfutn. i^/ow ad omneš villas caū. las & ramorum b.nf. ferfifes; &pc Braffu ad lam./unict. non tres ut in pknsque afus jpciebiis. Florcs omncs fermophrodiri- Ce'r» conmvcnte;- Seta infra apicem cujus<juc Jacinie, fibrii dianxiro tangiore, flayft, flex.Fi, pott fforefcentiam excrcfcnte in ^wflw rj^ am. ^?ffH Hbera. j?j/ai- biparirus. Semen uaura, cocWearc, mclusum cafye ftllato, quinque-fpinofb.

•Inter Jkxandrjam St Rojettam art Caftchunt jffffrfwr copibfe & ^ deser-
tis Kdhirinis, floreus iniria Martii Arab» Mhaenhum. f^jz.

In notis potiffTmis difTcr. a- Salfi projtr. LaJBagpi fed fihrol cum ifla
peculiare genus conltituir, hctmdphrodita unibraeata, an|m| f-Jia'
la fece omnea alie fibt polygamxfoliu* tribraacatis.

86. SALSOLA LONGIEOIIA; frutico/a_x projrata, foUh iaermifius , teretibus,
gahru, farinofir.

DJS-SCR. Cdtlft frnticolus, prbffratus; Folia carnofa, finanV, TonKi, rc-
rctr.fubtrigona, oppofira, acuminara; foperne Jcvircr canaliculata firini
fificle deeergibili, cwruleo-viridia. 'Florer feffiks, tribraHcari, confcrti-
plerique faminei, rofacci, limbo, laro, albido-rubente: hermatohrodit*
paoci; fine limbo.

Afiam vidi in eodem loca Bitchier fuirice Tamarifii gallia suffultam
diifuib caulf altitudine 2' uln. floribus ro&ccis fcrriJiffimam. Ad
Salf. vermk. proxime venit, cujus folia crefcendo elon^antur.

87. SALSOLA ARTicuLATA-; euule frnticojo; deaimbente, aphtjh, ramis flor-
feris, articulatis; JoniuJ eppa/kir act apices articuforum.

DESCR. Canlb signofus, procumbnsr ofiyacco-cinereus., reres; Kiarauialis,
propre» vctfigio. atriculorum cinoruonim. Folia nulla. Kami & ra-
muli oppofiti ex apice artkuli cujusdam; vetercs decumbent^: JTiiam.

res virides, floriferi, vix ercfti, articulis £. poll, longis, cylindricis, apice parum iucraflatis > terminttis utrinque opke acuminato lato, brevi, & fi flqrem vcl novum ramum fuftinet, patenic. • Floras oppofiti, feflFles in apice articuloruxn: mq'culi vel hermaph. exaruerunt, in unico Vlo qucm inveni fruticuio, petaJa vifi funt hnceolata, non coronata, rudimenro capfute flavo, coinpreflo. Fcemeinei corolla pcfiftcns, limbo 5-petalo, mcmbranaceo i pallidc rufo, patentc, magno j corona 5-ptiylla 1 pctalis iufidcnrc, lanceolata, Capfulcc latera regcmc, quse com-preH'a, orbiculata, rubra, acuminc nigro ex pidillo bifido arefa^o; inter pellicnlam & femen lucco rubro plena feu baccata Semen verticale viovx peliiculx inclufum, cochleatum, viride. Fcemeinei (lores totos interdum ramulos obregunt, quia plures funt & limbo corolla? am- plo: maſculi inter rdiuos fparfi fine ordine, pauci BraEfed fub fingulo florc utrinque una gluma.»formis, inftar unguis avis, incus cava, ilorfo viridi-carnofo, marginc membranaceo, pellucido, albo. His brafteis fe adjudicat Salib!^: articulis autem ramorum, apicibus binis dt^rnatis, Salicomiam petit.

In arena mobii eveca Pyrmnides, Arab. Tartfr. 

88. SALSOLO MDCRONATA; frutkofa, ramulis mucronatis; foliis fubulatis, inirmibus.

DESCR. *CauEs lignofus, diffufus, cortice pallido, filfuris obfcuris. Rami patentes, mucrone xigido, aibido, lignofo rerminati: junfores virides, floriferi, fpiniformes; fimplices, fcpe geminati, finguli fiipula membranacco, lanceolata, arida. Crcfcntibus ramulis ftipulae decidunt, ramique alterni «vadunr. Fhrts panim axillares, panim ih ramulis vi-ridibus fcffiles, alremi, conCerti, tribraſleari. BraSiut finguli floris 3, giuſifoitnes, virides> margine membranaceo, albo; ovaro• lanceolatcc: exterior convexa, Uterales fere complicate. Calyx membranaceus, vi-ridis, coroliiformis: in plerisque floribus laciuiie lanceolato:, crcfise fine corona, vix longiores braſleis: in quibusdam duplo longiores, unguibus iinearibus, «rcftis, limbo parentc, orbiculato, magno, violiceo, corona ad faucem 5 Iquamis lanceolatis, piftillo apprcfljs In quibusdam plan- tis nulli horum florum videntur, in aliis ad exitum ramulorum copiofi, dum Salicornia in ficco folo crefcir. Unum florem raro exemplo, in ipfo ramulo vidi Utrique flores fruftifcri. jictti, antheras fagitta- tas, ferrugincas ferunt: obtufi tantum filamenta fine anchoris. Hermaph. jlamina 5. Pif ilium bipartitum. Herm. & fceni. femen in cap- fua cochleari. Vidi aliquando folia in ramulis caulis, qui flores fere- bant*

bant millos, fed folia caranfa, fubuhra, oppoffta, bafi connara. Plorcs roficei, anda fiUmenra, fine an heris. *Saljola verm*, fimiisi, ob (lores expanfosj fed liuic ramī ipinu tcmuimci,

Arab. *Sjifik If.wmafih: Le-Cardmtrferpens*] quia decumbir & repi*. *Jllexandrū ad Caraconibas.*; florens exira Scptcmbr. cempeftate aridifima; planta (iccidīma.

89. SALSOLA KERMIS} frvticofai >aphgllaj ramh imrm̄btis; broEfeū farina/avilfīt.

DESCR. *Cautir* fruticofus, Jignofus, procumbens. *Sam* difflufi, cotiferti, alremi i ^villofī. Stipulae & folia nulli. *Ftoves* lēfīles, lateralcs; raro in raiiiis antiquis ; femper in viridibus^ alterni, triliracleati. *Bra&ece* orbitruluo- acuminate, c?nvjcjc^x rigicke, fucaile-ntic, virrdes* farmofo-villofc*, margine racmbranacco, pailido. *Flows* htrmapiūr* plurimi; petalis 5 viridibos, ovaro-acutis, eretJSi fine corona: Aanrinibus 5> fine dntberis; ftyJ-us nullusj iīg-mara 2. Gormen frugiferum, *Floret* f&m. pauciorcs, fins ordine iinnvixti hermaphrodtris; pctalis 5 viridi-bus, iūpra germen oonniventibus.; marina mcnibratiaccA, viokeca] quae simul c(t linibus pcralorum & apices germen tegentes ilint corollx corona. Ea folia qua; bra&ea§ vocavi, Çalycis loco funr, rriphylli.

Alexandriā^ Arab. *CunamrlK AX&s Nadtuva.* ' H<<c species & S. mucronata dd Potygamiain abeuat.

90. SALSOLA IMBRICATA ; frutirqfa, diffitfa^ īermis; ramis villojis; ramulis imbricatis^ hra&tis ebtnfif, nudSs.

DESCR. A prffcedeme diffcrt Ms noxis: *Caulrs* diffus. *Kami* rigid!, to-menfoii *Braftca* nudse, obtufa*, imbricantes *Flares* omncs videnrur effe rofacei, hermaphr. Non-coronari exerimt ftamma. R^faccorum corona convexa, obtufa, limbus albus. Intra corolla: coronam filamenta Si amhera 5 h̄attata?, creQxy flax. *Syllitre* fuffi, pulvrefulehti. Vidi & flores non - coron itos, hermapli. ftamkiibus exferris.

Lokaja in locis ftcrilibus. Ar. *Harm. j»y** Catnelis gratum pabulum.

91. SALSOLA VERMICULATA ?foliis tcrnisy oppojitis, fiortm intlvdwribns.

DESCR. *Cauhs* artkulatus. *Jirthuli* fenuungucm^ lonjji, apicc craffiores. *Filammta* plana, alba. *Anthw&* rubrs. Flores fa»m_t 11011 vidi.

Djidda in *Infula* itibujđad.

92. SALSOLA TETRANBRA* *frnticq/a > ddumbensy inermis} jloribus brachiatin oppofitis; tetrandrh.*

OBI. Quotquot apetui flores nondum explicatos, montrabant tantuin 4 nntherns ; ftylum 1 ; fligma bipartitum. Brazos 3. fucculent aiuple&untur (uigulum fiorem; media, hemifphsrica., obtegit laterales. Folia 6c rami oppofiu -, ilia toui&ntofa.

Alexandria.

SCANDIX.

93. SCANDIX INFEST A J caiiliims feabris; frtfihi fetis tii/pitlo'.

DESCR. *Flores radinti; difci abortivi» Petala non Integra*, fed obcordata. Getminis carim hitpidiv. Genioula non tumidaj. adcoquc differt a Scandice nodofa.*

Alexandria) copiofiflune; Arab Ckellan vel G-azar m*laikr\$ alirs Gazar Jjn it an.*

PHARNAEUM.

54. PHARNAEUM UMBBLLATUM; foliis radicalibus J}ellatis* t caulinis ob- ovatis, .

DKSCR. *Scapi umbclifcri. Florei urabellati. Invohtcra lincaria. Cap/via 3 - locularis. Stylus nullus. Planta pcrexigua, vix supra terram emi- nens 3 nee confpicienda 11U oculo. pyopc acimoro**

Lohajcv in campis, Evigilat poft b. g. a. m, obdormit h, 3, p. m.

55 # PHARNAEUM OCCULTUM; foliis cuneiformi- eblongis.

OBS* Planta adco pufilla, ut ne qtfidem prioris attingere poftit magnitudinem. Difficilis ergo deicriptio: vih eft milli' fine calyces petalis 5 viridibus: ftaminibus 5, totidcinque germinibus & ftylis,

Lohcijos cum praecedentc habitat iir folo argiitacco.

STATICE.

96. STATICE AxILLARIsj caute frutrcov, fotiojb^ panhulis axillaribus dichoto- mis|floribus ere&h, cot/fertis.

DESCR. Planra iplä fine floribus (pcftata firnilfima fcquenti. Catties crctlo- difFufi, fpithamaks, fruticofi, tcrctes, fcjuamari, fcrruginci. Folia con- fcita 1

•fert.1, alreroa, icraiTa, plana.) *trcB.i*, pcrolis vagmantibus, fcnGta ililataws in *fammam* ovalem, ubtuiarrr, uudam, diairum trausverfum Ion-gam. *PedtmcuR* ex fupcrmribes axiliis, primmn [implicos, virides p.; It. fptfrio, dcin omrerrim didhororoi rubefccntes, *ftoribns* confcrris, ffffflibus, furfom v^rfis, *latyte* fcrrugiacoi *corolla* membranacca, alba, radiis |—angulacibosj ferrugieis.

Lohajz.

97, STATIC MONOFETAXA; /O;/V/ *lanceohtis*; rn«/c *dkhofomo*.

DnscR. *Caulis* tores, mulrigcniculatus, dichotonius, bafi inclinatus, d~~cin~~ creQius, bruneus, fpirhainalis: fupcrne non nudufc qua now abir a *Stat*, *Jufjntt*, LINN. ^o/fs Hmilia pratedCHtis: laiiccolaf. 'JPeduttmH tcrminalcs, erotti, fa:pc ennjugari leu bini,, fpicati: *Sph'Jh* Vcflibus, stternis, apprcfTis, enfloois, braclea vftginajit&i ovata, viridi. F/um fipgnli l>*raclea obvolv*<u twembranaccn, evata^ 'cwinata, punicca: inter flores & pcdunculuin afix* minor:s *paha- lioccohxx*, plana?. *Calyx* campanuKuus, membratuccus.} 5-Jcntflrus, violafcens. *Carvlia* violjcea, infniifbulHorniis, 5 - fida ad dimidium, (amen nxmopetala; (qurrd contra characl. geacr.) *Stamina* corolla breviora, *fiijlilla* 5. *Stigmata* ~~tertuofa~~.

Alexandria- in dtifews circa 'CatQCombas. Arab. *Sc<tz* vol ^Zajtn. -Hanc plancam *Sibiricam* {Linn. Sp. PI.) meridionalcm quoquc cfTc, mi* runa videtur; conferant alii deferitionera noftram cutu -*Gmelini*.

\$\$ STATIC! cYUNDRiFoi.v; tank frulkofo* foliofo* ramofo, fefiis rykndri-as-, atttminatk.

DESCR, *Caulis-* fruriculofLis, diffufus, ratnotas, pcdulis, fufcus, inibrknttu *Jqrtatnis* marcidis fuperftiribus poft Tolm dct^fa; litpcriores virdcs imbiicari fqyumi folioruin pcciaribus, IcnccoLiti* cauli itpprcfiis, cum amplecccnribus. Eamm apicttras infida« *Folia* feiilia, ereclj, cyindrica, poliuria, fubeoriacca, (Tcca, flcxiitn, obtufa cum scumiire. *PtduvtuH* ox fu pee mis axjflis, mpoBicares, panicuhti, ramis pcc4^ribus. *Floret* agragati, fdllhs, turium verfi, violacei, parvi«

Mothha iu littoi'e argillacco.

99* STATICE APHY.LLA; *canh ramofo% articulata, undulato, tubercutato) fotuit
nuilis, niji fquamis ad genicula.*

Flores fefliles,, content > erefti, fpicati; omnes in fuperiore parte ramorucn,
Alexandria ad Catacombas copiolc.

CRASSULA.

100. CRASSULA ALBi;/o///> *lance&tath, oppofitis, vaginantibus.*

DESCR. *Caulix fpithamalis^, fimplcx. Folia oppofira, conferra, lanccoiara, Icfqaipollc-aria, vaginantu, plana, viridia, marginc cartilaginco - ciliata, ppillis hyalinis, filiformibus, approximatis, unius feriei, fere perpendicularibus ad folium. Pedwicufas terminalis, (implex bafl, rufefcens, (quamatus dichotomus, aricularus, brafteis binis linearis lanceolatis fub quavrs. dkhatomii. Flores corymboli, pedicellati, albi. Corolla 5-parrira : fquama? vel caDi luiuiaci, flavi 5, ad bafia germinum^ qux %| totidem^ue Jlyli.*

In monribus *Hadir & Boka.*



DE-

DESCRIPTIONES PLANTARUM

CENTURIA TERTIA.

CLASSES V. == XI.

**PENTANDRIA: NOVA GENERA. HEXANTDRIA.
HEPTANDRIA. OCTANDRIA. ENNEANDRRA.
DECANDRIA* DODEGANDRIA.**



CLASSIS V.

PENTANDRIA.

NOVA GENERA.

GERUMA.

1. **G**ERUMA ALBA, *fflonwyynla* *Calyx monopfwllus.. Corolla 5-petala.*
Ptritarpium ^-luculare, diffperm.⁹

Descr. *Calyx:* perianth', i-phylumi planum, inferum, f-dentatum, pectifitens, viride, parvum. *Corolla;* pct.ita \$, lauccol.no truncata, patentia, calyce triplo longiora, alba. *Fumenta* \$, erocio, corolla dimidiata breviora; *Antkree erebbe*, trigonese. *NeEtarivm* »innulus cnfl'us circumgermciui marginc extcriore ftimitia geft^ns. *Gersnen* ^lobofitsR, ncflario valde immcrfum. *Sttflns* filiformis^ parvus. *Stimnata* •;, pnrcntiflima, rubra, -cuneara, apice emarginata. *Pericarphm:* capula iipca ovalis. 4-Joculdrisii (au f-locul.?) 4-val\nis, difpsrma. *Smim OVALIA,* bina in quovis locuio J (altercum fa?pc a'borritum) iiiil^rtj puluae albx, trigone. *Folia* alterna, ovali-oblonga, lufbccrata.

Badū. Arab, Ejerrum. */*

ARNEBIA,

2. ARNEBIA TRASTTGMA. *Jtonngynia** *tnottopetata.*

CHARACTER GEVERJCUS: *Calyx:* perianth, f-parirum, creftnm, lineflre, acutum, perfiftens. *Corolla monopnala:* *Tubns cylindricus:* *Lhnhs* patens, j-fidus, obtufus: faux aprra *JFl.lamc?*, ta 5. *Atttheivr* q longiores, in fancc corollx. du* breviores. *Genriina* 4. *Styhis* filiformis, longitudine tubi. *Stiima* qiuulrifidum. *Pericarpinm* nullum: calyx ercflhs fovebat fenuina nonduni matun. *Sennua A,* extrorfltm piano, verricalia, trianguiaria, mtrorflum convcxa, totn iLabra. Hactiora, & *Stigmatis* radiis diffcit a *Litfwjptrmo*, proxime iimill

"SPECIES.

ferr.1, alrerDi, *craffa*, *plana*, *erecta*, pencils vagmantkis, fcnfim djlatatis ia *iaminam* ovatcm, ubtufam, tiudam, dig. iruin tran<. verfimi Iongam, *Pedmituti* ex fu peri?) rib us axiUis, primum fimpliccs, virides poll. fpaiio, dcin cemfertim diAoTomi rubcfccnrc?; , *jloribiis* confertis, iedili- "bus, foifarn vcrfis, *vatus* forrugineoi *corolla* mcmbraiucca, alKi, rs- diis % - ang\i\mhus, feiru^iiiei*.

Lohajæ.

97. STATICE M ON OPE TAT. A; /O'/;7J- *fanceohtis*; tank *dichotomo*.

DLSCR. *Caulis* tores., mulrigeniculatus, dichoromus, -bafi inclimtus, dc_{in} creflus, bz'neus, fpithatimlis: fupcrne non nudu&: qua nora abir a *Stat*, *Jufjrv.i.* LINN. *Folia* fimilia prrecedeatis[^] laoceobta. 'Peduncu_{lli} tci-minaJcs, crefti, ficpc conjugari icu bini, fpicari : *Sphutis* icflTlibue, nlrernis, apprcflis, tnflois, bra^lea vaginanrc, ovata, viridi. *Fiarn* .{1 egnli *brahea* obvoiuri nictnbil»nacci, ovata, 'cirin.HA, putiiwa: inter floras & pcdunculum alls minorcs *palsa*: Janccoli:tC, plrnsc *Calyx* cam- punul.irua, incembranjccus.) 5-dematus, viohfeens. *Corvlln* vtokeca, in- iundibuiitnmiS) 5 - fida ad dtmidiumi tanisn monopetiiKi: (cjur>d coiti- tia charaft gsner.) *Stamina* corolii breviora, -Pi/Iilia y. *Stigmata* tertuofa,

Alexandriæ in dofottts circa Catacomb as. Arab. Sa¹"/ vel *JZirjtn*, -Hanc plan ram *Sibirkam* (/,*««. *?y, P/,) mcridionalcm quoquc cfTc, mi- rum videtur; «o»feraot alii deferiptitmem noftram cum *Gmelnt*.

98}, STATICE rvi.iNDRirai.iA-; Tf»f *frutkofo**, *foliofo** *ramofo*, *fifirf* *tytin*^{dri-}
tis, *acumlnctik*.

DESCR. *Caulsf* fruricuiofus, diffufus, ratnofus, pcd^Iis, fufcus, imbrican_{is} *Jqnamh* mircidis fuperflicibus poft folia dcl^fa j fuperiorcs virides imbricati fquamis foliorum pcuolaribus, tanceolaris, cuuli iipprcfis, cum ampicclcnribus. *Barun* i npicibus infidant *Folia* fefilia, erecta, cyindiica, pollicLiri;i, fubconacca, (icca, flcxiiin, oibufa cum ccumiyo, *Pc- dunvuH* ex ILiprcmis zxtUis, ripollisMTcs, panicuhri, ranns patwibus. Jf/ofw a^grcgati, frffiks, iuifum verfi, vioUcei, p.uvi.

llochtue ia lictore argillaceo.

ovalis, olitnfa. *NeEtarium cyarhi*- forme, inter iftamina & germcn, annulatum, viride, breve, a gerininc divergns* nvargtne undulatura. *Statrdna ereQa*, corolla breviora. *Germen gJoboftim*. *Stylus brews*. *Stiqma acutum*. *Ptkarpmm^ capfula oblongo - cylindrka*, xrilocularis J monofperma in quo vis loculo,

Arab. *Gat* vel *Eat*. قات

In *Yemen* colitur iisdem Tiortis cum *Coffca*. Stipitibus piantarur. Arabe folia viridia avide cdunt, multum corum vires venditanres, cui copiofius comedcrit, vel to tarn vigilat noſlem: aflicverant quoque pcCtJm ea loca non intrare) ubi ha:c colitur arbor: 6V hominem ramum -*Cathae* in finu geftantcm, ruro poffc inter jnfeclos pefte verfaii. *Guftcus* .tamen foliorum tantam vinutcm indicarc nan videtun

5. CATHA SPINOSA; *foliis vvafif*.

DESCR. *Calyx* 5-demntas. *Fhres* albii, parvi, *Voroffa* ^-petaia. *Neftarinm* annulo craflb ad bafin germinis. *Capfnla* fupera bilocdaris. *Ritia* alterna, ovata, obmfifcnla, fubcrenata, glabra. *Spina** in ramis recentibus xilla: in vecerionibus xillars^ foliarib: *Ptduuucuti* xillars, tdichatoini.

Kurma.

MELHANIA.

B. MELHANIA VELTJTINA. *Moiw^ynia-i pentapetah\ Infra*.

DESCEU *Frutex* bicubiralis, diffufus. *Jiami* juniores tonTenrofi. *Folia* alterna, pctiolo poilicari, tereti, villofo, cinereo, lamina ovato-lanceolata, ferrita-, iitria, ue villofi, molh\ fuUutus venis cLuis valde reticuhra. *Stijmlce* cuique folio binic, filifarmes, crccels-i villoiae, cincrex, *Pedmeuli* axillares, folitarii > teretes, viUofi, cincreci, fopra dimidium divifi in limbellam 4-flomm. *Pedic&IR* pedunculo iimilcs, T)reviorcs> uniflori. *Calyx*: perianth, duplex, perfiftens: *extarhts* triphyHumj fo-Jiola duo oppofitu, rcrtium ad alrcrurn latirs, ovaro-acummata, bad margine reflcxa, caly-cis interioris laciiniis lariora, utrinque vilk)la. fc In* terms pentaphyHum, foliolis lanceolatis, ^pctrorfum viilolis, coiolla? apprcflTs, acqualibus *CyroUa* perali 5, cuneata, rctufa, flava, longitudine-caiycis, patentia campaniformia. *Neffarhnn*. corona circa bafin gemina, cui inferta filanicnta; crnittens ^ Kicrnias, alrcrnas ftaminibus & longiores, patentes, Uncaies, obtufas, corolla brcviorcs, flavis. *Flm lornenta* ^, flava, filiformia jinthetic bnceobt.r, ere&a*, ., filamenti longitudine, fulvae. *Gormen* fuperum, globofo - ovarum, viHofum,- albidurn.

biduip. *Stylus* nnas, filiformis, long, gcrminis, viridis. *Stigmata* ?, ftylo breviora, filiformia, parenriJ. *Pericarpinm*[^] capfula g&bofa, villofa, calycc cin&a, 5 • locularis, s-valvis, tetrafpcrma, angulis dehifcens. *Semina* 4 in quovis loculo, cuneata, pun&ita, punicea.

OBS» Denoininntio a loco habitationis in monte Me I 1; an defumtn tft Gloriant bane & inenioriam eodem jure adtribuendam effe putamus Pntn'x, qua? plantas educat & continuat, ac tribui communiter folet Botanico plancas coligenti_#

DIGERA.

7, DIGERA ARVBNSIS. *Monogynia*. *Calyx* 5 -phyllw% *Corolla* f -petata.

DESC.K. *Caules* perennames, dc cum hen res, terragoni, ilriari, faepe cubitales.

Kami & *Folia* alrerna, *petiolo* femipoH. fubrus elevaro, ftrjdt, luperne canaliculuo > margine ciliato. *Laming* iefquipoll. lanccolata, plana, in-te^{8ra}> glabra, rugofo-venofa, viridis, margine rufescence. *Pednnculi* axilhres, ercfti, fpithamales, bafi bipollicari fpatio nudi , dein fpicati fioribus, leflilibus, alternis. *Calyx*: *perianth*, f-phyllo, inxquale, margine membranaccum, ovato -lanceolatum, patens, concavum, perfiftens: *lacinice* tres exteriore breviorcs: una i'ub flore, dus ad latera: lacinix dua: mayores, oppoftrc ad hucus luperius 'fioris , patentes, vi-rides, margine rufescences: incercum calyci vel corollas adnumerauds ? *Corolla* > petala 3, ovalia, rubra, erefta, in cylindrAn conniventia, calycis Iaciniis breviora, obtufu, purpurca, peilillenria. *NrSfarhim* urrinque unurn, viride, inter calycis laciniam parvam lateralem & corollam: breve, planum, ltbrotundum, npice bilobum, lobis emarginatis. *Fi-lamenla* 5, oppofita rribus petalis & caiycis duabus Iaciniis majoribus, rubra, erefta, filiformia. *Antherw* incubentes, didyma!, rubrap, ultra corollam cminent. *Germen* fuperom, globofum , viride , fuperne planatum. *Stylus* unicus, filiformis, ruber. *Stigma* bidenramm, con-nivens. *Pericarpium*, drupa globofa, utrinquc carinara> tuberculata, apicc bidentata; undique claufa calyce & corolla; pulpa coriacea* viridis. *Semina*; nux globofa, unilocularis, monofperma.

M6r. *Surdûd.* Arab. *Didjar* vel *Budjer*. ↗

GYMNOCARPOS.

8. GYMNOCARPOS DECANDRUSI ; *Jiaminibus* quinque neutris; *monogynum* | *corolla nulla*.

CHARACTER GENERICUS. *Calyx*: perianth, inferum, monophyllum, 5-par-ttum, ball pentagonum, Iaciniis lincaribus, interne coloratis, margine hyalinis, apice patentibus & introrfum fornicatis. mucronatis, perfillen-
(I) tibus.

Corolla nulla. *Filamttita* 5, Ljcinis calycis inferta bafi, membranacca, fubufau. *Antherce* simplicis, Jhcumbentes. Cum his alternant *JHamenta alia* S^r fterilia> futurae laciniarum calycts inferta> breviora, patentia, antheris defimta. *Germen* globofum, villofum. *Stylus* unus, filiformis 1 fubulatus. *Stigma* (Implex, acutuni. *Periearpium* nullum: calyx induratus femen foget. *Semen* unicorn, nudum, ovato- acutum.

SPECIES. *Frutex* pedalis, ramofus, diffusus. *Canter* vetercs lignofi, cinerei: juntores virides, aniculis fcmipoll. gVabris, fub gniculis inCrassaris. *Folia* ad gnicula oppofita, earnofa_a teretia, lincari-rubulpta, patentia, iriucronulo termktata; f^rpe falcicalum minorum foliurum foventia. *Stipula* utrincjuc una fpatium inter folia rcplens, membranacca, rriangularis, brcvis. *Pednnculi* breves, terrnioalcs raiuoriūn omnium, raro axillarcs, florcs in capillum coligernes. *Flōres* TciHics, capitati, extertores brachteolis fubdhris fuffutri. *Cafijx* exrerne viridis, interne v4o-laceus, margine hyalinus. *Antherce* flivae.

In defertis *K&hirwh* orient, Arab. Syrr j**> vel *Djarad*. £/*>> Atiquan-tula e(t charaBeris fimilitudo cum *Herniaria*: verum ftigma non bipartitum, capfula nee adeft, & tota facies aliens.

MJESA.

9, MiESA. *MonBgyma) monopetala, Jhpera.*

CHARACTER GHNERICUS. *Calyx*: perkunh. duplex *Exferins* inftrum, diphyl-ium, mirrimutn, perfUtens, fofiolis oppofiris, hnceoLris. *Inierhts* gcr-mini adnatam, conicum, monophylluin, limbo fupero 5-dcntaro, den*tibus iemi-orbiculatis, corolla brevioribus. *Corolla* monop^tala₅ fu-peraj campanuUta, 5-fidd, faciniis fubrorundis, concavis, parentibus, albis. *NeEtarium* nulhim. *Filamrnta* 5, brcviffrnna, fififorinij, corolla: inierra. Ant her fe ovatx, crccfa?, didynia', filamentis longiorcs, flava:. *Germen* gtobofum, calyci immcrfum. *Stylus* reres, craflis, unus. *Stigma* truncatum. *Periearpium* bacca infers gfobod, unifocuhris, polyfperma, receptaculo corumnari in niecio, exrus bafi lufTulta fcjuavnis perianthii exterioris: coronata apicc periinithii intei'oris fcjuamis apprefjis, unibone in medio nudp> prominulo. *Semina* fubrotunda.

SPECIES. Arbor mediocris ftatura. *Kami* teretes, ftriati, hinc inde ver-rircofi. *Folia* alterna, patentia. *Petiolum* pollicaris, fupra planus ad bañin, canaliculatus apicc. *Lamina* 4 poll, lanceolata, ferrata, glabra. *Stipula** nulfcc. *Peditnculi*, thyrfi axillares, terminales, feu racemi compofiti. *Pedicelli* fuffulti fcjuama parva, lanceolata. *Flares* ajbi> rac<-mofi, *Jiaccas* non vidi maturas.

In

- J« montibus Temen ad Oddein. Arat. Mans, (jyasr[^] Alixs ifr«r. Mnipuh venales arboris Kat hujus Marfe fblis ambiuururj ad moleni •augendam.

HYPERANTHERA.

xo. HYPERANTHERA. *Monodynamia*; *fflonogynia*; *pentapetala*; *pefhlo nn** *majore*, *Juperione*; *Jlaminibus quafoior imitris*; *quinqne antheratii*, *uno iiperiore*.

CHARACTER GUNERICUS. Cfl/yjc periantk. i-phyllum, 5-partkwn, tubo brevifflimO) campanularo, Uciniis 5 coloraris, glabri, ciliatis, cuncatis, obmfis, parcntibus, jphnis. Corolla; petala 5, inequalia, calycis futuris infrra, obru(i, alba, medio violacea: petalum unum majas, superne fitimi, plenum: 4 mi nor a, ualia, vorius Ucus iucmus £ca, marginc bafeos inflcxa, apice cochlea ri-formia. Filament a 5 anherifera, iulatii, furgenia, superiora longiora: duo Icilicet aliis duoUis longicwa: & his iupreminn filamenrum kngius: omnia ball mru^u ville/ia, flavrda# Anthvrce incubentes, fimplices, orbicubt? ibllammta alia 4 fubulata, rdiquis breviora, Hue amheris, akemariria cum iupcrioiibus; (imer par infimum nullum) bad villafa. Germen fubularum-, hexagonuucn, villofum, superum. Stylus infenic atreuiuarus, viilofus, tores, Stigma triuentacum, acutum, facpe connivens. Ptrlearpimm₄ legivmen ipitiw-male, tercs, fexcarinarum 1 articuhrirn incra'ffitum.

SPECIES. Arbor magna. Rami viridcs> cerates, tometitofi. Folia ad ramorum fines propriaqua, pedalia, bipermatj. Rachis communis pcdaiis, arriculis poHice longioribus, exerioribus brcvioribws, pinrs quinluc-jug.is cam jmpari: rudimentum faftoH cochUformCj ptiolarum inner par finguliuTU pinnor fpifhamalcs, extiores Wcviors *, terctes; falicJis 6[^] 8- jugis; inter pzs fingulimi gJanddo. Fbliola oppofita ad rgcnicula rachis, petiolo filiformi, ovata, inrcgra, glabra, p!ana.

In urbe Beitefakih duas vidi arbores hujus generis, fed pcregrinas & incolis ignotasj n quodam folio vocatj Se/ibdn. Coifiam xmulatur ftaminum curvatura, corollfi irregularitacs & leguminc

CADABA.

11. CADABA. *Monogynla*. Cafgx %-phyllns. Corolla qpefala. Germen pedicellattan.

CHARACTER GENIRICDS. Calyx: perianth. 4-phyHum, laciniis ovato-acutis, concavis, patenribus, deciduis. Corolla tctrapetala, bina utcincjuc infita inter laciniam inta-iorcum cajyds & receptaculum. Unguts parcn-(l) Z ^)

tes* filiformes, longitudine calycis: lamina lanceolata, undutjta. Quibusdam petala proriū nulla. *Neffarium* inter rccptaculum & laciniām calycis supcriorem > tubulofum, unguibus corolla: longius, apice lingulatum, planum. *Filammta* 5, inaequalia, fi'iformi, inferta pīfillo supra bafin, tria inferius, duo supra. *Antfarce* ere&ae, lanceolate, acuminate. *Pifilli pedictllus* filiformis, incurvus, ftaminibus longior, elevens *Germ en cylindricum*. *Stylus* nullus. *Stigma* obtufum, villo-fum. *Pericarpium*, capfula pedicellata, cylindrica, unilocularis, bivalvis: valv.ulis po(t dehif^cntiam revolutis. *Semhia* plura, reniformia, pulpa triplicis seriei imbricata.

Species. CADABA ROTUNDIFOLIA; *fotiis orbhutatrs, glabris.*

DBSCR. Arbor grandis. *Folia alterna: petiula* femipolllicarii tercti, bafi & apice craft): *lamina* orbiculata, plana> crafla> glabra, interdnm fubre-panda, spe apice emarginata. *tlores* fine corolla. *NeEiarinm* curvum, bafi Luius, vinde, terminarum linguu ovata, phna, lata, supra fulva, fubtus flava. *Stamina* inferta prope bal'm pediceili germinis. *FriiEfns* pendec ex pedicello polllicari, ipfe bipolticaris, cylindricus, glaber, pen-nx onferinx craftTrie, rorulofus, viridis: vaivutis duabus revolutis port dchifcentiam intus rubris. *Semina* nigra> pulpa rubra> licca.

Lohaja frequens. u Arab; *Kadhab** قطب

12» CADABA FARINOSA ; *folii ovatis, obmgis* farinofis.*

DESCR. *Folia alterna, femipolllicaria*, farinofo - tomenrofa, plana, inregra# obtufa, alterna. *Ptdunculi* raçemi ramorum terminates. *Rami* reccn-tes tomentofo- forinofi. *NeEiarinm* album, parvum, lingua tubo ,angu-itiore revoluta, *Petala* 4, undulata. *Stamina* inferta pedicello germinis infra medium.

Arab. A/at, aliis *Korrak* vcl *Sarah* £/*/* *Ufus antitoxints*: dum rami recentes & minorcs mafticantur; vel putveris forma cduntun

13. CADABA GLANDOLOSA; *ramis, foliis, ealyce, pijlillo glandulofts, villap.*

DESCR. *Folia* femipolllicaria > fcabra> non emarginata > ovali- acuta. *Pedun** culi terminaies, fubramofi. *Capfnla* pedicellate, ovato-oblongae, femi* pollicares> hifpidx fctis clavatis.

Hadie. Arab. *Tannaim,*

PAPULARIA.

14. PAPULARIA CHRYSTALLINA j monogyna\ calyce »M//O; corolla monopetala.

DESCR. *Caules* procumbentes, papulofii, vclut plants chryftallinar; fubarticulati, rcretes. *Folia* oppofita> ovalia, femiunguem longa> craffinfcula, p:itemia, utrinque papulis nitidis chryftallifata; *petiolo* brevi, ball alaro; *jtipulis* membranaceis utrinque adnatis, lancolaris. *Corolla* calycina, monopetala , 5 - fida, viridis, laciniis mucronatis extus infra apicem. *Calyx* nullus, *Anthtrce* didymx, extus rubrs, polline flavo. *Stamina* alternant cum corolla. *Germen* cylindricum, fuperum> iurfuin craffius, fupra excavavarum. *Stylus* unus> filiforniis, brevis*

Ad *Dcihi*.

SUÆDA.

15. SU/EDA BACCATA; foliir teretitms, nitidis> punEtatis; frnftt tatcato.

- DESCRIPT. *Caulis* fruticofis, diiTufus. „ *Folia* ovata> obtufa, femiteretia, confcta> carnola, nirida, punftata> inferiora interdum fubutnra'. *Flores* in alis glomeratis feffiles# *Calyx* carnofus 5 - parricus. *Corolla* nulla. *Stamina* 5. *Pifiilhim* || fed triparritum. *Stigmata* lubulata. *FruEtns* baccatus. *Capula* calyce veftiu> 5<valvis% polyfperma.

Alexandria in campis; florens fine Sept. Arab. *JWulltraL* £\$* Eft *Chenopodiwn JEgypt. Hajfelquifii*. Si petala vel calycis iacinix fex {brent, ad *Bafillam* vemret. Salfuginofa planta> fed in acetariis non uiurpatur. '

16. SU-ffiDA VERA ; foliis fmittretibus, farinofis > von punfiatis ; figmate peltat o.

DESCR. *Stigmata* ante floris explicationem valde cmincntia, rubra, membranacea, 3 vel 4 - fida , fublaciniata. Poftea corolla & ftamina ad canderp fere altitudinem ex<refcunt, & Stigma evadit eapitato- plwum: Temper tamen fubladniarum. *Calyx* 5 - fidus. *Corolla* null;, *Flores* plerumque folitarii; interdum coacervati in axillis. *Folia* Gtrnofa, femiteretia, fupra plana, fubcurva, obtufa; ftrina fubrili, detergibili & ideo viridi - cierulea. *Kami* juvenes violacei: in prsecedenti (baccata) virides; raro fubrufi. *Erutex* diffufus.

17. SILEDA; foSis oblongis; interdum lincaribus> vix polUcaribus.

Arab. *Hommmdm.* pUffic*

18. SUÆDA
*tatis; fti**carnosif, ovatis, subglobosif, farinosif, punc-*

DESCR. *Flos* axilhris, foitarius, feffilis. *fl!^i»rto* rubra .vcl viridia, fu-
buJata, cmineiuia supra florcm nondura explicarum, deinde shuuina
aquantia. *Caulis* firuticofus, diffufus. *Folia* subglubofa, confrra - in-
friora longiora, ovaria, farina subtili cacruclecentia, albo-punftata, 'car-
nola, ftriaiffima. *Succidce- uercc* perfamilisj foliis vero & *fti^oL* ditFerr
A *Sal/ala wrm.* diftinguitiir flare rribus foliis non cinSo. *

Alexandria?) in arvis Jitrcis. Ottobr. initio.

19. SUÆDA FRUTICOSA; *foliis sparif, ternaif, lisiearibus, utninqut conuexis, obtusif.*

DESCR. *Fm̄tex* 3 uln. nitus. *jRiſo* pollicaria, nuda fine farina, fuhfcffili.
flares m mmorurn ulrimor-im medio axillars, feffilcs, capirari. *Peta-*
la, Lu Caiycis fo*Moh* qimique, viridia, patcmia, concava, ftaminibus
oppofica. *Ammlvs* viridis, clarus, inter ftamJna & piftiliunx *Gtrnien*
globoftim. *Stylus* filiformis, geraiinc angufiior, rripllo longior. Ger-
men supra dilatato-planum, c *cu)m* medio tres ttyli fubulat?; nondum.
waturis floribus ultra apicem daufi floris prominentes, patentcs: crc-
<cente flot'c, intra ilkim mrahuntur, & evadunt extfiorefi. *Capula*
parva, mefnbranacea, femen arile circmndans.

Djiddæ. Novctnbr. iwit. Arab. *Dvluk.*

20. SUJEDA^MCWOICA; *caub jrnticofit diffufv, foribus rna/tulerum & rmwc*
Jupra orbnulato\ fcemineis trigynU. **

DESCR. *Alia alterna, Jinearia/obmfa, vix pollicaria, carnofa , honVonuli-*
ter compreffa, patentia, pim&ata, mnrginis linea rtedia viridi-, fine fa-
rina. *Flores* axillars, conferti, feffiks; maſculi & fecm. mixri. *Jtfa-*
fivdi majores; ante explicationem %Ji 'mdli prominotes^ demtim pe-
tala calycina panduntur, & (lamina ? patent. *Gerrnen* filifornic, fila-
mcinis craſTus, brevius, apicc terminatum orbiculo nifimbranaceo, 'albo
c cujs ccntro Styli duo breves, rufefcentes. *Foeminei* flores minores!
%Iis 3; divergentibue, ultra florem claufum eminentibus. Claufos
femper vidi, & calycis *hclnm* velut connatas: nee opus* eft, ut aper-
tantur, quum Jfrifificationis partes exferuntLir ultra florem. (In JEgypti-
aca monoica Maſculomm ftylus fiipenie dilacauir in oAicuIuni, cui in-
iiuent ftigmata 2 nigra, brevb, aborientia.) *Semen* 1. magnum, calvce
tcctum. irutex difFufus, arborefcens, humilis: tato fere amio florals.
Alexandria & Lohaja.* Arab. *AfaL Juu«^*

OBS. ffat ejlplants e qua Arahes Ttmnxvfit HStam A ^ ^ vel Doluk> id eft:
• Sal alkali extrahunt; cijux.. dihta Jhlutionc vsftes favantur* aiitequani
Sapone zimbimntur y-pretiofa Ms in or is merce. Sit paratnr: *Liana* vel
tarboues

*rarBones terrefiri jovea injtdi aecanduntur; rami Afal' remiUr & fo
lioſi imponuntur fenjim, & depajlis primis. Sal fwidum joveoe petit,
unde forma fcorice uigra exeipitnr. Beit eljak/h conflat Rotl i| vet
2. Chomafj. (Rotl *Jl pandas 16. une. Chomafch 75, faeint
1. Imperial,*

21. SU3JDA HORTENSISJ *foUfi Ifnmrihus farinojs; eahjcibus frn&fns erarnojs>
divergentihus| Jtvgmntibtu iriplieibur.*

DESCR. Frurex ultra cubitum diffufiflimus, *Flores* in alts congeftr, feffrles, incompkci. Hcrrnaphrodirarum germirv* vcre frugifcra. An fint flores mere fecminci, nefcio ; in omnibus, quos maturos vidt, anthcrar quaque aderant. *Stigmata* g> bafi parum unira, ante apertos flores prorainentia, A *Siurda vera* diffrrrt, cui ftigma pehatum. B a center magis affinis; nam calyx fruQui lion connafctiar, lēd divei^ir. *Semen* capfula tegirur viridi e continuaro ftyfa orra. *Folia* qprnofo, lincaria> pollicjm, plana fupra*, farina cxrufefcenrc, dctrgibili^ albo-punfl;ita#

In *Kdhhrmh hornis* frcquens*, & in locis ruderatis circa agrosurbis *Tatrs.*
Arab> *MullaL*

.ROCAMMA.

22. ROCAMA: *digyna, catyce mouophijlh_x comiculata; corolla nttta; eapjhfa
2 - lueutariy. 2 -Jperma.*

DrscR. *Caules* annui> proftrari, reretes, fcabri, articulirt, (a?pe cuhitalcs. *Folia* oppofira: petiolo femipollicari^ canaliculato, marginē membramccoy verfus bafin latiore, aniplexicauli, connato ctim petiolo oppoita. *Lamina* poiTicaris, ovafi - oblonga, phntr, otnufa, inregra, glabra, craffi. *Flores* feffiles> axillares, fepteni in capitulū congefci: unus in media feffflis, rcliqui in parvis pcdiceHis nwnnlofis, fcpe binis bmiicis diftitifti virides. *Calyx* perianth, monophyllum, campanulatum, 5-fidum, pcrfiftens, laciniis ovaHbirs, erefta- patentibus^ extrorfum eorninito fubularo, patente, carnofo: fopc una lacinia corniculo rarer. Hoc cornicutom ex media partc lacinarum cxiens calycem reprfefentat conndtnm cum corolla, membranacea. *Corolla* nulla. *Filament* a y> ex receptaculo, calycis hciniis alterna, crekta, fubiifata, corolla brcviora. *Aid'force* creQae, didynxe,, *Germen* fnperum, globofum, compreffuni, fupra plantra, rubrum. *Styli* 2, fubulari, albi, apice divergentes. *Stigmata* acura. *Periearphim*, capfula cal/cc cinfra aineato, tetragona, comprefti, utroqec larerc & fupra canalkulata, bilocularis, difperma, brunea. *SVmina in quovis loculo bina> alrerum Itipra alter urn, fubrotunda* nigra.

Lohajce, Ar. Rokama. &&^

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

TILLANDSIA.

33. TILLANDSIA OECOMBEHS; *foliis ovato-lcmceolatit.*

DESCR. *Caulis decumbens. Folia craffiufcuU, Comtntlinw fimilia, fed longitudirulircr pun&ato-ftriara. Calyx 3- fidus. Corolla 3 - fida. Floret infc:i, violacci. Filamenta valdc villofa; an ergo Touruefortia?*

Ad Taas primatn vidi florentcm.

(6) *foliis lanteofatif, vaginantibus, nternis* ciliatis.*

An varictas, vcl specics diverFa?

PANCRAZIUM.

24. PANCRAZIUM MAXIMUM J *fpatha uuijlor** pttalis patentibus; neEtario pedaR.

DESCR. *Caulis vcl Icapus tercs, glaber. Ne&arium floris cnorms, cum tubo pedale. Pttala ^Iba, ftaminibus iongiora, acuta> patula, alt.non reflcxa; ut in Pantr. Zeyl. Folia non vidi.*

Legit illam & mihi atrulic unicam Dn, NIEBUHR, Socius itineris; propc
7^as.

ALLIUM.

25. ALLIUM DESERTOKUM ; *foliis caulinis Urtibns| antheris fubutatis; urn**
bella capfulifera.

Corolla albo - rufefccns, linea media oblcuriore. Eft e minoribus.

In defertis Kdkiriuis. Arab. Zaitccman. i^jUXxS^;

ASPARAGUS-

26. ASPARAGUS STIPULARISJ *Jlipulis bajii mucronatis > foliis simplicibiis ,*
JubnUxtis , mucronatis|

DESCR/ *Caulis angulatus, diffusus, raiuofus. Rami patenres, angulati. Folia fuhulata> mucronara, anguhtaf patentia< pollicarta, conferta, rigida, foliciriaj raro ternata, mucrone flavo, pellucido, acuco. Stipv Ut*
Tub

fub' alis ramorum foliorumque membranaceo - pallidap, lanceolatx, arplexicauh, aculeo fubrus deorfum fpc&inre, rigido. *filores* campa-nuUi, flayicanres > breviflimc peckmculati, bini vcl terni ad utrumquc larus axillce folii. *liaccce* breviffimo pedunculo, cjerulcac, globofar: baccis juniperinis fimillimic: pifo minores, *jf/p. aphylllo* non convenit fructu, ejut major & tricQCCus; discrepat quoquc foliis non ipinofis» ftipulatis, Ixiro CificicuJatis. (cfr« 'Tmirnef. Itin.)

jflexandtiai inculta habitans, rario.

27. ASPARAGUS RETROFRACTUS.

Folia fafciculata, linearia, acerofa, tenuia. *Spince* ftipularcs, folitariae, dc-flxie; ortas »x ftipulis pendulis, demum induratis in aculeos fragiles.

Hadie. Arab. *Schadjartt emumr.* *r*d^ ^rF^ a' »s* *Uomumer* vel *Henitf ennemr.*

CONVALLARIA.

28. CONVALLARIA RACEMOSA ; *Jcapo racemojb, braBltato.*

DESCR. *Stapiis* fquamatus, racemofus fafciculatira J braftea Janccolata fab quovisfafckulo. *Pedkcli* conferti, pacentes. *Corolla* 6-fida, infra. *Stamina* corullae inferca. *Stylus* longus. *Stigma* capiratam. Flores line calyce & sparha nudi. *Perkarpiu* bacca 1, 2, 3 cocca; coccis monoiperm. pili niagnitudine.

Haak. Arab. *Danaq.*

ALOE.

29. ALOE MACULATAJ vera.

Florcs flavi. *Folia* vix pedalia. *Scapus* Icfquipcdalis, Tora planca folita minor.

Lohajcr. Arab, *Sabbdre.* »y*Ly*

JUtxandria crat foliis non varicgatis. In jEgypto florcs hujus Al« rc pununtur in ardibus rcc*nter exftruftis ad vaporcs mitigandos.

30. ALOE OFFICINAVIS | *faribus rubris, ratemofs, tertti- triquetris.*

DESCR. *Scapus* bicubitali\$, teres, glabet, cincrews, interdum bifidus; corryhibus terminalis, pedalisj braftca membranacca, lanccolata, deflxia (üb flore fingulo. *Floras* rubri, pdicello parvo, cernui, raccmofi, rrcrcto-triquetri: oris laciniis apice reflexis: rrribus interioribus infra apicem conniventibus, & paullo longionbus reliquis. *Folia* extrorfum attenuata;

(K)

fupra

fupra cava, infra convexa; margine aculeis oppofiris, erc&is compref-
fis, 1>revibus; conferraj bafi plana, vaginantia: colore viridi, nebulis
albiS) fubcus rufefcente.

Mōr. Arab. *Sabr.* Si frangantur folia * produnt *putjpam* viridcm > vifci-
do- carnofam , foctore *Aloes focotr. ojjic.* unde hanc plantam exifti-
mo matrgm fucci iltius. *Aloe vera* LINN. *foliis gaudet plantis.*

31. ALOE VARIEGATA. Arab. *Beffil* vcl *BefeliL J^A*a** *Hadie.*

jFb/a linear - lanceolata J margine rctrorfum denraro - fpinofa , maculis albis
fpaffis, bafi vaginantia | interdum conferta, digitum longaj incerduni
anguftiora, pedalia, rctnota, minus maculara. *Caulis* bafi nudus.

32. ALOE PEKDENS. Arab. *Beffil* (JJ&J*!*) vel *Fijl asjar.* y t o l j i *Ibid.*

Folia fubdifticha, digira anguftiora, fcfquipith. ve] pedaliā > vaginancia j re-
mora. *Flores* raccmofi, flavi-. Crcicndo dependet fa?pe c rupibus,
pedunculis ramen furgentibus.

33, ALOE INERMIS ; *foliis inermibus> margine Jlib - cartttagineis.*

Folia carnofa, fcfquipoll. hta, curva, fubtus convexa, viridia: fupra con-
cavj,^ ferrugincicentia, albido - maculata, prorfus incrmia;# linese duæ
longitudinalcs, clevarae, in pagina fuperiori foliorum. Margo folii hya-
.linns, craflus, cartilagineus.

Ad urbem *Taccs.* Arab. *JEblia**. *AAA‡

34. ALOE VACILLANSJ *foliis dentato -fpinofis.*

Folia planiufcula, obfeure viridia, margins rubra, dentato-fpinofa. *Flores*
fubfcffiles, cernui, filamenro brevioreſi flavo rubentes. Crefccndo caú-
dtcein acquirit brachii cradic, ulna? longitudinej tanrx vero debilitatis,
ut levidina vi decumbar, nifi lapidem vel alitim obicein a latcre habcar,
cui inniratur: hinc & llrpc radices agit larcrals. Succus rovens flavi-
cans; ficcus ruber fanguinis inftar. His notis abunde diſcernicur ab
Aloe vera.

. *Kurma.* Arab, *Char char a% t|A-* .

HYPOXIS.

35, HYPOXIS; *floribus vlotaceis.*

DESCR. *Corolla* infera, fxfida. *Gmnēn* depreffum, margine fcx - lobum.
Stylus filiformis. *Stigma* aauum, Flores racemofi, violacci, vclur
totd

tota plants: & nudi. *Ptdicelli* femipollicares, bra&eolis fquami&rmibu* fuffulti. *Caulk* digici longicudine. Folia non vidi.

Ad *Taw k&&*.

H^MANTHUS,

35. H/EMANTHUS COCCINEUS.

DESCR.. *Canlis* ex^vaginis foliorum claufis, albis, violaceo-guttatis. *FoKa* fwfquitpirh. ovali - oblonga > *integra*, ncrvofa, viridiaj rac-his fubrus vio-Licco - gurtata-. *Spcta* nonnifi -dcntata. *Seta* longa: inter pedicellos. *Radix* tubcrofa. Non cdulis.

Badic. Arab. *Homhhmet ellmnafclu* OZAxri %&*x|*a* Al. *Vokettl hanhafch.* وَقِبْضٌ لَّخْشٌ

JUNCUS.

37. JUNCUS SITBULATUS; *fofiif Jubuhitis*; *panimtis termwalibus*; *invohcro* ~~di~~ *pkyllo* fubulato*.

Alexandria. Arab. *Halcen*.

35i. JUNCUS SPINOSUSJ *involucris panicula vnfimee pungentibiis,* superiores fetiferis.*

Arab* *Sammar*.

OF.S. EX hoc Junco sp. conficiuntur *Store** (*topet**), quibus pnvirrenta sdium -obtegunt Orientales, Knhiam .defcruntur ex JEgypto fupen'ore & e SuC-nfi regione tanta copia, ut C oiiiftflntinopolim exporrenrur. *ElygantUCnnx* funt texturae. Una & fufciciens cubiculo *medix* mognirudinis la^pe ^onfl:at<2c. Pifltr. Fncillma confrunniur flrte. ({uodque maxims miror , Narolix cives ipfi neiciunt Juncum eundem in vicinia abundaiuer crefientein, in Archipelago & circa Scambuldaein.

FRA^KENIA.

39. FRANKENIA KEVOLUTA; *caule frutrfcente, dickotomo, Jpit/iamali; foliis Gvntis, rnargine revolutis^ fioribns axittaribus, feJJIHbiis# albido- rufejientibus; Jligmate trlfido.*

Alexandria. Arab. *Nemaffe*. نَمَافِفٌ

RUMEX,

40. RUMEX GLABER; *floribus mafulis fexpetatis; tahjtt millo.*

DESCR. *Jiadlt* annua, fufiformis. *Cauks* plurcs, decumbemes, fpithanw-Jcs, tciercs, glabri, *Folia*, radicalia & caulina; foperiora minora, (RJ 2 maxima,

•maxima petiolo bipolllicari, supra piano bifulcato, lamina pollicari, erasfa, triangulari - ovaca, acuca > fubrepanda > marine fc&bra. *StipuLv membranaceae** vaginantes. *Floret J&minei* exreriores feffiles, majoifes, pyramidales, carinis 6 obtufis, inter quas pun&a impreflā. Apice *Calyx* fecm. termingtur laciniis* 3 exerioribus complicaris, recur vis, mucronatis j & 3 interioribus connivenribus. *Germen* intus triquerrum : *Stylif* 3 plumofis, ditffergentibus. Flores magnirudine fenñnis oryzae. *f lores Mafculi* in medio, peduncukti, pedicellis Sinifloris, (lore 4, C-petato: *piftito* nudo, calyce nullo. Naturali ordine convenic cum Rumice; fed corolla mafculi abludit. Lefflor> cui ad manus eft *Bauhint Prodr.*, determinabit, annon Rumex hie alcerius fit generis.

In desertis *Kñhirinh** Arab, *Sdgarat el agitz*, Aliis *Figl el djeb-beU J  J ^*

41. RUMEX PERSICAROIDES | *floribit kermophroditis, valvutis integris, nudis; foliis oblongo - lanceulatis.*

DESCR. *Caulis* fruticofus, bicubitalis, erefto- diffufus. *Folia* alterna: *petiolo pollicari*» carialiculato: *Lamina* bipolllicari, oblongo - acuta, glabra 1 craffa, incegra *Pedunculi* panicula terminalt ex race mis alternis: pedicelli um* bcllati, terni, uniflori. *Fiorum* petala patenria: (quod contra charact. gen.) *Anther a* non folum didyma?, fed & apice bifida?, ut apparent bince fingulie. *Nefitarium* fquamula alba, palmata; patens, fub fingula junftura petalorum.

In montibus *Hadienfibus*. Arab. *Öthrob.* 

42. ^UMEX COMOSUS; *Jioribns Jpicato - comojis; valvulis dentatis, alter a granifera.*

DESCR. *Flos* deficit tertia parte. *Catycis* fpliola 2 oppofita, ovato - acuminata, convexa. *Corolla* valvula: 2 planse, oppofita?, dentate, interiorc majore. *Stamina* 4: *anthers in* faiice corolla?: *pijilla* 2, patentia. *Stigma* 5 - fidum: fruflificanri granum adnafcitur valvular majori corolla!. *Caulis* procumbens, fefquipolllicaris, tcres, ruber,/implex, infra nudus> supra undique fpicatus floribus breviter pedunculatis, conferris; creftis, dum florent, reflexis fruclu maturo. Spica inter flores emirtit *Folia*, petiolo linear- lanccolato, fubrepando: ex apice (picae coma exit minorum foliorucn, oblongorum.

Vidi florentem & frugiferum menfe Decembr. ad Canalem propc hortum Ibrahim Bey *Kdkirce*.

An *JScryptius* LitfN.? Huic valvula corolla? Thon trifida (Sp. PL & Hort. Ups.), fed 5- & 7- fida & Ros deficiens.

RUMEX

43. RUMKX PICTUS; *fioribus dioiinis*> *monoids*; *valvulis fwmineis iuteqris*,
granijs'eris; *foliis linear ibits*, *pinnatifido-dent at is*.

Flores racemofii; superiores musculi; inferiores fawninei> valvulis albidis> ad marginem venis rubris pulcherrime pi&is.

Rofetta in afcnofis paflim. Arab. *Hem/is*.

COLCHICUM.

44. COLCHICUM MONTANUM.

Flores bipollicares, violacei. *Folia* ambiunt florem nondum explcatum.

Kurmce tantum vidi plantam.



NOVA GENERA.

ADENIA.

4\$. ADENIA, *Monogynia*; *corolla 6-peta?a*. Arab. *Aden.* *t±)d& Hadw.*

CHARACT. GENERICUS. *Calyx, perianth*, langiflimum, tercs, furfum crafflus» bipollicare> limbo 6-fido, ladniis oblongis> albidis j obtufis, recurvis» femipollicaribus. *Corolla* pecala 6> atba, calyci inferra inter hcinias calyji'irus, lineari-lanceolara, curva> calyce breviora. *Nefarium*: iquix 6'lineares, eretix, truncirar, inter cafyeem & quodvis filamenrum fingula, in eorum junfiura. *Filamenta* 6 fittformia, inferta calycis tubo ad bafin, dein parum connata > mox libera, calyce breviora, alba. *Anthera* ereftae> fimplices, lineari-lanceolatae, flavae *Germen* tubo calycis adnatum. *Stylus* oblongo - conicus> breviflimus> flavifcens. *Stigma* craffum> emarginatum.

SPECIES. **ADENIA VKNENATA** ; *foliis palmatis* ; *fioribns Jpicatis*.

DESCR. *Truncus* fcandens, viridis, - brachii craflitie. *Rami* tcretes, flexiles> alterni. *Folia* alterna. *Petiolum* reres^ereQus. *Lamina* peltata, palmata» 5-loba, lobis verfus medium majoribus, ovalibus: foliorum bafi callus feu glandula gibbofa, nigra. *Crrhi* ex ramis lateraliibus. *Pedumuli* ramuli conferti in apice ramorum, breves ramulofi, riidimentis foliorum glandula craffi, petiolata, fubtus bidentara; ad axillam rudifnenti *Flores* 2 vel 3 feffiles: ergo *Spica* compofita vocanda, in qua flores conferti,

Febr. mcnfe fere omnes hujus ipccieiffine fo!Ks & floribus erant, *Vennaiijfimam* perhibcnr, & fopc ex i do lbs in uhus verri, dum tencriorum, ramorum pulvis propinatur in liquore qualicunque, unde corpus intumefcit, *Oud ejj'ym* (*Capparis Jpin.*) amidoti vices minifrat.

SILIQUARIA.

46, SILIQUARIA. *Monogynia. Calyx ^-jphyUus^ Corolla 4-pet. ad latus fnperius.*

CHAR ACT. GEI*ERICUS. *Calyx perianth*, tetraphylkim, foliolis lancicolatis, infinK) latiore, pcrfiftcntibus. *Corolla* 4-pctala, irregularis, infera ca- lyco. Pctala ad htus fuperius pofita, calyce longjora, unguibus filiformibus, lamina ovato- oblonga, obtufa, crQa. *Filamenta* fex, aqua- lia, lbulata, incurva, corolla trcviora. *Anthera?* ovatae, fimplices, ercita*. *Genncn* fuperum, teres, incurvum. *Stylus* filiformis. *Stiqnm* capiratum; poftea germen clongatur ultra flor cig. *Perkarpinm* : filiqua cylindraceo-fubuhua, unilocularis, polylperma^ wtrinque longicudinaliter dehiicens. *Scniina* plurima > globofa, villofa.

SPECIES^ GLANDULOSA ; *flore albo; calyce glaudulofb.*

DESCR. *Radix* fufiformis, forte annua. *Caules* diffusi; ramofi, teretes, cubitiles, virides, Tcabri glandulis fufcis. *Folia* alrerna, ternara, fimplicia, undique glandulis fcabra: pctiolo supra emaliculare, foliolis oblongis, obrulis, imegris, lateralibus brcvioribus. *Pedunculi* terninales ramoriim, mcmofi, foliofi, fpithamales. *PedkelH* folio folirario fufuki, aliis foliis interjeflis, uniflori, *Calyx* viridis, giandulofus. *Corolla* abid-A, venis luteis, apice ferrugineo - nebulofa. *Filamenta* flava *Anther at* ferrugincie *Siliquce* pendulae, fcfquipollicares, virides, glaive dulofe. *Semina* fufca, villis albis, Affiniras magna cam Tetradym- miis filiquofis: fed ftamina oequalia & corolla irregukris> unilateralism


In defertis arenofis, fcciffimis ad *Birket el hadgi* prope Kahiram: florens ac feinina matura ferens medio Maji. Odor plants fortis, naufeofus.



C L A S S I S V J L
H E P T A N D R I A .
LIMEUM

47. LIMEUM HUMILE ; *foliis ovatis.*

DESCR. *Cciuhs* profratri. *Folia* crbiculato-ovalia, mucronata, pcriolata, breviflma, alrerna. *Petiohis-* pcrexiguus, amplexicaulis, *Calyx* vix carinatus. *Corolla* acuta*
Lohajcc.



C L A S S I S VIII
O C T A N D R I A .

AMYRIS-

48* AMYRIS OPOBALSAMUMJ *foliis* ternatis, integfis; pedtinnifis unifloris.*

DJZSGR. Arbor medioeris. *Ritoii* valdc divaricari: *Cortex* Lxvis, cinercusj ruprus odorc & fucco 'opobalfamum prodna. *Folia* alrema, tcnara, *Petiohis* fili&rmis. *Foliola* bafi approximara; medium majus, cbonvnum; latralia ovata; ornnia glabra, plana, inrcgra. *Pediwculi* in ramulis parvis reminalcs, folitaril, vcl plures,^ filiformcs, uniflori. *Cafg.r:* perianth. 1 -phyllum,, caxnpanulacura> inferum, 4-dcñtatum,. periiftcr.s: "denribus brcvibus, corolla? apprcffis *Corolla*, • petala 4, linearia , crcftj, Eonaivenria in prlma quadrangularc, obnifa, jnargine kvircr inflcxia, bafi magis. *NeSarinm*, annulus carnofus inrra, ftamina & germén : introrfum canaliculum circularcm circa germen formans, flavus: extus verruncuT* elevata inter fingula ftamina, *Filamenta* H * inQrtal inter petala & ncQarium, iihformi-fiibulaw, medio incurva, corolla foreviora. *AntMrce* oblonga?, didymse , flavae. *Germen* fuperum, parvutn. *Stt/lnf* breviflimns, anguftus. *Stigm** obtufum, tetragonum. *Piftillum* toruin filamentis brevius. *Pericarpinm*, bacca, ovato-acuca, glabra, futurac 4, an valvac? *pztlp* tenax, vifcida, intus bilocularis, monolpcAia: Hypc 1-locuLuis, vacua, fepc iinira. *Semen* ovato- acutuim, folitaritim. F!ores

res motjoici videntur. In nonnullis anthers vegetae erant, germen viride & tigma angustum: in ciliis anherae mara'dec, varia forma abortientefc, get men fuscum, fulcatum: tigma crassum, hyalinum, tetragomim : fern en nigricans, abortivum: an i'uecus balfami imptdit fructificationctn; nam capful[^] plures crane grandes, timen inanes?

Arbor primum vifa ad hofpiuum *Oude*, non longe ab urbe *Has*. Arab.
Xbufihdm. *Li*^j5 i. e. *perodora*.

49. AMYRIS KATAF; *joliis ternatis, apice ferratis; pedunculis dichotomis.*

DESCR. Arbor ligno aibo. *Kami* incrmos. *Folia*, incertae figune, obtusa vidi, & acuta. *Peduntuli* ad ramorum apices conferri, sparsi, velut coiymbi, terminates ramulorum, filiformes, pollicari spatio (impliccs* incarnati, dicitur dichotomo-ramosi: pcdicellis ex dichoromia ortis majoribus *Floras* vidi tantum niafailos; majores floribus Oprobalfami; exterum similes. *Calyx* dentibus lancularis, longitudine rubi calycis. *Corolla*, petala viridia, apice recurva, acuta; faux patens; inferta tubo calycis. *Neçfarhm* ollum *Filatnenta* planata, attenuata, re&a. *Antkera* inenmbemes. *Pirtillum* liillum: calycis fundus profus vacuus, & cavus sub petalis. *Bate as* in alia arbore vidi globofas, apice umbilico impreiro.

Beit elfakih planrate crant nonnullo arbores. Arab. *Kataf*. <*ijs3' Narrarunt Arabes, arborem hanccjuovis anno menfibus pluviosis (*Charif* diflis) intumescere & prxgnancem evadere *pulvere* rubro, fragrant; quo foeminc regi<nis *Abuarich*[^] ubi copiose invenirur, capita aspergerent lavare folent.

50. AMYRIS KAFAL. JIS

Obs. Maxime int^r fe sunt offnes *Katnf* & *Kafal* ut differentiat specificam determinare vix possum. *Krfcl* est arbor procevior, *liguo* rubro. *Folia* juviorum villoGi, acuta; antiqua: glabi-a, fepe obtusa, *Rnmult* opice parum spinosa. *Bncc** compveffir, utiinque subciliat, apice pundo nigro promisso. Sintne *hx wotx* confitantes, nefcto. Tarn *Beit el fakih* quaffin pridem in Surdum ajtibant Arabes, unom eandemque speciem cfe; junioris aitatis Kataf, provecloris Kafai. Utriisque *Folia* ternata: foliola sefllia, apice ferrata: lateralia minora, ovata, obliqua: medium inajus, pollicata, inverfe- ovatum, bafi angustatuin *Semen* baccor Kafal mabitur cute offea, ut nucem fere «mulctetur, fruchis drupa: *haccn* ovalis, bafi suffuko calye 4-dentata[^] fatribus 4 lineis iongitudinalibus iinpreflis. Utraque odorein spicat fragrantissimum balmum: pulpa bacca viridis, fr vulneretur, balfamuin illuat albiduim.

Lignum Kafal magia coinnioriorum pars est, & ad jfEgyptum tianfreretur, ubi vafl liydropora fittilia boc fuino impntrantur, ut guttum contrahant gemi huic expetitum. Gumini hujus arboris Medicomen purgans est.

Dixi oli; arbores nomine mihi cognitac, ut *Schattjartt el tnurr*. yl^ ^Lf^ i. c. *Arbor myrrh*; Altera *Chadofch** {J*}>& his descriptis similes, ex refe- rentium fide,

PASSE-

PASSERINA.

51. PASSERINA METNAN; *foliis ovatis, incurvis, quadrifariam itnbrisicatis, cauk fomentqfo; Jloribus congeflis, feffilibus, terminalibus.*

Chara&er *Paff. filiformis* fcrc quadrat; fed ex iconē *Burmanni* magna patet diverfitas: ibi florcs axillares, longe pedunculati: huic noftrae feffiles 3 vel 4; in capirulum terminate congefti.

Alexandria: Humilis fruticulus, tamen expanfus. Siccatus ad culinares ufuſ innumeris oneribus in urbctn invehitur. Arab, *Metnān.*

POLYGONUM-

52. POLYGONUM PERSICARIA; *repens, villofa; foliis ovato-lanceolatis; vaginis Jlipularibii Si villofis^ longe eiliatis, caulem totum tegentibux; interdum apite dilatato-patentibus; macula transverfa fitfea in Jngulo folio.*

Alexandria,



NOVA GENERA.

SODADA.

S3, SODADA DECIDUA. *Flos completes. Calyx & Corolla tetraphylta, in-aqualis. Stamina inclinata. Capula pedunculata.*

DESCR. *Frntex diffufus, ramis altemis, fequipoll remotis, patentibus. Ad fingulos ocellos Spitrīb due breves,, patenrcs, fubularx. Gemma in medio inter fpinas nuda. Folia decidua, raro prafenria: feffilia, oblonga. Pednnculi inter fpinas exeuentes, terni, uniflori. Flores rubri. Calyx perianth. 4-phyllum, coloratum, inequale, deciduum: lacinia fuperior maxima, convexa, gibba, comprcfla, fopç latcre Iaccra, flore erumpente*. Lacinie trcs inferiores equales, linearl - lanceolate , patentes, margine vittis ciliare. Corolla terrapetala, inaxjualis, calyce longior! Petala duo fuperiora recondita primum intra laciniam magnam calycis ovata, plana, acuminata. Petala duo inferiora alrernantia cum calycis tribus laciñis minoribus, oblonga, acuta, plana, mai-ginc & fubtus villofa. . Stamina filamenta oflo, filiformia, petalis lou^iora, inclinata, in-equalia, fufco-viridia. Jlntherw flave, fimpliccs, lanceolate, erefle, recurve, Pifiillnm: pedicellus ex receptaculo filiformis, inclinatus, filamentis craffior, longkudinc ftaminum, elevans Germen globofum, qua-*

rl,

driful.

drifulcatum. *Stylus* antheris fcfquilongior, fubulatus. *Stigma* acutum.
FruHns ruber, nuce coryli major.

Ubique per *Yemen*. Arab. *Soddd*. Fruftus adhuc immaturus Benjanis
 cdulis, co&us,

BINECTARIA.

J4# **BINECTARIA.** *monogynia* | *completa*. *Calyx* %-*phylhts*. *Conlla* ^-*pc-tata*. *Nectarium* *duplex*.

DESCK. *Caudex* arborcus, excclfus. *Kami* umbelFati, verruculati, ci-ncrei. *Folia* ad fumniitates ramoruni conferra. *Petiolus* pollicaris, teres, glabcr. *Lamina* ovato - oblonga, tripollcaris, rigida, nirida, obtufa, *Integra*, vcnofa, glabra. *Stipulce* ad suprcma folioLt binar, fquamiformcs; *lancolataE?*, craflsc, ftavefcentes, crefta?, cauli appreflie, decidua?. *Pednnnculi* axilkrcs, folitarii vel terni: fed turn laterales fa?pc abortiunt, filifoimcs, villofi, uniflori. *Calyx* nondum explicatus crat: perianth. 4. phyllum, foliolis ovaro-oblongis, villofis, viridibus. *Corolla*, petala 4, oblonga, concava, obtufa. *NeEtarhun* corolliforme, duplex: alrcrum extra altcrum intra (lamina, utrumque bafi Tub filamentis connatum in rubum brevcm, communem, cylindricum. *Exterius*, ereflum, flavum^ y-pairtitum, laciniis tincaribus, apicc bilobis, lobis bifidis, adhuc lobo alio cuneato, bifido, inlcerto lateri laminarum intiori parum sub fiffura laborum. *Litmus* g-fidum, laciniis g, lanceolatis, conniventibus in conum, pifillum tegentibus. *Filament a* 8, brevia, inferra nc&ario intcriori in fiffuris laciniarum. *Ant hen** filamentis quadruplo longiores, larcere affixa filamenro, erefre, neftario intiori appreifae, fufef. *Germen* sup:rum, conicum, villofum. *Stylus* brevis, filiformis. *Stigtna* acutum.* An fecundatio impeditur Neftario pifillum tegente ? Tamen explicatos Iponte florcs non vidi.

Beitelfah'h unicam vidi hanc arborem ab exteris introdu&am, & 'in pki-ni plantatam; incolis ignotam nomine & patria.

CAIDBEJA.

55, CAIDBEJA ADH/ERENS. *Odtandra* *tetragyna*. *Calyx* *monophyttut*. *Corolla*, fquamis 8; tomentifira.

DESCR. *Radix* Derennis. *Caukr* multi, digitum craffi ad Iwfin, fefquicubitalis, ramofi, diffusi; fctis rieidis, tuberculis ruhris infiftemibus, ut in *Urtica*. -*Folia* alterna, cum periolo pollicaru, fubrotunda, dentatoferrata, undique tuberculato - hifpida, luctus leabcrpm, adhaerentia. *Flores*

conjugati, axilhrrcs, fcfliles per omtrcs -caulis ramulos: *bra&ea* fub quovis flore, femiorbicula, acura* hyalina, alba, ciliara, calyce triplo treviore. *Calyx* monophyllus, inferus* campanularus, ere&us, viridis, 5-fidus, angulis a bad ad fiffuras valde* lariatis, reliqua pane externe fubnudus, Jaciniis, feu denribus lanceolaris, ciliaris. *Flos* velut lana tenacifflma oppletus usque ad limbum calycis: corolla? loco *Squama* 8» ad exortum laciniarum calycis affixa intus, obtufcc, incurvae, virides* *Filamenta* 8 fubulata, singula inrra fquamam coroilinam iivoluta, rufa* incurva. *Anther* a quadratx, flavje, didymae. *Germiua* 4 comprcfl*a ob(ongo-ovara, romenro rcnaci obtcQa. *Styti* 4* longicudinc filanven-ro'rum, rufefcenrcs. *Stigmato* acuta. *Ptricarpium* null urn: *Calyx* fo-vec femina in romenro. *Semina* 4, compred'a, ovaro-acura.

Sn convallibus monrium Caicareorum in defertis *Kdl tiririis* orientalibus ad *CaidJ&eyl* cujus nomen rranflarum in plantain mirae indolis, adhas renrem hamorum ope non iblum vftimentis, verum & corpori cui-cunque glabro; a qua societate non avellirur, nifi difecrpta. Variar, jiore\ lacinih tdycis ferns\ Jtamiuib 10; piftillis 5. Arab. *Lus-faq.* i^JL^i *Hadk* rario, *Hamfched* dicta.

OBS, Ha?c eadem eft pl&nta, quam No/* de LINNÉ dicavit memoi'ix Prof» FORSKAL nomine FORSKALEffii, cognomine *tenaaffima*. Prz(entem Auctoris defcriptionem tarn prope ad Linnxanam accedere; eo magis Jaudondum, quo plantam extrentu difficilem faOks ad ipf? Cotamicorum pcr/picacilli-anus. (Editor.)



CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

VOLUTELLA-

56. VOLETTELLA APHYLLA. *Calyx fexphyllus. Corolla fcxpeta. Pericarpium Dacca; femen uwtm. Radix & folia mitla.*

DESCR. *Caulif* pcrennis, fili crafiitie, parum ftrmtus, villofus, valde volubilis: fine foliis & ramis. *Peduncitli* patenres, laterales, caule craffiores, fpicati. *Radix* nulla. *Calyx* perianth. 6-phyllum, minimum, d?ciduum: laciniee ad bafin cor oik, fubrotundae, ciliatae, plans, corolla? appreffae, tres alternae extcriores craffiores. *Flares* leffiles, alterni, globofi, lenc minores, albi. *Corolla* inxqualis, erefta, calycequadruplo longior, peialis 6: tribus extervis ovalibus, concavis, obtufis, interne e bad cmittentibus corniculum cochlaci - forme capitulo ovato: apice duobus callis elevatis, supra conniventibus. Tria alterna *Intniora* reliquis breviora, anguftiora, lanceolara, utrinque in medio latere unidentata, introrfum verfus apicem duobus callis longitudinalibus. *Filamenta* vix ulla. *Anthera** novem separat;e, fcfliles inter corollam & neftarium? quadragonar, pyrarnidales, corolla'breviores. *Ne&ariim* inter antheras & piitillum, cornicula 3, reft a, minsverfa, fpinulara, interne plana, externe verfus apicem duobus callis longitudinalibus, supra conniventibus, longitudine pctalorum interiorum. *Gmnen* in calycem demerfum, globofum. *Stylus* fubulatus. *Stigma* capitulatum, nigrum. *Ptkarpium* bacca globofa, coronata, apice laciniis calycis tribus remotis, petalis Tex conniventibus; in medio mucro te&us, ex (tylo ortus. Drupa feffilis, rubra, pifi magnitudine. *Semen* nigrum, rugofum, pipfris grano fimile.

Mir a planra; renuidima, tota fere nulla, fine radicc, ramis, foliis; caule capillari J - flojibus vix manifeftis. Arbores fcandit, valde implicatj furgendo fruilem in flore fuperum invertit.

Mar & Hadie non infrequens. Vulgariter difta *Hadeg mōdeq.* Hadienibus *Djdha.* *-*>

Bacca infipida, a pueris editurj pulpa guftu pipcris, fed non acri.

Solent Arabes drupas contufas applicare vulneri, illis difto. *Örük.* (*Fena medin.*?)

C L A S S I S X.
D E C A N D R I A .

BAUHINIA.

57. BAUHINIA INERMIS; *foliis lobis ovalibns> divergentibui; leguminitnif com-*
• preJJiSi tomentqfis, tejlaceh.

DESCR. *Floret non vidi. Legnminct compreffla, Jinearia, digita anguftiorai bipollicaria, reftacea, apice falcata, tomenrofo-velutina, pcdicello pollicari, conjugato in ramorum apice. Folia fubromnda, lobis ovalibus, divergentibus, obtufis, glabris: feta parva inter lobos e rachi continuata. Spinw nullae. Petioti apice incrafliiti.*

Frcquens propc monrcm *UUlhdii* Arab. *Hinn embas* yd *Henn el dagar*, *Ju) J f^js^* aliis *Tummdr jX.*Z* vel *Athbir^* & I

CASSIA.

58- CASSIA LANCEOLATA | *fotioHs 5-jugis> fanceoktis, æqualibus.*

DESCR. *Foliola pollicarla, breviter pctiolata, lanceolata, viridiaj pjaustula ses-*
(ilis> supra bafin pctioli. Pedunculi racemi terminates longi, pallide
flavL Legumina lincaria, villoia, comprefla[^] incurvaj matura non vidi.
Surdnd. Arab. Súna. Etiam circa Mót frquens.

A *Caff, ligujlr. LINN,* differt, quod folia non septemjaga, & extima
 majora inferioribus. Cerciorem mihi fecit quidam, hanc Caffiant
 |-cram effe *Sennam 3!eccei?fem>* cujus folia Kahira venalia huic nottrx
 fimillima vidi, nee ovataj ut vult charaGer *Senna.* Senna Mecca?
 • *Lohajce .in^enibatur foliis S-7-J*&*> Uneari-lanaolatis,* E ter-
 ritorio *Abn arifch* quorannis magna copia Djiddam deporr[^]tur>. quam
 eandem efle njunt Kahirx vulgarcm noini'ne *Sennet Mete.* & in Eu-
 ropa *Senna Alexandriuce.* Arab. L[^].

Caffiarum uetus medicus his in regionibus notifTmus,, *Caffia fijflula*
 contra *Ckoteram* & *Diarrhcram** medicamen prxftantiffimum : fili-
 qui rufa coquitur aqui J. hora temporc. Mrfcetur dcinde *Rlia-*
barbnri ad nigredincm ufti 3j» ^{^o^c} ^{^ccosum} una dofi recir-
 piatui*.

50. CASSIA LIGUSTRINA.

Folia oblonga - viridia & breviora quam in Cassia lane. Glandula ad bafin pectioli. Flares obfeure flavi; pauci subcorymbofi. Legumbria teretia, iubcompreffa.

Ad *Djöblam* frequens.

(Jo. CASSIA TOR A. Arab. *KolkoL* "jxlii vcl *Didjer el akbar*. دجرا لاكبز
Ad *Sardiid*.

Annua. *Glandulce* fcepe inter foliola fuperiora. Foliola utrinque & margine villofa.

61. CASSIA SVNSUBJ *foliis trijnghy obovatis^ ciliatis; exterioribus majoribus.*

DESCR, Diverfane a priore Tora, nefcio. *Folia* mufro majoraj infima pollicaria, extima fcfquipoll. *Glandula* cylindrica, flava, bafi viridi, inter par infimum foliorum; & f_cpc' inter par medium. Inter foliola extrema *fqnamnla* linearis. *Petioli* canaliculati; bafi crafliores, cylindrici. *Stipula* binne, fcmipollicares, lineares, ereftae, ciliat_c A fequenti dñicrr foliis viridioribus, majoribus, ciliis glandulisque.

Afchrek. Frequens prope *Tacts.* Áral). *Swnfub** Ufus plantce nullus,

62, CASSIA. *Jlfrhrek.* <*Ji/te* Ad *JU6r*.

Foliola 4 vel S - juga, ovali - oblonga, glabra, obtusa cum acuminc. *Sitique* plane. Inter finguliu par foliorum fuperne velut papilluli fubulati,

POINGIANA,

63. POINCIANA EIATA. Ad *MeMn.* Arab. *Rattf.* OfSy. *Mfehitlach.* .^ L U ^

DESCR. Arbor bipinnata, incrmis. *Floves* corymbofi, magni, flavi. *Anthera* incubentes. *Calyx* monophyllus, 5 - fidus. *Folia* 7 - juga, *foliola* 15 - juga.

RUTA.

64. RUTA TUDERCULATA \ *foUis Utieari - lameolatis, margine involutis; cauibus foliis fvMus capfidisque tuberculatis.*

DESCR. *Radix* videtur pcrennis. *Catties* diffusi, furgentes, pedales, ifterdum rubri, interdum virides, puntis elevatis fcabri. *Folia* viridia vcl rubra, alterna, fefilia, pollicaria, lancolata, bafi anguftata, marginata, supra pun^ata, pilosa, plana, fubtus tuberculata. *Rami* nxillares. *Peduncidi* terminates, dichotomi, parce ramofi, floribus in dkhotomia fefilibus, reliquis pedicellis ramulorum terminalibus. *Pe-*_m *tala*

tola flava, eoncava, undulata. *Germen* tuberculatum. *Capula* 5. *fida*, 5-locuhris, tuberculatt) i'rpe dilpenru in quovis locula.

In deferris *Kdhhrim̄s*. Arab. *Maddjennina*. ***3F* Odor fuavis, fortis velut Rutaे horr. Plants a^جua bene contufae fucoo caput lavant fccminae JEgypt, ut criiies crfscanr^y quos longos amant.

ZYGOPHYLLUM.

65. ZYGOPHYLLUM PROLIFERUM; *capfulis baccatis, glofrofo- qumqnanngtarh busl foliis proliferif, carnojis y tomentqfis; cattle procumbente,*

DJESCR. *Caiilis* fruticofus, diffuso - procumbens, articulatus, villofus* cincrus, ad genicula parum incraflatus. *Rami* juniores virides^ romenrofi. *Folia* ad getiicula ramorum oppofita, lcfilia, 3-articulata, prolifera> articulis carnofis, viridibus> tomcnrofis, primo cylindrico, in cujus apicc duo reliqui ovati, crafflores infima. *Flores* axillares, folitarii> pedunculo breviflmo. . *Calyx* tamentofu9, brufco• viohceus: foliola 2 extima non nurginara*, tertium ad larus rectum, quartum & quintum toroambitu marginata, margine membranacco, albo. *Petala* alba, rufesceni*, acuminata, . *Stamina* 10, baīl fquaniis adnara ncftariferis. *Capula* cxtus. pulpofa, globofo-obtufa-. y-angularis, y-bci?hris, difperma. In rranfcurfu afpetta diverfa videtur a congeneribus, propius tamcn obfervata miram monfrat convenientiam: nam folioruni primus nrriculus perioli loco eft, ejui in ipeciebus cttcris folia fcrt geminata; hie vero duos arriculos.

Fruticulus hie *Alexandria* id falinas vulgatiflminus, ramen ab aliis pergrinantibus Botatiicis non determinants, pari cui multe aliis ^gypti plantis fato# *Ardb.Hmfida*. al. *Hcnid.* حصن

66. ZYGOPHYLLUM DESERTORUMJ *cap/Mb baacith, cylindricis, foliis proliferis; caule diffuso, glabro.*

DESCR. Siinillinum prarcedenci. Differt: *Cante* diffuso, fuberefto, fa?pc ad altirudinem fcfquipedalcm: articulis majoibus ffcnjipollciribus. Caulis & folia glaberrma. Folioruni duo articuli terminates congregati non ovati, fed cylindrici. Horis longitudine pedunculi. *Capjh/v cylindri ca.*

Copiofe in vallibus ficciffimis defcrti inter *Kdhiram* & *Suds*. Arab, *Rot-trajt.* ^?jkf Plantam faftidiunt oimnia pccora, & ipfc Camclus*

- 67. ZYGOPHYLLUM PORTULACOIDHS; foliis carno/is, glabris| Jlore unico pedicellate* in dichotomia.**

DESCR. *Caulis* dichotomus, profratus. *Folia* tricoria, Gppositæ sub-punctatae.
Flores flavi. *Petalorum* unguis longi; *Jacinse* subrotundæ. Ad basim
 cujusvis *Staminis* utrinque ell. *alicula* membranacea.

Planta omnium vulgatissima in deferto fuscissima. Arab. *Garmal* < *J*ja*
Maculas oculorum tolli putant Arabes, si folia hujus Zygoph, recentia. aqua contusa, oculis applicantur.

FAGONIA.

- 6%, FAGONIA ARABICA.** Arab. *Schoki.* Ad *Mör.*

DESCR. *Petala* calyci non inferca, necque cordata, fed receptaculo infertaj violacea, unguiculara, oblonga, emarginata. *Foliola* linearia, acuta, plana, craflulcula, fubvillofa. *Spince* verticillatar, quaterns, foliis longiores. *Stamina* 10, bail non appendicularia.

- 69. FAGONIA scABRAj/o/// ternatis, oppofitis, Jcabrif.**

DESCR. *Stipula* 4 verticillatae, teretcs, mucronatje. *Calyx* j - phyllus.
Corolla 5-petala, viobcea. *Capfula* 5-angulata, villofa,

Kdhira in delerris. Arab. *Djamdcv.* جمدق

TRIBULUS.

70. TRIBULUS PENTANDRUS; *foliis fub-f-jugif i vix aqiialibus j Jlaminibus quinque,*

Kâhira. Arab. *Gatba.* Pecora non refpuunt hoc pabulum.

OBS. Planta deficient Si ftamina in cliquo flore oderant ultra 5; eorum vice deficiebat unum alterumque ex petalis, quac communiter want 5. *Stigma corenatum carinis* 5. *Semitia bicornia*. *Caulis proflatus*.

(3) *Lohajce* reperta varictas; *floribus parvis > flouts % hexandris, flaminibus 5-8; foliis feept 6-jugis,* ' •

Aral). *Kótaba.*

SILENE.

71. SILENE VILLOSA; *petalis bifidis, oblongis% bafi fnb germrne in tubnm connatis.*

DESCR. *Caulis* pedalis, diffusus, oppofite-ramofus, foliosus, totus villofus, teres. *Folia* lanceolata, fefilia, digitum transverfum longa. *Pedunculus* axillares,

axillarcs, folitarii, longitudine calycis. *Calyx* inferior! medio arftiore, ibique petala intus conneftuntur in tubum *Corolla* violacea, calyce longior, limbi laciniis bifidis, oblongis, obtufis. Quum flos parum marcefcat, petala involvuntur. *Capula* in medio calycis incipit, & inde pcculiari modo supra fundum calycis elevatur. A *Ceraftoide* suo simili differt floribus pedunculads.

Prope *Pyramids** *Gizenfes* ad agrorum margins florens fine Januar.

Colorem & faciem e longinquo habet *Bellidis annua* in Germania ubique obviae.

72. SILENE SUCCULENTAJ *floribus axillarilms folitariis.. prdunctatis; petalis bifidis•; foliis carnofis* ovalibus, villojis, jefliibus j Jubvijcidis, confcrtis, patentijjimis**

Alexandria ad Catacombas. Vernalis,

COTYLEDON.

73. COTYLEDON DEFICIENSJ *foliis rotundis^ fubcrenatis) Jtamm̄thus tetradynamiiis,*

DESCR. *Caules* furgentes, cubitales. *Folia* oppofita, inferiora rotunda, petiolata, obfolcte crenata: fuperiora fedilia, obovara; omnia fucculenra, concava, cochleari • formia. *Pedunculi* oppofiri, brachiiri, ex fuperioribus alis tripollares: terminati racemis binis cum flosculo feTili in medio. *Flores* in racemis alterni; brafteola filiformi, rarifime fub flor, fed pedicello ejus oppofita. In omnibus partibus fru&tificationis deed quinta pars, ut in *Cotyl, laciniata*. *Stamina* 4 longiora: 4 breviora, longitudine piftillorum. *Squama* neftarifera 4 filiformes, inter germina & corollam, velut filamenta totidem fterilia. Similis *Cot Orbicidatce-i* foliis autcm crenatis differt.

Colitur in hortis JEgypti nomine *Vndni*> i. e. *Aurimlce* florens tot© menfe Febr. & Mart. Eadem indigena in monte *Melhdn*, ibique nominata *Odejn*.

74. COTYLEDON LANCEOLATA J *fotts Janceotatis, fe/JHibns , fubearinatis , apice ferratis, carnojis.*

DHSCR. *Pedunculi* axillarcs, tripollares, apice corymbofi. *Mores* 4-fidi, flavo-rubentes. Quinta pars fru&tificationis deficit. *Planta* villofa.

Kitrmcc. Arab. *Homedet er robah.* حميدة الرباح

NEURADA.

7J_# NEURADA PROCUMBENS, Arab. *Saaddn.* ^ j̄w̄w̄

DESCR. *CauBs* videtur fruticofus, prostratus. *Calyx* non j-fidus, fed multipliciter imbricatus. *Folia* tomentos. *Fntlfn̄s* orbicularis, aculeatus, subtus laevis, tomentosus. *Radix* perforat frumentum integrum in medio, & totus orbiculus refat, ut annulus in radice > sub planta,

Alexandria. Novembr. inicio.



NOVA GENERA.

CADIA-

76. CADIA. *Monogynia. Corolla pentapetala.- Legumen pohjperm̄mn.*

DESCR. *Fores* violacei-rubri, regulares, penduli. *Petabrum* numerus regularis, quinarius; *Jlaminum* denarius. *Variat;* interdum petala 6 vel 7: & pro quovis petalo superfluo, flamen superfluum, qua: facie iz vel 14. *Filamenta* a bafi introrfa gibba. *Piftihim* flexum ad latus. *Legumen* lineare, corniculum, racembranaceum, polyfpermum. *Glandula* ad antheras nulla.

Hadte. Arab. *Kadi, u*S*

Folia recentia, corpori fortiter appressa, levare *cordis dolorem* (hypochondriam) putanc Arabes.

ROKEJEKA.

77_# ROKEJEKA. *Digynia. Calyx monophyllus. Corolla 5 - petala. Pericarpium, capula 1 - locularis, % - Jperma.-*

CHARACTER GENERICUS. *Calyx* perianth, monophyllurn, f-fidum, erectum, laciniis linearis-obtusis, marginis membranaccis, flore brevioribus, perfiftens. *Corolla*^ petala 5, cuneiformia, obtusiflida, plana, patentia. *Filamenta* 10, subulata, corolla-breviora. *Antherae* subrotundae, incunibentes. *Germen* superum, obverse-hemisphaericum, calyce brevius, supra excavatum. *Styli* 2, subulati, patentes ad angulum reclum. *Stigmata* acuta. *Pericarpium* capula obovata, compreffa, unilocularis, triflorum, piftillis emarginatis, calyce perfiftent longiori & corolla, niaricida circumdata. *Semina* subrotunda, acuta, comprefixa, parva,

SPECIES. *Radix* & truncus in terra lignosa, crassa *Caules* multi, annul; diffusi, dichotomi, aniculati > ramosi(fimi), cubitales. *Artknli* pollicares,

poilicares, fuperiores anguftiorcs, fenfim Jongiores. *Fotia* ad genicuU oppofna, feffilia, vaginantia, poIKcaria, lanceolata, bafi anguftara, in-tegra, glabra; fuperiora minora) linearia. *Peduncuti capiTJares*, apice incrafati, ad dichotomias fuperiores ramorura &- caulum; folitarii in media dichotomia: deinde gemini rerminales ramuli. *Calyx* viridis, marginc albido. *Corolla* alba, venis lincisque violaceis.

In defertis circa *Kaldram*. Arab. *Rokcpjtka* ***/* vel &*£/* floretis to-to nieofe April, Sryli & pericarps indole a *Saxijraga* akkr,

CAUCANTHUS&

73. CAUCANTHUS. *Trigynia*. *Calyx i-phylleti* <ampamatus| *Corolla pcnfaptala*. *Germen calyce loiiigius*.

DUSCR. *Fruttx*; vel arbor mediocris. *Rami* oppofiri, cortice oinereo-vio-laceo, farinofo, verruculato. *Folia* in ramulorum apice conferta^ op-pofita. *Pethlus* femipoHicaris, filiformis, canaKcuiatus. *Lamina* orbi-culata, vix poUicaris, fa?pe emarginata, glabra, plana, integra. *Pe*dunculi* corymbi compofiti, terminales ramorum: pedicelli conferri^ fere " umbellati, femipollicares, filiformes, rufefcentes, uniflori. *Calyx* peri-anth, i - phylum, parvum, campanulatum, viride, 5-panitum, laciniis lanceolatis, appreffis. *Corolla* pctala 5, unguibus brevibus, ovata, concava, patentia, alba, integra hinc, inde crifpato - ciliata: fquatnt neftarifera nulla, calyce fextuplo longiora. *Filamenta* lo\$ filiformia, re&a, albida, corolla breviora-. *Antheriv* ovalcs, incubentes, didy-mx* margine pirominulo farinofo, flavo. *Gtrmen* -cvak, villofiim, ca-lyce longius. *Styli* 3 fubulati, albi. *Stigmata* truncara. *Pericarpium* nou vidi: dicitur effe Drupa ovi columbini magnicudine.

In montibus ad *Tqtrs*. Arab. *Kiha* vel *Kanka*. £*ji Enjthrox. fimilis, II petala bad fquatnara.



CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

PORTULACA.

79. PORTULACA LINIFOLIA; *foliis linear i-lanceolat is > oppofitis> rubentibtv, margine reflexis; genhulis bafi hirjlitis.*

DESCR. *Caules procumbentes. Calyx diphyllo. Flores terminates, feffiles. Stamina 8 vel 9. Vidi plantain ftaminibus 10-ig. Stigma 4-vcl 5-partitum. Petala 4 vel 5.*
Surdild. Arab. Koraat errai. Aliis IWortah. &>j Cruda edulis, fapore Portul. oler. In cephalalgia folia contufa frond applicantur.*

go. PORTULACA IMBRICATAJ *foliis confertis, ovato-acntis, fubtus plants, fupra convexis, punStatis; geniculis bafi hirfutis| fioribus feffilibus, terminalibus.*

DESCR. *Flores flavi, magni. Folia craffa, longa, feffilia, brachiatim oppofita, adeo propinqua, ut caulem geniculatum imbricenr, & fubquadragonum reddanr.*

Beit el fak/h. Arab. Rozzi. Aliis Ornuba. ظرفية

.81. PORTULACA; *cahjce 4-phytlo, perfiflente.*

His fimalis. Arab, *Harefchta amrai. ^cL*Ib & jft*

RESEDA.

82. RESEDA HEXAGYNA; *foliis lanceolatis , repandis , tmdutatis , fioribus hexagynis.*

DESCR. *CIMfc/ dccumbentcs, hifpidi, fefquipedales, ramofi * tcrcre, ftriis elevatis, que defcendunt binæ e bafi cujtsvis folii. Folia fefflia, bipollaria, lanccolata, margine undulata, glabra, carina, feu rachi fupra & infra hifpida. Pedwiculi caulis & ramorum racemi rerminales, pedicellisbreviffimis, braftcola linearis fuffultis. Flores alrerni, albi. Calyx j-phyllus. Stamina 13 feu 14. Pifilla fex in globum arftata, qui elevatur a fundo floris pcdicello: quod in aliis hujus generis infolitum.*

Inter rudera ad *Caid Bey prope Kdkiram.* Arab. *Dhendba, ULuo*

83. RESEDA TETRAGYNA | *tetraqyna| alba| foliolislanceolatis, repandis; interdum bafi pinhatim incifis; calycis dente fnpremo ccquali.*

*Alexandria, Arab. Romvejh. pV⁰,/**

EUPHORBIA.

84. EUPHORBIA DICHOTOMY; foliis oppajitis > integris, lanceolatis, fejjilibus.

DESCR. *Caulis* fubere&ufs > dicbotomus, fpithamalis. *Folia*, parva, ovato-lanceolata, feffilia, articulo breviora: quxdam inferiora majora, margine denticulata, hta. *Flores* axillares, folitarri, feffiles J pedicella gcrminis violaceo, folii longirudinc. *Capfufa* glabroe.

Alexandria in ficitis *Peninfula Ras-ettin.*

8j. EUPHORBIA RETUSA ; umbetla trifida, dichotoma, ivvotueris taticolelatifoliis linearibns retufis^ dtntieulatis, inferioribus minoribus.

. DESCR. *Radix* perennis, 1 poll, craffa, lignola, fufiformis, fibris nullis. *Caules* mulci, annui, ere&i, fpithamalcs, ramis nullis prater umbellas, tcretes, glabri, virides, punclis rubris fa?pe alpcrfi. *Folia* alrcrna, linearia, summa pollicaria, iuferiora gradatim minora, omnia rctufa cum acumine, ad apicem denricularo-fcrrara, fuperiora margine rubra, ad bafin parum dilatara, dentata. *Involnra* foliis majora* ad trichotamiam tria, ad dichotomies bina : fuperiora latiora ad bain. *Pet a la \$ & 4, bicornia. Capfula* glabra.

In deferris *Kdhirinis* rarius, florens init. Mart. Arab. *MelThrjn-xz Ntnanie.* *fil**i *Euphorbia retufa* (LINN. Amcen. Acad. Vol. 3, p-iif?.) in multis cum nofra convenic: verum huic folia deuriculara, & involucra foliis laciiora; nee annua, fed perennis.

86. EUPHORBIA OBLIQUATAJ ifiuolucellis late-fubcordatis, obliquis.

Caulis fpithamalis. *Folia* lincari-cuneiformia, reiufa, Iparfli, Integra, sub-emarginata. *Vfnbella* dichotoma > 3-fida.

Alexandria.

87. EUPHORBIA ANTIQUORUM; OC) major, articutata.

DESCR. *Caules* trigoni, ramofi, interdum anruli 4, & plures. Ramorum lare-ra 3 - pollicaria, articulis fubrorundis, obfeure viridibus, radiis obliquis, obfeurioribus. Allatus mihi ell *articulus* fere fpithamalis: 2 poll. ' craflus; lateribus cavis, tribus; angulorum marginibus callofis, undulatis: ad finguta undse angulum *Spina* 2> femipolliwres, patentes, fubulatae, ri^idae: inter fingula paria. spinarum in medio eft ordo transver-fus gemmularum trium vel quatuor. *Stamiua* nonnifi 5, An genere divellendc *Euph.* & *Tithymalus?*

Arab. *Gholak o'ls* vel *Kalalu* Hanc edunt Cameli coftam in fovea terre-Itri, quod crte mirum mihi videbatur#

88. EUPHORBIA ANTIQUORUM; /3) *minor, inartkntata.*

Rami poll, lati, vix arriculatij flavo - viricks. Flores j-dri.

Arab *Ckorra/ch.* O[^]ri/^

89. EUPHORBIA OFFICINALIS. Arab. *Sthorur.* *Djöbh.*

Caudicibus pedalibus, congeftisj cefpiris intar e terra parum eminet.

OBS. EX mihiis, & *Eupb. canit* (Arab. *Kajflir*) lafte, purgans drafticum paratur, tempore potiflinuim pluviavum, i. «, autumno; turn enhn falubrior putatur. Guttas 7 vel 8 iaiina mixtas in pilulas fovmaif: vel in lac hovinum txcipiunt: Canarienfis dofi guttarum 6, 7. Offic. 5 vel 6, lute fcilicet fortior eft. *EupL tirtcalli* (uccus oculis noxijs -creditur, & exscos redileie. *Dhnii** ^j&& vocatur#

90. EUPHORBIA FRUTICOSA ; aculeata, multangula, craffitie bipollicari; fubpedalis. *Chadra.* Arab. *Schörur.*91. EUPHORBIA, ACULKATA; *caiile atuleato[^] fubirigono, artltulis fubrotndis.*
Arab. *Kertb* vel *Keratb* Sab. Prope Tacvs.§2. EUPHORBIA PEPLUS J *foliis £? invokicellis ovalibus, integris, fejfilibus.*
Hadte.

93. EUPHORBIÄ THYMIFOLIA.

DESCR. Parva , procumbens, fubdicliototnu. *Folia oppofita[^] ovalia, obliqua, villofa, obtufa, ferrulata. Caulis villofus, rubens. Flores umbellis axillaribus. Pctala albo - rubentia, crenulata.*

Ghitnjnde. Arab. *Ritmtnid.* d[^]r Succus miftus farina triticea in paftamj piulae forma & dofi 5; purgans eft vehemens; Herba ipfa impo- nitur contufa vulneribus.

94. EUPHORBIA ESULA ;/o/rVV *Jpcirjis, lanceolate - cuneatis, integris.*

Arab. *Sttbcrfib.* UA*MAAW Imperfæclas vidi, umbellis variantibus.

95. EUPHORBIA CRANULATA ;/o/ffx *oppofitis, obovatis, fnbfejfiibus, integer- rimis; Jloribus axillaribus, folitariis.*

DESCR. *Canles proeumbentes, dichotomi villofi. Folia obliqua, ovalia, fubciliata, breviflma. Flores parvi, rubentes. Capfute villofe. Planta parva, kftans.*

Lokaja. *Hadle.* Arab. *Lebbejn* vel *JUelcrbene.* akjuJU

96. EUPHORBIA TRIACULEATA; *caule Ureti, Jeptcm-fulcato[^] foribns Urnis, fejfilibus ex ala aruleorum.*

IDESCR. Frutex cubitaiis, diffFufus, ramofus. *Rami digitii craffitie longitudinaliter fulcati. In carinis interjacentibus, convcxis inferuntur Aculei terni; cxtcriores brcviffimi, decurvi; intermedius pollicaris, fubulatus patenti-rccurvus. Flores ex ala aculcorum rcrni, feffiles. Stamina nonnifi 6 ; bina in quovis atigulo floris. Piflilhim non cgreditur ad Intus floris ; ur in Tkhy malis.*

Ad urbern Mtfa frqquens in planicie fubhumida,

GLINUS.

GLINUS.

97. GLTNUS SETIFLORUS ; *eanlibut dffujir; fioribus cap it at is , axiltaribus, Jeffilibns.*

DUSCR. *Cauks diffufi, furgentcs , teretes, vitlofo - fcabri, articulati, gniculis incrafatis. Folia ad genicula verriciflara, fuborbiculara, margine undulata » periolq pollictri. Flares in capimlis ad gnicwla feffiles, vel bfcviffime pcdicellati. Calyth foliola 3 exrciora majora, viridh, ovata, extus villofa, piano 3- inccri-ora duo oppofita, complicata, Ixv'n, flavcentia, minoja. Petala numerofifima , erefta> iincarii, flava>.apicc in 3 fca 4 fetas divifa , longitudine (laminum. Stamina plura quani 10. Germm ovatum. Styli 5, divergentes. Stigmata acura. Capftda globofa, 5-fiilcata, unilocularis, perlucenibus feminibus nigris , inulris, affixis fetas involurce. Ddhi, in loco olim inundaro , fyivcfiri.*

98. GLINUS CHRYSSTALLINUS; *Jloribus immerft in cmites projlratos* JlriSiis-Jimosy papillofo -nitentes.*

DESCR. Tota profrata, hcercns in fuperficie arenae. *Canfes e centro craflb plures , rigidi , tripollarcs , teretes , undique papillolb-nitenrcs, quafi faccharo obdufti vel chryftallifati, (ut in Mefembr. chryjt:) Kami pcr-breves, alterni, vel porius fl^fciculi ininomm foliormn nd axillas. Folia alterna: petiolo fefquipoll. piano, chrytallifaro : folia ovaro-acuta> iiv terdum obtufa > Temper cbryftalliata: in axillis faicicuH minorum foliorum. Flores in fuperiore ptvrre caulum & ramulorum iT:iro modo femi - immerfi , verrucarum inlbr , magnicudinc pilł minoris. Calyx 5-pIiyHus, lanceolatus, rigidus, craffus, ereftus : exrerne papillofus: interne & ad marginis }unfluras nlbidus, perfiftens. Stamina adco incerti numeri, ab 8 ad if. Situ peculiari j afExa jnnQura: bciniarum calycis, & diverfimode in fingula junftura : llamen 1 vel 2, 3 , 4, approximata & fnfciculata. Unde (1,4 fumantur pro quavis junflura> forent 20 : & planta Jcofandra Filamenta etiam folitaria. Ant her a creftse, didymse , flava:, fubglobofae: Germen y-angulare, deprefFocavum. Styli ? approximati , longitudine ttaminum. Stigmata fJmplicia, recurva inftar hami. Corolla proifus nulla: filaments, qua? Lcefiling corolte loco fe vidiffe putavit in *Glino lotoide*; alia certc non crant quam Stamina' antheris orba & abortientia : quum eorum numerus in hoc genere inconfantiflimus eft. Pericarpinm nondum maturum; vidi tamen Capfulam 5-gonam , 5 - dentatam, calyce cinSam, 5-locularem, polyfpcrmam : in loculo feniina 4. Affiniras fumma Mefembryanrhcmi.*

Copiofe in arcnofis ad *Birket el/iadji* locum primse ftarionis Karvani Mcc* cenfis, *Kdhira* egrcfl?. Nomen Arab. *Loffaq* dubitanter mihi diftum eft# Aliis *Kufjet rt ^belld O^JLJ wi£=>*

99. GLTNUS LOTOIDES.

DESCR, *Canlis procumbens*, dichotomus, hifpidus, ad dichotomias incraflatus. *Folia ovalia*, pctiolata, v illofo - hifpida, integra, vix pollicaria, sub-quinata, inacqualia; falciculataj in punfto unius lareris; nan verticillata, fed alterna. *Foliola lanceolata*. *Pednnculi* in alis plures, Iongitudine* pctiolonim, uniflori. *Calyx* 5 - phyllus 1 externa parte viridis, hifpidus *, introrfum albidus. *Corolla* fctae non manifdta. *Stamina* 11-15, *Anther* a didymie. *Gertnen* 5 - angulatum. . *Styli* 4 - 5. *Capfiua* 5-locularis, 5-angulata, polyfperma, *

Matarece in humidiufculis. Et ad *Welhdn*. Arab. *Hafchfe*. Folia recentia concufa Vulneribus applicantur*, eriam tendinofis,

* «§. *

NOVUM GENUS.

CULHAMIA.

100, CULHAMIA. *Mlmofrynia*. *Calyx nullus*. *Fruttificatio quadricellulata*.
Capjuto 5, bafi connexa*.

DESCR, Arbor magna: cortice glabro, obfcure - ferrugineo : caudice fa?pc fpith. crafla. *Folia* ad apicem ramorum confena, fparfa, patcntia. *Pctiolus* tripoll. glaber, teres, bad & apice craflor. *Lamina* cordaro-triloba, 4 poll, subrepanda, glabra, lobis ovatis. *Pednnculi* axillares, racemofo - compofiti, tripoll. sub (ingulo ramo & pedicello bractea lanceolara. *Fbrts* pedicello poll. *Calyx* nullus. *Corolla* monoperala, campanulata, fcnpoll. ferruginea, 5-fida, limbi laciñiis reflexis, lanceo-Luis, viridibus. *Pedicellus* filiformis, viridis, glaber, apice dilaratus, curvatus, e centro corolls fru&ificationem elevans. *Filament* a nulla. *Anthera* 1 ^ didymx, flavae, subglobosae, ternatim pofirae, affixsc apici pedicelli dilataro sub germe. *Gertnen* hemifphaericum, obfolete-Jlobum, villofum, pedicello devatum. *Stylus* incurvus, subulatus, villofus : in flore adhuc claufo nullus ; antheris inrerea orbiculum pedicelli tegcnribus : at flore perfetto & explicaturo excrefcit stylus. *Stigma* capitatum 1 flavicans. *Pericarpium*, Capfulac 5 oblongae, acuminatst fciquipoll. patentcs, bad connexx, supra fulco exaratsc, in quo pofca dehiscunt, villofae uniloculares, ad utrumque lams fetis rigidis, femina (implici ferie geftantes ; caeterum prorfus inanes & veri *Polliculi*. *Settnina* ad utrumque rima? latus 5, pedicello brevi inter fetas pofito, ovali-oblonga, teretia, giabra, nigra, bafi appendice pulpofa, hyalina, reniformi, prominula.

In mentibus *Hadienfibus*. Arab. *Kulham*.



DE-

DESCRIPTIONES PLANTARUM.

C E N T U R I A

QUARTA.

CLASSES *XIL* == *XVI*

ICOSANDRIA. POLYANDRIA. DIDYNAMIA.

TETRADYNAMIA. MONADELPHIA.



CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.



MESEMBRYANTHEMUM.

1. J\J [E S E M B R Y A N T H E M U M GENICULIFLORUM.

Folia tcretia, supra plana, tuberculata, infima connata, fefquipol!icaria; frā&a monfrain pulpam pellucidam, aquofam, e cuius centro radii ad peripheriam exeunt.

Kdhira ad pyramides. Arab. *Gkcifūt*. Pecoribus non gratum.

Panem Jhccedaneum Tririceo potiorem ex hoc Mcfembr. parant Arabes (*Beduiui*) quibus folis in ufu eftj -flEgyptiis non. Capfulas aqua fuba&as, poftea tufas foie ficcant. Dcinde fortiter pulfant, ut *Semina* decidunt, qua: rnola rcdiguntur in farinam j hrec àqua & fale fubafta in paſſiE formam fine fennento^ tcnuis placenta? forma coquitur in tabula ferrea *Sad]* vocata. Horum Seminum § *Ardeb.* vel I *Ucebce* feu 4. *Roba* venditur pretio 70, 8c, usque ad no *Parà*.

2. MESEMBRYANTHEMUM NODIFLORUM. Arab. *Ghafiū J ^ U* vcl *Schachacha*.


DESCR. *Cauks* difſufo - decumbentcs. *Calyces* digitum parvum craſli? obovati, 5-dentati; dentibus 2 majoribus, foliiformibus. *JPetala* anguſtiffima, fed plana, bafi connata. *Stigmata* femper 5; raro 4. *Tota* planta papulolà.

Nulla herba vulgatior hoc Mefembr. in locis defertis , arcnofis.

POTENTILLA.

3. POTENTILLA DENTATA ; *foliis pinnatis* ; *joliolis oblongis, profunde ferra* thy exterioribus approximatis; cattle ere&o.*

DESCR. *Caulis* pedalis. *Stipule?* ere&e , petoli bafi innatoe, ovato-lanceolatae, oblique. *Foliola* 4-juga cum imparij exteriora majora, propiora, fefquipoll. *Fores* flavi, pedunculati. Ad *Uahfdt* prope aquas inventit Dn, NIEBUHR.



CLAS SIS XIII.

POLYANDRIA.

CAPPARIS.

4. CAPPARIS OBLONGIFOLIA | *foliis ovati-oblongis, obtusis, cum ntfunme per* ennantibus,*

Pednntiili racemofii, terminates, teretes. Cqpjitla pedunculata. Stamina pifillo brevibra,

Môr. Arab, REDIF.

J. CAPPARIS MITHRIDATICAJ/O/?/ alternis, pendutis, Eneari - tanteohth.

DESCR. *Folia tripollicaria; vix digitum lata, Integra, obtusa, glabra, fuprt nitida; petiolo ccrcti, flavicante, feminguem-longo. Calyx 4-phyIL Petala 4 mfcra.*

*Surdûd. Aral), Schagar ,**> vel Odd ejyym. Cortra Venenum & morfus fcrpentuin hxc planra kudarur > (anquam heroica, Rami teneriorcs comedunrur crudi, fi rccentes; fficci, in pulvercm comminutij fine aqui. (cfr. Cent. III. 45.)*

6. CAPPAIUS SPINO\$AJ foliis alternis> ovatis ; JUpuRs fpmojis.

DESCR. *Folia alterna, sub-peltata, bafi emarginata, late ovata, obtusa, crassa rigida, Integra, vel rarius subrcpanda, planiflma, fcfquipollicaria, apicc Jmmo spinolb fubtus. Pttoli t^retes, apice crassiores. Stipulce binac spinoia'i recurvse, parvic, rubentes.*

Taces e muro excrefcebatur friuiculus, foliis Capparidem referens. FruQsi ficationcm non vidi.

ODS. Si hacc veta est Capp. spinofa, competit illi nomen Arab. *Lnfaf* لصف

* Hammam Farafai id est: *Tbenud sharaonis fit** sunt e regione *Ghoheibe*, five, inter *Snts* & *Tör*. Scaturit «qua e cryptulis» montis prope Uttiis, orificiis perquam angustis. Huc rependo ingreditur. AfKrmant Arabes multos hic lanitntem reenperfifffe. Post balneum abtinendum erit 40. diebas ob omni cibo fflito & pingui (Arab. *Safar*), & *Colo fructu* Capparidis spinofe vivendum, qua? copiofe crescit in campis vidnis. Si fructus non adeft, *folia* de coeli viceni praftant.

Eft quoque in ufu contra *Qdantalginvu* Capiti dolenti folia contrita applicantur.

7. CAPPARIS INERMIS; *fiipitlis nullis; foliis subpeltatis, ovato-cordatis, cragith fculis, plantis, pollicaribus.*

Etiam ad Taçts inventa> an varietas prior is?

CHELIDONIUM.

- g, CHELIDONIUM DODECANDRUM ; *foliis bipinnatifidis, petiotatis| Jloribus folitariis, dodecandris; Jiliquis hispidis.*

DESCR. *Radix fibrofa, annua. Caulis femJfpith. ramofus, fubereQus, lannato - hispidus. Folia radicalia longe petiolata, sub-ovata, bipinnatifida; laciñiis ovatis, feta terminatis, petioto fefcjuipolllicari; rachibus lübtus fctolis. Stipule nullx. Folia caulina radicalibis similia, sed majora; pcriolo fcmipoll. alatoj ftipulan. Stiptila 2, foliformes, feni-poll. Icifiles, pinnatifidie. Pvdnnncuti caulis & ramorum rcrinalcs & axillares, uniflori; in axillis longiorcs, quam in caule. Calyx hirfutus, diphylus. Petala 4, violacea. Stamina 10-14. Siliqua tctragona, fefcjuipoll. fcris hispida , fulco medio in quovis latere *, unilocularis, Stigma crucifoniic.*

In defcrtis Kdhirinis* Arab. Ridjet elchrdb. ^ ^ لـ جـ لـ خـ ^

MESUA.

9. MESUA GLABRA; *foliis crenati's, gtabris.*

DESCR. Frutcx. *Folia alerna, orbiculato-rctufi, htiora, profunde - crenata, tenuia, glabra, ungu; brcviora, pcriola duplo brcviora. Calyx 4-phyl-lus. Flores ramulorum terminates, fohtariij pedunculo fcmipolllicari. Corolla 4-phylla. Germen fuperum, 4-coccum. Stylus unus, fta-minibus longior. Stigma capiratum, didymum.*

In Arabia Felici. Arab. Chadar.

NYMPHiEA.

10. NYMPPLEA LOTUS; *foliis sub-orbiculatis, baft Jiffis juxta petiolum.*

DESCR. *Flos albus. FruStus fuperne 10 hamis , feu corniculis incurvis. Folia juniora Integra ; majora dentata, non cordata.*

Rofetta, copiofe in foffis agrorum oryzse, Arab. Nanfar جـ

CISTUS.

11. CISTUS STIPULATUS; *frutieofusl foliis confertis, tomento/is, ovalibus, breviter petiolatis j margine reuotutis,*

DESCR.

DESCR. *Caulis* procumbent. *Folia* pirva. *Peduntnli* raccmofi, terminates. *Calycis* 2 hcinisc anguftiflimse. *Corolla* flava, patens, obtufj. *Fruticulus* corns villofo-tomentoiiis.

Alexandria? circa Salinas in collibus fcciflimis. Arab. *Chosjain* i±£. /3) *Varietatem* vidi'in desertis *K&hirinh* ad *Liblab*, foliis alt mm, ran oppofitis & minus conferiis.

CORCHORUS.

12. CORCHORUS OLITORIUS. Arab. *Melochia*. *?p^JU (cfh *Alpin*) Copiofc colitur in hortis /Egypti.

OBS. Singularem *Ahortvm* hujus Corchoñ repen Rofitt*. Flores omnes petelorum loco habent parva folia vin'dia, ierratn, cnuliiis familia; adco ut feta quoque ad infimam ienatniam diftinck in quiimsdam > in uliis 11011. An hoc evincit; Petala florum vera efie folia caulin, quor Jigieam materfam atrenuando depoiuerunt? Flos til compendium tants caulis mafllr, quanta: foliorum habet. In hoc Corchoro calycina folia non ferrata; an ex ftipulis oriuntur. Forte flores fine calyce gignun-tur ex foliis, quae ftipulas non habent. Sunt genera , e. g. *Ciftus* , ubi alia: species ftipulis gaudent, alia non, fed in his delitefcunt in rudiincento. In hoc *Filament* a eraut longa: anthers pumica? , incumbentes» *Capfula* magna ; (Irpe latere rupra : singulis diflepi-mentis intus utrinque ferrato - imbricatis; quafi & hsc e foliis fttratis fuiflent orta»

13. CORCHORUS ESTUANS.

DESCR. *Folia* oblonga , ferrata ; interdum ftrraturis extimi? fetacers^ interdum line feris. *Capjula* triquccrae, angulis canaliculat;e, latcribus plana*, fcabra: , trivalves, triloculares,

MOT. Arab. *Metoehia*. Planta cdiilis, tenera cofcta.

REAUMURIA.

14. REAUMURIA VERMICULATA; *foliif carnofi*, *plantis*, *parvh*, *confertfijimis*.

Folia fubtus non tuberculata, nifi ubi fal pofuerit tubercula; at pun&a im-prefla utrinque. *Capfula* 1 -locul. 5-valvis: *Jimhia* villofa.

Alexandria. Arab. *Mullah*, g^ & ^d/^ ****

Ufus mtdicut: contra *PJoram* imponitur trita, & decofti forma bibitur.

STRATIOTES.

15. STRATIOTES ALISMOIDES.

OBS. *Spatba* qu«# conftituit calycem exteriorem eft monophylla, quinque - alata; alis undulatis, apice florem cmftens» ^ *Calyx* interior tripbyUus, fupcrus. *Stamina* non 30 fed fex. *Sryll* iex, bifidi,

In foflis agrornm infute *Farfch* prope *Rofettam*. Fru&ificatio male de-
scribicur in *Horto Malab.*

ANNONA-

16. ANNONA CLABEA, KESCHTA; *fotuir ellipthis**, *fru&u globqfb.*

DESCR. Arbor mcdiocris. *Folia* ovali - oblonga, rripoll. obrufa, conferta, Integra, glabra, fiipr* plana, fubtus venis elatis, periolo supra canaliculato. *Pedimentis*, iquama una sub bad , altcra in medio pcdiccllo : foli* tarii faepe, interdum bini, pollicarcs, tcretes , uniflori. *Flares* penduli. *Calyx* perianth, 3 - pliyllnm, foliolis femiorbicicularis cum acuminc; corollis bafi apprefiis 3 viridibus, planis. *Corolla* : petala 3 txteriora Ccunofa, tricjuctra , lincnri-lanccolata, pollicaria, bafigibba, ftriis paucis; latcre exteriori in medio fulcate , cxtus viridia, intus alba , fundo intus excavato punftis violaceis. Perala 3. *inferiora* omnium minima, fquamiformia, cum exterioribus alterna, ovato-lanccolata, patentia, plana, viridia. *Stamina* & *PiftilUi* ^onftituunt in medio pyramidem triquetrum, papillofum, corolla multotis breviorem. Latera hujus capituli cingunt *Jlamina* numerofaj filnmentis fetaceis, brcvibus: antheris globotis, f la vis: reliquum conftat germinibus plurimis, ovatis. Germinis collum anguftatur, & *Jtyli* loco eft. *Stigma* conicum, fimplex, rufe- feens. Germina omnia connafcuntur ported in *truEtum* globofum, pug- ill magnitudine, velut ex globulis compofitum. Intus lacle cduli lapi- do: quumque. *Kefchta* eft Arab, nomen *laffis caagulati*, inde & huic arbori ejusq; fru&ui communicatum.

In quibusdam hortis *Rofettcp* & *Damiatos* colitur arbor adhuc in /Egypto rariffima. *Rofettcv* venditabar quidam hortum, hac artorc fupzrbicntem, nullo alio traftu terra? invenienda. Florentcm vidi Junii menfc in horto *Gi%xe%* pagi e regione *Kdhirce Feterir*.

Hajfelquifi earn *Cajfta* adferibit; fed florem forfitan non vidit; at in fru&lu quoq; decctpus eft, a *Caffiae* valde abhorrente : nominis iimilitudo errorem non excufar.

RANUNCULUS.

17, RANUNCULUS CH/EROPHYLLOS. *Kurmee.*

Catties effufi, femi-glabri. • *Folia* multifida. *Calyx* reflexus.

igf RANUNCULUS MULTIFIDUS ; foliis muUifidis J infenprilms pinnatu; caule mvitifioro| calyte corollam crquanU.

DESCR.

DECS*. *Caulis bipcdalis, creflus, fubtus teres, fuperne ftriatus, pilofus.*
Folia inferior pinnaro - multifida. FrvMus ovalis. Semina ovato-acuta.*
In foffa prope urbern Taces.

NOVA GENERA.

ORYGIA-

19. ORYGIA. *Polyandria, monoqynia. Pentapetala, in/era. Calyx diphijltus.*
Capfitla %-valvis> unilocularis.

SPECIES. ORYGIA PORTULACIFOLIA J *foliif altertiis, cnneatis, glabris.*

DESCR. Frurex bicubitatis. *Folia alterna > cuneata, bafi attenuata > fetfftia, pollicaria, obtnfa farpc cum acuminc, crafla, patentia, glabra. Pedunculi paniculx terminalcs > ramis trifloris, pedicellis umbellatis. Ca/yx, perianthium diphyllum, patens, deciduum", foliolis ovatis, obtufis cum acumine ; altero longiorc, obtufoire. Corolla petala 5, fubrotunda, calyce longiora, patentia, violaceO-rubra. Filament a numcrofa, filiformia, peralis breviora, viridia. Antherce oblongar, didymic, incumbentes, flavor. Gormen globofum, fuperum. Stylus unus, filiformis. Stigma triplex, divergens, acutum, rnbrum. Pericarphim capfula globofa, trigona, trivalvis, unilocularis, polyperrna, Semina parva, comprefla, nigra > ghbra.*

Snrddd. Hadle, Arab. Hontdjrtidj. ^A^A Folia cdulia.

20. ORYGIA DECUMBENS j *caule decumbente* frutkofo j folih ouato - acittis, ftibfarinojis.*

DESCR. *Calyx f-phyilus, viridis, ovato-acutus. Petala multa, 20? lanceolata, rubro-violacea. Styli 5, filiformes, dbidi. Stigmata fimplicia, violacea. Capfula calyce cin&a, globofa> 5-valvis, J-locularis, polyfperma. Folia ca.Tulc(ccentia.*

Mufce rarius ad petras.

ONCOBA.

»x. ONCOBA. *MonofryvAa. Calyx i-phyllus. Corolla potypetala. Pericarphim, bacca unilocularis > polyjperma.*

DESCR. Arbo* grandis: ramis alternis, verrucofis. *Spin& ad exitum ramorum folitarise vel binsc, crctflo - patentes, bipollulares. Folia alrcrna> breviter*

breviter petiolata, ovato-acuminata, ferrata, bipollisaria, glabra *Calyx* perianthium, 1 - phylum, 4 - partitum, basi planum, persistens, lobis subrotundis reflexis, concavis, plabris, introrsum albidis. *Corolla* 11-petala, alba, paten tina, denticulata; 6 exteriora Jongiora", latiora, obovata, calyce loigiora: 5 interiora minora, ina?qualia. *Filamenta* a numcrofissilia, filiformia, erccia, pallidc-flava, inferta calyci, totum fpatum inter coroibrn & gcrmi-nis fundum replentia: quarc incertum, an ad Icofandriam vcl Folyandriam pertincat. *Intherce* ercflx, (impliccs, lineares, flavae, *Germen* supcrum, globofum, longitudinalirer fulcatum. *Stylus* cylindricus, filamentis longior, craflor. *Stigma* orbiculatum, supra cAvum, fukatum, inarginc Icptcmlobum, lobis denuo divisis in lobos cuncatos, gbindula viridi terminatos. *Pericardium* >> bacca globofa, umbonc ex obtuib apice, epidermide carnofa, tend; lub ilia crufa ollea craflor. Inrus unilocularis, pulpa plena, polyfperma! pol* licaris. *Summ* oblonga, compreffa.

Hadze. Arab. *Onkob.* v^>&2 Fruftus cdulis pueris. In *Surddd* falfo vocarunc hauc arborem *Korkor.* 

MJERUA.

22. M-^RUA. *Monogynia. Calyx fidns. NeEtarium mnitifetum. Receptaculum pedicellatum.*

DESCR. *Caiidi'X* fruticofus, vel arborcus. *Sami* punicei, glabri. *Folia* alterna. *Petiolns* brevis, filiformis. *Lamina* fucculenta, ovalis, retufa, pctialo Jongior > vix concava. In majori arbore vidi folia fcniipoll. cuncato-ovara, vix retufa; nec tamen specie diffcrt, quum prarerea omniraode simili. *Pedunculi* ramulorum & rami terminales, femipoll. filiformes, glabri, virides, folitarii, uniflori. *Calyx* perianth, monoph. 4-fiduni, glabrum, flavicans. *Tubus* urccolato-quadragonus: limbi lacinke 4, tubo longiores, reflexa!, oblongae, obtufa:, concuvac', fubciliatse. *Corolla* nulla. *NeEtarium* fetis numerofis, viridibus, compres-Hs, apici tubi calycini infertis, apicc laciniatis, conniventibus, tegentibus pedicellum, fruftificationem elcvans. *Receptaenlum* elevatum columna tctraedra viridi, filamentis craflori, e fundo tubi calycini furgenti, nctario conniente obtefta, apice filameiita & germe pedicellatum gerente. *Filamenta* circiter 30, fubulata, patentia, alba, calyce longiorai *Antherce* incumbentes, didymse, oblongcs, flavae. *Germen* ckvatum ex rccptaculo pedicello filiformi, illo brevius & craffius, cylindricum, viride, glabrum. *Stylus* nullus. *Stigma* verrucifbrme, obtufum. *Pericardium* pedicellatum: an bacca? ajunt in diamctrum femipoll. exrefcere.

In *Temen* paffim. Arab. *Meru* *** fruflus pueris edulis.

CHADARA.

CHADARA.

23, CHADARA. *Rionogynia. Cahjx i-phylus. Corolla \$-petala. Peri* carpium, mix 2-locularis, dijperma.*

DESCR. Frutex. *Folia* fere tantum in apice ramulorum duo yd tria petiolata, reniformi • fubrotunda, obtufe crenata, plana, glabra. *Pcdnn-culi* ex npicc ramulorum velut ex gemma cum foliis, (bepe folitarii, uniflori, femipull. glabri, supra mfliores. *Calyx* pcfrianrhium, 5-phyll. patens, linearis-hnceolatum, femipoll. introrfum albcfcens. *Corolla* 5-petala, obovata, patens, alba, calyce dimidio major: *Jquatna* ad balin finguli petali, neflarifera, femiorbiculata, margine villofa, inrrorfum inclinara. *Receptacnlwn* elcvatur a fundo corolla; *columna* tereti, viridi, medio anguftata, glabra, supra villofa, undique tecla neflarii fquamis connivencibus, go (tans in apice filamenta & gcrmcn, corolla brcvior. *Filammta* fubulara> alba, erefta, xqualia, corolla longiora, brcviora calyce & ftilo. *Anthree* parva, fubrotunda?, incumbentes, flavae. *Germen* dicoccum, fingulo extus unifulcato. *Stylus* unus, filiformis. *Stigma* dilatarum, viride, quadrifido -laciniatum. *Pericarpium* drupa co-riacea. *Semina* nux duplex, 2-locularis , difperma.

Siirdiid alibique frequens. Arab. *Chaddr.* ^d^ Aliis *Nabba.* نبع

24. CHADARA ARSOREA J *foliis "ovatis > ferratis, glabris.*

DESCR, Arbor magna. *Rami* ultimi romenrofi, villis glandulofis, teretes. *Folia* alterna, diilicha; *petiolus* teres, tomentofo-glandulofus, parcns. *Lamina* 4-poll, oblongo-ovalis, bad cordato-obliqua, plana , glabra, margine reflexo, ferrato - demiculata, fiittustomentofa, albida. *Stipule?* inferiorum dilabuntur: fuperiorum utrinque folitaric, ercftx, tomento- fe, lanccolata?, extus uni-alatae. *Pedunciiti* axillares, folitarii vcl plures, fimpliccs vcl bifidi, tomentofi, fefquipollccares. *Floras* ut in pri- ori. *Calyx* perianthium, j-phylum, foliolis linearis-lanceohtis, planis, reflctis, corolla longioribus, fubtus tomentofis, supra glabris, fla-vis, femipoll. *Corolla* 5 -ptala , orbiculara, reflexa, flava, inferta ncftario extus ad apicem. *Neffarium* campaniforme, fquamis 5 fub- rotundis, ciliatis, ereftis, viridibus, connatis, inter calycem & recept. poftis. *Receptaculnm* elatum columna pentagona, glabra, fuperne latiore, villofa, elevante (lamina & piftillum, ad eandem altitudinem pkni cum bafi petalorum. *Filamenta* inferta columnar, filiformia, ercfta, petalis longiora, piftillo breviora, flava. *Jlnthercz* globofae, flavae, di-dymae, ereftx. *Gerrnen* globofo - dicoccum, villofum, comprefflum* utroque latere unifulcatum. *Stylus* unus, filiformis. *Stigma* la rum,
(O) ⁶ fub-


fuborbicnlatum, 4-paititum, lobis cuneatis. *Pcnearpium*: Drupa vix
ccrafi magnitudine, globofa, flava, rufcfccns: pulpa dun, carnola, fta-
pofa: cortex membranaceus. *Nux g-locukris[^]* monoipperma: finditur
in duo hemifphxria: *nuclei* oblongi.

In montibus *Temtn.* Arab_# *Sccrak*

2\$. CHADARA VBLUTINA J *foliis alternify ovato - acutis > ferratis, ucht'mii,*
bafi obliquif.

Frutcx. *Drupa nigra*, monofperma, edulis. *Nux 4-locularis*. *Semen* late
ovatuni, glabrum, planum.

Hadie. Arab. *Neftham.* نفثام



C L A S S I S XIV.
D I D Y N A M I A.
P H L O M I S.

26. PHLOMIS ALBA; *involucris palmato-jiliforinibiis*, foliis ovatis > ferratis.*

Flores albi: labium fuperius hirfutum, prseferrim margins & intus J apicc emarginatum : dorfo elevare - flriatum. Erucae fepe findunt arro-dendo labii inferioris lobum medium.

Hadfe. Arab. *Scholiab* شوقيب

C L I N O P O D I U M

27. CLINOPODIUM FRUTICOSUM; *caule arborefcente; foliis ovatibtis, crcnatis; cahjcis labro wferiore fnbrotundo.*

DESCR. *Caulis frutex 3 ulnar. ramis oppofitis, crctis, villoTs. Fblia op-pofita. Petiohs teres, villoius, patens. Lamina patens, ovalis, obtufa, ball integra, dein crcnata. Stijmlce nullac. Flores verricillari» feffiles, in quavis axilla 9. Invokcra floribus cxtcrioribus subjcftai qmdripai'tka, filiformia, longitudine tubi calycis. Calyx tubo obverfe-fulcato, 10-carinato; carinis villofis, compreffis; circtrum glabro, viridi. Limbnf bilabiatus, inaequalis. Labinm fuperius lanceolatum, acutum, cre&um, unicarinatum, viridc. Inferius patens, membranaccum, hyali-nuni) iubrotundum, obtufum, verfus bafin utrinque unidentatum, corolla longitudinc. Ante forefcientiam tubus oblongiis, feu ventricofus, fauce arte claula ; & calyx reddit verticillum imbricarum, velut/j«amh. Corolla; tubus in tubo calycis occulratus; limbus ringens» nivcus; labium Jiptrhu fornicatum, villofum, margine hirfutum | inferius forni-catnm, trilobum; lobo mcdio# lat, longo, cordato. Stamina galca longiora, Antherte fcrruginex.*

Hadie.

T H Y M U S.

28. THYMUS SERPYLLUM. Arab. *Saatar.* *jX*** In monte C/tadra.*

DESCR. *Folia cuneiformia, bafi ciliata, plana utrinque, fubtus excavate-punftata, Capituli terminates, fubglobofi, pollicarcs, ex vrticillis con-geftis brachiatim, Bra&ece vrticillorum foliis majores, femipollicarcs, oblongas planar bafi ciliatse. Vrticillus uterque 7-florus. Flores pe-dicllati, «*

dicellati , albi : labio fupcriore rcflexo, bidenraro : inferiore piano , tri- lobo. *Calycis labium Jhyperius tridentatum* J inferius bipartitum. *Stamina longiora ad latera divergunt, & fupra corollam exitant.* *Cauks iruticu- lofi procumbemes; non vero repentes.* *Odorplantae fortiter fragrans.*

29. THYMUS IMBRICATUS ; *canibus decumbentibus , imbricatis; foliis ovato- acntis; Jlorilnis axillaribus, Jblitariis , feffilibus.*

DESCR. *Calyx ftriatus; fauce villis claufa J non bilabiatus , fed 5-dentatus;* fub labio inferiore *rima* una inter lacinias profunda. *Flores rubri.* *Caulif exiguus, fruticulofus.*

Kurmcc.

MELISSA.

30. MELISSA PERENNIS ; *floribus verticillatis, utrinque ternis, pedunculatis\ foliis oblongis, crenatis.*

DESCR. *Radix perennis , lignofa. Cauks infima parte perennes, lignofi, confertissimi , ereſli , tetragonoi: parte annua viridi, cineraicenrc, villis apprefliſ icabra; brachiati, farfti, ftriſli, fpithamales. Folia Icfi7lia, femipollcaria, villofa, bad linearia, pilis longis ciliara, Integra, relirjua parte latiore, lanceolata, crenata, marginc reflexo. Bracteae ad singul- lum verticillum utrinque tcrnae, media majorc, lanceolata, latcrals fili- formes, Flores ad omnes alas fuperiores caulis & ramorum terni, bre- ves, pedicello crec̄lo, patentes. Calyx villofus, labio fuperiorc con- vexo, apicc furgens dentibus latcrals conniventibus, medio brevidi- mo. Corolla albido-carrulcfcns, calyce longior, maculis flavis & ca*- ruleis. Labium fnperius re&um, bidentatum: inferius lacinia media lata, fere fuhrotunda. Stigma (Implex, nee bifidum, fed npice incur-* vum, acutum: quod charati. gen. repugn'at. An ergo Mel frutico/d ? fed folia utrinque arqualitcr villofa,*

In defertis *Kdhiriuis.* Arab. *Raafø* «js^ vel *Sagaret el gha-*

OCYUMUM.

gi, OCYUMUM FILAMENTOSUM j *foliis ovato- oblongis, ferratls, Jilamentis co- rolla duplo longioritnif,*

DESCR. Fruticulus. *Rami villofi, quadranguli, quadrifulcari. Folia petiolo brcvi: lamina ovali-oblonga, ferrata , obruHi, fubvillofa, femipollcari. Peduncelli fpicac terminalcs ex verticillis feffilibus, remotis', utrinque Floribus tribus: (juibus fubjicitur brakes loco callus fufcus, fubtus ca- vus,*

vtis , calyce mulro brevior. *Corolla* rcfclipinata, alba. *Filament* a florc duplo longiora, refta, villola ad balin; dum marcefunt, apicc tortilia.

Prope montem *Melhdn* frequens.

- 32, OCYMUM HADIENSE; *foliis ovatiyy ohtvjis, crenatis, vitlojis, flexilibits| fioribus refrafifis.*

DESCR. *Caules* furgentes, villofi. *Folia* flcxilia, ad bafin pedunculi con* ferta, oppodta*, petiolo tereti, villoio; *lamina* ovata, obtufe crenata, utrinque villofa, fubtus rugofli, punftis impreffis. *Pedunculi* *, racemus verticillatus, hifpidus, terminalis, ipithamalis. *Verricilli* utrinque 4-flori, pedicellis parentibus, villofts, b rev i dim is. *Calyx* bilabiarus , nmlri-carnahis, carinis hifpidis. *Labium* suprcmum mulro latius, planum, ovatum, ciliatum; inferius bifidum, laciniis* hnceolatis. *Corolla* pallide-cierulea, reiupinata: *tiibus* cofnpreflus, ad calycis apicem rcFraftus, *Labium*, quod dtierct eTe fuperius, at nunc *inferius*, ovarum. cavum, magnum. *Sperhcts* (natnrce ordine inferius) 4-lobum, Jobis 2 minoribus lateralibus, 2 mulro majoribus, divergentibus, fubrorundis, bafi vitta alba. *Stamina* exreriora, bafi rccurva, curvatura tubo ad-nara juxta geniculum: procelFu libcro nullo. *Ne&arinm* glandula ver-fus labium calycis quadrifidum.

In tnontibus altioribus *Hadienfibus*, alibique. Arab, fflednn, t^lcX* i e. *auricula**. Flornm ftruclura prorfus cadem cum fequenti; tan-, turn foliis flxilibus diftar^ quum alcerius funr rigid a & fragilia, nia-gisque carnofa.

33. OCYMUM oc) ZATARHENDI ; *foliis carnojis, rigidis, late ovatis, acutis, crenatis, villofis^ bafi truncatis.*

DESCR. *Cauks* furgentes, sempcrvirenrcs, quadragon-o-terctes, fctis molli-bus farfli. *Folia* brachiara. *Petiolns* femipoll. patens, villofus, luctus teres, planus supra cum canaliculo. *Lamina* carnofa, late-ovata, fere fubrotunda, fefquipol^ patens, villis mbllibus, reticulata, venis supcrne cavis, anguftis, infra laris, elatis: dentato-crenata, obtufa, bafi truncata. *Pedunculi* terminales, fpithamales, verticillati. *BraEtece* ad ver-ticilos urrinque foliaricc , membranaccae, ovato-lanccolatx , deflexsp. *Pedicelli* feni urrinque in fmgulo vercticillo, uniflori, femipoll. Superiores prius florent, ideoque longius exrefcunt. *Flores* refupinati. *Calyx* i-phyllus, bilabiatus: labio *inferiori* fquod fuper.) lato, cavo, fubrotun-do: *fnperiorij* (quod naturaliter eft inferius) breviore, quadripartiro, laciniis linear-i-lanccolatis. *Corolla* monopccala , ringens. *Tabus* albi-(O) 3 cans,

cans, compreflus, bafi fubtus gibbus, medio refra&us ad angulum recum, apice latior: supra planus infra geniculum, carinams supra. *Limbus bilabiatus*: *labium superius* (inf.) violaceum, cymbiforme, compreffum obtufum, integrum: *luerius* (fupr,) erethim, album, obtufum, vix 4-dentatum. *Fitamenta* 4, didynama: infcriora labio longiora, superiora adhuc longiora: omnia a bafi ad medium connata in tuhum ffflum circa piftillum. *Stamina* breviora, tubo annexe. *Neficirium* glandula infra germina, verfus bafin tubi, craTa, ovalis, crefta, viridis. *Germina* 4, parva, globofa. *Stylus* filiformis, ruber, longitudine ftaminum. *Stigma* duplex, acutura. *Pmcarpium* nullum. *Semina* 4 nuda, in calyce perfiftente.

Arab. /Egypti Zatar hendi. Beit el fakih Meddn. ^ 10^0

Cum *Oriffrano jEgypt*. LINN, nihil commune lubet, praetcr nomen Arab.

Saatar, quo duce auftores conjunxerunt planros difpares. Origani flores in ftrobilnm (picatum congefti: hujus in verticillis remotis, refupinati, quod Ocymi lignum eft, & calycis figura Aft & ab hoc generc, peculiari ftcedir nota: curvarura filamentorum admra corollx, non libera: corollx tubo fraflo, Kibio urroque integro: ghndua germina xcjiunte, iliis vicina in bafi tubi; qualcm in Ocy- mis non vidi.

34. OCYMUM jS) ZATAUHENPI? *foliis carnofis, cunedto-obhngis*, *utrinque fub - quadridentatis*, *villofis, fejfilibiis*,

. PiiiscR. Ccutlis fruticofus, diffuius, pedalis, brachiatus. *Jfami* tereres, villofi, conferti, brachiati, articulati; articulis unguem longis. *Folia* oppofita, feflilia, femipollis rernota, fubpollicaria, cradli, bafi artenuarn> Integra, fuperius utrinque 4 - dentata, apicis dence obtufo, villofiuscuLi, supra cava, fubtus punfti3 ferrugineis alperfa, intus pulpofa. *Pedimculi* axillares, terni, uniflori, breves, filiformes. Flores non vidi.

In montibus mediis inter Dorebdt & Tacts. Valde fragrans. Dicunt edulem efle, Simiis quoque gratam.

gy. OCYMUM GRATISSIONUM. Arab. *Hbbokbok*. ijt^jja*

FQHQ #ovaw, cr^nata, ilibtus tomentofa, *Flortf* verticillati, pedicellati. *Calyx* ut *Oc. graf*.

36. OCYMUM SKRPYLI.IFOUUM;/G#/J* *oblongo-cimeatis, cicuthfculis, complied* tis, fubtus fenbris*.

PESCR. *Folia* bad attenuata, unguem longa » integra. *Flores* in racmis verticillatis, terminalibus; pedicellati. *Calyx* ferrugincus. *Corolla* violacea, *Staminum* proceffus magnus, villofus.

In mome *Chadra** Arab# *AfaU J^PI?*

37. OCYMUM VAAUE ; *caule tetragono, brachiato; radicibus Jilamentofis; fructuum pilojob.*

OBS. Eft illia, fine dubio, species Ocyti zatar hendi, sed flores mihi ignoti. Vocatur *Vanla*. E regionibus montofis Orientem verfus affertur vena* lis Beit el fakih; tantae enim fragrantia? funt radices, ut incolae foleant af* fricando communicare odorem ipfis odorif^s, Moicho, Zibeto &c. et fua- veolentia hacc geftent fecum in capfula, *k. femper gratum spirent odorein. Caeteroquin maxima eft cultara *Ocyti bofil.* in iEgypto & Arabia; quo mirum in niodum dele&ianti# nares Orientalium. Zatar hendi species ab Ocyti Genere pofle divelli, fads mihi jam conftitit; licet charácters genericos noa adhuc determinare potui.

LATHR^EA.

38. LATHR/EA PHELYPEA; *calyce fnperiore monophyllo, %-dentaio fupra brae- team & cahjeem diphillum; Jhribus carukis,*

Alexandria. Arab. *Haluk rihi.*

39. LATHR/EA QUINQUEFIDA ; *caule Jimplici; /pica imdique imbricata; calyce coi&laqie 5 -fidls.*

Caulis pednlis. Spica diametro 3 - pollicari. Flores flavi,
*Alexandria, frequens ad onines ripas arenofas. Arab. Hake, tj *\$A*

ANTIRRHINUM.

40. ANTIRRHINUM HTELAVA; *foliis tinearibus, alternis, hifimis ternis; flo- ribus racemofo~capitatis| galea' bijida, labio Uidentato.*

DESCR. *Radix annua, fufiformis. Caulef mulri, diffufi, bafi declinati, dein iurgentcs, femifpith. tercres, glabri, tenucs, bafi ad poll, diftantiam nudi, dein foliofi: ramulis axillaribus creQis, floriferis, inferioribus minoribus. Folia hncari-lanceolatj, obtufl, pollicaria, feffilia, pbna, crappa, farina detergibili, infima terna, raro quaterna, rcliqua alrerna. Pedunculi ramorum & caulis terminales, racemofo - capirati. Braifea fub fingulis floribus foliarice, lineares, infimx foliiformes, calyce longiores, fuperiores extus hifpida:. Flores pedicellis breviflimis. Calyx externe hifpidus, Jaciniis fuperioribus longioribus. Corolla pallide-flava. Calcar flore longius. Labiumfijperius ttfcxxxm% bifidum. Inferius: intus villofum, limbo externo obtufe-tridemato.*

In defcrtis *Kdhirinis*, alibique vulgaris. Arab, *Halava, y* 

41. ANTIRRHINUM JEGYPTIACUM; O/*7.T ovatis, glabris, fubtridentatis.

DBSCR. *Caitlis* *fruticulofus, profratus. *Flares* sexu diftin&i. *PAala* viridia, filamentis perforata. In floribus apercis ftamina crant 4,'5; in claufis5, f*eppe 6. *Stigma* interdum in medio, inrerendum nullum.

Kdhint, Arab, JEfchibeddib v^dJJ i^yjūS vel *Dorceife* صَدْرِيَّة

BROWALLIA.

42, BROWALLIA HUMIFUSAJ hifpida, projrlata; fioribus axillaribus fejfilibus. albis.

DESCR. *Cautes* filiformes, . hifpidi, ramofi, profrati, adeo ut planta inter alias herbas prorfus latest, floribus tantum emergens. *Folia* oppofita, oblonga, fcffilia, bad attcnuara. *Pedunaili* axillares, folitarii > breviffimi. *Calyx* hifpidus, cylindricus, y-fidus, laciniis filiformibus. *Corolla*, alba : (ficca nigrefcit tota) *tubus* angustus, fcmipollcaris. *Limbus* patens, 4^ partitus, lobis obovatis, quarto duplo latiore , emarginato (hoc unico abit a characl. generis) limbo j-fido, arquali. *Capjula* comprefla, unilocularis , polyfpcrma, cinfta calyce multangulo. *Semina* cylindrica, urrinquc obtuia, parva, nigra.

In montibus altioribus. *Ha die*,

LIMOSELLA.

43. LIMOSELLA CALYCINA J ealyce exteriore parvo, diphytto\ interiore 5-phylto) corolla campauulata,fubcequali.

Caules repentes. *Folia* fere Portulacx, ' *Stamina* rcmota. *Cajfula* 1 - loculkris, polyfperma.

Ad *Uadi Zetrid*.

OROBANCHE.

44. OROBANCHE TINCTORIA.

DESCR, Planta parafitica radicuni veterum; fucculenta. *Comfit* fimpliciflimii?* pedalis, imbricatus brafteis 8c floribus, glaber. *Bradtece* ad finguluni florem UnceolatiE, obcuiae , pollicares, ereftae, tnargine denticulate, decurrentes in caule, carina elata prifmatica, extrorfum triedra, fcquipoll. *Flares* ordinc fpirali caulem cingunt. *Calyx* : exterior diphyllus: lacifis ad utrumque Urns fingulje, complicatce, linear-lanceolatae: *interior* tubulofus , 5 - fidus , obtufus, ercfetus > flavo - fucus , corolla brcvior. *Corolla* flava, tuba tereti, fefquipoll. *limbus* pitens, 5-fidus, obtufus, squalis, fubtus 2 cavitatibus. *Anthers* tnnsvverfee, hirfutse, conglutinata?. *Filamcta*

Filamenta bafi villofa. *Germen* oblongum; bafi annulo flavo cinflum. *Stylus* ftarninibus longior, apice curvus. *Stigma* capitatum, truncatum* flavum, oblongum.

Ad urbem *Mór*. Arab. *Hödar*: aliis *Zijbb alkda*. **نَبْرَةُ الْقَعْدَةِ**

45. OROBANCHE CRENATAJ *Kdhira*. Arab. *Halukmetabi*.

DESCR. *Caulis* pedalis, (implex, villofus. *Corolla* alba, 5-loba, denticulata-crenata. *Stamina* in ipfa fauce inclufa.

SESAMUM.

46. SESAMUM INDICUM.

Callus fubglobofus, flavus, apice cavus, perpendicularis ad utrumque latus fingulae aloe in caule fuperiori, five pedunculus ibi adfir, five non.

Ubique in Arabia culrum. Arab. *Djijl djyldn*. /Egyptiis vocatur *Sem-fem*. MJ*4M> Ex illo paratur Oleutji, (Arab. *Salit*. ISALO^) in re culi* naria urile, & ad ignem in lucernis fuftentandum.

RUELLIA.

47. RUELLTA IMBRICATA J *fioribns in axillifnpremis tongejlis, fecnndis; fejjilibus; braEfea obliqua, Jhbrotunda*.

DESCR. *Canles* annui, dcibiics, tctragonni, brachiati, villofi, arriculari, articulis tripoll. *Folia* oppofira': lamina poll, lanceolata, icabra. Axillae florifcric folium, majus : vacux parvuin: omnia difticha. *Flores* fes-iiles 3-5 in una axilla; broftcadapYici: una fubtus fubrotundo-obliqua: alrera anguftiore ad latus extcrius capituli, obliqua: flores in axillis fuperioribus conferti, forma fpicae fecundae imbricate: omnes ad latus inferius pofiri, fefiles,-congcfti in alrerutra axilla alternatim, non in utraque. *Calyx* 5-fidus, fed figura bilabiati: nam lacinia fuprema reliquis latior, plana, ovata, obtufa : 4, caeterae, linear-lanceolate. *Corolla* monopetala, alba, calyce longior, inaequalis: *Jacia?* limbi obovats: fupsriores, anguftiores, breviore. *Stamina* didynama: utrinque majus & minus approxima. *Capfula* comprefla, linear - acuta, bivalvis: bilocularis ? *Semina* lubrotunda, ungue elaflico fubtus: carafle genuino Ruellie.

Temen. In montibus altioribus.

48. RUELLIA INTRUSAJ *corolla lacinfa infima intrufa> fortuicata*.

DESCR. *Caules* decumbentes, ramis ereftis, quadragonis, dichotomis, villofis, articulis bafi incräftatis. *Folia* oppofita: *petiolus* planus, villofus: (P) *lamina*

lamina cordato - ovata, acuta, fefquipoU. villofa, integra. *PedimcuH* axillares , terminates , racemofii, quadranguli, villofi : pane nuda florifera, articulata. *Pedicelli* erⁿcli, uniflori; brafteola paimari triparrita, cuiex altero gniculi latcre appofita fquama (implex, lancollara. *Calyx* 5-partitus. *Flares* erefti. *Corolla?* tubus fupra cafycem larior, fuperne violafcens, tricarinatus, fobcus alb us, bifulcatus. *Limbus* 5-fid us, albus, fubtus violafcens. *Lacinice* 4, aequalcs, ovatae, patentes; *quint a* in faucem intrufi, fornicata; macula violacca. *Filameuta* utrinque brevius & longius approximata, convergenria ut Anthers? anrheris accedant. *Cap-Jūla* bilocularis, elaftica, difperma, apice acuta, ungue ehftico fub quo-vis femine. Corolla: irregularitas genus dubium reddit: at vindicant ftamina approximata: & Capfula fubulata, medio coarftata, elaftica.

Cum praecedentc frqquens. Arab. *Soudvud.* سودون

49. RUELLIA STREPENS; *flore magno violacBO\ foliis obtufir.*

Folia petiolata, oblonga, fubrepanda, fcabra[^] *Stigma* !ingularui.

Surdūd. Arab. *Kojfejf*, <-*\$*& verius *Mtakika*. t&JtOo Aliis *Ghobar*, جبار

50. RUELLIA GUTTATA. *foliis ovato • lanceolath; Jlore albo, guttato.*

DESCR. *Caulis* fruticofus, diffus. *Rami* ercfti, obfolcte quadragonii, fulcati, pubefcentes. *Folia* oppofitaj petiola femipoll. fupra piano; la[^]mina ovato - lanceolata , bipollicari, icabriufcula 1 fubd:nriculata, pubefcente. *Spicitt* terminalcs, imbricate *Bra&ecs* terna?, calyce longiorcs, laterales laxiores, convexiores: exterior plana, fongior> omnes longelanceolate, fcabrae, ciliatse, *Flores* albi; pollicem fere longi, limbus femipoll. larusj lacinia? infimx intrufe, refits ac fornicata? y prorfus ut in *Ruellia intrifa*, at flos fefquimajor, & in. faucc lacinia: intrufae non puncta violacea, fed gume oblongac, pallide-virides.

In monte *Chadra*. Arab. *Kafr. J*-MCΔ* Aliis *Ghobeire* غبيرة

51. RUELLIA ADHJERENS. *HadU.* Arab. *Hamfehed.* حمشه

DESCR. *Flores* albi, subfcfiles. *Stigma* laterale , perpendicularis *Calyx* 5-fidus. *Spicoe* terminales. *Folia* petiolata, bipollicaria, ovato-acuta, profunde crenata, fupra fcabra, fubtus magis fcabra fetis curvis ; quarum ope folia pertinaciter adherent vefimentis & cuti.

ACANTHUS.

52. ACANTHUS EDULisj/o/iV/ *lanceolatis, fubdentatis; fpicis bra&eis Jpinojis.*

DESCR. *Folia* quaterna, in ramulis itcrilibus lanceolata, fubdentata, obtufa, fpinulofa, *Spicw* bipollicaresj inibrictata: denfe quadrifariam *bra&eis* folia fupcran-

fuperantribus, ovato - lanceolatis, nervofis, margine fpinofiflmiis. *Flares* pallide - cxrulefcentes,

Lohajce. Arab. *Sogaf.* Folia edulia cruda, fapida. Scmina recentia in manu mixta faliva, cum fragore diffilire njunt.

53. ACANTHUS ARBOREUS; *tattle arboreo; foliis fnuato-dentatis, Jpinofis,*

DESCR. Arbor vel frutex magnus, 4 cubitorum. *Flares* rubri; fpicis terminalibus. *BraStece* lanceolate, ciliatae fpinis longis, filiformibus, femipollcaribus. *Folia* lincari - lanceolata , nrarginne undata ^ finuata , den* tato-fpinoffl) oppofita , fpirhamalia.

Hadie & Kurmce frcquens. Arab. *Senqf.*



NOVA GENERA.

SIMBULETA-

54. SIMBULETA, *Calyx %-fidus% Corolla campanidata > ringens. Antherce connate.*

DESCR. *Caulis annuus, pedalis, simplex, tenuis, eretus, teres, angulatus.* *Folia* sparsa, propinqua, linearis - filiformia; superiora simplicia, semipoll. inferiors bip.urtira, pollicaria, acuminara, glabra. *Peditnctilus*, racemusterminalis, 4-poll, floribus folirariis, brevirer pedicellaris, nutantibus. Sub fingulis tora&ea foliiformis, linearis. *Calyx*, perianthium 1 - pbyllum, campanulatum, f-fidum, pcrfiflens, laciniis linearibus, aequalibus. *Corolla* monoperala, ringens, alba. *Tuhm* campaniformis, calyce longior. *Limbi* labium fuperius reflexum, bifidum ; inferius longius, trilobum, reftum, lobo medio inflexo, *Filamenta* 4 , corolla inferta, duo longiora, *Autherce* nigne , 4) connar e in laminam quadragonam comprefiam. *Geqpen* ovatum. *Stylus* filiformis. *Stigma* capitatum, globofo-ovatum, ofcliquum. *FniStum* non vidi. Facies plantae prorfus *Refedce* vel *Polyqala*: accedit quoque ad charafterem *Columnece*, antheris connotisj fed peculiaria fibi reservat figna longe plura.

In monte *Kurma* tantum vidi, alibi non# Arab, *Sijmbukt enne-Ihn, ^MJJJ &JLM*J al. Sufal.* -

CHARACHERA.

55. CHAKACHERA. *Calyx duplex, 2- vet ^-phytbu. Corolla labio fuperiore milh, Capfula z-lacularis, bffperma.*

DESCR. *Frutex* diffus, raro cubitalis. *Rami* oppofiri, tereres, conferti. *Folia* oppofita. *Petiolas* femipoll. pftens, fupra planus, pubcfens. *Lamina* pollicaris & ulrra; lanceolata, intcgra. *Stipula* nullse. *Pedunculi* axillares: furfum craffiores, pollicars, fili craffitie; apice /pica poll, quadrifaria, imbricata, tetragona. *Spiculce* involucrum duplex bracteatum: *exterius* 4-phyllo, lanceolatum, crctflum; foliolis duobus oppofitis, brevioribus: *interim* 2-phyllo, foliolis majoribus oppofitis, fupra lacinias invol. exterioris. *Flores* fpicis bracteate oppofiti, conferti; finguli *braBea* triplici ciliata, calyce longiore: exterior latior reliquis, lanceolata, femipoll. dorso angulata; laterales linear-lancollatae. *Calyx* 5-phyllo, ereflus, connivens in cylindrum, lanceolatus, membranaceus, viridis, ciliatus, foliolis duobus interioribus minoribus; perfiftens. *Corolla* alba, monopetala, irrcularis. *Tubus* bafi venrificofus, dein anguftior, filiformis, faux angulla, non claufa. *Limbiis* labio *superiore* nullo; juxta fciues fuperne excifus: *labio inferiore* violaceo, vix unguem longo, trilobo, lobis emarginatis, lareralibus emarginatis. Sape 4 flores vicini in 4 fpicis angulis fimul florenc; mentientes florem unum tetrapet. regul. *Filamenta* 4, corollse tubo adnata, apice libera. *Anthem* ercetae, linear-fubulatric, flavse. *Germen* fuperum, cylindricum, bafi album, glabrum. *Stylus* filiformis, albidus, long, filamentorum. *Stigma* longitudine antherarum apice bidentatum, viride. *Pericardium-*, *Capula* quadtagono-fubulata, bilocularis, difperma. *Semina* bina in quovis loculo, ovata, obtufa, comprefla, ungue elatrico nullo.

In montibus *Hadienxbns.* Arab. *Fretran.* ejj / ^ / Aliis *Char acker.*

56. CHARACHERA VIBURNOIDES. In monte Bar ah.

DESCR. Frurex. *Folia* oppofita, petiolata, lanceolata, bipoll. ferrara, rugofa, fcabra, fubtus albefcenria. *Pedunculi* folitarii, axillares, folio longiorcs, apice gerentes capitulum floruni fefilium,



CLASIS XV.

TETRADYNAMIA.

ANASTATICA-

57. ANASTATICA HIEROCHUNTICA.

DESCR. *Cattlis* proftratus, trichoromus, villofus. *Flores* in trichotomia confrrti; fcmles, albi, *Folia* ovata, craffiufcula, longitudine petiolorum, villofo-hifpida. *Denticnli* terminati glandula, feu callo rubro. *Kdhirc* in defertis rarior. Arab. *Kaf marjam* ^ Ut£= id. eft: *mantis Maria*. Ufus superftitiofus fccminis parturientibusj qua? illain aqua? immictunti & ex mora, qua fe aperit lentiore auc citiore, par turn fibi ominantur levem vel difficlm.

SUBULARIA.

58- SUBULARIA PURPUREA; *foliis cordato-oblongis,fubdentatis.*

DESCR. *Caules* annui, diffufj, teretes, globri, cubitales. *FoKa* cordato-oblonga, obtufa; glabra, fubderirata. *Pedunculi*, racemi termfnales. *Floret* purpiirei, regularcs. *Glandula* intra ftamina breviora. *Siliqna* compreñs, ovales, membrana viridi cinctae ; difl'epimenta contraria, apicc & bad cordaro feu retufo. *Semina* plura. Non edulis.

Mör. Arab. *Bockel*.

LEPIDIUM.

59. LEPIDIUM SQUAMATUM ; *foliis pinnato - mtittffidis; Jloribus hcxandris; Jiliculis fafciculatis, late cordatis^ margine bifariam Jquamis imbricatis.*

Alexandria in defenis vicinis. Arab. *Babrafo&dt. OoLi>j** CAs*.

LUNARIA.

60. LUNARIA SCABRA; *tomentofo -fcabra, Jiliculis oblongis; foliis linearibus.*

DESCR. *Frutex* fpirhamalis, diifufus, farpe cubiralis *Cautei* tercres, viridi-albentes, tomentofo - fcabiri, ut & folia* calyx, filicute. *Folia* alterna, vix poll, fefilia, linearia. *Peduncuti*, racemi nudi terminales. *Pedicelli* florum breves. *Calyx* femipollucaris. *Petala* fufco-virentia, venis bruneis. *Stylus* breviffimus. *Silicitfo* (nondum maturas vidi) oval-oblongse. femipoll. ftylo brevi mucronata?. *Semina* plana, brunca, ala hyalina cinkta. Charácter him. *rediviva* competeret huic nofrs; turn vero illi addenda nota *foliorum cordatorum*.

In defertis *Kdhirinis* ad *Liblab*, florens initio Mart, Arab. *Djarba*, جربا

SISYMBRIUM.

4>1 SISYMBRIUM PINNATIFIDUM ; *filiis glabrh; fotis tyrato-pinnatifidh**

DESCR* *Conks annui, bipedales, teretes, glabri, ratnofi. Folia alterna; petiole nudo; lamina ovata, lyrato - pinnatifida > denticulata, punftis clatis, glabra. Pedunculi racemi terminates. Calyx patens. Corolla calyce longior. Siliquce ereflo-patentes, teretes, glabra?.*

In montibus *Hadienfibus**

HESPERIS.

\$2. HESPERIS ACRISV *fofis oblongo-ovatis, dentato-Jinuatis>glabris faferioridns petiolatis; petalis fubrotundis, obtufis.*

DCSCR. *Radix lufiformis, annua. Caulis pedal is ^ fubangulatus, glaber, ramofus, erc&us. Folia bipoll. oblongo- ovata, obtufa; inferiora perilo femipollucarij fuperiora fefilia, erc&a, ghibra, dentibus finibusque iusequalibus. Peduntuli racemi terminales, nudi, glabri, fpithamales. Pedicelli p&atnctes, filiformes, hifpidi, uniflori. Flores erefli. Calyx ercftus, villofus, apice dehifcens. Corolla > unguis albefcentes, calyce longiorcs: lamina obliqux, ovato-fubrotundae, integral, rufefcentes, interdum vidaces. Glandula nulla ad bafin Staminum, fed pim&um viride extra ftarnina longiora; & intra Ixreviora fpatiolum viridc, fubrugofum. Siliqna pollicares, ercfia?; compreflas, tuberculofae, non tam flirats ; diffepimentum longitudine valvularum, rugofum , in fuis cavitatibus fovens Semina ovata, mirnima.*

In convallibus circa *Kahiram* frequens. Arab. *Sphceri. i^Jrf^ Camelis*
non ingrata planra.: quamvis folia accrими faporis.

BRASSICA.

63. BRASSICA CRASSIFOLIAJ *foliis craffis, pinnatifidis.*

DESCR. Facies *Cardaminis-*, fed charafter Eraflicae: *Calyx ereftus; laciniae bafi & apice dehifcunt; medio arfte claudunt. Flores albo-rufefcentes, in raccmis terminalibus. Glandilce ne&arifera?. Siliquce laeves, curvae, bafi articulo cylindrico a fiindo floris eWatae. Folia pinnatifidj, craffa, laciniis linearibus, patentibus; radicalibus dentatis, Caulis glaber, fpithamalis.*

Ad *Pyramides* freqjuensj medio Januarii florens.

SINAPIS.

64, SIN APIS HARRA; oirV/ *ovalibus, fnuatis, hifpidis\ taute gla'bro; tah/cibur hifphits.*

DESCR,

DESCR* *Folia hirfuta -T radicalia, pinnatifida. Calyx patcntiffTmus. Corolte ungues ereftar. Glandules valde magnte extra ftamina longiora; alia minor, intra breviora. Flos flavus. Siliqitce pendula?, compreffile, in* xqualiter tuberculatce.*

*Kahircv. Arab, Hara ts^la** Pccoribus grata fierba.
Foliorum pulvis in aqua propinatur fceminis gravidis*

KAPHANUS.

65. RAPHANUS LYRATITSJ *fliqiiis teretibus> hifpidis; fotis lyratis| tattle bofi procumbente**

DESCR, *Catties multi ex una radice, bafi procumbentcs, poftea erefti, pedales, hifpidi. Folia infima tripollicari*<*i; omnia lyrata, alterna, viliofa, Flores in racemo rcrninali, pediunculis brevibus, fingulis braftea oblonga, dentata. Calyx villoius, rufcfcens» Petala flava, fauce violacea. Siliqnce tereti - torofo, intus articuhrc, articulo tereti a receptaculo floris elevaro, fubcurvo^ apics lanciatOw*

Prope Pyramides Grzevfes ad agrorum margins & in infula Djefiret ed dâhab inter arundines copiofe; florens Jonuario. • Arab. Rfchdd el barr. *J JU i*

CHEIRANTHUS.

66. CHEIRANTHUS TRISTIS ; *foliis dmtatis; filiquis tortilibus, apice fagktatis.*

DESCR. *Caides fefquipedales; ex ima radice plures, ramofi, decumbentes, teretes, glandulis flavis obfiti. Folia linear-lanceorata, dentato -finuata, villolb -glandulofa, feffliu, alrerna ; inferiors 3-poll. PeduncuK (piece ramorum & caulis terminalcs. Flores feffiles, ercfli, ob caukm decumbsneem fecundi Calyx bafi utrinque gibbus^ glandulofus. Petalo* rum laminae linear-lanceolate, undulatac, margine crtspatXy albs. Glandula ad larus utrunque ft.iminum breviorura, intra ftamina non aderar. Siliqucv bipolllicarc, fflifornics, rorrae, glanduloiae, ad apicem magno utrinque denticulo retro- {pe&ante. Sed nondum raarurs erant.*

*Kihirce ad pagum CaidBcy, 'n margin'e agri hordeo confiti, florins inirio Marr. Arab. Nrcgcifi SMXXI vd Schndjara a^l** Capris fineftidima planta,*

Varietatem babui, c deferro prope Liblab ; pet alts fu/h-vireiitibus, venis violaceis, folivnim dentthus mhwrib us | extera figna eadem, Hanc vocubant Noöomanie «Ail->si & drafticam effe J rccenreinquc dofi 3§ validum purgans -y vcrum hoc competit Euphorbia: > quae vera Noöomania eft.

67. CHEIRANTHUS LINEARIS ; *foliis HnearibUs[^] tomentojis j cauk ramofo, diffu/b.*

*Flores violacei. Siliqu[^]e edentulae. Scmina margine hyalino cincta.
Beit eljakih.*

68. CHEIRANTHUS VILLOSUSJ *taulibns decwnbentibus; foliis villofo-Jcabris, linearibiis, remote dentntis; Jloribus JeJJilibus.*

DESCR. *Rami teretes, villofi. Folia dentara* obtufa, fparfa. Flores violacei. Stamina -bafi latiora; glandMa nulla, Silicuh rcfla?; apice dentc utrinque fubalato.*

Alexandria. Arab. Mantur.

BUNIAS.

69. BUNIAS ORIENTALIS.

DESCR. *Folia feffilia, alterna, ovalia, breviflma. Flores racemofii. Stamina fubxqualia. Semina ancipitia, utrinque gibbo medio, muricaro. Fruticulus.*

Arab, Dorama| aliis Chodeira. Banjanis cdulis.

CLEOME.

70. CLEOME DIGITATA ; *foliis hijtrioribus digitntis, fuperioribus ternatis.*

Caules (Iriān, villofo-hifpidi. Foliola pollicaria. Flores hexandri.

Surdidt in arvis. Arab. Bijf چس

71. CLEOME ANGCJSTIFOLIA[^] *jloribiis hexavdris; corolla ad latus fuperius po* Jit a; Jlaminibus Jiirgentibus; foliis digit atis, linearibus.*

DESCR. *Planta annui, cubitalis, tress, ramofa. Folia alterna; petiolo bipol. Kcari, tereti j lamina digitata, foliolis pollic. latitudine petioli, plana , linearia, glabra, craflifcula. Racemi terminales. Pcdnnncnli> folio ternato, Jinearif fufulti, patentes, refl, fefquipoll. teretes, folitarii, uniflori. Calyx 4-phylus, .Tqualis. Corolla 4-petala, flava : petala omnia ad latus fuperius congefta, bafi violacea; exterior a majora, obovata; interiora duo duplo breviora, lineari - oblonga. Filamenta 6, violacea, per paria furfum gradatim breviora ; paria duo inferior*! apice furgentia: antheris ereftis, pone nigris, ante flavis. Par fupremum ftcrile; apice clavatum, flavum; rudimento anthersE globofo, flavo, parvo, fefili in apice filamertri. Siliqua bipollicaris, fubulata, primum patens > dein pendula. Semhta glabra.*

Circa Taas paflim ad margines agrorutn.

ISATIS.

ISATIS.

72. ISATIS JEGYPT1A,

DESCR. *Folia carnofa*, o'blonga, petiolata, crenato-finuata. *Calyx*, exlicate flore, inferne hians. *Corolla p.lliidc* - violacea. *SUUufa compreffofubulatae*, deciduce, fubdifpermae. *Caulii procumbens*.

Alexandria, vernalis. Arab. *Fidjleldjemal*.

73, ISATIS PINNATAJ *foliis cariwijf) pinnatis, fubdentatib.*

Flos & filkula ut in priore. *Caulis laevis*, procumbens,
Alexandria & Natotice.



NOVA GENERA.

ZILLA.

74. ZILLA MYAGUIOIDES. Arab. *Zillce*. *)j>

DESCR. *Radix annua*. . *Caulis ereftus*, fefquiifpith. ramofo-dichotomus, tcrs, glaber, (inatiis , rerminatus *fpina* duplii, pollicari , rigiJa, viridi. *Folia haftato-lanceolata*, denrata, alcerna, pollicaria. *Flores verfus apiccm* caulis & ramorum inter folia, racemoli, alrerni, laterales, ncc axillares, nequo braOiea inftruQi. *Petala albido - violacea*. *Glandula magna*'inter ftamina breviora & piftillum; alrerajnter longiora & calyccm. *Stamina* non bifida. *Germen globofum*, exiguum, viride, ftriis violiceis. *Stylus cylindricas*. *Stigma obfolete bilabiarutn*. *fruGlum* non vidi, niS prioris «nni, delapfum: magnitudine majoris pifi, cum mucronc ex *ftyh* fublato: globus erat albidus, rugofus, fulco urrinque lonptudinali. *Pulpa'* fpongiofa, arfle adharens nuci offae, globofe, <:arinis fex, loculis 2 ; in fingulo *Semen* parvum, lenticulare, ferrugineum: non dehifcit fruttus, fed totus dclabirur.

In deferris *Kahirinis*, florens inirio Mart. Here eft *Vejlingii Uraffica jfigypt. spinofa*, fed male depi&a. An vero pertincat ad *Myagrum incertus fum*. Cerre Glandulx fitus inter ftamina breviora & extra longiora, atque Fruclus indoles repugnant,

75. ZILLA; *ramis pcpndicularibns, alternis, confertis; foliis radicalibus ftfqiii-pollicaribus, ob/ongis, incequaliter erqfisy bafi obliquis*.

Kdhira. An pro specie vel varietate habenda fit, nefcio. Flos & fruQus fñmiles.

MNEMOSILLA.

76. MNEMOSILLA ^GYPTIACA ; *cahjce diphyUo\ corolla tetrapetata, mtalh mutatis j foliis bipinnatis, fantatis, gkbris.*

DESCR. *Radix annua. Caulis procumbens, prostratus, pedalis, vix folipfus, nifi ad exitum Peduncnhruin, ejus raro axillares, fā?ps terminates, umbelhti. j^b/fā bipinnata> dentata, glabra. Flores pedicellati, flavi. Calyx diphyllos, foliolis oppofitis, ovato - acutis, planis, corolla brvioribus, Cerrato-dentatris. Corolla irucquahs, terrapctala> limbo patcntc. Pctala cruciate per-puria; & disc laciniae calycis in petala routaca:. Duo petnla, calyci oppofita contrarra , majora: lamina colorata, transverfe - oblonga: finibus duobus & lōbo inrermideo ovjro , obtuso. Duo reliqua calyci parallel, minoni ; unguibus lincaribus, extrorfum cinalicularis: lamina coloratj, bipartite, lincarf - obtusa. Filament a 4 lon?Jora humilius fita, receptaculo inferta, attenuata, plana: ant her a fimplices, creftie, longitudine fihmcnromm, circa ftigm.i connarsc; liirgemc vero germe foedunt. 2 breviora, altiora , inferia petalis ad basim lamina:, anthem limplicibus, patentibus, majoribus reliquis. Germen lincarc, compreffum. Stylus nullus. Stigma bipartitum, fubulatum, incurvum, colorarum. Pericarpium: Jiliqua teres, torofo-articulata, curvata, farcta aniculis coriaccis , tcretibus, oblongis, medio anguftatis , utraque extremitate truncatis, apertis : articulatim delabitur , non dififtit. Semina: in medio cujusvis articuli unum> globolum,*

Alexandria in peninula Ras ettin copioej florens fine Martii.

Facies plantaj procul inftar Geranii^ tamen fingulari appetet ftruQura.

OBS. Hanc' plantain, venupta florls ftruChiva, prse cacteris iEgyptiaci^ Ceh Indav-Hrit fibi vindicafTe ftiorem, ip(e ingenu teftatur iif fchedula defcriotioni adjeft!a## Verum & priam ejus notitiam non fimplici acquifivit pretio,* dum in itinere terredri Káhiram inter & ALcxandriam Arabum vagantium manu obfelliſ & fpoliotus, magno vita: cum difcrimine elapius eft. Se fuamqu: ergo Mncmofillam modefte cominendat Botanicis, quibus Denominationis novarum plntarum competit jus, fi tot pericula, laboros & officia prsmiolo hoc digna ceneantur. Verecunclha:c defideria C7. AuBorh premere noluimus, qui totum hunc plantarum fafciculum illi fuperftitem curavimus. (Editor.)

CLASSIS XVI.
MONADELPHIA,
GERANIUM.

77. GERANIUM HIRTUM ; *peduneutis multifloris; calyce pentaphyllo| Jloribux pentandris ; foliis petiolalis, triangularibus > bipinnatifidis, hirjiitis.*

DESCR. *Radix lignofa, perennis, Caules annui, fefquifpith. articuiati, ad genicula gibbi, dichotomic ere&o-diffusi, villofi. Folia ad genicula oppofira; infcriora majara» villofa; petiole tripail. villofo* fupra unifulcaro. Lamina fcfquipoH. cordato- trianguljris, pinnatifida; laciinis lancollaris, acutis. S-iipuLv utrinque folitaria*, mcRibranacco!, hnceolatx>rufcfcentes, connatte in vaginam circa -caulem una cum bafi pctiolorum. Pedunculi umbelata fimplices, terminales, farpe s-flori, involucris membranaceis, aibidis» ovatis. Fhres violacco-xubri. Pedicelli florifcri, trcfti, frutlifcrij ad unum latus dependentes, FruSus ereftus> rubens> vix villofus, bipollcaris,*

78. GERANIUM MALACOIDESJÖW *cordato-wat's> fitmath, crtnat'S) eras-fnfmlis.*

Cotykdones cordato - otliquae, obtu(W.

Arab. *Garna vel Djarna. U^A. Camelis, Ovibus & Capris gratum.*

Variat: {&} fotiis trillofif> *cordato - ovatis, crenato-fiuatis.*

79. GERANIUM CRASSITOLIUM ; *foliis glalris, crajpujbulis, infertoribns cordatis, Inprioribus oblongis; vnnibttf crenato - lobatis.*

Arab. *Tummajr. Aliis Kabfjit.*

go. GERANIUM CICONIUM; *foliis bipinnatis, acutis, incip; peduneutis multifloris| calycibut \$-phyttis|jloribuspentundris^ caufoprocunbente.*

81. GERANIUM TRIANGULAREJ *foln's triangularibusy fub-pinnatifidis, dentatis> vix villoJiT.*

OBS. Omnia Juec Gerania JGgyptiaca funt: *dicbotomn; ptduncnlk muhrftoris; jlamibus 5 JinihLuh*

82. GI&ANIUM ARABICUM; *Jiaminibus io₃ fertilibus} pedunculis bints; fe**
His rotuudis, incijis.

In Temen frequens. Arab. *Talab* yel *Ch&da.* _m Aliis *Ghajl.*

Variat: cc) *Flore albo.*

/3) *Flore rubro, hnfi fufcefcnnte.*

Ufus medicus: in Cephalalgia lavatur caput Geranio in aqua cofto.

SIDA.

83. SIDA CORDIFOLIA. *Lohajce.* Arab. *Reñ.*

DESCR. Fruticulofa. *Folia* subpollicaria, cordato - orbicuhta; dentato - fcrrata; tomentofi. *Calyx* simplex, 5 -fidus, campanulatus, perfiftens. *Capful®* femper difpernuej (quod contra charaft. Gen.)

84. SIDA OVATA; *foliis ovato - oblovgis, ferratis J pedunculis axillaribus, Jolitarris unifloris, petiolo brevioribus.*

Surdūd.

85. SIDA PANICULATA? *Mor* difla *Reñ.* ^ ^ ^ Ad *Uahfdt:* *Ghobari.* {£/&+&

Folia corduto - acuta, fcrrato-dcntata: fubtus vix tomenrofa, quamvis albcfcunt; fupcrne viridia, glabra. Caules, Pctioli, calyces 'hirfutiufculi. *Pediivculi* axillares, iblitarii, uniflori, filiformes; petiolo Teiquilongiores. *Flores* fulvi,

MALVA.

86. MALVA MONTANA J *eaule decnmbente; foliis 5-/0^//, ferratis, villo/is, mollibus; ccilycibus axillaribus , glomeratis, villojis.*

Hadk. Arab. *Hörod* حورود

URENA.

87. URENA OVALIFOLIAJ *foliis cordato - ovalibus, ferratis, hifpidis.*

DESCR. *Fruirx* cubitalis, ramofus, diffusus. *Caules* teretes, hilpidi, tcnucs. *Folia* alrern^, 2. - poll remota. *Petiolum* poll, fubtus convexus, fupra planus, hifpidus. *Lamina* fcfquipoll. cordato • ovalis, utrinque hifpida, lumbus pallidior, fupra obfcure - viridis, obtufa, groffe crenata, crenis cum aciynine, patens. *Stipules* bina:, linear-lanceolatse, breves, creche, virides. *Petioli* axillares > folitarii, petiolo triplo cra(17)ores, longiorcs, poll, uniflori, hifpidi. *Calyx exterior* 5-partitus, interior! brcvior, laciniis lanccolatis, hifpidis *Interior* 5 -fidus, bafi 5-carinatus, li'mbi laciniis triangularibus, kuoribus calyce extcriore. *Corolla* calycc duplo-longior,

longior, flava, bafi violaceo - ferruginea. *Petala* j, oblique cuneara, obtufa, unguibus ciliatis, columns ihmminifera infertis. *Stamina* monadelpha, connata in cōkimnam fubulatam; filamentorum apices liberi, patentissimi. *Anthera* globofir, flavce. *Stigmata* fupereminc̄ntia f, apice clayara, cjpitulo rubro, orbiculari, depreflb, ciliato, inferne intra tu- bum ftaminiforum coidunata in It/lum cylindricum, album.

Montola loca circa Taws inhabitat.

GOSSYPIUM.

88. GOSSYPIUM RUBRUM. Arab. *Otb.* *Badf**. aliis *Odjdf.* O^I^J

Cautis fruticofus. *Folia* lobis quinis, obtufis. *Flores* & venje foliorum obfcure rubentcs. *Calyx* exterior puniceus,, integer« vcl apice tridcn-tatus.

89. GOSSYPIUM AREORBUM; fioribus flavis; invohcUr viridibiis, mittidentatis)foliorum laciniis ovali-acutis.

HIBISCUS.

So. HIBISCUS FICULNEUS.

DESCR. *Caulis* hifpidus; non aculeatus. *Folia* 5<fidia> palmata, fetis rigidis hifpida. *Capfula* 5 - locularis > fetofa.

Alexandria?* Bamie. بامية

91. HIBISCUS ^SCULENTUSJ *capfula* 10-loculari, glabra*, *follis* divijis; *frufitn* glabro, fpithamali.

Kahirce. Arab. *Bamia fchdmi* vel *Jtambūli*, aut *rumū*

92. HIBISCUS PRJECOX; *cappita* \$-lomlari, hifpida; *fruftu* triptoticarijifpido. Facies *Hib. escul.* Fruftus lapidior. Caulis annuus, tamen magnus, fere fruticofus.

Kdhira. Arab. *Bamia Uaki* vcl *Bceltdū*

93. HIBISCUS SYRIACUS.

Cofitur in hortis iE;jypti; floribus splendidis; aut totis violaceis, vel albis> baji rubris. *Calyx* exterior 6, 7> 8-fidus.

94.. HIBISCUS FLAVUS; *floribus detandris; foliis petiotatis, ovalibus, ferratis, obtusis, fimbriatis**

DESCR. Fruticulus. *Folia digito transverfo breviora. Petiola 8c rami fasciati. Pedunculi axillares, foliarii, uniflori, filiformes, peciolo fsepe longiores. Stipules parvae, filiformes. Calyx exterior 9-physis, filiformis. Flores flavi. Stamina 10 - 16. Stigmata 10.*

Lohcijcvy florens medio Febr<

B) An varietas? /o/«x eordatis, ferratis, vittofif, femipollcaribus J tault fraticqfhi /lore Jkivoy poiicari, bajj ferrugineae.

Circa /&*/ rarius.

95. HIBISCUS PURPUREUS; /b/r// eordato-obtongh, tenuis, seiratis; floribus purpureis, Jligmatibis 5, longis, fl/7/r[^] capitatis; capida Jitpernc septemalata.

Hadiē vidī prorfus similem, quoad flores & folia capfu/a ghbofa, villosa, tnosti, piji mngnitudhu.

.Arab. Chobcex. #*=> Aliis سعی

96. HIHISCUS TRIPARTITUS; /o///> trip.crtitif, hbis lanecolath, ferratis; pediunculis axillarilms, fru&u quadruplo brzvioribus| cattle & cahjee ciculeato-hispidis| capfulis pilofir.

97. HIBISCUS PALMATUS; foliis pafmath, dclitntis[^] glabrir, hipollcaribus| caule hi/pidv; calycis exterioris leuniis lincaribus.

Prope Mochhanu

STEWARTIA.

9\$. STEWARTIA CORCHOROIDES; foliis ovutis, ferratis, subtus villojis.

Caulis iruticulofus, fefquipedalis, Flores parvi, flavi. Capfnlcz 5, fcpxata?[^] bicornes,

CAMELLIA.

99. CAMELLIA GFRANDIFLORA ; /o/«> petiolath, eordatis, obtijis, integris; calye inflate| tubo corolla? quadripollcarū

DESCR. Frutex diffusus, cubitalis Cauks trachiati, teretcs, hilpidi, lētis albis 4 brevibus, filiformibus, rigidis» confertis, patehtiflmis ; arculis pollicaribus,

poUicaribus, apice incraflaris. *Folia* oppofita ac! $\cdot\cdot\cdot$ ui,t , pctiolo fcmi-
pollicari, tcreti, hifpido ; *lamina* plus cjuam pallicari, cordata, obtufa,
mtegra, parce vnofaj utrinque tubercnloia, hifpida. *Flores* terminates ra-
morum, folitarii, icffiles, fuffulri foFiis duobus. *Calyx* fere poll, j-pmirus,
.5 -nngul. tnflatusj laciniis lanceohtis, conniventibus. *Corolla* alba, tubo cy-
lindrico, 4. polh limbo patents poll. 5 - fido, fob - reguhri. *Stamina* filamcñ-
ra^, corolk'inferra, apice libera, fed bina utrinque connexa, antcquam
inferantur corolla. *Jtfthera* in fauce .corolte liaeares, ereftic, alb^e,
femiunguem longa?, bafi fiflic. *Pcficarpinm:* capfula ovata, 4-fukata,
bilocularis, femioibus rcnfionibus quaternis in loculo, cum nnguibus
elafticis altcrnis.

Ad *Taas* in montibus^



NOVUM GENUS.

ELCAJA.

100. ELCAJA^ *Monogyna, decandra; Jtaminihus aqualihu*s.

DESCR. Arbor grandis* *Kami* alterni^ viflofi. *Folia* altrerna, pinnata cum
impari, patentia; petiolo tereti, villofo, fpitbamali. *Folio/a* quadrijuga,
pedicellata, ovali - oblonga, exteriora aujora y infinia bipoll. extima trf-
poll. glabra, integra. *Stipule?* nulte. *Peduncnli* corymbi axillars , tcr-
minales, rotundati; paniculx confertse. *Flores* conferri, brcviter pedi-
cellari; /quanta braflcalij ovata, viridi, pateiite. *Calyx;* perianthium
campanulatum, i-phylkim, j-p.irtitum, villofum; laciniis orbiculatis,
craffis, ereflis, viridibus; binse mafriae externs, binat interna?; una
marginе dextro exterна; finiftro interna. *Corolla?* petala 5, calycc
longiora> linearia, recurva, bafi plana, apice obtufa, fubtus gibba, fu-
pra excavata, extus & marginе villofa, viridi-flava; ante exptcationem
Imbricata contra folem , feu marginе dextro exrerna, finifbo interna.
Filamaita 10, alba, linearia, squalid, connata ad dimidium in prifma
4-gonum, apice viHofa, ere&i. *Antherce* fimpliccs , recurvie, óvat«
extus fquammatce bina^ ex apice filamenti. *Germen* appet nullum *Stylus*
filiformis, Villofus. *Sthnna* capitatum, globofum. *Pericarphun;* capfula
obovata> bafi anguftata, pollicaris, tomentofa, trivalvis, rnlocularis, tri-

gona.

gona , lacunofj ; in medio valvarum fulcus, *Scmina* bina in loculo, oblonga, latere exteriore convexa; duobus intrioribus plana.

In montibus *Ternen* frcquncs. Arab. *Koka*. V[^] Floris facies cum *Citro* convenit. Fruftus venalis proftat *Beit elfakih*; mifctur cum odoriferis, quibus Arabum fccminse caput lavant. Liber Arabia) fdiomate fcriprus tirulo: *Scharh elmoudjiz*, hunc fruQum, vomitorium efic perhiber, & appellavi *Djouz tlkai*; unde & nos literature reltauravimus romcn.

Contra *Pforam* femina matiura iDifccntur in unguentum cum oleo **Scfum**.



DESCRIPTIONES P L A N T A R U M.

C E N T U R I A
QUINTA.


CLASSES XFIL—*XIX*

DIADELPHIA. POLYADELPHIA. SYNGENESIA.



CLASSIS XVIL

DIADELPHIA.



ONONIS-

1. **O**(NONIS CHERLERI ; *pednnmlis unifloris > filo appendhnatis; cautibus fw-bricath, comprtjfiis; laciniis foliorum tomentojis, dent at is.*

DESCR. *Folia* inferiora majora, valde dcnrataj junior*, magis fucculenta, hcmifpbxrica, supra cnnaliculaia, oppofiu, conferta, ut caulis apparcac imbricatus & tjuafi una cum foliis comprefliis. *Stipvice* juniorcs con-natie cum folia simplici, iñferiorcs hiKcalarar, mcmbranaçcxp, dentara?. *Pedtmculi* axillarcs, vcrfns apiccm caulis, breves, curvi, villofi, filo brcvi fupcrne in medio dorfi appendiculati. Tora planta vix fpicham. Chiraçler ell *Cherleri*: fed folia ad exitum ramorum rernataj caeterum folitaria & contiam cum (tipulis- in folium rrifido-palmatum.

Frequens in collibus pcniñfula.¹ Rds et fin, Alexandria.

OBS. Hanc 'Ononidin diverfo mini tempore infpexi. Prima deicriptio facia eft menibus (icciflimx cempc-ftaiis. Aliam monftrabat facie in eadem planta nquis pluvisquc rigata. Jain floiculis mngnis floitbar; foliis omnibus rernaris, fern ip oil. reinocis; ftdco ut caulis IICHI denfe fuerit imbricacus nee comproflus; excepcis couibus parvis. Rigidio Botanico injungitur (tudium ohfervandi Plantavum iEgyptiarum Mctamorybojin antumnahm & vernalon.

2. ONONIS SF.RRATA*, *peduncnlis axillaritms unijloris | foliis terizatis, /errata* dentatis; fibre albo; uexrllo rubicunda.*

Alexandria?.

3# ONONIS FLAVAi *foliis Urnatis, /ubrottuidis; floribus flavis J vexillo Jtriath| Jtigmafe favi.*

Djbbce.

4. ONONIS QJJINATAJ *foliis quinatis, integris, euneatis, /effilibus | floribus /effilibus, Jhbqnaternis.*

DESCR. *Caulis* frutiofus atticudine 3 ulnar. digitl craditie; decumbens, incrmis, *Folia* craffiuçula, vix femipollucaria. *Flores* parvi, albi, un-gucm longi. *Cari7ta* apice fusca. *Vexillum* ftriis violaccis, bafi violafeens. *Pedicelli* breves, axillares , 2 vcl 4-flori, fcfcjuiunguem longi. *Lcgumen* difpermum, breviter pcdiccllitum.

In monte C/iadra,


LUPINUS.

LUPINUS.

5. LUPINUS TERMISJ *talycibus alternis, appendiculatis, laiio utroque Integra acuto,*

DESCR. *Caulks* 5-pedalis, hirfutus. *Folia* dligirata, quina, fcna. *Foliola* oblonga, obruiā, exrrorfum latiora*, fubtus hirfuta, supra glabra, fefqui* poll. *Flores* in racemo terminali, alterni, albi vel caerulei.. *Pedunculi* villofi. *Cahfx* villofus, appendicc filiformi, fcrruginei colons. *Carina* apex cxrulco - vjndis.

Colitur in JE'iypto. Pedunculi <:rudi cduntur, ilccorticati J pifa coquuntur.

Arab. Tennis. 

OBS. *Fuhis syrius* (arob. *Barnd*) componitur.: *Nitri* 6 Rotl. quod feinpei' depnratum fumirur; *Sulphuric* 1 Rotl. *Carlwmnn* t Rotl. hujus prafertim Lupini, qui emniiim leviflifi putantur. *Satix dc Vit'u* proxime huic accedunt; fed in proportione if* Rotl. ad 6 Rotl. nirri. S compacloribus lignis uteadum eric, proportio ascendit usque ad 2 rel 3 Rotl. Caibones lie parantur: cauks Lupini denie infarinantur foveae terra?; supra ignis additur, & mox humo obruitur.c ^eniiiii teta farrago iu caibones tranfit.

6. LUPINUS DIGITATUSJ *calyribus verticillatis, appcndiculatis, folio fuperiori bipartite, injeriori integro**

DESCR. *Radix* perennis. *CauKs* cubicalis, ereclus, ad bafin hirfutus. *Rami* axillar.es. *Folia* \ peiiohrs. fubulatis: infimis spirrh. hirfuris, bad dilatatis; oppendiculo urrinque filiformi, ereflo, Tiurfuro. *Lamina* digitaw; fepe 9 folios complicatis , fefquipoll. cuneiforniribus , hirfutis. *Pedunculi* vcrlicilli ad npicem caulis & rnmorum, nudi. *Jerthitins* floribus quaternis vcl quinis, pedicello ercfti, *carina* alba, apicc flavefecnte, 4ilis cxruleis, vxiilo cjcrulco, macula flava. *Calyx* villofus, supra biparrfc tus, infra integer, lafciniis lanccolatis, femipoll. ijppendiculo utrincjuc filiformi, flaveiccnte. *Siliqtut* vrticales, hiriutx, lulcis improffis.

In *Delta* ad pagum Ntdjil. Copiofc in agris, an Ipomaneus, ncfcio.

COLUTEA-

7, COLUTEA SPINOSA; *fruticofa\ foliolis ouato-ohhngis; fpinis Jiliformbtts, folio duplo longiori&us.*

DESCR. *Frutex* fefquiped. diffufus, ramofiflimus, fcrc in globuni crccfcns. *Kami* cinerei, lignofi, conferti, fpinofi. *Spina* patentes, fpiralitcr alxmx, tripollicares, fubulatte, acutiffima?, apice flavicante, bafi tribus lincis clatis dcurrntcs, omqcs ortae ex induratis rachibus foliorura. *Ramuli* axillares fpinarum breves, fuperiorcs gi-adatim majores: longifllmi femipollicares, ipi fpinofi ex rachibus foliorum anriquis. *Folia*

ad apicem finguli ramuli 2, vel 3, vel 4 confertiflma; in fuprioribus ramulis fenfim nujora, fuprema maxima, rachi pollicari> viridi, villofa> rigida, mucronaca.* poftea in fpinam murandaj fuperiori dimidio foliofa, foliolis 4-jugis, oblongis, utrinque villofis. *Stipnle* du<T, ovato-lan-ceolatac, mcmbranacca?, alba?, rachi adnarx, bad in vagium connate. *Pediimuli* ad apicem cujusvis ramuli duo, finguli ex ala folii, filiformes, villofi, patentes, prope apicem geniculo cum fquama membranacea conciva, villofa, alba, ovata *Flores* crœfli, nlbido-fl-ivicantes, omnes in ramulis. *Calyx* cylindricus, hirfutus, mulriftriarus, dentibus creclis, bafi appendicibus 2 filiformibus, oppofitis, brevibus , villofis. *Vixilturn* obovatum, complicatum. *Carina* & *Ala*> longitudine vexilli. *Stigma* nonnifi in adulcioribus floribus barbatum, apice folo, non linca hirfuta ad medium ftyli. (cfr. Gen. PI.) *Frufius*; calyx inflatus in cradTiem |. poll, albido-pellucidus, filiquam totam villoiam includens. *Legitmen* imiloculare, trifpermum.

In defcertis *Kdhirinis* ad *Libliib*: florens medio Januar. vel initio Mart. Arab *KedddJ.* ^ jj £ = Dcpis in *Ruffel Nut. Hil%* of Aleppo. Tab. 5. nomine *Tragacanthce Orient, vefcaricr*; calycis hirfurie cx-prcfia non eft. *Cameli* hanc plantain, omnium fpinofillimam, edunt; ne* & ilia fine palato efct.

DOLICHOS.

8. DOLICHOS SINENSIS ; *pediinculis racemofis; cirrhis nullis; jipliolis ternatis, Jlipulatis, ovato - lavceohis.*

DESCR. *Caulis* volubilis, ultra 2 ulnar. *Folia* bipoll. villofa, medium longius, pedicellatum: *Jlipnlis* binis miuimis fquamiformibus , Luiceolitis. *Vexillum* latum, cmarginatum, ftriatum. *Carina* ante, feu verius vexillum in curvatura connata: pone, rupta bafi: ungue rigido, incurvo, callo prominente, femiorbiculato. *Ala* utraque verfus bafin alicula longiore, oblonga, verfus vexilli bafin extenfa. *Stigma* barbatum. *Flores* fljvi. *SuiquiP* villofa:, torulofa:, vclut articulate pro quovis pifo, quamvis intus unilocuhres.

Ad foſias agrorum prope *Nilum* radice aquis immerfa, Arab. *Hollaeh*.

9. DOLTCHOS FABA NIGRITA.

DESCR Fruciccm vidi ununi *Djidde* plantatum. *Caulis* volubilis. *Foliota* exfipulafa, ovata, i;abra, iutegra, fcfquipoll *Flores* violaceos e longquo vidi, fed examinandi copiam mihi prarripiur Gryllorum manipulas, qui iljos momento citius devalUbat. *Legnmua* pcndula, linca* ria,

ria, compreffa, crafla, dorfo planata, mucrone terminata» venrre convexa, 4 poll, longa. *Fab** membrana incrjcta conjunctae, purpurea?, pollicc longiores.

Fruftus *Kdhiram* afportatur cum *Carvana Nigritarum*, ex *Abyffmia*. Fccminis ac infamibus vilioris ordinis pro nioniK & ornamcntis penfilibus c(t ; duo conftant i para. Vocabur *Ful Djelldbe* > vcl *Ful borabra*: i c. *Faba Nigritarum*.

Advehunrur e *Syria* & *Grwcia* Fabx diftae *Habb el hdoc*, qua? ctiam mundo mulicbri inferviunt.

10. DOLICHOS FABA INDICA | *tank volubilhy foliolisppitlatis*> *ovatir, repan* dis, acuminatis, pallide viridibm, ventis Jiibtns vinfcntibus*.

D|iddce. Arab. *Ful hendi*; id eft : *faba indica*. Florem & fruftum non vidi; ob formae convenientiam ad hoc genus refero.

11. DOLICHOS* LUBIA ; *canle dtffnfo* ; *pednnctih axillaridur tongiffimir, apice racemqjis; legumiuibus ereffis, polyfpermis*.

DESCR. *Caulis* annuus, fefcjuipcd. procumbens, teres» glaber. *Petioli* alrerni, tripollicares, bafi gibbi, lupa plant, emarginati. *Folia* ad apicem ternaj infima oppofira, ovaria, bipollicaria; fingula petiolo proprio, tcreri. *Stipulce* utrinque folicariae, lanceolara> erefte. *Alhulv* duac ad bafin ptiolorum foliorufti infimorum: *alfce dim* ad bafin petioli folii intermedii. *Peduncnli* axillares, teretes, pedales, nudi, apice racemofo fpicati *Flares* conferti, pedicellati, patentes> verricalirer compreffi, flavi. *Calyx* 5-dentatus, dentibus 2 iiiprcmis obtufis, infimo longiore. *Fhcillum* fempcr complicatuin, inrrorfum albidum, caljo utrinque obliquo, elato, extra alam. *Alee* ca?rulex, bafi emarginati lupra. *Carina* complicata, albida. *Stylus* apice hirfutus. *Sterna* gibbo viridi, globofo, (ubtus callo conico, patentc. *hegumina* feffilia, ercila, teretia, compreffa, fabra, fpitham. decemfperma.

Arab. *Lubia baledi*. In agris *M^jpti* frequens, culrus : feritur inirio Januarii: Ineunre Junio floret. Legumina cotb & deinde oleo.ac accto mixta Laftucae mftar, fapidifflma lunt. Aucbrcs plurimi hunc dixrunt *Phafeolum*, qui verus ramsn Dolichos.

12. DOLICHOS DIDJRE; *cattle volubili*; *Jipulis marqhie reflexis, obtufis*.

Foliola lateralia bafi extrorfum gibba; *medium* rhombeo-lanceolanim.

Lohaje. Arab. *Didjre tya* J An hce norat sufficiant ad fpeciem diverfim confituendani, non judicaverim; nam in ca?tcris fignis cum *Dot. Inhia* convenir,

13. DOLTCHOS JESCHYNOME SESBAN j vcl Sejfeban سیسبان

DESCR. *Vaulis* obfolere-angulatus, glabcr," (pongiofijs. *Stipnlarum* loco callus utrinque elatus. *Petiolus* bafi articulo crafto , coriacco. *Foliola* oppofira, brcvi petiole*, linearia, obtufa cum acumine , eequalia, 14-18 -juga. *Pedunculi* racemoii. *Flores* flavi. *Calyx* brcvis, sequalis , ? -dentatus. *Vexillwni* cordate - emarginarum, fubrus ferrugineo - punGatum, *ungue* lincari, inciirvo^, inrerne duas aliculas formante lanccolatas, crctas, icotinientes. *AL?* oblongs, b~~af~~ in angulum acutum ^pvoduflx: intra illas 2 calli cornuti vxilli. *Carina* albida, pone fiflura longa, dchifcnce , anticc truncato-emarginata , urrinque acumine Unckokno-*Stamina* non onmia bafi coalita; decimuin diftiuftifllmum : ergo *jEfchytome* efic ncquit hxc fpecies. *Lequmina* fefquifpith. urrinque dorfara, glabra z cxrus torofa ad (Ingula piiâ *: intus ifthmis intercepta. *Semina* oblonga, unum in quovis artcnlo, *Coronilla* non eft hxc plants, quia calyx non bifidus , & huic ake ad vexilla*

[^]Egyptiis uriliffinia planta ad *Sepes* vivts circa hortos & agros; denfe & cito excrefeir, praeftantiffimo afpeflu. Urilis deinde foco, & hanc ob caufTim copiofc culta. Scroina feruntur in foftulis; potidimum ad Canales; large enim inigantur. Annuo intervallo Caulis 4 , ulnar. attigit altitudinem, craRlticm hraclii. Poll: ires annas rami adulti & utilcs.

14. DOLICHOS ARBORros ; *Jloribtis ferrughieis*; taudice arboreo.

DESCR. *Stigma* capitulo fub-barbato levifi?me. *Filamenttim* decimum totum liberum. Calli vexilli lanceolati imra alas. Tot notae sufficiuat ad Speciem ver; m confituendam.

Ad *Uadi Zebtd.* Arab. *Sefebdn.*

15. DOLICHOS CULTRATUS j caiite volubili\$ kguminibus racemofit, compreffts, dorfo . ventrequc tuberculath; foliolis ovatis, aciitis, glabris^jloribus xilbis.

Lohaja. Arab. *Didjre vel Kefcht.*

16. DOLICHOS CUNEIFOLIUS; foliis *Jimpliribus**, *Jiliquis* racemofis , pendulh. evjiformibus, tornutis.

M6r. Arab. *KolkoL J£^j£ Florcs* flavi ; femina minuta.

17. DOLICHOS POLYSTACHIOS.

DESCR. *Foliola* exftipulata, late-ovata, medio majori , bipollicaria. *Petiol* bafi incräftati. *PeditncvJi* axillares, fefquifpith: Ipatiomidi, dcin fpicatij vernteis

verrucis promhwntibus, ahernis, cui fungufe infcruntur *pedicelli* bini. *Calyx* tubulofus. *Corolla* purpurea. *Vexillum* fubromndum, cmargi- nauun, bafi album j callis gibl>ofi&, craffis. *Carina* bad & apicc bifida. *Legumina* spithamalia, polf. law, plus \$ poll craffa, lateribus parallels* dorfo piano, inaequali, margins angularo, bafi curvo, dcrn re&o; vcn- tre convexo> parum wnalicufato. *Semina* a, fungifa in peculiar! ROCUO. *lldr.* *Hadie.* Arab. *Sjef.* <-*سجف* Scmiua matura fi comedumur, alvum ciimt.

LATHYRUS.

ig. LATHYRUS SPECTABILIS; eaule vokbiliifeliolis *ftfqüütrijugis*> binis fitis interjects.

DESCR. *Petioli* bafi incraflati, *Foliota* vix pollicaria, ovata, retufa, cum feta. *Pedunculi* axillares, folirarii, uniflori: in medio fquamis 2 lanceo-ktisV oppoliris, ercftis *Calyx* tubuJaiiSy bafi gibbus, brafteis duabus ovatis, lcffilibus. *Corolla* pollicaris, cavuka. *Fexi/htm* medio flavum. *Carina* alba, ba*ñi* fifla, apice inflata; circa anheras connate fubtus. *Stamen* decimum ad bafin separatum. *Stylus* supra convexus> fulco tenuiffino longitudinali > villofus.

Surdnd in fylvis paffiwi.

19. LATHYRUS TOMENTOSUS; *pedimntls nnifloris, teniatis.*

Folia 5 -juga eum impari. *Cirrhi* nulli. *Legumina* comprcfla, Jiiiearia. *Panicillee* axillares, tcrminalcs*

M6r. Arab. *Sonctfa.*

GLYCRRHIZA.

20. GLYCRRHIZA ACULEATA; *ramis rachibmque foliorwn miwerjalibus & f partialibm t aculeatis.*

DESCR. *Pinna* 6, 7-j?gtf> tripofficars. *Foliota* y, 7 -juga, fctfUi*, ovali- oblonga ; exeriora" imjora.; exrima pollicaria, fquamuh inremcente. *Pedminiti* axillares, fpicio-comofl. *Floret* flavi, diftintli braflis, quales supra racemum erian> in comam coacervantur. *Legumina* ovalia, fefquipolllicaria, comprcfla, monofpcrim, muricata aculeis subulatis, iubvillolis, unguem Jongrc, patenummis.

Hadie plantatus frutex hie ex Ittdfa allatus, Bijnjanorum #ope, qui ilium vocant \$.&•/. Arabes nonien & ufum ignorant. *Zebid* quoque in horto vidi cultum a Banjana.

HEDYSARUM.

31. HEDYSARUM ALHAGIJ *caule dijinfo|Jpinis patentibas, floriferis.*

DESCR. *Radix* percnnis. *Caules* autumno cmoriuntur : ramofiffimi, diffusi, feiquipcdales , teretes , niridi , villofi. *Rami* patentes, alrerni, axillares, refii, itcrum rambfi. *Folia* in caule & ramis alterna, feffilia, infima mnjora, femipoll. pendula, oblonga, emarginata, villofa. *Stipulcp* binae, breves, filiformcs, flifca*, pendulor. *Spina* ad singulam axillam foliarior, patcnteS) poliicares, tcretcs, villofne, virides, rigidx, terminate mucrone flavo, acutissimo. *Florts* in spinis sefliles, alrerni 2 vcl q, patentes, fquamula brevi, filiformi ad pedicelli exitum. *Pedicctli* filiformes, brevifffimi. *Calyx* campaniilatus, bafi fquamis filifonnibus 2, flavidoru-bens; limbo patente, 5 - fido: lobis 2 fub vexillo: 3 *Tub* alis & carina. *Corolla* papilionacca, rubra, femipoll. *Vexillum* retro flexum: mar-gine inflexum: pagina iuferiorc flava. *Jlla* supra conniventes, deflexx, planar. *Carina* antrorfum connivens , obtufe - rotunda. *Sfamina* alternatim tnajora: *Simplex* ad bafin separatum: reliqua novem-fida: *duo in-Jima* simplici longiora: *duo alia* his brcviora: *par infequens* longius in-flmo: huic brcvius *par*: *nonum* filamentum fupremum, reliquis longius. *Anthera* globofac, crebbe, flavor. *Germen* linearc, reftum, comprediiim. *Stylus* fubulatus, albicans, incurvus. *Stigma* acutum, nudum. *Siliqua?* villofo, teretes , toroib-articulate: arriculis mono(permis.

Arab. *Aghitl.* (3 ^ ^ *Varhtatem* vidi," *fili quis glabris.*

In ruderatis locis *JEgypti* frequens*, florens menie Junio. Foco infer-vir. Cameli (pinofa hac dcleftanrur planta.

22. HEDYSARUM LAPPACEUM; *foliolis ternatis, ohcordaiis; caulibus procumbentibus; fili quis compreffis, spinofis.*

DESCR. *Caules* perenncs, procumbentes, tcretcs, villofi, fefquicubitalcs. *Rarni*, alterni, ramofi. *Folia* temara, feffilia, foliolis carnofis, rotundo-ob-cordaris, villofis, breviflimis. *Peduncuti* breves, axillares, uniflori, farpe tiflori *Flores* flavi, interne rubefecentes, carina obtul: filamento dc-cimo separato. *Legumen* digitum transverfum longum, comprefliim, pedicellatum, pendulum, arriculis 2, 3 fubrotundis , utrinque villofis, muricatis: fecis patcntibus, rigidis, pilofis, apice hamatis, veftimentis ad-hicrentibus. *Calyx* perfiftens.

Lohaja?. Arab. *Höbb tl adjai**. commune nomen Lappaccorum.

23. HEDYSARUM VIOLACEUM ; *folio jimplici linear, caule aniiito, procumbente.*

DESCR. *Flos* papilionaccus, violaccus. *Peduncyli* racemofi, conjugati. *Legu-mina* rcfta, comprefla, articukta, punflaro-rugofa.

Surdiid.

INDIGOFERA.

24. JNDTGOFERA now.*} foEolh femi-Jex-jtyrjr, cuneatis; racemis folio brtvioribus; Jeyummibis rcfif, tcretiljuš, fubvillofit.

Ab Jndi(T. itnS. distinguitur foliis cuneato • oblongis & Icguminibus non articularis, iiUimis Tamen fcmina separantibus.

Surdūd in arvis fpontanca. Arab. *Hotter*, 

OBS. Ubiquic hrec fpecies, qua; Arabum tñcloria eft, •colitur ob/Colorem czruleum, quan lumnopere nmdnt incoldE utriusque fexus.

Plaiaua fe^ti expmiditur, licc&cur; dcimde injicitur teftis magnis, ad dimidium usque; aqua fontana afluundit ad fumnum inarginem Sic per 2 tioros feripentationeui fubit. Turn valide mifcetur bacuto arundinaceo, cui ad infcriorem apicein quatuor paxilli lignei crucwtim pofiti. Folia imtamia auferruntur, Aqna per foramen ^ fpith. fupra funduin teftar •e.iittitur, qu^viidis £k m\yms nfus. Sedimenrum cfc Indigo. Foveola in terra excnvatur, non profunda , 2 win. -diametro; foliis rejcdfs comniinutw veftirur, luic flrato Indigo infternitur ad ficcandum. Ifre vero pulris latus inafTz infemis femper inquinat. Venditur Beir el fakih 6 vd \J Maun (1 Man eft 2§ Rotl.; impcnalis prttio.

25. INDIGOFERA SEMI - TRI - JUGA ; foGoruJemi-trijugis, <obcordafts> fubcomplxatis, tomentofis.

Caulis proftratus, fruticulofus. *Fhrts* rubrl *Legumiva* biarticuiata, tertia, tomentofa, mucronata.

Lohajce.

2d. INDIGOFFRA OBLONGIFOLIA } fvRis fimplicibtf, ptltolalū, ovafi-oblongis*, cattle frutcojb, inert/ii, diffufo; florum racemis axillaribns.

Lohajtr. Arab. *Hafar.* j^-^a*- DecoQuai herbs recencis laudatur contra Colicam.

27. INDIGOFERA SPINOSAJ teguminibus linatis , teretibus, Jiabris; eautefrnticofo, diffujo,fpinofo.

OBS. Plura fpéciniini mihi obvenerunt *Hedyfiri nlbagi ffinrfu* & hujus lnMgoferg| qua? dum contuli, ejusdem generis nnturalis inverii; *Lotbi jpin.* iegumiua non apparent externe oiticulata; hue tamen referri debut. *l o!m* , *Imi. fpht.* ternara ; *AU* iimplicia femper. *StifuU* illius parvs , crefhe; *AIL* pendular, *Spi»£* illius totJE lice* , fili enflitie ; *A\h* carnofie, apice mucronacx, penna columh. crafftie. *Calyx Illius* patens, & flores nibri; *Alb.* fimiliter. *Ugtuina* illius teretia, cylhidrka; *AIL* curvn, articulata.

Lohaja. Arab. *Hall.* 

28. INDIGOFERA TINCTORIA.

DESCR. *Calyx* planus. *Vexillum* ftavefcens, raargine involutum} ab alis & carina refractum, ut flos faciem habeat corolla? dipetafee, in qua vexillum unurn., akc rubrse alterum pecalum rferum „ eaque expanfa: in codem piano. *Floris* *Carina* flaveCccm> fub alis compreffla, obtufa, utrinque calcare laterati conico, *Legumen* articulatum; i&minibus (ingu-
Jis illhmo separatis. *Folia* bijaga- cum. inipaci, ovalia> cxrulcfcentia> fcabra.

Hacc iEgyptiomm Tndigof. rinfloria¹. Arab. *Nile*, adjā Scmin* cum oleo *Sefdmi* & *Sale ammo7iiaco* mixta, mane affumra, *Tcmiam* expellunt. Distil eric i aqua per triduum abftinere^ aliuro cibuai nan edcrc, nifi pancm*, potus *Coffe*[^] permixtitur.

29. INDIGOFERA spICATA;/a/l/o/i/ alternū^ qnadrr-jugif} legummibusre\$üs> pendutis, fubfpicatis.

DESCR. *Catties* hrbacei> deewmbentes, tcretes, fcabri, fubpedales. *Folia* altcrna,, pinnata. *Foliola* alrcrna, obovar>> villo&a, pedicellate; exteriora majora, 8 vel 9. *Pedunwli* fykx axillares; dura frufltim geftanr tri-pollicares, falio longiores, fubracemofi. *Floret* viohceo-rubri, i&ffiles* *Calyx* patens. *Carina* utrinque calcare lateralni conico- *Legttniina* pendula, refta, tcreria^ fcabra; ifthmis car>ofis^ *Bolgofe*. Arab. *MfcheUr JOM**A vel Schiter.

GLYCINR

30. GLYCINE ABRUS.

DESCR. *Folia* non conjugate, fed arremtr. *Foliot* 12-13-jug*,* exteriora majora:, nondum polKcaria, ovato-oblonga, obtuli cum acumine, *Setnina* ovalia, rubra, macula bafeos roagna, oblonga, nigra. *Pedunculr* race-mofo-fpicati.

Hadi& Arab. *Byfli'a*. g^ E* Siemwi&ius armiHas aliaque ornamenta fibi contexcrc folent fecmina: forris pauperioris* Hujus Glycines Lit-gumina vidi Kaihirx venalia *fimfnibus ghbojis*.

ASTRAGALUS.

31. ASTRAGALUS TRIT^STRIS.

Semper caulefcens, *Siliqiu*v biloculatse; non biarmanc, nee fdbufatse, led hirlütse. An *A. alpinus* ? fed kgumina vix utrinque acuta^ & pedunculus folio brevior.

*Kdhira**. Arab, *Chamfaret tl anij*. 9>^jS55, i^afA

32. ASTRAGALUS ANNULA^IS; *tatikjteut, diffujut; kgnminibns hainofit> mm-prefcis, introrjhm .tonaliculatU.*

Legumina annulum ferc rcfcrunr, una pane apercum.

Alexandria; vernalis,

33. ASTRAGALUS FKUTICOSUS; *floribut oxillaribut, feffifibur,*

DESCR. *Caulh 'lignffus, pedalis, ere&us. Folia ptnnwa, tomentdfii. Fotioh 17-jugn, fubrotunda, complicata, fcffilia, emsrgin<ci. Floresnumcrofi. Legnmina bilocukria, ed imtim caulcm feffilia, fed pauca.*

jRoJetta.

TRIFOLIUM. •

34. TRFFOLIUM ALEXANNUM. Arab. *Berfim. f&y* «ks Btrfun.*

DESCR. *Folia pollkar-ia v urrinque villofa-, flancoolata, dcmata, dtcrna; fob* floralia oppoHta. .Foliorimi Stipules mcmbianaccjc, veniricofse, ^vaginantes, ciliarar > allrida:, venw viridikus, urrinepe longo acumine viridi, lineuri: inrcr quf Pet wins villoius, caxialicularus. Ct^pitula ramorum & cauli terminalia-, pedtmculara. Calyx villoius, y -4untatu6, laciniis iincari lancaolatis^ credit exterioribus majoribus Corolla monopctata. Vexillum linearc-obtufum , alis longius. Jlce bad 4&H0 .cra(To,, promf-nulo. .Stigma -vet-fus vxijlum pubeicens.*

OBS. HOC illud A| Trifolium, quod JEgyptii totis agris «edliutt; o^timuin & fere unicum pabulum junieitoruin. Bis quovis anno non feritur, ut reliqua Ceffetlia, led ciecrefcenrc Ni1o. Ubi agri vici, -aqna hydraulic is 'inachtñiB infer-tur, & terrff liUTnc&aTT 'femiira imtnirtuiTtur. Tres meHes patitur Tiifolium. Singula rice exrefcir •§ uln. Cmque mccli ti'es -merifes trpus; -poft emoricur. Yrima feges •optinra, rocfitnr Ha; ftcundn <& Tertin JXihb*. Miro agriculturr ordine in eodem agro (eritur cum Tritjco; (dum l'cilicet, od fruAificationefn •deftinfltnr). Mixtum illud reinentum dicitur Cbalit. liod^m ineffe Triticuin & Tritolium non folce, fed manu avelluntur prope ad terrain, ratlice tdida; liitK fafcieufi diflinSi colliguntui i (liiiil quoque cikurantur. Trifalii feniini separantar Cribro Qrbal cElo.

35. TRIFOLIUM BICORNE.

DESCR. *Caulis repens. Flores rubri, monopetalii, resupinati; vexillo eretto, obtuso. Capit, dentibus inferioribus 3 brevieribus, paraMeliis: superioribus 2 bngioribus, divergentibns. Capitula villoia, globofa, pedunculata, axtharia: pars fdb laciniis calycinis valde inflata in forniccem ventricofum , poft florfecmiam* Folioh ovaria, ferrata, glabra.*

Inter Trif. faiivum florews fine Dcembr.

36. TUIFOLIUM UNIFOMUM; *ttaguminibus racemofis* > *nudis*, *monofpermis*; *foliis fmplkibus*, *cordatu-Jubrotundis*, *repandis*.

DESCR. *Folia alterna*, pollicaria, glabra; pctiolo brevissimo J interdum femipoll. *Florum capitula oblonga*, violacea, femipoll *Caulex fuffruticofi*.
Taces ad aquas. Arab. *Lobab el abid*, <AAA*JJ I*AAJ

37. TRIFOLIUM MELIOTHUS; *kgumimbm racemofis*, *nudis*, *monofpermis*, *rugosis,fetifreris*[^]

Caulis diffusus. *Foliota cuneiformia*, apicc fermra. *Flores flavi*.

Arab, Gurt. Frcquens circa *Kdhiram*. Arab, in Yemen *Rijam*. +1**

LOTUS.

38. LOTUS ROSEAJ *catilibut propratis*; *pedunculis 4-foris*, *foliis quinatis*.

DESCR. *Caules fublignofi* > proftrati, felquipedales, villofi, ramofi. *Folia quinata*, nlrerna, *Foliola oblong**, acuminara, villoia, polite. *Folii pinnata* > bijuga cum t̄mpari. *Pedunculi foliariorum* > axilhrcs, erecii, iefquipoll. floribus, 1 - 4, umbctlarisj bra ft ca ad umbeltam unica, ovali, acuta. *Calyx dentibus 5*. *Corolla violaceo - rubra*. *Alee connivenres*. *Carina apicc fufca*, fubulara. *Lequmen pollicare** tcres, mucronatum, dorfo & ventre canaliculatum, incus idhmofum.

In infula *Djefiret ed dahab* prope *Mafr elattk* (*Kdhiram veterem*) in folo arcnofo copiofc: florens fine Januar. An *Lotus cretica* ? .

39. LOTUS HIRSUTA; *leguminibus fubquaternis 1 capitulatis*; *foliolis ternatis, ovali- ambris* > *utrinque villofis*.

DESCR. *Caules decumbentes*. *Cirrhi nulli*; adeoquc a *Lathyrus* differt. *Flares flavi*. *Stipula binse, parvae*[^] lanccolax. *Stigma glabrum*.

Hadē.

TRIGONELLA.


- 40* TRIGONELLA STELLAI/I> *tegminibus axillaribus*[^] *confertis, fejilibiis, rigidis, arcuatis*, in *flellam extenjis*.

DESCR. *Caules pedales*, proftrati. *Stipnlee* bince, lunarx, bafi bidentatce. *Folia petiolo fefquipoll. foliolis rcrnaris, retufis*, fubrorundo - cunearis, apice denratis > bafi inregris. *Legumina* femipoll. in capiculum 1[^]lliforme congefta, rigida > furfum arcuara, rugis obliquis : medio capicuh cminet mucro rrgtdus loco pedicelli communis.

In defertis arenofis circa *Kdhiram*. Suaveolens ut MeJiloih.

41. TRIGONELLA HAMOSA. *JMqufo falcatir_y lavidtts; foliolis fubrotundis § dentatif, bafi inttgris.*

Dfiscn. *Peduncular* racemofo - capitatus> com munis, filo, non fpina terminatus, petiolo breviorj in defloratis longior. *Folhta* fubrotunda, carnofa> deivkulata, unguem longa , bad inregra. *Alee* patenres, bngitudine vxilli, cui carm*ki* a:qualis eft. *Legumina* falcato-cochleara, fubcomprecda, rugofa

Arab* *Daragrag.* 

MEDICAGO.

42. MEDICAGO POLYMORPHA; *fotih obovathj emarginatis% brmi]Jimir_y aprve euneatis** bafi integris, undique profunde ferratis, utrinque vilhjis.

Legumen anfra&tibus cyfindricis, utroque margine fpinofTs, connaris*, vet sprialibuswechlnaris : terrium fpirale revolutionum paulo diftanriij urraqc superficie planum J marginc vero dupfici fcric (pinoiūm , Ipinis divergentibus.

In *JE&ypto vulgaris.* Arab. *Nefl.* In ptftis humidis.

M. polymorphe varietates, quas natura conftantibus & cxft;mril)us *nous dKHnxir*, quo minus & Botanici diftingucre poffmt, nit oWbt^ usque dum experientia duce innotuit, an ex eodem fcmine prodcanr varietares, vel ex diverfo feminc vene species. De no minibus enim folis non longa movenda quxftk), neque ulrinix fettioncs Naturae rimandx erunt: five species,five varietatcs appHemur, modo evitcrur confusio. Mcdicago nomine triviali *potymorpfae* fatis. indigitat obfeuritatem charafteris  £



CLASSIS XVIII POLYADELPHIA. CITRUS.

A.) AURANTIUM.

43. NARENDJ «;ELU 3 ^ 7 ^ / ^ /b/ffj iifagr-h* olis parvis, separatis cunci* formibus; petiolo utriuqnc duplo triplo-vc latioribus*
 In foliis tnajoribus dbcordata ala fcmper libcra.
 3) Narendj malech; foliis similiis praecedenti.
44. NAKENDJ BOUTUGHAL J l s * ^ g ^ l - i foliis integrity Jiibdenticutatis \$ ala utrinqu lotitudine pectioli.

B.) MEDrCA.

45. LIMUNMAXBCH ^ t ^ o ^ ^ i folris dirplicato-fetYuJatis; altspetiolo latioribus|
 46. LIMUN H^EXU cJLx^i fKiis ferratis; alts vix ullis; subttis punxstatit% Juvifcidis.
 47. IDALIA HJELU ^ I ^ UJLAPJII ^ ^ JJI foliis fernxtis, alatiti alis utrinque latitudine pectioli.
 48. IDAWA MALBCH; foliis Mlaris, Ji&fcrratisj alis .utrinque Jatitudie petioH\ in veteribus tnulto angustiore pet tola.
 49. LIMUN SJMIKI} foliis ferratis; alis triinutiffimis..
 Inoculatam vidi; tamen aculcis gaudentem.
50. KAB-BAD <£J£=S foRis subferrafis % vix mlati, riji in junioribus* FruGus obovatus, tuberculofits.

51. N.'CFFASCHJ foliis ferratis j ala J(tvi\ frttBfu acido.
 52. TURUNDJ BJELEDI %?/i vel &>jk foMs elliptxto- obhngis, ferratis * obtu- £%ift|ilis| itonnjfi rudrmentis afatis.

53. TURUNDJ MSABBA J foliis ut pracedcnfit, fed brevioribus; fru&xt gratiore.

OBS. Tot Species vel potius Varieties receiifere volui, ne Aortulfnos offendrein. In hortis Káhirinis prxfertim nutriuntur. Rofcta vidi Ijorrum Citric grmtifTnTJu], fed terrain fub quavis arbore nudam ik gcamine dcfiitut∋ line dubio vapores graves fuiit plantis & con-ofivi.

Gtri Naren<ij (Ponieranti) fruclu* adhuc immaturuf & mice non major, in duos portes dlflecatur, qux filo fufpenfe iiccantur; oleo ddnde inje^sp, 40 diebus cflori folis exironuntur; liinc Cofi»cticum oritur feiniilis acceptiflum, quo crines albos vel jam incerros nigro tingunt coioi-e; & nifi rugs faciei negant, i'enectutis (igna alicuantuluin procraftinanL

C L A S S 1 S XIX.
S Y N G E N E S I A .
SCORZONERA.

54 SCORZONERA TINGITANA.

DESCR. *Radix* armua, fiiformia* Ca&/ brevifljin, fcmipoll, diffufi, folio-* rum bad te&i. *Folia* bipinnata, amplexicaulia, confertiflta, lanceolira, extrorfum dcntato • fihtfar*: hunk* denticulate, ciliarae. *Pedmuuli* tcr-jninales, axiHarc&, pateiKes. Axilkrcs mudi, tcnninalcs, fcpana fub flore iinico. linear - lancolata,. roargina membranacca. *Calyx* bad gibbus* Squamae inferiores laxar, apice rcflexn?. *Corolla?* ftavx. *Semhia* 4 - angula, 4 - fulcata, vcrfus bairn- laciora * tubercular^: rarum vifur iit Sygcracfa.

In defertis arenofis *Kahirmis*. Arab. *Nnggd.* ◷!* Nulla pecora pl'antijr hac vefcuntur, nc Cameli quid em-, **ioli** AfinL non afpernantur.

55. SCORZONERA CIMATA ; caute proeumbente; ramo/o:, firxbro•; pcdnnclis fquamofis j /◎//> retrorjutn, alternatim obtvfe Jintuito -dentatfo , qfabrh^ margine attileis ciliatis.

DESCR. &7<£V fibrofa, fuffTformis. *Calyx* creflus: lacinix intimx muJro long lores, lanceolatcs; reliquae ovatx; omncs virides, margine albo, tenuiffimo.

jlkxaudrhv. Arab. *Schadoid.* Aliis *Haiuve.* ↗

PICRIS.

j6. PIGRIS SCABKA*

DESCR. Cl^IV fquamis II remotis, lincaribus, crSis; JTfer^ fepe unico, termiftali; *Fotin* repando-undulara, fetis hifpida, ut & fcapua & calyx. *Semina* transverfim (triata. *Pappus* pedunculatus, plomo(us,

In monte *Ciddra*. Arab. *Murrnh.*

LACTUCA.

57. LACTUCA FLAVA ; jforiBus ligulatis* fcivis.

DESCR. Cauks dichotoino-ramofij. fquama fub fhgulb raraa. *Folia* radicalla fyraro-finuuta ; margine fpinulis confertis. mucronulata, caulina pauca, finuata, amplexicaulia. *Calyx* calyculato-imbrkatus, calyculo latere mcinfranacco.. *Semina* fcabra; *Pappus* ftipitatus* *Receptaculum* nudum,

Surdii Arab* *Bindibe*, *±d*#

58. LACTUCA

58. LACTUCA INERMTS; *foliis linearis lanceolatis, fefftibus, rttrorjum dent at is, inermibus,*

DESCR. *BraSfcce haftato-lanceolate* integrae. Caules breves. Flores pa-*
niculați, albido-caerulei. Pedunculi fquamati; fquamis haltatis, ferfili-
bus. Foliorum radicalium carina villofa, inerniis.

Kurmce. Arab. *Kat tr rtrjan.* Edulis cruda.

PRENANTHES.

59. PRENANTHES SPIVOSA; *taule fruticofo, dichotomo[^] Jpiuojb.*

DESCR. *FrvtzX bioubitalis, diffusus, dichotomus, teres, spinis pollicaribus,*
Jateralibus, ubulntis, viridibus. Folia feffilia, fefquipoll fparfa, linea-
*ria, g la bra, bafi attenuata, inrcrdum denribus lobisque Lueraitbus. Pe**
dumnli ramuli filiformis, laterales vel ex dichoromia, fquamulis imbricati,
interdum conferti, interdum foJirarii, femper uniflori Calyx ± polli-
caris, calyculo imbricato, laciniis supremis apicem membranaceis. Flq/iuli
flavi, Jigubti, duodeni. Stmina alba, linearia, ftriata. Pappus feflilis,
Tota plinta laQclccns, foetens.

Ad *Ghobeibe* 6 milliar[«] a Suds; frequens in arena littorea. Arab, *Kebbdd.*

LEONTODON.

60. LEONTODON MUCRONATUM; *latiniistalytints inferioribus recurvis; pe**
dun en Us fquamojis ; foliis piunatifidis, dent at is, undatis, dentibus mucro-
natis.

DESCR. *Radix amiua, fusiformis. Caulis fpithamalis[^] rameo-dichoromus,*
crcflo - divaricarus , angularis, glaber, viridis, farina exrulca detergi-
*bili. Folia raditalia tripoll. usque ad bafin pinnatifidj, Uciniis extror**
fum majoribus, patentibus, undato - dentatis, inrcrjeſlis aliis minoribus,
alternatJm: finguli tlenriculi terminati mucrone albido. Folia caul,
minora, amphixaqlia, fingula ad cxitum ramorum vcl ad Jichot. Pe-
dunciiR terminalcs, conjugari, fefquipoll fquamof, un.flori Jqnamis fa-pc
3 cordaris, acutis, ampicixaqlibus. Calyx laciniis acutis, "infimis ovaris;
Teliquis lanceolatis: ordinum 3 infeiiorum erefta-, apice recurva?, fu-
periorum corolla: appreflāc: omnes margine attenuatx, albid;e. Carol'
lulcn calyce fefquiloniorcs, apicem emarginaras 5-dentluar, supra flavje,
fubtus excimse nrbfc, lineis duabus nigris, interiorcs urrinque flavse.

In defenis *Kdhirimis.*

61. LEONTODON ASPERUM ; *fotii dentato-pinnatifidis; scabris, Jetis utrinque hifpidis.*

Caules fquamofi, fubnudi. Calyces hifpidi, fquarrofi. Seqüina laevia. Pappus (implex, longe-plumofus.

Alexandria.

CREPIS.

62. CREPIS RADICATA ; *fotii finuatis, dentatis, dliatis, radkatibus| cautibus prqfratis > mntiifioris.*

DESCR. * *Caules femifpith. profrati, angulari, hifpidi, ramofi j braftea ad ramorum exitum haftato - lanceolara, hifpida. Folia fc(filia> tripollicaria, Extrorfum lariora, finuata, dentibus acutis, pilis hifpida, ciliata. Calyx fetis nigris. Flares flavi.*

Circa Pyramides. Arab. Srcrgha, aliis Hauddn. ^jJjj s^

LAPSANA.

- 63 LAPSANA TARAXACOMRS; /*tapis iwifloris, detumbentibus; fotii pinnatis; piunis angulato - mueronatis , retrorjum imbricatis.*

DESCR. *Recept, nudum. Pappus (implex, feffilis. Calyx imbricatim cacylacus, laciniis longioribus, excrorfum carinatis , interne cmaliculatis. Semina utrinque alita.*

Alexandria. Vernalis. Folia Taraxacu

SCOLYMU.S.

64. SCOLYMU.S HisPAiQicus.

DESCR. *Flores flavi. Calyx imbricatus , mnrginc membranaceus, acutus , non fpinofus. Receptacnhim paleaccum. Pappus nullus. BraEfeat subquince, foliiformes, ambicnts calycem. Flores extrcmi inferti laciniis intimis calycis. Folia finuato - pinnarifida , fpinofa, margine venisque albis, decurrentia alis laris , finuatis, fpinofis ; undc tocus caulis quafi. alurus. Folia radicalia longiora, conferta, bad attenuaca. Tota planta laElefccns.*

Kdhira. Arab. Lchlech.

CACALIA.

65. CACALIA PENDULA ; *cautibus defcendentibus , aphyllis; pedunculis terminilibus ereEtis.*

DESCR. *Caules bicubitales, ramofi, verfus apicem fub-trifidi, carnofi , imbricati fquamis. fubulatis > rigidis , ficcis , cauli parallelis » plurium ordi-*

(T)

nunr

num spirarium. Sub singula fquama fcnVicyliiKkrclatus; albo-pun3:atus, lineis 3 vcl 5 viridibus, convergentibus. His cuinis convexis toti cauks teguntur. *Pidunculi* termhulcs, iolitarii > uniflori, erefti, ex caule pendulo, spirhamaks, fquamati, fquamis fiiiformibus, ere&is. *Calyx* a^jialis, cylindricus, dcnribus & fulcis 8-13- *FlofeuK* rubentes, rubulofi, hermaphr. *Reeptaculum* nudum, *Semina* villofa. *Folia* nu!la_v

Yemen in montibus ex prxrupto dependens, deorfum crefcens. Arab.
Kaad. O-a^{T^A}=> E caule fupcr caibones ignicos calcfa&to fuccus exprimitur, contra aurium dolorcs commendatus.

66. CACALIA ODORA; *foliis lanceolqtis* | *caule lineis albis Jlriato*.

DESCR. *Catties* difliifo - ereftt, cubirales, ramofi, apice foliofi : cicatricibus foliorum delapforum albis, procuberantibus | ab hac cicatrice furfum & deorfum *Linca* trcs nitida?, elevatee decurrunt. *Folia* in apice ramorum juniorum fparfa, lanccolata, crafa, fcflilia, glibra. *Pedunculi* umbellari, terminiles, 5 • 7. fubulati, ghbri, crcli3 apice fquamis 2 lincaribus. *Involncnim*: fquams aliquot parvee, lanceolata*, ex rudirnentis foliorum. *Calyx* cylindricus, erctlus, j-dentatus, 5-fukatus, glaber. *Fiores* omnes hermaphr. 9 vcl 13, *Corolla* calycc fcfquilonior, bafi filiformis, apice latiore, 5-dentato. *Filamenta* 5 filiformia. *Anthera* a connatac, flavae, ultra corollam prominula. *Germen* inkrimi, fubrriquetrum, villofum. *Stylus* filiformis, albus. *Stigma* duplex, flavum, divergenS) filiforme, apice craflum. *PerkarpiuM* calyx femina includens. *Semen* tercs, villofum > m̄cchio crndum, ftriarum. *Pappus* fccfilis, multifctus. *Rceptaculum* nudum, plunum.

Yemen in moinibus frequens. Arab, *Edcher*. /*^<M Caules Hccati inferviunt fuffumigio odore grato > prsefcrtim variolis laboranribus.

67. CACALIA SEMPERVIVA; *foliis carnojis, feffilibus., tanceolatis, confertis.*

DESCR. *Caulis* vix pedalis, bafi conferte foliarus,* dein fecrius divifus in duos pcdunculos unifloros, ercftos, gibros, albo - punftatos, nudos, apice crafTfor.s, & fquamis aliquot lincaribus fparfis. *Folia* in ima parte caulis carnoia, iſiquifpirh. lanccolata, fcflilia, ercfta, glabra, nitida, plana, fubtus carina longitudinali data. *Calyx* 13-denrarus, 13-fuIcatps, violafcens. *Flofcuti* numerofi, 60; in calyce communi, rubri. *Semen* & *Pappus* valde pilofi.

Inter 11 oka & Kurma in montibus. Arab. *Tyflok*.

Terra: extrafta nonnifi longa mora ficcatur.

CHYSOCOJtfA.

68. CHYSOCOMA MOCRONATA ; *foliis teretibus, mncronatU.*

DESCR. *Calyx cylindricis, imhricarus. Receptaculum nuclum. Flores flivi, hcrmaphr. Setniua hifpida; pappo finiplici. Caulis diffusus, rercs, fefquipedalis, fruricofus. Ratni alterni, Pedtmeuli foliolis tereribus fquamati, Sxpe pinnce lireralcs mucronatae. Flores ioJirarii raniorum tcr-niinaks.*

Kdhirce. Arab. *Dafrh* صفرى

69. CKRYSOCOMA OVATA ; *foliis ovatis, repapdu, hispidis.*

Herbacea. *flares corymbofi; floiculi circker 15 j oranci hennapbr. \$-fidr, violacei. Pifilla brevia.*

Snrdud \ in humidis.

70. CHYSGCOMA SPATOLATA \ foB s oblor -gis, dtnialu, fublementojis, fejjl libuf; floribus Urminalibtis.

DESCR. *Ftutex diffusifimys, fubpedalis, confcre r-nmoitis. J^/Za nngu em Jonga; sa pe denre 4id balia inriaque uno> imerdurn duplicitj liini: figura spatulara, Flores terminalcs, digit transverG longitudinc; flofcui vio-lacei. Cahfx. Irjuamoib- imbricatus. Ruiptaeukm nudum, Paupus pilofus.*

Props Toss.

SANTOLINA.

71. SAN TOLINA FRAORANTISSLX A ; *corynbi\$ fafiigtatti; tank frutkojo, dif-fujh, tomeittofo; foliis ovatis, ferratis, feffilibns.*

DESCK.* **Fruticulus** pedalis, di/fufus. *Folia br evissim h propinqua, qundrifaria inibrificantla. Calices ovati, tomcutofo, imbricati , albidi. Floret y* *Pednnncali corymbofi:* pcdiciliisj partini onifloris, parriin trifloris. *Receptaculum paleaceum. Pappus nulhis. Floftufi 20 , wbulofi, herrtaphhtodki.* Facies Jlthillm agerat.

In defcrts arenofis ad **K&hiram** & Sttfis. Arab. *Ketfihn gebcli, Drogiftis (Fnlmnuii) in ufu eft, ob odorein fortcm & fragramem rct'olvencs medicjmentam, Succus oculis dolentibus inungitur.*

72. SANTOLINA TERRESTEUS; *canfibus projlatis\ pcdnncnlis unijloris; foliis bjtiiy linearibus, craffrnfatfir**

Flores in ipfa terra? fuperficic; interdum plants ipfa plus media parte sub terra.

In locis **inundaris** *Mutarea.*

TANACETUM.

73. TANACETUM HUMILE.

DESCR. *Caulis** decumbens, villofus. *Folia* villofa, pinnata, hciiniis laceris, acutis. *Rami* axil lares. *Pedunculi* oppofiti decurrenres ad akeram alam, pollicares, villofi, uniflori. *Capitnlnm* flavum, magnitudine pifi, faftigiatum, feu truncjtum. *Calyx* hsmifphxricus > p.Iyphillus, sequalis, imhricatus. *Flo/culi* fceminci radii mulrorum ordinum, *Corolla* viridis, trifidi. *Corollulae* hermph. flavae. 5 -fidae.

Circa *Kdhiram* in marginibus agrorum florens fine Decemb,

CONYZA,

74. CONYZA ODORA?

DESCR. *Flores* pallide-violacci; radii trifidi, numerofiores; hermaph. tanturn %, 6 vel 7 in disco. *Folia* oblonga, dentara. *Corymbi* corollse cylindrici; adcoquc charatt. *Con. odorco* non convenir, licet figura *Plumieri* non obftct.

Ob odorem fuavem culta in hortis *JEgypti* unde fe propagavit per lit* tora Nili. Arab. *Barnuf.* <~**M

75. CONYZA TOMENTOSA ; *foliis hajlato-tanceotatis, amplexicaulibur, dentatis cov fertis, Jubtus tomentofis,*

Caules tomentofi, procumbentes. *Folia* femipoll. margine revoluta. Squamae cahjcincc obtuifae. *Flos* albus.

Alexandria; & *Hadie.* Arab, *Tom erneb* vel *Mottcrj.* ^L/c

ERIGERON.

76. ERTGERON SERRATUM; *cattle ramofo* erefito - dfffufo, cubitali\ foliis cunei-fyfmi - lanceolatis, Jerrato • dentatis ,fejfdibns, villnjis.'*

Flores subglobofi. *Calyx* fquarrofus. • *Floris* discus luteus. *Pedunculi* terminalcs 3 vel 4; uniflori. *Petiola* alira, amplxicaulia.

Prope • *Mafr el atik* (*Kdhiram veterem**) florens fine Januar.

SENECIO.

#77# SENEPIO LYRATUS ; *corollis radiantibus j panicnla corymbofa, terminali; foliis lanceolatis, lyratis, amplexicaulibus, denticulatis.*

DESCR. *Caules* cubitalcs, ramofi, difffufo, fulcati, villofi. *Folia* bipollicaria, digitum lata, fefilia, lyrata_s dcnriculata: lobus terminalis, bafi transverfus^

verfus, apicc acinus. *Pinnule?* ad bafin folii, alrernsc, oppofitae, intcgrx, dentatiej utrinque 2 - 4: par infimum reniforme, dentatum, amplexicaule. *Peduncnli* panicula corymbofa, terminalis, fquamofa, *Pedicellorwn* fquamse fparlle, filiformes, apice calyculum mentientes. *Calyx* communis; bafi craifus, nicidus, dein cylindricus, opacus, fufcentus, aecqualis, apice non fpiucchrus, tcrminatus dentc in fulcos. • *Flofculi* diili- ligulaci, patcnrcs, "oftoni.

In montibus *Hadwifibus*. Arab. *Mekdtkat*, Aliis *Hòrimrhn*.

78. SENEPIO SUCCULENTUSJ *foliix fuccukntis*, *citneiformtbiis % fijfdibur* cattle procumbent?.

DESCR. *Canlis* fruticofus, procumbens, ftriatns, puniceus. *Kami* alterni, breves. *Folia* cuneifbrmia, fucculcnra, plana, confrra, *Integra*. *Pedunculi* ramorum terminales, fquamati, uniflori. *Calyx* cylindricus, imbricarus, fquamis lanccolatis, bruncis, margine albidis. . *Antkerce* bafi biiëtae? quare ad *Lnil am* acceditj calyccque non fquarrolb. *Pappus* pilofus.

Alexandria ad Catacombas in arena lirtorea copiofe. *Rofettce* in loco humido inventus: *joiñs integris*, apice tridentatis.

S. *halimifol.* efle nequit, foliis non ferratis, ncc pedunc. corymb, (cfr. Hort. Cliff.)

79, SENEPIO HADIENSIS | *foliis laneeotato-ovatisi crajfts*, *glabris*, *denticulatis*, *panicula corymbofa*.

DESCR. Frutex diffufus, tricubitalis. *Caiiles* erefti, debiles. *Folia* alrenu, lanceolato - ovata ", tripollcaria > quicdam denticulata, cjuxdam fcrrara, quxdam inregra; crafla, glabra. *Pedmiculi* ex axiHis fuprcmis, terminales, omnes corymbum facientes: parre limpid nudi, apice corymbulofi. *Pedicelli* temipollcaries, filiformes, uniflori, fquamati, fquamis brevibus, filiformibus, fupra conforris, calyculum mentienribus. *Calyx* communis, (implex,*callo carnofo, nrtido, oftodenrato ad bafin: calyx fupra cylindricus, 8-fulcacus-> apicc S-denratus. *Rceptacuhm* nudum. *Flofculi* flavi: radii 5, ligulati, fominei, feniles: lingula oblonga, patenti, rcflexa, emarginata: difci 14, quinquedentati* hermaph. fertiks. *Semina* lincaria, pilofa. *Pappus* feffllis.

Yemen in montibus. Arab. *Sarla abjad O ^ »' ^ Lu* vel *Salà el bdkar*.

OBS. Serfdom's genus odluic detenninatum fuflicntr non eft. Vidi plurcs 'fpecits huic fimiles: Calyce ffquali, apice non femper fphacelato, bafi in* ci'fedata, calculata, iquamulis hiiibi'inibus > i(gio 5-floro.

80. SENEPIO LIKIFOLIUS ; *calyte baft mrajfnto, Juhcalyenloto; radio %-floro| fquamis talijtinis-, apice vix fphacelatis.* • Hadie.

81. SENEPIO SQUALIDUS.

DESCR. *Radius* patens in defloratis , revolutus. *Folia* pinnatifida. *Calyx* .calyculatus; omnibus fquamis & laciniis apice fphacelatis. *Caulis* digitum longus. Aliis in locis vidi plantam pedali magnitudine. *Kdhirce*, in defertis frequentiflimus. Arab. *Korrcejr.*

ASTER.

g2. ASTER CRISPUS ; *radio difco breviore J eaule fomentofo; foliis Imearibnt^ Jerrato - crifpis.*

DSSCR. *Caulis* cubitaKs, diffusus , procumtens, plurimus, jamofus, tomentosus albus , tercs. *Folia* alterna, vix pollicaria, lincaria, romentofa, ferrato - finuato - divaricantia. *Pednnculi* ramorum terriniales , uniflori >. fquamis lancolato-filiformibus , glabris , ' viridibus. *Flos* compofirus> flavus. *Calycis* folioia apice filiformia, divaricata. *Radius* difco brevior. *Recentaculum* nudum. *Pappus* feffiis, pilofus. Facies AJteris non eft.

Circa *Kdhiram* ad *Pyramides* *Giftnfes* , alibique , e murorum rimis ex crefcens.

83. ASTER ERICA:-FOLIOS ; " talyce cylhdrico, imbrtcato,* fquamis memhranattis| floribus albis, radiatis] receptaculo nudo, pappojo^ Kurmtf* Arab. %Anfif. Uuj&te

INULA-

84. INULA ODOR A; *foliis caulinis margine undulatis* Hnearibus, amplexicaulis, fomentojis; flora Jlavo.*

Ubique per Temen culta ob odorem gratiffiifum; fertis florcis cingens capita festivis diebus. Folia cruda edulia. Ufus medicus contra Ha>morrhoides; fi herbae rocentis cofiae vapor excipitur ab agro fedente in fella perforata.

Arab. *Munis j vel Nefrhufch .(j^jAMi vel Chda. %£»*

85. INULA DYSENTERICA,

Anther a & filamenta bad fetofa. Calyx fquarrofus, Pedmculi nudi# Squama fub floribus unica.

Kdhirce. Arab. *Rara Ejub v**' Elfs ^ e^; l^crymce ^jfobi| Job cnim affliftus ulceribus hac herba corpus Hnxit, & protinus fanus faftus; tanto compendio Irymologia in falvo eric.*

ARNICA.

ARNICA-

86. AKNICA *m*svr A; foliis oblongis_y hirfutis, fubtus tomentop•; /capo nudo, unifloro*

DESCR. *Folia fpithamalia, petiolo brcviora ; ante evoliitionem hirfuriflma. Scopus cubiralis, villofus. Floret albi ; radiis exrrorfum violafcentibus] Retcjtf. nudum. Pappus pilofus. In floiculis radii unum vcl duo tanturn fiamenra antheris deftiuuntur.*

In monte *Bardh.*

BELLIS.

- 87 BELLTS *foliis tanceotato - ciliatis j pttioilo atatd, linear7, foliis angifliore; floribusjlavis.* Taces.

SIEGESBECKIA.

88. SIEGESBECKIA ORIENTALS.

Calyx, involucro j-phyllo, patentee liifpidus, glandulofus, vifcidulus. Reptatum palcaccum. Pappus nullus. JJadi'e,

BUPHTALMUM.

89. BUPHTALMUM RAMOSUM; *foliis oppofitis, fefflibusy tanceolatis, ferrutatis, remotis; ectule hifpido, ramofo\ calycibus Urminalibus Jblitariis> obtufe folio/is.*

• *Hadie.*

90. BUPHTALMUM GRAVEOLENS; *foliis amplexicaid. alternis, knceolatis jinnato-dtmtatis; calycibus obtufe foliofis.*

DESCR. - *Caiilis ramofo-difflufus, fefquipcdalis, ima pars, ut & radix perennis. Ftores flavi, pedicello brevi, ftriato. Stigma omnium florum duplex. Squama receptaculi flarum fcrc longitudinc. Pappus membranaccus.*

Kdhirc. Arab. Rabd. J.J^

CENTAUREA.

91. CENTAUREA MUCRONATAJ *cahjeibns mermirbus; fqtiamis ovatis, mucronatis; foliis laneeolatis ; mucronate -ferratis, Jiffilibus.*

DESCR. *Canlit pedalis, angulatus, bafi pilofus, glaber, ramis paucis. Folia feffilia , intcgra , ferraturis niucronaris; inferiora bipollicaria, bafi an*u-ftata, utrinquc pilofi; fupciora polticaria, lincariu. Capitula folitaria, terminalia , ovata. Calycis fcjuamse , ovatae, glabrse , virides , margine albidae , apice fuscae , reflexac, mucronane. Corolla* violaccw, calycc duplo longiorcs Radii piltillis nullis: ftaminum loco fetse fine antheris: difci hermaph. ftigmatibus. violaccis, bidentatis.*

Alexandria.

92. CENTAUREA MAXIMA; *cahjcibus inermibus; fquamis mucronatis; foliis lanceolatis, tomentojois.*

DESCR *Catties fruticofi*, tricubitales, ramofi, tomentofi. *Folia alterna.*

Petiolus fcmipoll. tores, tomentofus. *Lamina* fpith. 2 poll lata, laiv ceolata, denticulata, utrinque tomentofa. *Pedunculi* terminates, uniflori. Sub flore *braSita* linear - lanceolata, pendula, inflexa. *Calyx* ovatus, villofus, fquamis fufcis, mucronaris, lanceolatis. *Flofculi* violacci: radii & difci 5-fidi. Inter plantas vircentes in monnbus, ilia quafi maculas albas magnas facit.

In montibus *Temen.* Arab. *Bogdd* aut *Bajud* fM vel *Baruad* 0>jA aliis *Mokar.* J&*

93. CENTAUREA CARDUUSJ *floribus albis; cahjcibus foliis Jpinojis circumfeptis.*

Folia <fcntato -fpinofa, amplexicaulia. *Caulis* decumbens, tomentofo-lanus. *Kores* nonnulli radiis ligulatis, caftratis.

Alexandria. Arab. *Akefth.*

94. CENTAUREA ACAULIS; *cahjdbus oblongis? palmato-Jpinojis} ad radieem glvmerato - fejjilibns^ foliis pinnatis, incijis.*

Alexandria vernalis. Arab. *Serrat en naghū*

95. CENTAUREA ^ALOTRAPA; *foribus pallide* violaceis| interdum albis vel Jlavis j radii vacuis, quadrtfidis | difci hermapfir. 5 -jidis.*

Spinw calycinae magnae, bafi ciliati. Folia pinnata, ferrata.

*Alexandria*¹ copioffime ad omnes vias & agrorum margins. Arab. *Schök*, i. e. *fpina:* vel *Morrejr.* *Folia* & caules adhuc juniores cdules crudi. In ccephalalgia folia contufa applicantur capit.



NOVA GENERA.

MICRELIUM.

- \$6. MfCRELIUM. *Potyfr, fiptrjl. radiata. Retept. fetaceum, paleacem. Pappus nn/hts. Calyx 9-fidus: corolla longior.*

DESCR. *Caulis diffiifus, hifpidus, pcdalis. Folia oppofita, feflilia, bafi con-nata, hifpida, lanceolata, denticulata. Pedunculi geminati, nxillars ex una axilla, rerminales, uniflori, altero fefquilongiore, folio ramen bre-tiore. Calyx 9-fidus, a?qualis> corolla longior. Keceptacutum (etacco-paleaceum. Pappus nullus. Flos facie ojleris J quamvis aliis notis difcedit.*

Rq/etta parcus ad foHas agrorum & hortorum.

clufo corollas tubo: *Jlignite* bipartito: ftaminibus nullis. *IWaJhuli* in disco plurimi, corolla latiore, infundibuliformi, f-dentaro. *Filmnenta*; capillaria, brcvia, antheris longis, conrutis. *Pericarpium* nullum. *Calyx* ematurus fubglobosus femina fovea. *Seinina* cuneiformia, compreffa, marginara, coronara denticulis (era termimtis. *Pappus* nullus. *Receptaculum* commune, plnum, paleaceum: paleis hyalinis, linearibus.

Kdhira Ipontanea. Arab. Karuan.

POLYCEPHALOS.

100. POLYCEPHALOS. *Polyqamia capitata*. *Calyx* ^-phyHits,* *multiflorus*.

DESCR. *Cattlis* profrato-repens, fubangulatus, viridis, herbaceus, farcius. *Rami* alterni, erefli₃ tcretes, alati ex decurrenria foliorum. *Folia* alterna, lanceolara» 3-poll, dentato -ferrata, punftis excavatis utrinque, venosa, glabra, decurrentia ad alam frequentem, formanria alas lacas, denratas. *Stipulnt* nullse. *Fiores* in capulo terminali, sub quo bra&cie 3 lanceolares, ciliatx, decurrentes alis Intis, calycem primum communem form-antes. *Capitnrum* violaceum, globosum, diametro 1 poll, concinens fasciculos floruni innumeros, alio calyce communi distinctos. *Fascienlus* quivis riorum, bvaSiea ovato-acuu, mariftara, viridi> margine hyalino 1 villofo: calyx 4-phyllo, multifloro, viridi, margine villofo: kwiniis lateribus acute convexis: intra calycem Mores 9-18J plerique fominei, pauci herm. *Fiores* fcomiuei in uno fasciculo, seu inra unum calycem 7- 15 > calyce proprio nullo, corolla subulara, longa, apice angustata. *Stamina* nulla. *German* cylindncum, albidum. *Stylus* filiformis corolla lon^ior. *Sti?jna* bifidum, divergens. *Fiores* hennapfi. raro 3 in uno fasciculo *Corolla* ventricofa-rubulosa, albida, apice violaccio, ^-dentato. *Filament* a \$, alba Ant her cp connarx, supra corollam furgentes. *Gtrmen* parvum. *Stylus* filiformis, albus. *Stigma* implex, filiforme, curvatum, glandulosum. *Pappus* nullus. *Receptaculn* squamatum bracteis distinctorum florum.

Rofettcc in litore Ni!i; florens in iro Nov'mbr. Arab. *Habagbdg*. Odor plantx, (foliorum imprimis) *Hyflosum* fragranter spirans.

OJJS. Mirer indolis planta. *t'efiuopi* ottinis videtur, sed facitis cajituli ut *Scabioft*. E longinquu a p pa ret *Pulyfiawta aqualis*; quia in omnibus fasciculis florum, in radio & disco arqualiter sunt hermaphr. feminines mixti. Capitulum confidero velut or turn ex multis retratlis pedunculis florum compositorum polygamis liiperflua? , & quisque fatus illus florum est velut flos peculiaii compofitus bractea & calyx c. mmuni: flores fecmineos in radio>, hermaph. in disco glandulosis. Quid? quod in radio plur: fint feries Roiculorum focmin. ideoque flores disti htvm pnuiores quam feminici radii; quod in congeneribus contrario fe hahet modo

DE-

DESCRIPTIONES PLANTARUM

CENTURIA

SEXTA,

CLASSES XX—XXII.

GYNANDRIA. MONOECIA. DIOECIA. POLYGAMIA.



C L A S S I S* XX.
G Y N A N D R I A .

ORCHIS.

1. ORCHIS FLAVA J bulbis iudivris * ovato - oblongis *, ne Siarii labio Jitbro* tnndo, in Ugror.

DESCR. *Scopus* faepe cubitalis & ultra. *Flores* racemofl , tnagnt , flavi. *Jiulbi* virides, tripollicares, supra rerram faepe exftantes. *Folia* glabra, cubitalia, lincaii - lanceolata, rnlilcara, bad complicate.

In monte Barah. Arab. *Djisfdb.* <->£?* Succum herbae illitum vulncri fpincc impLxflac^ illam expclkrc poilc , affeverant **Arabes**.

2. ORCHIS APHYtxA. Ad *Uahfdt* & *Kurmá*.

Rasemns fccundus. *Flores* campanulati > albL *NeSlarium* filiforme. *Folia* nulla.

3. ORCHIS VIRIDIS. Ad *Mhhrras*.

Scapns ramofus. *Flores* virides. *Neffiarii* cornu obtufum , ccurvum > labio albido, intus papilloib. *Fulici* fimilio' plantar *Strlab*.

ARISTOLOCHIA.

4. ARISTOLOCHIA SEMPERVIRENS ; *folih late-cordatis* ; *caute fruticulofo** *Jlriato*.

LohaJ&. Arab. *Ghaga*. * i ^ *Mufa* dicebatur *Luaja*. K^J Laudantur folia contrita , vclut optimum medrcamen vulneribus tendinofis. Scd contra mor/his férpentum heroica flint folia recntia, fi contrita vulneri imponuntur & iimul manducantur, vcl dcoflum eorum in h&c bibitur. Guftus ingratus & naufcoluš eft. Quisquis 40 dicrum *dixta* hac uti vclit pljma, nunqunm ille lethaliter laeditur a ferpentum iftu ; co usque vires Aridolochisc evehunr. incolje. (*)

ARUM.

(*) Auffr&Hores orbis plaga.¹ Vcenenis abundant fumme lethiferis varinqne fub forma hahitantibus , ' in venis Montiam , Vegetabilium vj Animalium diverforum. Sinuil tanun pancreaticain prrbent niedicinam eidem regioncs. Incolae, funeflis '(k continuis cladibus culocti tandem ijj panacea-, incidcnint, quas fhcro arcano fibi 6c lisredibus refcrvnrunt. Qnum vitam fylvefrem & ruralem ducebanr, medicinasn fuhindc depruhendebant anfmaiium domefticin; qu^ni, fbbulis narrantiuin inviđiofe licet tdtain , fabuloiaiu uudique effc negavic uhus in homi-
nes

ARUM,

5. ARUM FLAVUM; *fotns pedatis*; *folio/is ovato - aeutis, mtigris, fpat/ia tia-dice tongiors.*

DESCR. *Spadix* herbaceus, pedalis, acaule*; ad dimidium te&us foliorum vaginis. *Folia* fccpe 2 vel 3. # *Folia/a* ovato-acuta, glabrum, interna vcrfus medium majora; intcjcmixris foliolis minoribus; foliola maxima bipollucaria. S>/ja bipollucaris, flava, laxe-knoseolata, glabra. *Spadix* flavicans, vix pollicaris.

Ad Taces. Arab. *Dochaf*, دخاف

6. ARUM PENTAPHYLLUM: /forf;>. Arab. *Dochaf*.

Folia fspe 6 vel 7-na;; ac velut umbellata in apicc pctioli fcapum tequai>tis. GMAJ* *viridis*,

ZOSTERA.

7. ZOSTERA UNINERVIS:

DESCR. *Fotia* breyiflma, fpifhim. integra, pfena, ncrvo mcdio obfcuro, bafi vaginanria. *Caulis* compreffus, articulatus, flavus, gniculis latibus.

8. ZOSTERA CILIATA; J!ipite viridi, vaginis imSricnto; foliu difikhis, apics.. rctnfs, cUiatis margine & ejus bafi ampxantibus folia fpmora.

(U) 3

DESCR.

nes translatiu. (*Lignum Quaffi* in officinas nostraras reeptum, primam dcber notitijnn mancipio *Quaffi*) Ii'adem, fine dubio, occaione, dum alexipharmacis inveniebantur, prodat etiam artificm Serpenrcs domandi; quod pne/tifitatorium vocat yulgus, qnodqne in bunc usque diem ulna famiuii & Iedum non-patefecmiws. Egrugius Viator KAMPFER afpexit, nquaqnam introfexic htec facina^ Inceitum adhuc eft aw Planta, qait venena vincic, simuJ ontipathiff vel horroris -vi aget in ferpenrcs. Horticulrura & Oeconoiuia polu-kiis dudum 110s inftruxit, Aniinalia mirifice aveifari vel appctere certa vegetabiJia. Symbolinn his myfteriis aliquando iilufrandis. cfert exemplum in Infula *Bombay* dum ibi commorabar, ab Anglo civc uarwrum. Animnl q.noddam fe qua? drupedum claiTe) aluit, quod in otila veF triclinio ferpenrcs admiflas o^pa-clinulo modo voluit; fed in horto out campo aperro ocytis pugnam iniV'info cum Cobra CapelJa^ earn, ut mihi videtur, ob cauffam quod mediciifim paratam habcrct in fylva viciua.

Cafuin prorfus iimilem nuper mihi rraddit Amicus ex America rcdux. Verno no- mine cvro duflum inner Col/ram *aijamque ft-rpenrem.vidit Hir vuln'cta protinus herbann (uundem odiit & guftavir. Cato illn'n notabat.-nluriiviisue rentamuubus mftitntis, fidele pbarniflcmn nnrioxicum probavir Nomtn plants boranicum neicit Amicus, fed triwali fiencionatione vocatur C/r<-nis berba CoMun. Quardam ad hanc rein fpcaaiitia vide in Dcferiu" Ai-ab. p» 134- (EAVor.)

DESCR. *Stipes* interdum pedalis, compreflus, verfus folia latior, viridis, imbricatus vaginis breviflisis. *Folia* difticha, digitum lata, (pith, valde ciliata, inferiora magis; apice obtusa, emarginata: baferis vagina flaviante, cuncta, pollicari, hiargine amplexanre folium superius: vaginae columnjim faciunt «compre(Tam, caule multo latiore.

Arab. *Kofchar**

9, ZOSTER A STIPULACEA; *JlipuHs oppofitis, oblongis* tomplieatif folis geminatis, oblongo-Janceolatis, petiolatis.*

DESCR. Planta Cdmprcffa, ira ut omnes partes in uno piano. *Caulis* cylindricus, anicularis, articulis ftipula trevoribus, viridis, vix spithamalis. *Stiputo* ad genicula oppufitcc, complicatae, femipoll[^] oblongae, obrufx, hyaline: unius larcis foliifex. *Folia* e fngulis axillis ftipularum vclut e fpatha. prodcuntia, gemina: *petiolo* linearis, viridi, hyalino, in ftipula delucentc. *Lamina* tenuis, 2 poll, utroque extremo attenuata, ciliata, venis fimplicibus obliquis, hyalinis.

Omines hse Zofterx ad littora *Moehha-*, gramina xferentes submarina.



NOVUM GENUS.

MOSCHARIA.

10. MOSCHARIA. *Tetrandria, monogynia. Calyx 5-dentatus. Corolla milla.*

DESCR. *Radix* perennis. *Caules* piures, anpui, ereflo-diffusi, tetragoni, (pithamales. *Folia* brachiatim oppofita, fefflia, bipoll. lincaria, apice dentata, obrufa, villofa. *Floras* ab imo caule in quavis ah folitarii, fefiles: magnirudine pif minoris. *Calyx* globofus, villofus, apice 5-dentatus, claufus, perfiftens. *Corolla* loco membrana hyalina, velut faccus frutificationem totam vefticns; ilia ferro aperienda, fi aditus patet difquifirioni botanies. *Filamenta* nulla. Avtherce 4: ftigmacis apici circumfex arquc connate, didyma.¹. *Germina* 4, obovara. *Stylus* filiformis. *Stigma* (implex. *Pericarpium* nullum. *Semina* 4, kevia, nuda.

In dcfertis circa *Alexandriam*, ftorens medio April. Odorem *Mofchi* fpirat fortidimum.



C L A S S I S XXL
M O N O E C I A.
PHYLLANTHUS*

11. PHYLLANTHUS MADERASPATEXS. *Had&.*

Calyx fam. fexdentatus, obtufus. *Mafculi* petala 5 parva: ftamina 3: calyx 5 - dcntatus.

12. PHYLLANTHUS OVALIFOLIUS *, *caule arborea j foliolir ov alt his ,. obtvjis, integerrimis.*

Folia alternatirn pinnata, florifera! Foliolorum ftipulac, fquamuke z lancco-latiE, divergentes, cäuli appreflie.

Had/e. Arab* *Hoñurmer.* حُنْرَمَر

13. PHYLLANTHUS HAMRUR; *Jliputts 2 lanceolatis ; folih alternts^y fimplicr-ter pinnattSy foliolis qabava - oblongis * alternis.*

Foliola 14-23 numero J fere femipollucaria, Frutex inermis;

Melhdik Arab. *Hamrûr.* حَمْرُر

14. PHYLLANTHUS KIRURI.

Corolla 5-petala; calyce mulro minor. Petala plana> orbiculara, . Stamina %, raro 6. Calyx mafc. & fcem. 5-fidus»

Hadie. Arab, *Mekatkata*, vcl *IMeneckete.*

BUXUS.

15. BUXUS MOICA. In monte *Bar ah.* Arab+**Katam.* pX\$

DESCR. *Flores prope ramos in alis capitulati, fubfeftiæs. Jlntherm 4 rabra: , magnie, prominentes. Calyx & corolla mafculi 4-fida : piftilla nulla. Alii fruticcs liaccgs producunt fubicfiles inter folia, fufco-violas, parvi pifi magnitudine^ duras. Capjula? monoip. durx# Baccatæ non edulcs.*

URTICA.

16. URTICA PALMATA: *foliis alteniis, ferratir* ovatir* palmath\ Jpicis fa-miueis rigidis, Jiciüvdis, pinnato - ramojs.*

DESR. *Caulis annuus, cubifalis > fulcatus, hifpidus> vix ramofus. Folia alteina. Petiolus bipoll kviter canaliculatus. Lamina late ovata, vel trilobo-*

trilobo - palmata, ferrata, hifpida, 3 poll. *Pednnctili* axiHarc, .fpicati, patentes: mafculi capiculati: fceminci, fpina radii pojJicari, patenti, rigida, 'hifpida, nunofo-pmnataj nonnlf i fubtus florifera. *Stamina* 4. *Semen* compreffum, nitidum, fubrotundum.

Temen in montibus. Arab. *Schadjdret el mehdbbe*, *-oc[!]J fyss?* 1, e. *plant a amoris*: ironice flc difla.

17. IJRTICA iNiiRsj/oAV/ *qppojitis*, *ovato-acutis*, *ferrato - crenatis*; *capitutis interfoliaceis, feffilibus*.

DESCR. Cbffer annui, pcdales, fubquadragoni, quadrifukaci, hifpiduli, ramofi. *Folia* oppofira. *Pttiolus* pollicaris, patens, canaliculatus, tifpidulus. *Lamina* ovaro-acurn, hifpida, pollicaris., bail integra, d:in groVc ferrata & fcrc crenura. *Stipuui?* dua? urrinque; .patentee, lanceolate, pilofx. *Flares* fcffiles, formantes capirulum ad urrumcjue larus tixillx iupfa ftipuUm: Mafculi & feminei mixti, Cum apricitur corolla, exfiliunt filamenra clallica.

In montibus *Hadienjibus*.

18. URTICA PKRASITICAJ/O&VV *ulternis*, *ovato-mutiS)/erratis?* *mollibus; tapitulis axilJaribus feffilibns*.

DESCR. *Canks* ramofi, pedals, turctes, vHlofi. *Folia* alterna, *Pttiolur* pollicaris, tcres. *Lamina* late ovaria, fefqinpolL b,|C| integra, dcin grofic ferrata. *Stipilce* binae , lanceolate, patentes, breves. *Floret* capitati, numerofi, feiUJcs, axillares, mafculi & fceminci mixti: horum-%)i fubulati, loirgi, villofi, albi. Non urens'.

&*Icidte* miiros inhabitat hortoruin CofFca:. Arab. *Nedjda*. f&zF*

19. URTICA DIVA-RICATA.

Pedunciili a^illares bafi nudi; apice ramofi , in codem pJauo. *Stamina* eh-* ftice exfiliunt c corolla. Non urens.

Hadie. Arab. *Meharreka*.

AMRRt)SIA.

no. AMBROSIA VILLOSISSIMA j *foliolis pinrmtifidis* j *dentaiis*; *taxm*, *viuvjiytmo*.

DESCR. Planta annua, tota villofitfima, *Radix* fufiformis, fubnuda. *Canlit* cubitalis, teres. *Bam fa&vAi* oppofiti, longrorc, bafi callo cincti; fuperiores alterni, fenfim •tninorcs, omnies ramulofi ainternatim. *Pedtmntli* fpica? caulis ramorum rarnulorumquc omnium rcrminalcs, (impliccs. *Fkres* Mafculi iupcriores breviter pediclati> fine foli's cauliis inter-

fpcrfis: frd inrra calycem communem dift̄m&i paleis filiformibus incurvis, corolla longioribus. *Fcrmbm* fubrus, vel ad bafin fpicae Mafc. vel in axillis eriam inferioribus fcdilos, quiui congefti in capirulum, foliis cincti. *Folia* alrerna: petiolo pollicnri, supra leviter canaliculato: lamina fcfquipoll. pinnata: foliolis pinnarifidis, dentatis.

In *lnfulis Niloticis* circa *Kdhiram* frequens, ad agrorum margines florens inicio Junii. Arab. *Demfije*.^{*} ***** Herbae decofli vapor admis- fus oculis dolentibus prodeflc dicirur.

ODS. CharáCV. gener. repugiat, quod corolla comm. mafc. mills inrra cnlycem comiu & recept. non nudum, fed paleis filiformibus. A *Munfiuin* nbit, quod fpicx terminales caulis & rainolorum. Flores Malè, racemofo - fpicati: Fcem. capitati, (ediles,

ACALYPHA.

2T. ACALYPHA FRUTICOSA.

DESCR. *Frutex* tricubitalis. *Rami* reretes, verruculis remotis fcabri: juniores, virides, villofi: *Folia* vix polliciria, perioUra, ov;uo-acenta, fcorrja. *Flores* jam. in involucro *cucullato ieffiles^ *majiuli* amentis peculiaribus. •*Germen* villofum.

Arab. *Rorfam*. *Jo-** aliis *Schohat*. In *Surdūd*. *jinféhat* ISJŪAS cd *Uahfdt*. *Dafrdn*. (^7*^)(3 In *Hadiē*. Hanc & trcs fequentes in valle *Snrdiid* inveni ; cum Acalyphis LIIS;N# iion bene conciliandis. A *vir^ata* diffiit , quod folii ovato-acuta, petiolo.breviffimo: & braftcoe fcem, *cucullitx*, ferraro - denrara?.

Foliis in aqua maceraris lavantur infantes pudulis *Tijl*. hborantes.

22. ACALYPHA DIZCIDUA; *invotucris fecmineis eucullatis, Jirratif, decidnis| folds lanceolato - ovatis; petiolo fefquilonioribus*.

Herbacea: fpithamalis : *folia* vix fefquipollaria, ferrata. *Involutra* feflilia, axillaria : *ptiuli* pollicares.

Umbrnm amat. *Ac. virg.* charafter huic compctit. Arab. *Bortorn foghaier*.

23. ACALYPHA SPICATA; *invohuris ftemineis tucutlatis, Jerratii; foliis tan-ceolatis*.

Herbacea. *Pfdnnculi* axillares fefquipoll. *involucra* fom. fpicata, terminata amento malculo. *Folia* & petioli fcorrari ejusdem longitudinis, pollic. Si involucra effent incifa; ad *Virgin*, venirec.

24. ACALYPHA SUPERAJ *foliis watts** *petioto brtvioribus > amentis axil/art-*
hus mafculii flare f&mineo pedicellate > tenninatis.

Herbacea. Sefquifpith. *Petioli* bipoll. *Folia* vix fefquipoll, lanceolato-ova-
ta, ferrata, acura.

Charafter *Indict?* quadraret, fi effent braſle&^A fecm. (forte delapfæ erant:
unicam enim vidi fpeciem.)

ay. ACALYPHA CILIATAJ *involueris femineis ciliis Jiliformibus^ conniventibus.*

DESCR. Annua, cubitalis, crctfh, ramofa. *Caules* reretcs, pedalcs, pilofi;
dimidia partc inferiore nudi, dein folioft. *Folia* fefquipoll. & minus
remota, patentia: *Petiolus* inferiorum lamina longior; fupriorum bre-
vior. *Lamina* majorum bipollcaris, ovato-acuta, crcnata, venofa; fub-
tus pubefcens, pallidior, fupernc feris hiipidula. *Peduncnli* fpicse axil-
larcs, fubpoll. iVpe geminx, ercftac, flores fceminei ad bafin; mafcult
fupernc pofiti. *Flores* fceminei obtegunrur *involucro* connivent, ftriaro,
marginc ciliiti filis p.irrcrn intgram sequantibus: *Jtigmata* ibla fupcremi-
nenr, capillaria, multifida. *Calyx* vix oculis nudis confpicuus, minu-
tiffimus. *Flores* majiuli fuperiores, numerofi, parvi dum florent, *pe-*
iicello fubtili, patentiiTimo clavati. *Calyx* 4-gonus, quadrifidus. *An-*
ther ce albx, adeo conferrx, uc vix armato diftinguantur oculo, *Capfula*
3 - locul. 3 * valvis, monofperma.

Temen in montibus inferioribus ad *Tacts* inter fegetcs.

CROTON.

26. CROTON TINCTORIUM?

DESCR. *Caulis* diffufo - procumbens. *Folia* petiolata; fubrotundo-obliqua;
interdum rhomboidea, rugofo - plicara, margine repanda: folia termina-
lia, ovata, regularia: omnia obrufa, villofa, fcabra ftcilis pilorum.

Ad *Gize* > pagum c regione *Mafr el atik* in margine agrorum florens
inirio Junii. Arab. *Ghobbajre*. Aliis *Battich el malaike*. Flanta re-
cens lubflrata gallinis inquinatis pediculis, hsec enecat infefta.

27. CROTON LOBATUM.

DESCR. *Folia* ferrara, ferraturis mucronulatis, non fpinofis. *Calyx* maris
& fceTi. 5-phyllus; laciniis dcnticulatis. *Corolla* mafculi purpurca.
Capfula glabrac. Ad foliorum exortum utrinque *Stipula* palmata, laci-
niis fubularis* ramofis, flexilibus.

Mor. Arab. *Mdjerfche*.

fig. CROTON VARIEGATUM.

DESCR. *Folia* breviflora petiolata, digitum longa, lanceolata, integrifolia, nitida. *Stipula* uncinata una, bipartita; lobis filiformi - fimbriatis, erectis, unguis brevioribus, callo prominulo infunditibus; callus interior folio propinquior, longior.

Uadi Zebid. Arab. *Dundul* دندول

29. CROTON SPINOSUMJ foliis 3-5-/061/» integrity glabris| JlipulisJpinofis.

Flora punicea. Folia nitida. Planta frutex.

30. CROTON VILLQSUM ; foliis palmatis, quinquelobis, glandulosa ferratis,

VESCR. Fruticulus sefquicubitalis, erecto - diffusus. Caules antiquiores circuncircumflexi recentiores virides; omnes villoosi, molles, tereres. Folia sparsa, olivacea, petiolo Tcmipollucari, tereti; lamina palmata, quinquelobata, loba, obtusa, villosa, polluta, diametri, ferruginea, glandula ad (ingulam ferratum). Stipulae? nullae; fed ad exitum cujusvis petioli, ucrinque & Jlipra *Clan** dulce fufes, fefiles, vifcidiv, ucrinque tuberculata. Maris Calyx 5-plicatus, integer: corolla flava, 5-partita, glabra, campanulata. Famine calyx 5-phyllo; laciniis ^uneiformi-trideotatis! glendulosa-ferrulata.

Eor. Arab. *ÖbaL* عبا

OBS. Dura pungit, succum emittit lateo - aquosum, tanta? acriditadinis, ut feii-nm nrrodiit 6c inquiet; luhiloinkius pabulum quantum in hac platifl *Cimex* putcherriinae formie.

Ufus medicus est in morbo dido *Sanfur* ~dtXso vel *Roha* ss^fy^ ab's *Dymnidi?* (J^C(3 ^lii^ Amede) gj^5 id est: *furuncuh*, *apoftematc.* Stipites recentes imponuntur; sic tumor emollitur & dolor fedatur. *Crotou lobatum* fuccedancum est, sed virtute inferius.

31. CROTON TRILOSATUM; foliis petiole brevioribus, 3. foliis, lameolath, ferratis.

An Croton? sed 10-andra, non i-adclpha.

JATROPH A.**32. JATROPH A PUNGENS.**

DESCR. Flores multiflori in spicis terminalibus: fomineis calyx nullus. Corolla 5-6-petalata pinnatifida, hirsuta. Capula 3-cocca, hirsuta. Folia petiolata, cordato-lanceolata, terrata, fimbriata hirsuta; sicut tota planta; urens Urticose inflata.

Temen. Arab. *Rürekrek* <*\$/** vd Mekerkaka **/*? vel *Humejta*.

RICINUS.

33. RTCINUS MEDICUSJ *foliiipeltatis*, 7-/0A/V; *lobis lanceotatis, ferratis*, /»•
^ffwx fnqgf'x divergentibus.

DESCR. Folia interdum R - loba. *Glandula* una implex vcl didyma , in apicc perioli fub folio, ball ftipularum loco utrinque, vel inrerdum ibidem una in medio ctiam alae. *Truncus* craffitie i'emifpith, Ahitudo ultra 5 ulnas.

Rofetta; colitur ob ufuſ medicos. Arab. *Chama.* خروع



NOVA GENERA.

KOSARIA.

34, KOSARIA. *Calyx commuuis, monophijllus, carnofus*, 10 -jiddis. *Receptaculuin planum. Flores verruciformes, conferti.*

CHARACTER GENERICUS. *Calyx communis, 1 -phyllus, carnofus, fubrus convexus, carinis obtufis. Limbus 10-1 2-fidus, radians* Liciniis linearis lancolatis, planis, crafftis, patenci * recurvis. Receptaculum placcntiforme, femipoll. diametri, tegumento contiguo primum convexo, dcin piano , germina tegenrej inter qua? undique pit/pa carnofa. Flores numeroliflimi, velut verrucae parvfe, in crufa tcgentc recept, mafc. & fcem mixti. Mafculi: corolla verruca conico - truncata, apice aperta, parva viridis. Filamenta 2 , raro 3 , filiformia, albida , corolla longiora. Pifiilla nulla. Fcemeinei corolla verrucula in crufa tegente recept. conica, chufa, viridis: Germen ovatum, nitidum, album, in pulpa recpt.- rcconditum: Stylus filiformis, albus: Stigma acutum. Pnicarpii loco recept. in cuius pulpa dclitefcunt femina, quibus maturis dehiicit apex corollx fcem. Stmiua iolkaiia, ovato-crígona, acuta, apicc carinata, nicida, albida.*

SPECIES. *Caules: fpithamales, ereſH, digitum craſT, bafi ramofi; tuberculis plurimis, fpirds, confertis, truncatis, i]ui cicatrices funt foliorum de- Lpforum Folia fparfa; inferiora deciduntj ad apices reliant. Petioli cylindrici, glabri, crerfi, fcmpoll. & fi in umbrofo crefcit 2 poll. Lamina lanceolara, fsepe deflexa, ultra 2 poll, marginc undulata, fudentata, glibra, membranacea, viridis; interdum rufefcens, bafi cor- dat*. Pednnculi axillares, folitarii, recurvi, terercs, pctiolo breviores. Calyx communis faſpe pendulus, interdum verticalis, raro pollicaris diametri.*

diametri. Lacinice limbi calycini sequales* faepe alternc* ininores, in eadem planta. *Floculi* ut parvse verrucae e rccepr. exftants: wi-*fculi* filamentis antheratis: *fceminei* ftylo capillari acutoj fubtilissimi,

Hadle in Coffeae-cetis fub arboribus inter lapides. Arab. *Kofar.* />***.

Planta laetefcens, fcetcs; florc *Manhantiam* refert. Contufa *exan-themata* cunt. Sale mixta datur Vaccis xgris, gravidis.

TURIA.

35. TURIA. *Monoica, pentandra.* *FruEtus cylindricnr, utrinque: attenuates, 10 -fulcatufy villofus+*

DESCR. *Cautes* fcandentes, y • angulares > (cabrL *Cirrhi* ad lams petioli, bafi fimplices, dcin 5 - fidi. *Folia* alterna* fpithanwlia, palmata, lobis verfus me- dium longioribus, latioribus: 5-bba; lobis infirnis rrilobis; marginc fer- rato - finuata, utrinque fcabra. *Petioli* ftriis elevatis 7> cjuarum lu- prema maxima canaliculara. *Peduncilli* bterales > fspe gemini, axillares. *Floret* monoid: *mafciili* umbellati; *fcem.* fa?pe folitarii *Ma/euli:* calyx 5-part, lanceolatus, patens, faperus, perfiliensr *Corolla* j-pctalu, ca- lycc" longior, patens > rotata; laciniis obovatis% fefquipoll. flavis* intus pilofis; fubtus nervis clatis,. pl>(Ts. *Fflament a* ?> erefla, filiformia, calycc breviora; apice varie divisa *Antheris* undubto-Libyriinihi-fomii. bus: filamenta enim duo infra antheras dividuntur in duo alia filam. & (in^uluin corum habet iu,im antjieram propriam labyr. - form:m. Terium Filam. elt fimplex, & una anthera. *Germinis* rudimentum femiglobofum , fub flore. *Fceminei* Calyx & Corolla ut *Mafculi:* *Neffarium* annulus callofus, nitidus, albicans. *Stamina?* filamenta 9 erefta, calyce breviora, fubulata, antheris nullis, medio callo viFlofo annuhta. *Germen* inferum, cylindrico-incrafatum, tomentofum; punc- tis ehtis, fparfis: *ftifas* bad fimplex, cylindricus, 3-fuIcatus, supra me- dium divifus in *Jli<>mata* 3, patentia, fuperiore latcre canaliculata, apice incraffata, villofa, flava, fuperne biloba. *Pericarpium* pomum cylindii cum, #utrinque attenuatum, villofum, verrucis fparfis, lineis Jongirudi- nalibus 10 obfcure-viridibus; coronatum calyce patentee ftylo, itigma- tibus & ftaminum rudimenris.

In Yemen culta. Arab. *Turia.*

a(u TURIA LELOJA; *fruStu conico, gkbro\ foliis tritobis.*

DESCR. *Catties* annui, ftriis longitudinalibus, farinofi, fubdichotomi, cirrhi; feandentes. *Folia* alrcrna. *Petiolus* femipolL fetofus, supra canaficufj tus. *Lamina* reñiformis, tripartita, pollico brevior, lobis tribus re- pando-angulofis, medius ovato-acutus> (implex; iatralcs bifidi; lobule

interiore longiore. *Cirrhi* ad latus petioli, simplices, torti cum foliis# *Peduncili* axillares, folitarii, filiformes, fabri? vix poll, apice racemofii, floribus paucis, monoids. *Majiuli*: *Calyx* campanulatus, j-dentatus, glaber. *Corolla* campanulata, 5-partita, patens, lanceolata, viridis, parva. Intra corollam *Squama* 3 ereSc, tubrotundx, crassae, extus fornicatae; foventes Antheram parvam, fessilem, flavam, didymam* *JFm̄mei*: *Calyx* & *Corolla* ut in mafc, *Germn* inferumi conico-cylindricuni orbiculo baieos dilarato, fubtus piano, pollicare. *Stylus* intra corollam. *Stigma* capiratum, bilobum. *Pericarpium*: pomum pendulum, conicum, orbicido bafeos dilatati, fubrus piano; glabrum, flavum, fcfquipoll. longum; intus biloculare, ferie feminum dupli in quovis loculo. *Stmina* vifco involuta, globofa, carina transverfa, media*, supra & infra phna, flava; piñi parvi tagnrtudinē

Arab, vulgariter *Lua*, P%3 vd *Hack eJomja*. In libris Arabum Botani* cis *Leloja*.

37. TURIA; foliis tordato-angutatis) cifiatis, bipollicaribus.

Temen. Fru&u maturo delabitur operculum pomi ex apice & viani aperit fetnibus.

Hanc & duas frequentes sufficiem determinare non liorit, int-ne varictates vel species.

38. TURIA GLJEJ pomis ovatif, 10 -filiatis, glabris} foliis trihbis, dentieulatifs, utrinque fabris.

DESCR. *Caules* 6-anguli, fabri, volubiles. *Floret* parvi", virides. *Orrhi* foliis oppofiti. *Folia* i poll, diametr. *FruStus* nuce minor, inaturus cinerafcens, hifcens, valvis revolucis; non edulis.

Lohaja. Arab. *Gijef*.

39. TURIA MOGHADDJ fruSiouaR - oblongo* glaherrmo|foliis 7rilo6if> inU-gtrrimū^ lobis lateralibus fubtrilobis.

DESCR. *Cautes* teretes, teves. *Fbres* albi, magni. *Cirrhi* opponi foliis. *Folia* 3-peticaria, integra, lobo medio late lanceolata; lateralibus ballbis innuatis. *Pom* a || poll longa, vix 1 poll, diametr. glabra; imtnatura viridia, albo-punftata; matura, flava j eduiia.

Lahaja. Arab. *Moghadd*.

CUCURBIT ACEA

iEGYPTI ET ARABIA FELICIS.

A) CUCURBITA,

- 40. CUCURBITA LAGENARIA.** *Kdhinv* culta. Arab. *Qard m'daner*. قرع مندور
Variat; *fructu globojo*; vel *tafi glohofo*, dein attenuate.

Non edulis; fed ad *Lagenas* vafculum aptiflmmum, Ieve, capax, fepe ii
pedis diametro. Pifcatores (blent poma vacua ratibus fuis arundineis
affigere> ut leviores narent.

- 41. CUCURBITA LAGENARIA.** Arab. *Dubba dibbe*. *K&hirce & Temen*.

Folia tomentofa. *Glandular* 2 fubtus juxta petiolum. *Flares* albi. *Grrhi*
oppofiri foliis, bifidi. *Fruflus* edulis, coctus.

- 42. CUCURBITA LAGENARIA.** Arab. *Clara tauvtl*. JLJJL *C,3* *Kahirce*.
Flos albus. *Folia* ut *Qarà m'dauer*, *FruStus* bicubitalis> coflus edulis.

B) CITRULLUS.

- 43. CITRULLUS BATTICH** £xla* -ffigptyiis. Morenibus *Dubba farakis*.
Aleppenibus, D/ff5fl.r. Ebraeorum גְּתַרְיוֹת

Diftingunt Arabes hunc Battich a *Bartich*. £>\$&/*: *Gtrutto* vero *; & ajunt
fructum maturum evadere cinereum.

Folia multifida. *Corolla* j - fida. *Seminis* fuperficies miris linearum pin-
gitur anfraQibus, ut in Graptolitho , quos imaginatio in varias diri-
git figuræ. Nuper fructus Alexandria apertus, in quo omnia erant
femina figurata> quod rarissimum est,

- 44. CITRULLUS.** Arab. *Schurredj*. *S^J& *Hadie*.

Folia glabra, palmara, integra. *Cirrki* fimplices. *Fruffur* oblongus, glaber,
albo-maculatus> bipollcaris , edulis coctus. *Semina* marginata.

- 45. CITRULLUS.** Arab. *Kdfch*. <jMi *Hadie*.

Flores mafculi filamentis 3 latifimis ; antheris connatis in formam ovatam,
carinis laUyrinthiform. Florum diameter 4-poll. fulvi; intus toti, extus
venis villofi. *Folia* cordato - fubrotunda , obtufa, lobata, denticulata,
fpithamaKa, fetis hifpida; fubtus glandulis nullis. *Grrhi* bifidi. *Fruffus*
magnitudine capitis humanij fi^urjc varia?: aut globofo - rofratus; aut,
ovali-oblongus; alias glaber, fulcatus alias, Edulis coftus. *Semina* com-
preffa, ovali-acuta, marginata.

PEPO.

C) PEPO.

46. PEPO LONGA. Arab: *Kara vcl Garna. Kdhirce.*

Caules villofi, molles, cirrhosi. *Folia cordito-fubrotunda*, villofa, mollia, fubdentara. *Flores albi.* *FruStus cylindricus*, tener, villoius; matus glaber-

47. PEPO. Arab. *Qar'a Jlamhull Kdhira.*

Flos flavus. *Folia* cordato - fubrotunda, dentato - angulata, hifpida, mollia, *Caulis* hifpidus, fetis rigidis. *Cirrhi* nulli. *FruStus* teftaceus, laevis, ovali-globofusj cdulis coflus.

D) CUCUMIS.

48. CUCUMIS ANGURIA. *Mozhha.*

Folia tripartite)-dcntata. *FruSfus* echinatus, ovalis.

49. CUCUMIS TRILOBATUS. *Taas.*

Stamina 3. libera. *Antherce* undulate, lateri exteri filamenti infra apicem affixae, filamento latiores; an ergo differt a *Tiiria leloja*, cuius antherse filamento anguftiores? *Folia* xriloba, denticulata, l'cabra. *Fntffus* muricari.

50. CUCUMIS. Arab. *HVhaimta. SurJi'd.*

Caulis volubilis. *Folia* triloba.

51. CUCUMIS ANGULATUS. Arab. *Kauun. Kahirc.*

Flos albus. *FruSfus* globofus, angulis muluis[^] femiterctibus[^] dulcis. *Cortex* Jignofus.

52. CUCUMIS MELO. Arab. *Dummeiri. ±JjXv<>. Kdhira.*

Flos flavus. *FruEius* globofus, utraque extremitate depreffus; dulcis.

53. CUCUMIS CHATE. Arab. *Abdettavi. xJjW. 0*2 feu Adjilr. ^ys*.*

Caules teretes/fetis rigidis. *Folia* Jobata, tientata, utrinque fcabra, angulis obtufis. *Flores* flavi. *FruStus* juvenis hiffutusj matus glaber, utrinque artenuatus. Edulis crudus.

FruQus in -ffigypto omnium vulgatiflimus, totis plantatus agris. Multi ex illo parant *Potum* gratidimi faporis. Secatur foramen ad umbilicum, fru&u maturo &*in caule adhuc perfiftente. Bacillo intrufo pulpa quaffua mifecrur; deinde cera vulnus obturjitur, Melo in fovea quam proxime excavata deponitur & lepelitur cautiffime, ne a caule difTringatur. Post aliquot dies pulpa deprehenditur foluta in liquorem delicatum.

EJ SATIVUS.

E) SATIVUS.

54. C. S. FAKUS. Arab. *Fakiis.* (*jcy& Kdhira*)

Flos flavus. *Frtffur* cylindricus, profundc fulcarus, fubvillofusj faepe cubitalis; minorcs fapidiores,

5j. C. S. SMILLI. Arab. *Smilli.* *Lohajce.*

Catilis rcpens. *Cirrhi* axillares. *Flores* bini ternive axillarc*> flavi. *Caulis* & pctioli bifidpi. *Folia* cordato - finuata > denticulaca, fcabra. *FruSius* oblongus, Isevis; maturus flavidus , tripollcaris. *Edulis* cwdus.

56. C.S.CHIAR, Arab. *C/iidr.* *j^fp** *Kdhircr.*

Flos flavus. *FruEtus* glaber, ovaro-cylindticus, pedalis.

57. C. S. CH^TTE. Arab. *Qatte.* KAS vcl &L\$ *Kdhirce.*

Flos flavus. *FruBur* viridis; cieterum priori fimilisj folia quoquc fimilia.

58. C, S. BATTICH DJEBBAL. Arab. *Battich djebbeli.* Cultus ab Arabibus monticolis. *Frućtus* non grandis, dulcifimus.

59. C. S. BRULLOS. Arab. *Battich brulloji.* Cultus ad *Delta* promontorium *Erullos.* *Fru&us* interdum cubialis diametri; dulcidimus; intus albus, fcepe ruber.

60. C. S. ENNEMIS. Arab. *Battich emiemts.* (*ju**J I ^ W* *Kāhira.* rario.

FruRiis subcylindricus, fope cubititis* inrus flavus, raro ruber; ddicatissimos.

61. C S. ARAKIS. Arab. *Jrcikīs.* *Lszfys* *Lohajoe.*

Canks tereres, glabri. *Cirrhi* axillares. *Folia* fcfquipoll. diametri , finuato-quinquangula, remote denticulara, glabra. *Flares* mafuli, albi , flavefcentes, campanulari, extus-glabri, vcnis elatis, viridibus ; inrus villofi. *Germen* sub flore femineo oblongum , tuberculatum. Non cdulis.

62. C. S. SCHEMMAM. (*DuJaim.* Spēc Planr) Arab. *Sc/ieemmām.* *j*U*i* *Kdhircr.*

Cautes 5 - fulcati, fetis rigidis, fcaudentcs, cirrhoR. *Folia* cordato - oblonga, acuta , subfinuata , dentato-rcpanda , hifpida. *Calyces* villofi moiles. *Flares* flavi, conferti in alis. *Fruſius* globofo - ovatus , glaberrimus, magnirudine citri, flavus, maculis inxqualibus, fulvo-ferrugineis , vcrfus polos in lineas conflactibas ; pulpn aquof 1, fcminibus tota plena. *Fruftuf* juvenis villoius; maturus glaber. Odor; forris ncc ingratus; eamque ob cauffam cultus; non edulis.

C L A S S I S XXII:
D I O E C I A.
SALIX-

63, SALIX a:c YPTI AC A ;/b/?/j tanccoiatis.

Flores diandri. Stipule? fofiorum recentium femicordatse ; quod obftat charaft, Salicis segypr. Succeffu temporis hse ftipulae ddabuntur.

*K&hira. Arab. Ban w U voLChaldf. LJ^Q**

OBS. # E floribus mafculis defiltatur aqua in iEgypto ufitatiffima nomine *Moje cballif.*

Folia Salicis (ut cniue notum eff) *mufcas* alliciunt; eadem quoque aite in ffigypto ramus foliiferus noclu fufpenditur in cubiculo, ad quern fe cojiferunt *mufca?*; Earmn ftercora colliguntur , caute cultello obraia, & pro medicina laudata ufurpmitur -] grani dofi in (*trawyiria*. Solent alii eundem in finem fila teliuia in culinis expanclere, quibus node inlideut nxufcx.

EPHEDRA.

64. EPHEDRA APHYLLA ; *ramis patentijlmis.*

DESCR. *Caulis* tercs, planatus, articutarus, fubdichotomus, glaber, non iulcatus, aphyllus, craghtie pennse columbinne, arriculis fciquipollcaribusj non lignofus, fed coriacco - fpongiosus , viridis, diffusus, altrifime (candens.

Rofettcc in fcpibus alriffimis. Grace. ZTio'cfloo. Nominis fimilitudo Spar-Hum diadelphitm non cvincirj quumque flores n'm vi'di, convenientiam memini cum planta ejusdem formx in infula fmros quondam inventa > quam Ephedram putavi ; forfitan vcro in urraqc deccptus (urn.

CLUTIA,

6\$. GLUTIA LANCEOLATA ; *folits lanceolatis, iutegris, egtandulofis,fubtus midis.*

' fioka. Arab. .Alloh, ئەلەھ vcl Luck. ح



NOVA GENERA,
iERVA.

66. iERVA. *Pentandriay monogynia. Calyx ^-phyllm. Capfnla monojperma.*

DESCR- *Frutex fubercftus, cubitalis. Caftles obtefli tomento albido, cragFo, fcabro, Folia infima majora, fcquipoll, oblonga, bafi attenuata, integra, undicjue*

undique tomentofa, tomcnto albido. *Pedimculi spica*» cylindrical, caulis & ramorum terminates, spith. bad ramofce, spicas alias minoris perpendiculares exferentes, *Floref* undique confertidimi, fefiles: utrinque bra&eola membrunacea villofa. *Calyx 5 -phyllus*, patens, laciniis oblongis, extrorfum albis, hirfutis, introrfum glabris, rubentibus. Quotquot in iEgypto vidi plantas, floribus erant famineis; maſculis rariflisis, *Stamina* nu'la; *germen* fuperum, globoſum*, *Jlijah* longior, filiformis: *Jligma* bifidum. *Capitla* oblonga, monopcrma, calyc vallata. In alia planta flores erant tantum hermaphroditic incomplcti, inferi: (lamina 5 anrhcrifera, totidem alterna, ftcrilijaj omnia bail connata. Haud longe ab *Uahfdt* in *JErvam marem*, fruſtra couſqui quantum incidi: *Stamina* filamenta f, filiformia, corolla breviora, *antherce* incubentes, didymcc, ovales, flavor.

In defcrtis K&hirinis rarior. • *Temen* in fo:o arcnofo & calcarco frqquen-tiffiina. Epicis pulvinaria & fellse equcltres infarriuntur.

Arab. *Tetnen-*: *JErua*. I^I & Ra. J^ Kdhmu. *Sadjaret ennадje*, K.C* J Jiyac**"

CEBATHA.

67, CEBATHA. *Dioica, faxandra. Calyx, perianth. 6-phyllum. Corolla 6-petala. Pericarphim* batca trhocca.*

CHARACTER GENERICUS. *Florer maſcuti. Calyx:* perianth. 6-phyllum, patens, deciduum, laciniis ovalibus, obtufis, alternis, externis minoribus. *Corolk|| petala* 6, bafis cavitate filamcntum ampleQentia, phna, ercGa, ovata, calyce breviora, triangulari forma pofita. *Fifameiita* 6, fingula inferta cavitati bafeos pctali, obverfe fubuhta, acurvj, obtufa. Antheric hemipharricc. Piftillimi nullum.

Flows Jccmwei: *Calyx* perianth. 6-phyllum : fimalis calyci male, lie & corolla. *Germen* trigonum, tricoccum. *Styli* 3 horkunwles, trec tcs, breves. *Stigmata* retulà, cmarginata. *Pericarpium* : bacca tricocca; coccis compreffis, fubcarinata, interna bafi coha:rcntia, intror fum roſtro ex delapfis ftylis cnato.

SPECIES. *Caules* frutices, volubiles, teretes, glabri. *Rami* alterni, perpendicularcs. *Folia* alterna; *petiolo* tereti, filiformi, perpchdiculari. *Lamina* pollicaris, ovalis, apic obtufa, fa*pe cmarginata, plana, glabra, flitida, venofa. *Pedunculi* axillares: *faminei*, gemini, filiformes, uniflorfT crefti; *math* plurimi, paniculati, congefliſin cJpiula axillafia. *Flores* virides. *Anthem* flavx. *Baccw* rubric: cocci finguli lente majorcs,

Hadk. Arab, *Kebafh.* Baccar̄ marurrc edules \ fed acri guftu. Ex his bac-
cis *Vimim adnftvm* pararur, quod vacant *Chamr elmadjmine.* aiysçtLā-
Baccie obtrix vafulo immittuntur, cum manipulo uvte fccse. Vas
obtūratur probe, & 10 dicrum temporc repqnitur. Deindc deftil-
latur imffa. Obrinetur spirirus, ultra quam dici poreft fo'rtis: Sac-
charo mL\ms> minus incbriat: fine illo > exeat fitim & ardorem in-
tolerabilem.

LEJEBA.

68. LE/EBA. *Dioica* > *hexandra.* *Calyx, pertanthium \$-phylhm> Corolla 3-petala.*

DESCR. *FlosWafc.* *Perianthium* 5 • phylum >, pateñ j foliolis tribus inter-
ioribus ovatis, convcxis, obtufisj viridibus: 2• exterioribus minimis, cr-
biculatis, flavicamibus. *Corolla* petala 3 > fubrotundo-oblonga ; calye
majoraj viridia> plana> patentia, margine membranacea. *Nyftariiun*
fquamje 6 in funda corolla?, in triangulum difpo%» > obovarae > planx>
furgentes; Bhfi cono obverfo vaginantes ftanjina fingula. *Filametita* 6_h
fubctavata; tongicudinc neftarii> ejusque fquamas perforamia. *Autherce*
quadrats, flavs.

K&hhce. Arab. *Labath et djebbel.* Genus apcurate determinare nequeo;
in rarritis mihi allatis > foli erant flores nafc. fine germine. Ad *Liblab*
obtinui flores fcem. fine mafcutis.

KEURA.

69. KEURA oDORIFERtAjofV/ Hneari-tanceolattSy ciliato -Jpiiwfis-.

DJESCR. *Arbor* P^Irois similis ; at fine fpatha j rattrofo-dichotoma,, *Folta*
familia foliis *Bromtlice* trifariam imbricata; floralia alba, inter qua? ver-
fus terminum ramorutn imbricata bafi funt *pauicula ina/cnfay* feu amenta
ramofa, nuda, fragrantifTma. *Antherce* fparfc.

ISadte, ftipitibus propagatur^ quum'arbor feminea non habetur: ab ex-
teris illara » fine dubia Banjanis auftoribus, quibus *Ketira* fonat;
Hadhnibus *Kadi* ^ j l ^ s (quod tamen generale eft nomen diver-
farum. arborum.) *Mockha* vocatur *Kabua KadL* Affertur multuin
ex *Machrafch*) loco ad orientem urbi? *Zeitd.*

Praeftantiflma arbor. Ocioris caufla colitur,, quern Ipirat tanr divitem,
ut una *Spita* alteravc fatis fint ad rcpendum cubile fpatiofmn haliru
odorifera per longum tempus» fi loco fubhumido rponantur; ideo-
que incotor nou curant arbores ipfas teftis plantata^sedibus inferre, atr
hortulis colere. Beicelfakih venditur fpica florifera pretio g-cho-
**nfe 1 i. e; •£ impérialis HungaricL

C L A S S I S X X I I I .

P O L Y G A M I A .

A N D R O P O G O N .

70» ANDROPOGON ANVULATUM; *Jpkis ad apieem culmi confertir * alternir; Jloribus geminatis; arifiato Jiffili hermaphrodite > pedicmato, mntico, mani_m*

DECSR. *Culmi bipedales, erefli, ramofi, geniculis incraflaris, hirfutis, fpeciofe certe, annulorum pibfbrum inftar; articulis taviffimis, lēmfipith» cylindricis-, FoJjBrum vagina? rripollicares, ftriatae, nudse: lamina plans, fubpedalis, utrinqae hifpida, lupra & ad bafin. Vagina iinra folium emittunt membranam hyalinam, amplexieaufem, ovaram, imberbem. Sphce Jincarcs 3 -poJh interdum gemina?, inrerdum oppofira; faepe foliatar, alternce, patemes ; in corum cxitu in gentcula utrinque grbbus. Floret apprefIT, gcminati j alter feffilif, alter pedicellatns : priori? calyx bivalvis, villofus, Lmceotato- ovatus, corallam includcns, bafi villis crnftus: corolla univalvis, membranacea, phna cum arifta_y.eba(i floris: Stamina 5 inter valvulam corolla &ari(lara; Styli 2vil!ofir Jfrffa tortilis> polfcaris^ corollis dccuplo longior. Flos alter pedtcello floribus breviore, villofoj calycecompreffo, villofo_r bivalvi: corolla & fVu&ificatione prorfus nulloj*

Padim ad ripas Nili : florens inirio JuniL

7K ANDROPOGOM RAMOSUM. *Hadie.*

DESCR. *Culmi ramofi\ cubitales. Spica conjugafner, rexmfnairey. Spimfa conjugatae; altera feffilis, longe ariftara: alien? pedicclhiM, matica: utraque uniflora; fcffilis^ hermaphr. & mafcnla: pedicelbta- tantum mafcula.*

72. ANDROPOGON BICORNE. Arab. *BThdh ^l=c ^ ibid.*

Culmi ramofi. Sphce conjugarje, congefej fub - corymbofc_y lēmfpollicares; Spicula inferior fefffflis, ariftata, pedrcelfata, mutica. Panicula fers fe^ ejucubitalis, ramofiffima, fblis inrennixtis.

73, ANDROPOGON CONTORTU3VT ; *Jpic̄s fflformifitw; foribur geminis, baſt villop\ mafculo pediceltatu> mntico ; fiermnphrodito, Jhjfdi, arijlato**

DESCR. *Arifta bermaphrodif e bafi corolla?; contorta Spica co:irftnra in figunim filiformcm: flofculi enim rachr apprefIT funt. Folia brevia, coniplicata 1 bail barbata. Culmi ramofi, furgentes**

Lohaja in-hortov

HOLCUS.

74. HOLCUS DOCHNA ; *panicuh ramis fubternato-vertidllatis, patntibns| fub-dimentis Jlorum feffilibus>fub floribus fertilibtts, ariftatis.*

DESCR, Gramen maximum, fsepe 5 uln. *Culmus* teres, faepe ramofus, genieu* lis fncraffatis, villofis, flavidis. *Folia* plana, fefquifpith. linear-i-lancco* lata, viridia, neivis obfeurioribus, linca media nivcaj ghibra; bafi marginata membrana. erc̄hi cauli appreffha. *Panicula* verticillata, ramis ternis, interdftn binis, vel alrernis, ereQis, baC callo mag no ferruginco. *Kami* irerum ramulofi, vel racemofi. *Flofculi* geminati in brcvi ramulo alrcro fcffili, altero tcrminali, breviter pedicllaro : flofculi ftepe^terni, faepe folirarii. Sub fingulo flore *rudimeutum* flori* parvuin, feffile j oblongum, ferrugincum, marginc viridc, in duas glumas divifibile, fruflifi- caiione nulla. *Flofculi* nimulorum terminales & pcdicellati Tub fe habent 2 talia rudimenta. *Calycince* ghimce villofce, ftavicanres, apice vi-rides, 0vales, mutics. *Corolla* parva, alba, pellucida , villofa, altera gluma arifta flore longiore, bafi fcrruginca, nitida, apice flavicantc, opaca, fubulata , curvata & velut torca in xnedio. Paucos vidi flofculos fine ariflis in quibusdam paniculis : tamen flores erant hermapbroditi & frugiferi: an cafu ai'iftas amiicranr? *Semen* magnitudine oryzx; ovale, compreffum, ferruginqum , in calyce perfiftente, apice dehifcente re-tentum.

Rofette primum mlhi otveniebat in horto, cultus ob pabulum Avicula- rum; florens initio Novcmb. Poitea Cereale vulgare in Arabia in- veniebatur, Arab. *Dochn.* دخن

75. HOLCUS EXIGUUS; *paniculis coar&atis, ramis alternis> rudimentis florum ptdicellatis ; fub floribtis fertilibus, arifiatis.*

DifFert ab *Holco Dochia*: alritudine vix ulnx: differt quoque paniculis coar- Satis; foliis linearibus: fpiculis lanceolatis; rudimentis florum non feffi- libus, fed pedicellatis. .

Ad ripam Nili: initio. Novembr.

76. HOLCUS DURRA; *panicnJa ovata| /JJÜKHS feffilibus, fibvillojis| alternatim appendiculatis j fiofiulo nno vel dmbus vacuis ,fejfilibus.*

Variat: a) glutnis viridibus; feminibus albis. Taam fchebb facardi.

b) glnmis fufcis| ftmin. albis. T. fchxer abjad.

c) ghmris fufcis, fern, apice fulvis, T. fchaeer ahmar,

KAMrcu Durra: in Arab. Taam. *k Colitur fere unicum cereale, fimul cum II. *Dochn*,

Moruum patitur hoc cercalc, Arab. *Ökab* dum femina evadunt unguem longa, conica, inrus repleta pulpa nigro-fuscāj qua: demimi corticem rumpens, exitum quaerir. (cfr. CoiffpcQ.Faun.Or,p. XX. n. 5.)

OBS. HOC est Arabum Cereale vitgatifiinuna, ex quo panis conficitur palato Euprosro infipidus. *Tres mejes* quovis anno infriruuntur. 1. *U&fmi.* 2. *Chntif.* 3. *Akba.* Cuique i menfis opus ad maturitatem. Prima lēges arts ferirur, duꝝ reliquē oriuntur ex femiuibus fponre deciduis. Hole us maturns mirum in modum expetitur ab Avibus variis; adco ut Coloni vigiliis & cōtinuo clamore nequicquam eas abiganc vide plura de hac re in Editoris Defer* Arabix p. 154. 158-

77» HOLCUS RACEMOSUS ; *fpzca cylindrical Jpiculis ternatis, pedicellatis, intervalles fetaceis, longijimis.*

DSSCR. *Ciilmus* fimplex, cubitalis, fupeme, ubi nudus, (cabr. *Folhrum* vagina; convolurce, glabr^c, margine ciliatae. *Lamina* subpedalis, linearise canaliculata, glabra, margine fcabfa. *Spica* terminalis, fpith. digirum craffa, pilofissima, involucris parcntibus & racemulis. Quivis *racemus* pcdicello corarauni, brcvi, undique obfefro fetis irucqualibus> femipoll bafi plomoiis: apice geftans 3 fpiculas feffiles, uniflbras; raro 4 vel 2., *SpiculcB* ternae, feffiles in pcdicello communi. Harum unica *media* herraaph. later ales mafculi. Ucriusque *Calyx* bivalvis, uniflortis, muticus, acutus; *corolla* biglumis, apice fetigern. *Stamina* 3; anthcris. flavis. *Stylus* herm. fimplex, capillaris, nudus, longitudine corollac; *Stigmata* 2* prorainentia, lincaria, villofa, longitudiiac ftyli*

Ubique in Temen. Prope accedit ad *Hokum Dochn,*

ATRIFLEX.

78. ATRIFLEX HASTATA ; *foliis hrjlato-oblongis, breviter petiolatis, apicemarginatis, fubtomentosis, albidis ; baji rotundatis.*

Djidda;

79. ATRIPLEX CORIACEA; *caule fruticojo, decumbente j foliis ovatis, concavis, farivojis, coriaceis.*

DESCR. *Caales* pedales, ramofi. *Folia* alcerna, conferta, viridi - albentin. *Pedunculi* fpicsc caulis vel ramorum terminales longae, flavae, fjepe conjugatse. *Calyces* magni, bivalves,
Alexandria ad Catacombas.

80. ATRIPLEX poRTULACoIDES; *cattle fruticofo, procumbent*.*

DESCR. *Folivt* oppofita, ovalia, periolata, craflufcula, raro obovata, *Frufifus* fceminci obcordati.

Rojettce.

MIMOSA.

MIMOSA.

81. MIMOSA SENEGALENSIS; KETAT.

DBSCR. *Spince* ftipulares ternatae. *Folia* geminata, bipinnata, pinnae trijugae, *Fot'ola* 5-vel 6-juga, linearia, fili latitudine, obtusa, breviflora. *Raches* omnes tamen univerKilis pinnarum, quam partiales foliorum terminanrur fucus aculeo parvo recurvo. *Legumina* ovalia, pollicaria, compreda, subdiferma, vindi - violaceantia, bad pedicellate Flores spicati.

Ad *Hers.* Arab *Ketdt.* قنات

82 MIMOSA TORTILISJ HARES J *lequminibus contorto-gloemeratis.*

DIZSCR. *Florim* capirula a^ba. *Leiyimma* cocheiria. *Folia* bipinnata; piani s-jugi^j extimis fquamuta interflavicas. *Foliola* 7.-9-juga, oblonga, breviflora.

Prope *Has.* Arab. *Harts.* حرف

83# MIMOSA UNGUIS CATI. Arab. *Dhoba.* && vcl *Dobb.* ظب aliis *Smurr,* +**»

DESCR. *Foliola* pinnarum gemina; communi pcdicello inddentia; obovata, unguiculata, obliqua inferta. *Folia* in quavis axilh duo, pinnata. *Pinna* bijugae, . extiores majores, singulae contantes foliolis duobus. *Sripular* *Spina* 2 ? breves, recurve *Legumina* valde comprefla, endiformia, glabra, ~~am~~ ibnaca.

Snrdiid alibique. Florcs *Mel* pra?b>nt aqibus album, uberrimum. Lignum ad focos. Contra nubeculam vel ma~~culam~~ in oculo bourn, folcent Arabes folia- reccntia mafticata in oculum intrudere; eamque medicinam aliquot diebus rcpeterc. Ad maculas vero ocularcs hominum non in usu est.

84. MIMOSA FLAVA; SYLLIM, *Surdiid.* Arab. *Syltim.* سليل

DESCR. *Pinnm* primae 3- j-jugee: *foliola* 7-10- juga, linearia, semiunguem longa, obtusa. *Floret* pallido - flavi. *Squama* inter partiales ultimas: glandula nulla.

85, MIMOSA ASA. *Hadie.* Arab. *Afak.* حسق

DESCR. *Spina* fipulares binx, ternsche, patentes, recurvae. *Folia* ex altibina, bipinnata. *Pinna* 3-juga?. *Squann* nulla inter ultima. *Foliola* 6-juga, ovali - oblonga; media longiora. * *Caulis* frutex.

86. MIMOSA ÖRFOTA. Ad Dahki. Arab. Örfota. عرقطة

DESCR. *Folia gemina, bipinnata. Pinna 4 - * -jugs; ultima? fquama diftinfatap. FbSola 6-9-juga, ovali-lincaria, bafi obliqua, femiungucm longa. Spina duac Tub īngula axilla, ftipularum loco, patcnritfimsc, longirudinefolioli. Legumlna inarriculata, comprctfa, ball arrenuata.*

Folia hujus Mimofa?, laſli Camelino recenti indira, ejus coagulationi & acefcenria.¹ plurimis diebus obftare, affiranr incolx.

Ligno & refina Mimofa? örfotx infumatur laborans convulfionibus Epilepricis. Expellitur principio fudor fcetidus; exferuntur deinde quafi apices Tarnix, qua: cutem sub collo & in latere pcrforar. Utrosquc apices ferro candenri uftulant, quo fafto morirur vermis, & Tgrorus convalefcir. Morbus ifte vocatur Sora £•/*> & Vermis Ork. عرق

87. MIMOSA STELLATA; *foltis geminis** *pinnatis, 9-jugis: Jpinh Jlcllatis, Urn̄s | duabus opice recurvis.*

Kurmcr.

88. MIMOSA CLOMER AT A J *foliis iijpinnatis; leguminibns nigris, contorto-gto** *meratis.*

89. MIMOSA LEBBEK; *foliolls obtttjif, pollicaribux, \$-%-jugif; rachibuspartia-* *libus bijütgis.*

Or.s. Use nota fuffciunt ad Iianc Miinofam diflinguendam a MIM. ARBORF, *cbibus fart'talibus 7-8 "jugi*i fiM* 24-27-jttgis; fioribus monadtlph,*

Kahircr horrenfis ilia; Arab. Lccbath. Hanc Conftanthopoli vidi, Turcis Djul ibrzim, i. c. Eos ferheus| propter ftamina filiformia, longiflTma.

go. MIMOSA SFJAL *|foliis bipinnatis, folitariis; pinnis trijugv; inferioribus fquama tma, extimis fqtiamma duplići diftinfilif.*

Catilts fruticofus. Foliola ovali-lincaria, 14-jugaj unguc brevoraj media longiora. Spince nulls.

Hadie. Arab. Sejdl, سیال

•

•

•

NOVA GENERA.

SEHIMA-

91. SEHIMA iscfjEMOides; *Jpica fimplici; fpknUs conjugatis, bifloris; Jlore mafculoy mutico; hermaphrodite), ariftato.*

DESCR. *Calm* cubitales, filiformes, fimplices, raro ramofi, glabrij articulis fefquifpith. *Folia vaginis fpich.* contra folem volutis, glabris*, *lamina vaginis brevior, linearis, plana, ftriata, icabra, bnfi hiriuta.* *Spiraea terminalis*, fpith. coarftata, *Spiculce* geminate: altera feffilis, altera pedicelhta; utraque calyce bivalvi, bifloro, coroib bivalvij in *fejjili* > flos exterior mafculus, interior hermaphroditus; in *pedicellate*, uterque mafculus; fed hermaphroditorum mares prius pcreunt; & ignarus hujus ceconomiae namrae, putat eos non adfuiffc *Calyx*; glunia bivalvis, linear-i-lanceolnta, biflora, corollis longior; exterior apicc bifcra, inormis: interior arilla ex apice; glumis longiore. *Flos exterior* mafculus, *corolla* bivalvi, intus villofa, pellucida, linear-i, mutica. *Stamina* ^. Piftillum nullum. *Flos interior* herm. corolla bivalvi, intcriore minori, apice fiffo, e fiflura emicente *Arijam* fpicula longiorem, bafi fufcam, apice albam: ante flores explicatos infra Ipiculas fuperiores Ipiraliter rsconditam, *Styli* 2, plu-mofi. *Stamina* 3. *Spiculce* pedicellate. *Calyx* bivalvis, biflorus, corolla major, ciliatus, linear-i-lanceolatus, muticus: gluma exterior longior. *Flos* uterque mafculus. *Corolla* bivalvis, mutica.

Temen in montibus ad *Hadie.* Arab. *S&him.* 

OBS. Genus novum con flitui lianc plantam, nain ab Ifcbarino differt Spiculis pedicellatis, mere mafculis, quatnvis bifloris.

THEMEDA-

92. THEMEDA TRIANDRA.

Hadie. Arab. *Thamed.*

DESCR. *Gramen polygamum.* *Spiculce* vclur ex fpatha capitataej extiores verticillata?, mafculap. *Calyx univalvis, uniflorus.* *Corolla bivalvis.* *Styli* & ariftae nullae. In medio capiruli exfurgit pedicellus brevis, in quo fpiculkx dua: *mafcule* pedicellatx; una *hermaphrodite* feffilis; *calyce* univalvi; *corolla* bivalvi; arifta ex receptaculo flore multoties longiore. *Culmi* racemofii. *Vagine* compreflx, latae, enfiformes, recondentes ramos & capitula ante explicationem. Omnia capitula folii vagina prius recondita fuerunt.


FICUS.

FICUS.

93[%]: FICUS VASTA; *fotis cordate - ovaTbus, obtufs, integrity glabris, m/M//,*
Jubcoriaceis.

DESCR. Vaftiflma arbor. 7r«m/ velut ex pluribus compofitus; raro tecs, faepius lario rior duobus lateribus. *Pedunaili unuem Jongi & craffi, villofi, fruclu quadruplo breviores, apice dilatati. Folia cordaro • fubrotunda, viiiola, alterna, propinqua, fpirhamalia. Petoli & rami ultimi villofi. Fruflus major duplo nuce avellana, feu plus iernipoll. diamotri. Ptdicelli ramei brevijitni.* Arbor laflefct.

In Ternen ubique. Arab. *Tdlak. KJH^D* vel *<JUL>* In libris Arab. Botanicis vocatur *Delb. v-^J^ Cynipes ranrum aprcos in fructu invent; caud^ pcrbrevi; atieoque Sycomorinis diffimiles. Di(fufa ramis -arbor, & creiçenribus velut totidem contignationibus J mira & grata vifu.*

54. FICUS MOMFOUA. *Hadk.* Arab. *Bates.* 

DESCR. *Folia pctiol& longiora , semifpith. cordato-ovata , acute, ferrata, utrinque fcabra, alterna, Stipula binse, membranaces, linearis - lanceolatilE> crcciiie. Frncius cduhs quidem, fed ingratus.*

9c# FICUS PALMATA; *fotis cordato-acutis, palmatisque , frrato -trenutis, Jiabrti, flexUibus** Ad *Uahfdt.*

36. FICUS SKURATA; *foliis ovcUi- acutis, palmatisque , Jcabris , trenato-re- pandis.*

DESCR. *Folia fcaberrima, fimplicia, Integra & lobata, in eadem arbore, margine repanda. Rami axillares, folitarii , vel genicuhti , pedicellofi. FruSus nucis magnitudine, non edulis. Pedunculi pectolite breviores.*

Arab. *Hafchref. cJ^&e^ Bolgofi** alibique. Cynipes copiofe inhabitant, Foliis ferrum politur & arrugo abraditur.

97, FICUS INDICA. Arab, *Thdab c**S* Ad *Uahfdt & Uadi Zebfd,*

DBSCR. *Rami non radicantes; licet facpe gracie, longique dependent. Fru&us pifo major. Pedunaili axillares geminati; fru&u duplo breviores, terminati (quamis 3, late-lanceolatis, quibus fru&um luftincent. Folia (llicina, faepc delabuntur Tub fructu, cicatrice relifla, & quia di-*

ftant parum, videntur pedunculi conferti j (ut de F. ind. *Linn.*) quanvis r² ipfa retrnoci. Arbor vaftiflma & hie frequens.

Ex cortice parantur *funes eanjlici*, quibus fclopeta incenduntur: cortex interior recens tunditur, & fuccus probe exprimicur; deinde in funiculum torquuntur.

58. FICUS KELIGIOSA. Arab. *Mtddh* ~~فَدْدَه~~* vcl *Fitddh.* <*فَدْج* *UadiZebd.*

DESCR. *Folia late-cordata*, acuta, intcgra, glabra, nirida, rigida, fpithamalia. *Pedwieili* axillares, goniini; fructu duplo longiores, vix pollinaires, bafi incrassati, apicc magisj *Squamis* obcufis binis, ternisve bafin fructus ampleftentibus. *FruEfus* glaber.


Foliis (iccatis & contufis) Coria subiguntur & parantur. Ex corifice parte, ac e F. indica inftruuntur funiculi pyrotechnic[^]

(3) Arbor Indis *Barefch*: foliis prorfus *F.* rclig. fimilibus.

99. FICUS SUR; *foliis oblongo - acittis*, *valde repandis* > *glaberrimis* > *bafi fub** *cordatis*.

Arbor Sycomoro fimilis. *Fruflu6* prope truncum conferti, ovi columbini magnitudine, edulcs.

Djobfo. Arab. *Sur.* 

100, FICUS SYCOMORUS, VERA | *foliis hte-ovntif*) *repandif*> *vet fubangulatis*, *ohtnfiufciiliS*) *glabris*, *bafi cordatis*. Arab. *Djümmeiz.* 

Arbor in ^gypto frequentissima, plantati in littoribus & ad vias juxtn pagos, ramos dilFundcns tantx latirudmis, ut arbor adulra obumbret fpanum circuit 40 paduum diametri. Adcoque una fcries arbonun fufKcit a iingulo lacrc viarum.


Fruftus non in ramis nafcitur; fed ex ipfo trunco. & e lignoramorum maximorum furculi exeunt conferti, frugiferi. Incolae narrarunt mihi fructurn multoties per annum maturefecrej imo & feptics. Fidem quoque adjicio *Haffelquiflio*, Botanico autoprjc, qui Junio tantum menfe id fieri poffe, affirms. Hoc enim intelligendum de Ficubus eduhbus fcrniniibusque vcris fcetis.

At quod de *F. corica* & Capriflico retulit in Irin. Orientali *Tournefortius*, earn fructus maturare aliquoties quovis anno; led primos alteros ve fructus

fructus non Scmina, vrum *InfeEta*[^] Cynipes tantum foverc; id ctiam in Sycomoro obtinere arbicror. At requirit hacc afrertio experientiam obfervationum integri anni. Ego ccrtc multos frugus, parrim fponte delapfos, partim ab arbore decerptos, diffccui menfe Jan. & Fcbr. an. 1762. Quidam ovo columbine minorcs crant, duri & obfcure virides. In horum cavicace nihil, nifi obfcura & nimis adhuc fubiilia floram rudimenta vidi.. Sed majores & poll diamerri, molles & flavcfccentes, diflecli laétafcabant. Nonnulli incus *Juei* alii *fucco rubro* pragnantes. Illi maturiores crant, magisque flavidi; & in Whs/quanta? confpiciebantur sub umbilico calycis inregerrimx; ut quoque refert Hasselquist: non vero ferratae, (Gen. PI.) quod competit *F. cariccc*. Propc has fquamas erant *lores mafc.* adhuc eland, obovati, Kwes, fcfiles, nullo elevati pcdicello, pakis inrcrtlincti. In (Ingulis *duo* tantum *Jlamina*) unicus ex innumeris, quos aperui, tria prcbuit; quod ergo non ex naturae ortline eft; quamvis in *F. carica* id forte poilic obrineri. Reliquum fpatum Calycis incernum replctum crat *Jlofcitlis fa>m.* pcdicello hemiphserico infilcntibus; *germine* plerumquc tumicio, ohovaro, scquanre flores mafc. magnirudinc> bafi confrifto & laciniis perianthii ad fundum divifis laciniatisque cinclo. Verfus apiccm exit c latere *Stylus* brevis, .albidus, ftigmace paulo longiorc, incraftiro > cylindricoi punicco j simplici. Omnia hicc germina tumida jam vcl plena erant *Oynipe* perfefto, vcl vacua & apice aperta, egreffo cynipe: (grant quoque alia marcida, nee femine nequc cynipe fcera. Nonne ergo Germina hac solis infecis producendis destinata, quæ etiam seminum loca prorsus replet, corundem productioni demum infervitura? Reliqua enim germina non fœcundata tabescunt; ea sola, in quibus *Cynipes* habitant, tument; velut in plantis poft fecundationem, & feminis loco prabent *Infectuni* hucusque ibi educatum. An flores mafc. in his fru&ibus infcliferis, dum aperiuntur, inferviunt fecundationi florum fcem. incertum adhuc eft.

Infecla hnjus Germinis funt duplicitis generis. *Unum Alatnm atuleo emida* reffo; defcriptum ab Haffelqu. nomine *Optipis Sijcomori*. Arab. *Nanus Djummeiz*. *AUtrum Apttrum amkis ani binis transverfis*. In ficubus inius ficcis, Cynipes aptcri jam exivcrunt, una cum multis ex alatis; quorum alii adhuc in germinibus refabant prorfus perfefti & maturi. In fructu liquurem nibrum continentc, etiam aptcros reperi, fed alatis pauciorcs-, unumquemquc in suo germinc. Aptcri videntur fexu folo diffcre, ut dc Formicis & Apibus notum eft. Agunt vices horrulani, inambulando pollinem fpargentes, qui calyce & flore clauib eo mclius undique dividitur. Alatorum officium eft alios peragrare . fructus .

fructus eosque matnrare , (imulque fuum genus propagare. **Exeunt** non per umbilicum **ficus** fed prope ilium per foraminula ipforum den* tibus exsefa , corpore non latiora. Fine mentis Apr. mature funt **Ficus Sycotn**, ab /Egyptiis appellatae JD/z*w<3 bcedri| i.e. **Sycomori prcvco&ts|** quia csetcne **XKn** matuuae evadunr, ante Nili inundationem. Molles funt, flavefcentes? fucculentse, dukes: non fecundatx vel vermbus pertufar*, g^rniiina tamen magna, carnofii. Flores niafculi ad umbilicum claufi, cjui in n^edio apertus foramine parvo ^ & circutn illud extus eft **annulus** latus, impreffus, nitem. Ifte annulus non Cynipis opus eft, uc HaffTel quift putavit, fed *artis* veftigium Quum enim fruttus ad m^ignitudinem pcrvenit diametri poll, folent incole ad umbilicum ejus partem refe care ; qui locus deindc nigrefcit. Sine hac circumcifionc, maturitateni non obrineri , ajunt, Cultros habent> ad hoc artificium faftos, apice rotundatos, & ab una parte neuatos. Si ficus aliquse praerereunrur , & feQioncm non fubeunt, Cynipe plencc ^vadunt, ^erfus tempus inundationis NilL Quicquid fit; in his arts maturatis ficubus, nulla vidi feinifla.



**DESCRIPTIONES
PLANTARUM.**

**CENTURIA
SEPTIMA.**

CLASSIS XXIF.
CRYPTOGAMIA.

**APPENDIX
PLANTARUM
ARABIA FELICIS
INDETERMINAT.**

CLAS SIS XXIV.

C R Y P T O G A M I A .



ACROSTICHUM.

1. / A CROSTICHUM FILARE; fronde bipinnata; Jlipite pilofo; pinnis alternis>
• primariis remotis-, pinnatis; fecundariis erzffis % confluentibus, linearibus
apice Jilari dentatis.

DESCR. Frons pedalis. *Sachis* pilofa, pilis puniceis. *Pinna primaries* alter-
temce, fefquipoll longe lanceolate, pinnatse, patentes, petiolatce. *Se-
tundaria* femipoll ad rachin erefto - patentes, altcmae, confluente, im-
primis extriores, linear - cuneata?, longitudinaliter ftriarae; fecundum
has (Irias apice dentatse; dentibus ina^qualibus , filiformibus : inferiores
interdum apice divifc in lobos paralldos, lineares, insequales.

Temen in fylvis montods.

2. ACROSTICHUM DICHOTOMUM; jfa/?// linearibus, dichotomis, pollicaribus.

Hadie. Arab. *Mejabe/e.* **»*£* Folia recencia conrufa imponumur vulneri
ex uftione.

LONCHIM

- 3# LONCHITIS BIPINNATA; fronde bipinnata^ rachi Jüptra bi/ulcata; pinnis aU
ternis\$ pinnulis linearibus, covfuentibus, interioribus emarginatis.

DESCR. Frons pedalis, viridis. *Rachis* communis, supra bifulcata ; idque
propter alicuhm urrinque, q|n pinna primaries connectuntur, quacalrerns,
fefquipoll. patentes, bafi pinnatae, exterius pinnatifidae; *rachis* linca
media longitudinali devata fuperne. *P. feenndarice*, lineares, erefto-
patentes, linea longitudinali media elata , obtufa ; interiores bad niagis
remots , apice emarginats; interdum bilobae, lobo utroque , vel altero
emarginato. *FruEtificatio* fubcutanea, in pinnis fee. nonnifi folitaria, (fra
ad medium marginis exterioris , finulum formantis. In pagina frondis
superiori fruflificatio pariter extollit cutem in lunulam viridem , corni-
bus marginem fpeSantibus,

Temen in fylvis montofis.

ASPLENIU^

ASPLENIUM.

4. ASPLENIUM LAJSCEOLATUM ; *frondibus pinnatis, lanceotatis; pminis oblongiSi ocutiS) incffis, alternis.*

Kurma.

POLYPODIUM.

5. POLYPODIUM PECTINATUM; *fronde bipinnata\ pinnis Jictndariis, lanceotatiy counexis, inte^ris^ patentibus.*

DESCR. Frons pedalis. *Pinna prim*, oppofirac, patentes , fcfilcs, libcne, bipoll. *Setund.* lanceolate , anguftse, iniegrs , bad inter iè & cum proximis connexa?, Vidi in muJris frugifens pun ft a albâ in frondis pagina fuperiore, ordine pofita, que ac niacuke frufHfiantes lumbus fed minorcs: an (lores maiculi?

6. POLYPODIUM CUENATUM | *fronde fupra-decompojifa ; pñmis attends \ fecimdiiriis pinndtit; foliis pinnatifidis, trmntis, eWatis.*

DLSCR. Frens pedalis: *rachis villofa, viridis. Pinna fit.* Uncollatae, fcs-
^uipoll. *Fbliola ovalia, conne^a, pinnuifida, viJlofd, crenulara, ciliata*«

Cum priore in montibus Yemen ad *BalghoJZ.* Arab. *Najittw.* ISJUM*

7. POLYPODIUM DENTATUM; *fronde pinnata, dentata j fiperne nonnifi pin* natifida; pinnis trenatis, infimis drjlexif.*

Ibid. Arab. *Rilias.*

- g. POLYPODIUM SCTIPERUM; *fronde bipinnata; foBoSs reniformibus; dentibts fitiferis\ tattle lamto.*

Ad *DardantUos**

PTERIS.

- 9* PTERIS OBMQUAJ *frondepinnata\ pinnis Uneari-hmeohitis^inUgrisy ereBis% bafi obliquis.*

DESCR. Frons cubital is. *Pinna alternre, infimae maximre, fpith. anguftae, integral acumifiatse, bafi libcra?, obliqua?; quia ereQie ; non vero perpendiculares ad rachim, ideo bafi fuperne pars detnta eft, & fubtusvelut auricula femiorbiculaiis addita, ut rachi accommodet.*

Omnes Pccrides hie descriptae in montibus *HaAimfibus* habitant.

10. PTERIS SUBCILIATA ; *fronde phinata; pinnis lanceolatis, ferrulato-crliatis*, bafi fupra latioribus.*

DESCR. Frons pedalis. *Pinna tripollicares, oppofit*, patentes, lanceolate vix ferrulato-ciliatae, bafi vix unguem lats, fuperius latiores.*

11. PTERIS QJJADRIPINNATA J *fronde quadripinnata*; *pinnis fecundariis iaji liberis*; *infimis bipinnatis*.

DJESCR; *P% fecund*, patentes, ferrulate, oppofitac, non connatae, fed remote; uno punfto rachi adnatae, *Infima bafi bipinnarae*.

12. PTERTS REGULARIS; *fronds supradecompojita*; *pinnis primariis feffilibus*; *fecundariis connatis*, *patentibus*, *Itntari-fanceolatis*, *integrity infimis pincitis*.

DESCR. Frondes fefquipedalcs. *P. prim.* Kneat4 - fenceolarje, (ènfini attenuate. *P. fee.* infimx; bafi pinnatifidx, & totse pinnatx piimulis coinxis inter lè & cum proximis.

13. PTERIS DECURSIVA; *fronde supradec. pinnif fee* ereffo reeurvis> decurm*tibus*; *infimis dewrfive-pinnatis*.

DESCR. Frons cubitalis* *P. fee.* non patentes, fed in frondis piano furfum fpeftantes, apice in codem piano recurvce: omnes fubaltcrnae, concatnarc* toca bafi-rachi adnats; fuperne bafs perpcndiculuris rachi_r h> f^rne form.i alse cuneatae decurrit ad pinnularu proximam. *P. fee.* iu-filiia', decurdve - pinnate.

14. PTERIS SEMISERRATA; *fronde pinnata*; *phnh linearis - lanceolatis*, *apict ferratis*, *infimis duabus biparthis**

DBSCR. Frons cubitalis > d̄tmidia parte nuda. *Pinna* Kneari-knceolatae, vix digitum Iata? fefejuifpith, bad inregr^; pirre attenuata ad apiceni ferrulaca?> ciliatae, fuprcnix connexx bafi, reliqua? magis magisquc liberce; infima utraque bipairita_x lobo fingulo rcli^uis pinnis firaili.

15. PTERIS VIRIDIS,

DESCR. Frondis fofiofa, feu *pinna prfma*, diftinfter, 2 ve! 3 fupremae corxnatae, intcgra?,, fuprema: lanceolatae, fimplices, alrern<T, feffiles^ denw larerali ad bafin. *luferiores* fenfim longius pctiolatae, magis oppofitxj primuin pinnarifidae, dein- pinnatse^ trijugee cum impari: feffiles, ovalcs> a rachi oblique ftri-atsc, terminales, *Raehis* major & minor atro-purpurea, ax pinnx omnes virides.

16. PTERIS DENTATA j *pinnis primis feffilibus*, *remotis*, *demrfive pinnatis*, *pinnis oppofitis*, *limaribus*, *crenato dmtatis*.

DESCR. Frons f:{quipoll'. *Pinna* magrae inferne oppofitJCj 3 poll, longac? carum *p. y^* alicula connexx, obcufe»dcntaoc#

- 17. PTERIS SBKKVLATA**; *froude Jiuprad**[^] *pinnis fee. xonuttenatk, hmealatis, Jerrulatis\ infim's fejuufitis, phmatis.*

DESCR. Frons fcipedaiis. *P. primnria fyprema* fimplices, -concatenata?; reliqaac remotje, supra alrcrnac, pinnata:: *iufieriores*, oppofirc, bafi bipinnatJE. *Secundarice* pſttenes, Jonge-lanceolatar, ferrulatjc turn oppofltis & proximis connex[«]; *hifimce Je}unſbea* pinnatx. Haec ipedes at diis fc didinguit foliolis icrrulatis_# acutis.

- 18. PTERIS FARWOSA"**; *pinnis prim, fefjllilm**^{*}, *oppofitis\ Jiiprenih ſovzatncitis%* *injerioribus remotis; fminduriis -commis J fubtw farmofo-tonrentojis.*

DESCR. Frons pedalts. *Pinna* onines oppofitar. *Primaries* iuperiores cum oppofita connane & cum proximis concatenate*, marginc lolum crcnaco-dncar.T. *Inflriores C^nCnn* rcinota;, usque ad bipUicare (patium pijniric. *Setimdarice* connatie -cum oppofita & concatnarie cura proxiinis: in iu'imiſ maximis pinnis interduni per paria remorx: exterioreſ niinorcs ; omnes obrufe -^crenaro -dentate.

ADIANTHUM.

- 19. ADTANTHUM INCISUM**; *fionde pimiata; pinnis fefflibur, attornis, Jbrni-ovatist fuperne incifis^ intus & fubtus refit?* integrir.

Hadte. Arab. *MefMt elghordb.* v J ^ J okf** Singular pbruc lobi duo prope rachinj fxpc folo: florifci)e \$ iiwerdum reliiju^.

LYCOPODIUM.

- 20. LYCOPODIUM IMBRICATUM**; *frondibus ramofis, jritmafif; omnibus rachi fnpra & fubtns hifarhm imbricath.*

Jbid. Arab. *Rafen.* i^y^ Ad Uahf&t diflum Stkafar rabba; K^yTUi i. c. *gratias agens domino suo**_y <jua folia, licet exaridn & concorta, pluvia irrigata confeſtim ic expandunt & virorem renovant,

ULVA.

- 21. ULVA RETICULATA**; *froude reticulata; ramis finearibi\$ s, plams, varie perforatis.*

Foramina majora pollicaris diametrij rami foranumous oblongis, mxcjualibus, unius fcrici.

Ad *Gomfadce* & *HJochhce* littora, ut & icquens.

- 22. ULVA CAVEKTSOS***; *Jubghbofa, Jofitaria, rugofo-pficata, intus vacua.*

Diameter bipoll. Color cinereo-viridis. Plica? fine ordine: cutis hine inde vdut contraflra, deprcf'l'a, intus formans locula plura, vacua, fine pulp 1.

(A a) a

23. ULVA

23. ULVA ORYZIFORMISJ *articulis veficukribur[^] conge/tis, cohar&itibus.*

Ad littora Gallise, Afiae, ^Sgypti. Soli aliquamdiu expofua, refert pultetn oryzs cofhe.

34. ULVA CUNEATAJ *caule teretiy nndiqnt imMcato} vejicis cuneiformibus, compreJUs[^] apice perforatis> limbo diktat o> concave.*

DESCR. *Caulis* anguftus, fubteres, undique imbricatus veficutis, cuneiformibus, compreffis; fupcrnc limbo ereQo> dilatato; foramine pnrvo in media, tefto particula limbi inflexa; unde limbi figura rcniformis. Tota alba; fed forte exficcata erar»

Prope urbem *Tōr.*

ay. ULVA *vejicii watts; compreffis; foramine apicis oblongo.*

Mochhct. An varietas prioris?

26. ULVA CONFERVOIPES; *viridis fili crajfitie; fimplex fne ram̄s.*

In freto *Onfnnd* rario.

CONFERVA.

37. CONFERVA PJ-AWA; *frondibns comprejjis> ru&ro-viotaceis; ramts dtstichis> confertis.*

DESCR. Digi*ti longitudinc** *Frondes* coacervatac, comprefla?, adeo ut omnes in eodem phno; rubro'violacece, membranaccae. *Caules* majores latitudine magni fili; coriacei. *Rami* pollicares, conferri, ramulis itcruin confertis, difhehis. Planta aquis extrafta non collabicitur[^] rigidula,

Mochhco paflim.

28* CONFERVA SETICULOSA; *caittibus viridibns, teretibus, ramojis, feticulis, Jpcir/isy nnmerojis.*

DESCRI. *Canles* fpirhamales; bafi fili latirudine, tcrctes, virides, pellucidi; ramis numcrofis, fparfis. *Seticufa* vel papilli fubulati, undiquc per caules ramosque, frequentes, breves. PJanta rig id u la; non in rivis crefcir, fed in aqua marina *Mochha^my*, aliquantum divcrfa a figura jn *Dill. Mufc.* tab. 4. fig. 15.

25, CONFERVA LITTORALIS; *ramis longis, remote pilofis[^] non fcabris, fub-geminis.*

Conjlatinop. in portu, Plaota fufca, filiformis.

30. CONFerva DICHOTOMA; */rcniculis incrajjatis > rubris, ftrpe piliferis, fete crajjitie| fills dichotomis, hyalinis.*

OBS. In geniculit flavis vidi ope microscopii punaa. brunea. Figm-a *DillUnii* cictara a *Linn*, non quadrat, (tab. 6. fig. 36. 37.) articulis obovatis, geniculb a-ngufratis.

Adhoeret Fucis natantibos in *Mari Mediterranea*.

31. CONFerva THERMALIS:

O*s. Thermae *Hammin faratin* e regfone *GBoheih* aquam effundunr ad mare canaliens multis. In horum fundo- hare viguk Conferva, licet caloria numerabatur gradus 49 in Thermometro Rcaumurii. Diftantia erat jam 30. poffuuin ab orificiis in monte , aqua totam viam emenfa in arena. Hanc plsun* patientiarn non iatis potui admirari. An tales Salamandiar ycgetantes hi aliis reprariantur Thermis, jgnoro. Specimen, antequam delcriberewi, magno & meo dolore perdidi,

SPONGIA-

32. SPONGIA OFFICINALISJ *tenax > fubramofa» violafcens, foramnibns mcrjoribnsy apertis.*

Ad Sue's frquens lapidibus affixa; fubftantia durror. Eriam ad Firtoro *Ate** *xandti**. Arab. *Hojh jufeph.* **X>*>yi ^A ^O. Cum fucco Grri & aqua mixra, frequens Cofmeticnm muherihs ad inducnduro calorcm rubrum. Sed cutem vehememer fcedar.

33. SPONGIA RUBRA; *tenax, fimplex > carinofa^ obfcure rubra, deprelfa, Jnbrotunda^ tnbereulis elevatis, ports aqualibus.*

Ad Sue's Lapidibus affixn, frequentifima: intus cinerafcens.

34 SPONGIA NIGRA; *tenax, globofa, ttqualis, farffa; extus nigra; intus cinerea.*

Ad Sue's parcius. Subftantia sequalis> cunicufis nullis.

35. SPONGIA FLABELLIFORMIS.

Chartam rferens albidad: Iamclfce p?urcs bad connnta?: altcra pagina srquar lis; altera fulcis tenuibus longitudinalibus, interrupris.

Ad url>cm *Tor*. Diveifa a *MaffMertJi* rubra, crafla, expanfa, utrinque æqua-H; in quam charact. *Sp.jlab.* *Linn*, quadrat.

FUCUS.

36. FUCUS SERRULATUS; *cattBus teretibus , ramqfis; fotis Tmearibns, ferrulatis, fimplhibnf > veficis nullis.*

DKSCR. Torus vrhidis. Ccwles artgufti, teretes, fpith. ramofj. *Folia* poHicaria, Linearia, acuta, fccrara; interdum fimplicia^ iincrimum media divifas, in duas, cresve lacunas lincares, ferratas.

37. FUCUS ACEROSUS *tautibus teret. ramofis; nixnis dljichis, conferth; undi- que Jitis filiformiifi paUntibus: v*Jkis foliisque Willis.*

DESCR. *Caules* {pith, exteriorcs dcrcfcentes, & demum filum jequantcs. *Rn- mi* diftiche ramofi, ramulis confertis, poll. filiformibus. *Sttce* filiformes, flexiles, attenuate, breviflms, parcntes, confcrte iniidcntes caules ramosque; unde figura fimilis arborum a^erofaruai duin pin^uncur. Color flavid - fufcus.

38. FUCUS PAPILLOSDS; *cattle Ureti> rarno/b, tvncRque ferkbus sprialibus pa- pillorum, apke dilatato - multiloborum J vefiris net fylit tllis*

DESCR. *Color* aliis fufcus, aliis flavus*. *Caufes* confcic ramo-fi, pcdales. *Papilli* minimi, reretes, apicc era II ores & faftigati, angulad, vel in paptfliilos 3, 4, f <3iviii: mukis feriebus Ipiralibus circa caulem & rai- nos: fitpe lnulrilobL

g8. FUCUS UNIARIS; *frondibiis plantis, finearibns, dithotomis, fenfim angustio- ribus; aphibiis acutis; vefitis nllis,*

DESCR. *Frondes* integral, fpith. ad (ingulas dkliotomias decrcfcomes, planas> cenucs, pcliucidas, flavid - fufcas:; npiccs ixpe furcari, femper acini. *Ramtti* suprcmi prope apicem lanccolati. Planta niollis, aqnis extract* coJabcns. Veficae & fruHificationes non manifeftae.

40^ FUCUS CESPITOSJS; *caule tercti, ramvjb, coferto, pepittojb; papUHs .at- tnuatis, fxmplicibus, ramnhfis.*

Fufcus; ramis complicaris, denuo connatis. Fapiili undique conferd, atte* nuati. Vefica? nulke,

41 FUCUS SETICULOSUS: *Urts, ramofus| papiltis fparfs; ramis baft hi veft* lam poplhfam dilatatis.*

DESCR. *Caulis* fpith. fili craflitic: papitlis fparfs, feciformibus; fine ordinc ramofus. *Rand* minorcs propc bafin in vcficulara ovatam, papillisdcn- tam, dilatati, dcin iterum angulH, filifornies, ramulofi.

42. FUCUS FRAGILIS; *tanlibns JiKformibus-, dichvtomis, fragittus, fafigiatis| foliis vejicisqiw mi His,*

DESCR. Similis Licheni Fragili, faciens ccrpitem fubgJtabofum, confcrte ra- xnofum. Caules rufefecmes, filiformes, rigidiflimij ficci fra^ilcs, quad calcard.

43, FUCUS PLUMARIS; *cattle tereti, repenn Jilrfum, ramofo, ramis plumiformi- bus ; foliis difinEtis; veficis millis.*

DESCR. Color torius gramineo-viridis. *Caulis* flavefcens, repens, vcl pro- f ratus fuodo incumbens: *ramis*, fparfs, confertis, bipoll plumiformi- bas:

bus: i. *cfoliolis* filiformibus, diftichis; pateiniW, confcrtifTmiV; rami unguis fpatio fimplices > dein divifi in 2 vel 3 fimiles plumas linear*-lanceotyras, fefquipollares. Singularis proifus ~~rftftura~~.

Ad. FOCUS DEBILIS; *canibus teretibus* > *ramofit, fnbfqftfoiatis, tubulolis, debi-hbns\ fonts veficfsqne nullrs.*

DESCR. O)«/f/ felquiipirh, adeo dcbiRs, ut aqua extraflus , dilabatur.

(3) /^r w ^: caule rigidore , minorc, in globurn tripollicaris drametri fc diffundentc: aquis extrafto , figuram fervante. Uterquc colore livido: caule intiis cavo , apice furcato * acuto; rami nee dcrcfcenes, ncquc crafftie aufti.

45. FOCUS LAMiNOsusj/ro>fiffit<r jrhnh> *didotomis, finfun tntiqribns* margine nndis.*

Scqucini pcrGmilis & forte varietas. *Cantts* in media bafi *Froncls* exit (tubulams ad femipoll. (patium, utrinfsjue convexus* tomemalūs, *Falia* iuilla ad margincm frondium. Arab. *Kanaf*.

46. FOCUS Foi.iiFERj *frondibnsplanb^ diet}, nltimif marfnit? Of apice foliiferis.*

DESCR. *Frondes* bafi fulcie, anguftje; dein fenfim dilatatac r exima: veyrucu* lis fufcis , fparfls numerous in utraque pngina j marginc profci-ctes /i/ifl parva, litcari-lunceolrtta, in eoctem pJuno cum frondc fira, integra. Ca^/V femipoll. fpatio a radio: extenditur I conveiiras utrinque in media bafi frondis.

Omnes hi Fuci ad *Mochhce* fircora;

47. FOCUS DENTJCULATUS; *cauk tereti| ramofh t joliis HneariBus denfteutatis*, veficis globojis, pedunculntis.*

Ultra 3 ulnas fxpe longus; flavelcens;

48. FOCUS CRISPUS; *canle tereti, fitbram&fij foliis coiiferfts> feflilrdus » ovalibus, denticulatis ; undnlato - erispis; vtfcch pedunculatis..*

Folia pollic. Color viridis.

49. FOCUS RACEMOSUS; *caule tereti, repente-ramofol veficiō obovafrs., confrrte racemofis; foliis nullis.*

Totus viridis. CauKs rcpens in fuodo', Racnii veficuJarum tripollkares, undique veficulis viridibus imbricati.

yo. FOCUS ARTIGUT-A-TUS; *ramh altcrnis, arthulalis, Inqnetris| antculh tuner- fortnibw, anguiis fnbalatis, dentatis; foliis vejitisqite uullrs.*

•Carrilagineiirs: viridi-fl'avicans: rami bipoll. fine ordime exeentes e genicuffs: articuli triquerri, dcorfum attenuaci: genigulaarflMa, triquetro-filifoniiiai Ha quacuor species ad littora Suh.

51. FUCUS •CONOIDES; tank tereti, rixmofo, ratnis tonoiđibus j vejkis deltoidibus, dentatist ramos imbrkantibus.

DESCR. *CanPs* pell, flavefcens, durtis. *Rami* inaequali fpatio diftnntes, conos abietinos referentes, cylindricos, obtufos, polliccm craffos, 3 poll kjngos, veficis denfe imbricatis. *Veficce* altcrnse, propinquar, feſñhs, deltoidca?, ſupra concave, fubrus pyramidem rriquetram inverfam formances, lacribus tribu* triangubribus. Omnia 4 latcrum marlines carinati, demato-fpinofi : pyramides intus vacu^ej adeoque veficac. In tarum alis novi ramuli uvis parvis fimiles ; macuri conoides.

\$2. FUCUS SUBREPANDJUS; cattle cnmprejjh^ ramis atternh; foliis lint art* Ian ceolatis, fubrepando-dentatis, vejiculis peduuculatis.

DESCR. *Caulis* cubitalis * cowpreffus, flavefcens. *Rami* aherni, ex marginibus caulis, nan e laterej fcquipoll. *Folia* alterna • conferra, obrufa, quacdam intcgra, alia fubrcpanda, alia fcrrato - denrata. *Veficukc* axillares, globofo-ovatsc. *PunSia* exiavaxa, fpbla in urraque foliorum pagina.

QBS# FUCUS hk prope accedit ad *Futum natatitem* (*Sargjzc*) fed foliis gaudet dentatis, non ferratis ; neque funt vefica ariftatip. Natat acervatim propulfus ventis 6c unciis; fimul uinien crefcit & fe propsgat. Vermn hare eft patria fbrtuka; vidi ilium fcopolis Coralligenis flfiixmn & denfa fyiva vigenrem* Maxime credibik mihi wdetur, Sargaxo originem laliere e fundo fixb & bafi radicam; quemvis teneri csules, exteraa vi abrupti & in unam texturam ccinpulii ventis pmödicis, etiam fie vivere poilim. M«re Itubruin lipe hanc fylvam geilat natautein, plenara AiiimaittilHis ptrrvs marinis

53. FUCUS TRIVODIS; tank tereti, ramofo| ramulis in tr̄s veficulas inflatif, apice fuihulatu.

DJSSCR. *Caulis* reres, flavefcens^ *Rami* bipollicares* *Rcmidi* aUerni, conferti femipoll. bail filiformes, medio trinodi, latiores, ob ramuli me* dium dilaratum in veficulas tres, rard 4*, inrerdum binasj ofelong^s, pro* piiKjuas; apice filiformi fubulari. *Folia* null*.

Hce trcs (species ad lirtora urbis *Tōr*.

54. FUCXJS UVIFER; tens* ramis Jjwrfif, glandutir waſts, tonfertis.

Refert uvas puniceas parvas pellucidas.

In portu *Gonftantimp*. *Mochha* vidi ramos uv̄s ungue brcvioribus, pollice longiores, cylindricos, papillis cyliixlrici^ ; kerum ranmloljs»

5f# FUCUS i>ivAHICATUS; Jlauejitns, membranaceus >duhotomus, lincaris; apicū bus multilaaniatis.

Coiiftantinop.

56. FUCUS VISCIDUS; *caulibus teretibus, dichotomis, rtwiofis, fqftigiatis, ajw* ctusbicornibus.*

Totus albidus. Facie & magnitudine LVA nwsḡf. Vifcidus, ctiām intus.

Cofiftantinop. teftis concharum affixus.

57. FUCUS MUSCOIDES; *raw* tereti, rubro, apice Jlavido, ramojijjimo *, Jpiñu- Its fparfis , mollibus.*

An idem cum illo ex *Infula Afcens.* (*Spec. PI.*), conferant **alii.** -

Conflantinop. copiofe. *Gracis }Avt>fjLiyyo&<ilotVYi.* Turcis frequens in ufu contra *Lumbricos* infantum: dum per biduum aceto fuccus extrahitur; dein herba, dofi gr. aliquot 1 propinatur.

58. FUCUS CARTILAGINEUS| *foltis vubris> oblofigis; petiolo anguflo, eaulerubro autviridi, comprejfo, dentato, vix articulate, breviffimo.*

In freto Örefund; Confervis aliisque Fucis adhxrens.

59. FUCUS EXCISUSJ *eaule bafi exeifo| ramnlis lateralibus fubulatu , brevibus % fpiniformibus, in medio caule in ramos longiores exeimtibus.*

Ibid. Rarior, Color nigricans.

60. FUCUS PROLIFER Jfrondescens, viridis j articulis obovatis, plants, proliferis.

Alexandria ad littora Man's Mediterranei,

LICHEN.


61. LICHEN PRUNASTRI.

OBS, Lichen hie i&gypti indigenus non eft ; īngilari tamen ottentione digims, propter ufum in re piftoria. Ncfcit -filgyptus artem OMevīam more Europa'o parandi ; hinc & Fermentum ignorat. *Cbamir* ejus loco adhibetnr, quac mafia eft panis non cóch, ik leviflime acefcens. Hare mixta cuui farina fub-«&ta, ferinentationein producit. In hoc fecrcto primum deceptus fni. Plurimum audivi nomen *Scbdbe^ SAAW* herbs cujusdam, mihi ignota?, line cujus admixtione nullus conficitur panis. Allata mihi fuit Artemifia (abfinth.), quam eodem nomine denotant Arabes, propter colorem cinerafcenrem; significat eniū Schsbe *capillos canos*. Verum tandem exemplar obtinui , & acJ. mirabundus agnoui plantam Hyperboream. Totis navium oneribus Alexandria advehitur ex Archipelago, & prafertim *Infula Stuncbio** Rofetts, K^hira? & tiliis locis diftribuitur. Hujus Lichenis manipulo aqua per duas horas imbuitur ; quae pani azymo adjefta guftum conciliat peculiarem & Turcis deliciofum. *Lichen futfurceus* quoque in ufu eft, fed parcior affertur, Pretium eft 7 vel 8 P^ l Of*.



APPENDIX PLANTARUM

ARABIA FELICIS
INDETERMINAT.



I. SUB-OBSCURiE.

FRUCTIFICATIONE IMPERFECTA*

I. HORAK. <-*r^ Hadie. *Pentandria* monogynia,

DESCR. *Caudex* arboreus. *Folia* oppofita , late - Janceolata , plana , rigida> crassa, fupra nirida > fubtus fcabra. *Panicidce* axiHares. *Flores* feffiles, infundibuliformes, monopetali, inferi. *Calyx* 5-partitus, perfiftens. *Stamina* 5 , tota adnaw, anchoris folis liberis. *Stylus* 1 ; apice incras* fatus, Cmplex.

II. SCHANS. JUUÅ*& In monte Sudan. *Pentandria*, monogynia,

DESCR. Arbor incrnis. *Folia* ternata, feffilia; lateralia ovata % medto obovata , fub - cmarginata. *Petiolum* breviflimum. *Flores* flavi, magni, pentandri, monogyni, monopctali, inferi. *Stamina* inclinata. *Capfula* utrincjue fububta, unilocularis, disperma,

III. ANONYMA. In monte Melh&n. *Hexandria*, monogynia.

Arbor Cirro fimilis* *Flos* 4-petalus, neftario tubulofo ? in medto extra ftamina.

IV. ANONYMA. In WleMn% *Didynamia*, gymnofpermia.

Flos rcfupinatus,, fine proceffu bafeos filamentorum. *Calyx* j-fidus.

V. ANONYMA. Hadie. *Didyn. angiofpermia*.

Frutex. *Calyx* 5 -fidus > labio fuperiore ftriato , emarginsita ; inferiore tri-lobo; *Folia* ovata, intcgra.

VI. ANONYMA. In monte Barâh. *Dtdyn. maxofp:*

DESCK. *Flos* albusy ringens labia inferiore tnlobo, pianoj fauce venis vio-laccis notata; Libia fuperiore ere&o, bidentoto,. *Folia* petiolata, ovato lancedata» intègnt, pb e fentia.

VII. SCHAD-

VII. SCHADJARET ELHARNEB.i^gJJ *[^] Hadte. *Diadelphia*.

Folia ternata, myrtiformia, fragantia.

VIII. SCHUREDJ. Surddd. METTAN vocata *Beit elfak/h.* *Diadelphia*.

Legumina clavata, compreffa, villofa. *Folia* ternata, fubrhombaea, tomentof*.

IX. ANONYMA. In monte Barak. *Diadelphia*.

Volubilis. *Flares* subfipicati > flavi, *Foliola* ternata, ovato-lanceolata, medio majore.

X. ANONYMA. *ibid.* *Diadelphia*.

Scandens. *Flores* subterni, violacei. *Folia* ternata,

XL MATEN. ^jjX* In Barhlu *Diadelph*.

Flores racemofi, capitati, miniato-rubri. *Folia* ovato-rhombca, ternata, medio pollicari. *Stigma* glabrum,

XII. ASM. ***££ In Sudan. *Diadelphia*. *Decandria*,

DESCR. Arbor. *Flores* papilionacei, flavi. *Stamen* decimum liberura.

Stigma non barbatum. *Ah* vxillo breviores (quod in Diadelphis raram). *Folia* pinnata, trijup'a cum knpari, *Foliola* pedicellata, obovata cum acumine, extroiTum fenfim majora.

XIII. ANONYMA. Melhdn. *Diadelphia*.

Legumen compreflum, lincarc, tripollicare, digitum latum. *Foliorum* pinse primit 9 - jugae; *foliola* linearia, fere 20-juga. *Spines* ftipulares binae, fuperiores muko longiores,

2. PLANTS OBSCURE

FRU^TIFICATIONE DEFICIENTE.

XIV. KffiLUB. q^gl£=i Hadle.

DJBSCR. Frurex brachiatus, ramis villofis. *Folia* breviter petiolati, oval-acuta, fefquipollaria, Integra, supra nitida, fubtus villofa. *Paniculce* corymbofa:, ramorum terminalcs vcl axillares ; paniculae rami & pedicelli pitctes, uniflori, femipoU. *Stamina* pedicello breviora, cylindrical villofa, fcriebus nngularibus 5 - duplicibus *Glandnlanm*; f.u ahernatiin in duabus lineis pofitarum. *Nucleus* unicus, oblongus.

XV. SCHEKAB. c**i *Hadie.*

Fruticulus, foliis oppofitis, breviter periolatis, ovato - acutis , integris, glabris, pollice brevioribus, fragrantibus.

XVI. ASN. <^uJ *Melhdn.*

Arbor, Malo fimilis , foliis oppofitis , lanceolatis, integris , tripoll, marginC & rachi villofis.

XVII. NASAF. OÜaS *Hadie.*

Arbor: foliis alternis, linguiform. integris, bipoll. villofis J petiolo pollicari, villofo, furfuni craffiore; ramis ultimis villofis. Folia interdum bafi fubcordara.

XVIII. GAVAG. cÿ" In *Melhdn.*

Arbor: foliis cordato-acuminatis, alternis; capfulis 3, facpe 4.

XIX. SAR. ^ *Ibid.*

Foliis alternis, confertis, lanceolatis, integris, petiolatis, nitidis, pollic'

XX. THOA £yi *Ibid.*

Arbor: foliis petiolatis, oblongo - lanceolatis, integris, glabris, alternis, opa cis, venis reticulatis,*

XXI. LiEBACH. g t,j *Ibid.*

Arbor: foliis petiolo duplo longioribus; caetrum fimillimis cum faliis arboris Sar. (XIX.).

XXII. BSUSS. (JUUJMO *Sordid.*

Foliis alternis, lanceolatis , fubfpith. integris, breviter petiolatis; fquamis ad bafin folii.

XXIII. KUER. *Melhdn.*

Foliis late - ovatis , petiolo brevioribus , ferratis , alternis ; Jlipulis binis , filiformibus, longis.

XXIV. HINSIB. v^yMAa. *Prope Tacts.*

Arbor: ramis apice spinofis j foliis petiolatis, ternatis J foliotis approximatis J medio quadruplo majori, apice fubferrato; lateralibus ovalibus, feminguem longis; petiolo breviflmo.

XXV. SIBBIE. «^{AAW} Kurma.

Frutex :/affir alternis, unguem remoris, angufte lanceolatis, bafi attenuatis; fefquipoll.

XXVI. HOBED. Oflxa. *Ibid.*

Frutex: foliis oppofitis, breviter petiolatis; longe lanccolatis, integris, rigidis.

XXVII. KATAF. (falfo fie difta.) *Ibid.*

Arbor: foliis oppofitis, diftichis, cordato-lanccolatis, feffihbus, 6-poll longis, 2 poll, latis , integris , fubtus villofis , parum rcmotis, ideoquc subconfertis.

XXVIII. T^AINAB. CAÅW *Djöbla.*

Arbor. Drupa oblongo - globofa, flavefcens, glabra, nucis magnitudinc, cortice tenui, pulpa exigua, valde infipida, glutinofa, hyalino - flavefecntc. Nuces foveolis 9, multiloculares. Calyx xo-dentatus, ftriatus.

XXIX_# NAKUS. O-ji i Kurma.

Frutex: foliis oppofitis, lanceolato - cuneatis, apice rotundatis, felquipoll. integris, glabris, feffilibus, vel breviter petiolatis, rigidis.

XXX. EMRICH. £^A o J *Djöbla.*

Caulibus fcaberrimis: foliis coriaceis , fcabris, integris, oppofitis, breviter petiolatis, ovato-acutis, tripoll.

XXXI. NdMAM. ,*i Hadfe.

Arbor: foliis ternatis, ovato-lanceohitis, integris, 4-poll, pedunculis racemofis, terminalibusj pedicellis longisj baccis bilocularibusj feminibus 2.

Vocatur falfo *Chiar Schambar:* i. c. *Cajfta jijluh.* Pulvis ilipitum eft antidotum laudatum.

XXXII. TENUAB. CJ^AÖ *ibid.*

Arbor leguminofa: joliis pinnatis; foliolis ovali-oblongis, exterioribus majoribus, 8~j^ugi^s> extⁱmⁱs iquamula di(tin)ftis.

XXXIII HALEDJ. ^U *Surduš.*

DBSCR. Arbnr fpinofa, valide. munita. *Folia ovali-oblonga, craſhufcula, plana, integra, obtuG , glabra, bipoll. geminata, feffilia, in pedicello ċommuni, brevi; fubfarinofa, feniipoll remota, Spina alternae, patenlifimse, foliis longiores, fa-pc bipoll. fubulatc, virides, mucrone flavo.*

Rami tercetes, fubfcabri. *Fruſius*: drupa ovalis, pollicaris, viridis, pulpa \$xigu&-, vifcida, dulcis. *Nnx* grandis, obtufe 5-angulaca & altemnatim 5-fulcata, j-valvis, unilocularis, monofperma.

XXXIV. ANONYMA. *Hadie.*

DESCR. Fruriculus. *Folia* oppofita > fubfcflilia, lanceolata, integra, polfcarrii, olivae-formia, ilibrus tomento albefccntia. *Caulis* infimus & *Radix* villis puniccis teguntur.

XXXV. BiECKA. *Hi* vd *Ebka*. »5^1 *DjMI**.

Arbor, *foliis* obovatis, glabris, integris*, laftcficens, venenata*

XXXVI. FERAR. *Beitelfakih.*

Frutcx. *Spince* pollicarcs, alremap. *Folia* fupra fpmas congefta, fpinis **bre*** viora, cuneiformia, integerricna. *Pedunciili* paniculari, congefti, axillares. *Capfula* bilocularis, bivalvis, monolperma (in ijuovis loculo.)

XXXVII. DAGABUSCH. *Lohaj** alibique.

Gwlis angulatus, denticulatus. An *^jclepias* *Caulis* amarus, tamcn paftori-* bus edulis,

XX^VIII. OKASCH. *ibid.*

Caulis articulatus, tercs, flexilis; aphyllus. Edulis*

XXXIX, DHARAF. *Kwma.*

DESCR. Arbor. *Rami* articukti, vaginati *Folia* alterna. *Petiolns* bipoiUcaris, glaber, cylindricus. *Lamina* cordato-lanceolataj integra, fefquifpith.

XL. ADIR. ^1 In arenofis circa *Sués*.

Herba fpithamalis. *Folia* fefflia, pinnatifida ; laciniae lincares, glabra?.

Planra Arabum medica. Decoftum foliorum recentium purgans, Infufuni foliorum frigidum in hypochondria commndatur.

XLI. ANDIAR. /=?=* Gramen crinitum. *Kurmcc.*

XUI. SCHIACH. *foliis pinnato-divifis, tomentofis, fragrantibus.*

In valle *Mosbeha* propc *Sués*, copiofe. Forte *Gazellarum* (plures enitn vidi) pabulum^ nam hoc in carnpo fere nullx crcfccbant plants anima- lium palato convenientes,

XLHI. SYMM ELHORAT, id ell: *Fenemim pifcium* ; fructus *Arabia Felicis*, rnagna copia transveftus ad Regiones Miris Rubri fuperiores ; eft eniin *Pifcaturcs* utiliffimus. Vehementer ilium apperunt pifces, fed ejus efu ver- iiginc corripiuntur & ad fuperficiem niaris Itupcfañli enarant

XLIV. SCHAMAMA, 8x>l*f fru&us variegatus, Citro flmilis.

XLV, HASCHISCHET EDDAHAB. c^ftjJJ *jSaj&a> Si oves hac vcfuntur planta, dcntes colore aureo tinguntur, & caro flava evadir, Oleum hcrbse fulvi vcl aurei coloris eft. (*conf. Defer. Arab. Editoris. p. 140.*)

XLVI. BASSAL MISKAVT. LJJU'U^CJ*« Hanc plantam ad Cepas peninere
puto, Referebat mihi Ärabs , illam in terra flcca crefcentem inveniri
dulcem; acrem vero in humidis ; aut ninium in hortis fi irrigatur*

XLVII. ZIWAN. CJ! ^ / -*Zizania Aleppenftbus* notiflum.

Inter Tritieum viget. Si femina reftant farinae mixta, hominem reddunt ex panis efu temulentum. Mcflbres plantain non separantj fed poft triturationem Vanni aut Cribri ope (emina rejiciuiu*

XLVIII- SCHEILEM. JU»i etiam agri vitium; a priore tamen diverfa species.

Decofto plants obtunduntur fenfus hominis,, qui operationem Chiriägicarti fubire debet; *Avicenna* fie referente.

XLIX. EDJLIL. J*l?fcJ an species *Satanhil* Sripite & foliis unguntur ulcera; fed periculofum septicum indurans eft.

i., **ANAS.** CJ ^ ^ Arbor venenatiflma j fi quis vel tantillum fucci guftaverir, os intumefcit.

Crefcit in monte *Bord.* £j>. prope *Behahh.* حـ

LI. SCHOKAR. J*& Rami finduntur in lamintis tcnuesj qu* contufc mare- riem *Salab* ـــــ prabent funibus tonjuendis.

LII. GHARIB ELBiECKE. ^XJJ v ^ ff Frcquens in *Djebbel Hofnein*, in terrirorio *Abu arifcL* Arbor lacrymans; avibu* vifitata, qua fuccuro ftillantem excipium.

UIII. DAHU **d vel **MDAHU.** Defbliata rota anno primo j principio fC- quentis foia promit. Lignum initio p^r oftiduum album; poft flavfcir per ofta dies ; dein rubrum evadir, rotidem diebus, totidemque nigrefcir. Poftremo, enitentibns foliis viridem recipir colorem; (Sic mihi reliituin eft.) Surculi radicales exudi parum guftati > vehemens abortivum funt.

LIV. HABBALE. «JL^a* vcl MOMSOCHA. Lk^u*.* adhuc BOCL EL HOMAR A+srMiJ^o Stipes igne uetus fceſet, Recens laceratus fundit fuccum rubro - flavum , urina? Afini fimilem; & fruſlus annua mora nigrefcens ab hoc animali Phalli fimilitudinem mutuatur.

LV. SEGLEG. OULU Ad *Abu artfch.* Foliis recentibus expreffus fucus infillatur oculis infantis, recens nati. Excceſatur per ofliduutn; quo tempore elapfo> ejusdem arboris folia, (vel verius fucus) propinatur: fie Vifus non folum reftauratur, verum & miram obtinet vim , in ultimatin usque feneftutem duraturam. Solent quoque oculos ungere *Galcsga lift a* ^ *Qöhl* diſta ; quse per totum corpus excitat maculas exanthematicas nigras *Bohak LJ*^ quibus eruptis oculi fanantur & vires recipiunt. Caeterum, idem hujus rei paradoxx narrator, affirmabat *Leones* odorem arboris nequaquam tolerare.

ff _____

**DESCRIPTIONUM
PLANTARUM
SUPPLEMENTUM.**

**CE NT U R I A
OCTAVA.**



PLANTARUM SUPPLEMENTUM.

D I A N D R I A.

1. **L**iLEA EUROPE A. Graec. "EA^S. In *Archipelago* fylveftris. FruQus ^S Graecis expetitusj Turcis ingratus.

OBS. In cadem arbore vidi ramulos diverforum foliorum : *Vtterum* enim ultimi ramuli *foliis lanceohtis* gaudent; *Juniores* furculi e trunco furgentes ferunt *folii pnrvs*, *ovata-*, *acuminata*.

2. **SALVIA BIFID A** ; *foliis radkalibus hctftato-lyratis> dentatis, hifpidis.*

DESCR, *Canlis pedalis*, tetragonus, villofus, fere nphyllus. *Calyx bilabiatu*s. *Verthilli biflori*. *Florcs magni*, violacei; *labium inferius medio albo*, punflis violaccis. *Galea exrus glandulofa*, pilofa, viicida, bifida. *Folia* in imo caulcpauca, pollicaria, petiolata, lyrara; ad radicem plura, spirhamalia, haftato - lyrata, dcntata, obtufa, urrinquc hifpida. *Petiohm folio dimidio brevius*; fcilicet: folium ad bafin laminae anguftum, inde dilaratum in auriculam utrinque unam ; qua? tamen ambs angufticres lamina magna ; his denique adjungitur petiolus nudus.

Ad pagum *Belgrad* propc Constantinop. frequens in pratis.

T R I A N D R I A.

3, **CYPERUS MINIMUS** | *capitulo terminali; invohcro triphijllo j foliis plants, femi- teretibus, canaliculatis, recurvis; fcapo tereti, Jifquipedali.*

Ad littora *Marts Marmorcp**

^, **PHALARIS MURICATAJ/pica cylindrical foribmgemkatis| calyce fruEtifero, aculeato - muricato,**

DESCR. *Culmus teres*, glabcr, ramcfus, ereftus, fefquifpith. *Folia* ad fin- gulum geniculum 2 | quod in Graminibus infolitum. *Vagina* ftriarae, fefquipoll. incrdum equates, oppofirx; interdum ina:quales, alterna?. *Folia* plana , glabra , ciliata, fetis rigidis pungentibus. *Spica terminalis*, flo- rens , viridis, hifpida, fructificans, Ferruginca > aculeata. *Flos* fefTilis, geminus, fempcr in pedicello communi brcviflmo. *Glumce* calycince utrceque fetis hifpidae, corollam includentes, mucronats; interior linsaris, angurta*, exterior ovato-oblonga, priore latior & longior,

Gramen singularis forma?, Calycibus muricatis, in (pica geminatis. Phalaridis nomine infignivi, ob Calysem uniflorum, corollam includentem.

Ad littora Martis Mormorae.

§, BROMUS SQJARROSUS; art/Us compress ; glumis interioribus citiatis; foliis utrinque pubefcentibus & vaginis inferioribus | fuperioribus glabris.

Efiac propc Maffilam.



T E T R A N D R I A .

6. SCABIOSA LYRATA;/O//7J raScalibus ovatis; caulinis pinnatis.

DESCR. *Caulis* subtomentosus. *Pedunculi* longi, glabri. *Folia radicalia* ovaria; in petiolis interdum pinnata, unde evadunt lyrata. *Folia caulinaria* pinnata. *Corolla* j-fida:, radiantes, violacee. Dichotomia unsu

Ad Dardanelhs. Fades Stabiofce argent.

7. GALIUM PASCHALE; foliis linearis-tanceolatis, mturonatis, glabris.

DESCR. *Folia* 4-8-na, margine retrorsum fimbriata. *Caulis* quadrangulus, *Pedunculi* dichotomi. *Fruitus* glaber.

OBS. Graeci Constantinop, plantam vocant P/£#£/. Radicem aqua coquunt, usque dum succum probe emifit; quo facto, ead'm aqua coquuntur *Ova pa/chaUa*, qux inde i*ubro tinguntur colore.



P E N T A N D R I A ,

8. CONVOLVULUS PROSTRATUS; caule prostrato; foliis fejilibus, Tmeari-tumatis, pilosis; pedunculis axillaris, unifloris, dibracteatis.

Mdr. Vidi eundem inter frutices ereffum.

§, C. BIFLORUS; foliis pqftice truncato-rotundatis; pedumulis fape bifloris.

In desertis Kdhirinis.

10. C. HASTATUS; caule volubiR) bicnitali, fcandente; foliis haftatis* bipoU liuaribus, bafi infra ttnidentatis, pedumulis geminis, Jhmel dichotomis.

Kdhirce. Arab. Qllccik; nomen generale plantarum volubilium. Florum forma & color similis Conv. arvenfi.

11. CONVOLVULUS SERICEUS; eaute vokbiliJ Jigmate fimplici; foliis palnato -pedatis ,fericeis; pedunculis unifloris.

DESCR. *Caulk* volubilis, cubitalis > fulbignofus > filii crafltie, leviter tomentofus. *Folia* alterna, petiolo filiformi, femipollucari. *Lamina* cordata, pollucarisj palmaro-pedata, lobis vel laciniis septem, mediis longioribusj interdum filiformibus, inrerendum denraris, extimis bifidis, omnibus cinereo-lériceis, *Stipula* binw, breves, filiformes. *Pedunculi* axilhres, **foliatarii** > uniflori. *Flores* viotacēt, pollicares. *Stigma* fimplicx, acutum. *Capfiila* bilocularis, globola, difperma. *Semina* nigra.

Ad littora *Mari's Marmorce* in fepibus. Dubii generis planta ; ftigmate fimplici, nee tamen capirato ad *Ipomceam* vix accedit Capfula bilo-
culari similis est *Conv. macrocarp.*

12» PHYSALIS RAMOSA ; foliis fmplicibus geminisque, late ovatis, aeutis, Jnuata -dentatis, Jitbillofis.

Flores flavi. *Fru&us* valde inflatus, quinquagonus > bacca > ruber^ foccus*
Plant! annua ; facie AlkekengL

Ad Uahftid.

13. SIDEROXYLON INERME; foliis ovatQ-laneeolatis, crenatis+glabrir, alternif,
Corolla inter lacintas non dentata*, monopetala, infera >, j-flda. *Folia* 3-pol*
licata. *Bacca* 4-fpcrma.

Sadié. Arab. *Uaraf.*

14. RHAMNUS NABECA. Vdriatz

- a) *Rh. divaricatns;* foliis femipollucar. Caulibus ad ffngula folia dlvaticatisj
fpinis validisi (Wpe geininis. .
- i) *Rh. redhis**, ramis reftis; fpinis aut nūllis, aut (blitariis ad larus petrolf,
reftis patentibusj foliis pollicanbus. *Uirrusqte* caudex arboreus; fructus drupa > nuee bifocubri^ folia crenulata, trinervia, glabra, ovaria^
obmfa, akerna, diiticha, pctiolata; ftipula! fcrace^

Arab. Prior *Sidr*, vdGha/l aut JElb. wUff AkttArdjvdOrredj. g۰۰۰

15. HVONYMUS INFRMIS; ;foffir altemis, ovatis> ferrutatir.

DESCR. *Caulis* fruricotlis.. *Folia* prrva, feflGai, nitida¹, venis reticulata;
Cahjx c-ampanulatiSy 5-particus > ruber. *Baccce* 3-5 intra calycemj
yirtJcs; marura? nigrefctentes.

*Hadfe** Arab. *Btn&. oU** Djöl/fez Qtpm ennemr, jv5) i^y?

16. MANGIFERA AMBA.

DESCR. *Folia confrra, fparfa, alterna, lanceolata, fpitham. Perimthium 5-phyllum. Petala 5, infera. Stamina 5; unum folurn magnum, fertile in iis quos vidi floribusj reliqua minura, abortientia; singula impofira Glandular magnar, Fru&us ovatus, flavus, edulis, magimudine ovi anferini**

Hadte illara hortis, exotica, Indict originisj adhuc rara, Arab, Amb. عَنْبَر

17. NERIUM OBESUM ; *joliix fparfs_t obImgi\$ ramis toriformibur.*

Caiidex mollis₃ bulbum referens supra terram, volumine capitis burnanl Melhdn. Arab. Oddajn. ^oe vel Aden. ^ &z

18- *N_# foliis ternatir, longe-tanceolatis'f plants, nitidis, fpHhamatibut.*

Hadie. Arab. Darah. Arbor magna; folia immillima Salicis frag.

19. *N. fo&f integris; petiolo bipollcari; ramis articutath, vaginatis**

Kurmce. Arab. Dharaf. Incertus (am, an haec (pecks & prior ad Neriuni pertineant,

20. *CHENOPODIUM VIRIDE;/b/iffj- nudis; Jloribur feffilrGnr, verthillatis.*

DECSR. *i**b7l** obtufc- ferrata, cordata,, venofa,, fub-villolā. Braffect linear-lanceolate, ciliary. Calycir labium infcrius colorarum, longunTy criden-rarum. Planta herbaces.*

la Temen frequens Arab- Rokefr ed djemmeL*

SI, CH. *sEROTiNUM?/ofif/ oblongis, erqfis_T poftice integris| racemis compo/fitr_s, terminatibus.*

Folia subtus valde farinofa, alba, fiipra. fere nud_r Racemi infimi fuffulci braftea lanceolata Petiolus brevifirmus, Taces in cultis;*

22» CH. *TRIANGUEARE J foliis frfmimilarwus_y crqiiilaferis_y pojlice integris f racemis decnmp&fifis_r fitbnndis, axillaribns_r tei'minalibus.*

DESCR. *Folia lefqmipoIL parum fulrus firinofa; farina viridi; latiora; magi's quam longiora, eroft; facpe inregra. Pefiohts fefquipull. Racemi raro lufulti braftea lanceolau; ramis dentio> ramulofisj. kleoque d^coinpofitr^ Circa Taas freq.ucn^*

23^r BUPLEURUM FtAvuivr; *fnliis linearibus.*

DE*CK. *Caulis dichoromus, creflus,- pedalis. Folia rafficalia Rneirfur, adeo ut caulis fere nudus appearar. Folia caulina lanceolate-lincaria, fessilia,*

C^{Cc}) J

Inva-

Involucella univerfalia 5-phylla, lanceolato-mucronata, 3-carinata. *Involucra partialia* 5 - phylla, umbella duplo longiora.

Ad *Dardanellos* in arvis.

24. *CAUCALIS PUMILA?* *Alexandria* § *vernalis.*

DESCR. *Folia* tripinnata, villofa, ut tota planta. *Petafa* plana, apice replicata, inflexa. *Involucra* univerfalia, fimplicia, raro apice bilobaJ-in* rcrdum omnia triloba. *Pediinculi* maſculoruni florum breves. *Flores* fubradiantes, fertiles, feffiles, abortientes, fubpedicellati.

25. C. GLABRA ; *foliis tripiniatiſ, ftlabris ihvolucris univrfalibits trident a** *tis j Jloribus omnibus pedicellatis.*

Petala ut in prxcedente. Tota planta glabra; villis vix manifeftis, *Semina* hifpida.

Cum priore habitat

26. C. ANGUSTIFOLIA; *foliis multi/idis, anqitflisy cheerophylli-formibus^ involucro ntroque, germine & feminibus hijpidis,*
Hadie.

17. ARTEDTA MURICATA ; *foliolis ovato-ferratis.*

DESCR. *Involucrum* utrumquc ramofum. *Caulis* hifpidus. *F/ores* difci abortivi. In medio cu jus vis umbelke eminent longiori pedunculo *foliolum* crifpum, rubrum, vclut umbellula fpuria.

i3) An varietas: *Jlore difci maſculi abortiente; involucro umvtrfaai pinnati' fido^ partiali Jimplici.*

Tenedos &, ad *Dardanellos*. Grsec. Aglyyavo.

28» RHUS SIENEB ; *foliis longo - lanceolatis, ferratis, fubtus tomentojis, albis.*

Baccw feffiles in ramis fub foliis, confertae, hifpidae, globoſae, fubſpicatae.

In montibus *Hadēnibus*. Arab. *Saneb.* v̄.wo aliis *Bcejad.*

29. TAMARIX ORIENTALIS; *ramis & ramulis articulatis, ramornm vaginis cylindricis ,acumine uuko fquamiformi J ramulis longiffimis^ nudis, articulatis, vaginis cylindricis, ad genicula uno acumine.*

©BS. *Flos* ftaminibus 5; verum 6c 6; -pifil-lis 3. Differt a *Tamar. gaHica*, cuius rami fquamati, fquamis alternis, feffilibus, lanceolatis, ramuli breves, imbi>cad; foliolis lanceolatis, confertis*

Arab.

Arab. Atl. J i) Hcbr. >fc_N ALPINUS dudum delineavit arborem, haud tarae*n* accurate.

Galke Tamaricis in officinis usurpatur loco fruatus. In hac ^{arbores} habitat peculiaris **CICADA cornuta**.

30. *CORRIGIOLA REPENS*; foliis avato - tanetolatis; fioribus capitath.

DESCR. *Cunis* penia columina angustiores, repentes, villoso-scabri, articulati; articulis pollicaribus, extrorsum gradatim brevioribus. *Folia* ad genicula ^{vix illam}, uvatō-iānceoiāra, scaoniuſcuJa, craňa, marginc subtus mcrallata, fetula terminataj incerti numcri, 3-8na, iniequalia, femipollīcana. *Stipite*; squama? aliquot membranacese sub foliis. *Rami* ad eēnçula fepe duq oppofiti, breves, raro pollicares > interdum ramulōfi, apicibus flonfens. *Ilores* in apicibus ramulorum & caulis capirati, subquim, quidam feffiles, quidam brevirer pedicellari, squamulis quibusdīm membranaceis involucrati. *Calyx* 5-phallus, laciniis subrotundis, me Ho viridi, alato, margine hyalino, lato. *Corolla* 5-pcreala, patens, petakS lanceolans, calyce brevioribus, tenuiflrmis. *Stamina* filimenta & fili formia, longitudine corolla. *Pifiillum*; *germen* globofum ; *jJus fili*". formis,gernune longior; *Jigma* trifidum. *Semtna* non vidi.

In defertis *Kahirim*. Omnia signa novi generis habet.

31. C. AiBELLA; /o/ »/ oppofitis; jlijmlit hyalinis.

DESCR. *Canles profrati*, dichotomi. *Calyx* f-phylJus, muticus. *Petata* f, cava, obtda, mucrone fetifbrmi extus fub apice. *PijHum* tinicum. *Fores* confern, feffiles. *Folia* oppofita. *Stijmte* hyalinse : hinc tota planta alba appetet.

Arab. *Libbajt.*

32. *JLSINE SKGETAUS.* *Kdhirce frequcns.* *Arab. Girgfair.*

OBS. *Stamina* fiepe 3, raro 2 vel 4, interdum 5; hinc *Polycarponi* similis *Caenula* i-loculans, 3-valvis. Aliquando vifa mihi ftaminibus 10; *anSp'ereuld?*

33. A. PROSTRATA; foliis oblongis j eaule jirojrato , dichotomo : Jore p  a,
taudro, trigyno.

Kdhirce. Arab. Robbaire.

34. PARNASSIAFOLYNECTARIA; 70/«*linearis-lanceolatis*; ne *Stariis decentfetofis*

DESCR. *Catties filiformes*, decumbentes, pedalcs, ramofii, infra violacei, fu-
perne virides, utrinque linca longitudinali ele^ata, dupli. *Calyx*
perianth. 5-phylum, inferum, perfifteiis, patens; *lacinice* linear-lancc-
olatx,

olatae» corolla duplo brcviores. *Corolla* petala. 5, intera, ovato-acuta, patcntia, concava, integra, glabra, alba, nervis violaceis; fubtus medio violacea. *NeSfarium* ad bafin cujusque petali duplex, conico -cavum, fertile, margins fctis 9, mediis fenfim longioribus* *Ne&aria omnia* albida, in cavitate flava, calyce breviora. *Filament a j, ere&a,* alba, corolla breviora. *jtuthera* incumbentes, didymae, bafi fifise, ovato-obtufse, violaccje. *Germen* cyhndricum, apice comprefifo - anguftarum, utrinque carinatum, albidum, filamemorum longitudinc. *Stylus* nullus. *Stifrma* compreffum, suprà capfulam hilabiatum. *Pericarpium*, capful* cylindrico - fubulara, unilocularis, polysperma, coronata ftigmata bilabiate marline incrafato. *Semina* plurima, parva, globofa. *Folia* oppofita, linearis-hnceolara, feffilia, glabra, femipollucaria. *Pedunculi* ramorum suprcmorum & caules terminales, filifonnes, uniflori,

Baih.

• * •

NOVUM GENUS.

35. ERACLTSSA HEXAGYNA; *calyee \$-jjhytlo; corolla nulla; fiylis ftx\ tapful** *trilotulari* fexvalvi, di/ptrma.*

DESCR. *Radix* fimplex, lignofa, perennis. *Caules* ex una radice multi, fili crafftie, rereites, glabri, diffusi, parum ramod, fpithamales. *Folia* alterna, brevirer petiolara, ovata, integra, interdum acuminata; perexigaa. *Pedunculi* axillars, foliarrii, folio breviores, uniflori, verfus apicem caulis iparfi; marurante fruflu eloigantur in longitudinem folii. *Calyx* 5 - phyllus, foliolis orbiculatis, acuminatis, convexis, margine membranceis, perfiftentibus. *Corolla* nulla; ad bafin vero receptaculi fquamula membranacea, qua(i) rudimentum corolla?. *Stamina* 5 > libera. *Germen* fuperum, globofum, multangulum. *Styli* fcx, breves, divergentcs. *Stigmata* fimplicia, crafla. *Capfnta* globofo - depreffa, calculata, trilocuhris, fcxvalvis, bifperma in quovis loculo. *Semina* duobus laceribus exterioribus planis, tertio convexop

Nomen novae huic planrs datum in memoriam loci natalis *Eracliffce%* pagi Gratis habitari, in littore occidentali *Maris Marmom, PhyU fanthi aliquanrum* convenit,



HEXANDRIA,

36. PANCRATIUM ILLYRICUM.

Stamina longimidine neSarii Bulhi albi, magni.

Alexandria, horccnfis. Arab. Sufann.

CBS. An Hebrororum *yp}i1}* ? Illam plantam Dofh'(T. CELSIUS *JJUum Mum* putflt. •SimiJifudo magna eft cum hoc Pancratio, quotl ctmdore fupeiat Lilia, & omnem albedinem tinctoria orte provocatam. Candidus veftium color Sacrificulis olim refervatus erat; an vtro hinc concludi poteit, regak ilium fuiflc ornamentum, praeter purpuram?

37. AMARYLLIS ALBA J*foliis linear-i-lanceolatis| Jlore albo.*

Spatha 10-flora 1 floribus^ declinatis.

Kurmce. Arab. Soraf.

38. ORNITHOGALUM FLAVUMJ *foliis linearibus, piano complkatis| Jloribus fiavis, racemofis,*

Siirdild. Arab. Bajfaler robah. بصل الرباح

39. ANTHERICUM APHYLLU»*J *radice bulb of a.*

Folia nulla. Radix bulbis pugni magnirudine, tunicis craflis. Ex una radice 6 vel 7 bulbi.

In infula Rhodo.

40. A. ASPHODELUM; *foliis cafnop, teretibus| capjiila \$-loculari, difperma.*

Ibidem.

41. HYACINTHUS SUROTINUS?

Lacinice (non pcrala) corollx extciores diftinftae. Color rubro-fufcus. Scmina multa in quovis loculo.

Kdhirce in defertis. Arab. Borrcrjt. կ^ի Radix edulis Beduinis.

42. RUMEX LACHANUSJ *foliis late-lanceolatis.*

Flores valvulis intcgris, graniferis. Folia petiolata, bafi petiolis vaginanti-bus; folia caulina late-lanccolata; radicalia fpatulata, obrufa.

Natolicv. Grace. Αδχαρο.



OCTANDRIA.

43, ERICA VERTICILLATAJ *verticillo ex ala folii prodennte.*

DJESCR. EX ala folii *mriicHlns* cxitj ad quodlibet enim folium in ||s vrticillis, qui flores quoque ferunt, plurcs pedunculi oriuntur. Apices ramorum raro floriferi; sed flores medium c&ulm occupant; & sepe duo vrticilli iolio.rum interponunrar verticillls folia & pedunculos gerantibusj adeo ut tertius quisque Vert, medii caulis fit florifer.

Circa *Confstantinop.* Grec. Φύλα.



DECANDRIA.

44. JUSSIVE A EDULIS ; *eauSBw prqflrair̄s* fotifs tcmge-petiolatij, ovatif, mar**
Sine plicato -Jerratis | floribus tetrapetalū , offiandrif.

Florum racemi axillares. vScmina matura fine Decembr.

Lohaja. Arab, *Uakr.* Edulis; co&a^more oleraceorum > vd mixta
 pani Durra.

/jy# J. DIFFUSAJ *cattle repente; foliis laneeolatis,*

Flores pentapetali, decandri, flavi. *Capfulce* feffles.

Rofsttcr ad ripam Nili, ia marginibus agrorum/ Arab* *Forgaa* vd
FrcekaL

46. SILENE VILLOSAJ *foliis ciineiformibns; baji ciliatis.*

DESCR. *Folia* cuneata j ad bafin fetis ciliata. *Flores* folitarii, violacei J petalis integris, circnulatis. *Fru&iis* fecundus, axillaris-, feffilis, decem-carinatus. Tota planta villofa.

Prope *Conjlatthiop.* •

47. S. INVOLUTA ; *foliis lanceolate-Unearibufr fejjilibus> ciliatis > fnbtns tomen-tojis.*

DESCR. *Caulis* fruticofus, craffiis, teres> villofus. *Calyces* axillares, oppofiti, pedunculati, angulati, vifcofi. *Petala* involuta, olivacea, apice bifida. *Flores* inerendum muld aggregaci in axillis, prajfertim ad apiceni caulis.

Ad *Dardanellos* in arvis.

48. ARENARIA FASCICULATA; *foliis filiformibus, oppositis, connatis.*

Plants parva, fruticulosa, cespitosa J floribus albis*

Kitrma?

49. A. FILIFOLIA; *foViis Jiliformibus, fiberit.*

Cauks dichromi f debiles. Calyces xquales.

In monte *Boka.*

50. CERASTHJM JRÖCUMBENS} *caute procumbente> dichotomo; capjiutff dijufjis**.

DESCR. *Caulis pedalis, villofus, viscidus. Folia lancolata, vilcofa, undulata. Petala calye longiora. Caputce Temper eretae.*

-Ad pagum *Belgrad* propc *Conjlatinop.*



D O D E C A N D R I A .

51. PEGANUM RETUSUM j *foliis Jubcarnojif, Jhffilibur, tuneiformibitis<> retnsif.*

DESCR. Erutex. *Sami ipinofi, tomcentofi. Stamina 15. Petala 5, Crys-*
5-fidus, inferus. Copula polypetra.

Alexandriæ. Arab. *Gharghca*

52. EUPHORBIA BELGRADICA; *florae ereBo; ramis alternis, dichotomis*, foliis oppofitis: xaulinis oblongis^ ferrnatis: foperiaribus fimkhcularibns| omnibus feffilibus; capulis foliaris f axillaribus, tuberculatis.*

Ad pagum *Belgrad* propc *Conftantinop.* rarius in fylvis.



I C O S A N D R I A .

53. PYRUS SPINOSA; *ramulis mncronatis| foliis oblongis.*

DESCR. Arbor magna. *Ramuli mucrone acuro terminari. Sphæ latérales minorcs. Folia pectiolata, oblonga, utrinque glabra; face obtulæ, supra nici'da, fcfquipollaria, digitæ angustiora. Fru&tis pomum, loculamentis plurimis.*

lmos 8c in litore Natolia. Grac. Ayyupgoc. Putavcrim praefcnriam Ipinarum hanc Pyrum a Cydouia dirimcre quae incrimis est.*

54. PYRUS HADIENSIS ; *foliis ternatis, lanceolatis, rugosits, integrity vents fubtus grijeis.*

Hadfe. Arab. *Sfcerdjel.* Cam *Cydonia europxa* vix conciliari potest.



POLYANDRIA.

55. CAPPARIS DAHI |*spinis axillarib; 2 trevibus, oppofitis| foliis bipinnatis, pinnis 2-feu 3'jugis; foliolis ovali-vbloqvis, obtnjis, q-yjugis.*

In monte *Welkdn*, Arab. *Dn/ii.* ^U Ha?c pUnra inter mithridaticas eft, & candem Vcenis refiftendi vim hubet, ac *Capparis Jjjinofa*. (Cenr. IV. 5. cfr. Dcfcript. Anim. p. is. N. 12.)

56. DELPHINIUM GRANDIFLORUM; *Jloribus armlets; ne&ario diphyllo,*

DESCR. *Flores cccrulai NeSiaria diphylli, integra, peralo longiora; macula ftilva. Caulis & pedunculi uniflori, fquamati; fquamis lanceolaris. E latcre ncftarii exit urrinque petalum violaceum, longe unguiculatum: hxc duo petala (1 adnumerentur 2 hciniis ncftarii, tune demutn crit corolla 9 - perala, & planta accederet ad *Delph. peregrinum*.*

Ad *Dardanellos*. Grace. Kygto Ζεμπτλια.

57. CLEMATIS VIT ALB A |*foliis ternatis & bijugis cum irnpari; foliolis ovato- Icmceolatis,fcrratis.*

Kurma. Arab. *Sckeradj.* ^ش



DIDYNA.MIA.

58. SATUREIA GRECA ; *foliis ovatis , ferraiis, petiolatis; jloribus axillaribus racemojis.*

Calyx 5 - dentatus, fauce villofa. Anther a cruciate. Caulis obfoletc quadrangulus, pubefcens.

Circa *Conjstantinop.* in ruderatis. Graec. Φλεργην.

59. NEPETA szvE'rn.LJE; *foliis petiolatis; non dent at is > fed crenatis; leviter fubtus tomentojis.*

Circa *Taces* in fubhumidis.

60. MENTHA

60. MENTHA GENTILIS ; *foliis cordato-lanceolatis, obtusis, rufiulis.*

Folia perpendiculariter ferrata; breviter petiolata. *Stamina* corolla longiora.
Kahirce hortensis. Arab. *Nanaa*. 

61. M. KAHIRINA; *foliis ovato-lanceolatis, acutis, ferratis; ferraturis dejacentibus.*

Verticilli pedicellati, g-12-flori. *Folia* breviter petiolata. *Stamina* corolla breviora.
*Kahirce** Arab. *Lmam* vel *Nmdme*. 

62. MARRUBIUM PLICATUM; *foliis femoriberculatis, tomentosis, rugosis, /?i-riflo-lobatis.*

Flores violacei. *Calyx* 5 - dentatus, pungens.
Alexandrite. Arab. *Frafim*. 

63. ANTIRRHINUM SUHNUM; *foliis linearis-Inncoelatis, atternis> drjantibns.*

Cattus diffusus, facie cubitalis. *Floras* flavi, calcarati; in racemis terrinalibus.
Circa Constantinop.

64. VITEX AGNUS CASTUS.

OBS. *Folium* integra, saepe septena. *Flos* interdum olbus> vel csei-uleus. [^]?avi du-riffima, vix prster capulam crassissima continens; flava vel nigra; medio Septembris matura.

In *Archipelago* & *Natolia* ubique copiose. Grsec. *Aiyoiqtx*. *Alexandria* hor-tensis. Arab. *Kafmarjam*. Variabat *foliis* y-jiis*, *digitatis* vel i-teqriss.

Smimce, Semina certum medicamen contra Colicam, si in pulvorem redacta Cypae bifariam scftae asperguntur, & bulbi isti stomacho imponuntur.



D I A-D E L P H I A.

65. PELYGALA BRACTEOLATA; *foliis atternis> obovato-cuneatis, integris, foli-villois, pollicaribus.*

DESCR. *Cauces* cubitales, fere ramosi. *Pedunculi* racemi terminales. *Folia* feffilia, propinqua, obovato-cuncata. *Capula* ovales, emarginatæ, villoso:, testa calycis alis subrotundis, unguem longis. *Corolla* carina apice criftata.

Hadie. Arab. *Schadjaret el hover*, [^]ys? J [^]x[^] Ajunt ex hac *Polygala* Indigo posse pardri.

66. GENISTA HJETAMJ foliis fimplit|**bns| ramis -alternis^ Jlriatis |fruEtu ovali,
tinihculari.**

Flores albi, feflfles. *Semina* duplii ferie, vclut in bileyularibusj non tamcn paricte separata.

Rofelta vidi plantam e defertis allatain; pottea abundanriflime crefccnrcni invenicbañ circa Sue's in campis arenofisj alritudine fruticuli, **Ard).** *Ratam bahdm.*

Radix perquam amara; decoflum bibunr Arabes dolorc cordis (hypochondria) labor antes. Herba in aqua macerata, vulneribus imponitur.

Annon hac Genifta eadem cum Hebr. tZDri^? In *Hjpania* arabicum nomen c pr-iico usque Saracenorutn sevo iervarum hodie *Retamas* fognat. (cfr. *Ofbeck* itiner.)

Vita pauperrimcE symbolum eft '(Hiob. C. 30- v. 4, 5.) & hominis ia defeno palanrisj cui nullam fupcreil: alimentum nifi hujus radicis; <juan Arabum nemo guftarc cupit, propter amaritieni. Defignac quoquc *ipfa loca* iterilia, trish'a, fine arbore & umbra; ipfe Frutex ramis sparfis, rariss., miferum eft refugium in aperto & fervido campr>. (cfr. 1 Reg; C. 19. v. 4.) Igni injécla *fragore tonat*, vcluc Juniper uş: hscc nota apprimt CGiwenit aniino iracundo & immiri, (cfr. Pfalm. 120. v. 4)

67. PHASEOLUS RADIATUS. Arab. Kofohari.

DESCR. *Cciulis* ere9:us, teres, hifpidus. *Fotlola* ftipulata, villofo - hifpida. *Flores* parvi, fufco - flavi. *Legumina* harizontalia, hifpida, toralofa, terenciaj quadripolllicaria.

68. PH, PALMATUS. Arab. Gotn.

DESCR. *Caulis* ^qumquaogularis, hifpidus, fefquipedalis. *FeUota* hifpida, palniata. *Flores* parvi flavi, fubfpicati. *Legumwa* glabra, torofa, pendula.

Ambæ species in Tmtn coluntur pro pabulo Jumentorum.

69. HEDYSARUM IMMACLATUM; leguminibw conjugatis, rettis? ixtus fobatit.

Folia pollicaria, ovata, *Flos* albus.
Hadte.

70. TRIPOLIUM REPENS Jfoliolis late oboualis* emarginatis; capititis atbis.
Hadk.

71. LOTUS

71. LOTUS MLGRADICA ; *fotolis qminatis, eumiformibus j fatt5* ereSto; Jiliquis calyce fefquilongioribas-> Jblitariis , ereSiiS , glabris,*

DESCR. Caff/fr ereftos , pedalis , reres , (hiatus , villofus. *Folia feffilia, cjuinata, vcl bijuga cum impari. Foliola verlus impar gradacim rnajora, fernipollcnria, ovaco- oblonga, obcufj cum acornntnc, fubtus villoli. Pcdunculi iblirarii, axilhres, erefti> apicc umbellifcri. Flores non. vidi. Legiunina oblonga, terctli, mucrona terminata-, ferruginea, difpcraia, non binata; calyce perfiftente, puniceo, villofo, laciñato, pedicellis brcvibus. Semina globofa, nigra, hilo alboj fingulo iftlimo di(linflo.*

Ad Belgrade pagunx prope Confiantinop*

72. L. CRETICA J foliis tanceolatis, fasfcicuhtis.

Cattis fruticofus. Folia quina ad unum latus caulis feffilia, feu fasfciculata, lanceolata, ungue brcviora. Inter Semina iflhmtts tenuifTmus; cui forfitan hi omnibus Loti fpciebcis adeft, ^uaravis feiuinibus niacuris bi ifthmi exolefcant & i-etrahancur#

Akxandriw. Arab. *Efibe.*

S Y N ' G E N E S I A ,

73. SCORZONERA HISPIDAJ *foliit linearibus, dentatis* eilhtis; scapis nni-jhris.*

DESCR. *Folia radicalia plurima, fncari-lanceolatj, denrato - finuata, pilis rigidis hifprda. Scapi plures ex una rndrce, fpithamales, prlofi, uno alteroce foliolo fcriforaii, acuto. Calyx hispidus, imbrkaxus. Semitic* ferruginea, j pappo plomofo. Flores flavi.*

Ad EJlac prope Maffilim, in montibus.

74. SONCHUS OLERACEUS; *foliis bafi cordatis, atnptxicanlibus, tanceolatis^ Jinuatis, denticuiatis.*

Djobla.

75. LACTUCA SINUATA.

DESCR. *Caulfs pedalis J aculeis in dimidio inferior! (parfis, confertjV all)is. Folia inferiora 4 poll, supcriora minora, haftato - lanceohra, feffilia, glabra, Integra-, ciliata ^aculeis. In Lafly falii>na omnia folia, led in hac rmjora tantum cariná aculeata. Flores in racemis ramornm & caulis tcrminalibus, bracteola flava fingulis subjefta. Valde kftefcir.*

Natolifc

Natotia in arvis ad Dardanelles; ctiam /Hexandrīr, Grace. Γαλαξίδια.
Hujus plantar & *Chondrillce* fiores in herbario voraciter deftruunt
Tineae.

76. L. DECORTICATA; *foliis lanceulatis*; *dentato-jtmtatis*, *glabris*, *appendice utrinque lineari*.

DESCR. *Caulis* cubitalis, ereftus, tercs, ramofus, glaber, albusj per intervalla longitudinalis appendices foliorum dectirrcntes elatae, virides, corticem mentientes; adeo ut *caulis* inter eas faciem decorticati habear. *Folia* ima pinmta, fuperibra lanceolata; omnia finuato • dentata, feffilia, glabra. *Pedwiculi* fpicic longx; *caulis* & *ramorum* terminates. *Fiores* feffiles, braćleola lanceolata, decurrente ḥodem modo ac *folia*. *Calyx* pollicaris, cylindricus, irabricatus, *Flofculi* 5, flavi. *Semina* brunea*, pappo ftipitato.

In *Infula Imros* & circa *Conjlantinop*.

77. LEONTODON MEGALORHIZON; *fcqpo pilofo*; *talycis laciniis ad apicem gibbis* J *foliis dent at 0 - pinnatifidis*, *glabris*.

DESCR. *Scapus* pilofus pilis longis, raris, flaccidis. *Calyx* ereflo-patulu^ Foliola verfus apicem fubtus gibba. Infinra foliola laxa, erec̄to - patula, margine albdeentia, menibranacea. *Flofculi* radii fubtus violacei, margine lutei. *Radix* craffirie digitii, longa, fuliformis, laftc amariflma.

Ad *Dardanelles*.

78. HIERACIUM HISPIDUM; *joīns ablongo-lanceolatiS* fihdentatis.

DUSCR. *Caulis* ere&us, foliofus, hispidus. *Folia* oblongo-lanceolata, fubtus hīpida, fubdentata. *Folia* caulinā fumma integra. *Pedunculi* axillares, {juamofi. *Fiores* ad apicem *caulis* fubpaniculati, flavi.

Ad *Cotiftantiwp*. in fylvis rarijs.

79. ECHINOPS SPHJEROCEPHALUS; *foliis pinnatis, fpinofis*.

Calyx uniflorus. *Capitula* ccer^lea, magna, tripollicaria. *Calyculi* cinftilana longa, denfa.

Tenedos. In *Natolia* vidi fimilem huic, fed *capitulo uno*.

- go. E. STRIGOSUS; *ccinle multifioro j foliis fttpra laniferis j ccipitulis caruteis, parvisy vix pollkarilms*.

Tenedos. Grace. Kcc&ocg öiyccBo.

81. E. RITROJ *capitulis parvis, cceruleis ; cahculo unifloro; caute mult 1 flora**,
. foliis utrinque laniferis.

Ad Dardanelles,

82. SERRATULA SPINOSA; *caule dichotomo J floribns albis.*

DESCR. • *Caulis dichoromus, fruricofus, in acervos diffusus. Folia glabra, Ftores albij omnes, quotquot vidi, hermaphroditæ. Si radius fcem adwflet, ad Centaur, spinofam accederet.*

Tenedos, frequens in fccis. Gneç. luXot sv@icc. Turc. Djevann. In littore NatoliCB inventa mag is tomentofa.

Propter (pinas imponitur fepibus agrorum & hortorum armaturae inftar.

83. CNICUS DENTATUSJ *foliis cordato - lauceolatis, amplexkaulibus, dentato-Jpinojis.*

DESCR. *Caulis pedalis, creflus, ramofus fupernc, raro infra, tcras, ftriatus, villofus. Folia fefquipoll. dentibus validis mucronatis e marginc, & inter illos alii minores. Vena: fubtus clatce. Rami erefto - patentcs, tripoll. Ftores flavi, ramorum & caulis terminates, folitarii, ereflij caulinus hurciilior rameis> ideoquc prius floret ac maiurefcit. BraSteoe arçle cingentes flores, ortse ex foliis congeftis, fenfim in fquamas calycinias abcuntibus. Calyx ovarus, laciniis ex rim is foliiformibus, denrato-spinofis; interioribus membrahaceo- mucronatis , ad apicem urrinquc rocmbrana hyalina) crenata, icnfim decrefcenc in fquamis intimis. Hinc planta magis convenit cum Carduo. Receptaculum pilofum. Semina angulataj difci quoque pappofa. Pappus fctis membranaceis, fufcis.*

Malta' frequens in ruderaris. In Archipelago rario, & in Natolia vidi Cnicum hunc /minibus difci pappofis, radii dental is.

84. C. ACARNA; *foliis laneeolatis, deenrentibus, tomentofis, ad cxitum Jpinarum dentatis.*

DESCR. *Caulis multi-alatus, propter folia decurrenria Cfahjx lanatus; foliolis apice palmato - spinolis 5 iptimis incrnilms, ncutis. Sphw marginales triplices vel duplices, flavae. Receptaculum pilofum. Pappus plumofus. Semina obovata, lasvia, compreffa.*

Ad Dardanellos. Graec. "Ayfi ciyycc&o.

85. C. -HORRIDUS ; *jfloribus caruleis; caule Jpinofiffimo;*

DESCR. *Caulis ilibtrichotomus. Folia pinnarifida, margine spinofifTma, decurreria. Spinet in eque palmato-multiplices; unde caulis spinofifl-mus. Calyces cymofi, five terminales, conferti, fccfiles, foliolis inrcr- (E c) mixtis.*

mixtis. *Foliola calycina* longe mucronata > lateribus spinofa ; inrima faepe inermia, lanceolara. *Floret* cacruei. *Semen* ovato-compreffum, apice lanatum. *Pappus* foliolis 5 vel 6 membranaceis.

Ibid, frequens. Grac. Moivgócyyo&o vcl Xxpohipò. In *Rhodo* similem, fed minorem vidi.

g6. C. SPINOSISSMUSJ *caule lanato; foliis lanceolatis.*

DESOR. *Caulis* liblanatus, fuperne lanigerus, nc (l telis aranearum obduflus effet. *Calycis* foliola intima simplicia. *Folia* feſſiliq., lanceolata, ciliato* spinofa; denrato-pinnatifidaj radicalia, larc - lanceolata.

In dcfertis' *Kdhiriuis.*

57. ARTEMISIA SEMSEK ; *foliis multifidis, filiformib[us] viridibus, fubvillofis.*

Petioli tricjuctri. *Folia* gravcoknria; frequenter adhibita in uſus medicos. Cum *Abrotano* non bene convqnit hsc Artemifia.

K&hira horcends. Arab. Semfek vel IMfccka.

88. GNAPHALIUM *calycibus albis; foliis remotis, petiotatis, Juprapilos,* lanceolatis, integrity corymbo terminal?; *caule ramojo.*

89. G, *cahjeihu*s *cinereis* | *foliis linearibus, integris.*

50. G. *calycibus cinereis* | *foliis enneatis, obtufis* > *fubjinuatis.*

Kurm̄m.

51. G. *frutkofum; calycibus jffav-is, corymbojis, terminalibus;* *foliis linearibus, amplexicaui*

Kurmce. Arab. Scheratat. laLe^ū Bar ah: Sinde. *MAI Corymbus parvus > flavus.

52. G. ORIENT ALE j /o/f/ confertis, lanceolatis y villojis, amplexicaulibus, »ir-
ffz* fl/A/V; fragrantibus.

Hodie. Arab. Adhaun el kelb. أذون الكلب

93. ACHILLEA LOBATA; /O/«J villojis, linearibus, Jiibdentatis, apice fobatis.

Pknta annua. Corolla radio albo.

Alexandria?, rarior.

94. BUPHTALMUM MELITENSE; *calycibus acutt foliofis, pedunculatis* | *foliis lanceolatis, &j^ attenuate-petiolatis.*

OBS. Differt a *Bupbt. spinofe* floribus minoribus, polHcaribus; illius feſſquipoll. & rif^Mr fulvus-, noſh'i flavus. Illius flores feſſiles; hujus pedunculnti Si inoii c/i</ff & folia lenigera , & caulinā bafi late' aplex Mclitcnfis; . fubvinoia, pcciolatn. Illius caulis ftriatus^ hujus diffusus, gracilis. Utriusque folia & heinia^ calycis mucronata.

Malta in rudcratis frequens.



D I O E C I A.

j. PISTACIA TEREBINTHUS; *foliis impart-pinnatis, obovatis.*

ODS. *Foliola* ovato-lanceolata, decurrentia. *Europaris Tertibintbut* vocatur, fed flores non vidi. Ad vias & in kortis, plantatur ubique in *Natalia*.
Grace. ~~X/yes.~~

6. EPHEDRA FCEMINEA ?

DESCR. *Frutex* aphyllus. *Rami* fimbriati vel Ephedrse. *Pedimculi* oppofiri; interdum ex altera ala unicus; ex altera 3 vel 4 umbellarira. *Amenta* non adcrant; nam pedicel!} omnes ex ala prodeunt vel folitarii; vel umbellari. Rarissime ex uno articulo 4 rami verticillarim exhibant. *Flores* fcemineos tantum inveni; *Jlyli* 2. *Semina* 2.

In *Infula Imros*, *Pyrum* fcanclebat caule non volubili, fed totam coronam arboris implicabat. (cfr. Cent. VI. 64.)

P O L Y G A M I A .

ANDROPOGON ISCHJEMUM.

DESCR. *Caulis* erectus, fefeuifpith. femiteres, geniculis fufcis. *Folia* plana, utrinque villofa, vaginis compreffis, nudis. *Spica* terminalesi pedunculatae, producantes bine vel terns ex duobus geniculis fummi caulis, creftae, lineares. *Flores* conjugari. *Hermaphroditus* feffilisj gluma calycis exterior lanata. *Stamina* & piftih (ita inter glumam corollinam & ejus ariflam, quee fine dubio eft inftar gluma: corolla.¹ incerioris. *Stigma* plumofum, violaceum; ftylus nudus, flavefcens. *Flos* mafc. pedicello lanato; calyce glabroj corolla mutica.

Belgrad prope Conftantinop. In aquazdu&u magno > florens copiofe medio Augufti.

FICUS CHANAS; *Jycomoroides*; *foliis fcabris.*

ycomoro finiilis. *Fru&us* edulisj in maturis delapfis nullae Cynipcs repertrce.

Surdu&d in montofis. Arab. *Chanas* (JJUJA vel *Otfte*. جنة)

F. TOKAJ *joliis** dlfiiichis , fcabris, ovato-acutis, integrity alternis , petiolath.

'elkdn. Arab. *Toka*. تفجع

F. TAAB; *foliis conjuqatis; petiolatis, ovath, integrh| 4-politaribus.*

1 *Zebid*. Arab. *Tiicb*. ثعب

CONTENTA.

CONSPECTUS

F L O R J E O R I E N T A L I S ;

rioruia Eftacienfis & Melitenfls.	pag ¹ .	I.
Flora Conftantinop. Tenedos &o.	XV.	
Flora /Egyptiaca.	XXXVII.	
Flora Arabia: Felicis.	LXXIX.	

DESCRIPTION ES.

CENTURIA I.	Monandria.	Diandria.	Triandiia.	-	-	-	pag. i.
CENTURIA II.	Tetrandria.	Pentandiia.	-	-	-	-	39.
CENTURIA III.	Pentandvia: Nova Genera.	Hexandria.	Heptandria.	-	-	-	
	Oclandria.	Enneandria.	Decandria.	Dodecar.dria.	-	-	6 it
CENTURIA IV.	Icofandria.	Polyandria.	Didynamia.	Tetradynamia*	-	-	
	Monadelphia.	-	-	-	-	-	97'
CENTURIA V.	Diadelphia.	Polyadelphia.	Syngeneia.	-	-	-	129.
CENTURIA VI.	Gynandria.	Moncecia.	Diccia.	Polygamia.	-	-	155.
CENTURIA VII.	Cryptogaraia.	-	-	-	-	-	183.
APPENDIX:	Plant. Arab, indeterm.	-	-	-	-	-	194-
CENTURIA VIII.	Supplementum plantarum.	-	-	-	-	-	201.



1818